

D N.

LEON. FVCHSII,
MEDICI ILLVMINATI,
SCHOLÆ TVBINGENSIS
PROFESSORIS PVBLICI NEC
NON PRINCIPVM WIRTEN-
bergenſium Protophyſici,

Operum Didacticorum Pars I. & II.

Continens I. Institutiones Medecinae, ſive Methodum ad Hippo-
cratis, Galeni, aliorumq; veterum ſcripta recte intelligenda.

II. Libros De Humani corporis fabrica.

III. Medicamentorum omnium, præparandi, componendi, miſcendiq; rationem
ac modum legitimum, & e natiuis fontibus petitum.

IV. Omnium morborum a capite ad calcem vſque medelam.

V. Paradoxorum Medecinae Synopſin.

*Ab Auctore ipſo paulo ante mortem eius, reſectis mendis & erroribus pernicioſis, recogni-
ta, aucta & locupletata, luculentiffimiſq; annotationibus illuſtrata,*

CVM MEDICIS TVM PHARMACOPOEIS LONGE
vtiliſſimæ, & ſumme neceſſariæ;


Indice Rerum & Verborum ſatis locuplete donata.



PRODEVNT E COLLEGIO

Paltheniano, Quod eſt in nobili Francofurto.

M. DCIV.



HARDI PYCHSII, ARTIS MEDENDI

AD OCTISSIMO VIRO GEORGIO HIZLERO, GRAE
carum & Latinarum literarum in eadem Professore
habita & scripta.



AGNOSCERE vellem, vel cuperem potius: Rector magnifice, Comites & Barones generosi, clarissimi Doctores, Auditores nobilitate generis, eruditione & virtute ornatissimi: Maxime, inquam, cuperem, Deus Opt. Max. fecisset, ut clarissimum virum Leonhartum Fuchsum, Medicum & Philosophum præstantissimum, in inclita hac Schola valentem potius videre, & de hoc loco sæpe multumque adhuc dicentem audire potuissemus: quam ut eundem mortuum pro vetusto & iam olim recepto more oratione publice ornaremus. Tunc & præceptore, summis animi & corporis dotibus ornatissimo: Respublica præsidio salutari & præclaro ornamento non esset spoliata. Oporteret eum virum, qui annis triginta fuit collega consuetudine in eum amicus coniunctissimus, socius in dandis accipiendisque consiliis fidelem, ab immortalis Deo, omnia optime regente & gubernante, is nobis publice ereptus, & ex hac ærumnosa vita in celestem patriam euocatus non nostram deploremus: felicitatem, quæ iam in sempiterna vita, cum civibus fruatur, ei impediri non velimus: ad res præclaras & exemplo nos excitemus: memoriam denique sempiternam, cum summa gloria, & celebratione laudum & virtutum ipsius amplectamur, conservemus. Quæ sane voluntate & consilio Senatus huius Scholæ, in hunc celebratissimorum hominum conventum sum progressus. Doleo autem, cum orationem meam illius virtutibus nullo modo adæquari posse, quæ præclaræ fuerunt: ut vel optimus Orator, si eas non dico ornare veritate enarrare conetur, defatigari posset. Ego vero libenter agnosco, meo ingenio in me admodum esse exiguum, exercitationem dilatam: iudicium ita tenue, ut in hac clarissimorum hominum coronationibus, sine pudore dicere non possim. Veruntamen cum hoc imbecillitatis sit tribuendum: vos humaniter de me iudicaturos: hanc tunc operam pro vestra benevolentia singulari in optimam partem, & quædam de præcipuis huius viri, de universa re Mediceæ ornamentis dicentem (in quo omnis hæc mea versabitur oratio) bene spero atque confido: præferim cum me officiose, pie, & obedienter faciat. Porro, ut a principio omnia repetam: quo alios, qui præclarius id possunt, excitem, illique habeant, in quo stylum suum exercent: natus fuit Leonhartus Wendingæ, quod Rhætiæ est oppidum, pulcherrimo loco situm, quod nunc ad Bavaricam pertinet: anno salutis humanæ supra millesimum quingentesimum. Patrem habuit Ioannem, ex patre consulari eiusdem nominis. Matrem vero Annam, e Dentenorum consulari etiam familia natam. Familia ab omnibus civibus honestatis studiosa est habita. Uterque parens pietatis, & religionis fuit: in primis mater, probatis moribus & nota attendentia omnibus fuit commendata. Ac quoniam similes sui filios, parentum volunt: filium etiam optime instrui, & ad religiosam pietatem erudiri, ut Philolophus testatur, & c.

Vita & Mors

ἡ δὲ παιδεία καὶ τὸ πᾶν : non parum refert, hoc aut illo modo statim a pueris assuehieri. sed plurimum : imo vero in hoc sita est omnis vis. Itaque cum primum infantiz anni præterissent, & aduentare pueritia inciperet, mater honestissima mulier, ad literarum Magistros filium deduxit. Pater enim mortuus est, cum annum filius ageret quintum. Primum autem studiorum tempus in patria consumsit. Fuerunt illis temporibus inauspicati labores discentium. Cum enim illi, qui ætatem puerilem informabant, in docendo rationem fœdam, varietate vagam, obscuritate difficilem, sequerentur : fiebat, ut pueritia, docta, erudita, & eleganti institutione careret. In illa tamen conturbata docendi ratione, regularumque & præceptionum multitudine vasta, eiusmodi ingenii acumen in puero elacebat, ut magnam de se spem præberet omnibus. Quo magis reprehendendi sunt illi, qui hodie in tanta rerum omnium ad discendum occasione & facilitate, in summam negligentiam incurrunt : nec naturam suam artibus ingenuis erudiri patiuntur. Paulo post literarum studia aliquo modo a barbaris Magistris, & informatione fœda, vindicari coeperunt. Ideo cum literarum ludus Hailbrunnensis præ ceteris celebraretur : eique præesset vir bonus, bonarum artium Magister, Conradus nomine : ad pleniorum ingenii cultum, cura matris ac propinquorum, anno ætatis decimo missus est Hailbrunnum, quæ ciuitas est Imperii. Habebatur is Magister, pro illorum temporum conditione doctus : & certe eius integritatem, & in docenda iuuentute assiduitatem & fidem, multi prædicabant. Hic in ceteris auctoribus, quos explicabat ; Terentii optimi Latine lingue auctoris Comœdias, & Horatii odas in schola sua interpretabatur. Eo in loco ita se gessit Fuchsius : ut & Magister ingenium eius laudaret, & alii mirarentur. Annum verlatum in Schola Hailbrunnensi, Erphordiam Turingiæ ciuitatem est missus : atque in ludo, qui a D. Maria virgine nomen habebat, quod literarum studia in eo florent, dicendi artes, & varia Poetarum genera, magna diligentia & fructu audiuit. Sub hac disciplina cum annum & sex menses mansisset : ita ingenium & diligentiam suam omnibus approbatum : ut dignum iudicaret, qui ad præstantiores Magistros mitteretur. In hoc enim primo studiorum cursu, initio statim egregia quædam indoles in eo apparuit : acumen in percipiendo præclarum : ardor in dicendo talis : ut omnibus singularis & eximie virtutis & doctrinæ spem afferret. In publicam itaque eiusdem ciuitatis Scholam (Academiam vocant) se contulit : in qua exiguuo tempore tantum in literis & pietate profecit : ut Baccalaureus (quo nomine honorum initia in Academicis appellantur) fieret : eamque de se opinionem commoueret, ut aliis quoque docendis idoneus haberetur. Quare in patriam reuersus : consilio amicorum & cognatorum ludum aperuit. Quod munus Fuchσιο ideo demandabatur : ut studiis suis patriæ seruiret : sibi vero nomen compararet. Ac certe magna fide, diligentia, assiduitate, auditorum fructu, in patria officio suo annum cum dimidio est functus. Ceterum cum studium discendi ardens, & ambitio honesta, hortaretur eum, ut ad maiores dignitatis gradus contendendum sibi iudicaret (ad maiora enim natum fuisse euentus docuit) Ingolstadtum ad ampliorem ingenii cultum capiendum est profectus : anno salutis humanæ supra mille quingentos decimo nono : quo anno Carolus Austriæ Princeps, & Hispaniarum Rex, Romanorum Imperator est electus, annos vnde viginti natus : Mensis Iunii die vigesimo octauo : quo die Alexander Magnus a vita discessit Babylone, anno ætatis trigesimo secundo, ante Christum natum trecentesimo vigesimo tertio. Illo tempore totum se artium & Philosophiæ studiis addixit. Floruerunt eodem tempore Ingolstadii præ ceteris Ioannes Capnion : qui, quod vir bonus, pius, & trium principalium linguarum, Latine, Græcæ, & Hebræicæ, peritissimus esset : a Monachis & horum propugnatoribus grauissime vexabatur : itemque Iacobus Ceporinus, tribus etiam linguis vir eximie doctus. Hos præ ceteris audiebat, obseruabat, colebat : tum quod magnum horum nomen in viris doctis esset : tum quia intelligeret, eos recte de literarum studiis iudicare. Sæpe hi de conturbata & fœda multorum docendi via dicere : errores longe lateque diffusos exponere & iugulare : ruinam diuini cultus demonstrare, temporum morumque vitia indicare : sæpe optare & monere, ut Scholæ & Ecclesiæ recte constituerentur & emendarentur. Horum consilio & auctoritate permotus : ad Latinam linguam & Philosophiæ studia, literas Græcas, Fabium & Ciceronem imitatus, adiunxit.

D. Leonhardi Fuchsi.

adiunxit. Volentes enim præstantissimi auctores utriusque linguæ peritiā esse coniunctā. In his omnibus tantos breui tempore progressus fecit: ut Magistri liberalium artium titulum atque insignia assequeretur. Factum hoc est decimo septimo die Ianuarii, anno salutis humanæ supra millesimum quingentesimum vigesimo primo: quo Lincii Ferdinandus Austriæ Princeps, Ludouici Vngariæ Regis sororem, Annam duxit in matrimonium: Solimannus Turcarum Imperator Belgradum (olim Taururum, hodie alba Græca vocatur) Vngariæ propugnaculum cepit. Hisce temporibus maximus Theologus Martinus Lutherus, excitatus concionibus Pontificiorum declamatorum, cum scribere incepisset: Religio ad veritatem est reuocata. Fuchsius, quoniam optimum & salutare studiorum atque doctrinæ genus id esse iudicabat, quod suam industriam & progressus ad religionem & pietatē aggregaret: Lutheri etiam libros legere voluit. Ex his cum cognouisset: non quibuslibet hominum doctrinis habendam esse fidem: sed omnia expendi oportere: præterque eam doctrinam, quæ sita Prophetis & Apostolis relicta, non esse recipiendam aliam: Pontificum præstigias animaduertere & odisse, & mature amore veritatis, & refflorescentis doctrinæ flagrare cœpit: cuius rei postea documenta præclara dedit. Factus bonarum artium Magister, medendi arti perdiscendæ operam dedit, cuius Doctoribus & Professoribus diligentem assiduūque auditorem atque discipulum se præbuit: ita tamen, ut Græcarum literarum studia, a quibus Medicinam originem desumisse non ignorabat, coleret semper & amplecteretur. In hoc studio tantum breui tempore consecutus est: ut & hanc linguam optime calleret: & ne interpretes sequeretur, scriptores Græcos ipse legeret, ut sua lingua ipsos loquentes quasi audiret. Hac ergo diligentia, hoc instituto, hac assiduitate, magnam doctrinam paucis annis sibi comparauit: quam quotidiano labore, exercitatione, atque constantia ita auxit: ut solenni more honores, quos Doctores vocant, anno supra mille quingentos vigesimo quarto, Calendis Martii, consequeretur. Atque ita paucis annis, per omnes Scholasticos honores ascendendo, omnibus est ornatus: & ita ornatus: ut non inane nomen haberet, sed doctrinam præclaram, eruditionem excellentem, laboriosissimo literarum studio comparatam. Porro cum magni ingenii excellentisque animi sit, studia sua ad vtilitates publicas & hominum salutem referre: Doctor noster, ut & ipse multos iuaret, Monacum, Bavaricæ ditionis ciuitatem, est profectus: vbi maxima dexteritate, & multorum salute, artem medendi factitauit. Hoc tempore de vxore ducenda, quæ rei familiaris curam gereret, deliberare cœpit. Et si enim ita inde ab adulescentulo vixisset: ut liber ab omni cupiditate & libidine semper esset visus: nec de eius temperantia & continentia boni viri dubitarent: tamen cum vitam cœlibem grauib. de causis improbaret: amicorum consilio, primam vxorem, Annam Fridpergeram duxit: puellam virginem honestissimam, natam honesto loco, bene educatam, cum qua in matrimonio castissimo annis multis coniunctissime vixit: & utriusque sexus liberos suscepit decem, filios quatuor, & sex filias. Paulo post Monaco relicto, rursus Ingolstadtium se contulit: & quia cupidissimus literarum erat: & quia eius opera ad docendam medendi artem expetebatur. Venit Ingolstadtium anno salutis nostræ millesimo quingentesimo vigesimo sexto: die vigesimo tertio mensis Maii. Hoc suscepto munere, cum biennium Ingolstadii docuisset summa cum fide ac diligentia: ab illustrissimo Principe, Georgio Marchione ad exercendam medicinam, honorifico salario Onoltzbachium accersitus fuit: anno supra mille quingentos vigesimo octauo, die decimo octauo mensis Maii. Vnus est multum eius opera & consilio, motus fama viri, & re ipsa confirmatus, is, de quo dicimus, Marchio. In curando enim eam diligentiam & industriam adhibuit semper: ut Deo fortunante iuaret plurimos. Non possum silentio hoc loco præterire, quod memorabile videtur: ex quo eius in curando industria apparebit. Anno salutis humanæ supra millesimum quingentesimum vigesimo nono, quo Turci Viennam Austriæ obsederunt: nouum genus morbi Germaniam inuasit. Homines enim sudore pestifero affecti, intra vigesimam quartam horam, aut ex hac vita demigrabant: aut, si virus exsudassent, valetudinem pristinam paulatim recuperabant. Ea grassante lue, quia remedium multis erat incognitum, multa perierunt millia. Illo tempore Medicus hic noster, Dei æterni propitio fauore, pro sua solertia, vitam multorum con-

Vita & Mors,

seruauit. Ex quo, non tantum fauorem & charitatem multorum, sed laudem quoque & admirationem a præstantissimis ea facultate viris est adeptus. Morbus ille vulgo dicebatur sudor Anglicus. Nam Henrici septimi Britanni Regis primo, qui fuit salutis humanæ supra mille quadringentos nonagesimus sextus, eadem lues insulam illam inuaserat. Ita autem eo in loco medicinam exercebat: vt literarum studia nunquam intermitteret. Cum enim studiis & laboribus suis non solum Principi & præsentibus prodesse vellet: verum etiam alios iuuare cuperet: medicinam scriptis multis in lucem emissis, tum illustrare cepit. Exstant eius lucubrationes vtilissimæ, annis illis quinque, quibus Onoltzbachii cum Marchione fuit, ab eo scriptæ, quæ valde probantur doctis: quæ hic recensere non alienum videtur: vt intelligatis ipsum mature medendi artem illustrare cœpisse. Sunt autem hæc, dum Onoltzbachii fuit, ab eo scripta: Compendiaria ac succincta admodum in medendi artem *εισαγωγή* siue introductio: Liber sextus Epidemiorum Hippocratis e Græco in sermonem Latinum translatus, cum commentariis luculentissimis: Apologia aduersus Hieremiam Truerium Brachelium Medicum Louaniensem, qua monstratur, quod in viscerum inflammationibus, pleuritide præsertim, sanguis e directo laborantis lateris mitti debeat: Paradoxorum Medicinæ libri tres, in quibus multa, a nemine hætenus prodita, Arabum ætatisque nostræ Medicorum errata confutantur: & obiter Sebastiano Montuo Medico Riuriensi responderetur. Sub idem tempus gubernatio Academiæ Ingolstadiensis, clarissimo Iurecōsulto Leonharto Eccio, a Guilhelmo Bauariz duce, commissa fuit. Is quod Fuchsum Medicinæ virum peritissimum iam ante cognouisset, effecit: vt iterum ad docendam Medicinam vocaretur. Factum hoc est anno supra mille quingentos trigesimo tertio. Sed eo cum venisset: quod missarum nundinationes improbareret: & Euangelii doctrinam sanam, quam ex nostrorum scriptis didicerat, & in qua Onoltzbachii confirmatus fuerat, maxima constantia profiteretur: & Cœnam integram, vel, vt loquuntur, sub vtraque specie, omnibus communicandam iudicaret: docendi munere fungi non potuit. Et si enim illis, qui Ingolstadii tum erant, hominis excellens eruditio cognita, isque ea institutus disciplina erat: vt bonorum gratias iam ante sibi conciliaffet: habuit tamen prope omnes, quod humana potentia & pontificia tyrannide niterentur, & magnopere confiderent, importunos: præter Leonhardum Eccium Iureconsultum, qui eum defendebat: tum quia virum doctissimum esse sciret: tum quia iniustissimam causam inimicitiarum vel potius odii, esse animaduerneret. Nihil enim aliud ipsos ad malenolentiam prouocarat: quam quod firmus & immotus in doctrina Euangelii pura defendenda persisteret: eos summo studio & diligentia ad eandem hortaretur: ad correctionem vitæ morumque commoneret. Saluberrimum consilium hoc fuit. Sed plus apud eos superstitio & cupiditas ad odium valuit: quam ad amorem & obseruantiam, tanti viri eruditio & doctrina. Itaque cum turbulentis consiliis oppugnare optimum virum non cessarent: & seditiosis clamoribus rem agerent: Fuchsius mendacio atque adulationi, libertatem & veritatem magno etiam suo periculo ante posuit. Eodem ergo anno, quo redierat, iterum discessit Augusti mensis die nono. Prima namque viri boni laus est, mortem pro religione, si necessitas postulet, oppetere: proxima excedere iis locis, in quibus sine impietate consistere non licet, & emendatio vitiosæ disciplinæ atque doctrinæ præfractæ recusatur. Sed vt reuertar, vnde non nihil digressus sum, Fuchsius Ingolstadio cum discessisset, Onoltzbachium iterum, a Marchione vocatus, se contulit. Vnde quod oppido pestilentia malum esset infestum, mox Culmbachium, cum Fridrico Marchione seniore, patre Georgii, reliquaque Marchionum familia, cum suis se conferre coactus fuit. Ibi ultra annum commoratus, rediit Onoltzbachium, anno supra mille quingentos trigesimo quarto: quo Rex Persarum (Sophum vocant) duplici clade Turcos in oriente affecit. Hætenus breuiter cōmemoravi, quæ Wendingæ, Hailbrunni, Erphordiz, Ingolstadii, & apud Marchionem egerit Fuchsius: restat, vt reliquæ vitæ, a qua maximarum & amplissimarum virtutum exempla peti possunt, cursum enarremus. De qua rogo vos, vt me pauca dicere & quo animo patiamini. Ad hoc ipsum fere tempus Illustrissimus Princeps D. Ulricus celeberrimæ memoriæ, nostri Principis pater, recuperata iam ditione sua, Pontificiam superstitionem repudiare & abole-

re, &

D. Leonhardi Fuchsi.

re, & Ecclesias iuxta verbi diuini præscriptum constituere cœpit. Ac quoniam cognouerant, veam Religionem miris subinde artibus & machinis aduersariorum oppugnari: ea, quæ sapientia fuit, facile vidit: ditioni suæ florentissimæ, nisi præcaueret, paulatim de uturos non Theologos modo, sed Iureconsultos etiam, Medicos, ceterarumque disciplinarum Professores, quæ hominum genera semper necessaria sunt Rebus publicis. Itaque ut aliquod esset remedium contra mala, quæ impendere videbantur accersitis viris doctissimis, & conductis honorificis salariis, Academiam hanc nostram auxit, cumulauit, ornauit. Illo tempore, cum Medici nostri virtus & doctrina excellens, publica fama commendaretur: optimus Princeps eius quoque operam liberali salario conduxit: & suæ Academiæ adiunxit: a quo tempore semper eum benignissime est complexus Princeps. Patris vestigiis filius etiam, illustrissimus, & præstantissimus pietate, virtute, sapientia Princeps, D. Christophorus, dominus noster clementissimus, insistens: propter viri doctrinam, multarum rerum experientiam, inque iudicando prudentiam, Fuchsiū dilexit & magnificet, neque solum in primis Medicis habuit, sed eius etiam salarium amplificauit. Quo etiam tempore summus Theologus Ioannes Brentius Hala Sueuorum, ut de Academiæ constitutione, eo etiam præsentē deliberaretur, ab eodem Principe Ulrico est accersitus. Huius annua opera & Ecclesiæ & Scholæ utilis & maxime salutaris fuit. Sed de illo hoc loco plura non dico: ne aliis dicere adulanter, aliis blandiuscule videar, tamen si vere. Cum Tübingam venisset Fuchsius, (venit autem eo mensis Augusti die decimo tertio: anno salutis nostræ millesimo quingentesimo trigésimo quinto) & munus suum in Schola suscepisset: celeriter consecutus est multorum admirationem: & hæc Academia cœpit tunc mirabiliter frequentari & celebrari: tum propter alios doctissimos viros, (ex quibus nonnulli in hoc publico sunt conuentu,) tum propter hunc Medicum nostrum præstantissimum. Nam, Deum immortalem, quam amans honestatis, religiōis pietatis, & cœlestis veritatis semper fuit? Quæ animi magnitudine & constantia? Quo studio, diligentia, assiduitate, in docenda iuuentute? Quam exquisita optimarum literarum cognitione & doctrina? Quam studiosus Reipublicæ? Quæ mentis integritate? Quæ fide, & consiliorum prudentia in negotiis publicis? Si conarer omnia persequi, me non solum tempus, sed etiam vires deficerent. Xenophon, Plato, & alii cōmentarios quosdam de illis, quæ Socrates egit, quæque dixit, confecerunt (ἀπομνημονεύματα vocarunt) utilia profecto, & omnium cognitione digna. Sed si omnia Medici & Philosophi nostri dicta atque facta colligerentur: cum Socratis consiliis componere vsu, prudentia, religiosa pietate, non dubitarem. Sunt enim nostris temporibus, & Ecclesiæ Christi accommodatiora. Etenim si virtutes, quæ in Philosopho & Medico Christiani nominis inesse debent, considerentur: an non tales illæ in eo exstiterunt: ut non apud nos, & in Germania solum: verum etiam apud exterarum gentes & nationes in regionibus remotis, sint notæ? Ut enim a Religione & pietate erga Deum (vnde tanquam ex fonte, omnis veræ virtutis & sapientiæ principium dimanat,) initium sumam: Religione vera & pietate nihil habebat prius Fuchsius, aut antiquius: huius amore sic flagrabat, ut semper eam admirabili constantia colendam statueret: ab hac in omnibus actionibus principium sumebat: huic primam, huic postremam diei horam tribuebat: Contrariam veræ pietati doctrinam, non verbis tantum, sed re ipsa etiam condemnabat, etiam tum, cum esset summum periculum. Præclare Metellus dixisse fertur: Improbe facere, proprium esse sceleratorum hominum: Recte agere, si absit periculum, aut utilitas etiam inuitet, commune bonis cum malis: Laudabiliter autem facere, quando cum facto honesto periculum aut incommodum coniungitur, peculiare esse bonis & fortibus viris. Laude digna Metelli oratio. Virtus enim iis exercitationibus nitescere vult: quæ cum molestis societatem habent, atque cum periculo sunt coniuncta. Eadem laus nostro etiam Medico recte tribuitur. Non enim solum in pace, otio, & reipublicæ tranquillitate, veræ pietatis studiosissimus fuit: sed & in sæuissimis tempestatibus & fluctibus, puram doctrinam, in qua institutus, & sacrorum librorum lectione confirmatus erat, palam est professus, ac acerrime propugnauit. Testis est constantia Ingolstadiensis. Testes sunt superiorum temporum, post bellum sociale, perturbationes & periculosi motus. Testis est liber ille, nescio, quorum

Vita & Mors,

mercenaria opera confectus, vulgo Interim dictus: quod præscriberet, qu'il interim, dum Concilii decreta publicarentur, seruandum esset illis, qui falsam doctrinam, vitiosos cultus, atque ritus in suis Ecclesiis sustulissent. Hæc formula cum vrgeretur, tum minime clementer: multi, inprimis Ecclesiæ Doctores, qui eam, quod contraria veritati, & ex mendaciis, & horrendis nominis diuini contumeliis conflata esset, non approbabant, misere afflicti & vexati fuerunt: alii loco moti, alii eiekti, alii reuincti catenis in custodiam dati. In his quasi procellis, studiis hominum huc illuc inclinantibus, animisque formidine concussis & occupatis: Fuchsius noster, vt initio Evangelii doctrinam Ingolstadii maxima constantia professus fuerat: ita & tum, in ista, dico, tempestate, nullius periculi terrore vel metu induci potuit: vt de veritatis cœlestis & sanæ doctrinæ studio quidquam remitteret. Erat enim robore animi, & constantia singulari munitus: & tam in rebus aduersis, quam secundis, in sincera doctrina defendenda constantissime perseuerabat. Ceterum cum religionis amantissimus fuisset semper: tanta fuit in viro grauitas: vt nihil aut in verbis, aut in factis sentiretur: quod non vel morum disciplinæ & literis, vel aliorum commodis, vel publicis vtilitatibus inferuirit: nihil leue, nihil ineptum: prudentes & piæ cogitationes: profana omnia dicta & facta fugiebat. Quibus omnibus quantam auctoritatem sibi comparauerit, non attinet dicere. Sunt hæc magna. Quid cetera? In docendi munere, quanta sedulitas, fides, diligentia? Duabus autem maxime rebus in docendo necessariis, summam consequebatur laudem: tum illa artium via, quæ ^{per se} a Græcis dicitur: tum sermone puro, perspicuo, & aperto. Nam in explanandis Medicorum scriptis, primum expeditissimam & vtilissimam viam cognoscere & inire: nihil a re alienum asferre: verba sensumque genuinum diligentissime explicare: non diutius hærare & immorari, quam res, quæ ad cognoscendum exponebatur, requirere videretur: eorum, quæ necessaria ad explicandum erant, nihil omittere. Deinde tam pure, tam aperte, tam simpliciter omnia tradere, vt facillime omnes assequerentur. Itaque non tam ordine & modo, quem seruabat, optimo, quam orationis elegantia animos auditorum conciliare, ita vt cum fastidio ipsum audiret nemo. Huius rei inter multa alia, exemplum potest esse anatome: quam docuit dexteritate & perspicuitate singulari. Humani enim corporis partes, & singularum partium actiones & figuras ostendebat: omnium ossium, cartilaginumque naturam, musculos, venas, arterias, neruos, & cetera indicabat, & oculis subiiciebat: ac quasi contrario ordine, quam eo, quo factum est, corpus resolvebat. Quo nomine magni nominis Medicum, & anatomes illustratorem, Andream Vesalium Bruxellensem magnificiebat: quod ante illa tempora nemo eo exquisitius, aut industria maiore, partes humani corporis, & singularum actiones, situs, figuras annotasset, & ante oculos posuisset. Vesalius non modo Fuchsium vicissim diligebat: sed tanquam annis superiorem colebat, obseruabat, verebatur. Natus enim est Vesalius anno humanæ salutis supra mille quingentos decimoquarto, calendis Ianuarii: quo anno Persarum Rex Turcas in maiori Armenia magna strage vicit. Verum vt ad Doctorem nostrum reuertar: tanta fide, studio, & diligentia, munere docendiungebatur: vt, cum sæpe occasiones, quibus ad quæstum & opes via patefiebat, offerrentur, nunquam ab officio suo se auocari passus fuerit. In ætate etiam iam graui, cum Senatus permissu a docendo vacare ei licuisset, muneri & officio suo præfuit diligenter. Quid? Cum vltimis mensibus propter infirmitatem valetudinis abstineret a publico, auditores domi suæ instituebat. Habemus, auditores, in hoc Professore nostro exemplum diligentia, quod imitemur omnes. Neque vero solum ea virtute præditus erat, vt vellet suam pulcerrimam artem excolere & amplificare: sed doctrina etiam in eo fuit tanta, vt posset: Quam, pulcerrimis illis virtutibus, quæ studioso homini necessariæ sunt, consecutus erat: temperantia in voluptatibus, incredibili admirabilique studiorum constantia, & diligentia cum laboribus maximis coniuncta. Sine his etiam magna ingenia non longe progrediuntur. Nulla enim concordia studiis doctrinæ & sapientiæ, cum negligentia, mollitie & prauitate intercedere solet. Itaque in Bibliotheca, & inter libros, inquirendo perpetuo versabatur. Inprimis vetus illud & nobile præceptum semper sibi tenendum putabat: vt temporis

D. Leonhardi Fuchsi.

poris quam maximam rationem haberet. Vnde semper aliquid vel audiendum, vel legendum, vel scribendum, vel cogitandum, vel querendum iudicabar. Quam ob causam in literis labores suscipiebat, perterebarque incredibiles: in eo non priuata vtilitati consulens, sed publicam vtilitatem spectans. Quo etiam nomine omni laude est cumulandus. Alexander ille Magnus cum literarum laudem cum militari gloria coniungere vellet: discendi eas cupiditate inflammatus, sumtus magnos fecisse: & Aristoteli sexcenta talenta ad omnis generis animalia conquirenda, ex quibus multiplicis naturæ vis cognosci posset, dedisse fertur. Sed doctrinam hanc sibi peculiarem, neque cum aliis communicatam voluit. At in nostro Medico longe diuersum studium. Cum enim bonum tanto melius esse, quanto cum pluribus communicaretur, sibi persuasisset: laborum suorum fructus ad multos peruenire voluit. Itaque nihil præclarius esse existimauit, quam omne studium atque ingenium ad illam artem illustrandam conferre: quæ omnibus salutaris, & vsui mortalium maxime necessaria. Quare vt Onolizbachii, ita & Tubingæ, edidit in lucem scripta plurima, spectatæ eruditionis atque scientiæ: quæ eum de vita hominum optime meritum esse declarant satis. Hi autem libri, dum in hac schola versatus est, ab eo euulgati, & in lucem emissi sunt: Hippocratis Epidemiorum liber sextus, recognitus & auctus plurimis in locis: Apologiæ tres, quarum prima aduersus Gulielmum Puteanum docet, Alben aperire ora venarum: altera, aduersus Sebastianum Montuum, nonnulla Paradoxorum capita defendit: tertia in internis inflammationibus, pleuritide præsertim, e directo partis affectu sanguinem mittendum esse ostendit: Explicationum difficultium aliquot questionum, & hodie controuersarum, libri quatuor aucti & locupletati: Medicinæ methodus seu ratio compendiaria perueniendi ad veram solidamque medicinam, mirifice ad Galeni libros recte intelligendos utilis: item de vtitata huius temporis componendorum miscendorumque medicamentorum ratione libri tres, iis, qui praxin medicam exercent, maxime necessarii: Annotationes in libros Galeni de tuenda valetudine: De sanandis totius humani corporis eiusdemque partium, tam internis, quam externis malis, libri quinque, accurata diligentia conscripti: De historia stirpium commentarii insignes, adiectis earundem viuis plus quam quingentis imaginibus, nunquam antea ad naturæ imitationem artificiosius effectis: Accessit succincta vocum difficultium & obscurarum, passim in hoc opere occurrentium explicatio, idque latina & populari lingua: Apologia aduersus Gualtherum Ryffium: Hippocratis Aphorismorum sectiones septem, e Græco in Latinum sermonem conuersæ, & luculentissimis illdemque breuissimis commentariis explicatæ: adiectis annotationibus, in quibus quotquot sunt in Galeni commentariis difficiles loci, explicantur: Apologia aduersus Cornarium: De curandi ratione libri octo, causarum signorumque catalogum breuiter continentes: Nicolai Myrepsi Alexandrini, medicamentorum opus in sectiones quadraginta octo digestum, e Græco in Latinum conuersum, luculentissimisque annotationibus illustratum: Galeni aliquot opera latinitate donata, & commentariis exposita & illustrata: vt pote de inæquali intemperie libro primo de differentiis & causis morborum & symptomatum libri sex: De iudiciis libri tres: De curatione per sanguinis missionem liber vnus: De temperamentis libri tres: De differentiis febrium libri duo: De laborantium locorum notitia libri sex: Tabulæ sex in Galeni libros de morborum causis & symptomatibus: Tabula in librum de curandi ratione per sanguinis missionem: Tabulæ aliquot, vniuersæ medicinæ summam & diuisionem compendio complectentes: De compositione medicamentorum libri quatuor, aucti & diligenter recogniti, adiecto dispensatorio, vt vocant, qui liber antea desiderabatur: Libri quatuor de fabrica humani corporis: Institutionum medicinæ, ad Hippocratis, Galeni, aliorumque veterum scripta recte intelligenda, mire vtilis libri quinque: qui aucti, & summa cura & diligentia recogniti, iam iterum in lucem emittuntur: Libellus, num morbifica aliqua de Galeni sententia sit causa continens. Post mortem in Bibliotheca reperti sunt hi libri, qui edentur ab heredibus: Commentarii illi, quos hactenus auidissime expectarunt omnes de stirpium historia, in tomos tres, incredibili magnitudine digesti: ætate extrema a sene (mirum) propria manu scripti & confecti: stirpium icones continentes plures, quam mille

Leonhardi Fuchsi
de historia
stirpium
opus iussu
g. c.

Vita & Mors,

quingentas. Hoc opere solertius, ingeniosius, laboriosius, & præclarius, in hoc genere hætenus visum esse nihil, confirmare non dubito. Sed plura de eo hoc loco non addo. Nam breui, ubi in lucem emissum fuerit: non modo expectationem diuturni desiderii omnem explebit, sed etiam longe superabit. Item Paradoxorum libri tres, correcti & aucti: Commentarii in aliquot libros Galeni de simpl. medica. facultatibus: Libellus, quod iecur sit sanguificandi primarium instrumentum: Commentarii in libros Galeni de medendi ratione XIV. Commentarii in sextum Epidemicorum, libri etiam de medendi ratione aucti & emendati: Annotationes in libros Galeni de Compos. medicamentorum localium, & id genus alia. Hæc & alia abunde satis demonstrant: Fuchsiū propter labores maximos, & hoc de genere humano bene merendi studium summum, laude sempiterna, & amplissimis virtutis præmiis, quibus ortus est, magnorumque virorum commendatione fuisse dignissimum. Veteres præclare de vita humana meritos in Deorum numerum referebant. Vnde etiam tam multiplex gentilium Deorum turba originem sumsisse videtur. Sed quam pauci reperiuntur, quibus tam splendidum diligentiz, laborum, eruditionis, virtutis, maximorumque in rempublicam meritorum testimonium tributum sit: quale est hoc, quod nostro Philosopho est datum? Cum enim potentissimus Imperator Carolus V. tantam viri doctrinam magnifico testimonio dignam iudicaret: insignia & ornamenta nobilitatis, non petenti, & recusanti etiam, obtulit. Grauiissimum hoc sapientissimi Imperatoris de meritis Fuchsi in rempubl. præclarissimis, iudicium fuit. Fuit tanta virtus, tanta eruditio, fuerunt tanta merita, tanti Imperatoris comprobatione digna. Hac multarum rerum scientia in nobilium & principum virorum notitiam peruenit, non in Germania solum, sed etiam apud gentes exteras, in regionibus remotis. Hac a Tuscorum Duce Cosmo Medice, oblato honestissimo & amplissimo annuo sexcentorum coronatorum stipendio, ut in Pisana Schola publice Medicinam doceret, humanissime sæpe inuitatus fuit: quod hætenus paucis admodum Germanis contigit: ut ex superiori Germania, in Italiam eruditissimis in omni disciplinatum genere hominibus, liberalissimisque studiis affluentem, in tantam spem vocarentur. Hac amicitiam cum doctissimis viris, qui vel nostra memoria vixerunt, vel adhuc viuunt, coniunxit & coluit: quibus charus, gratus, & reuerendus fuit: omniumque seculorum posteritas huius viri laudum immemor non erit. Neque solum in Bibliotheca, & inter libros, tantus erat: sed & in publicis negotiis gerendis industria admirabili, & gravitate spectata. Hac de causa gubernatio Academiæ semestris ei commissa fuit sæpius. Quod munus quoties administrandum suscepisset, ita se gessit: ut grauiissimi & sapientissimi Magistratus auctoritatem tueretur. Ciues, ut filios, paterno amore complecti ac tueri: affectos iniuria subleuare: vim vlcisci: bonos laudare: negligentes excitare: officium facientibus præsidio & auxilio esse: contumaces cuiuscunque essent ordinis, terrire minis: pœnis afficere: omnes pari & æquissima iuris moderatione complecti: omnes in officio continere: omnibus ius suum tribuere. Ob hanc prudentiam, gravitatem, rerumque usum, eius collegii, quod ab optimo Principe Vtrico constitutum, a filio, Duce sapientissimo locupletatum, & liberaliter ornatum est, (in quo adolescentes egregia indole, maximis sumtibus, quo Ecclesiis pastores idonei non desint, nutriuntur,) præ ceteris commissæ sunt rationes: quod administrasse ipsum summa cum fide ac diligentia, & ad tolerabilem mediocritatem reuocasse, nemo ignorat. Ob hanc eandem viri excellentem virtutem & industriam: Scholæ Senatus & illius contubernii (quod ab Auctore Martinianum dicitur) administrationem ei commisit: cui ita præfuit, ut in ordinem redigeret omnes. In his occupationibus publicis ita verlabatur: ut semper literarum amor maneret, earumque studia desereret nunquam. Ut enim Vlysses (quem Homerus Græcorum prudentissimum fecit) in asperis saxis Ithacam suam, in omnibus & laboribus & æumnis cogitabat: ita Fuchsius semper ad Bibliothecam rediens, & in maximis occupationibus, doctrinæ studia nunquam intermittebat: ut nisi in literis viueret, vivere haud posse videretur. Quam in re imitatores & æmulos habet non plurimos. Etsi enim permulti ingenii acumine præditi & celeritate ad intelligendum sunt ornati: alii tamen inertissimum & desidiosissimum otium sectantur: alii voluptate mollescent: alii, si hæc evitare possunt, ad quætuosas artes

D. Leonhard Fuchsi.

se conferunt, antequam puerili disciplina & institutione sint enutriti & eruditi. Agē vero, quanta omnibus in rebus mentis integritate erat? Sicut veritatis cultor, ita fraudis inimicus fuit: nihil simulabat prorsus. Fuit in antiquissima & prudentissima Athenarum vrbe Solon legislator: qui sapientiæ gloria maxime in Græcia floruit. Is tamen, vt id, quod cupiebat, sine periculo suo obtineret: stultitiam simulasse dicitur. Noster Philosophus nihil simulate, nihil astute, nihil insidiosè: omnia sincera, simplicitia, libera, aperta. Cuius ergo viri, Auditores, maior laus esse potest? Inter tot vigilias, labores, lucubrationes & occupationes quotidianas (de quibus hæcenus, quam breuissime potui, dixi) valetudine ita comoda & integra est usus: vt ante grauissimum illum morbum, quo sublatuſ est, nullum admodum corporis morbum senserit. Huic vxor Fridpergera cum summa diligentia & sollicitudine inserviebat: mores suos ad mariti ingenium accommodabat. Ex quo amor in matrimonio constans & firmus semper exstitit. Verum, quæ conditio est rerum humanarum, quo tempore Medici nostri valetudini, maxime vxoris diligentia & cura fuisset opus: Coniunx charissima, grauissima & optima fœmina, anno supra millesimum quingentesimum sexagesimo tertio, mense Februario, mortem obiit, sibi quidem felicem, (nam inuocatione filii Dei feliciter e vita demigravit) suis autem, & potissimum seni nostro, acerbissimam. Quid mirum? vxorem amiserat, cum qua multis annis coniunctissime vixerat: eamque ob virtutes multas vehementer dilexerat. Sed tamen, quo erat animi robore, summum illum dolorem fortiter ferebat: moeroriquē resistebat. Fortitudo enim in omni vita talis in eo fuit: vt in vultu, cogitationibus, in ore, & omnibus actionibus eluceret. Ceterum cum res domesticæ & familiares, senem, quam longissime, & latissime suam artem diffundere cupientem, impedire viderentur: quo minus lucubrationes suas, præcipue autem illud opus pene diuinum (de quo paulo supra mentionem fecimus) de stirpium historia, recognoscere & conficere posset: anno sequenti, valetudinis & occupationum suarum rationem habēs, alteram duxit vxorem: in re domestica adiutricem: viduam, matronam honestissimam, admodum religiosam, matrem familias bonam, senisque nostri valetudini accommodatam. Hanc antea in matrimonio habuit optimus vir, Michael Gretterus, Pastor Ecclesiæ in Salinis Suevicis, pietate præstantissimus. Fecit, ad quod eum non libido, sed necessitas impellebat. De temperantia enim, modestia, & continentia, testis est vita, a primis statim annis per omnem ætatem acta. A pueris namque ad modestiam, temperantiam, sobrietatem, diligentiam, & labores se assuefaciens: vt frugilitatem amauit, ita vitam delicatiorē, molliorem, & luxui deditam fugiebat: D. Basiliū concionem secutus: *ἄνθρωπος ὁ ἀνθρώπων, οὐχὶ τῶν ἀνθρώπων*. Nec imitabatur eos, qui in cōpia, & rerum affluentia sumtibus profusis viuunt, patrimonium profundunt, fortunas abligerunt: sed cum aliquando in adolescentia, pecunia non abundasset: eam postea custodiendam, & ad necessarios vitæ usus seruandam, non profundendam iudicauit: cui tamen ita semper pepercit: vt legitimos & honestos sumtus facere recusaret nunquam. Quid multis? Cum semper a voluptatum illecebris disiunctissimus fuisset: summa erat eius in victu temperantia. Vtinam mihi hac in parte, tanta dicendi facultas & copia esset: vt hanc pulcerrimam & maximam virtutē, (temperantiam & modestiam dico) ea commendatione, quæ potest esse diligentissima, omnibus commendare possem. Eius enim vis, natura, & utilitas, ita se late explicat & diffundit: vt vix vlla virtus magis in vita humana necessaria videatur. Tenet enim modum in omnibus, quæ fiunt, quæque dicuntur: quem ultra citraque nequit illud, quod rectum appellatur, consistere. Quid, quæso magis commendat Christiani nominis homines, quam grauitas in vestitu? constantia in prætermittendis corporis voluptatibus? in edendo bibendoque frugalitas? In hac virtute summum decus & ornamentum consistit: hæc ad summa dignitatis fastigia euehere potest: hæc est, quæ ex infimo loco ad summum homines deducit: hæc ex obscuris nobiles reddit: hinc omnis pendet vitæ honestas: hinc actiones rectæ & laudabiles oriuntur omnes. Siquidem qui turpiori intemperantiæ, omnium perturbationum matri, dediti, immodicis epulis & potationibus indulgent: facultates suas absorbent: contrahunt æs alienum: bonitatem ingenii vitiis corrumpunt. Et quod maximum est, religionē colere, diuini numinis misericordiam implorare nō possunt. Quare

Vita & Mors

hanc virtutem anteponamus rebus omnibus: omni cura, studio, animi contentione, hanc apprehendamus, colamus, foueamus, reuereamur. Nisi multa propter breuitatis & tēporis rationem prætermittenda existimarem, proferrem copiam exemplorum in vtranque parrem, tam ex Græcis, quam ex Latinis Scriptoribus: quibus demonstrarem, non respublicas tantum, sed priuatos etiam, & inferioris ordinis homines, duce modestia, ad magnos honores, ad magnam potentiam peruenisse: contra, eiusdem neglectu periisse misere. Sed temperantissimi Medici nostri exemplum ob oculos nobis ponamus: qui huius virtutis cultu eo peruenit: quo ipsum peruenisse admiramur omnes. Idem adiutrice hac diuina virtute sibi corporis robur, & valetudinem integram, supra annos sexaginta conseruauit, eadem duce, corporis sui eximiam formam coluit & exornauit. Fuit enim, (vt de illo naturæ beneficio, quod a Philosophis in felicitatis partibus numeratur, egoque fere præterieram, breuiter dicam) fuit Fuchsius egregia & liberali figura, & statura appositæ ad dignitatem, cum aperta & venusta membrorum conformatione. Vox magnæ viro & Philosopho digna, grauis, clara, plena. Motus corporis & incessus, neque languens, neque concitatus, neque insolens: sed plane talis, in quo nullæ ineptiæ inessent. Magna hæc, magna esse fateor. Sed, quæ longe maiora, hanc corporis dignitatem, indolis elegantia ita cohonestabat: vt animi pulchritudo, ipsa corporis forma & elegantia, venustior esse crederetur. Gratiior enim est (vt Poeta testatur) pulchro veniens e corpore virtus. Et sane ex eius vita per omnem ætatem acta facile apparet, singulari naturæ & ingenii bonitate, egregiaque & præclara indole, præditum fuisse: quam a parentibus secum in hanc lucem attulerat. Et si enim apud Homerum Telemachus paucos parentum similes esse affirmat, inquit: Πάῦροι γάρ τοι παῖδες ὁμοιοὶ πατρὶ πέλονται: οἱ κλέοντες χάριν, πᾶσι δὲ τι πατέρες ἀρίεις. Id quod interdum fieri solet? sæpenumero tamen, vt robur, forma, valetudo, aliaque corporis comoda sunt hereditaria sic & sanctissimarum virtutum, hereditatem liberos a parentibus accipere sæpe videmus. Sic Polemarchus non solum bonorum, sed etiam paternæ virtutis κληρονόμος a Platone inducitur. Sic Fuchsius maiorem virtutem tutatus est: neque solum tutatus est: sed ita etiam auxit: amplificauit, & illustrauit, bonitate ingenii, industria, diligentia, doctrina, consiliorum prudentia, & omnis virtutis, sapientiæ, religiosæque pietatis studio: vt familiæ illius laudes inter morituræ sint nunquam. Atque hic cursus vitæ fuit. Reliquum est, vt de morte eiusdem quam breuissime exponamus. Cum in rebus optimis, de quibus hætenus est dictum, naturam suam vsque in sexagesimum quintum annum studiosissime & vehementissime exercuisset: eius valetudo infirmior, & natura imbecillior esse cœpit: tum quod per omnem superiorem vitam maximos labores, eosque reipubl. causa suscepisset: tum quod iam ætate affecta, & summa senectute esset. Quapropter cum superioribus diebus in morbum grauissimum & periculosissimum incidisset: facile is naturæ vim vigiliis, curis, & laboribus antea vitæ exhaustam superauit. Ac licet amici initio bene sperarent: ipse tamen ex certis indicibus morbum hunc, finem huius caducæ vitæ allaturum, præsagebat. Neque propterea mortis metus ei iniiciebatur: non mortis aduentu exhorretcebat. Verum cum eam nihil aliud, quam ex hac mortali, ad sempiternam & felicissimam vitam, ad cælestem ciuitatem, ad Christi regnum, demigrationem esse iam olim didicisset: pro religiosa, qua semper fuit, fortitudine: æquissimo animo se ab hac vita discessurum fortiter affirmabat: præsertim cum sibi Deum non tam adempturum longiorem vitam, quam maturum finem daturum intelligeret. Satis enim ipse sibi vixit. Omnia enim studia sua, omnes actiones suas, ad publicas commoditates, pietatem, & religionem retulit. Veræ etiam gloriæ, quam æternam consecutus est, vixit satis: si Scholæ maxime cum requirenti, si nobis, eundem desiderantibus, satis diu superstes fuisset. Toto morbi tempore, vigiliarum somnique, nec die, nec nocte discriminata tempora habere potuit. Vnde permolesta ei fuit insomnia: & quoties somnus eum complecti cœpisset: facile e somno suscitabatur: & quoties excitabatur: cum diuini numinis inuocatione, se, & spiritum suum immortali Deo commendabat. Sermones similes fuerunt superiori actæ vitæ: pleni constantiæ, fortitudinis, religionis, pietatis. Memorabile hoc est in optimo nostro sene: quoties de religionē, rebus Diuinis, Deo, æterna vita, cum amicis, ipsum quotidie officiū & amicitia causa inuisentibus, etiam in grauissimo mor-

D. Leonhard Fuchsi.

mo morbo, conferebat, ita dilucide, pure, latine, eleganter, apte, pie, constanter, & fortiter animi sentia explicabat: ut ex morbo nullo infirmus esse videretur. Et fuit sanus animo semper, etiam in corporis aegritudine maxima. Christianæ enim patientiæ, religiosæ pietatis, omnisque virtutis, documenta dedit maxima. Evangelii doctrinam constanter ad extremum usque spiritum profitebatur: in Christo Iesu, qui pro mundi delictis vitam & sanguinem profudisset: & solus ab æterna morte nos miseros liberasset: & vnicus ab æterno patre aduocatus, mediator, & seruator humani generi datus esset: se spem omnem collocatam habere testabatur: per huius mortem aditum se patefactum habere ad coelestem ciuitatem, & æternam & felicissimam vitam, constantissime asseuerabat. Cum autem morbus quotidie magis inualesceret: tandem ad sextum Idus Maii intra septimam horam & octauam antemeridianam, hanc caducam & miseram vitam cum immortali & sempiterna permutauit, placide & omnino feliciter inter amplexus charissimorum filiorum, & vxoris honestissimæ, summa cum testificatione constantiæ, Religionis, omnisque pietatis: & inuocatione eius, quem per omnem vitam coluerat filii Dei, Domini nostri Iesu Christi, lenissimo mortis sopore. Corpus postmodum ad eandem sepulturam est datū, ad quam, Annam, honestissimam Matronam, primam vxorem, dari vidimus. Atque ita amisimus clarissimum virum, Leonhardum Fuchsiū, Medicum & Philosophum præstantissimum: exemplum diligentis & laboris decus atque ornamentum Scholæ nostræ singulare. O mortem detrimentosam Reipublicæ: nobis omnibus accerbam. Cui enim ista mors ob utilitates publicas non esset acerbissima? Quis tam graui Reipublicæ vulnere imposito, quo superiora ex multorum doctorum hominum obitu accepta, quæ consenuisse iam videbantur, refricantur & recrudescunt, non doleret? Quis non lugeret mortem talis & tanti viri? Quis non lacrymas, officio & pietate plenas effunderet? Præsertim cum in ista paucitate talium virorum, maximæ sint & periculosissimæ metuendæ commutationes & inuersiones rerum publicarum.

Veruntamen in hoc communi luctu modum tristitiæ & doloris statuere debemus: ne, si nostra causa eum lugere nimium pergamus, ei æternam felicitatem inuidere, idque velle, quod Deus nolit, videamur. Ergo recreemus nos, illoque solatio nos consolemur: quod iam particeps æternæ felicitatis, & coheres Christi, coelestibus commoditatibus & gaudiis fruitur: inter beatas animas versatur: Patriarchas omnes, sanctosque Apostolos intuerur: viuunt felix atque beatus, cum Deo Patre, cum Christo Domino, cum diuino spiritu. Quod ut & nobis omnibus feliciter contingat: Iesum

Opt. Max. precor, cuius laus & honor, gloria & potentia, in æuum sempiternum permanebit.

AD LECTOREM PRÆFATIO.



Cur complura in paradoxorū libris cum posteriorib. scriptis non conueniant.

V. V. inter ingenii mei fecus Paradoxorum libri primum propemodum locum sibi vendicent: siquidem anno ætatis meæ 34. in lucem editi sint: neminem eruditorum fere arbitror, imperitos enim ac tudes nihil moror, qui mihi vitio daturus sit, quod complura in ipsis reperiantur, quæ cum posterioribus meis scriptis parum conueniant, imo non raro ex diametro pugnent. Nam haud dubie secum initio expendent eius temporis, quo libri illi a me scripti sunt, statum & quod ars medica, tunc multis atque gradissimis vulneribus, quæ partim a barbarie, quæ tunc omnes bonas artes & præcipue hanc ipsam misere afflixerat, partim a Mauritanorum lacunis, quæ illam totam conspurcarunt, acceperat, penitus exanimata fuerat, considerabunt. Præterea, quod omnium fere rerum, quæ Medicum scire oportet cognitio, tum perierat, aut certe proflus obscurata fuerat, in animum reuocabunt. Vt enim aliquas saltem commemorem, quot usquisque eo tempore inuenus est; qui tot cognitas habuit herbas, quot tenui prandiolo aut cornula absumere, rusticus potuisset? Quis tum fuit, qui dissectionem humani corporis a limine salutauerat, aut tenuiter saltem attigerat? Quippe omnes fere Mundini non vsque adeo boni scriptoris nugis contenti, nihil amplius requirebant. Quibus insuper Medicis morborum, symptomatum, quæ differentiz & causæ perspectæ tum fuerant? quandoquidem in vniuersum omnes a Practicorum, vt vocant etiam hodie, qui hæc omnia ignorabant, & turpissime inter se confundebant, placitis pendebant. Quot denique fuerunt, qui notas laborantium locorum, & curandi indicationes eo tempore cognitæ habuerunt? sine quorum tamen omnium exquisita notitia nemo vnquam feliciter curauit? Ad hæc quæ nunc dicta sunt, accessit etiam ætas mea iuuenilis, in qua nondum satis mature scire iudicium potuit, & insuper etiam optimorum librorum penuria, quæ ad hoc meum institutum summe erat necessaria. Et si autem inficiari non possum, nec Hippocrate, Galeno, Dioscoride & Paulo non caruisse, quum adornarem paradoxa, tamen quum hos auctores non ita pridem nactus essem, fieri profecto non potuit vt breuissimo hoc temporis curriculo, quod paradoxorum editionem antecedeat, prout necessitas postulabat eos perlegerim, mihi quæ familiares ac notos reddiderim. Quapropter cum illis temporibus medicinam sic deformatam fuisse constet, vt pristini sui mitoris fere nullum amplius superesset vestigium, adeoque plura admodum fuerint, quæ meos in eruendis ac detegendis Medicorum erratis conatus, tum remorabantur, multos fore æquos rerum indices spero, qui me ~~non~~ dignum esse venia iudicari sint, & in optimam partem interpretaturi, quod quædam in iis meis paradoxis mihi inconsiderate exciderint, quæ posterioribus meis scriptis non per omnia consonant. Ne verò ea, quæ mihi tum parum recte ob iam commemoratas causas dicta sunt in iis perpetuo hererent, nonnullisque vel errandi, vel calumniandi occasionem darent, consultissimum esse existimaui, vt hæc tandem corrigerem, emendarem, & in eam redigerem formam ac speciem, vt per omnia posterioribus meis scriptis consentirent. Confestim igitur priore editione in manus sumpta, omniaque diligenter legendo percurrrens, plurima in ea mutauim, non pauca induxi, & penitus e medio sustuli, aliqua etiam adieci, quod deprehēderent omnes, qui hæc alteram cum priore editione conferre non grauabuntur. Neque hoc solum in iis Paradoxorum libris, verum etiam in aliis quibusdam meis lucubrationibus, commentariis nimirum in Hippocratis aphorismos, Institutionum medicinarum libris, & in iis quos de compositione medicamentorum conscripsi, qui partim nunc editi sunt, partim breui edentur, feci. Idem quoque facturus sum, Deo permittente & adiuuante, in aliis omnibus meis scriptis. Siquidem pro virili annitar, vt in meis lucubrationibus vnus doctrinæ consensus, concentusque sit. Nec puto futurum quenquam, qui hoc institutum meum, studiosis medicinarum saluberrimum, sit improbaturus, quandoquidem nemo hactenus repertus sit, qui semper & quauis ætate exactam diligentiam præstiterit. Habet enim prima ætas suam imbecillitatem, suosque lapsus ac vitia, quæ facile nullus profecto cauere, vitareque potest. Sunt præterea in literarum studiis, perinde atque hominum ætatibus, certi quidam progressus, vel, vt Quintiliani verbis utar, est sua studiis etiam infantia, adeo vt nemo repente doctissimus euadat, imo omnes pedetentim & gradatim ad solidam eruditionem, rerumque perfectam cognitionem perueniant. Vt rectissime Græcis di-

Ad Lectorem præfatio.

cis dictum sit, *Ἐγὼ δὲ αἰδουμένην περὶ τοὺς ἀνθρώπους*. His igitur de causis mihi certo persuadeo, meum hunc, quem in emendandis ac corrigendis iis Paradoxorum libris laborem suscepī, medicæ artis studiosis non solum gratissimum, sed & multis modis utilissimum fore, eumque collaudaturos omnes veritatis amantes, & qui studio medicinæ consultum cupiunt. Quod reliquum nunc est, Deum æternum patrem Domini nostri Iesu Christi, conditorem generis humani, & Ecclesiæ ac optimorum studiorum conservatorem, toto pectore oro, propter filium suum Dominum nostrum Iesum Christum, ut mihi vitam tantisper prorogare, viresque tum corporis, tum animi integras ac firmas conservare clementer velit, donec in reliquis etiam meis scriptis id, quod iam in Paradoxis illis me fecisse spero, pari diligentia & alacritate in studiosorum gratiam & commodum præstare possim. Vale Tubingæ 10. Calend. Maii, Anno M.D.LXVI.

LEONHARDI FUCHSII IN LIBROS PARADOXORVM MEDICINÆ, AD STUDIOSES VERITATIS,

P R A E F A T I O.



Nihil in vita humana periculosius, nihil tam pestilens, nihil denique Iuueniles
magis detestandum, quam teneros iuuenilesque animos his imbui, animi o-
quæ operæpretium fuerit aliquando dediscere. Nam ita natura com- primis im-
paratum est, ut aut nunquam, aut omnium certe difficilime eorum, buendi.
quæ a tenera ætate hausimus, obliuiscamur. Siquidem natura, Quin
tiliano teste, tenacissimi sumus eorum, quæ rudib. annis percipimus, Lib. 1. cap. 1.

& hæc ipsa magis pertinaciter hærent, quæ deteriora sunt. Perinde
namq; ut sapor, quo noua imbuimus, durat, lanarumq; colores, quibus simplex ille can-
dor mutatus est, elui non possunt, ita ægerrime, ea quæ ab ineunte ætate, & a teneris, ut
aiunt, vnguiculis auide didicimus, extirpantur, & funditus tolluntur. Hinc quum in e-
luendis, quæ semel infederint vitiiis, labor difficultasq; sit, grauiusq; dedocendi quã do-
cendi onus existat, haud imprudenter Timotheū olim musicum fecisse constat, quod
a discipulis ab aliis prius parum apte institutis, duplicem exegerit mercedem, vnam e-
quidem ut bona artis doceret, alteram ut dedoceret ineptias. Proinde quum & huic, qui
cum ipso ferme nutricis lacte errores fugit, inq; prauæ doctrinæ secta educatus est, Ga-
leno auctore, geminum tempus necessariū sit, vnum in quo errores prauasq; opiniones
dediscat, alterum in quo meliorib. se exerceat, cōsulto fecerint medicæ professioni no-
mina daturi, si iis non assueuerint, quæ olim rursus dediscenda erunt. Id quod eo magis
conabūtur, quod, Hippocrate teste, vita brevis, ars verò medendi lōga sit. Quapropter
minime committent, ut temporis occasionem, quæ præceptis admodū existit, in nullius
momenti reb. iisdemq; deterrimis, addiscendis temere cōterant, sed optima sibi potius
primum discenda proponant, ne ipsis olim in dediscendo multo maiori, quam discēdo
opus sit opera: Multo namq; cōsultius est primū ea, quæ optima sunt, et si minima etiam
videantur, haurire, ut scil. deinceps quum peiora dediscēda essent, animum maioribus
applicare integrū sit. Tum vero optimam discendi rationē sibi proposuerint, vbi a pu-
rissimis fontib. potius quam cænosis riuulis, lacunisque putidis, præstantissimæ artis me-
dicæ rudimenta haurire voluerint. A fontibus autem haurient, si ex Græcis, minime aut
Arabib. eius artis præcepta didicerint, quod in illis nihil non purum, nihil non eruditū,
nihil porro, quod non summo iudicio excultū, depromptumq; sit, inueniri queat: in his
vero contra nihil ferme, quod non rancidū putidumue sit, offendi possit: quamuis præ-
ter incōditam ac plane ineptam, adde etiam obscuram dicendi rationem, omnia pene,
quæ docent, quādoquidem plusquam *ἡ φύσις* a veritate dissideant, Aristarchi virgu-
la digna existant. Quod si n. quicquam in iis est, quod imitari mereatur, e Græcis certe
sumum esse putato: neq; n. alios Arabes quam reliquorū, Græcorum præsertim trans-
scriptores fuisse cōstat. Licet in Græcorū referendis præceptis vim tractandi artisq; pru-
dentiam neglexerint, omnia n. turbauerunt, omnia peruerterunt, nullumq; sibi docendi

Iuueniles
animi o-
primis im-
buendi.

Lib. 1. cap. 1.

Timothe-
us clarus
in arte ti-
biarum.
Lib. 7. the-
meth. ca-
pit. 3.

1. Aph. 1.

Optima
discendi
ratio.
Medicinæ
fontes.
Maurita-
norū scri-
pta qua-
lia.

Præfatio.

scopum proposuerunt, verum modo hoc, modo illud attigerunt, adeo frigide, adeo leuiter & oscitanter, vt reticuisse penitus satius fuisset. Quid multa? Arabes quotquot fuerunt, nihil aliud studuerunt, quam vt fucorum instar alieno labore partis fruerentur, seque alienis atque adeo furtiuis vestirent plumis. Id quod sane tolerandum erat, ni suo fœdissimo contactu, harpyiæ ritu, omnia contaminassent. Itaque merito ab illorum lectione rudes adhuc medicæ artis tyrones auocandi sunt, imo plane admonendi erunt, vt eos ipsos tanquam ipsissimas pestes, vnde nihil nisi præsentissimum venenum sugere possint, deuient. Nisi enim prorsus ab illorum lectione arceantur fieri, nequit, quin falsa pro veris ingurgitent, eaq; ita illorum animis infigant, vt nullis subinde modis elui & euelli queant. Proinde vt olim tolerâdos non nihil fore Arabes duxi, ita hodie ex omnibus scholis, tâquam seductores pessimos, adde carnifices etiam ipsissimos, funditus tollendos & proscribendos consulo, quod bona, quæ in iis sunt minime perniciosus paria existant. Vnum enim hoc studuerunt, vt librorum magnitudine se admirabiles redderent: ob id vniuscuiusque dicta, siue vera, siue falsa, seu vero similia, aut etiam imaginaria fuerint, in suas congersere chartas. Et quid per Deum immortalem attinet habere Arabes, quum nihil in iis sit veri, quod non apud Græcos recentiores fuis clariorque tractatum sit? Non enim inficias ire possumus, pauca quædam esse in illis, quorum apud Græcos saltem veteres nulla plane mentio fiat: ea tamen talia sunt, vt nec illi horum exactam cognitionem habuerint, tantum abest vt posteris recte tradiderint. Quum itaq; nobis errorum monumenta reliquerint, præstat certe eadem altissima obrui terra, aut vt nunquam posthac in lucem prodire queant, Vulcano cōsecrari, quandoquidem posteriores Græci, inprimis autem Aëtarius, omnia fere, quæ ab illis inuenta creduntur, clarius ac plenius memoriæ prodiderint. Quare posthabitæ Arabibus, ad Græcorum, Hippoc. & Galeni præcipue, lectionem animum conferant studiosi, quod ii ferme vni sint, qui in auctorum censum ascissi meriti sint: id namq; quod recta ratione ducti inuenerunt, & in monumenta retulerunt, omnia postmodum experientia comprobarunt. His itaq; ducib. insistentes medicæ artis rudimēta discant, nam ita miro quodam amore, vbi parum adoleuerint, ad ea, quæ a clarissimis veterum tradita sunt discenda properabunt, eademq; iudicio passim adhibito explorare multa diligentia studebunt. Ad quã certe discendi rationem etiam Gal. inuitat, dum in hanc sententiã scribit: *χρητὴν μέλλουσαν γινώσκειν τὰ πλεονεκτήματα τῶν πολλῶν ἀμύνων, διδύς μὲν καὶ τῇ φύσει καὶ τῇ πρᾶτῃ διδασκαλίᾳ, πολὺ τῶν ἄλλων διανεργεῖν. ἐπειδὴ γὰρ ἡμετέριον ἀληθείας πρὸς ἑστῶτον μανίαν, ὥστε ἐνδεσθῶντα, καὶ μὴδ' ἡμέτεροι μὴ τι νυκτὸς διαλέξαι ἐν ἀποδιδόντα, καὶ συντεταμένον ἐκμαθεῖν ὅσα τοῖς ἐνδεσθότασι εἴρηται τῶν παλαιῶν. ἐπειδὴ δ' ἐκ μὲν αὐτῶν κείνους αὐτὰ λαοὺς ἴσιν χεῖρον παμπόλιν, καὶ σκοπεῖν πρὸς μὲν ἐμολογεῖ τοῖς ἐναργῶς φαινόμενοις, πρὸς καὶ δὲ διαφέρεται, καὶ ὅτως τὰ μὲν αἰετῶς, τὰ δ' ἄποσφραδίζου. quod est, neq; n. omnes Græca capiunt: Qui nosse quid aliis rectius debebit, statim non natura modo, verum etiam primis doctrinæ rudimētis multum ceteris præstet oportet. Idem vbi iam adoleuerit veritatis in sano quodam teneatur amore, veluti numine aliquo affatus, tum sine vllius diei noctisq; intermissione properare ac contendere ea, quæ a clarissimis veterum tradita sunt, discere, eademq; vbi didicerit iudicare, multoq; tempore explorare & considerare, quæ reb. sensui patientib. consentiant, quæue dissentiant, atq; illa quidem eligere, hæc vero repudiare. Atqui, proh dolor, videmus nostra tempestate optimam hanc discendi rationem penitus inuersam esse, q; nimirum pessima tantum primo loco discamus, optima a. vel prorsus contemnimus, vel tenuiter saltem, nec non nisi in postremis attingimus. Quæ sit, id quod Hippo. quoq; cōqueritur, vt oi in τῇ φύσει μὲν πολλοὶ, ἐργῷ δὲ πάγχυ βαιοί. id est, Medici fama quidem multi, opere a. pauci admodum sint. Et qui fieri posset, vt medicinæ studiosi hodie meliora sectarentur, cum pauci, imo fere nulli sint, q; in Germaniæ nostræ gymnasiis prælegūt, quib. probatissimi medicinæ scriptores, vel a limine trāum salutati sint, tantū abest, vt penitus cognitos habeant, atq; adeo reliquos docere possint? Linguarum namq; sine quarum cognitione omnium disciplinarum manca sit & cæca tractatio oportet, hostes omnium sunt acerrimi, nec tantillum quidem ad exactam eius artis notitiam conferre putant: ideoq; cum illi optima ne primorib. quidem labiis degustarint, fieri minime potest, vt hæc iplia alios docere queant. Linguarum enim inscitiam, necessario disciplinarum omnium ignorantia sequitur. Proinde id vnum potissimū student, vt a recto tramite in deuia quædam perducāt, ac ineptissimos quosq; eos nempe, quos olim nō didicere tantū, sed & deuotarunt ēt, auctores discendos præponant, quo sibi similes, hoc est, inertissimos producāt*

Hippocrates.
Galenus.

Libri 3. facul. natur.

Recta discendi ratio hodie inuersa.

Linguarū
scilicet
omnium
discipli
narum i
gnorantia
comitatur.

medi-

medicos. Nervis enim & facultatibus omnibus contendunt, quo ab optimis auctoribus suos auocent auditores, ne scilicet iisdem nonnihil degustatis, quam indoctis asinis ha-
 -tenus aures praeberint animaduvertere, & paulatim magis atque magis persentiscere
 -queant. Hinc quum *τυφλοί τυφλοῖς ὁδῶσι* sint, quid mirum si eorundem sequaces nullo pror-
 -sus adhibito iudicio non secus atque illi temere in pessimos irruant auctores, quæque in
 -his falsa sunt, haud minori studio quam quæ vera deuorent? Tanta namque superstitione
 -ac religione ea, quæ illi ipsi scribunt venerantur, vt piaculum putent vel latum vn-
 -guem ab his dissentire, præsertim, quum in eodem honore a suis illis inepris ac barbaris
 -præceptoribus habitos videant. Verum hoc potius veritatis studiose persuasum sit, ni-
 -hil esse perniciosius quam vulgarem hanc opinionem, quæ maiorum placita absque iu-
 -dicio & delectu pro oraculis habentur. Multo enim literis conducibilius est, de scriptis
 -magnorum etiam auctorum iudicare, quam sola auctoritate acquiescere, & fide aliena
 -quæuis accipere. Quamobrem Aristotelem, vniuersæ Philosophiæ principem, ea in re
 -sequi secum constituent, qui aduersus Socratem & Platonem, quos tamen vt præcepto-
 -res summo in honore habuit, scripturus ita dixisse legitur: *ἀμφοῖν ὅταν φίλοι, ὅταν ἀπηναικῶς τὸ*
 -*ἀλθὲν*. quod est, quum ambo amici sint, sanctum tamen est iis veritatem præferre. Qui-
 -bus siquidem verbis veritate ipsa viro bono nihil antiquius esse debere innuit. Et hinc
 -sane tritum hoc in scholis Philosophorum dictum dimanare cœpit, Amicus Socrates,
 -amicus Plato, magis tamen amica veritas. Quo nimirum significare voverunt, nemi-
 -nem, vtcunq; etiam eruditum, veritati antepōnendum esse. Hoc quod diuinus etiam ille
 -Plato faciendum suadet, dum *ἀφ' οὗ τῆς ἀληθείας ἐμπιπὼν ἄνθρωπος* censet. Hinc vt Luciani
 -verbis utar, *ἡ δὲ μῆτις ἐν δ' αὖτ' ἡμῶς οἱ πῶδες φέρων ἐκείνους ἀπηναικῶς*, sed iudicium adhibentes singula dili-
 -gentissime excutiamus, scientes nullius vel mortui, vel viuētis auctoritati tantū, quan-
 -tum rationi & veritati tribuendum esse. Quare in perlegendis Medicorum libris, Ara-
 -bum potissimum, ita statuamus, non omnia, quæ omnes auctores dixerunt vera esse, sed
 -nonnunquam, imo fere semper, insigniter hallucinatos fuisse. Neque est, quod mirerur
 -quispiam cur de Arabibus, quos velut numina quædam maxima hodie Medicorum
 -pars colit, tam audacter pronuntiem, digni enim sunt quos ita tractes, ob multos scili-
 -cet capitales, quos passim inculcant, proque veris proponunt, errores. Et quum indies
 -magis atque magis quam periculosa illorum errata sint intelligam, nec non quam plu-
 -rimi existant, qui hos ipsos adhuc mordicus teneant, proque illorum tuendis placitis
 -haud aliter quam pro aris & focis digladiantur, multo certe acerbius quam antea vn-
 -quam a me tractabuntur, vt nimirum impudentibus illis impostoribus, ac grunnienti-
 -bus gryllis *ἀχάρινα σώματα* obstruantur. Neque per me, modo Deus diutius superstitem ve-
 -lit, licebit *ἀμυστιάζοις* illis nebulonibus, iuuentutem posthac inanibus nugis circumduce-
 -re. Proinde merito, quod antea parcius fecimus, nunc horrantibus viris eruditis, ani-
 -mumque addentibus, vberius præstitimus. Non est autem, quod ideo me Arabibus, id
 -quod Montuus facit, quis conuitiari arbitretur, quod ab iisdem dissentiam, aut lapsos
 -esse indicem: quis enim nescit eruditorum iudicia esse debere libera? adeoque præter
 -conuiciandi suspensionem non tantum ab Arabibus, nihil de re medica meritis, sed et-
 -iam Græcis aliquot his multo doctioribus, & ea de arte bene meritis, modo luor, præci-
 -pitatio, impudētia, & dicacitas scurrilis absint, discedere licebit. Et quū veritate ipsa vir
 -bonus nihil prius neque antiquius habeat, cur conuicium dici mereatur si quis veri tu-
 -endi studio potius quam ledēdi libidine agitur, illorū errata paulo acerbius insectetur
 -non video, modo non maledictis solis, verum & rationibus atque probatissimorum au-
 -ctorum auctoritatibus, id quod ego facio, eadem demoliri tentet. Sed fac esse conui-
 -tia, num non præstantius multo interdum conuitiis proscindere errantes, quam turpi-
 -ter ad illorum errata conuiuere, aut obstinate veritati, quemadmodum Montuus pas-
 -sim solet, obluetari? Silendum certe minime, ne scilicet veritatem diffiteri videamur,
 -prohibeamusque ne simplices atq; rudes animi perniciosis ineptissimorum hominum
 -dogmatibus impune imbuantur. Hos igitur vt redimas, constanter asinis illis conuitia-
 -ri licebit, vtcunq; delicatuli illi ringantur. Quis enim hos venia dignos putet, qui to-
 -ties iam admoniti in erratis non leuiculis, sed capitalibus obstinate persistunt, ac moni-
 -torem, cui gratiam debebant, vltro rident & incessunt? Proinde quo veritatem ex ani-
 -mo sitientes, Arabum illosq; sequentium quorundam neotericorum Medicorum vo-

Maiores
decreta
cū delectu
legenda.

1. Eth. ca. 6

10. de Re-
pub.

Montuus
responde-
tur.

Conui-
tiorum
interdum
locus exis-
tit.

Paradisa:

Præfatio.

lumina infinitis referta esse erroribus clarius agnoscerent, Paradoxa hæc nostra, nihil quod non præter illorum dictum sit sententiam, complectentia, in publicum prodire volui, vt ex his tanquam leonem ex vnguibus, reliqua quoque illorum placita, quanti momenti sint æstimare queant, sibi que caueant, ne temere in hos pessimos auctores incidant, horumque decreta veluti Delphica quædam oracula rata ac firma habeant. His qui totam iam ætatem in Arabibus contriuerunt, atque in illis tanquam ad Sirenios scopulos consenuerunt, nihil scribimus: quid enim iuuat, vt Nasonis verbis vtat, ad surdas si cantet Phemius aures? Bœoticas igitur has aures nihil moramur, quando probe constet senem psittacum negligere ferulam, canesque vetulos loris assuefacere velle temerarium esse. Studio sitaque ac veritatis amatoribus hæc nostra legenda damus, non obstinatis illis veteris inscitæ propugnatoribus, quorum aures ita obcalluisse scimus, vt nec nostra, nec aliorum admonitionibus molliiri possint. Multa autem sunt apud Auicennam præsertim & Mesuen errata, quæ dedita opera præteriuimus, quod sciam futuros haud paucos, qui eadem maiori dignitate, quam ego queam, propalaturi sint. Nam vt nuper ad me ex Ferraria scripsit Ioannes Sinapius, vir singulari facundia & eruditio-
ne præditus, statim ex noua Academia Florentina prædibunt dialogi ac opuscula alia, in quibus Arabes, Auicenna potissimum & Mesue, pulcre suis pingentur coloribus. In his itaque nihil dubito quin bona etiam eorundem errorum pars erit, quos optimi illi viri in studiosorum gratiam propalare conabuntur. Ceterum quod ad Operis diuisionem attinet, vniuersum in tres digessimus libros. In primo, quæ ad medicam materiam spectât tractamus paradoxa. Decet n. vt is, qui artem aliquam ratione quadam sibi tradi postulat, omnis materiæ vires primum addiscat. In altero, quæ ad causas, morbos, eorundemque medendi rationem attinent, paradoxa attingimus, vt scilicet hinc, quantum a recta medendi methodo hodie deuiant Medici, intelligere possint studiosi. In tertio per pauca, quæ ad anatomen corporisque humani sectionem pertineant proponimus, vt inde citra huius peritiæ omnem medendi rationem esse mancā discant. Indicem quoque duplicem proposuimus: primum quid singulis opere toto capitibus contineatur explicantem: secundum, vocabula & quæ scitu digna visa sunt, complectentem.

INDEX



INDEX OMNIUM OPERVM Dn. LEONHARDI FVCHSII HOC VOLV. MINE CONTENTORVM.

PARSI. SECT. I. DE MEDICINA generatim.

CAP. I. De medicina origine, incremento & perfectione. 1.

2. De medicina prestantia. 4.
3. Medicina quid? 5.
4. Quod medicina sit ars, & non scientia. 6.
5. Medicina ex quo artium genere? 8.
6. Quot in vniuersum medicina partes? 9.
7. Quot medicatricis medicina partes? 10.
8. Quot Medicorum Secta? 12.
9. Qui trium sectarum Principes exstiterint. 15.
10. Vniuersa medicina in tres ordines distributio. 15.
11. De primi ordinis, seu rerum naturalium numero. 16.

SECTIO II. DE ELEMENTIS.

CAP. I. Quid elementum. 16.

2. Quot numero elementa. 17.
3. Quod elementa in animalis constitutione non maneant pura. 18.
4. Elementi principii discrimen. 19.

SECTIO III. DE TEMPERAMENTIS.

CAP. I. Quid temperamentum. 20.

2. Temperamentorum differentia quot, qualesque sint. 21.
3. Calidum, frigidum, humidum, & siccum multiplex. 23.
4. De temperamentis quatuor temporum anni. 23.
5. De aetate numero, & temperamentis. 25.
6. Hominis tactum solum, esse iudicem eorum, quae actu calida sunt. 28.
7. De singularum partium corporis humani temperamentis. 29.
8. De qualitibus secundis. 29.

SECT. IV. DE HUMORIBVS.

CAP. I. De humorum numero. 31.

2. De humorum temperamentis. 33.
3. De secundis quatuor humorum naturalium qualitibus ac sedibus. 35.
4. Quis quatuor humorum naturalium usus, & motus: quaeque eorundem sequantur temperamenta. 37.
5. De quatuor humorum naturalium differentiis. 38.
6. De quatuor humoribus secundariis. 41.

SECT. V. DE PARTIBVS corporis humani.

CAP. I. De partium humani corporis differentiis. 42

2. De capitis ossibus. 44.
3. De spina, & quae huic annectuntur ossibus. 46.
4. De ossibus manus. 47.
5. De cruris, & huic connexis, ossibus. 48.
6. Quid ligamentum, musculus, cutis & cuticula. 50.
7. De musculis caput, & eas, quae in capite sunt, partes, mouentibus. 50.
8. De musculis, thoracem, & eas, quae huic concreta sunt partes, mouentibus. 52.
9. De musculis manuum mouentibus. 54.
10. De musculis cruris mouentibus. 56.
11. De ligamentis. 57.
12. De partibus nutritioni famulantibus. 58.
13. De Instrumentis propagandae speciei famulantibus. 62.
14. De corde, & instrumentis ipsius functionibus ministrantibus. 64.
15. De cerebro, & instrumentis ipsius functioni famulantibus. 67.

SECT. VI. DE FACULTATIBVS.

CAP. I. Quid facultas? 73.

2. Facultates corpus nostrum gubernantes tres. 74.
3. Animalis facultatis genera. 74.
4. De vitali facultate. 76.
5. Naturalis facultatis genera. 77.

SECT. VII. DE ACTIONIBVS.

CAP. I. Quid actio & opus? 78.

2. Actiones corporis esse tres. 78.
3. Animalis actionis differentia. 79.
4. Vitalis actionis differentia. 80.
5. Naturalis actionis differentia. 80.
6. Actiones corporis a Medico cur consideranda. 83.

SECT. VIII. DE SPIRITIBVS.

CAP. I. Quid Spiritus. 84.

2. Quot sint Spiritus. 85.
3. Spirituum custodia qualis esse debeat? 89.

LIB. II. SECT. I. DE AERE.

CAP. I. Aer quis optimus, & contra quis pessimus. 90.

2. Aer vitiosus ut emendandus. 91.

SECT. II. DE CIBO ET POTV.

CAP. I. Quis cibi & potus usus, & quot in illis assumendis consideranda. 92.

2. De cibi bonitate & malitia. 93.
3. De cibi mensura. 93.
4. De qualitate cibi. 94.
5. De consuetudine ciborum. 95.
6. De cibi delectatione. 96.
7. De ordine ciborum. 96.

Elenchus

8. De tempore assumendorum ciborum. 97.
9. De cibis, qui temporibus anni congruunt. 98.
10. De cibis, qui etatibus conueniunt. 99.
11. De potu. 100.

SECT. III. DE MOTV ET quiete.

CAP. I. De exercitiorū generib. ac differentiis. 101.

2. Quis sit exercitiorum usus. 105.
3. De preparatione ad exercitationes. 106.
4. De tempore exercitationis. 106.
5. Quae exercitationis mensura. 107.
6. De Apoherapia. 107.
7. De Quietē & otio. 108.

SECT. IV. DE SOMNO ET vigilia.

CAP. I. Quis somnus, & quae eiusdem causa. 109.

2. Quae somni commoda. 110.
3. Somni tempus quod. 111.
4. Quae sit conueniens in somno forma decubitus. 113.
5. Somniratio in aegris quae. 113.
6. De insomniis. 114.
7. De vigilia. 114.

SECT. V. DE REDVNDANTIA, & inanitione.

CAP. I. Quot redundantia genera & differentia. 115.

2. Quid vacuatio, & eiusdem genera ac differentia. 121.
3. In quibus morbis secunda vena. 121.
4. Scopi mittendi sanguinis quot. 122.
5. Quae vena incidenda. 125.
6. Quando ad animi defectionem usque sanguis mittendus. 130.
7. Quo tempore, qua die, quae hora sanguis mittendus. 131.
8. Quae ante venae sectionem necessaria sit praeparatio. 132.
9. Quid sectionis venae tempore faciendum sit. 133.
10. Quantum sanguinis detrahendum. 133.
11. Emissi sanguinis observatio. 134.
12. Quid a venae sectione faciendum. 134.
13. De cucurbitulis. 135.
14. De scarificatione. 136.
15. De Hirudinibus. 137.
16. Quid purgatio, quibusque conueniat, aut non. 137.
17. Qui purgationis scopi. 138.
18. Quae diei hora medicamentum purgans exhibendum. 140.
19. Quae ante purgationem sit necessaria praeparatio. 141.
20. Quid concoctio & quot eius differentia. 143.
21. Quomorbi tempore purgandum. 147.

22. Quid purgationis tempore, & a purgatione sit faciendum. 149.

23. Quousque purgandum, & quomodo impedita & immodica purgationi sit occurrendum. 149.

24. Expurgatorum humorum observatio. 150.

25. De vomitu. 150.

26. De urina excretionē. 151.

27. De sudore. 152.

28. De Balneis naturalibus. 153.

29. De Balneis arte confectis. 157.

30. De Hemorrhoidibus. 159.

31. De mensium profluuiio. 159.

32. De vacuatione per nares. 160.

33. De Venere. 160.

34. De excreationibus. 161.

35. De Somno vacuante. 162.

36. De insensibili perspiratione. 162.

36. De inedia. 163.

38. Quid generatim in vacuationibus Medico sit considerandum. 164.

SECT. VI. DE ANIMI PERTVR- bationibus.

LIBER III. SECT. I. DE RE- bus præter naturam.

CAP. I. De trib. affectibus præter naturam. 166

2. De causis morborum. 167.

3. De morbi definitione. 172.

4. De morborum partium similarium generibus & differentiis. 177.

5. De generibus & differentiis morborum instrumentariorum partium. 181.

6. De continui solutione, similaribus, & instrumentariis communi morbo. 181.

7. De differentiis morborum generatim. 184.

8. De symptomatis definitione. 186.

9. De symptomatum generibus, differentiisue. 187.

10. Febrim brevis & dilucida explicatio. 188.

11. Vitiorum capitis brevis enarratio. 194.

12. Vitiorum oculi succincta explicatio. 202.

13. Vitiorum auris brevis enarratio. 204.

14. Vitiorum narium explicatio. 205.

15. Vitiorum faciei explicatio. 205.

16. Vitiorum dentium explicatio. 205.

17. Vitiorum oris expositio. 205.

18. Vitiorum thoracis enarratio. 206.

19. Vitiorum ventriculi explicatio. 207.

20. Vitiorum intestinorum enarratio. 207.

21. Vitiorum iecoris expositio. 209.

22. Vitiorum renum & vesicae enarratio. 209.

22. Vitiorum genitalium explicatio. 209.

24. Vitiorum uteri expositio. 210.

25. Vitiorum, quae in articulis accidunt, enarratio. 210.

Capitum.

LIBER IV. SECT. V. DE SIGNIS Medicis.

- Cap. 1. de Utilitate signorum. 215.
2. Quid signum, & signorum genera. 216.
3. Quid tempus morbi, & tractationis de temporibus morborum usus. 218.
4. Quot sint morborum tempora. ibid.
5. Quot tempora uniuersalia unusquisque morbus habeat. 219.
6. Tempora morborum ut dignoscenda. 220.
7. Vigor morbi Medico prae aliis temporibus potissimum dignoscendus. 221.

SECTIO II. DE IUDICIIS.

- Cap. 1. Quid iudicium. 222.
2. De iudicii differentiis. ibid.
3. Quae sint iudicii boni iam instantis nota & indicia? 223.
4. Futurum iudicium quibus notis praecognoscendum. 224.
5. Optimi iudicii cognitio est certa, mali vero contra incerta. 225.
6. Quae ostendant quem finem sit habiturus morbus. ibid.
7. Num iudicabitur morbus, aut minas, unde cognoscendum. 226.
8. Num per excretionem, aut abscessum futurum sit iudicium, ut cognoscendum. 227.
9. Quae propria sint uniuscuiusque excretionis signa. ibid.
10. De diebus decretoriis. 229.
11. Quae sint nota mortis citra iudicium futura. 233.
12. Mortis dies & hora, ut praecognoscenda. ibid.

SECTIO III. DE VRINIS.

- Cap. 1. Quid urina, & quis eius usus. 234.
2. Quot in urina consideranda, & qua ratione illa sit inspicienda. 235.
3. Urina in omnibus mediocri Medico primum cognoscenda. ibid.
4. De colorum in urina differentiis. 236.
5. De iis, quae urina colorem mutant. ibid.
6. De consistentia urina. 237.
7. De differentiis locorum contentorum in urina. 237.
8. Quid ex urina coloribus praedicendum sit. 238.
9. Quid ex consistentia urina praedicendum sit. 239.
10. Quid ex urina quantitate sit praedicendum. 240.
11. Quid ex contentorum consistentia praedicendum. 240.

12. Quid ex contentorum colore sit praedicendum. 241.
13. Quid ex contentorum quantitate sit praedicendum. ibid.
14. Quid ex contentorum locis sit praedicendum. 242.
15. Quid ex innatantibus in urina ramentis, capillis, & aliis corpusculis in urina sparsis sit praedicendum. ibid.
16. Quid ex urina corona praedicendum sit. 243.
17. Quid ex bullis urina praedicendum sit. ibid.
18. Quid ex urina contentis priuata praedicendum sit. 244.
19. Quae ex egestionibus sint praedicenda. ibid.
20. Quid ex sputo praedicendum sit. 245.
21. Quid ex sudore praedicendum sit. 246.

SECTIO IV. DE PULSIBVS.

- Cap. 1. Quot pulsus rationis paries, quidque pulsus, & quod eiusdem genera. 247.
2. Pulsus diuisio. 248.
3. De pulsuum generibus & differentiis. ibid.
4. De pulsuum causis. 255.

LIBER V. SECTIO I. DE CONTRADICTIONE.

- Cap. 1. Quid indicatio, coindicatio, & contraindicatio. 264.
2. Tres esse rationalis curationis indicationes simplices, & quibus uniuersalis methodus constat. 265.
3. Contrarietas indicatio curationum maxime generalis est. 267.
4. Tria esse in uniuersum circa quae omnis medendi opera versari debet. 268.
5. Morbi natura, & temperamentum quid indicent. 269.
6. Vires quid indicent. 270.
7. Consuetudo quid indicet. 271.
8. Aetas, regio, anni tempus, & calis constitutio quid indicent. 271.
9. Laborantis loci natura quid indicet. 271.
10. Contraria indicationes ut tractanda. 273.
11. Medendi praecepta unde discenda. 274.

Finis capitum libri Institutionum Medicinæ. Sequuntur Capita Anatomiae.

LIB. I. DE OSSIBVS.

- Cap. 1. Quid Anatome, & quis eiusdem usus. 279.
2. Cur ab ossibus humani corporis historia sit auspicanda. 281.

Eienchus

3. Obscurorum nominum passim in hoc libro
occurentium explicatio. 282.
4. De commissuris ossium. 283.
5. Quid os, quisque ossium usus, differentia, &
numerus. 284.
6. Capitis structura ratio, & eiusdem varia
figura, 286.
7. De caluaria, & cur donata sit suturis. 287.
8. Quales sint, & quot numero sutura. 288.
9. De ossibus capitis. 289.
10. De osse iugali, & ossibus, quae rupi praeputa
assimilantur. 293.
11. De organo auditus, & ossiculis huius con-
structionem ingredientibus. 293.
12. De Maxilla superioribus ossibus. 294.
13. De inferiori maxilla. 296.
14. De dentibus. 297.
15. De ossium capitis, & maxilla superioris fo-
raminibus. 298.
16. De osse hyoidi. 302.
17. De spina. 302.
18. De cervicis vertebra. 305.
19. De Thoracis vertebra. 308.
20. De lumborum vertebra. 311.
21. De sacro osse. 312.
22. De osse coccyge. 314.
23. De thoracis ossibus. 215.
24. De osse cordis. 319.
25. De scapulis. 320.
26. De claviculis. 323.
27. De humero, seu brachii osse. 324.
28. De cubiti ossibus, ulna & radio. 326.
29. De brachiali. 329.
30. De postbrachiali. 331.
31. De digitis manus. 331.
32. De ossiculis sesaminis extrema manus. 333.
33. De ossibus sacri ossis lateribus commissis. 334.
34. De femore. 336.
35. De tibia. 338.
36. De patella. 340.
37. De pedis ossibus. 340.
38. De unguib. 344.
39. De Cartilaginibus. 344.
40. De palpebrarum cartilaginibus. 343.
41. De auri cartilagine. ibid.
42. De nasi cartilaginibus. ibid.
4. De cute, & cuticula. 351.
5. De membrana carnosae, & adipe inter hanc
& catem reposita. 351.
6. De Musculosa substantia frontis cutem mo-
uente. 352.
7. De musculis palpebrarum. 353.
8. De oculorum musculus. 354.
9. De labiorum, buccarum, & nasi alarum mu-
sculis. 355.
10. De musculis inferiorem maxillam mouen-
tibus. 356.
11. De musculus ossis hyoidis. 358.
12. De lingua musculus. 359.
13. De laryngis musculus. 360.
14. De musculis caput mouentibus. 362.
15. De capitis, & primae, secundaeque cervicis
vertebrarum ligamenti. 363.
16. De musculis dorsum mouentibus. 364.
17. De vertebrae ligamenti. 366.
18. De musculis brachium mouentibus. ibid.
19. De ligamenti humeri ad scapulam articu-
li. 368.
20. De musculis scapulam mouentibus. 369.
21. De musculis thoracem mouentibus. ibid.
22. De musculis abdominis. 371.
23. De musculis cubitum flectentibus, & ex-
tendentibus. 373.
24. De musculo, nervosa sua exilitate, media
vola, & interna digitorum cuti subna-
to. 374.
25. De carnea substantia interiori digitorum
regioni, ipsorumque radicibus, & media
vole manus superstrata. 375.
26. De musculus radium pronum & supinum
constituentibus. 376.
27. De musculis motuum brachialis opificibus.
376.
28. De musculis manus digitos mouentibus. 377.
29. De ligamenti manus. 380.
30. De peculiaribus penis, virilium testium, &
muliebri uteri musculus. 381.
31. De cervicis vesica musculo. 382.
32. De recti intestini musculus. 383.
33. De musculis femur mouentibus. 383.
34. De musculis tibia mouentibus. 386.
35. De musculo in poplite occultato. 388.
36. De musculis pedem mouentibus. ibid.
37. De musculis pedis digitos mouentibus. 390.
38. De ligamenti ilium ossa sacro colligantibus,
& coxendicis, ac genu articuli, deque re-
liquis omnibus, quae in tibia & pede ha-
bentur, ligamenti. 391.

LIBER II. DE LIGAMENTIS, & musculis voluntarii motus, instrumentis.

- Cap. 1. Quid ligamentum, & quis eius usus, ac
differentia. 347.
2. Quid musculus, unde dictus, de eius parti-
bus. 348.
3. De musculorum differentiis. 349.

LIBER III. DE INSTRUMEN- tis nutritionis.

- Cap. 1. Nutritionis instrumentorumque nutri-
tionis

Capitum.

tionis famulantium, quæ in corpore tripli-
cia sunt, necessitas. 393.

2. De peritono. 394.

3. De omento. 395.

4. De intestinis. 397.

5. De duodeno. 398.

6. De ieiuno. 399.

7. De tenui. 400.

8. De caeco intestino. 400.

9. De colo intestino. 401.

10. De recto intestino. 402.

11. De mesenterio. ibid.

12. De stomacho & ventriculo. 403.

13. De icore. 408.

14. De venis generatim. 410.

15. De vena porta ortu, eiusque propaginum se-
rie. 411.

16. De caua vena ortu, & eius partis, quæ supra
recur consistit, distributionis ordine. 413.

17. Venæ caua portionis, ad partes infra septum
transuersum locatas, distributa series. 419.

18. De bilis flauæ vesicula. 423.

19. De liene. 425.

20. De renibus. 426.

21. De vesica & meatibus urinariis. 428.

LIBER IV. DE INSTRUMENTIS propagandæ speciei famulan- tibus.

Cap. 1. De testibus virorum. 430.

2. De virilis membri partis structuræ. 434.

3. De utero & reliquis muliebrib. generatio-
nis famulantibus instrumentis. 436.

4. De inuolucris seu tunicis fatum in utero te-
gentibus. 442.

5. De mamillis. 444.

LIBER V. DE CORDIS STRV- ctura, & instrumentis ipsius func- tioni ministrantibus.

Cap. 1. Quomodo aer in respiratione digeratur,
cordisque, & ipsi administrantium par-
tium functionis enumeratio. 445.

2. De tunica costas succingente. 446.

3. De membranis cavitatem thoracis interse-
pientibus. 447.

4. De aspera arteria. 448.

5. De faucium glandulis. 452.

6. De gargareone. 452.

7. De pulmone. 453.

8. De cordis inuolucro. 454.

9. De corde. 455.

10. De cordis ventriculis, & vasis, ac eorundem
orificiis. 458.

11. De membranis quatuor orificiorum cordis. 461.

12. De arteriis generatim. 463.

13. De magnæ arteriæ ortu, & ramis, in quos
ipsius pars ascendens digeritur. 465.

14. De amplioris descendentisue magnæ arteriæ
tenui in suos ramos serie. 466.

LIBER VI. DE CEREBRI STRV- ctura, & instrumentis ipsius func- tioni famulantibus.

Cap. 1. Cerebri functionum, & eius partium bre-
uis enumeratio. 470.

2. De dura mēbrana: cutē exterius caluariam
succingente. 471.

3. De tenui membrana. 475.

4. De cerebro & cerebello. ibid.

5. De calloso cerebri corpore, & cerebri ventri-
culorum dextri & sinistri septo. 477.

6. De cerebri ventriculus. 478.

7. De fornice camerae cerebri. 480.

8. De cerebri glande. 481.

9. De testibus & natibus cerebri. 482.

10. De vermiformib. cerebelli processibus. 482.

11. De infundibulo, & glandula pituitam ce-
rebri excipiente. 483.

13. De olfactus organo. 484.

14. De oculo visus instrumento. 485.

15. De nervis generatim. 488.

16. Quod nervorum a cerebro ortorum sint pa-
ria. 489.

17. De dorsali medulla, & nervorum ab ipso
prodeuntium. 493.

18. Septem nervorum parium, e cervicis verte-
bris prosilientium series. 495.

19. Duodecim parium nervorum, dorsalis me-
dulla, thoracis complexæ vertebrae series.
497.

20. Nervorum in universam manum series. 499.

21. Quinque nervorum parium e lumborum
vertebris prodeuntium series. 503.

22. Nervorum a sacro osse prosilientium series.
504.

23. Nervorum femur, tibiam, & pedē adun-
tium distributionis ratio. ibid.

ELENCHVS CAPITVM SE- cundæ Partis operum Leonhar- di Fuchii.

LIBER I. DE VSITATA COMPO- nendorum medicamentorum ratione.

Cap. 1. Quid medicamentum, & quod a nutri-
mento distet, ac quoruplex sit medicamen-
torum natura. 2.

2. Quid sit medicamentum simplex, & etus-
dem diuisio. 3.

3. Quæ ad recte medicamenta componenda
necessaria sint. 4.

Elenchus

4. De stirpibus & herbis.
5. De floribus. 13.
6. De semine. 16.
7. De fructibus. 20.
8. De radicibus. 25.
9. De succis. 31.
10. De liquoribus. 32.
11. De lachrymis. 39.
12. De gummi. 43.
13. De corticibus. 44.
14. De lignis. 45.
15. De animantibus & eorundem partibus. 47.
16. De excrementis animantium. 52.
17. De metallicis. 54.
18. De lapidibus & Gemmis. 68.
19. De terris. 71.
20. De iis, quae ex mari & aquis sumuntur. 72.
21. De rite colligenda materia medica. 74.
22. De rite afferuanda materia medica. 76.
23. De delectu & in uniuersum preparatione materiae medicae. 77.
24. De preparatione aliquot priuatim medicamentorum. 90.
25. De succedaneis. 94.
26. De limitatione ac finitione ordinis cuiusque calificantium, refrigerantium, humectantium, & desiccantium. 98.
27. Quae calefaciendo & refrigerando temperata sunt. 99. Item, Quae quarto ordine calefaciunt. ibid.
28. Quae primo ordine calefaciunt. 99.
29. Quae secundo ordine calefaciunt. ibid.
30. Quae tertio ordine calefaciunt. ibid.
31. Quae primo ordine refrigerant. 99. Item, quae quarto refrigerant ordine. ibid.
32. Quae secundo ordine refrigerant. 100. Item, quae primo humectant ordine. ibid.
33. Quae tertio ordine refrigerant. ibid. Item, quae secundo humectant ordine. ibid.
34. Quae primo desiccant ordine. ibid.
35. Quae secundo desiccant ordine. ibid.
36. Quae tertio desiccant ordine. ibid.
37. Quae quarto desiccant ordine. ibid.
38. De medicamentis simplicibus, peculiares corporis partes iuuantibus. ibid.
39. Quae caput iuuant. 101.
40. Quae thoracem roborant. ibid.
41. Quae cor iuuant. 102.
42. Quae stomachum & ventriculum roborant. 102.
43. Quae iecur firman. ibid.
44. Quae lienem iuuant. ibid.
45. Quae renes roborant. ibid.
46. Quae ueterum iuuant. ibid.
47. Quae artus iuuant. ibid.
48. De secundis & tertiis simplicium medicamentorum facultatibus. 102.
49. Quae reprimunt. 103.
50. Quae ex alto trahunt. ibid.
51. Quae discutiunt. ibid.
52. Quae ora vasorum aperiunt. ibid.
53. Quae ora vasorum obstruunt. ibid.
54. Quae rare faciunt. 104.
55. Quae densant. ibid.
56. Quae obscurant. ibid.
57. Quae meatus repurgant, & obstructionem tollunt. ibid.
58. Quae exstergunt. ibid.
59. Quae emolliunt. ibid.
60. Quae indurant. ibid.
61. Quae suppurant. ibid.
62. Quae crustas efficiunt, & adurunt. 105.
63. Quae putrefaciunt. ibid.
64. Quae cicatricem inducunt, & glutinant, carnemque generant. 105.
65. Quae urinas mouent. ibid.
66. Quae menses ciunt. ibid.
67. Quae menses sistunt. ibid.
68. Quae lac & semen generant. 106.
69. Quae dolorem leniunt. ibid.
70. Quae stupefaciunt. ibid.
71. Quae venenis resistunt. ibid.
72. Quae ambustis medentur. ibid.
73. Quae strumas discutiunt. ibid.
74. Quae purgant. 107.
75. De cassia nigra. 110.
76. De manna. 110.
77. De Oxyphænice. 112.
78. De myrobalanis. 112.
79. De sena. 113.
80. De polypodio. 114.
81. De epithymo. 114.
82. De Aloe. ibid.
83. De cnicco. 116.
84. De Rha seu Rheo. 118.
85. De agarico. 118.
86. De scammonio. 119.
87. De colocynthide. id.
88. De Turbit. 120. b
89. De lathyri. ibid. i
90. De elleboro. ibid.
91. De euphorbio. 121.
92. De armenio lapide. ibid.
93. De cyaneo. ibid.
94. De Hermodactylo. 122.
95. De Tithymalo. 122.
96. De elaterio. ibid.
97. De thymalae. ibid.

LIBER II. MEDICAMENTARIUS
dictus: De uisitata medicamentorum
componendorum ratione.

Capitum.

Seçtio 1. De ponderibus, quorū in componendis medicamentis usus est, ratione. 124.

2. De antidotis, seu confectiōibus, magnis vocatis & opiatīs. 126.

3. De Antidotis robur corpori adiucientibus, liquidis sine electuariis. 150.

4. De Antidotis robur corpori adiucientibus, solidis. 156.

5. De medicamentis, tum lenientibus aluum, tum purgantibus, liquidis & solidis. 174.

6. De cataportis, seu pilulis. 189.

7. De Saccharis & conditis. 199.

8. De Eclegmatis. 203.

9. De zupapiis, & succis medicatis. 204.

10. De serapiis. 207.

11. De pulueribus, & speciebus. 221.

12. De pastillis. 224.

13. De collyriis. 232.

14. De pilis odoratis. 233.

15. De oleis. ibid.

16. De unguentis. 245.

17. De emplastris. 256.

18. De ceratis. 261.

LIBER II. DE MEDICAMENTORUM, componendorum, miscendorumque ratione.

Cap. 1. De Antidotis. 263.

2. De Antidotorum lethalibus aduersantium usu. 264.

3. De Antidotorum, dolorem sedantiū, & stupefacientium, usu. 245.

4. De Antidotorum somniferorum, usu. 267.

5. De Antidotorum, robur corpori adiucientium, usu. ibid.

6. De Antidotorum purgantium usu. 270.

7. De bolipurgatorii usu. 271.

8. De diluti purgatorii usu. 272.

9. De cataportiorum usu. 274.

10. De eorum usu, quæ vomitum eliciunt. 276.

11. De Saccharorum & conditorum usu. ibid.

12. De eclegmatum usu. 277.

13. De zupapiorum usu. 278.

14. De succorum medicamentorum usu. ibid.

15. De serapiorum usu. 279.

16. De decoctis parandis. ibid.

17. De puluerum usu. 281.

18. De pastillorum usu. 282.

19. De glandibus. 283.

20. De clysteribus. 284.

21. De collyriis. 285.

22. De gargarizatu. 286.

23. De dentifriciis. 287.

24. De pessis. ibid.

25. De errhinis. 288.

26. De sternutamentis. 289.

27. De apophlegmatismis. ibid.

28. De odoramentis. 290.

29. De suffimentis. 291.

LIBER IV. DE VSITATA COM- ponendorum, miscendorumque me- dicamentorumque ra- tione.

Cap. 1. De unguentis. 292.

2. De Linimentis. 293.

3. De emplastris. 294.

4. De Cataplasmatibus. ibid.

5. De ceratis. 295.

6. De dropace. 296.

7. De Sinapismo. ibid.

8. De epithematis. 297.

9. De embrochis. 298.

10. De fomentis. ibid.

11. De sacculis. 299.

12. De incessionibus. ibid.

ELENCHVS CAPITVM TER- tiæ Partis, Operum Leonhar- di Fuchsi.

LIBER I. DE MEDENDIS HVMA- ni corporis vitiis.

Cap. 1. De Alopecia & ophiassi. 1.

2. De destitutio capillorum. 3.

3. De tincturis capillorum.

4. De porrigine. 6.

5. De phthiriasi. 7.

6. De Achore & fauo. ibid.

7. De dolore capitis. 9.

8. De dolore capitis ex calida intemperie na-
to. 10.

9. De dolore capitis ex frigida intemperie pro-
creato. 12.

10. De dolore capitis ex intemperie sicca vel hu-
mida orto. 13.

11. De dolore capitis ex plenitudine. 14.

12. De dolore capitis ex biliosis humoribus. 15.

13. De dolore capitis ex pituitosis humoribus. 17.

14. De dolore capitis ex ventriculi vitio, adeoque
per consensum orto. 19.

15. De dolore capitis ex ebrietate. 19.

16. De capitis dolore, ex ictu vel casu. 20.

17. De dolore capitis in febribus. 21.

18. De Cephalæa. 22.

19. De Hemicrania. 23.

20. De vertigine. 24.

21. De phrenitide. 26.

22. De lethargo. 29.

23. De caro. 31.

Elenchus

24. De catocha & catalepsi. 31.
25. De comate. 32.
26. De memoria abolita. 33.
27. De apoplexia. 35.
28. De resolutione alterius lateris. 36.
29. De resolutione, qua unam aliquam tantum partem obsedit. 38.
30. De epilepsia. 39.
31. De convulsione. 45.
32. De incubo. 47.
33. De Mania. 47.
34. De melancholia. 49.
35. De Tremore. 53.
36. De ophthalmia, siue lippitudine. 53.
37. De Pterygio. 55.
38. De Phlyctenis. *ibid.*
39. De ulceribus oculorum. 56.
40. De cicatricibus, & albuginibus oculorum. 57.
41. De sugillatis. 58.
42. De pure sub cornea. *ibid.*
43. De suffusione. 59.
44. De dilatazione & diminutione pupille. 60.
45. De visus obscuritate. 61.
46. De Nyctalopis. 62.
47. De expressione oculi. *ibid.*
48. De AEgilope. 63.
49. De aurium dolore. 64.
50. De aurium sonitu. 65.
51. De surditate, & graui auditu. 66.
52. De parotidibus. 67.
53. De ozænis. 68.
54. De sanguinis ex naribus profluuiis. *ibid.*
55. De destillatione, grauedine, & raucaitate. 70.
56. De dentium dolore. 72.
57. De dentibus denigratis, liuentibusque & mobilibus. 73.
58. De Aphthis. 74.
59. De fæcore oris. 75.

LIBER II. DE MEDENDIS HUMANI CORPORIS MALIS.

- Cap. 1. De columella phlegmone. 76.
2. De laxata columella. 77.
 3. De consillarum phlegmone. *ibid.*
 4. De serpentibus, & malignis consillarum ulceribus. 79.
 5. De angina. 79.
 6. De tussi. 81.
 7. De Asthmate. 83.
 8. De pleuritide. 84.
 9. De peripneumonia. 86.
 10. De sanguinis reiectione. 87.
 11. De empyemate. 90.
 12. De tabe. 91.

13. De cordis palpitatione. 92.
14. De syncope. 94.
15. De lactis defectu. 97.
16. De lactis redundantia. *ibid.*
17. De lacte in grumos conuerso. 98.
18. De phlegmone mammarum. 99.

LIBER III. DE MEDENDIS HUMANI CORPORIS MALIS.

- Cap. 1. De imbecillitate ventriculi. 99.
2. De nausea & vomitu. 101.
 3. De siti immensa. 102.
 4. De Stomachi dolore. 103.
 5. De phlegmone ventriculi. *ibid.*
 6. De cibi fastidio. 104.
 7. De appetentia canina. 105.
 8. De Bulimo. 107.
 9. De cruditate. 108.
 10. De inflatione ventriculi. 110.
 11. De singultu. 111.
 12. De cholera. 112.
 13. De diarrhæa. 113.
 14. De lienteria. 115.
 15. De dysenteria. 116.
 16. De teneismo. 118.
 17. De coli doloribus. 120.
 18. De Ileco. 122.
 19. De lumbricis. 123.
 20. De hemorrhoidibus. 125.
 21. De procidentia ani. 126.
 22. De rimis ani. 127.
 23. De imbecillitate iocinoris. *ibid.*
 24. De obstructione iocinoris. 129.
 25. De phlegmone iocinoris. 130.
 26. De intemperie lienis. 132.
 27. De phlegmone lienis. 134.
 28. De lienis scirrhus. *ibid.*
 29. De lienis obstructione. 135.
 30. De ictero. *ibid.*
 31. De malo corporis habitu. 138.
 32. De aqua inter cutem. *ibid.*
 33. De Anasarca. 139.
 34. De Ascite. 141.
 35. De Tympanite. 141.
 36. De renibus cruentam urinam excrementibus. 142.
 37. De renum phlegmonibus. 143.
 38. De renum calculo. 144.
 39. De renum ulceribus. 146.
 40. De diabete. 148.
 41. De vesica calculo. 149.
 42. De sanguinis ex vesica eruptione, & eiusdem grumis. 150.
 43. De vesica phlegmone. 150.
 44. De ulceribus vesicae, & eius cernicis. 151.

Capitum.

45. De urina stillicidio. 153.
46. De urina difficultate. ibid.
47. De urina suppressione. 154.
48. De pudendi exulceratione. 155.
49. De priapismo. 155.
50. De feminis profluuiis. 156.
51. De iis, quire Venerea utri non possunt. 157.
52. De ramice. 158.
53. De suppressis mensibus. 159.
54. De redundantibus mensibus. 162.
55. De fluore muliebri. 163.
56. De uteri suffocatione. ibid.
57. De uteri procidentia. 165.
58. De Mola. 166.
59. De uteri phlegmone. 167.
60. De uteri inflatione. 168.
61. De uteri exulceratione. 169.
62. De phimosi uteri. 169.
63. De sterilitate remanenda. 170.
64. De partus difficultate. 172.
65. De Ischiade. 174.
66. De podagra & arthritide. 175.

LIBER IV. DE MEDENDIS HUMANI CORPORIS MALIS.

- Cap. 1. De diaria. 179.
2. De diaria plurium dierum. 183.
3. De Synochoputrida. 184.
4. De continuis febribus. 186.
5. De ardente febre. 188.
6. De exquisita tertiana intermittente. 189.
7. De tertiana notha. 192.
8. De quartana. 193.
9. De quintana. 195.
10. De hectica febre. 196.
11. De Hemitritao, seu semitertiana. 198.
12. De pestilentia. 199.

LIBER V. DE MEDENDIS TUMORIBUS.

- Cap. 1. De phlegmone. 214.
2. De herpete. 215.
3. De erysipelate. 216.
4. De carbunculo. 217.
5. De Gangrena. 218.
6. De imperigine. 219.
7. De scabie. 220.
8. De pruritu. 221.
9. De exanthematis. ibid.
10. De ambustis. 223.
11. De formica, verruca, & clauo. ibid.
12. De vitiligine. 224.
13. De oedemate. 225.
14. De inflationibus. 226.
15. De scirrhis. 227.
16. De strumis. 228.

17. De abscessibus. 229.
18. De cancro. 230.
19. De elephantia. 232.
20. De morbo Galli. 234.
21. Instrumenta telis atque in fixis aliis rebus extrahendis idonea & necessaria. 235.

LIB. VI. DE MEDENDIS VULNERIBUS.

- Cap. 1. De vulneribus in uniuersum. 239.
2. De vulneribus magnis in superficie acceptis, & minime profundis. 247.
3. De vulnere profundo, & recondito, citra amissionē substantiæ, in carne accepto. 248.
4. De cauo vulnere. 249.
5. De aequali, siue impleto vulnere. 251.
6. De vulnere supercrescentem carnem habente. 252.
7. De vulnere contuso, & alio præter naturam affectu coniuncto & implicito. 253.
8. De ecchymosi. 254.
9. De vulnere ex morfu velictu animantium, tum venenatorum, tum rabidorum. 256.
10. De morfu carnis rabiosi. 257.
11. De vulnere ex sanguinis profusione ex venis. 358.
12. De punctura nerue, seu punctum vulneratis nervis. 259.
13. De nervo casim vulnerato. 263.
14. De nervi contusione. 265.

LIB. VII. DE VLCERIBVS.

- Cap. 1. De ulcere simplici, & quod solum consistit. 266.
2. De ulcere cum intemperie. ibid.
3. De ulcere cum tumore particula. 267.
4. De ulcere contuso. 268.
5. De carne in ulceribus supercrescente, quam ὑπερσάρκωσις Græci nominant, tollenda. ibi.
6. De ulcere cum duritia, & laborum decoloratione. 269.
7. De ulcere cum varicibus complicato. ibid.
8. De verminoso ulcere. 270.
9. De ulcere disrupto, & cum ossis corruptione complicato. ibid.
10. De ulceribus agre cicatricem admittentibus, & malignis. 271.
11. De ulcere exedente. 273.
12. De sordido & putri ulcere. 275.
13. De profundo & cuniculoso ulcere. 276.
14. De fistula. 279.
15. De cancro exulcerato. 282.

LIBER VIII. DE MEDENDIS FRACTURIS & LUXATIONIBUS.

- Cap. 1. De fracturis in uniuersum. 283.
2. De luxationibus in uniuersum. 291.

Elenchus

INDEX BREVIS EORVM, quæ capitibus singulis Paradoxorum continentur.

CAPITA LIBRI PRIMI.

- C**ap. 1. Aloen per se ora venarum non aperire, neq; sanguinē ciere, quemadmodū multū Serapionis Mesuesque peruerso dogmate seducti opinantur, sed eadem potius occludere, atque sanguinem undecunque fluentem sistere. 295.
2. Aloen melli commixtam non minus, imo plus purgare, contra Auicē. & Mesue erroneam sententiam. 299.
3. Aloen ventriculo & iocinori non nocere, ut falso plerisque Auicenna & Mesue persuaserunt. ibid.
4. Rheobarbarum nostrum & vulgare in plerisque a veterū Rheobarbaro differre, atque adeo diuersum esse. 300.
5. Castam Arabum & recentiorum, a veterum atque Græcorum aliā & diuersam esse. 302.
6. Mannam Arabum ac nostra tempestatis medicorum, a Manna Græcorum & veterum esse plane diuersum. 303.
7. Verum & Græcorum eupatoriū nec Auicennam nec Mesuen cognouisse, quum tamen a vulgatissima & omnib. hodie notissima herba agrimonia appellata, nihil differat. 304.
8. Eupatorium Græcorū non habere vim purgatoriā, veteres omnes uno ore, secus atq; id, q̃ a Mesue describitur, affirmare. 306.
9. Arabum placita in describendis herbis non esse sectanda, vel vnā radicem, quam hodie sub turbith nomine officina vendunt argumento esse, hanc enim tam variè atq; ambigue pingere, ut impossibile sit diuinare, quid per illam intellexerint. 307.
10. Prudenter facturos medica artis studiosos, si Mesuen rheubarbaro, epithymo, scāmōnio, polypo dio, & euphorbio exhibitionis præscribentem pōdus, haud secuti fuerint. 308.
11. Centaurium maius Mesuen, Auicē. in hoc ut plerisque aliis secuti, præter antiquorum exemplum, cum minore confundere, ac vires vtriusque indiscriminatim commiscere, minus quoque non sine magno errore maiori præferre. 310.
12. Arabes ferme omnes nō sine magna inscitia nota, armenium lapidē cum cyaneo, quem lazuli vulgo vocant, confundere. 312.
13. In describendis cicutā & napello herbis non solum ancipitē fuisse, sed & eorundē vires miscuisse Auic. ita ut hinc verisimile admodum sit, illum vtrāque ignorasse. 313.
14. Napellū, lethale homini in cibo aut potu venenum, ad leucen, quā albaram nominat, abigendam, perperam & non sine capitali errore ab Auic. propinatum esse. 316.
15. Radicis pentaphylli succum minime perniciosum, quemadmodum Auicē. somniavit, sed potius cōtra lethalia venena admodum efficacem esse. 317.
16. Harmel Arabibus non cicutam, sed rutam potius sylvestrem alteram significare, vtriusque Auicē. ac huius sequaces reluctentur, veterum omnium testimoniis euidentissimum esse. 318.
17. Ladanum, vel, ut barbari addita vna litera loquuntur, laudanum, nō ex hedera, perinde ut Auic. somniat, sed cisto potius frutice, quem ladam alias nominant, colligi. 320.
18. Auic. volubilis maioris facultates cū hedera proprietatibus confundere, notius ferme esse, quam ut demonstrari debeat. ibid.
19. Sucutum neque semperuiuum, neque mandragoræ speciem esse, veluti Auicē. putat, sed eam potius herbam, quam veteres symphitum petreum appellant. 321.
20. Ignorasse populum arborem Auic. cum ex ambigua eius de illa sententia, tum etiam quod calidam esse in ordine tertio statuit, colligi. 322.
21. Charabe quod Græci electrum, Latini autem succinum vocant, non esse populi nigra lachrymam, quemadmodum Auicenna & alii quidem, fabuloso seducti errore docent. 324.
22. Haud recte Auicē. & Mesuen herbam mezereon, quā a Græcis chamaelea dicitur, inter lactariorum genera connumerare, ac cum thymelæa confundere: multa quoque, quæ chamaeleoni debentur, nominis vicinitate deceptos, chamaelea tribuere. 326.
23. Auicennam calamitū cum origano confundere, atque vtriusque vires promiscue docere. 328.
24. Auic. thapsia tribuere, quæ iuxta veneno cōueniunt nulli fere in confesso esse, adeoque vtriusque naturam illum non satis perspectam habuisse. 329.
25. Herbas quatuor, asinē videlicet, helxinen, anagalliden, & myosotida, natura & figura plurimum distantes, Auicennam uno eodemque capite sub auricula muris appellatione, confudisse. 334.
26. Ignorasse Auic. Serapionē, Pandectariumq; isatim herbam, quam illi Nil & nilech appellant,

Capitum.

- pellant, variam & ancipitem eorundem, de illa sententiam satis indicare. 333.
27. Iuiubas & sebesten fructus, qui Græce pariter atq; Latine, serica & myxa vocantur, ad leniendam aluum veteres Græcos, perinde atque Auicennam & uniuersam Arabum scholam, usos non fuisse. 334.
28. Nostra atatis Medicos herbam veteribus pedem coruinū appellatam, ob ambiguam de illa Auicenna sententiam, a nostra sic vocata diuersam esse, prorsus ignorare. 336.
29. Sanguinem draconis vulgo dictum, non esse sideritidis herba succum, ut Serapion, illumque hodie sequentes Medici perperam arbitrantur. 337.
30. Cenabrium vulgo vocatū, a cinnabari veterum diuersum esse. 339.
31. Myrtum sylvestrem nō ferre fructum, quem Arabes cubebam nominant, ut impudenter admodum cōmentus est Serapion. 340.
32. Alibium non esse herbam eryngium, veluti Pandectarius putat, sed eam quā Græci bubonion: Latini autem inguinariam appellant. 341.
33. Herbam vulgarem boraginē hodie dictam veterum existere buglossum, adeoque hāc pro illo ad medicinæ usum esse adhibendam. 342.
34. Sandaracam Arabum & hos ipsos sequentium a sandaraca Græcorum & Latino-rum non formatantum, sed viribus etiam esse diuersam. 343.
35. Saccharum antiquorum a vulgari hoc nostro, quod nunc voce parum deflexa, barbaro vocabulo zucarum appellamus, diuersum esse, & a sale Indo, cōtra Gentilem & Herculanum, nihil differre. 344.
36. Memithe Arabum, neq; esse chelidoniam, neque papauer cornutum, ut Medici seculi nostri existimant, sed id potius quod Dioscorides & alii veteres glaucium nominant. 347.
37. Herbā lichenen Græcis dictam, Platearium præter omnem rationem Hepaticam, quæ se hepati conferat, appellare, quando id nominis eupatorio Græcorū potius veterum testimonio conueniat. 348.
38. Phaselum non a phasiolo, sed a phaseolo legumine, quod dolichum alio nomine vocant, diuersum penitus esse.
39. In cantu haridum exhibitione alas, tanquam reliquis earundem partib. magis exutiosas, minime esse abiiciendas, sed iuxta Galeni placita, totas potius ingerendas.
40. Mumiam vocatam non solum esse humano-rum cadauerum tabidam sanicem, ut multi credunt, sed etiam id quod pissis phalōn Dioscorides nominat.
41. Medicamentum purgans detrahendis humoribus esse simile, contra Mesuē, illumque sequentes Medicos.
42. Theriacam, cuius vix hodie verum exstat nomen, eos quos veteres pollicentur effectus nostro seculo non præstare, quod multa huius confectiōem constituentia, nedum a pharmacopolis, sed a Medicis etiam ignorentur.
43. Syrupum, ut vocant de eupatorio, eos quoque siue pollicetur, effectus præstare non posse, quod multa huius cōpositionem ingrediuntur medicamenta, quæ seplasia iis ac Medicis ipsis prorsus ignota sint. 363.

CAPITA LIBRI SECUNDI.

1. Non esse nisi duo tantum caussarum insalubrium genera, externam scilicet & internam, vel ut hodie loquuntur, primitiuam & antecedentem; contra Auicennam totumq; iuniorum Medicorum cætum, coniunctam namque in morbis Galenum ne somniasse quidem. 365.
2. Medicos iuniores repletionis species confundere, neque quod turpe admodum est, easdem recte definire. 368.
3. Vbicunque virisque auxiliis, & vena scilicet sectione, & purgatione opus erit, tum venam potius incidendā antepurgationem, quam purgandum ante venæ sectionem esse, contra omnium ferme hodie medicinam facientium sententiam. 371.
4. In internorum viscerum phlegmonibus tutius rectiusque e directo, quam in opposito latere, contra Arabum ac recentiorum fere omnium sententiā, venam secandam esse, idque non modo vacuandi, sed & reuellendi gratia faciendum. 372.
5. Parcā seu diminuentem materiā vacuationem, minorationem hodie barbaro vocabulo nominant, concoctioni humorum nisi iurgeant, nō esse præmittendam, contra multorum hodie medicarum sententiam. 379.
6. Non atate etiam consistentes tam sanos quam agros, ut multi hodie medicorum facere consueuerunt, immodicis medicamentis purgatoriis excarnificandos, multo minus infantes. 381.
7. Cataportia vehementius trahentia, pilulas nostri vocant, non nisi ieiuno, & ei qui probe concoxit esse exhibenda, contra o-

Elenchus

- mmium ferme hac tēpestate medicantium, sententiam. 383.
8. Præter omnem rationem nostrates solo decocto pisorum post epota medicamenta purgantia abluendi abstergendive gratia uti. 384.
 9. Febricitantes, tertiana præsertim exquisita correptos febre, immodicis medicamentis purgatoriis non esse excarnificandos, ut plerique hodie faciunt, quum alterantibus uti interdum satis sit. 385.
 10. Quum veterum omnium testimoniis ad februm curationem balneo nihil utilius sit, inique facere hodie Medicos, quod febricitantibus illo interdiciunt. 387.
 11. Flavam bilem tenuisque succos, ut facilius ex corpore educantur, non indigere ut crassiores reddantur, quemadmodum præter omnem rationem Auic. credidit. 389.
 12. Capitale esse pleuritidis lenticulam ex aceto dare, id quod tamen facere Auic. contra omnium veterum præscriptum constat. 392.
 13. Omnium exitiosissimum esse veterumque placitis maxime aduersum, dysenteria affectos purgantibus excarnificari medicamentis. 393.
 14. Colico cruciatu tentatos validis medicamentis purgantibus, ut hodie multi faciunt, non esse purgandos. 395.
 15. Indocte admodum contraque veterum exemplum agere iuniores hodie medicos, qui neglectis omnibus pene aliis remediis, in medendo renum calculo, assidua tantum clysterium iniectione utuntur. 396.
 16. Elephantiasin & lepram morbos aliter apud Arabes, aliter apud Græcos accipi, contra plurimorum hodie sententiam. 398.
 17. Morbum quem vulgo Gallicum nominant, non esse eum, quem Græci lichenem, Latini vero impetiginem appellant, sed novum potius & veteribus incognitum. 402.
 18. Non esse diuersa morborum genera, primum seu ignem Persicum, carbunculum atque anthracem, ut multi medicorum hodie putant, sed unum potius eundemque diuersis his designari nominibus morbum. 404.
 19. Auicennam erysipelas formicas, myrmeciam, ignemque Persicum, morbos natura distantes, eorundemque curationes turpiter admodum confundere. 407.
 20. Auic. perperam omnibus bubonibus in discriminating remedia reprimenda adhibere, quum iis tantum, quæ ab humoribus malignis ortum habeant, cōueniant. 409.
 21. Cænam non in uniuersum, ut fere omnes nostra ætatis Medici docent, prandio minorem esse debere, sed ut plurimum pleniorē. 410.
 22. Pulsem ex auena confectam, non sine magno errore, & agri periculo, a nostri sæculi medicis febricitantibus, ac aliis eiusmodi morbis correptis exhiberi. 412.

CAPITA LIBRI TERTII.

1. Sex tantum numero esse intestina, ideoque falso a Cor. Cel. Auic. ac aliis quam multis pyloron seu portonarium vulgo dictum, inter intestina connumerari. 414.
2. Biliofam superfluitatem non ad ieiunum intestinum, quemadmodum Auic. putauit, neque ad pyloron, ut alii quidam opinantur, sed ad duodenum potius confluere. 416.
3. Meatum bilem ad intestina deferentem non in omnibus geminum esse, ut Mundinus ac alii quidam arbitrantur, cum paucissimis quibusdam exceptis, omnibus reliquis unicus sit. 417.
4. Ieiunum non eandem quam rectum intestinum habere rectitudinem, quemadmodum Rhazes, Mundinus, ac alii quidam arbitrantur. 419.
5. Ad ileon siue tenue intestinum non plures quam ad ullum aliud intestinorum venas pertinere, id quod tamen Mundinus præter veritatem asserit. 420.
6. Stercora seu alui excrementa, in ventriculo non generari, ut Auic. & nonnulli hunc sequentes sentire videntur. 420.
7. Mesenterium perperam a quibusdam inter intestina connumerari, quum peculiare potius ab iis membrum sit. 422.
8. Venas nullas, per quas sætus in utero urinam emittit in suminis seu abdominis extremam cutem terminari, quemadmodum, præter omnem rationem & sensum, Mundinus & Alex. Benedictus docent. 423.
9. Vterum non habere septem sinus siue cellulas, ut Mundinus, præter omnem veritatem astruit, sed duos tantum, idque in homine. 426.
10. Septum transversum, quod Græci diaphragma nominant, non prorsus carne carere, veluti Alexand. Benedictus, Plinium in hoc secutus sentire videtur. 428.
11. Perperam Alexandrum Benedictum in trium ventriculorum cordis assertionem Aristotelem defendere, quum ut plurimum duo tantum sint. 429.

Elenchus

12. *Gulam nullos habere musculos motui deglutitionis seruiantes, quemadmodum Aui-cenna ac alii quidam existimant, quando motus ille sit plane naturalis, atque adeo musculis minime egeat. 433.*
13. *Viam vocis, ac spiritus, tracheam, id est, asperam arteriam dictam, non esse interiorem, neque cibi & potus, gulam nominatam, exteriorem, ut Alexand. Benedict. asserere ausus fuit. 435.*
14. *Alexandrum Benedictum, præter veterum exemplum, pharynga cum aspera arteria confundere. 436.*
15. *Magno & impudenti errore, Alexandrum Benedictum bronchum cum larynge confundere. 437.*
16. *Perperam Alex. Benedict. epiglottidem cum ligula, quam epiglottida Græci vocant, confundere, & epiglottidi musculos tribuere, qui proprie loquendo laryngi gutturine potius tribuendi erant. 438.*
17. *Cerebrum naturam aduersus cordis calorem non esse molitam, veluti Alexand. Bened. Aristotel. in hoc secutus, putat. 440.*

AVGERIVS FERRERIVS, THOLOSAS MEDICVS, LECTORI.



Eteres omnes & recentiores, qui optimam studendi rationem nobis explicarunt, inter cetera præcepta hoc in primis dederunt, vt ab Institutionibus ac Isagogis auspicaremur, quibus tanquam manu duceremur ad disciplinas & artes, quas initio petendas nobis proposuerimus. Habent n. disciplinae omnes in fronte obscuras quasdam nubes, & prædens tenebras, quib. nondū initiati deterreantur, & sæpè numero desperent ad internam & remotissimam illam lucem peruenire: & nos primo animo concipimus artis eius, quam probamus & sequimur, ideam quandam re ipsa & amplitudine ac difficultate longe maiorem. Quo fit, vt quum omnes scientias collaudent, & rerum cognitione delectentur, pauci tamen sint, qui fruantur illarum possessione. Quippe repelluntur multorum ingenia primis illis obscuritatibus, & in ipso statim vestibulo confunduntur vasta illa idea, quam animo comprehenderunt. Quibus malis præsentissimum remedium est, compendiosis institutionibus, artificialibusque methodis totius artis summam exprimere, summatiaque illa descriptione rudium animos informare. Sic enim fiet, vt portentosa illa idea paulatim deficiat, & tenebræ dehiscant, ipsaque iam propinqua lux appareat, quæ prius remotissima videbatur. Quod quum in omnibus artibus locum habeat, sic in medicina potissimum desideratur: quod nulla sit ars, quæ maiorem requirat rerum cognitionem, quæ circa magis difficilia versetur, quæ rudes animos celerius repellat, quæ methodos institutiones, introductiones & compēdia, tum discendi, tum memorandi causa magis postulet. Sed in compendiis, isagogis & institutionibus, sicut & in rebus aliis, delectum adhibere conuenit. Circumferuntur enim Arabum & Barbarorum Medicorum introductiones, institutiones, & summæ, quæ caliginem potius inducant, quæ lucem afferant. Sed nec introductio Galeni falso inscripta satisfacit: quod paucissima artis capita attingat, atque ea fere sine methodo. Vnus Leonhardus Fuchsius, quod quaerimus, iis Institutionibus præstitisse videtur, tanta fide, facilitate, & diligentia, vt nihil iure desiderari possit, siue quod viam ad Galenum purissimum medicinæ fontem parer, spectes: siue etiam, quod eos, qui in Galeno satis diligenter versati sunt, confirmet, memoriam augeat, iudicium roboret, Vale.

VINCENTIVS OBSO- POEVS LECTORI

Εὐ πείθει.

Sint licet hac variis feruentia tempora turbis,
Plenaque luctificis sint licet illa malis.
Vt quoque veritas tua lumina, tristis Erinny
Saeuat & secum fata timenda trahat.
Hinc belli rabies saevis circumsonat armis,
Miscens immitti funera crebra manu.
Hinc misera lues agros populatur & vrbes,
Hinc subita mortes, hinc malesuada fames.
Præterea sancta discordia pectora lege
Atque tot heretici dogmata prava gregis.
Et turba atrocis sacramentaria bella
Adde remersorum fæda lauacra quoque.
Vt taceam infames turpissima monstra Sophistas,
Nulla quibus pestis noxior esse potest.
Non tamen hac quamuis feralia tempora prorsus,
In tota cuncta commoditate carent.
Sunt hac ingenis, sunt hac fœlicia Musis,
Et studiis florent nobilitata bonis.
Vt plane veterum vincant hac tempora seclum
Artibus egregiis, eximisque viris.
Mittam doctrina lumen mirabile sacra,
Illustrans sancta pectora cæca fide.
Purius hoc nullo quam nostro tempore visum est,
Obscurum crassis nubibus ante fuit.
Inclita iam triplici loquitur Germania lingua,
Floret io miris Attica Musa modis.
Ipsos iam fontes legum iurisque peritus.
Scrutatur, cessat barbara glossa legi.
Hoc etiam Medici meliore sydere nati
Exemplo veterum iam monumenta terunt.
Incipit esse minor vetulis Auicenna lacunis,
Hippocrates summa dignior arce sedet.
Huius & interpres Graio sermone Galenus
Atque alii quotquot Cecropis ora tulit.
Horum etiam cultor non segnis Fuchsius ille
Qui tibi de tanto protulit ista penu.
Magnum Pæonia thesaurum protulit artis
Exculta mentis sedulitate sua.
Hunc tu viperea caueas percellere lingua,
Neue Theonino rodere dente velis.
Alterius si quem stimulis vaga gloria pungit,
Moliri potius dexteriora stude.
Talem te in campum, si qua est vis vlla, vocamus,
Hacque sit ingenio strata palestra tuo.
At si non audes dubio te credere campo,
Quid iuuat inuidiam prodere liuor iners?
Ergo tua si quid censura assumere tentas,
Ne temere crepidam praterisse velis.
Si non exspueris talem de pectore morbum,
Tum quod agis semper perdisce liuor age.

Τέλος

CARMEN

CARMEN IN LAVDEM
LEONHARDI FUCHSII, SCRIP-
PTVM A IACOBO OETHOEIO, NOT-
HVSANO.

OMnia quæ mundi vasto conclusa theatro
Corpora, natura vis generosa fouet.
Certa sui debent ortus primordia caussis,
Quis sine nil nasci, nilque vigere potest.
Has bene cui nouisse datum est, is munere diuum
Felix, æthereæ semina mentis habet.
Dignus & est memori qui laude uehatur ab auo,
Præmiaque a sera posteritate ferat.
Ergo quis æthereum dubitet tibi inesse vigorem,
Fuchsi, Pæonia gloria magna schola?
Quis non deberi tibi fama præmia dicat,
Perpetuo tituli laude manente tui?
Dogmata dum magni demonstrans clara Galeni,
Morborum caussas, seminaque ipsa doces.
Ostendisque artis ratio qua certa medendi,
Corporaque ægrorum quo releuanda modo.
Scilicet hæc quondam de te testata vetustas,
Virtuti tribuet præmia digna tuæ.
At tu Pæonia equeris qui castra cohortis,
Mollia tam docto fata precare viro:
Vt reliquos vita traducens molliter annos,
Amplificet medicas, ut bene cœpit, opes.
Sic tibi suppeditet Cræsus Epidaurius herbas,
Sic tua sit Phæbo dextra medela duce.

AD LECTOREM.

Abstulerant Arabes ducibus vexilla Pelasgis,
Et veterum e regno Pæona depulerant.
Fuchsius ast Arabum e castris vexilla redemit.
Et veterum in regnum Pæona restituit:



LEONHARDI FUCHSII
ARCHIATRI ILLVSTRISSI-
MORVM DVCVM WIRTENBER-

GENSIUM,

Operum Medicinalium Pars I.

INSTITVTIONVM MEDICINÆ,
LIBER PRIMVS.

De Medicina generatim.

SECTIO I.

De Medicina origine, incremento, & perfectione. CAP. I.

A



VOTQVOT vnquam a condito mundo vixerunt homines, vno omnes ore ac cōsensu medicinæ initia Diis immortalibus ascripserunt. Nam vt a Mose, omnium eorum, qui exstāt, Hebræo scriptore antiquissimo, artiumque omnium principe, exordiamur, hic certe Genesios cap. 1. Deum optimum maximum, herbas, stirpes, & arbores fructiferas, itemque animantia, & alias res vniuersas, quibus

Medicina
origo diuina.
Moses.

Iesus Syrach.

in hodiernum vsque diem ad tuendam sanitatem, & propulandos morbos vtimur, e nihilo condidisse diserte scribit. Mosi verissimi vatis sententiam Iesus Syrach, inter Hebræos vir singulari pietate, prudentia, varia rerum cognitione, di-

B uinoque præditus spiritu, cap. 38. sui libri cōfirmat, iis sane verbis: *Τίμα Ιατρὴν ὡς τοὺς χεῖρας ἡμῶν αὐτῶν, καὶ γὰρ αὐτὸν ἐκποίησεν κύριος. ὡς δὲ γὰρ ὑψίστου ὄντος ἰατρὸς, καὶ ὡς βασιλέως ἀνέστη δόμα. κύριος ἐκί- σθη ἐν γῆς φάρμακον, καὶ ἀνὴρ φέρνιμος ἐπεσοχθῆναι αὐτοῖς. Ιατρὸς δὲς τόπον, καὶ γὰρ αὐτὸν ἐκποίησεν κύριος.* Malui-

mus autem Septuaginta citare interpretationem, vt pote nobis notio- rem, cuius is plane sensus est, *Affice medicum suis honoribus ac premiis, vt necessitate urgente vti illo possis: nam eum creauit dominus. Est enim a supremo medicina, & a rege stipendium accipiet. Dominus ex terra condidit medicamenta, & prudens homo non contemnit ea. Cede locum medico, dominus enim illum creauit.* Hæc ille. Statuendum itaque prorsus erit, medicinam Dei munus esse, ideoque creatam & in terras missam, vt virium nostrarum imbecillitatem aliquantisper huius ope sustentemus. Ea igitur, quum res poscit, ita vtamur, vt agnoscamus non humano

Medicina
Dei munus.

C onfiliio, sed diuino beneficio vitæ prorogandæ proposita esse remedia. Non solum vero sacræ literæ palam docent, Deum & remedia nobis proposuisse, & medicos condidisse, sed etiam prophanz hunc honorem arti nostræ tribuunt. Siquidem Græci, apud quos primum exulta est medicina, Apollinem Deum inuentorem eius fuisse tradunt. Primus enim Apollo herbarum ac medicinæ vsum, antea prorsus neglectum, inue- xit. Græcorum de medicinæ origine sententiam secuti sunt etiam Latini scriptores, qui itidem Apollinem eius fuisse inuentorem memoriæ prodiderunt. Nam inter Latinos poetas non contemnendæ auctoritatis Ouidius Apollinem ita loquentem, & in- uentionem medicinæ sibi arrogantem, fingit, inquit:

Apollo mē-
dicinā in-
uentor.

Lib. 1. Me-
tamorph.

*Inuentum medicina meum est, opifexque per orbem
Dicor, & herbarum subiecta potentia nobis.*

D Post Apollinem medicinam adhuc rudem & inertem, ab Apolline patre institutus, paulo subtilius Æsculapius excoluit. Qui quum & ipse multa subinde inuenerit, fa-

Æsculapius.

Etum est, ut a nonnullis inter primos etiam medicinae inuentores numeratus sit. Relatus vero & ipse propter insignem hoc tempore medicinae peritiam, in Deorum numerum. In ea enim sic excelluisse fertur, ut mortuum Hippolytum, & Androgeum, Minois filium ab Arheniensibus, quod palaestra ceteros superaret, per inuidiam interfecit, ad vitam reuocauerit. Quod Propertius iis carminibus significare voluit, inquit;

*Et Deus extinctum Cressis Epidaurius herbis
Resituit patriis Androgeona fociis.*

Necnon Q. Serenus Samonicus, qui de Aesculapio inter cetera sic scribit:

*Tuque potens artis, reduces qui tradere vitas
Nosti, atque in caelum manes reuocare sepultos,
Qui colis Aegaeas, qui Pergama, quique Epidaurum.*

Iisdem quidem temporibus ob quarundam herbarum peritiam claruit Chiron Centaurus Thessalus. In Pelio enim Thessaliae ciuitate habitauit, Saturni & Phylliræ filius, Achillis præceptor ac pædagogus. Hunc autem multarum stirpium habuisse notitiam, Centaurium herba abunde testatur, ut quæ ab ipso in hodiernum usque diem nomen retinet. Proinde quum constet, illum aliquot herbarum ac medicamentorum habuisse peritiam, factum est, ut a Plinio, aliisque multis, medicinam inuenisse creditus sit. Sunt vero, qui non solum Aesculapio coetaneum, sed & eius fuisse præceptorem tradant. Porro Aesculapio duo fuisse filii perhibentur, ambo medici, Podalirius & Machaon, qui bello Troiano ducem Agamemnonem secuti, non mediocrem opem commilitonibus suis attulerunt, & ob id Homérico carmine laudati sunt. Ita enim de iis scriptum reliquit Homerus:

*Τῶν αὖτ' ἡγεσθὲν Ἀσκληπιῶ δὲ παῖδε
Ἰντῆς ἀγὰρ Ποδάλειε & ἦ δὲ Μαχάον.*

Quos versus Eobanus Hessus, clarissimus & optimus Germaniæ nostræ vates, ita reddidit:

*Quos duo ducebant fratres, Phæbique nepotes,
Matre Coronide præstantes arte medendi,
Belligerique ambo Podalirius atque Machaon.*

Hos tamen Homerus, antiquissimus poeta, non in pestilentia, neque in aliis morborum generibus aliquid attulisse auxilii, sed vulneribus tantummodo ferro & medicamentis mederi solitos asserit. Ex quo apparet, has solas medicinae partes ab iis esse tentatas, easque esse vetustissimas. Illorum itaque temporum observatio Chirurgiæ magis initium dedisse videtur, ut quæ sensui sit propinquior, & proinde cognitu faciliior, ac inuentu prior. Quemadmodum igitur Empiria plerisque aliis initium fecit, ita medicinam ab ea coepisse par est, illamque varie primum exstitisse, dum alia e similitudine animalium sumpta, alia casu ac fortuito deprehensa, deinde frequentata, & aucta subinde, initium huic parti artis fecerunt. Sic & ab oraculis multifariam petita medicamenta, idque ad tempora usque Plin. ut metipse testatur, ab aliis postea usurpata sunt: quibus postremo seruatis, ac in monumenta redactis in immensum creuit Empiria. Atque hinc est, quod medicinam Aristoteles in libro naturalium questionum, cuius index est de animalium proprietate, in ipso statim principio ait sparsim esse inuentam a diuinandi peritis in hominum conuentibus, & casu, vel somnio, vel vaticinio, vel demonum inuocatione, vel huiusmodi alio modo: quæ omnino de experimentatrice eius parte dicta fuisse oportet: Vnde non iniuria habita est primum hæc ars inconstans, ut quæ sæpius mutata sit, quod experimenta nulladum ratione stabilita, parum fida plerunque essent, & idcirco ab vno ad alium sese modum transferendi, sectatoribus suis occasionem subinde præberent. Hæc fuit antiqua medicina, quæ licet diues experimentis esset, nondum tamen omnibus morbis succurrere poterat, quod inquisitionis nouorum præsidiorum ratio nulladum haberetur, & causæ rerum, iniuriam illi præbentes, adhuc nescirentur. Ceterum sunt, qui apud Aegyptios medicinam inuentam esse velint, imo ipsi a se primum profectam esse affirmant. Quod non alia de causa fit, quam quod præter herbas, alia quoque medicamenta illic in usu fuerint. Id quod iis versibus testatus est Homerus:

*Αἰγυπτιῶν τῇ πλεῖστα φέροι ζείδωρος ἀνὴρ
φάρμακα, πολλὰ μὲν ὀσθλὰ μισγμένα, πολλὰ δ' ἁλυστά.*

Chiron Centaurus
Thessalus.
Centaurium
herba unde
dicta.
Lib. 7. ca. 56.

Podalirius
& Machaon

Iliad. 2.

Chirurgia
inuentio.

Experimentatrix
medicina in
eas & inconstans.

Cui apud
Aegyptios
reperita esse
medicina
credatur.

A Quos quidam ita conuertit:

*Fertilis Aegyptus rerum medicamina mista,
Optima multa simul deterrima plurima profert.*

Haecenus itaque, quæ medicinæ fuerit origo, ac quis vetustatis eiusdem splendor, demonstrauimus. Nunc quæ illius fuerint incrementa docebimus. Satis constat incrementa medicinæ Asclepiadæ hanc ipsam non parum auxisse, ac posteris, veluti hereditario acceptam, tradidisse. Horum autem studio ea pars medicinæ inuenta est & accessit, quæ morbos intus latentes curat, quæq; inquisitionem maiorem difficilioremque, neque statim ita obuiam habet. Hanc quidem medicinæ partem, aliquousque in densissima nocte latentem, Hippocrates, genitus in Co insula, in primis clara & valida,

*Incrementa
medicina
Asclepiada*

B Heraclidæ Phaneretesque filius, omnium quotquot ante se fuerunt, medicorum facile princeps, primus apud Græcos in artem redegit, ac fere consummatam in lucem reuocauit. Quo nomine diuinos meruit honores. Nam constat, eum ab Atheniensibus Eleusiniis sacris secundum ab Hercule monstrorum domitore initiatum fuisse. Maximam autem Hippocratis apud Græcos admirationem & existimationem fuisse, illud Nicomedis satis testatur, qui de eo ita cecinit:

Hippocrates

*Ἰπποκράτης φάσκει μερόπων καὶ σάου λαῶν
Εθεα, καὶ νεκρῶν ἦν σάσις εἰν αἰδῆ.*

Hoc distichon Vincentius Obsopceus, cuius veteris amicitia ego lubens memini, olim ita conuertit:

C *Lux hominum Hippocrates, dum gentibus ille medetur,
Copia per stygias raro petiuit aquas.*

Ceterum quæ hætenus copiose a nobis dicta sunt, Soranus Ephesius in præfatione suæ Iliades breuiter ac dilucide iis verbis expressit: *Medicinam, inquit, Apollo quidem inuenit, Asclepius amplificauit. Hippocrates perfecit. Hippocrati secutus est Diocles Caristius, Praxagoras, Chrysippus, & huius discipulus Erasistratus, Aristoteli filia genitus, & alii, quorum infra in c.*

*Diocles.
Praxagoras.
Chrysippus.
Erasistratus.
Galenus.*

D de medicorum sectis mentionem faciemus. Post hos omnes ab Hippocrate quidem elapsis annis, ni fallor, sexcentis tantum Galenus, vir nedum in medicina, verumetiam in omnibus aliis disciplinis excellentissimus, optimusque Hippocratis interpres, secutus est. Nam ut eius monumenta, quæ multa & varia posteritati reliquit, palam testantur, nullum penitus doctrinæ genus fuit, quod ille non exquisitè tenuit. Præter ceteras tamen artes, quas omnes cognouit, medicinam vnice excoluit, eamque nondum plena Coo illo Hippocrate elaboratam, perfectissime absoluit. Nam ut Apelles, insignis pictor, Veneris corpus, & summa thoracis politissima arte perfecit, reliquam vero corporis partem incoatam reliquit: ita Hippocrates in medicinæ principiis ac elementis, ceu capite, diligenter elaborauit, reliquum autem eius, tanquam corpus imperfectum ac rude, posteris expoliendum & perficiendum reliquit. Constat autem, vnum Galenum tot editis, omnium iudicio, doctissimis in arte medica libris, id ipsum præstitisse, qui medicinam ita illustrauit ac perpoliuit, ut nullam eius partem præterierit, quam non excoluerit, atque absolutam etiam nobis reliquerit. Quare illam absolutæ

Simile:

E medicinæ speciem, quam vix inueniri posse Hippocrates affirmauit, & in nullo se vnquam vidisse testatus est, medicorum omnium vnus expressit Galenus. Ut dubium non sit, quin a Deo excitatus, dissipatam iis temporibus medicinam reparare debuerat. Siquidem Plinio attestante, exorti erant impostores plurimi, qui artem deprauabant, non modo in facienda medicina, quod omnibus ætatibus accidit, sed multo magis in docendo nouas præstigias ostentabant. Quas enim ineptias non protulerunt Erasistratus, Asclepiades, Themison, Thessalus ille ineptissimus ac impudentissimus homo, & id genus alii Sophistæ. Quibus nisi se strenue, totisque viribus opposuisset Galenus, multis & iis quidem prodigiis erroribus & mendaciis insignibus contaminatam, & omnino deprauatam hodie haberemus medicinam. Deus itaque quum hanc artem retinere, & ad posteros conseruare vellet, daturus orbi terrarum excellentem artificem, Galeni ad hæc studia excitauit ingenium, ut esset qui præstigatorum illorum, qui artis præcepta sophisticis nugis ac disputationibus labefactare contendebant, nugas refutaret, & funditus extirparet. Hic igitur primus, ea quæ apud Hippocratem erant obscura, dilucide explicare, quæ parum discreta ac limitata distinguere, quæ vero defec-

*Galenus laudat.
dis.
Galenus a
Deo excitatus.*

runi, supplere studuit. Proinde vni Galeno acceptum referre oportet, quod hodie post A
tot peruerforum ac plane monstroforum dogmatum auctores, legitima ac vera artis
præcepta, ex quorum præscripto medicinam facere liceat, habeamus. Quum itaque
tantum in illustranda medicina elaborauerit, factum est, vt quum adhuc in terris age-
ret, primas in hac arte obtinere creditus sit. Postquam vero e vita hac mortali excessit,
nullus vnquam liuor, nulla calumnia, nulla denique obliuio nomen eius obscurare po-
tuit, adeo vt in hodiernum diem apud omnes gentes splendor & gloria illius vigeat, nec
vlla eius laudibus æternitas finem est allatura: viuit enim omnium in animis, sempiter-
namque sibi tot extra omnem aleam positis scriptis, ac post se relictis monumētis, me-
moriā parauit. Quæ cum ita sint, in hanc curam & cogitationem medicinæ initiatos
incumbere oportet, vt in vniuerso studiorum suorum cursu hos duos, Hippocratem B
inquam & Galenum, longe valere iussis Arabibus, & id genus aliis ineptis scriptoribus,
qui medicinam multis modis fœdarunt, ac infinitis propemodum erroribus, vt alibi
monstrauimus, referferunt, duces & principes, quos sequantur, sibi proponant, & cer-
to iudicio, quibus se formandos dent, deligant, ac in assidua eorundem lectione, opti-
mæ frugis plenissima, omnes ingenii vires ac neruos intendant, seque plurimum in re
medica profecisse sibi plane persuadeant, si Hippocrates & Galen. illis valde placent.

De Medicina præstantia. CAP. II.

Non temere Hippocratem dixisse, medicinam omnium artium præclarissimam es-
se, tum plane cognoscemus, vbi quam plurimarum rerum naturas hæc ipsa intue-
atur, & exquisitè rimetur, doceatq; animo nostro expenderit. Principio namque, C
admirabilem hominis fabricam naturamque explicat, ossa nimirum omnia, cartilagi-
nes, musculos, ligamenta, partes item nutritioni famulantes, & propagandæ speciei in-
seruientes, cordis præterea structurā, & ipsius functioni ministrantia organa, cerebrum
denique & huius actioni destinatas partes, in summa corporis minutissima quæque, ho-
rumq; omnium vsus prosequitur. Nec ista tradidisse contenta est, sed & quomodo hæc
omnia ex elementis nata sint, qualemque ex horum commistione consecuta sint tem-
peraturam, ostendit. Postea causas, quæ fabricam hanc & naturam conseruant, quæq;
eandem destruunt ac demoliuntur, ob oculos ponit. Tandem præsidia, quibus ea, quæ
elementorum concordiam turbant, & omnis generis morbos accersunt, propellun-
tur, edocet. Quapropter singularum stirpium, animalium, & quæ patefactis terræ fau- D
cibus eruuntur, metallorum, lapidum, gemmarum, eorum etiam quæ ex mari & aquis
extrahuntur, vires exponit. Et quis omnia, quæ medico sunt cognoscenda, breui saltem
in capite percenseret? Quum itaque tot & tantarum rerum peritia ornatum esse opor-
teat medicum, quid mirum omnis eruditionis Oceanum, rerumq; humanarum peri-
tissimum varem Homerum, in hæc prorupisse verba,

Ἰντὲς γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξει· ἄλλων.

Quod carmen Eobanus Hessus optimus Germaniæ vates, ita conuertit,

Vir medicus, siquidem multis virtutibus vnus

Præualeat, ante alios multos.

Et rursus alio in loco,

Ἰντὲς δὲ θεῶν ἐνστάμεν· πρὸ πάντων

Ἀνθρώπων.

Odyss. A.

Honores
Medicis o-
lim decre-
ti.

Arque hinc est, quod veteres Medicis, propter artis quam profitebatur præstantiam,
amplissimos decreuerint honores. Quippe Hippocrati Abderas sanandi Democriti
caussa proficiscenti, vniuersa ciuitas, non viri tantum, sed & mulieres, insuperque se-
nes & pueri, obuiam ante portas processerunt, illumque summis & honoratissimis ti-
tulis prosequentes, seruatorem patriæ, patremque appellauerunt. Huic quoque a Se-
natu & populo Atheniensium is honor est habitus, eaque relata est gratia, vt propter
seruatam a truculentissima peste Græciam ei ludi decreti sint, magnisque mysteriis ab
iis initiatus, aureaque corona mille aureorum, regio plane insigni, donatus sit. Era-
sistrato Aristotelis filia genito, ob Antiochum regem sanatum, a rege Ptolemæo filio F
eius centum aurea talenta, hoc est, nostra pecunia nummum aureorum sexaginta millia nu-
merata sunt. Q. Stertinius, summus in re medica, olim Romæ habitus, duodena millia, &
quingentos aureos nûmos a Cæsarib. accepit, quū priuato quæstu dena quina millia in
singulos annos, numeratis domibus, cogere solebat. Romani præterea Cæsares medicis
in singu-

E

A in singulos annos amplissimum stipendium, ducenta & quinquaginta sestertia, ut Plinius auctor est, pendebant: quum tamen reliquarum disciplinarum professoribus centena tantum in annum numerabant. Sed desino plura medicorum præmia referre, quod sciam discendarum artium finem non esse questum, aut mercedem, sed veritatis potius fruendæ ac inquirendæ studium, & ut quam plurimis profimus. Tantos vero honores, ac tot præmia nullo alio nomine in medicos cõtulerunt veteres, quam quod immensam esse illorum doctrinam perspectum habuerunt, & ad multorum vitam & valetudinem tuendam summe necessariam. Ut cæcos plane & iniquos fuisse iudices palam sit, qui inter professores Medicis postremum locum assignarunt. Sed hæc est perpetuo bonorum fortuna, ut ipsi pessimi quique præferantur.

B

Medicina quid? CAP. III.

Medicina a variis varie est definita. Ab Hippocrate quidem in libello de flatibus sic finitur. *Medicina, inquit, est adiectio & subtractio. Adiectio quidem deficientium, subtractio vero eorum, quæ in corporibus hominum redundant.* Hanc definitionem Galenus lib. 11. Terap. methodi, cap. 12. & aliis plerisque locis citat & cõprobat: nec certe temere: nulla enim est medicinæ pars, quam ista finitione non sit complexus Hippocrates. Quum enim primæ ac maximæ eius partes sint duæ, quarum altera sanitatē tuetur, altera morbos profligat: præsentem certe sanitatem non nisi adiectione optimorum ciborum & potuum, & superuacuum excrementorumve subtractione seruabimus: amissam vero

Hippocratis definitio.

Cro eisdem quoque, nempe subtractione ciborum, ubi ex redundantia morbus natus est: adiectione vero eorundem ubi ex defectu morbum contraximus, recuperabimus. Subtractione itidem eorum medicamentorum, quæ redundantiam vacuant, & adiectione eorum, quæ corpori robur adiiciunt. Quid multa? Adiectio & detractio omnes res, quæ homini tam ad tuendam sanitatem, quam ad præcauendum futurum morbum, & præsentem profligandum administrantur, continent, ac complectuntur. Idem in libello de arte, medicinam ait esse artem, quæ a morbis ægrotantes prorsus vindicat, & morborum vehementiam obtundit, atque iis, qui a morbis victi sunt, manum non ad-mouet. In quibus enim desperata omnino salus est, Galeno lib. 11. Terap. Methodi cap. 9. teste, imprudentis consilio fuerit, apud vulgum infamare præsidia, quæ multis fuere salu-

Dti: Hic in commentariis suis super Hippoc. aphorismos rectissime, & de sententia Senis consuluit Galenus, deploratos non oportere attingere, sed magis recedere, euentu morbi prænuntiato. Herophilus in hunc modum medicinam definire voluit: *Medicina, inquit, est scientia salubrium, & neutrorum.* Nomen autem scientiæ communiter, & non proprie accipien-

2. aphor. 19. Herophilus definitio.

dum. Cõmuniter namque sumta scientia est quædam notitia siue theorematum præceptionumque ordine sese consequentium: & ad vitæ utilitatem conspirantium, ut infra fusius dicemus, collectio, adeoque idem cum arte significat. Proprie vero accepta scientia, est certa, firma, & a ratione non declinans notitia, quæ firmis certisque principiis constat. Salubre autem, siue ut Græcis vocatur, *ὑγιεινόν* dicitur, quod tum sanum est, & quod sanitatem tum præbet, tum indicat. Insalubre siue morbosum, seu ut Gal. sua lingua vo-

Scientia est communiter sumta.

Salubre. Insalubre.

Ecat *νοσέειν*, idem tria denotat, quod morbo affectum & obnoxium est, quod morbum affert, quodque morbum indicat. Quod contraria hæc intercedit, quum proprium nomē non habeat, per negationem Græce *ἰσίνεον*, Latine vero *neutrum* dicitur, & triplex existit. Primum quidem est, quod neutrius extremorum affectuum: secundum quod vtriusque: tertium, quod nunc huius, nunc illius est particeps. Vnumquodque aut horum trifariam dicitur. Aliquando quidem ut corpus, aliquando autem ut causa, nonnunquam vero ut signum. Corpus enim quod continet sanitatē, & causa quæ hanc tum efficit, tum conseruat, & signum quod eandem indicat, omnia in quæ hæc salubria dicuntur. Eadem ratione corpora quæ morbos continent, & causæ quæ hos tum efficiunt, tum fouent, & notæ quæ ipsos indicant, insalubria vocantur. Nec aliter corpora, causæ, & signa, neutra

Neutrum.

Salubria. Insalubria. Neutra. Corpus salubre.

Fappellantur. Ceterum corpus salubre trifariam nominatur: simpliciter scilicet in præsentia, & magna ex parte. Salubre simpliciter corpus est, quod ab ipso naturæ ortu simplicibus ac primis partibus probe temperatum est: & instrumentis, quæ ex illis constant, apte compositum. Hoc itaque semper salubre est, quod scilicet temperatissimum sit, optimoque compositum. Salubre vero in præsentia, quod in præsentem tempore sanum est, ipsumque

Simpliciter.

In præsentia.

Magna ex
parte.
Infalubre
corpus.
Simpliciter.
In præsen-
tia.

Semper.

Magna ex
parte.
Neutrum
corpus.
Prima signi-
ficatione.
Aliqua.

Tertia.

Herophilus
subtilitatis
ac garruli-
tatis studio-
sus.
Causæ.
Salubres.
Infalubres.
Neutra.

Medicina de
finitio alia.

Scientia.

Ars.

Medicina
est ars.

quo tempore valet, probe temperatum est, apteque compositum, non quidem summa illa constitutione, sed sibi peculiari & propria. Quod autem magna ex parte salubre est, haud longe abest ab optima constitutione. Infalubre autem corpus pari modo quadri- fariam dicitur. Infalubre simpliciter corpus est, quod ab ipso ortu primis & simplici- bus partibus intemperatum est, vel instrumentis male compactum, vel utrumque. In- falubre vero in præsentia est, quod eo tempore, quo tale dicitur, ægrotat. Non obscu- rum autem est, id quo tempore infalubre dicitur, aut partibus simplicibus intemperatum aut instrumentis male compositum, aut utrumque esse. Infalubre semper; quod ab ipso ortu, aut simplicibus primis partibus vel omnibus, vel quibusdam; vel principibus in- temperatissimum est: aut in instrumentis pessime compositum,isque similiter, vel om- nibus, vel quibusdam, vel præcipuis, hoc est, quod deterrimam habet constitutionem ab ipso ortu, quæ per totam vitam talis durat, perseveratque.

Infalubre magna ex parte corpus est, quod ab huius quidem vitio recedit, non- dum tamen in medio constitutum est. Neutrum corpus trifariam appellatur. Iuxta pri- mum significatum neutrum corpus est, quod neutrius extremorum particeps, & ex- quisite medium est saluberrimi & infaluberrimi corporis, adeoque inter utraque am- bigit, æqualiter distans. Hoc proprie neutrum appellatur, ut est corpus senum & imbe- cillum. Iuxta alterum, quod ipso ortu contrariorum simul affectum est particeps, siue in vna parte, siue in differentibus, ut est corpus, quod aliquam, vel aliquas partes probe temperatas, & compositas, exempli causa iecur & pedes: aliis vero male temperatas & constitutas, ventriculum nimirum & cerebrum, obtinet. Iuxta tertium, quod aliquando salubre, aliquando infalubre vicissim existit, ut est quæ æstate salubriter, hyeme vero in- salubriter degit. Atque hæc quidem est ἀπολογία, qua Galenus in explicatione definitio- nis Herophili subtilioris sectæ, ut Plinius lib. 26. cap. 2. ait, cōditoris, & ad verba garruli- ratemque descendens, uti coactus est. Qua tamē nihil opus esse intelligunt omnes, qui- bus perspecta sunt ea, quæ cap. 4. libri de morborum differentiis tradit Galenus, ut in nostris Commentariis in eum librum exaratis, ut lib. 1. de simpli. medica. facult. cap. 19. abunde demonstraui. Ceterum causæ sunt itidem triplices. Salubres, quæ sanita- tem efficiunt. Infalubres, quæ morbum. Neutra, quæ neutrum affectum procreant. Si- gna sunt itidem triplicia. Salubria, quæ præsentem indicant sanitatem, futuram prænu- tiant, & præteritam ad memoriam referunt. Infalubria vero, quæ morbum præsentem significant, futurum prædicunt, & præteritum in memoriam reuocant. Ad eundem modum neutra sunt, quæ neutrum affectum ostendunt, prænuntiant, & memoriæ tra- dunt, & quæ nihil omnino de affectibus indicant: aut non magis salubrem, quam infa- lubrem, aut partim salubrem, partim infalubrem: aut aliquando salubrem, aliquando vero infalubrem. De quibus copiosius lib. 4. cap. 2. dicemus. Medicina itaque scien- tia est, non proprie pressequæ, sed communiter a late sumto vocabulo, salubrium, in- salubrium, & neutrorum. Porro quum proprie loquendo, ut sequenti cap. fufius do- cebimus, medicina scientia non sit, alii hanc sic definire maluerunt: *Medicina est ars ad humani corporis sanitatem tuendam, profligandoque morbos comparata*, vel ita, *Medicina est ars usu, atque ratione constituta, corporis humani bonam valetudinem custodiendi, perditamque recu- perandi*. Quæ itidem bonæ sunt definitiones, quod totius medicinæ capita contineant. Sed de medicinæ definitione satis.

Quod Medicina sit ars, non scientia. CAP. IIII.

QVVM in definitione medicinæ, quam præcedenti capite adduximus, diserte di- ctum sit, medicinam artem esse, & nequaquam scientiam, necessarium erit, ut hoc in capite eius rei causam paulo copiosius explicemus. Quod ut ordine præstemus, pri- mo, quid sit ars & scientia, perspicue exponemus. Scientia proprie est, quæ ex certis, in- dubitatis, firmisque principiis comparatur. Vel, est notitia vera, cui propter demonstrationem fir- miter adsentimur. Vel, ut supra est definita, certa, firma, & a ratione non declinans notitia. Ars au- tem est ex multis notionibus, seu animi perceptionibus, usu & exercitatione acquisitis, atque in vnum vitæ utilem finem spectantibus, coacervatio. Alii ita finiunt: *Ars est præceptio animi, quæ dat certam viam rationemque faciendi aliquid, quod utilitatem, aut honestatem contineat*. Proinde quum medicina, quæcunque ratione perlustrat, ad hominum utilitatem referat,

- A referat, & accommodet, nec sit eorum, quæ necessario fiunt, sed finem suum contingenter nanciscitur, artis nomine hanc contineri par est. Neque enim medicina est nisi habitus, qui cum ratione vera in faciendo positus est, quod plane arti conuenit; *ut testis est Aristoteles, qui libr. 6. Ethic. capit. 3. & 4. arti aduersus scientiam, singula hæc dilerte adscribit, quum inquit: Πάντες γὰρ ὑπολαμβάνομεν ὅτι πᾶσι μετὰ, μὴ ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν, ἢ μὲν ἄγε, ὅτι πᾶσι μὲν ἔστι ἀποδείκνυται: τέχνη δ' ἔστι μετὰ λόγῳ ἀληθὺς ποιητικὴ.* Hoc est, omnes existimamus, quæ scimus secus euenire non posse. Est igitur scientia habitus, in quo vis quadam ad demonstrandum est posita: ars vero habitus, qui in faciendo cum ratione vera est. Non est igitur medicina, ut quispiam existimaret, partim scientia, partim ars dicenda, tamen si multis constat theorematibus, quæ ipsa quidem per se continet scientia: verum quoniā omnium inter se quam aptissime coherentium & concordantium ea est in medicina conspiratio, isque consensus, ut homo incolumis & saluus per eam seruari possit, æger autem in integrum restitui, ex ipso fine, vniuersa, artis nomen accipit. Quæ dicimus, confirmat auctor, introductorii seu Medici: qui Galeno lib. 6. Epid. sect. 2. com. 31. teste, Herodotus fuit: ubi in eum scribit modum: *Rationales aliqui, ut Erasistratus, medicinam partim scientiam, ut est ea fuerit. pars, quæ causarum & naturæ cognitionem docet: partim coniecturam, ut curationem & signa tradentes partes existit, censuerunt. Methodici vero in vniuersum ipsam esse scientiam prædicant. Vtrique autem, potissimum vero Methodici, a veritate aberrarunt. Scientia enim est conueniens, firma, & nunquam a ratione declinans notitia. Ea vero neque apud philosophos est, præsertim dum rerum naturas perscrutantur: multo sane minus in re medica, imo ne omnino ad homines venit.*
- C Quamobrem medicina merito ars dicatur. Siquidem ars est perceptionum animi & notionum certa qualitate & quantitate exercitatione conquistatarum ad finem quendam vitæ vtilem spectantium coaceruatio: Perceptiones igitur & ipsa humanas, & eas multitudine sufficientes habet, ut sit earundem coaceruatio, præcipue coexercitatarum, hoc est, sibi concordium ac consonantium connexarumque. Quo fit ut propriissime ars nominetur, quod nimirum artis definitio ei conueniat, & quod animi perceptiones in ea ad aliquam vitæ commoditatem spectent. Quippe homines sanitati restituere, & in sanitate perdurare, ad vitæ pertinet. Hæc ille. Ars itaque est medicina, & nequaquam scientia. Verum mox aliquis ita secum cogitabit: Si medicina, vti iam ostensum est, ars existit, igitur coniectrix erit. Si coniectrix, igitur nulla theoremata firma, stabilia, & perpetua habebit. Pro hoc nodo dissoluendo animaduertendum, omne theoremata præceptumue Galeno
- D in lib. de optima secta teste, esse generale & firmum. Erunt itaque etiam singula præcepta medica vera, vtilia, & iactis principiis consentientia. Quatenus enim sub animi perceptionem quodlibet præceptum cadit, eatenus verum esse oportet. Falsi namque nulla perceptio est. Quatenus autem ad finem aliquem vitæ vtilem pertinet, eatenus vnumquodque theoremata siue præceptum vtile & necessarium esse opus est. Coaceruationem vero perceptionum ad præceptorum inter se, & ad præmissa principia consensum habere, necesse est. Quemadmodum enim sub vno principe subditorum multitudo concipitur: sic etiam præceptum ad ante iactum principium refertur. Ob id omne theoremata præceptumue medicinæ, ut etiam aliarum artium, in primis verum esse debet: secundo vtile: tertio iactis principiis consentiens. Quæ vero talia non sunt, & quibus vnum ex tribus iam dictis deest, theoremata & præcepta medica dici non merentur. Quamobrem hallucinantur illi, qui medicinam artem coniectricem esse existimant, propterea quod theoremata coniectrix habeat. Non enim a theorematis (hæc enim, ut comprehensum est, vera, atque adeo perpetua, firma, stabilia, & principiis consentientia sunt) sed ab actione, & medentium opera, quæ incertum habent euentum, ea coniectrix dicitur. Proinde ut omnium artium præcepta firma & perpetua sunt, ita etiam medicinæ. Verum ut non omnium artium finis semper attingi potest, adeoque fit, ut illæ coniectrices sint & appellentur, quod scilicet incertum ancipitemue euentum habeant: sic quoque medicina coniectrix nominatur, quod finem suum non semper, sed plurimum attingat. Nihil autem æque medicinam, Galeno cap. 12. libri de curandi ratione per sanguinis missionem teste, in suis actionibus coniectricem efficit, atque cuiusque remedii quantitas. Nam etsi frequenter compertum habemus, tempus exhibendi cibi aut potus, eiusque aut calidi aut frigidi instare, tamen quantum dandum sit, certo haud scimus. Idem in purgantibus etiam medicamentis vsu venit. Siquidem quod ægrotanti præbendum sit medicamentum, quod aut bilem flauam aut atram aut pituitam, aut serosa excrementa vacuet, ex-

Introdu-
torii seu
Medici
auctor quis
fuerit.

Scientia.

Ars quid.

Obiectio
diluitur.

Theorema
ta & præ-
cepta me-
dicina fir-
ma.

Tria ad
præceptum
medicina
requisita.
Medicina
cur conie-
ctrix ars
dicitur.

quisite nouimus, ceterum quantum dari oporteat, ignoratur. Quantitas enim, *ut libr. 3. Ther. metho. c. 3. Galenus ait*, nec dici, nec scribi, nec omnino percipi potest, ut igitur coniecturis quibusdam colligatur, necesse est. Proinde medicinam ipsam coniectricem facit in primis remediorum quantitas, quæ non nisi coniecturis quibusdam deprehendi potest, & dein medentium actiones & opera, quæ incertum euentum habent. Cardanus *tractatu 3. suarum contradictionum cap. 20.* more suo, mirifice in hac quæstione dissoluenda se torquet, sed ita ut rem magis inuoluat & obscuret, quam explicet. Quapropter omnes medicinæ studiosos hortor & moneo, ut tanquam pestilentissimum venenum libros contradictionum Cardani fugiant, modo nolint, se in eas coniici ambiguitates ac difficultates, vnde se perpetuo extricare nequeant.

Medicina ex quo artium genere. C A P. V.

H

HActenus quid medicina, & quod ars, & nequaquam scientia sit, demonstrauimus.

Reliquum nunc est, ut ex quo artium sit genere, inquiramus. Quod ut rectius fiat, initio animaduertendum erit, artes non ex materiis ipsis, quandoquidem materiam vnā constat pluribus artibus subiici, ut lignum, exempli gratia, nauium artifici, carpentatio, machinarumque structori: sicuti & vnā eandemque artem permultis ut materiis, ut verbi gratia medicæ arti, cum vnā sit, infinitæ materiæ subsunt, corpus nempe sanitatem suscipiens, cibi, ac potus, medicamenta omnia, & quæ ad victus rationem pertinent: sed ex fine. Propter hunc enim & communibus actionibus & propriis præceptis atque principiis differunt. Quapropter si a fine, ut decet, artes iudicemus, earundem quatuor erunt genera. Vnā quæ Græcis θεωρητική, Latinis contemplatoria vocatur. Hæc est Galeno in libro de optima secta ad Thrasibulum teste, quæ in sola rerum, quas inquirat, contemplatione, id est, cognitione & æstimatione, sine vlla corporis actione, finem habet, ut *Arithmetica, Astronomia, & Physica*. Siquidem nulla harum aliquam exigit actionem, sed ipso rei, cuius studium habet, intellectu, quæuis contenta est. Altera Græcis

C

πρακτική, Latinis actiua dicitur, & est quæ actiones aliquas efficit, vbi vero ab actione cessauit, nullum ex se opus ostendere potest, sed quamprimum ab agendo cessauerit, finis quoque vnā definit, ut saltatoria, citharistica, & quæuis alia ars musica. Nam nihil in saltatoria & citharistica præter ipsam actionem ostendere possumus. Tertia Græcis ποικιλία,

Latinis factiua, seu efficiens appellatur, quæ nimirum opificia postea indicat, vel quæ operis, quod in oculos incurrit, consummatione finem accipit. Est itaque id artis huius finis, quod quiescente artifice demonstrare valemus, ut in fabili grabatum, in pictoria imaginem, in statuaria statuam, in ædificatoria domum, in medicina sanitatem. Ceterum factiuarum artes in tres digeruntur species. Quædam res ipsas creant, componunt, aut nouum opus, & ea, quæ non sunt, efficiunt, ut textoria, coriaria, & nauium structoria.

Nonnullæ, quæ facta sunt conseruant, corrigunt ac reparant, ut nauium gubernatoria, &

¹ quæ laceras vestes, & disruptos calceos sūt. Aliquæ virumque præstant, ut ædificatoria.

² Huius enim duplicia sunt opera, domus nimirum nondum existentis constitutio, &

³ non factæ reparatio, & correctio. Quarta Græcis κτηνική, Latinis comparans nominatur,

quæ scilicet nihil efficit, verum res quasdam studio & labore venatur ac conquirat: ut

piscatoria & ars fera canibus insectandi, & quæuis venatoria. His itaque præmissis, facillimum est scire, e quo artium genere medicina sit. Siquidem Galeno etiam in lib. de

optima secta, & in eo quem de artis constitutione inscripsit, teste, ex earum est genere, quæ

faciunt, & quod iam factum est, conseruant, instaurant, ac corrigunt. Factiuam vero esse

hinc constat, *habet enim aliquod opificium nempe sanitatem, quod finita actione ostendere possit*:

Neque temere adiectum est, finita actione: In medendo namque nondum medicinæ

finis innotescit, utpote quæ aduersus morbos semper inest: At vbi curationem absoluit, tunc hominem sanitati restituit. Non solum autem medicina sanitatem efficit, sed

& eam, quæ adest, conseruat. Quid multa? Medicina vitiatam corporis humani constitutionem emendat, corrigit, instaurat, atque adeo sanitatem facit, eamque iam præ-

sentem conseruat. Eiusdem itaque artis est opus efficere, & vitiatum corrigere. Non est

igitur, cur idcirco quispiam geminum esse medicinæ finem existimet. Quod tamē ple-

ræque faciunt, qui vnum esse eius finem putant id, quod non est efficere, utpote sanitatem: & alterum, eam, quæ est, conseruare. Quam enim, inquit illi, per eandem præce-

pta ef-

P

Cardani
contradi-
ctionum li-
bri studio-
sis medici-
na haud
legendi.

Artes non
ex mate-
riis, sed ex
fine iudi-
candas es-
se.

Artium
quatuor
genera.
Contem-
platoria.

Actiua.

Factiua
seu efficiens.

Factiua.
artes tri-
plices.

Comparans.

Medicina
est ars fa-
ctiua.

Medicina
non gemi-
na, sed v-
num est fi-
nis.

- A**pta efficiat sanitatem, & eandem etiam conseruet, duplicem utique finem habebit. Nisi igitur euidenter eadem essent præcepta ad utrunq; finem ducentia, differentium etiam finium diuersæ utique essent & artes, & duæ medicæ. At quoniam eadem sunt theoremarum, scopi vero euariant, una ars utique differentes habebit scopos. *Hæc illi.* Sed mercede qui ita colligunt, si ignorât artis medicæ vnicum esse scopum propositumue, sanitatem scilicet finemque vnicum, nempe sanitatis consecutionem: quâuis modi consecutionis ipsius sunt multiplices. Non mutatur autem neque scopus, neque finis, secundum variû consequendæ sanitatis modum. Quippe nos, quæ nocere solent cognoscentes, dum submouemus aduersa & noxia, sanitatem consequimur. Vbi vero vitam illa, præsentem sanitatem tuemus. Ex iis igitur, quæ hætenus diximus, omnibus fit euidentissimum, medicinam neq; theoritice, vel ut vulgus cōciso vocabulo nominat, theoricam, neq; practicam, siue neq; contemplatoriam, neq; actiuam, proprie loquendo esse. Neq; enim in sola rerum naturæ contemplatione, quas sibi proposuit considerandas, finem suum obtinet, ut Arithmetica: neque etiam ubi ab actione cessauit, nullum ex se opus ostendere potest, ut Musica: sed contra potius postquam agere destitit, suum opus euidenter monstrare valet, adeoque, ut diximus, factiua est. Non recte igitur, & plane contra Galeni, cuius tamen se, si Diis placet, interpretem esse gloriatur, sententiam initio sui vasti Canonis medicinam partim esse theoritice, partim practicæ docet, quâ neutra harum sit, *ut iam ostendimus*, sed potius factiua. Non esse autem medicinam theoritice, diserte *libr. 1. de placitis Hippocratis & Platonis*, iis testatur verbis Galenus: *Hippocrates quidem theoritice contemplatoriamue artem minime tractauit. Plato vero contemplatoriam philosophiam nobiliorem esse putauit.* Quinetiam Auerrhoes *libr. 6. collectaneorum cap. 1.* perspicue Auicennæ explodit opinionem, medicinam factiuam esse artem, ratione, & experimento inuentam, quæ tum sanitatem tueatur, tum morbum propellat, scribens. Proinde medicinam, Arithmeticam, Musicam, Astronomiam, Iuris prudentiam secare in Theoricam & Practicam, id est, contemplatiuam & actiuam, recentiorum est inuentum. Id quod non alia de causa fecerunt, quam quod illi θεωρήματα, quæ Cicero præcepta interpretatur, huic vsum & accommodationem præceptorum ad exempla tribuerunt. Quo sane modo artes omnes in contemplatiuam, & actiuam diuidi possunt. Non itaque ad finem, ex quo artes omnes iudicandæ sunt, respexerunt, adeoque ambas **D** voces improprie usurparunt. Quapropter ut medicinæ studiosi errorem hunc perspicue cognoscerent, artium diuisionem paulo exquisitiorem a Galeno proponere volumus.

Medicinā neq; theoricam, neque practicam esse.

Auicennæ erratum.

Quot in vniuersum medicina partes. C A P. VI.

- Q**um abunde iam ostenderimus quid medicina, quodq; ars, & quidem factitia sit, restat, ut quot sint huius partes, explicemus. Sunt autem numero quinque, & vniuersæ Græcis appellationibus donatæ. Prima φυσιολογική dicitur, & est, quæ vniuersam hominis naturā & constitutionem indagat, ac perquirat, hoc est, quæ de hominis elementis, humoribus, spiritibus, temperamentis, partibus, earumq; facultatibus, & actionibus tractat. Ad eam igitur medicinæ partem spectant Galeni libri, *de elementis, de temperamentis, de facultatibus naturalibus, de fœtus formatione, de semine, de placitis Hippocratis, & Platonis, de administratione anatomica, de usu partium humani corporis*, & id genus aliis. Hos idcirco naturales vocat, quod scilicet de humani corporis natura tractent, & in iis causæ constitutionis partium totius animalis, & humani corporis assignentur. Altera est, ιγνική, quæ sanitatem tuetur, & quo minus in morbos incidat, corpus præcauet. Ceterum sanitatis custodia equatuor rebus pendet, admouendis, educendis, faciendis, & extrinsecus incidentibus. Admouendorum autem nomine, *cibus, potus, & si quid medicamentorum intro sumitur, etiam aer attractus* intelligitur. Faciendorum vero, *frictio, ambulatio, vectio, equitatio, & omnis alia corporis exercitatio.* In hoc genere continentur *somnus, vigilia, venus, animi affectus.* Foris incident aer nobis circumdatus, *unguenta, lauacra.* Educenda, quæ in aluo, iecore, liene, venis, & arteriis, reliquisque corporis partibus excrementa colliguntur. Hæc partem in libris, quib. de tuenda sanitate titulum indidit, & in iis quos de alimentorum facultatibus, ac in eo, quem de boni & mali succi cibis inscripsit Galenus absolutissime tradidit.

Φυσιολογική.

Νατορες libri.

ιγνική.

αισθητική.

παθολογική.

κατά.

Tertia αἰσθητική, & alio nomine παθολογική dicta est, quæ causis, affectus præter naturam, & symptomata inquirat. Ad hæc medicinæ partē pertinet Galeni libri *de morborū & sympto-*

impugnari. *tum differentiis inscripti.* Quarta *σημειωτική*, indicia tradit, quæ & integram & aduersam va-
διγανδύ. *letudinem luculenter demonstrat; atq; adeo præteritorum cognitionem, præsentium* A
sc. *inspectionem & futurorum prædictionem continet. Ad eam medicinæ partem spectant*
Cur non- *Hippocratis libri omnes, quibus titulum fecit de præsagiis. Item Galeni libri de laboranti-*
nulli me- *bis locis, de iudiciis, de diebus decretoriis, de differentiis febrium, de præmotione, de differentiis pulsuum,*
dicinam *& de prædictione ex pulsibus. Quinta θεωρητική, est qua legitimorum præsidiorum admotione mor-*
in theori- *bum propulsat, sanitatemque restituit, & in summa, medendi rationem docet. Ad has itaq; quinque*
ca & pra- *partes, ex quibus medicina constituitur, & nequaquam ad finem medicinæ respicientes*
dicam se- *nonnulli medicinam partim theoreticam, partim practicam faciunt. Nam eam partem quæ*
cant. *uniuersam corporis humani naturam & constitutionem inquirunt; itemque eam, quæ affe-*
ctus præter naturam indagat, & eam etiam, quæ signa tradit, cum omnes in contempla- B
tionem & simplici rerum cognitione versentur, theoreticas appellat. Eam vero, quæ sani-
ratē tuerur, & eam quæ morbos propulsat, quod in actione consistant, practicas. Verum
quum artes ipsæ ex fine, ut dictum est, iudicandæ & distinguendæ sint, hæc sectio ab e-
ruditis omnino, tanquam inutilis, & a veterum sententia euarians, contemnenda erit.

Quot medicatricis medicina partes. CAP. VIII.

Διαίτητική. Hæcenus quot sunt in uniuersum medicinæ partes, qua potuimus breuissime mon-
Viſum *strauimus. Nunc quod postrema pars nempe θεωρητική, in alias tres, easque præcipuas*
sermon. *medicinæ partes digeratur scilicet διαίτητικήν, φαρμακευτικήν, καὶ χειρουργικήν, ostendemus. Διαίτη-*
Notatur *τική est, qua victus ratione morbis medetur. Vel qua curandi rationem per victum tradit. Victus*
nostri se- *vero nomine non solum cibus & potus, sed & exercitatio, somnus, vigilia, in summa, om-* C
culi medi- *nes res non naturales medicis vocatur, de quibus paulo post ordine disseremus, intel-*
corum oſci- *liguntur. Hæc utique potissima medicinæ pars est, sine qua reliquæ duæ partes, quæ cu-*
tantia. *randis morbis præstant, consistere suoque munere fungi nequeunt. Hanc imprimis Hip-*
propter mirari satis non possum quorundam nostri seculi medicorum oscitantiam dicam D
an temeritatem potius, ignoro, qui eius partis in profligandis morbis nullam prorsus, aut
perexiguam saltem rationem habent, præclare actum esse cum ægroto existimantes, si
vnam aut alteram formulam illi, quā receptā nominant, ex qualibuscunque medicamen-
tis, sibi maxima ex parte ignotis, concinnatam corraſerint, & ad Seplasiarios suos, æque
imperitos, imo multo illis indoctiores, transmiserint, nihil curantes, quæ æger victus ra-
tionem interim utatur. Quam enim hoc damnosum sit ægrotantibus, & Hippocratis, Ga-
leni aliorumque veterum medicorum instituto alienum, nemo sane qui monumenta
illorum quæ posteritati reliquerunt, introspectit, ignorare potest.

Φαρμα- *φαρμακευτική est, quæ medicamentis intra & extra corpus ad motus medetur. Sūt vero*
χολική. *hæc ipsa duplicia, nempe simplicia & composita. Ad exquisitam igitur curandi rationem* E
Simplicia *inprimis simplicium medicamentorum cognitio necessaria est. Nā ut ridiculū, imo tur-*
medicamē- *pe prorsus est, tabrum lignarium ferram aut asciam, sutorē subulam, sartorem forficem*
torum co- *ignorare: sic etiam merito ab omnibus ridebitur ac contemnetur medicus, qui eius quā*
gnitio me- *profitetur artis materiam, quæ illi in propulsando morbo instrumenti vice est, non satis*
dico neces- *perspectam habet. Quocirca merito reprehendendi veniunt nostræ ætatis medici, qui*
saria est. *omnes propemodum curam cognoscendarū stirpium in Seplasiarios, homines magna*
ex parte indoctissimos, aut stolidas certe mulierculas reiciunt, cū tamen, si modo recte
mederi velint, harum non solum facultates, sed & faciem ac formam, ne scilicet adulterinas
pro legitimis vsurpent, cognoscere illos oporteat.

Qui scri- *Ad quam sane cognitionem consequendam proderit, ut ex Græcis auctoribus le-* F
prores ad *gant Theophrastum, Dioscoridem, Galenum, Paulum, Actium, Orbasium, Actuarium*
simplicia *& Symeonem Sethi. Neque enim veteres duntaxat Græci ad recte cognoscenda simplicia*
notitiam *medicamenta sunt adhibendi, sed etiam posteriores, recentioresque: quod scilicet illi*
consequē- *multa protulerint, literisque mandarint, quæ prioribus incognita, & indicta prorsus*
dum na- *tuerunt*
cessarii.

- A** fuerunt: & quorum hodie frequēs est in officinis medicorum vsus. Inter Latinōs, quem in hoc negotio consulant, præter Plinium, ex veteribus neminem habent. Is enim, quod plerique faciunt, iis, qui studio agnoscendarum stirpium tenentur, minime contemnendus erit, quod in eo multarum rerum, herbarumque historiæ reperiuntur, quæ a nullo alio vel Græcorum, vel Latinorum, qui saltem hodie exstent, traditæ sunt. Habet tamē is in percensenda simplicium historia suos errores, quo nomine, vt cum iudicio & delectu pleraque illius legas, oportet. Neque etiam propter vetustatem omnino contemnendus erit *Apuleius, Platonius Philosophus*, cuius de aliquot, nec iis sane paucis, stirpibus exstat scriptum. Arabum *de stirpibus* Commentarii ideo legendi sunt, quod plerasque Græcis incognitas descriperint. In iis tamen legendis acri iudicio opus erit, quod non raro vnā pro altera pingant, nec satis diserte, quas tractandas suscepunt, explicare possint, & quod multis erroribus eorundem scripta referta sint. Inter hos vero vnus Serapion omnibus ceteris præferendus erit, vt qui in hoc genere reliquos omnes superarit. Is enim non solum ea, quæ a Dioscoride & Galeno sunt de stirpibus prodita, verum etiam ab aliis Arabibus, se vetustioribus, literis mandauit, & vno in volumine complexus est. Est vero & hoc etiam nomine præ aliis legendus Serapion, quod ex huius cum Dioscoride collatione, multa iniuria temporis, & librario- rum culpa deprauata loca, pristino nitore restitui, ac emendari possint. Adhibendum vero in eo quoque legendo iudiciū, ne falsa pro veris temere arripiantur. Nam in eo vbi Arabum de stirpibus, aliaque materia medica refert opiniones, mira rerum confusio est, vt certe iudicio exquisito iis, qui illas excutere volunt, opus sit. Porro ad recte cognoscendas stirpium tum effigies, tum facultates, non parum, vt speramus, adiuuabunt studiosos commentariorum nostrorum de stirpium historia tomī duo: in quibus non solum singularum quanta potuimus perspicuitate ac breuitate, historias exposuimus, verum etiam viuas & exquisita ratione expressas earundem imagines intuentium oculis subiecimus. Qui sane eo nomine gratiores esse debent, quod ad viuas herbas studiosos quasi manu ducant, & in inquirendis stirpibus eos plurimum dirigant, & quasi in rem præsentem perducant. Quod vt plane præstare possent, vniuersas stirpium effigies maiori forma pingi curauimus. Nam quæ in angustum redactæ sunt, quod plagiarii plerique nostras deformantes ac deprauantes faciunt, singulas herbarum partes exprimere non possunt. Debeant itaque multis nominibus maiores esse minutoribus cariore. Ceterum quum non omnes corporis præter naturam affectus simplices, sed ex iis non pauci compositi sint, atque adeo ad hos propulsandos, non simplicibus, sed compositis medicamentis opus sit, componendorum quoque medicamentorum rationem teneamus, necesse est. Quam certe optimam Galenus in libris *de compositione medicamentorum generalium, & localium tradidit*.
- Atque optandum sane esset, vt illum hodie in componendis medicamentis potius quam Arabes sequeremur. Et e re quoque tum medicorum, tum egrorum esset, vt illius compositiones in vsum quotidianum reuocarentur. Nam etsi quædam in eius compositionibus reperiuntur medicamenta simplicia, parum hodie cognita aut prorsus ignorata, tamen cogitandum idem etiam in Arabum nobis compositionibus vsuenerit, vt quam plurima scilicet in iis simplicia ignoremus. Et quod nobis succidaneorum libellum reliquerit Galenus, facile quid in eorundem, quæ nobis incognita sunt, nec haberi hodie possunt, vicem sit restituendum, ex eo cognoscemus. Verum quum constet Galeni compositiones multas iniuria temporum intercidiisse, præstat illi adungere recentiores Græcos, Paulum, Aetium, Aëtuarium, & præsertim Nicolaum Alexandrinum vnguentarium, quem hodie non sine multorum risu, præpositum nominant, *μυρρην* vocē in hanc linguæ Græcæ ignorantia immutantes. Atque hūc certe præ aliis confert legere, quod ex huius præscripto omnes hoc tempore Septaliæ suæ cōponant medicamēta. Quū vero de hoc auctore hætenus vix sextam partem, eamque multis in locis deprauatam exstare intelligerem, vt hunc integrum haberēt deinceps tū Medici, tū Septaliarii, nō piguit nos eius laboris, vt illū e Græco sermone in Latinū cōuerteremus. Et debet sane vtriusque nostra opera esse hoc saltē nomine grata, quod suas, quibus hætenus vsi sūt cōpositiones ex nostra cōuersione emendare; & si qua in illis defuerunt, hinc restituere possint. Siquidē perspicue ex ea deprehēdent nullā fere esse in officinis medicorum Ni-

Plinius in cognitione simplicium non contemnendus, cum iudicio tamen legendus. Apuleius, Arabes.

Serapion.

Aureis de stirpium historia commentariorum tomī duo.

Magnarum partium rarū quis vsus. Compositorum medicamentorum vti necessarius. Galenus in compositionibus medicamentis inuadens.

Galeno in compositionibus medicamentorum qui adiunguntur. Præpositus propter dictionem Græcā in qua inuenitur. Nicolaus Alexandrinus a barbaris cœcatus.

Qua ad reſe componenda medicamenta requirantur. colai compositionem, quæ omni ex parte legitima ſit, & in qua non aliquid vel deſideretur, vel perperam adiectum ſit. Quod vero ad nouas attinet compositiones, qui illas vaſte componere ſtudet, is principio curet, vt exquisitam ſimplicium habeat notitiam. Dein, vt noſtratia & cognita, potius quam peregrina & ignota ad compositiones adhibeat. Quod ſi peregrina etiam ad medicamentorum compositionem accerſere voluerint medici, vt legitima & nequaquam ſpuria ſint, dent operam. Longiſſime vero ab hoc inſtituto abſunt noſtri temporis medici, qui ſuis compositionibus ea potiſſimum adhibent medicamenta, quæ nec ipſi, nec Seplaſiarii, illorum miniſtri agnoſcunt. Hi ſane ſunt, qui ſe nihil effeciſſe arbitrantur, niſi Indiam, Æthiopiam, Arabiam, & illos extrema orbis parte ſitos Garamantas coniungant, & a tribus mundi partibus conquiſita remedia corradant. Quorum proſecto medicorum inſignem ſtulticiam, & inanem B. oſtentionem, Plinius lib. 24. cap. 1. eleganter admodum iis depingit verbis. Poſtea, inquit, fraudes hominum & ingeniorum captura, officinas inuenere iſtas, in quibus ſua cuique homini venalis promittitur vita. Statim compositiones & miſtura inexplicabiles decantantur. Arabia atque India in medio eſtimantur, ulcerique paruo medicina a rubro mari imputatur, cum remedia vera quotidie pauperrimus quiſque cænet. Hæc ille. Iam dictis ſimiles ſunt, qui ſuis compositionibus falſa & adulterina pro veris ac legitimis miſcent. Quales certe ſunt, qui pro vero acoro, vulgari illo & paluſtri vtuntur. Item, qui adulterinis, eupatorio, ſerpentaria, ſcordio, endiuia, & id genus multis aliis, admoniti etiam ſapenumero, & erroris manifeſte conuicti, vt non ceſſant. In quos certe præſcriptos aſinos magiſtratum animaduertere deceret, ne ſubinde illis impune in vitam hominum graſſari pro arbitratu ſuo liceret. Redarguendi quoq; ſunt C. huius ætatis medici qui iam, qui in corradendis medicamentis ſimplicibus nullum plane modum faciunt. Nam dum componunt ſua medicamenta, laudem aliquam ſibi comparare ſtudent ex eo, quod infinita fere medicamenta miſcent. Atque in hoc quidem ſtudio alter alterum ſuperare conatur, dum quiſque ſe quidem eo doctiorem aliis eſſe putat, quo plura miſcuerit medicamenta. Sed ſtulti me hercle homines, vt qui non quam bene, ac recte, ſed quam copioſe componant medicamenta, vnice ſtudent. Quapropter euenit, vt dum ſuis cupiditatibus temere indulgent, eruditionemque oſtentare ſtudent, imperitiā ſuam potius prodant, ac doctis omnibus ſeridendos exhibeant, proque ſperata gloria, ignominiam non leuem ex monſtroſiſtis, nulloque artificio concinnatis, & a ratione abhorrentibus compositionibus conſequantur. Præſtat itaque D. pauca, & ea quidem cognita, legitima, & optima ratione inter ſe miſta, quam infinita, nec omnia ſatis perſpecta, & maxima ex parte adulterina, nullaque arte ac ratione inter ſe confuſa, compositionibus medicamenta ſimplicia inferere. Quæ vero ſit legitima componendorum medicamentorum, ac formularum ratio, & iis temporibus vſitata, in tribus libris ea de re exaratis tradidimus ita perſpicue, vt ab omnibus intelligi, ac cognoſci poſſint.

ἡ ἑρμηνεία.

Tertia medicatricis medicinæ pars *ἡ τριτὴ*, dicta eſt, quæ manibus medetur. Hæc Galenus multis in libris magna cum laude docuit, nempe libris *Therap. methodi Tertio, Quarto, Quinto, & Sexto*: item in *Commentariis quatuor in librum Hippocratis de articulis, & in tribus aliis in librum eiſdem de fracturis, in Commentariis quoque in librum Hippocratis de vulnerarij medici munere conſcriptis*. Deniq; in *Commentariis in librum Hippocratis de ulceribus, & vulneribus capitis*, & multis aliis libris, qui non exſtant, ſed vel temporis iniuria interciderunt, vel apud inuidos quosdam *βιβλιοτάκταις* latent, & cum blattis & tineis egregie rixantur. Ad chirurgiam exercendam conducit etiam *ſextus Pauli Aegineta liber, quem tamen ex Galeni libris, vt alios omnes, expilauit*. Diſcenda vero hæc medicinæ pars omnibus medicis erit, ſi non hoc nomine, vt illam exerceant, ideo ſaltem, vt adſtantes chirurgis quid faciendum ſit præſcribere, & eorundem errata, quæ fere quotidie multa admittunt, reprehendere, corrigere, & prohibere poſſint.

Quot medicorum ſectæ. C A P. VIII.

CVm abunde iam de medicinæ partibus dictum ſit, reliquum eſt, vt vnde hæc ars comparari queat, monſtemus. Varia vero ea de re opinati ſunt medici, ideoque in varias etiam ſunt ſciſſi ſectæ. Sæcta autem, vt hinc ordiamur, eſt *dogmatum coaceruatio, quæ ſe mutuo conſequuntur, aut conſequi apparent, vel putantur, vel, ſectæ eſt multitudinis dogmatum artificioſe conſtructorum, atque ad vnum ſinem relatorum conſenſus*. Celebres vero in me-

Sæcta quid.

- A** in medicina sectæ tres fuerunt, nempe *Empirica, Methodica, & Rationalis*. Primæ sectæ auctores solam experientiam arti satis esse affirmabant, hacque de causa non ut ceteri ab inuentoribus, sed *ἀπὸ τῆς ἐμπειρίας*, hoc est, *ab experientia*, se *Empiricos* nominauerunt. Neque enim veluti *Rationales* seu *dogmatici* artem indicatione simul & experimento constare putabant, sed experientiæ totam inniti, quam & eorum obseruatione, quæ sæpe simili modo contigerunt, constari affirmabant. Neque enim obseruatio est nisi experientia. Proinde *ἐμπειροὶ* alio nomine, quasi dicas *obseruatores*, appellati sunt. Eadem itaque est, *Galeno etiam in lib. de optima secta teste*, obseruatio, quæ experientia. Quapropter experientia est eius, *quod sapius, & eodem modo visum est, comprehensio seu obseruatio, & memoria*. Siquidem omnis generis experientias, communi nomine *memoriam* appellauerunt.
- B** Hinc etiam *μνησκόποι*, id est, *memores* sunt dicti. Memoriam autem eorum, quæ ut plurimum in iisdem malis idem efficere deprehenderunt, *θεωρημα* vocauerunt. Summa itaque illius cautio fuit, ne quis vlllo pacto ab indicatione quippiam inueniri opinaretur. Est autem indicatio, ut *Gal. in lib. de optima secta scribit*, comprehensio iuuantis vna cū nocentis comprehensione cū re indicante simul adueniens, sine obseruatione: aut ratiocinatione. Vel breuius & apertius, *Indicatio est cognitio iuuantis & nocentis, quæ cū re, quæ iuuamento eget, cognita simul aduenit, absq; obseruatione & ratiocinatione*. Quod n. iuuat, primo cognoscendū est, & eadē ratione postea q. nocet, deprehenditur. Quæ itaq; per indicationem comprehenduntur, & inueniuntur, in natura rei sunt designata: percepta enim natura eius, quod nos ad agendum mouet, & moliendum aliquid impellit, protinus etiam vna cum eo quid agendum sit, & quid fugiendum sit, quasi digito ostendit. Vnde *ἐνδείκναι*, indicationisq; nomen ductum esse intelligitur. Exemplo res planior fiet: *Qui quid morbus sit, qualisq; eius natura cognoscit, is statim etiam nouit, quid faciendum sit*. Quū n. morbi natura, corporis nostri naturæ inimica & infesta sit, sui ablationē mōstrat, nulla interim adhibita nec obseruatione, nec ratiocinatione. Proinde q. febricitantib. frigida cōueniant, ita indicāte febris natura cognoscimus. Cōtra calida illis obesse scimus, q. hæc cōtraria sint iis, quæ prodesse morbus indicauit. Id nec obseruatio, nec ratiocinatio facit. Nā obseruatio seu experientia rerū naturā nō expēdit, sed longo rerū vſu se tuetur. Quapropter ea in omnib. vtunt̃ Empirici. Ratiocinatione quoq; siue demōstratione non est opus: q. rei natura proposita, statim quid cōferat, aut quid obſit, cognoscimus, nec vt ratione aliqua abditas causas inquiramus, oportet. ut *lib. 5. cap. 1. fusius dicemus*. Ceterum cognitio, quæ ex propria inspectione, quam *ἀντοψία* Græci dicunt, habetur, iisdem triplex erat, nempe *fortuita, consulta, siue ex instituto nostro apparens, & imitatrix*. Fortuita quæ Græce *τυχεῖα* nominatur est *quæ sine humano consilio, vel casu, vel natura euenit*. Casu, ut si quis cui occipitium dolore afficiatur, ex alto deciderit, atq; inde vena frontis recta disrupta & incisa, sanguineque effuso iuuetur. Natura, ut si febricitanti sanguis sponte per nares effluxerit, statimque desinat febris. Huius generis iuuantia & lædētia *φύσικα*, hoc est, *naturalia* vocabant. Eam quidem inspectionem, quæ fortuito, & inconsulto, neque ex instituto nostro accidit, *πρὸς τὴν τύχην* quasi *incidentiam* dicas, aut *fortuitam occasionem*, appellarunt. Consulta vel ex nostro instituto apparens cognitio est, quæ ex proposito nostro accidit: ut si quis in febre perditē *ἰσίων* sitiens, ad bibendam aquam, vel mala granata edenda coactus, febrem euaserit: vel in monte aliquis a serpente ictus herbam, quacunque sibi oblata fuerit, vulnere adhibens, sanitatem inde recuperauerit: vel si quis somnis admonitus venam in morbo tundens, sanitatem consecutus fuerit. Hæc quia præpropera est ac subita quasi, ideo *ἀντοψία*, id est, *subito factam*, vel ex tempore paratam nuncupauerunt. Tertia cognitio illis *μιμητική*, id est, *imitatrix*, eo quod imitatione comparatur, dicebatur. Fit vbi quispiam imitatur, quod semel, aut bis, aut etiam frequenter effectum conspexit. Quæ quidem vltima cognitio, ipsorum artem maxime constituisse videtur. Quoniam vero Empiricis interdum morbi quidam incogniti occurrebant, vel quorum non habebant satis explorata remedia, instrumentum quoddam ad inueniēda remedia commenti sunt, nempe *τὴν τῷ ὁμοίῳ μεταβαλόν*, id est, *transitum transgressionemue ad simile*: quo vtentes idem sæpe auxilium a malo ad simile malum transferunt. Item a loco ad locum, a remedio prius cognito ad simile veniunt. A malo ad malum, ut si ab erysipelate ad herpetem transferunt. A loco ad locum, ut si a brachio ad femur. A remedio ad remedium, ut si in diarrhæa a coroneo malo ad mespilum se transferunt. Deniq; experientia fit ex historia, vbi nimirum discunt, quod ab aliis est obseruatum: Quapropter

Tres medicorum celebres sectæ. Empirici.

Obseruatio.

ἐμπειρία.

Experientia quid. Memoria.

μνησκόποι.

θεωρημα.

Indicatio.

Fortuita.

Consultata.

Transitus ad similia.

Historia.

ab alijs differt. Sic enim appellant, quod ipsi viderunt: historiam autem quod ab alijs **A**
 acceperunt. Historiam namq; vocant rerum sapius circa eadē probatarum narrationem. Quū
 enim frequenter oriantur morbi quidam, ad quos nullum auxilium ab ipsis est observa-
 tum, vt in hac difficultate aliquibus etiam remedijs abundarent, neq; fortuitum exspe-
 ctarent euentum, historia vsi sunt. Neq; hac solum de causa, verum etiam vt breuior es-
 set traditio. Quum enim Empirici ad symptomatum *συμπτωμάτων* respiciant, & conuenientē
 ex eis curationē accipiant & obseruēt, idq; nec malo cognito, nec causa inquisita: fieri
 autem non possit, vt vnus in omnib. symptomatis obseruationem faciat, ne quis omne
 vitæ curriculum, discendo tantū consumat, sed & aliquādo arte vtatur, ad medicādum
 vtilem esse historiam asseruerunt. Ceterū *συμπτωμάτων* Empirica, vt lib. 2. *Therap. methodi, mul-*
tiq; alijs locis testatur Galenus, non est, nisi symptomatum, quæ in laborante sunt loco, con- **B**
 cursus, coaceruatio, & congeries.

Methodi-
ci.

Haftenus quæ fuerit olim prima medicorum, nempe Empirica, secta, quam potui-
 mus breuissime adumbrauimus: reliquum est igitur, vt alterius sectæ, methodicæ nimi-
 rum, placita succincte quoque perstringamus. Huius itaq; sectæ medici sese *Methodicos*
 nominabant nulla alia de causa, quam quod methodum seu rationem artis compen-
 diariam sequerentur. Siquidem illi neq; longam, neq; difficilem esse medicinam dice-
 bant, secus atq; Hippocrates: sed breuem, facilem, perspicuam, & quæ tota sex mensib.
 promptissime perdisci posset. Quare non verbotenus tantū cū reliquis sectis disceptabāt,
 sed etiam multa artis opera nouabant. Nam neq; laborantem locum ad curationis indi-
 cationem quicquam prodesse affirmabant, neq; causam, neq; ætatem, neque tempus, **C**
 neq; regionem, neq; virium ægrotantis inspectionem, vel naturæ, vel ipsius habitus, ne-
 que consuetudinem, neque dissectionem. Neglectis enim iis omnibus, a solis pathe-
 matis remedii indicatione petita, eandem sufficere asseriebant. Nihil autem ab iis spe-
 ciatim, sed communiter generatimque statuebant, atque iam *κοινότητες*, hoc est, *commu-*
nitates nominabant, quæ vbique & in singulis pathematis sunt: vt communitas de Me-
 rhodiorum sententia non sit, nisi res. a pluribus eadem. Atq; horū sane quidam, Thesi-
 salii nimirum asini, morborum omnium, qui ex victus ratione proueniunt, alii simpli-
 citer omnium, duas communitates, & tertiam quandam ex illis mistam ostendere nite-
 bantur. Nominabant vero has ipsas *ἀσχυρὰ καὶ ῥαγδαία*, vel *σπασμὸς καὶ πόσινος*, id est, *adstrictionem &*
fluorem, vel adstrictum & fluens. Adstrictionem autem dixerunt esse *meatum densitatem,*
& necessariorum excrementorum suppressionem. Fluorem vero *immodicam meatum rarefactionem,*
& eorum quæ resineri debuerant, excretionem. Quum autem simul supprimerentur & ef-
 ferrentur, complexū mitionemue tum constitui affirmabant, quemadmodū in oculo,
 qui phlegmone simul & defluxione laborat. Siquidem phlegmonem, quæ illis adstrictū
 malum erat, quum non sola nunc, sed cum defluxione in vno eodemque loco orta est,
malum compositum mistumq; esse dicebant. Ceterum indicationem eius, quod confert, in
 adstrictis quidem laxitatem esse, in fluentib. vero suppressionē asseriebant. Verbi gratia,
si genu tumore laboras, relaxandum esse aiebant: sin alius aut oculus fluxione vexabatur, cohiben-
dum atque comprimendam præcipiebant. In mistis autem, ei quod vrgeret, vtpote magis in-
 festanti, periculumque minitanti, resistendum. Hoc idem est, quod illi vehementiori **E**
 occurrendum esse potius, quam alteri, dicebant.

Rationa-
les seu do-
gmatici.

Tertia secta est eorum, qui se a ratione, cui innituntur, rationales & dogmaticos
 nominant. Hi sane naturam corporis, cui mederi conantur, diligenter perdiscunt,
 omnium signorum exquisita habita ratione, causarū omnium, in quas quotidie corpus
 incidens, vel salubrius, vel insalubrius seipso efficitur, vires inquirūt. Præter hæc aeris est,
 aquarum, locorum, regionumq; naturæ, vitæ, studiorum, ciborum, potuū, & consuetu-
 dinum medicum peritum esse oportere aiunt, vt morborum omnium causas, & reme-
 diorū facultates inueniat. Insuper eū esse, q. cōlicere, & raticinari possit, medicamētum
 huiusmodi facultate præditum, si huic generi causæ adhibeatur, certum aliquid effe-
 cturum esse. Negant enim illum inuenire remedia posse, priusquam in iis omnib. mul- **F**
 tifariam sit exercitatus. Curationis denique indicationes non solum ab ipso effectu, ve-
 rum etiam ab ægrotantis viribus, necnon ab ætate anni, tempore, ægri natura, regione,
 partibus corporis, & alijs omnibus, quæ paulo ante commemorauimus, elicere, cōgru-
 entiaq; morbis semper accommodare præsidia, in summa, semper cōtraria affectib. præ-
 tet na-

Ater naturam ministrare medicum debere affirmant. Ceterum non eunt inficias, experientiam quoque esse necessariam, negant tamen per eam omnia posse inueniri. Siquidem duo sunt instrumenta apud omnes homines ad res inueniendas necessaria, & quæ fidem faciunt iis, quæ recte sunt inuenta, nempe ratio & experientia. Quapropter ad experientiam aditum commodè fieri non posse, nisi per aliquam rationem contendunt, quod alias incerta parumque sibi constans, & ut Hippocrates ait, periculosa, fallaxque sit. Atque hæc quidem tres præcipue medicorum fuerunt sectæ.

Qui trium sectarum principes exstiterunt. C A P. IX.

Prioris sectæ, quam Empiricam vocarunt, auctor & princeps exstitit Philinus Cous, qui primus eam a rationali separare ausus est, occasione ab Herophilo, cuius auditor fuit, accepta. Quum autem Empirici suam sectam primam esse vellent, & Rationali vetustiore, *Acronem Agrigentinum* ei dedisse initium finxerunt. Quam sane famam secutus Plinius Empiricen in Sicilia a Creonte Agrigentino cœpisse tradit. A Philino Serapion Alexandria in ea secta floruit. Cornelius Celsus in præfatione libri septimi Empiricen in Aegypto quoque increuisse tradit, Philoxeno maxime auctore, qui pluribus voluminibus hanc partem diligētissime comprehendit. Gorgias etiam & Sostratus, & Hieron, & Hammonius Alexandrinus, multique alii celebres viri, singuli quædam reppererunt. Ac Romæ quoque non mediocres professores, maximeque Tryphon pater, & Euolpistus, & horum eruditissimus Meges, quibusdam in melius mutatis, aliquantulū ei disciplinæ adiecerunt. Dein Apollonii duo pater & filius Antiocheni. Hos secuti sunt Glaucias, Menodotus, Sextus, Heraclides Tarētinus, & alii, quorū sæpe apud Galenum fit mentio in ea secta floruerunt, illamque quasi corroborarunt. Alteram sectam, Methodicē dictam, Themison Laodiceus Syrius incepit, qui ab Asclepiade rationali institutus, occasione nata ad methodicę sectæ inuentionē se contulit. Hinc est, quod Galenus illum multis in locis *communitatū repertorem* nominet. Hanc vero sectam subinde Theſſalus Trallianus absoluit, qui, ut Plinius lib. 29. cap. 1. auctor est, sub Neronis, immaniſſimi Tyranni, & pessimi nebulonis principatu vixit, cunctaq; maiorum placita deleuit, ac rabie quadā in omnes sui æui medicos perorauit. Tanta n. huius belluæ fuit arrogantia, ut monumēto suo in via Appia sese *iategyinn*, hoc est, *medicorū victorē*, inscripserit. Nec minor illius aſini fuit impudentia, ut qui sex mēſium ſpatio se vniuerſam vel-

Dle tradere medicinam ſuis diſcipulis nullo ſuffuſus pudore ſit pollicitus. Poſt hūc Mnæſius, Dionyſius, Proclus & Antipater ſecuti ſunt. In ea vero ſectā, de quibuſdā diſſenſerūt Olympiacus Mileſius, Menemach⁹ Aphrodiſæus, & Soranus Ephēſius, ut *liquido exiis, quæ lib. 1. Thera. Methodi ſcribit Galenus, omnib. cōſtat*. Tertiā vero ſectę auctor & princeps fuit Hippocrates Cous, medicorū omniū, citra controuerſiam, ſummus. Poſt hūc Dio-cles Caryſtius, Praxagoras Cous, Herophilus Chalcedonius, Eraſiſtratus Chius, Mneſitheus Athenienſis, Aſclepiades Bithynus, Cienus, qui & Pruſias dictus eſt, aliq; multi, quorum paſſim in Galeni monumētis mētio fit, floruerunt. Ceterū priorum duarū ſectarum principū placita, utpote manifeſte falſa & a veritate abhorrētia, Galenus in libr. *de optima ſectā ad Thraſybulum* luculentiffimis argumentis reſellit, & explodit, quemad-

Emodum etiam in eo, quem *de ſectis ad eos, qui introducuntur*, inſcripſit.

Vniuerſa medicina in tres ordines diſtributio. C A P. X.

Maiores noſtri prudenter ac ſcite ad modum vniuerſam medicinam in tres ordines digeſſerunt, idq; non alio ſane conſilio, quam ut ad eos artis medicę ſtudioſi diligenter reſpicerent, inq; illos quicquid vſquam apud probatos medicinæ ſcriptores inueniſſent, referrent, adeo ut ſi quid illis explicandum declarandumue occurreret, ex iſtis ſtatim, ceu communib. locis ac formulis peterent. Non parū itaq; hac ratione memoriz ſtudioſorum conſulere voluerunt, q̄ ex iis ordinib. facile quid illis vel dicēdum eſſet, vel faciendum, ſtatim ſuppetet. Primus ordo earum eſt rerū, *quæ corpus humanum compingunt, & conſtituunt*. Et placuit illis viris, eas res, ex quib. corpus noſtrū compa-

F& conſtitutum eſt, appellare naturales, quod ſcilicet ad humani corporis naturā ac ſubſtantiam perficiendam concurrant. Siquidem natura, ut lib. 3. de temp. cap. 4. atteſtatur Galenus, aliud non eſt, quam vniuerſa ſubſtantia, & temperies ex primis elementis conflata. Hinc eſt, quod Hippocrates librum ſuum, in quo e quib. elementis humanum corpus fabricatū ſit, inquirat, *de natura hominis* inſcripſerit. Secundus ordo earū eſt rerum

Experientia neceſſaria, atqui non ſola. Duo inſtrumenta ad res inueniendas neceſſaria.

Empiricæ auctores & principes. Philinus. Acro Agrigentinus. Libr. xxix. c. 1. Serapion.

Apollonii Glaucias. Menodotus. Sextus. Heraclides. Methodice. Themison Communitatū repertor. Theſſalus

Rationalis. Hippocrates. Dioeles. Herophilus. Praxagoras. Mneſitheus. Eraſiſtratus. Aſclepiades. Cienus.

Tres vniuerſe medicinæ ordines.

Primus ordo.

Res naturales. Natura quid.

Secundus ordo.

Res non
naturales.
Res cor-
pus no-
stru neces-
sario alte-
rantes.
Tertius
ordo.
Res præ-
ter natu-
ram.
Affectus
præter na-
turam.

quibus corpus humanum, vt sanum permaneat, fouetur ac conseruatur. *Has veteres me- A*
dici, non naturales nominauerunt: nõ certe ideo, quod in vniuersum & simpliciter cor-
pori nostro aduersentur, aut illius naturæ contrariæ sint, sed quod sinistre adhibita, cor-
pus humanum alterent, adeoque eius temperamentum ac constitutionem naturalem,
sanitatemq; destruant. Atq; hinc est, quod rectissime Galenus *cap. 85. artis medica* eas no-
minet res nostrum corpus necessario alterantes, vt infra fusius dicemus. *Tertius ordo* ea-
rum est rerum, quæ humanum corpus lædunt ac corrumpunt. Has sane præter natu-
ram nuncupauerunt, quod nimirum humani corporis naturæ omnino aduersentur, &
contrariæ sint. Galenus *libro 2. Therap. Metho.* & multis aliis locis *affectus præter naturam*
vocat, quod scilicet corpus nostrum præter naturam afficiant. Hos itaque iam comme-
moratos tres rerum, vt ita dicam, medicarum ordines, prout instituti ratio postulat, se- B
orsum nunc prosequemur, a naturalibus nominatis orsi.

De primi ordinis seu naturalium rerum numero. C A P. XI.

Quotolo-
gia.

PRimi ordinis res veteribus *naturales* appellata, ea medicinæ pars docet, atq; comple-
ctitur, quæ supra a Græcis *φυσιολογίαν* nominari diximus. Quippe hæc de iis tractat re-
bus, quæ ad naturam, adeoque humani corporis substantiam ac constitutionem pertinet.
Merito autem harum rerum tractatio primum sibi vëdicat locum, quod nemo recte de
ceteris reb. medicis differere possit, nisi prius vniuersam corporis constitutionem ac na-
turam exquisitè perspectâ habeat. Quapropter qui recte & ordine medicâ artē cognos-
cere, eamq; subinde cū dignitate & laude exercere volunt, ii plane strenuâ dabūt ope-
ram, vt q̄ tum veteres tum recentes probati auctores de reb. naturalib. recte memoriz C
prodiderunt, perdiscant. Res autem ad corporis nostri naturam & cōstitutionem con-
currentes, quas naturales paulo ante dici ostendimus, septenario comprehenduntur
numero, horumq; hæc, quæ sequuntur, sunt nomina.

Res natu-
rales nu-
mero se-
ptem.

1. *Elementa quatuor, Aer, Ignis, Aqua, Terra: vel qualitatium nominibus, Hippocratis more, uten-*
do, calidum, frigidum, humidum, & siccum.
2. *Temperamenta, temperatum, calidum, frigidum, humidum, siccum.*
3. *Humores, sanguis, pituita, bilis, flaua, & atra.*
4. *Partes, caro, os, membrana, nervus, vena, arteria, cor, iecur, caput, manus.*
5. *Facultates, animalis, vitalis, naturalis.*
6. *Actiones, animalis, & naturalis.*
7. *Spiritus, animalis, vitalis, naturalis.*

Quas utiq; res naturales septem pro instituti nostri lege, breuiter & ordine quoad pos-
sumus, optimo enarrabimus, ab elementis auspiciati.

DE ELEMENTIS.

SECTIO II.

Quid elementum. C A P. I.



Vm elementi vox ambigua sit, deq; multis rebus efferatur, sciendum prin-
cipio erit, nobis hoc loco de communib. omnium rerum, & primariis ele-
mentis esse sermonem. Quorum vt exquisitam habeamus notitiam, *quid*
sit elementum, initio nobis definiendū erit. Nam vt prudentissime in officiis E
Cicero monuit: *Omnis quæ a ratione suscipitur de aliquare institutio, debet a definitione profisci-*
ci, vt intelligatur quid sit, de quo disputatur. Elementum itaq; *Galeno lib. 1. de elementis auctore*,
est minima rei, quam cūstituit portio. Vel, vt idē lib. 8. de Hippocratis & Platonis placitis ait,
est *minima pars eius rei, cuius elementum existit.* Licebit & hunc in modum finire: *Elementum,*
est prima & simplicissima portio, ex qua quidque primum constituitur. Ceterum minimum est,
quod amplius suscipere sectionem nequit. Simplex vero, *quod immixtum intemperatumue, & qua-*
litate summum existit. Minima itaq; pars est elementum, non quidem sensu, quod multæ
particulæ ob paruitatem sensum effugiant, sed reuera. Neq; n. vere elementorū sensus
iudex existit. Nõ igitur particula, quæ minima, simplicissima, & primaria videtur, sed q̄
natura talis existit, vere elementum est. Proinde Hippocrates humanæ naturæ elemēta P
cōsiderans, ea sane, quæ sensu & simplicissima, & primaria sunt contemnit: quæ aut vere
& naturaliter sunt elementa, inquirat. Hippocratem igitur imitantes, non eam q̄ mini-
ma primariaq; pars apparet, elementū esse dicamus: sic n. alia quidē a quilibet, & lyncis, &
si q̄ alii homines vel animātes acerrimi visus sunt alia nobis singulis elemēta apparebūt:
sed

Elementū
quid.

Minimū.
Simplex.

Sensus ve-
re elemē-
torum iu-
dex nõ est.
Hippocra-
tes quæ e-
lementa
inquirat.

- A** sed quæ natura & reuera prima, simplicissima sunt, & in alia dissolui amplius nequeunt. Proinde quemadmodum Grammaticorū elemēta seu literæ compositæ vocis minimæ sunt partes: sic etiā Mundi elementa humani corporis. Quippe voces compositæ omnes hæc sunt: *Iram pande mihi Pelida diua superbi*. Vnaquæque autem harum iterum in syllabas, syllabæ rursus in elementa seu literas secantur. I, namq; prima syllaba vno constat elemento, *ram*, tribus composita est, quorum nullum in alia minora partiri potest. Pari ratione humanum corpus quoddam est, cuius partes sunt caput, manus, pedes, & id genus aliæ: quarum vnaquæque iterum ex similaribus dictis partibus, de quibus suo dicemus loco, composita est: atque hæc quidem rursus ex quatuor humoribus & semine constant. Quæ tandem ex elementis, multis tamen interuenientibus mutationibus, generantur. Vt hinc constet elementa esse, & dici merito *minimas, primas, & simplicissimas humani corporis partes*: Si minimæ sunt, non possunt igitur amplius sectionem suscipere, & in alias dissolui. Si primæ sunt, iis nullæ aliæ sint priores, oportet. Si simplicissimæ, immistæ minimeq; temperatæ, & qualitate summa sint necesse est. Rectissime igitur in libro primo de elementis Galenus tradit, in solis elementis qualitates intemperatas mistura ue expertes inueniri, summam quidem in igne caliditatem & siccitatem, in terra summam frigiditatem & siccitatem, in aere summam caliditatem & humiditatem, in aqua summam frigiditatem & humiditatem. Contra falso Philosophi alteram qualitatem in elementis esse remissam retusamue afferunt. Nam si vera illorum esset sententia, sequeretur, in igne non solam esse siccitatem, sed etiam aliquas humiditatis portiones, quæ nimirum illius siccitatem retunderent, adeoque non simplicissimam & immistam. Siquidem, ut recte libro tertio de simplicium medicamentorum facultate cap. 14. dixit Galenus: Contrariorum mistura qualitatum summities frangunt. Verum ea de re plura in commentariis nostris libr. 1. cap. 2. de temperamentis diximus, ad quem locum nunc lectorem ablegamus.

Quot numero elementa. C A P. II.

- H** Actenus quid sit elementum, monstrauimus, nunc inquirendum est nobis, num unum tantum specie sit elementum, an plura potius & diuersa, sibi que dissimilia. Non esse autem hominis, aliorumque corporum primum elementum vnum, hinc maxime liquet. Si enim homo esset vnum, hoc est, vnico ex elemento conflatus, neutiquam doleret. Quippe vnum est immutabile, cum non sit ei, nec a quo, nec in quod permutteretur. Quod non immutatur, id pati non potest. Impatibilis rursus doloris expertus sit oportet. Verum homo dolet, quia nimirum temperamenti alterationem, & continuitatis diuortium sustinet, igitur non est vnum. Eadem quoque ratione licet Epicuri, Democriti, & Leucippi sententias conuellere, qui atomos, omnis prorsus qualitatis atq; alterationis expertes necnō incōpaetilia corpuscula introduxerunt vniuersæ generationis primordia. Siquidem homo haud doleret, si ex talibus corpusculis componeretur. Quippe necessum est, ut id quod dolet, tum sensus, tum etiam alterationis sit capax. Si enim ab omni penitus alteratione sit alienum, eūdem omnino statum, quem ab initio sortitum est, perpetuo seruabit, nec quicquam immutabitur. Iam vero si transmutetur quidem, sed nulla sit illi innata sentiendi vis, nihil propterea magis affectus ipsos sentiet, quam lapides, dum calefiunt, refrigerantur & finduntur. Quum itaque atomi neutrum sortiti sint, adeoque nec alterari, nec sentire possint, certe si ex eis, aut alia quapiam huiusmodi vniformi natura concreti essemus, non vtiq; doleremus: dolemus autem, nequaquam igitur sumus ex simplici aliqua, vniformique substantia conditi. Quapropter quum elemētum non potest esse impatibile, non erit etiam specie vnum. Quippe quod vnum est, semper est impatibile, cum nihil reliquum sit, in quod transmutari, aut a quo pati, ut diximus, queat. Quicquid enim transmutatur, in alterum transmutatur, & quod patitur, ab altero patitur. Quare plura esse elementa, necesse est. Quum autem quatuor sectæ omnes sint eorū, qui in vniuersum de elementis differunt, ut copiose libro primo de elementis ostendit Galenus, ij certe, qui ex igne, aqua, aere, & terra inuicem transmutatis atque alteratis, & ad temperamentum, quoddam reductis, corpora nostra gigni volūt, consentanea pronūntiant. Quatuor igitur sunt omnium rerum cōmunia & primaria, ex quibus, & in quæ simplicissima cuncta & constant & resoluuntur, elementa, ignis, aer, aqua, & terra. Vel certe de Hippocratis sententia, qui in libro de humana natura inscripto, & alias etiam, qualitatum nominib. appellat elementa, calidum, humidum, frigidum, siccum. Calidum n. is appellat neq; solam qualitatem, neque

Calidum quod per excellentiam ipsi simile nomē sortitur, sed corpus summa compos caliditatis: frigidū, in quo **A**
quid Hip- extrema frigiditas: humidū, in quo suprema humiditas: & siccū, in quo summa siccitas existit.
pocrati li-
gnificet. Proinde iuxta Hippocratis etiam assertionem, animātia non ex qualitatib. tantū:
Frigidum. vt quib. sine corporibus ne esse quidem licet: sed ex ipsis corporibus, quæ summas qua-
Humidū. litates receperunt, nasci constat. Atq; substantiæ quidem elementorum animali diem
Siccum. obeunte, abeunt, mundi; seu vniuersitatis elementis permiscuntur. Qualitates vero a-
Animan- nimante vita defuncta, corrumpuntur, ad propriam aut naturam non redeunt. Quod pla-
tium cor- ne Hippocrates in libr. de humana natura iis innuere etiam verbis voluit; *Homine*, inquit,
pura non *fato fungente, frigida in propriam reuertuntur naturam, siccum in siccum, humidum in humidum,*
ex qualita- *calidum in calidum, frigidum in frigidum. Huiusmodi tum animantium, tum aliorum omnium na-*
tibus dun- *tura est. Nam cuncta similiter oriuntur, atque similiter occidunt. Siquidem natura ipsorum & ex his*
taxat ele- *omnibus, qua diximus, constituitur, & singula in idem, vt dictum est, vnde constituta sunt desinunt,*
mentorū *igitur eodem etiā tandem recedunt.* Hæc ille. Quare non est quod quispiam putet illum ex
nasci. *omnibus, qua diximus, constituitur, & singula in idem, vt dictum est, vnde constituta sunt desinunt,*

Elemen- *torum* *substantiæ, non qualitates seu vires in nobis asseruantur.*
torum *substantiæ, non qualitates seu vires in nobis asseruantur.*
substantiæ, *vt ipso loquuntur, vires duntaxat in nobis asseruari.*
non qua-
litates seu
vires in
nobis as-
seruantur.

Quod elementa in animalis constitutione non maneant pura. CAP. III.

C Vm iam ostensum sit nobis, ignem, aerē, aquam & terram esse prima, communiaq;
 & simplicissima rerum omnium elementa, adeoq; ex iis tum stirpes, tum animalia
 omnia gigni, reliquum est nunc, vt inuestigemus, num hæc ipsa in animantis con-
 stitutione maneant pura, & impermixta, aut inter se temperent. Quamuis itaq; corpora
 animantium non solū ex qualitatib. sed & ipsis substantiis elementorum, quib. qualitates
 illæ insunt, nascantur, non manent tñ in animalis constitutione pura & impermixta, sed
 inter se confunduntur, & temperantur, ita sane vt vnū aliquod ex iis procreetur, q; neq;
 ignis, neq; aer, neq; aqua, neq; terra dici possit, q; deinde a forma, quæ iuxta elementorū
 proportionem producit, denominationē suam sortitur. Proinde simile quid in ele-
 mentorum mixture accidit, quod in emplastro, quod *tetragadis* appellant, euenire
 solet. Huius enim exemplo, Galenum sequuti, vtémur. Quemadmodū enim hoc neq;
 ceram, neq; picem, neq; resinam, neq; adipem, etsi ex iis compositum est, recte dixeris:
 ita quoq; id, q; ex quatuor elementis constat, neq; ignem, neq; aerem, neq; aquam, neq;
 terram, sed animal, verbi gratia, vel stirpem, nominabis. Non est igitur, vt cum Empe-
 docle quis affirmet, elementa exiguarum partium sola appositione permisceri, cum il-
 lorum substantiæ, ita inter se misceantur, confundantur, ac temperentur, vt simplex, nō
 temperatum, & immistū in animantium corporib. elementum nullum reperiatur. Qua-
 propter maiorem in modum quispiam ineptiret, si propterea quod nullum ex quatuor
 elementis solū syncerumq; cōspiciatur, inficiaretur ea omnia simul in eo reperiiri. Effer-
 n. hoc perinde, ac si quis credere noller, tetrapharmacum ex cera, resina, pice, & adipe
 componi, quoniam eorum nullum integrum syncerumq; contineri in eo videat. Igitur
 tametsi nullum ēt e quatuor elementorum numero integrum syncerumq; in animan-
 tium corporib. reperiatur, tñ non est propterea dubitandum, quin illa ex iis confusa &
 temperata sint. *Et cur queso quis sibi in animantium corporib. terram ostendi postulat, qua syncera*
sit, atq; impermixta: cum eiusmodi ne in vniuerso quidem a se ostendi queat? Quamcunque enim
 particulam eius acceperit, ea statim erit alicuius caloris, humorisq; cuiusdam, & aeræ
 substantiæ particeps: cum tamen terra ea, quam elementum esse opinamur, sit quā ma-
 xime densa, grauisq; & sicca, & præterea frigida. Quod si tu in mundo lapidem mihi o-
 stenderis, ferreum sane corpus, ego tibi illi simile aliquid in animantium corporibus,
 ossium nempe cartilaginum, pilorum, testarumq; genus ostēdam. Quare si cupis in ani-
 mante terram intueri, eandem habes, qualem in vniuerso. Eam vero quæ sola sit, & cu-
 iusq; mixturæ expers, neq; in illo facile reperiās, quemadmodum neq; aquam purā, quæ
 aliorum nulli commista sit, nec ignem, nec aerem. Sunt etenim hæc omnia quasi adul-
 terata, & aliis quæ sunt diuersi generis, mista.

Num ali-
cubi sint
pura ele-
menta.

Quod non ita intelligas velim, quasi nusquā syncerę elementorū naturæ habeantur. Nam tametsi, quæ apud nos exstant, quorumq; sensus iudex est, impura sunt omnia,
 syncera

A syncera tamen vspiciam esse: quæ principia sint, & velut fontes, e quib. ista fluxerunt, necesse est. Horum tamen vere elementorum, sensus, vt diximus, iudex esse non potest. Desinas igitur in animalium corporibus in mistum quippiam disquirere, sed satis sit, si aliquam videris particulam frigidam, siccam, & densam, teræ meminisse: si vero humidam, raram, & fluxilem, in aquæ considerationem venisse. Calor autem in corpore animantis exsuperas, ignem tibi repræsentet. Vbi naturâ spiritus, citra quæ animal constare nequaquam potest, perpêderis, ær animo tuo occurrat. Proinde cum in animantium corporibus nihil sit syncerum, & impermistum, rectissime Hippocrates non hominis modo, sed aliorum quoque animantium naturam, ex calido, frigido, humido, & sicco inuicem commistis, ac temperatis constare tradidit. Nisi enim inuicē elementa

B commiscerentur, homo, aut quoduis aliud animal, consistere haud posset.

Nam quamcunque corporis particulam summis suis qualitatibus præditam singularim occuparent, eam haud dubio corrumpere. Nulla siquidem in summo calidum, aut frigidum, aut humidum, aut siccum, salua tolerare posset. Non igitur solum ex inuicem commistis, & sic qualia sunt remanentibus elementis, veluti in tritici, hordei auenæ, fabarum, & eruorum aceruo sit, sed alteratis, transmutatisque, & per tota commistis, animantium corpora generari Hippocrates statuit. Sed hic quæri solet, *num elementorum substantia, an qualitates solæ totis totæ misceantur.* Siquidem veterum ea de re duplicem fuisse opinionem constat. Aristoteles namque, ceterique Peripatetici, vt libr. 1. Terap. metho. cap. 2. attestatur Galenus, qualitates tantum in se mutuo transire, omnino-

Vtrum elementorum substantiæ an qualitates solæ totis totæ misceantur.

C que misceri: Stoici non has modo, sed etiam substantias ipsas, existimant. Quanquam autem hoc definire medico superuacuum est, vt loco iam citato, & in fine libri primi, de elementis, Galenus docet, hincque adeo factum est, vt nec Hippocrates de iis quippiam pronuntiari: tamen præstat Aristotelis, & Peripateticorum amplecti sententiam, & qualitates virtutesque in mistis totas esse totis permixtas affirmare. Id quod etiam Galenus loco paulo ante demonstrato facit, vbi elementa suis qualitatibus duntaxat tota totis misceri scribit. Fieri enim non potest, sed ne intelligi quidem, vt corporum substantiæ totæ totis misceantur, seque mutuo penetrent, & eodem prorsus situ constitutæ sint, & collatæ. Quauis autem totæ totis non misceantur, mutantur tamen & alterantur elementorum in misto substantiæ. Si enim integræ & illæsæ manerent, nihil dissimile

D sibi compositum redderent. Sed quod ex iis componitur, dissimile est, igitur substantiæ illorum immutatæ, & integræ haud manent. Negandum autem minime erit, substantiam per se totam alterari: hac namque ratione dolorem, voluptatem, sensum, memoriam, ratiocinationem, ipsamque adeo animam, in qua hæc alterationes fiunt, e medio

Substantia per se tota alteratur.

tolleremus. Ceterum mutua inter se transmutationis elementorum causæ non sunt nisi summa, quas illa obtinent, qualitates subiectam substantiam alterantes. Siquidem hæc vniuersam substantiam transmutant, atque alterant, & natura primæ sunt, rerumque omnium communes, & elementorum constitutrices, ac opifices. Proinde recte Hippocrates non hominis modo, sed aliorum etiam omnium naturam, ex calido, frigido, humido, & sicco, esse constitutam pronuntiavit. Nam hæc vt in confesso est apud

Qualitates transmutationis elementorum causæ.

E omnes, mutuo in se agunt, & quod agunt id neque concretionem secretionemque habent, sed quod ipsa substantia per se ipsam tota patitur, & alteratur. Iam igitur abunde constare arbitramur in mistis manere elementorum substantias, sed mutatas, ita sane vt libere, aut sui iuris non sint, vinctæ scilicet, ac quasi interceptæ mutua qualitatū pugnantia, vt pristinas vires expromere haud valeant, neque ignis vrere, neque aqua impen- se refrigerare possit. Neque enim æque valentes vires retinent in mistis, vt antea, vbi syncera erant, vtpote suis actionibus a contrarii elementi actione oppugnatis, & fractis.

Elementi & principii discrimen. CAP. IIII.

F Non prætereundum nobis hoc loco erit, quod elementum a principio differat. Elementa enim sunt corpora, vt comprehensum est, simplicia, ex aliis se simplicioribus facta, quæ in partes diuersarum specierum diuidi nequeunt, ac plane eiusdem sunt generis cum iis, quorum sunt elementa. Principia vero sunt, quæ non fiunt ex se vicissim, neque ex aliis, sed ex se omnia, quæ naturaliter fiunt, promouunt, nec cum rebus, quarum sunt principia, eiusdem esse generis pos-

Elementa

P. principia

Elementa
non sunt
qualitates.

sunt. Ex quibus sane notionibus liquet principio, quod elementa non sint qualitates, *ut* A
nonnulli putarunt, sed potius substantiæ, quibus quatuor qualitates insunt.

Elementa
eū iis quo-
rum sunt e-
lementa, e-
iusdem sunt
generis.
Principia
quæ.
Materia
prima.

Corpora namque cum sint, ut eorundem notio attestatur, substantiæ quoque sunt, & nequaquam qualitates, est necesse. Porro cum elementa sint corpora, mixtionis ta-
men & temperaturæ expertia, constat etiam ea, quorum sunt elementa, esse corpora,
non tamen simplicia, sed mixta. Siquidem elementa cum iis, quorum sunt elementa, e-
iusdem generis esse oportet: ut igitur mixta, quæ ex elementis constant sunt corpora, ita
etiam elementa. Porro principia non sunt nisi quatuor qualitates, nempe summa cali-
ditas, frigiditas, humiditas, siccitas, una cum materia, quæ omnibus elementis subiecta
est, quæque omni caret qualitate, & ut ortus, ita etiam interitus expers, atque a Philoso-
phis prima dicitur. Siquidem ex iis elementa, & omnia alia sunt procreata. Nam quum B
summa caliditas ad materiam accedit, ignis procreatur: quum summa frigiditas, aqua.
Simili modo aer fit, ubi materia in se receperit summam humiditatem: terra vero, quum
siccitatem. Necesse est igitur hunc in modum subiici quiddam, in quo seruat, ac su-
perstite, fiat rerum conuersio. Ex quo intelligitur, *materiam nec ullo ortu generatam, & in-*
diffolubilem ac immortalem seculis omnibus esse. Præterea non sunt cum rebus, quarum sunt
principia, eiusdem generis. Quippe hæc elementorum, quæ, *ut ostendimus*, corpora esse
constat, sunt principia, adeoque diuersi generis, nempe qualitates. Quod vero ex iis
principiis omnia alia naturaliter fiant, exemplo constitutionis hominis demonstrasse

Materia pri-
ma perpe-
tua.

Elementa
prima per-
petua.
Partes reue-
ra simila-
res.

satis fit. Ex primis simplicissimisque elementis sensilibus, quæ simularia dicuntur, *fibra,*
membrana, carne, adipe, ossē, cartilagine, ligamento, neruo, medulla, & omnibus aliis, quorum uni- C
uersæ particulæ eiusdem inuicem sunt speciei, eandemque omnino formam retinent,
homo constat. Hæc rursus ex aliis quibusdam ipsis proximis gignuntur elementis, *san-*
guine nimirum, pituita, & utraque bile, flaua scilicet, & atra. Quæ iterum ex illis ortum ha-
bent, quibus vescimur, quæque bibimus. At hæc ex *aere, igne, aqua, & terra* gignuntur. Ipsa
verò hæc ex nullo amplius corpore alio constituta sunt, sed ex materia & qualitatibus.

Cur princi-
pii & elemē-
ti differen-
tia tenēda.
Philosophi
cur a prin-
cipiis ex-
oriri.

Quapropter hæc, ignis, aquæ, aeris, & terræ principia erunt. Igitur expedit hanc princi-
pii & elementi probe tenere differentiam, ut hinc intelligamus, cur Philosophi secus ac
medici a principiis potius quàm elementis, ordiendum esse iudicauerint. Quippe caus-
sas illi quærunt, cur inter se elementa misceri ac transmutari possint, quæ non sunt, ut di-
ctum est, nisi qualitates, utpote quæ subiectam alterant substantiam, ac stirpes & ani- D
mantia efficiunt. Medici autem id, quod a Philosophis est demonstratum, assumunt,
atque ab elementis ipsis auspicantur. Quæ illis ideo sunt consideranda, ut cognoscant
ex horum legitima & conuenienti temperatura sanitatem constitui: ex eorundem au-
tem parum recta ac vitiosa mixtione, morbos accidere. Atque hæc pro instituti nostri
ratione de elementis dixisse sufficiat. Quod si alicui de iis plura cognoscere libet, Hip-
pocratem in libro de natura humana inscripto, & Galenum in suis cōmentariis, quos in hunc
Hippocratis librum exarauit, & librum eiusdem primum de elementis legat is.

Medico e-
lemēta cur
confide-
randa.

DE TEMPERAMENTIS

SECTIO III.

Quid temperamentum? CAP. I.

Tempera-
mentum
quid.



Ost elementa, ut de temperamentis differamus, quandoquidem inter
res naturales vocatas secundum obineant locum, ordinis ratio exigit.
Temperamentum autem non est, nisi ex quatuor elementis seu calido, frigido,
humido, sicco, constans mixtura, vel, est concentus quidam quatuor qualitatū prin-
cipum, ex omnium elementorum permixtione. Nec temere adiectum est ex qua-
tuor elementis: neque enim sine elementorum omnium mixtione temperamentum in-
duci potest. Non enim si quis aquam & ignem paribus, quodammodo portionibus coi-
re & coalescere statuatur, hincque mutua repugnantiarum vi temperationem quandam
inferri, ea protinus temperamenti rationem subit, ita ut neq; ex duobus illis facta per-
fusio, exacta mixtio censeatur. Perfectum enim non est, sed incoatum, atque mancum,
quod ex duorum triumue duntaxat elementorum connexionem fit: cuiusmodi est plu-
rimum genus eorum, quæ ex sublimi deturbantur, ut & Græci nominant. Quapro-
pter temperamentum est quatuor elementorum permixtio. Per elementa vero non solum
qualitates

Concretis
mixtisque
corporibus
gignendis
vnius ele-
menti ma-
teria satis
esse nō po-
test.
mixtura.

F

A qualitates ipsas, sed & substantias, quibus qualitates insunt, esse inaudiendas ex præcedentibus notum est. Quippe clarissimorum Philosophorum imitatione, ut qualitates elementorum, sic omnino etiam substantias in misto compositoque retineri, harumque confusione & mistura temperamentum constare fatendum. Ridenda igitur est Avicennæ Fen. prima Canonis primi, doct. 3. cap. 1. inepta opinio, qui primarum qualitatum actione mutua quintam qualitatem, eamque simplicem, emergere putauit, quæ una reliquis omnibus in congressu pereuntibus superstes maneat. Id enim quam absurdum sit, hinc in primis patet, quod fieri nequeat, ut omnes per actionem qualitates dissolutæ euanescent, neque non ea tandem superet, quæ validior quum esset (neque enim elementorum omnium par in temperatura) portio conflictus principia dedit. Præterea, si plura, eaque contraria illi non insunt, qui fiet temperamenti per singulas ætates immutatio? Quæ denique insita erit illi causa morbi, senii, & interitus? Adde, quod nequidum animal fato fungitur, poterunt substantiæ elementorum suis qualitatibus instructæ, recedere, mundi que elementis immisceri, quandoquidem iam qualitates earundem dissipatæ sint, nec in composito manserint. Dictum enim supra est, elementorum substantias animante diem obeunte quidem recedere, mundi que elementis immisceri: qualitates tamen post animalis vitam vere corrumpi, nec ad propriam naturam redire. Quocirca nouam illam qualitatem pro temperamento inuehere; vanitas quædam opinionis est, ex omnium animis explodenda.

Non solum qualitates, sed etiam substantiæ elementorum in mistis manent. Opinio Avicennæ qui quintam, adeoque nouam proportionem inuenit qualitatem explosa.

C Temperamentorum differentia quot qualesque sint. C A P. II.

EX elementorum temperatura misturaue nouem in vniuersum temperamentorum differentiarum, quorum vnum temperatum, alia autem octo intemperata sunt, emergunt, de quibus ordine differemus, a temperato exorssi. Temperatum autem, quod Græcis *εὐκτέρον*, id est, *bene temperatum*, & *σύνμετρον*, hoc est, *moderatum*, nostræ ætatis medicis *æquale* dicitur, duplex existit: vnum temperatum simpliciter & absolute, alterum vero temperatum in singulis generibus. *Temperatum absolute simpliciterue*, hoc est, *elementorum & contrariorum inter se collatione, est, in quo elementorum & contrariorum æqua prorsus portio existit*. Hoc tamen temperamentum optimum, exquisitum, absolutum, summum, & ad vnguem mediocre, ac medium quoque appellatur. Siquidem ipsum in vniuersa substantia vere, adeoque pondere medium existit. Hinc est, quod a nostri seculi medicis *æquale ad pondus* nominetur, & nimirum in eo par & æqualis commistorum elementorum spectetur moles. Hoc Galenus lib. 1. de tuenda sanitate cogitatione potius usurpauit, quam solide subsistere scribit. Proinde si alicui vnquam contingit, aut in animali corpore visum est, ne momento quidem, ut idem ait, durauit. Temperatum vero in singulis generibus est, *quod a prioris prosecutione, absolutæque illa, & exquisita mixture paululum abest, & in quo ea contrariorum elementorum mediocritas consistit, quæ tum animantis, tum stirpis naturæ maximè conuenit*. Hoc itaque temperatum, moderatumue dicitur, non quidem simpliciter, ut præcedens, sed in suo genere. Hoc igitur modo temperatum est, quod generis sui decoram illam & consentaneam æquabilitatem est adeptum, quæ tanquam numeris omnibus absolutum, salubriter, integre, & naturæ suæ congruenter se gerit, omnibusque muniis, ad quæ natura sua ducitur, rite fungitur. Quapropter tum animal ac stirpem optime se habere dicimus, quum suam functionem optime & citra reprehensionem obit. *equum*, verbi gratia, *quum velocissime currit*; *Canem*, *ubi ad venationes & tutelas quam animosissimus, ad domesticos quæ mitissimus est*. *Ficum*, *quum plurimos optimosque ficus profert*; *Vitem autem*, *ubi optimas plurimasque producit uvas*. Proinde omnia hæc, animalia dico & stirpes, optimam mediamue in suo genere temperaturam habere dicimus. Non autem absoluto sermone, quum paritas exacta contrariorum in iis non sit, sed ea potius mediocritas, quæ ad potestatem maxime refertur, id est, quæ maxime poterit, iis adsit. Hinc est, quod iuniores medici hanc temperaturam æqualem ad iustitiam nominent, quum nimirum in illa commistorum elementorum ea sit mediocritas, quæ animantis ac stirpis naturæ conueniat, ac quasi iustitiæ ritu temperata sit. Siquidem iustitia, ut eam Iureconsultus in l. 10. ff. de iusti. & iur. definit, *est constans & perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*. Singulis itaque per dignitatem, quæ suum est tribuit, veluti diis, parætib. cognatis, amicis, domesticis, &

Nouem temperamentorum differentiarum. Temperatum duplex. *εὐκτέρον*. *σύνμετρον*. Temperatum simpliciter.

Æquale ad pondus.

Temperatum in singulis generibus.

Quando optime se animal aut stirps habet.

Temperatum æquale ad iustitiam. Iustitia quid?

Obiectio di-
lucitur.

Eucrasia in
latitudinē
extenditur.

Epilogus.

Intempera-
tum.

Simplex
tempera-
mentum.

Composi-
tum.
Octo intē-
peries.
Auerrhoes
in omnes
fere contu-
meliosus.
Tempera-
mentum in
vna opposi-
tione tem-
peratum, in
altera intē-
peratum.

ciuibus. Proinde ut iustitiam esse dicimus, non eam quidem, quæ pondere & mensura, A
sed quæ eo quod pro dignitate conuenit, æqualitatem explorat: sic etiam *temperamen-
tum ad iustitiam* vocant, quæ singulis animantium & stirpium naturis conuenit, nō quæ
ex pari elementorum spectatur mole. Quod si vero alicui absurdum esse videtur, tem-
perati, seu medii temperamenti nomine censerī, quod ad vnguem temperatum non
sit, is quæso reliquorum in vita nominum vsum ad memoriam reuocet. Siquidem & po-
tionem, & balneum *temperata* dicimus, non solum quando alterum huic, alterum illi
tale est: sed etiam quum ad eundem hominē in latitudine tale est. Nam si auerso pau-
lulum eo, qui biberit, iniecerit quis in calicem calidæ frigidæve exiguum, nullam me-
diocris temperamenti mutationem deprehendet. Ad eundem modum, neque si quis B
in solum temperatum frigidæ pusillum iniecerit, temperaturā mediam protinus cor-
rupserit. Quin ambientē quoque nos aerem temperatū dicimus, etiam si in alterutram
partem paululū est propensus. Et quid miri est, si *eucrasia* mediocritatē in satis amplam
latitudinem extendatur? quando etiam in lyris consonantiam ipsam, quæ summa re-
ctissimaque est, vnicam atque insectilem esse probabile sit, quæ in vsus hominum venit,
certe latitudinem habet. Sæpe namque quam percommodè temperare videaris, alter
superueniens musicus exquisire temperauit. Hactenus monstrauius *eucrasiam* siue *tem-
peratum simpliciter* dici, quod medium plane est in utroque contrariorum genere, ita ut non magis
sit calidum, quam frigidum, aut humidum quam siccum. Temperatum vero in animantium &
stirpium genere, in quo ea est mediocritas, quæ tum animantis, tum stirpis naturæ conuenit. Proinde
in eo, quod primo loco posuimus, contraria quæ in illo sunt, inter se comparare & æsti- C
mare oportet, adeoque ad elementorum portiones temperiem referre, in altero vero
ad actiones. Ceterum ubi quid a prædicta mediocritate recedit, intemperatum dicitur,
& ab eo contrariorum, quod vincit ac superat, nomen accipit. Calidum enim vocatur,
in quo calidum elementum frigidum præualet: frigidum autem, in quo frigidum calido
præstat: idem statuendum de humido & sicco. Atque quod ita in vna tantum opposi-
tione intemperatum est, *simplex temperamentum* dicitur. Cuius quidem quatuor sunt
differentiæ, nempe *calidum tantum, frigidum tantum, humidum duntaxat, & siccum dun-
taxat*. Quod si vero in vtraque oppositione alterum superet, siue calidum vna cum
humido, siue calidum simul cum sicco, siue frigidum simul cum humido, siue fri-
gidum vna cum sicco, vique pro vincente sortietur id corpus appellationem. Hæc D
itaque quatuor temperamenta, *composita* nominant: ut in vniuersum octo sint intem-
peries, quatuor nimirum *simplices, & totidem compositæ*. Ac quatuor quidem compo-
sitas intemperies omnes tum Medici, tum Philosophi nouerunt. Reliquas vero sim-
plices, quæ ex dimidio harum, & altera tantum oppositione constitutæ sunt, plerique
ignorauerunt: ita ut etiam Auerrhoes, ut fuit in omnes fere contumeliosus, hoc loco
Galeno obgannire, illumque erroris in simulare, quanquam falso ac temere, ut alias sæ-
pe, voluerit. Siquidem esse temperamentum, quod in vna oppositione sit temperatum,
in altera vero intemperatum, hinc abunde pater. Si enim necessarium omnino non
est, siccam esse, quæ calida sit, sed licet eam & humidam esse, licebit vtrique & mediam
esse: propior namque siccæ intemperaturæ media est, quam humida. Ad eundem mo- E
dum est & frigidū, quoddam temperatum alterum, in quo nimirum frigidum pollet:
hoc tamen nec humidum esse, nec siccum esse necesse, sed potest inter hæc & medium
esse. Rursus enim hic quoque eadem affertur ratio, nempe, si necesse non est frigidum
temperamentum esse humidum, scilicet & siccum, id fieri manifestum est, medium
quoque esse posse: quippe quod vicinius sit humido, quam sicco. Præterea, sicuti ne-
cesse non est, si quæ temperatura sicca est, hanc protinus calidam quoque esse, sed fieri
potest, ut etiam frigida sit: ita fieri potest, ut quæpiam nec calida sit, nec frigida, sed in
hac quidem oppositione media seu temperata, in altera sicca. Simili modo nec humi-
dam temperiem necesse est calidam frigidamve esse, sed eam mediam esse inter huius
oppositionis extremalicer. Si igitur necesse non est, ut vel intemperiem, quæ in calido
est & frigidum, sequatur ea, quæ est in altera oppositione intemperies, vel hanc, quæ in il-
la: licebit aliquādo & naturam, quæ in caliditate & frigiditate temperata est, vel siccam
esse, vel humidam. Ac rursus, quæ in siccitate & humiditate temperata est, vel calidam
esse, vel frigidam. Quapropter mirum videri non debet, si aliquid ex dimidio sit tem-
peratum,

Aperatum, & ex dimidio intemperatum, adeoque octo in vniuersum esse temperamentorum genera intemperata.

Calidum, frigidum, humidum, & siccum multiplex. CAP. II.

Cum nouem esse temperamentorum differentias iam demonstrauerimus, reliquum est, ut ostendamus, quærenti, cuius sit temperamenti, *homo, equus, bos, canis*, aliudue quodlibet, non esse absoluto sermone respondendum. Non enim fieri potest, ut qui ad ea, quæ multis modis dicuntur, & inter se diuersa sunt, vno modo responderet, non coarguatur. Oportet igitur duorum alterum, aut omnes percensere differentias, aut percontatum prius, de qua rogauerit, illam solam dicere. Nam si ut in animalibus

Quærenti
cuius sit tem-
peramenti
homo, non
est absoluto
sermone re-
sponden-
dum.

B cuius esset temperamenti rogauerit, ad id quod medio est inter omnia animantia temperamento hominem nimirum respicientes, respondere oportet. Si vero absolute, atque ut ad totam suam substantiam, sic contraria quæ sunt in eo comparare inter se atque æstimare necesse est, haudquaquam ad functionem temperiem referentes, sed ad elementorum, ex quibus substantia constat, portiones. Proinde ut hæc rectius cognoscantur, & in respondendo minus aberraretur, sciendum erit *calidum, frigidum, humidum, & siccum* multipliciter accipi. Primum absolute, ut nimirum ita *syncerum, simplexque sit, & mixtura careat, ac de nullo alio dicatur*. Hoc modo sola elementa calida, frigida, humida, siccaue dicuntur, quod nimirum syncera sint, & a mixtione aliena, id quod certe de nullo alio corpore dici potest. Neque enim vllum aliorum corporum prorsus & absolute calidum, frigidum, humidum, siccumue est, sed sola elementa. Quicquid enim præter hæc cœperis, ex horum mixtura constat. Secundo modo calidum, frigidum humidum, siccumue non


Calidi, frigidi, humidi & sicci acceptiones.
Absoluta.

C absoluta ratione, veluti *syncerum, & a mixtione alienum, sed per excessum exsuperantiamue dicitur id, quod ex contrariis inter se mixtis constat: ceterum ex pollentis superantisue in mixtura nomine appellatur*. Atque ea sane ratione calidum vocatur, id in quo maior est caliditatis portio: frigidum, in quo frigiditatis. Ita etiam humidum nominatur, in quo humidum sicco præualeat. Siccum vero, in quo siccum humido præstat. Hoc modo pituita, adeps, vinum, oleum, mel, pilus, os, cartilago, vnguis, cornu, lignum, calida, frigida, humida, vel sicca nuncupantur. Quod autem ad eum modum calidum, frigidum, humidum, siccumue

Per exsuperantiam:

D appellatur, iterum bifariam tale dicitur. Primo absolute, hoc est, nulli priuatim & seorsum collatum, sed ut ad totam suam naturam, vniuersamque substantiam. Ita sane canis simpliciter & absoluto sermone, prout videlicet, alteri, verbi gratia, formicæ non comparatur, siccus dicitur. Altero modo non absolute, id est, alicui collatum. Idque rursus trifariam. Vel enim symmetro ac medio eiusdem generis confertur, ut si leo cum homine collatus fuerit, vterque enim animal est. Vel symmetro eiusdem speciei, ut si homo a tate florens cum adolescente conferatur. Vel vnicuius obuiio, veluti si Dion Theoni, Conradus Petro comparatur. Ut in vniuersum sint calidi, frigidi, humidi, & sicci acceptiones septem, sequenti complexæ schemate.

Calidum per exsuperantiam bifariam dicitur.
Absolute.
Non absolute.



De temperamentis quatuor temporum anni. CAP. IIII.

F Annum vniuersum a veteribus in quatuor esse digestum tempora, Ver, scilicet, Aestate, Autumnum, & Hyemem, omnibus est notissimum. Qualia autem horum sint temperamenta, inter medicos non conuenit. Sunt enim qui quatuor temperamentorum coniugationes, quatuor anni temporibus adaptant, adeoque Ver calidum & humidum, Aestatem calidam & siccam, Autumnum frigidum & siccum, Hyemem frigidam & humidam,

Quatuor anni tempora.

esse, idque non sine magno errore, statuunt. Siquidem inter se conferunt anni tempora, Ver nimirum cum Autumno, Æstatem cum Hyeme, Autumnum cum Vere, & Hyemem cum Æstate, horumque inter sese mutua collatione eorum temperamenta colligunt: cum tamen horum quodlibet ex suapte natura æstimatum, non ex alterius collatione, calidum, frigidum, humidum, siccumve nominari debeat. Ad quam sane formulam, si hæc ipsa æstimes, apparebit tibi Ver esse, omnis excessus plane in medio: cum neque sicut in hyeme plus valeat in eo frigidum quam calidum, neque sicut in æstate minus. Ad eundem modum siccitatis humiditatisque æquabilitas in eo spectatur, neque scilicet in eo veluti in æstate prævalente sicco, neque sicut in hyeme exsuperante humido. Hinc rectissime Hippocrates *Ver esse saluberrimum, minimeque morbis, qui mortem afferant, obnoxium*, dixit. Quod enim saluberrimū esse inquit, hoc ipso perspicue docet, *Ver esse temperatum, nequaquam autem calidum & humidum*. Siquidem calidum, humidum & temperatum inter se maxime pugnant. Calidum enim humidumque excessum indicant, temperatum vero omnis excessus plane in medio est: quapropter cum calido & humido statu non coincidit. Accedit, quod omnium aeris temperamentorum pessimum, id est, quod calidum & humidum existit, tātum abest, ut saluberrimū dici queat. Nam ubi totus annus calidus & humidus fuerit, magna succedat pestilētia, necesse est, quemadmodum copiose admodum ex Hippocrate *lib. 1. de temp. cap. 4.* Galenus ostendit. Quod itaque temperamentum in quatuor anni temporibus inueniri nequit, in vitioso & pestilenti aeris statu interdum incidit, temperatum igitur esse nequit. Verum opponet forte quispiam iis, quæ iam diximus, Hippocratis in *lib. 1. de natura humana*, & aliorum quorundam tum philosophorum, tum medicorum auctoritatem, qui vno omnes ore, *Ver calidum & humidum esse dicunt*. Cui quidem ita cum Galeno respondendum erit, *Quod Hippocrates, & nonnulli alii cum Medici tum Philosophi, Ver calidum & humidum esse statuerunt, id nulla alia de causa factum est, quam quod quatuor anni temporibus, quatuor temperamentorum coniugationes aptare voluerunt. Quod ut commode facerent, inter se conferre anni tempora coacti sunt, atque ex mutua inter se collatione horum temperamenta, ut paulo ante diximus, collegerunt. Quapropter sic in temporibus anni ver calidum & humidum dixerunt, ut in genere corporeorum animalia, hæc nimirum cum stirpibus conferentes. Hoc namque cum autumno, quem frigidum & siccum esse affirmabant, contulerunt. Quod tamen minime faciendum erat. Sunt enim perse, & ex sua natura, si recte de eorundem temperamentis statuere volumus, quemadmodum paulo ante dictum est, æstimanda anni tempora. Sed, rursus alius in hunc modum instabit, Verisque temperamentum non esse temperatum ostendere niteretur. Si Ver esset, inquit, saluberrimum, adeoque temperatum, nulli profecto in eo morbi procrearentur, atqui in eo sunt morbi, igitur non est temperatum. Generari autem in vere morbos, ipsemet Hippocrates perspicue testatur, ut qui *sect. aphorismorum 3.* multos, ac quidem peculiare, verni temporis morbos, nēpe furores, morbos comitiales, anginas, lepras, impetigines, alphas, pustulas vlcerosas, tubercula, & id genus, alia mala percenter. Quid vero illi respondeamus, in promptu est, nempe quod Hippocrates ipse abunde huic obiectioni satisfacit, ut qui in citata paulo ante sententia non dixerit, *Ver morbis prorsus vacare*. Nam ita sibi ipsi contradixisset: sed esse *inusta, & avaritia*, id est, *minime mortiferū, aut rectius, morbis, qui mortem afferunt, minime obnoxium*. Nam morbi, qui in eo fiunt, non alia ratione accidunt, quam quod profundum corporis hoc tempore expurgatur, & quod vitiosi humores a partibus principatum in corpore obtinentibus ad cutem detrusi perueniant. Proinde corpori, quod præcedentibus temporibus prauos humores coaceruauit, potius imputandum erit, si verno tempore quispiam ægrotet, quam tempori. Si enim aliquod corpus bonis humoribus refertum, vernum excipiat tempus, hoc saluberrimum conseruat, nihil ex propria eius natura nouans, aut immutans. Non sic vero Æstas, Autumnus, vel Hyems: hæc enim tempora etsi purū corpus, & omni vacans reprehensione excipiunt, tamen hæc quidem flauam bilem, ille atram, Hyems vero pituitam generat, ut fufius in *lib. de humana natura Hippocrates docuit*. Verum alius quæ diximus de vere temperato, ita impugnare perget: *Initium & finis veris in frigus & siccitatem propesa sunt*, igitur, *temperatum esse nequit*. Cui ita respondendum erit: *Fatendum quidem est Veris initium, quod hyemi proximum est, ad frigus propensum esse: ac eiusdem finem, qui æstati proximus est, ad siccitatem inclinare: tamen haud immodice, perinde atque Hyemem & Æstatem, & citra omnem excessum,**

Veris tem-
peramen-
tū, quando:

apho. 3.

Ver non ca-
lidum & hu-
midum.
Aeris tem-
peramentū
calidum &
humidum
pessimum.

Obiectio
diluitur.

Obiectio
alia.

Apho. 20.

Responsio.
Morbi cur
in vere oc-
citant.

Obiectio
tertia.

Responsio.

- A** cessum, qui mediocritatis & *εὐπαρέας*, ut Græci loquuntur, latitudinem transliat. Quod lauacri similitudine fiet clarius. Vt enim illud, non obstante quod in alterutram partem paululum sit propensius, temperatum dicimus: sic etiam nihil prohibet, quin Ver, etiam si eius initium & finis in frigiditatem & siccitatem paululum declinat, temperatum esse statuamus. Neque enim hac declinatio, cum exigua admodum sit, leuisque momenti, & vix animaduerti queat, excessus nomine censeretur. Et certe medium tempus inter has declinationes, quod proprie Ver dicitur, vere temperatum existit. Atque hæc de Veris temperamento dixisse satis sit. Ceterum, Æstas ipsa, extra omnem controuersiam, calida & sicca existit, quod in ea humiditas a siccitate, frigiditas a caliditate vincatur. De Autummi vero temperamento, medicorum variant sententia. Sunt enim, qui absoluto sermone, & citra omnem limitationem hunc frigidum & siccum esse, at minus recte asserant. Non enim frigidus est, si ipse per se spectetur, quod scilicet in hoc frigiditas non superet caliditatem, sed modo in eo frigus nos afficiat, modo calor vigeat. Quippe meridie est multo calidior, quam mane, aut vespere. In calore itaque & frigore plane inæqualis esse deprehenditur, & ex ambobus mistus, ut hac ratione absolute nec calidus, nec frigidus dici possit. Atque ea causa est, quæ maxime mortiferum, ut ait Hippocrates, Autumnum facit, inæqualis nimirum in calore & frigore intemperies. In altera itaque oppositione Autumnus inæqualis est. Porro quum in humido & sicco medium omnino statum, quemadmodum Ver, non obtineat, sed ad siccius vergat, adeoque vincat in eo siccitas humiditatem, merito hoc nomine *siccus* appellatur. Hyems quidem, omnium consensu frigida & humida dicitur, non tamen ea de causa, quod reliquis temporibus frigidior, humidiorque sit: sed quod frigiditas in eo superat caliditatem, & humiditas siccitatem.

Æstatis temperamentum.

Autumni.

Cur autumnus mortifer. 3. aphor. 4. & 9.

Hyemis temperamentum.

De ætatum numero, & temperamentis. CA 2. V.

- E**xpeditis quatuor anni temporum temperamentis, ordinis ratio exigit, ut de ætatum numero, tum temperamenti nunc agamus. Vt autem ex anni temporibus calor innatus immutatur, ita quoque ex ætatibus. Eam vero mutationem, quam ætas affert, veteres annorum spatiis, & interuallis dimensu discreuerunt, atque ætates appellarunt. Vt certe ætas non sit, nisi id vitæ curriculum, quo perspicue constitutio corporis per se immutatur. Cum autem alii aliter ætates digesserint, nos de Galeni sententia vniuersæ vitæ sex omnino ætates, suis temperamentis insignitas, statuimus, nempe pueritiam, pubertatem, adolescentiam, iuuentutem, constantem mediamque, & senectutem. Quæ Græcis, *ἡλικία παιδῶν*, id est, puerilis ætas, Latinis pueritia dicitur, primum inter ætates ordinem obtinet, & confestim ab eo tempore, quo vterum homo egreditur maternum, incipit, & ad decimum quartum usque annum protrahitur. In ea constituti Græcis *παιδες*, Latinis pueri appellantur, ac quadruplici differentia, Hippocrate in 3. aphorismorum sectione teste, constant. Primo loco parui sunt, & recens nati, Græcis *νεογνὰ παιδία* dicuntur. Secundo, qui ad dentitionis tempus accedunt, ac dentes iam edunt. Tercio, medii inter dentientes & pubertati proximos. Quarto, qui iam ad pubertatem accedunt. Hæc certe ætas temperamento calida, & humida existit, quod hinc maxime colligitur. Prima namque pueri in utero matris constitutio ex semine & sanguine, rebus calidis ac humidis est, Cum vero paritur, adhuc humidissimus est, non modo in sanguinis vasis, visceribus, & carne, quæ plane mucosa est, sed etiam nervis, ligamentis, imo & ossibus, quæ tamen omnium, quæ in nobis sunt, siccissima esse constat. Si quidem hæc ipsa tenera, flexibilia, adeoque quasi cerea sunt, ut facile sequantur, quocumque ducas. Hincque adeo fit, ut puerorum nutrices ea ad arbitrium suum fingant formentque. Huc accedit, quod corpora in alio quam calido & humido temperamento crescere nequeant. Calidi igitur & humidi pueri sint, necesse est. Eam ætatem nonnulli in binas partiuntur, nempe infantiam, & pueritiam. Infantiam ad tertium quartumque annum extendunt. In qua quidem ætate constitutus Græcis *βρέφη* & *νεογνὲς* dicitur. Ab eo tempore pueritiam incipientes, ad decimum protrahunt. Nos vno pueritiae nomine utranque complectimur. Altera ætas Græcis *ἡβη*, Latinis pubertas nominatur. Hæc, ut sect. 3. aphorism. commento 27. & sect. 5. commento 7. auctor est Galenus, initium capit anno decimo quinto, & ad decimum octauum prouehitur. Tertia ætas Græcis *μεγαλία*, Latinis adolescentia vocatur, eodemque Galeno sect. 5. aphorism. commento 9. attestante, incipit anno decimo octauo, & ad vigesimum quintum

Ætas quid. Ætates sex. Prima Pueritia.

Infantia. *Ἀπὸ φ.*

Secunda: Pubertas.

Tertia Adolescentia.

durat. In hac constituti ætate, Græcis etiam *ἡβῆτες*, id est, *puberes, vel adolescentes*, nominantur. Hippocrates *sexto Epidem. libr. τῆς γ' τοῦ* quoque appellat, quod tum vocem mutant, & *ἡβήσκειν* incipiant, *ut fusiis nostris in commentariis diximus*. Ceterum Hippocrates, & Galenus etiam interdum, *ut loco paulo ante indicato*, adolescentiam sub pubertate comprehendit, neque id quidem temere. Vtraque enim earum ætatum, pubertas scilicet & adolescentia, medii, adeoque optimi, sunt temperamenti, Galeno *sectio. prima, aphorismorum comment. 18. & in commentario super librum Hippocratis de victu priuatorum, teste, ut hoc nomine facile pro vna eademque ætate haberi possint*. Quarta ætas est *νεανίσκων & ἀκμαζόντων*, id est, *iuuenum & vigentium*, hinc Latinis *iuuentus & iuuenta* dicitur. In hac sunt *νεανίαι*, id est, *iuuenes*, sic, *Varrone teste*, a iuuanda Republica, Latinis dicti, modo *ἔξ ἡβῆτων*, hoc est, *annos pubertatis & adolescentia egressi*. Vnde illud Terentianum, *Excessit ex ephebis*. Hippocrates vocat *νῆς & νεώτερος*. Græcis hæc ætas *ἀκμή*, id est, *vigor, florens* siue *vigens ætas* appellatur. Orditur, Galeno *sectione Aphorism. tertia, commento trigessimio, & sectione quinta, Aphorism. commento nono, auctore, anno vigesimo quinto, & ad trigessimum quintum extenditur*. Hæc utique ætas, *ut sect. prima, Aphorism. comment. vigesimo quarto, attestatur idem Galenus*, calida & sicca existit. Hoc loco quaeri solet, *num pueri an iuuenes calidiores sint*. Ad quam quidem quaestionem ita de Galeni etiam sententia respondendum erit: Caloris æqualitatem in pueris & florentibus ætate esse: id quod vnusquisque, qui sensum in multa particularium experientia exercuerit, manifeste deprehendet: differre tamen, quod qualitate puerorum calor magis sit halituosus, & multus, suauisque: ætate autem florentium exiguus, siccus, nec similiter suavis, sed tristis, adeoque tangenti quasi molestus. Siquidem puerorum substantiæ, utpote humidæ, multum foras effluit: florentium vero ætate substantiæ, utpote siccæ, parum. Proinde neuter eorum simpliciter videtur calidior, sed alter multitudine eius, quod diffatur, alter acrimonia. Dissimilis igitur cum in vtrisque substantia sit, in pueris quidem humida & aërea: in ætate florentibus sicca & terrea, ut illorum calor tangenti blandior, horum vere minus suavis, ac veluti tristis occurrat, quemadmodum copiosius id ipsum *libro secundo, de temperamentis, capit. tertio, & sectione. prima, aphorism. commen. 14. Galenus monstrauit*.

Quinta ætas.
νεανίσκων
της
1. aphor. 13.

μεσολιγες

πρὸς γῆμα
στην

πρὸς γῆμα
Declinans

ἀνδρία
Virilis ætas

Temperamentū hu-
ius ætatis

Quinta ætas Græcis *μεσολιγες*. Latinis, Ciceroni præsertim in dialogo de senectute, constans, & media, inter manifeste crescentes, & decrescientes, siue iuuentutem & senectam scilicet, dicitur. Hippocrati in *Aphorismis* qui in hac ætate sunt, *νεανίσκων* nominantur, id est, *constantes & maturi, ac consistentes*, quod nimirum iam vires cōsistant, subsistantve, nec amplius crescant, imo minui potius incipiant. Verum esse, quod dicimus, confirmat Galenus in Commentariis iam citati Aphorism. ita scribens: *νεανίσκων τὰς λέγει τὴν μέσων ἔχοντας ἡλικίαν, ἀκμῆς τε καὶ γῆρας, ὡς πάντες μὲν ἵδου τὰ τῆς ἀκμῆς, μηδὲ πῶς δὲ μηδὲ μίαν ἀδύνασιν σαφῆ γῆρας ἔχειν*. Quibus sane verbis Galenus dilerte innuit, *consistentes aut subsistentes esse, qui mediam inter vigorem seu iuuentutem & senectam obtinent*. Hinc est, quod ætas hæc *μεσολιγες*, & in ea constituti *μεσολιγες* Græcis appellentur, ut idem plane sint *νεανίσκων* & *μεσολιγες*, quod diligenter obseruandum erit. Habet autem hæc ætas & alias apud Græcos appellationes. Siquidem illis *πρὸς γῆμα*, & *πρὸς γῆμα*, hoc est, *declinans*, Galeno *sectione tertia, Aphorismorum, Commento trigesimo, & libro quinto, de tuenda sanitate, capite ultimo, teste, vocatur*. Hoc autem nominis illis datum est, quod in ea vires hominis decrescere incipiant. Appellatur etiam Græcis alio nomine *ἀνδρία* & *ἀνδρῶν ἡλικία*, id est, *virilis ætas*. Incipit anno trigesimo quinto, & finitur quadragesimo nono. Galeno *sectione tertia Aphorismorum, Commento 30. attestante*. Præsens ætas, potissimum si ad præcedentes ætates conferatur, frigida & sicca existit. Hinc est, quod Galenus loco iam citato ita scriptum reliquerit: *Omnium fere, inquit, ætatum, ea, quæ iam declinat, paucis indiget ad corporis resurrectionem. Siquidem quod in ea resoluitur, paucissimum est. Neque enim corpus similiter calidum, sicuti prius, neque in augmentum amplius quicquam in ea absumitur*. Frigidus autem esse in hac ætate constitutos, Hippoc. quoque *libr. 1. de victus ratione* perspicue docet, iis quidem verbis: *Vir ubi iam corpus eius constiterit, frigidus & siccus est, quod nimirum caloris excessus impetusue non amplius prapolleat, corpusq; quiescens augeri desinat, ac frigidius factum sit. Siccatas*

Sexta ætas
Senectus.
γῆρας

etiam prioris ætatis inest. Hæc ille. Sexta ætas senectus nominat. In ea cōstituti Græcis *γῆρας* ἀπὸ τῆς γῆρας, & honorē denotat, deducto nomine: *γῆρας*. n. ætas est honore dignissima: &

- A** πρὸς βῆτι (neque enim inter hæc duo vocabula vllum est, Galeno auctore, discrimē) dicuntur, Latine autem *senes*. Horum Galenus libro quinto, de tuenda sanitate capit. ultimo, tres recenset differentias. Primam eorum qui αἰμορροῦντες, hoc est, *viridis senectus præditi*, quod nimirum adhuc ad Rempublicam gerendam idonei sint, & ciuilia obire negotia queant, nominantur. Hæc incipit anno quinquagesimo, & ad sexagesimum vsque durat. Nec est, quod aliquem hoc loco perturbent Christophori de Vega, libro primo prognosticorum, comment. 29. rationes, qui αἰμορροῦντας a constantibus consistentibusue nihil differre putat. Quod enim de consistentibus subsistentibusue 3. sect. Aphorif. Comment. 30. Galenus dixit, quod scilicet omnia vitæ munia aequē illi, qui in vigore sunt, possint peragere, non tamen eodem modo ad labores sufficere: non est idem cum eo, quod in fine libri quinti, sanitatis tuenda, de crudis senibus retulit. Nam ibidem simpliciter & citra collationem eos ciuilia posse obire negotia inquit. In Aphorismis autem non simpliciter, sed collatione cum iis, qui ætate vigent, & non priuatim ciuilia tantum, sed omnia vitæ munia peragere conari ait. Vt hoc nomine subsistentes a crudis senibus differre necesse sit. Siquidem illi omnia vitæ munia adhuc peragunt, hi vero ciuilia tantum. Præterea nobiscum non pugnat Galeni locus, quem ex libro secundo Prognost. Comment. 49. producit. Nam in eo, seniores vocat, qui in consistente ætate, & qui cruda viridiue senectus præditi sunt. Senes autem, qui annis iam multis prouecti sunt, adeoque qui secundam & tertiam senectutis partem attigerunt. Quare seniores, qui inter florentes ætate, & senes ætate medii sunt, duobus appellat nominibus: priore quidem, qui scilicet ætate iam subsistunt, *μεσσηπόλιος*, id est, *dimidia parte canos*, posteriores autem, αἰμορροῦντες. Quod vero μεσσηπόλιος idem sint, qui καθεσκηότες, confirmat abunde Phauorinus, qui ita scriptum reliquit: Μεσσηπόλιος, ὁ μεσῆλιξ, καὶ ὁ σφόδρα πεπολιώμενος, ἀλλὰ μέσος, ἔπα γέρον. Quibus certe verbis palam ostendit μεσσηπόλιος non esse nisi μεσῆλιγος, hoc est, *in media ætate constitutos, & nondum senes*, vt necesse sit αἰμορροῦντες ab iis esse diuersos, quandoquidem senes omnis generis a μεσσηπόλοις separaret, vt hinc iterum manifestum sit, inter vigentes & senes duas interuenire ætates, nempe *subsistentem mediamue, & crudam senectam*. Quod iterum liquido Phauorinus demonstrat ita scribens, Μεσσηπόλιος ἐστὶν, ὁ ὑπερβᾶς μὲν τὸν ἀκμαῖον, ὡς ἀργεῖλος δὲ καὶ εἰς ὑπερέκμωον, ἢ καὶ αἰμορροῦντα, καὶ μέσως πῶς ἔχων τῶν πολιῶν. Quibus itaque verbis rursus inter vigentem & senectutem duas ætates interponit, ὑπερέκμωον, id est, *subsistentem & vigorem excedentem*, atque αἰμορροῦντα, id est, *primam senectutis partem*. Vt Vegæ argumenta nullius esse momenti hinc intelligant omnes. Secundam differentiam senum facit eorum, qui ciuilia munia, propter virium imbecillitatem, obire non valēt: & quibus hoc nomine iam debetur quies, ac delicatior vita, iuxta Laertem Homericum, ad quem ita filius ait:

Τοῦτ' ὃ εἶπες, ἐπεὶ λέσσετε φάρμακον
Εὐδαιμονία μαλακῶς, ἢ γὰρ δίκη δὲι χεῖντων.

Isque videtur, qui lotus, dapibusque refectus,

Molle cubile premas: namque hac est vita senilis.

Odyss.

- Eius initium est anno sexagesimo, & protenditur vsque in septuagesimum. Tertiam statuit eorum, qui appellantur πέμπτελοι, ὡς τὸ πέμπτεται εἰς τὴν ἀδοπομπήν, id est, *quorum iam* **E** *quasi pompa funeris ducenda sit ad infernum orcutue, vel qui ad manes iam mittēdi sint*. Silicernia Latinis dicuntur. Hæc est omnium postrema, vitamque claudens ætas, quæ decrepita nuncupatur. Orditur anno septuagesimo, & durat ad vitæ vsque finem, qui magna ex parte anno, vt sacra testantur literæ, octuagesimo instat. Est autem senectus in vniuersum frigida & sicca. Siquidem solidæ senum partes, nempe ossa, membranæ, ligamenta, arteriæ, venæ, nerui, tunicæ, carnesque omnes sicca sunt: vt merito Aristoteles senium marcescenti stirpi assimilauerit. Vt enim stirpes dum nouellæ sunt, molles, humidæque cernuntur, senescentes autem assidue magis siccescunt, postremum aridæ prorsus redduntur, idque ipsis mors est: ita quoque animal, quanquam vitæ ingressu, vt ostensum est, humidissimum existit, tamen in dies longius procedens, magis magisque siccatur & arefcit, vt quum iam senectutem, extremam maxime, attigerit, non modo ossa arida sint, & humoris expertia, verum etiam caro. Eius rei vero causam Galen. luculenter in Primo de tuenda sanitate exponit. Hinc veteribus vsitatum fuit, vt senes bis terue quotidie, temperamenti corrigendi gratia, lauarentur. Ceterum non est, quod

Tertia. τίμπτελοι

Psal. 90. Senectus frigida & sicca.

Obiectio
dilutus

quis propterea, quod superuacuis excrementis onerantur senes, hos humido temperamento esse præditos arbitrerur. Non enim ipsæ senum particulae humidiores sunt temperamento, sed potius capacitates, quæ inter corpora patent, superuacua humiditate implentur. Quippe serosis & pituitosis excrementis, ob viriū infirmitatem, senes pleni sunt, in solidis autem partibus plane sicci, *ut libro secundo, de temp. capit. secundo, & libro quinto, de tuen. sanit. capit. sexto, & libro sexto eiusdem operis, capit. 3. & in Commentariis super Hippocratis libellum de victu priuatorum Galenus fusius monstrat.* Porro, quod hætenus a nobis de ætatibus dictum est, sic accipiendum erit, ut id, quod magna ex parte ita accidit. Neque enim ætates certo & exquisito annorum numero circumscribere licet, nisi forte in latitudine quadam: quod non sit vnus omnium certissimus pubertatis terminus propter temperaturæ diuersitatē. Siquidem calidi citius, frigidi vero tardius pubescunt. Pubescere namque aliqui incipiunt, ubi quartum decimum annum expleuerunt: quidam vno post anno, aut etiam amplius. Initium præterea remissionis habent nonnulli post quintum & trigessimum, *ut lib. 6. de tuen. sanit. cap. 2. & sect. aphor. 3. Comment. 27. Galen. copiosius docet.* Denique hæc ætatum ratio de præscripto medicorum, Hippocratis maxime & Galeni, *ut diximus*, excogitata est. Alii, qui ex professo medici non fuerunt, aliter ætates digesserunt, & constantem omnes fere præterierunt. Hinc est, quod Censorius ex Varrone ita diuiserit ætates: *Pueros vsque ad 15. quod sint puri & impuberes. Adolescentes ad annum 45. quod Rempublicam in remilitari iuuare possint. Seniores ad 60. quod tum primum senescere corpus incipiat. Senes autem in quinto gradu ætatis vsque ad finem vita.* Verum quod hæc ætatum ratio a veritate abhorreat, abunde patet. Omnibus enim perspicuum est, corpus ante 60. annum senescere.

Aliorum,
qui medici
non fuerunt,
de ætatibus
opinio.

Hominis tactum solum, esse iudicem eorum, quæ actu calida sunt. CAP. VI.

Hominis
tactus iudex
est tempera-
mentorum.

NE quis exemplo quorundam cum Philosophorū, tum medicorum, sensibilibus rerum cognitionem, laborioso consequi raciocinio moliatur, animaduertendum erit id, quod *in se ipso*, id est, *re ipsa*, aut quod dicere solent *actu* calidū, frigidum, humidum, siccumque est, tactu diiudicandum esse, non quidem leonis, aut equi, aut asini, aut alterius animantis, sed solius hominis. Qui enim equo aut asino potius quam homini, animantium prudentissimo ac sapientissimo, horum discernendi scientiam defert, præterquam quod ridiculus habetur, rerum cognitionem homini adimit, asinis vero largitur, a quibus nemo potest erudiri. Hominis igitur potius prudentiæ, præstantique naturæ, tactus id concedamus, ut reliquorum omnium sit velut lex & regula. Nectamen cuiusuis, sed eius potissimum hominis, qui optimi sit habitus, quique omnium iudicio temperatus, si non omnino, & quod dicitur *ad pondus*, saltem ad iustitiam censeatur. Is itaque ignem omnium, quæ sub sensum veniunt, calidissimum, niuem aut glaciem, frigidissimam: quod vero paribus illorum portionibus confusum est, id ut in medio extremorum est situm, ita in calore & frigore temperatum esse pronuntiabit. Pari ratione aquam humidissimam, terram siccissimam: si quid vero pari horum portione componetur, id in humiditate ac siccitate medium ac temperatum esse statuet. Porro non quæuis temperatissimi hominis particula tactus instrumentum est, sed cutis, ac præcipue, quæ est in manu. Nam etsi tactus per totam cutem æquabiliter fusus est, tamen quum ea, quæ in manu est, ab omnibus extremis, calido, inquam, frigido, humido, & sicco, pari absit interuallo, adeoque omnis excessus expers, ac media sit, huic recte inter noscendorum temperamentorum æqua æstimatio regulæ cognitionis & iudicii defertur, si modo ab iis, quæ extrinsecus occurrunt, verbi gratia, a calore, a frigore, nihilo sit immutata, neque uti in remigibus & fossoribus callo obducta. Ergo calidi frigidiq; corporis solus tactus est iudex, humidi autē & sicci, vna cum tactu ipsa ratio. Siquidem quod siccum est, durum prorsus est, non tamen si quid durum est, idem statim & siccum erit, nisi mediocriter existat calidum. Nam & quod a frigore concretum est, durum cernitur, sicuti glacies. Quo utique minus sicci humidique ad eundem statim discretio est, ante scilicet, quam æstimatum sit, quemadmodum se in calore habeant & frigore. Neque enim si quid cum vehementi calore sit molle, idem statim est humidum: verum quum mediocriter calidum est, tum æstimare durumne an mol-

Cutis volæ
manus ta-
ctus instru-
mentum.

Tactus
quorū solus
iudex sit.

An molle sit, oportet. Si enim molle sit, humidum est: sin durum, siccum. Quæ quidem si sic se habent, partium, quæ in humano corpore datæ sunt, nulla est humida. Sed de partium corporis humani temperamentis sequenti capite agemus. Non est itaq; adhibitis iam dictis distinctionibus de primis qualitatibus, quæ sub tactum recidunt, fides tactui abroganda. Quod si vero spreto sensibus, omnium, quæ sensibus obiciuntur demonstrationes quispiam requirit, quibus colorem album, corum nigrum, ignem calidum, glaciem frigidam sibi persuadeat, is profecto desperata cognitione certi, omnia in suspicionem, Pyronisq; hæsitacionem trahet, *ut fufius lib. 2. de tempe. Galenus docet.*

De singularum partium corporis humani temperamentis.

CAP. VII.

Ordinis ratio, ut nunc de partiũ corporis humani temperamentis breuiter differamus, postulare videtur. Vt autem tactus æstimatione, sic denum essentia & compositione, partium corporis humani temperamenta discernuntur. Quum vero in excessibus iudicandis opus sit, ut mediocre aliquod habeamus, in quod, tanquam scopum aliquem, intenzi simus, & ad quod omnia mediocria comparemus, cutis vero ipsa, ut ostensum est, media plane sit, & omnis excessus expers, ut hanc omnium animalium partium, tanquam normam, ad quam referantur, ac iudicem proponamus. Vt enim sensus iudicio, sic & essentia compactioneue cutis media temperie est prædita. Reliquarum itaque partium corporis temperamenta illius comparatione, in hunc quidem modum sunt æstimanda. Spiritus omnium, quæ in corpore sunt, calidissimus, hoc ipso cor minus calidum, deinde sanguis, post hunc caro simplex. Hanc sequitur iecur, hoc lien, lienem renes, iis succedit cutis temperata. Ab hac in frigidum propensus est adeps & pinguedo, dein cerebrum, hoc frigidior spinæ medulla, qua frigidiores nerui sunt molles, deinde sequuntur duriores motibus accommodari, ab iis est vena, deinceps arteria, post hanc membrana, iis omnibus frigidior tendo, hoc rursus frigidius ligamentum, proximum cartilagineum ligamentum, quod Græcis *χονδροςυνδεσμος* dicitur, subsequitur *cartilago*, os ei finitimum, affidet huic pilus, ultimo loco est pituita, omnium quæ in corpore sunt frigidissima. Pilus omnium est siccissimus, quem suo quæque ordine, deinceps consequuntur os, *cartilago, chondrosyndesmos, ligamentum, tendo, membrana, arteria, vena, nerui duri*: molles quippe humiditate & siccitate, mediam naturam, ut cutis, obtinent. Proxima itaque cuti est mollium neruorum natura. Hinc in humidum iam abit cor ipsum. Hoc humidiores sunt renes, iecur, lien, caro simplex. His succedit pulmo, post hunc est spinæ medulla, dein cerebrum, mox ossium medulla, proxime illi est adeps, subsequitur sanguis, postremo pituita, omnium quæ in nobis sunt ut frigidissima, ita humidissima est. Atque hæc partium temperamentorum series, tactus iudicio confirmatur. Cum enim in nobis quoad viuimus, tanta esse frigiditas nequeat, ut per eam aliquid in duritiem concreseat, quicquid tactu molle deprehenditur, id quoque calidum & humidum: quicquid vero durum, id statim frigidum & siccum videbitur. Cui & essentia compositio consentit. Ossium enim essentia, frigidum & siccum ipsorum esse, ut diximus, temperamentum declarat: Idem facit pilorum, cartilaginum, tendonium, neruorum, ligamentorum, venarum, arteriarum, membranarumque essentia, utpote quæ a colore cocta, & a frigore conereta est. In vno tamen, ut comprehensum est, magis quam in altero frigidum & siccum præpollent, *ut fufius lib. 1. de temperamentis, cap. ultimo, & lib. 2. eiusdem operis, cap. 4. Galenus prosequitur.* Ceterum indicia, quibus totius corporis eiusque partium temperamenta cognoscuntur, in arte medica exquisitè tradidit idem Galenus. Ea etiam, quæ ex pilorum ratione sumuntur, *lib. 2. de tempera. cap. 6.* Alias vere multas, quibus cum partium, tum totius corporis deprehendi possunt, notas, capitibus 7. 8. & 9. usque ad finem secundi libri iam citati docet, quas sane omnes medicus, ut recte temperamenta diiudicare queat, ad vnguem teneat, necesse est.

De qualitatibus secundis. CAP. VIII.

Cum ex secundis vocatis qualitatibus temperamenta quoque cognosci aliqua ex parte possint, operæ pretium faciemus, si de iis quoq; breuiter differemus. Secundæ autem qualitates sunt, quæ primas, nempe caliditatem, frigiditatem, humiditatem, quæ:

Secundariū
qualitatum
differentiæ. & ſiccitatē ſequuntur: vel, vt planius dicā, quæ ex cōmiſtione, temperaturaue prima-
A
rum qualitatum procreantur. Sunt aut̃ harum quatuor differentiæ, nempe viſiles, vt co-
lores, olfactiles, vt odores: gūſtates, vt ſapores, tactiles, vt mollities, durities, grauitas, leuitas,
Colores. denſitas, raritas, craſſitudo, tenuitas, aſperitas, leuitas, & id genus alia. Colores quidē, cutis præ-
ſertim & pilorum, non parum ad temperamenti corporis cognitionem conducunt,
quemadmodum libro ſecundo de temperamentis, & in arte medica Galenus docet. De medica-
mentorū vero temperamentis ex colore certi nihil colligi poteſt. In ſingulis enim
coloribus calida, frigida, humida, & ſicca inueniuntur. Non eſt igitur neceſſarium, vt
quicquid rubrum exiſtit, idem quoque calidum ſit: hac enim lege roſas calidas eſſe conſe-
queretur, quod tamen a vero abhorrere in conſeſſio eſt. Neque contra, quicquid album
eſt, frigidum exiſtat neceſſe eſt. Alias enim omnes flores candidos, frigidos eſſe fateri co-
B
geremur, quod quam ſit abſurdum, omnes intelligunt: nam ſunt quam plurimi eius co-
loris flores temperamento calidi. Quod cum omnibus, præſertim iis, quibus ſtirpium
eſt aliqua cognitio, ſit notiſſimum, nulla eget longiore demonstratione. Ex odore iti-
dem de medicamentorum temperamentis colligere nihil licet, quod libro ſecundo, de
ſimpl. medic. facult. capit. tertio, & libro quarto, eiſdem operis, cap. vlt. Galenus monſtrauit.
Nō tamen capita eius rei hic breuiter attingemus. Quæ odore carent, hæc craſſam
quidem eſſentiam obtinēt: ceterum, quæ ſit eorum in calore & frigore natura, non ita
conſtat. At quæ odorata ſunt, tenuia quodam modo exiſtunt, & calida, verum eius te-
nuitatis caliditatisq; quantitas haud indicatur. Cauſſa vero præcipua, maximaq; quam-
obrem ex odore nihil certi de temperamentis iudicari queat, inæqualitas eſt eſſentiæ. C
Neque enim omnes eius partes æque euaporant, nec perinde vt in gūſtu ſenſum mo-
uent. Quippe in gūſtu omnes ſimiliter gūſtabilium corporum particulæ linguæ offe-
runtur: ſenſumque mouent pro ſua natura ſingulæ, vt copioſius locis paulo ante indi-
catis Galenus docet. Porro genera differentiæ ve ſaporum numero ſunt octo, nempe
adſtringens, auſterus, acerbus, acidus, dulcis, amarus, ſaluſus, & acris: quorum quatuor priores ob
Adſtringēs.
Acerbus. frigoris exceſſum eueniunt: tres poſteriores propter caloris redundantiam. Medius
inter hos omnes, ob temperatum, quem obtinet, calorem, eſt dulcis. Adſtringens ſa-
por, qui Galeno ^{ſeuor} dicitur, contrahit, ob turat, denſat, repellit, increaſſat, & exſiccāt,
genusque eſt acerbi, & auſteri, quod vterque adſtringat, nec niſi in maioris minorisq;
ratione differant. Ceterum vbi in ſubiecto corpore frigiditate ſuperante ſiccum ter-
D
reum dominatur, adeoque actio caliditatis ſiccum conſicere atque extenuare haud
poterit, & probe cum humido commiſcere, tanquam a frigoris exceſſu impedita, tunc,
vt par eſt, in eo miſto vires terræ exſuperant. Quapropter vbi eiſmodi eſſentia terrea,
parum a calore deuicta, acceſſerit, ſapor in miſto creabitur adſtringens, conſtipans;
Auſterus. deſiccans, & in multam profunditatem vſque exaſperans, qui Græcis ^{ſeuor}, Latinis
acerbus, Germanicis Herb dicitur, qualem pyra ſylueſtria immatura in ſe habent. Quod
ſi vero frigiditas haud ſumme exceſſerit, ſed aliqua etiam facultas caloris, quanquam
obſcura in miſto apparuerit, quæ ſecum parum aliquid humoris attraxerit, & cum ſic-
co terreo quodammodo attenuato permixuerit, non tanta viſ adſtrictionis & conſti-
pationis gūſtanti apparebit, ſed tanto remiſſior, quanto & plus caloris & humoris con-
E
cocti inuenietur in miſto. Sapor is, qui tum procreatur Græcis ^{auſter}, Latinis auſterus,
Germanicis Raud/ appellatur. Hic etiā in profundum ſubit, & aſperum quendam in-
æqualemque mouet ſenſum, tanquam reſiccās & humorem omnem corporum ſenſi-
tiuorum depaſcens.

Acidus. Si autem ſubiecta materia plus habuerit humoris, quam terræ eſſentiæ, calorque
inceperit in humore concoctionem, quæ ad perfectam miſtione tendebat, ſed longe
antea deſecerit, & exhalarit, quam finem aſſequi potuerit, eoque exhalato frigiditas
tanquam victrix in humore permanſerit, tunc gigneretur ſapor, qui Græcis ^{acidus}, Latinis
acidus, Germanis Saur nominatur. Quum vero ea eſſentia, in qua is ſapor conſiſtit, ob
humoris redundantiam, tenuis ſit, ad profundum penetrat, nec in ſuperficie hæret ex-
F
ſiccans, & exaſperans. Quia vero calor, qui poſtea exhalauit, in humorem egit, adeoque
caloris in eo reliquit veſtigia, ſubtiliorumq; partium aduſtionē, ideo quæ acida ſunt,
non ſolum in profundum ſubeunt, ſed etiam incidūt, diuidunt, extenuant, obſtruccio-
nēs auferunt, & expurgāt, abſtergūtve. Vt hinc omnib. palam fiat, exquisitæ adſtringentiæ,
acerba,

- A** *acerba, austera, & acida omnia frigida esse.* Sic autem vocamus, quæ præter adstrictio-
nem, acerbam, austeram, & acidam qualitatem, nulla alia sensu notabili qualitate ^{Exquisite}
prædita sunt. Atque ii sunt tres sapor, qui a medio temperamento ad frigidum ^{adstringē-}
declinant, quorum duo adstringentes, nempe acerbus & austerus, in terrea crassa ^{tia, &c.}
que substantia consistunt. Tertius vero acidus in humida, quæ a calore, qui postea ^{Dulcis.}
exhalauit, mediocriter attenuata fuit. Porro dulcis sapor fit, *ubi temperatus calor o-*
ptime commiscet humidum cum sicco. Proinde dulcia omnia mediocriter sunt calida, ^{Salsus.}
laxant, concoquunt, emolliunt, & rarefaciunt. Quod si calor hos fines exceßerit,
& subiecta materia sicca fuerit, quam caloris redundantia adusserit, attenuauerit-
que, necessario fit substantia terrea in eo misto ficior & tenuior, magisque in pro-
B fundum penetrans. Quocirca primum hinc sapor nascitur salsus. Siquidem false-
do aliquod adhuc humiditatis vestigium retinet, quæ coniuncta est, & humanæ tem-
peraturæ familiaris, unde & falsedo in omnibus fere animantibus gustum acuit, &
delectat. Salsa itaque calida & sicca, non tamen vehementer existunt, & quum
linguam contingunt, eam neque contrahunt, neque constipant, imo contra pla-
ne agunt, nempe detergent, & abluunt, adeoque gustum, vt comprehensum est, a-
ciunt. At ubi tota pene humiditas nimia vi caloris exhausta fuerit, tunc ingratis-
simus sapor generatur, qui *amarus* nominatur. Hinc amara quatenus amara sunt, ^{Amarus.}
nullum nutriunt animal. Nulla enim in iis superest humiditas, unde alimentum e- ^{Amara}
lici possit. Sunt itaque amara omnia admodum sicca, omniumque hoc nomine mi- ^{cur non}
C nus putrescunt. Meatus quoque corporis expurgant, abstergunt, extenuant & hu- ^{nutriunt.}
mores crassos incidunt. Ceterum si subiectum, in quo validus & igneus calor ad mi-
stionem agit, humorem satis copiosum habuerit cum sicco terreo commistum, at-
tenueturque vi caloris & effervescat tam humida pars, quam sicca, tunc ex huius ^{Acria.}
modi commistione & temperatura oritur sapor, quem Græci *σπουδρ*, Latini *acrem*,
Germani *ves* & *scharppf* dicunt. Huius saporis substantia usque ad profundum lin- ^{Arabet}
guæ, eo quod tenuis sit, deinde suo fervore, dilatat, exsiccat, mordicat, & erodit.
Atque hæc de saporibus in præsentia dixisse satis sit. Quod si vero de illis quispiam
plura cognoscere velit, is caput 37. libri primi *de simplicium medicamentorum facultati-*
bus, & caput sextum libri quarti *cum sequentibus omnibus, usque ad finem libri, & 26. li-* ^{Tactiles}
D *bri. s. Galeni* perlegat. Quod ad tactiles qualitates attinet, hoc initio monendum e- ^{qualitates}
rit, id quod siccum est, quod supra quoque diximus, durum prorsus esse. Non ta-
men si quid durum est, idem statim & siccum erit. Etenim inseparabile a sicco corpore
durities est, non tamen eius vnus propria. Nam & quod a frigore concretum est, durum
cernitur, sicut glacies, siccum tamē non est. Vnde non statim sicci humidique adeunda;
in rebus maxime externis, discretio est, ante scilicet, quam æstimatum sit, quem-
admodum in calore & frigore se habeant. Neque enim si quid cum summo frigo-
re, repræsentatur durum, id etiam siccum est. Nec si quid cum vehementi calo-
re est molle, idem statim est humidum. Cera enim vehementer calefacta, mol-
lis, ac liquida est, non tamen humida. Verum quum mediocriter est calidum, tum
E æstimare, durumne an molle sit, oportet. Si enim molle sit, humidum est, sin du-
rum, siccum. Quod autem asperitas, læuitas, tenuitas, crassities, densitas, & rari-
tas ad temperamentorum, ac medicamentorum facultatum dignotionem condu-
cant, *libr. 2. de temperamentis, & in libris de simplicium medicamento facultatibus*, abunde
Galenus docuit. Quare hos libros, unde harum rerum omnium cognitio petenda
venit, studiosi adeant. Neque enim instituti nostri ratio fert, vt singula hæc vbe-
rius attingamus. Vnice autem ad temperamentorum totius corporis, & principum
eiusdem partium conferunt, quæ Galenus in *arte medica* a cap. 13. usque ad 67. tradit.

DE HUMORIBVS. SECT. IV.

De humorum numero. CAP. I.

F



HYLVS, succusue, qui iam confectus e ventriculo per mesenterii venas, ^{Humores}
vt suo susius dicemus loco, in iecur traducitur, non prorsus ex vna eadem- ^{quatuor.}
que substantia constat, nec simili caloris, & frigoris mensura tenetur.
Quapropter in iecore non potest in vnus, ac simplicis humoris specie co-

Elementa
animar-
tium san-
guine præ-
ditorum.

Sanguis
purus &
syncerus
nusquam
in venis
reperitur.
Quatuor
humorū
in sangui-
ne pro-
portio.

Sanguinis
appellatio
ne, quid
veniat.
Sanguinis
quatuor
partes.

In musto
quatuor
substantiæ.
Fæc.
Flos vini.
Vinum.
Quatuor
humorū
procrea-
tio & se-
cretio.

Sanguis
in venis
purus ge-
minus.

uerti, sed necessario quatuor inde nascuntur humorum differentiarum, qui tum substantiarum A
tum qualitatibus ratione, primorum elementorum naturas quodam modo imitantur.
Hinc eos Galenus *libro secund. de elementis*, animantium sanguine præditorum elemen-
ta nominat. Sunt autem hi humores numero quatuor, sanguis nimirum, pituita, bilis
flaua, & atra, vel rectius melancholicus, vel niger humor, quod scilicet atra bilis nondum sit,
sed ei vicinus, naturamque illius statim subiturus. Flauam autem bilem allicit, & in se
recondit propria vesicula, atram lien, quemadmodum renes humorem eum, qui aquæ
speciem gerit, atque hoc pacto ab eorum sordibus & squalore sanguis expurgatur, pu-
rusque & integer redditur: Pituita autem cum sanguine manet, eique permiscetur, con-
coctioneque, *ut infra latius dicemus*, in sanguinem mutatur. Ceterum non usque adeo
diligenter potest sanguis a bile tum flaua, tum atra expurgari, & quasi elui, quin pro- B
pterea vtriusque non nihil derelictum sit, quo, sicuti & pituita, is perfunditur. Itaque
sanguis, qui e iecore ortus est, maioribusque venis concluditur, exquisitè vnus & purus
esse non potest, sed ex pituitæ, bilis vtriusque, & puri sanguinis permixtione conflatus.
Atque hos etiam succos ex omnium consensione vsque dicendi, sanguinis appellatione
designamus. Vt bilis in venis non sit, nisi sanguinis tenuissima & calidissima pars. Pituita
vero altera sanguinis crudior pars, quæ frigida & humida est. Melancholicus autem suc-
cus crassior ea, quæ frigida & sicca est. Sola vero ea, quæ tum substantiæ, tum qualitatibus
mediocritate quadam continetur, *sanguinis puri* appellatione notatur. Hinc est, quod
rectissime Galenus *in libello de plenitudine* scriptum reliquerit, immixtum & ab aliis hu-
moribus syncerum sanguinem nusquam in venis comprehendi. Igitur qui intra venas C
coercetur sanguis, quatuor iam dictis humoribus perfunditur, sed ea proportionem, ut in
temperata & mediocri constitutione purus sanguis multum antecellat, ceterisque præ-
stet: ab hoc dein pituita, quia dulcis est, potestque in sanguinem conuertere, abundat. Ter-
tio loco est melancholicus succus: omnium autem paucissima est flaua bilis, quod ad
corpus alendum sit superuacanea. Quod autem Melancholicus succus bilem exsuperet,
hinc maxime liquet, quod illius quam bilis receptaculum capacius & plenius in nobis
sit. Præterea, quod ex vena secta sanguis si asserueretur, plus subsideat lutulenti, quam
per summum innater biliosi. Nec est cur absurdum alicui videatur, sanguinem ex tot
conflari partibus, seu in vnâ substantiam quatuor conuenire partes. Nam id ipsum in
lacte, musto, & aliis quoque succis liquido conspicitur. Atque, ut de reliquis taceamus, D
in musto certe est aliud, quod grauissimum existit, aliud quod leuissimum, aliud ter-
tium quod toti musto permixtum est, in eoque feruet, ad hæc quartum, ipsum videli-
cet purissimum ac syncerissimum, cuius reliqua tria excrementa existunt. Quippe
posteaquam mustum recens ab vniuerso expressum coniectumque in dolia fuerit, ab inna-
to sibi calore effervesceat, mutatur, ac coquitur, tumque excrementa, quæ prius quidem
confusa inerant, comparere incipiunt, atque cum primum concoctionis vi secernun-
tur & secedunt: alterum quidem grauius magisque terrenum, quod in fundo subsidens
fæcem appellant: alterum leuius, magisque æereum, quod per summa innatat, & flos vi-
ni dicitur. Porro vbi mustum a fæcibus & spuma fuerit expurgatum, tamen crudis ad-
huc partibus visum effugientibus perfusum est, quas tandem aliquot dierum numero E
vini calor euincit & concoquit, tumque syncerum & purum, quod remanet, vinum
nominatur. Simili profecto ratione chylus in iecur transfusus, cum humidus quidam
liquor sit, quodam modo feruet & concoquitur, tandemque in eo non nihil crassum
existit fæci respondens, non nihil etiam tenue & leue flori consimile, hoc bilem fla-
uam, illud melancholicum humorem appellamus. Hæc itaque quia superuacanea, &
ad corpus alendum minus sunt idonea, idcirco sanguini puro corporis alimento illa
permisceri par non erat. Quamobrè natura illa segregas, flauam bilē in propriam vesicu-
lā ad iecoris portam constitutam, melancholicū vero succum in lienem reponit. Vtra-
que autem bile secreta, crudus quidam humor ei confusus permiscetur, qui est quasi
dimidio coctum alimentum, quod manens cum sanguine vna rapitur in venas, ut per F
inedias, & cibi penuriam tempore mutetur, & in regre coquatur, fiatque sanguis com-
modus, & salutaris, purusque. *Ut* hinc omnibus palam fiat, sanguinem purum in venis
esse geminum. *Vnum*, qui a prædictis excrementis purgatus est. *Alterum*, qui sanguinis
hoc modo expurgati purior est portio.

EX iam dictis facile humorum temperamenta colliguntur. Quippe sanguinem, Equum substantia & qualitatibus mediocris sit, *temperatum* statuere oportet. Id quod etiam Galenus confirmat, qui in *Commento 36. libri primi Hippocratis de natura humana*, ita scriptum reliquit: Καὶ ὁμοῦν ὅτι καὶ αἷμα κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, ὃ θερμὸν καὶ ὑγρὸν ἀλλ' οὐ κερνόν, id est: *Atque constat, eadem etiam ratione sanguinem non calidum & humidum esse, sed temperatum.* Et clarius *Com. 39. eiusdem libri* in hunc modum scribens: Αὐτὸ δὲ τὸ αἷμα τὸ δοκοῦν ἐκρετότατον, λέγεται τοῖσιν, ὅτι μὴδὲν ἐκρετὰ μάλιστ' ἐν αὐτῷ τῶν ἐναντίων ἀλλήλοις, μήτε τὸ θερμὸν ὃ ψυχρῷ, μήτε τὸ ψυχρὸν ὃ θερμῷ, μήτε τὸ ὑγρὸν ὃ ξηρῷ, μήτε τὸ ξηρὸν ὃ ὑγρῷ. ἐπεὶ τοίνυν δέεται καὶ τὸ αἷμα αὐτὸ τῶν τετραῶν ποιότητων, ὑγρῷ, καὶ ξηρῷ, καὶ θερμῷ, καὶ ψυχρῷ, οὐδὲν ὅτι καὶ τῆς τῶν ἄλλων δέσεται μέγιστον· καὶ διὰ τὸ τὸ ἐκρετότατον αἷμα μετίζει τὸ καὶ φλέγμα καὶ χολήν ξανθὴν, καὶ μελάνην. Hoc est, *Sanguis ille, qui videtur temperatissimus, talis dicitur, quod in ipso nullum contrariorum aliis magnopere praeceat, neque calidum frigido, neque frigidum calido, neque humidum sicco, nec siccum humido.* Posteaquam itaque & ipse sanguis indiget quatuor qualitatibus, humiditate, siccitate, calore & frigore, manifestum est, quod & cum reliquis humoribus misceri postulet. Quo fit, ut temperatissimus quoque sanguis sit pituita, flava, & nigra bilis particeps.

Huc accedit, quod libro 2. de facultatibus naturalibus, sanguinem ex mediocri ac temperato calore, reliquos autem humores ex immodico procreari scribat Galenus. Qui sane Galeni locus non aliter intelligendus venit, quam quod in eo corpore, quod mediocri calore praeeditum est, sanguinis pars purior, in eo autem, in quo calor redundat, utraque bilis, in eo vero, in quo frigus exsuperat, pituita generetur. Quippe per sanguinem intelligit puriorem eius partem, qua mediocritate, tum substantia, tum qualitatibus continetur. Per bilem autem, tenuissimam vel crassissimam eiusdem partem, ut per pituitam, crudiores, ut fere id dicere voluerit Galenus, mediocrem calorem puriorem sanguinis partem procreare, reliquas autem duas partes, tenuissimam nimirum & crassissimam, ab immodico generari calore. Crudiores autem eiusdem partem a frigore exsuperante.

Nemo enim ambigere debet, quin ab aestu, exercitio, balneis, in summa ac calidiorum caussarum vehementi occurratone pars sanguinis tenuissima, adeoque flava intra venas bilis, quemadmodum etiam reliquae eiusdem partes persistente similibus caussarum impetu, procreentur. Quod Galenus loco citato iis confirmat verbis, quae a paulo ante productis mox subiicit inquit: Quando & ciborum qui natura calidiores magis sunt biliosi: qui frigidiores, magis pituitosi. Simili modo ex atatibus, quae calidiores natura sunt, has biliosiores esse constat: qui frigidiores, pituita magis obnoxias. Iam vita rationum, & regionum, & anni temporum, multaque priores his ipsarum quoque naturam, quae frigidiores sunt, ea magis cernuntur pituitosa: quae calidiores magis biliosa. Haec ille.

Quae utique manifeste docent, Galenum non aliud sentire, quam quod a mediocri calore in humano corpore plus sanguinis: ab immodico contra, plus utriusque bilis gignatur. Atque hinc est, quod ab vno eodemque alimento in diuersis corporibus, diuersi nascentur humores, quod mellis exemplo ibidem Galenus demonstrat. Hoc namque in eo, qui natura calidior est, & aetate florens, vitamque laboriosam degit, totum in flauam bilem seu leuiorem sanguinis partem vertitur. Contra in senibus, non in bilem, sed in sanguinem, hoc est, puriorem sanguinis partem, mutatur. Ut hinc omnibus palam fiat, ex caloris vi in humorum, & partium sanguinis ex alimentis procreatione varietatis plurimum afferri. Sed redeundum nobis ad institutum erit. Sanguinem esse temperatum hinc etiam pater. Quippe Galenus libr. 2. de Temper. capite quarto, sanguinem humorum optimum maxime, & proprium esse scribit. Si optimus est, igitur temperatus sit oportet: Optimus enim in corpore humano humor nullus esse potest, nisi idem in qualitatibus quatuor mediocri, adeoque temperatus sit: Proinde cum sanguis sit temperatus, errare plurimum necesse est, Medicos, qui hunc calidum & humidum esse affirmant. Nam si horum opinio constabit, fandum erit sanguineum, quod ipsi appellant temperamentum, non optimum, sed omnium fere pessimum esse. Quippe corporis temperamentum, in quo calidum praevalet frigido, & humidum sicco, in utraque oppositione intemperatum est,

Sanguis temperatus.

Galenus idem explicatus.

Sanguis non est calidus & humidus.

tantum abest, vt temperatum dici debeat, aut possit. Hinc est, quod omnium intem- A
perierum (vt libro 8. Ther. method. cap. 7. etiam attestatur Galenus) putredinis morbis maxi-
me exposita sit, propterea, quod per ipsam sanitatem proxime ad putredinem accedat,
veluti tum ex sudoribus conicere est, qui iis grauiter olent, tum vero ex vrinis, deie-
ctione, atque etiam ipsa expiratione. Etenim qualis est hircorum, talis est etiam illa-
rum naturarum temperies. Ideoque prompta est ex qualibet occasione tum aliis mor-
bis, tum vero febribus corripi. Accedit, quod hoc temperamentum, quemadmodum libr. B
5. de tuenda sanit. cap. ultimo, testatur Galenus, fluxionum vitiis maxime obnoxium sit. Idem
quoque libr. 6. eiusdem operis cap. 4. naturas calidas & humiditas in ætate puerili fluxionum
& plenitudinis morbis maxime tentari tradit, itemq; putredinis. Proinde vt omnium
aeris temperamentorum pessimum, id est, quod calidum & humidum existit, vt libr. B
1. de tempe. cap. 4. demonstrat Galenus: ita etiam humani corporis temperamentum, quod
eiusmodi est, pessimum sit, necesse est. Quod si itaque sanguineum temperamentum
optimum est, vt reuera est, consequitur sanguinem non esse calidum & humidum, sed
potius temperatum. Atqui hic sciulus quispiam statim nobis Hippocratis & Galeni au-
thoritatem opponet, quorum vterque sanguinem esse calidum & humidum, hic qui-
dem in libro 1. de temperamentis, ille in libro de humana natura, diserte scriptum reliquit. Cui
vicissim id reponimus, verum vtrique esse, quod Hippocrates sanguinem appellet ca-
lidum & humidum, sed qua id ipsum faciat ratione, diligenter considerandum erit.
Non autem alia haud dubie ratione, Galeno etiam com. 36. libri de natura humana Primi,
teste, quam qua Ver calidum & humidum esse ait, nempe non absolute, sed collatione C
ad aliud tempus, Autumnum scilicet. Per se enim, & ex sua natura æstimarum, tempera-
tum est, vt supra monstrauius. Sanguinem igitur collatione cum ceteris humoribus ca-
lidum & humidum esse. Hippocrates recte statuit: pituita enim calidior, bile vero hu-
midior. Pari modo Galenus quoque sanguinem conferendo ad ea, quæ maiorem frigi-
di portionem contraxerunt, pituitam scilicet, calidum esse inquit: collatione vero ad
ea quæ maiorem siccæ portionem sortita sunt, ossa verbi gratia, cartilaginem, & id ge-
nus alia, humidum. Verum instabit rursus alius hoc modo: Galenus sanguinem non solum
calidum, sed & in corpore calidissimum libr. 1. de tempera. capite ult. asserit, tantum abest, vt illum
temperatum dicere possis. Respondeo, Galenum hoc loco non loqui de sanguine per se æ-
stimato, sed cum cute collato. Huius enim respectu calidissimus est inter ea, quæ simul D
sunt humida, sanguis. Præterea non loquitur Galenus ibidem de eo sanguine, qui alie-
no calore vacat, sed eo potius, qui est a corde plurimum calefactus: id quod ex eiusdem
verbis, quæ deinceps sequuntur fit euidentissimum. Ita enim paulo post ait: Sanguis vero
ipse a corde suum accipit calorem. Quod etiam confirmat Hippocrates, qui in fine libri de cor-
de sanguinem non esse natura calidum, sed calefieri diserte scribit. Proinde sanguinis
temperamentum non posset commodius æstimari, quam in iis, quæ corde essent desti-
tuta, animantibus, in illis enim temperato plane calore præditus esset. Quod in libro de
foetus formatione, iis etiam verbis innuere voluit Galenus: Nullum, inquit, animal ex san-
gue est manifeste calidum, neque manifestum calidum ex sanguine. Nam sanguini, qui in venis est, abs-
que cordis calore tepida quedam caliditas insit a est, & propterea etiam in iecore. Cor vero quasi quen-
dam ignis focum animalia sortita sunt. Sine corde enim animalium calor per similes est calori, qui a-
statis tempore in domibus sentitur. Sed quemadmodum domus incenso in ipso igne calidior reddi-
tur, ita & animalium corpus e corde calorem maiorem acquirit, quam is sit, qui venis & iecori insitus
est, & sanguini videlicet in ipsis contento. Hec ille. Proinde vt sanguis per se æstimatus, prout
in iecore & venis est, non a corde calefactus, temperatus est & dicitur, ita ille qui a cor-
de calorem nactus est inter corporis partes, quæ simul humidæ sunt, calidissimus exsi-
stit. Atque iam facile etiam diluuntur alia quedam Galeni loca, in quibus ille flauam bi-
lem sanguine calidiorem esse affirmat: quorum sane vnus est in lib. 2. de temp. cap. 4. vbi
non obicuriis verbis sanguinem, flaua bile longe calidiorem esse ait. Alter in capit. 5. li-
bri de inæquali intemperie, vbi ita scriptum reliquit: Calidissima natura merito flaua est bilis, at
frigidissima pituita: Reliquorum humorum sanguis, post flauam bilem maxime est calidus, sicut a-
tra post pituitam est frigida. Tertius in libro 1. ad Glauconem de tertiana exquisita curatione, vbi
flauæ bilis humorem inter omnes, qui in corpore sunt, de quibus Galenus & Eneator, id est, calidif-
simum & siccissimum esse tradit. Nam in libr. 1. de temperamentis de sanguine non per se æsti-
mato

Obiectio
prima.
Responsio

Obiectio
altera.
Responsio

Sanguis
calorem
suum a
corde ac-
cipit.

Obiectio
tertia.

Amato, sed cum cute collato loquitur, ibidemque quæ hac ratione in corpore humano sunt humidissima simul & frigidissima, calidissima simul & humida, siccissima simul & frigidissima inquirat. Quæ utique ratione rectissime pituitam humidissimam & frigidissimam in corpore esse ait. Nihil enim, *ut dictum est*, in humano corpore hac frigidius simul & humidius est. Pilum vero siccissimum & frigidissimum statuit. Nihil enim hoc siccius simul atque frigidius est. Sanguinem autem, a corde nimirum calidissimum, quod scilicet eo in corpore nihil, quod simul humidum sit, calidius existat. Est quidem eo calidior flava bilis, atque ea etiam sicca, non humida simul est. Et cum in utrisque sequentibus locis, secundo nimirum & tertio, inter se humores quatuor conferat, exque horum collatione eorundem temperamenta colligat, merito flavam bilem calidissimam & siccissimam esse inquit. Quippe in ea maior calidi portio est, quam in omnibus aliis humoribus. Ceterum est etiam cor sanguine calidius, utpote id, a quo sanguis suum mutuatur calorem, sed simul etiam sanguinis potissimum collatione, siccum. Id quod Galenus quoque confirmat, qui in *libr. 2. de tempera. cap. 4.* in hunc scribit modum. *Iam, inquit, cordis caro omnibus his carnibus, nimirum lienis, renum, & iecoris, tanto est siccior, quanto est durior. Calidior vero non modo his, sed etiam omnibus plane corporis particulis. Quod etiam sensu clare deprehendas licet in thoracis animalis dissectione, si digitum in sinistrum eius sinum immiseris. Inuenies enim locum hunc omnium, quæ in animali sunt, non paulo calidiorum.* Ex his igitur omnibus, quæ diximus, abunde patere arbitramur, sanguinem per se & ex sua natura æstimatum, quod certe in disquirendis temperamentis fieri debet, esse temperatum, minime vero calidum & humidum. Hæc fusius a nobis tractata sunt nulla alia de causa, quam quod a nemine alio, quod sciam, sanguinis temperamentum recte sit explicatum, cum in vniuersum, omnes iam multis annis receptam sequantur opinionem. De reliquorum humorum temperamentis nulla est inter medicos recentiores dissensio: imo omnes vno ore fatentur pituitam esse frigidam & humidam: bilem flavam calidam, & siccam: atram vero vel melancholicum humorem, frigidum & siccum. Ut errare necesse sit eos, qui Prodicum in Opere suo de natura humana sequentes, *φλέγμα* (sic enim Græci pituitam vocant) a verbo *πυρρῶδες*, quod *ustum*, ac *supra modum coctum* esse significat, dictum esse arbitrantur. Siquidem ignorant illi Græcis auctoribus *φλέγμα* duo significare, nempe *φλέγμα*, id est, *ustionem*, & *humorem illum natura frigidum ac humidum*, quem Latini *pituitam* appellant. Animaduertendum autem, quum humores hos calidos, frigidos, humidos, sicciosue dicimus, tales esse non nisi potestate dicimus. Quippe dissidet id, quod actu & secundum, ut ita dicam, apparentiam tale est, ab eo, quod potentia, seu facultate eiusmodi existit. Actu enim est, quod iam præsens est. Potestate autem, quod adhuc futurum est, atque ut fiat, quod dicitur, veluti habile, non tamen adhuc subsistens. Hæc utique ratione flavam bilem siccam appellamus, quantumvis aspectu humida sit. Potestate autem flavam bilem esse calidam & siccam, indicio est, quod ubi plurima in ventriculo continetur, perperua siti infestamur. Contra si hæc euomitur, protinus a siti magis vindicamur, quam si plurimam haussemus portionem. Si tim autem a calore & siccitate provenire, notius est, quam ut multis a me ostendi debeat. Id ipsum etiam *libr. 1. de simplic. medicamen. facult. cap. 30.* Galenus copiose docet. Pari ratione aquam marinam, non obstante, quod humida, prout apparet, existat, siccam esse affirmamus, quod nimirum potestate talis sit: siquidem carnes siccant, & incorruptas seruat. Sic atram quoque bilem, non obstante, quod actu humida sit: neque enim in humorum censum veniret, nisi talis esset: siccam potestate esse adstruimus. Verum hæc ex libris Galeni de simplicibus abunde patere omnibus arbitramur.

Pituita
tempera-
mentum.
Bilis fla-
ua.
Atram.
Humores
quomodo
calidi, fri-
gidi, humi-
di, & sicc-
i dicuntur.
φλέγμα.

Actu esse.
Potestate
esse.
Flava bi-
lis potesta-
te calida
& sicca.
Sitis caus-
sa.

Aqua ma-
rina sicca
est.

*De secundis quatuor humorum naturalium qualitatibus, ac sedi-
bus. CAP. III.*

FActenus de primis qualitatibus, quæ quatuor humoribus insunt, abunde dictum est. Nunc de illis quæ has sequuntur, adeoque secundæ nominantur, nobis dis-
cendum erit. Sanguini itaque, ut etiam Galeni in libello *de crasso* inscripto est sen-
tentia, dulcedo inest. Nam quum a moderato calore, *ut libr. 4. de simplicium medi-*

Secundæ
humorū
qualita-
tes.
Sanguis
dulcis.

ca. facul. cap. 10. idem Galenus attestatur, cuique corpori dulcedo proueniat, sanguisque ut
 A
 præcedenti capite demonstratum est, temperatus sit, ut idem quoque dulcis sit, neces-
 se est. Dulcem autem esse gustus quoque confirmat. Quum igitur dulcedo non nisi a mo-
 derato calore procreetur, illaque sanguini liquido insit, consequitur etiam illum esse
 temperatum. Pituita profecto naturalis qualitatis omnis secundæ, ut aqua, expers ad-
 eoque insipida est. Neque enim dulcedinem, neque amaritatem, neque acrimoniam,
 neque aciditatem præ se fert. Cum enim omnium, quæ in corpore sunt, frigidissima,
 adeoque minimum concocta & humidissima sit pituita, fieri non potest, ut aliquis iam
 dictorum saporum illi insit, quod horum nullus ab admodum frigida qualitate pro-
 creari possit. Ut errare maiorem in modum omnibus constet eos, qui pituitam natu-
 ralem dulcem esse affirmant. Porro flaua bilis, amara est, idque sane merito, quod cali-
 B
 da admodum sit, quippe amarus sapor, quod multis argumentis *libr. 4. simpli. cap. 16. &*
19. Galenus demonstrat, calidis & siccis corporibus inest. Atra bilis naturalis, qui me-
 lancholicus, vel niger humor proprie dicitur, acerba est: siquidem sapor acerbus, non
 nisi in terreis & frigidis, qualis certe, *ut e præcedentibus patet, atra bilis est, ut idem Galenus*
eodem in loco cap. 7. testis est, reperitur. Ceterum quæ diximus, ad humores naturales vo-
 catos referenda sunt. Sic autem medici appellant eos, *qui sunt in animali, quod secundum*
naturam se habet, adeoque illos qui suas iamque expositas qualitates seruant. Hi certe omnes, v-
 no duntaxat excepto, sua in quibus continentur in corpore loca obtinent. Sanguinis
 C
 enim locus venæ sunt & arteriæ. In iis namque vasis sanguis naturaliter continetur, &
 in totum distribuitur corpus. Non solum vero in venis, sed etiam in arteriis, contineri
 sanguinem, Galenus in eo libello, cui titulum fecit, *an sanguis natura in arteriis contineatur,*
aduersus Erasistratum & eius sectatores luculenter admodum demonstrauit. Distat tamen
 nonnihil sanguis, qui in arteriis est, ab eo, qui in venis habetur, *ut idem Galenus libr. 1. de*
laborantibus locis cap. 1. & libr. 6. de Hippocratis & Platonis placitis confirmat. Quippe sanguis
 venarum colore ruber est. Arteriarum vero, utpote calidior, tenuis subtilisque, flauior
 existit. Quanquam autem sanguis purus, & syncerus, *ut in superioribus ostensum est, & in*
lib. de plenitudine, & multis aliis locis attestatur Galenus, nusquam in venis reperitur, sed sem-
 per pituitam, ac geminas biles sibi commistas habet: tamen quia is plurimus est, alii au-
 tem humores eo pauciores, ideo solus, tanquam is qui reliquos copia superat ex omni-
 bus ex venis apparet. Porro generationi sanguinis, seu, ut ita dicam, sanguificationis of-
 D
 ficina, & instrumentum, iecur est, *quemadmodum id ipsum Galenus libr. 3. de usu par. corpo. hu-*
mani. & libr. 6. de placitis Hippo. & Platonis copiose demonstrat. Pituitæ, quæ in prima ciborum
 mutatione, *Galeno Comm. 39. lib. de natura humana teste,* generatur, ac colore alba existit,
 concoctioneque in sanguinem mutatur, expurgandæ natura nullum proprium instru-
 mentum machinata est, quod segregari a sanguine, excludique non deberet. Est enim
 veluti dimidio coctum alimentum, quod manens cum sanguine vna rapitur in venas,
 ut per inedias, & cibi penuriam, tempore mutetur, & integre coquatur, coctumque iam
 sanguis euadat. Desiderat itaque talis humor non vacuari, sed in corpore manens alte-
 rari. Quicquid vero pituitæ in intestinis relinquitur, a bile ex iecore in ea defluen-
 te abstersum, commodissime ac celerrime per sedem eiicitur, *quemadmodum lib. 5. de usu*
par. corpo. humani fusius Galenus ostendit. Porro excrementum, quod a cerebro destillat, & e
 naribus manat, *veluti idem Galenus libro 2. de naturalibus facul. cap. ultimo attestatur,* proprie
 non appellatur pituita, sed Græce *πύμα καὶ κόρυζα*, Latine *mucus*. Flauæ pallidæue bili, quæ
 E
 excrementum est, quæ a colore eius qui flauus pallidusue est, appellationem hanc acce-
 pit. Græcisque simpliciter *χολή* dicitur, natura propriam sedem destinauit vesicam, quæ
 iecori subest. Hæc enim bilem in iecore natam, ibidemque sanguini mistam proprio
 ductu & via, quæ ex iecore in se pertinet, attrahit, eamque synceram quidem, nec alio
 quopiam humore adulteratam, tum quod viæ meatusue angustia crassiorem illabi non
 finit, tum quod eiusmodi attractio maxime ex humoris familiaritate, & conuenientia
 incitetur. Et quanquam hic humor mordax est, & acris, vesiculæ tamen proprioque re-
 F
 ceptaculo tristis aut infestus minime existit, sed ob mutuam cognationem iucundus &
 amicus, ex quo illa voluptatem & iucunditatis sensum aliquem percipit. Ceterum, eo
 haud quaquam alitur, quod vsquequaque amarus sit, nullo benigno succo perfusus, sed
 sanguine, quem per venam conspicuam ex iecoris porta in suam ipsius ceruicem inser-
 tam

Pituita
qualitatis
omnis se-
cundæ ex-
pers est.

Flaua bilis
amara.
Atra bilis
acerba est.

Naturales
humores
qui.

Sanguinis
locus.

Differt
sanguis ve-
narum non-
nihil a
sanguine
arteriarum.
Cur solus
sanguis in
venis ap-
pareat.
Iecur ge-
neratio-
nis sangui-
nis officina.
Pituitæ re-
ponendæ
nullus a
natura in
corpore
destinatus
locus.

Mucus.
Flauæ bilis
sedes.
Ut flaua
bilis in ve-
siculam
trahatur.

Vesicula a
sanguine
alitur.

A tam suscipit. Necessarium autem fuit, ut a bile sanguis purgaretur, ne scilicet vniuersi corporis color, perinde atque in iis accidit, qui ictero laborant, ab ea inficeretur contaminareturque. Atra bilis naturalis, vel, *ut cum Galeno sect. 6. Aphor. Comm. 53. exquisitius loquamur*, melancholici humoris, qui est veluti fax & sedimentum sanguinis, adeoque niger, sedes ac receptaculum, lien est. Is enim parte sua concava venam habet a iecoris porta allatam, qua ille a crasso melancholicoque humore iecur expurgat. Hunc enim insita facultate, qua sibi gratus est, & suavis, attrahit, & in se recondit per venarum tenuitates diffundens, & dein assidua opera summaque administratione hunc elaborat, & in tenuiorem quoad licet succum commutat, vbi in illius venis & arteriis elaboratus fuerit, non vniuersus, neque crassior eius pars, sed tenuior duntaxat lienis fit alimentum, & in eius carnem sensim illabitur. Id autem quamuis tenue sit, nequaquam tamen rubrum est, sed subnigrum, lienis colore. Ceterum necesse admodum fuit, ut lien ad se melancholicum humorem alliceret: nisi enim ab eo expurgaretur iecur, inde impurius sanguis, totumque corpus decolor magis redderetur.

Atra bilis naturalis seu melancholici humoris sedes.

Quis quatuor humorum naturalium usus, & motus: quaque eorundem sequantur temperamenta. CAP. IV.

EX iam dictis facile quis sit praedictorum quatuor humorum in corpore animantis usus, quique eorundem temperamenta sequantur in eodem effectus cognoscetur.

C Nam sanguinis in corpore usus est, ut nutriat; ex eo enim omnes corporis particulae nutriuntur, nonnullae quidem exigua interueniente alteratione, ut carnosae, aliae vero, veluti ossa, non nisi multa intercedente mutatione. Verum sunt, qui ventriculum ex sanguine nutriri haud concedunt, *ut qui hunc potius ex chylo, succone illo, qui ex cibo, quem is concepit, procreatus est, nutriri contendunt, quandoquidem ille famem & cibi appetentiam sedet, quod certe non posset, nisi ventriculum pasceret ac nutriret.* Sed hanc obiectionem pulchre diluit Galenus lib. 4. de usu partium, vbi scribit, ad perfectam ventriculi & intestinorum nutritionem, toti mesenterio & omento naturam plures intexuisse venas nutriendis illis dicatas, haudquam ab eis traicientes ad iecur. Quanquam reficiuntur etiam interdum ea cremore illo, quem ex cibis conficiunt: necnon in longiori inedia, per quas venas prius distributio ad iecur facta est, per easdem rursus aliquando sanguis benignus ad eorum nutritionem retrahitur. Vnde omnibus certe perspicuum fit, refectionem eam, quam ex cremore e cibis profecto capeffit ventriculus, veram nutritionem non esse, nec appellari a Galeno, sed potius oblectationem quandam & satietatem nutritionis æmulam. Quippe quod in cremore longe optimum habetur & congruens; id ad se rapit ventriculus, inque suas tunicas sugendo recondit, ex quo fructum voluptatemque, perinde atque vesicula iecori substrata ex bile, percipit, & quodammodo reficitur. Verum quum cremor ille vacua tunicarum spatia referciens, in vaporem fusus & extenuatus, ad extremum evanescit, isque sua qualitate conuenienti, cognata ac familiari potius quam substantia animalem appetentiam, nequaquam autem naturalem depellat, quæ ex eo fit refectio, nutritio proprie dici non potest. Nam naturalem appetentiam, quæ vacuum & dissipationem partium sequitur, vna duntaxat sanguinis substantia per ventriculi corpus & molem effusa, dum in eius naturam conuertitur mutaturque, satiare potest. Animalem vero non modo sanguis, sed & quicquid qualitatis cuiusdam suauitatis, cognitioneue, & conuenientia praeditum in ventriculum ingeritur, compescit. Ceterum nemini absurdum videri debet aliquid voluptatem e re quadam capere, non tamen inde nutriri. Nam simile est, quod accidit iis, qui æstiuo tempore se in aqua frigida lauant. Quippe illi non leuem ex ista lauatione voluptatem sentiunt, ac qualitatis frigidae suauitate mirum in modum delectantur, non tamen nutriuntur. Porro sanguinis in humano corpore abundantia temperaturaque efficit moderatos, ridibundos, blandos, venustos, ac floridos. Quum enim sanguis temperatus sit, ut hæc omnia eius temperamenta sequantur necesse est. Ceterum pituitæ usus est, ut quod eius in ventriculo generatur, ac cum humoribus, qui ex cibo & potu in iecur distribuuntur, perfertur, Galeno in libello de atra bile astipulante, dum cum iis una concoquitur, sanguis euadat:

Sanguinis usus.

Ventriculum, sanguine vere nutrir.

Ventriculus cremoris benignitate fruatur atque oblectatur.

Ingestus cibis animalem, sed non naturalem appetentiam sedat.

Sanguinis temperatura quid in corpore efficiat humano. Pituitæ usus.

Hæc utique *segnes, somnolentos, carnosos, obesosue, ac cito canescentes facit*. Neque enim alios pituita, cum frigidus admodum humor sit, efficere potest. Ita, ut *rectissime Galenus commen. 49. libri de natura humana*, dixerit, *ad mores fingendos nihil conducere pituitam*. Segnes enim sunt perpetuo pituitosi, adeoque ad nulla officia, somno excepto idonei sunt. Flauæ bilis vsus, ut intestina a pituitosis excrementis repurget & abstergat, atque eorundem excretionem adiuuet. Defertur autem hæc ipsa ad intestina per meatum duodeno insertum. Atque is meatus, per quem iecur bilem in ventrem, adeoque intestina euomit, magna ex parte, *Galeno etiam attestante, lib. 2. de temper. ca. 8. & lib. 3. de usu par. corpo. humani*, vnicus est, in nonnullis, iisque paucissimis, geminus. Et ubi geminus est, maior in duodenum, minor in ventriculi fundum paulo supra ianitorem inseritur. Bilis vero iracundos, celeris ingenii, vel, ut *Galenus commen. 39. libri de natura humana scribit*, dexterritate animi, & prudentia præditos, agiles, leues mente, macilentos, & cibum confestim concoquentes. Atque hinc est, quod naturæ biliosæ cibos concoctu difficiles, verbi gratia, bubulas carnes, melius quam concoctu faciles, saxatiles nimirum pisces, conficere valeant. Cum enim ipsis calor acris & mordax insit, par est, ut isti cibos concoctu difficiles, melius quam eos, qui facile coquantur, vincant. Quod enim facile concoquitur, facile item alteratur & corrumpitur. Contra quod difficile concoquitur, difficulter quoque tum alteratur, tum corrumpitur. Pisces itaque saxatiles alteratu faciles, in biliosis calidisque admodum ventriculis necesse est corrumpi. Bubulas vero carnes, ut pote alteratu difficiles, non corrumpi, sed potius concœqui, quod *Galenus etiam cap. 1. libri primi de alimentorum facultatibus docet*. Melancholici humoris portio, quæ lienis vi confici ac elaborari nequit, proprio ductu in ventriculum eructando eiicitur, *Galeno etiam lib. 5. de usu part. corpo. human. attestante*, ut illius actiones iuuat, firmioresque ac validiores efficiat. Nam quum hæc sit acerba & acida, ventriculum certe intendit, constringit, & in seipsum contrahit, atque exquisitè comprehendere cibos, ac retinere, quod plane concoquantur, cogit. In ventriculi itaque capacitatem hoc modo eructata, hinc tandem in intestina relabitur, ac vna cum reliquis excrementis foras propulsatur. Vt hinc palam fiat omnibus, Auicennam aliosque nonnullos eius viri placita mordicus tenentes, plurimum hallucinari, dum non alia de causa melancholicum humorem in ventriculum euomi tradunt, quam ut famem ac naturalem appetentiam exciter. Quam enim hoc sit falsum, & a dissectionis ratione abhorreat, alibi, nempe *libro sexto Epidem. sectio. sexta Commento primo, & lib. 1. de symptom. causis, cap. 7.* copiosissime demonstraui-
mus, ut necesse non sit hoc loco multis referre. Porro melancholicus humor, *Galeno quoque Commenta. 39. libri Hippocratis de natura humana teste*, constantes, firmos, auaros, morosos, tetricos, tristes, inuidos, & timidos reddit. Quorum omnium causas, eius humoris natura satis perspecta, indicat. Non prætereundum silentio erit, quod de motu quatuor humorum naturalium Soranus Ephesius medicus scriptum reliquit: *Humorum, inquit, suis temporibus in corpore dominantur, nempe sanguis ab hora noctis nona, usque ad horam diei tertiam: bilis flaua ab hora diei tertia, usque in horam nonam diei: bilis nigra ab hora noctis tertia, usque ad horam noctis nonam: Pituita ab hora noctis tertia usque ad horam noctis nonam*. Hæc ille. Atque hanc rationem motus humorum *Galenus quoque lib. 12. Ther. method. c. 5.* probare videtur, quum accessiones ex crudis humoribus excitatas, præcipue ad vesperam, & noctu, non mane, nec usque ad meridiem incidere scribat.

De quatuor humorum non naturalium differentiis. C A P. V.

PRædicti quatuor humores haudquaquam eandem seruant formam seu speciem, *Galeno etiam libro secundo de libr. de natur. facult. astipulante*, quum animal præter naturam afficitur, qualem quum secundum naturam se habent, ac sana sunt, obtinent. Siquidem quum præter naturam afficitur animans, humores naturales suas qualitates amittunt, corporique noxam non leuem inferunt, ideoque tum insalubres & non naturales appellantur, & nequaquam simpliciter sanguis, pituita, bilis, flaua vel atra, sed cum adiectione, ut ex eorundem specierum differentiarumue commemoratione liquide patebit, efferuntur. Nam, vta sanguine exordiamur, ubi is naturalis est, vitioque

- A que omni vacat, reliquis humoribus, qui illi in venis commisti sunt, dominatur, ac simpliciter & reuera sanguis est, & dicitur. Quum vero a pristina natura desciscens, vitio corruptelaque deprauatur, non naturalis, & cum adiectione, prout ab vno, aut pluribus sibi commistis humoribus superatur, sanguis biliosus, pituitosus, melancholicus, serosus vel putridus nominatur: vt de sanguine dictum est. Ita etiam de reliquis humoribus sentiendum erit, eos nimirum naturales appellari, quum debita & conuenienti mensura & portione, suisque qualitatibus tum primis, tum secundis præditi, sanguini in venis commisti, aut suis sedibus contenti sunt. Non naturales vbi contra se habent. Pituitæ autem non naturalis, *Galeno libr. 2. de different. febr. cap. 6. auctore*, quatuor sunt species. Vna quidem valde frigida, ita sane, vt neque excretionis violentia quum excidit, veluti *libr. 1. de laborantibus locis cap. 1.* Galenus scriptum etiam reliquit, calida euadat. Hæc pituitæ species vitro fuso tum colore, tum consistentia similis est, ideoque a Praxagora, *vt loco iam citato testatur idem Galenus*, vitreus est appellatus. Philippus Medicus, & alii iuniores simpliciter nullo alio adiecto nomine, crudum vocauerunt. Is humor ex crapula, desideque, ac otiosa vita, *Galeno cap. 10. libri de inequali intemperie teste*, procreatur: & *vt idem in lib. de plenitudine auctor est*, cibi fastidium, & inappetentiam efficit, inque calido loco obstructus, vehementissimos cruciatus excitat. Altera pituitæ non naturalis species est, quam plerique cum screatu exspuunt sensilem obtinens dulcedinem, ideoque dulcis nominatur. Hæc, *vt eodem loco Galenus testatur*, somnolentos efficit, & exquisitè frigida non est. Cum enim dulce sit, vt aliquid etiam caloris habeat, necesse est. Siquidem dulce nihil est, nisi idem mediocriter calidum sit, *vt libr. 4. de simplicium medicament. facultatib. cap. 10. & 11. Galenus demonstrauit.* Tertia dictæ pituitæ species acida, quod exspuentibus eiusmodi esse videatur, vocatur. Hæc certe minus, quam vitrea, magis vero, quam dulcis, frigida est. Nam quum concoctione paucus admodum calor ei adiectus sit: neque enim acidus sapor sit, *Galeno libr. 4. iam citati operis, cap. 13. attestante*, nisi quando a calido mutatur subiecta materia, ita tamen, vt non superet: vt vitrea minus frigida sit, dulci vero frigidior, quandoquidem calor exiguus ille, a quo mutata est, facile & nullo ferè negotio euanescere possit, necesse est. Hæc quidem pituitæ species famelicos facit. Quarta pituitæ non naturalis species salza nuncupatur, quæ propter putredinem, salza vel salza serosæ humiditatis mistionem sit. Quum enim dulcis pituitæ portiones quædam vi putredinis assæ, reliquæ dulci substantiæ permiscantur, falsum in ea saporem efficiunt, quemadmodum etiam in maris aqua fieri cernitur. Hæc *Galeno attestante*, sitibundos efficit. Iam dictis quatuor pituitæ non naturalis speciebus sunt qui quintam adiciant, quam *Gypseam*, quod a Gypsi lapidis forma & duritia non procul absit, appellant. Hæc in digitorum articulis, ac pulmonibus non raro deprehenditur. Galenus hanc sub vitrea complexus est, & merito quidem, quod non sit, nisi vitrea, quæ ex concretionem ita est indurata, vt in lapidis iam consistentiam abierit. Ceterum flauæ bilis a naturæ modo deficientis, *Galeno in libello de atra bile, aliisque locis teste*, quinque sunt species. Prima Græcis *λευκὸς χυλός*, Latinis *vitellina*, quod ouorum crudorum vitellis tum colore, tum consistentia similis sit, vocatur. Hæc, *vt Galenus loco iam citato auctor est*, in iecore & venis procreatur, quando caloris vehementia summe coquitur, & quasi torretur, vt iam ex tenuis substantiæ dissipatione crassiolem, igneumque colorem consequatur, adeoque vitellorum crudorum ouorum, *vt diximus*, formam exhibeat. Plurimum itaque hallucinatur Auicenna, qui hanc fieri, *Fen. 1. Can. 1. doct. quarta, cap. 1.* contendit, quando pituita aut melancholia portio flaua bili permiscetur. Hinc maioris & minoris famæ genera bilis conminiscitur, quæ quam plurimos hodie Medicos in designandis febrium differentiis mirifice implicatos & circumretitos tenent. Hac enim sua opinione Auicenna vitellinam bilem frigidiorē reddidit flaua & naturali, cum tamen constet illam multis partibus ardentiorē & calidiorē esse. Frigidior enim necessario propter frigidorum humorum, pituitæ scilicet aut melancholiæ, commistionem redderetur. Sed vt alia multa pro sua, qua ductus est, imaginatione homo ille fingere solitus est, quæ nusquam in rerum natura exstant: ita quoque hoc loco ex humorum permissione, noua quædam, & inaudita simplicium genera inue-

Sanguinis non naturalis differentie.

Pituitæ non naturalis quatuor species. Vitrea.

Crudus humor.

Dulcis.

Acida.

Gypsea.

Flauæ bilis non naturalis quinque species. Vitellina.

Auicennæ error.

Porracea. here conatus est. Altera bilis non naturalis species Græcis *μεγανισμός*, Latinis *porracea*, A
 Aerugi- quod porri colorem referat, dicitur. Tertia Græcis *ισάδης*, Latinis *æruginosa*, ab æruginis,
 nola quam præ se fert, similitudine, vocatur. Quarta *ισατίδης*, *Isatidis colorem referens* Latinis
 Isatidis co nominatur. Quæ sane omnes, Galeno in libello de melancholia, & libr. 2. prognost. com.
 lore m re- 39. *astipulante*, in ventriculo ex vitiosis, & mali succi cibus, cuius generis sunt, allium,
 ferens. porrum, cepa, nasturtium, & sinapi, gignuntur. Quum enim nequeunt a ventricu-
 lo deuinci, neque in cremorem conuerui, ac colorem suum magna ex parte retinent,
 primum ex illis fit porracea, quæ si infixa diutius illic hæreat ac commoretur, ventri-
 culi persistente incendio, in æruginosam mutatur: hæc rursus in eam, quæ Isatidis B
 aut Glasti colore tincta apparet, minus quidem viridis, quam superiores, sed tanto il-
 lis deterior, quanto propius ad nigrum accedit colorem. Procreari etiam nonnun-
 quam in iecore, & venis posse videatur, idque ingrauib. & calidissimis morbis, qui
 vehementi caloris incendio vitellinam bilem adurunt, & in has species commutant,
 quæ tum prorsus perniciosæ & exitiales iudicantur. Porro alia bilis species a Galeno
 libr. 10. de simplic. medic. facul. cap. de bile, recensetur, quam cœruleam nuncupat. Verum
 hæc a quarta nihil distare videtur, cum constet omnibus, Isatidis aut Glasti colorem
 esse cœruleum. Ceterum atræ bilis non naturalis humor, qui est omnium deterri-
 mus, duæ sunt, Galeno libr. 2. de natur. facul. teste, species. Vna ex melancholico suc-
 co fit, qui putredinis, aut caloris feruore *ἡ ἐξ ἡμῶν τοῖσιν*, id est, *acidam qualitatem*, Ga-
 leno lib. 2. de natural. fac. attestante, transmutatur. Nam ex vitione non naturalis caloris a C
 corem asciscit, eoque discrimine a melancholico succo, qui acerbus est, diffidet. Hæc
 itaque reuera acida est, vt quæ ex acerbæ caloris vi exsoluta in acidam permutata trans-
 ierit.

Altera species ex vitellina vocata bile fit, quoties ipsa igneo percocta est calore.
 Quippe ex vitione hæc primum in porraceam, dein in æruginosam, post in cœruleam,
 nouissime in atram omnium perniciosissimam commigrat, quam veteres atram bilem
 radentem appellauerunt, vt quæ caloris feruore veluti cinis quidam sit reddita. Hæc
 certe a naturali, perinde atque fæx vsta a non vsta differt. Quippe calida admodum est,
 & acris, adeo vt carnem vrat, liquet, & corrumpat, cum naturalis refrigerandi & desic-
 candi facultatem habeat. Hincque adeo Galeno libr. 14. Thera. metho. cap. 9. *ἡ ἀκρὴ*, id est, *a-* D
cris propriissime appellatur. Ibidem *ἡ ἐξ ἡμῶν*, vt etiam libr. 2. de natural. facul. & *ἡ ἐξ ἡμῶν*, hoc est, *in*
aceti modum acrem vocat, quod corpus animalis sua crassitudine partibus eius se affigens,
 adhærescensque, arrodar, exulceret, & radat, terramque, si super eam fusa sit, fermenti
 more, & quodam quasi æstu efferuescens, attollat, bullasque, quales feruentibus iuscu-
 lis innatare videmus, excitet: vt rectissime Hippocrates dixerit, *difficultates intestinorum,*
quæ ab atra inceperunt bile, esse lethales, eo quod acris sit, & minime acida: fieri enim non potest, ut
ea, quæ ex flaua bile per assationem gignitur, atra bilis, vnquam sit acida. Siquidem austerus, aci-
 dusque sapor exsuperantis frigiditatis sunt indicia, & rebus primo insunt crudioribus,
 & nondum a calore elaboratis, & percoctis. Quum enim percoquuntur, acida, dulcia,
 amara, & salsa demum euadunt. Proin si amara sunt, vt in succedentem saporem acrem
 nimirum permulentur necesse est. Amarum namque nunquam acerbum, vel acidum
 fit. Ceterum Auicenna, & alii, qui huius sectantur placita, tertiam atræ bilis speciem ad-
 iiciunt, quæ ex pituita adusta procreatur. Quod si de omni pituita non naturali intel-
 ligunt, illis concedendum haud erit. Neque enim de vitrea hoc recte affirmatur, vt quæ
 propter immensam suam frigiditatem, superstite animali, nunquam eousque aduri po-
 test, vt in melancholiam, ac veluti in cinerem vertatur. Neque etiam de acida, eandem
 ob causam. Neque de dulci, quæ ex cerebro destillat, aut in pulmone, ventriculo aut
 intestinis coaceruatur. Hæc enim vehementi calore concrescit quidem, sed in alterius
 humoris speciem nunquam mutatur, sed in frigidioribus maxime locis concretionem
 durescit, & in vitream, aut gypseam abit. Reliquum igitur est, vt de salsa, & quæ in venis
 computruit, adeoque caloris cuiusdam præter naturam particeps est, idipsum intelli-
 gamus, quam certe credibile est, si vehementius & prorsus torreatur, in quâdam acrem,
 atramque bilem commutari posse, quæ tertia eiusdem sit species. Quod Galenus
 in libello de atra bile inscripto breuiter iis innuere verbis voluit, *Pituita*, inquit, *quali-*
tatis

Cœrulea
 nō differt
 ab ea, quæ
 Isatidis
 nomina-
 tur.
 Atræ bilis
 non natu-
 ralis spe-
 cies tres.

2. Atræ bi-
 lis radens.

4 Apho.
 44.

3.
 An ex pi-
 tuita, atra
 bilis pro-
 creati pos-
 sit.

A talis expers est, ut aqua: sed naturali qualitate mutata, non tantum salsa, sed acris quoque redditur.

De quatuor humoribus secundariis. C A P. VI.

- A** Vicenna Fen. 1. Cano. 1. doct. 4. cap. 1. præter iam dictos alios adhuc quatuor humores recenset, quos secundos appellauit. Hunc deinceps multi alii medici sequuti, idem plane quod ille statuerunt, atque quatuor illis humoribus secundis, peculiaria nomina imposuerunt. Verum si quis horum naturam & essentiam paulo intimius rimetur, & penitius excutiat partium simularium potius substantias, quam humores esse deprehendet. Tamen quum non simpliciter humores, sed cum adiectione secundarii nominentur, non admodum reluctamur iis, qui clarioris doctrinæ gratia illos ita appellare volunt. Præstaret tamen eos simularium partium humores, quam secundarios nominare.
- B** re, ut ex eorundem procreationis modo satis liquet, qui est eiusmodi: Sanguis simul atque e vasis amplioribus in angustiora, quæ unicuique parti natura dedit, attractus exciderit, omni tum qualitate, tum proprietate circumstantis particule sensim perfunditur, eaque commutatione partium naturam assumens, fit primus humor ex quatuor secundariis nominatus. Atq; is certe non est, nisi sanguis purior & multiplici concœctione exquisitè elaboratus in exilibus arteriis venisque contentus, hinc mox ex earum finibus in vacua partium simularium loca influxurus, & ex quo partes similes proxime alentur. Hic certe cum nondum ad simularium substantiam pertineat, sed in propriis cuiusque particule, ut dictum est, exilibus arteriis & venis consistat, recte humor appellari potest. Huic nullum est peculiare a recentioribus medicis impositum nomen, ideoque humorem secundarium nomen non habentem appellarunt. Alter secundarius humor est, qui per oscula exilium vasorum iam excidit, & per media spatia simularium partium roris modo dispergitur, inque earundem substantiam diffunditur, atq; influit, illisq; adiungitur, apponiturque. Adeoq; proprium est partium simularium, Galeno etiam cap. 59. artis medicæ teste, alimentum quod ex appositione fit. Quippe id proprium est, eodem Galeno libr. 3. de tempera. cap. 4. teste, alimentum, quod iam nutrit, & appositum est. Hinc nonnulli humorem hunc alimentarium nominant. Galenus
- C** libr. 7. Therap. metho. cap. 6. ἐκφυλτορ, libr. vero 2. de diff. feb. cap. 13. σικκινος ὑγερμα, hoc est, insitum humorem appellat, non quod nobiscum natus sit, & substantiæ nostræ portio sita prima statim origine suscepta, sed quod partibus simularibus insitus est. Recentiores etiam non inepte Rorem vocant. Tertius humor est is, qui crassior iam factus ac coactus concetufue partibus agglutinatur & solidis fibris adhærescit, & in partis substantiam mutatur, illique perfecte iam assimilatur. Hic non est, nisi carnosa & adipis substantia. Hinc est, quod a nonnullis carniformis nominetur. Recentiores autem medici huic vni & eidem, a statu vario, varia indiderunt nomina. Quatenus enim ille annectitur & agglutinatur, Gluten ipsi ab agglutinando, appellatur. Quatenus vero in partis substantiam mutatus est, & illi perfecte iam assimilatus, Cambium barbara voce nuncupatur. Nā etsi cambire elegans & antiquum sit verbum, quo Plautus, Priscianus, & Ennius vsi sunt, & idem quod permutare significet, tamen Cambium vox Latina non est, quæ tamen barbari permutationem innuunt. Quartus humor est, qui partibus simularibus ingentius est, & a prima statim origine susceptus & insitus. Hinc a quibusdam primogenius, & natiuus, ab aliis humidum
- E** radicale, quod scilicet spiritus, & calor, totiusque vitæ fundamentum sit, & pabulum, vocatur, Galenus solidam simularium partium substantiam, libr. 7. Ther. method. cap. 6. vocat, ut infra fusius monstrabimus. Porro quatuor humoribus secundariis iam ordine recensitis, absumtis & depastis, quatuor siccitatum genera seu differentiarum comitantur: de quibus ita loco iam citato Galenus dislerit. Quod, inquit, senium in sanis est, id sicca intemperies est in agris. Itaque etiam insanabilis est, si prorsus sit consummata. Est autem prorsus consummata, ubi solida simularium partium substantia redacta est sicciore. Nam est & altera siccitas, utique quum ea, quorum substantia ex humore concreto constat, sicut caro & adeps, sunt liquata. Etiam tertia, quum propria humiditas, unde partes nutriuntur, omnino absumpta est. Continetur ea in omnibus animalis partibus, ceu ros quidam per ea sparsus. Quarta ab iis diuersa siccitas est, quæ in propriis cuiusque particule exilibus arteriis venisque consistit. Prouenit & hæc ex sanguinis penuria. Hactenus Galeni verba recensuimus, e quibus perspicuum euadit omnibus, primam siccitatem esse, quando humidum, quod vocant radicale, absumitur. Nam quum solida substantia partium simularium Galeno non sit, nisi ea, quæ ex semine nata est, qualis est arteriarum, venarum, neruorum, ossium, cartilaginum, membranarum, ligamentorum,

Humores secundarii, rectius simularium partium humores appellarentur.

Quatuor secundarium humorum generatio. Primus.

Nomen non habens. Secundus.

Humora: alimentarius. Humor insitus. Ros. Tertius.

Carniformis.

Gluten.

Cambium. Camb. re.


Quartus. Primogenius & natiuus. Humidum radicale.

Quatuor siccitatum genera. Prima. Altera. Tertia. Quarta.

& tunicarum, *ut metipſe lib. 1. de naturalibus facultatibus teſtatur*, & humidum radicale a ſemine quoque deriuetur, *ut idem ſit dicere ſolidam ſimilarium partium ſubſtantiam abſumi, aut humidum radicale, neceſſe eſt*. Solida igitur ſimilarium partium ſubſtantia, non ad carnoſam earundem ſubſtantiam, *ut pote quæ ex ſanguine nata eſt*, ſed ad humidum primogenium ſeu radicale, quod a ſemine prodiit, pertinet. Proinde quamcunq; ſolidior illa ſubſtantia ab ortu conditionem acceperit, eandem totius vitæ curſu retinet. Nam fibræ ex humido liquidoque ſemine creatæ, quanquam diuturnitate magis magisque ſicceſcunt, dum ad extremum ſenium, quod aridiſſimum eſt, veniant, ſemper tamen eius humidum, quod a ſemine contraxerunt, aliquid ſibi in omnem vitam recôdunt: quod *ut recens natis & infantibus plurimum eſt, ſenibus exiguum, ita interiectis ætatibus mediocre*. Huius itaque humidum abſumtio primam, & quæ ſanari non poteſt, ſiccitatem procreat. *Ut autem quarti humoris ſecundarii abſumtio primam, adeoque peſſimam ſiccitatem efficit; ita tertii conſumtio ſecundam, ſecundi tertiam, & primi quartam, quæ curatu omnium facilima eſt, parit.*

DE PARTIBVS CORPORIS HVMANI, SECT. V.

De partium humani corporis differentiis. CAP. I.



ARTIVM humani corporis prima differentia eſt, quod ex iis aliqua ſunt ſimilares, aliqua *inſtrumentales*. Similares autem partes, *ὁμοιομερῆς* Græcis dictæ, quæ ſibi undique ſimiles ſunt, unam parilemque omnino ſubſtantiam adeptæ, appellantur. Ita enim *libr. 1. de hiſt. anim. cap. 1.* Ariſtoteles definiuit, eas eſſe, quæ in ſimiles ſibi partes diuiduntur, ſcribens. Nec aliter Galenus eaſdem *lib. 1. Thera.*

Meſho. cap. 6. definit, ubi inquit: *Partes ſimilares ſunt, quæ undiq; in ſimiles diuiduntur. Et lib. 8. de placitis Hippo. & Platonis*, ubi in eum modum eas finit: *Similares, ait, partes ſunt, quæ omnes tum ſibi mutuo, tum toti ſimiles partes habent, veluti arteria, vena, nerui, oſſa, cartilagine, membrana, ligamenta, tunica, caro & id genus alia*. Atque hæc ſane omnes veræ & legitimæ ſunt ſimilarium partium definitiones, quod ſingulas in ſe earundem partium differentias, quæ quidem, *ut ex Galeno maniſeſtiſſime colligitur*, geminæ ſunt, complectuntur. Aliæ enim ſunt, quarum vniuerſæ particulæ inuicem eiſdem ſpeciei ſunt. Et hæc quidem reuera, *hoc eſt*, ut ad vniuerſas partes, quæ eas conſtituunt, ſimilares ſunt. Quippe in partes alterius naturæ, rationis, ſeu ſpeciei, diuidi nequeunt. Primæ quoq; ſunt, quod iis aliæ priores non ſint. De iis proſecto loquitur Galenus *lib. 1. de elementis*, ubi inter cetera ſic ſcribit: *Homo*

Quæ partium ſimilarium differentia reuera. Similares reuera. Primæ partes.

Simpliciffimæ partes quæ ſimilares ſenſus iudicio. Venæ & arteriæ ſimpliciffimæ & reuera ſimilares non ſunt.

ex primis & ſimpliciſſimis ſenſibilibus elementis, ſimilaribus nominatis, conſtat fibræ, membranæ, carne, adipe, oſſe, cartilagine, ligamento, neruo, medulla, & aliis vniuerſis, quorum particula omnes eiſdem inuicem ſpeciei ſunt. E quo ſane Galeni loco etiam palam ſit, eiſdem generis ſimilares, non ſolum primas, ſed ſimpliciſſimas dici. Aliæ ſunt ſimilares partes, quæ non reuera undique ſibi ſimiles ſunt, & eiſdem naturæ, ſed ſenſus duntaxat iudicio. Si quidem in partes alterius naturæ, & diuerſæ ſpeciei, diuidi poſſunt. Eiſdem generis ſunt venæ & arteriæ, quod ſimpliciſſimæ & reuera ſimilares, ut ad vniuerſas ſuas partes, non ſint. Ex fibris enim & membranæ, quæ certe diuerſæ ſunt naturæ & ſpeciei, conſtant. Hinc eſt, quod Galenus *cap. 2. libri de inæquali intemperie*, rectiſſime arterias & venas e ſimilarium numero ſubmoueatur: neque enim, *ut dictum eſt*, reuera ſimilares exiſtunt. Sed præſtat Galeni verba recensere: *Digitorum*, inquit, *particula ſunt oſſa, cartilago, ligamentum, arteria, vena, membrana, caro, tendo, unguis, cutis, adeps. Hæc autem diuiſiſſe in aliam ſpeciem non eſt, ſed ſunt ſimilares ac prima, exceptis tamen arteriis & venis. Hæc namque ex fibris & membranæ conſtant.* Hæc ille. Non ſunt itaque venæ & arteriæ ſimilares partes prima ratione, id eſt, *ut ad vniuerſas ſuas partes, adeoque ſimpliciſſima*, ſed altera duntaxat ratione, *hoc eſt*, ſenſu iudicio, & ut ad ſe totas. Omnes enim venæ & arteriæ partes, toti venæ & arteriæ, & mutuo ſibi ſimiles ſunt. Non eſt igitur, *ut ſimpliciſſimas* appellemus partes, ſed potius ſenſu ſimplices. Atque hinc eſt, quod Galenus *in libello de opima corporis humani conſtitutione*, ut etiam venas & arterias inter ſimilares partes numerare commodè poſſet, eam partium ſimilarium finitionem afferre voluerit: *ὁμοιομερῆς*, inquit, *ὁμοιομερῆς τῶν μερῶν ἀπλά*, id eſt, *Similares partes vocantur, quæ ſcilicet ſenſu ſimplices ſunt.* Abunde enim ſufficit, ut in reſolutione partium inſtrumentalium aliquid ſenſus iudicio ſimplex, & ſimilare ſit. Ut hinc omnibus palam ſit, Galenum non vno ſimpliciter modo ubique de ſimilaribus partibus locutum fuiſſe. Nam

Galenus a pugniacia vindicatur.

A ubi venas & arterias inter similes partes, hic ad sensum magis quam ad rei naturam spectat. Quod non obscuris verbis, *capite secundo, de differentiis morborum*, ubi venas & arterias inter similes partes recenset, & seipsum explicat, significavit inquitens: *Porro singula partes instrumentales, ex aliis, quæ sensus iudicio simplicia videntur, sunt constituta.* Et paulo post: *Itaque, ait, si vel ossum aliquod, vel caro, vel reliquorum corporum, quæ sensus iudicio simplicia esse videntur, &c.* Contra, ubi e numero similiarum partium venas & arterias excludit, hic ad rei naturam potius quam sensus iudicium respicit. Siquidem altiori indagine venarum & arteriarum naturam, essentiamque perquirens, sensusque iudicio minime contentus, ex dissimilibus partibus, nempe fibris & membranis, coalitas esse considerat. Quare cum duæ sint, *ut iam liquido monstratum est*, similiarum partium

B differentiarum, inepte admodum a nonnullis partes similes in hunc finiuntur modum: *Similes partes sunt, quarum omnes partes eiusdem inuicem speciei existunt, vel ita: sunt, quarum omnes particulae eiusdem speciei cum toto existunt.* Quippe hæc finitiones alteram duntaxat similiarum partium differentiam complectuntur. Vtrigitur similiaribus utriusque differentiarum partibus congruentem finitionem, adeoque absolutam & perfectam habeas, primam, quam nos ex *Aristotele & Galeno* produximus, amplectaris necesse est. Sed hæc alibi etiam copiose diximus. Ceterum similes partes multis quoque aliis nominibus a Galeno donantur. Nam *propria hominis elementa* eidem nominantur: idque non temere. Quippe et si hæc partes communes quoque brutorum quibuldam existunt, equo nimirum, boui, cani, & id genus aliis: omnia enim huiusmodi arterias, venas, ner-

Inepta similiarum partium definitio.

Propria hominis elementa.

C uos, ligamenta, membranas, & carnes obtinent: non tamen hæc ad vnguem plane humanis similia, sed nonnulla quoque genere diuersa, velut vngulas, cornua, calcanea, rostra, squamas habet. Dicuntur etiam *ἀπλά μέρη*, hoc est, *simplices partes* ob causam paulo ante expositam. Vocantur etiam *πρῶτα μέρη*, id est, *prima corpora*, quod scilicet ex illis constituantur aliæ partes, quæ *secunda & composita* appellantur. Item *ἁπλοῦς*, hoc est, eiusdem generis, propter causam supra dictam. Et *στοιχεῖα*, id est, *elementares*. Præterea *αἰσθητὰ στοιχεῖα*, hoc est, *sensilia sensuiue obnoxia elementa*. Ex iis namque, veluti elementis, partes compositæ & instrumentales constāt. Quod autem sensui obnoxia sunt, hoc ipso a mundi elementis, utpote quorum sensus minime iudex est, differunt. Denique eidem *στερεὰ μέρη*, id est, *solida particulae* nuncupantur. Ita enim *libro primo, de natu. facul.* scriptum reliquit:

ἀπλά μέρη, πρῶτα, ἁπλοῦς, στοιχεῖα, αἰσθητὰ στοιχεῖα.

στερεὰ μέρη, Partes solidæ, Instrumentariae partes, Diuersæ partium instrumentarium appellationes.

D Vocantur autem sic *solida corporis particula, arteria, vena, nervi, ossa, cartilaginee, membrana, ligamenta, tunica omnes, quas elementares, similes, & simplices paulo ante nominauimus.* Hæc ille. Porro instrumentariae partes sunt, quæ ex simplicibus similiaribus conditæ sunt. Verbi gratia, *caput, manus, pes, cerebrum, cor, iecur, & id genus alia.* Sortiuntur autem & illæ alias quoque apud Galenum, reliquosque scriptores appellationes. Siquidem Græce *δύναμις*, *σύνθετος, ἀνομοιομερής, ἐτερογενής, καὶ ὁργανικὰ μέρη*, id est, *secunda, composita, dissimiles, & diuersi generis particulae* nominantur. Quarum quidem appellationum causæ, facile ex iis, quæ paulo supra de similiaribus dicta sunt, cuius innotescunt. Animaduertendum autem hoc loco erit inter se differre instrumentariam partem & instrumentum: vel ut Græci loquuntur, *ὁργανικὸν μέρος, καὶ ὄργανον*. Nam, *ut dictum est*, pars instrumentaria duntaxat ea nominatur, quæ composita est. Instrumentum autem, *ut libro primo, The. Meth. capit. 6.* Galenus attestatur, quælibet animalis pars, quæ perfectam edere actionem potest, vocatur. Ita sane oculus instrumentum est, quia actionem perfectam, nempe visionem, edit: lingua itidem, quia loquelam: & crura, quia itionem perficiunt. Atqui simul etiam partes sunt instrumentales, quod ex pluribus similiaribus compositæ sint. Sunt vero etiam instrumenta arteria, vena, & nervus: quodlibet enim illorum perfectam edere actionem potest, distributionem nimirum spiritus vitalis sanguinis, sensusque & motus in vniuersum corpus. Non tamen sunt instrumentariae partes, sed potius similes. Quid multa, quum a similiaribus, ut Galenus *loco iam citato* fusius docet, functiones edantur, instrumenta sint necesse est. Non sunt igitur instrumenta, quod crebro Galeni interpretes faciunt, cum partibus instrumentalibus temere confundenda, nec promiscue pro instrumento pars instrumentaria Latino interpreti reddenda erit. Licebit quidem instrumentum simpliciter appelles partem instrumentariam, eo quod plures sint partes compositæ, quibus instrumenti nomen conueniat, & quæ perfectam edere actionem possint, imo omnes partes instrumentariae, sunt etiā instrumenta, atqui

Differunt pars instrumentaria & instrumentum.

Instrumentum.

E minatur, quæ composita est. Instrumentum autem, *ut libro primo, The. Meth. capit. 6.* Galenus attestatur, quælibet animalis pars, quæ perfectam edere actionem potest, vocatur. Ita sane oculus instrumentum est, quia actionem perfectam, nempe visionem, edit: lingua itidem, quia loquelam: & crura, quia itionem perficiunt. Atqui simul etiam partes sunt instrumentales, quod ex pluribus similiaribus compositæ sint. Sunt vero etiam instrumenta arteria, vena, & nervus: quodlibet enim illorum perfectam edere actionem potest, distributionem nimirum spiritus vitalis sanguinis, sensusque & motus in vniuersum corpus. Non tamen sunt instrumentariae partes, sed potius similes. Quid multa, quum a similiaribus, ut Galenus *loco iam citato* fusius docet, functiones edantur, instrumenta sint necesse est. Non sunt igitur instrumenta, quod crebro Galeni interpretes faciunt, cum partibus instrumentalibus temere confundenda, nec promiscue pro instrumento pars instrumentaria Latino interpreti reddenda erit. Licebit quidem instrumentum simpliciter appelles partem instrumentariam, eo quod plures sint partes compositæ, quibus instrumenti nomen conueniat, & quæ perfectam edere actionem possint, imo omnes partes instrumentariae, sunt etiā instrumenta, atqui

non licet vice versa partes similes, quæ instrumenta sunt, partes quoque instrumen-
tarias, voces. Hinc est, quod Galenus *ca. 3. libri de morborum diff.* partes instrumentarias,
ὄργανα, id est, *instrumenta*, vocat, at non viceversa similes partes, instrumentarias appel-
lat. Non est igitur *ὄργανον μόνον* cum *τῷ ὄργανῳ* temere cōfundendum. Porro iam dictarum
partium variz sunt differentiz. Quippe ex iis tres sunt, quæ medicis principes vocan-
tur, cerebrum, cor, & iecur. Sic autem dictæ sunt, quod ab iis vniuersum corpus regitur
ac gubernatur. Sunt enim principia ac veluti fontes facultatum nostrū corpus guber-
nantium. Nam cerebrum animale, cor vitalem, iecur naturalem facultatem suppe-
ditat. Non desunt, qui iam dictis quartam adiiciunt principem partem, testes nimirum,
eo quod genitricem facultatem obtineant, & ad speciei propagationem ac conseruationem faciant.
Propterea, aliæ sunt partes, quæ iam commemoratis quatuor ministrant, nempe *nerui,*
arteria, vena & vasa seminaria. Nerui quidem cerebro, arteriæ cordi, venæ iccori, vasa se-
minaria testibus famulantur. *Per nervos* enim cerebrum, sensum & motum in totum ani-
mal transmittit. *Per arterias*, cor, vitalem calorem, & spiritum in vniuersum corpus dis-
tribuit. *Per venas*, veluti canales, iecur sanguinem in totum corpus spargit. *Per vasa se-*
minaria genitale semen testes in vterum deriuant. Sunt etiam quædam partes, quæ lei-
psas gubernant, verum a principis vim quandam mutuatur, vt est *ventriculus, intesti-*
na, lien, & renes. Ventriculus enim ex cibo ingesto cremorē propria & innata vi gignit,
sed aliquid mutuatur. A cerebro enim sentiendi, a corde viuendi, a iccore nutriendi,
altricemue facultatem accipit. Idem de reliquis iudicium. Sunt denique quarti generis
partes, quæ nec aliorum gubernationi præsumt, neq; aliunde gubernantur, cum inna-
tam facultatem habeant, vt *os, ligamentum, membrana, cartilago, glandula, pinguedo, & caro*
simplex. Omnes enim hæ partes natiuas obtinent facultates, quas neque ab aliis mutu-
antur, nec aliis dispertunt: caro quidem carnis procreandæ, os ossis, cartilago cartila-
ginis, & reliqua eodem modo. Omnes autem corporis partes venarum, arteriarum, &
neruorum adminiculo ad essentiz suæ conseruationem indigent. Venis quidem, vt nu-
triantur, arteriis autem ad insiti caloris moderationem. Neruis, vt quæ illis noxia sunt,
sentiant. Atque hæ quidem sunt generales partium humani corporis differētiæ. Nunc
reliquum est, vt speciatim de singulis differamus, tamen quoad fieri potest breuissime,
vt hinc medicinæ tyrones leuem saltem partium humani corporis notitiā consequan-
tur, & ad dissectionem instructiores veniant. Exordiemur autem ab ossibus, vt quæ ve-
luti fundamenta sunt vniuersum corpus sustentia. Sunt autem numero sane multa,
nempe *trecenta & quatuor.* Quæ vt ordine quodam commemorentur, vniuersam huma-
ni corporis ossium inuicem coherentium compactionem, quæ Græcis *σκαλετὶς* dicitur,
in quatuor præcipuas partes, *caput, spinam, manus & crura*, digeremus, initioque capitis
ossa succincte admodum percensebimus.

De ossibus capitis. CAP. II.

κράνιον.
Caluariz.

περικράνιον.
Os cal-

uariz, ossa.

συνκίρην.
Syncipitis

ossa duo.

παρακίρην.
Parietalia.

παρακίρην.
Frons.

ὀπίσθιον.
Occiput.

χρόνια.
Tempora.

ὀστέα πε-
τρώ-

σα.

ὀστέα
Processus

ossium te-

poris.

μαστοειδῆς.
Mamillaris

OS quoddam cerebro instar galeæ, rerum opifex circumposuit, quod Græcis *κράνιον*
Latinis *calua & caluaria*, vulgo *testa* dicitur. Membrana vero, quæ caluariam cra-
niumue extrinsecus ambit, *περικράνιον* appellatur. Ceterum caluaria octo constat ossi-
bus, duobus *συνκίρην*, utrinque nimirum uno frontis unico, occipitis similiter uno, duobus *παρα-*
κίρην, ad utranque videlicet aurem uno cuneiformi, & ethmoide. Syncipitis, quod Græcis *βρεγμα* vo-
catur, ossa duo, utrinque enim unum est, in capitis lateribus, veluti quidam parietes, locata sunt,
vnde etiam Barbaris *parietalia* vocantur. Frontis, quam *μέτωπον* Græci nominant, os, quod
unicum esse diximus, quodam modo orbiculare est. Occipitis, quod *ὀπίσθιον* Græci nuncu-
pant, unicum dūtaxat os existit. Temporum, quæ Græcis *χρόνια* dicuntur, ossa bina sunt,
utrinque vnum ad suam aurem positum. Hæc, quia petra speciem præ se ferunt, vt *Ga-*
leno visum est, aut quod lapideam duritiem habent, *λιθονοῖν*, id est *petrosa lapideæ* appel-
lantur. Duobus vero temporum ossa donantur processibus: quorum vnus oblongus,
tenuisque, styli scriptorii, acusue imaginem exhibet. Ideo Græcis *χρυσώδης, στυλοειδῆς, & β-*
λωνοειδῆς, & a calcaris gallinacei effigie, *πτερυγιον* vocatur. Alter processus vaccini vberis pa-
pillæ imaginem refert, ideoque Græcis *μαστοειδῆς*. Latinis autem mamillaris nominatur.
His duobus alius adhuc processus accedit neutiquam infimus, qui mediam ossis iuga-
lis, de quo paulo post, partem efformat. Atque hactenus sex caluariæ ossa numerauimus.

Septimum

- A** Septimum eiusdem os Græci σφιννοειδές, Latinis *cuneiforme*, quod veluti cuneus inter capitis & maxillæ superioris ossa immittatur, dicitur. Hoc Galenus in *libris de usu par. corporis humani*, os palati crebro appellat. Hoc, si quod aliud, insigniter varium est, proinde veteribus a multiplici forma πολυμορφόν, est nominatum. Hoc, quia cerebro substratum, illiusque veluti basis est, aut quia alia caluariæ ossa ei innituntur, vulgo *basilare* nuncupatur. Porro cuneiforme os in externa parte ad caluariæ basim, quatuor processus habet, vtrinque binos, & vesperilionum alarum modo prominentes, vnde etiam Græcis σφιννοειδές nominantur. Octauum caluariæ os in frontis ossis basi locatum, multis foraminulis coli aut cribri instar, odorum gratia, peruium est, ossa & usque instrumentorum sedes continet, cuius rei gratia Græcis ἡδμοειδές, nostris *colatorium & cribratum* dictū est.
- B** Hippocrati a spongiæ similitudine, & quod spongiæ ritu perforatum sit, σπιννοειδές vocatur. Prædicta caluariæ ossa futuris quibusdam, quæ Græcis ραφαί appellantur, distincta sunt, quæ pro capitis figuræ diuersitate variant. Siquidem naturalis capitis figura quinque obtinet futuras, quarum tres veræ dicuntur, ferratiles enim sunt, dentatisque perdatinam compagibus coeunt. Atque harum quidem duæ transversæ sunt, quarum altera in syncipite seu vertice est, & Græcis στεφανία, Latinis vero *coronalis*, quod scilicet coronæ in ea potissimum capitis parte collocentur, appellatur. Altera in occipite est, quæ a maiusculæ literæ Λ effigie Græcis λαμβδοειδές, & ab υ forma, ὑπολειδοειδές nominatur. Tertia a medio posterioris, siue eius, quæ in occipite consistit, per capitis longitudinem, ad medium vsque anterioris futuræ extenditur: hincque adeo Græcis ὀβελία, vulgo *Sagittalis*, quod veru sagittæve instar recta, & satis longe incedat. A virgæ quoque ductu, nonnullis ραβδοειδές vocatur. Harum trium futurarū figura fere Η maiusculæ Græcorum literæ similis est. Præteriam dictas tres futuras, duæ aliz occurrunt, quæ non sunt nisi duæ a sagittali futura quodam modo æque distantes lineæ, per capitis longitudinem, vna vtrinque, supra aures porrectæ. Hæ sunt duobus mutuo sibi incumbentibus coherentibusque ossibus, quæ non futurarum speciem, sed veluti duarum inuicem incumbentium squamarum imaginem exprimunt, a quarum quidem similitudine Græcis λαπιδοειδές πτερές κοινήματα, id est, *squamosa conglutinationes* dicuntur. Vulgus medicorum *membranosas* nuncupat *futuras*. Galenus & alii quidam clarioris doctrinæ gratia futuras νεσπιδας, hoc est, *temporales* vocant. Quomodo autem in non naturali capitis figura futuræ hæ variantur, *lib. i. nostræ anatomes cap. 8.* diximus. Sufficiat enim hoc loco naturalis capitis futuras recensuisse.
- C** Ceterum inter capitis ossa proximum locum obtinet, quod Græcis ζυγωμα, ζυγωειδές, & ζυγώδες, Latinis *Iugale* dicitur. Hoc vero nominis accepit, quod vtraque ossa (sunt enim vtrinque singula) bouū, equorumque iugis similia sint. Constat hoc os ex duorū ossium processibus, inuicem transversa futura coeuntibus. Vnde vulgo *os paris* nominatur. Ossis temporis ampla & anfractuosa cavitās, instrumenti auditus gratia, insculpta est, quæ tortuoso foramine in capitis amplitudinem, cerebri sedem pertingit. Hæc, præter alia tria complectitur officula, quorū vnum incudi, aut rectius molari denti, alterum malleolo non inepte comparatur, quæ instrumentum auditus aperientibus ac scindenti bus apparent. Quin etiam temporis os posteriori inferiorique ipsius parte simul cum occipitis ossis bale eam caluariæ regionem efformat, quam prærupta petra aut rupi, non duritia modo, verum etiam imagine dissectionis periti conferunt. Ceterum superior maxilla, quæ Græcis ἡ ἀνω σιαγών, aut γένυος dicitur, præter tenuia quædam fungosa, & veluti membranea officula, quæ in narium amplitudinis summo, in exsiccatis caluariis impense cartilaginea obseruantur, & dentes, duodecim constat ossibus, vtroque scilicet latere senis. *Primum os*, alteram ossis iugalis partem constituit, & nonnihil temporis, superciliique ac sedis oculi, totum scilicet exteriorem angulum in se complectitur. *Secundum*, reliquis omnibus minimum, & squamæ modo tenue, in interno, siue magno oculi angulo, consistit, vbi foramen habetur, cui caruncula præest internum oculi angelum occupans. *Tertium*, similiter vt præcedens, tenue & squamæ modo pelucidum cernitur. Paulo minus toto quadrangulum est, in interno latere oculi repositum. *Quartum*, reliquorum ipsius ossium longe maximum existit, superiorumque alterius lateris dentium alueolos sibi insculptos habet. *Quintum*, ex duobus nasi ossibus, alterum est, officulū videlicet durū, solidum, latū, tenue, oblongū, & quadrangulo po-

Os palati.
σφιννοειδές.
Cuneiforme.

Basilare.
Processus
alis similes.
Os ethmoides.
Coactum
σπιννοειδές.
Sutura:

ραφαί
Naturalis
figuræ capi-
tis.
Veræ.
Coronalis.

Lambdoi-
des.
Sagittalis.

ραβδοειδές.
Fictæ & me-
mbranosæ futu-
ræ.
Squamosæ
conglutina-
tiones aut
comissuræ
temporum.
Sutura te-
porales.
ζυγωμα.
Os iugale.
Os paris.
Inst. orienti-
um audi-
tus.
Officulum
incudi co-
paratum.
Officulum
malleo si-
mile.
Os præru-
pe petra.
Malleus su-
perioris
ossa.
Primum.

Secundum.

Tertium.

Quartum.

Quintum.

Sextum.
Inferior
maxilla.

Processus
eius.

Dentium
numerus.
Incisorii.
τοιμαίς.

διχασήρες.
κτείνες.

γελάσσοι.
κυνόδοντες.
Canini.

Maxilla.
res.
ρόμφοι.
μύλαι.
μυλίσται.
Molares.
Genuini.

σφαγερισή.
eres.

δ-φίγνοι.
κρατήρες.

Dentes sa-
pientiae.

φάτνια.
βόσπρια.

Foramina
capitis.

Os hyoides.
υοειδές.

υ-φίλοειδές
λαμβδωει-
δές.

φασίγγα-
τες.

Spina.
ράχης
σπον.

σπόνδυλοι
Vertebrae.

ἀγνῶται.
Transuersi
processus.

Cervix.
Dens.

κωνοειδής.
Processuū
vertebrarū
cervicis nu-
merus.

tius, quam triangulo simile. *Sextum*, cum suo pari non minimam palati, & narium am-
plitudinis portionem constituit. Situm est ad palati extremum, quæ nares in fauces, vel
narium foramina ad palatum tendunt. Inferior maxilla, quæ Græcis ἡ κάτω σιαγὼν, ἢ γένυς
nominatur. Homini vnico conformatur osse, ac in summo mēto lata est. Desinit vtrin-
que in duos processus, quasi bicornes, quorum alter infra latior, dein in mucronem de-
finiens vertice ipso tenuatur. Alter in capitulum transuersum oblongum finit. Porro
dentes, qui Græcis ὀδόντες dicuntur, plurimum numero 32. sunt, vna serie in vtraque
maxilla sedecim. Priores quatuor, quia secant, Græcis τομαίς τεμνικοί. Latinis *Incisoria* ap-
pellantur. Sunt enim acuti & lati, vt oblatum ipsis cibum mordendo cultri instar prom-
te incidant, & confringant. Vocātur etiam διχασήρες, quasi *diuisores*, quod scilicet cibum di-
uidant, & secant, atq; partiantur quicquid offertur. Et κτείνες, id est, *conciſores*, quia cibū κτείνουσι, B
id est, *conficiunt & comminuunt*. Aliis placet sic a pectinum similitudine esse vocatos. Et
γελάσσοι, quod inter ridendum nudentur, & ostendantur. Deinceps horum lateribus v-
trinque duo alii adiacent, Græcis κυνόδοντες, Latinis *canini* dicti, quod exsertis canū, qui
hos insignes habent, dentibus similes sunt. Post hos decem (ab utroque enim latere, vt
plurimum quini) Græcis ῥόμφοι, Latinis *maxillares* nominati. Sic autem a loco, cui infixi
sunt, vocatos esse constat. Alio nomine eosdem Græci μύλαι, & μυλίσται, Latini *molares*,
quod iis, veluti molis cereales fruges tenuentur, & atterantur cibi. Postremi dentes, qui
omnium sunt reconditissimi, ac propemodum gingiua operiti, a Plinio *genuini* ap-
pellantur. Postremo nascuntur anno ætatis vigesimo, sed & in senectā quibusdam, anno
nimirum octogesimo, vt lib. 5. de genera. animal. cap. ultim. & tertio de partibus eorundem au- C
tor est Aristoteles. Quo circa Græcis σφαγερισήρες, quod scilicet eo tempore, quo sapere so-
lemus, producantur: & δ-φίγνοι, id est, *serotini*, & κρατήρες, quasi *atatem perficientes ac comple-
tes*, vulgo *dentes sensus & sapientia* nuncupantur. Sinus, quibus dentes continentur, & in-
figuntur, propter similitudinem, quam cum brutorum præsepibus obtinent, Græcis
φάτνια, Latinis *præsepia*: fossulæ vero siue alueoli, quos dentes subeunt, Græcis βόσπρια, a fo-
uea similitudine vocantur. Ceterum foramina capitis, quæ multa & varia sunt, hoc loco
referre nihil attinet, quod si tamen quispiam hæc ipsa cognoscere voluerit, is ea ex capite
15. lib. 1. nostræ anatomes petat. Porro supremæ laryngis gutturi (ve parti ad linguæ radicē,
os vnitatis nomine donatum, sed variis pluribusque officulis contextum præponitur,
quod Græcis a literæ υ figura υοειδές, & υ-φίλοειδές atque a A imagine nonnullis λαμβδωειδές ap- D
pellatur. Sunt quibus, propterea quod in faucibus consistat, φασίγγατες dicitur. Constat,
vt plurimum vndecim ossibus.

De spina, & quæ huic annectuntur ossibus. CAP. III.

Spina, quæ Græcis ῥάχης, & νῶτον dicitur, ex pluribus ossibus & varie inuicem articulatis
& commissis efformata est, spinalique medullæ, quam Græci σπῆλαιον μύελον vocāt, iter
præbet, ac corporis veluti carina quædam fundamentumque est, triginta quatuor ossi-
bus, quæ Græcis σπόνδυλοι, Latinis *vertebrae*, quod *verticillorum*, quibus mulieres fusos aggra-
uant, formam referant, dicuntur. Harum vertebrarum processus in corporis posteriora
exserti, aculeoque & spinæ per similes, Græcis ἀγνῶται, Latinis *spina* nuncupantur. Ha- E
bent etiam suos transuersos processus, qui tamen peculiari nomine donati non sunt. V-
niuersa vero spina in tres diuiditur partes, *cervicem*, *thoracem*, *lumbos*, *sacrum os*, & *coccygæ*.
De quibus ordine differemus. Cervix, siue collum, quod Græcis ἀνχὴν καὶ τεράχλος dici-
tur, septenas continet vertebrae, multis, & in omnibus non pari numero, processibus
ornatas. In medio secundæ vertebræ, ex superiori mediaque sui corporis regione, pro-
cessus quidam insignis, & altus, admodumque durus & solidus enascitur, quem quod
denti, ac potissimum hominis canino, assimilatur, Græci priuatim ὀδονοειδής, id est, *denti-
formem*, & ὀδόντα, hoc est, *dentem* nominant. Alii hunc processum, quod turbinata sit fi-
gura, seu nucis pinæ formam referat, κωνοειδής: alii quod cuspidis seu nuclei pyramidisue
modo extuberet, πύεινον, & πυεινοειδής appellant. Porro vertebratum cervicis processus vn- F
decim numero sunt, duo in superiori corporis sede, vtrinque scilicet vnus, ad latus sinus,
cui incumbens vertebræ oblongum corpus insidet. Duo item descendentes, qui in-
cumbentem subeunt vertebram. Duo dein descendentes, quibus subditæ vertebræ a-
scendentes processus excipiuntur. Quatuor transuersi processus, vtrinque enim sunt
linguæ

- A** singuli, at illi rursus gemini bifidique. Vndecimus, posterior processus, seu spina dorsi Thoracis
pars thoracem constituens, quam nonnulli simpliciter Dorsum vocauerunt, Græci ve- vertebra.
ro, quod post septum transversum consistat, *μετάσποννον*, in homine quidē magna ex parte
duodecim habet vertebrae. Aliquando tamen, quanquam raro, quibusdam vel deest v-
na, vel superest, sed deesse rarius quam superesse inuenitur. Homines vero plerunque a
canibus vna thoracis vertebra superantur. Iam dictis subsunt lumborum, qui Græcis
ὀσφύες, & *ἰξύες* & *ῥοῖαι* dicuntur, vertebrae quinque. In canib. tamen & caudatis simiis plu- Lumbi.
res lumborum vertebrae existunt. Dein succedit os Græcis *ἱερόν* appellatum, Latinis *sa-* Os sacrum.
crum, quod scilicet grande, magnumque sit. Quippe veteres Græci quicquid ingens, ac
præclarum haberi volebant, *sacrum* vocabant. Dicitur etiam *πλατὺν*, hoc est, *latū amplum-*
B *que*, quod eius amplitudo facile reliquarum vertebrarum, quibus instar basis turissimiq;
fundamenti subiicitur, magnitudinem vincat. In homine plurimum sex propriis ossi-
bus, inuicem valide nexis, in simiis autem & canibus, tribus tantum, compactum est. Os
sub sacro osse locatū Græcis *ὀκκωξ*, a *forma obliquitate*, & in *mucronem ductum*, ac rubore ap- Coccyx os.
pellatur. Siquidē illi hoc ipsum ad Cuculi rostrum retulerunt. Sunt qui illud etiam *ἀρρο-*
πύριον, quod proprie *caudam volucrum* significat, nominare solent. In homine hoc os cre-
bro ex quatuor exstruitur officulis, in canibus autem e tribus. Thorax Græcis medicis *θώραξ*.
vocatur, *quicquid costis utrinque interceptum* circumscribitur. Anterior autem thoracis
pars iisdem *σῆδος*, & *σέρνον* nuncupatur. Thoracis autem ossa sunt ex spina duodecim dorsi
vertebrae, totidem costae, & os pectoris. Costae, quae Græcis *πλευρά* dicuntur, viris & mu-
lieribus ab utroque latere plurimum duodecim sunt. Rarissime enim decimatertia vi-
situr, atq; hac rarius adhuc vndecima. Septem elatiores suis cartilaginibus pectoris ossi,
& vertebrae dorsi articulantur, hinc Græcis *γνηαίαι καὶ ἀληθεῖς*, Latinis *vera, legitima, perfecta* Veræ.
que nominantur. Quinque autem inferiores solis vertebrae annectuntur, ad pectoris, ve-
ro os non pertingunt, sed in thoracis lateribus desinunt, ideoq; Græcis *ψόδαι καὶ ῥόαι*, La-
tinis *spuria & tenuiores, illegitima, imperfecta*, a recentioribus mendosae vocantur. Harum
costarum spuriarum cartilago mollis est, vnde *χόνδρι* etiam nuncupantur. Proinde fa-
ctum est, ut partes supra umbilicum utrinque ad latera iam dictis spuriis costis subiectae,
Græcis & Latinis *Hypochondria* nuncupentur. Pectoris os, quod Græcis, ut dictum est,
D *σέρνον καὶ σῆδος* appellatur, alia in quadrupedibus animantibus, aliam in homine constru-
ctionis rationem habet. Quippe in hoc tribus plurimum ossibus septē costarum utrinq;
articulationē excipientibus exstruitur, in illis vero septem constat ossibus. Primum pe-
ctoris os in homine superiori sede lunatū cernitur, & veluti foueam ostendit, quā Græ-
ci *σφαγγὴν*, Latini proprie *iugulum* nominant, vulgus *furculam* superiorē. Ossi pectoris ad
finem subnata est cartilago, quae quod obtuso ensis gladiiue mucroni similis est, Græ-
cis *ἐπίσθις*, Latinis *ensiformis & mucronata*, barbaris *malum granatum*, quod scilicet vnius
balustii apicis imagini accedat, item *scutum, clypeus oris stomachi, scutalis, cultralis*, & quod
laryngis operculi formam referat appellatur. Officulum quoddā ad basim cordis inuenitur:
vbi aortae, venae arteriosae, earundemque membranarū habentur radices. Scapula quae
Græcis *ὀμοσ*, ὀμοπλάτη, ἐπὶ ὤμων, & simpliciter *πλάτη* appellatur, Latinis etiā *Scoptulum oper-* Scoptulū.
E *tum*, & simpliciter *Scoptulum*, vulgo & Barbaris *Spatula* dicitur. Trianguli quodam modo
imaginem exprimit. Hæc duos obtinet processus, quorum superior, ac super humeri
articulum pertingens, veteribus Græcis *ἀκρόμιον* Latinis *summus humerus* nominatur. In-
ferior siue interior processus, instar antiquae Græcorum literæ σ cauus est, ob id *σγμοειδής*
nuncupatur. Aliis ab imagine, quam habet cum altera anchorae parte, quae terrae infigi-
tur, *ἀγκυροειδής* vocatur. Nonnullis vero *καρχηονειδής* quod *cornicularo stri modo incuruatur*, vo-
catur. In utrisque lateribus consistunt clauae seu clauiculæ, quae Græcis *κλείδες*, Latinis ve-
ro, *iugula & forcule* nuncupantur. Pars clauiculæ pectoris ossi cotermina, Græcis *ὠσ*.
σφαγίς dicitur. Quae autem superiori scapulæ processui articulat, *ἐπωμὴς* Græcis vocatur. *ὠσ* & *σφαγίς*.
De ossibus manus. CAP. IIII.
- F** Brachii os, seu, ut Celsus nominat, humerus, est os id, quod scapulæ & cubito articulat, *ἐπωμὴς*.
ac Græcis *βραχίον*, Lat. *brachium*, Barbaris *adiutoriū brachii* appellatur. In medio inferio-
ris humeri sedis sinus cū suis tuberib. talis prorsus consistit, qualis in trochleae rotula, ad
quae funes voluunt cernit, quod ob id humeris *rotula* vocat. Vniuersa vero pars inter brachium
humerum & brachiale sita, Græcis *πῆχυς*, ὠλένη, & ὠλεον Latinis *cubitus* nuncupat. Con-
Cubitus.

Vlna:
Radius.
Vlnæ pro-
cessus duo.
καρπῶναι,

stat autem duobus ossibus inuicem incumben-
tibus, & coarticulatis, quorum inferius, A
quod & longius est, Græcis priuatiu *πῆχυς*, Latinis *vlna*, barbaris *focile maius* vocatur. Su-
perius autem Græcis *κερκίς*, Latinis *radius*, barbaris *focile minus* nominatur. In superiori
sua sede vlna, quæ posteriorem cubiti articuli regionem constituit, duos insignes adipi-
scitur processus, quos Græci *καρπῶνας*, quod rotundi sunt (foris namque gibberosi, intus
vero caui existunt) vocant. Vnum ex anterioribus & supernis eius partibus, qui minor
est, & sinum in anteriori humeri sede ad elatiorem rotulæ regionem exsculptum spe-
ctat, suisque tuberibus illi exquisitè congruit. Alterum ex posterioribus & inferioribus
partibus ipsius, priore multo crassiorum & ampliorem, quem Athenienses *ὠλέκρανον*,
Hippocrates verò *ἀγκῶνα*, Latini, *gibberum* nominant. In inferiori sui parte vlna proces-
sum alium obtinet, quem, quia in acutū procedit, Græci a scriptorii styli, aut columnæ B
imagine *χαροειδῆ* & *συλοειδῆ* appellant. Extremæ summæue manus, quæ Græcis *ἀνέχεις* di-
citur, & a cubito ad extremum vsque digitorum aciem progreditur, partem cubito ar-
ticulatam, Græci *κέρπον*, Latini *brachiale*, barbari *Rasctam* vocant. Octo autem inter se for-
ma & magnitudine differentibus ossibus, ac duplici ordine distinctis brachiale exstructū
est. Pars autem summæ manus a brachiali ad radicem vsque digitorum deducta, Græcis
μετακέρπιον, κτῆς, κτένιον, & *ἀνδρον*, Latinis *postbrachiale* nominatur. Constat quatuor ossibus,
quæ reliquis digitorum ossibus sunt longiora. Digni autem manus, qui Græcis *δάκτυλοι*
dicuntur, numero quinque sunt, ternisque seriatim, ac velati in acie positos ossibus cō-
stant, q̄ ob id Græcis *δάκταγες*, *κόνδυλοι*, & *συνταλίδες*, Latinis *cateruæ*, *agmina aciesue*, *internodia*
& *articuli* vocantur. Hæc si singula coniungas, erant numero quindecim. Primus ac ma-
ior digitus Græcis *ἀντήχεις*, hoc est, *promanus*, quod reliquis quatuor sibi oppositis æqui-
ualeat, atque adeo pro tota manu sit, dicitur. Hippoc. hunc *μέγαν*, id est, *magnum* nomi-
nat. Latinis *pollex*, quod vi ac dignitate ceteris polleat, appellatur. Eo enim amisso om-
nes reliqui potestate interciderunt, quod absque eius ope & auxilio agere possint ni-
hil. Secundus Græcis *λίχανος* a *lingen-do*, quod meditabundus ori insertus crebro lingatur.
Latinis ab vsu *Index* nuncupatur. Tertius Græcis *μέσος*, Latinis, *medius*, *impudicus*, *infamis*
& *verpus*, a verrendo podice dictus est. Quartus Græce *ἑξ᾽ μέσος*, Latine *anularis*, quod
veteres in eo anulos gestabant, vocatur. Alio nomine *ιατρικός* Græcis, *medicus* Latinis ap-
pellatur. Quintus Græcis *μικρός*, Latinis *minimus* & *paruus*, atque *auricularis*, quod nimi- D
um eo aurium fordes expurgentur, nuncupatur. Ceterum natura manuum articulis,
veluti auctarium, securitatis gratia, vt scilicet implerēt, stringerent, ac quo minus laxa-
tioni obnoxii essent, ossicula quædam circumposuit, quæ a Sefami leguminis minuti
specie, Græcis *σισαμειδῆ*, Latinis *Sesamina* nominantur. Ea vero in singulis manibus sunt
duodecim. Duo in secundo pollicis internodio. Duo etiam, sed multo minora, impen-
siusque cartilaginea, in primis quatuor digitorum internodiis habentur. Vnum quoq;
in pollicis tertio internodio, vnumque ad exterius latus connexus ossis postbrachialis
paruum digitum sustentis ad brachiale interdum inuenitur. In reliquis vero digito-
rum internodiis rarius vnum, nisi in valde senibus inuenitur.

Decruris, & huic connexis, ossibus. CA 2. V.

SActri ossis lateribus vtrinque grande os connectitur, cui integro nullum nomen est
Sinditum. Quanquam enim continuum est, tamen in tres veluti sedes distinguitur.
Ampla enim & lata, superiorque ipsius pars, quæ ilia respicit, Græcis *λαγόναν*, Latinis
Ilium os appellatur. Media alteraque eius sedes femoris caput profundiori acetabulo
admittens, Græcis *ἰσχίον*, Latinis *coxendicis os*, & simpliciter *coxa* nuncupatur. Tertia se-
des, anteriorq;, qua in pubis regione cum alterius lateris osse committitur, insigniter-
que perforatum est, Græcis *ἦεν*, Latinis *pubis* & *pectinis os* appellatur. Femur, quod Græcis
μυῆς dicitur, os est, quod a *coxis* incipit, & ad *genua*, quæ Græcis *γόνυα* vocantur, finitur. Quippe
rotundo capite coxa inarticulatur, duobus autem capitibus grandioribus in ribiæ ossis
sinus intrat. Ad femoris ossis, ceruicem duo conspiciuntur processus: quorum alter ex-
ternum femoris latus occupat, quem Græci *μέγα τερχαντήνα*, Latini *magnum rotatorem* no-
minant, quod scilicet omnium corporis processuum nulli alteri ossi commissorū faci-
le maximus sit. Hunc etiam propter amplitudinem, & quandam cum natibus imagi-
nem, Græci *γλυτὸν* vocant. Alter minor est, multoque inferius in interno femoris late-
re, non-

Ilium os.
Coxendicis
os.
Coxa.
Pubis os.
Pectinis os.
Femur.
Genua.
Processus
femoris.
Magnus
rotator.
γλυτὸς.
Rotator
minor.

- A**re, non nihil versus posteriora conspicuus, & modice oblongus est, hacq; de causa *mi* Tibia.
nor, & interior *rotator* dicitur. Vniuersa pars cruris, quæ inter talum genuque posita est, *κνήμιν*, Latinis *tibia* nuncupatur. In ea quemadmodum in cubito, bina sunt ossa, *κνήμιν*, id est, *tibia*
quorum alterum, nempe interius & grandius totius membri nomine *κνήμιν*, id est, *tibia*
vocalur. Alterum vero, quod exterius locatum est, & interiori crassitudine admodum Fibula.
cedit, Græcis *πέδιον*, Latinis *fibula* vocalur. Anterior tibiz pars tenuis, excarnis, & insi-
gniter gibba, Græcis *κνήμιν*, & frequentius adhuc *περὶ κνήμιν*, & *ἀντὶ κνήμιν* appellatur. Poste-
rior vero pars, quæ tibiz quasi pulpa est, quod hic obiter, sed extra institutum attinge-
re placuit, *ὑπερκνήμια* Græcis, *Sura* Latinis nominatur. Ante tibiz vero cum femore ar-
ticulum os quoddam præponitur rotundum, & breui scuto non ab simile, Græcis *ἐπιμο-* Mola.
λις & *ἐπιγονάτις*, Latinis *mola*, *patella*, & *genu rotula* nuncupatur. Porro tibiz & fibulæ imæ Patella.
partes talo commissæ, exterioreque suo latere gibbæ, & nulla prorsus muscoli parte ob-
tectæ, Græcis *σφυρῶν*, Latinis *malleoli* appellantur. Sunt enim duplices, qui enim in fibula Interpretæ
eminet, *exterior*, qui in tibia, *interior* nominatur. Aliquot Latini interpretes, maximo Galeni er-
errore *σφυρῶν talos* interpretantur. Pes Græcis *πούς* dictus, sex donatur ossibus. Primum ossis.
Græcis *ἀστέρας* & *ἀστὴρ*, Latinis *talus*, vulgo *Balistæ os*, quod nucis balistæ formam refe-
rat, dicitur. Ab imis tibiz ossis, & fibulæ appendicibus, magna sui parte comprehendi-
tur. Huic alterum os, quod Græci *ἄλκων*, Latini *calcaneum*, & *calcem* vocant, omnium pe-
dis ossium facile maximum subiicitur. Tertium os posteriori sede admodum profun-
do donatur sinu, cauitatemq; naui similem obtinet, unde etiam *nauculare* & *nauiforme*, Naucula-
Catque a cymbæ imagine, *καρυοειδής* Græcis, Latinis *os cymbæ referens*, nominatur. Quar-
tum os, quod Græcis & Latinis *ταρσὶς* appellatur, non est nisi quatuor ossium, ex quibus
constat, series, quorum tria nauculari aut cymbæ referenti ossi coarticulantur: quar-
tum vero exteriusque situm, quod tessellæ cubouæ assimilatur, & ob id Græcis *κοβοειδής*
vocalur, calci iungitur. Quatuor tarsi ossibus quinque plantæ, quæ Græcis *πυδν* nomi-
natur, ossa articulantur. His quinque pedis digiti sustinentur, e quibus pollex duobus
tantum ossibus efformatur, reliquis interim tria internodia sibi vendicantibus. Quin-
etiam in pede totidem, ac in manu exigua occurrunt officula *Sesami semen* referencia. Sesamina.
Adhæc in pede, non minus quam in manu, ungues visuntur. Porro utrique palpebræ, Vngues.
quæ Græcis *βλέφαρον*, nuncupatur, vna adnata est cartilago, utrinque mollis & longa, in
Dpalpebrarum extremo, qua illæ inuicem conniunt, locata. Hinc cartilagini palpebra-
rum pili, qui Græcis *βλεφαρίδες*, Latinis *Cilia* nominantur, insiguntur. Auris cartilago iti-
dem mollis & tenuis, auris formam refert. Ab inferiori nasi ossium sede, qua hæc aspe-
ra, & latiora, quam superiori parte sunt, duæ nascuntur cartilagine, quæ deorsum in an-
teriora exporrectæ, inuicemque coniunctæ, sensim molliores euadunt, ac in nasi ex-
tremo veluti in cartilagineum ligamentum degenerant. Ab osseo item septi narium
foramina dirimente alia exoritur cartilago, quæ a tota anteriori septi sede procedens,
internæ duarum primarum cartilaginum regioni secundum ipsarum longitudinem
adnascitur. His tribus cartilaginibus aliæ duæ, utrinque singulæ, accedunt. Caput aspe-
ræ arteriæ, quod Græcis *λάρυγξ*, Latinis *guttur* dicitur, ex tribus constat cartilaginibus:
Equarum prima anterior maximaque, foris quidem gibba, intus autem caua, scuto quo-
dam modo similis prælongo, hinc Græcis *θυρεοειδής*, Latinis *Scutiformis*, Barbaris *Scutalis*,
& *pelialis* vocalur. Secunda prima minor est, & maior tertia, maximaque sui parte po-
steriorem laryngis sedem constituit, ac quantum scutiformis cartilago a perfecti circu-
li figura deficit, hoc ipsa adicit, & superiori posteriorique eius parte supplet. Hæc no-
mine destituitur, ideoque *Innominatam* appellant. Anulo autem, quem Turcæ sagittan-
tes dextro pollici imponunt, ut eius ope arcus neruum robustius trahant, similis est. Ter-
tia cartilago Græcis *ἀρύταινοειδής* nuncupatur, quod scilicet quum integra est, & membra-
na tunicave asperam arteriam intus succingente adhuc obducitur, illi ollarum parti,
qua aquam manus lauaturis affundimus, quam *ἀρύταιναν* vocant, similima sit. Membranis
Fautem suis liberata gemina esse videtur, duabusq; constituitur partibus. His tribus igitur
laryngis cartilaginibus, alia quædam mollis, & substantiæ tertiæ cartilaginis superio-
ri parti prorsus similis accedit, quæ laryngis perelegans efficitur operculum, accurate
prohibens, ne quid cibi aut potus in laryngem defluat. Hæc quidē Græcis *ἐπιγλωττις* no-
minatur, & quæ palatum respicit, gibba est & mollis, qua vero laryngi innititur, caua si-

Lingula.

γλωττις.

Error me-
dicorū lin-
gulam cum
epiglottide
confunden-
tium.Ligamentū
quid.Vſus liga-
menti
Musculus.Partes mu-
sculi tres.
Caput.
Venter.Finis.
Cauda.Συναρτη-
σις.Τένων.
Tendo.Cutis.
Στρώμα.
Cuticula.Ἐπιδερμὶς.
Carnea
membra-
na.Frontis mu-
sculosa sub-
stantia.
Musculi
palpebrarū
superioris
duo.
Oculorum
musculi se-
ptem.Buccarum
labrorū &
nasalarum
musculi
duodecim.

maque, ac multo quam superiori parte durior. Porro tertia cartilago laryngis in medio rimam efferunt tibiārum seu potius fistularū linguis, quas ori indimus, rimis similem, quæ Græcis γλωττις, Latinis *lingula* nuncupatur. Nostræ ætatis medici maximo & pudendo errore, *lingulam* & *epiglottida* inter se confundunt, quum tamen dissectionis peritis liquido constet, esse diuerſas plane corporis partes. Reliquæ asperæ arteriæ cartilagine, quæ ipsius caudicem & ramos in pulmones digestos constituunt, c vel Græcæ litteræ imaginem exprimunt.

Quid ligamentum, musculus, cutis & cuticula. CAP. VI.

Ligamentum, quod Græcis σύνδεσμος dicitur, corpus est simile, ex osse, aut cartilagine, aut quavis duriore membrana principium ducens, sensus omnis expers, durum, sed tamen cartilagine mollius, album, & ex sanguine, cauitatisque expers. Varios autem in colligando, continendo, obtegendo, & musculis constituendis in homine vſus præstat. Musculus autem, qui Græcis μῦς appellatur, pars corporis est instrumentalis, voluntarii motus instrumentum, ex ligamento in fibras plures diuiso, & carne has continente & intertextente formatum, neruorum, venarum, & arteriarum in se recipiens surculos. Constat musculus tribus partibus: principio, medio & fine. Principium quidem, quod caput musculi vocant, prima diuisio constituit. Id enim est, quod neruum maxima ex parte recipit, vel in quod inferitur neruus. Medium vero, in quo diuisionis series consistit, hoc est, vbi neruus & ligamentum in multiplici diuisione sic confusa sunt, vt vix discernantur, ventrem appellant. Qua vero parte se tandem colligunt, atque in vnum refluunt, neruorum, & ligamentorū exiles fibræ, finis, cauda, & extremum dicitur, Græci ἀναρτήσις, id est, *eneruationem*, quod fibrarum musculi citra carnis interuentum veluti coalitus existat, appellant. Alio nomine Græcis τένων, Latinis *Tendo* nominatur. Verum non omnis musculus in tendinem finit, sed in illis tantum habetur, qui longo ductu feruntur. Atque ii sane modo in teretem, modo latum, & veluti membraneum, modo breuiorem, modo longiorem desinunt. Breues autem tendine carent, & vndique carnosī sunt. Porro cutis omnium partium corporis natium tegumentum est, ac Græcis στρώμα, eo quod στερεώσις, id est, *excoriari* queat, Latinis *corium* nominatur. Huic alia tenuis cuticula, & prorsus ex sanguine obducitur supernasciturque, cœparum propemodum tenuioribus ac pellucidis respondens inuolucris. Hæc quia cutis quædam velut efflorescentia est, Græcis ἐπιδερμὶς, quasi *summa cuticula, aut extrema superficies* vocatur. Cuti per ynuerſum corpus membrana subiacer, quæ cuticula longe robustior crassiorque est, & fibris quibusdam raris, iis qui illi subternuntur musculis adheret, connasciturque, cuti vero pertinacius committitur. Hanc dissectionis periti, quod carnis fibris adaugeatur, carneam appellant. Vulgo & barbaram sectantibus medicinam *Panniculus carnosus* dicitur. Inter hæc membranam & cutem pinguedo, seu adeps, qui Græcis τιμωλίη nominatur, plurimis nascitur. Nunc breuiter musculorum numerum, eo quo ossa ordine, a musculis in capite locatis orsi commemorabimus.

De musculis caput, & eas, quæ in capite sunt, partes, mouentibus. CAP. VII.

Carneamembrana sub frontis cute, quæ σφραγισμὸς Græci vocant, carnis fibris aucta, musculosaque reddita pluresque; neruorum propagines mutuata, illam mouet. Palpebram superiorem duo tenues, lati, & membranei musculi hanc attollentes & deprimentes mouent. Vnus portionem maioris anguli, qui ad nasum est, amplectitur, palpebram ad superiora contrahens. Alter totum minorem angulum occupat, palpebram deorsum agens. Inferior palpebra plane immobilis est. Oculum septem agunt musculi, duo quidem in lateribus, singuli scilicet ad vtrumque angulum: alii autem duo, vnus quidem inferne: alter vero superne: quintus vero & sextus, vt circumactionis motui præessent, positione obliqui sunt. Septimus grandis est, & vndeunque a iam dictis occultatus, solusque neruum visorium in orbem ambit, ipsum cōstringens ac muniens. Buccas & labra quatuor vtrinque musculi agunt. *Primus*, membraneus & amplius ex vertebrarum ceruicis spinarum regionibus, deinde scapularum & clauicularū, & pectoris ossis sedib. ortu, vsque ad faciē protenditur. Cōstituitur a carnea membrana, carnis fibris ad-
aucta. Secundus similiter membraneus est, totamque eam buccarum sedē, quam inflamus, complectitur, a superiore maxilla pñatus in inferiorē inferitur. *Tertius* a maxillæ superioris osse enascitur, inque superioris labii latus implantatur. *Quartus* ab inferioris maxillæ humiliori parte ortus, in mediā humilioris labri sedē implantatur. Ceterū, vt hoc quoque obiter dicamus,

- A** dicamus, Bucca, quæ Græcis *ὤστρον* dicitur, *utrunq; flaciei latus est, quod spiritu deento inflatur.* A malis iuxta tertium iam dictum musculus carneus quidam, sed tenuis membraneusque enascitur musculus, qui in ipso modice versus priora descensu, in duas portiones partitur, vnam nasi alæ radici, alteram superioris labii parti, quæ Græcis *μύσα*, Homero *ὤστρον*, Latinis *barba superioris labii* nominatur, inferens. Alius denique in internarium amplitudine habetur musculus, ad suæ cavitatis latus externum, sub tunica illam amplitudinem succingente, reconditus. Maxillam inferiorem mouentes musculi vtrinque quatuor existunt. Primus a mandendo Græcis *μάνσorioς*, Latinis *mansorius* vel *mandibularius* dictus, ad posteriorem maxillæ inferioris sedem sub osso iuguli situs. Totus quodam modo triangularis est. vnumque eius latus versus iugalis ossis extremitatem porrigitur, alterum a malis, ad infimam maxillam retrorsum ducitur: tertium ab
- B** aure in anteriora deorsum fertur. *Secundus* Græcis *νεστωρίος*, Latinis *temporalis* appellatus, instar semicirculi primum a verticis ac frontis osse nascitur, dein in cavitatem ibi in capitis ossibus exsculptam descendit, tandemq; mansorio adeo continuatur, vt hos duos vnum esse musculum quis contendere posset. *Tertius* in ore delitescens vocatur, & ex tota cavitata sinuve exoritur, qui in ossis cuneum referentis processibus vespertilionum alias exprimentibus insculpitur, ac in internam maxillæ, vbi hæc latissima est, sedem inseritur. *Quartus* os aperiens dicitur, is sane gracilis & oblongus est, ex prominentibus temporum ossium processibus, qui styli imaginem præ se ferunt, originem ducens, inferioris maxillæ parti, vbi exasperatur, & processulos inæqualiter extuberantes obtinet, implantatur. Ossis hyoidis octo sunt musculi. Duo ex summa pectoris ossis sedenoti, & in anteriorem ac gibbam hyoidis ossis partem inserti, illud deorsum, si quando violentius tum a superioribus musculis, tum a scutiformi cartilagine fursum vellicitur, retrahunt. *Duo alii*, qui iis opponuntur, ampli, breues, a maxilla inferiori sub summo mento enati, hyoidique ossi primis contermini inserti, illud fursum ducunt. *Duo item alii* admodum graciles, teretesq;, qui ab ossis temporis processuum stylium referentium radicibus orti, hyoidis ossi inferuntur, illud in latera fursum alliciunt. Præterea duo graciles longique ex elatiori scapulæ costa orti, in hyoidis ossis regionem, in quâ prædicti inferuntur, idque deorsum vtrinque ad latera detrahunt. Musculi, qui linguam agunt, nouem. Duo quidem recti, & impense crassi, obscureque ad inuicem discreti, ex
- C** media superiori que hyoidis ossis parte orti, linguæ medio inferuntur. *Tertius & quartus* ex duobus superioribus ossis hyoidis ossiculis pronati, linguæ laterib; inferuntur. *Quintus & sextus* a capitis processibus, styli imaginem referentibus enati, linguæ radici innascuntur. *Septimus & octauus* singuli a lateribus maxillæ inferioris iuxta molarium dentium radicem principium ducunt, linguæ per longitudinem implantantur, nõ quidem prorsus in linguæ medium, sed duorum primorum musculorum latera. *Nonus* ab interna inferioris maxillæ sede iuxta summum mentum prodit, inque linguæ radicem amplam insertionem molitur. Laryngis musculi proprii duodecim sunt, quorum quatuor primam laryngis cartilaginem secundæ committentes, & laryngis rimulam arctantes, breues sunt, sed lati, tenues, & carnosi, ab inferiori primæ cartilaginis sede originē ducunt, horumque exteriores primæ cartilaginis parti priora laryngis spectati: interiores vero primæ cartilaginis humiliori sedi inferuntur. Quatuor alii secundæ tertiam committentes, rimulamque aperientes, a secundæ cartilaginis sede enascuntur, tertiæ que cartilagini implantantur. *Nonus & decimus* tertiam primæ copulantes, rimulamque claudentes, ex media primæ cartilaginis sede oriuntur, & tertiæ cartilaginis partis anteriori sedi inferuntur. *Vndecimus & duodecimus* in basi tertiæ cartilaginis consistentes, lingulamque arctantes, ex radice tertiæ cartilaginis nascuntur & in tertiæ cartilaginis medium implantantur. *Communes*, & qui laryngem vicinis colligant, octo existunt: quorum primi duo rimulam referantes ex tota propemodum inferiori hyoidis ossis sede principium ducunt, & singuli insui lateris inferiorem primæ cartilaginis sedem implantantur. Duo alii a pectoris ossis interiori regione pronati primæ cartilagini inferuntur, prioribusque contrariam actionem adipiscuntur, ac laryngem arctant. *Quintus & sextus*, a posteriori sede gulæ inuicem proximi principium ducentes, lateribus primæ cartilaginis inferuntur, lingulamque coarctant. Præter hos sex iam dictos alii duo propemodum teretes, ex media interiori ossis hyoidis sede explantati, in la-

Buccæ quid.
Quintus.
Sextus.

Maxillam
inferiorem
mouentes
musculi o-
cto.

Primus
Mansorius
Secundus
Temporalis

Tertius, In
ore delite-
scens.

Quartus,
Os aperiens.

Ossis hyoi-
dis proprii
musculi
octo.

Musculi lin-
guæ nouē.

Laryngis
musculi
1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10.

11. & 12.

Laryngis
musculi co-
munes o-
cto.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

Caput mouentes musculi primum par.

ringis operculi radicem inseruntur, id sursum attollentes, atque a cibis & potibus depressum eleuantes. Caput mouentes musculi in vniuersum quatuordecim sunt, seu septem paria. *Primum* ex quinque superiorum thoracis vertebrarum spinis enascitur, sensimque extrorsum oblique ascendens occipitis ossi inseritur. *Secundum par*, quod non duobus, sed plurimis efformari videtur musculis, ex transuersis quatuor superiorum thoracis, & quinque inferiorum cervicis processibus ortum, itidem in occipitium implantatur. *Tertium*, ex secundæ cervicis vertebræ spinæ extremo natum, in occipitii medium inseritur. *Quartum*, sub tertio occulatum, a primæ vertebræ sede, ubi aliæ in spinam desinunt, prodit, & similiter occipitis ossi inseritur. *Quintum*, ab occipitis ossis medio transuersum quodam modo descendens in apicem transuersi primæ cervicis vertebræ processus implantatur. *Sextum*, a spina secundæ cervicis vertebræ exortum in transuersum quoque primæ cervicis vertebræ processum inseritur. *Septimum par*, insignius est, atque a pectoris ossis media summa regione, & clauiculis qua illi articulantur, enatum, sursumque oblique ductum in mamillaræ capitis processum implantatur.

De musculis thoracem, & eas, quæ huic concretæ sunt, partes, mouentibus. C A P. VIII.

Thoracem mouentes musculi octogeni. Primus.

In horum musculorum numero primum occupant locum musculi thoracem mouentes, qui sunt octogeni vnus: vtrinque nimirum quadraginta, & vnus vtrique lateri communis. *Primus*, qui brevis est, sed amplius ac tenuis, a clauiculæ inferiori interiorique regione enatus primæ thoracis costæ, qua pectori committitur, inseritur. *Secundus*, ex tota scapulæ basi interiori in parte pronatus, tanquam digitis quibusdam octo superioribus costis, longe antequam in cartilagine degenerant, implantantur. *Tertius*, ex apicibus trium inferiorum cervicis vertebrarum, ac primæ thoracis vertebræ spinis membranæ latumque principium ducit, ternis veluti digitis tribus quatuor superiorum costarum interuallis sub scapulæ basi inseritur. *Quartus*, ex posteriore ossis sacri regione, & interiore illius ossis sede incipit, sursumque ad cervicem ductus duodecim costis, quæ primum a vertebra discedunt, implantatur. *Quintus*, in posterioris thoracis sede ex spinarum apicibus duarum infimarum thoracis, & aliquot etiam primarum lumborum vertebrarum spinis, membraneus latusque enascitur, ac 9. 10. & 11. costarum interuallis, ipsisque costis, ubi in interiora reflectuntur, & multo ante, quam in cartilagine degenerant, velut in aliquot diuisus digitos implantatur. *Sextus* thoracis amplitudine repositus, verarum costarum cartilaginibus, vniuersoque pectoris ossi lateri exporrigitur. Super sunt adhuc intercostales musculi, qui in 12. costarum interuallis reponuntur. Horum quidem alii *Exteriores*, alii vero *Interiores* sunt. *Exteriores* in singulis costarum interuallis consistunt, & simul atque costæ a transuerso vertebrarum processu in anteriora oblique prorepit, principium obtinent, ac fibræ a superiori costæ in inferiorem oblique in priora deorsum properantibus. *Interiores* vero contrario prædictis modo ab inferiori costæ sursum oblique in anteriora ad superiorem costam fibræ porrigunt, adeoque ad x. literæ similitudinem interfecant. Hanc fibrarum seriem interiores musculi per singula spuriarum costarum interualla retinent, & in verarum quoque interuallis, ad eam usque costarum sedem, ubi in cartilagine degenerant. Ibidem enim illico ac interni eo deuenerint, fibrarum ductum emutant. Nam a superioris costæ cartilagine in inferioris, fibræ in priora deorsum oblique protenduntur. Proinde, si istum fibrarum ductum respicias in sex legitimarum costarum interuallis, quaterni sunt musculi, adeoque priori numero 12. accedunt. In superiorum autem interuallis bini tantum numerantur. Quapropter hac ratione vnus lateris intercostales musculi quatuor & triginta existunt. His vnus vtrique lateri communis accedit, amplius & rotundus orbicularisue,

Septum transversum. Diaphragma. Præcordia. Dorsum mouentes musculi sedecim.

in medio nerueus, in circuitu vero ad insertionem carneus, quæ Græci *σάκος*, & *σάκος*, Latini *Septum transversum*, Plinius *præcordia*, quod scilicet cordi prætendantur, appellant. Græcam autem & Latinam appellationem hæc pars non alia de causa accepit, quam quod instrumenta spiritus ab alimenti organis distinguat. Ceterum dorsum mouentes vtriusque lateris musculi sunt sedecim, octo nimirum paribus complexi. *Primum par*, a quintæ thoracis vertebræ corporis lateribus incipit, & sursum oblique ad primam usque cervicis vertebram conscendens pertingit, gulæ subiectum. Hinc est, quod veteres hos duos musculos sub stomacho gulaue latitantes nominasse videantur. *Secundum par* a prima thoracis costæ carnosum amplumque pronascitur, sensimque arctatum internæ transuersorum omnium cervicis vertebrarum processum sedi implantantur. *Tertium*,

Musculi sub stomacho latitantes.

ex trans-

- A** ex transuersis sex superiorum thoracis vertebrarum processibus exoritur, & pertinaciter admodum externæ sedi transuersorum ceruicis vertebrarum processuum inferitur. *Quartum*, a septimæ thoracis vertebræ spinæ radice, & omnium succedentium vertebrarum spinarum radicibus oritur, & in totam inferiorē spinæ secundæ ceruicis vertebræ inferiorem sedem validissime implantatur. *Quintum*, ab ilium ossis cavitatis posteriori superiori que sede pronascitur, atque in transuersos lumborum vertebrarum processus, & infimam thoracis costam inferitur, figuraque triangulum est. *Sextum*, ex longioribus totius corporis est musculus, ab infima sacri ossis sede incipiens, & deinde ex spinis quinque vertebrarum lumborum, nerueo valido que admodum principio enascitur. Hinc sursum conscendens, carnosus paulatim ad externum ipsius latus efficitur, tandemque longe arctius redditum, transuersis omnibus thoracis processibus innixum, singulis ex interna sua sede, tendinem instar ansulæ cuiusdam insertum dispergit. *Septimum*, sub sexto occultatum, a posteriori sacri ossis sede acutum principium ducens, ac sursum ascendens modice latius redditum, ad vndecimæ thoracis vertebræ spinam, in acutum finitur angulum. *Octauum*, ab vndecima thoracis vertebra ad primā vsque ipsius protenditur, totam spinarum amplitudinem, quæ ab ipsarum radice ad apicem vsque consistit, amplexans, illis ita committitur, vt septimum par illis, quibus adnascitur, spinis. Scapulam mouentes muscoli vtrinque quatuor existunt. *Primus*, ex secunda, tertia, quarta, quinta, & interdum sexta superioribus thoracis costis, paulo antequam in cartilagineas finiant, enascitur, & tandem in latum nerueumque tendinem cessans, trianguli modo in internum scapulæ processum, ancoræ imaginem referentem, inferitur. *Secundus*, raram præter ceteros corporis musculos figuram foritur. Ab occipitio transuersa linea, quæ ab eius ossis medio versus auris porrigitur radicem pronatus, in scapulæ spinam, summumque humerum, & clauiculæ portionem, eius nimirum partem latiore, inferitur. *Tertius*, validus a transuersis superiorum quinque ceruicis vertebrarum processibus exortus, lata sed carnea insertione in internam superioris anguli scapulæ basis sedē inferitur. *Quartus*, amplius & tenuis, sed omni ex parte carneus, a quinta, sexta, & septimæ ceruicis vertebrarum, ac trium primarum thoracis vertebrarum spinis principium ducens, toti propemodum scapulæ basi carneus implantatur. Abdominis, quod Græcis *ἐπιδείμιον* dicitur, muscoli in vniuersum sunt octo. Obliqui quatuor: in vtroque enim latere bini, qui inuicem incumbunt, & contrarias seque mutuo decussatim, seu ad similitudinem x Græcæ literæ inrersæcantes fibras obtinent. Superiores enim fibræ deorsum versus priora oblique procedunt, quem huius fibrarum ductus gratia *Descendentem* vulgo nominant. Inferiores vero fibræ sursum oblique ad anteriora tendunt, qui ob id *Ascendens* vocatur. Rectorum ab vtroque latere vnus est, qui cum fibras secundum corporis longitudinem extensas habeat, rectus appellatur. Transuersus similiter vtrinque vnus est, cui id nomen *quod eius fibra secundum corporis latitudinem, aut a dextris ad sinistram ferantur*, inditum est. Penem quatuor mouent muscoli, quorum duo carnei quidem, ab anteriori sede muscoli rectum intestinum orbicularim amplectentis enascuntur, sibi inuicem proximi, & internis lateribus mutuo committuntur, rectaque sursum in priora ad vrinarii meatus, sub illis corporibus, ad superiora reflexum ascendentes, eius meatus lateribus inferuntur. Alii duo vtrinque habentur, singuli ab appendice ossis coxendicis, paulo inferius quam penis corpora principium ducentes, quod carneum & gracile est, & vtrinque oblique sursum procedentem efficit musculum, qui carnosus permanens sui lateris corpori non procul ab exortu implantatur. Ceterum ad vnumquemque testem singuli graciles admodum muscoli pertingunt, ex ea vasorum seminalium, & testis tunica, quæ a peritonæo principium ducit, ciformati. Hæc enim in posteriori ipsius sede in ipso a peritonæo exortu longis aliquot, rectilve, acinuicem sibi proximis carneisque fibris adaucta, formam & naturā gracilium, & oblongorum musculorum exprimentibus, qui tandem iuxta infimam semen deferentis vas sedem inferuntur, Græcisque *σπερματικὸς* dicuntur, quod scilicet horum ope testes viriles obscure ac modice sursum vellantur, ne plus aquo laxati & ad anteriora pendentes nimio oneri seminalis vasis sint. Pari modo membranæ vteri firmantes vtrinque carneis augentur fibris, exilium regionibus deorsum oblique ad vteri latera perreptantibus, hacque ratione vterus vtrobiue vnum possidet musculum, illis specie similem, quo viri testes donantur.

Musculi tur. Vesicæ virilis ceruici vnus orbiculatim obnascitur musculus, qui oblongi anuli, aut **A**
muliebris oblongi rotundique meatus effigie exprimit, & iuxta glandosum corpus superius cras-
uteri. sior, quam inferius est. In mulieribus vero, quarum vesicæ ceruici eiusmodi corpus glan-
Vesicæ viri- dosum non adnascitur, musculus totum meatum ambit, qui a vesicæ corpore in supe-
lis museu- riorem sedem ceruicis uteri non procul a pudendo subingreditur. Recti intestini extre-
lus. mum finemue circulatim vnus ambit musculus, immaturæ inuoluntariæq; excremen-
Muliebris torum egestionis præfectus. Siquidem eius intestini orificium stringit, ideoque Græcis
vesicæ mu- σφιγκτηρ, quasi *constrictor* nominatus est. Duo alii musculi a ligamentis ex pubis ossibus, &
sculus. coxendicis ossæ, & sacro exorti, ipsaque demum peritonæi infima sede enascuntur, qui
Recti inte- deorsum protensi rectum intestinum amplexantur, extimæ tertiæue ipsius tunicæ in-
stini muscu- ferti, post egestionem protusum recti intestini finem alacriter sursum reuellant. **B**
li tres.
σφικτῆρ.

De musculis manuum mouentibus. CA. 2. IX.

Brachium mouentes musculi vtrinque septem sunt. Primus, in media clauicula sede pe-
mouentes **pectoris ossis proxima, & pectoris ossis latitudine, & ipsi insertis cartilaginibus enascitur, sensimq;**
musculi se- quodam modo in angulum arcuatus, in acutum tantisper procedit, donec amplo & nerueo, admodum-
ptem. que robusto, sed breui tendine humero secundum ipsius longitudinem inseratur. Secundus ex media
 1. clauicula parte secundum ipsius longitudinem, quæ scapulam spectat, & summo humero, ubi is clavi-
 2. cula committitur, totaque scapula spina principium nerueum sumit, qui vix bene pronatus ilico car-
 3. nosus efficitur, itaque permanens sensim in angustam, tanquam in trianguli verticem tantisper por-
 4. tigitur, donec humero tendine amplo robustoque ad humeri ossis latitudinem, non modice sub ipsius
 5. ceruice implantatur. Vniuersus hic musculus trianguli imaginem præ se fert, adeoque figura Δ non absimilis
 6. est, unde Græcis δελτοειδής est nominatus. Tertius carneo principio ex humiliore scapula costa prodit,
 7. modiceque sursum in priora tensus humerum accedens, in validum breuemq; sed latum tendinem cessat.
 8. Quartus, magnus latusque est musculus, qui a spinarum apicibus, quæ a sexta thoracis vertebra spi-
 9. na ad sacri ossis usque medium habentur, principium sumit, dein vniuersus auctus in angustum tan-
 10. tisper procedit, donec tendine lato, valido, sed breui, humero implantetur. Hic itidem musculus tri-
 11. angularis est, sed plane inaequalibus costis conformatur. Quintus vniuersum sinum, qui inter su-
 12. periores scapula costam, & ipsius spinam est occupat. Procedit enim a scapula basi, & omnino car-
 13. nosus totam scapula cavitatem implet, tandemque in amplum validumque cessans tendinem, arti-
 14. culum humeri ad scapulam superat, eiusque articuli ligamento pertinacissime inseritur. Sextus con-
 15. cauam internamque scapula sedem opplet, ex basi totius scapula ortus, & in trianguli verticem tan-
 16. tisper arcuatur, dum amplo tendine interiori articuli regioni implantetur. Septimus vniuer-
 17. sum scapula gibbum, quod sub ipsius spina habetur, implet. Carnosus ex scapula basi exoritur, dein
 18. arcuatur articuli ligamento amplo & breui tendine inseritur. Cubitum duo vtrinque flectunt
 19. musculi, quorum vnus & anterior, duobus validissimis, & mutuo distantibus principiis exori-
 20. tur: vno quidem nerueo, & ad amussim tereti ab elatiori ceruicis scapula sede: altero a radice in-
 21. terioris processus scapula, qui anchoræ assimilatur: ex duobus autem illis principiis efformatus, paulo
 22. supra cubiti articulum neruosior excarnisq; redditus, in robustum, & crassum, & ad amussim tere-
 23. rem finit tendinem, qui articulo expansus, in interiori radii partem modice latefcens implanta-
 24. tur. Secundus siue posterior, a brachii ossis exteriori latere carneo latoque principio, quod bicor-
 25. ne est, enascitur, sensimque in priora humeri tendens, tandem anteriori vlnæ & radii sedi ampla im-
 26. plantatione inseritur. Hic quidem musculus sua sede, quæ cubiti articulum transcendit, montis spe-
 27. ciem appositissime repræsentat. Extendunt autem cubitum tres musculi, quorum quidem
 28. primus valido, lato, ac nerueo principio ex humiliori scapula costa non procul ab eiusdem ceruice ex-
 29. oritur. Alter a brachii ossis ceruicis posteriori sede enascitur. Hi certe musculi in descensu inuicem
 30. conuascuntur, ut integrum tibi sit vniuersum musculum, aut vnum dicere, aut duos statuere. Ter-
 31. tius a media fere longitudine brachii exortus, duobus iam dictis ita commiscetur, ac coit, ut nullo
 32. prorsus pacto in hominibus discerni queant: simul autem cum illis tandem validissime in exter-
 33. num latus posterioris vlnæ processus partim carneus, partim nerueus inseritur. In interna cu-
 34. biti sede gracilis reponitur musculus, qui ab interno ossis brachii tuberculo pronat-
 35. us, in latum degenerat tendinem, internæ summæ manus cuti magna ex parte
 36. ad extremam usque digitorum aciem subnatus. Huius beneficio ea cutis minus ver-
 37. satilis, & circumacta pertinax, ac proinde ad tangendum aptior redditur. Radius
 38. in

Brachium
mouentes
musculi se-
ptem.

Deltoideus.

Cubitum
flectentes
musculi
duo.

Cubitum
extendentes
tres.

Musculus
vnus ner-
uosa sua ex-
ilitate me-
dia vlnæ, &
internæ di-
gitorum cuti
subnatus.

- A** in prouum duobus ducitur musculis. Vno quidem inferiore, qui ex tota amplitudine interioris vlnæ sedis enascitur, qua brachiali proxima est. Hinc carneus ad anteriorem radii regionem transuersim procedens ipsi adhuc carneus inseritur. Hic ad amussim quadratus est. Altero superiore, qui ex interiori vlnæ latere, qua humero articulatur, carnofo validoque principio oritur. Hinc admodum oblique internam radii sedē conscendens, carnea insertione antē medium ipsius longitudinis implantatur. In supinum vero radius aliis duobus musculis fertur. Vno quidem longe, ab externa humeri regione longe supra exterius eius tuberculum pronato, hinc deorsum expanso, radioque infrato, & ad eiusdem finem, cui brachiale articulatur, procedente, lato tendine radii appendicis superiori regione inserto. Altero ab exteriori cubiti articuli regione ad mediam radii longitudinē oblique exporrecto, ibidemq; inserto. Brachiale quatuor præcipuis vtrinq; agitur musculis, quorum primus ab interno humeri tuberculo ex carnea nerueaque substantia mistum principium assumit, tandemque in validum & quodammodo teretem tendinem cessans, inferiori quarti brachialis ossis sedi implantatur. Secundus itidem ex interiori humeri tuberculo enascitur, radio exporrectus in postbrachialis ossis, quod indici præponitur, radicem inseritur. Tertius ab exterioris tuberculi humeri radice pronatus, ac vlna exporrectus in postbrachialis os minimum digitum sustinens insertionē molitur. Quartus longe supra exterius humeri tuberculum oritur, & bifido tendine in postbrachiale amplius insertionibus implantatur. Vna quidem pars in radicem ossis indicem sustententis altera in radicem, cui medius innititur digitus, inseritur. Digitos manus mouentes musculi sunt vigintiocto. Primus ab interiori humeri tuberculo principium sumit, tandemq; ante brachialis radicē in quatuor exactos tendines discinditur, qui secundis quatuor digitorum internodiis inseruntur. Secundus ab eadem sede cū primo, sed magis declinuis originem ducit, primosq; substernitur, ac in quatuor tendines dirimitur, qui primi musculi tendinib; subiecti ante secundi digitorum internodii radicē eos tendines findunt, ac perforant tandemq; in quatuor digitorum tertia ossa insertionē moluntur. Tertius ex vlna sede, qua hac radii capitulum in proprium sinum amplectitur, ac ubi radius ab vlna primum dehiscit, enatus, tandem tertio pollicis ossi articuloque inseritur.
- Tertium musculum in serie alii tredecim numero subsequuntur, in extrema manu repositi. Horum octo, qui quatuor digitis seruiunt, recta secundum postbrachialis longitudinem digitos addunt, ac lateribus interiori in sede primorum ossium inseruntur. Duodecimus ex superiori transuersi brachialis ligamenti sede carneus enatus, primi pollicis ossi inseritur, perquam obscure secundum pollicis internodium contingens. Decimustertius ex transuerso quoque ligamento, & osse brachialis pollicem fulciente pronatus, in primi pollicis ossis radicem implantatur. Decimusquartus ex postbrachialis osse, cui medius innititur, principium ducit, & membraneo tendine secundi pollicis lateri, quod indicem spectat, se inserit. Decimusquintus ex media sede postbrachialis ossis, quod medio præponitur digito, originem ducit, & in medio interioris partis secundi pollicis internodii insertionem tentat. Decimusextus ex postbrachialis ossis, quo anularis sustinetur, radice principium sumit, & lateri interiori secundi pollicis internodii versus priora implantatur. Decimusseptimus ab elatiori sede externi humeri tuberculi enascitur, & in tres, ut plurimum aut quatuor tendines degenerans, tādē indici, medio, ac anulari præcipue implantatur. Decimus octauus gracilis longusq; est, ab exteriori humeri tuberculo ortus, in duos partitur tendines, quorum vnus ad paruum, alter ad anularem digitum contendit, ac illorum primo ossi inseruntur. Decimus nonus duob; iam dictis substratus, ab vlna osse ultra medium ipsius longitudinis enascitur, non procul a brachialis sede, & in duos inuicem coherentes tendines diductus, vnum, nempe superiorem exteriori indicis, alterum medii lateri inserit. Vigessimus brevis, sed validus, a quarto brachialis osse pronascitur, & externo postbrachialis ossis paruum sustententis digitū lateri exporrectus, primo eius digiti ossi, implantatur. Vigessimus primus ab vlna exteriori sede, & iuxta medium longitudinis cubiti enascitur, versus radium oblique repit, & in tendinem finitur, qui externo lateri exterioris pollicis regionis indicem spectantis vsque ad tertium articulum inseritur. Vigessimus secundus ab vlna paulo superius, quam iam dictus prodit, & oblique super radium conscendens illi insternitur musculo, qui bicorni tendine brachialis inseritur: ubi in duas portiones scissus, vna, eaque superiore, in tendinem quodam modo teretem cessat, exteriorique brachialis ossis pollicem sustententis sedi implantatur. Altera vero portio in duas dirimitur partes, quæ singula in tendinem finiunt, quorum vnus in primi pollicis internodii radicem inseritur: alter vero in secundum & tertium pollicis os implantatur. Vigestimustertius ex anteriori sede ossis brachialis, cui pollex innititur, principium ducit, ac deorsum protensus, primo pollicis ossi membraneo tendine inseritur. Vigessimusquartus ex inte-

Radium mouentes musculi quatuor.

Brachiale agētes musculi quatuor vtrinque.

Digitos manus mouentes vigintiocto.

Tredecim post tertium ordines.

4.5.6.7.8.9.10.11.12.

13.14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25. 26 27.
28.

riore latere ossis postbrachialis inuicem suffulcientis enatus, toti externo lateri primi pollicis ossis inseritur. Superiunt adhuc quatuor muscoli teretes & graciles, singulis quatuor secundi digitos mouentium muscoli tendinibus, qui quatuor digitorum tertium os flectunt, exportecti. Enascuntur autem ex membraneo inuolucro tendines illos induente. Hinc simul singuli cum singulis tendinibus ad digitos procedentes, in digitorum radicem, primum nimirum os, inseruntur, ad internum eorundem latus versus interiora insertionem membraneam moluntur.

De musculis cruris mouentibus. C A P. X.

Femoris
musculi
decem.

Femur decem propriis agitur musculis. Primus ab ilium ossis extrema sede, & coccygis ossis posteriore regione, velut ex semicirculo enascitur, tandem in latum validumque, finiens tendinem, posteriori magni femoris processui sedi, & eius quoque radici ampla insertionem innascitur. Secundus sub primo magna ex parte reconditus, ab anteriori superiori que ilium ossis spina regione pronascitur, & membraneo, sed valido tendine elatiori magni femoris processui sedi implantatur. Tertius, secundo longe minor ac sub ipso prorsus occultatus, ab ilium osse iuxta posteriorem coxendicis acetabuli sedem, lato & semicirculari principio enascitur, ac lato robustoque tendine maiori femoris processui inseritur. Quartus, a lateribus trium inferiorum sacri ossis vertebrarum, quibus ilium ossa non coarctantur, principium sumit, & tereti tendine posteriori maiori femoris processui sedi implantatur. Quintus omnium corporis musculorum maximus, pluribus partibus a coxendicis ossis appendice oritur, qui in miram ventris amplitudinem dilatatus, deorsum recta per femoris posteriora fertur, donec denuo gracilescens, tertiam tendinem in internum femoris caput inserat. Sextus ex undecima & duodecima thoracis, & prima, secunda, & tertia lumborum vertebrarum lateribus principium ducit, tandemque in validum & teretem tendinem cessans, interiori seu minori femoris processui implantatur. Septimus ex tota interioris ossis ilium regione, tanquam ex semicirculo carneus enascitur, & in tereti cessans tendinem minori femoris processui, praedicto nunc tendini proximus inseritur. Octauus a pubis ossis ortus, breui sed amplo tendine sub minori femoris processui inseritur. Nonus totum pubis exterius foramen contegit, amploque tendine in magni femoris processui sinum insertionem molitur. Decimus posteriorem interiore foraminis iam dicti sedem occupat, ac velut

Tibiam
mouentes
musculi
nouem.

aliis musculis hinc pronascentibus auctus, maiori femoris processui implantatur. Tibiam mouentes musculi nouem. Primus ab anteriori ossis ilium spina sede, aut ab ilium ossis appendicis anteriori extremo enascitur, & in anteriorem tibia sedem ad amussim tereti tendine inseritur. Secundus a pubis ossis pronascitur commissura, deorsumque per femoris interiora descendens, sensim gracilior euadit, in exactumque, ac teretem finiens tendinem, eadem sede cum primo inseritur. Tertius ab elatiori & posteriori ossis coxendicis appendicis sede nerueus, gracilisque, enascitur, tandemque in teretem degenerans tendinem, eadem regione, qua praedicti insertionem molitur. Quartus ex eadem sede coxendicis ossis pronascitur, & portionem suam a femoris osse in descensu assumens, tibia cum fibula articulo, sed potissimum fibula, inseritur. Quintus a coxendicis ossis appendice sub tertii & quarti musculi capitibus principium ducit, inque teretem cessans tendinem in anteriorem tibia sedem cum tribus primis, verum minus decliuus implantatur. Sextus ab ilium ossis spina enascitur, membranaceo modo musculis os femoris amplexantibus obducitur, tandemque in anteriorem tibia sedem, & externum illius latus inseritur. Septimus ab externo femoris ossis latere pronascitur, totam radicem magni femoris processui in orbe amplexus, ac paulo supra patellam in amplum tendinem desinens, qui octauo & noni tendinibus commissus, simul cum illis patellam apprehendit. Octauus a femoris ossis ceruice exoritur nerueus, a femoris quoque magni processui radice ipsius portio enascitur, tandemque in latum validumque cessans tendinem, totam patellam amplectitur. Nonus ex ilium ossis tuberculo supra ipsius cum femore articulum originem sumit, & septimo, & octauo musculo instratus, ad anteriorem genu regionem fertur, ac in tendinem degenerans, cum tendinibus septimi & octauo musculi permixtus validissime in anteriorem tibia sedem implantatur. Qui in poplite latitat musculus, ab externi genu articuli ligamenti posteriore sede pronascitur, & oblique deorsum versus interiora descendens, in tibia os ampla & prolixa insertionem implantatur. Pedem mouentes musculi nouem sunt.

Musculus
in poplite
occulta-
tus.
Pedem mo-
uentes mu-
sculi nouem.

Primus ab interno femoris capite iuxta genus articulum unico enascitur principio. Secundus ab externo capite principium ducit. Verique musculi suo venire posteriorem sura molem, illic promouentes, efformant. Tendo autem ab utrisque enatus cum quarti pedem mouentis tendine congruens, in posteriorem calcis sedem inseritur. Tertius insigniter gracilis est, ab externo quoque femoris capite enatus, & in poplitis regione in tenuissimum tendinem assinaens, calcis ossis interno lateri implantatur. Quartus pedem mouentium suramque constituentium, ac tibiam complexantium ma-

Aximus est, a posteriori sede fibula cum tibia coarticulatione nascitur, & paulo supra calcis regionem in
validissimum tendinem desinens, cui duorum primorum tēdo vnitur, simul cum ipso posterioris cal-
cis sedi inseritur. Quintus a tibia osse ac fibula, qua hac ossa inuicem dehiscere incipiunt, exoritur, &
& iuxta interioris malleoli posteriora tendinem educit in tarsos, quod cubum tesseramque imitanti
ossi proximum est implantatum. Sextus in anteriori tibia sede positus, ab anteriori sede coarticula-
tionis fibula cum tibia enascitur, tendinemq; in radicem ossis pedii pollicem sustentis inseritur. Se-
ptimus a fibula principium ducens, externum tibiae latus occupat, ac tendinem sub pedis inferiora re-
flexum, pedii ossis pollicem sustentis radici inserit. Octauus sub septimo excepta tendine ipsius an-
teriori sede prorsus occultatur, atque ex fibula superiori appendice enatus, in teretem cessat tendinem,
qui radici ossis pedii paruum digitum sustentis implantatur. Nonus portio est eius, qui in ante-
riori tibia sede locatus, quatuor pedis digitos extendit, iuxta medium tibiae longitudinis externo
ipsius latere pronascitur, & ad medium fere longitudinis ossis pedii ante paruum digitum positi
inserirur. Pedis digitos mouentes muscoli sunt decem & octo. Primus totam infernam
pedis sedem seu plantam occupat, & infima parte membranam impense crassam, & lato in manu
tendini non ad similem pertinaciter obnatam possidet, atque a calcis ossis inferna sede enatus, secun-
dis quatuor digitorum internodiis singulos tendines offert. Secundus posteriorem tibiae sedem per-
reptat, ab eoque osse pronatus, tendinem in plantam mittit, a quo exigua portio tendinibus com-
miscetur indicis & medii tertium internodium flectentibus: reliquis autem totus in secundum pol-
licis os inseritur. Tertius itidem in tibia posteriori sede locatus, a fibula ad tibiae nexu pronascitur,
& quum ad calcem fere descendit, atque adhuc latus conspicitur ab interno ipsius latere teretem pro-
mit tendinem, qui modice dilatatus in alios quatuor tendines digeritur, singuli ad vnum quatuor
digitorum excurrētes, illisq; manus tendinibus, qui teniū quatuor digitorum internodium flectunt;
respondentes. Decem muscoli iam dictis succedunt, qui insigniter mutuo implexi sunt,
ac pedii ossibus adnati, secundumque eiusdem longitudinem ducti, & illius quoque
interualla opplētes, vtrinque ad primi internodii latus versus interiora insertionem mo-
liuntur. Decimus quartus, cuius partem nonum pedem mouentium esse diximus, a tibia anteriori
sede pronatus, & sub sexto pedem mouentium musculo occultatus, a tibia osse, qua fibula sub genu ar-
ticulo connectitur, nerueum sumit principium, ac tandem in quatuor tendines dirimitur, qui qua-
tuor digitis inserantur. Decimus sextus in superiori pedis sede reponitur, & huic regioni p longitu-
dinē obducitur. Carnea est moles in quatuor diremta tendines, quorū vnus pollicis superioris sedis ex-
terno lateri, secundus indicis, tertius medii digiti, quartus annularis inseritur. Decimus septimus in ex-
terno latere pedis reponitur, ab externo calcis ossis latere nerueo principio ortus, & externo lateri pri-
mi ossis parui digiti implantatur. Decimus octauus interno lateri, secundum totam ipsius longi-
tudinē protenditur, & tandem in teretem degenerans tendinē externo lateri prioris pollicis articuli
inserirur. Ceterū in plāta pedis carnea cōsistit moles in quatuor grāciles dissecta portio-
nes tēdinib; adherētes, quorū ministerio tertia quatuor digitorū ossa flectūtur. Quod si
itaq; hāc molē vnus loco musculi numeraueris, decē & nouē tū erūt omnes pedis digi-
torū in homine muscoli. Sin quatuor musculorū loco hāc habueris, duo & viginti erūt.

De ligamentis. CAP. XI.

Omnibus articulis orbiculatim ligamentum ab vno osse in aliud, aut in cartilaginē,
vel a cartilagine in os, aut cartilaginē priuatim insertum obducitur. Quibusdam
etiam, at paucis, articulis ligamenta accesserunt peculiaria. In capitis n. articulo teres quoddam
a dente secundae ceruicis vertebrae in occipitis os ducitur, & secundum dentis postero-
rem sedem in prima vertebra, vnum transuersim fertur vertebrarum corpora ligamen-
tis admodū cartilagineis, quae Galeno *ῥαχιδνὸν ὀστέον* vocantur, cōmittuntur. Ascē-
dentes vero & descendentes earundem processus validis quoque, sed tantum ambien-
tibus colligantur. Deinde in spinarum interuallis membraneum consistit ligamentum,
sicut in cubito & tibia, vbi ossa inuicem dehiscunt. Praterea in pubis ossium foraminibus
huius generis occurrit ligamentum, seu potius membrana. In humeri articulo tria pe-
culiaria visuntur, quorum primum teres est, & ab interno scapulae processu enatum in
extremum humeri caput fertur. Alia duo ab elatiori ceruicis scapulae sede pronata, in
idem caput pertinent, & vnumquodque hic ab interno scapulae processu in summum
humerum ducitur. In brachialis ossium inter se & cum postbrachialis ossibus connexu,
vt & in pede, passim cartilaginea ligamenta interueniunt. A sacro osse duo teretia in co-
xendicis os pertinet. Ex femoris superiori ca. teres ligamentū in coxendicis acetabulū

inferitur. In genu articuli medio cartilagineum consistit ligamentum, & deinde in posteriore ipsius sede, & vtrinque ad latera vnum. Ex ligamentorum autem transuersim tendinibus obduktorum, tendinesque ne sua sede declinent continentium numero, in interna brachialis sede vnum continuum habetur. Iuxta brachialis radicem in externa radii & vlnæ sede sex occurrunt. In anteriori tibiæ sede iuxta talum vnum obseruatur. Tria inter calcem internumq; malleolum: vnum inter calcem & externum malleolum. Insuper in interna inferioriue pedis digitorum sede huius etiam generis ligamenta videntur.

De partibus nutritioni famulantibus. C A P. XII.

Peritonæum. Commune omnium instrumentorum nutritioni seruientium inuolucrum Græcis, & Latinis ab iisdem inuolato nomine *peritonæum* dicitur. Sic autem nominatum est, quod iam dictis partibus omnibus circumtendatur. Neque certe simpliciter *περιτόναιος*, & *περιτόνιον* tantum appellatur, sed a nonnullis tota hæc appellatio inditur *περιτόναιος ὁμήν*. A quibusdam autem *περιτόναιος χιτών*. Sunt, quibus etiam *περιτόναιον στέπασμα* nominatur. Arabibus *Ziphac*, & *Zimphac* nuncupatur. Est vero peritonæum *membrana tenuis, latis araneorum telis simillima, nullis fibris intertexta, oblongum cui instar utrem referens, nutritionisq; organa, ventriculū nimirum, intestina, omentum, mesenterium, iecur, lienem, renem, utranque vesicam, uterum, & vasa demum quæcunque inter septum transuersum, & crura sunt, amplectens*. Omentum Græcis *ἐπίπλοον* & *ἐπίπλαν*, quod scilicet ventriculo, & intestinis incubat, & quasi innatet, dictum, membrana est nullis fibris implicata, simplexque, sed multis venis, arteriis, & nervis abundans, marfurpiique aut sacculi, aut peræ imaginem referens. Ab errabundo autem venarum ductu, quæ funiculi ritu implicantur, Græcis alio nomine *γαγγαμὼν* & *σπλην*, vulgo *rete* & *reticulum*. Mauritanis & nostræ ætatis, qui illorū placita sectantur, Medicis, *Zirbus* vocatur. Inferior omenti membrana posteriori ventriculi sedi substrata, priuatim glandosum quoddam corpus impense magnum obtinet: quod in carnibus rubet, simplicisque carnis speciem quodam modo refert. Græcis *καλλιπρεπς*, quod scilicet *e-sui sit iucundum*: & *πάγκρεας*, quasi *totum carneum*, quod ex carne glandulosa contextum sit, appellatur. In homine autem hoc corpus album magis, quam rubrum cernitur. Via, quæ cibum in ore effractum, ac potum ad ventriculū defert, Græcis proprio nomine *δισπαράγος*, communi autem, *σείμαχος* dicitur. Quippe Græci omnem angustum ductum, seu collum isthmi instar alicui ampliori ventri cavitatiue præpositum, *σείμαχος* nominant, Latinis *gula*, Arabibus *Meri* appellatur. Cicero & Celsus stomachi vocem, pro gula usurpant. Porro ut stomachi gulæue cavitatem semper humecta, ac velut vncta esset, glandulas natura adiunxit, alias quidem ad fauces, stomacho & laryngi communes, quæ Græcis *παρόσθια*, Latinis tonsillæ, ut suo fufius dicetur loco, vocantur: alias binas in medio prope modum stomachi ductus connexit. Ventriculus, qui Græcis *γάστρ*, & *κοιλία* dicitur, quod ab ore delatum est, concoquit, ac velut in lacteum succum insita facultate permutat, ut suo in loco plenius docebimus, & eadem per alterum ac inferius eius orificium, ex elatiore sede dextri ipsius lateris exortum, ad intestina transmittit, vnde etiam Græcis *πίλωρος*, nobis autem *Ianitor* nuncupatur, Barbaris *Portonarius*. Duo enim sunt ventriculi orificia. Vnum, quod iam dictum est. Alterum quod in fine gulæ ac elatiore ventriculi parte est, & Græcis *ὑπερστία*, Latinis *superius ventriculi os* vocatur. Intestina, quæ Græcis *έντερες* dicuntur, bifariam diuiduntur, in gracilia nimirum & grassa. Gracilia tria sunt numero. Primum ab inferiori ventriculi orificio recta quodammodo eoque descendit, vbi intestina in anfractus orbefque primum conuolui incipiunt. Hoc intestinum, quia duodenum digitorum longitudinem in viro, ut plurimum, æquat, ideo Herophilo potissimum, & aliis Græcis *δωδεκαδάκτυλον*, Latinis, *Duodenum* dictum est. Sunt qui non intestinum, quod in nullos anfractus ducatur, sed *ἐκκυσ*, id est, *exortum* seu *processum potius intestinorum* appellant. Huic intestino meatus flauam bilem ad intestina deferens, implan-tatur. Secundum illic incipit, vbi primum in anfractus gyrosue conuoluitur, & vñtis Græcis, *Ieiunum* Latinis, quod inter disseandū reliquis intestinis inanius, & magis vacuum reperiatur, vocatur. Tertium Græcis *λεπτόν*, Latinis *tenuē* aut *gracile* nominatur. Hæc tria gracilia intestina, Plinio lib. 11. c. 12. auctore, in homine & oue *Lactes* nuncupantur. Grassa itidem tria a nonnullis numerantur. Primum est, in quod tenuioris terminus cessat, omnibus ceteris in homine breuius, atque arctissima omnium intestinorum parte multo

- A** multo angustius strictiusque, & crassiori lumbrico in orbem conuolutum, potius quam intestino simile existit, ut appendicis verius, quam intestini loco haberi possit, & vno tantum ore donatur, ideoque Græcis τυφλόν, Latinis *cæcum*, aliis, barbaris nimirum medicis, *monoculum* appellatur. Alterum est, quod a dextro ilio super dextrum renem sub iecoris cauo, dein secundum ventriculi fundum ad lienem properat, & hinc rursus super sinistrum renem versus pubem fertur, ac alium anfractum supra internam ossis ilium sedem faciens, ad sacri usque initium prorepat. Hoc Græcis κάλον, ἀπὸ τῆς καλῆς εἶδος, hoc est, a *torquendo*, appellatur. Quippe immensi in eo, ubi pituita aut crasso spiritu obstructum fuerit, dolores excitantur. Tertium, quod ab osse sacro ad anum usque recta deorsum fertur, Græcis ἀνδρουμένον, & δέχον, Latinis *longæon*, vel *longænon*, *Rectum*, *anus*, & *podex* nominatur. Ad posteriorem intestinorum sedem locatum est vinculum, dura membranaeque substantia constans, cuius beneficio intestina ad dorsum colligantur, quod Græcis μεσεντέριον & μεσώγειον nominatur. Mesenterium quidem a situ, quod in medio intestinorum situm sit, adeoque illa veluti vinculum quoddam complectatur. Mesaræum vero, a propria substantia ac venis, quæ eius centrum subeunt. Si quidem venæ, quæ ex iecoris porta veniunt, in eo coeunt, illisque iecur veluti manibus, quæ ei cibum ex ventriculo afferunt, utitur, ideoque mesarææ, mesenteriacæ, & vulgo mesaraicæ vocantur. Viscus quod venarum omnium principium ac sanguinis officina est, in dextra hypochondriorum sede locatum, Græcis ἥπαρ, Latinis *iecur* appellatur. Hoc canibus, ac præsertim porcis, in quinas magna ex parte, nonnunquam in sex, aut quatuor diductum est magnas fibras, quas *λῆβες* Græci nuncupant. Hominibus vero in tot & tam magnas fibras non discinditur, sed vnicum continuumque præcipua ipsius substantia corpus est. In caua iecoris parte vesica flauæ bilis conceptaculum, κύστις χοληδόχου Græci nominant, sedem obtinet. Nonnulli *bilis folliculum*, *vesicam felleam*, & *vesicam bilis susceptricem* vocant. Meatus quo vesicula bilem allicit, rursusque alio depellit, πόρος χοληδόχου Græcis appellatur. Ceruix enim vesiculæ paulatim in angustum desinit meatum, qui in duos partitur processus, hunc quidem sursum, illum autem deorsum porrigens. Qui sursum fertur, iterum in duas digeritur propagines, quæ singulæ in ipso iecore rursus in alios surculos, & hi denuo in alios tantisper digeruntur, donec innumeram ramorum constituent seriem per iecoris corpus inter portæ venæ ramos & cauæ propagines diffusam. At processus meatus vesiculæ, qui deorsum porrigitur, inferiori membrana omenti suffultus, parumper oblique deorsum properat, ac duodeno intestino non procul a ieiuni principio implantatur. Hic expulsum e vesicula bilem ad intestina defert.
- In cauo præterea iecoris series venarum, grandem & impense amplam constituunt venam, quæ Græcis πλεχυσία, Latinis *caudex* seu *truncum* referens, & nonnullis πύλη, id est, *porta* nominatur, quod per hanc veluti portam aliquam cremor in ventriculo & intestinis elaboratus, iecori inuehatur. Hæc ad eum modum in multos venarum surculos digeritur. Primum duos exiguos ramulos vesiculæ flauam bilem recipienti distribuit. Dein ventriculi posteriori sedi circa humilium eius orificium, ramum transmittit. Inde ventriculi fundi dextræ parti ramus offertur. A quo ramuli in ventriculum, & superiorem omenti membranam sparguntur. Post in duos grandes partitur truncos, quorum alterum, qui dexter & grandior, humiliorque est, totum fere per mesenterium varie digestum intestinis offert, prius duodeno, & ieiuni initio, ramum exhibens. Sinister truncus inferiori omenti membrana intextus, ventriculi posteriori sedi paruum offert propaginem. Dein etiam omenti inferiori membranæ, in omentis glandulis, postea secundum posteriora ventriculi ramus ab illo ascendit, ventriculi dorso medium spectanti sedi surculos primum exporrigens, & coronæ ritu superius ventriculi orificium amplectens, a quo præter propagines deorsum sursumque depromtas, vnus secundum posteriora ventriculi ad inferius eiusdem orificium prorepat. Ipse autem sinister portæ caudicis truncus sinistrorsum semper tendens, insignem hic quoque promit venam, omento, ac colo intestino simpliciter. Ille vero in varios sectus surculos, & sobolem adhuc humiliori omenti membranæ spargens, lienis cauo inseritur, ab ipsius propaginibus antea, quam lienem subeant, ventriculi sinistro lateri ramulos offerens. Inter quos insignis occurrit, qui fundum ventriculi in sinistra sede perreptans, ventriculo & superiori membranæ omenti soboles deriuat. Postquam

ſiniſter portæ truncus commemoratus produxit propagines, ad lienem tranſuerſim accedens in duos ramos ſecatur, qui ruſus in alios partiuntur, atque ita tantisper in alios dirimuntur, quouſque numeroſa ramorum ſerie in cauam ſimamue lienis ſedem recta linea ſecundum totam lienis longitudinem, inferiori omenti membrana perpetuo ſuſtulti, implantentur, atque infinita ſobole venulas perquam graciles, inuicemque implexas, per vniuerſum lienis corpus digerant.

Canave-
na.

Venæ ca-
uæ infra
iecur con-
ſiſtentis
distribu-
tio.
Emulgen-
tes venæ.
Seminalis
ſiniſtra.
Dextra.

Ceterum, vt ex concaua iecoris ſede exiguæ venularum propagines prodeunt, venæ portæ caudicem conſtituunt: ita quoque ex gibba ipſius ſede innumeræ venularum ſoboles exortæ in vnam cocunt venam, quæ ab inſigni amplitudine Græcis *κοίλη*, Latinis *cana* nuncupatur. Hæc per poſtერიorem iecoris ſedem deorſum prorepens, illico ramum ex ſiniſtro latere in pinguem membranæque ſiniſtri renis tunicam promit. Dein caua vena ab vtroque latere ampliſſimam propaginem in renes diſtribuit, dextram quidem dextro reni, ſiniſtram autem ſiniſtro deriuans. Hæ ſeroſam aqueamue ex ſanguine humiditatem trahunt, ac veluti emulgent, ideo vulgo *emulgentes* nominantur. Ab humiliori ſede eius venæ, quæ ſiniſtrum renem petit iuxta ductus ipſius fere medium, vena in viris pronāſcitur, quæ in ſiniſtrum teſtem excurrit, *ſeminalis*que ſiniſtra vocatur. Vena autem dextrum teſtem accedens, non a vena in dextrum renem protenſa originem ſumit, ſed a cauæ caudice aliquanto demiffius, quam venæ renibus exporrectæ principium ducit. In mulieribus alia eſt harum venarum diſtributio, *quemadmodum alibi copioſe monſtrauimus*. Porro vbi caua vena vertebris lumborum innititur, geniculatim illis propagines dat in muſculos proximos, & ad abdominis vſque latera abſumendas. Atque harum illæ ſunt præcipuæ, quæ a caua inibi pronāſcuntur, qua ſupra offis ſacri ad lumborum vertebras nexum, in duos æquales ſcinditur truncos, quorum ſiniſter, perinde ac dexter ſurculos quosdam offis ſacri foraminibus offert: & in duos partitur ramos, quorum interior propaginem mittit in muſculos exhauriendam, qui offis ilium, & ſacri poſtერიorem ſedem occupant: & aliam deriuat in veſicam, & penem, & mulieribus in vterum multiplici ſobole pertinentem. Quod reliquum eius rami eſt, ab externo ramo portiunculam aſſumens, per pubis offis foramen in femur ducitur, cuti & muſculis interna femoris occupantibus ſurculos exhibens, & ante genu articulum ceſſans, ſuoque termino cum alterius cruſ petentis venæ ramo, *ut mox dicemus*, coiens. Exterior namque ramus ſiniſtri cauæ trunci per inguina femur aditurus peritonæo propaginem offert, in inferiorē abdominis ſedem ad vmbilicum vſque abſumendam: in femur vero procidens pubis cuti, & pudendi muliebris ſobolem porrigit. Verum inſignem venam per femoris, & genu, & tibię interiora, ſub cute ad pedis vſque digitorum ſummum diſfundit, in progreſſu ſparſim cuti ramuſculos depromentem. Aliam quoque ſub cute ad coxendicis articuli anteriora deriuat. Ipſe autem penitus inter muſculos ſubmerſus, propaginem communicat muſculis, & cuti in externa femoris ſede locatis, & aliam offert muſculis internam, anterioremque femoris ſedem ſibi vindicantibus. Atque cum hac propagine extremum venæ eius coit, quæ per pubis offis foramen deſcenderat. Hinc grandis vena ſecundum femoris poſteriora retorquetur, propagines eius ſedis muſculis communicans, a quibus ramuli in cutem pertinent, tum ſurſum, tum deorſum ad ſuram vſque excurrentes. Inter inferiora vero femoris capita grandis hæc vena in duos ſciſſa truncos, minorem exterioremque verſus fibulam deriuat, a quo præter ſoboles anteriorem genu ſedem petentes, ramus diſcinditur, ſub cute externam tibię ſedem verſus poſteriora obtegente, ad digitorum pedis vſque ſuperiora diſſectus. Quod vero reliquum altius inter muſculos externe fibulę ſedi attenſos occultatum eſt, vltra tibię longitudinis medium properat. Interior autem truncus inſigniter amplius, ramum diſpenſat ſecundum internam tibię ſedem verſus poſteriora ſub cute ad pedis vſque digitos diſperſum. Deinde alium depromit, per ſuram nonnihil reconditum, ad calcem vſque pertingentem. Quod vero huius trunci præcipuum eſt, muſculos poſteriorem tibię ſedem occupantes ſubit, & ab anteriore ipſius regione ramum per ligamentum membraneum demittit, fibulam tibię alligans: atque is ſub anterioribus tibiam integrentibus muſculis abſconditus, ad pedis vſque ſuperiora pertingit. Ipſa vero vena ſecundum poſteriora deſcendens, & hincinde cuti, & conterminis muſculis ramulos offerens, tandem inter calcem & tibiam pedis inferiora ſubit, inibi in *muſculos*, & digitos

- A in eum modum distributa, ut duæ soboles singulis offerantur. Porro venæ caux pars, quæ supra iecur consistit, ita se habet. Sursum ascendens, ac septum transversum cum cordis involucri perforans, duas propagines septo largitur, per uniuersam septi sedem multiplici serie excurrentes. Ad dextram cordis autem caua, ampliori orificio in dextrum cordis ventriculum dehiscit, quam caux orbicularis amplitudo vsquam visitur. A posteriori eius implantationis sede vena prodit cordis basim coronæ modo cingens, quæ ob id Græcis *σφαιρική*, Latinis *coronalis* dicitur: & ab inferiori ipsius sede ramos dorsum per cordis superficiem digerens. Caua a corde sursum conscendens, ac cordis involucri inibi prætergressa, venam præmit, quam Græci, eo quod coniuge priuatur, neque in altero latere parem asciscit a caua propaginem, ἀζύγη, Latini *venam absque coniuge*, & *paris expertam*, nominant. Ab hac vena utrinque geniculatim pullulant propagines, singulæ ad vnum nouem costarum inferiorum intervallum perreptantes. In iugulo autem tota bipartito scinditur, ab ipsius anteriori sede pectoris ossi, & inter septem tribus thoracem membranis venas offerens, abdominis superiora perreptantes. A radice vero alterius trunci factæ modo in iugulo bipartitionis, insignis deriuatur vena, super primam costam in axillam procurrent, sed prius in thoracis cavitatem ramum promens, in tria superiora sui lateris costarum intervalla absumendum, & alium in posteriora thoracis iuxta ceruicis radicem sparsum. Præsens vena thoracem egressa, interdum hic *humeraliam*, *cephalicam* nostri nominant, venam, & ramum musculis anteriori thoracis sedi instratis: alium posteriori sedi thoracis, & cauo scapulæ, & lateri thoracis alium digerit, in axillam festinans. Trunci autem in iugulo factæ bipartitionis reliquum, in duos impares ramos discinditur, & horum *interior*, graciliorque internam iugularem constituens venam, duabus propaginibus duram cerebri membranam ad euntibus, caluariam subit. *Exterior* vero ab externo latere propaginem, ex qua humeralis vena constituitur deducens, sursum conscendit, superficiariam efformans iugularem varie ad fauces vsque excurrentem, & in linguam, laryngem, palatum, faciem, tempora, & verticem distributam, tribusque venis caluariam ingredientem. *Humeralia* vero priusquam sub clauicula, & summo humero in brachium fertur, ramum posteriori ceruicis sedi, & alium scapulæ gibbo, & alium summi humeri superiori sedi exporrigit, & secundum exterius latus musculi cubiti flexentium anterioris sub cute prorepens, surculosque graciles cuti depromens, supra cubiti articulum dissecta, aliquando vnum ramum penitus latentem, & mox absumtum, ad cubiti articulum deferit. *Alium* sub cute oblique ad cubiti flexus medium cum axillaris venæ ramo coiturum, communemque venam constituturum. *Tertium* sub cute secundum radium in posteriora cubiti, ac tandem ad brachialis radicem iuxta vnæ extremum mittit, qui axillaris propagini inibi commixtus, parui, & anularis digitorum exteriora conscendit. *Axillaris* in axilla latitans, & cuti anteriorem brachii sedem versus interiora inuestienti ramum offerens, surculum præbet capitibus musculorum cubiti extendentium, & alium illorum mediarum propemodum longitudini, dein aliam propaginem cum quarto brachium petente nervo secundum brachii posteriora ad cubiti vsque exteriora ablegat. Mox in duas secta venas: toto prorsus ductu venam in profundo submersam, ac arteria semper comitatam, per cubiti articuli flexus medium deducit, quæ ante cubiti longitudinis medium in duas secta propagines, vnâ secundum radium, alteram secundum vnâ versus brachiales porrigit. Et hæc rursus in surculos dirempta, in internam digitorum sedem ita digeritur, ut singulis digitis duæ offerantur soboles, & surculus quidam inter pollicis primum internodium & postbrachialis os indicem sustinens, ad manus externam sedem pertingat. *Alterâ* vero vena sub cute semper exporrecta iuxta cubiti articulum in duos partitur ramos, quorum alter oblique versus cubiti articuli flexum contendens, cum humeralis ramo commiscetur, simul cum illo communem efformans venâ, quam vulgus medicorum *medianam*, & *nigram* vocat: quæ duabus illis mediis venis constituta oblique deorsum repens, radiumque tandem conscendens, in externa cubiti sede instat. Y literæ in duas discinditur soboles: quarum altera medii digiti potissimum externam sedem petir: altera vero pollicis & indicis offertur, surculum in internam manus sedem spargens, ramulis montem Veneris implicantibus commiscendum. At alter axillaris iuxta cubiti articulum factæ diuisionis ramus, varias propagines in cubiti internâ

Venæ caux supra iecur consistens distributio.

Coronalis vena.

Vena paris aut coniugis experta.

Cauæ caudicis in iugulo bipartitio.

Humeralia.

Iugularis interna. Externa.

Humeralis distributio.

Axillaris series.

Communis vena. Mediana. Nigra.

sedem deponit, quibus crebro vena accedit, ab altero venam communem constituen-
tium ramo, quem axillaris porrigebat enata. Hę propagines admodum varie modo co-
eunt, modo rursus inuicem direptę, ac internam cubiti sedis cutem implicant, tan-
dem in internam manus cutem prorępunt. Ceterum insignior eius rami propago vna
exporrecta, & in cubiti exteriora etiam surculos promens, iuxta brachialis radicem hu-
merarię ramo commiscetur, ad paruum digitum & anularem contendenti, qui Arabi-
bus aliquot ac barbaris *Syelen*, & *Saluatella* nominatur. Pleniorẽ venarum historiam re-
peries *libro 3. anatomes*. Ad sinistram ventriculi sedem secundum inferiora magis ac po-
steriora viscus consistit, quod Gręcis *σπλην*, Latinis *Lien* vocatur, ac lutosi & fęculenti
sanguinis in iecore confecti est receptaculum. Ceterum sanguinem in cauam venam ex
iecore missum, serosa & aquea humiditate purgant colantque renes, Gręcis *νεφει* dicti, B
qui numero bini sunt, & iecori quam fieri potuit, proxime allocati. A quei excrementi
receptaculum natura vesicę, quę Gręcis *κύστις* & *κύστη* dicitur, creauit. Hoc vtrique excre-
mentum vrinam vocant, & a duobus meatibus, qui Gręcis *ουρητῆρες*, Latinis *urinarii* no-
minantur, in vesicam defertur.

De instrumentis propagandę speciei famulantibus. CAP. XIII.

Testes. Inter instrumenta generationi seruiencia in viro testes primum occurrunt, qui Grę-
cis *ὄρχις* vocantur, & quod gemini sint, *διδυμοι*. Quanquam interdum vnus tantum non-
nunquam etiam tres reperiantur. Testes autem pluribus inuolucris seu tunicis inte-
guntur: ac aliis quidem vtrique testis communibus, aliis autem priuatim singulos testes
involuentibus. Duo enim vtrisque testibus communia sunt inuolucra. Curis quidem v- C
num effingit, quod reliqua corporis cute tenuius est, & veluti sutura quadam, rugisque
interstinguitur, Gręcisque *σχιδν*, *scrotum* Latinis, & a nonnullis, transpositione litera-
rum, *scortum* nominatur. Alterum vero commune inuolucrum, membrana carnosā ef-
format. Vtrunque autem testem priuatim involuentes tunicę duę sunt. Vna exterior,
valida quidem, sed tenuis, venisque abundans. Hęc Gręcis *ἐπιτεσχιδν* priuatim appella-
tur, quod scilicet velaminis, seu putaminis vaginęue formam habeat. Articorum enim
more, pro λ ponitur, vt idem valeat quod *ἐλντεσχιδν*. Quę vtrique vox ἀπὸ τῆς ἐλντεσ, quod *ve-*
lamen, *receptaculum*, & *putamen* significat, & *εσχιδν*, quod speciem denotat, deducta est. Si
quis tamen mauult apud Galenum legere *ἐπιτεσχιδν*, ad musculum illi inuolucro adna-
tum referat, oportet. Is enim cum ruber sit, vt reliqua caro, illi inuolucro aliquem rubo- D
rem conciliat. Altera intima testis tunica, dura, crassa, & valida admodum est, testis sub-
stantiam vtrinque mollem & sequacem involuens, Gręcisque veteribus *δερδν* vocatur.
Intima testis tunica. Primi autem anatomes professores, qui testem *διδυμοι* nominauerunt, hanc quoque tu-
nicam *ἐπιδιδυμοι*, id est, *super testem*: huic enim innititur, ac proximis incumbit, appella-
runt. Et haud dubie Galenus caput testis, nihil aliud præter elatiorem huius intimę tes-
tis tunicę partem, nuncupauit.

**Vasa semi-
naria.** Ad singulos testes singulę pertingunt venę, & arterię ortu differentes, quę me-
dicis seminarię nominantur. Vena *dextrum* accedens testem, a cauz venę caudicis an-
teriori sede, sub venarum in renes exporrectarũ exortu, pronascitur. *Sinistri* vero testis
vena ab humiliori sede venę sinistrum renem adeuntis principium ducit. Vtręque au- E
tem arterię humilior, quam dextrum testem petentis venę principium consistit e di-
recto, & sibi proxime ex elatioris anteriorisue magnę arterię sedis medio promuntur.
Simulatque vero prædicta vasa peritonzi foramen superarunt, ex dextro quodam mo-
do latere, rursus oblique deorsum in sinistra ad dextri testis elatiorem sedem ducun-
tur, arteria non amplius venę duntaxat, vt in reliquo processu accumbit, sibrisque
membraneis tantum connectitur, sed varia quadam peculiarique ratione vena cum
arteria coit, & ambę inuicem commiscuntur, corpusque vnum pyramidis ante-
rius posteriusque depressa instar efformant, cuius quidem conum vasa, vbi primum
inuicem permiscuntur, efficiunt, basin vero ea sede, qua elatiori testis parti committun-
tur. Per vniuersum hoc corpus ramorum myriades inuicem complexi obseruan- F
tur, non quidem omnes recta deorsum procedentes, sed alii partim recta, partim or-
bicularim, partim transversim, alii alio modo implicantur. Quapropter, cum
corpus hoc multas varices exprimat, ideo veteres anatomici illud *κισσώδην* καλοῦν-
ται, quasi *varicosum ad testis assistentem* diceres, appellauerunt. Ad externum varicosi illius
corporis

- A** corporis latus, qua testi applantatur, aliud corpus album, & durioris nerui modo durum, extrinse testis tunica adnascitur, hincque incipit. Hoc exterius qua testi non committitur gibbum, & quodam modo teres est: qua vero tunica illi connatum est, secundum connexum testis cauum existit. Per totum autem ductum, quo testis tunica corpus id necitur, propemodum aequaliter crassum, eiusdemque figuræ est, quam compacto vitis, aut cucurbitæ capreolo assimilare queas. Quanquam non in orbem, sed velut in latera huius corporis reuolutiones fiant, ad eum fere modum, quo angues, & anguillas ocyus repere cernimus. Huius namque corporis anfractus & inuolutiones admodum inuicem continuæ & connatæ conspiciuntur, vt lignorum vermibus eas assimilare integrum sit. Hoc vas sursum ad magnam peritonæi cauitatem via conscendens, qua seminalis vena & arteria descenderunt, nerui cuiusdam modo teres efficitur, & deorsum ad pubis os reflexum, posteriorem vesicæ sedem accedit, ad quam vas a sinistro teste deferens etiam properat, quod dextro vasi vnitum, simul cum illo in vesicæ ceruicis radicem inter glandulosum corpus ceruici obnatum, quod Herophilus *ἀδνοστήν* nominauit, inseritur, communisque semini & vrinæ meatus confurgit, qui deorsum modice ductus, denuo sursum ad pubis ossium commissuram foris reflectitur, corporibus penem efformantibus subnatus. Prodit enim vtrinque a pubis osse vnum nerueum teresque corpus, quod intus impense fungosum, ac crasso sanguine plenum cernitur. Vtrunque simul connatum vnitumque, penem, qui *κυνλός*, Latinis *coles, penis, mentula, virga, & pudendum virile* vocatur, constituit. Eius certe substantiæ beneficio, quum penis semen in vterum missurus est, erigi, augerique aptus est: alias quum nullus suæ proceritatis vfus est, flaccidus & gracilis existit. Hinc est, quod natura ipsam ita tabrefecerit, vt spiritu impletus, erigi, produci, & insigniter turgere possit, & rursus eodem spiritu dissoluto arctari, concidere, flaccescere, & breuior fieri. Penis ad commodum Veneris vsum summa sua parte & apice glandis modo tumet. Hinc Græcis *βάλανος*, & Latinis *Glans* appellatur & regei. Cute quoque, qua regi queat, decoratur, quæ Græcis *πρόθυ*, Latinis *præputium* dicitur. Inferior autem penis per eius longitudinem vergens, & suturæ modo protuberans linea Græcis *σάφη*, Latinis *sutura* nominatur. Totam exporrectam extuberantemque ad anum vsque penis partem, Græci *πυέην*, Latini taurum nuncupant. Spatium inter testium inuolucrum, quod **D** *scrotum* nominatur, & anum conspicuum, Græcis *πρωταῖον*, *interfeminium* Latinis dicitur. Porro mulier sibi vterum vendicat, semini excipiendo, foetuique continendo dedicatum, qui Græcis *μήτρα καὶ ὕστερ* nominatur. Hic inter vesicam & rectum intestinum situs est, ac in fundum & ceruicem distinguitur. Fundi forma non prorsus rotunda, verum antèr postèr iusque depressa, superius obtusa, & duos, vtrinque videlicet vnum, retufos ostendens angulos, quos Herophilus, oportuniſſime iam nascentibus bouum cornibus assimilans, *κέρατα* & *κεράτια* appellauit. Quemadmodum enim, vitulorum capita vtrinque, quæ pronascentur cornua, extuberant: ita etiam superior vteri pars vtrouque veluti in duos obtufos, vt diximus, angulos desinit, qui reuera veteribus anatomicis cornuum vice habiti sunt, vasorumque semen muliebri deferentium inferiorem recipiunt. Fundi simplex est sinus semen genitale suscipiens, foetumque continens. In non prægnantibus viscido quodam & subalbo muco illitus, & læuis, & inconspicua propemodum sutura seu extuberantiõr linea interſtinctus. Hinc in orificium desinit, glandis penis modo in vteri ceruicis amplitudinem prominens. Ceruix vteri teres est, & in iis, quæ in vtero haud gerunt, alias non distensa; non multo minus ipso fundo ampla. In extremo ceruicis ore, vbi concidua labra rimam relinquunt, vtrinque vna prominens cuticularis coriacea caruncula; sed tenuis, & ex longa basi in mucronem desinens, Græcis *νύμφη, μύρτον, ἐπίδερσις, & κλητοεῖς* nominatur. Vteri lateribus, vtrinque vnus accutnbit testis, non prægnantibus quidem paulo elatius, quam fundi superior pars consistit. Vtero autem gerentibus eandem certe sedem occupant. Ad hos vasa **F** *seminaria*, eodem prorsus modo, atque in viris, pertingunt. Verum hic id priuatim accidit, quod media tantum seminariæ venæ arteriæque pars testi offeratur, altera vteri fundum implicante. Vas semen tenue & impense aquosum paucumque a muliebri teste deferens, in obrusum sui lateris vteri angulum inseritur. Oscula vasorum ex vtero in secundam venientium Hippoc. & Galenus *κετυλιδόνες*, Latini *acetabula*, quod scilicet

Vas semē
a teste ad
vesicæ cer-
uicem de-
ferens.

Glando-
sum cor-
pus vaso-
rū semen
deferent-
ium in-
sertionem
excipiens.
Penis sub-
stantia.
κυνλός.

βάλανος.
Glans.
πρόθυ.
Præputiū.
σαφή.

Taurus.
Interfemi-
neum.
Vterus.
μήτρα.
Cornua.

Fundi vte-
ri sinus.

Vteri os.
Cervix.

νύμφη.
Testes mu-
liebres.
Vasa semi-
naria mu-
liebria.

Acetabu-
la.

Tunica
fœtum te-
gentes.
Prima.

eet hæc vasa ab vteri finibus porrigantur, vocarunt. Ceterum fœtus, qui ex vtriusq; fœ- A
minæ scilicet ac maris, semine procreatur, in vtero tribus inuolucris seu membranis in-
regitur. Prima & extrema *χέλυς* Græcis, *Secunda* Latinis, & aliis *secundina* dicta, fœtum in-
star latioris tantum cinguli ambit. Haudquaquam enim superiorem, vti neq; etiam in-
feriorem fœtus partem contingit, sed tantum ita se habet, ac si quis a mucronata pecto-
ris ossis cartilagine ad elatissimam vsq; ilium ossium sedem fascia impense laxa scinde-
ratur. Insigniter crassa est, & lienis modo nigricans, quod vtero connatum, vasa in vteru
pertinentia excipit: quo illa in ipso postmodum collecta, duabus venis, & totidem arte-
riis in vmbilicum inferantur, & vna tandem vena iecori, duæ autem arteriæ grandis ar-
teriæ propaginib. per pubis ossiu foramina descensuris offerantur. Secunda fœtus mem- B
brana a sarciminis imagine, quam refert, *ἐλλαττοῖδης* appellatur. Fœtum vniuersum com-
plectitur, venulis quibusdam & arteriis intertextum. Inter hoc & tertium inuolucrum
fœtus vrina colligitur, quæ peculiari meatu, quem *ὕδρην* vocant, ex elatiori fœtus vesicæ
fundi regione per vmbilicum in hanc amplitudinem perfertur, in hoc a natura forma-
tus, ne vrina cuti eiusdem circumfusa, sua acrimonia & mordacitate obsit. Tertia fœtus
tunica tenuissima est membrana, vnde *ἀμνιόν*, quasi *agnina*, a mollitie & teneritudine ag-
nellorum Græcis dicta est, alba quemadmodum & secunda, venulisque ac arteriis im-
plicata, fœtui proxime & vndecunque obducta. Hæc fœtus sudorem inter se & fœtus
cutem subflaua quadam ac lutosa substantia obducta asseruat, qui ante partum non mi-
nus, quam fœtus vrina profluens vteri ceruicem irrigando, fœtui faciliorem exitu parat.

Altera.

Ter-
tia.

Quarta.

Mammæ.

Fœtus in lucem editus lac familiare ipsius alimentum e mamillis, quas Græcis *μα- C
στῆς, ἡτθὺς καὶ ἡτθία* nominant, a nemine edoctus sugit. Hæc ad ossis pectoris latera in tho-
race sibi sedem vendicant, & papilla, quæ *θήλη* Græcis vocatur, ornantur. Ceterum ma-
millæ glandoso corpore insita vi sanguinem per venas ipsi adductum in lac conuerten-
te exstruuntur. Cutis mamillarum, quæ orbiculatim ad papillam nigricat, circulumque
constituit, *φῶς* Græcis appellatur.

Quinta.

De corde & instrumentis ipsius functionibus ministrantibus. CAP. XIV.

Succingens

Inter partes, quæ vitali spiritui ministrant, & intra thoracem sitæ sunt, primum sibi
vindicat locum, tunica membranaue, quæ Græcis *πτοζωκός*, Latinis *succingens*, quod ni-
mirum omnibus costis, demta duodecima, quæ a septi transuersi implantatione occu-
pata est, ab interiori parte subtensa sit, ac vniuersam thoracis cavitatem succingat, sub-
linatque nominatur. Vulgus *pleuram* vocat. Ex hac nascuntur duæ aliæ membranæ, v-
trinque singulæ secundum thoracis longitudinem procedentes, ac in duas præcipuas
amplitudines eam distinguentes. Hic Græcis *διζωκάρτοις*, Latinis *intercipientes & inter-*
sepientes, vulgo *mediastinum* nuncupatur. Fistula, quæ a faucibus per collum deorsum in
pulmonis vsque substantiam digeritur ac protenditur, Græcis *βέρυξ* & *ἀσμεία* simpli-
citer, quod aerem contineat, primum est appellata. Temporis vero progressu, quum
& vasa vitalem spiritum sanguinemque continentia, arteriæ etiam nomine donata
sunt, hæc quidem leues arteriæ, illa vero *τεγχεία*, hoc est, *aspera*, ab inæquali, qua constat
substantia, nuncupata est. Caput huius arteriæ Græcis *λάρυγξ*, Latinis *guttur* nomina-
tur, *φάρυγξ* autem, hoc est, *fauces*, Galeno teste *spatium oris internum, quod gula ac gutturi pra-*
iacet, dicitur. Vniuersum itaque spatium, quod in profunditate ab interna mentis se-
de ad ceruicis vsque vertebra pertingit, in latitudine vero quicquid inter dextram
inferioris maxillæ partem & sinistram habetur faucium nomine complectitur. Idem
locus Galeno 3. apho. Com. 26. teste, Græcis *ισθμός*, ab angustia dictus est: quod scilicet nulla in
vniuerso corpore sit regio aque angusta, & tot organis donata. Triplex in faucibus glandula-
rum genus reperitur. Sunt enim glandulæ alterutra parte singulæ ad radicem laryn-
gis adnatæ, magnæ & fungosæ admodum, carnisque propemodum coloris, sed ma-
gis nigricantes. Deinde in spatio, quod nobis hiantibus medium inter narium fora-
mina & laryngem apparet, vtrinque in lateribus vna reponitur glandula vtrunque in-
signis, & impensius fungosa in hocque propria, vt saliuam procreet, ac asperam arte-
riam, & stomachum quoque cum tota oris amplitudine humectet. Has glandulas Græ-
ci *παισθμία*, & *ἀρνάδες*, Latini *tonsillas*, barbari *amygdalias*, quod nimirum amygdalis assimi-
lentur, appellant. Græci tamen, vt libro 3. de sympto. causis, cap. 11. testis est Galenus, ha-
rum glandularum etiam inflammationes *ἀρνάδες*, partium vero illis adiacentium phle-
gmonas,

Leuis ar-
teria.

Aspera.

Guttur.

Fauces.

Glandulæ
faucium.

Tonsillæ.

Tonsillæ.

Tonsillæ.

Tonsillæ.

Tonsillæ.

Tonsillæ.

Tonsillæ.

Tonsillæ.

Tonsillæ.

Tonsillæ.

Tonsillæ.

Tonsillæ.

Tonsillæ.

Tonsillæ.

Tonsillæ.

Tonsillæ.

Tonsillæ.

Tonsillæ.

Tonsillæ.

Tonsillæ.

- A** phlegmonas, *παισθήματα* nuncupant. Tertium genus, inguinū, & axillarum glandibus respondens, sub aurium radicibus, & vniuerso spatio inferiori maxilla conscripto continetur, & cavitates omnes exquisite implet. Hoc genus nullo peculiari nomine donatum est. In externa oris & palati parte, vbi narium foramina ad os descendant, carnosae & fungosae quaedam particula in oris amplitudinem propendula superius, vbi palato continuatur, latior, inferius pyramidis instar acutior apparet, quae veteribus Graecis *γάρφαρον*, hoc est, *gurgulio* dicta est. Quia vero instar columnae extensa est, ideo posterioribus Graecis *κίον*, Latinis *columella*, Barbaris *vunla* nominatur. Quum vero instar vuae superius angusta, inferius autem sphaerae modo rotunda aliquando, vbi phlegmone corripitur, propendet, *ut libr. 6. de compos. medica. localium, cap. 3.* auctor est Galenus, *σφυλή* appellatur. Pulmo qui Graecis *πνεύμων* dicitur, quatuor fibris, quas Graeci *λόβες* vocant, magna ex parte distinguitur. Ex vtraque enim parte duas habet. Membrana, quae vniuersum cor cum suis auriculis, ac vasorum initiis veluti arcula aut theca cooperit, Graecis *πνευμάτιον*, Latinis *inuolucrum & capsula*, vulgo *capsula*, quod veluti domus quaedam cordis sit, nuncupatur. Cor autem, quod Graecis, *καρδιά* dicitur, in homine sua basi, quae ipsius nobilissima pars est, cum vasorum sit origo, exacte ut in reliquis animantibus dextrae sinistreaeque sedis medium obtinet. Vtraque ad basim ipsius parte appendices obtinet, quas dissectionum periti auriculas nominant, quod aurium proprie dictarum similitudinem referant. Humanum cor intus duas insigniter amplas cavitates, quas Graeci *κοιλίας*, Latini *sinus ventriculos* appellant in cordis lateribus sitas habet, vnam dextram, alteram sinistram. Dextra quidem sinistreae amplitudinem vincit, ambaeque forma plurimum variant. Dextra enim magis deorsum ad cordis mucronem, quam sinistra descendens, cavitatem instar crescentis lunae paratam adipiscitur. Sinistra vero ampla etiam basi incipit, sensimque in arcum versus cordis mucronem definit, cavitatem instar coni obtinens. Vtriusque cavitatis superficies perquam inaequalis est, & multis quasi foueis in carneam substantiam penitus impressis scatet. Ex iis foueis nullae, quod sensu saltem comprehendi liceat, ex dextro sinu in sinistram penetrant, adeo sane, ut mirifica Dei industria per meatus visum effugientes ex dextro in sinistram sanguis resudet. Ceterum quatuor sunt cordis vasa in vtroque sinu bina, *vena nimirum caua, vena arterialis, arteria venalis, & arteria magna*. In dextrum enim latus basis dextri ventriculi ad humiliorem eiusdem basis sedem
- D** vena caua amplo patentique orificio ingreditur, atque ex iecino re sanguinem defert, ut vena caua primum cordis vas sit. Ex eodem sinu egreditur aliud vas, quod vena arteriosa nuncupatur, & sanguinem ex iam dicto sinu in pulmonem defert. Venam autem ab usu appellatur, quod venae scilicet usum gerat. Arterialem vero, quod arteriae corpus, duplicemque tunicam nacta sit. Sinistro cordis ventriculo vas tertium, quod arteriam venosam nominant, inseritur, & ex pulmone aerem cordi communicat, fuliginosaeque cordis excrementa educit. Arteria vero ab usu, quod scilicet aerem continet, deduciturque, dicta est. A substantia autem venosa, quod venarum corpori respondeat, & vnicam tantum tunicam habeat, nominata est. Quartum vas magna est arteria, *ἀορτή* Aristoteli vocata. Nonnulli Graecorum *μερίσην*, alii *παρῆαν*, alii *ὀρθήν* appellant. Ex dextro elatissimae sinistri ventriculi sedis latere enascitur, aliquousque recta sursum sub venae arteriosae caudice tantisper prorepens, donec, cordis inuolucrum permeans, in duos scindatur ramos, quorum vnus corporis superiora, alter inferiora perit, de quibus paulo post dicemus, vbi prius membranarum cordis numerum exposuerimus. Membranae autem cordis, non sunt, nisi corpora, quae cordis vasorum radicibus, ipsorumque exortibus adnata, colore, substantia, crassitie prorsus membranae existunt, materierum regurgitationib. praefixae. Sunt autem omnes cordis membranae numero vndecim, ac tres quidem singulis trium vasorum orificiis, duae autem duntaxat vni tertioque adnascuntur. Caua vena seu primum dextri ventriculi vas, tres membranas obtinet, quae quia quum clauduntur & inuicem coniuunt, spiculorum sulcis structura quam simillimae sunt, Graecis *τεινῶδες*, quasi *trifurcae*, aut *tricuspidales* appellantur. Venae arterialis itidem tres sunt membranae, quae quia semicirculum ad amussim exprimunt, Graecis *στροφοειδείς*, a *σ* literae imagine, nominantur. Venalis arteriae orificio duae duntaxat membranae praeficiuntur, quae mitre episcopali non incepte assimulantur. In magnae arteriae ostiolo tres sunt membranae, in nullo a tribus venae arterialis membranis distantes. Ceterum arteriae magnae caudicis truncus superiora

Columella.

γάρφαρον.

κίον.

σφυλή

Pulmo.

Fibrae pulmonis 4.

πνευμάτιον.

Cor.

Auriculae

cordis.

Cordis sinus duo.

Cordis vasa quatuor.

Vena caua.

Vena arteriosa.

Vena arteriosa.

Arteria venosa.

Arteria venosa.

Arteria venosa.

Arteria venosa.

Arteria venosa.

Arteria venosa.

Arteria venosa.

Arteria venosa.

Arteria venosa.

Arteria venosa.

Arteria venosa.

Arteria venosa.

Arteria venosa.

Arteria venosa.

Arteria venosa.

Arteria venosa.

Arteria venosa.

Arteriæ
magnæ
diductio.

Soporali
arteria fi-
nistræ.
Dextræ.

Animalis
spiritus
procrea-
tus.

Renum
arteriæ.

Semina-
les arteriæ

petens, statim a sinistro ipsius latere ramum promit oblique sursum ad primam, siue e-
latissimam thoracis sui lateris costam protensum, a quo primum propago superioribus
costis offertur, & dein alia prius commemorata multo amplior, transuersis vertebra-
rum cervicis processibus. Quod eius reliquum est, per foramē occipiti insculptum cal-
uariam subit, atque in sinistram duræ cerebri membranæ sinum exhauritur. Dein alia
sinistro pectoris ossis lateri exhibetur, & verarum costarum cartilaginum interuallis
ramos offert. Ab hac etiam propagine in sui lateris membranam, quæ thoracis ampli-
tudinem intersepat, & in glandium iugulo repositum furculi mittuntur. Quod autem
ipsius est reliquum, sinistram mucronatæ cartilaginis latus thoracis cavitatem ingreditur,
& recto hic abdominis musculo subnatum ad vmbilici quodam modo regionem
procedit, in progressu vtrinque ad partes abdominis ramulos offerens. Vbi vero ra-
mus ille thoracem superauit, furculum posteriorem cervicis sedem occupantibus mu-
sculis transmittit, & similiter, vt axillaris vena ad digitorum vsque extrema digeritur,
si axillaris ramos cutem subeuntes exceperis, ac in alto latitantes solum intellexeris.
Ceterum insignior portio dicti paulo ante magnæ arteriæ trunci ad iugulum ascen-
dens, in duos impares partitur ramos. *Sinister*, qui gracilior est, nonnihil oblique in
læuam deflexus, sursum cum interiori iugulari iuxta asperæ arteriæ sinistram latus per
cervicem exporrigitur, soporalisque sinistra censetur. *Dexter* vero ramus sinistro cras-
sior, similiter sursum tendit, & simul atque primam thoracis costam contigit, ex dex-
tro ipsius latere arteriam promit in easdem prorsus soboles discissam, quas a ramo, qui
sinistræ manui offertur, pullulare constat: ad superiorum scilicet costarum interualla,
ad transuersos cervicis vertebrarum processus, ad pectoris os, ad posteriores in collo
locatos musculos. Quod vero maioris dextrique rami adhuc reliquum est, secundum
asperæ arteriæ dextrum latus sursum conscendit, ac huius lateris soporalem constituit
arteriam. Hæc vbi ad fauces vsque pertingit, in duos finditur ramos: quorum gran-
dior idemque interior furculum porrigit in faciem penitius, & in temporum cutem
ad verticem vsque absorbendum. Ipsa vero laryngi & linguæ, & triplici hic reposito
glandularum generi soboles offerens, caluariam adit: & in duas diuisa propagines, mi-
norem in primum dextrumue duræ membranæ sinum exhauriendum mittit. Gran-
dior absque venæ coniugio per proprium foramen ad narium amplitudinem versus
nasi extremum contendit. Ipsa autem propago caluariæ basi instrata, & in nullum ta-
men plexum reticularem digesta, antrorsum fertur, & ramum cum secundo pari ner-
uorum cerebri ad oculum depromens, sursum ascendit, duram cerebri membranam
perforans, & partim in tenuem membranam hic absorta, partim vero in dextrum ce-
rebri ventriculum repens, plexus eius in hoc ventriculo repositi, ac extimo fœtus in-
uoluto comparati portionem efformat, vitalemque spiritum cerebro offert, vt ex il-
lo cerebri beneficio animalis præparetur. Porro magna arteria grandiore trun-
cum sinistrorsum ad spinam detorquet, a quo vtrinque rami ad octo humiliores costas
exporriguntur. Quum vero is sub septo deorsum fertur, huic quoque propaginem ve-
nam offert, quæ in plures secta furculos, in humiliorem septi iuxta vertebra sedem præ-
cipue deperditur. Post commemoratas propagines ex elatiori sui corporis sede vnum
promit truncum, ramos in ventriculum, iecur, bilis vesiculam, lienem, omentum, duo-
denum intestinum & colon offert, venæ portæ ramis comitatos. Dein aliam radicem
truncus hic in superiorem mesenterii sedem in plurimas soboles diffusam dispensat.
Post hanc inferius paululum ab utroque magnæ arteriæ latere ampla educitur arteria
in sui lateris renem transuersim prærepens. Præterea ab arteria sinistram renem acce-
dente, ac demissius plerumque quam ea, quæ sinistro reni offertur, vena principium su-
mente, seminalis arteria non enascitur, sed frequentissime, vt dextri testis arteria, ab
arteriæ magnæ corpore originem ducit. Iam dictis propaginibus alia succedit inferius,
quæ seminales arteriæ, ab anteriori etiā magnæ arteriæ sede principiū ducens, & in hu-
miliorē mesenterii sedē distributa. A posteriori autem seu inferiori magnæ arteriæ sede,
qua hæc vertebra comittitur, geniculatim vtrinque ad singulas lūborū vertebra, ipsisque
accubentes musculos furculi depromuntur. Ad sacri ossis initiū, etsi arteria prius caua in
sinistro latere subiicitur, eā quo tutior prorepat, cōscendit, & eodē cū caua modo hic bi-
partito scinditur instar, A, parem cum illa ad extremum vsque pedis distributionem in
pro-

A profundo faciens. Quippe nullus huius arteriæ magnæ trunci ramus cutem subit. Verum id priuatim huius trunci propagini per pubis ossis foramen procedenti accidit, quæ illi arteria committitur, quæ ab umbilico secundum vesicæ latus descendens, foetui propria censetur. Exquisitiorem arteriæ magnæ delineationem reperient studiosi in cap. 13. & 14. lib. 5. nostra anatomes.

De cerebro, & instrumentis ipsius functioni famulantibus. CAP. XV.

Cerebrum, quod Græcis ἐγκεφαλον dicitur, animalis ac principis facultatis sedes, in caluaria reponitur, formam cavitatis, quam occupat, concinne referens. Diuiditur in *anteriorius*, quod proprie *cerebrum*, & in *posterius*, quod *cerebellum* Latinis, πρηνυκαλις Græcis dicitur, decuplo aut vndecuplo minus cerebro existens. Anteriorius autem in *dextrum* & *sinistrum* diuiditur. In ipsius medio iuxta basim continuum est. Porro vniuersa caluariæ cavitates cerebro excipiendo adaptata, quadam membrana subducitur, quæ propter crassitiem, qua ceteris, non modo cerebri, verum etiam totius corporis præstat membranis, Græcis παχὺα μὲνιγξ, hoc est, *crassa membrana*, & ab insigni duritie, vulgo *dura mater* nuncupata est. Præfens membrana quatuor sinus obtinet, qui non solum venarum, sed & arteriarum quoque usum præstant. *Primus* ad latus dextrum maximi in occipitis osse foraminis, quo dorsali medullæ via præbetur, incipit, & sursum modice instar quartæ circuli partis protenditur, quousque elatissimam cerebelli partem occipitis ossi contiguam attigerit. *Secundus* ad sinistrum latus iam dicti ossis initium sumit, & sursum eodem quo primus modo usque ad elatissimam cerebelli partem conscendit. Quasane in parte dexter sinus cum sinistro coit, atque ex ambobus vna communis efficitur cavitates. Iste amborum iam dictorum sinuum congressus, Herophilo, ut lib. 9. anat. admi. & de usu par. cap. 6. auctor est Galenus, τὸνδε id est, *torcular*, dictum est. Recentioribus *lacuna*, *puteus*, *fovea*, & *conductus sanguinis* appellatur. *Torcular*, quod concursus ille in primum & secundum sinus, sanguinem tanquam vinum e torculari promit. Ex mutuo hoc amborum sinuum congressu alii duo exoriuntur sinus longitudine, & cavitatis forma inuicem variantes, tertius scilicet & quartus. *Tertius* longior est, & caluariæ, quemadmodum priores duo, contiguus, per capitis longitudinem antrosum procedit: *Quartus* ab anteriori sede communis primi secundique summum congressus recto tramite versus priora cerebri, nusquam deorsum neque sursum vergens, progreditur. Consistit enim in dura membrana, ubi per cerebelli longitudinem, id & cerebrum ad eas usque cerebri sedes intercedit, quæ testium & clunium imagini assimilantur. Hic itaque quartus sinus suo ductu cerebelli longitudinem, & duræ cerebri membranae inter cerebellum & cerebrum implicationem haud excedit. Ac proinde id sibi priuatim vendicat, quod sit breuissimus, & nusquam caluariæ contiguus. Per suturas caluariæ, fibras dura membrana porrigit, quæ in peculiare inuolucrum, quod Græcis πεινεγών dicitur, degenerant. Altera membrana cerebri interior, & penitus cerebro coniuncta, Græce λεπτή μὲνιγξ, Latine *tenuis membrana*, vulgo *pia mater* nominatur. Cerebri & cerebelli est inuolucrum, & ipsorum substantiam proxime continet ac firmat. Dicta est alio nomine χορσίδης: quod scilicet instar extimi foetus inuolucris plurima vasa deducat suffulciatque. Pars cerebri in externa ipsius superficie ad elatissimam dextri & sinistri ventriculorum sedem se offerens, tenui membrana non obuoluta, subdurior & magis candicans, vetustissimis Græcis τολλῶδες σῶμα hoc est, *callosum corpus* appellata est: Cerebrum vero tribus insignibus & impense albis donatur cavitatibus seu ventriculis, quorum vnus per cerebri longitudinem in dextra cerebri parte consistit, qui ex posteriori sede deorsum per cerebri substantiam reflexus, ad medium usque basis cerebri perfertur. *Secundus* huic prorsus respondens, in sinistra cerebri parte collocatur, & ambo qua internis lateribus se inuicem spectant, superiori sede, tenui quadam cerebri substantia mutuo distinguuntur, quam Græci διάμεγμυ, Latini *septum* vocant. Communis autem dextri & sinistri ventriculorum cavitates, tertius cerebri est ventriculus, quæ binosa se educit meatus, quorum vnus ex humiliori ipsius sede, ubi acutum angulum per totam sui longitudinem vallis cuiusdam ritu exprimit, recta deorsum versus grandem & peluim porrigitur, cerebri pituitam excipientem. Alter autem meatus, qui posterior est, tertii ventriculi non minima pars censendus venit, qui inter cerebri testes & nates, ac super dorsalis medullæ initium decliuus, ad quartum ventriculum a nonnullis appellatur.

Quartus a nonnullis appellatus cerebri ventriculus. Fornix. tum, contendit, qui communis est cere bello, & dorsalis medullæ initio. Quartus itaque A ventriculus, ad quem posterior meatus tertii ventriculi porrigitur, ex dorsalis medullæ, & cerebelli similibus componitur, non secus, quam si vtraque manu vnam cavitatem fingeres. Ex posteriori dextri & sinistri ventriculorum sede, qua hæc deorsum in priora reflectitur, statim in ipso reflexu, corpus quoddam ampla basi enascitur, similem prorsus substantiam cum cerebri ventriculorum substantia candidior duriorque visitur: dein sensim antrorsum procedens, veluti in acutum trianguli verticem coarctatur. Hoc quidem corpus eo, quod fornix seu testudinis modo exstructum est, vel veluti domus tectum quoddam in sphaeræ superficiem concavam circumactum Græcis *καμάειον*, & *καλλιδοειδης*, hoc est, *testudo fornixue*, & *camera* nuncupatur. Nam eius generis ædificia, qui architecturæ sunt periti, *καμάεις* & *καλλιδος* appellare solent. Iuxta poste- B rioris testudinis modo formati corporis sedem, glandulam natura condidit nuci pineæ, aut turbinatæ figuræ similem, ac proinde veteribus anatomicis Græcis *κωνοειδης*, & *κωνάειον* dicta. Reponitur autem sub valis venosi ex quarto duræ membranæ sinu inter- Glandula. *κωνάειον*. Nates cerebri. tium cerebri ventriculum porrecti initio, mucrone suo sursum spectans, basi vero cerebri substantiæ incumbit. Pars quædam cerebri reponitur inter anteriorem cerebelli sedem, & posteriorem tertii ventriculi partem subflava, quæ effigiem quandam exprimit duabus sibi commissis natibus quam similitimam, quapropter hanc Græci *γλοῦπον*, & *σίδυμον*, Latini *nates*, *clunæ* sue *ac testes* appellant. Ceterum cerebelli pars vna a prioribus Vermicu- lares excre- scentiæ. in posteriora veluti in orbem ducitur, eaque talibus implexa est reuolutionibus, ut vermis in ligno nascentis effigiem appositissime ostendat. Duo itaque huius partis apices, C quorum hic anteriorem ventriculi cerebello & dorsali medullæ communis sedem respicit, ille vero posteriorem a iam dicta similitudine veteribus Græcis *σκοληκοειδης* *επιρύσσεις*, Latinis *excrecentia vermiculantes* vel *vermiformes* dicuntur. Neque enim aliud sunt, quam prominens cerebelli substantia, *σκόληκος*, id est, *vermem referens*. Tenuis membrana cerebelli basin succingens orbiculatim a se educit sui portionem processumve, substantia prorsus cum reliqua tenui membrana similem, nisi quod gracilibus venis intertextitur. Eius processus initium, accurate refert elatissimam regionem infundibuli, quo in angustioris orificii lagenas vinum infunditur. Est enim amplum & orbiculare. Ab ex- ortu vero sensim in arcum infundibuli instar cogitur, donec tādē veluti in angustam oblongamque fistulam similiter, atq; infundibulum finiat, quæ deorsum protensa, per D peculiare sibi in dura cerebri membrana excisum foramen descendit, suo mucrone ad glandem, qua cerebri pituita excipitur, desinens. Hinc vniuersum hoc membraneum infundibuli corpus Græcis ab imagine *χόλον* nuncupatur. Quanquam etiam a scyphi vel labri forma, quam superior huius corporis pars exprimit, *πέλος*, hoc est, *pelvis* nominatur. Porro reticularis plexus, cuius multis in locis Galenus meminit, in boum, non hominum cerebro reperitur. In dextrum autem cerebri in homine ventriculum, simili- Reticularis plexus. Flexus cho- reoides. Animalis spiritus generatio. ter & in sinistrum per ipsius posteriorem inferioremque sedem soporalis arteriæ insignior ramus conscendens, plexum efformat, qui Græcis, quod extimum fœtus in uolucrum refert, *χρησίδης* dicitur. Ex vitali spiritu in illo plexu cerebri muniis, ut diximus, aptato, ac ex aere, quem inspirantes in cerebri ventriculos allicimus, cerebri substantiæ E insita vis, spiritum animale conficit, quo cerebrum ad animæ functiones principes partim vitur, partim per nervos ad alias corporis partes transmittit. De olfactus organo abunde lib. 6. nostræ anotomes, cap. 13. egimus. Et infra sect. 6. cap. 3. de hoc quoque dicemus. Adhunc igitur locum ablegamus lectorem, ne hic iusto longiores simus.

Ceterum nervorum e cerebro prodeuntium septem sunt paria, seu coniugia, quæ Græcis *σέζυγαι* appellantur. Primum par a cerebri basi, qua sinus innititur, cui glandula insidet cerebri pituitam excipiens, initium ducit, & antrorsum nonnihil oblique fertur, dextro quidem nervo sinistrorsum, sinistro autem dextrorsum protenso. In progressu moxque ab ipso ortu ambo inuicem coeunt, atque in eum permiscuntur modum, ut dextrum a sinistro nulla prorsus ratione queas discernere. Hi sane nervi a congressu e calvaria ducendi inuicem mox dirimuntur, & per foramina ipsorum nomine insculpta, in oculorum sedes extra calvariæ cavitatem procidunt. In oculos ubi subierunt, in latam degenerant, expandunturue tunicam, quam a retis similitudine *Retiformem* vocant, de qua paulo post fusius differemus. Inter reliquos autem corporis nervos, ii soli

- A** soli meatu, qui sensu diiudicari possit, perforati creduntur, hincq; adeo Herophilo & Eudemo *πρωτοὶ ὀφθαλμοὶ*, id est, *meatus visorii*, aliis *nerui visorii* appellati sunt. Secundum par paulo posterius, quam visorii ex cerebri basis lateribus principium ducit, & ad foramen in oculorum sedis radice sibi cum aliis quibusdam vasis commune prorepat. Simulatque vero e caluarie excidit amplitudine, dissectus in ramos septem oculi musculorum moribus præest. *Tertium* duabus radicibus inuicem distantibus utrinque enascitur: vna quidem crassiore, cui oportune tertii paris nomē accommodaueris, altera tenuiori, & duriori. Gracilior hæc tertii paris radix exoritur a latere basis cerebri, vbi dorsalis medulla ab ipsa initium ducit. Hinc recto tramite sub cerebri basi antrosum progrediens, duram cerebri membranam perforat, & secundo neruorum pari attensa cum ipso per comune foramen in oculi sedē procidit, in quatuor dissecta propagines, quarū primā per peculiare foramen ad frontis cutē, & musculosam huius sedis substantiam digeritur. *Alterā*, in anteriorem superioris maxillæ sedem prolabitur, ac multiplici serie in musculos superius labrū, & nasi alam extrorsum in suo latere mouentes, & demū in ipsum labrum, & in inferiorū dentium gingiuas dispensatur. *Tertiam*, narium adit amplitudinem, inibi in narium tunicā degenerans. *Quarta*, ad internam temporalis muscoli sedem contendit, tota in eum musculum absumenda. Crassior maiorve a latere basis cerebri, anterieus tamen, principium sumit. Hæc statim ab egressu propaginem diffundit, quæ vitis aut cucurbitæ capreolī instar inuoluitur, ac binos tandem quinti paris neruorū cerebri ramulos in consortium admittens, ipsiq; vnitus in temporalem musculum inseritur, ac in manforium ramulos porrigit, deinde & musculis buccas mouentibus, ipsiq; demum faciei cuti in buccis surculos offert. Postquā vero crassior hæc radix propaginē iā dictam expromsit, non nihil deorsum descendens surculum in gingiuas molarium dentium deriuat, ipsiq; adeo dentibus seriatim soboles distribuit. Dein priusquam decliuis linguam contingat, ramum posteriori ex parte promit, qui musculo in ore delitescēti, & maxillam inferiorē attolenti insertus, inferioris maxillæ foramen adit. In foramen delapsus rantis per antrosum fertur, quousq; sui lateris dentium inferioris maxillæ radicibus singulas offerat soboles. Non minima vero ipsius portio dextri sedi inferioris labri complures surculos deriuat. Maior vero portio crassioris huius radicis, quando linguz basi committitur, cum alterius lateris neruo linguz tunicam efformat, aptum saporibus dignoscendis instrumentū. *Deinde* & exigues quoq; surculos penitus in linguz substantiam dispensat. Proinde vt primum pars visus, ita hoc tertium gustus censetur instrumentum. *Quartum* a dorsali medullæ principio posterius paulo quam tertium par exoritur, sed antrosum modice tensum posteriori tertii paris sedi committitur, atque vna cum illo per commune ipsis foramen ex capitis amplitudine ad palatum elabitur, quo simul atque peruenit, in surculos quosdam partitū, in palati tunicam degenerat. *Quintum* par nonnihil quarto crassius, ac veluti pluribus enatum surculis inuicē mox ab ortu connexis principium ducit ex media propemodum dorsalis medullæ sede. Hoc par vniuersum per foramen fertur impense tortuosum, & priuatim ipsi incisum, quousque in cavitatem pertingat auditus organo præparatam: vbi naris scinditur, & propagines membranæ modo latas huius cavitatis sedibus offert, auditus organi non minimā partem constituens. Præter has propagines, binos educit neruulos, qui seorsum per proprium foramen elabuntur. Vnus non procul ab egressu tertii paris ramo commiscetur, instar vitis capreolī inuoluto. Alter vero per foramen repit impense actum, & insigniter quoque tortuosum, & immissam illi setam non admittens, ob idque etiam cæcum appellatum. Is neruulus transuersim super musculum ducitur, qui a iugali osse pronatus, inferiorem maxillam mouet. Vbi vero ad anterieus vsque eius muscoli latus antrosum prorepat, dicto tertii paris ramo commiscetur, in genarum cutem, & musculos buccæ motuum auctores digerendus.
- B**
- C**
- D**
- E**

Secundum

Instrumentum saporum.

Gustus instrumentum. Quartum.

Quintum.

Cæcum foramen.

F ti paris radice multo gracilior, sed quodammodo durior. Hæc sursum versus priora cerebri sub basi aliquandiu protensa, duram cerebri membranam perforat, ac per propriū foramen sub secundi paris foramine exsculptū, e caluaria procidens in temporalem musculum, illumq; digeritur, qui in ore delitescens maxillæ ad superiora motus auctor censetur. Hanc radicē cum sua coniuge liceret peculiaris coniugii loco recensere. Ve-

Sextum. rum ne aliorum anatomicorū numerus perturbetur, eam quinto pari, adscribemus. **Sextum** par paulo inferius quinto pari, aliquot distinctis, & a se inuicem direntis surculis initium sumit, qui mutuo mox ab initio commissi vnum efformant neruum, qui non procul ab egressu in musculos posteriorem cervicis sedem occupantes ramum diffundit, numerosa vtrunque serie in soboles digestum, quarum præcipue musculo exporriguntur scapulam mouentium secundo. Ipse autē sexti paris truncus soporariæ arteriæ & septimo pari coheret, & simul cum ipsis membranæ interuentu connexus, ad laryngis vsq; lacera protenditur, inibi portionem a septimo pari assumens, illaq; se augens. Dein quum hanc asciuit portionem, laryngis musculis ramulos transuersim exhibet. Hinc soporali arteria & interna iugulari concomitatum, ad thoracis vsque elatiorem sedem descendit, ac mox insignem vtrunque propaginem ad primæ thoracis vertebræ **B** **latus**, seu potius ad anteriorem primæ thoracis costæ radicis sedem deriuat. Præter hæc propaginem iuxta superiorem thoracis sedem ramulos musculos offert, a pectoris ossis, & clauicula ad mamillarem capitis processum deducto, & ab eo, qui capitis motibus inseruit, ac musculo, qui os, referens, hinc pectore accedit. Præterea, & illi, qui hinc ad infimam primæ cartilaginis laryngis sedem perfertur. Ita hætenus vterque sexti coniugii neruus priusquam cavitatem thoracis subeant, distribuitur.

**Dexter ner-
uus recur-
rens.**

Sinister.

Quum autem dexter sexti paris neruus thoracis cavitatem ingressus est, atque inter arterias & venas in iugulo repit, ab interiori ipsius latere modo tres, modo duos inuicem mox succedentes ramulos diffundit, qui ad arteriam, quæ in dextram alam exporrigitur, veluti ad trochleæ rotulam reuoluti simul cocunt, neruumque vnum efformant, ad dextrum asperæ arteriæ latus sursum excurrētem, qui ob id neruus dexter recurrens nuncupatur. **Sinister** iam thoracis cavitatem ingressus, arteriæ in sinistrum propagatæ ramulos, qui sursum reflecterentur de se porrigere nequit, quod ea oblique sursum, nō autem arteriæ dextræ modo transuersim in aliam contendit. Proinde hic sinister neruus tantisper versus cordis basim descendit, quousque extra cordis inuolucrum arteriæ magnæ contingat truncum, qui deorsum ad spinam explicatur. Atque hic mox tres, aut etiam pauciores a neruo educuntur surculi, qui ad arteriæ truncum, quæ is ad spinam deflectitur: reuoluti inuicem vniuntur, sinistramque neruum recurrentē constituunt. Qui sursum properans membranæ beneficio asperæ arteriæ sinistro lateri attenditur: ac quum primum laryngem contingit, non minus quam dexter neruus in ramos deriuatur, qui omnes in sui lateris musculos deorsum capita, fines autem sursum habentes; cessant. Postquam iam reuersiuos expromsere, sexti paris nerui, ac cordis basin spectant, ramulos duos notatu dignæ crassitudinis in pulmonum tunicas, cordisque inuolucrum dispergunt. Quod reliquum est, deorsum ad stomachum fertur, ac dexter dextero ipsius lateri attenditur, sinister autem sinistro. Mox vero atq; hi nerui stomacho membranæ interuentu laxè adnectuntur, singuli in binos partiuntur ramos, adeo oblique secundum stomachum conuolutos, vt dextri nerui rami sinistram ipsius sedem in progressu obtineant, sinistri autem rami dextram sedem amplexentur. Atq; ita quatuor præsentis rami septum transuersim vna cum stomacho permeant, ac sparsa admodum serie superius ventriculi os ambiunt, ceteruntque, propagines in priora ac posteriora corporis ventriculi spargentes. *Deinde* propaginem inferiori omenti membranæ offerunt transuersim in iecoris, & lienis cauum porrectam. Item collo intestino, duodeno, ac ieiuno intestinis, item bilis vesiculæ, mésentério, renibus, vesicæ, & vtero surculos præbent. **Septimum** ac vltimum par, vt ceteris paribus durius est, sic quoq; ex duriori nascitur principio. Incipit enim aliquot inuicem distantibus surculis a dorsali medulla, vbi modo caluariam est egressura. Hoc præterquam quod sextum par impense auget, præcipue in linguæ, & ossis referentis, & laryngis musculos absumentur. Priusquam vero reliqua neruorum paria attingamus, oculi constructionem interseremus. Constituitur autem oculus ex septē tunicis, & tribus humoribus. Prima tunica, in quam visorius neruus degenerat, expanditurue, mediam oculi sedem in anteriora duntaxat, **F** **ambit**, vitreique humoris posteriori sedi proxime obducitur, illum integens, & dilatata substantiæ admodum similis, ac proinde mollis, & veluti mucor aliquis e narib. proci- dens nihilque minus quam membranea existit: vt hoc nomine Anatomicorū nonnulli hanc tunicam appellare haudquaquā voluerint. Hæc forma dimidiato tantū oculo compa-

**Oculi con-
structio,
hoc est tu-
nicæ & hu-
mores.
Prima reti-
formis.**

- A** comparatur, aut minori piscatorum reti, q̄ vni accommodatur baculo, & ex ampla basi dimidiati globi modo in obtusum mucronem fertur. Ab huius itaq; retis imagine pre-
lens tunica Græcis ἀμφιβληστροειδής, Latinis *retiformis* dicta est. Altera tunica vniuersæ an-
teriori sedi crystallini humoris, instar tenuissimæ ceparū pelliculæ obnascitur, durior
tamen, nulla parte posteriorem ipsius sedem contingens, sed inibi finiens, vbi crystalli-
nus humor amplissimus cernitur. Hanc a continuarum araneæ telarū imagine, & quod
tenuissima ac pariter pellicula sit, Græcis ἀράχνοειδής, Latinis *araneiformis* appellatur. Ter-
tia tunica ex tenui procreatur membrana. Quippe hæc simulatq; cum neruo oculum
subit, in tunicam degenerat ad omnes oculi sedes globi modo pertinentem. Nō enim
vti primam, posteriorem tantum oculi sedem occupat, verum & anteriori quoq; obdu-
B citur, & in tota posteriori oculi sede primam tunicam proxime inuestit. Qua vero an-
teriori oculi sedi obducitur, interna sua superficie vndiq; aqueum siue albugineum vo-
catum humorem contingit & complectitur. In anteriori regione nonnihil introrsum
comprimitur, & in huius compressionis medio, foramine quodam peruia est, q̄ nobis
pupilla, Græcis αὐτὴν nominatur. Adeo vt hæc tunica vix folliculo, a quo peduncu-
lus, quo affirmatur, extractus est, quā similima existat. Hinc Græcis παρρηϊδής, Latinis *vua*
dicitur. Quoniā vero a tenui cerebri membrana hæc tunica constituitur, & quod oculi
venas & arterias sustinet, perinde atque tenuis membrana cerebri vasa suffulcit, aut q̄
multorum vasorum inuolucris foetus instar est vinculū, Græcis etiam χορδοειδής, nostræ æ-
tatis medicis *Secundina* nominatur. Atq; eam quidem partem, quæ posteriorem oculi se-
C dem occupat, & nigra est, quartam esse tunicam recentiores arbitrantur. *Quinta* a dura
cerebri membrana visorū neruū inuestiente nascitur. Quam primū enim hæc mem-
brana oculi posteriori sedi applantatur, dilatescit, & crassior ac durior euadens, orbi-
culatim vndiq; oculo obducitur, tam in anteriora, quam in posteriora pertingens. Hęc
autem, perinde atq; prior, non simplici donatur nomine. *Qua* enim posteriorem oculi
sedem constituit, & in anteriori sede ad iridē vsq;, quæ nō est nisi maior oculi circulus,
quo album oculi a nigro distinguitur, pertingit, crassa & dura est, vnde Græcis σκληρής, Latinis
Dura nuncupatur. Ea vero sede, qua oculi nigrum consistit, hæc tunica in cornu
imaginem degenerat, quod in laminas diuisum, & exacte læuigatum, vitri alicuius lu-
cernæ accommodatur, pellucidumq; est. Atq; hinc est, quod Græcis κερτοειδής, Latinis
D vero *Cornea* vocat. Septima tunica est ea, quæ anteriori quoq; duræ tunicæ parti ad Iri-
dem vsq; obnascitur. Hęc quia oculum continet, & vicinis partibus committit, Græcis
ἐπιπρεπυκός, Latinis *adherens*, Barbaris *coniunctina* appellatur. Alba quoque a colore, quem
obtinere, nuncupatur. Hactenus oculi tunicas enarrauimus. Inter tres eiusdem humo-
res oculi centrum est humor, qui Græcis χυρσαλλοειδής, Latinis *Glacialis & crystallinus* voca-
tur, a similitudine, quam cum lucidissima glacie obinet, non quidem in consistentia &
duritia, verum in colore. Albus enim clarus, lucidus, splendens, & mediocriter durus
est. Ab oculo exemptus nō est exacte rotundus, sed anteriori & posteriori parte leuiter
compressus, ad lentis fere similitudinem, vnde etiam Græcis φαλόνειδής dictus est. Alter
humor in posteriore oculi sede reponitur: vulgati quidem albo vitro iam refrigerato
E colore & luciditate respondens, hinc Græcis ὑαλόνειδής, Latinis *vitreus aut vitriiformis* di-
citur. Hic humor multis numeris copiam crystallini humoris superat, & quū adhuc in
oculo reponitur, semiglobo similis est, cuius plana superficies oculi interiora spectat,
rotunda vero in posteriora protendit. Consistentia humore crystallino longe mollior
visitur, & ab oculo exemptus suam formā neuiquā seruat, quamuis interim aque modo
non defluat, sed ita consistat, quemadmodum vitrum in fornacibus fustum. Ceterum v-
niuersum spatium, quod inter anteriorem crystallini humoris sedem, & pupillā habetur;
humore adimpletur, qui aquæ modo tenuis & pellucidus est, & ob id Græcis ὑδαλονειδής,
Latinis vero *aqueus* vocatur. Quanquam nonnulli hunc oui albo comparantes *albugi-*
neum nuncupant. Iam reliquum est, vt alia quoque neruorum paria commemoremus.
F Nerui autem a dorsali medulla in vertebra conclusa principiū ducentes triginta com-
plectuntur paribus, quorum septem cervicis a vertebra exsiliūt, duodecim a thoracis,
quinque a lumborum, sex a sacri ossis nullo interim neruo a coccyge osse profiliante.
Quæ a cervicis exsiliunt vertebra, in musculis ipsis adnatos proximosque digeruntur;
& a quarto, quinto, & sexto, parium surculis vtrinq; vnus efficitur neruus, septo trans-
uerso proprius. A quinto, sexto, & septimo paribus, varius neruorum confluit rex-

Secunda a
rachnoides.

Tertia v-
nea.

Quarta s-
cundina.

Quinta
dura.

Iris.

Sexta cor-
nea.

Septima
adherens.

Humores
oculi tres.
Crystalli-
nus.

Vitreus.

Aqueus.

Nerui a
dorsali me-
dulla orti.

A cervicis
Vertebra.

A thoracis. tus, *quemadmodum alibi fufius docuimus.* A iam dictis vero paribus, & dein a primo & secundo thoracis sex in brachium pullulant, præter varias soboles scapulæ cauo & gibbo dispersas. Ac **Primus brachium subiens nervus.** *primus* brachium subiens nervus, eius quinti paris nervorum rami soboles est, qui in muscoli brachium attollentis sedem a scapulæ spina pronatam digeritur. Atque hæc soboles impense gracilis in cutem brachii externæ sedi obductam diffunditur. **Secundus.** *Secundus* per axillam brachium ingrediens, ramulosq; priori cubitum flectentium musculo præbens, insignem ipsius portionem tertio accedenti brachium nervo impartitur. Ipse vero in cubitum festinans, & ramulum primo radium in supinum ducenti musculo exhibens, cutem subit, ac in varias dissectus propagines, superioris interiorisque cubiti sedis cutem ad extremam vsq; manum implicat. **Tertius.** *Tertius* per axillam quoque descendens, & anterioris brachii sedis cuti ramulos depromens ac secundi nervi portione adauctus, propaginemque communicans, posteriori cubitum flectentium musculo per interiorē sedem interioris tuberculi ossis brachii in cubitum properat, musculis hinc principium ducentibus furculos vna cum quinto nervo spargens, & secundum radium exporrectus, atq; in manus volam ductus, duas soboles pollicis internæ sedi & totidem indici quoque, & vnam tantū externo lateri interioris sedis medii clargitur, non infrequenter etiam medio binos ramulos, & vnum annulari offerens. **Quartus.** *Quartus* brachii nervus ceteris multo crassior, per axillam ingrediens, & ramos musculis cubitum extendentibus disseminans, per brachii posteriora ad externum ossis brachii tuberculum contendit, in cutem prius duas diffundens soboles. Nervus ad hanc externam articuli cubiti sedem positus, ramum in cutem externæ cubiti sedis ad brachiale vsq; spargens, & mox in duos veluti truncos diuisus, musculisque ab externo brachii ossis tubere pronatis soboles dans, vnum truncum vlnæ exporrigit, a quo ramuli in musculos ab externa ipsius sede pronatos digeruntur, ipse autem truncus iuxta brachialis radicem cessat. Superior vero truncus radio exporrigitur, & præter furculos graciles, quos accumbentibus præbet musculis, brachiale petit, & duos ramulos externæ pollicis sedi, ac duos item indicis, & vnum medii digiti interno lateri impartit. **Quintus.** *Quintus* nervus arteriæ brachii proximus in axilla latitat, & nullas omnino soboles in brachio a se deducens in cubitum per posteriorem interioris tuberculi ossis brachii sedem pertingit, ac musculis hinc pronascētibz vna cum tertio nervo ramos communicans, per vlnam ad brachiale excurrit, in medio ductu ramum diffundens, qui duobus furculis in externam parui digiti sedem, & duobus item in anularis, & vno in medii exterioris sedis externum latet absumitur. Quicquid vero quinti nervi internam brachialis sedem adit, anteriori parui digiti sedi, & anularis, & medii ramulos offert. **Sextus.** *Sextus* nervus insigniter gracilis, per internam brachii sedem sub cute deducitur, & in progressu ramulos quosdam in cutem diffundens, ad cubitum pertingit, in cuius cutem per vlnam ad brachiale vsque crebris furculis disseminatur. Porro a nervis e thoracis vertebra profiliētibz præter ramos, qui retrorsum ad spinas vertebrarum, & hinc in musculos ab illis principium ducentes porriguntur, singula costarum intervalla singulos sibi ramos vendicant, ad pectoris, & abdominis vsque medium orbiculatim pertinentes, & musculis thoraci instratis, abdominisque musculis, & demum curi furculos dispergentes. Ad hæc ab intercostalibus nervis portiuncula digeruntur, quæ sexti paris nervorum cerebri propagines costarum radicibus exporrectas adaugent. Ceterum distributio e lumborum vertebra progredientium, thoracis nervis magna ex parte respondent, quod e singulis rami retrorsum ducantur in musculos vertebra adnatos disseminati, & per ilia ad abdominis medium circulatim ascendunt, ramulos proximis musculis & cuti clargientes, verum a primo horum pari ad testes cū seminalibz arteriis propagines quā minime pertingūt. **A lumborum vertebra.** A quatuor autem humilimis paribus nervi in crus procidentes principium sumunt. Primum insuper sacri ossis nervorum par, similiter ac thoracis & lumborum paria e vertebra elabatur. **A sacro osse.** Quinque autem humiliora sacri ossis paria non a lateribus profiliunt, verum vna radice antrosum, altera retrorsum egrediuntur, & posterioribus radicibus in musculos sacro ossi & ilium ossibus adnatos, & cuti sparguntur. *Anterior* vero primi paris ramus, vna cum anterioribz trium succedentium parium radicibus omnium maximum nervum in crus disseminatum constituit. Humiliorum autem parium radices in vesicam, anum, & penem, aut mulieribus in yteri cervicem, & pudendi coliculos

A deperduntur. Ceterum, quatuor nervi in crus progrediuntur. Primus per sextū femur mouentem musculum deducitur, ac in externam femoris cutem ramum disseminans, in musculos absumitur externum femoris latus occupantes. *Secundus* simul cum grandiori femoris vena, & arteria femur subit, mox ramū depromēs per internum femoris & genus articulum, & tibiæ regionem ad summum vsq; pedis digitorumq; extrema sub cute simul cum vena descendens, huc illucq; ramos digerens. Quod vero secūdi nervi est reliquum, in musculos cessat anteriore femoris sedem contegentes. *Tertius* nervus pubis ossis foramen perreptans, 9. & 10. femur mouentibus musculis ramulos offert, sobolemq; deriuat in internam femoris cutem aliquoulsq; sparsam: reliquum autem eius nervi in secundū tibiā mouentem musculum, & quintū femur mouentem spargitur, in interna femoris sede inibi locatus. *Quartus* omnium corporis neruorum, qui ex pluribus nervis construuntur, crassissimus, vbi coxendicis os a sacro dehiscit, in posteriora femoris ducitur, ramum in cutem femoris posteriorem spargens, qui paulo sub media femoris longitudine cessat. Humiliori enim sedi alius offertur ramus, a quarto propagatus neruo, qui etiam musculis a coxendicis ossis infima posteriorique sede pronatis, soboles exhibet, vti & musculis ab inferioribus femoris capitibus exortis. Dein in poplitis regione in duos dissectus truncos, graciliore exterioremve ad fibulæ cum tibiæ osse iuxta genu articulum defert, a quo ramus ad externam tibiæ cutem dispergitur. Eius vero trunci reliquum fibulæ exportigitur, vbi 7. & 8. pedem mouentium musculorum pendet origo. Porro grandior interiorue truncus ramum in internam tibiæ cutem, & in suræ pariter cutē ad calcem vsq; porrigit. Ipse vero in musculis suram constituentibus occultatus, ramum per ligamentum membraneū mittit, quo fibula tibiæ alligatur. Hic ramus musculis anteriore tibiæ sedē obtinentibus reconditus, tandē in pedis superiora contendit, inibi digitis oblatas. Præcipua eius grandioris trunci portio secundū tibiæ posteriora deorsum properans, & nonnullas soboles huc illuc musculis exhibens, inter calcem interioremque malleolum pedis humiliora adit, & exiguas admodum soboles musculis inibi repositis offerens, inferiori singulorum digitorum sedi duas propagines cōmunicat.

Quatuor nervi cruris perentes.

DE FACULTATIBVS, SECTIO VI.

. Quid facultas. CAP. I.

D



FACULTAS, quæ Græcis *Νύξις* dicitur, *Gal. lib. 1. de naturalib. facul. teste*, non est, nisi causa, a qua procedit actio. Vel, *ut aliis verbis lib. 1. de simpl. medica. facult. c. 1. idem definit*, causa quædam effectrix. Ita quoque in libro de plenitudine, facultatem appellat *causam effectricem*, nihilq; referre arbitrantur *degeniv, an πειννεν* dicas. Nec aliter definit facultatem in libello *de facultatum substantia*, item in *lib. 1. de causis pulsuum*, multisq; aliis locis, quæ nihil attinet referre. Vt in promptu sit, Galeno nihil aliud facultatem dici, quam *efficientem rei cuiusque causam, quacunque tandem ea sit*. Facultas autem ideo est appellata, *Gal. in lib. de facul. essentia teste*, quod quæ facit facere possit. Verbi gratia, *aloen tot facultates habere dicimus, quot res facit*. Itaque hanc purgare posse, & stomachum roborare, & vulnera glutinare, vlcera plana cicatrice inducere, & humentes oculos siccare cum omnib. constet, ideo aloeni purgandi facultatē, & stomachū roborandi, & vulnera glutinandi, & vlcerib. inducendæ cicatricis, & oculorum humores exsiccandi: in summa tot habere facultates, quot actiones, dicimus: Facultas vero hæc, siue causa actionis, Galeno non est nisi naturalis constitutio, seu rerum nativa temperies. Quanquā enim alicubi, præsertim *lib. de causis pulsuum c. 1.* diserte se ignorare facultatum essentiam fatetur: tamē in *lib. 1. de simplicium medic. facult. c. 1.* non aliud, nisi certam quandam elementorum temperiem, aut temperamenti proprietatem esse affirmat, quo nomine naturam *2. sect. aphor. Comm. 51. & lib. 2. de sympt. causis. c. 1.* multisque aliis locis appellat. Et in *lib. 1. de præsagitione ex pulsibus*, idem asserit, vbi in hunc modum scribit: *Facultatis essentia in singularum partium cōmodo temperamento est posita. Nam tum demū suum quæq; munus obit strenue, vbi est temperatissima, contra male fungitur, si intemperata est.* Præterea, in *lib. 2. eiusdem operis*. Nihil, inquit, in illis cōmentariis attulimus *de facultatis essentia*: neq; enim prius hoc decretū, quam undique reperissem, constans pro-

Facultas cur dicta.

Essentia facultatis quæ.

Natura.

nuntiare fuit ausus. Nunc vero essentiam facultatum addocti sumus, nihil esse præter qualitatem A
temperamenti. Hæc ille. Quæ sane verba ideo recitanda nobis esse duxi, quod Galenica
de re sententiam perspicue ostendant, & causam, cur de facultatum essentia aliis in
locis dubitauerit, exponant. Denique in libro de plenitudine, manifestis verbis, *facul-*
tatum gubernantium corpus essentiam temperamenti proprietatem existere asserit. Atque hæc
plane de facultate loquendi ratio Medicis est accommodatissima, ut qui in profligandis
morbis, & tuenda sanitate alio non respiciunt, nisi ad hanc temperamenti propieta-
tem, quam si temperata est, omni studio sarram tectam conseruare nituntur: si intem-
perata est, ad mediocritatem & conuenientem temperaturam reducere studet. Quod
monendum esse putauimus, propter eos, qui facultatem esse vim illam, & potestatem dicunt,
quam anima ex se profert, & tanquam de sinu suo promit, actionesque edit. Quorum B
certe sententia, facultas non est nisi insita & ingenita animæ proprietas, quæ ipsa qui-
dem est accidens, & nulla essentia portio, sed intimum quiddam & ingenitum. Verum
hic loquendi modus Philosopho magis, quam medio conuenit, ideoque Galeno ne-
glectus.

Facultates corpus nostrum gubernantes tres. CAP. II.

Tres facul-
tates ani-
mal guber-
nantes.

Cum Galeno facultas non sit, ut demonstratum est, nisi effectrix causa, tot certe illi erunt
facultates, quot efficientium causarum propria insunt corpori differentia. Sunt autem effi-
cientium causarum tres differentia. Igitur tres quoque animal gubernantes facultates erunt diuersi
inter se generis, & sedibus disclusa, totique corpori ex suo quodam veluti fonte quæq; distributa, na-
turalis scilicet, vitalis & animalis. Plato in 4. de Repub. Gal. etiam libr. 9. meth. capit. 10. attestante, C
animas nominat. Esse autem diuersi generis hinc maxime pater. Cum enim vnâ-
quamque temperamenti proprietatem sua sequatur facultas, vnâquamque vero fa-
cultatem sua actio: ut diuersæ inter se cuiusque partis sunt actiones, ita diuersæ eius
sunt etiam facultates. Et ut hæ ipsæ inter se sunt diuersæ, ita temperamenta quoque
diuersa sint oportet. Animalis est, quæ ex cerebro per nervos, ceu canales quos-
dam, sensum & motum in vniuersum corpus transmittit, ac intellectum fouet. Hinc
Galeno & aliis Græcis *λογιστική*, hoc est, *ratiocinatrix* alio nomine dicta est. Ea quidem vo-
luntariis actionibus vna cum sensibus præsidet, & in cerebro domicilium habet, & in-
ter tres facultates primum & summum obtinet locum. Vitalis est, quæ ex corde, in quo D
sedem habet, ceu quodam insiti caloris fonte, per arterias, veluti canales, vitæ toti cor-
pori impertit. Hæc non modo ut stirpibus, aut vita præditis, sed etiam ut animantibus
nobis insita est. Græcis tum Medicis, tum Philosophis alio nomine *θυμωδής*, hoc est, *i-*
rascibilis, seu *animosa* vocata est. Irascibilem autem facultatem in corde sedem obtinere
multis veterum poetarum testimoniis Galenus lib. 3. de placitis Hippo. & Platonis confir-
mat, quæ breuitatis ergo præterire placuit. Atque hæc secunda, & quasi media, aut in
medio corporis sita est facultas. Naturalis est, quæ ex iecore per venas omnibus parti-
bus corporis alimoniam præstat. Græcis alia appellatione *ἐπιθυμητική* id est, *concupiscibi-*
lis, seu *appetrix*, vocatur. Appetitricem autem hanc facultatem iecur pro fonte habere
Homer. Odyssæ A, & inter Latinos poetas Ouid. eleganter ostenderunt, vbi Tityi p-
pter stuprum, quod Latonæ offerre conatus est, iecur vultures rodere sinxerunt, utpote E
in eam partem illato supplicio, vnde iniuriæ origo exstiterat. Hæc tertia & infima est
facultas. Ceterum hæ facultates tres a Medico non solum in sanis, sed & ægris magno
studio conseruandæ sunt. Nam has seruare, ut Galeni lib. 9. Therap. metho. cap. 10. verbis
vtar, nihil plane aliud est, quam vitam seruare. Cum autem vita, Galeno ibidem teste, non
sit nisi ipsæ vires, aut earum actiones, maxima me hercle virium erit dignitas, quando
viuere ipsum nobis ex harum custodia constet. Virtus igitur omnium prima custodienda
est, adeoque si in morbo aliquo extrema imbecillitate laborant vires, priusquam
morbo medeamur, vires instaurandæ sunt. Proinde toto hoc tempore, quo vires ac fa-
cultates reficiuntur, eorum, quæ morbum sanent, nihil plane ægroto exhibendum e-
rit, ut libro quinto fusius dicetur.

Facultates
corpus no-
strum gu-
bernantes
a medico
conseruan-
dæ.
Vita quid.

Animalis facultatis genera. CAP. III.

Animalis
facultatis
tres diffe-
rentiæ.

Vniuersum animalium facultatum genus Galenus in tres partitur differentias, *sen-*
tientem sensusue effectricem, mouentem, & principem. Sentiens, quæ Græcis *αἰσθητική* dici-
tur,

- A** rur, quinque in species distribuitur, nempe *facultatem videndi, audiendi, odorandi, gustandi, & tangendi*. Quæ enim videt animal, ea ipsa facultate nec audit, nec odoratur, nec gustat, nec tangit, tanta scilicet est inter eas diuersitas, quam & instrumentorum, & subiectorum in quæ incumbunt, varietas peperit. Videndi facultas est, *quæ in oculo sita colores per medium excipit*. Consedit autem in crystallino humore, qui pellucidus, primum est videndi instrumentum, humoribus circumfusus, tunicisque, *de quibus suo diximus loco*, septum, quæ vsum ei conferunt, vt melior perfectiorq; sit visio. Audiendi facultas *in auribus sita est, sonos percipiens, eiusq; discrimina diiudicans*. Audiendi autem instrumentum præcipuum est quinti paris cerebri neruorum alter, qui cavitatē temporis ossi incisam membranæ modo oblinet, non quidem vniuersam, at quibusdam tantum sedibus, quasi ea nerui portio in plures diuideretur membranas, aliquot eius cavitatis regionibus obductas. Non temere vero dictum est *præcipuum*: non enim solum neruus ille membranæ modo dilatatus, sed & ossicula duo, quorum vnum incudi, alterum malleolo assimilatur, cum aere quodam prætenui auribus ingenito, & membrana obuoluto, ad aurium imam capacitatem posito, quo auditorii nerui extremum pertingit, auditus instrumenta sunt. Nec ab re dictum est, *cum aere ingenito seu interno*, exterior enim mediū est, per quod auditio fit. Odorandi facultas *odores percipit, eorumq; discrimina diiudicat*. Eius proprium instrumentum extra caluariam non excidit, sed sunt processus quidam cerebri albicantes, neruis non ab similes in anteriori cerebri parte ducti, ad sinus octaui capitis ossis, qui horum gratia parati sunt, pertingentes. Oriuntur autem non ab anterioribus ventriculorum cerebri sedibus, quod ventriculi cerebri, qua maxime in anteriori cerebri parte consistunt, antrosumq; spectant, ampli & lati, neutiquā in angustum cogantur: sed a posteriori potius eorundem sede, cornu modo per cerebri substantiam deorsum descendentes, atq; antrosum porrecti a cerebro abscedunt, neq; amplius tenui membranæ connati, in suum singuli porriguntur sinum: & adhuc antrosum magis protensi ad sinuum finem, seu anteriorem ipsorum sedem desinunt, sinibus suffulti ac cerebro interim proxime accumbentes. Illic itaq; constituta odorandi facultas per narium ductus, ossaque cribri modo perforata, vna cum aere haustos rerum odores comprehendit. Gustandi facultas *rerum sapes internoscit*, cuius quidem instrumentum esse linguam oris amplitudini ad amussim congruentem, medicis iuxta ac philosophis concessum est omnibus. Gustus enim occasione a tertio pari neruorū cerebri, neruus linguæ offertur, qui hoc nomine gustatorius anatomicis appellat. Maior. n. portio crassioris radici iam dicti neruorū paris, simul atq; linguæ basi cōmittitur, cum alterius lateris neruo linguæ tunicam efformat, aptum saporibus dignoscendis instrumentum, vt suo quoq; loco monstrauimus. Tangendi facultas *tangibiles qualitates differentiasue animaduertit, vt sunt durities, mollities, leuitas, grauitas, densitas, raritas, asperitas, lenitas, crassitudo & tenuitas*. Vt autem reliquæ facultates propriis conclusæ sunt instrumentis, ita tangendi facultas nullo proprio coarctat organo. Cum. n. tactus ad animantis vitam sit maxime necessarius, toto corpore æquabiliter, neruorum ope fusus est. Vt toto cœlo erreret Arist. qui in libello *de sensu* organum tactus in corde locare videtur. Porro iam ordine cōmemoratas facultates, alii quinque sensus externos nominant, non certe quod foras expromti sint & pmineant: id enim falsum esse vel vnus odorandi sensus satis ostendit: sed quod externarum rerum propriis instrumentis cognitionem capiant. Atq; hæc de prima animalis facultatis differentia dixisse satis sit. Mouens facultas vt vnum, idq; certum sibi vendicat instrumentum, musculus nimirum: ita & motionis modū ipsū obtinet vnum, voluntarium scilicet. Hæc sane facultas, quæ voluntatis imperio mouet, alio nomine *ἡ δὲ ἐκ μὲν, & πρῶτη* proprie vocatur, quasi *factricem* dicas. Tertia animalis facultatis differentia princeps, quod a principe parte prodit, triplex est, Galeno auctore, nempe *imaginatrix, rationatrix, & memoratrix*. Aristoteles, Theophrastus, Themistius, & Periparetici fere omnes, quartam adiiciunt, quam *sensum communem* nominant. Hanc **F** autem Gal. sub imaginatrice complexus est. Nam hæc imagines ab exterioribus sensib. oblatas apprehendit, & singulorum sensuum obiecta discernit. Quod dum facit, necesse est, vt formas & imagines, quas sensus præbēt & renuntiant, retineat: adeo vt digressis iis, quæ sensus ciebant, illorum tamen vestigia & effigies diutius hæreant, & cunctentur in nobis. Quapropter sub imaginatrice facultate id etiam, quod alii sensum cōmu-

Sentiens.

Videndi facultas.

Audiendi. Instrumentum auditus.

Odorandi facultas. Instrumenta olfactus.

Gustandi facultas.

Tangendi facultas. Tangibiles differentie.

Aristotelis error. Sensus quinque externi.

Mouens facultas.

πρῶτη. Princeps facultas.

Imaginatrix facultas.

Galēnus
sub imagi
natrice fa
cultate sen
sum cōmu
nem quare
complexus.
Communis
sensus cū
dictus.

Ratiocina
trix facul
tas.

ῥαϋον.
δύναμις.
Memora
trix.

Sedes prin
cipum fa
cultatum.

Error iunio
rum dete
ctus.

Liber de
corde, non
est Hippo
cratis.

Vitalis fa
cultas cū
dicta.

Vitalis fa
cultaris ne
cessitas.

nem nuncupant, Galenus merito complexus est. *Communis* enim nulla alia de causa **A**
vocatus est, quam quod externis sensibus ceu famulatu multiplici ac vario vtitur, ipseque
instar regis ac principis, & tanquam iudex pro tribunali sedens, ut Themistii vtar ver
bis, de omnibus, quæ quinque illi sensus suis quinque officiis perfuncti annuntiarunt,
pronuntiet, censeat, & iudicet. Vt igitur Philosophi sensum communem veluti e sugge
sto rerum omnium imagines a ministris & nuntiis sensibus extrinsecus allatas, & ante
sepositas contemplari, apprehendere, adeoque externarum rerum varietates discer
nere, internoscere, iudicare, continere, & recondere statuunt: ita quoque Galenus hæc
omnia imaginatrici facultati tribuit. Altera principum facultatum est, quam Galenus
δύναμιν, Latini *cogitatricem*, & *ratiocinatricem* appellant. Hæc utique conceptas species **B**
& imagines sub censum & iudicium reuocat, ac quæ qualesque illæ sint, iudicat, adeoque
ratiocinatur aliud ex alio eliciens, componit denique & diuidit. Omnes vero ratioci
nandi notiones ab imaginibus & spectris rerum externarum, & quæ sub sensum cadūt,
proficisci hoc argumento colligitur: quod quem natura cecum, surdumque progenuit,
is non possit Geometriam edoceri: neque qui odoratu destitutus est, aut gustu, possit
villam de odoribus & saporibus cognitionem animo concipere, & qui non sentit, nihil
discere, vel intelligere potest. Hæc facultas; quæ de singulis ratiocinatur, contempla
tur, consultat, ac iudicat, Hippocrati *ῥαϋον*, hoc est, *mens*, Galeno *δύναμις*, id est, *ratio*, Phi
losophis intelligentia nominatur. *Memoratrix* facultas, quæ Galeno *μνημονευτική* appella
tur, quod a prioribus est receptum, & elaboratum, ceu fidiissima tutrix, conseruat, reti
net, ac veluti in horreū condit, & quod firma contentione seruauit, in vsu tum expro
mit, quum ceteræ iam cessant. Ceterum principes facultates totius sunt cerebri, in cu
ius toto corpore fuscæ sunt, ideoque suas actiones non certis ac diuersis cerebri locis ex
ercent, sed in toto potius cerebro. Vnde palam fit, iuniores ab antiqua & veteri Philo
sophia, atque medicina prorsus defecisse, qui imaginatricem facultatem priore cerebri
parte, ratiocinatricem media, memoratricem posteriore collocarunt: vel, ut ipsi lo
quuntur, imaginationem in anterioribus cerebri ventriculis, cogitationem in medio,
memoriam in postremo ventriculo hætere purant. Hæc enim opinio ex Arabum fa
ctione *primum nata*, nullis rationibus stabilita, partim ficta pueriliter, partim effutita te
mere, ita demum iactationem habuit in populo. Siquidem non est necesse, principes il
las, & interiores, ut alii vocant, facultates sedibus & instrumentis diiungere, quum **D**
vna eademque essentia contineantur, sede vna firmentur, similique vrantur instru
mento corporeo, quanquam efficiendi ratio est diuersa. Hinc est, quod Galenus nus
quam ista domiciliorum distinctione vsus sit, sed simpliciter principes facultates se
dem in cerebro habere tradit, idque non solum de sua, sed & Hippocratis, atque Pla
tonis sententia. Vt inde perspicuum fiat omnibus, librum de corde inscriptum, non
esse ad Hippocratem auctorem referendum. Nam in eo manifeste docetur *ῥαϋον*, hoc
est, *rationem in sinistro cordis ventriculo habitare*. Verum sunt etiam alia multa in hoc libello
dogmata Hippocrate indigna, & a ratione plurimum abhorrentia. Vt hoc nomine ni
hil, aut parum illi libello fidendum sit. Si itaque Hippocratis, Platonis, & Galeni ratio
nibus iuniores non cedunt, audiant saltem vniuersam Græcorum medicorum familiam, **E**
qui omnes ad vnum iisdem principiis informati, læsa memoria non modo occipiti, sed
toto capiti ac cerebro remedia adhibere præcipiunt.

De vitali facultate. CAP. IIII.

Altera facultas, cuius vnus sedes est in corde, vitalis, quod vitam in vniuersum dif
fundat & deriuat corpus, dicitur. Nam ceteras omnes, quum adhuc rudes & in
coatæ sunt, perficit, easdemque quoad viuit animal ruetur, & ad agendum impellit. Id
plane declarat syncope, in qua tantisper dum vitalis facultas corporis partes nō guber
nat, reliquæ quoque facultates omnes pariter intermissionē faciunt. Mox autē ut ea ex
citata reuixerit, ac seipsam collegerit, omnes illæ quasi recreatæ recurrunt. Proinde **F**
tanta est vitalis facultatis necessitas, ut citra illius opem reliquæ ne minimum quidem
efficiant. Hinc recte, ut comprehensum est, vitalis nomen ei impositum est, quod præ
stantiore magisque salutari vitæ genere corpora illustret, vnaque reliquarum o
mnium perseverantiam, & firmitatem contineat. Est enim animantium vita, fa
cultatum

Acultatum actionumque earundem conseruatio, a corde cum influente calore profecta. Vitalis facultas a reliquis diuersa. Est aut hęc facultas a reliquis, nempe animali & naturali, secus ac nonnulli arbitratur, diuersa. Ab animali, utpote cuius motus omnis est ad arbitrium, qui orta defatigatione sensum ingrauescit, atque demum intermittit. Cordis aut & arteriarum motus non est in nostra potestate, ut nobis pareat, sed perennis, constans, & continuatus, nullius causę vi laceratus, & qui nunquam interrumpi potest. A naturali, quod hęc corporis nutritioni duntaxat addita sit & mancipata, nec tam apertos motus expromere soleat, Ab utrisque vero esse diuersam vitalem, vel hinc etiam fit manifestum, quod hęc claudatur aliis illęsis. Quippe quum quis pestilenti febre male torquetur, affligiturque cordis dolore, vomitione, animi defectione, quumque pulsus obscurus & imbecillus deprehenditur, quis tum ambigere potest facultati in corde vitali, cuius hęc sunt opera, negotii plurimum exhiberi, aliis quidem, aut nihil omnino, aut multo minus agatis? Ut enim alia morborum genera, aliis solent facultatibus malum quoddam inferre, sic hoc maxime pestilens vitalem vim obsidet, oppugnat, atque demolitur. Vnde plane perspicui potest, vitalem non modo cogitatione, & ut dicere solent, ratione, sed re ipsa ab aliis facultatibus differre.

Naturalis facultatis genera. C A P. V.

Naturalis facultatis, ut multa sunt opera, ita quoque varię differentię, primarię quidem ac principes tres, generatrix, auctrix, & altrix, quas Aristoteles *lib. 2. de anima*, Generatrix facultas. *cap. 4.* vegetatrices nominat. Generatrix, vel, *ut alii vocant*, procreatrix, est, *qua substantiam commutat & conformat.* Dum enim quęuis substantia in alteram commigrat, ut semen in os, cartilaginem, aut neruum, ea proprię essentię commutationem subeat necesse est: alioqui enim eadem substantia maneret: simul vero ut aptam & cōuenientem suę naturę figuram accipiat, oportet. Quapropter erunt sane procreatricis seu generatricis facultatis duę partes, quib. illa absolute cōpletur, nempe imutatrix, & formatrix. Prior partis vniuscuiusque substantiā qualē cernimus, ex semine, vel ex sanguine pduxit. Posterior illi compagem, formā, & situm propriis vřibus idoneum contulit. Generatricis itaque proprium munus est, partes singulas, ipsumque adeo fœtum expromere. Generatrix facultas. Auctrix facultas est, *qua corpus quoquo versum porrigit, ac profert.* Quoquo versum autem porrigitur, dum in longitudinis, latitudinis, & profunditatis dimensiones dilatatur, & ampliatur. Auctricis itaque facultatis proprium munus est, in omnem partem proferre, quę iam nata sunt, & integram formę suę absolutionem obtinuerunt. Auctrix facultas. Altrix facultas Altrix facultas. Gręcis *σπερμιχή, & τροφική*, id est, *assimilatrix* nominatur, est, *qua adiectum alimentum in corporis substantiam conuertit, eique assimilat.* Quum enim corporis nostri substantia assiduō fluore variis ex causis cōtinenter dissipetur, *ut lib. 1. de tuenda sanitate, Galenus fufius monstrauit*, proprium certe altricis facultatis munus est, non nihil substantię pro disperditā sarcire, quod quidem vel par est ei, quod effluxit, vel eo vberius, vel parcius. Id quod efficit, ubi alimenta in corporis substantiam mutat & assimilat: ut palam sit, altricem facultatem ab auctrice non solum appellatione, sed & actionibus, & edicis operibus plurimum diffidere. Auctrix enim facultas, non quemadmodum altrix, circa alimentum versatur, sed circa corporis partes solidas. Has enim quoad sinunt, in omnem partem efferunt, atque dilatant, quibus diffusis tum deinde altrix alimentum nititur apponere, affigere, & assimilare. Ceterum auxiliares vel ministrę altricis facultatis sunt quatuor, attractrix, retentrix, alteratrix, seu concoctrix, & expultrix. Altrix facultas ab auctrice diuersa. *Attractrix* facultas, quę Gręcis *ελκτική* dicitur, est, *qua cōuenientem particula succum appetit, & attrahit.* Conueniens autem & familiaris cuique particulę succus est, qui maxime ut huic assimiletur, adeoque ut inde alatur accomodus est. Hęc itaque facultas materię copiam, ex qua quęuis particula nutritur, suppeditat, & alteratrici famulatur. Facultas vero ista non solum corporis partibus, sed & stirpibus, ac nonnullis medicamentis inest. Stirpes enim Altricis ministrę. *congruentem e terra succum, magnes ferrum, purgantia medicamenta vnum quempiam humorem, aliqua etiam infixos corporis aculeos substantiarum similitudine illi-ciunt, atque attrahunt.* Vim enim similitudo habet ad conciliandam amicitiam: amicitia ad societatem consuetudinemque inmundam. Igitur hęc similitum amicitia vna causa est efficiēs, ut non modo animantiū particulę, sed & stirpes omnes quicquid fa- Attractio- nis causa.

miliare est, & salutare proleſtent. Quicquid vero nocens, & aduerſum aſpernentur & A
reſpuant, & ab ipſo, tanquam a peſtiferis, niſi forte vtiliū premantur inopia, abſtineant.

Retentrix
facultas.

Retentrix facultas Græcis *ῥετικὴ* vocata eſt, qua attractum ſuccum eoꝝſque retinet,
donec alteratrix eum in naturam partis, qua nutritur, mutauerit. Hæc maniſeſtiſſime iis parti-

Alteratrix.

bus ineſſe apparet, quæ magnam obtinent cavitatem, vt eſt ventriculus, vterus, & veſi-
ca. Euidentiſſimum vero eſt, hanc alteratrici miniſtrare. Alteratrix facultas Græcis

Expultrix.

ἄλλοιοτικὴ, eſt, quæ id, quod attractum, & aliquandiu retentum eſt, alterat, immutat, concoquit, &
parti, qua alitur, apponit & aſſimilat. Expultrix facultas, Græcis *ἔκλεκτικὴ* vocata, eſt, qua a
concoctione inutilia & aliena ſegregat, & excrementa ſingula ex corporis particulis pellit, ne ſi moram
diutius in corpore trahant, putreſcant. Hæc citidē, vt retētrix, alteratrici miniſtrat. Comme-

Naturales
facultates
quæ habeat
inſtrumen-
ta.
Fibræ tri-
plices.

rata vero altricis facultatis genera vniciuique corporis particulæ ineſſe, tribus in libris B
de naturalibus facultatibus inſcriptis Galenus aduerſus Aſclepiadem, & Eraſiſtratum
acerrime diſputans, copioſe demonſtrauit. Porro iam dictæ facultates fibrarum ope
munus ſuum perficiunt. Quanquam enim concoctrix facultas nullum fibrarum genus,
ſed innatum duntaxat nobis calorem ad concoctionem accommodat, tamen reliquæ
tres munus ſuum per fibras exſequuntur, attractrix quidem rectis, expultrix tranſuer-
ſis, retentrix obliquis. Vt enim in muſculis fibræ nutu noſtro & arbitrio contractæ, &
ad ſuam originem quaſi reductæ motum efficiunt: ita & naturalibus inſtrumentis acci-
dit, rectis fibris ſolius naturæ inſtinctu cōtractis, breuioribusque factis alimētum attra-
hi: tranſuerſis autem adſtriſtis, ſubditam capacitatem in anguſtiam adduci, & quic-
quid ea cōtinetur expelli, & detrudi. Quia vero obliquæ fibræ intentæ nec breuiorem, C
nec anguſtiorē partem reddūt, ſeruata quadam naturali æquabilitate & conſtantia,
omnia plane continent, nihilque vel attrahunt, vel expellunt. Quibuſcunque igitur
naturalibus inſtrumentis triplex huiuſmodi facultas acceſſit, triplex etiam fibrarum ge-
nus eſt conſeſſum, vt ventriculo, & vtero. Quibus vero vnica data eſt, vt in teſtiniſ, ſim-
plex fibrarum genus obſiguit.

DE ACTIONIBVS. SECTIO VII.

Quid actio & opus. CAP. I.

Actio quid.



Motus du-
plex.
Actiuus.
Paſſiuus.

CTIO functione, quæ Græcis *ἰσχύς* dicitur, Galeno lib. 1. de natural. facultat.
& lib. 1. Therapeut. Meth. cap. 6. atteſtante, eſt motus actiuus ſiue efficiens, D
qui a facultate procedit. Vel motus efficiens. Vt hinc palam ſit, motum eſſe
duplicem, nempe actiuum & paſſiuum. Actiuus eſt, qui a ſe & propria natu-
ra editur. Paſſiuus, qui ab alio quopiam, extrinſecus poſito, excitatur. Verbi gratia.
volatio eſt actio animalis volatilis, & inceſſus animalis grefſilis, eo quod a natura propria horum a-
nimantium excitatur. Quod autem ab alio ſic agit, vt locum mutet, id vtique non agit,
ſed patitur. Egit igitur, qui ex Pireo Sunium commeauit, quippe motus eſt actiue, hoc
eſt, ex ſeipſo, & propria natura. Contra paſſus eſt, qui ex Pireo Sunium nauigauit, ſiqui-
dem naue vectus eſt. Quum itaque neceſſe ſit omne id, quod agit, moueri, is certe
motus, qui ab agente efficitur, actio erit. Opus autem, quod *ἔργον* Græci nominant, eſt E
id, quod iam per actionem factum & completum eſt, vt ſanguis, caro, neruus. Ceterum
licet quidem actionum opus quoddam naturæ appelles, ceu concoctionem, diſtribu-
tionem, & languificationem: non tamen contra licet opus actionem omnino voces. Si-
quidem caro naturæ opus eſt, non tamen eſt actio, paterque alterum eorum nominum
bifariam dici, alterum non item. Nam opus interdum actionem, interdum etiam
id, quod per actionem factum eſt, ſignificat. Actio vero duntaxat motum efficientem
denotat.

Opus quid.

Actiones corporis eſſe tres. CAP. II.

Animalis
actio.

CVm actio non ſit niſi motus actiuus a facultate procedens, conſtat tot eſſe corpo-
ris noſtri actiones, quot eiſdem ſunt facultates. Sunt autem tres, vt oſenſum eſt, F
corporis facultates, animalis, vitalis, & naturalis: igitur totidem quoque eiſdem erunt
actiones. Animalis itaq; actio eſt, qua ab animali facultate, interuenientibus neruis, & muſculis,
veluti inſtrumentis, procedit, vt eſt ſenſus, motus voluntarius, ratio, & id genus alia. Vitalis eſt,
qua a vitalis facultate miniſterio arteriarum proficiſcitur, vt pulſus cordis & alia. Naturalis eſt,

Vitalis.

A *quæ a naturalifacultate ope venarum progreditur, ut concoctio.* Hæc Galeno *libr. 6. de tuen. va-*
le. cap. 2. alio nomine *σωματικὴ*, id est, *corporalis*, quod scilicet corpori animantis a natura in-
 fita sit, appellatur. Nec est, cur aliquem turbet, quod Galenus *libr. 2. de motu musculorum*,
 duas tantum corporis actiones recenseat, animale & naturalem, præterita prorsus vi-
 tali. Nam illic sub naturali vitalem complexus est, quod ex definitionibus earundem;
 quas ibidem affert, omnibus fit notissimum. Animalem enim ita finit, est, quam, quum
 fit, sedare poteris, ubi velis, & quum non fit, excitare. Hinc quum ex nostro pendeat ar-
 bitratu, non immerito alio nomine voluntaria appellatur. Contra naturalis illi est, quæ
 non penderet a consilio, aut arbitrio animantis, sed sponte & naturaliter fit. Quæ utriusque
 finitione non solum eas actiones, quas vulgus medicorum naturales vocat, sed & eas, quas vi-
 tales priuatim appellamus, comprehendit. Est namque hoc modo motus cordis & ar-
 teriarum, quem pulsum nominamus, actio naturalis. Quippe hunc neque sedare, neque
 excitare, neque celeriores, neque tardiores, neque crebriores, neque rariorem effi-
 cere licebit. Hoc sane nomine factum est, quod Galenus *libr. 1. de spirandi difficultate* *ζων-
 τικὴ*, id est, *vitalem actionem*, animali plane opponat, ut palam sit omnibus, nihil referre, v-
 trum tres, aut duas actiones corporis nostræ esse fateamur, modo instar Galeni has de-
 finiamus. Præstat tamen in actionibus recensendis facultatum numerum, quandoqui-
 dem ab illis proficiscantur, retinere.

Animalis actionis differentia. CAP. III.

C **F**acultas animalis in tres partitur, ut suo *expositum loco est*, species, sensificam, motri-
 cem, & principem, & quævis illarum suas edit actiones. Sensifica enim quinque actio-
 nes edit, visionem, auditionem, odoratum, gustum, & tactum. Has quidem actiones
 philosophi sensus exteriores appellant. Visio autem est actio qua colores percipiuntur. Audi-
 tio, qua soni, & eorundem discrimina sentiuntur. Odoratus, qua odores apprehenduntur. Gustus,
 per quem saporis discernuntur. Tactus, qua quidem qualitates tum primæ, tum secundæ, itemque
 aliæ, quæ non sunt aliis sensibus propria, percipiuntur. De quibus omnibus cum copiose Philo-
 sophi in libris, de anima tractent, non est, cur hic de illis longius agamus. Motrix facul-
 tas unam obtinet actionem, quæ Galeno *lib. 2. de temper. cap. 3. & libro 3. de sympto. causis, cap.
 10. & lib. 12. Thera. meth. c. 7. τρεῖς*, id est, *factrix*, vel, ut alii interpretantur, *actiua* pro-
 prie, quod scilicet omnium earum, quæ a cerebro prodeunt, efficacissima sit, & sola fe-
 re actionis nomen mereatur, dicitur. Hæc autem per musculos veluti instrumenta
 editur & perficitur. Nec ab re dictum est proprie, siquidem generatim practica actio
 est, quæ cum motu locali fit. Quæ sane ratione attractio, retentio, distributio, & expul-
 sio, quæ tamen naturales sunt actiones, practicæ nominantur. Quippe hæ omnes non
 sine motu perficiuntur. Ceterum quum proprie vocata actio practica & voluntaria,
 per musculos obeatur, omnibus perspicuum esse arbitror, respirationem non compo-
 sitam esse actionem, ita sane ut partim voluntaria, partim naturalis sit, quod plerique
 falso sunt opinati, sed meram voluntariam. Si quidem per musculos illi destinatos fit,
 adeoque ex arbitrio nostro pendet, quod Galenus in libello de causis respirationis & in 2.
de motu musculorum copiose demonstravit. Ibidem enim historiam quandam refert de
 barbaro quodam seruo, qui respiratione retenta mortem sibi consciuit. Quod si non
 liceret usquequaque respirationem cohibere, ne idcirco quidem aliquis negare posset,
 quin ipsa pro arbitrio fieret. Apparet enim earum actionum, quæ motu voluntario fi-
 unt, alias quidem omnino liberas esse, alias vero affectibus corporis subditas esse, & ser-
 uire. Priores utique perpetuo absque impedimento a nobis, quoties, & quantum volu-
 mus, nulla ad eas nos urgente necessitate fiunt. Posteriores vero non perpetuo, sed in tem-
 pore quodam, & cum mensura, a quibusdam corporis affectibus lacessitæ, fiunt. Nam
 ire ad aliquem, & alloqui, & capere aliquid, & recipere, absolute liberæ sunt. Egerere
 vero, & mingere, corporis affectuum sunt remedia, ideo non perpetuo libere, sed vr-
 gentibus affectibus fiunt, Sicut acere nobis quidem liberum est. Sunt enim qui integrum
 annum, & eo amplius, quemadmodum Pythagorici, tacuerunt. Egestionem vero vel
 urinam retinere, non modo annis aliquot, sed ne mensibus quidem, imo nec diebus
 paucis quisquam potuit, sed affectibus urgentibus tum egerere, tum mingere cogitur.
 Adeo non ii urgent, ac se penumero angunt multitudine grauantes, vel acrimonia mordentes

Naturalis.
Corpora-
lis.
Obiectio
diluitur.

Animalis
actionis
finitio.
Naturalis.

Sensifica
facultatis
actio-
nes.
Sensus ex-
teriores.
Visio.
Auditio.
Odoratus.
Gustus.
Tactus.
Motrix.
facultatis
actio
proprie.

Practica
actio ge-
neratur.

Respira-
tio actio
volunta-
ria tantum.

Actionis
quæ mo-
tu volun-
tario sunt
duplex
differentia.

Pythago-
ra.

Principis
facultatis
actiones.
Imagina-
tio.
Ratioci-
natio.
Memoria.

vt quidam ne locum quidem consuetum adire valuerint. Quare quanquam libere sunt A
& voluntarie actiones vrinae & egestionum retentio, non tamen prorsus & absolute, sed
corporis affectibus seruiunt ac subditae sunt. Similis profecto iam dictis est respirationis
actio, imo iis multo magis vrget, ac celeriore necessitatem habet. Siquidem ne quis
moriatur ac suffocetur, periculum est, nisi assidue respiret. Nihil igitur mirum, si peni-
tus retinere respirationem arduum & difficile sit, neque enim omnes ad moriendum
sunt procliuēs, etiam si infinitis confluantur malis. Est tamen nihilominus ipsa anima-
lis ac voluntaria, vt dictum est, actio. Principis facultatis actiones triplices esse constat, i-
maginationem, ratiocinationem, & memoriam. Imaginatio est, per quam imagines ab ex-
terioribus sensibus oblatae apprehenduntur. Ratiocinatio, qua conceptae imagines sub censum & iu-
diciū reuocantur, ac quae qualesque illae sint iudicantur. Memoria est, quae id, quod a prioribus a- B
ctionibus elaboratum atque receptum est, conseruatur & retinetur. De quibus omnibus cum co-
piose pertractent Philosophi, non est cur hic de illis longius disseramus.

Vitalis actionis differentia. C A P. IV.

Pulsus cor-
dis.
Motus
cordis.
Lætitia.
Tristitia.
Spes.

A Vitali facultate, quæ etiam irascibilis & animosa dicitur, multæ proficiscuntur actio-
nes, nempe arteriarum & cordis pulsus, de qua suo diffuse tractabimus loco, motus cor-
dis, cuiusmodi sunt lætitia, tristitia, spes, desperatio, confidentia, metus, amor, odium, misericordia,
inuidētia, ira, iracundia, excañdescētia, furor, verecūdia, pudor, cūctatio, præcipitatio, humanitas,
& morositas. Lætitia vero, motus est, quo cor præseñte fruītur bono. Proinde eius veluti quædā C
dilatatio est, quæ præseñs obiectum amplectitur. Tristitia motus plane contrarius est, quo cor
quasi percussum constringitur, premitur, angitur, tremī, & languescit. Spes est motus, quo cor fu-
turum bonum appetit, seque ad illud accipiendum veluti aperit ac præparat. Et per similes prope-
modum hæc motui lætitiæ est, propterea quod futuri boni cogitatione ita mouetur cor,
ac si præseñs fere iam bono aliquo frueretur. Desperatio est motus, quo cor de futuro bono
ac salute prorsus desperat, seque ad ea accipiēda veluti auertit. Confidentia, est motus, quo cor vel-
uti futurum bonū expectat, vel futuri boni expectatōne aliquid audet. Metus est motus, quo cor,
veluti futurum malum fugiens constringitur. Estque similis tristitiæ, futuri enim mali cogi-
tatione mouetur cor perinde, vt præseñti aliquo malo. Amor est motus, quo cor appetit ali-
quod seu vere bonum, seu quod videtur bonum, idque vt eo potiatur, quasi astrahere gestit. Odium
contra motus est, quo cor aliquod tanquam malum auersatur, idque depellere gestit. Misericor- D
dia est motus cordis ex miseria alicuius iniuste laborantis ortus. Inuidētia contra motus propter
res secundas alterius concitatus. Ira est motus iniuria, vel indignatione aliqua concitatus, quo cor
offensionem aliquam auersatur, eiusque auctorem pœna afficere conatur. Incalescit autem cor in
eo motu, & incendit spiritus, qui sanguinem etiam inflammant, vt rectissime Galenus
lib. 2. de tuenda sani. cap. 11. ex Platonis in Cratyllo, & Aristotel. lib. 1. de anima sententia, iram esse
caloris feruorem in corde dixerit. Distat ab iracundia, vt quæ virium sit hominis ira-
cundi, id est, eius, qui parua, vel nulla causa irascitur. Iracundiam tamen Latini sæpe
pro ira vsurpant, iram contra nunquam pro iracundia. Excañdescētia est ira nascens, &
sine modo existēns. Hæc si acius exardet, furor appellatur. Verecūdia est motus, quo
dedecus & turpitudine fugitur, lausque consequitur. Pudor est motus, quo conscius sibi ipsi propter
admissam turpitudinem irascitur. Cūctatio est motus, quo quis magna deliberatione aliquid ag-
greditur. Præcipitatio contra motus est, quo quis omnia inconsulte, & temere, citraque deliberatio- E
nem aggreditur. Humanitas motus est cordis, quo quis se erga alios facilem, lenem, & comem ex-
hibet. Morositas contra motus est, quo aliquis se difficilem præbet. Possem longe plures vitalis
actionis differentias, earundemque descriptiones recensere, sed has exempli gra-
tia commemorasse sufficiat, præsertim cum iis oranium philosophorum libri referri
sint.

Iracūdia.

Excañde-
scētia.
Furor.
Verecū-
dia.
Pudor.
Cūctatio.
Præcipita-
tio.
Humani-
tas.
Morositas

Naturalis actionis differentia. C A P. V.

Genera-
tio.
Immuta-
tio.

A Naturali facultate, quæ etiam concupiscibilis & appetitrix nominatur, vt ostensum
est, multæ prodeunt actiones, vt sunt generatio, immutatio, formatio, auctio, nutritio, al- F
teratio, appetentia, attractio, retentio, concoctio, distributio, & excretio. Generatio siue pro-
creatio, actio est, quæ ad nouam substantiam perducit. Quapropter simplex actio naturæ
non est, sed ex immutatione, formationeque composita. Vt enim os fiat, item neruus, ve-
na & reliquarum quælibet, alteratam esse oportet, vnde animal fit, substantiam. Vt ve-
ro con-

- A** ro congruentem figuram & posituram, & caua quædam, & vel enata, vel adnata, aliaque id genus habeat, effingi eam oportet, quæ alteratur, materiam. Auctio vero *solidarum animalis parium argumentum, ampliatioque in longum, latum, & profundum est.* Nutritio est adiecti alimenti in corporis substantiam conuersio, & perfecta assimilatio. Vt nutritio sit quædam appositio, & assimilatio, sed sine ampliatio. Quippe ut assimilatio fiat, agglutinatio, siue adhærentia, quam Græci *αἰσχροῦ* vocant, præcedat oportet: sicut etiam ut illa fiat, appositio, quæ Græcis *αἰσχροῦ* nominatur. Postquam enim succus is, qui omnem animantis particulam nutriturus est, a vasis excidit, in totam eam primū dispergitur, mox adiungitur, deinde agglutinatur, demum assimilatur. Appetentia *Galeno libr. 1. de symptom. causis, cap. 7. attestante, non est nisi implerionis desiderium, estque duplex, animalis nimirum & naturalis.* Animalis est, qua animal excitatum, ad quarendum sibi & capiendum cibum impellitur. Atque hæc profecto recte animalis appellatur, quod scilicet ex arbitrio animalis pendeat tota. Id quod abunde comprobarunt, qui inedia sibi mortem consciuerunt. Naturalis appetentia *animalem præcedit, & est, quantum stirpes, tum animalia postquam vacuata sunt, ut rursus impleantur, id quod illis familiare est, appetunt.* Et recte quidem naturalis nominatur, est enim voluntatis expers, & naturaliter fit. Appetentiam hanc naturalem statim attractio excipit, quæ id, quod illis congruit ac familiare est, attrahunt. Quod vero ad animantia pertinet, postquam appetentia ventriculi attractionem incitauit, quæ sibi adduxit, sinu suo complexuque recipit, eaque retinendi facultate, & obliquarum fibrarum ministerio includit, complectitur, retinet, & arcet supra subterque, & omni ex parte adeo compresse, ut iis circumiici, & prorsus adhærescere videatur, nec inane quicquam relinquat. Alioqui cibus in tanta capacitate huc illuc fluitans, neque lateribus ventriculi coarctatus, haud quaquam plene concoqueretur. Hæc itaque ratione accepta cohibet, nec ante legitimum naturæque præscriptum tempus effluere quicquam patitur, nisi quum aut magnæ copię pondere, aut qualitatıs mordentis acrimonia lacescitur. Vt in duabus plane rebus retentricis facultatis proba consistat actio. Vna, ut nullum inter ventriculum & cibos vacuum relinquatur spatium. Altera, ut comprehensionis tempus, concoctionis temporı æquetur. Vt legitimum comprehensionis ventriculi tempus, non sit nisi id, in quo plenam perfectamque concoctionem absoluit. Non autem quæuis vel leuissima cibi alimentiuę mutatio, quæ id aut exeritur, aut molitur, aut odore, sapore uę mutatur, sed ea duntaxat, quæ a natino calore fit in alimento perfecta substantiæ conuersio *concoctio* dicitur. Hinc rectissime Galenus in libro de symptomatum differentiis definit concoctionem, esse in peculiarem & propriam familiarem uę eius, quod alitur, qualitatem conuersionem. Quocirca eo duntaxat loci hæc fit, ubi alimentum diu multumque hæret, & facultas illa retentrix valida est, simulque concoquendi facultas copioso abundat calore. Hoc autem tribus tantummodo locis concessum est, e quibus etiam triplex existit concoctio, quarum prima in ventriculo, secunda in iecore, tertia in singulis partibus fit. Sua vero cuiusque antecedit præparatio, suæque sequitur absolutio, suum cuiusque alimentum tanquam subiecta materia, suus genitus humor, suumque excrementum. Prima omnium est *χλωσις*, quæ in ventriculo perficitur, mutaturque multiplex & varium alimentum in quippiam vnius substantiæ, quod candidum quidem est, & cremori ptisanæ persimile. Alimentum autem omne mutat & conficit ventriculus, nullis quidem fibrarum adminiculis, sed tum proprio ingenitoque calore & spiritu, tum eo, quem ut lebeti magno circumiectus ignis, ita & proximæ partes illi inferunt, iecur, lien, cor, septum transversum, & omentum, quod illius calorem reflectit, & continet. Ceterum propria ventriculi substantia, & insita reconditaque quædam proprietates concoctionis illius absolutionem perficit. Sic Struthiocamelus ferrum concoquit & exterit, quod non potest leo calidissimus. Sic fruges aridas & præduras minutæ aues conficiunt, crudumque quippiam mutant, quod vix audeat homo attingere. Ita coturnix veratrum coquit & mitigat nobis prorsus inimicū, inuictum, indomitū, & quod omnē corporis nostri vim, omnes conatus respuit, & aspernatur. Porro alimentum tamen, quod ventriculus subigit ac mutat, præparatio quædam in ore prægressa est, qua non atteritur modo & molitur cibus, sed & leuem subit conuersionem. Quippe qui ante durior & solidior erat, dentibus in ore constructis manus extenuat, & mollior reddit, nec leuē inibi mutatio.

Formatio
Auctio:
Nutritio.

Agglutina-
tio.
Appositio

Appeten-
tia.
Animalis.

Naturalis.

Attractio.
Retentio.

Conco-
ctio.

Triplex
concoctio

Prima co-
coctio ven-
triculi.

Causa ef-
ficiens co-
coctionis
ventriculi.

Alimenti
prepara-
tio in ore

Primæ
côcoctio-
nis hu-
mor.
Ventricu-
lus cremo-
ris beni-
gnitate
fruitur.
Totus ven-
triculus
sanguine
nutritur.

nem accipit, admiscetque sibi quodam modo animalis qualitates, vt pristinam speciem & naturam vix retineat. Hunc autem tandem ventriculi facultas concoctrix mutat, conficit, & plenius concoquit, atque ex eo humorem procreat, qui proprio nomine Græcis *χυλός*, Latinis *cremor* nominatur. Quod vero in hoc cremore longe optimum & familiare habetur, id *Galenus libro 3. natural. facult. teste*, halitus specie ad se rapit, inque suas tunicas sugendo recondit, eis etiam adiungit & agglutinat, atq; ex eo demum fructum voluptatemque capit, & quodam modo saturatur, non tamen proprie nutritur. Neque enim pastio illa, quam ex cremore capeffit, vera est nutritio, sed ex qualitatis cognatione, & conuenientia oblectatio quædam, & satietas nutritionis æmula, quod scilicet ventriculo non assimiletur. Hinc est, quod Galenus religiose vitet, ne dicat ventriculum sibi assimilare chylum, sed tantum reponere, & adiungere. Neque est, cur quispiam miretur appositionem, & adhærentiam fieri, quam non consequatur assimilatio. Quippe id ipsum fit etiam in vitiligine, in qua certe adhærentia nutrimenti facta cernitur, non tamen assimilatio. Quapropter id, quod apponitur & agglutinetur, *Galenus etiam loco iam citato teste*, veluti nutrimentum est, non proprie nutrimentum. Ita ex chylo ventriculus nutritur quidem, at improprie, quia non assimilatur illi. Atqui instabit quispiam, & nobis ex *3. de naturalibus facultatibus libro*, locum obiiciet, in quo Galenus discrete dicat, *in tertia temporis portione ventriculum iam nutriri, iis quæ affixerat, plane sibi assimilatis*. Cui vicissim respondemus, verissima esse hæc Galeni verba, non tamē ad chylum esse referenda, vtpote qui non assimilari possit, quandoquidem non sit proprie, vt diximus, loquendo nutrimentum, sed ad id, quod ex oblato cibo ad se venæ ad ventriculum pertinentes traxerunt. Quippe id iam in sanguinem commutatum iis temporum vicibus apponitur, affigitur, & assimilatur, non chylus ipse. Nam cremor ille vacua tunice ventriculi spatia reficiens, in vaporem fusus & extenuatus ad extremum vanescit. Quapropter famem siue appetentiam duntaxat animalem compescit. Quippe hæc a penuriæ sensu fit, quum venæ ex ipso ventriculo veluti emulgentes sugentesq; trahunt. Ventriculus vero huiusmodi suctionem non ferens, sed tanquam diuulsus, huius molestiæ remedium, cibum exquirat. Cibo autem oblato venæ ad ipsum conuertuntur, & ex eo, non ex ventriculo alimentum trahunt. Hoc vbi in sanguinem commutatum, appositum, affixum, & assimilatum fuerit, naturalem appetentiam sedat. Quippe hanc vna duntaxat sanguinis substantia per ventriculi corpus & molem effusa satiare potest, dum in eius naturam conuertitur. Animalem autem non modo sanguis, sed & cremor is in ventriculum demissus, compescit atque saturat. Vt igitur vtraque ventriculi tunica, interior nimirum & exterior ex qualitatis chyli, cognatione & conuenientia oblectationem quandam & satietatem nutritionis æmulam capeffit, nec vere nutritur: ita ex sanguine, qui in venis est, quæ ad ventriculum pertinent, vere nutriuntur. Atque hinc est, quod Galenus *libr. 4. de usu partium, cap. 19.* discrete scribat, *has venas a natura ad perfectam nutritionem ventriculi esse procreatas*. Quasi dicat, eam nutritionem, quæ ex chylo fit, quod is ventriculo non assimiletur, non esse perfectam. Neque est necesse, vt is chylus in iecore primum in sanguinem conuertatur, quandoquidem, vt *Galenus libr. 4. de usu part. corp. humani*, auctor est, venis, quæ ad ventriculum & intestina pertinent, virtus quædam sanguifica inest, qua chylum in sanguinem, priusquam ille ad iecur perueniat, permutare solent. Præterea, assertionem nostram esse veram, nempe ex sanguine proprie nutriri ventriculū, hinc fit manifestissimum, qd dū foetus vtero continetur, totus ventriculus puro & syncero sanguine alitur, nullo nimirum tum in eius ventriculo existente chylo. Quia igitur nunc cum ulatis atque perfectius is ali postulat, optima ratione similiter ex sanguine nutritur, & incrementum suum capeffet. Porro vt huius concoctionis excrementum est, quod Græcis *σποπτήμα*, Latinis *stercus* vocatur. Hoc excrementum in ventriculo vili substantiæ confusum erat, sed ventriculum egrediens, postea e superioribus gracilibusue intestinis vniuersus cremor syncerus ac purus in iecur rapitur. Reliqua crassior, impurius, & sæcis æmula materia, in colum intestinum, mox in rectū irruit, illicq; donec expellat, hæret. Secūda côcoctio in iecore perficitur, & priuatim Græcis *αίματος* appellatur. Hac n. cremor e ventriculo haustus, propria iecoris vi, quæ in eius potissimum substantia insidet, in verā sanguinis speciē conuertitur, quam a cremore

Ingestus
cibus fa-
mem dū-
taxat ani-
malem se-
dat.

Primæ cō-
coctionis
excremen-
tum.
Stercus.

Secunda
concoctio
iacoris.

- A** re non modo colore, sed etiam vniuersa substantia plane diuersam esse constat. Hic sane adumbrationem quandam in venis mesenterii accepit. Præparant enim hæ cremorem iecori, conferuntque quasi rudimentum sanguinis, quale in eis per dissectiones deprehendi solet, idcirco sane quod a iecore initium ducunt, cuius proinde naturam referunt & æmulantur. Vires enim habent venæ non solum continendi, distribuendi; sanguinis, sed etiam concoquendi, hæque a iecore originis suæ principio & quasi fonte, quemadmodum a ventriculo intestina mutuantur. Nam cibus in ipso etiam per intestina transitu elaborationem etiamnum & absolutionem completam adipiscitur, quod iners & otiosa nunquam esse possit, quæ in eis est commutandi facultas. Ceterum cremorem ope venarum mesenterii præparatum, & rudi quadam sanguinis forma adumbratum iecur accipit, & vera & expressa sanguinis specie ornat, & perficit. Ut alterius concoctionis utilis humor non sit, nisi sanguis, aut, si vniuersa complecti velis, humor omnium, qui Græcis *χυμὸς* nominatur. Quo quidem nomine non modo purus syncerusque sanguis, sed illi etiam, qui cum sanguine gignuntur naturales, & nutritioni accommodati, humores notantur, atque designantur. Excrementum autem eius aliud est, quale quod florem in vino appellant; e tenuissima enim cremoris portione assa & torrida natum, quasi flammeam acrimoniam assumit, quocirca excrementum vere est, omnino præter naturam, nec alendo corpori accommodatum, & flaua bilis nominatur, atque in vesiculam, quæ iecori subest, reconditur, ac in priorem tenuium intestinorum partem, siue duodenum, *ut suo loco fusius monstratum est*, excernitur.
- B** *Quamquam igitur mordax est & acris hic humor, vesiculæ tamen proprioque receptaculo tristis non est, aut infestus, sed mutua cognatione iucundus & amicus, ex quo illa voluptatem, & iucunditatis sensum percipit. Et o autem haudquaquam alitur, quod vsquequaque amarus sit, nullo benigno succo perfusus, sed sanguine, quem suscipit per venam ipsius ceruici insertam.*
- C** *Alterum est, quale quod facem in vino nominant, ex crassa terrenaque cremoris portione factum, quod naturæ concoctionem subterfugit, neque iecoris vi mutari potuit. Hoc a liene infusa facultate, qua sibi gratus est, & suavis, attrahitur, & subinde in ventriculum euomitur, a quo exiens vna cum sicciori alimenti excremento per omnia intestina permeat. Postquam enim in illius venis & arteriis, quæ illic multæ sunt, & ingentes, elaboratus fuerit, non vniuersus, neque crassior illius portio, sed tenuior duntaxat*
- D** *lienem fit alimentum, & in eius carnem sensim illabitur. Tertium excrementum, quod e iecore, venis, & arteriis profunditur, eiusmodi plane est, quale in lacte concreto serum. Hoc renes a sanguine trahentes, & ad se rapientes, ad vesicam transmittunt, vrinaque nuncupatur. Hæc autem vesicam non alit, sed sanguis, qui per peculiare venas vtrinque in illius ceruicem insertus influit. Tertia concoctio in singulis partibus fit, qua appositus adiectusque sanguis iam a priore natura deficiens, in idoneam alendæ partis substantiam conuertitur. Hæc rudimentum quoddam & primordium capit in venis exilibus, in quibus sanguis a partis natura & calore mutatur. Eius autem absolutio est perfecta assimilatio, atque nutritio, omnium concoctionum finis. Huius utilis succus est vniuersum eorum humorum genus, qui secundarii appellantur, de quibus supra diffusè egimus. Eorum vero excrementorum, quæ in singulis animalis nascuntur partibus, ex ipso vnde aluntur succo, aliud quidē ceu semicoctæ quæpiam reliquæ, quæ assimilari nutriendæ parti nequiverunt: aliud, quod transmittendi alimenti vehiculum fuit. Tenuissimum autem huius generis excrementum facile sane eiicitur, partim in speciem vaporis ab insito calore solutum, partim violento motu confertim erumpente. Nominant vero, quod ita excernitur, *sudorem*. Alterum vero, quod vulgo est incognitum, ut quod conspectum præ tenuitate effugit, a Græcis *ἀσθητὸν αἰσθῆσαι διαπνοή*, Latinis *insensibilis sensumue latens transpiratio*. Ab hoc excremento, iis sordibus, quæ extrinsecus cuti adhærescunt, origo est. Atque ex iis, quæ iam diximus, qua ratione in singulis concoctionibus, tum distributio, tum excretio fiat, palam fit omnibus, nec ut de singulis verba faciamus est necesse. Vnum tamen adiiciendum prioribus erit, nempe attractionem, retentionem, distributionem, & excretionem, quum non sine loci mutatione fiant, practicas quoque dici, ut supra etiam est monstratum, actiones.*

Venæ mesenterii præparant iecori cremorem. Venæ concoquendi ac sanguificandi facultatem obtinent. Intestina cibum concoquunt. Secundæ concoctionis humor. *χυμὸς*. Secundæ concoctionis excrementa. Primum.

Vesicula bilis alitur sanguine.

Alterum.

Lien quomodo alitur. Tertium.

Tertia concoctio in singulis partibus. Præparatio tertiæ concoctionis.

Tertiæ concoctionis humores. Excrementa. Sudor. Insensibilis transpiratio.

Naturalium actionum numero quæ practice dicantur.

Actiões corporis a medico cur consideranda. C A P. VI.

D Vabus potissimum de causis actiones corporis a Medico accurata opera sunt cōsi-

Ex actio-
nibus cor-
poris con-
stitutio di-
gnosci-
tur.
Actio læ-
sa labora-
tem par-
tem pro-
dit.
Num a-
ctio nulla
lædatur,
nisi pars
quæ ipsa
efficit la-
boret.

Differen-
tia inter
naturalia
& anima-
lia instru-
menta.

siderandæ. Vna, quod ex illis, quæ, qualisque corporis sit constitutio promte, cognosci A
possit. Eam enim constitutionem, quæ intra sanitatis limites consistit, illæ læ & incul-
paræ actiones sequuntur. Morbosam vero vitio læ, & culpabiles. Altera, quod ex a-
ctionibus læsis laborans pars dignoscatur. Siquidem nulla actio læditur, *Galeno etiam lib.*
1. de laboran. locis, cap. 2. teste, nisi pars, quæ ipsam efficit, laboret. Id quod tamen non de o-
mnibus actionibus, sed de naturalibus duntaxat intelligendum erit. Nam naturales a-
ctiones, perinde atque facultates, a quibus illæ prodeunt, omnibus corporis partibus
sunt insitæ & cognatæ, ut Magneti lapidi vis trahendi ferrum, ut nihil mirum sit actioni-
bus iis læsis, partes quoque, quibus illæ insunt, necessario lædi. Quapropter non est sim-
pliciter concedendum, nullam actionem lædi posse, nisi etiam pars, quæ ipsam efficit, la-
boret: sed prius de actionibus, ac earundem instrumentis distinguendum erit. Quippe B
si hæc verba ad animales actiones transferas, nihil iis magis absurdum dici posset. Cum
enim illæ ipsæ partibus non sint insitæ, sed aliunde, nimirum a cerebro, ubi animæ sedes
est, in eas deriuentur, sæpenumero certe impediuntur, etiam si nulla in partibus, quarum
actiones sunt, noxa existit. Non levis itaque inter naturalia & animalia instrumenta
vocata differentia est, quam luculenter admodum lib. 1. *de laborantibus locis cap. ult.* iis do-
cuit verbis: *Plurimum differunt, inquit, naturalia ab animalibus instrumentis. Siquidem natura-*
libus connata actionis vis est, animalibus vero instrumentis a principio, veluti lumen a sole, ipsa de-
fluit. Quapropter accedit, ut ipsis interdum haudquaquam læsis, nihilominus eorum pereat actio. Id
quod naturalibus instrumentis accidere non solet: quoties enim horum actio læditur, semper ipsa prius
laborant. Hæc ille. Quid multa? quum animalia instrumenta cognatum sensus & motus C
principium non habeant, sed iis aliunde velut lumen a sole suppeditetur, nihil mirum si
solis partibus, quæ & sentiendi & mouendi vim obtinent, accadat, ut ipsis interdum haud-
quaquam laborantibus ac læsis, eorum nihilominus pereat actio. Contra vero in natu-
ralibus eueniat, ut quoties horum actio læditur, semper ipsa priora laborent. Innatam
namque & insitam, qua actiones suas perficiunt, omnia facultatem habent.

DE SPIRITIBVS. SECT. VIII.

Quid spiritus. CAP. I.

Spiritus de humanis spiritibus hoc loco differendum sit, initio, ut implicatam huius
nominis rationem expediamus, necesse est. Spiritus autem propria significatio
omnibus in linguis ventus est. Cum vero ventus præpotens sit, mirabiliaque ef-
ficiat, & oculorum nostrorum obtutum effugiat, affinitate quadam & similitudine fa-
ctum est, ut spiritus nomen ad rem omnem, quæ sub aspectum non cadit, transiret, siue
corporea ea sit, siue incorporea. Hinc sit, ut quæ in nobis inest substantia auræ tenui
per similes, spiritus appellationem subeat. Non est igitur spiritus nisi pertenuis, vapo-
rosa, aerea, aut si mauis ætherea substantia, per quam facultas a partibus principatum
in corpore obtinentibus in reliquas corporis partes defertur, ut proprias actiones ede-
re possint. Ut hinc etiam palam fiat, spiritum esse facultatum veluti vinculum, primum-
que obeundæ actionis instrumentum. Est autem a corpore & humoribus quippiam
diuersum, quod Hippocrates 6. *Epidem. 8. sectione, aphor. 8.* impetum faciens nuncupa-
uit, non a substantiæ tenuitate, sed quod eius, ut venti, vis & incurfusio magna sit, & vn-
diquaque momento temporis corpus facile penetret. Qua igitur ratione istos ciet
impetus, intelligitur affinitatem habere cum corpore: qua autem videri non potest,
ad incorpoream substantiam accedit, ex quo fit, ut amborum medius sit, & vtriusque
particeps. Quod si vero quispiam spiritus substantiam & statum nondum plene as-
sequitur, is corporis nostri structuram contemplatus arterias adeat, inque cordis sinus
& in cerebri ventriculos introspectat, quos dum inanes ac nullius prope humoris parti-
cipes, videbit, neque tamen frustra ac temere tantos a natura conditos, mox, opinor,
cogitatione apprehendet prætenuem auram, eos, tum impleuisse, dum in viuis fuit ani-
mal, quæ tamen eo animam agente leuissima quum esset, sine sensu euauit. Esse autem
spiritum substantiam aeream, hinc maxime liquet, quod huius fouendi gratia in inspira-
tione aerem introducimus, qui non modo corpori refrigerationem (hæc enim satis
posset aliunde comparari) sed pabulum quoque ministrat. Corporis autem densa mo-
les eiusmodi subsidio haudquaquam indiget, ut quæ crassiore recreatur alimento, o-
mnium elementorum permixtione concreto. Quapropter necessum est, aerem hauriri
& at-

Spiritus
quid.

Impetum
faciens.

Spiritus
est substā-
tia aerea.

A & attrahi, vt finitimæ in nobis sui generis substantiæ, nempe spiritui, iungatur, eique velut in pastum cedat. Quod confirmat Hippocrates, qui in libello de Alimento ita scriptum reliquit: ἀρχὴ τοῦ πνεύματος, πῦρ, σῶμα, βέλγη, πνεύματι δὲ ἀλλὰ διατρεφῶν: id est, *Principium alimenti spiritus, p̄res, os, aspera arteria, pulmō & reliqua perspiratio*. Minime itaque absurdum est dicere, vt *Argentarius censet*, spiritum seu spirituosam substantiam ex aere inspirato ali & nutrirī. Quanquam enim verum est, nihil nutrirī proprie loquendo, nisi quod solidum sit ac viuūt: tamen κατὰ χεῖρας & improprie sæpe etiam ea, quæ non viuunt, nec solida sunt, ali dicuntur a rebus, a quibus conseruantur & recreantur. Et vt alia omnia omittamus, habemus Hippocratem eius loquendi rationis auctorem, maximæ auctoritatis virum, qui aerem, vt dictum est, spiritus esse alimentum memoriæ prodidit, & disertis verbis in iam citata sententia affirmauit.

Spiritus ex aere nutritur.

Quot sint spiritus. CAP. II.

DE spirituum numero inter medicos non cōuenit. Sunt enim, qui triplices, & hi quidem numero superiores: sunt etiam, qui duplicem tantum esse affirmant: est quoque *Argentarius*, qui unum duntaxat esse contendit. Sed si quis ad ea, quæ præcedenti Capite diximus, diligenter respexerit, promte se ex ista sententiæ varietate explicabit. Nam de Galeni sententia, duo sunt primarii spiritus, *in situs & influens*. In situs est, quem multis in locis sua lingua σῦμφοτος nominat. De quo in eo, quod præcessit capite, abunde dictum est. *Influens*, qui a principiis, corde nimirum & cerebro, prodit, & in vitalem & animale, naturali, qui illi sua lingua φυσικός appellatur, in dubio relicto, ab aliis prorsus excluso, digeritur. Nam lib. 12. *Thera. method. cap. 5.* in eum scribit modum: *Quod si naturalis quoque aliquis spiritus est, utique is quoque in iecore & venis continebitur*. Nihil aut mirum, Galenum de φυσικός, hoc est naturali spiritu, dubitasse. Nam spiritu naturali, qui nutriendi facultatem ad corporis partes deferat, non esse opus videtur, quod ea omnibus corporis partibus, haud secus atque magneti lapidi vis attrahendi ferrum, & succino paleas, vt in libris de naturalibus facult. demonstrauit Galenus, insita & innata sit. Proinde naturali spiritu, qui hanc facultatem a iecore ad alias partes deferat, haud indiget. Accedit, quod iecori desit materia, ex qua naturalis spiritus procreari possit. Si enim vlla materia, vnde naturalis procrearetur spiritus, esset, certe vitalis, vnde etiam animalis, vt infra latius dicetur, generatur, esset spiritus. Non est autem rationi consentaneum, ex vitali, ac eo per paucos, naturalem constitui posse, & postea in totum corpus longe lateq; diffundi. Quum enim vitalis spiritus generatio in corde sit, & ab eo per arterias in vniuersum corpus diffundatur, necessarium esset, magnas arterias ad iecur peruenire, spirituum vitalium tantos riuos suppeditantes, qui pro naturalis spiritus materia sufficerent. Ex dissectione vero ipsa satis constat, ad cauas duntaxat iecoris sedes, arterias, & eas quidem exiguas, exporrigi, vt huius calorem euenilarent, temperarentq;. Hæ autem non tantam spiritus vitalis copiam illuc deferunt, vt inde naturalis gigni queat, quando palam sit, plures esse corporis partes, quæ naturali, quam quæ animali egent spiritu. Omnibus enim, vt nutriantur, opus est, at non omnes sensu & motu indigēt. Præterea nulla est in iecore tanta cavitās, quanta in corde & cerebro existit, in qua naturalis spiritus tanquam in officina aliqua generatio cōmode fieri posset. In corde enim sinister est ventriculus, spiritus vitalis officina: in cerebro autem ventriculi illius effatu digni. Sed nec canales aut meatus suppetunt, per quos vbi iam genitus esset, ad partes corporis deferretur: nisi quispiam dicat per venas vna cum sanguine spiritum naturalem transire, quod tamen absurditate non vacat. Neque enim corpus venarum vnica duntaxat tunica contextum patitur, vt per illud spiritus meare possit. Huc accedit, quod iecoris sanguis, vt pote crassus ac turbidus, necdum ab excrementis emundatus, ad spiritus generationem non sit idoneus. Denique quum quæuis particula calorem de corde iugiter manantem concipiat, quo conseruato enutritur & generatur, animale vero spiritum a cerebro habeat, e quo mouetur & sentit, superuacaneus certe sit naturalis necesse est. Proinde quū nec finis adsit, ob quem spiritum naturalem gigni oporteat, nec materia, vnde procreari vel conseruari possit, nec locus idoneus, in quo gignatur, nec via, per quam ad corporis partes deriuetur: merito ille omittendus videtur, præsertim quum citra eius famulitium iecur suum principatum tueri valeat, distributo nimirum per ve-

Spirituum numerus.

Galeni sententia. σῦμφοτος.

φυσικός.

Cur Galenus de naturali spirita dubitauerit.

Epilogus doctorum.

nas omnibus corporis partibus alimento. Vti is motus rationibus Galenus, non immerito an aliquis sit spiritus naturalis dubitauerit. Galeni sententiæ subscribit Auerroes, *primo collectaneorum lib. cap. decimoquarto*, inquit, *Spiritus duo sunt, spiritus apparens in corde, & spiritus apparens in cerebro: sed spiritus in hepate non apparet per viam sensus*. In errore igitur versantur Argenterius & Montanus, qui Galenum aliquot ex eo productis locis naturalem statuere spiritum contendunt. Nam omnia hæc loca, quæ ipsi ad naturalem, quem ille *φυσικόν* vocat, detorquent, de *συνόρυγ*, id est, insito eidem nominato loquuntur: *ut ex superioribus satis patuit*. Sed iam, quod sit Galeni de vitali & animali influentibus spiritibus sententia, exponemus. Inter partes corporis principatum obtinentes, cor & cerebrum, tum natura, tum spiritu præpotente valent: hincque adeo fit, ut non seipsa duntaxat gubernent, sed alios de se spiritus, tanquam iugi de fonte, promant, in totum corpus propriis ductibus deriuatos. His namque quicumque sunt singulis partibus insiti spiritus, aluntur & conseruantur. His quoque ad functiones suas cōcitati, perpetuam operum functionem, *ut dictum est*, edunt. Ut hinc etiam intelligatur, præter insitum spiritum, qui stabilis & in vnaquaque parte fixus est, duos, minimum, insuper errantes, vagos, & influentes esse spiritus: vnum vitalem, quem cor assidue per arterias emittit: alterum vero animale, qui in cerebri ventriculis genitus, hincque per nervos profectus partibus sensum & motum suppeditat. Neque enim necessarium fuit spiritum innatum esse mobilem, quod per se ad edendas actiones potens non sit, sed sufficebat influentem talem esse, ut scilicet mobilis, singulis partibus insitum spiritum ad edendas functiones excitaret. Vitalis autem spiritus generatur a cordis natura & proprietate, ex sanguinis vaporibus depuratis, & aere attracto & inspirato, *Galen. lib. 12. Ther. meth. cap. 5. auctore*. Hic corpori vitam suppeditat, ac vitalibus functionibus ministrat, mutuato sane a facultate cui seruit nomine. Vitalem autem spiritum generationis sue materiam ex humorum exhalatione siue euaporatione, & aeris inspiratione lumere, *Galen. lib. 7. de Hipp. & Platonis placitis, cap. 6. testatur*. Vt igitur spiritus vitalis nutritur & conseruatur, tum ex sanguine, tum ex inspirando: ita vicissim perit suffocatione materię tota essentia contrarię admittance, nutrimenti defectu, vacuatione immodica, impedita inspiratione, & transpiratione. Suffocatur autem obstructione, & redundantia, non solum partium principum, sed etiam vniuersi corporis. Oppleris enim venis, aut obstructis, vel principum partium, vel totius corporis, natius calor, adeoque spiritus opprimitur, & suffocatur. Admifcetur vero aliena substantia inspiratione aeris pestilentis, aut vaporis aliquius tetri odoris, qualis ex stagnis, paludib. & cadauerib. non crematis, aut alia corrupta substantia exhalare solet. Spiritus igitur vitalis in corde domiciliũ habet, & per arterias in omnes corporis partes deferretur. Portio autem vitalis spiritus, quæ per arterias sursum ad cerebrum fertur, vna cum aere, qui per nares inspiratur, in implexu in dextro & sinistro cerebri ventriculis constituto, quiq; ab extimi fœtus inuolucris imagine nomen inuenit, & *χορσίδης* dicitur, ob frequētes eius anfractus ad cerebri vsus magis magisque adaptata, & a cerebri facultate perfectius cocta & elaborata, spiritus fit animalis clarissimus ac tenuissimus, ad motũ sensumque, & ad omnes denique animales actiones apte cōparatus. Animalis igitur spiritus ex vitali perfectius cocto oritur. Proinde quũ oporteret ipsum exquisitissimam omnium immutationē adipisci, natura illi diuturnā cōcoctionis moram, non quidē reticularē illum extra cerebrum plexum, *ut Gal. censuit*, quod nullus huiusmodi in homine reperiatur, sed potius plexum illum, qui, ut cōprehensum est, choroides dicitur, & quasi labyrinthus varius, in cerebri ventriculis fabricauit. Spiritus itaque vitalis vi ac proprietate, spiritus, qui cerebro insitus est, mutatione iam dicta accedente, spiritus fit animalis. Hic vero, ut *Gal. quoque, loco supra citato auctor est*, primum cerebri in actionibus, tum sensilibus, tum voluntariis edendis instrumentum est. Quo respiciens Hippoc. illum animę essentiam esse dixit. Paratum autem a cerebro spiritum nervi iis, quibus hunc mādari oportet partibus, communicant. Aere quoque per nares inspirato, & vndeque vbi aditum reperit, & maxime per foraminula odorum gratia in octauo capitis osse exsculpta, & per ea etiam, quæ palatum & fauces spectant, ad cerebrum perlato, ac ibidē elaborato, fomentũ incrementumque recipit. ut rectissime Gal. hunc nũc ex vitali, nunc ex aere inspirato, nũc ex sanguine gigni & nutriti dixerit. Ut mirari habeat Argenterius, qui fieri nō posse putat, ut aer inspiratus ad plexũ ferri possit. Non fert quidē ad plexum

Argenterius & Montanus Galenũ nō recte naturalem statuere contendunt. De influentibus spiritibus, vitalibus, & animali.

Vitalis spiritus procreatio.

Spiritus vitalis quibus de causis perit.

Animalis spiritus generatio.

Argenterii opinio improbat.

- A** plexum reticularem, qui in homine, ut commemoratum est, nullus reperitur, sed ad plexum choroidem, per loca utique iam ostensa. Gignitur etiā & nutritur ex sanguine, sed intercedētib. antea aliquot mutationibus. Immo fieri potest, ut etiam ex euaporatione eius sanguinis, qui in cerebri venis existit, augeatur & nutriatur. Quare non raro Argenterius nodum in scirpo, dum præter rationem veterum scripta parum candide interpretatur, quærere videtur. Ceterum vitalis & animalis spiritus, calidum & spiritum innatum in situmue membris augent. Nulla namq; in nobis pars aut calorem, aut insitum spiritum, aut vires ab ortu datas potis est retinere, citra influentium horū spirituum vires: sed breui omnia tempore cōciderent, a principiorū virib. destituta, nisi omnium insitæ vires influentibus a corde & cerebro facultatibus & spiritibus auferentur. Facultates quoq; excitant, redduntq; aptas amplioris caloris beneficio ad propria exercenda officia. Quod innuere quidam volentes, spiritus esse facultatum vehicula dixerunt; & recte quidem: Nam facultates vitalis & animalis per spiritus, veluti sua vehicula, e suis quæque fontibus, per propria instrumenta, quæ etiam ab illis fontibus enascuntur, in omne corpus distribuuntur. Naturalis autem facultas, quum omnibus partibus insita sit, eiusmodi vehiculo, *iuxta Galeni sententiam*, non eget. Atqui hoc loco iis, quæ diximus, Argenterius multis modis reclamationat. *Quis enim, inquit, animo concipere posset, per nervos densa corpora, dura & solida, substantiam aliquam promte subire, undique penetrare subito accedere, & recedere posse?* An non Argenterii, radii solis per vitrum, substantiam nervis multo densiorem, duriores ac solidiores penetrat? Quid igitur mirum, spiritum, qui omnium, quæ in corpore nostro sunt, leuissimus & tenuissimus est, nervos penetrare posse? Quod si humor crassus ita interdum nervos penetrat & infarcit, ut facultatis transitum, quod ipse fatetur, impediatur: cur non multo promtius per eosdem spiritus meare posset? Sed pergit, inquiens: *Quod si motus voluntarius, & sensus prorsus desiderant spirituum immisionem in nervorum substantiam, cur non idem sit in motu arteriarum: & quare non mouentur arteria, nisi per tunicas illarumque substantias feratur vitalis spiritus?* Respondeo: Verisimile est etiam vitalem facultatem recipi a corde in arteriarum tunicas & corpora, rāquam ab eo ortam: atqui illa aliis partibus, tanquam exigua, non impartitur, nisi spiritus, qui in illarum cavitate, tanquam in canali cōtinetur, beneficio, arteriarum ad easdem partes deferatur.
- D** Siquidem is spiritus, perinde atque calorem a corde influens, facultatem a corde arteriarum substantiæ immisam, & aliis quoque partibus communicatam excitat, mouet, & ad agendum aptam facit. Quapropter arteriæ facultatem quam sumunt a corde, absq; spiritus ope & immissione non exercent, nec ad alias partes deferunt. Vt autem arteriæ absq; spiritu vitali facultatem suam exercere, & aliis partibus communicare non valēt: ita etiam nervi vim suam a cerebro exceptam sine spiritu animali, eam excitante, & ad agendum aptam reddente, partibus aliis impartire nequeūt. Sed iterum instat Argenterius, dicens: *Si natura voluisset per nervos transire aliquod corpus, utique cavitationem, ut venis & arteriis illis, dedisset aptam ad suscipiendam & continendam huiusmodi substantiam.* Respondeo, Nequaquā: quod enim venæ & arteriæ cavitationem habent, non ob spiritum factum est, sed ob sanguinem, qui per has in totum corpus deferitur. Spiritus enim insitus partes etiam solidas promte penetrat, quod tenuis admodum sit. Si itaq; insitus per solida corpora penetrare potest, igitur etiam animalis, ut qui eiusdē cum insito, *ut ostendimus*, naturæ existit. Quare nihil mirum est, spiritum animale solidis instrumenta, nervos nimirum, permeare posse, etiam si cavitationem non habent. Verum rursus vrget: *Si, ait: animalis facultas spiritu eget per nervos transmissio, quomodo fient opera principum facultatum? quas in cerebro absque nervis fieri credimus?* Opera principum facultatum non fiunt sine spiritu, quod ipse etiam fatetur Argenterius: sed sine nervis. Quum enim propria sint cerebri opera, in ipso cerebro fiunt, adeoque sine instrumentis, haud secus quā in iecore accidit, in quo sanguinis generatio fit sine instrumentis. Nam quum illæ actiones iam dictis partibus a proprietate substantiæ insint, non egent instrumēto, quod facultatem hanc ad eas deferat. Spiritus itaq; animalis facultati animali in cerebro vim suam præstat sine nervis: reliquis autem partibus, quæ a cerebro distant, per nervos, qui veluti instrumēta ipsum ad eas deferunt. Quomodo enim vim suam exsereret, ubi nō esset? Nec metuendum est, ne ob vasorum & instrumentorum vicinitatem hi spiritus, quod suspicatur Argenterius, inter se misceantur & confundant. Nam ita inter se arteria & nervus distant,

Partes omnes tum insitis, tum influentibus facultatibus ac spiritibus gubernantur.

Spiritus vehicula facultatum.

Argenterii obiectiones.

Opera principum facultatum ut fiant.

vt neutra pars alteri confusa sit. Vt igitur inter se distinctæ sunt hæ partes, ita quoq; vitalis & animalis spiritus harum ministerio ad corporis partes delati, inter se confusi & mixti nequaquam sunt. Deniq; quod inquit, *Sicut unum est calidum innatū, ita sufficit etiam unum esse spiritum a corde duntaxat emanantem*: minime illi concedendum erit. Nam quum duæ sint facultates diuersis fontibus insitæ, vitalis nimirum substantiæ cordis, & animalis cerebro, q̄ peculiare & inter se differentes edunt actiones, necesse etiam fuit, vt duo spiritus ab iisdem fontibus promanantes, & has facultates in functiones suas concitantes essent. Spiritus itaq; a corde promanans, nō nisi vitalem facultatem excitat. Quapropter vt vitalis facultas modum & sensum in corpore efficere nō potest, ita quoq; vitalis spiritus easdem actiones excitare nequit. Vt igitur necessario ad has functiones obeundas alia facultate opus est, ita quoq; alio spiritu, animali nimirum, qui eandē facultatem

Ogomo-
do spiri-
tus sur-
sum, deor-
sum, & in
omnes
partes fe-
ratur.
Totum
corpus cō-
fluxile &
conspira-
bile.

ad suas actiones concitet, opus erit. Porro si quispiam dubitet, quo pacto spiritus tenuis-
sima alioqui substantia sursum, deorsum, & in omnes partes feratur, huic statim in men-
tem veniat: illud Hippocratis in libro de alimento, *ἔνθροια μίλα, ἐμπροια μίλα, ἐνυμᾶθρα πᾶντα*, id
est, *Confluxio vna, cōspiratio vna, consentientia omnia*. Quā quidē sententiam Galenus etiam
multis in locis suorum monumentorum inculcat, præsertim vero in lib. 1. de Medendi ratione,
vbi totum corpus *ἐμπύρον καὶ οὐπύρον*, id est, *conspirabile & conflatile*, esse ait, idq; propter eum,
qui est ab vna in alteram partem continuum transitum. Nam ita ab opifice rerum cor-
pus nostrum constitutum est, vt ad vniuersas eius partes nō modo spiritus, sed & sanguis
ac nutrimentum, eo multo crassiora corpora, permeare possint. Et si aer corpora nostra
ingrediens, per vasa citra impedimentū transire potest, quāto magis id ipsum posse spi-
ritum sibi aliquo modo congenerem putabimus? Quū itaq; suo impetu ad singulas cor-
poris partes influens spiritus ferat, & per se mobilis, haud secus atq; calidū innatum, sit,
recte ab Hippocrate impetum faciens nominatus est. Atq; ita ē argumentum a crassi-
tudine neruorum petiit, concidere sit necesse. Sed satis de Galeni sententia, qui duos

Opinio
eorū qui
tres influ-
entes sta-
tuunt spi-
ritus.
Naturalis
spiritus.

tantū influentes spiritus statuere videtur, iam diximus. Qui tres influentes esse spiritus
censent, ii supra vitalem & animale, tertium, nempe naturalem adiiciūt: de cuius qui-
dem procreatione ita sentiunt. *Alimenti purior*, inquit, *magisq; aerea portio, concoctione in
eam transit sanguinis tenuiorē substantiam, quæ vaporis calidi speciem exhibet*. Ea tum a facultate
iecori insita vim accipiens, eiusq; vbertate perfusa, spiritus fit naturalis, reliquo sangui-
ne tanto præstantior, quāto iecoris molera facultas ei naturaliter insita præcellit. Vapo-
rem igitur hunc calidum ac crassiusculum, quem sanguis, qui ad alendas partes in ieco-
re confectus est, defert, lata quadam significatione spiritū naturalem vocant. Huius spi-
ritus, quātum per venam cauam vna cū sanguine effert, & in cor inuehitur, illic denuo
caloris innati vi accuratius elaboratū attenuatumq; in aeris prope speciem mutatur, at-
que decedit: & ex dextro cordis sinu per cōmunes, eosq; arctissimos aditus, in sinistrum
sinum viam capeffit ac permeat: vbi hausto per pulmones aere tēperatum, materia quē-
dam fit, cui calor & vis cōcessa vitalis, spiritum profert vitale per arterias in totū corpus
diffusum atq; confertum. Quæ portio vitalis spiritus per arterias sursum ad cerebrū fert,
eo, quo diximus paulo ante modo, spiritus fit animalis. Proinde iuxta illorum sententiā
vapor ille sanguinis in iecore natus, e quo spiritus fit naturalis, vitali primū, deinde & a-
nimali sese materiam, & quasi alimentū exhibet. Quanto autem vitalis naturali tenuior
est, tanto animalis vitali. Quum itaq; in substantia spirituum varietas insit, efficit profe-
cto hæc ipsa, vt non vnius eiusdemque ii sint naturæ, quando quidem etiam ipsorum di-
uersa sint officia. Huius igitur opinionis assertores præter insitam innatamque natura-
lem omnibus partibus facultatem in iecore communem & influentem statuunt aliam,
ideoq; illinc quoque naturalem spiritum dimanare, qui eius distribuendæ sit vehicu-
lum, necessario affirmant. Non enim, dicunt illi, sanguis ad id muneris satis est ac-
commodatus, vt qui crassiore media inter corpus facultatemque substantiam est
fortitus. Ergo tandem inferunt, *Vt vniuersum animal gubernant principes facultates tres:
ita quoque totidem spirituum vehiculus, ex propriis fontibus, per suos canales in vniuersum
corpus distribuuntur*. Atque hæc quidem sententia, quæ spiritum naturalem quoque
aliquem esse statuit, nihil absurditatis habet. Nam etiamsi nulla prorsus e ie-
core influens facultas esse conceditur, tamen verisimile est, aliquem saltem esse
vapo-

Vitalis.

Animalis.

A vaporem calidum, siue spiritum naturalem, qui facultatem hanc insitam vna cū calore innato ad suas functiones excitat. Atque hinc est, quod Galenus nō diserte spiritum naturalem negauerit, sed dubitabūdus tantū dixerit: *Quod si naturalis quoq, aliquis spiritus est, utique is etiam in iecore, tanquam fonte, & venis veluti instrumentis, continebitur.* Postremo ex iis, quæ diximus facile cognoscitur, an vnum tantum nobis esse spiritum influentem dicere liceat. Si enim ad materiam, vnde is generatur, nempe sanguinem ac humorum massam respexerimus, vnus dici potest. Siquidem vnus est sanguis, vna humorum massa, vnde per euaporationem omnes spiritus influentes procreantur. Quapropter vt vnus est sanguis, vnaq; humorum massa, quæ ad generationem & mutationem vniuersi corporis sufficit: ita vnus quoq; , qui ex eo sanguine per euaporationē fit, spiritus dici potest. Sin ad principes partes, in quibus ab illarum viribus & spiritibus infitis hæc euaporatio ita alteratur, vt ad vehendas hinc in alias partes earundem facultates idonea reddatur, tot certe spiritus esse fateri cogemur, quot sunt sedes ac fontes, in quibus illi continentur, & vnde in alias partes emanant. Vt enim e diuersis promanant fontibus, ita quoque eorundem diuersa sunt officia, adeoque ea de causa nobis vnum tantum esse spiritum influentem dicere non licebit.

Est Galenus de spiritu naturali dubitabundus loquitur. An vnus sit spiritus influens.

Spirituum custodia qualis esse debeat. CAP. III.

Q Vum hætenus, quid sit spiritus, & quotuplex nobis, cōmemoratum sit, reliquum est vt nunc, *qua de causa medicum hoc cognoscere necesse sit*, expōnamus. Quippe quum sine spiritibus corpus nostrum viuere nequeat, nec facultatum essentia citra hos consistere possit, vt illorum rationem habeat, eosque diligenter cognoscat Medicus, & eorundem custodiæ maxime attentus sit, oportet. Custodiet autē, si curabit, vt spirituum substantiæ tum qualitate, tum quantitate, quoad fieri licet, naturaliter se habeant. Naturaliter autem se habebunt, si neque alterascant, aut immutentur, & si nihil substantiæ eorum vacuetur, aut defluat. Quum itaque in corpore generabili fieri non possit, quin quotidie aliquid de substantia spirituum defluat, atque adeo immutetur, id plane Medico agendum erit, vt quæ substantiæ portio defluit, hanc apponendo sarciat: quod vero alterascit, in iustum temperamentum per cōtrariam alterationē vindicet. Et si tum vacuatio, tum alteratio sensim paulatimque fiant, etiam correctio vtriusq; sensim administrabitur. Sin confertim, vel magna aliquando vacuatio, vel etiam adiectio incidat, & morbus ita efficitur, medendi quoque methodus ad eius curationem requiretur. Quæ qualis sit, Galenus lib. 12. *Thera. metho. cap. 5.* copiose admodum, & ex professo docet, vt necesse non sit, illam hoc loco inferere. Nunc igitur sermoni, de humani corporis constitutione, rebusque naturalibus vocatis, finem imponentes, ad rerum non naturalium explicationem progrediemur.

INSTITVTIONVM MEDICINAE

LIBER SECVNDVS.

PROOEMIUM.

E



X PEDITO primō ordine, qui fuit earum rerum, quæ corpus humanum constituunt & componunt: reliquum est, vt ad alterum transeamus, qui eas complectitur res, quæ corporis eiusdem cōstitutionem, modo recte ac commode vsurpentur, conseruant. Has certe Galenus, *cap. 85. artis medicae*, eam ob rem causas sanitatis cōseruatrices nominauit. Quippe legitimam corporis constitutionem, adeoq; sanitatem, qualem acceperunt, seruant. Nostri temporis Medicis res non naturales appellantur: quod scilicet naturam & constitutionem corporis nostri non ingrediantur, nec eiusdem essentiam compleant: tamen illud necessario alterent & immutent, & nisi oportune & salubriter adhibeantur, sanitatem & naturam hominis destruant. Hinc est, q, etiam a nonnullis causæ immutatrices nominentur. Siquidem vbi non recte adhibentur, sanitatem immutare possunt. Proinde duplici nomine res non naturales dictæ sunt, & quod nobis a natura non insint, sed forinsecus adueniant: & quod, nisi oportune, vt corporis cōstitutio exposcit, adhibeantur, ita corpus alterent, vt sanitatem etiam sæpenumero destruant. Sunt autem causa-

Causæ cōseruatrices.

Res nō naturales.

Causæ immutatrices.

Causarum, rum corpus nostrum mutantium ac destruentium duo genera. *Alterum earum, quæ* A
 quæ corpus nobiscum sunt congenitæ, ideoque internæ dicuntur necessariæ quidem, atque inui-
 nostrum mu- tabiles. Suntque numero tres, *siccitas* nimirum, quæ ætatis cursu ad interitum ducit, *affi-*
 struunt, duo *dua substantia fluxio, & excrementorum prouentus, ut fufius libr. 1. de mutenda sanitate Galen. de-*
 genera. *monstrat.* Alterum earum, quæ extrinsecus incidunt, quæ ob id externæ nuncupantur.
 Internæ. Quæ iterum duplices sunt: *aliquæ enim* non necessario corpus nostrum immutant, affi-
 Externæ. ciuntque, adeoque vitari possunt: cuiusmodi sunt quæ contundunt, diuellunt, vulne-
 Numerus rant, & alia permulta, de quibus nulla ars constitui potest. *Aliquæ vero corpus nostrum*
 rerum non necessario immutant, quarum sex esse genera constat, nempe:

- 1 *Aerem siue ambientem.*
- 2 *Cibum & potum, seu ea qua assumuntur.*
- 3 *Motum & quietem tum vniuersi corporis, tum singularum eius partium.*
- 4 *Somnum & vigiliam.*
- 5 *Excretionem & retentionem.*
- 6 *Animi perturbationes.*

In earum causarum genere, q, Galenus etiam loco paulo ante citato testatur, ars
 versatur, q, corpori tuèdo dicata est. Sunt enim eiusmodi, vt corporis constitutione in-
 columem, vbi probe, & vt necessitas corporis exigit, cum opportuna mensura & quali-
 tate adhibentur, conseruare possint. Siquidem aere, cibo & potu substantia deperdita
 restituitur, adeoque senectus & siccitas, remoratur. Motu, quiete, somno & vigilia, aliis-
 que modo comprehensis multa alia incòmoda, quibus sanitas destruitur, declinamus, C
 & excrementa, quæ ex cibo & potu in corpore coaceruantur, vacuamus. Vt hoc nomi-
 ne merito ad eam medicinæ partem referantur, quæ sanitatem tuetur, ac præcauet ne
 in morbos incidamus, Græcisque *ἐπιμετρία* vocatur. Quapropter quum a rebus non natu-
 ralibus nominatis corpus nostrum non modo alteretur ac mutetur, sed & sanitas ipsa,
 vbi sinistre ac perperam adhibentur, destruat, danda omnibus opera erit, vt illis sic
 vtantur, ne inde sanitas ipsa noxam vllam contrahat, sed per illas magis tueatur, fouea-
 tur, conseruetur. Vt igitur vitam morbis minime obnoxiam degamus, adeoque valea-
 mus, quum, vt Martialis inquit, non viuere, sed valere vita sit: quis harum rerum rectus
 & legitimus sit vsus, solícite & accurata diligentia, exorsi ab aere, ex veterum monu-
 mentis iam demonstrabimus.

DE AERE. SECTIO I.

Aer quis optimus, & contra quis pessimus. CAP. I.

Aer cur Me-
 dico confi-
 derandus.

A Er duabus potissimum de causis Medico attenta obseruatione considerandus ve-
 nit. *Vna*, quod eius evitandi nulla sit ratio: sed inuitis etiam nobis, quod eo priua-
 tum animal viuere nequeat, hauriendus, adeoque quouis tempore præsentis cœli statu
 vtendum sit. *Alterâ*, quod natiuus calor, ac spiritus eo ad sui conseruationem egeant.
 Vt rectissime a Galeno *lib. 9. Ther. method. cap. 4.* dictum sit, aerem cum plane esse, sine
 quo nec tolli morbus, nec teneri sanitas possit. Nisi enim assiduo bonus inspiretur, quo
 calor natiuus refrigeretur ac ventiletur, eius moderatio, in qua sanitas consistit, turba- E
 tur. Cum autem aer corpora nostra, vt experientia constat, mutet, adeoq; ratione mo-
 do materiæ sanatis modo, causæ morbum fouētis habeat: perspicuum euadit, sine illo
 morbum tolli non posse, quod necesse sit ægros perinde ac sanos præsentia aere vti. Sedulo
 igitur agendum est, vt aerem habeamus, qualem esse expedit: hoc est, talem, qui præsen-
 tem sanitatem tueri, & morbum ingruentem abolere possit. Sanitatem autē tuebitur,
 qui optimus & saluberrimus est: morbum autē profligabit, qui illi contrarius est. Optimus
 vero aer est, qui tota sua substantia exquisitè purus est, nitidus, tenuis, patēs, & liber, nullis
 inquinamētis oblitus, nulla putredine affectus, aut corruptela pfusus, ventisq; diffusus:
 eiusmodi fuerit, qui nec stagnorū, nec paludis halitu est infectus, nec ex pfundo specu
 pestilentem auram spirat. Nec qui ex cloacis, quæ vastum aliquod oppidum, aut nume- F
 rosum exercitum purgant, vitiū contraxit; nec qui ex animalium, olerū, aut leguminū
 putredine, aut fimo coinquinatur: nec qui ob stagnum aut flumē vicinū nebulosus est:
 nec qui editis vndiq; montibus in cauo loco & valle inclusus, nullum perflatum recipit.

Pessimus.

Contra pessimus est aer, qui turbidus & nebulosus existit, & qui ætatis maxime tem-
 pore

- A** pore lacuum & paludum exhalationibus corrumpitur, & inficitur. Vnde in maritimis ad Oceanum magnum vrbibus accidit, vt ad finem æstatis, & sub autumnum appetentem, singulis fere annis pestis se ostendet. Eiusdem classis est, qui ex profundis specubus erumpit: quales sunt, quos Galenus *commentario primo libro Epide. in principio, & alibi*, *χαρανίας* *Βαργέβος* nominat. Nam ita legēdum, & non *χαρωνίος*, vt habent nonnulli codices. Quod ex Plinio fit manifestum, qui *lib. 2. cap. 93.* in eum modum scribit. *Spiritus lethales alibi, aut scrobibus emissi, aut ipso loci situs mortiferi, alibi volucris tantū, vt Soracte vicino vrbis tractu: alibi præter hominem, ceteris animantibus: nonnūquam & homini, vt in Sinuessano agro, & Puteolano sunt, quæ spiracula vocant, alii Charonias scrobes, mortiferum spiritum exhalantes.* Hæc Plinius. Strabo in 14. Charonium antrū vocat, & in Asia non procul ab vrbe nomine Acharaca
- B** situm scribit. Sed forte non ingratum erit eius subieciſſe verba: *In via inter Tralles, inquit, atq; Nyssam, vicus est Nyssaensium, non procul ab vrbe Acharaca, vbi Plutonium est, luo sumptuoso circumdatum. Item Plutonis ac Iunonis delubrum, & antrum Charonium natura admirabile, quod luo imminet. Tradunt egrotos, qui horum deorum curis vacant, eo proficisci, atq; in vico specui vicino apud sacrorum peritos immorari, qui pro eis indormientes curas ex insomniis captant. Hi Deorum remedia inuocantes, saepe illos in antrū ducunt: vbi tanquam in cauerna manētes, multos dies & ieiunij & quieti exsulant: nonnunquam egrotantes propriis insomniis intendunt: ductū & cōsilio sacerdotum. Locus hic ceteris pestifer est, & inaccessibilis.* Hactenus Strabo: cuius verba, etsi proluxa, ideo recensere voluimus, vt Galeni loco aliquid lucis afferemus. In genere pessimus ac pestilens aer is est, q̄ ex cloacis oppida magna & numerosum exercitū expurgantib. exhalat. Itē, qui ex cadauerū insepultorū putredine corrumpitur & inquinatur: q̄ in bellis, & ingenti fame, vbi præ multitudinem eorū, qui moriuntur, nō sint aut sufficiant vespillones. Cuius rei memorabile exemplū est, quod anno a Christo nato 1438. in Thuringia accidit. Nam quum eo tempore tota regio immēsa fame premeretur, factum est, vt panis inopia tot morerētur quotidie homines, vt omnes per totam regionē viæ, omnesq; in vrbibus, vicis ac villis plateæ mortuis corporibus refertæ essent, ita sane, vt non tantū fame, sed & mox sequuta peste, multa hominum millia perierint. In cuius quidē rei memoriam Erfordienſes pistores singulis annis, die diuo Marco sacro, in quo Papistico ritu institutę supplicationes celebrātur, panes minutos, quos ob id *Marcesios* appellāt, pinſunt, ac venum proponunt: quorum vnus exigui orbiculi, qualibus catenę nobiliū adornantur, magnitudinem referens, tum tribus nummis eius regionis vſitatis coemptus fuit. Quos certe panes ipse olim, quum illic tyrocinia facerem, non sine multorum admiratione, mecum in patriam attuli, vt illis, qui parum creduli essent, eius rei fidem facerem. Sed ad institutum redeamus: vt purus, tenuis, adeoq; optimus aer nulli non ætati, adeoque puero, iuueni, ſeni, & omni temperamento conducit: ita impurus, crassus, nebulosus, ac vitiosus, ex æquo omnib. ætatibus, omniq; temperaturę noxius est. Cauendus igitur omnibus modis aer impurus, intēperatus, foetidus, occlusus, venenatus, ac pestilens, vtpote qui spiritus, vitales præsertim, vitiet. Grassante igitur pestilentia, aer venenatus ac pestiferiis maxime, qui neque publici officij necessitate conſtricti sunt, neq; liberos, aut alios sanguine iunctos habent, quorum caritate deuincti manere coguntur, fugiendus erit. Siquidem non solum Galenus & Hippocrates, verum etiam experientia ipsa testatur & confirmat, multo maximam partem eorum, qui in pestifero aere hærent, contagione infectorum oppetere mortem, & per paucos euadere. Quare cauſis iam dictis non obstantibus, Christiano etiam homini, cui medicina omni in morbo, tanquam Dei dono, vt licet, peste grassante, veluti præsidium Medicorum omnium testimonio laudatissimum, fugam arripere minime prohibitum est.

Aer vitiosus vt emendandus. CAP. II.

- Q**UÆ ex calore, frigore, siccitate, humiditate, diuersitas aeris contingit, nō perinde ſed ad omnes homines habet: ſed corporib. quę optimo tēperamento sunt, etiam optimē tēperatus aer est ſaluberrimus. In quib. vero aliqua exsuperans qualitas dominat̄, iis vtiliſſim⁹ est aer, qui ei qualitati maxime est cōtrarius & aduerſus, frigidus calidæ, calidus, frigidæ, humidiori ſiccus, ſicciori quā par est, tanto humidior, quanto ſiccitas ipsa modū exceſſit. Quapropter ſi accidat, vt ambientē contraria qualitate præditū habere non liceat, ſedulo agendum, vt talem, quoad fieri poteſt, qualem eſſe expedit, præpares. Verbi gratia, in calido & ſiccō morbo, qualis eſt febris, aerem frigidū & humidū eſſe conuenit.

Lib. 7. de
vſu par:
cap. 8.
Charonii
ſpecus.
Galenī lō
cus emen-
datus.

Charonia
ſcrobis.
Charoniū
antrum.

Thuringi-
ca famis
memora-
bilis.

Grassantē
peſte fugi-
endum.

Aer frigi-
dus & hu-
midus vt
parandus

uenit. Quod si talem habere nequeamus, arte nostra moliemur, ut morbo aduersetur, A
adeoque sanantis materie non causæ morbum fouentis rationem habeat. Humidiores
itaque frigidioresque domos, in quibus æger decumbat, tum deligemus, tum vero præ-
parabimus. Ac deligemus quidē, quæ ex seipsis eiusmodi sunt. Præparabimus vero, sub-
terraneis inuentis domibus, quæ & frigidissimæ sint, & maxime perflatæ, & ad Septen-
triones versæ, tum auris quibusdam, quæ ipsis sint suauis, opera nostra paratis: alias ex
euripis aliquibus, in quos multi aquarum fontes cum impetu incidant, aura, ut inspiret
machinantes: alias aqua frigida de vasis in vasa transfusa. Præterea domus pauimento
assidue aqua, quæ prorsus gelida sit, asperso. Floribus denique ac germinibus, quæ frigi-
dæ humidæque facultatis sint, per arcem projectis: verbi gratia, *violis, nymphaea, rosis, vi-*
tium capreolis, ruborū summitatibus, aut lentisci ramis. Turba quoque hominum ingredi pro- B
hibeatur: nam id quoque habitationem calefacit. Contra ubi frigidus & humidus fue-
rit morbus, curādum certe erit, domos ut eligamus ac præparemus, quæ calefaciant & ex-
siccant, floribus & germinibus humi fuis: verbi gratia, *chamameli, maiorana, lauedula, spica*
nardi, & id genus aliis. Quid multa? frigidis morbis calid⁹ aer opponendus calidis frigidus,
humidis siccus, siccioribus humidus. Cum igitur aer causæ sanantis rationem obtineat,
non temere Hippocrates in Epidemiis scripsit: *In diuturnis morbus terram mutare expedit.*
Siquidem verisimile est, aerem huic parum conuenire, qui in eo degens longo tempo-
re ægrotat. Transferendus igitur in alium, sibi magis congruentem, & morbo plane cō-
trarium aerem, erit. Atque hinc est, quod idem Hippocrates scripserit, *pueros, qui morbo*
comitiali laborant, mutatione potissimum ætatis, locorum, & victus a morbo liberari. Ita quoque C
Galenus *libr. 5. Ther. method. cap. 12.* testatur, eos, qui Romæ, quod is locus destillationibus
assiduis obnoxius esset, pulmonis vlcere laborauerunt, se ad Tabias, quod illic aer esset
siccior, & ad curandum vlcus aptior, ablegasse. Est & hodie obseruatum, iuuenes ali-
quot vehementi tussi lancinatos, iamque tabis in periculum vocatos, quum nullis me-
dicamentis subleuari potuerant, in patriam remissos, nullis aliis adhibitis remediis ob
patrium haustum aerem sanatos esse. Verum, ut loci mutationem recte præscribere, æ-
grumque eo, ubi sibi congruentem aerem inueniat, ablegare medicus possit, primum
locorum notitiam habeat, adeoque Geographiæ peritus sit, necesse est. Locorum au-
tem notitiam consequetur, si vel ipse crebris peregrinationibus locorum situm ac di-
uersitatem perlustrando inquisuerit: aut ex assidua lectione eorum, qui de iis aliquid D
memoriæ prodiderunt, didicerit. Ex omnibus autem aliis vel vnus Strabo, plurimum
ad id institutum adiumenti afferet Medico. Dein, ut ventorum quoque rationem co-
gnitam habeat Medicus, oportet. Ad quam consequendam, plurimum conferet Hip-
pocr. *sect. 3. Aphorismorum, aliisque in locis:* præterea Aristoteles, alique, qui hanc rem ex
professo tradiderunt, Philosophi. Postremo ad loci mutationem recte præscribendam,
non parum astrorum ac syderum ortus & occasus cognouisse conferet, quod aeris &
coeli constitutionem, quod experientia ipsa confirmat, mirifice immutent. Ut hinc et-
iam palam fiat, Medico necessarium esse, ut eam partem Astronomiæ, quæ astrorum ac
syderū ortus occasusue tradit, perspectam habeat. Eam vero, quæ superstitiosa quadam
obseruatione ex astris nescio quæ portenta, & mendaciorum prodigia prædicat, ac fu- E
turatorum euentum vaticinatur, & ob id *Astrologia* ac *diuinatoria* nominatur, Medicus
veluti certissimum artis impedimentum audacter contemnere debet. Quam enim su-
perstitiosa rerum vanitate sit contaminata, adeoque Christiano homine indigna, & ne-
fandissimis anilibusque figmentis ac deliramentis conspersa, ab aliis doctrina excellen-
tibus viris abunde est monstratum. Et certe omnium odio digna est, quod libertatem
animi actionesque nostras siderum necessitati perperam obstringit. Sed de aere hæc
dixisse satis sit.

DE CIBO ET POTV. SECT. II.

Quis cibi & potus vsus, & quor in illis assumendis consideranda. C A P. I.

Cibi & po-
tus quis
vsus.

Q Voniā de cibis & potibus nunc differendum erit, initio, quis eorundem sit vsus, F
explicabimus. Siquidem quum tota animantium moles in perpetuo fluore sit, nec
vllum sit temporis momentum, quo non in aera dissipentur corporis spiritus, humo-
res, ac solidæ partes, nisi altera similis substantia pro ea, quæ defluxit, restituatur, qua de-
trimento sum istud corporis defluuium expletur, breui tempore euaporabit atque dis-
sipabitur

A sipabitur vniuersa. Contra hoc necessarium ac natiuū miserę mortalitatis malum, Con-
ditoris puidencia cibum & potū vberima benignitate dedit. Cibo igitur, quicquid sic-
cioris substantię effluxit, restituitur & sarcitur: potione vero, quicquid humidioris. Hęc
cū ita se habeant, summo studio annitēdum erit, vt illos tm cibos assumamus, qui nos sic
alant, vt quoad fieri potest, nos non lēdant. Id vt consequamur in cibis assumendis nouē
consideranda veniunt: nempe cibi bonitas, mensura, qualitas, consuetudo, delectatio,
ordo, tempus, hora & ætas. De quibus omnibus ordine agemus.

Nouem
in cibis at
sumendis
confide-
randa.

De cibi bonitate & malitia. C A P. II.

Q V i corpus morbis minime obnoxium circumferre cupit, huic in hanc curam vni-
ce incumbendum erit, vt cibis boni succi perpetuo vtatur. Siquidem ad procrean-
dos morbos maximam vim obtinet *κακοχυσία*: quæ nō aliunde magis, quam ex mali & vi-
tiosi succi cibis conciliatur. Boni autem succi cibus est, e quo bonus procreatur sanguis:
bonus vero sanguis est, qui neq; iusto calidior, neq; humidior, neq; frigidior, neque sic-
cior, non tenuis, non crassus, non pinguis ac lentus, non acris mordaxue, amarus, salus,
acidus, breuiter, perfectā adeptus mediocritatem. Mali cōtra succi cibus est, e quo ma-
lus generatur sanguis. Malus autē sanguis est, qui a descriptione boni sanguinis recedit.
Non est autem, quod in mali succi cibis statim habeatur, quisquis a summa perfectione
vel tantulum excidit: imo boni succi cibus erit, qui sanguinem faciet non tantum illum
optimum, sed notabili atq; euidenti vitio carētem. Nam vt omnib. aliis in rebus aliquid
omni ex parte absolutū proponitur, quo se mens nostra, velut ad ideam referat, quum
de iis rēbus cogitandum erit: ita in ciborum quoq; ratione nobis optimus aliquis cogi-
tatione vsurpatur, ad quem in eorundē delectu perpetuo nos, veluti in scopū aliquem,
intentos esse oportet. Quem etsi raro ad plenum consequi nobis sit integrum, anniten-
dum tm nihilominus, vt is nobis contingat, qui paruo momento ab eo, qui optimus est,
declinat. Neque paruz rei magna hic habenda ratio: atq; in bonis adhuc locus ei relin-
quendus, qui proxime ad optimū accēdit, & notabili vitio vacat. Qui vero particulatim
huius vel alterius naturę cibi sint, Galenus in libello de cibis boni & mali succi, breuiter & lu-
culenter admodū docuit. Est n. veluti compēdium quoddam eorum, quæ copiosissime
in trib. libris de alim. facultatibus tradidit. In quorū sane 1. & 2. de panum & frumentaceo-
rum generibus: in altero, de fructibus & stirpibus: in 3. de cibis, qui ex animalibus, carne
scil. lacte, & id genus aliis sumuntur, tractat. Vt non sit necesse hoc loco de singulis par-
ticulatim differere, cum id ipsum affatim & perspicue locis iam ostensus præstiterit Ga-
lenus. Ad alia itaq; explicanda, q̄ in ciborū assumptione expendenda sūt, progrediemur.

Cibus bo-
ni succi.
Bonus san-
guis.
Cibus ma-
li succi.
Malus san-
guis.

Liber Ga-
leni de ci-
bis boni &
mali succi

De cibi mensura. C A P. III.

S I vsquam locum habeat, quod ille dixit, *Ne quid nimis*: certe in ciborū ratione habet.
Proinde qui sanitati studet, huic præ omnibus aliis danda opera est, ne vllō tempore
plus cibi, quam natura exigit, ingerat. Vbi enim plus cibi, quā pro natura ingestum est,
Hippocrate attestante, hic morbum facit. Alta igitur mente omnibus reposita maneat hæc
non minus utilis quam brevis Hippocratis in Epidemiorum libris sententia, vbi ita in-
quit, *ἀνὴρ οὐκ ὀρεῖται ἀποκρίν τεσσάρων, ἀλλὰ τὴν πέντε*: Sanitatis studium est, nō satiari cibis, & impigrum esse ad
E laborem. Si enim quis ad satietatem vsq; ingerat cibum, cum iam vires grauet, fieri nō po-
test, vt illum perfecte natura concoquat. Si vero non concoquitur, morbum pariat, ad-
eoque pristinam sanitatem destruat & aboleat necesse est. Si vero mediocritate in assu-
mendis cibis vsus fuerit, nūquam aut raro periculosum morbū incurret. Lex igitur hæc
præcipua sanorum esto, *ne immodice cibos ingerant: tantumq; cibi & pot^o assumant, vt hinc vires
conseruetur, nō opprimantur*. Ceterum non tm sanos, sed & ægros hæc lex adstrictos habet.
Siquidē & illic vnice confert, imo necesse est, vt in cibis assumēdis legitimā mensurā te-
neant. Vt n. morbi sunt diuersi, ita aliā atq; aliā cibi mensurā postulant. In diuturnis nā-
que morbis plen^o, in acutis aut tenuius cibandū erit. Cui^o rei rationē reddit Gal. lib. 1. ad
Glaucōnē, iis quidē verbis: *In acutis morbis, & qui ad vigorem celeriter perueniunt, si tenuiter omnino
cibare velis, haud magnopere lades. In longiorib. vero, nisi per initia liberalius escaueris, aut vna cum
morbo hominem necabis, aut intempestiue victus ratio mutanda erit. Neque enim accedente vigo-
re uberior victus, quam prius, sed contra omnium, qui per morbum exhiberi debent, tenuissimus
in id tempus reseruandus est*. Quæ singula Hippocrates breui admodum sententia com-
plexus est, inquit: *Vbi morbus per acutus est, statim summos labores obtinet, & summe tenuis-
simo victu utendum. Vbi vero non, sed pleniorē victum adhibere licet, tantum a tenuissimo victu*

1. Apho. 17
6. Epide.
lectio. 4
Apho. 20

Lex præci-
pua sano-
rum & æ-
grotorum.

1. Apho. 7.

declinandum, quantum morbus ipse summis leuior fuerit. Et iterum eodem loco. Quando mor-
bus in suo vigore fuerit, tunc tenuissimo victu uti oportet. Vt hinc palam sit, quanto acutior est
morbus, tanto illum vigori viciniorem esse, adeoque in eo tenuiori victu utendū. Quan-
to autem contra diuturnior est, tanto illum a vigore magis abesse, & tenuem victum re-
spuere, pleniorēq; expetere. Proinde non temere dixit Hippocrates: Victus tenuis &
exquisitus in diuturnis quidem morbis semper, in acutis autem, ubi non competit, periculosus. Vt
itaque medicus in prescribenda legitima cibi mensura non erret, ad duo, a quibus potis-
simum cibandi consilia petuntur, nempe morbi summum vigorem, & ægrotantis vires
ille respicere debet. Id quod etiam Hippocrates faciendum esse iubet, dum ait: Coniicere
oportet, num ager possit cum victu ad vigorem vsque morbi perdurare: & nunquid ille prius deficiat,
nec cum eo victu durare queat: aut morbus antea deficiat, & redundatur. Hæc ille. Si itaque Me-
dicus diligenter morbi vigorem, & vires ægroti expendat, haud facile neque in tenuis,
neque in plenioris victus vsu errabit. Cum vero vtriusque error sit periculosus, alter ta-
men altero est deterior. Si diligenter inter se eorundem errores conferuntur, perspi-
cuum euadet, deterius esse, si quis se a tenuiore victu ad pleniorē intempestiue trans-
ferre cogatur, quam si e pleniorē in tenuiorē mutationem instituat. Nam ubi morbi ra-
tione, qui iam verius vigorem properat, detrahendum maxime esset, ibi virtutis conser-
uandæ gratia adiciere cogitur Medicus. Atque id est, quod ab Hippocrate est dictum:
In tenui victu agri delinquant, quo fit, ut maiore afficiantur detrimento. Omnis enim error, qui com-
mittitur, maior sit in tenui, quam paulo pleniorē victu. Propterea etiam iis, qui sani sunt, periculosus
existit admodum tenuis, status, & accuratus victus, quod nimirum errores grauius subinde ferunt.
Quapropter tenuis & accuratus victus, maxima ex parte periculosior est eo, qui paulo plenior exsi-
st. Hactenus Hippocrates. Non autem ab re adiectum est ab Hippocrate, Maxima ex
parte. Nam iis verbis quorundam imperitorum Medicorum erroneam sententiam ex-
plodere voluit, qui affirmant, Medicum quouis tempore in pleniorē, quam tenuio-
rem victum, proniorē esse debere: cum tamen tenuem non perpetuo esse periculo-
sum, sed maxima tantum ex parte, Hippocrates asserat. Est enim, ubi pleniorē victu in
morbis non sine grauissima noxa uti liceat. Quippe in acutis morbis, qui celeriter ad vi-
gorem perueniunt, si quis pleniorē victu vsus fuerit, inemendabiles noxas afferet, eo
quod naturam, quæ tum in coquendo morbo est, in suo munere impediat, & ad confi-
ciendos cibos auocet. Quod autem noxæ non contemnendæ e pleniorē victu accidant, D
adeoque eo nomine non quouis tempore in pleniorē victum proniorē esse conue-
niat, in nostris super paulo ante citatam Hippocratis sententiam commentariis copio-
sissime demonstrauius, ut necesse non sit, id hoc loco pluribus agere. Ad eius itaque
Aphorismi enarrationem lectorem nunc ablegamus, ne in immensum præsentis libri
moles accrescat.

De qualitate cibi. C A P. IV.

Post mensuram cibi, eiusdem etiam qualitas, tam in sanis, quam in ægris, a Medico
 accurata diligentia expendenda venit. Quippe in sanis, simili qualitate præditi cibi:
 in ægris, contrarii sunt assumendi. Qui enim naturaliter se habent, adeoque sani sunt,
 eos in hoc statu seruare ac custodire oportet. Qui vero præter naturam afficiuntur, &
 cum morbis conflantur, eorum statum immutare est necesse. Nihil autem seruatur,
 nisi per similia, neq; immutatur tolliturque quicquam, nisi per contraria: ideoque sani
 similes semper postulant cibos, ægri contrarios. Proinde temperamentum eorum,
 qui recte valent, per similes cibos conseruandum erit. Quod vero tale est, ut iam
 actiones offendat, id per contrarios demolendum erit. Quorum itaq; temperamen-
 tum, verbi gratia, natura humidum, quale vtrique puerorum, est, iis cibis humidus ma-
 xime conuenit. Qui vero sicco aliquo morbo, qualis febris est, laborant, iis cōtrarius ci-
 bus, nempe humidus, utilis est. Qui vero humido correpti sunt morbo, qualis est ana-
 sarca, iis siccus: qui calido, frigidus: qui frigido, calidus competit cibis. Quod, ut alia o-
 mnia, breuissime quoque Hippocrates docuit, ubi in Aphorismis, ita scriptum reliquit:
Victus humidus omnibus febricitantib. prodest, præsertim vero pueris, & aliis, qui hoc genere victus
uti consueuerunt. Et in Epidemiis, ubi in eum scribit modum: Calida natura refrigeratio, a-
qua potio, & quies confert. Per calidam namq; naturam, ut in eius sententiæ enarratione tu-
lius monstrauius, non eam in qua natiuus, adeoque mediocris: sed eam potius, in qua
acris

A acris & mordax calor, atq; adeo præter naturam & immodicus abundat, Hippocrates intelligit. Et rursus eodem in lib. ubi ait: *Calidum corpus per id, quod comeditur, intus refrigescitur contrarium, contra.* Possem complures alias eius auctoris sententias ad institutū nostrum facientes producere, sed quia satis est paucas has citasse, ad ea potius, præsertim cum res per se plana sit, quæ reliqua sunt, progrediemur. Reliquum autem est, ut Medicus, qui cibi calidi, frigidi, humidi aut sicci sunt, cognoscat. Quum vero hoc ipsum Galenus in iis libris, quos de alimentorum facultatib. posteritati reliquit, perspicue tradiderit, sufficere in præsentia locum indicasse. Neq; enim consilium est singula particulatim in iis libris referre, quod ita in immensum ac molem magnam crescerent

De consuetudine ciborum. C A P. V.

B Quantum in victus ratione momenti habeat consuetudo, in primis hoc a veterib. celebratū satis indicat, *omnes enim quæ sunt in natura: Consuetudines esse acquisite naturas.* Vrgitur natura ipsa similium ciborū assumptione conseruanda est: ita quoq; consuetudo, quæ, ut dici solet, altera est natura. Hinc non temere Hippocrates dixit: *Quæ longo tēpore consuetæ sunt, etiam si deteriora sunt, insuetis minus molestare solent.* Consuetudo vero in victus ratione non solū in sanis, sed & in egrotantib. accurate obseruanda erit. Quapropter Hippocrates non temere in 1. Aphor. sect. ubi ex professo de victus ratione agit, aliquid consuetudini dandum esse præcipit. Et clarius lib. 2. de ratione victus acutorum morborū, ubi inter alia ita de consuetudine inquit: *Quod vitiosus tum cibus, tum potus, semper sibi similis, ad sanitatem tutior sit, quam si quis subito ad alterū vel meliorem se transferat, facile intelligitur. Nempe,*

C *tum iis, qui bis die comedunt, tum iis, qui semel, noxam imbecillitatemq; pariunt repentina mutationes: & qui prandere non consueverunt, tamen prandent, statim agre habent, toto item corpore graues redduntur, imbecilles, & segnes. Quod si præterea cœnauerint, ructus acidus, & alui lenitas subsequitur. Grauat enim præter consuetudinem ventriculus, qui antea aridus esse, neq; bis intumescere, neq; bis cibos concoquere consuevit. Hæc ille. Quæ etsi prolixa sunt, tñ referre placuit, ut inde, quantum vim, tam in sanis, q̃ in ægris habeat consuetudo, cognosceretur. Sed dicet hic quispiam: Si tantū momenti consuetudo in victus ratione habet: igitur hæc ipsa, etiam si praua est, nunquam mutanda erit. Respōdeo, nūquam subito esse mutandam: q̃ Hippocrate teste repentinæ mutationes omnes cauendæ sint. Et idē lib. 2. Vict. acut. morb. Aphor. 18. ait. Repentina mutationes noxam imbecillitatemq; pariunt. Cum itaq; oēs subitæ mutationes periculo haud*

D *vacent, a consuetis quoq; cibis nemo repente transferendus erit, sed si omnino prior victus ratio mutationē requirere videat, fiat paulatim & sensim, iuxta illud Hippo. Plurimum & repente vacuare aut explere, aut aliter quomodocunq; corpus mouere periculosum. Et omne quidē nimium natura inimicum est. Quod vero paulatim fit, tutum, præsertim ubi quis ab altero ad alterum progreditur. Vt iam perspicuū euadat, subitam mutationē omnem, ut quæ de extremo in extremū absq; medio fit, naturæ, q̃ in mediocritate consistit, esse aduersam: contra eam, quæ sensim & paulatim fit, amicam: ut nō temere Hippocrates in paulo ante citata sententia dixerit, vitiosum tum cibū, tum potū semper sibi similem, ad sanitatem tutiorem esse, quam si quis subito se ad meliorem transferat. Ceterū, nō satis est mutationem consuetudinis non esse repentinam, nisi legitimo et fiat tempore. Legitimum vero tempus*

E *est sanitatis, quū optime scilicet valemus. Nec tñ quoduis sanitatis tempus: sed id duntaxat, quo a reb. ciuilib. immunes sumus, & nullis aliis negotiis distringimur. Quod certe confirmant ea, quæ lib. 5. de tuend. sani. c. 8. scribit Galenus, ubi inquit: Consuetudines ipsæ, tametsi prauæ sunt, displicentibus sibi adhuc corporibus mutandæ haud sunt. Quin nec per summam sanitatem, semper id tentandum, sed tum, quum is, cui mutandæ sunt, a ciuilibus maxime negotiis vacat. Et paulo ante iam citata verba: Quin etiam, inquit, intemperies ipsas, quacunque adhuc intra sanitatis fines subsistunt, si corrigere studebis, contraria quodam modo victus ratione curabis: quod tamen per multum sit otium. Nam si in negotio sint, similibus vteris, potissimum, quum ita fuerint corpora assuetæ. Idē plane testantur, quæ ille scribit lib. 6. eiusdem operis, c. 3. ubi inter cetera, ita ait: Porro alimenti species, si quis temperamentum vertere in melius studet, contraria esse tem-*

F *perantia debet. Sensim vero id fiet citra noxam, si & præsit Medicus: & qui curatur, ita sit a negotiis liber, ut omnia suo tēpore peragat. Nam qui in reb. ciuilib. versatur, & multis negotiis distringitur, huic tutius est, ut nec tentet temperamentum suum mutare. Nec discrepant, quæ lib. 8. Ther. method. c. 9. scribit, inquiens: Satiùs arbitror est, quū plane valent, non quum egrotant, vel de se queruntur, intemperatis naturis victus rationē mutare. Gaudent enim natura consuetis semper. Proin,*

6. Epid.
sect. 3.
Apho. 35.

Consue-
tudo ac-
quisita
siue altera
natura.
2. Aph. 50.
Aphor. 17.

An præter
consuetu-
do mutan-
da sit, nec
ne.

6. Epid.
sect. 3.

Apho. 22.

Quo tem-
pore mu-
tatio con-
suetudinis
fiat.

2. Vi& a-
cupit 18.
Ad con-
suetudi-
nis muta-
tionem
tria requi-
runtur.

de verissime dixit Hippocrates: *Mutatio ipsa quidem non parum conducit, si eius recta sit translatio; hoc est, si fiat sanitatis tempore, & per otium, nec sit repentina.* Nam, ut ex iam dictis liquet, tres illæ conditiones ad consuetudinis mutationem requiruntur.

De cibi Delectatione. C A P. VI.

2. Aphor.
28. Num per-
petuo qui
delectant
cibi ægris
exhiben-
di.

Secio 4.
Aphor. 7.

Porro in cibis præscribendis Medicus diligenter consideret, quibus æger maxime delectetur. Nam qui cum voluptate assumuntur cibi, eos ventriculus avidius amplectitur, promptiusque & expeditius concoquit. Contra, eos qui displicent, auersatur, refugit, nec auide amplectitur, neque expeditie concoquit. Hinc fit, ut sæpenumero suauiores cibi, etiam si deteriores sunt melioribus, minus tamē suauibus præferantur. Id quod Hippocrates quoque faciendum esse præcipit in Aphorismis, ubi ita scriptum reliquit: *Paulo deterior cibus & potus, qui tamen sit suauior, melioribus quidem, sed minus suauibus antefereendus.* Verum non deerunt Medici, præsertim qui assentationibus se se potius, quā eruditione vendere studēt, quiq; autum magis, quā salutem ægri sitiunt, qui hinc sui erroris patrocinium arripient, sibiq; licere putabūt, ut nunquā ægro exhibeant, nisi quibus maxime delectetur. Sed quæ fallantur, quamque scelerate Hippocratis sententia abutantur, perperamque ad tuendos suos errores eandē detorqueant, alia eiusdē sententia demonstrat, in qua quantū ægrotantibus in cibo & potu sit gratificandum, disertè exponit. Ea vero est in 6. Epidemiorum lib. ubi in eum scribit modum: *Hæc sunt, in quibus ægrotantibus est gratificandum, ut scilicet cibus & potus pure conficiantur. Grata etiam sint, quæ viderint, & mollia, quæ attingūt, sed non admodum ledant, & facile reparabilia sint, veluti, frigida exhibitio, ubi ea opus fuerit, & alia.* Hæc ille. In qua sane sententia Hippocrates perspicue, in quibus potissimum rebus ægrotantibus sit gratificandū, & in quibus iisdem obsequendum sit, ostendit. Quippe in eo maxime ægrotanti obsequendū erit, ut tam cibus, quā potus, qui illi offeruntur a ministris, puri, & a sordibus repurgati sint: Sic enim maiori cum voluptate eosdem assumeret, tumque eos ventriculus avidius amplectetur, & expeditius concoquet. Dein obsequendū etiam interdum ægris, ut illis permittantur et ea, quæ non quidem plurimum, sed parū admodū nocent. Quod significare volens Hippocrates, dixit: *Non admodū ledant, & facile sint reparabilia.* Et in Aphorismis paulo deteriore laudavit cibum, non omnino prauū, eiusmodique inferentem noxam, quæ corrigi nequeat. Sic certe aquæ frigidæ interdum potum ægrotanti concedimus, ubi scilicet ea opus est, & noxa, quam infert, reparari facile potest. Quod de aqua frigida diximus, id ipsum de omnibus aliis, tum potibus, tum cibis intelligendum venit, ut non sit necesse de singulis particularim verba facere.

De ordine ciborum. C A P. VII.

Legitimus
assumen-
dorum ci-
borū or-
do.

IN cibis assumendis, non solum ea, quæ hætenus dicta sunt, obseruanda erunt: sed & hoc vnice curandum, ut legitimo ordine cibi ingerantur. Legitimus autem assumendorum ciborum ordo est, ut concoctu facilia, iis, quæ difficulter concoquuntur, præmittantur. Nam si is ordo turbatur, tū illa, quæ concoctu difficilia sunt, ea quæ iam concocta sunt, quo minus descendere, & e ventriculo egredi possint, impediunt. Debent quoque ea, quæ liquida sunt, solidis & aridis antecedere, quæ alias liquida in superficie ventriculi natent. Præterea, edulia, quæ deiectionem moluntur, iis, quæ tarde cōmeant, lubricantia, adstringentibus celeriter subsidenda, iis, quæ in ventriculo morata corrumpuntur, citius sumenda sunt. Verbi gratia, oua sordida, & id genus alia concoctu facilia, iuscula, olera, carnibus assis, cotoneis, aut punicis malis præmittenda sunt. Ut autem Medicus omnium horum exquisitam notitiam habeat, adeoque quis sit legitimus assumendorum ciborum ordo, perspectum habeat, diligenter illi Galeni, quos de alimentorum facultatibus libros conscripsit, euoluendi erunt, e quibus certe singulorum ciborum facultates cognosceret, quemque ordinē in assumendo obtinere debeant, clare admodū disceret. Ceterū quæ de ordine ciborum hætenus diximus, ea ad ventriculum naturaliter se habentem referenda erunt. Nam si cui ventriculus iusto laxior sit, huic certe præstiterit quouis tempore adstringentia lubricantibus præposuisse: quod alias fieri nequeat, ut tantisper cibus, donec perfecte concoquatur, in ventriculo retineatur. Robur etiam aliquod ex iis ventriculo accedit, si ea, quæ assumit, rectius conficere potest. Quid multa? ventriculus præter naturam affectus non eam victus rationem, nec cum ingerendorum ciborum ordinem, quem sanus, requirit: sed potius victum contrarium, & qui illum ad mediocritatem quandam reducere queat.

De tempore assumendorum ciborum. CAP. VIII.

- A** Vrandum quoq; nobis erit, ut tam sani, q̄ ægri, non intempestive, sed convenienti tempore cibū ingeramus. Quod fiet, si statas certa;q; horas prandio cœnæq; destinemus. Sani utiq; solita & consueta hætenus hora, postquā hesternus priorue cibū descenderit, & iam confectus fuerit, ac ipsi modice antea exercitati fuerimus, iamq; illiciente appetitu prandium sumemus, & cœnabimur. Si enim cōsueta hora id ipsum fecerimus, naturam ipsam ad cōficiendos cibos alacrem ac promptam experiemur, ut quæ statis horis suum facere officium didicit. Quod si vero priore nondū cōfecto cibo, necdum in alium demisso, aliū ingeramus, hic profecto perinde, atq; is, qui prior assumptus est non cōcoquetur, adeoq; maximæ cruditatis causa erit. Tempus assumendorū ciborum in sanis.
- B** Cauendū quoq; erit, ne varia eadem in mēsa edula, nec varie apparata, nec culinæ artib. gulam irritantia sumantur: sed simplici ac unico cibo ad necessitatem, non ad satietatem, cōtenti simus. Quod sane Hippocrates et monuit loco iam crebro citato, ubi *sanitatis esse studiū ait, non satiari cibis*. Recte igitur Martialis & Horatius præcipiunt, *ut conuiuius sit facilis, & sine arte mēsa*. Quum n. diuersorum ciborum diuersa sit natura, accidit, ut ciborū eadē mēsa varietate, copia & productione in lōgas moras, nihil nocētius homini ad salutem esse possit. Proinde mirum nō est, quod ii, qui gulæ ac vētri toti seruiūt, deditiq; sunt ac sese a summo mane ad summam vsq; noctem multo varioq; tum cibo tum potu nō implent solū, Crapula quorundā notatur.
- C** sed et distendunt, cū cibis cibum assiduo excipiat, & cōpotationib. studeant, magnam sibi cruditatem comparant, nec vllus eorum ad iustam senectā perueniat. Nam dum ex intemperantia illa maximam crudorū ac vitiosorum humorū copiā coaceruāt, fit ut podagra, calculo, colici dolore, carcinomate, febribus, & id genus aliis malis prius annis aliquot mittere torti, tandē vitam cū morte cōmutent. Ceterū prodest plurimum, ut ante cibū exercitemur, quod ita calor natiuus augeatur, cibusbq; assumēdus dein expeditius immutetur ac conficiatur, nutritioq; felix succedat. Quod quū intelligeret Hippocrates, non ab re in Epidemiis ita scriptum reliquit: *Labor cibū præcedat*. Sed ea de re suo loco fusius Deniq; fames optimum condimentum, ad mensam afferenda, & iā illiciente appetitu cibum assumādus; nece ad edēdum instigāte cibum differendus est. Quippe si ventriculus iam vacuus alimētum postulat, nec eius copia est, excrementis impletur. 6. Epide. sect. 4. aphor. vlt.
- D** Ea sunt, sanies quædam biliosa, pituitosa, & serosa, quas solas trahenti illitum, quū nutrimento indiget, iecur remittit, & cōcedit. Ut nō temere hætenus hoc in scholis Medicorum sit usurpatum: *Diutius tolerare famem, ventriculum malis complet humorib.* Plurimum igitur ad sanitatis cōseruationem cōfert, si legitimis hora & tempore, cibum assumatur. itz, n. cruditas, sanitatis corruptela, vitabitur. Contra vero, infirmum, morbosumq; ac Deo & hominib. odiosum corpus red: let assidua crapula, ciborūq; ac potuū ingestio, ut eo maiori studio nobis aduertendū sit, ne per sanitatem intempestive cibum ingeramus. Tam prandium vero, quam cœna semper a cibo, nunquam a potu, auspicetur, q̄ alias in venarum inedia, vinum adhuc crudum ad eas rapiatur. Cauendum aut vnicē ne matutino tēpore, vētriculo adhuc vacuo & ieiuno, vinū forte, aut offæ vino macerata, Diutius tolerare famem, ventriculum malis complet humorib. Plurimum igitur ad sanitatis cōseruationem cōfert, si legitimis hora & tempore, cibum assumatur. itz, n. cruditas, sanitatis corruptela, vitabitur. Contra vero, infirmum, morbosumq; ac Deo & hominib. odiosum corpus red: let assidua crapula, ciborūq; ac potuū ingestio, ut eo maiori studio nobis aduertendū sit, ne per sanitatem intempestive cibum ingeramus.
- E** quod magnates tū facere consueuerunt, ingerātur, quod inde maxima corporis mala, ac grauissimi morbi oriuntur. Intervallo præterea eo, q̄ inter pandiū & cœnam interiectū est, a potu abstinendum erit, q̄ cōcoctioni ciborum id plurimū cōferat. Cœna vero prandio plenior sit sanis quidē & iuuenibus. Aegrotis autem, iis præsertim, q̄ nocturnis morbis & destillationib. laborāt, ac senibus, cœna prædio minor congruit, ut alias fusius mōstrauimus. Cœna præterea tunc maior ac largior sit, quando interstitii tantum ab ipsa ad somnū intercesserit, ut vapores a copiosiore indigesto cibo elati discutiantur atque dissentur: id n. quatuor horarum spatiū fuerit. Quod si minus, parciore cœna utendum. Si n. copiosior tū foret cœna, ob somnū imminētē caput multis vaporib. repletur, & animales spiritus lædent. Quum vero cōsuetudinis, q̄ naturæ loco habenda est, Diutius tolerare famem, ventriculum malis complet humorib. Plurimum igitur ad sanitatis cōseruationem cōfert, si legitimis hora & tempore, cibum assumatur. itz, n. cruditas, sanitatis corruptela, vitabitur. Contra vero, infirmum, morbosumq; ac Deo & hominib. odiosum corpus red: let assidua crapula, ciborūq; ac potuū ingestio, ut eo maiori studio nobis aduertendū sit, ne per sanitatem intempestive cibum ingeramus.
- F** magna vis sit, & ipsius hoc loco habenda ratio erit, dandaq; opera ut sentim, non subito, a praua cōsuetudine trāsferantur homines. Nō solum vero p̄ sanitatē, sed & per morbos cauendū erit, ne intempestive cibum assumatur. Siquidē in morborū accessionib. a cibo prorsus est abstinendū, q̄ hoc tpe natura circa morbi materiā occupata sit, ideoq; cibi oblatione, a suo munere haud auocanda. Hinc est, q̄ Hippoc. prudendissime dixerit: *In accessionib. a cibo abstinere oportet, siquidē cibū dare nocet. Et si per circuitus morbi accessiones habet* In accessionibus morborum a cibo prorsus abstinendū.

a. Aphor. 19. *in ipsis accessionibus cibum subtrahere oportet. Et paulo post: His quibus per circuitus accessiones sunt, nihil dandum, neq; ut quicquam assumant cogendi, sed adiectionibus ante iudicationem subtrahere cōuenit.* Idē ē faciendum esse alibi præcepit, inquit: *Quā vacuatione forbitiones exhibere volueris, observa febrū accessiones, ut neq; quā adsunt, neq; quum venturae sunt, eas ingeras sed quum iam finita sunt, aut quieverūt, & quum maxime a principio distare videntur.* Verum ne quis iā citatis Hippocratis locis motus, in omnib. accessionib. morborū a cibo esse abstinentiū existimet, adhibenda in febrium potissimum accessionib. distinctio erit, neq; n. quod diximus, in omnib. febribus, sed in quibusdā dūtaxat, observandū ērit. Quippe in earū febrū accessionib. q̄ ob plenitudinem, vel obstructionē, vel phlegmonem, vel humoris cuiusdā putredinē, excitant, cibus in accessione oblatus maximo malo est: adeo sane, ut ii quidem, quib. hac ratione febris accēditur, nec in inclinatione febris citra magnam noxā nutriantur, nedū ipsa accessione iā inuadēte. Quū vero excitatur febris, ppter mordentē acrimoniam excalescenti extenuatq; ex Sole, inedia, & laborib. succi, maximū eius remediū est, humidum nutritiū. Proinde sic laborantes, omni certo tpe, sed potissimū per inclinationes accessionum sunt nutriendi, ut ex p̄lixa & venusta quadā historia copiose admodum *lib. 10. Ther. meth. c. 3. & 5.* Galenus monstrat. Cur autē ægrotantes nonnulli interdum in ipsa accessione imo in accessionis inuasionē nutriendi sint, hæc est ratio. Quippe qui calido & sicco tēperamento, vel a primo statim ortu, vel certe illo tempore quo laborant, præditi sunt, iis vires necessario imbecilliores existūt. Neque n. fieri potest, ut abunde calidum & siccum corpus, quum febricitat, viribus sit valentib. ideoq; quum inuasura adhuc est, & quum incipit febris, cibandi sunt. Ut hoc nomine audacter nobis contemnenda sit diatriba, id est, *tridui inedia*: & æger, ubi idipsum vires postulant, protinus primo secundoque die, idque in accessione cibandus.

De cibis, qui temporibus anni congruunt. CAP. IX.

Hyemis victus. **I**n cibi potusq; ratione præscribenda, anni quatuor tpa, quæ Græcis *ἔτη* dicuntur, minime sunt negligenda, q̄ alii tibi Veri, alii Æstati, alii Autūno, & alii Hyemi conueniant. Hyeme namq; plurimam comedere, minimum bibere conducit. Cur autem hoc tempore plusq̄ aliis temporib. esse, minus autem bibere expediat, temperaturæ eius acceptum referendum erit. Frigida n. admodum, quum sit & humida, plurimos sanecibos exigit, & paucam potionem. Nam quum alimentum perpetuo cum nativo calore, a quo vnico cōficitur, sit cōparandum, & is hyeme sit plurimus, plurimum ēt alimentū, ut hoc tpe dandum sit, consequitur. Quod et confirmat Hippo. qui in Aphorismis ita inquit: *Ventres hyeme natura calidissimi sunt.* Quocirca hoc tempore alimenta copiosiora dari debent. Siq̄ dem innatum calorem copiosorem habent, plurib. igitur alimentis egent, parum autē bibendum q̄, tēpus hoc corp⁹ nostrum plurimum humectet. Ut edum autē p̄potu vino meracissimo, q̄ id calefacere & exticcare, adeoq; temporis excessui valde repugnare possit. Cibi itidem, tum sint calefacientes & exticcantes, nempe panis, carnes autē, pisces itē autē, brassica & id genus alii, a quib. corpus hoc tpe frigidū & humidum existens, calidum & siccum euadit. Vere autē iā inuenit paululum cibo demendū, q̄ aeris nos ambientis tum frigiditas nō sit tāta, quanta in hyeme fuit: adeoq; calor fere laxatur, & minus potest cōcoquere. Nā quum vernum tempus, p̄sertim in medio sui, sit tēperatum, paluatim ad eā mediocritatē ciborum, q̄ huic tpi cōueniens est, veniendū ērit. Hinc est, q̄ potioni et aliqd adiciendum sit & plus q̄ hyeme bibendum. Nam eadem ratione paulatim ad mediocritatē huic tpi congruentē transeundum erit. Ut perpetuo verū sit, *Subitas mutationes cauēdas esse.* Quapropter paulatim quoq; ab assis ad c̄. x. progrediendū. Magis vero carne, q̄ piscib. hoc tempore vescendum. Cum n. ver summo tempore, nempe hyemis & æstatis, in quorum medio versatur, mediā temperaturā habeat, ut suo monstratum est loco, mediam etiam victus rationē requirit. Non igitur verno tēpore, ut hyeme calefacientib. & exticcantib. cibis, nec refrigerantib. & humectantibus, ut ætate, utendum. Piscium vero alimentum esse frigidum & humidum, adeoq; verisimiliter aptū, nulli non constat. Carne igitur magis verno tempore, p̄sertim vitulorū & hœdi utendum. In summa, quū verno tempore corpus mediocriter sit affectum, atq; adeo temperatum, in eo sane statu, mediocri victu conseruandum erit. Quare hoc tēpore, quod Soranus etiam *c. 5. sua Isagoges* monuit, minime est ieiunandum, imo cum ventres, tum, ut Hippocrates attestatur, natura calidissimi sint, somniq; longissimi, plura alimenta

A menta sunt exhibenda. Si enim calorem innatum habent multum, igitur plurib. etiam alimentis egent. Ceterum æstate cibis magis demendum, potioni vero adiciendum. Æstatis victus. Quippe cū hoc tempore, utpote calido & sicco, corpus exuratur, squalidumq; euadat, multa sane portione, eaq; diluta eget. Cum autē plurimum caloris innati æstate dissipetur & exhalet, cibo etiam magis, quā Vere, demendū. Cibis etiam, non nisi elixis, ac frigidis vtendum, ac vnice studendum, ut a calore & siccitate corpus vindicemus, quod certe cōsequemur, si illud molle & frigidum reddemus. Per autumnum cibo paulo pleniore ac sicciore vtendum, minus tamen, sed meracius bibere conuenit. Nam paulatim a victu æstatis, in eum, qui autumnō conuenit, est veniendum. Paulo autem, quam in æstate, pleniore vtendum victu, quod iam caloris feruor remittatur, pauloq; validior nā- Autumni victus.

B rius calor fiat. Quod sane nomine minus etiam, sed meracius bibendū. Vt scil. paulatim ad id, quod meracissimum est, vinum, quale hyemi, ut dictum est, congruit, veniamus.

De cibis, qui ætatibus conueniunt. C A P. X.

Q Vemadmodum in cibo & potu, anni temporum habendam rationem ostendimus, ita quoq; ætatis aliquis in iis respectus esse debet. Quippe puerorum victum frigidum & humidum esse cōuenit, iuxta id Hippocratis: *Victus humidus omnibus febricitantib. prodest, maxime vero pueris.* Cum n. temperamento calidi sint pueri, adeoq; in cōfessio sit, illis plus caloris innati inesse, frigida victus ratione, præsertim q; ad potū attinet, ipsis vtendum erit. Vinū itaq; pueris inimicū est, q; scil. haustum, *Galeno lib. I. de tuen. sanit. c. 9. te- ste*, eos nimīū calefaciat, caputq; illorū halitu repleat. Proinde prudenter admodū Plato Puerorū victus. 1. Aph. 16.

C in 2. de legibus præcepit, ne pueri vsq; ad duodeuigesimum annum, omnino vinum gustarent. Eiusq; rei rationē mox subiungit, inquiens: *οὐ γὰρ πῦρ ἐστὶν πῦρ ὀφέλειον: non oportet ignem igni adicere.* Humidi vero cibi, illis duab. de causis competunt. Vna, quia quum in hac ætate corpus plurimum crescat, & augeatur, non oportet exsiccantib. cibis illud incrementum inhibere. Altera, quod puerorum substantia omnium facillime discutiatur: ut igitur humido alimento reparetur, est necessum. Puberum & adolescentiū ætas, quum Puberum & adolescentium victus.

D in optimo temperamento, ut suo monstrauius loco, consistat, victū plane similē, hoc est, temperamento mediū illis esse adhibēdum liquet. Temperamento autē medius est, qui neq; calidius, neq; frigidius, neq; humidius, neq; siccius ipsorum corpus efficit. Iuuenibus certe, quoniam impense calidi & sicci sunt, cōtraria, hoc est, frigida & humida Iuuenum victus.

B victus ratio cōfert. Vnde omnibus perspicuum euadit, quod neq; illis, etiam de sententia Platonis, vinum conueniat. Quippe furiosum horum habitum adauger, Platoni scribit Galenus loco paulo ante citato, vbi ait, *vinum iuuenes ad iram & libidinem præcipientes facere, & partem animi rationālē, hebetem turbidamq; reddere.* Vt hinc facile ratio reddi possit, cur nostra ætate, in hac veritatis luce, & disciplinarū omniū rectitudine, doctrinarumq; incrementis, pauci admodū iuuenes ad frugē perueniant. Quum n. ex æquo fere omnes vinū non modice, ut illos deceret, bibant, sed affatim ingerāt, in eoq; immodice hauriendo noctes diesq; cōsumant: quid mirū tā feroces reddi, ut a nemine coerceri queant? Sed nedū hoc vitiū illis cōciliat, vini immodici vsus: verum etiam ingenii vires, & animi vigorē enervat, ac hebetem reddit. Vt præclare luserit olim Eobanus noster iis versibus:

E Immodici sensus perturbat copia Bacchi:
Inde, quis enumeret, quot mala proueniant?
Corporis exhaurit succos, animique vigorem
Opprimat, ingenium strangulat atque necat.

Optarem autem vestibulo, ac singulis parietibus locorum, vbi studiosi habitāt, hos versiculos inscriptos esse. ita enim crebra horū lectione & inspectione forte fieret, ut ebrietatem, tanquam immanissimam bestiam, & certum illis exitium afferentem, euitarent. Senibus porro cibi & potus, qui solidas eorūdem partes frigidas & siccas iam factas, calefacere & humectare possunt, cōducit. Proinde calefacientes & humectantes maxime Senum victus.

F sane victus rationem senum quidam hoc etiam versu innuere voluit:

Vi lauit, sumpsitque cibum, dat membra sopori.

Paucos tñ cibos requirūt senes, ut Hippoc. quoq; attestatur inquiens: *Senes facillime ieiunium tolerant, secundo loco, qui constantē ætatem agūt, nullatenus adolescentes, omnium vero minime pueruli, præsertim illi, qui inter ipsos sunt alacriores.* Atq; eius rei rationem statim in sequenti

Aphorismo expreſſit, in eum ſcribens modum: *Quæ creſcunt corpora, plurimum caloris innati obtinent; itaq; plurimo alimento indigent, alioqui corpus abſumitur. Senibus vero parum caloris ineſt, propterea paucis alimentis indigent, ſiquidem a multis exſtinguitur.*

De potu. C A P. XI.

Cum abunde ſatis de cibo dictum ſit, reliquum eſt, vt de potu etiam nũc differamus.

Cum vero tria potus apud Germanos ſint præcipua genera, aqua nimirum, vinum, & cereuiſia, de ſingulis ordine, breuiter tñ, agemus. Qui itaq; per bonam valetudinem aquæ potu vt conſueuerunt, iis annitendum erit, vt aquam, non niſi optimã bibant. Optima vero eſt, *Galeno etiam lib. 1. de tuenda ſanitate, 6. 9. teſte*, quæ limpidiſſima, puriſſimaue, guſtuiq; non modo, verum etiam olfactui iucundiſſima, hoc eſt, quæ omni tum odoris, tũ ſaporis vitio carere, omniſq; qualitatſ expers eſſe videtur. Qualitatſ aut omniſ expers eſt, quæ nec falſedinis, nec amaritudinis, nec aciditatis, nec cœni, nec ſulphuris, in ſumma, nec alterius rei vllam ſignificationẽ præbet. Virtutes quoq; optimæ aquæ præcipuæ ſunt, ſi leuiſſima & tenuiſſima eſt, ſi hypochondria celeriter tranſit. Leuiſſima vero eſt, *Hippo. attẽſtante*, q̃ cito tũ incaleſcit, tũ refrigeratur. Quod ſi ad Orientem fons eius excurrit, & p̃ meatum aliquẽ mundum, aut puram terrã percolatur, omnes optimæ aquæ notas habebit, atq; hoc nomine, omni ætati vtiliſſimam eſſe, exiſtimandũ eſt. Non n. ſicuti vino, eſcis, exercitatione, vigiliis, ſomno, ac Venere, aliis alias vt pro ratione expedit, ita de aqua quoq; ſtatuendum eſt: ſed q̃ nũc optimam indicauimus, hac vt puero, iuueni, ſeni, conducet. Cõtra, vitioſa aqua erit, q̃ turbida, quæ ex ſtagnis & paludib. hauritur, q̃ male olet, quæ falſa eſt, deniq; in qua qualitas aliqua guſtu deprehẽditur, adeoq; potu inſuauiſ eſt, & quæ circa hypochondria heret, qualis eſt, cuius fons contra Septentrionẽ fluit, ſolemq; auerſum habet. Hæc igit̃ aqua peſſima eſt, q̃ in hypochondriis diutiffime moreſ, ægre concoquatur, fluctuationes excitet, in flatum mutetur, & corrumpatur, adeoq; ṽtriculi robur reſoluat. Ceterũ hominibus, q̃ feruentib. temperamentis, ſiue natura, ſiue ætate, præditi ſunt, aquæ potio vtilis eſt, quod Hippoc. quoq; in *Epidem.* confirmat. Quod ad vini rationẽ attinet, de eo in præſentia, non vt eſt medicamentum, ſed potius, vt eſt alimentum, agemus. Qua ratione conſideratũ, quintuplicem differentiam habebit. *Prima* in colore eſt poſita, quatenus nimirum album, fuluum, flauum, rubrum, nigrumue vinũ diciſ. *Alterâ* in ſapore, quatenus dulce, aũterũ, acidũ, acerbumq; eſt. *Tertiâ* in odore, quatenus iucundo, graui aut nullo odore eſt. *Quartâ* in conſiſtentia, quatenus tenue, & craſſum. *Quintâ* in ætate, quatenus ſcil. recens, aut vetuſtum exiſtit. Vinorum itaq; omniũ rubra, ſimul & craſſa ſanguini generando ſunt accõmodatiſſima, & q̃ minima egeant mutatione, vt ſanguis fiant. Poſt ipſa ſunt nigra, craſſaq; & dulcia, tũ q̃ colore quidẽ rubra ſunt & nigra, conſiſtentia vero craſſa, vna cũ adſtringendi qualitate. Hiſ aut minus ſua natura alunt, q̃ alba ſunt ſimul ac craſſa, & acerba: Omniũ aut minimum nutriunt, q̃ colore quidẽ ſunt alba, cõſiſtentia autem tenuia, & aquis hydromeliti faciendo appoſitis quodammodo ſimilia. Dulcia vero conſiciuntur in ṽtriculo, ac diſtribuuntur facilius, q̃ aũtera, vt quæ facultate ſunt calidiora. Quæ autem admodum ſunt craſſa, tardius quidem perficiuntur, ac diſtribuuntur: ſi tñ in ventriculum adeo robustum incidunt, vt cõfici recte ab eo poſſint, alimentũ copioſius corpori exhibebunt. Conſtat præterea, q̃ quemadmodũ hæc corpori alendo tenuib. ſunt præſtantiora, ita ad vrinam ciendã ſunt deteriora. Ceterũ vt bilioſis calidis tẽperamentis p̃ ſanitatẽ aquæ potio, de Hippoc. eſt ſententia, maxime conuenit: ita vinum, præſertim vinoſum, ob eſt. Summe autẽ calidis naturis abſolute potio aquæ confert. Aliis autẽ, q̃ ſumme calidæ nõ ſunt, vinũ dilutũ, aquoſumue & exiguum prodeſt, vt fuſus in fine *libri quinti de tuen. ſanit.* Gal. docet. Contra pituitoiſis ac frigidis temperamẽtis, crudorumq; humorũ magna vi preſſis, vinum maxime fuluum ac dulce, qualia ſunt ex noſtratib. Rhenenſia, conuenit. Viranda ſunt, q̃ nimis vetuſta, nimisue recẽtia: namq; illa præter modũ, hæc nullatenus, donec recẽtia fuerint, calefaciunt: q̃ vt aliquẽ vſum cibis cõcoquendis afferant, tñ ab eſt, vt ipſamet ſint difficilis concoctionis. Præterea nec cõmode p̃ aluum tranſeunt, nec digerunt, nec vrinã mouẽt, nec ſanguinis cõfectioni, nutritioni q; idonea ſunt. Muſtum ægre coquit, craſſumq; ſuccum & inflationes facit: aluum tñ mouet, idq; boni duntaxat in ſe habet, q̃ ſi interdum efficere non poteſt, mirum in modũ nocet. Quod ad tertium potionis genus, nempe cereuiſiam atinet, qua ad ſeptentrionem ſitæ gentes maxime

vtun.

Aqua o-
prima.

5. Aph. 26.

Aqua vi-
tioſa quæ.

Quibus
aquæ po-
tio con-
uenit.
6. Epide.
ſectio. 4.
Aphor. 13.
Vinorum
ratio.
Vinorum
in alendo
differen-
tia.

Quibus
vinum cõ-
ueniat, &
quib. non.
6. Epide.
ſectio. 4.
Aphor. 13.

Vetuſta.
Recẽtia.

Cereuiſia
ratio.

A vtuntur: sciendum quidem erit, hanc e tribus confici rebus, aqua, hordeo, & lupo salit-
tario: quarū priores duæ naturæ frigidæ, tertia vero calida existit. Dū vero conficitur, Cōfectio. Tempera-
mentum.
semper plus aquæ, quam hordei, & huius quidē plus quam lupi salitarii sumitur. Quale
autem sit cereuisiæ tēperamentum absolute, vix explicari potest: quod illius nō exigua
sit pro harum rerum, ex quibus conficitur, mistura, differentia. Possunt n. illa ita inter se
temperari, vt fere ex harum cōmitione temperata potio confletur, qualis est cereuisia
dulcis & perspicua. Cū vero magna ex parte in cereuisiis nō leuis sentiat, amaritudo,
non dubium est, has omnes esse temperamento calidas. Et quo quēis amarior, eo quo-
que calidior existit. Quare iis populis, qui Aquilonares regiones incolunt, potus est nō
ineptus. Præter autem nutriendi facultatem, quam ex hordeo aut tritico nanciscitur, et-
B iam medicamētosam facultatem ex lupo salitatio obtinet. Quapropter iis, qui ea mo-
dice vtuntur, vires corporis augeat. Quod verū esse, Septentrionalium locorum incolæ
abunde testantur, quos robustissimos esse constat. Nec ita facile, vt vinum, lædit neruos,
nec articulorū dolores, nec alia vitia, quæ vini portionem comitantur, creat. Medicamē-
tosam vim a lupulo vocato, habent omnes cereuisiæ admodum amaræ, adeo, vt urinā et
moneant, & aliquid bilis et per aluū educant. Quare si quis exacte de cereuisiarū facul-
tatibus pronunciare voluerit, is diligenter earundem cōsistentiam, & sapore cōsideret.

Facultas
cereuisiæ.

DE MOTV ET QUIETE SECT. III.

De exercitiorum generibus ac differentiis, CAP. I.

C **M**OTVS voce, hoc in loco, omnis generis exercitia intelligenda veniunt, Morus
quid.
quod ad motum ceu genus quoddam, omnes exercitiorum modi referēdi
sint. Exercitiorum autem veterib. multa ac varia fuerunt genera. Atq; eo-
rum quidem duo sunt præcipua. Quædam enim exercitia tm sunt, quædā
vero nō exercitia solum, sed & opera. Exercitia tantū sunt, lucta, pugillatus, pancration,
cursus. Luctam aut q Græcis πάλη dicitur, esse ludi genus, Exercitia
tantum.
*quum duo sese mutuo apprehenden-
tes ad terram nituntur affligere*, notius est, quam vt a me pluribus explicari debeat. Pugila-
tus Latinis, Græcis πυγμή, certaminis genus fuit, Lucta.
Pugillatus
*quod castibus, quibus aduersarium feriebant,
exercebatur*. Hinc Cic. lib. 2. Tusc. Pugiles castibus confusi ne ingemiscunt quidem. Et iterum:
Pigiles etiam quum feriunt aduersarium, in iactandis castibus ingemiscunt. Cæstus autem erat Cæstus.
claua, habens pilas plumbeas loris bubulis appensas, aut certe bubulis pellibus infutas.
quod lib. 5. Aeneidos Vergilius iis innuere videtur versibus:

Sic deinde locutus.

*In medium geminos immani pondere cæstus
Proiecit, quibus acer Eryx in preliis fuctus
Ferre manum, duroque intendere brachia tergo:
Obstupere animi, tantorum ingentia septem
Terga bouum, plumbeo infuso, ferroque rigeant.*

Pancration certaminis genus fuit, quod omnibus corporis aduocatis & intentis virib. Pancra-
tion.
omniumq; neruorum contentione transigebatur. A πᾶν quod omne, & κρῆτος, q; robur

E significat. Vnde παγκρῆσις a manibus pedibusq; quasi totius corporis conatu, omnibus-
que virib. connixi certabant. Ita Suidas & Phauorinus παγκρῆσις lū interpretatur τῶν χειρῶν παγρη-
καὶ ποδῶν πινδύμαχοντα: id est, *manibus & pedibus in pugilatu pugnantes*. Lucianus in Anaharce, τις αἱ.
παγκρῆσις, inquit, τὸ πᾶν ἀλλήλους ὀρθοτάδων: hoc est, *ferire vicissim stando in erectum*, id est, *quū
alter cum altero luctabant erectis pedum digitis*. In quo sane certaminis genere omnibus cor-
poris virib. opus fuit. Vt hinc omnib. palam fiat, Hermolaum Barbarū & Volaterranū, Hermo-
lai Barba-
ri & Volae-
terani ex-
tor.
viros alioqui doctissimos, nō recte Pancratia stē interpretari pro eo, qui quinq; generib.
nempe saltu, cursu, disco, iaculo, & lucta certauit, & vicit. Et sic quidem opinātes carpit
etiā Nicephorus Gregorias, Synesii in libellum de insomniis interpres: ὁλυμπιακὸς ἀγῶνας

F πᾶντε φασὶ, πυγμῶν, πάλης, ὀρθῶν, ἀλόντων, & δίσκων. τὸ μέντοι παγκρῆσις ποῦ ἐστὶν πᾶν, σύνδεσιν γὰρ ἐν πυγμῆς καὶ
πάλης lū: id est, *Olympiaca certamina quinque esse ait, pugilatum, luctam, cursum, iaculum, & di-
scum*. Ceterum pancratium diuersum quidpiam erat. Compositum enim ex pugilatu &
lucta erat. Plurarchus etiam sympos. β. Pancration ex pugilatu & lucta mistum fuisse te-
statur. Aristotel. quoque libr. 1. Rhetoric. cap. 5. idem confirmat iis quidem verbis: Ἀγωνιστικὴ
δὲ σῶμα αἰσθῆσις οὐ γκρίνται, ἐν μεγέθει καὶ ἰσχύϊ καὶ τάχει. καὶ γὰρ ὁ ταχὺς ἰσχυρὸς ἐστίν. ὁ γὰρ δυναμικὸς τὰ σέλη
ῖπτιν πᾶς καὶ κινεῖν ταχὺ, καὶ πόρρω, ὀρμηκός. ὁ δὲ δλίβεν καὶ κατέχειν, παλαιστής. ὁ δὲ ὅπου τῇ πληγῇ, πλῆκτικός.

ὁ δ' ἀμφοτέρω τούτοις παγκρατικός, ὁ δὲ πᾶσι τούτοις πένταθλος: hoc est, *Certatoria corporis vis magnitudine, robore, & celeritate constat. Celer namq; robustus est. Qui vero crura proicere quodammodo, & celeriter longeq; potest, cursor. Qui premere ac retinere, luctator. Qui vero pulsando plagis inferendis propulsare, percussor. Qui utrisq; valet, pancratiasticus. Qui omnibus iis, pentathlonus.* Hæc Aristotelis verba adiciere placuit, quod prioribus lucem non exiguam afferant, & doceant pugilatum esse, quum quis plagas, tum cæstibus, tum pugnis infert. Præteriam dicta exercitia sunt Græcis ἀκροχαισμός, ἐκπλεθεισμός, πτυλισμός, σκιομαχία, *salus, disci iactus, follis, pile vel parua, vel magna, & corpus per alteres fatigare.* ἀκροχαισμός exercitii genus est, vbi quis cum altero circa complexum, vel omnino summis manib. certat, & pugnat. ἐκπλεθεισμός, cum in Plethro, id est, in sexta stadii parte, quæ est cubitorum sexaginta octo, quis prorsum retrorsumq; vicissim, idq; sæpe in vtrunq; partem sine flexu cursitans, vnoquoque cursu breue quiddam de spatio demit, quoad deniq; in vnico vestigio constiterit. πτυλισμός, vbi quis summis pedib. ingrediens, tenfas in sublime manus, hæc antrorsum, illam retrorsum, celerrime mouet. σκιομαχία non est, nisi vmbra armorum meditatio: Sic dicta, quod sub tecto & in vmbra pugne simulachra fingeantur, quum vera pugna in sole & puluere peragebatur. *Discus* autem lapis est rotundus, quem exercitaturi accipientes in longum, atq; in auras proiciunt. *Follis* vero, qui Græcis κορυκός dicitur, pilæ genus est, ex pelle factæ & vento inflatæ. Hæc etsi reliquis crassior est, tamē non admodū grauis. Hoc in loco me præter omne meum meritū, pungit Franciscus Valleriola, q̃ instrumentū ad ludendum aptum, Galeno, aliisq; Græcis κορυκός dictum, idem esse cū eo, quod *follem* Latini appellant, existimem. Cōstanter n. affirmare audet, Galenum *corycum* a *folle*, quoties amborum mentio incidit, perpetuo discriminare. Verū initio quidē a Valleriola maiorem in modum peto, vnum mihi ex omnib. Galeni monumētis proferat locum, vbi ille vtriusq; instrumenti, coryci scilicet & follis, seorsim mētionem faciat, illaq; inter se differre dicat: & si diuersa sint, quo tandem nomine ipse *follem* Latinis nominatum, lusoriū instrumentum appellauerit. Atqui sat scio, ipsum neutrū præstare posse, quandoquidem quod Latini *follem* nuncupant, id Græcis sit *corycus*, nec vllō vsquam in loco Galenus hæc duo ab inuicē distinxerit. Quod enim Valleriola, pro erroneæ suæ opinionis confirmatione duos ex lib. 2. de *Tuen. Janitate*, Galeni locos adducit, nostræ sententiæ ne tantillum officit, quod in illis corycū non a folle, sed tātum a pila parua diuersum faciat. In primo namq; loco Galen⁹ sic ait: καὶ δὲ κορυκὸς, καὶ δὲ τῆς σφαίρας μικρῆς. Quæ verba metipse Valleriola sic vertit: *Tum coryco, tum pila parua.* In altero autem ita inquit: καὶ τὸ δὲ τῷ κορυκῷ τὴν καὶ τῆς σφαίρας μικρῆς ὁμοίαν: hoc est, eodem Valleriola interprete: *Tumq; per corycum, & parua pilam exercitatio.* Vt ex vtroq; iam citato loco luce meridiana clarius sit, Galenum corycū non a folle, sed a pila duntaxat parua, de qua peculiarem cōscripsit librū, discriminasse: id quod, inuitus licet, Valleriola etiam fatetur, iis quidem verbis: *An non, ait, conceptis explicatisq; verbis, coryci exercitationem, ab ea, qua pila parua perficitur, distinguit Galenus, quū duas faciat & coryci, & pila lusoria exercitationes?* Non est igitur vt productis ab eo duobus Galeni locis, nostram sententiam confurauerit. Verum, quia parum, imo nihil plane iam dictis locis effecerat, ideo mox ad aliam se confert rationem, hanc nimirū: *Follis pila genus est, corycus vero, vt Hesychius, & Phauorinus suis in dictionariis aperte testantur, non pila genus sit, sed vter, vel sacculus, aut pera ex pelle, coriæ confectus.* Iam dictorum auctorum testimonia mox subiicit, quæ referre nihil attinet, quod ei lubens concedam, corycum Græcis quoque tum vtrem, tum sacculū significare. Sed mox instat inquit: *Si igitur corycus instrumentum est quoddam, instar peræ, aut marsupii, vtriusue conformatum, constat profecto corycum follem non esse, quum follis sphaericus sit: vter autem, vel marsupium, oblonga.* Mirari autem subit, qua fronte Valleriola omnem vtrem, omneq; marsupium oblonga esse dicere audeat, quum experientia vtrunq; esse falsum testetur. Constat n. vtriculariorū vtres esse rotundos, multa q; hodie inueniri exquisite rotunda marsupia. Sed demus & vtrem & marsupium omne esse oblongū, nihilominus tamē per similitudinē Græcis follē etiam, κορυκόν nominare licuit, quod ille ex pelle, instar vtris & marsupii, conficiatur. Atq; hinc est, q̃ veteres follē, pellem & vtrē, vt infra plenius dicetur, appellarint. κορυκόν aut Græcis significare etiam follem, hoc est, vt Valleriola et exponit, pilā vento inflatam, aereq; incluso turgidam, & non tantū vtrem coriaceum, atq; marsupium, hinc maxime constat, quod κορυκόν vocarint omne id, q̃ ab aere aut vento incluso inflatur, turgēt, attollitur, & auge-

Acroch-
nismus.
Ecplethri-
smus.

Ptylic-
mus.
Scioma-
chia.
Discus.
Follis.

Francisci
Vallerio-
læ deco-
ryco opi-
nio falsa
reiecta &
explosa.

- A** rur, a verbo *κορύσσειν*, quod attolli denotat. Iam dictis accedit, quod Latini omnes interpretes, & ii quidem doctissimi, *κορυκόν* follem interpretati sunt. Vt omnib. iam palam sit, Valleriolam me falso erroris insinulasse, quū ipse potius a Cælio Rhodigino in errorem deductus sit, qui *lib. 11. antiquarum lectionum, c. 6.* ita scriptum reliquit, *Corycum aliqui intelligunt follem.* Exstat verbū apud Gal. quoq; *lib. sanit. Tuend. 2.* Verum a folle disparare videtur & pila: sic enim scribit: *Tum corico, folle, pila.* E quibus sane Cælii verbis cōspicuum omnibus sit, ipsum nulla alia de causa in falsam hanc venisse opinionem, quam quod putarit Galenum a folle & pila corycum distinxisse. Igitur in eum errorem nullo alio nomine lapsus est, quam quod illam sententiam non ex Græcis Galeni verbis, quod facere debuerat, sed ex Latina Linacri interpretis conuersione, a typographo deprauata, collegerit, utpote in qua corycū manifeste a folle, ut Cælii verbo utar, disparatur: quum Græce sit, *ἡ διὰ κορύκην, ἡ διὰ σφαίρας μικρᾶς*: id est, *tum corico, tum pila parua.* Linacri igitur interpretatio legitima sic habuit: *Tum coryco, hoc est, folle, tum parua pila.* Arque sic olim nos etiam in nostris super citatum Galeni librum annotationibus locum hunc emendauimus. Igitur ex iam dicto Cælii loco, Valleriola suam de coryci & follis differentia absurdam, & ex diametro a veritate aberrantem, hausit opinionem. Vt autē sole clarius meridiano nemo non intelligat, utrunque, Cælium nimirum & Valleriolā, turpiter lapsum & hallucinarum fuisse, non pigebit nos follis & pilæ rationem copiosius explicare. Pila quidem ludi genere magni & graues viri impendio olim delectati sunt. Siquidē Augustus, *ut in eius vita auctor est Suetonius*, post ciuilia bella exercitationibus campestribus, eorumq; & armorum dimissis, ad pilam primo, folliculumq; transit. Scæuola insuper optime pila lusit, atq; ad hoc diuerticulum, animum forensibus negotiis fatigatū, transferre solitus est. Pilarum autē veteribus, q̄ e Martiale omnibus liquet, quatuor fuerunt genera. Prima, dicta est trigonalis, a trigone loco thermarū, q̄ ad huiusmodi pilæ vsum ædificatus fuit, paruoq; calore tepidus per hyemē teneri solitus est, ne exuti ad ludendum homines, statim frigus conciperent, & rigore concuterentur, neue ludendo exerciti nimis æstuarēt. Locus igitur hic Græcis *τρίγων*, a triquetra, hoc est, triāgulari figura, quam Græci *τρίγωνον* vocant, dictus, pilæ huic, quod in eo iactaretur, atque illa ludere illic solebant nomen dedit. Hæc ad vnum mittebatur angulum, ita ut utrunq; e parietem contingeret, reddebaturque non minus sinistra quam dextra manu, miramque corporis agilitatem requirebat. De loco Mart. ita *lib. 14.* canit:

Qui lentum ceroma teris, tepidumque trigona.

Et rursus *lib. 12.*

Captabat tepidum dextra, leuaque trigonem,

Imputet exceptas ut tibi saepe pilas.

Et *lib. 14.* de pila trigonali:

Si me nobilibus scis expulsare sinistris,

Sum tua: si nescis, rustice, redde pilam.

- Porro pila hæc omnium minima erat, prædura, firmo pilo plena, a quo nomen habet. Atq; hanc esse arbitror, quam Galenus *σφαίραν μικρᾶν*, id est, pilam parua, alii palinarem, nominat, q̄ reliquæ omnes ea sint maiores. Eius mentionē facit *lib. 2. de sanit. Tuend. c. 10.* Vbi tamē perperā legit *ἡ διὰ κορύκην, ἡ διὰ σφαίρας ἢ μικρᾶς, ἢ μεγάλης*, pro *σφαίρας μικρᾶς* tantū. Quæ ex alio eiusdē ibidem loco sit manifestum, vbi tantū parua pilæ mentio fit, iis quidē verbis: *ἡ διὰ τὸ κορύκην τὴν σφαίραν μικρᾶν*, omissa penitus magnæ pilæ commemoratione, Et quid opus fuisset Galeno magnæ pilæ meminisse, quum *κορύκην*, quæ non est nisi magna pila, antea mentionem fecerit? Quinetiā Paul. Ægineta *lib. 1. c. 17.* vbi ad verbū Gal. sententiā descripsit, *μεγάλης* vocē penitus omisit, inquiens: *ἡ διὰ κορύκην τὴν σφαίραν μικρᾶν*. Accedit, quod Gal. peculiarem librum ediderit, de exercitio parua pilæ inscriptum, ut eam omnibus aliis maiorib; anteferreret, veluti eam quæ vniuersas corporis partes exerceat: Siquidē illa, ut in eo libello metipse scriptū reliquit, crura, brachia, cervicem, caput, oculos, dorsum, lumbos, & omne ex equo corpus cōmode exercet, & animum voluptate mira afficit, vegetumq; & alacré reddit, ut fusius in libello nominato, legētes cognoscere possunt. Quo sane nomine factū est, ut veteres viri p̄stantissimi, hoc genere ludi vñce delectati sint. Altera pila, paganica nominata est, a pagis, hoc est, vi-

Cælii Rhodigini lapsus.

Pila quid.

Parag. 39.

Pilarū genera quatuor. 1. Trigonalis.

Pila parua Galeni. Palmaris pila.

Parua pila commoda.

2. Paganica.

lis, quod pagani ea vterentur. Hæc crassior, laxiorque, & pluma plena fuit, nec ad vsum tam agilis, ut quæ nec tam lenis est, nec iactata facile resilit. De qua quidem Mart. lib. 14, ita scriptum reliquit:

*Hæc qua difficilis turget paganica pluma,
Folle minus laxa est, & minus arcta pila.*

3. Follis.

Pila pugilator.

Folliculus

Quasi diceret, est laxior quàm pila trigonalis, & arctior firmitiorque quàm follis. Tertia pila, Græcis κορυμβός, follis Latinis dicitur. Hæc ex pelle siue aluta fit, spirituque ac vento inflatur, ceteris crassior, imo omnium maxima, atqui non multo grauior. A flatu nomen apud Latinos habet, quia spiritu ventoue ac flatu, ut dictum est, impletur: siue quod follem veteres pellem appellabant, & per diminutium folliculum, & virem. Nihil enim aliud est, quam pōllis vterue flatu impletus. Hoc pilæ genere ludentes, minus fatigantur, ideoque imbecilliori ætati conuenit, quod Mart. lib. 14. maxime confirmat:

*Ite procul iuuenes, mitis mihi conuenit ætas.
Folle decet pueros ludere, folle senes.*

Follis pugilatorius.

Folliculus

Folliculus

Agitatus follis lætius fert, magisq; resilit, ac tardius descendit, veluti ex industria percussorem expectans. Quoniam vero hoc pilæ genus pugno excutitur, follis pugilatorius quandoque nominatur, ut a Plauto in Rudente: *Ex templo hercle ego te follem pugilatorium faciam, & penditem incurfabo pugnâ periturissime.* Ceterum veteres Græci saccos ex corio factos, & item Marsupia, utrelque expelle confectos κορυμβός, quemadmodum Latini folles, appellarunt, quod hæc omnia instar pilæ vento inflatæ, follisue, ex pelle coriue consistant, & si re aliqua impleantur, tumeant & turgescant. Ut mirati subeatrum Cœlium, tum Valleriolam, cur affirmare audeant, κορυμβός & follem esse res diuersas, quum κορυμβός Græcis, & follis Latinis proprie hoc tertium pilæ genus, de quo hic agimus, significet, adeoque inter se non differant, ut iam a nobis ostensum est. Reliqua vero, similitudine potius quadam ab ea pila sumta, κορυμβός & follis vel folliculi nomen acceperant. Porro, ne id silentio inuoluamus, Hipp. lib. 2. de Dieta, exercitii eius, quod διακορυμβός, id est, per follem fit, meminit, & κορυμβόμαχίαν nominat. Siquidem κορυμβός & κορυμβός Græcis pila illa appellatur. Sed præstat verba Hipp. de hoc exercitii genere subiicere. ἀεὶ χειρὶν ἐν ἰσχυρίσιν, καὶ τὰς σαρκὰς ἐλκύνειν, καὶ κορυμβόμαχιν, καὶ χειρὶν ἐν τῷ πλάγιον ἀπὸ πλάγιον. Hoc est: *Summis manibus concertatio atenuat, & carnes sursum trahit. Follis lusum exercitatio, & manuum adrythmum motio: siue gesticulatio, similia faciunt.* Quid multis opus est verbis? κορυμβός, siue κορυμβός Græcis, & follis Latinis, pila fuit magna, vento plena, & leuis, quam veteres exercitii gratia per aera varie, & alternis exagitabant, modo recta altum, modo oblique & in transuersum. Eo ludi genere hodie etiamnum nō solum in Italia, & Gallia, verum etiam in aliquor Germaniæ locis, Norinbergæ potissimum, vtuntur. Quarta pila est, quam Harpastum, a verbo ἀρπάζω, quod rapio significat, eo quod plures proiectum harpastum conentur arripere, & extra ludi limites eiicere, nominant. Nam hoc pilæ genus non repercutitur, sed quum multi ludentes, in duas partes diuisi sint, ita ut vtri que e regione sibi inuicem opponantur, quisque annititur pilam arripere, & ad suos, qui post se sunt viciniore, limitib. transmittere: eiusque partis victoria est, quæ pilam extra limites eiecerit. Laboriosum genus ludi est, grandioribusque tantū conueniens. Siquidem sæpe in terram decidit pila: ad quam cateruatim accurrentes, se inuicem prosternunt, puluere ac sudore infecti flauescunt: Vnde hoc Martialis 14.

*Seu lentum ceroma terit, tepidamque trigona,
Siue harpasta manu puluerulenta rapis.*

Et rursus: *Nec rapis Antei velox in puluere Draucus,
Grandia qui vano colla labore facis.*

E panno fere fit hæc pila, aliquādo etiam ex pelle, lana tomentoue implet. Talis est, qua nostri maxima ex parte hodie ludunt. Alio nomine φανίδα, Cælio lib. 20. cap. 14. teste, appellant, a Phenestio eius inuētore: vel a verbo φανίζω, quod decipio sonat. Fit enim in hoc ludo, ut quum alteri sæpe ostendant, se velle pilam proiicere, alteri tamen iaciant ad decipiendum aduersarium. Sed, ut hoc etiam prædictis addamus, pila hæc, maior est paganica, & quam follis tenuior. Hæc quidem a nobis copiosius sunt dicta, ut non solum nos ab iniusta Valleriolæ reprehensione assereremus, sed etiam ut vefam & legitimum rationem pilæ, quæ veteribus vstitutissima fuit, quæq; pila, quam Galenus par-

A uam nominauit, fuerit, indicaremus. Digressi igitur longius, ad aliorum quæ restât exercitiorû explanationē redeam⁹. Ceterû alteres massæ & moles lapideæ, aut plumbeæ, aut ex aliis metallis conflatæ fuerûnt, ita prorsus efformatæ, vt manuû digitis insertis cōmode leuari possent. Fuitque harum geminus vsus. Vnus, quum summis manibus, vitæque tamen scorsum, apprehenso altero, porrectis iis, aut in sublime erectis, eodem habitu persistebant. Alter vsus apud saltantes erat, qui illos in gymnasio circumferentes saltabant, vt maiore nixu corpus in longiora spatia saltu proiicerent, vt alibi fufius diximus. Gymnasium autem fuisse locum in publica aliqua vrbs regione exstructum, quo vngendi, fricandi, luctaturi, discum iacturi, aut tale quippiam facturi confluxerunt, notius est fere, quam vt hic dici debeat. Porro exercitia simul & opera sunt, quæ exercendo opus relinquunt: vt quum quis fodit, remigat, arat, vites putat, onus gestat. me tit, equitat, armatus pugnat, iter facit, venatur, piscatur, & id genus alia in vita vsus causa exercet. Est & vociferatio *thoracis & vocalium instrumentorum exercitium*. Venatio principum propria, exercitatio esse solet, quam mirificis laudibus Xenophon extulit. Exercitiorum generibus gestatio quoque annumeratur, cuius quidem mirum modum Asclepiades exhibuit. Is enim, vt lib. 26. cap. 3. Plinius auctor est, supra nauiculatorum, lecticarum, ac curruum vectationem, lectum pensilem excogitauit, cuius iactu aut morbos extenuare, aut somnos allicere conabatur. Atq; hæc fere fuere apud veteres, quantum e Galeni scriptis colligi potest, exercitiorum genera: e quibus nonnulla vsque ad nostra tempora durarunt. Differunt autem inter se, quod quædam sunt velocia, in quibus scilicet est mouendi celeritas: quædam tarda, in quibus est mouendi tarditas: quædam valentia, vel, vt *Græci vocant* *ἐντονα*, quæ nimirum violenter robusteue citra velocitatem fiunt: alia imbecillia, quæ iam dictis plane contraria sunt: alia vehemētia, Græcis *ἐποδὲς* vocata, quæ violenter & cum celeritate exercentur: alia lenia, mitiaue, iis contraria. Exempla singulorum refert Gal. lib. 2. de Tuend. valer. c. 11. ad quem locum, ne in imensum excrescat caput, lectorem ablegamus.

Gymnasia

Exercitia & opera.

Vociferatio.
Gestatio.

Differentiæ exercitiorum.
Velox.
Tardum.
Valentia.
Imbecillia.
Vehemētia.
Lenia.

Quis sit exercitiorum vsus. CAP. II.

E Xercitiorum sane. qui sanitatis studio tenentur, præcipuam curam habere debent, quod illorum, modo quis ipsis recte vtatur, maxima sit comoditas, vt contra, temere neglectorum, summa incommoditas. Quod innuere volens Hipp. dixit: *ὁ μὲν οὖν ὑγιᾶς, ὁ ἐν τῷ νόσῳ*: Sanitatis studiū est, impigrum esse ad labores. Et Gal lib. 2. de Sanit. tuem. Sanitatis, inquit, tutela, a labore auspicianda est. Libro præterea de boni & mali succi cibis: Ad sanitatem tuendam, ait, *maximum quidem malum est, omnimoda corporis quies, perinde atq; maximum est bonum, motio moderata, hoc est, si corpora moderate exerceantur*. Tria vero potissimū sunt cōmoda, quæ corpora se se exercitando consequuntur, nempe instrumentorum ex mutuo ipsorum attritu durities, insiti caloris augmentum, & spiritus citatior vehementiorq; motus. Sequuntur vero hæc, reliqua etiam particulatim commoda. Instrumentorum quidē duritiem, tum vt minus ex labore afficiantur, tum ad actiones robur. Caloris autē augmentum, tum deducendorum in corpus validus attractus, tum immutatio magis expedita, tum nutritio magis felix, tum singularum corporis partium fusio, cuius beneficio solida mollescere, humida tenuari, meatusq; laxiores fieri accidit. At ob spiritus valentio rem impetum motumq; expurgari meatus necesse est, & excrementa expelli. Priuatim vrobustæ ac violētæ exercitationes, musculos & nervos validiores reddunt. Aliæ quoq; brachia, aliæ spinæ totam, aut pulmonē tantum, aut thoracem tantum, aliæ lumbos, aliæ crura magis exercēt. Quippe acrochirismi & sciamachiz brachiorum & manuû ppria sunt. Rectas spinæ partes magis exercent, qui depositis ante se alteribus vlnæ interuallo distantibus, postea medii ipsi stantes, inclinant se atq; attollunt, dextra quidē eum, qui ad sinistram iacet: sinistra, qui ad dextram: tum rursus vtrunq; in suū locū referunt. Transuersas, qui hoc identidem deinceps faciunt, iisdē vestigiis insistentes. Thoracis vero & pulmonis maxime respirationes pprie exercitationes sunt. Vociferatio quoq; supra has addit, q̄ vocis instrumenta pmouet, adeoq; asthmaticis, necnō nisi recta ceruice spirantibus cōfert. Lumborū exercitatio est, assidue se inclinare, ac rursus erigere, idq; aut pōd⁹ aliq; a terra tollētes, aut assidue in manib. sustinentes. Iratio aut cursusq; crurū exercitationes sunt. Ceterû gestatio maxime iis, q̄ ex diuturno morbo cōualescunt, & vires recolligunt, confert. Somnū irē allicit, multiq; aliis morbis, vt lib 3. c. 6. Aet. monstrat, auxiliat. Equitationis, q̄ inter gestationis species numerat, vsus modic⁹ est in egris. Habet

Exercitiorum tria præcipua commoda.

Singularū partū exercitationes.

Vociferationis vsus.

Gestationis vsus.
Equitatio.

ramen aliquid utilitatis in valentibus. Supra enim alia exercitia stomachum, & intestina, *Celfo lib. 4. cap. 19. teste*, mirifice confirmat.

De Præparatione ad exercitationes. CAP. III.

Corpus ante exercitationes ab excrementis vacuum. Præparatio frictio.

Frictionis differentie. Dura. Mollis. Mediocris.

Ligare. Soluere.

Multa. Pauca.

Mediocris.

Galenus de Tuenda sanitate accurate legendus.

Porro cum exercitatio ipsa prædicta commoda haud præstet, nisi quis sese ad eas recte præparet, & legitimo tempore ea utatur, principio cur præparatione opus sit, & qualis hæc esse debeat, dicemus. Sciendum itaque, si quis protinus ad valentiores motus exercitationesque accedat, priusquam totum corpus molliatur, & excrementa extenuentur, & exigui meatus laxentur, metus est solidarum quampiam ruptum, aut couulsum iri. Timendum præterea est, ne excrementa spiritus impetu impulsæ, prædictos meatus obturent. Ut ergo hæc fiant, oportet linteolo totum corpus mediocriter fricando prius calefacere, mox oleo fricare. Neque enim protinus ad oleum accedendum, aut videlicet quam cutis incaluerit, & meatus laxentur. Ei rei satis omnino sunt pauci manuû circumactus, qui nullo cōpressu sint graues & mediocriter celeres, huc demum directi, ut corpus citra compressum calefaciant. Siquidem peractis iis cernere licebit floridum ruborem per totam diffundi cutem. Tum igitur oleum inducendum, & nudis manibus, quæ medium inter mollem durumque modum seruant, infricandum. In præparatoria namque ante exercitationem frictione, quæ huc spectat, ut corpus molliat, mollis duræque mediam qualitatem dominari oportet. Quod, ut rectius intelligatur, animaduertendum triplicem esse frictionem, duram, mollem, & mediocrem. *Dura* est, quæ corpus cogit atque constringit. *Mollis*, quæ idem laxat & soluit. *Mediocris*, quæ in qualitate carnem non alterat, sed plane duræ ac mollis medium modum seruat. Id quod Hipp. *lib. 3. 197. iatpñov*, hoc est, *de Medici officio, tex. 26.* iis verbis significauit: *Dura frictione*, ait, *corpus ligatur: molli vero soluitur*. Ligare enim Hippocrati idem, quod coactum reddere ac constringere: quemadmodum soluere, molle reddere, & laxare denotat. Harum certe frictionum quæuis trifariam dicitur. Est enim dura, pauca, multa, mediocris. Mollis, pauca, multa, mediocris: Mediocris, pauca, multa, mediocris: ut sint in vniuersum frictionis differentiæ novem, Multa vero frictio extenuat ac minuit. Pauca, nec auget, nec minuit carnem, nec omnino quid euident efficit, sed parum duntaxat calefacit. Mediocris augendi vim obtinet. Proinde quæ supra modum exsoluta sunt corpora, frictione dura: quæ contra adstricta, molli fricanda sunt. Si vero æqualiter habeant, palam est, quod neque molliter, neque duræ, sed quantum eius fieri potest, utroque excessu vitato. Atqui de exquisita ratione frictionis, nemo Gal. *lib. 2. de tuenda sanitate*, diligentius scripsit: ut igitur illum accurato studio legant, medicinæ initiatos, hortor. Etsi autem frictio desuetudine abolita est, tamen veteribus, senibus potissimum, & qui sedentariam vitam debebant, vstitutissima fuit. Maximam vero quum offerat utilitatem, optatum utique esset, ut in nostros usus reuocari posset. Ceterum qui exquisitam hanc, quæ per frictiones fit, præparandi rationem usurpare recusant, quod in Germanis solenne est, id id saltim præstare debent, ut ante exercitia vniuersum corpus, singulasque eiusdem partes, eas præsertim, quæ vacuandis superuacuis destinatæ sunt, ab excrementis repurgent: ita enim cauebunt, ne excrementa, spiritus impetu impulsæ, cutis meatus obturēt, aut ab internis in omnes animalis partes rapiantur. Sed de præparatione ad exercitationes satis.

De Tempore exercitationis. CAP. IV.

Tempus exercitii.

Si quis exercitationis commoda consequi velit, huic necesse est, ut ea legitimo utatur tempore. Nam cum distributionem in corpus adiuvet, non debet quando administratur, crudorum & non coctorum aut ciborum, aut humorum multitudo, vel in venis, vel in vasis contineri. Periculum enim est, ne priusquam per maturam concoctionem utiles fiant, in omnes animalis partes rapiantur. Quoniam vero exiguos meatus expurgat, & excrementa expellit, vtilius ac melius est, ut ante cibos adhibeatur. Nā si a cibo corpus labore exagites, crudis omnino implebis humoribus. Distribuitur enim cibum ex ventriculo antequam concoquatur. Non est etiam exercitatio ad eunda, nisi expulsis prius excrementis, quæ vel in vesica, vel in feriore aluo continentur. Verendum namque est, ne quid ex iis in habitum corporis, vi caloris, qui per exercitationem accenditur, rapiatur. Igitur ad exercitationem optimum tempus est, quum hesternus

cibus

- A** cibus fuerit tum in ventriculo, tum in vasis perfecte concoctus, ac probe elaboratus, atque iam denuo cibandi tempus institerit. Quod si vero aut prius, aut posterius exercitatione usus fueris, aut crudis humoribus corpus impleueris, aut flauæ bilis prouentum in eo auxeris. Quare Germanorum nostrorum scholasticorum mos reprehensione dignissimus est, qui nunquam se, nisi statim a cibo sumto exercitare solent, aut salientes, aut currentes, aut pilam excutientes, aut discum proicientes, & id genus alia exercitia obeuntes. Vt nihil mirum sit, cum hac ratione magnam crudorum humorum copiam accumulunt, illos perpetua scabie, aliisque morbis, e vitiosis humoribus natis, confictari. Idem enim illis accidit, quod euenire solet iis, qui in cacochymia & humorum vitio se exercitant. Nam & iis ad cutem euocatur malorum humorum copia, vnde vlcera & scabies procreantur, iuxta illud Hippocratis: *Si impurgatus laborauerit, vlcera erumpent.* Præstaret itaque eos non vulgi opinionem, sed Medicorum potius præcepta, & diuini Hippocratis consilium, veluti, oraculum quoddam, sequi ac obseruare, qui in Epidemiis ita scriptum reliquit: *Προϊν τῶν ἡμετέρων: Labores cibus antecedant.* per labores non nisi exercitia intelligens. Sed sanitatis tutelam a labore esse auspicandam, quem excipere debent cibus, potio, deinde somnus, mox Venus, in iis videlicet, quibus Venere est vtendum, eodem etiam in libro significauit iis verbis: *Labor, cibus, potio, somnus, Venus, omnia mediocria.* Quibus certe verbis non solum tempus, ipso nimirum sermonis ordine, sed & modum ipsum, addito ad finem dictionis epitheto, *mediocria definiuit*, de quo sequenti mox capite dicemus. Vt autem corporis, ita quoque animi exercitia tempestiua esse debent. Intempestiua enim studia incredibiliter valetudinem frangunt, ac labefactant. Aur ora itaque studiis amica est, & horæ antemeridianæ omnes, & ex pomeridianis tres, aut summum quatuor, quæ eæ nam antecedunt, feriis studiis dandæ sunt. Qui nocturnis lucubrationibus impallescent, ac se macerant, ii & corporis & ingenii vires breui enervant.

Scholasticorum Germanorum mos reprehensus.

6. Epid. sectio. 5. Aph. 33.

6. Epidem. sectio. 4. Aphor. ult.

sectio. 6. Aphor. 5.

Studiorum tempus.

Quæ exercitationis mensura. CAP. V.

- E**xcitationi esse adhibendam mensuram, ex paulo ante citata Hippocratis sententia satis constat. Quâtiſper autem sit exercitandum, Galenus in fine libri de Tuenda valetudine, quatuor notis posse cognosci docet, dum ita scribit: *Exercitetur dum & corpus intumeſcit, & color illi floridus apparet, & motus promte, æquabiliter, & concinne edit, ac sudor cum calido vapore mistus, manans cernitur.* Inhibenda vero exercitatio tum primum est, quum aliquid horum immutatum fuerit. Quippe si contractior paulc corporis moles videbitur, desistendum illico est. Si enim vltra quid pergat, etiam boni succi non nihil educetur, atq; ita tum gracilius corpus fiet, tum aridius, atque ad incrementum minus habile. Non minus profecto, & si coloris gratia vanescat, cessandum est. quando si exercitationem continues, frigidum corpus efficies, & nimium exhauries. Iam motuum alacritas, æquabilitas, vel concinnitas si remitti, collabique cernitur, vtrique statim desinere conueniet. Idem si in sudore accidat vlla qualitatis eius quantitatisue mutatio. Quippe quem & copiosum magis, & magis in calentem edi par est, prout motibus vehementiæ plus, accesserit. Quum igitur is aut minor intelligitur, aut frigidior, tum scias discuti, exhaustiri que corpus: præterea refrigerari, & plus iusto siccati. Quo magis solite attendendum exercitando corpori est, vt quum dictarum iam notarum quælibet apparet, protinus cessetur. Sudorem vero & tumorem corporis inter exercitandum præcipue esse consideranda, Hippocrates etiam in Epidemiis iis hortatur verbis: *In exercitationibus signum extenuationis est sudor guttatim emanans, qui que tanquam a riuiulis egreditur: aut a tumore contractio.* Quæ sane sententia Hippocrates duo potiora inhibendæ exercitationis signa memorat, nempe sudorem, & molis corporis contractionem. De quibus quum multa in huius sententiæ enarratione dixerimus, non est cur hic multum legentium magno fastidio repetenda sint.

Quâtiſper exercitandum quatuor notis cognoscitur. Inhibendæ exercitationis notæ.

6. Epidem. sectio. 3. Aphor. 4.

De Apothepia. CAP. VI.

- A** B exercitatione, quod veteres studiose obseruarunt, apothepia vocata vtendum erit. Sic autem Galenus & alii veteres, omnis exercitationis probe peractæ postremam partem nominauerunt. Hæc vero duplici consilio suscipitur, nempe, vt exercimenta expurget, & vt corpus a lassitudine tutum reddat. Prior causa etiâ exercitationi commun. est, quando etus quoque duplex omnino, vt diximus, propositum est, & vt

Apothepia quid Apothepia cur suscipitur.

Tria ad-
pothera-
pia necesse-
ria

1
2
3

Apothera-
pia frictio
qualis esse
debeat

Mediocris
frictio ut
perficienda

Cutem ten-
dz partes in
apothera-
pia

Spiritus co-
hibitionis
utilitas
Spiritus co-
hibitio
quid

solidas animalis partes firmet, & excrementa expurget. Proprius tamen apothera-
piz scopus est, ut lassitudinem, quæ succedere immodico exercitio solet, submoueat, atque
prohibeat. Quamquam autem qui tantum bonæ valetudinis causa exercitantur, iis nec
necessum, nec utile plane est, immodicos labores adire, adeoque nullus etiam lassitudi-
nis metus instat; nihilo secius tamen iidem apothera-
pia videntur, et si nullo lassitudinis
timore, at certe excrementorum purgandi causa. Tutissimum itaque est, apothera-
pia semper uti. Quæ autem qualisque adhibenda, sit: ipsa finium, ad quos redimus, demon-
strabit natura. Nam quoniam id petimus, ut solidarum animalis partium excrementa,
quæcunque ex calefacta extenuataque per exercitationem in corpore adhuc manent,
prorsus eiciantur, & frictiones, quæ per alios administrentur, adhiberi oportebit, & cum
iis una tum ipsarum, quæ fricantur, partium tensionem, tum etiam spiritus cohibitionem.
At quoniam nec frictionum vnica ratio est, nec, spiritus cohibendi, deligendum ex vtro-
que genere, quod vtilissimum est. At ex frictionibus quidem eam, quæ dura est, cogere
corpora, hoc est, densiora simul durioraque reddere, traditum iam est. Itaque hæc ad a-
pothera-
piz parum est accommodata, siquidem quod densatur, intra se claudit: quod
laxum sit, liberum excrementis exitum præbet. Ad eundem modum quod durat, iis quæ
tensa sunt, maxime est aduersum, ut quod eorum affectum magis adauget. Contra quod
mollit, id est vtilissimum. Si igitur simul & excrementa discuti, & quæ tensa sunt, molli-
ri conuenit, duræ certe frictiones omnino sunt fugiendæ, nec iis minus a lendis cauend-
um. Nam postquam a se corpus non amplius di mouetur, periculum est, ne frigescat
ac densescat, dum nulla ope externa calefit. Hac igitur de causa, non solum cum cele-
ritate est fricandum, sed etiam quoad fieri potest, plurimum manibus, quo nulla corpo-
ris pars nuda maneat. Ac si nec tardam esse frictionem oportet, nec duram, oleum ni-
mirum fricando corpori largiter circumfundi debet: id enim ad velocitatem simul
& molliem frictionis multum conducet: & alioqui aliud secum non mediocre com-
modum affert: quando & quæ tensa sunt remittat, & quæ inter vehementius laboran-
dum fatigata sunt emolliat. Atque iis quidem de causis, dura vitanda est frictio. Ob alias
vero mollis: quippe ea nec alte dimittitur, sed circa cutem ipsam, & ei vicinas carnes defi-
cit, nec ea quæ in angustis meatibus contenta sunt, excrementa elicit. Cuius profecto
causa, tum ipsam fricandarum partium tensionem, tum spiritus cohibitionem iniun-
gimus. Media igitur mollis duræque, quæ eadem mediocris est, ab vtriusque incómo-
do abest, & mollis in efficacia, & duræ violentia noxaque. Ea vero perficietur fricantis
quidem manibus valenter iniectis, ita ut earum impressio ad duram frictionem proxi-
me accedat, ceterum pinguitudinis copia & velocitate mouendi eatenus remissis, ut
plane euadat mediocris. Nam & pinguitudo ipsa, valentioris contractionis non leue
præsidium est, & breuitas ipsa contactus tantum demit de violentia, quantum etiam
de tempore. Porro tendendæ obiter, dum fricantur, partes sunt, quo quicquid inter cu-
tem & subiectam illi carnem excrementorum residet, per cutem expellatur. Quippe
ambabus iis laxis, non magis foras, quam intro ferri excrementa contingeret. D. Itentis
vero iis, quæ sub cute sunt, omnia foras eliduntur, ceu gemina manu expressa, vna foris
eius vtrique qui fricat, altera intus, ipsis scilicet, quæ tenduntur particulis, manus vicem
supplentibus. At propter hæc quidem excrementa, non exigua portio apothera-
piz est
spiritus detentio, & cohibitio. Appellat vero ita, ubi omnibus thoracis musculis, qui
circa costas habentur, intentis coactisque expirationem continemus. Accidit namque
tunc, ut spiritus, qui a costis premittitur, dum efflari per larynga prohibetur, vniuersus pes-
sum ad transuersum septum detur, atque ut cum hoc quæ ipsi subsunt omnia simul attol-
lantur, iecur, lien, ventriculus, & quædam alia. Oportebit autem interim musculos, quæ
in ab domine sunt, leuiter contrahere, ut ab iis vnacum septo, ceu gemina manu pressis,
quæ intersunt partibus, excrementum, si quod intra se habent foras elidatur. Sed de a-
pothera-
pia, quoad institutum nostrum pertinet, satis multa. Neque enim hodie ob-
seruatur, & Gal. qualis hæc esse debeat, in 3. de Tuend. valetud. lib. copiosissime docet. Ad
eum itaque locum, qui plura de spiritus cohibitione scire vult, ablegamus.

De quiete & otio. CAP. VII.

Quemadmodum exercitium commode ac suo tempore administratum, ad tuendam
sanitatem plurimum momenti habet, ita quies immodica & perpetua non solum
corporis

A corporis, sed & animi vigorem obtundit. Quod enim ad corporis rationem attinet, quietem & otium immodicum cruditate parere, & vitiosorum humorum copiā, constat. Nam ut per exercitium calor innatus augetur, adeoque ciborum concoctio fit expeditior: ita per otium exstinguitur, & ciborum concoctio impeditur. Hinc est, quod Galenus cap. 3. libri de Morborum causis, rectissime otium inter frigidorum morborum causas recenset. Et inter Poetas certe Ovidium haud latuit, otia plurimum bonae valetudini obesse, qui in primo de Ponto ita cecinit:

Cernis ut ignauum corrumpant otia corpus?

Ut capiant vitium, ne moueantur, aquae?

B Cum itaque otium sanitati non parum officiat, ideo natura mouendi studiū nobis adhuc pueris inseuit, ut quāuis ea in ætate constituti oclusi circumseptique, simus parietibus domus, discurremus tamen, & brutorum more lasciuimus. Qui igitur sanitatis studio tenetur, is otium immodicum, tanquā ipsissimam pestem, fugiat. Est autē non solum hoc nomine otium immodicum detestandum, quod sanitati plurimū officiat, sed & quod animi torporē inducit. Id quoque inter Poetas Ouidius iis versibus pulcre indicauit, inquiens:

Adde quod ingenium longa rubigine laesum

Torpet, & est multo quam fuit ante minus.

Fertilis assiduo si non renouetur aratro,

Nil nisi cum spinis gramen habebit ager.

Tempore qui longo steterit, male curret, & inter

Carceribus missos ultimus ibit equus.

Vertitur in teneram cariam, rimisque dehiscit,

Si qua diu solis cymba vacabit aquis.

C Proinde quum immodicum otium & corpus & animum deprauet, prudentissime Draconem, celebrē apud Athenas legumlatorem, fecisse fateamur oportet, quod eos, qui otii damnati forent, capite mulctādos censuerit. Neque enim talium hominū vsus aliquis in republica esse potest, ut quibus pulcrū est in medios, ut ille dixit, dormire dies, nec aliud illorum studium est, nisi ut edant, bibant, dormiant, & fruges consumant. Accedit quod *variā semper*, ut præclare Lucanus dixit, *Dant otia mentem*. Quapropter ad quāuis per-

D petrandā flagitia dediti otio proueniunt. Ut non temere Ouidius ita cecinerit,

Quaritur Aegyptiū quare sit factus adulter?

In promptu causa est, desidiosus erat.

Lib. Trist.
Elegia.

Lib. 1. de
Remedio
amoris.

Hinc illa fuit olim Areopagitarum quoque functio, ut unde quis se aleret, accurrate scrutarentur, inque desidia compertos, non citra mulctam transmitterent.

Verum habet etiam otium mediocriter, suoque tempore usurpatum sua commoda. Nam si quis ex multa motione corpus defatigauit, huic otio & quiete utendum erit, de Hippocratis etiam sententia, qui ita in Aphorismis scriptum reliquit: *In omni corporis motu, quum fatigari quispiam coeperit, quies confestim lassitudinis remedium est.* Notū etiā hoc est Ouidii,

Quod caret alternare quies, durabile non est:

Hec reparat vires, fessaque membra nouat.

E Animo denique curis & studiis fesso, sua relaxatione ac remissione opus est. Quam nisi concedas, non est, cur diu vigorem eius cōseruare possis. Ut rectissime dixerit Ouidius:

Otia corpus alunt, animus quoque pascitur illis.

Immodicus contra carpit utrunque labor.

Otiū me-
diocriter
commoda.
2 Apho. 48.

4. Epist.

1. de Ponto

DE SOMNO ET VIGILIA, SECTIO IV.

Quid somnus, & quae eiusdem causa. CAP. I.

F **S**omnus naturalis (de eo enim hic agitur) ut lib. 1. de Symptomatum causis, testis est Galenus, nihil aliud est, quam animalium facultatū quies. Nec temere dictū est, *Animalium*: quippe facultates naturales ac vitales in somno haud quiescunt. Hinc concoctiones in somno magis perficiuntur, cordisque motus validior est. Aristot. in lib. de Somno, impotentiam sensuum somnū esse definit, quod in idem recidit. Impotentiam autem non omnimodam sensus amissionem, sed difficilem tantum sensum appellamus. Siquidem non sensus expertes penitus sunt dormientes, ut Galenus etiam lib. 2. de Motu musculorum testatur, sed difficile sentientes. Nam illi

interdum loquuntur, mouentur, ambulant, equitāt, imaginātur, aliasq; animales & voluntarias actiones exercent. Quies igitur harum actionum in somno non est perfecta cessatio, sed quasi intermissio vigoris quædam. Immobilitatem igit ac impotētiam sensuum somnum esse Aristoteles dixit, quod neq; visus colores, nec sonus auditus, nec odores olfactus, nec sapores odoratus, nec tangibiles qualitates tactus, toto hoc tēpore, quo somno sopiti & oppressi sumus, discernere queunt, vt non immerito vincti tum esse sensus omnes, & ad obeundas functiones impotentes dicantur. Nec aliter Paulus Aegineta *lib. 1. cap. 97.* somnum describit, quum illum facultatum animalium esse quietem scribit, ab vili humore cerebrum madescente prouenientem. Causam tamen vnā somni explicat, nempe *cerebrum*. Quando enim viles vapores ex alimēto mediocri sursum feruntur, atq; in cerebrum exhalant, tum a cerebri frigiditate in humores coacti, & liquefcentes, suauiterq; defluentes, meatus sensuum & neruorum obstruūt, somnumq; accerunt. Non est tamen, vt cum Aristotele *lib. 2. de Partibus animal. cap. 7.* cerebrum actu frigidum putemus: fieri enim non potest, vt vlla interna corporis pars, etsi aliarum collatione partium frigida est, in viuente corpore actu frigida sit. In somno autem necessario animalis facultas a suis muniis quiescit. Quippe per somnum, animalium spirituum ab instrumentis sensus & motus ad suum principium fit regressus, ideoq; vt in eo regressu facultas animalis quiescat, est necesse. Vnde liquido constat, *cerebrum esse somni causam, quod eo per vaporum delationem occupato, facultas sensifica membrum mitti desinat, & dormire statim animal cogatur.* Hinc est, quod spiritiosa omnia, & quæ vaporem ex se multum fundere possunt, vt vinum, lac, & quæcunq; humectant, aut insigniter refrigerant, somnum conciliant. Huic rei fidem quōq; facit, quod fere nunquam magis nos, quam statim a sumto cibo, quum plurimi vapores ad cerebrum ferūtur, somnus infestet. Atq; hæc quidem de somni ratione, & eius causa, Medicorum est constans sententia, nempe quod is ex benigna quadā viliq; cibi exhalatione sursum lata cerebrumq; imbuentem ac aggrauante fit. Cui quidē Aristoteles quoq; subscribit, vbi caput impletum somnum afferre tradit. Nam *cap. 3. libri de Somno & vigilia*, diserte scribit, *somnum maxime post cibum fieri, quod tum copiosus humor & corpulentus sursum commeet. Qui quum consistit, caput aggrauat, & dormire facit.* Atq; hæcenus Aristoteles cum Medicis sentit. Dissentit autē ab iisdē, vbi definitionem somni enarrans, cor primum esse sensorium statuit, atq; idem somni esse causam affirmat. Quam falsa vero hæc sit sententia, & quam a veritate abhorreat, hinc abunde liquet. Neq; enim somnus fit impedito aut cessante corde, cum omnibus constet, in somno, vt pote nativo calore tum ad interiora reuocato, motum cordis esse validiorem, tantum abest, vt tum quiescere illud dicamus. Proinde quum cor in somno non sit impeditū, nec in eo cesset ipsius actio, fieri non potest, vt cum Aristotele somnū esse cordis, quod ipse *πρῶτον αἰσθητικόν*, id est, *primum sensorium* appellauit, quierem esse dicamus. Non parum vero errat Aristoteles etiam in eo, quod *cor esse primum sensorium* affirmat. Siquidem sectio ipsa, & ocularis inspectio abunde docent, cerebrum, nō cor, esse primum sensorium. Quippe nerui, sensus, & motus instrumenta, a cerebro, non a corde oriuntur. Vt mirari subeat hodie etiam reperiri, qui friuolis nulliusq; momentirationibus, & argutiis, saltum hoc Aristotelis dogma tueri studeant. Sed his præteritis ac contemptis, verum & rationi consentaneum potius dogma sectemur.

Quæ somni commoda. CAP. II.

Cum Aristotelis etiam testimonio *ἀδύνατος αἰεὶ ἐν πύρρῳ*, hoc est, vt semper agamus fieri non possit, liquet somnum animantibus ingentium vtilitatum causa additum esse. Siquidem quum diurnis assiduissq; laboribus ac morib. defatigata nostra corpora (multa namque partium eorundem per labores dissolutio) virium resolutionem sentiunt, admirabili ac summa Dei providentia factum est, vt somno, ceu salutari laborum, viriunque collapsarum remedio ac instauratione nos vti voluerit. Hinc tot eius apud Poetas exstant encomia, e quibus hoc est Virgilii:

Fessos sopor irrigat artus.

Et illud Ouidii:

*Somne quies rerum, placidissime somne Deorum,
Pax animi, quem cura fugit, tu pectora duris
Fessa ministeriis mulces, reparasq; labori.*

A Sed ex Medicorum placitis, quæ somni sint comoda, audire præstat. Cōfert autem initio, qui mediocris est. Iuxta id Hippocratis: *Labor, cibis, potio, somnus, verus omnia medicoria.* Is n. *vt lib. 1. de Sympto. causis, c. 9. attestatur Galenus*, cibū optime concoquit, q̄ toto hoc tempore, quo quis dormit, animalis facultas, vt dictum est, quiescit, naturalis v. validius agit. Quocirca tum ciborum cōcoctio fit optima. Concoquit a. non solum cibos, sed & humores, animi aggritudines obliuione delet, mentis insaniam corrigit. Ceterū per somnum cibos optime confici, nō solum in ventriculo, verum etiā in totius corporis habitu, Hippocrates in *Epidem.* breuissima, pro antiquo more, sententia indicauit, in-
B quiens: *Labor articulis & carnibus, cibis v. & somnus visceribus.* P. æterea optimā cibi concoctionem per somnū fieri, hinc certissime colligitur, q̄ vitium robur a somno mirifice auctum, in vniuersum fere oēs sentiūt. Quippe a somno experrecti robustiores, & ad quidvis agendum aptiores nos esse animaduertimus, familiari vtq; alimēto nobis appposito. Vt hinc etiā palam fiat, somnum esse cunctis animalibus necessarium; illumq; ad incolumitatē, salutem, & quietē datū, vtpote sine quo vires corporis durare, & sufficere corpori nō possunt. Vt rectissime ille dixerit: *Quod caret alterna requie durabile nō est.* Somnus igitur id præstat, vt & vires roborēt oēs, & corpus reficiat, cōcoctionesq; confirmet, ac meliores efficiat. Ad hæc internas corporis partes humectat, visceribusq; vt functionibus suis obeundis sufficiant, & ad omnia naturæ opera plurimum confert. Senibus vero adeo conducit, vt nihil fere aliud æque senectutis siccitatem ac duritiā humectet, deperditamq; in ipsis humidam substantiā magis reparet, ac emolliat. Vnde illud Homeria Galeno *lib. 5. de Sanit. cap. 3. ex Odysseæ ultimo citatum:*

*Vt lauit sum sitq; cibum, det membra sopori,
Namq; hæc senibus iusta.*

Porro vt somnus mediocris sua, quæ iam retulimus, comoda habet: ita immodicus præter alia incōmoda, hanc potissimū noxam affert, quod ne excrementa oportune expellant, adeoq; iusto longius in corpore detineant, efficiat. Proinde ii, q̄ in magnam partē diei stertunt, & fere dormiēdo cū gliribus certant, raro ad iustā senectutē perueniunt, quod hæc ratione magnā excrementorū copiam nō solum in cerebro, verum etiā in aliis corporis partib. coaceruent. Quantisper v. sit dormiendū, ex alimentorū perfecta concoctione æstimat. Ea a. rursus ex ventris contractione, & vrina deprehenditur. Quæ enim aquæ speciē profert, crudum adhuc in venis succum esse indicat enim, qui a ventre submittitur. Quæ rufa & biliosa, iam dudum concoctū esse huiusmodi succum portendit. Quæ modice pallet, peractæ modo secundæ cōcoctionis est signū. Imperfectæ v. cōcoctionis, vt *sect. 6. Aphoris. Cōmen. 1. Galenus attestatur*, acidus ructus certū indicium est. Vt hinc perspicuū euadata somno desistendū esse, vbi mediocriter rufa, aut mediocriter pallida vrina est. Nec pōt etiā omniū vna & eadem esse somni quantitas, q̄ ii citius, illi tardius concoctionem perficiant. Magna tamē ex parte septem, octo, vel ad summū, *Gal. lib. 6. de Tuen. vale. c. 5. teste*, nouē horarum spatio finitur ac circumscribitur somni duratio. Fugientus igitur omnino immodicus somnus erit, quod, vt dictum est, excrementa detinear, caput grauet, multoq; vapore impleat, partesq; omnes ad motū pigriores reddat. Quapropter quiuis curare debet, ne somno immodico deditus, bonam vitæ partē perdat, & dormiendo plus satis excrementorum in corpore copiam coaceruet.

Somni tempus quod. CAP. III.

T Empus somni cōuenientissimū est nocturnum, vna aut certe duabus a cœna horis. Quippe nox propter suam humiditatem ac trāquillitatē ad somnum est aptissima. Præterea satis tēporis, quoad absoluta fiat ciborū cōcoctio, habet, ita vt somnū interrumpere negotiorū gratia noctu nō sit necesse. Diurnus cōtra, maxime nō assuetis, & cubatibus nocentissimus, primū q̄ cerebrum nimia humiditate oppleat, q̄ potius vigiliis exsiccantibus absumere ac dissipare oportet. Dein, quia tēpus quo quis interdiu dormit, ad perfectam concoctionem non sufficiat. Hinc est, q̄ diurno vtentes somno meridie excitati a somno, ob interruptam ante horā suā concoctionē, subinde acidos edant ructus crebro quoq; flatibus impleātur. Accedit, quod somnus diurnus nimia humiditate cerebrū implens, capitis grauedines, aliosq; frigidos procreet morbos. Impleta. ideo humiditate caput, q̄, vt dictū est, nox cerebrum abunde satis humectarit, vt nō necesse sit, illud per somnum interdiu denuo humectare, imo per vigilias potius desiccādum erit.

Somnus
mediocris
quid con-
ferat.

6. Epido.
par. 3. Apho-
10.

Somni im-
modici in-
commoda.

Quātilper
dormien-
dum.

Nocturnus
somnia
laudatur.

Diurnus
noxius.

a. Praef. 11.

Somnus
diurnus
quando ad
mittendus.Vesperis nō
multum ci-
bi ingeren-
dum esse.Obiectio-
nis solutio.2. Aphor. 51
2. Aphor. 17.Mediocris
cibus qui.
Valentior.An cena
prandio li-
beralior
esse debeat.

Atq; hinc est, quod non temere in praesagiis ita scriptum reliquerit Hippocrat. *Interdum vigilare, noctu vero dormire oportet.* Vt autē somnum a prandio arceamus, *Aetius lib. 9. cap. 39.* deambulationibus indulgendum esse, & animi laxamenta adhibēda suadet, nec vlla ratione diurnos somnos admittēdos censer, nisi lassitudinis sensus adsit, aut praecedente nocte quis nihil, aut parum admodū dormierit. His igit de causis nocturnum somnum nos amare, diurnū cōtra fugere decet: breuissimus tñ somnus, qui calorē solū colligit ab externis partib. reuocatq; ad cōcoctionē alimēti obeundā, nō nocet. Is n. quū minimo tēporis spatio durer, vaporib. caput replere nequit, interim vires recreat, & si quā erat in capite & sensib. grauitas euanescit. Introcedit n. non solū calor, sed & humores, qui grauitatē stupiditatemq. afferebāt. Dormiendū ergo a prandio, si nequit euitari somnus, minimū, aut plurimū. Minimum, vt calor solū colligat, & vires recreentur ex negotiis & vigiliis dissolutae. Plurimū, vt perficiatur concoctio. Is n. qui eā incoar, nec absoluit, illa parit incōmoda, q̄ paulo ante cōmemorata sunt. Sedente v. corpore captatus meridianus somnus minus nocet, q̄ debumbēte, q̄ ita faciliior ascendenti vaporī exitus p̄beat. Non a. statim a prandio, vt noctu etiā non confestim a cōna, dormiendū est, sed expectandum, donec cibus prius probe misceat, & in ventriculū descendat: id q̄ aliquā morā, & motionem, qualis in leui deambulatione fit, postulat. Duabus tamē minimū a cōna horis vigilandū est, priusquā nos quieti mandemus. Sed vt nocturni somni commodis vti liceat, necesse est, ne vesperi immodico ingesto cibo vētriculū grauemus. Qui enim vesperi multum cibum ingerunt, ventriculumq; huius copīa onerant, ii noctu nec p̄be dormire, nec recte cōcoquere possunt, quod nimia copia facultas aggrauetur, nimioq; pondere assumtorū ciborū pressa, inquietudinē parit, somnumq. interturbat. Nec huic sententiae aduersatur, q̄ Galen. *lib. 7. Ther. method. cap. 6.* vesperi valentius alimentū esse dandum praecipit. Quippe aliud est dicere, valentius esse exhibendum alimentum, & aliud, plurimū cibum esse offerendum. Nam immodicus & plus iusto copiosior cibus, qui ingerit, siue validus, siue imbecillus fuerit, perpetuo naturē inimicus est, morbūque facit, iuxta id Hippocratis, *Omne nimīū, natura inimicū.* Et iterū: *Vbi plus cibi prater naturā ingestum est, morbum id facit.* Quocirca immodici cibi sumtio nec in prandio, nec in cōna laudem vllā meretur, sed perpetuo, tanquā noxia damna. Mediocris v. contra, vtpote naturae familiaris, & qui a facultate nullo negotio, & perfecte vinci potest, quouis tempore sumtus, p̄batur. Mediocris v. est, qui vniuscuiusq; ventriculi facultatē minime grauat. Vt mediocris nullus dicatur cibus, nisi collatione ad vētriculi facultates. Valētiore a. cibos, & multū alimenti corpori p̄bentes, Galenus vesperi exhibendos esse recte consulit, quod huius administrationē non solū somnus & quies, sed & lōgius, donec alius ingeratur cibus, tēpus excipiat. Sed & ii tamen ea ingerēdi sunt copia, q̄ facultatem haud grauet. Vt hinc palam fiat, tam in prandio, quā in cōna mediocritatē esse seruandā. Si v. mediocritas in assumendo cibo exceditur (quod tñ si accidat, probare non possumus) praestat liberalius in cōna ingerere cibum, q̄ prandio, iisdem de causis, quibus valētiore hoc tempore sumitur cibus. Multa enim sunt, quae cōnae concoctionem iuuant: noctis frigiditas, quae, vt hyems, vētres calidiores reddit: somnus & quies, tum animi, tū corporis, q̄ calorem & animā non distrahunt a functionibus naturae, sed intus circa concoctionem alimentorum sinunt versari: deinde spatium temporis, q̄ multo maius est, quā q̄ est inter prandium & cōnā: exceptis tamen iis, qui senes admodū sunt, & morbis, maxime nocturnis, & destillatione affligunt. Liberalius dicimus, non immodice: nolumus enim patrocinari iis, qui hodie gulę seruiunt, & genio admodū indulgent, quiq; vesperi nullo nō ciborum & potuum genere se infarciunt, ac gradissimis poculis viscera ac ventrem distendunt. Id n. non est liberalius cōnare, sed cibum ac potū affatim & supra modum ingerere. Vt igit in elargienda pecunia prodigalitas dānatur, cōtra laudatur liberalitas: ita quoq. liberalitas in sumendo cibo, haud immoderatio nunc a nobis p̄batur. Quod autem plerosque cōna magis q̄ prandium grauat, partim p̄pter cōsuetudinem accidit, qua solemus liberali^r prandere, partim p̄pter prandii reliquias crudas, quae cōnam corrumpunt, & euidentius mane sentiunt, partim etiam quod vapores noctu plures ad caput ferantur, & minus discutiātur: ideoq. qui morbis nocturnis, vt diximus, laborant, & destillationibus capitis affliguntur, liberaliorem cōnam fere nequeunt. Galenus tamen vetusto morē, quum priscis & prandium, & cōna eadem perpetuo hora tum æstate, tum hyeme pararetur, quod illi diem, quicumq. fuisset, aut æstiuus,

A aut hybernus, in duodecim horas diuidentes, tertia prandebant, nona vero cœnabant, cœnam prandio maiorem fore consuevit: quod tunc interstitii tantum a cœna ad somnum intercefferit, ut vapores a copiosiore ingesto cibo elati ad cerebrum discutiuntur atque diffidentur: id enim quatuor horarum spatium fuerit, quod ventriculo ad concoctionem ingesti cibi adscribitur. Liberalius igitur copiosiusque veteres cœnabant, haud veriti vapores, qui a largiore cœna efferuntur ad cerebrum, quum iam discussi fuissent, antequam dormiendi instaret necessitas. Actuarius autem, ut qui morem hodiernum in exhibendo seruabat, in quo per horam, aut duabus maxime horis a somno abstinemus, minorem prandio cœnam esse voluit, quod ob somnum imminens caput multis vaporibus repleatur, ac spiritus animalis lædatur. Sed ea de re satis.

B *Quæ sit conueniens in somno forma decubitus. C A P. IV.*

In somno capeffendo legitima decubitus forma obseruanda erit. Ea vero est, si primum in dextrum latus fiat: ita enim cibus promptius per stomachum gulamve in ventriculum descendit. Nam etsi gula exacte supra mediam ceruicis vertebrarum, & quatuor primarum thoracis sedem, in neutram partem inclinat, ad principium tamen quintæ thoracis vertebræ, ut ampliori magnæ arteriæ trunco secundum dorsi vertebra inferiora corpora petenti cedat, non nihil in dextrum latus a media vertebrarum regione abscedit. Vbi autem probe iam descendisse cibum coniecerimus, in sinistram latus decumbendum erit: ita namque a iecore ventriculo magis incumbente, ventriculi calor augebitur, eiusque concoctio adiuuabitur. Est etiam grata ista laterum vicissitudo, quod vnum latus non sufficiat tanto totius corpori oneri diu sustinendo. Fatigationem itaque non parum leuat, ab vno in alterum latus per vices decubitus. Supinus autem decubitus in vniuersum damnatur ab omnibus, quod grauissimorum morborum incubi, apoplexiæ, stuporis, resolutionis neruorum, & id genus aliorum, occasio sit. Nam quum in eo defluxus ad posteriora corporis, adeoque neruorum exortum fiat, facile illic obstructionem nasci posse, omnibus perspicuum euadit. Accedit, quod in eo decubitu non queat iusta per oculos, nares, & palatum excrementorum cerebri fieri expulsio. Pronus decubitus in iis maxime damnandus venit, qui oculorum defluxione laborant. Siquidem in eo superuacua capitis promptissime ad oculos decumbunt. Atque hæc, quæ hætenus de somno diximus, in sanis maxime obseruanda & consideranda veniunt.

Legitima forma decubitus.

Supinus decubitus.

Pronus decubitus.

Somniratio in ægris quæ. C A P. V.

In ægrotantibus, quod ad somni rationem attinet, initio diligenter a medico expendendum erit, num illi a somno melius, aut peius se habeant. Cuius rei rationem Hippocrates in Aphorismis ita scribens reddit: *In quo enim morbo somnus laborem affert, lethale est. Si vero iuuat, lethale non est.* Laborem autem hoc loco significare noxam, notius fere est, quam ut pluribus dici debeat. Si itaque somnus lædit, indicio est, calorem natium esse imbecillum, nec causas morbum efficientes posse superare. Contra ubi iuuat, noxios humores probe concoqui per somnum significat. Vt cumque autem somnus ægrotantes iuuat, tamen non est omnibus ex æquo, nec quouis tempore illis concedendus. Si enim viscerum aliquod phlegmone laborare cœperit, somno nihil ægris magis noxium esse potest. Nam quum per somnum, ut Hippocratis testimonio confirmatur, sanguis interiora petat, cauendum vnice erit; ne inter initia phlegmones, sanguine ad laborantem locum adhuc confluyente, somnum ægris permittamus, modo ne increfcat phlegmone prohibere, quo nihil e re ægrotantis magis esse potest, velimus. Arcendi itaque, quoad fieri potest, in principio phlegmones viscerum, quum adhuc sanguis superuacuus ad laborantem locum confluit, a somno ægri sunt, & ad vigilias potius transferendi, ut scilicet sanguinis ad interiora confluxus, adeoque phlegmones incrementum, prohibeatur. Pari ratione inter initia pestiferi morbi somnus vnice fugiendus erit, utpote in quo cum sanguine veneni vis ad cor & interiora corporis defertur. Sic superioribus annis, quum febris sudorifica, quam *Anglicum sudorem* nominarunt, Germaniam inuasisset, experientia comprobauit, ei generi febris somno nihil fuisse nocentius. Cauendum denique diligenter erit, ne in principiis accessionum ægris somnum permittat Medicus. Nam cum hoc tempore vel horror, vel rigor, vel externarum partium refrigeratio accadat,

Somnus iuuat, an lædat ægros, considerandum.

2. Aphor. 1.

Somnus non semper concedendus ægrotantibus.

Somnus in principio phlegmonum obest. 6 Epidem. sectio 5. Aphor. 29.

In principiis accessionum haud dormiendum.

sanguisq; ac calor naturalis, humoresq; omnes in profundum tum abeant, expedit magis per vigilias eorundem ad exteriora tractionem moliri: quod alias febres vix dissoluantur, ac difficulter ad consistendi tempus perueniant, fluxionesq; ac cruditates multiplicentur. Neq; enim tum, vt in aliis somnis, humores ad vetriculum confluentes concoquuntur, sed adaucti crudi potius permanent.

De insomniis. CAP. VI.

6 Epide.
sect. 8.
Aphor. 16.

Insomnia
eius medicis
expedenda.

Lapidea
somnia.

Lauare.
Natare.
Bibere.
Edere.
Venere vii.

Grauari.

Volare.
Currere.
Versari in
stercore.
Locis odoriferis.

Non tantum somni Medico habenda ratio erit, sed & insomniorum. Id quod verum esse in Epidemiis Hippocrates confirmat, vbi sic scriptum reliquit: *Qua per somnum accidunt, nec non ipsa insomnia consideranda.* Quibus vtiq; verbis oculorum suspensiones, oris hiatum, decubitus, & alia, quae in prognosticis recensentur, Hippocrates expendenda esse innuit. Nec illa tantum, sed & ipsa insomnia, quod ex illis interdum corporis affectu, corpusq; infestantes humores deprehendere liceat. Si enim quis ignem ardentem per insomnium videat, eum flaua bile infestari significatur. Si vero fumum, aut caliginem, aut profundas tenebras, ab atra bile. Pluuia vero, frigidi humoris abundantis index est. Nix, glacies, & grandis, frigidam pituitam portendunt. Porro in iis temporibus ac alimeto summo mentem adhibere conuenit. Nam qui niue conspergi se putat, si hoc in accessione inuasionis cum rigore, aut horrore, aut refrigeratione fieri imaginatus fuerit, tempori potius, quam corporis affectui tribuendum est. At qui in declinatione huiusmodi somniauerit, firmiorem humorum redundantium frigiditatis indicationem nobis praebit: idq; adhuc magis, si nihil pituitosorum ciborum assumerit, quibus in ventriculo contentis huiusmodi quaedam imaginatio fieri potest, etiam si in toto corpore similis affectus non existit. Quod vero corporis affectum insomnia interdum declarent, Galenus in libello *de Insomniis* aliquot historiis confirmat. Quidam enim somniauit, crus alterum lapideum euasisse, ideoq; paulo post crus hoc resolutionem nervorum incidit. Pugil quidam in sanguinis vase se stare putabat, vt vix emineret, quapropter Galenus sanguinis cepia ipsum laborare, & vacuatione egere coniecit. Nonnulli qui de re torie sudaturi erant, lauare, & in aquae calidae lauacro natare se opinati sunt. Sic inexplebilis bibendi imaginatio, vehementer sitientibus accidit: sicut insatiabiliter edendi famelicis. Veneri indulgere, semine genitali repletis. Videtur namq; in somno anima profundum corporis ingressa, externis sensibus neglectis, corporis affectum sentire, & omnium quae concupiscit, tamquam iam praesentium imaginationem artipere. Quapropter qui vix se mouere posse graui onere onusti per somnium imaginantur, iis animalis facultas a multitudine humorum molestat. Contra, qui volantes se, aut citissime currentes somniant, iis corporis affectus leuis, & expers superuacuum existit. Qui in sterquilino & caeno versari se imaginantur, ii vel humores prauos, & graueolentes, ac putridos habent: aut intestina copia stercoris oppleta. Contra, qui in odoriferis locis se versari arbitrantur, bonis humoribus abundant, & contrarium plane corporis affectum obtinent. Verum de somniis satis.

De vigilia. CAP. VII.

Aphor. 8.

6 Epide.
sect. 4.
Aphor. 12.

VT somnus mediocris confert, immodicus a. noxa non vacat: ita quoq; mediocres vigiliae profunt, immodicae autem obsunt. Quod Hippocrates etiam confirmat in Aphorismis ita scribens: *Somnus atq; vigilia utraque, si modum excesserint, malum.* Quemadmodum enim somnus immodicus cerebrum plus & quo refrigerat & humectat: ita vigiliae, vbi modum excedunt, cerebri bonam temperaturam corrumpunt, sensus debilitant, virtutem deliciunt, cruditatem pariunt, adeoq; cibi potusq; concoctionem impediunt. Id Hippocrates etiam affirmat, qui lib. 2, *de Vitu acut. morbo. apho. ultimo*, in eum scribit modum: *Vehemens vigilia, tum cibi tum potionis cruditatem efficit.* Nam per vigilias nativus calor, adeoq; sanguis & spiritus ad exteriora mouentur, iuxta id Hippocratis: *Vigilans circa exteriora manifeste calidior, circa vero interiora frigidior. Dormiens contra: ut mirum non sit, tum concoctione impediri, ac cruditatem nasci.* Vt hoc nomine vnice cauendum sit, ne vigiliae modum excedant, quod id ipsum sine maxima corporis noxa fieri nequeat. Vigiliae enim si immodicae fuerint ac intempestivae, vires corporis labefactant ac perdunt, cruditatem, vt comprehensum est, pariunt, cerebri & sensuum functiones debilitant, naturales autem imbecillas reddunt, vniuersum deniq; corpus resoluunt, & siccant.

DE REDVNDANTIA ET INANITIONE. SECTIO. V.

Quot redundantia genera & differentia. CAP. I.



Edundantia, quæ Græcis Medicis *πλεονεξία* dicitur, de Galeni sententia duplex est. Vna qualitatris, in qua nuda qualitas elementaris citra humoris affluxū iustam mensuram excedit. Sic certe Galen. lib. 8. Ther. method. cap. 1. febri-
 lis intemperantiz excessum, caloris *πλεονεξίαν*, id est, redundantia, nominat.

Redundan-
 tia duplex.
 Qualitatis.

Eius autem tot sunt species, quot sunt intemperies simplices, nempe quatuor, calida, fri-
 gida, humida, sicca. Altera quantitatis est, ubi cibi potusve, aut humoris in corpore tanta
 est quantitas, ut nobis molestiam pariat, aut morbum aliquem conciliet. Quare duplex

Quantitatis

est eius generis redundantia: vna cibi, quæ Græcis proprie *πλησμονή*, Latinis *satietas* pro-
 prie appellatur. Quocirca non satis recte, nec proprie nonnulli Hippocratis & Galeni
 interpretes, *πλησμονή* repletionem interpretantur, quod in *explicatione Aphorismi vige-*

πλησμονή.
 Satietas.

simi secundi primæ sectionis Aphorismorum diffuse admodum monstrauimus, ut hic repete-
 re non sit opus. Et hoc quidem loco Valleriola mihi malam gratiam refert. Quū enim

is locos suos communes feret totos ex meis Institutionibus compilarit, tamen facere nō
 potuit, quin huius officii immemor, me nihilominus satis acerbè, præter tamen omne

meum meritum, perstrinxerit. Iudico autem illum paulo magis a me fuisse offensum,
 quod rationes suas, quas pro causæ continentis in morbis assertionem attulit, ita refuta-

uerim, ut quod ad illas responderet, plane nihil reliquum haberet. Reprehendit autem
 me in præsentia, quod vni ciborum satietati, Græcorum vocem *πλησμονή* accommoda-

uerim: quandoquidem, ut ille ait, Græci in more habeant, eam non tantum vni ciborum satietati,
 ut perperam Fuchsius, vir aliqui doctissimus, arbitratur, sed & humorum in vasibus plenitudini ac-

commodare. Et si enim Hippocrati 2. Aphorif. 20. *πλησμονή* vox satietatem proprie significat, tamen
 alius in locis ea non pro satietate, sed potius pro plenitudine usum fuisse constat. Hæc ille. Pro con-

fesso autem accipio, quod ait Valleriola, Hippocratem loco præcitato vocem *πλησμονή*
 propria in significatione, nempe pro satietate usurpasse. Si enim verū est, quod *πλησμονή*

vox proprie satietatem significat, cur igitur mox in eadē sectione, *Aphorismo* nimirū eius
 20. Hippocrates eadem voce alia in significatione usus est, & confusionis auctor esse vo-

luit? Si enim vna voce binas redundantia species, ut Valleriola somniat, diuersis quidem
 in Aphorismis Hippocrates intellexit, euitare certe haud poterit, quin fateri cogatur,

illum vna voce, non sine magna legentium confusione, pro diuersis rebus usum fuisse.
 Necesse etiam est, ut redundantia diuisio, quam ibidem Valleriola præmisit, & in qua

singulas eiusdem species & differentias distinxit, sit falsissima. Quare euadendi locus
 nullus ei relictus est, imo necesse est aperte fateatur, se in prædictæ sententiæ Hippo-

cratis expositione hallucinatum fuisse. Sed æge reliqua ipsius verba, ut plenius eius error
 detegatur, expendamus. Aphorismo profecto, inquit, 22. sectionis 2. *πλησμονή* vox non pro

satietate, ut male Fuchsius interpretatur, sed magis pro plenitudine humorum sumitur. Quod in-
 dicat Hippocrates eo in Aphorismo verbis expresse. Vult enim morborum per contrarium cura-

dorum generalem, ut in eius partis commentario testatur Galenus, tradere methodum. Quumque
 plenitudini euacuatio contraria sit & habeatur, nimirum si morbos a plenitudine factos euacuatio

sanet, & ab euacuatione prognatos, plenitudo, & resectio. Nec vero ea Hippocratis eo loci mens fuit,
 de satietate loqui, ut intellexerit, morbos tantum a satietate factos, euacuatione sanari. Nam *satie-*

tas cibi, plenitudinis in genere vna est differentia. Voluit autem eo Aphorismo Hippocrates, non vni-
 tantum plenitudinis differentia comminisci, curandique rationem tradere, sed ex æquo omnium

plenitudinis differentiarum, atque adeo generis in vniuersum, ut aperte in commentariis docet Ga-
 lenus. Hæc ille. Nemo vero est, qui non videat, Valleriolam iis verbis meam partim cō-

firmare sententiam, partim falsissima, sibiq; ex diametro pugnantia, dicere. Meam e-
 nim sententiam in eo confirmat, quod altera Aphorismi huius parte ait, Hippocratem

per contrarium curadorum morborum methodum tradere. Siquidem hæc mea, imo
 Hippocratis mens est, ut priore Aphorismi parte, satietatem per contrarium, nempe

vacuationem, & vice versa, vacuationem per resectionem, sanandam esse doceat. Ut
 autem ex particulari hoc, generalem sententiā colligeret, nimirum contraria contrario-

rum esse remedia illud ad reliquas redundantia quatuor species transferret, mox su-

iicere voluit: καὶ τὸν ἄλλον ὑπεραντίωσι, hoc est, & aliorum contrarietas. Firma igitur & sta-
 bilis adhuc mea stat sententia, nimirum πλησμονὴ ciborum tantum satietatem significa-
 re, nec, ut Valleriola mihi falso & per caluminam affingit, Hippocratem male interpretatus
 sum. Falsum autem principio est, quod morbos ab euacuatione genitos, curari plenitu-
 dine inquit. Quum enim plenitudo sit, Valleriola etiam testante, ubi humores & quali-
 ter inter se adaucti fuerint, nunquā pfecto inter remedia morbos sanātia, numerari po-
 terit. Nam siue hæc ad vasa, siue ad vires fuerit, tamen neutra morbos sanabit. Si n. ad va-
 sa fuerit, qualis est athletarum, hæc ipsa, Hippocrate etiam 1. aphorism. 3. teste, curatione, &
 ea quidem veloci ac celeri, egebit, quod alias periculum sit, ne vasa ipsa rumpantur, aut
 calor narius suffocetur & extinguatur. Sin ad vires fuerit, metuendum erit, Galeno ca. 5.
 de Curatione per sanguinis missionem auctore, ne in putredinem promte ea laborās incidat,
 & nonnunquam etiā in partes quasdam impetu aliquo decumbar, inibiq; tumores præ-
 ter naturā efficiat. Et quomodo is, qui ab euacuatione factus est morbus, ab eo, q. virtu-
 tem grauat sanari poterit? Sed ut Valleriola hanc euitaret absurditatem, statim adiecit:
 Et refectio: non animaduertens, se iterum meam confirmare sententiam, qui πλησμονὴ
 hoc loco pro ea satietate, quæ vacuationi factæ satis sit, & Galeno ἀνάρεσις proprie dici, &
 interpretatus sum. Præterea falsam mihi affingit sententiam, quasi dixerim, Hippocra-
 tem docuisse morbos tantum a satietate factos, euacuatione sanari, quum id ne per so-
 mnium quidem vnquā mihi in mentem venerit: ut qui sciam, morbos omnes a plenitu-
 dine tum cibi, tum humorum progenitos, vacuatione curari, quandoquidem id ipsum
 in altera aphorismi parte disertis verbis Hippocrates innuat. Falsissimum insuper est, q.
 satietatem cibi, plenitudinis vnā esse differentiam inquit. Siquidem pueris etiam, qui
 prima medicinæ fundamenta iecerunt, notum est, plenitudinis differentias esse duas
 tantum, eam nimirum, quæ ad vasa, & eam quæ ad vires nominatur. Satietas igitur cibi
 non plenitudinis, quæ, ut Valleriola quoq; in sua diuisione docuit, πλεθώρα Græcis dicitur: sed
 redundantiz, quam iidem πλεονεξία nominant, species siue differentia existit. Ita sane
 in iis, quæ manifestissima sunt, Valleriola turpiter labitur, & sibi passim pugnantia, liuo-
 re forte occæcatus, scribit. Deniq; quod ait, Hippocratem voluisse eo aphorismo non
 vnus tantum plenitudinis differentiz comminisci, curandiq; rationem tradere, sed ex
 quo omnium differentiarum: eiusmodi plane est, vnde omnibus liquidissime apparet,
 illum contra suam distinctionem, quam paulo ante attulit, speciem cum genere, nem-
 pe πλεθώρα cum πλεονεξία, id est, plenitudinem cum redundantia, confudisse. Quid multis
 opus est verbis? si Hippocrates ex æquo omnium redundantiz differentiarum curan-
 di rationem in prima & altera aphorismi parte tradere voluit, necesse est, ut Valleriola
 etiam fateatur, Hippocratem elementaris qualitatis redundantiam, vacuatione quo-
 que sanandam esse docuisse, quo absurdius dici potuisset certe nihil. Pergit Valleriola
 inquit: Adde, quod si de satietate intellexisset Hippocrates, falsi crimine culpandus veniret:
 quum non omnis satietas vacuatione ad sui curationem opus habeat, sed plerunque vel longa quies,
 vel prolixior somnus, aut inedia absque vllō sensibili vacuationis genere, mederi illi possint, ut plu-
 ribus in locis testatur Galenus. Non ergo de satietate tantum locutus fuisse eo in loco Hippocrates vi-
 detur, sed congruentius pfecto de plenitudine, cui euacuatio tanquam oportuna auxilium de-
 betur. Hactenus ille. Proh pudor, Valleriolam virum alioqui doctum, tam pueri-
 liter ineptire, ut qui ignoret satietati semper mederi vacuationem. Nam etsi proli-
 xior somnus, aut inedia interdum satietati medentur, tamen id non præstant, nisi tan-
 quam vacuantia remedia. Quod autem tum somnus, tum inedia vacuet, libro secundo
 harum Institution. sect. 5. capite 35. & 37. plenius docuimus, ut opus non sit hic pluribus
 monstrare. Ceterum quod per longam quietem, eam, quæ post satietatem sit, & in
 qua prolixus adhibetur somnus, intelligat, notum esse omnibus arbitror. Ridiculum
 autem est, quod generalem morborum per contrarium curandorum methodum,
 quam altera huius Aphorismi parte tradit Hippocrates, ad sensibile vacuationis genus
 restringit, quum sole clarius sit, Hippocratem in iam dicta Aphorismi altera parte, o-
 mnem curandorum morborum ὑπεραντίωσι, id est, contrarietatem, intelligere. Ut igitur
 illic de omni generatim redundantia, ita quoque de omni vacuatione tam sensili
 quam

A quam insensibili locutus est. Quis enim tam stupidus esset, ut διαπολὺν ἢ διαφύρην, id est, insensibilem siue latentem perspirationem, & evaporationem, inter vacuantia non recenseret auxilia? Quod v. ad Galeni testimonia, quæ Valleriola citat, attinet, hæc quidem sententiæ nostræ nihil incommodant. Nam Galenus *capitibus 4. & 10. libri de Curat.* ratione per sanguinis missionem, nequaquam negat, omnem plenitudinem vacuatione esse curandam: sed id potius docet, quod non omnis plenitudo sanguinis missionem requirat, sed sufficere interdum purgationem, frictionem, ambulationes, motus, & inunctiones discutientes. Omnia vero hæc, quæ a Galeno nominatim ibidem recensentur vacuare, notius est, quam ut a me demonstrari debeat. Porro Hippocratem neque de satietate tantum, ut falso mihi Valleriola affingit: neque de plenitu-

B dine solum, veluti Valleriola putat, locutum esse, sed generatim de omni redundancia, paulo antea nobis dictum est. Verum autem esse quod affirmamus, Galenus etiam in commentariis suis satis confirmat. Nam in illis expressis verbis τὸν πληθμονὸς, cum πληθὺς meminit, inquit: ὅδ' ἐστὶν ἐκ τῆς γινόμενης ὑπὸ τῆς πληθμονῆς, ἢ ἐκ τῆς ἐξ αὐτῆς ἐπιμένοντος τοῦ ἰσώσεως, ἀλλ' ὅσα κατὰ τὸν αὐτὸν γίνονται χρόνον ἐπὶ ἐν μανιαδαῖς, ὅτι μὲν ἐν πληθῶνι ἐργάζεται νόσον ἐμπεριέχουσαν, ὅτι δὲ ἡ ἰσώσις αὐτοῦ κένωσις ἐστίν, ὅδ' ἀπὸ δέχεται, καὶ ἀπὸ περὶ ἢ ὅτι πάντων τῶν ποιούντων τὰς νόσους ἡ ἀνατίσις. Id est: *Neque si quid non amplius a satietate sit, neque si ipsa non amplius existente aliquid remanserit, hoc curabit vacuatio: sed quæcumque eo, quo sunt tempore curare aggredimur.*

Quod quidem plenitudo morbum efficit, antea dictum est. Quod vero curatio eius vacuatio sit, dicere non est opus, sicuti neque quod omnia ea, quæ morbos creant, contrarium sanat. Ne autem

C quispiam putaret, Galenum vocem πληθμονὸς pro πληθῶνι usurpasse, ut Valleriola somniat, ideo paulo post hæc subiecit verba: ὅτω δὲ οἱ διὰ πληθμονὸς νόσοι συνίσταται, τὸ πλεοναῦτα κενῶσαι χρὴ τὸν πληθμονὸν ὥσπερ γὰρ καὶ οἱ ὑπὸ κενώσεως, ἀνατρέφειν ὅτι τέχνη ἀποσώζει. Id est, *Sic vero ubi propter satietatem morbus consistat, statim satietatem vacuare oportet: quemadmodum si ex vacuatione sit morbus, quam celerrime reficere conuenit.* Quid v. apertius est, quam Galenum hoc in loco per πληθμονὸν non plenitudinem, sed potius satietatem intellexisse? Nemo enim sanæ mentis, plenitudine vacuationem curabit, sed ut hoc loco Galenus docet, ἀνατρέφειν, id est, *refectione.* Ut sole meridiano clarius sit, πληθμονὸν hoc etiam in Aphorismo, non nisi satietatem denotare. Et quid opus est multis testimoniis? quum metipse Galenus, quid hæc vox significet, *sect. 2. Aphorism. comment. 17.* disertis doceat verbis, sic scribens:

D ἡ γὰρ πλεοναῦτα τροφή τῆς τοῦ σώματος φύσεως, ὀνομάζεται πληθμονή. Hoc est: *Plus enim cibi, quàm corporis natura conuenit, satietas nominatur.* Ut nihil certius sit, in præfato Hippocratis Aphorismo,

Duplex satietas, ut etiam πληθμονή.

πληθμονὸν cibi satietatem denotare, tam eam, quæ præter naturam est, quam eam, quæ naturalis est, & alio nomine refectio proprie dicitur. Igitur iniuria me maxima afficit Valleriola, quod inepte ac perperam Leonicerum & Plantium, doctissimos atque fidelissimos Hippocratis interpretes, a me notatos & reprehensos dicit, quod pro satietate, plenitudinem conuerterint. Quod enim ad Hippocratis, neque ad Galeni mentem iam nominati viri πληθμονὸν dictionem pro plenitudine interpretati sint, puto me luce meridiana in iis, quæ præcesserunt, demonstrasse. Quare falso & per calumniam interpretationem meam sugillauit Valleriola. Iudico etiam nunc eruditus omnibus ex hac mea refutatione innotuisse, utrum ego, an Valleriola propius ac penitus Hippocratis mentem attenderit? Occinendum igitur Valleriolæ potius, quàm mihi, hoc quod est in prouerbio, *Et bonus quandoque dormitat Homerus.* Præterea quum me iam tertio in suis locis communibus falso & per calumniam, *ut dictum est*, ne quid grauius dicam, reprehenderit Valleriola, hortandus mihi venit, ut cautius deinceps mecum agat, & me temere toties non carpat, modo non velit aliquando, ubi mihi plus satis stomachum mouerit, audire quæ nolit. Et quæ hæc est insania, ut docti doctos, nulla plane necessitate, & conuictis etiam aspersis, ut hoc loco Valleriola fecit, sugillant ac lacerent? An non vero hoc est conuictum addere, si quis Valleriolæ instar dicat, Fuchsius inepte, ac perperam calumniatur & carpit prænominatos interpretes? An calumnia est, si quis alterius interpretationem, nullo dicto conuictio improbet? Sed Valleriolam non tam male habuit, quod Leoniceri & Plantii interpretationem notauerim, quam quod ipsius de causa in morbis continente opinionem ita confutauerim, ut non habeat, quod mihi reponat. Quare ut se aliqua saltem ratione vindicaret, me falso

A bit, quum aut cuncti pro veteri proportionē aucti fuerint, aut vnus ex iis exiguum quendam excessum acceperit. Prior quidem simpliciter plenitudo siue multitudo appellatur: altera autem cum adiectione eius, qui excessum illum acceperit, humoris, vel sanguinea, vel pituitosa, vel biliosa, vel melancholica nominatur. Quod satis confirmant, quæ a Galeno lib. 2. de Compo. medica. local. scribuntur, quum inquit: *Quando alius quispiam humor auctus fuerit, veluti est pituita, & flaua bilis, itemq. nigra, eiusmodi auctiōnem non simpliciter multitudinem & plenitudinem, sed cum adiectione pituitæ, aut flauæ bilis, aut nigræ plenitudinem dicimus.* Atque hinc est, quod Galenus in libro de Plenitudine, quatuor eiusdem esse species diserte statuatur, nempe sanguineam, biliosam, pituitosam, & melancholicam. Sanguinea itaque est, in qua sanguis purus reliquos humores auctos vehementer, aut magnopere excedit. Nam quum is sanguis secundum etiam naturalem proportionem reliquos in venis humores semper exsuperet, necesse est, si exiguum supra eam, quæ ex æqua facta est, auctiōnem in sanguinea plethora excessum accipiat, magnopere excellat. Idq. Galenus loco paulo ante citato iis innuere verbis voluit: *Potest igitur, ait, sanguis in plethoricis affectibus vehementer præcellere, aliorum humorum nullus.* Nam si illorum aliquis plurimum auctus fuerit, cacochymia, non multitudo, aut plenitudo nuncupatur. Sed de cacochymia post fusius. Sanguinea quidem plenitudo, corpus rubicundum efficit. Biliosa est, in qua bilis ceteros adauctos humores parum superat. Hæc subpallidum corporis colore reddit. Pituitosa, in qua pituita alios humores proportionē suā in auctos excedit. Hæc albescere corpus facit. Melancholica, in qua ceteros, qui ex æquo increuerunt, melancholicus humor superat. Hæc nigrius corpus efficit. Multitudo autem siue plenitudo simpliciter dicta, gemina existit, vna ad vasa, ad virtutem altera. Ad vasa est, in qua humores adeo exsuperant, vt venas quoquo uersum inflent, ac distendant. Cum igitur amplam vasorum capacitatem prorsus hæc plenitudo impleat, rectissime, & apud omnes peruulgato nomine, plenitudo ad vasa nominatur, vasorumque apertiones & rupturas molitur. Ad virtutem plenitudo, est ea, quæ ad vires comparatur. Etsi enim in ea vasa nec tument, nec copiā distenduntur, plus tamen in illis est reconditum, quam vta natura regi gubernarique possit. Quapropter fit, vt facultatem aggrauet, & eius actionibus noxam inferat. Accidit igitur hoc nomine, vt mediocris sæpè numero plenitudo infirmiori naturæ ac facultati molesta sit, & grauis, ideoque merito plenitudo ad virtutem dicitur. Vtraq. autem plenitudo humores, si diu duret, ad corruptelam ducit, & fluxionem particulis in corpore imbecillioribus transmittit. Quippe necesse omnino est, humores, qui regi ac gubernari a viribus nequeunt, putrescere & corrumpi. Hinc est, quod nonnulli recte admodum plethoram siue plenitudinem duplicem esse statuunt, puram scilicet & impuram. Puram vocantes eam, quæ ex optimorum humorum portione constat. Impuram, quæ cacochymia particeps est, vt est ea, quæ febrem continentē putridam efficit. Siquidem in ea humores omnes redundant, & putrescunt æqualiter, quemadmodum fusius lib. 9. The. meth. c. 3. Galenus docet. Impuriore itaque sanguine venæ implentur, estq. ex plenitudine & cacochymia permixtum vitium. Nam, vt Sect. 2. Aphor. com. 17. testatur Galenus, potest quidem abq. corruptela incipere ad vires plenitudo, verum utilis & benigna manere nequit. Nā ipsam in qualitate mutari, atq. adeo spatio tēporis corruptelā subire est necesse. Verū licet hoc accadat, tantisper tamen plenitudinem ipsam appellamus, donec vacuato superuacaneo, reliquū vtile & benignum reddi possit. Nam q. vinis acscentibus accidit, eiusmodi quiddam & in sanguinis alteratione fieri solet. Id vero tale est. Vbi plane acida facta sunt, ad vini naturam rursus nō redeunt: verum si leui momēto ad id vergant, vt acescere quidē, nondū tamen acetum esse videantur, ex iis cōplura pristinam recepisse naturā visa sæpius sunt. Idē etiā in sanguine euenit. Nā si ipsius magna facta est corruptio, nō iam ad suā naturā redire potest: parum v. si degenerauerit, vacuato superuacaneo, qui restat, naturā suā recuperare pōt. Atq. talem affectū, non corruptionem, sed plenitudinem appellādi Medicis moris est: solā eam corruptelā nominantibus, quæ tam magnā præter naturā sortita est mutationem, vt a natura amplius vinciat regi nequeat, vt pbus & utilis humor fiat. Quod a plenitudo ad vasa, si vires grauet, necessario putrescat, Galenus etiā li. Thera. meth. 9. c. 5. clariis verbis docet. Vt valde ineptos esse oporteat, q. plenitudinē saltē ad vires vna cū cacochymia cōsistere haud posse arbitrātur. Porro si vn⁹ in toto corpore humor tantum abundat,

Plenitudo simpliciter. Plenitudo cum adiectione.

Sanguinea.

Cacochymia vnius humoris in vasis. Biliosa. Pituitosa.

Melancholica.

Plenitudo ad vasa.

Ad virtutem.

Plenitudo pura. Impura.

F

κακοχυμία
totius cor-
poris.

verbi gratia, pituita, vtrique bilis, aut serosus humor, κακοχυμία, Latinis *vitiosus humor* **A**
succus ve appellatur. Quod satis testatur Galen. lib. 13. Ther. cap. 6. vbi cacochymiam ita
 describit: ὅταν ἢ δι' ἐκείνης χολῆς, ἢ μελαίνης, ἢ πλεγματικῆς, ἢ τῶν ὑπερβολῶν ὑγρῶν μέσῳ γίνηται τὸ σῶμα
 κακοχυμίας καλῶσι: Vbi flaua, vel atra bile, vel pituita, vel serosis humoribus corpus refertum fuerit,
 cacochymia vocatur. Sic etiam in lib. de Plenitudine, vbi vnus tantū in corpore humor plu-
 rimum abundat, cacochymiam appellari scribit. Vnius itaque humoris tantum exupe-
 rantia, vt verbi gratia in arquato morbo flauæ bilis, non plenitudo, sed vitiosus humor,
 quam Græci κακοχυμίας vocant, dicitur. Rectissime vero hoc genus redundantiz, *cacochy-*
mia Græcis dicta est. Cum enim fieri non possit, vt vnus aliquis in corpore plurimum
 redundet humor, quin idem prauam etiam induat qualitatem, vtrunque excessum, tū
 in qualitate, tum quantitate Græci hoc nomine significare volentes, κακοχυμίας appella-
 uerunt: hoc quidem nomine humoris non tantum redundantiam, sed & prauā quoq;
 qualitatem innuentes. Hinc Galeno alio nomine διαφθορά, id est, *corruptela* nuncupatur. **B**
 Quamquam sect. 2. Aph. Com. 17. ita nominari scribat vitium ita magnum, vt non possit
 iterum per naturæ concoctionem ad pristinam bonitatem humoris redire. Quare non
 inepte deterior cacochymia, nonnullis hæc corruptela nominatur. Quando autē hu-
 mores maligna & peruersa sunt præditi qualitate, vt in pestilentia maxime accidit,
 κακονμία peculiari nomine appellatur. Quod autem in cacochymia non solum in quan-
 titate, sed & qualitate vitium sit, ex eiusdem generatione abunde patet. Nam, vt Galen.
 lib. 3. de Temp. cap. 3. scribit, cacochymia multis fit ex prauis & vitiosis cibis, alijs vero ex
 corruptela, & putredine. Si itaque ex iis, quæ iam diximus, fit cacochymia, in illa sit **C**
 qualitatis vitium oportet. De corruptela namq; & putredine, quin qualitas in iis praua
 sit, nemo dubitat. In prauis autem & vitiosis cibis inesse prauam qualitatem, horum de-
 nominatio satis docet. Sole igitur meridiano clarius est, toto cælo errare Recentiores,
 ac Barbaros Medicos, qui cacochymiam esse definiunt, vbi in qualitate duntaxat pec-
 cant humores. Constat enim ex iam dictis, in cacochymia non solum prauos, sed etiam
 immodice auctos & accumulatos esse, adeoq; etiam quantitate peccare, humores. Atq;
 hinc est, quod Gal. lib. 12. Methodi medendi, cap. 7. cacochymiam nominet, quam alias in-
 temperiem cum affluxu humoris vocare solet. Ceterum, si in habitu corporis eius ge-
 neris redundantia, quæ cacochymia dicitur, fit, peculiaria consequitur nomina. Quæ **D**
 enim a bile per vniuersum corpus sparsa fit, icterus, & a Latinis morbus regius: quæ ab
 atra bile, elephantiasis: quæ a pituita, leucophlegmatia dicitur. In partis alicuius sub-
 stantia inhibito humore, a bile flaua, herpes, & erysipelas: ab atra, cancer, vel scirrhus:
 a pituita, œdema: a seroso humore in ventre collecto, ascites: In testiculis, hydrocele
 generatur. Hæc certe est legitima generum ac specierum redundantiz partitiō, quam
 pauci admodum tenent, quod magna pars medicorum, etiā in ista veritatis luce, Ara-
 bum & Barbarorum commenta mordicus adhuc teneant, illisque toti, spretis & con-
 temtis Galeni aliorumq; optimorum Scriptorum monumentis, addicti sint, & e tur-
 bidis lacunis, quam purissimis riuis medicinæ principia haurire malint. Sed permitta-
 mus hos suo more insanire & ineptire, nos vero prædictas redundantiz differentias me-
 moriz gratia breue in schema aliquod congeramus.


Cacochy-
mia cur
dicta.

διαφθορά.
Corrupte-
la.

κακονμία.

Recentioru
Medicorū
error.

icterus.



Quid vacuatio, & eiusdem genera ac differentia. CAP. II.

Cum haftenus redundantia genera & differentias retulerimus, reliquum est, ut nunc quoque; vacuationum, quae illis contrariae sunt, genera & differentias exponamus. Vacuatio vero, ut hoc initio expediamus, non est nisi humorum in corpore sua quantitate molestantium excretio. Cuius quidem duo sunt primaria genera: una enim vniuersalis, particularis altera. Vniuersalis seu generalis est, quae suapte natura totum vacuat corpus: aut quae ab vniuerso corpore humores & excrementa educit. Huiusmodi sunt, sanguinis quouis modo profusio, purgatio, vomitus, per urinam excretio seu mictio, sudor, balneum, praesertim aquarum discutientium, & aereum appellatum, haemorrhoides, Venus, insensibilis transpiratio, medicamenta discutientia toti corpori admota, somnus a vacuatione admissus, vehemens exercitium, multa frictio, & propter haec omnia inedia. Atqui praedicta per se quidem totum vacuant corpus, inedia vero ex accidente, *ut suo fufius loco dicemus.* Particularis vacuatio est, quae partem duntaxat aliquam excrementorum onere pressam vacuat leuatque. Quo in genere est cerebri per palatum & nares expurgatio quidem evidens, per aures & oculos obscurior: excretio, quam pulmonis & thoracis vitia excussit: ventriculi per vomitum, & aluum. Intestinorum per solam alui deiectionem. Iecoris & lienis, per urinam & aluum. Renum & vesicae, per urinam: muliebrium locorum, per menstruas purgationes, & quaecumque; aliae vacuationes, quae unicam duntaxat partem excrementis suis leuant. Danda igitur opera, ut harum partium excrementa singulis temporibus expurgentur: atque in primis studendum, ut venter quotidie bis semelue pro consuetudine eat. Qui si naturae beneficio laxus fuerit, id in magnam felicitatis partem est numerandum. Quippe qui aluum natura apertam habent, haud facile morbis corripuntur. Qui contra adstricta sunt aluo, ii perpetuo cum morbis conflantur. Singulis praeterea diebus mane sensuum instrumenta omnia, lingua, oculi, nares, aures, totaque; facies frigida abluenda, capillis capitis prius leuiter pexis. Ceterum iam dictorum vacuationum generum vnumquodque; alias per se suaque; sponte, alias arte completur. Sponte facta vacuatio est, quam citra ullam medicationem quippiam e corpore profundit. Atque id quidem interdum natura duce, quae dum nos recte moderatur, & integre valet, quicquid vitiosum est aut redundat, id omne e corpore excludit, estque; ac dicitur tum naturalis, & opportuna vacuatio. Interdum vero natura imbecillior ignaviorque humores non valens in corpore regere atque cohibere, eos prorsum diffuere sinit: imo etiam quum robustior validiorque; constat, tanta plerumque; copia vel acrimonia laceffitur, ut infesti humores e vasculis receptaculisque; suis proprio impetu foras exsiliant, naturae aspernantes imperium. Viriisque; generis symptomatica, irrita, praeter naturam nulliusque; usus est vacuatio, quod benignus atque salutaris humor pariter cum pernicioso promiscue nullo delectu erumpat. *Artificiosa vacuatio* nominatur, quae externi subsidii ope excitatur. Ea rursus bipartito scinditur. Vna quippe legitima existit, quae quod qualitate, vel quantitate negotium facessit, duntaxat educit. Altera huic aduersatur extraordinaria, qua utilis & qui in nullo vitio est humor exigitur. Haec medentium culpa vel incitiae, qui neque, quod iustum, nequeque; idoneum est, perspectum habet, decernitur. Haec sunt vacuationum omnium genera, quibus redundantes ac noxii omnes e corpore eiiciuntur humores. Quonia vero in usu exercitationeque; medendi vniuersales vacuationes particularibus anteferunt, opere prepetium fuerit de vniuersalibus hic primum sermonem nos instituire, a venae sectione exorfos.

DE VENAE SECTIONE.

In quibus morbis secanda vena. CAP. III.

Cum per venae sectionem, Galeno etiam suffragante, vniuersa humorum multitudo, ab vniuerso corpore aequaliter vacuetur, satis constat, hanc morborum omnium, quicumque; ex sanguinis affluentia & vbertate, vel ex quauis illius eruptione ortum acceperunt, propriam convenientemque; medelam esse, siue praesentes ii sunt, siue duntaxat imminet. Quocirca educendae plethorae plenitudiniue vnicum ac proprium remedium statui debet. Venae sectio, eius praesertim, quam ad vasa ducit. Ex ea namque; plenitudo ad mediocritatem redit, dolores ex tensione placent, corpus graui onere leuatum erigitur, & quasi recreatum alacrius expeditiusque; fit ad functiones omnis generis obeundas. Eadem quoque; innatum calorem liberalius ventilans, arctioresque; vias & meatus referans, morbos arcer, in quorum idipsum discrimen adducebatur. Quod si forte ii morbi per incuriam in sede-

rint, venæ sectio immodicam plenitudinē subtrahens efficit, vt natura iam dominatrix A
& expedita pondere, reliquis humorum vitiis deinceps imperet, idque concoquat, q̄
sibi reddere potest familiare, expellat quod prorsus inutile nunquam post hac futurum
est idoneum. Quinetiam si quis morbus ex plenitudine in quampiam partem inuasit,
illa influentem etiamnum humorem in diuersum reuellit: eum vero, qui iam influxit,
deriuat in latus, & vacuat, hocq; modo prorsus morbū depellit. Si vero plenitudo, quæ
ad vires refertur, infestat, non semper sanguis mittendus est. Fieri enim potest, vt cru-
dus per corpus sit coaceruatus humor, quo præfente, secta vena bonum duntaxat san-
guinem vacuat, malum vero, qui in primis maxime venis circa iecur & mesenterii col-
ligitur, in vniuersum trahit corpus, vt *fusus lib. 3. de Tuen. sanit. c. 5. Gal. ostēdit*. Virtus etiam
prius ab eiusmodi affectu exsoluta, per sanguinis missionē in extremū malum recidet, B
vt nequaquam subinde reparari queat. Neq; enim parum in vena secta dissoluitur vir-
tus, vt *c. 6. lib. de Curandiratione per sanguinis missionem plenius Gal. docet*. At quia in plenitu-
dine ad vires, imbecilla facultas opprimitur, ne qua illinc putredo, aliaue humorū cor-
ruptela emergat, confert quidem & cōducibilis est interdum modica sanguinis missio.
Veruntamen si morbus necdum adest, nec instat, ea plenitudo minuetur commodius
inediis, moderata exercitatione, atque iis, quæ ad concoquendum iuuant. Quæ sane
ratione in pestilenti cœli constitutione, alias tenui victu, alias venæ sectione sanguis in-
fra modum adducendus est, vt paucum, natura purius conseruet, nec tam facile a putri-
contagione labefactari sinat. Quapropter diligēter in sanguine mittendo plenitudinis C
non solum species, sed & eius tum quantitas, tum qualitas distinguendæ erunt. Plenitu-
dinis autem ad vasa, tensio nota est. Ideoq; quantum tensionis sensus augetur, tantum
etiam ea plenitudo crescit. Eius autem, quæ ad vires refertur, grauitas indicium est. Et
quanto grauior sibi homo videtur, tantum etiam hæc ipsa plenitudo aucta erit. In prio-
re itaque copiosius, in altera parcius sanguis mittendus. Quod ad qualitatem attinet,
considerandum certe erit, num plenitudo sanguinea, biliosa, pituitosa aut melācholi-
ca sit. Id quod ex colore dignoscēs, memor colorem humorum esse, siquidem vniuer-
sum corpus in externo tum calore, tum frigore mediocriter se habeat, indicium. In san-
guinea namque plenitudine abundantius, in aliis tribus, pro humoris exsuperantis spe-
cie, parcius sanguis mittendus. Ceterum in vtraq; plenitudine, vbi opus est, celeriter
vacuandum erit. In ea quæ ad vasa nominatur, antea quam in partes corporis, maxime D
nobiles, decumbat, & in iis phlegmonem, aut alios præter naturam tumores excitet:
imo priusquam sua copia subito suffocet, venarumq; ruptiones afferat. In ea, quæ ad vi-
res refertur, priusquam in putredinē incidat, aut cum impetu in partes corporis irruat,
& in iis tumorem, præter naturam excitet, vt *plenius v. 5. lib. de Curandiratione Galen. docet*.
Ceterum vena secanda etiam in omnib. morbis, qui ortus sui causam ex sanguine ha-
bent, vt sunt continens febris, & omnis generis phlegmones, item febres putridæ tum
continue, tum intermittentes, in quibus obstructionis & putredinis præcipua, aut certe
adiuuans concomitansque causa est immodica plenitudo, & alii qui ex sanguinis copia
& illapso procreantur.

Scopi mittendi sanguinis quot. CAP. IV.

QVi de missione sanguinis consilium inire tentat, huic decē præcipue accurata di-
ligentia expendenda veniunt, vt quæ non solum quando sit mittendus sanguis de-
monstrant, sed & mittendi sanguinis quantitatem præfiniunt. Proinde recte a Medicis
mittendi sanguinis scopi nominantur, quod in illos venam secare volentes intētos esse,
& eo vniuersa consilia sua dirigere oporteat. Primus & maxime proprius mittendi san-
guinis scopus est, magnitudo morbi. Si n. magnus vehemensq; fuerit morb⁹, sangui-
nem mittēmus, etiā si nulla plenitudinis nota adest. Sic incipiente phlegmone, aut pp
ictum, aut dolorem, aut partium imbecillitatem, citra plenitudinem sanguinē mittere
expedit. Quippe ex ictu, aut casu ex alto loco, partes corporis afflictæ sanguinem ad se F
præter naturā trahunt, adeoq; phlegmones in iis excitandæ occasionē præbent. Proinde
ne id fiat, sanguis quem alliciunt per venā sectam auertendus erit. Dolorem aut attrahere,
& fluxiones concitare, notius est, quā vt plurib. dici debeat. Ad partes autē imbe-
cilliores reliquas sua superuacua reponere itidē notum est, & nos hæc omnia copiose
inc. 8.

In plenitu-
dine ad vi-
res nō sem-
per vena
secanda.

In plenitu-
dine ad vi-
res sanguis
modice mit-
tendus.

Plenitudi-
nes vt distin-
guendæ.

Qualitas
plenitudi-
nis.

In vtraque
plenitudi-
ne celeriter
vacuandū.

In quibus
morbis se-
canda vena.

Scopi mit-
tendi san-
guinis de-
cem.

Magnitudo
morbi.

A *inc. 8. libri de Curandi ratione per sanguinis missionem* tradidimus. Alter scopus in secanda vena, priore nō minus proprius ac necessarius, est virium robur & imbecillitas. Nam non solum in sanguinis missione, verum etiā in omni alia vacuatione maximi refert, lāgidas & imbecillas vires a robustis internoscere. Hæ siquidem largam, illæ vero nullā vacuationem ferūt. Quod si itaque robur validum fuerit, & mittendi sanguinis necessitas incubuerit, sanguis audacter detrahēdus. Sin invalidum fuerit, aut nihil, aut parum saltem sanguinis auferēdum. Et sub hoc altero scopo ætarū quoq; ratio, senum præcipue, complecti potest. Nam, *ut c. 9. lib. de Curandi ratione per sanguinis missionem Galenus inquit*, nulli, qui in ea ætate constitutus est, robur inest. Viribus autē maxime imbecillis est senectus, quæ decrepita nuncupatur, quapropter nullam venæ sectionē tolerat. Qui igitur reliquum vitæ calorem secā vena cum sanguine profundit, moribundum præcipitat senem. Hinc Gal. post 70. annum, modo vires parum validæ sint, & sanguine haud abundant, senibus venam tundendam esse prohibet. Quod si vero in hac ætate constituti, multi sanguinis fuerint, viresque robustas habuerint, si ita morbus iubeat, iis etiam secandam esse venam præcipit. Puerorum autem ætas viribus quidem abundat, ceterum quia corpus calidum & humidum, molle, tenerum ac patens obtinet, multo tenui humore confertum, quod sponte sua assiduo discutitur ac defluit, sanguinis missionem tuto non feret: quantū enim ex incidenda vena moliendum fuerat, id ultro ex corporis natura præstatur. Cum itaq; puerilis ætas ex seipsa habeat, vnde naturaliter vacuetur, vacuatis præsidii haud eget. Quapropter Galenus pueris ante 14. ætatis annum venam secandā esse non putat. Quod profecto non simpliciter de omni venæ sectione, & sanguinis missione, sed de pleniorē illa, veteribusque consuetā audiendum erit. Nam moderatam & hodie vñtatam, quæ tum viribus, tum plenitudini aliqua ex parte respondet, non tantum pueri, sed & senes etiam ferunt. Sic nostra tempestate in decrepita ætate, quæ graui vrgenteq; pleuritide, aut peripneumonia torquetur, sanguinem mittimus. Sunt etiam, qui 5. aut 6. ætatis anno 3. sanguinis, aut 4. vncias emittentes, pleuritidem & alios grauiorē morbos sanarunt. Et Auenzoar Arabs filio suo trimo se vñliter venam rudisse commemorat. Nonne sponte instinctuq; naturæ pueris sanguis interdum abunde prodit enaribus, nulla corporis, aut virium iactura? Cur igitur qui graues morbos experiuntur, nō illorum etiam remedia sustinerent? Sed ea de re alias plura. Quæ inter senectutem & pueritiam mediæ interueniūt ætates, quoniam firmis viribus & corpore bene constituto tenentur, nulla vacuandi præsidia, adeoq; nec venæ sectionē metuunt. Prædictos tres sanguinis mittendi scopos Hippocrates pro antiqua loquendi ratione breuiter admodum hac complexus est sententia: In acutis morbis sanguinē mittes, vbi magnus fuerit morbus, & æger ætate florēs, & virium robur affuerit. Tertius scopus secandæ venæ, est *natura corporis*. Natura autē non est nisi temperamentum, q̄ ex quatuor elementorum cōmitione constat. Qui enim natura calidiores sunt, amplas obtinent venas, Gal. etiam lib. 2. de Temp. c. 5. attestante, multoq; abundāt sanguine, ideoq; copiosā ferunt vacuationē. Contra, qui frigidi sunt natura, angustas venas habent, & exigui sunt sanguinis, proinde sanguinis missionem largam haud tolerant. Sic humidi natura, iis qui sicci sunt, venæ sectionem magis sustinent. Quartus scopus est corporis habitus, qui si mollis, tener, & rarus est, imbecillus sit, & dissolutioni obnoxius, oportet. Proinde cū promptē diffluat, & ex se resolutioni idoneus sit, vacuationem ferre nō potest. Contra, qui dēsus, firmus, solidusq; est, pauca e corpore dissipari sinit, ideoq; largā vacuationem sustinet. Qui præpinguis, & obesus existit, quanquam minimum discutitur, tamē quia angustis est venis, parumq; sanguinis habet, difficile venæ sectionē sustinet. Qui mediocriter graciles sunt habitu, Galeno loco paulo ante citato teste cum venarum laxitate coincidunt, idcirco copiosā venæ sectionē ferre possunt. Nec temere dictum est, *Mediocriter graciles*. Si enim admodum graciles sunt, copiosā sanguinis missionē haud tolerant. Habent namq; & illi sanguinē exiguum. Nulla enim alia de causā, tam vehementer graciles euaserunt, quam q̄ sanguinis copia, adeoq; alimento destituti, & plurimum extenuati atq; exsiccati sunt. Quintus in tundēda vena scopus est anni tēpus, q̄ num calidum an frigidum sit, expendendū medico erit. In calido enim tempore improbe vacuati, Gal. lib. 1. ad Glauco. teste, syncope & resolutione intereunt. Quippe calor ambientis e corpore foras euocatum spiritum discutit, resiccatq; corporis habitum, & imbecillio-

2. Virium
robur & im
becillitas.

Ætatum
ratio.

Pueri.

An pueris
ante deci-
mum quar-
tum annū
tundenda
vena.

3
Tempera-
mentū cor-
poris.
Natura
quid.

4
Habitus
corporis.

5
Tempus
anni.

tem reddit. Proinde tum omnino a sanguinis missione abstinendū erit. In frigido tem-
 pore corpus refrigeratur, idcirco sanguinis missionem impedit. Quid n. attinet corpus
 antea abunde satis refrigeratum, sanguinis detractioe magis refrigerari? Igitur accō-
 modatissimum tempus mittendo sanguini Ver ipsum, q. plane temperatū est, adeoque
 neque nimis calidum, neq. supra modum frigidum, & succi viriumq. plenum. Atq. hoc
 certe nomine Vere secta vena præcauendis morbis idonea est. Quod Hippoc. etiam in
 Aphor. confirmat inquires: *Quibus sanguinē mittere confert, iis Vere detrahere prodest.* Gal.
 quoq. c. 7. lib. de Curandi ratione per sanguinis missionem, sese multos podagricos aliisq. mor-
 bis obnoxios sanguinis missione principio Veris facta curasse, & ne subinde in eos mor-
 bos inciderēt, præcauisse testatur. Et statim quidē incipiēte Vere sanguis iis est mittendus,
 qui Verno temore morbis capiuntur. In extrema vero eius parte, iis est mittendus, qui
 in æstate corripī morbis soliti sunt. Atq. hæc sane distinctio prodest ad recte intelligē-
 dos Galeni locos, qui prima facie inter se pugnare videtur. Is n. interdum *ἐν τῇ πρῶτῃ ἀρχῇ τῆς
 ἡμέρας*, id est, *incipiente iam vere*; nonnunquam *πρὶν ἀρξάναι τὸ θέρος ἐν τοῖς πλεονότοις τῆς ἡμέρας*, hoc est,
priusquam æstas incipiat in postrema Veris parte, sanguinem ad præcauēdos futuros morbos
 mittendum esse hortatur. Post ver autumnus, dein hyems, omnium vero minimū æstas
 secundæ venæ apta. Sextū, q. in secunda vena cōsideratur, est regio. Ea namq. si feruens
 & arida fuerit, multum calidi innati viriumq., multum etiam peccantis humoris e cor-
 pore haurit ac discutit, hincq. adeo vires comminuunt, pauciorq. sanguis in venis ma-
 net. Qui igitur in ea degunt, parciores in mittendo sanguine esse conuenit. Regio aut
 frigidior, & humidior, innatum calorem, humoresq. intus coerces, horumq. minimum
 dissoluit, quocirca sanguinis missionem melius tolerare possunt. Porro in extreme fri-
 gida regione, vt est quæ in Aquilonem deurgit, sanguis frigore veluti congelatus va-
 cuationi vix cedit: sed & partes interiores si suo calore, aut ob sectā venam, aut aliam ob
 causam, destituantur, ambientis frigoris iniuria extinctionis periculū subibunt. In hac
 igitur regione constituti, sanguinis missione abstineant. Quæ vero inter illas intercedit
 regio temperatior, largam sanguinis profusionem tolerat. Proinde eadem est regionis,
 quemadmodum etiam cœli status, quæ temporis ratio. *Septimo loco* in sanguinis missio-
 ne victus ratio, q. præcessit, cōsideranda venit, num scil. plurib. cibis, & potionibus, iisq.
 multum nutrientib. vsus sit æger, aut contra. Si n. largo est vsus cibo, & sic per intempe-
 rantia crudorum humorum copiam congeffit, huic certe sanguis mittendus non est. Id
 q. etiam confirmat Gal. qui c. 7. lib. de Curandi ratione per sanguinis missionem ita scribit: *In-
 continentēs, inquit, ebrios, ac gula deditos, neq. purgatione, neq. sanguinis missione magnopere iuuab-
 is. Nam per victus intemperantiam crudorum humorum copiam celeriter coaceruat. Sin mediocri
 cibo contentus fuit, & vacuationē tolerare potest, huic intrepide re ita postulante, sanguinē detrahes.*
 Octauo loco, qui venam secare cupit, consuetudinē cōsideret, necesse est. Si quidem
 habet hæc ipsa plurimum momēti, Gal. lib. 1. c. 13. ad Glauc. teste, tum ad alia omnia, tū ma-
 xime ad vacuationis indicationē. Alii n. nunq. sunt vacuationē antea experti, neque in-
 tegrā pertulerunt, largoq. cibo vsi sunt. Quapropter sanguinis missionem, in ediamque
 citra noxā non ferent. Quū n. consuetudo procliuitas quædā ac facultas sit eodē modo
 semper agendi aut patiendi, in reb. naturæ tā amicis q. aduersis vsu cōparata, si qd ægro
 insolitū, iniucundum, quodq. extimescat, obiciat, id sine magno detrimento, sæpe et-
 iam sine graui periculo, subire haud poterit. In quo genere cum sit sanguinis missio,
 hanc vacuationem sine metu, ac plerunque animi deliquio, si meticolosus sit, & vacua-
 tionem nunquam ante expertus, sed liberali cibo semper vsus, non sustinebit. Alii con-
 tra vacuationibus sunt assueti, & parco cibo vtuntur: hos itaque modo reliqua cōsen-
 tiant, intrepide vacuare conuenit. Igitur qui venę sectionem iam experti sunt, modo vi-
 res crebra vacuatione nondum læsæ sint, alacrius ac leuius eam perferent, q. inexperti.
 Considerandum etiā in mittēdo sanguine erit, num is, cui tundendā venā suscepimus,
 exercitiis, aut otio vsus fuerit. Quippe qui crebro exercitiis vtuntur, q. eam ob causam
 pauca in corpore superuacua congerant, parcus sunt vena secta vacuandi. Contra, qui
 hæc ipsa prorsus negligunt, & in otio vniuersam suā transigunt vitā, aut exercitiis saltem
 raro vtūtur, largius sunt vacuādi. Deniq. in secāda vena expendendum erit, num con-
 suetæ excretionēs supprimantur, aut nō: verbi gratia, in viris accurate scrutandum, num
 hæmorrhoides solito profluant tempore, aut in vniuersum cohibeantur. In mulieri-
 bus autem, num statis temporibus menses erumpant, aut prorsus supprimātur. Quibus

Ver sangui-
 ni mittēdo
 accommoda-
 tissimum
 tempus.
 7. Aph. 54.

Quando in
 Veris prin-
 cipio, &
 quando in
 vltima eius
 parte san-
 guis mit-
 tendus sit.

6
 Regio.

7
 Victus præ-
 cedens.

Consuetu-
 do.

Consuetu-
 do quid.

9
 Exercitia.

10
 Excretionū
 suppressio.

A enim tum viris, tum mulieribus solitæ excretiones præter naturam retinentur, sine noxa omnes sanguinis missionem ferre possunt. Quod si vero illis mediocriter exeant, ubi per eas corpus abunde purgatum fuerit, aliam vacuationem non requirent.

Quæ vena incidenda. CAP. V.

In mittendo sanguine accurata diligentia expendendum erit, quæ vena in quouis partium affectu secanda sit, interna scilicet, media, humeralis poplitis, an ea, quæ iuxta malleolum est: tot enim hodie tundi consueverunt venæ: id quod ex laborantis partis situ maxime indicatur. Non enim ratio solum, verum etiam usus ipse ostendit, aliam alii parti vacuationem congruere. Situs itaque eam venam incidendam demonstrat, quæ in laborantem partem inserta, cum ea societatem cognationemque habet. Quippe hæc humorem a laborante sede prolicat. Interna itaque, quam iecorariam in dextro brachio, in sinistro autem lienarem, hodie facientes medicinam basilicam vocant, secanda, ubi partes, quæ infra ceruicem sunt, verbi gratia, *latera, pulmo, cor, iecur, lien, aut ventriculus laborant*. Externa vero, quam humeralem & cephalicam nominant incidenda, ubi partes, quæ supra collum sunt, facies, nimirum, aut caput, affliguntur. *Media*, quam alio nomine communem, nigram, funem brachii, matrem, & medianam, barbaram sectantes medicinam appellant, tum secanda erit, ubi interna vel externa parti laboranti propria obscurior fuerit, ab utrisque enim iam dictis venis diducitur. Vt autem omnes prædictæ partes venæ sectione in gibbero facta iuuantur: ita quæcumque iis inferiores sunt, earum, quæ in poplite, aut malleolis inciduntur. Prædictis vero inferiores existunt, quæ iuxta coxam, vesicam, & uterum sunt. Renes autem ambigunt, siquidem inferiores sunt iis, quas prius recensuimus, collo nimirum ac thorace: superiores autem iis, quas secundo commemorauimus, loco, coxa scilicet, utero, & vesica. Quapropter venæ sectionibus in gibbero factis interdum auscultant, quando utique phlegmone recens fuerit, ac sanguinis copia, siue plenitudo aderit. Qui vero affectu illo laborat, quem proprie Nephritim nominant, hos eam, quæ in poplite est, incidere oportet, aut omnino eas, quæ in malleolis sunt. Ceterum, non indifferenter quævis prædictarum venarum secanda erit, sed in mittendo sanguine semper *rectitudo*, ut Hippocrates nominauit, obseruandum erit. Hæc autem loquendi ratione nihil aliud innuere voluit, nisi *rectitudo*, hoc est, quod in rectum, aut e directo est, vel *directio*, id est, *rectitudinem*, ut alibi fusi ostendimus. Rectitudinem autem non mathematico more, sed vere Medico, rectam lineam intelligimus, quæ in dicto eius venæ processu cernitur, per quem est humorum cursus. Alii rectitudinem secundum fibrarum, quæ in venis sunt, rectum ductum æstimant, quod in idem recidere videtur. Nam horum sententia illæ corporis partes e directo sitæ sunt, in quas rectæ fibræ diriguntur. Quæ quidem ratione sinistrum crus e directo dextri, & contra dextrum e directo sinistri situm intelligitur, quod ex hoc in illud vena rectis fibris concedit: Estque necessaria consideratu hæc fibrarum rectitudo, non certe, quod trahendo iuuent, quandoquidem sanguinis redundantis expulsio solarum transuersarum fibrarum munus sit: sed quod excretrix facultas in ista fibrarum rectitudine actionem suam expeditius obeat. Proinde etsi rectas fibras nihil trahendo in sanguinis missione conferre concedimus, tamen plus sanguinis & expeditius ab iis partibus, in quas diriguntur, aut rectæ fibræ perueniunt, quam ab aliis prolicat. Si quidem ex fluxionis conditione & procliuitate, humores recto fibrarum ductu promptius & facilius currunt ac fluunt. Quare non temere in morborum iudiciis humorum cursus omnes, qui hoc modo per directum fiunt, laudantur. Contra vituperantur, qui ordine inuerso oblique in transuersum feruntur. Rectitudo igitur partium, & venarum inter se consensus, societas quædam & communicatio est, quæ nusquam reperitur, nisi simul etiam fibrarum rectitudo adsit. Hæc itaque perpetuo Medico obseruanda erit, siue reuulsione, siue deriuatione, siue vacuatione utendum sit. Nam in reuulsione humorum nec dextrum, nec sinistrum, nec sursum, nec deorsum, nec foras, nec intro contraria sunt, nisi & in venarum fibrarumque recto cursu collocentur. Sic quidem sinistrum latus dextro contrarium non est, nisi ab hoc in illud communis & directæ sit venarum societas, per quam sinistrum latus incisum e dextro euocare potest. Quod diserte Galenus multis in locis suorum monumentorum testatur, præsertim vero *lib. 13. Ther. method. cap. 11. & lib. 2. ad Glauconem, cap. 7.* ubi ita scriptum reliquit: *Influentium adhuc humorum retractio reuulsione, obsidentium vero iam lo-*

Quot venæ hodie secantur.

Interna vena quæ dicitur tunda. Externa.

Media.

Venæ poplitis, & malleoli. Renes ambigunt.

In sanguinis missione ne rectitudo semper obseruanda. Rectitudo quid.

Comunes
venæ.

cū derinatio, medela eſt. Vtunque autem vacuationis genus per communes venas fieri debet. Com-
munes autem vocat venas, quæ cum laborante parte communicantiam & ſocietatem
quandam obtinent. Cauſſam vero, cur per communes venas tum reuellendum, tum
deriuandum ſit, Galenus in libello de Artis conſtitutione hanc ſane reddit: *Ex proximio-
ribus enim, inquit, & communibus laboranti parti venis, vacuatio optima & facillima ſit.* Quin-
etiam rationi conſentaneum eſt, eam potiffimum incidendam eſſe venam, quæ cum ea,
quæ in afflictam partem inferitur, ſocietate cognationemq; præcipuam habet. Quip-
pe per illam ipſam a laborante particula humor pernicioſus nō modo promptiſſime, ſed
etiā celerrime & potentiſſime detrahitur vacuaturq;. Cum itaq; propter cōmunica-
tionem illam ſocietatemue expeditior eius, qui ad ægram partem iam confluit, aut flu-
xurus eſt, ſanguinis fiat reuulſio, & eius, qui iam confluit, a parte laborante derinatio, & B
vacuatio, debet certe hæc ipſa ſummo ſtudio in omni ſanguinis miſſione ac vacuatione
a Medico obſeruari, quæ certe quadruplex eſſe ſolet. Vna eſt, quæ ſanguinē in aliquam
corporis partem procubiturum & illapſurum duntaxat retrahit & reuellit, hoc eſt, in
contrariū trahit. Neque enim reuulſio, quæ Græcis *ἀντίρροια* dicitur, aliud eſt, quā humo-
rum in contrarium tractus. Contrarium autem eſt, quod e contrario fluxionis in recto ve-
næ proceſſu ſitum eſt. Eius certe miſſionis ſanguinis vſus eſſe debet, quū a futuro mor-
bo tueri Medico conſilium eſt. Siquidem tum ſola cōfluxuri ſanguinis reuulſio ſufficit,
quod nihil adhuc humoris in vllam corporis partem confluerit. Atq; hæc quidem ad
maxime longinquas partes fieri debet. Id quod Hipp. in lib. de Officium natura, iis cōfirmat
verbis: *Danda, inquit, opera eſt, ut quam longiſſime a locis, ubi dolor & ſanguis cogi didicit, vena-
rum inciſiones fiant.* Sic enim haud magna repente mutatio fiet, & conſuetudinē mutaueris, ne am-
plius eo loci ſanguis coeat, Loqui vero Hippocratē de ea venæ ſectiōne, quæ a morbo tue-
tur, & præſeruat, hæc verba, *Vbi dolor & ſanguis cogi didicit:* & item hæc, *Conſuetudinem mu-
taueris:* ſatis indicāt. Sic Gal. etiam c. 11. de Curandiratione per ſang. miſſionē, ad reuellendam
menſtruam purgationem mulierum venam in gibbero ſecandam eſſe præcipit, nulla a-
lia de cauſſa, quā quod tum ſatis ſit medico, profluxurum ad vterum ſanguinē, in con-
trariū, & ad maxime longinqua trahere. Altera ſanguinis miſſio eſt, qua iam illapſi hu-
moris tractus ad vicina & in latus ſit. Hæc Græcis *παρὰ πλάγιν*, Latinis *derinatio*, quod ſan-
guinem e laborante parte in vicinum locum deriuat, dicitur. Fit, verbi gratia, in pleuri-
tide, quando ſanguis a venis coſtas phlegmone obſeſſas alentibus in cauam trāſfertur D
venam. Per has enim & coſtæ & alimētum capēſſunt, & noxii humores præter naturam
in eaſdem influunt. Eius vſus eſt, quando humorem laborantem partem iam obſiden-
tem in latus & vicina trahere loca Medicus ſtudet. Tertia ſanguinis miſſio eſt, qua pro-
cumbens iam & illabens ſanguis reuellitur ſimul & deriuat. Quare eius vſus tum maxi-
me erit, quando phlegmone in generatione adhuc eſt, q. ſcil. in ea pars ſanguinis adhuc
ad laborantem locum confluat, & pars iam ei ipſi fluxerit. Is. n. qui nunc in partem irruit
& impetū facit, reuulſionem: is aut, qui iam ſubſtitit, atq; in ea hæret, derinationē requi-
rit. Quarta ſanguinis vacuandi ſpecies eſt, q. ex ipſa laborante ſit parte. Ea vtendū, quan-
do vīq; adeo fluxio inſarcta eſt parti laboranti, vt omni fluēdi remeandiq; habilitate ſit
orbata, q. in diuturnis & inueteratis phlegmonibus frequēs eſt, in quib. ſcirrhoſæ quæ-
dam reliquiæ inhærent. Hæc cucurbitularum maxime ope completur, & cōmodiſſime
ſimplex, q. ſcil. duntaxat vacuet, citra id, quod reuellat aut deriuat, appellatur. Fit enim
ex ipſa tantum laborante parte, adeoq; nec ad contraria, nec ad propinqua trahere po-
teſt. Ex iis igitur, quæ hætenus dicta ſunt, perſpicuū euadit, quæ vena in quouis partium
affectu ſecāda ſit. In plenitudine n. cui nulla partis phlegmone aſſiſtit, illinc plurimum
detrahere ſanguinē par eſt, vbi fons & origo eſt eiufdem. Proinde cōmodiſſime vſuq;
maximo tundeſ vena dextri gibberi interior, quæ a iecore, vtpote ſanguinis, fonte, plu-
rimum prolicit. Eadē prorsus ratione in febribus citra phlegmonē, continentibus, tam
ſimplicibus, quam putridis, continuis & omnib. aliis, in quibus venæ ſectiō cōuenit, in-
terior dextri gibberi vena incidi debet, demtra quartana, quæ interiorem ſiniſtri brachii F
flagitat. Quod ſi vero phlegmone pars aliqua corporis obſeſſa fuerit, eā venam, q. recti-
tudinē cum laborante particula habet, incidere oportet: verbi gratia, in dextra pleuri-
tide, interior dextri gibberi vena tundenda venit, q. huic cum dextris coſtis rectitudo,
communio, & ſocietas ſit, adeoque promte, quod ab ea parte ſimul reuellat, deriuat, at-
que va-

Quadruplex ſanguinis miſſio, atque vacuatio. Reuulſio quid. Contrariū.

Derinatio.

Vacuatio ſimplex.

Quæ vena in quouis partium affectu ſecāda ſit. In plenitudine. In febribus.

In phlegmonibus partium.

- A** que vacuet, pleuritim hanc adiuuat. Reuellit namq, quia sanguinem ad costas procumbentem in contrarium trahit. Deriuat, quod sanguinem agram partem obsidentem ad vicinam, nempe cauam venam transfert. Hunc reuulsum & translatum tandem extra corpus educit, & vacuat. Secta autem in sinistro brachio vena, dextram pleuritidem nō adimit: sed cum illi nulla sit, cum agra particula rectitudo & societas, bonum duntaxat sanguinem educit, noxio in laborante particula relicto aut puro sanguini venarum permiscet; & quod frequentissime accidit, sinistram pleuritidem inuenit. Dextræ autem pleuritidis non ab re exemplo vsi sumus, quia sinistræ alia est ratio, vt alibi copiose monstrauimus. Verum obstat huic rationi sciolus quispiam, & dicit: *Quomodo a dextro latere in sinistrum transferetur sanguis noxius, quum, se etiam auctore, illis inter se nulli sit societas, ac rectitudo?* Respondeo, Duabus de causis. Vna, quod vacui ratio hoc ipsum requirat. Necesse enim est, in vacuati sanguinis locum, vicinis præsertim venis vehementer inanitis, alium succedere. Trahentibus itaq; propter inopiam venis in aduersa & sinistra parte agra partes prompte concedent, vtpote quibus sanguis iam non tantum sua copia, sed & vitiosa qualitate molestus est. Quod si tamen sua sponte partes agra non concederent, aut a se propellerent, tamen vt trahentibus partibus, vtpote fortioribus se & adhuc integris, aliquid concedant, necesse est. Trahit enim perpetuo ab imbecilliore pars robustior. Altera, quia expultrix facultas, quæ suum munus per transuersas fibras, vt dictum est, obit, a noxio & redundante in afflicta parte sanguine irritata, ocyssime in oppositum latus iam vacuatum, atque adeo, tum vacui ratione, tum quia validior est, ad se trahens, transfert. Quod si vero aduersarius elabi cupiens dicat, latus sinistram non a dextro, in quo vitiosus sanguis est, sed a reliquis potius partibus, in quibus bonus est sanguis, trahere: reponendum illi, fieri, quod imaginatur, non posse. Hæc namq; partes, in quibus probus hæret sanguis, vtpote validiores, sinistro lateri iam vacuato, adeoq; imbecilliore non nihil, harum saltem collatione, reddito, nihil cōcedent. Nisi fateri velint, imbecillius ab eo, quod se fortius est, quod tamen fieri nequit, trahere posse. Ergo cum in phlegmonibus omne Medici cōsiliū eo spectet, vt a loco phlegmone obfesso plus sanguinis celerius ac potentius, quam a reliquis partibus hauriat, vena certe incidenda erit, quæ in directo situ partis laborantis est. Sic enim & naturam vna cum ratione, & Hippocratem, summum virum, imitabimur, qui in pleuritide interiorem manus venam secare iubet ab eo latere, quod e directo est. Idem quoq; præcipit grauissimus auctor, & post Hippocratem maximus Galenus, qui non solum in pleuritide dextra, verum etiam in iecoris phlegmone (cui tamen venæ omnes societate iunguntur) interiorem dextræ manus aperiendam iubet, lib. 13. Ther. meth. c. 11. iis quidem verbis: *Cum iecur iam phlegmonem contrahere cœpit, pariter tum reuellendus, tum vacuandus, qui ad iecur fluit sanguis est, interna in dextro gibbero infecta vena, propterea quod e directo est, & ampla via cum vena, quæ cana dicitur, societatem habet.* Quibus sane verbis primam eam venę sectionem, quæ e directo est, non solum reuellere, sed & deriuare, ac vacuare diserte docet. Vacuationis enim voce hic, vt sæpe alibi, quemadmodum c. 16. libri de curan. ratione per sang. mis. ostendimus, deriuationem intelligit. Atq; iis certe venis, quæ sunt in directo situ, tãtam vim attribuit, vt non comparente interna, mediam secandã iubeat, & si nec ea se profert, ad humeralem confugere malit, quam ad eam, quæ est in aduersa manu. Non solum aut in iecoris, sed & omnium aliarum partium phlegmonib. in summa, perpetuo, ibidem eam, quæ e directo est, tundendam venam esse docet. Atq; eius rei rationem alibi exponit, nempe c. 15. lib. de curan. ratio. per sang. missio. vbi inquit: *Reuulsio n. e directo facta, euidentē vtilitatem celeriter offert: at e transuerso, nequaquã. Si reuulsionis causã, inquit ibidē, venã incidas, e directo quidē sanguine profuente, euidentē protinus cōmoditatem percipies: si vero contra venã feces, nihil omnino proficies.* Et paulo post: *Si pleuritis, quæ e directo laborantis lateris est vena, incidatur, euidentissimū sapenumero subsidium ostendit: sin ex manu aduersa: aut omnino obscurū, aut longo post tempore.* Quippe, quæ per finitimam amplam, & e directo sitam venam fit reuulsio, validissime, plurimū, & celeriter a phlegmone obfessa parte deducit & reuocat, priusq; putrē & inquinatū, quam ex reliquo corpore benignum & salutarem sanguinem educit. Dein Galenus maiore vsu & emolumento venam e directo sitam secari non solum, quum fluxio substitit, sed & statim inter initia, vbi iam inuadit phlegmone iecoris & lateris, præcitatis verbis innuit. Nam ea venę sectio omnia confert & impertit, reuulsionem, deriuationem, & vacuationem.

Obiectio diluitur.

Alia.

4. Videtur acut. 67.

Vacuatio nem pro deriuatione Galeni sæpe usurpat.

nem. Quippe humorem, qui ex vena caua fluebat in iecur, vel in latus, retro in cauam reuellit venam: impactum iecori aut lateri in eam ipsam venam cauam trāsferendo deriuat: vtrumq; vero foras vacuat, nec non iecur latusue, adiacentesq; illis amplas venas exhaurit. Quumq; hac ratione pars laborans magis, quam cetera exinanita fuerit, si ad penuriam vsque detractum sit, vix denuo pars ea alia humorum fluxione conficiabitur, nisi forte nouo viuēdi errore peccetur. Distantes enim indigentia auidæ, proprium sanguinem elabi non sinent, nec pars ægra, nisi dolor aut calor restet vehemens, ab illis eripiet: imbecilla quippe est nec multo egeralimēto. Vbi mox ab emissio sanguine phlegmones dolor placatur, tamen postea nullo ægroti aut affidentium errore recrudescit, signum hoc esto, nec ad indigentiam, nec satis detractum fuisse. Quare quod defecit, supplendum erit, eadem vena de integro incisa: sed tantisper tamen a priore sectione intermittendum est, dum aliquid humorum corporis remigret in venas, quod non ante quartam horam fieri potest. Quæ diximus, nihil cum iis pugnant, quæ *libr. 13. Ther. method. cap. 13.* Galenus scribit, vbi reuulsionem ad distantissima fieri, præcipit, iis quidem verbis: *Siquidem longissime a tentata fluxione parte, quod redundat, reuellere, nequaquam ad eam trahere, conuenit.* Nam venæ sectio non trahit ad ægram partem, sed ab ea reuellit, deriuat in latus, & vacuat, vt dictum est. Quare hoc Galeni præceptum ad venæ sectionem detorqueri, nec potest, nec debet, sed ad ea potius præsidia, quæ ad laborantem partem humorum defluxum reuellunt, qualia sunt purgatio, vomitus, cucurbitulæ, vrinam mouentia medicamenta, & id genus alia, *de quibus eo loci Galenus nominatim mentionem facit.* Quamquam autem venæ etiam sectione interdum vtimur, quæ ad maxime longinquas partes reuellit, tamen hoc nō fit, nisi vbi a futuro morbo, vt diximus, tueri Medici cōsiliū est. Vbi autem partes iam phlegmone laborare cœperint, vena in distantissima parte aperienda minime erit. Nam hæc ipsa noxium humorem ignauius tardiusq; concitat, neque hunc a sede laborante abducit, sed benignum duntaxat tollit, & si copiosa fuerit, hæc sanguinis missio, vitiosum e propria sede raptum sanguinem cum vtili salutarique confundit. Est autem in phlegmone celerius & validius ab ægra sede, *Galenolibr. 2. Viſt. acut. com. 10. etiam attestante,* tum reuellendum, tum vacuandum: & vt ibidem Hippocrates quoque docet, sanguis eousq; detrahendus, quoad colorem mutauerit, quorum nullum certe consequemur, nisi quum amplam venam e directo loci laborantis sitam tundimus, vtpote, quæ hæc omnia commodissime præstare queat. Non est igitur vlla in phlegmone ex distantissimis partibus sanguis reuellendus: sed tum solum, quando futuram fluxionem prohibere studemus, vt scilicet ea fluxio in tractum nouæ viæ longiorem conuersa, sensim a pristina consuetudine citra virium offensionem desciscat. Ex quibus promte iam intelligi perspicique potest, quanto in errore versentur Arabes, & qui eorum præceptis instituti sunt, propterea quod arbitrantur in phlegmonibus non eam, quæ in rectum, sed potius eam, quæ ex aduerso est, venam incidendam esse. Nec huius sui dogmatis aliam rationem prætexunt, nisi quod eiusdem lateris venam fluxionis impetum augere dicunt: quod tamen nos constanter negamus, & a veritate, qua nihil antiquius esse debet, quod asserūt, omnino abhorreere dicimus. Fiunt enim internæ phlegmones, de quibus hic potissimum nobis sermo est, vbi sanguis præter naturam in aliquam corporis partem, verbi gratia, in pleuritide in latus, irruit. Secta itaq; interiore eiusdem brachii vena, sanguis elatere in cauam venam reuocatur, hincque per gibberum foras profunditur. Quapropter aperta hac vena, fluunt quidem humores, minime tamen in partem ægram, sed foras, quod ægrotanti vrile est. Sed instant: *In vacuatorum locum, vt alii succedant humores est necesse, igitur augetur fluxus.* Respondeo: Neutrum fieri oportet. Si enim solus humorum excessus tollatur, in eorum locum non fluent alii, quod neque in sanis, adeoque transmittentibus partibus, vt pellant, est excessus: neque in recipientibus seu ægris, vt eius ratione attrahant, est defectus. Detur tamen, quoniam, venis vehemēter vacuatis, fieri potest, alios in vacuatorum succedere locum humores, iam fluent humores: fatemur, sed non præter naturam: quoniam neque vitiosi (deteriores enim vacuati sunt) neque multi, cum in aliis corporis partibus, vtpote sanis, nulla sit humorum redundantia. Trahent itaque, tum partes vacuatae, ac viciniore venæ sectæ alimentum a distantioribus, ac plenioribus, propter totius corporis consensum, sed ea duntaxat quantitate, qua tenuiter refici possunt. Minus igitur attrahent, quam reliquerunt

Eadem de
integro
vena quā
do cœden-
da.
Obiectio
diluitur.

Quando
ad maxi-
me distan-
tia loca re-
uellendū.

In distan-
tissima
parte, vbi
v. scera
phlegmo-
ne labo-
rant, vena
non tun-
denda.

Arabum
& qui eo-
rum præ-
cepta se-
quuntur
M. dico-
rum im-
mēsus er-
ror.

Obiectio
diluitur.

- A** runt naturalis proportionis comparatione, alias vis minor traheret maiorem, quod absurditate non vacaret. Et quid multis opus est verbis? Præstat certe in partibus morbo vicinis esse tam modicum alimentum, ut aliunde trahant, quam esse tam multum; ut vel in alias partes pellant, vel trahentibus concedant. *At saltem, inquit, quum ingens erit plenitudo, ne fluxio geminetur, copia primum, vel ex inferiore pedis vena, quam Saphenam vocant, vel ex aduersi brachii interiore subtrahenda, mox vero reliqua ex eodem latere sectione demenda erunt.* Verum quid hoc quæso consilii est, ægrum toties torquere, ac veluti de industria excarnificare, quem semel possis hoc morbo leuare? Sectio enim venæ e directo laborantis partis, qua ad indigentiam profunditur sanguis, copiam e plenissimo fonte haurit, simulque phlegmone obfessam partem releuat, nullum metum nouæ fluxionis affrens. At ex aliis venis, quæ e directo non sunt, aut in distantissimis locis, detractus sanguis solam copiam imminuit, nec quicquam tamen deprauati elicit sanguinis, adeoque oppressæ parti leuamento non est. Etsi casu eueniat præuacuationis multitudine ægræ partem exinaniri, putris tamē eius partis humor puro venarū sanguini permiscebitur, reddeturque malum, quod corrigendum fuerat, pristino deterius. Ut hanc vnam mehercle ob causam omnibus iis, qui ad Arabum, ac ineptorum quorundam hominū doctrinam impuram, scabram, præposteram, barbaram, fucum lectori facientem, malæ fidei, vacillan-
B tem, garrulam, intricatam, sibi non constantem, breuiter bonorum ingeniorum scopolum, defecerunt, ad castissimam illam ac purissimam Græcorum scholam sit redeundum, nisi opere oleique amissione, laborumque omnium iactura, in iis sentibus, vnde exitus
C illis nullus subinde patebit, tanquam ad Syrenios scopulos consenescere velint. Verum ut ii, qui mordicus Arabum præcepta tenent, errori suo patrociniū aliquod quærant, non verentur profecto nobis obtrudere Galenum, inter Græcos summæ auctoritatis, Medicum, quem manibus & pedibus in Arabum concedere sententiam dicunt, *lib. 13. Ther. meth. c. 5.* vbi altero crure male habere, reliquum esse scarificandum præcipit. Quasi vero is locus illorum errori patrocinari quicquam possit, quum tñ constet, illum iis verbis aliud non docere, nisi iis membris, quæ læsa sunt, non esse adhibenda eius generis remedia, quæ fluxionem ad ea concitare possunt, ut sunt cucurbitulæ, tum leues, tum cū scarificatione adhibitæ. Quanquā & ipsa scarificatio per se, eo quod dolorē excitet, fluxionem ad ægram partem trahit. Quapropter rectissime dextro crure laborante sinistrum
D esse scarificandū, ut quæ longissime a tentata fluxione parte, quæ redundat, reuellat, Galenus hortatur. Ita n. esse faciendum alibi etiam suadet, nempe *ca. 95. Artis medica*, vbi ita scriptum reliquit: *Si vniuersum corpus plus a quo plenum fuerit, per ægram partem minime vacuandum. Nam si scarificationibus, aut sectionibus sensibilibus vacuabimus, plus ratione excitati doloris attrahemus.* Sed dices, Cur non crure laborante manum potius, quam reliquū crus, quandoquidē ibidem manu laborante crus scarificandū esse non obscuris verbis innuat, scarificandum esse docuit? Respondeo, Quod nulla sit rectitudo manus dextræ cū sinistra, aut contra sinistræ cum dextra, sed potius cū crurib. manus rectitudinem obtineant, ut ex processu venarū, & earūdem fibris manifestissimum sit. Præterea diuersitatis non exigua subest ratio, hæc nimirum: *Crurib. laborantibus, non facile sursum humores trahuntur. Qui enim fieri possit, ut id quod graue est, expedite sursum traheretur? promptius n. in partes scarificatione vacuatas, e vicinis & superne deorsum, quam inferne sursum, humores ferentur.* Accedit, quod manus magis distent a cruribus, quam ut facile eo aliquid a cruribus trahi & reuelli queat. Nam manus scarificata, aut in ea vena secta, prius vniuersus, qui est in ea vena, & vicinarum partium, sanguis vacuandus erit, quam sequatur is, qui in crure est. Hinc est, quod in phlegmone crurum, de qua hic Galeno sermo est, non in manu, sed in altero, quod sanum adhuc est, crure venam secemus. Longior enim a cruribus ad manus distantia est, quam ut ab iis reuelli & vacuare celeriter, quod in phlegmone requiritur, possis. Alterum vero crus laboranti multo vicinior est, & cum eo quoque, ut antea ostensum est, rectitudinem & communitatem obtinet. Quapropter ex eius venis, utpote vicinioribus & ægræ parti communibus, vacuatio fit optima & facilima, Galeno
E etiam in libello de artis constitutione teste. Verum iterum instabunt aduersarii dicentes: Si crura inter se rectitudinem, propter vena cava circa lumborum vertebrae diuersionem habent, qui sit, ut Galenus cap. 19. libelli de curan. ratio. per sanguinis missionem in podagra ex gibbero detrahendum esse sanguinem, & nequaquam ex cruribus inubeat? Respondeo, Duabus de causis: vna, quod in podagra vtrunque crus, etsi non semper vno & eodem tempore, tamen per vi-

Obiectio
alia.

Arabum
d: crura
qualis.

Obiectio
dissoluitur.

Cur autem
ro crure
laborante,
reliquum
scarifican-
dum sit.

Alia obiectio.

Alia.

ces, neque ex longis temporum interuallis, laboret. Non potest itaq; nec etiam deber, A
in ægris cruribus reuulsionis causa incidi vena, aut scarificatio adhiberi, sed in partibus
distantibus, vt scilicet illabentium humorum tractus in contrarium fieri possit. Altera,
quod in podagra sanguis sua duntaxat copia, quæ præter naturam ad crura decumbit,
peccet & minime, vt in phlegmone, putris ac vitiosus sit. Quapropter licet tum, imo ne-
cessarium est, ad prohibendum ad crura defluxum, minuendamq; partium transmittentium
copiam, in distantiore parte secare venam, quod tum sola sufficiat reuulsio, se-
cus atque in phlegmone cruris, vbi etiam vacuatione ex laborante parte opus est. Quo-
circa tum venam in altero crure, vt pote quod cum laborante rectitudinem habeat, in-
cidere oportet. Atque hæc copiosius a nobis dicta sunt, vt Arabum perniciosum sane,
hodie tamen vsitatum errorem, non solum detegeremus, sed & confutarem. B

Quando ad animi defectionem vsque sanguis mittendus. C A P. VI.

QUum in virium constantia & firmitudine morbus inuadet magnus & periculosus,
vasa immoderatiores copia, vt in bono athletarum habitu, aut continentibus febri-
bus accidit, distendens, vberior certe sanguinis missio, quæ affectus magnitudini vsque-
quaque responder, eumque lenire potest, requiritur. Imo in eo quicquid præponderat,
& mediocritatis limites transcendit, sum mouere maiorum & præstantissimorum Me-
dicorum institutis conceditur, expeditque, Hippocrate & Galeno primariis Medicis

In arden-
tissimis fe-
bribus
quare ad
animi de-
fectionem
mittendus
sanguis.

In maxi-
mis phle-
gmonib.
In vhe-
mentissi-
mis dolo-
ribus.

Obiectio
diluatur.

Ad animi
defectio-
nem vsq;
vacuandū
esse, quo-
modo in-
telligen-
dum.

testibus, vsque ad animi defectionem ducere, si eger tolerare possit. Et Galenus quidem
sectio 1. Aphor. commen. 23. multisque aliis locis firmissime asseuerat, in ardentissimis febri-
bus, in maximis phlegmonibus, & in vehementissimis doloribus, experientia se didi-
cisse, maximo ægrotum commodo huiuscemodi vacuationem conferre, modo vires
sint validæ. In ardentissimis vtique febribus, quod earundem feruor statim extingua-
tur, habitusq; corporis refrigeretur, plurimè etiam alius citetur, aut sudores emanent,
conducit. In maximis phlegmonibus, quod hoc præsidio feruentis sanguinis copia edu-
catur, & obfessa phlegmone pars refrigeretur, atque ne in aliquam partem principem
feruentis sanguinis multitudo ingruat, prohibeatur. In vehementissimis dolorib. quod
sanguinis affluxum ad partem quam dolor vexat inhibeat. Cum enim dolor omnis at-
trahat, & fluxiones commoueat, necesse est, vt e vena, quæ societatem cum dolente par-
te obtinet, sanguinem mittamus, ne scilicet in hanc superuacuum sanguis decumbat, &
in ea phlegmonem excitet. Sæpe etiam excretoria facultas causam, quæ dolorem exci-
tat, eiicere dum properat, phlegmonem in particula excitat. Quum enim primis suis
conatibus nihil profecit, vehementius aggressa, Galeno etiam libr. 13. Ther. method. cap.
3. teste, quod infestat expellere sanguinis aliquid ex superpositis partibus in afflicta
simul exprimit. Atque hinc fit, quod ex dolore particula proportionem confluentis in
eum humoris, in tumorem attollitur. Atqui hic nobis forte quispiam alium Gale-
ni locum, cum iis, quæ diximus ex diametro pugnantem, obrudet, in quo diserte
prohibet, in doloribus confertim vacuandum esse. Is autem est in libr. 1. ad Glauconem
cap. 13. vbi ita inquit: *Quum vehemens vigilia, dolorque grauis agrum infestat, subitas & mul-
tas vacuationes vitare oportet.* Sed si recte commemorati iam loci expendantur, &
diligenter quid vtrobique doloris nomine intelligatur, consideretur, nihil pugnare vi-
debuntur. Siquidem vbi in vehementissimis doloribus ad animi defectionem vsq; va-
cuandum esse hortatur Galenus, illic certe dolor pro affectu dolorifico, aut in quo do-
lor excitatur accipitur. Quo sane modo sæpe ab Hippocrate, Galeno sectio 2. Aphor. Com-
men. 6. attestante, vsurpatur. Vbi vero cauendas esse subitas ac multas vacuationes in do-
loribus iubet, hic quidem dolor pro symptomate, non pro affectu dolorifico sumitur.
Loquitur autem eo loci potissimum de dolore, qui febris symptoma est. Nam illic Ga-
lenus ex professo de continuarum febrium, quæ cum symptomatis consistunt, curatio-
nibus agit. Vera esse, quæ dicimus, confirmant ea, quæ ibidem scribit Galenus, quum ra-
tionem reddit, cur non affatim confertimque vacuandum sit, inquit: *Sed & aliquid*
symptomatis relinquendum est. His enim verbis nō vniuersam copiam noxiorum humorum
vacuandam esse, sed aliquid dolori, qui vires mirifice eiicere solet, relinquendum esse
innuit. Parcius itaque, tum vacuandum, ne dolor in febribus excitatus vires omnino
prosternat. Ceterum veteres, quando dicunt ad animi vsque defectionem mittendum
esse sanguinem, vacuandumue, non, vt nonnulli existimant, defectionem excludunt,
sed

B

C

D

E

F

A sed volunt, ut hæc ipsa vberiore vacuationem consequatur, quemadmodum fufius in enarratione aphorismi tertii primæ sectionis aphorismorum innotrauimus. Hanc enim defecti-
tionem in malis enumeratis tanquam legitimum vacuationis modum statuunt. Verum nõ simpliciter, nec sine iudicio sanguinem vsq; ad lipothymiam animiue defectio-
nem mittere permittit, sed quum iam vires præ vacuatione manifeste ingrauescunt, &
initium patiuntur defectiõis animi, atq; lipothymia, cohibendum esse, neq; vnquam
vacuationes ad extremum, & vsque ad syncopen deducendas iubent. Syncope enim o-
mnium virium præceps lapsus est, adeo, ut qui illa opprimuntur, nec audiant, nec vide-
ant, nec sentiant, nec moueantur, & ut vno verbo expedium, omnes functiones quasi
interceptas habent. Lipothymia autem mitior est, utpote in qua etiamnum ægrotus lo-

Lipothy-
mia.

B quitur, audit, videt, agnoscitque præsentis. Nam in ea spirituum influentium ratum ex-
solutio fit, remanentibus viribus principibus partibus insitis ac congenitis. Hinc alio no-
mine Græcis *ἐκλυσις*, id est, *exsolutio* dicitur. Et si igitur in *ἀσποθυμία* siue animi deliquio spi-
ritus iam dicti exsoluuntur, & vires aliquo modo dispereunt, attamen ex insitis atq; con-
genitaliæ denuo suscitantur, e quibus facile æger recreari ac pristinas vires recuperare
potest. Si itaq; vires illæ, quæ principibus partibus insitæ sunt, languent, ægerq; hoc no-
mine imbecillis est, tum nequaquam ad animi deliquium vacuandum erit, etiam si hoc
morbus requirit, quod scilicet si illud obrepserit, instauratio nulla fiat, sed hoc mox synco-
pe, & eam ipsa mors sequatur. Tentandū igitur est, exsuperantem humorem educere,
quoad vires tolerat, ut *infra latius dicitur*. Quoniam igitur syncope mortis imago est, quæ

C affidentes perterret, & ægrum in maximum vitæ discrimen adducit, in eam nunquam
Medicus vacuatione ægrotum præcipitet, modo existimationem suam inuiolatam tue-
ri, neq; in vllas obrectatorum reprehensiones incurrere velit. Conducibilis itaq; est æ-
grū diutius torqueri, quam vna cū morbo vitam omnē profundere. Nec recte morbum
demit, qui cum illo ægrum de medio tollit. Atqui dices, *quid igitur faciendum, si cū virium*
imbecillitate magna redundabit humorum copia, cuius ratione ut morbum depellamus, multa certe
vacuatio necessaria erit? Tum enim semel & vniuersæ facta vacuatio citra maximum periculum ad-
hiberi non potest, utpote quam vires tolerare nequeant. Respondeo: Si per virium imbecillita-
tem nequit vniuersa vacuatio compleri, cum præstantior virium, quam morbi sit obser-
uatio, partitione vtendum, idq; summo iudicio, summaq; prudentia adhibitis. Partitio

Quando
parcienda
& iteran-
da sit venæ
sectio.

D autem fit ex modicis interuallis, atq; vel dissoluto vinculo, vel digito indito vulnere in-
termittatur tantisper, dum cibus boni succi, & morbo minime aduersis vires reficiantur.
Interdum autem hora vna, interdum plures ad virium instaurationem necessariae sunt.
Optimū vero, non vltra diem prorogare: ac bis sanguinē, si vires sinunt, eodem die mit-
tere, præsertim in vniuersalib. hoc est, totius corporis morbis, qui certe nullā cunctatio-
nem ferunt, siquidē properandum, priusquā putredo, aut alia inualecant mala, quātum
expedit educere. In partiū autē morbis, præsertim earundē phlegmonib. partitas vacua-
tiones longiore interuallo seiungi oportet. Nam cū harū materia e vasis in partiū molem
cōfluxerit, vtile est repetitam sectionē in posterum, quandoq; in perendinū differre, ut
hoc tps spatio, corrupti humores ex ægra sede in exhaustas remigrēt venas, quos exin-
de repetita sectio promptius eripiet. Nec humores illi, quos pars laborās sensim vno alte-
rouē die eo deposuit, ppter ea q; corrupti sunt, illic relinqui debēt, etiam si dolores con-
quieuerunt. Venenatā autē materiam, ut in pestilēti bubone, vel carbunculo euenit, non
in posterū diē relinques, sed eo ipso die festināter, plenitudine totius corporis præsentē,
iterata vacuatione demoliaris, ne pestilēs & venenata contagio diutius in venis hæreat.

Quo tempore, qua die, quaque hora sanguis mittendus. CAP. VII.

NO N temere de tempore, quo vena secanda venit, inquiritur. Quippe vena intem-
pestiue secta, spiritū pariter cum sanguine exhaurit, innatum calorē eripit, & dissi-
pat, principes partes refrigerat, ac earundem calorē adeo exstinguit, ut quasi eneruatæ
ac debilitatę languescant. Quapropter iis, qui nulla necessitate pluries in anno venas se-
cant, plurima incommoda incidunt. Et si n. frequens venæ sectio, detractō quasi ponde-
re corpus leuare videt, quoniam tñ non parum spiritus calorisq; demit, maturam sene-
ctutem, & hanc grauiorib. morbis obnoxiam reddit: cuiusmodi sunt cachexia, hydrops,
arthritis, tremor, paralyxis, apoplexia, & id genus alii. Impensius enim refrigerato nati-
uo calore, primogenioq; humido imminuto, viscera languescunt, cruditas dominatur,

Venæ in-
tempesti-
ue sectæ
noxa.

Ab initio
secunda
vena.

Fen. 4.
Cap. 2. ca.
20.

Auicennę
ingens er-
ratum.

Quo die
secunda ve-
na.

Qua hora
secunda
vena.

quæ tot malorum causa sit, atque origo. Dein, si iusta occasio secundæ venæ a Medico A
neglecta fuerit, tum parum aut nihil prodest, imo sæpenumero obest, si sanguinem de-
inceps mittat. Debet itaque venæ sectio administrari, mox & ineunte morbo. Hoco-
nim pacto quicquid morbi in posterum gignendum est, prohibebitur: quicquid vero ge-
nitum & procreatum iam est, profligabitur. Sic in febribus, priusquam sanguinis moles
feruoris incēdio torreatur, aut valida putredo inuale scat, maturanda est sanguinis mis-
sio. Sic si phlegmonum initio hoc genus præsidii tentetur, proculdubio ipsarum incre-
mentum arcebitur, plerunque & hæc omnino sanabuntur. Qui enim in partem confluit
humor, nondum hæret, & profluentis sanguinis impetum cursumque promte sequitur.
Accedit, quod vires per initia firmæ sint & constantes, nec admodum iis dissimiles,
quæ pridem erant integra valetudine. Si quo igitur tempore, ipso maxime initio hoc B
auxilii genus ægri tolerabunt. Præterea, venæ sectio morbis, quibus conuenit, incipien-
tibus, si decernatur, sublata multitudine, quod reliquum erit, facilius natura concoquet
atque euincet. His igitur de causis acceleranda venæ sectio, si modo ventriculus, pri-
mæque venæ nulla humoris corruptela, vel cruditate, vel cibo semicocto refertæ sunt,
ut infra latius dicetur. Vt merito explodenda veniat Auicennæ opinio, qui incipienti
morbo prorsus inutilem ac plane aduersam venæ sectionem nugatur, & concoctionem
expectandam censet. Quum vero sciam ab aliis peruersam hanc opinionem pluribus
& validissimis argumentis confutatam esse, lubens mihi tempero, & ad alia, quæ restant
explicanda, festino. Vt autem vniuersalium temporum, ita particularium, & dierum,
quibus morbi recurrunt, ratio habenda erit, nec vena, nisi mitescente iam & remitten- C
te, aut intermittente morbo secunda. In accessionibus itaque ab ea omnino temperan-
dum est, quandoquidem neque natura, tum sanguis excretionem ullam molitur. Si
quæ vero forte excretiones tum incidunt, solius morbi feruore impetuque fiunt. *Præ-
terea,* cum in accessionibus humores maxime quodam quasi æstu incitati efferuescant,
obturbatique permisceantur, nulla tum iusta eorum fieri potest secretio: quapro-
pter in ea vena resignari haud debet. Quandoque etiam vel præcautionis vel
curationis gratia potestas datur sanguini mittendo horam deligere, conuenientior
erit matutina, *Galeno etiam cap. 21. libri de curandi ratione per sanguinis missionem suffragante,*
quam pomeridiana. Siquidem a Solis exortu sanguis suscitatur, viget, atque domina-
tur, ipsoque diei lumine tenuis, serenus, fluxuique fit aptior, maxime secunda tertiaque D
diei hora. Proinde non statim a somno excitis, sed antea horam circiter vnam vigilantibus,
& postquam hesternum cibum probe concoxerint, corpusque ab excrementis, tum
per urinam, tum per aluum expurgauerint, sanguis mittendus erit. Astrologica etiam
observatio tum tenenda erit. In morbis autem vehementibus, quique nimium præci-
pites sunt, nihil istiusmodi delectus habendus, sed quacunque hora ii vehementer pre-
ment, & instabunt, hac ipsa venam incidito. Quinetiam in febribus, aliisue morbis, qui
circuitibus affligunt, quietis aut remissionis animaduersio multo præstantior, quam
matutini temporis. In quacunque igitur diei noctisue hora remissio inciderit, ceteris
rite administratis, vena fecetur.

Quæ ante venæ sectionem necessaria sit preparatio. C A P. VIII.

Primæ ve-
næ

AD venæ sectionem maxima potissimaque præparatio est partium, quæ in prima
corporis regione sunt, puritas & expurgatio, ut nihil insit in illis vitii, quod opus
impediat, aut certe remoretur. Vitia ea sunt ventriculi primatumque venarum, earum
scilicet, quæ iuxta iecur & mesenterium sunt, cruditas, noxiorum humorum colluies,
alius facibus adstricta, os ventriculi impense sentiens, vel imbecillum. Hæc certe non
omnino prohibent & excludunt, sed duntaxat retardant venæ sectionem, donec arte
sint sublata. Si enim, quum ventriculus cibi copia tumet, quem nondum confecerit,
sanguinem mittas, necessario plurimū crudi succi in sanguinis locum succedet, quem
venæ exinanitæ indigentesque rapient. Eadem ex causa, si adstricta aluo venam ape-
rueris, iecur exhaustæque venæ sordidum quiddam & impurum e facibus exsugent. Quæ F
ratione Galenus, vel in continente febre, quæ omnium maxime accelerato hoc præsi-
dio gaudet, quum ciborum cruditas est, tantū moræ in secunda vena interponit, quan-
tum satisfacere, tum ad eorum concoctionem, tum ut excrementa descendant videbi-
tur. Hæc sponte, nisi succedant, clystere vel balano prolicienda sunt, aut prunis cassiæ
alius

A alius emollienda. Si corruptus noxiusque humor in ventriculo, aut in vicinis illi partibus exsuperat, multo magis differenda est venæ sectio, donec sit expurgatus, quod scilicet is humor multo maiore detrimento, quā cruditas, rapiatur in venas, hasque impuritate multa polluit. Præstat igitur, ut antequam vena resignetur, vitiosus humor deturbetur. Quibus eximius est oris ventriculi sensus, iis ante venæ sectionem consulendum est, osque ventriculi muniendum iis, quæ corroborant, quæ humorum morsum retundunt, & quæ humoris influxum arcet, ut est mali cotonei vel punici succus, & id genus alia. Atque hæc quædam præparatio omni venæ sectioni præmittenda est, quā morbi clementia cōcedit. At nonnunquam morbus tam immanis & importunus est, ut nulla præparatione præmissa, nullaque interposita mora ad venæ sectionem festinandum sit: velut in bono habitu athletico, a quo præsens aut suffocationis, aut ruptionis vasorum periculum impendit: in vehementissimis phlegmonibus, in ardentissimis febribus, in casu ex alto, aut in graui collisione. Sæpe etiam, quum crassior est sanguis, ut fere spes nulla sit, eū facile per venæ sectionem posse educi, extenuantibus illum medicamentis tribus vel quatuor ante venæ sectionem diebus vtendum erit, ut est mulla, cui aliquid hyssopi, nepetæ, origani, aut pullegii incoctum est. Interdum & balneæ necessariæ sunt, veluti quum venæ procul a viscere distantes, in cruribus nimirum aut summa manu, secantur, & in iis, qui crassiorem in venis sanguinem obtinent. Siquidem balnei calore sanguis liquatur & attenuatur, adeoque ut effluat magis idoneus redditur. In corpore tamē plethorico, & in phlegmone suspecta, balnearum vsus, tanquam nocentissimus, fugiendus. Proderit etiam hoc nomine, ut scilicet corpus incalcescat, deambulatione vri.

In balneo quando secanda vena.

Quid sectionis vena tempore faciendum sit. C A P. I X.

C V M venæ sectio non raro ad animi defectionem deducat, præsertim eos, qui antea nunquam venam aperuerunt, præstat tam illis, quam ægris decumbentibus, in maxima tum corporis, tum animi tranquillitate venam incidere. Idque faciendum erit maxime, ubi imbecillæ vires fuerint, aut syncopes metus subfit. Sit pars, quæ inciditur, pro-na, & in hanc facilis directusque, ut dictum est, sanguinis cursus, ex corporis ea sede, quam plurimum exinanire proponimus. Artus quoque cōfricentur, dum incalcescant, & proxime supraque eum locum, in quæ scalpellus adigetur, arctius vinciatur, ut sanguine proleto vena tumētor in conspectum se det. Infra etiam illigetur, quā tremula inconstans-que vena ad scalpelli quævis impulsus subterfugit, aut e sua sede diffilit. Constat autem, quib. densa & squalida cutis est, & quib. angustæ venæ aut in altū demersæ, multa carne, vel adipe obductæ, iis multo arctius vinculum iniici debere, quam quib. est diuersa constitutio. Minores manuum pedumque venas, quia hæ non satis implentur, in calentrē aquam demittimus, quæ & profluenti sanguini impetū facit. Si ne sic quidem vena in apertum promatur, eam quo loco inesse solet, digitorū impulsu percontare, dum sanguinis fluxu & incurfione, illius sit explorata sedes. Hancque signatam, scalpello industrius artifex feriat, sedulo etiam prospiciat, ne vel arteriam, vel neruum, tēdinemue pro vena perat. Aperta vero arteria, sanguis emanat tenuis, rubicundus, igneus, & saltu quodam exsiliens. Ex neruo aut tendine puncto dolor ingens, stupor, resolutio, & brachii conuulsio cum tumore interueniunt. Ceterum, vena ut decet aperta, vinculum a superiori parte laxandum erit, quo inde sanguis vberius defluat. Si ex crassitie sanguinis, aliaue ex causa sanguis minus abunde & lægnius fluat, æger pugnum arctè vehementerque adducat, neruos, musculos & latera, tussi ac voce valida contendat: vulnus vero aquæ calidæ fomento proritetur. Vtile denique est, etiam si pro ratione sanguis dimanat, medio cursu digitum vulneri imponere, tum ut vires reficiantur, minusque dissipentur, tum etiam ut deterior spurciorque sanguis, ex intimis in sectionem confluat.

Decumbentibus vena secanda.

Partis in qua inciditur vena, situs.

Minores manuum & pedum venæ.

Apertæ arteriæ signa.

Quantum sanguinis detrahendum. C A P. X.

E M A nantis autem sanguinis quantitas æstimanda est, ut is demum oportune sistatur. Æstimatio autem ex morbi necessitate, magnitudineque, & ex viribus maxime sumitur, ut quantum morbus exigit, & quoad vires tolerant, educatur, adeo ut quocumque tempore dissoluuntur, etiam si restant superuacua, a vacatione nihilominus desistendum cessandumque est. Tribus autem maxime notis, quo tempore sanguinis effluxus sit cohibendus, cognoscimus, mutatione scilicet sanguinis, labascente effluxionis impetu ac robore, & pulsus commutatione. Mutatio vero sanguinis & in colore, & in consi-

Tribus notis, quādo sanguinis effluxus sit cohibendus, cognoscitur. Mutatio sanguinis.

stentia, tum potissimum expectanda est, quum vehemens dolor, antingens phlegmo-
ne est in locis venæ sectæ finitimis, *ut lib. 2. Victus acutor. Apho. 10.* exemplo pleuritidis mō-
strat Hippocrates. Siquidem sanguis, qui iuxta phlegmonem hæret, alius est ab eo, qui
in ceteris corporis partibus, quæ secundum naturam se habent, continetur, ut qui a ve-
hementi, & præter naturam phlegmone calore supra modum est calefactus. Quapro-
pter si sanguis, qui in totum spargitur corpus, antea pituitosior ac crudior erat, rubicun-
dior & magis flauus euadet, qui in ea, quæ phlegmone obsidetur, parte cōtinetur. Quod
si vero in vniuersum corpus diffusus sanguis rubicundus fuerit, haud dubie, qui ad phle-
gmone est, adustus assatusq; in nigrum permutabitur. Coloris itaq; mutatio index est,
sanguinem ex phlegmone obsessa sede, in qua is est a reliquo dispar, euelli. Et si autem
coloris mutatio modum & mensuram vacuationis indicat, tamen non semper exspe-
ctanda est, sed interdum antequam apparet, a sanguinis detractione erit desistendum,
idq; duabus de causis. *Vna*, quod virtus sit imbecilla, nec tantam vacuationem, quam
coloris sanguinis mutatio sequitur, ferre queat. *Alter*, quia phlegmone maligna est, nec
quicquam de se sanguinis concedit, quod vehementer impactus humor sit. Hæc itaq;ue
cogūt intempestiue cessare, ac potius iterato, quod reliquū est, detrahere, alias quidem
eodem die, alias ut dictum est postero. Pari modo & labascens fluxionis impetus ac ro-
bur, sanguinem esse cohibendum monent. Si enim sanguis minori impetu, quam an-
tea, effluat, vires iam defecturas præmonstrat, maxime si accedat pallens faciei color, &
oculorum caligo. Omnium tamen certissima & minime fallax est, pulsus mutatio. Si
enim ex cerebro raruseuadat, aut ex magno paruus, ex vehemēti debilis & obscurus, ex
æquali inæqualis, vires collapsuras præfagit. Hæc igitur tria si ex vacuationis sanguinis
quantitate incidant, protinus intermittendum, ne imbecillitas progressa, vel mortem
inferat, vel iacturam, quæ nullo pacto refarciri possit.

Emissi sanguinis observatio. CAP. XI.

Sanguis e vena effluens mundis terisque peluiculis, terrenis, vitreis, plumbeisue ex-
cipiendus, non item æneis, ne ab iis vel propriæ substantiæ, vel coloris, vel alterius
qualitatis conuersionem subeat, quæ Medici de corporis affectu iudicium peruertat.
Sint & peluiculæ multæ, in quibus sanguinis varietas conspici & distingui possit. Sepo-
nantur loco mundo, quo nec puluis, nec fumus, nec ventus, nec Solis radii pertingant.
Omnium prima in iis observabitur sanguinis substantia. Viscosus est, qui lente fluxit, &
tanquam glutinum digitis obhæret. Crassus est & densus, qui multas fibras habet, qui o-
cyus concrescit, atq; conglaciat. Vterq; obstructionum aliorumque inde morborum sit
auctor. Qui tardius cōcrescit ac durefcit, tenuis est: qui vero iam refrigerescens minime
durefcit, is omnino vel aquosus vel putridus est, cuius omnes fibræ direptæ atq; corru-
ptæ vanuerunt. Serum multum tanquam aqua citrina concreto sanguini innatans, vel
potum liberaliorem, vel iecur infirmum, vel imbecilles renes, vel eodem obstructos o-
stendit. Spuma innatans, nisi fluoris impetu nata sit, incendium atq; feruorem eius hu-
moris monstrat, cuius colorem præ se fert: rubra quidem sanguinis: flaua, bilis: alba, pi-
tuitæ: liuida, melancholiæ. Durefcens sanguinis color per summa rubicundus, boni vi-
tilisq; sanguinis est index. Color pallidus, bilem: albus, pituitam: viridis, bilem retorri-
dam: liuidus aut plumbeus, atram bilem, cum pernicio, ut disparium colorū permistio,
varios humores exsuperare commōstrat. Sanguini innatat nonnunquam pingue quid-
dam & adiposum, instar telæ aranei cohærens. Hoc, si admodum pingue & obesum est
corpus, ex ipso sanguine causam habet, qui est in adipem pronus. Sin corpus strigosius
fiat, minusque obelum, id ipsum colliquari & marcescere portendit. Si diffuso sanguine
grana quædam arenularum æmula offendantur, aiunt vel Elephantiasin, vel ad hanc
propensionem notari: quanquam obseruantib. nihil tale deprehensum est. Quare qua
facilitate affirmatur, ea quoq; contemnitur: Si sanguinem graueolere, quod rarum est,
contigerit, putredinis corruptionisque immensæ est indicium.

Quida vena sectione faciendum. CAP. XII.

Sanguine, ut morbi magnitudo viresq; ferebant, emissio, æger supinus decumbat, ut
omnibus partibus in spinam dorsi tanquam in corporis basin reclinantib. summa sit
quies, & in quiete partes exhaustæ repleantur refarcianturq; spiritus. Neq; igitur ad cō-
suetam munia pperet, neq; celerius inambulet, neq; vilo exercitationis genere se fatiget,
neq;

Coloris
sanguinis
mutatio
nem non
semper ef-
se exspe-
ctandam.

Labascēs
fluxionis
impetus.
Pulsus mu-
tatio.

Iudicium
de sangui-
ne emissio-
ne ex substā-
tia.

Serum.

Spuma.

Color.

Pingue.

Grana.

Graueo-
lentia.

A neq; vtatur Venere, neq; in balneū descendat. Quippe sanguis & spiritus vehementius incitati, ne dissipentur aut incalescant, sedandi cōprimendiq; sunt. Venæ tamen sectioni non cōtinuo indormiendum est, ne aut languidior intro repens calor extingatur, aut imminuti spiritus obruantur. Itaq; vigilans conquiescat, absitq; omnis, tum animi, tum corporis contentio. Hora vna aut altera a sanguine misso, alimentum licet offerre, exiguum quidem, quodq; boni sit succi, quod promte alar, & quod sit profligando morbo accommodatum. Duab. ab hinc horis, aut etiam minus, nihil verat obdormiscere, modo assidentes prōspiciant, ne vel laborās in brachiū cēsū se deuoluat, vel vinculum dissoluat, quo sanguis dimanet, vel aliud sibi incommodum ferat. Reliquus cibus sensim increfcet, neq; temere aut auide ad pleniorē properandum est, vt quem natiuus calor imminutus non plene sit confecturus, & quē crudum multumq; exsuctæ venæ rapient, quo demū omnem corporis molē referciant. Et si autē integra sit omnis alimenti cōcoctio, quid tñ iuuat ilico se succis largius implere, quos animus est vena secta demere? A misso itaq; sanguine exquisitior victus ratio tenenda erit, neq; protinus æger ad pristinā dietā, perinde vt canis ad vomitū, redeat. Vt maiorem in modū detestandus sit Germanorum mos, qui fere nunquā lautius comedunt, aut largius bibunt, quā a venæ sectione.

Quando a venæ sectione alimentum offerendū

Detestandus Germanorum mos.

De Cucurbitulis. C A P. XIII.

Cucurbitula quid.

Quartum vacuationis genus per cucurbitulas fit. Cucurbitas autem & cucurbitulas a forma Latini appellant instrumentum, quo sanguis a profundo corporis attrahitur & elicitur. Has vulgus Medicorum ventosas, quod spiritibus ac ventis e corpore proliciendis sint accommodatæ, nominare solet. Ex quo illud Satyrici natum:

Iam dudum caput hoc ventosa cucurbita quatit.

Ceterum earum omnis ratio actioq; ex vacui in rerum natura odio fugaq; proficiscitur. Aere enim, ac vento ipsarum intus vel igni consumto, vel ore exsucto, vi magna & necessaria, qua parte cuti applicantur, scarificatæ quidem sanguinem, integræ vero spiritus flatusque vehementer cito proximos quosq; primum, tum & remotiores euocant. Earum olim, Celsolib. 2. cap. 11. auctore, duo fuerunt genera, a materia desumpta. Ænea altera tantum parte, quæ corpus attingit, perforata, igni comprehendendo apta. Altera cornea, eadem illa parte æque ac superior patens, lumina vero tenui foramine, quo exsuebantur, pertusa. In æneam linamentum ardens conicitur, ac sic os eius corpori aptatur,

Cucurbitularum ratio actioque. Cucurbitularum genera.

Dimprimiturq; donec inhæreat. Atq; hic mos apponendarū cucurbitularū in hodiernū vsq; diem durat. Cornea per se corpori imponebatur, deinde vbi ea parte, qua exiguum foramen est, ore spiritus adductus erat, superq; cera cauum id claudebatur, æque inhærescebat. Non vero ex iis tantum materiæ generib. sed etiam ex aliis, ligno nimirum, vitro, plumbo albo, & argento, hodie parantur cucurbitulæ. Sed e vitro facta facile omnium & læuissima & tutissima est. Nam si fixius adheferit, haud difficile abrumpitur, quum reliquæ, nisi maiore molimine detrahi nequeant. Porro cucurbitulis nō quouis tempore, sed tū, vbi vniuersum corpus ante fuerit vacuatum, vtendū erit. Siquidē alias locum, cui adhibita fuerint, totum replebunt. Quod certe generatim in omnibus localibus remediis, quæ certæ alicui particulæ ita adhibentur, vt a ceteris nihil perinde eliciant, perpetuo obseruandum erit. Maximopere itaq; cauendū, ne in plethoricis, ac cerebri eiusq; membranis phlegmone, quā priuatim Græci *phrenitim* nomināt, in principio mali cucurbitulis vtamur, quemadmodū nec vlla alia in parte phlegmone obfessa. Quippe tū a laborantib. partibus humorum influxus magis auertendus erit. Verum, vbi iam nihil influit, totumq; corpus antea vacuatū est, atq; aut mouere, aut amoliri, quod in laborante phlegmone particula existit, aut foras trahere necesse est, cucurbitas admouere optimum erit. Quū vero vitia adhuc fiunt, nō iis partibus, q̄ laborare incipiunt, sed iis potius, quæ eis coniunctæ sunt, & continuæ, reuulsionis gratia cucurbitulæ affigendæ. Ceterum gemina est cucurbitularum admouendarum ratio. Quædam n. citra scarificationem, & cutē adhuc integra corpori adaptantur, & hæc quidē leues nominari consueuerūt, nulla alia, vt arbitramur, de causa, quam q̄ minori molestia, quā illæ quibus scarificatio accedit, adhibeantur. Harū vsus primum est, vbi ab aliqua particula reuellere, aut fluxionem quampiam restringere annitimur. Sic sane mensib. supra modum promanantibus, cucurbitas sub mammis affigimus, Hippocrate etiam monitore, qui in Aphorismis ita scriptum reliquit: *Mulier si velis menses cohibere, cucurbitulam quam maximam mammis ap-*

Cucurbitulis quā de vtendum.

Cucurbitularum admouendarum ratio duplex. Cucurbitule leues. Cucurbitularum leuiū vsus. Aph. 50.

pone. Pari ratione sanguine supra modum enarib. erumpente, leues cucurbitulas hypo-
chondriis affigimus. Infigēdæ autē super iecore, si ex dextra nare promanat sanguis: sin
ex sinistra super liene. Si vero ab vtraque nare profluit, super vtroque viscere sunt po-
nendæ. *Deinde*, vt flatus intus abditus, doloremq; excitās, foras eliciatur. Nam ad tollen-
dum hunc dolorē vnice confert cucurbitulæ applicatio. Quod in primis confirmant ea,
quæ lib. 12. *Therap. metho. cap. vlt.* scribit Galenus, iniquens: *Dolor, qui spiritum flatusum co-*
mitatur: propriam quādam curationem sortitus est ex cucurbitula cum flamma copiosa multisoties ad-
mota. Videturq; tibi præsidium hoc in huiusmodi malis incantamenti cuiuspiam simile quid efficere,
sive ii in intestinis, sive in quauis corporis particula sint exercitari. Illico enim cucurbita admota, qui
spiritu flatuso cruciantur, tum a dolore liberi, tum omnino sani redduntur. Tertio, vt pars aliqua
in locū suum, vnde excidit, reducat, vt dum ventri applicatur cucurbitulæ, vt intesti-
na euoluta recipiantur. *Quarto*, vt appetentiam excitent naturalem. Nam attractis hu-
moribus, penuriæ sensum & suctionem in ventriculo concitant. *Quinto*, imbecillum
ventriculū roborant, quod scilicet naturali eius appetētia excitata, vt statim nutritio se-
quatur, efficiant. Nutritas autem partes reddi robustiores, omnibus notum est. *Sexto*, vt
animi deliquio, sanguinem & spiritum ad exteriora reuocando, liberent. *Septimo*, vt flu-
xiones ex alto corporis ad eius superficiem transferant, & resiccent. *Octauo*, vt faculta-
tes, quæ menses corrumpunt extrahant, id est, vt caussas, quo minus menses statis tem-
poribus effluant, impediētes tollant, & e corpore eliciant. Atq; ii sunt leuium cucurbi-
tularum vsus. Quædam sunt cucurbitulæ, quæ cum scarificatione admoventur. Harum
quis sit vsus, sequenti capite exponemus.

De scarificatione. CAP. XIII.

Cucurbi-
tulæ cum
scarifica-
tione.

CVM scarificatione cucurbitulas applicamus, quum e propinquo leuiter ac blande
vacuare consilium est, virtute, aut ætate, aut corporis teneritudine venæ sectionem
non admittentib. Hæc n. minori, tum vi, tum præsidio e minutis venulis aliquid dūtaxat
exsugunt, nulla virium, aut natiui caloris iactura. Quod in pueris, in grauidis, in senib. in
morbo longinquo fractis, aut acuto prostratis, quādo alio præsidio vti non licet, attēta-
mus. Atq; ad eū modū admoemus cucurbitulas, vbi phlegmone iam dicti corripunt,
idq; statim morbi initio. Particulæ vero ipsi, q̄ phlegmone laborat, inter initia, quū hu-
mores adhuc cōfluunt, cucurbitulæ cū scarificatione nō adhibendæ, sed tū potius, vbi in
parte firmati sunt. Si n. scarificationib. aut sectionib. sensibiliter vacuabimus, plus exci-
tati doloris ratione ad partē laborantem attrahemus. Nō est aut initio phlegmones ad
laborantē partem trahendū, sed ab ea magis, & quidem q̄ longissime, auertendū. Phle-
gmonæ itaq; factæ, vt humores iam impacti & hærentes educant, cucurbitæ sunt appli-
candæ. *Præterea* cucurbitulas cū scarificatione admoemus partib. tensis, vt tensionē ef-
ficientēs humores eliciant. *Tertio*, partib. quib. acris adiacet fluxio, vt ea euocata, partes
vt antea, deinceps nō irritent ac molestant. *Quarto*, vt venenū, q̄ a rabido cane, aut scor-
pione iniectū est, extrahatur. *Quinto*, vbi materiā ab vna parte in aliā trāsferre animus
est: vt si cap. laborante crura scarificamus. *Sexto*, qñ materiā in corpore redundantē mi-
nuere nobis placet: præsertim si redūdantia ipsa materia, q̄ statis temporib. vacuari cō-
sueuerat, prouenit: veluti si hæmorrhoides in viris, ac menses in mulierib. supprimantur,
crura scarificamus, prius tñ balneo vsi, aut calida per spongiā ea imbutā fouētes, vt sc.
ab eius calore sanguis tenuatus & solutus, ad tractum & vacuationē aptior fiat. Et affigū-
tur cucurbitulæ fere crurib. tanquam partib. corporis ignobilioribus, quo nobilioribus
opem ferant. Hinc est, q̄ Galenus in libello de scarificatione ita scriptum reliquerit: *Scarifica-*
tione crurū crebrius alias etiam vtendū, quod sapius per annū incidere venam non expediat: quippe
cum sanguine copioso vna vitæ excernitur spiritus. Eo aut copiosius absumto, vniuersa cor-
poris moles refrigeratur, omniaq; naturalia opera deterius fiunt. Quapropter ab igno-
bilib. utpote crurib. detractionem fieri cōuenit. Prodest et scarificatio, *Galeno eodē in*
loco teste, oculis diutina fluxione vexatis, & capitis affectib. thoraci & dorso accidentibus
malis. Adhæc anginis, & multis aliis morbis. Item ad hæmorrhoidas aut mēstrua prouo-
canda, cucurbita cū scarificatu poplitib. & crurib. applicata cōfert: idq; sæpe utilius, q̄ si
vena malleoli tūderetur. Renib. appressa, infernis benefacit partib. Natibus admota la-
terib. ac lumbis, ipsiq; et thoraci subuenit. Mēto applicata, maxillarū & faciē malis sani-
tatē pollicetur. Inter vtrasq; scapulas in ipso dorso apposta, q̄ hodie vsitatū est, thoracis
malis auxiliat. Inter collū & scapulas spinæ admota faciē morbis, vt impetigini succur-
rit. In

Ante cru-
rum scarifi-
cationē
cu bal-
neo vten-
dum.
Vbi affi-
gendæ.

A rit. In summa, cuicumque particulæ cum cutis scarificatione affixa fuerit, huius sanguinem elicit, ex fugit, vacuatque, & quicquid ad sequendum est promissimum.

De Hirudinibus. CAP. XV.

Inter præsidia sanguinis vacuatoria hirudines quoque commemorantur. Hæ veteribus crebro in usu fuerunt, hodie fere iis uti desierunt, præsertim in Germania, Medici. Præstat tamen nihilominus propter veterum scripta recte intelligenda harum usum habere perspectum. Hirudines itaque, captæ, aliquot diebus includantur, ut cicurètur: ita enim famelices, carnes quibus admouentur, facilius & auidius apprehendunt. Eas autem, quæ recens captæ sunt, propter suam virulentiam apponere non satis tutum est, sed vno die exiguo pastæ sanguine asseruandæ sunt. Sic enim, quod in iis virulentum est, exprimitur, propterea quod sanguini, quem hauserunt, cedat. Pars autem, cui hirudines admovebimus, nitro prius est perfricanda, ut incalcescat, & sanguis ex alto in summum euocetur. Aut certe inungenda aliquo calorigifico, & ex profundo in summam trahente medicamento. Aut si prædictis fueris destitutus, saltem unguibus scalpenda erit. Ita namque promptius apprehendent. Priusquam vero adhibeantur hirudines, in vas purum aqua tepida plenum, & amplum iniicere eas oportet: dein spongia comprehensas & absterfas, sordibusque purgas, manibus applicare. Purum autem debet esse vas, ut sordes rectius extergi possint. Eadem de causa ut aqua sit tepida oportet, quod ea, quæ frigida, ad abstersionem sit commodior. Amplum, ut manibus comode attingi, atque adeo sordes spongia comprehendere expeditius abstergeri queant. Vbi ad motum fuerint, iamque adhaferint, oleum tepidum particulæ infundendum erit, ne refrigeretur. Hac n. refrigerata, non facile sanguis ad hirudinum suctum sequitur, ut qui a frigore crassescat, & ad interiora pellatur. Quod si ex manibus & pedibus earundem suctu aliquid trahendum erit, ut manibus applicentur, non est necesse: sed partem aquæ, cui innatant hirudines, immergere oportet: ita n. sua sponte citra manuum nostrarum operam, eas apprehendent. Vbi autem partem iam adhaerent, nec sanguinem ad sese satis trahunt, forfice caudæ earundem præcidendæ sunt. Quippe sanguine effluente, trahere non desinent, donec ipsæ sua sponte decidant. Si vero sua sponte haud deciderint, salem aut cinerem ori ipsarum inspergere oportet, ita n. mox decidet. Posteaquam vero deciderunt, cucurbitula appositæ virulentiam earundem elicere necesse est. Aut si cucurbitularum usus displicuerit, spongiæ pars, cui ad motum sunt, fouenda erit. Hæc n. præsertim ubi noua fuerit, manifeste desiccatur, adeoque virus quod relictum est, discutit & dissipat. Quod si vero e foraminibus cutis cruentæ effluerint lacrymæ, cuminum, quod illi desiccandi & fluxiones compescendi insit facultas, aut farinam, quæ emplasticam obturandiue vim obtinet, inspergere convenit. Dein partem lana, quæ exiguo oleo est imbuta, inuoluere ac circumdare oportet. Lana enim, *Dioscoride attestante*, vulneribus commodissime imponitur, ut sanguinis eruptionem compescat. Oleo tamen, utpote, cui obturandi facultas inest, imbuta efficacior sit. Si vero sanguis cum impetu erumpat, linteum aceto imbutum iniiciendum. Acetum namque, ut testis est Dioscorides, adstringit, & vnde cumque promanantem sanguinem, in succidis lanis, aut spongia impositum, sistit. Aut certe galla vsta, aut spongia pice liquida madens, & dein vsta imponenda. Habent enim hæc omnia glutinandi facultatem. Ceterum, hirudines, non cum, qui in profundo hæret, sanguinem eliciunt, sed eum duntaxat, qui carni adiacet, ideo cucurbitularum vicem supplent. Detrahendæ autem, ubi dimidiam vitiosi ac redundantis sanguinis partem esse extractam coniecimus. Prohibemus enim nec permitimus effluere, donec, quod satis est, excretum fuerit, quod particula ipsa, tum ab hirudinibus natura frigidis, tum ab ambiente refrigeretur. Retinendum igitur aliquid sanguinis, ut hinc pars incalcescat. Sed de hirudinibus abunde satis.

DE PURGATIONE.

Quid purgatio, quibusque conveniat, aut non. CAP. XVI.

FXPEDITO primo vacationis yniuersalis genere, ad alterum transeundum nobis erit, nempe purgationem, quæ, *ut sectione prima Aphorism. comment. 2. te.* Purgatio statur Galenus, non est, nisi humorum sua qualitate molestantium vacuatio. Quod est, purgatio est vitiosorum, & eorum, qui corpus intestant & molestant, humorum vacuatio. Quippe qualitas hoc loco, *ut fufus in enarratione iam citata* Qualitas. *Aphorismi Hippocratis diximus*, non nisi differentiam, aut speciem corruptorum humo-

Quibus
hirudini-
bus vici-
dum.

Quomo-
do pars,
cui admo-
uebantur
hirudi-
nes, sit
preparan-
da.

Quo pa-
cto parti
iam præ-
paratæ
sint adhi-
bendæ.

Quid post
admotas
hirudines
faciendū.

Quid fa-
ciendum,
ubi iam
parti ad-
hærent.

Quæ ra-
tione effi-
ciendum
sit ut deci-
dant.

Spongia
noua.
Cumini.
Farina.

Lana:
Oleum.

Acetum.

Galla.

Quem
sanguinem
hirudines
eliciant.
Quando
detrahen-
dæ.

rum contracte quidem significat. Nec temere dictum est, contracte: siquidem generatim *ποιός* siue qualitas, *Galeno libr. 4. de uen. sanit. teste*, non nisi *ιδίαν*, id est, *speciem seu differentiam*, cuiusque humoris denotat. In purgationis autem definitione, potius *καταρ-
μα* significat. Purgatio autem duplex est, nempe spontanea, & non spontanea. Spontanea est, quæ a natura fit, quæ sua sponte corpus a noxiis humoribus purgat. Non spontanea est, quæ per medicamentum purgante facultate præditum perficitur. Cum itaque purgatio non sit, nisi vitiosorum humorum vacuatio, palam hinc fit omnibus, sanos, & qui inculcata sanitate fruuntur, non esse purgandos, quod prauorum humorum copia, qui sani sunt, haud premantur. Constat autem, medicamentum purgans peculiarem & proprium humorem trahere, flauam nimirum bilem, aut atram, aut pituitam, aut serosam humiditatem, qui ubi non adsunt, necesse est, ut sanguinem & carnes colliquet, ut scilicet ex ipsis proprium attrahat humorem. Quapropter sania medicamenti non purgantur, sed potius contabescunt. Ut non temere Hippocrates dixerit: *Qui sano sunt corpore, per medicamenta purgati, celeriter exsoluuntur.* Et mox: *Qui corpore bene se habent, hos purgare periculosum est.* Et iterum: *Veratrum iis, qui sano sunt corpore, periculosum est: quippe conuulsionem efficit.* Quapropter plurimum errant nostræ ætatis Medici, qui sanis etiamnum singulis fere septimanis pilulas, & id genus alia medicamenta purgantia propinant. Nec ad tuendum hunc errorem satis est, quod dicunt, varia excrementa, quæ in ipsis quotidie procreantur, purgationem requirere. Siquidem hanc rationem pulcre diluit Galenus *sectio. 3. Aphor. 15.* inquit: *Valde indigentibus, & ex longis temporum interuallis purgatio utilis est.* Eorum vero, quæ quotidie procreantur in corpore, excrementorum vacuatio minor est, quam ut exigat purgantis medicamenti efficacitatem. Si vero quispiam voluerit bis mense, aut semel omnino, saltem ea uti, veritus ne excrementorum multitudo aggregetur, præter id, quod nocebit, corpora etiam in malam consuetudinem trahet. Hæc ille. Fatemur quidem excrementa illa, quæ singulis diebus in corpore coaceruantur, esse vacuanda, si modo integram sanitatem conseruare velimus: atqui non per purgationem, sed alia vacuationum præsidia, ut sunt ea, quæ aluum leniter subducunt, aut quæ urinam sudoremue moderate proliciunt. Purgatio igitur iis tantum conuenit, qui cacochymia laborant, & prauis succis referti sunt, modo alii ad purgationem necessarij scopi purgandum esse non dissuadeant.

Qui purgationis scopi. CAP. XVII.

Qualitas humorum. Idem fere purgationis, qui sanguinis missionis, sunt scopi. In ea enim principio qualitas humorum est consideranda, hoc est, quod genus humoris vitiosi sit vacuandum & educendum. Non enim aliud, nisi quod corpori nostro prauitate sua molestum est, humoris genus vacuare oportet. Quod si igitur pituita supra modum aucta est, corpusque infestat, hanc omnino vacuare oportet. Si vero flaua bilis, vel atra corpus molestat, a pituita abstinendum, & bilis potius vacuanda. Sic ubi serosa humorum pars abundauerit, & hanc vacuare oportet. Id quod Hippocrates etiam iis verbis innuere voluit: *In perturbationibus ventris, & vomitibus sua sponte factis, si talia purgantur, qualia purgari oportet, confert, & facile ferunt. Sin minus, contra.* Et iterum: *Quæ vacuantur, non sunt estimanda copia, sed quod talia vacuantur, qualia vacuari oportet, & quod ager facile fert.* Proinde ut in omnibus aliis vacuationibus, ita etiam in purgationibus, secundo loco ægrotantis vires diligenter sunt expendendæ. Quum enim immodicæ purgationes vires lædant, & eo magis quo fuerint copiosiores, donec tolerant, & nondum laborant, tentandum ut exsuperans humor expurgetur. Quum vero dissoluantur, etiam si restant superuacua, ab eorundem tamen vacuatione desistendum erit. Hinc non temere Hippocrates dixit, *vacuationes, quæ ad extremum ducunt, esse periculosas.* Et rursus inquit: *Plurimum & repente vacuare, periculosum.* Quocirca vehementes purgationes, quibus tamen hodie plerique vtuntur, magno studio vitandæ sunt, quod maximo periculo haud vacent. Nam extra hoc, quod ex ea vires supra modum debilitantur demoliunturque, ventriculo etiam noxam inferunt haud leuem. Siquidem cum

A eum non raro ita lædunt ac turbāt, ut subinde parum recte per vniuersum vitæ spatium officio suo fungi possit. Vt hinc perspicuum euadat omnibus, quanto cum errore ægro- tantiumq; discrimine recentiores & barbaram sectantes medicinam, nonnunquam e- ra licatiue (sic enim loquuntur) vacuandum esse præcipiant. Nam ne vnum quidem ex omnibus veterib. proferre possunt auctorem, qui vnica vice radicitus humores, quan- tumuis malignos, purgandos esse suaserit. Præterea nulla necessitas, nulla denique ratio est, quæ eos tam absurdum opinari coegerit. Quod vero eorundē opinio sit non solum absurda, sed & pernicioſa, hinc promte dignoscitur. Quum enim in sanguinis missio- ne (quæ tamen in nostris est manibus, ut ipsam nobis p arbitrio nostro inhibere liceat) etiam ea, in qua vsque ad animi defectionē sanguis detractus est, vniuersum q. noxium erat, haudquaquam vacuetur, quando quidem, *ut Gal. lib. 8. Ther. meth. c. 4. testatur*, non- nullis alui deiectio, quibusdā bilis vomitus, aut sudores, interdū omnia tria superuenire compertum sit, quæ certe haud secuta fuissent, si copiosa illa sanguinis missio, quod no- xium erat totum & radicitus vacuasset: quanto minus per purgans medicamentum id, q. noxium est, totum vacuare licebit? Cum enim in nostra potestate nō sit, ut purgantis medicamenti vim inhibeamus, in nullo certe affectu vsq; ad animi defectionē purgare conuenit: tantum abest, ut radicitus vacuare per purgantia medicamenta audeamus. Metus enim est, ne etiam animi defectione inuadente, vniuersam suam actionem me- dicamentum obierit. Si itaq; iā deficiente animo plus purgarit medicamētum, certum est syncopen, & hanc ipsam mortē, comitaturam. Non est igitur radicitus, aut, ut *Hipp. loquitur*, ad extremum vacuandum, aut purgandum. Ceterum in purgatione ætas mini- me prætereunda erit, q. hæc interdū, quo minus purgantia medicamēta propinemus, obſtet. Pueri enim cum nondum iustam incrementi perfectionem sint consecuti, pur- gationibus plane inepti existunt. Quapropter si aluus ipsorum adstricta fuerit, mel, si nihil aliud impediatur, cibo adiiciendum, aut resina terebinthina, quæ ciceris quan- titatem æquet, *Paulo libro primo, capit. septimo, auctore*, exhibenda. Casia quoque fistu- laris dicta ad eam rem, quod vi leniente & emolliente prædita sit, satis commoda ex- sistit. Senes autem, potissimum ubi viribus admodum destituti sunt, quod natura sicciotes sint, purgantibus medicamentis parum idonei sunt. Est etiam ideo ætas Medico in purgationibus expendenda, quod hinc non raro infestantem corpus hu- morem deprehendere liceat. Cum enim quæuis ætas suos habeat morbos, quemad- modum sectione tertia Aphorismorum, palam attestatur Hippocrates, facile quales eosdem procreauerint humores, inde Medicus cognoscet, qualiaque purgantia me- dicamenta in illis sint exhibenda, intelliget. In purgatione quoque tempus anni præ- sens, minime negligendum erit. Sunt enim quædam anni tempora, in quibus pur- gationem adhibere prorsus temerarium est. Ex quorum vtiq; numero est æstiuum, maxime id, in quo caniculæ sydus exoritur. Exusta enim tunc natura, eam, quæ a me- dicamentis purgantibus fit, acrimoniam non fert. Natura etiam ipsa æstu iam imbe- cilla reddita, ex purgatione magis dissoluitur: Quocirca plures hoc tempore pur- gati incidunt in febres, & viribus plane destituuntur. Accedit iis omnibus, quod hoc tempore calor aeris ambientis in corporis superficiem & partem externam trahat hu- mores, contrariam ei, ad quam medicina ducit, ut hoc nomine prauam admodum hanc purgationem esse oporteat. Proinde non temere dixit Hippocrates: *Sub cane, & antecane, medicamentorum usus molestus atque difficilis est*. Accommodatissimum au- tem tempus ad purgationem est Vernum, quod nimirum omnis excessus in medio sit, adeoque temperatum. Quapropter in eo non est calor, qui corporis efficiat dissolu- tionem, neq; frigus humorū concretionem afferens, non inæqualitas vires perturbans. Atq; hinc est, quod Hipp. in Aphorismis sic scriptum reliquerit: *Quibus medicamentum purgans confert, hos verno tempore purgare conuenit*. Porro anni temporum observatio non modo in molienda purgatione utilis est, sed & ad noxii humoris dignotionē nō parum conducit. Hyeme namq; *ut in lib. de humana natura Hippocrates attestatur*, in homine pi- ruita augeſ, Vere sanguis, Æstate flaua, Autumno vero atra bilis. Quare si hyeme mor- bi inuaserint, magna ex parte pituitosi erunt: sin æstate, biliosi. In hac itaque, quæ bilem ducunt: in illa vero, quæ pituitam vacuāt, potius sunt exhibēda medicamenta. Pari ra-

Radicitus
haud vacu-
andum vilo
tempore

Ætas.

Puerorum
aluus ut se-
nienda

Senes.

Tempus
anni.

Æstate pur-
gationes
vitandæ.

4 Aphor. 5.

Vernum
tempus pur-
gationi ac-
commoda-
tissimum.

6 Aph. 47.

Regio. tione regio quoque ipsa, in qua degunt, qui purgatione indigent, a Medico consideranda erit. Hæc enim si supra modum calida fuerit, purgationem impedit, quod ad exteriora humorum motum, contra quam purgans soleat medicamentum, concitet. Præterea non nihil etiam ad infestantis humoris notitiam confert. In calida enim regione, calidi plerumque humores exsuperant, quemadmodum in frigida, frigidi. Morbi denique species in purgationibus contemplanda Medico erit, quod ex ea, quamcunque tandem ætatem morbus inuaserit, humor noxius, morbumque excitans promte agnosci possit. Exempli gratia, si e februm genere tertiana hominem inuaserit, quod a bile modum & debitam mensuram excedente infestetur eger, constat. In ea igitur bilem purgans medicamentum esse dandum, hinc Medicus colligit. Quod si quartana febris hominem corripuerit, atram bilem corpori faceßere negotium, nulli non perspicuum euadit. Hæc igitur purgans medicamentum requiret. Sin quotidiana affligerit, pituitam molestare corpus omnibus patet. Hanc itaque educere potens medicamentum propinabimus. Quapropter singula iam ordine commemorata Medico, quo firmiorem ac magis stabilem noxii humoris notitiam habeat, accurate considerata erunt. Neque enim villo tempore alius humor extra eum, qui in corpore præter naturam redundat, illudque infestat, purgante medicamento vacuandus erit. Atqui dixerit forte quispiam: *Quid igitur Medico faciendum erit, si cum humoris alicuius dominio alii quoque redundauerint omnes, estne simul utroque vacuationis genere, nempe venæ sectione, qua omnes, & purgatione, qua vitiosus tantum vacuatur humor, utendum?* Minime gentium, quod simul & eodem tempore duabus vacuationibus, sibi quodammodo contrariis, quales illæ quidem sunt, uti sine maximo tum sanorum, tum ægrorum dispendio non licet. Nam venæ sectio humorum cursum & impetum ad exteriora reuocat: purgatio contra ad interiora. Non parum etiam duæ vacuationes, nulla interposita mora adhibita, vires ipsas debilitarent. Accedit, quod vacuandorum quantitas hac ratione a Medico meriri haud possit. Proinde vbi utroque vacuationis genere opuserit, alterum præcedere, alterum sequi debet. Et præstat quidem venæ sectionem purgationi præmittere, quam venæ sectioni purgationem. Id enim ut faciamus, non solum veterum, Hippocratis potissimum, Galeni, & aliorum Græcorum nos hortatur auctoritas, sed & ratio ipsa. Quod vero vno consensu id ipsum veteres docuerint, alibi, nempe, *libr. 2. Paradoxorum, cap. 3.* monstrauimus, ut non sit necesse hoc loco repetere. Ratio vero, cur venæ sectio purgationem præcedere debeat, hæc est: *Summota aut imminuta plenitudine, qui redundant prauis & noxiis humores, expeditius a medicamento purgante trahuntur.* Siquidem hoc venas, arterias, inanesque corporis regiones inueniens minime oppletas, nullo negotio in totum dimanat corpus, humoresque per lata vasorum spatia fusos & attenuatos trahit, vacuatque. Sin præpostero ordine purgationi primæ concedantur, medicamentum purgans propter plenitudinem & vasorum angustiam in totum corpus deferri nequit, sed substat, & nihil efficit: aut certe id, quod efficit, male efficit. Nam agitationem aliquam humorum excitat, at propter viarum angustiam, aut immodicam copiam eosdem attrahere nequit. Præstat itaque, si par inest vtriusque remedii necessitas, ut a sanguinis missione ordiamur. Siquidem melior deinde exinanitis vasibus humorum attractio fiet, & natura ab eo, quod ipsam premebat, onere leuata, ac purgantis medicamenti vi iam excitata, quicquid noxium & inutile est reliquum, facilius segte gabit, impellerque, ipsumque medicamentum, etiam si minime vehemens ac debile est, minori negotio, quod restat, trahet, & educet, omniaque ex sententia succedent.

Qua diei hora medicamentum purgans exhibendum. CAP. XVIII.

QUI purgans medicamentum est sumpturus, is curet, ut id ipsum conuenienti hora faciat. Neque enim omnis hora ad eius sumtionem idonea existit, sed ea sola, qua ventriculus a cibis maxime vacuus est. Quod si namque ea hora, qua ille cibis refectus est, purgans medicamentum dederis, vis eius a ciborum copia obruetur, nec leue periculum imminet, quin ipsi a medicamento sumto corrumpantur, aut semicotti cum medicamento viribus in venas & totum corpus deferantur. Proinde ad purgantis medicamenti sumtionem aptissimum tempus est matutinum, quod tum concoctiones omnes perfectæ sint, ventriculusque nihil in se ciborum contineat. Cuius sane rei optimus est testis Paulus Aegineta, qui *lib. 7. c. 6.* ita scriptum reliquit: *In vniuersum in omnibus efficacibus purgationibus*

Duabus vacuationibus si mul eodem tempore minime videndum.

Vena sectio purgationi præmittenda.

Matutino tempore purgationes sumenda.

A tionibus medicamentum homini, quem certa prius victus ratione alueris, ieiuno, & ei, qui probe concoxit, exhibere oportet. Quapropter recentiorum, & eorum, qui hodie medicinā faciunt, modis omnibus explodēda opinio erit, propterea quod quum caput maxime purgare conantur, catapotia, seu, ut vſitati illis vramur vocabulo, pilulas post cœnam, aut certe paulo ante cœnam, deuorandas præbent. Quippe is mos non solum aduersus ea, quæ diximus, ex diametro pugnat, sed etiam a veteribus prorsus damnatus est. Siquidē Paulus Ægineta lib. paulo ante citato, c. 4. eos, qui aloē vesp̄i exhibent, aut a cibo, noxā inferre, diserte affirmat, quod scilicet alimentum cibumue corrumpat, & flauam bilē minus vacuet. Si igitur aloē, quæ ex toto corpore trahere nequit, & grata est ventriculo, a cibo exhibita tantam noxam inferre potest, quid futurum est, si vehementia catapotia, quorum compositionē scammonia, colocynthis, & id genus alia medicamenta ingrediuntur, exhibentur? Verum dicit forte quispiam: Cum is recentiorū mos cum veterum placitis & ratione ipsa tantopere pugnet, quid igitur eos impulit, ut illū omnes propemodū ambabus, quod fertur, vlnis amplexi sint? Peruerſa meherecle imaginatio, quæ etiam alias illis crebro impoſuit. Arbitrantur namq; quum cibus adhuc in ventriculo heret, fore ut pilularum facultas vna cū vaporibus a cibo elatis permixta, recta sursum ad caput feratur, & eā ob causam humores noxios ex capite promissiſſime deorsum in vētriculum trahat. Quasi vero per fauces & gulam noxii in capite contenti humores a medicamēto hausto mox recta deorsum trahantur, & non potius per venas ad ventriculū & intestina deducantur. Per quas n. venas purgantis medicamenti visa ventriculo in caput distribuitur, per easdem certe ex capite & vniuerso corpore in ventriculum & intestina proprios & sibi familiares humores trahit. Sed & sensus, & ratio ipsa, quam absurda & erronea sit, recentiorum Medicorū opinio, abunde testantur. Sensus quidem, quod nihil noxiorum humorum per fauces, si qui sumserunt medicamentum purgans, descendere ex capite percipiant. Ratio, quia si ex capite per fauces in ventriculum humores traherentur, multo sane expeditius ſcreatu vacuarentur, quam per alium. Quum itaque ostensum iam sit, cōmentum eorum esse plane frigidum, & cum anatomes ratione pugnare, vtpote quæ doceat purgantis medicamenti in ventriculum assumpti vim per intestina & mesaraicas venas ad iecoris portam, ab hac ad iecur, ab illo rursus ad concauā vocatam venam, ab ea mox sursum ad iugulares, & ab illis ad cerebrum distribui, ac subinde per eādem viam attractos humores a cerebro ad intestina & ventriculum descendere: neque enim: ut testis est lib. 3. de Naturalib. facult. Gal. alia distributionis, & alia tractionis vasa sunt: debent deinceps hunc morem tanquam noxium, & a veritate abhorrentem omnes, quotquot veritatis amantes sunt, Medici deferere. Atqui non deerunt, sat scio, qui pro tuendo veteri errore, nobis Galeni locum ex c. 8 lib. 14. Thera. meth. proferent, vbi ille sexagenario cui-dam, qui tumefactam linguam habebat, catapotia ex aloē, scammonia, & colocynthide composita vesp̄i exhibuit, adeoq; hoc factō recentiorum morem haud dubie confirmauit. Sed facile quod nobis obicitur, refutari potest ab eo, qui vniuersam historiam paulo attentius expendit. Etsi enim vesp̄i exhibuisse pilulas Galenum negari non potest, non tamen a cœna, sed vacuo plane ventriculo illas hunc exhibuisse satis cōstat.

E Si enim cibi aliquid ingessisset æger, Gal. id ipsum silentio non transisset. Quod vero nihil cibi vesp̄i sumserit, hinc primū colligitur, quod homines hoc seculo temperantiores quam hodie fuerint, ita ut non solum ægri, sed & sani maxima ex parte in cœna nihil ciborum assumerint. Quod dicimus, confirmat etiam morbi ratio, quem acutum, imo peracutū fuisse constat, ut hoc nomine tenuissima vsus sit victus ratione. Et dato quod nihil talium acciderit, tamen quia Galeno metuendum erat, ne aucta linguæ inflatione deinceps nihil medicamentorū deglutire posset æger, festinatione opus fuit, nec maturinum tempus expectari potuit. Quare ex hoc loco suæ opinionis patrocinium nullum inuenire aduersarii possunt.

Pilulas a cœna non esse exhibēdas.

Occasio prauæ opinionis recentiorum.

Obiectio diluitur.

Quæ ante purgationem necessaria sit preparatio. CAP. XIX.

F Vi purgans medicamentum conuenienti hora est sumpturus, is vnice studeat, ut ad purgationem sit idoneus. Idoneus autem erit, si humores redundantes, & a medicamento purgante trahendi, tenues fuerint, omnisq; tenacitatis lentorisue expertes, & meatus omnes, per quos huiusmodi humores trāsire debēt, aperti. Ineptus contra erit, vbi redūdans vitiosus succus crassus & lentus existit, meatusq; per quos noxius ille suc-

Duo præpara-
tionis
modi.

cus purgandus erit, haud patent. Qui igitur ad purgationes inepti sunt, hos Medicus A
paratos & idoneos reddere debet, id quod bifariam fieri potest. Vno modo, ut humo-
res crassi & tenaces extenuentur, & incidantur, adeoque fluxui parati reddantur. Vten-
dum igitur in hoc tum cibis, tum medicamentis, quibus extenuandi & incidendi facul-
tas inest, de quibus Galenus peculiarē librum exarauit, & lib. 8. Ther. meth. c. 4. de iisdem
copiose tractat. Non vero simplicibus tantum medicamentis, ut sunt *hyssopum*, *origanum*,
calamintha, *pulegium*, & similia, sed & compositis, *oxymelite*, & *serapiis e calamintha*, *hyssopo*,
marrubio, & similibus, quorum hodie magna in officinis medicorum est copia, vten-
dum esse abunde constat. Alter præparationis modus est, ut meatus corporis, per quos
humores, qui purgandi sunt, transibunt, referantur, & aperiantur, adeoque corpus fluidum fiat. Si enim illi minime pateant, & obstructi fuerint, per eos transire noxii humores nequeunt. Referendi itaque erunt per ea, quæ illos detergent, & obstructione liberant medicamenta, corpusque cibis humectantibus, ac balneis meatus corporis laxiores efficientibus fluidum faciendum, iuxta Hippocratis in Epidemiis consilium, inquit: *Si volueris ut is, qui Elleborum bibit, celerius purgetur, ut lauet, aut comedat præcipe. Et iterum: Qui ad Ellebori sumtionem non facile sursum purgatur, horum corpora ante potionem præhumectanda sunt, vberiore cibo atque quiete. Et vno verbo: Corpora, vbi quispiam purgare vult, fluida faciat oportet.* Id quod efficiet, vbi humores tenues, nulloque lentore præditi, & meatus corporis aperti fuerint. Quod satis in Commentariis huius aphorismi testatur Galenus ita scribens: *Erit fluidum corpus, omnibus quidem meatibus reſeratis, humoribus vero incisis, deterſis, & extenuatis, si quis modo humor in corpore crassus ac lentus fuerit.* Quum itaque duo in vniuersum sint præparationis ante purgationem necessarii modi, nempe crassorum & lentorum humorum attenuatio, absterſio, & incisio, meatuumque apertio, omnibus perspicuum euadit, vbi meatus corporis, per quos humores purgari debent, aperti sunt, & humores tenues, nulla opus esse præparatione. Quapropter biliosi humores, cum suapte natura tenues sint, adeoque ad vacuationem maxime, quæ per medicamentâ purgantia fit, faciles & expediti, modo viæ & meatus, per quos transire debent, reclusi sint, præparationem nullam requirunt. Hinc est, quod Galen. lib. 14. Ther. meth. cap. 17. inter cetera sic scriptum reliquerit: *Flaua bilis vacuatio facilis est: pituita vero, ac potissimum eius, quæ crassior & glutinosior est, item nigra bilis difficilior.* Hippocrates quoque in libro de Humana natura, bilis vacuandæ facilitatem satis innuit, dum quoduis medicamentum purgans post familiarem & cognatum sibi humorem flauam bilem statim trahere, scribit, quod scilicet ductu facilima sit. Galenus denique lib. 3. Progn. comm. 25. humores corporis calidiores tenuioresque, quales sunt biliosi, paratissimos esse ad excretionem tradit. Quod si vero meatus, per quos bilis duci debet, obstructi sint, certe ea præparatione, quæ illos aperit ac referat, opus erit. Ad eam vero parandam non adhibenda sunt vehementer calida, quod illa bilis copiam augerēt: sed ea potius, quæ facultatem habent extenuandi, & absterſendi, ac referendi citra vehementem calorem: ut est in ciborum genere ptisana, in medicamentorum, cichorium, intybum, semina peponum, & cucumerum, item serapium acidum simplex, oxyſaccharum, & id genus alia. Non parum etiam ad relaxandos corporis meatus balneum aquæ dulcis conducit, ut comprehen-
sum est. Ex iis omnibus perspicuum fit, Auicennæ verba *Fen. 1. Canone 4. tract. 2. capit. 7. de Intentione ad curationes vniuersales febrium putredinis*, docētis, *subtilem seu tenuem humorem esse incrassandum, & lentum incidendum, neque simpliciter ad præparationem, neque etiam ad concoctionem noxiorum humorum ac morbi posse referri, adeoque merito, tanquam a veritate abhorrentia, ab Auerrœ & aliis quibusdam esse reprehensa.* Ad concoctionem morbi non posse referri, sequenti capite monstrabimus. Nunc de præparatione tantum dicemus, quæ solius est crassi & tenacis, ut ostendimus, humoris. Nam is ut commodè purgari possit, extenuantibus & incidentibus tum cibis, tum medicamentis est præparandus. Humor autem tenuis, cum suapte natura ad vacuationem sit facilis & expeditus, ut facilius ac promptius purgetur, nunquam a Medico incrassandus erit. Quanto enim subtilior est, tanto facilius a purgante medicamento trahitur, quod tum ratio ipsa, tum experientia satis confirmât. Quum itaque Auicenna in purgationibus quoque opus esse dixerit, ut tenues humores incrassentur, merito ab Auerrœ est reprehensus iis quidem verbis: *Auicenna iubet in morbis a tenuibus humoribus genitis, concoctionem præcedere, quam hoc pacto definitam*

6 Epidem.
sect. 5.
Aphor. 18.
4. Aphor. 13.
2. Aphor. 10.

In bilis re-
dundantia
quibus me-
dicamentis
meatus re-
ſerandi.

Auicennæ
error dete-
ctus.

Præparatio
solius crassi
humoris.

7. collect.
ca. 9.

- A** definitam tradidit. Concoctio tenuium, est eorum incrassatio, crassorum vero extenuatio. Verum enimvero facilius humores tenues purgabuntur crassis. Vnde a nonnullis scriptum est Medicis, se nunquam purgans medicamentum exhibuisse, quin flava bilis prior vacuaretur. Leuissimam enim & tenuissimam esse, ceteros autem humores sequi. Quod idem sensus tibi indicat, tenuiora scilicet crassioribus promptius purgari. Hæc Auerroes. Maximo igitur errore Auicenna retulit in vniuersum ad omnem vacuationem, adeoque ad eam etiam, quæ per purgantia fit medicamenta, quæ ad peculiâres, eas nimirum, quæ per sternutamenta, aut tussis fiunt, duntaxat pertinent. Nam cum sternutamentum & tussis non fiant, nisi per plurimum & vehementem spiritum celerrime foras erumpentem, qui impetu suo explodit ea, quæ in naribus & respirationis meatibus cõtenta sunt: necesse est, vt ea, quæ per illa vacuantur, neque lenta & crassa, neque tenuia admodum sint. Quæ enim lenta & crassa sunt, adeo naribus & arteriæ inhæret, & impacta sunt, vt ab iis facile auelli & abstergi nequeant. Quæ tenuia sunt, hæc subleuata, inter sternutandum & tussendum a spiritu diuisa retro fluunt, vt capiosius lib. 4. de Laborantibus locis. c. g. Gal. docet. Cum itaq; ea, quæ sternutamentis aut tussi expellenda & vacuanda sunt, crassitudine quadam participare necesse sit, vt ea, quæ supra modum tenuia sunt, aliqua ex parte etiam incrassentur, oportet. Non etiam pellenti omnino obistere, adeoque violenter ac tenaciter inhærere debet: quocirca si lentore ac crassitie participant, extenuantibus & incidentibus medicamentis attenuanda & incidenda veniunt. Quid multa? quæ hac ratione vacuanda sunt, essentie mediocritatem habeant necesse est. Quapropter rectissime de iis Auicennæ dictum, quod præcipit, tenues humores incrassandos, & crassos ac lentos extenuandos esse, intelligitur. Male autem ad eam expulsionem vitiosorum humorum, quæ per medicamenta purgatoria fit, torquetur. Hæc enim non aeris impulsu, ad quem debita eius, quod patitur, resistentia requiritur, quæ in mediocritate certæ essentie consistit: sed attractoria purgantis medicamenti, & expultrice facultate perficitur. Quanto itaque humor tenuior ac mobilior fuerit, tanto facilius a medicamento purgante per angustos meatus trahitur, ac subinde expeditius expellitur. Errandi autem occasionem Auicennæ haud dubie Galeni locus, ab eo parum recte intellectus, præbuit, qui est in libello de Constitutione artis Medica, vbi non obscuris verbis inquit, *crassum & lentum humorem esse attenuandum, tenue vero incrassandum*. Verum si locum illum Galeni intentis oculis conspexisset Auicenna, non de iis, quæ e corpore per medicamenta sunt vacuanda, sed de iis potius, quæ in eo manere debent, adeoque in statum naturalem redire possunt, intelligendum esse animaduertisset. Nā Græce sic habet: τὸ δ' ἐπ' ἀνελθεῖν δύσμερον εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἀλλοιῶν διὰ τῶν ἐναντίων: τὸ μὲν παχὺ καὶ γλιχρὸν λεπύνοντα: τὸ δὲ λεπὸν, παχύνοντα: Quod in naturalem statum redire potest, contrarius alterare oportet: crassum quidem & lentum, attenuando, tenue vero incrassando. Verbi gratia, vbi humores in capite præ nimia sua tenuitate in thoracem destillant, incrassari debent, & in naturalem statum, vt deinceps destillare non possint, reduci. Pari modo, si pituita plus iusto crassior fuerit, attenuari debet, & in naturalem statum reduci, vt subinde cocta in sanguinem mutari possit. Atque hæc de præparatione, quæ arte fit, adeoque a concoctione, quæ a natura perficitur, vt sequenti ostendemus capite, dixisse satis sit.

Auicennæ errandi occasio.

Galeni locus enarratur.

Quid concoctio, & quot eius differentia. CAP. XX.

- P**urgans medicamentum a Medico temere nunquam est propinandum, nisi vbi humores vitiosi morbumq; excitantes fuerint concocti. Siquidem post cõcoctionem naturam ipsam vacuationi habemus adminiculantem, vt pote, quæ tum humores discernit, & redundantias excernit. Vt non ab re Hipp. in Aphorismis ita præceperit: Concocta purgante medicamento educere, & ea, quæ non sunt cruda, mouere oportet, neque in principis morborum, nisi humores turgeant. Magna vero ex parte non turgent. Vt igitur quæ cruda, quæ item concocta sint, cognoscamus, quid concoctio sit, & quot differentiis constet, ostendamus necesse est. Concoctio itaque Aristot. lib. 4. Meteor. c. 2. auctore, est perfectio, quæ a naturali propriione calore ex oppositis fit passivis, quæ sua cuique materia existit. Vel breuius ac clarius: Concoctio est actio quadam natui caloris in qualitates quæ patiuntur. Galenus & eum sequentes Medici, concoctionem definiunt esse alterationem ab innato corporis calore factam. Atque hæc perspicua plane est definitio, & perfecta, vt quæ singulas dif-

Crudi humores non purgandi.

1. Aph. 12.

Concoctio quid.

Concoctio duplex. ferentias complectatur, quæ certe, eodem Galen. lib. 1. Epidem. sect. 2. constitut. 3. comment. 41. A
 teste, gemina existit. Vna, quæ est alimentorum, & eorum, quæ secundum naturam se habent. Hanc Galen. lib. 3. de naturalibus facult. ita definit: *Concoctio est alteratio in propriam eius, quod nutritur, qualitatem.* Et in lib. de Sympto. differentiis, cibi alimentive in qualitatem animantifamiliarum, permutationem esse tradit. Libro autem 1. Epidem. Comment. 2. apho. 44. concoctionem in coquentis eius, quod concoquitur, substantiam quandam esse deductionem scribit. Quæ quidem definitio cum prioribus in idem recidit. Hæc Græcis proprie *παρασκευα*, & Latinis priuatim *concoctio* nominatur. Eius autem tres sunt species. Vna, qua cibus in ventriculo concoquitur: altera, qua inibi generatus succus in iecore & vasis in sanguinem mutatur: tertia, qua sanguis in singulis partibus corporis, in idoneam alendæ partis substantiam mutatur, ut fusius lib. 1. sect. 6. capit. 5. diximus. Quæ in ista concoctione, altera B
 tioneue in ventriculo & iecore exquisitam elaborationem non sunt adepta, & citra sanguinem substituerunt, cruda vocantur. In habitu autem totius corporis cruda sunt, quæ elaborationem nullam: semicocta, quæ imperfectam consecuta sunt. Sanguis itaque pituitosus & lentus reuera crudus ac semicoctus existit, quod raro ex eo tumida, aquosa, flatulenta, in summa, alba & pituitosa procreetur, ac species hydropis, quam ob id λευκοφλεγματίαν appellant. Cruda itaque sunt, quæ in ventriculo nullam prorsus alterationem, aut imperfectam, quæ tamen proprie semicocta nominatur, acceperunt. Crudi sunt, qui in iecore aut habitu totius corporis nullam alterationem sunt experti, aut perfectam elaborationem non attigerunt, humores: qui tamē proprie semicocti appellantur. Crudi igitur omnes sunt generatim humores, qui citra sanguinem bonum subsistunt: ut lib. 4. de Tuenda sanitate, cap. 4. fusius monstrat Galenus. Tales autem sunt frigidi & crassi seu pituitosi, ut loco iam citato, & multis aliis locis Galenus ostendit. Vnde perspicuum euadit, biliosos humores non esse hac ratione crudos, quod nimirum excessu caloris, atque ex sanguine supra iustum modum percocto, adeoque asso & exusto fiant: non igitur hanc concoctionem primam, de qua nunc loquimur, requirunt, sed solus sanguis, & humor, ut in sanguinem mutetur, idoneus. Ceterum cruda, quæ in ventriculo hærent, quod illis non sit per angustas vias transeundum, etiam priusquam concocta fuerint, educi possunt. Et præstat etiam illa, priusquam in habitum totius corporis traducantur, educere. Hinc est, quod Galenus vnicum cruditatis esse remedium lib. 1. de Alimentorum facultatibus, ait, si ea, quæ cruda sunt, per alium secedant. Cruda vero, quæ D
 in primis venis, iecore, & aliis vasis hinc in vniuersum corpus distributis, & in habitu totius corporis sunt, medicamentis purgantibus vacuanda non sunt. Cuius quidem rei causam recenset Galenus lib. 4. de Tuenda sanitate, cap. 5. in hunc scribens modum: *Deiectio*, inquit, in iis, quibus plurimi crudi humores in venis sunt, tormina cruciatuque circa umbilicum, & rosiones creat, animique deliquia, cum eo quod nec notari dignum quippiam educit: quando crudi omnes humores, pigri atque ad motum inepti, propter crassitatem frigiditatemque sunt. Quos it, ut etiam omnes angustas vias obstruant, per quas id quod medicamentum deiciat, ferri ad alium debeat: itaque nec ipsi educuntur, & alii sunt impedimento. Id quod sane Hippocrates illo oraculo præcauit, quo breuissime præcipit: *Concocta medicamentis tentanda esse, non cruda.* Eadem de causa nec exercitare, nec omnino mouere, sed nec lauare expedit eos, qui in primis venis crudorum copiam habent: siquidem omnes id genus motus, succos illos in totum corpus agunt. Seruandi igitur hi sunt in omni quiete, dandaque ipsis cibus, potio, medicamenta sunt, singula eius generis quæ attenuent, dissecant, & consiciant succorum crassitudinem, idque citra manifestum calorem. Nam qui excalescenti vehementius sunt succi, hi in omnem corporis partem feruntur. Ergo nutries hos maxime oxymelite, aliquando etiam prisana & mulsæ exiguo quopiam. Sustinent enim id victum, si modo vlli alii, tenuem, ipsa nimirum crudorum humorum copia, quos paulatim concoquunt, ad corporis alimentum abutentes. Hæc ille. Atque hæc quidem de prima, quæ proprie concoctio nominatur, dixisse, satis sit. Altera est eorum, quæ præter naturam sunt. Et hæc quidem non est, nisi humorum morbum efficientium alteratio, atque Hippocrati in Epidem. & Galeno *παρασκευα*, Latine *matuatio*, discriminis gratia nominatur. Cocta itaque de hac ratione F
 Hippocrati & Galeno appellantur, quæcunque a natura ipsa euiecta sunt. Cruda vero, quæ non sunt euiecta. Verum esse quod affirmamus, testatur Galenus lib. 1. Epid. Comm. 2. aphor. 46. inquit, *Ut concoctiones fiunt natura morbosas causas euincente: sic non euincente contraria.* Et lib. 2. de Vict. acut. morb. Com. 44. ubi ita scriptum reliquit: *Concoctio est, ubi natura causas*

A caussis fortior fuerit, easque suo robore permutauerit. Ibidem quoque disertè docet, cocta esse, quæ a natura ipsa euiecta sunt: cruda contra, quæ minime. Hac ratione pus in phlegmone, quod a natura euiectum est, concoctum vocatur, etsi pars nulla ex pure alatur, quemadmodum ex crudis & pituitosis, vbi concocti fuerint, humoribus aluntur. Eadē ratione & vrinas crudas concoqui dicimus, etsi corpus ex coctis vrinis ali non possit. Ita sputum quoque crudum vel coctum appellamus. Ad hunc quoq; modum destillationem grauedinem, ichores, & humiditates, quæ in lippitudine emanant, aut crudas, aut concoctas esse dicimus. Hoc deniq; modo biliosos humores crudos, vel coctos esse pronunciamus. Et Gal. quidē loco paulo ante citato, crudam bilem suis notis pingit, quemadmodū etiam concoctā, inquires: *Cruda quidem bilis flaua est, & acris, & male olens: Cocta vero & pallidior, &*

B *minimum male olens.* Vt hinc palam fiat, hanc alteram concoctionem nihil aliud esse, nisi dominatum & victoriā naturæ in humorem noxium, siue putridum, siue nō putridum. Ex hac itaque concoctione id consequitur natura, vt humorem illum, qui antea parum obsequens fuit, nunc gubernare, ac pro suo arbitratu excernere possit. Proinde omnis humor, qui externendus venit, antea concoctus sit, oportet, quod tantisper dum crudus est, & a natura nondum euiectus, vacuari commodè non queat. Concoctus autem, & tanquam subactus ac domitus, nullo, aut saltem minore negotio a vacuante medicamento praefligatur & exhauritur. Hanc igitur concoctionem non solum pituitosi, vt priorem, sed & biliosi exigunt humores. Quapropter libet admodum concedimus,

C *flauam bilem, non obstante, quod natura tenuis sit, concoctionem hanc alteram requirere.* Nisi enim prius a natura euiecta sit, medicamentis purgantibus, & vacuatibus etiam aliis commodè educi nequit. Hac vero ratione cocta, & veluti subacta & edomita, naturæq; obsequens reddita, absque vlla molestia, minori q; negotio ad conuenientia vacuationis loca, a purgante medicamento trahetur. Nam nisi in eum edomita fuerit modum, sua acrimonia erodet, atq; excoriabit, foetoreq; suo, & fetuore molesta erit. Atqui aduersus ea, quæ dicimus, forte quispiam ita instabit: *Flaua bilis ex tali concoctione crassior euadet, & sic agrius expelletur.* Crassiorem autem euadere, in primis testatur Aristor. lib. 4. Meteor. c. 2. vbi non obscuris verbis ea, quæ concoquuntur, crassiora aridioraq; reddi scribit. Item Alexand. Aphrodiseus in vniuersum omnia, quæ concoquuntur, ex tenuibus crassiora euadere testatur. Quinetiā Gal. lib. de Torius morbi temporibus asserit, tū sanie

D ipsam, tum vrinā, tum sputum, item lippitudinē, humoresq; qui e cerebro in palatum & nares destillant, denique omnia excrementa initio atque dum cruda adhuc sunt, aquea & tenuia esse: quum vero processu temporis concoquuntur, crassiora & pauciora euadere. Quibus omnibus & ratio & experientia ipsa subscribit, quæ omnia, quæ concoquuntur, & a calido patiuntur, humido nimirum euaporante, & quod tenuius est absumto, aliquo modo crassescere docet atque testatur. Fatemur itaque ea, quæ a natura euiecta concoctaue sunt, necessario crassiora & pauciora euadere, quandoquidem concoctio ipsa, vt etiā Gal. lib. 4. de ratione victus in morbis acutis fatetur, cogat, & increasset. Adeo vt recentiores Medicos plurimum hallucinari constet, propterea q; concoctionem, vel, vt ipsi loquuntur, digestionem, quum id, q; crassum est, attenuatur, fieri statuāt. Errandi autem occasionem iis, qui crassi concoctionem, cum eius subtilatione (ita enim loquuntur) fieri censent, Auicenna præbuit, qui, vt præcedenti capite ostensum est, Galeni locum male intellectum, ad concoctionem eorum, quæ præter naturam sunt, adeoque in habitum corporis redire nequeunt, perperam detorsit. Nam etsi concedimus concoctionem tenuium esse increstationem, tamen falsum erit, eandem crassorum attenuationem esse, cum omnes humores natura etiam crassi in ea immutatione, qua a natura euincuntur, vt monstratum est, crassiores aliquo pacto reddantur. Atque hac quidem ratione bilis flaua concocta, mitiorque facta, aliquo modo crassescit, propterea quod id, quod in eo nimis subtile fuit, ad quandam æqualitatem moderatam reductū est. Verum infert aliquis confestim: *Igitur bilis & alii humores, qui ex tali concoctione crassiores euadunt, agrius deinde expelluntur.* Respondeo, Nequaquam. Nam cum eam crassitudinem ab

E innato calido, & nequaquam ab immodico, neque etiam a frigore adepti sint, fieri non potest, vt hæc ipsa excretioni vacuationeue obsistat, & aduersetur: imo cum hanc crassitudinem nō, nisi quia a natura euiecti sint, consecutos esse constet, multo promptius iam ac tutius expellentur. Quippe cum natura ordinem & morem, Galeno etiam teste, ob-

F

An sanabilis concoctione egeat.

Obiectio.

Quæ concoquuntur, crassiora & pauciora euadere. Recentiorum Medicorum error.

Obiectio diluitur.

Nō omnis crassitudo excretioni aduersatur. Aphor. Com. 24.

Nō omnia
crassa, etiā
cocta.

4 Aphorif.
76.77.

Concoctio
nes a calidis
externis in-
nantur.

Galenī lo-
cus enarra-
tus.

Concoctio
nulla a fri-
gidis fit.
Error recen-
tiorum me-
dicorum.

seruat, vt primo concoquat, dein discernat, & postea vacuet. Quum itaque post conco-
ctionem naturā ipsam vacuationi adminiculantē habeamus, expectandū erit, quoad
ab ipsa natura eucti, adeoq; crassiores redditi fuerint humores noxi. Nō igitur omnis
crassitudo vacuationi obstitit, sed ea duntaxat, q̄ non fita natura. Nec cuncta, quæ cras-
siora reddunt, ea quoq; concocta sunt, q̄ nimirū duæ sint crassitudinis causæ, calidum
videlicet, & frigidum. Calidum quidē, euaporando, frigidum adstringendo increffat.
Quæcunque igitur ab innato calido crassiora redduntur, ea concocta sunt, non q̄ a fri-
gido, seu nō naturali calore. Cū autē ea, quæ crassiora sunt, a calore natiuo facta sint cō-
cocta, necesse est, vt crudis sint contraria. Si crudis, quæ immoderata sunt, contraria exi-
stūt, mediocria sint oportet. Quapropter rectissime Hipp. urinā crassam appellat eam,
quæ mediocris est, collatione nimirum ad tenuem, quæ immoderata existit. Quæ contra a frigore,
aut immodico calore crassiora redduntur, hæc cruda sunt, & vacuarioni aduersantur.
Ceterum etsi vtraque concoctio, vt monstratum est, ab innato calido sit, tamen ab ex-
ternis auxiliis, quæ hunc robustiorem reddunt, augment & fouent, iuuatur. Id ipsum vero
possunt omnia, quæ temperatum & mediocre calore obtinent, adeoq; caloris na-
tīui substantiam, non qualitatē augment. Cuius rei testis est Gal. qui *lib. 5. de simpl. medic.
facult. c. 5.* diserte naturales alterationes concoctionesue ab innato fieri calore, ab exter-
no autem iuuari, scribit. Qualis autem esse debeat is, externus calor, in fine libri de *Con-
stitutione artis Medice* explicat, vbi quietem, calefactionē moderatā, boni succi ciborum
mediocre esum, & vini moderate calidi potionem ad concoctionē deducere tradit.
Non efficere, quia id munus solius est natīui caloris, sed *is πείλει* inquit. Nec obstat,
quod *sect. 5. aphorif. Comm. 22.* idem Gal. calorem externum concoquere scribit. Conco-
quit enim, non quia concoctionem efficit: ea enim a solo natīuo, vt comprehensum est,
fit calore: sed quia calorem natīuum concoctionem efficientem iuuat, fouet, & augeat.
Aut certe concoquit, non quidem primo & per se, sed secundo, & ex accidente, natīuo
nimirum calore interueniente. Nam quando de iis, quæ aliquid efficiunt, sermo est, di-
ligenter, Gal. etiam ipso *lib. 1. de simpl. medic. facult. c. 2. & 3.* monitore, discernendū erit, num
per se ex propria facultate, an ex accidente, & aliquo alio interueniente, id ipsum præ-
stent. Proinde quum Gal. *lib. 1. Epidem. sect. 2. constit. 3. Com. 41.* scribit, omnia, quæ medio-
criter calefaciunt, tum cibaria, tum fomenta, tum cataplasmata, frictionē item medio-
crem, ac balnea concoctiones efficere: *ἐργάζονται* enim verbo vtitur: intelligendum erit,
cuncta hæc non primo, & per se, sed secundo, & aliquo alio, nempe natīuo calore, quæ
singula hæc fouent, augment, & iuuant, interueniente cōcoquere. Atq; locos hos ita esse
intelligendos, aliū eiusdē auctoris, quem paulo ante ex *lib. de Simpl. medic. fac.* citauimus,
palam euincit. Ibidem enim diserte inquit, *concoctiones ab innato calore fieri, ab externo autē
iuuari.* Simili ratione certe explicandus venit Hipp. locus, qui est in *sect. 5. Aph. 21.* vbi aquæ
frigidæ perfusionem, curare distentionem scribit. Non enim per se & primo: alias hoc
tritum Medicorum axioma, contraria contrariorum sunt remedia, euerteretur: sed ex
accidente, reuocādo nimirum calorem natīuum, distentionem aqua frigida sanat. Ca-
lor autē per se, *metipso Hipp. teste*, curat. Vt iam abunde pateat, calorem natīuum per se, &
primo concoctionem efficere: externum autem ex accidente, quia nimirum natīuo o-
pituletur, illumq; foueat, & augeat. Quod manifeste etiam Arist. *4. Meteor. c. 2.* iis signifi-
care verbis voluit: *Quum quid concoctum est, perfectū est ac genitum, atq; perfectionis exordium
a natīuo calore prouenit: quamuis aliquo externorum adminiculo ad calcē vsque per duci soleat; quo-
modo alimentum per balnea, & id genus alia concoquitur.* Et idem quoq; ibidem testat, quum
humoris concoctionem, quam maturationem vocat, natīuum calorem efficere scribit.
Porro cum ex iam dictis omnib. sit manifestum, concoctiones a calidis tantum, neq; iis
quidē omnibus, sed duntaxat tēperatis ac mediocrib. iuuari, hallucinari cōstat omnes
nostræ ætatis medicos, qui bilis concoctionem a frigidis serapiis, violaceo, rosaceo, &
nymphæa, intybo, & id genus aliis, fieri dicunt. Constat enim frigidū concoctioni per-
petuo aduersari. Nam calorem natīuum, qui concoctionem efficit, refrigerando extin-
git. Hinc est, quod Alex. Trallian. *lib. 1. ca. 10.* biliosum humorem non per frigida, sed
mediocriter calida concoquendum esse docet: idq; ex Gal. *lib. 2. de Comp. med. localium:
cap. 11.* sententia, qui itidem balneis temperatis, & vnctionibus, & potu diluto bilem es-
se concoquendam hortatur. Sed præstat verba Tralliani subiicere, quæ sic habent:

- A** Εἰ μὴ τὸ ἔλαττον τῆς πλεονάζουσης τῶν χολαδὸν χυμῶν πλάκας ἢ κεφαλαλγία γίνεται, ποιεῖν ταύτης τὴν θεραπείαν δεῖ τῶν καθαρῶν, ὡς ὑποκρίνεται διωκμένων τῶν χολαδὸν χυμῶν. ἀλλὰ ἵνα τὸν διωκτὴν κενώσῃ κεφαλῇ, ὡς γὰρ τὸν δεῖται τῶν πρώτων, οὐκ ἐστὶν τελευτῆς, καὶ αἰμῶναι, καὶ ὕδαρ' ποτὶ πλείονι. ὅτε γὰρ δεχθῇ καὶ οἷον ἀδινεστερ γινόμεν' οὐκ ἐστὶν ὑπὸ τῆς ἰκοντος· αὐτῶν λαμβάνεται φάρμακον. *Si igitur capitis dolor subinde propter biliosi humoris redundantiam nascatur, curatio eius medicamentis, qua biliosum humorem purgant & subducunt, perficiatur. Verum ut probe hunc vacuare possit, humidior prius victu opus est, balneisque temperatis, unctionibus, & potione diluta liberaliore. Ita enim diffusa bilis, & veluti imbecillior facta, facilius a medicamento ipsam trahente vacuabitur. Atqui obiciet quispiam, frigida serapia biliosos humores alterare, crassioresque reddere, ideoque etiam concoquere.* Respondeo, Alterant quidem, sed cum hæc alteratio non fiat a calido nativo, concoctio nec dici, nec esse potest. **B** Increasant quoque, sed non euaporando, ut calor innatus, sed adstringendo. Quapropter humores biliosi a frigidis serapiis crassiores redditi, crudi adhuc sunt, & a natura nondum eucti, nec substantiæ mediocritatem consecuti: igitur etiam ad excretionem & vacationem inepti sunt. Sed instabit rursus alius. *frigida concoquere, si non per se, saltem ex accidente, nempe reuocando calorem.* Respondeo, verum esse, si id ipsum de iis frigidis intelligatur, quæ extrinsecus admouentur. Hæc enim cutem constringendo & caloris euaporationem prohibendo, auctiorem calorem nativum reddunt, qui subinde per se concoquit. Frigida vero serapia, & id genus alia medicamenta, quæ intra corpus assumuntur, calorem nativum imbecilliorum efficiunt, aut prorsus, si frigida admodum fuerit, quale est e papauere cōpositum, exstinguunt. **C** Vt hinc manifestissimum sit, *Serapia frigida concoctionem iuuare non posse.* Quapropter Actuarius in lib. de comp. medic. zulapia frigida non exhibet, ut bilem concoquant, sed ut eius feruorem potius exstinguant, adeoque alterent, ut natura illam subinde euincere & concoquere possit. Hinc diserte inquit, si bilis incandescat, & hominem exurat, & calefacientia respuat, frigida zulapia ante bilis purgationem esse danda, donec in vrinis decens apparuerit concoctio. Sed de concoctione satis.

Quo morbi tempore purgandum. CAP. XXI.

- H** Atenus de concoctione, & quod a purgationibus Medico abstinendum sit, donec humores concocti fuerint, diximus. Vnde omnibus palam fit, in morborum principiis, quod tum omnia adhuc cruda sint, nec nisi vigoris tempore, *Galenolibr. 3. de Iudiciis, c. 5. septe*, exquisita cōcoctio fiat, non esse purgandum. Nam nec natura ipsa, cuius Medicus minister & imitator est, vnquā in morbi principio, & dū humores adhuc crudi sunt, ullam vacationē instituit. Neque enim hoc tempore vel naturæ, vel purgantibus medicamentis obediunt, eaque de causa grauissima symptomata excitant. Quapropter eo tempore, quo natura superuacua vtiliter expellit, si imperfecte ipsa mouet, purgante medicamento Medicus vti debet, ac id quod deficit medicando supplere, ut ex utroque noxii humoris vacuatio recte fiat, natura quidem expellente, medicamento vero attrahente. Idque perpetuo faciendū, nisi humores turgant: tum enim in principio etiam morbi, & humoribus nondū coctis, medicamento purgante vti licet, ne scilicet humores parū stabiles, & ab vna parte ad aliam sine ordine defluentēs, in principē aliquam partē decumbant. **E** Nam turgere, vel, ut Hippocratis verbo utamur, *ὄρεγαν*, *Galenolibr. 8. de comp. medic. local. ca. 3. auctore*, nihil aliud est, nisi humores motū impetuosiore, ac cōcitatiore ab vna parte in aliam defluere, idque statim morbi initio hominem irritantes, quiescere nulla ratione permittentēs. Hos itaque humores, eo quod agitentur, & de vno ad alium locum transfluunt, purgante medicamento in morbi principio vacuare conuenit. Eos vero, qui aliqua in parte firmantur, ac fixi hærent, ante concoctionem neque purgantibus medicamentis, neque aliis præiudiis mouere oportet. Siquidem naturam tum vacationi adminiculantē Medicus non habebit, ut quæ illos hoc tempore non vacuare, sed concoquere studeat. Cuius rei certissimum est indicium, quod humores quiescunt. Nam quiete, non motu, fit concoctio. Motus contra significat, quod natura eosdem vacuare cupiat, utpote partibus corporis omnibus molestos & infestos. Quod Hippocrates innuere voluit, dum *concocta purgante medicamento vacuanda tantum censet, & ea, quæ cruda sunt, nequaquam mouenda, neque, in principiis morborum, nisi humores turgant.* Et rursus, ubi in acutis morbis raro, & in principiis medicamentis purgantibus esse utendū præcipit. Et iterum, ubi medicamentis purgantibus utendum in valde acutis morbis, si materia turget, eadem die hortatur. Vt hinc omnibus perspicuum est.

Imminuen-
tibus mate-
riam medi-
camentis
purgantibus
inter initia
viti non li-
cet.

ua dat, inter morborum initia non esse purgandum, modo humores non turgeant, neque validis, ne-
que iis, quæ materiam morbum excitantem imminuunt, & ab iis, qui hodie faciunt medicinam, mi-
noratiua appellantur, medicamentis. Siquidem Hippocrates crudos humores, ne mouēdos
quidem ullis remediis esse præcipit, tantum abest, ut purgādos esse permittat. Non autē
abre dictum est, *Materiam morbum excitantem minuentibus*. Non enim prohibemus, quin
initio morborum, nulla adhuc apparente concoctione, mitiora illa medicamenta, quæ
vulgo *benedicta* vocātur, exhibeantur, quod eorundē vires primas venas, vel etiam loca,
in quibus crudi humores morbumq; excitantes hærent ac firmati sunt, non attingant,
sed duntaxat materias in viis illis, per quas morbifici humores ducendi sunt hærentes,
educunt. Quib. plane vacuatis, natura subinde non nihil exonerata, ad reliquos morbi-
ficos humores tū concoquēdos, tum expellendos expeditior & alacrior fit. Eam certe
ob causam Galenus non raro exhibet inter initia morborum medicamenta, quæ hu-
mores in ventriculo & intestinis hærentes vacuant, etiam crudos existentes, quod
scilicet illis non sit per angustas vias transitus futurus. Sic surditate a crassis humori-
bus nata, nondum apparente eorundem concoctione, totum corpus de Galeni et-
iam consilio, purgamus, non protecto ut crudos adhuc in auribus humores vacue-
mus, quod eo vis medicamenti purgantis non perueniat, aut si etiam perueniret,
quum non cedant, nec tractioni obsequantur, nihil tamen educeret: sed potius ut
inhibeamus ne alii humores in venis, aut in aliis corporis partibus fluctuantes ad la-
borantem partem confluant. Quinetiam idem Galenus libro primo, de compositione me-
dicamentorum localium inter initia Alopeciz nulla præcedente concoctione, aut præ-
paratione purgat, non tamen eos humores, qui in capite firmati sunt, sed alios, qui
per vniuersum corpus sparsi sanguinem vitiant, ut in nostris super Hippocratis Aphorif-
mas Commentariis copiosissime demonstrauimus. Atqui dicent aduersarii, si non nisi conco-
ctis iam humoribus medicamentum purgans Medico exhibere licet, certe nullo vn-
quam morbi tempore dandum erit. Quia non in principio, in quo humores omnino
crudi sunt. Non etiam in augmento, quia nondum integre concocti sunt. Exquisita
namque concoctio, ut paulo ante ex Galeno ostensum est, non fit, nisi vigoris tempore. Non
licet autem in vigore purgante medicamento vti, quod tempore hoc, quo morbi con-
sistunt, & vigent, Hippocrate monitore, quiescendum sit, corpusque nullatenus mouen-
dum. Quippe præter id, quod tum natura concoctioni noxiotum humorum intenta
ab opere suo distrahitur, adeoq; illa, ne eos euincere possit, impeditur, etiam per quam
viam molitura sit iudicium non facile dignoscitur. Quomodo igitur operi naturæ fa-
uebit, quando nondum ad quam partem sese vertet sciat? Quum itaque Medico perito
cauendum vnice sit, ne contrarium naturæ motum molitur, & vigoris tempore, quo
hæc ipsa tendat, ab illo ignoretur, nullis prorsus vacationibus, nedum purgationibus,
quum morbus viget, utendum erit. Non etiam in declinatione, quia tum non est opus,
quandoquidem tum vis morbi decreseat, hominemque interimere amplius nō possit.
Quibus ita respondendum esse puto: Verum esse, quod perfecta iam concoctione, & morbo incli-
nante non sit purgandum, si natura per iudicationem vniuersum id, quod noxium fuit, expurgauerit,
iuxta id Hippocratis: Quæ iudicantur, & iudicata sunt integre, non mouere, neq; nouare vel me-
dicamentis, vel aliis irritamentis, sed sinere oportet. Si vero post exquisitam concoctionem
ad id, quod noxium est, expellendum natura satis potens non fuerit, Medici officium
erit, ut declinante iam morbo illud, quod deficit, suppleat, ne scilicet recidiuam, quod
reliquum est, efficiat. Quæ enim in morbis a iudicatione, ait Hippocrates, relinquuntur,
recidivas facere consueuerunt. Quapropter rectissime Galenus loco paulo ante cita-
to inquit: *Experientia testatur, neminem vnquam vi morbi in declinationibus periisse. Sed
adhuc magis ratio. Neque enim contingit, ut postquam causa morbosa iam cocta sunt, ac natu-
ra euicerit, ager moriatur, modo recta curatio a Medicis adhibeatur.* Ceterum rectam cura-
tionem adhibebit Medicus, si quod imbecillior natura vacuare non potuit, ipse va-
cuet, & ne recidiua, quæ plerunque ipso morbo deterior est, accidat, prohibebit. Vi
sole meridiano iam clarius sit, ante perfectam concoctionem, in morbis eam admit-
tentibus, nunquam esse purgandum, cum eo tempore, quo concoctionem absoluit,
quod noxium est, natura per iudicium expurget, ut hoc nomine importunis re-
mediis a concoctionis munere non sit distrahenda, nec in suo opere impedienda.

Non

A Non autem temere dictum est a nobis, non esse purgandum, aut purgantibus medicamentis utendum. Siquidem iis verbis non esse medicamenta validiora, & e longinquo trahentia, adeoque quę reuera sunt & dicunt purgantia, vsurpanda innuere volumus. De iis enim Hippocratem, vbi cruda non esse purganda monet, locutum esse constat. Proinde mitioribus, & quorum vis ultra iecur non transcendit, vt sunt casia nigra, manna, oxyphœnicum, hiera picra, & id genus alia, ad alui subductionem in principio etiam morbi, quemadmodum paulo ante dictum est, vti medico licebit: quod ea tantum, quę in ventriculo & intestinis sunt, vacuent. Nonnunquam etiam, quę in primis venis continentur, modo illis non sint impacta, educunt.

Quid purgationis tempore, & a purgatione sit faciendum. CAP. XXII.

B **Q**ui purgans medicamentum est sumpturus, is calidū hauriat oportet, non tepidum, aut frigidum. Nam ita medicamentum ventriculum minus offendet, & citius suam exseret facultatem. Tepida namq; ventriculum relaxant, frigida vero nō parum offendunt. Quum vero promte admodum, iis præsertim, qui ad vomendum proniores sunt, vomitus post medicamenti sumptionem excitetur, præstat odoris vehementiam aliquo iucundo & odorato obtundere, ne ei, qui hausturus est, a medicamenti odore parū grato nausea cōcitetur, quam mox vomitus excipiat. Aut nares obstruere, ne ad illas odor medicamenti attingere queat. Porro medicamento sumto assum panē aceto imbutum odorare conuenit, & calidis pannis ventriculū fouere oportet: ita enim vomitus arces.

Medicamentum purgans calefactū bibendum.

C Prodest etiam os colluere statim, vbi haustum fuerit, vino odorifero, aut mandere aliquid suaue & iucundum, q; horribilem medicamenti saporem obscurare possit. Dein horam vnam quiescat, qui sum sit medicamentum, nec somnum admittat, vt vis medicamenti ad vniuersas corporis partes pertingere possit, & ne ab immodico calore, præsertim si lene fuerit medicamentum, dissipetur. Omnium autem maxime a somno arcendus erit, vbi iam purgare cœperit, quod ita medicamenti actio intercipiatur. Quod si tardius actionem suam medicamentū purgans exserat, vt inambulet, & se moueat, modo per morbum integrum sit, præcipiendum erit, iuxta id Hipp. *Eum, qui Elleborū bibit, ad corporis motus magis, ad somnos vero & quietem minus ducere oportet. Corpora autē motu turbati, nauigatio indicio est.* Et statim post hæc, *Quum volueris vt Elleborus magis ducat, corpus moue: vbi vero sistendum esse censueris, somnum conciliato, & haud moueto.* Ceterum ab assumpto

4. Apho. 14.

4. Apho. 15. Quid a purgatione faciendum.

D medicamento, ne eius actio impediatur, nihil est offerendum, nisi os ventriculi natura admodum sensile ac imbecillum, purgantis medicamenti acrimoniam sustinere non possit, adeoque syncopen minetur. Tunc enim ptisanę cremor, aut etiā cicerum ius cum saccharo, vt quę gulam, & os ventriculi vellicant, detergeantur, exhiberi potest. Quod si vero prospere & citra vilius symptomatis accessionem purgatio pcedit, nihil penitus attendendum; sed satis erit, si eger ab immodico tum calore, tum frigore, se tueatur. Absoluta tandē purgatione, æger mediocri & boni succi alimento reficiendus erit. Sarius autem fuerit humidum, vt sit potius, quam siccum, & concoctu facile. Id enim promtius in ventriculo, iam imbecillo aliquo modo a medicamento facto, transmutabitur, atque ad expellendas purgantis medicamenti, & humoris ab eo attracti reliquias, præsertim si illi aliqua nō sit abstergendi facultas, aptius erit, vt sunt iuscula saccharo condita, aut ea, quibus cicer, aut hordeum in coctum fuerit.

Quousque purgandum, & quomodo impedita & immodica purgationi sit occurrendum. CAP. XXIII.

Qua sit absolutę & iam peractę purgationis nota, Hipp. in Aphor. ostendit, ita scribens: *Qui medicamentorum potionibus quum purgantur haud sitiunt, si non desinant prius, quam sitiant.* Sitis itaque, q; humiditatis indigentiam nuntiet, abunde esse purgatū corpus, noxiōsq; humores perfecte vacuatos ostendit. Quanquam non semper expectanda est sitis, q; interdum minori quantitate oblatum medicamentum non satis purget, nec noxios omnes humores educat: neq; enim facile conueniens cuiq; quantitas sciri potest. Ne igitur longiori, quam par sit, inedia crucientur, præstat vt iis, qui propterea, q; nō satis purgati sunt, sitim haud sentiunt, a medicamenti sumptione 6. aut 7. horis cibis exhibeatur, eo nimirum tempore, quo aliis, qui abunde purgantur, offerri cōsue tum est. Porro si eueniat, aut haustum medicamentum sua actione frustretur, nec quidquam educat, sed vētriculi morsum, aut tormina, aliaq; grauissima symptomata exciter,

4. Apho. 19.

Peractę purgationis nota.

Quando purgatis cibis sit offerendus. Si medicamentū sua frustretur actione.

Si immodice
purget.
4 Aph. 14.
& 15.

admitendum erit Medico, ut protinus eos, quos medicamentum attraxit, humores, e molliente & aluum subducente clysteri, aut glande subiecta vacuet. Sin contra accidat, ut immodice purget medicamentum, somno indulgendum erit, ac quiescendum. Ita enim esse faciendum Hipp. in præcitat. Aphorismis monet. Præterea imperus humorum intro confluentium ad alias partes frictionibus, vinculis, balneis aquæ dulcis, & id genus aliis præsidiiis reuellendus. Aer etiâ, in quo æger versatur, temperatus esse debet. Iusto namq; calidior, vires dissolvit: frigidior autem ad internas partes humorum impetum propellit, adeoque purgationem auget. Prodest etiam exhibere theriacam, ut quæ humorum impetum ad exteriora ducat, ac purgatoriam medicamenti vim haberet atque obtundat. Confert etiam *diacydonium* vocatum medicamentum, & similia, quibus adstringendi facultas inest, offerre. Perdurante vero adhuc purgatione, inanes cucurbitulas ventriculo admouere, & adstringentia vnguenta, emplastra, & cerara imponere, vtile est. In summa omnia ea sunt admouenda, quæ ad sananda alui profluvia usurpantur, de quibus in medendi ratione nostra diffuse tractauimus, ut necesse non sit hoc loco de iis copiosius differere.

Expurgatorum humorum observatio. CAP. XXIV.

Alui excre-
menta ut
medico sint
côsideran-
da.
2. Aphor. 23.
Qualitas.
Consisten-
tia.
Color.

Purgatione peracta, alui excrementa, & quæ vacuata sunt, a Medico accurate sunt cōsideranda. In initio aut quæ vacuantur; vulgi more, non multitudine sunt æstimanda, Hippocrate etiam suffragante: sed si talia vacuata sunt, qualia vacuari oportet, & æger facile toleret. Talia vero vacuantur, qualia oportet, ubi noxii ac vitiosi humores vacuantur, vtilis autem in corpore retinentur. Id certe quod accidit, quando æger vacationem hanc leniter fert. Non solum vero qualitas excrementorum alui, sed & consistentia eorundem, num scilicet solida, an liquida sint, expendenda venit: Deniq; color eorundem, num pallida, rufa, liuida, aut nigra sint. Ex eo namque varia dignosci & præcognosci etiam possunt, ut copiosissime lib. 2. Prognost. Aphor. 13. & seqq. aliquot Hippocrates, nec non ibidem in Cōmentariis suis, & lib. 1. de Iudiciis Galenus monstravit, & nos infra lib. 4. ne quid lector desiderare possit, hæc omnia breuiter perstringemus. Ceterum præter iam dicta, excrementorum quoq; mutationes diligenter Medico sunt contemplandæ. Nam si in spontaneis & a natura factis alui profluiis variæ humorum species vacuatur, laudabile est, propterea, quod corpus exquisitius expurgent. Quod confirmat Hipp. qui in Aphorismis ita scriptum reliquit: *In profluiis ventris mutationes excrementorum iuuant, nisi in praua commutentur.* In praua aut commutantur, si nigra aut liuida fuerint, aut colliquatione & putredinem præ se tulerint. Quo itaq; plures deteriores in alui profluiis fuerint colores, eo peius erit. Siquidem multorum & prauorum in corpore affectuum sunt signa. A purgante vero medicamento hausto melius est plures & deteriores etiam excrementorum ac deiectionum esse colores. Et cerre quâto plures fuerint colores, tâtò minus mali erunt. Quod Hippo. in Apho. iis significare verbis voluit: *Nigra, inquit, deiectiones, veluti sanguis niger, sua sponte exeuntes, & cū febre & sine febre pessima: & quo plures deteriores fuerint colores, eo peius. A medicamento autem si tales egeruntur, melius est & quo plures colores fuerint, eo minus mali erunt.*

Mutatio
excremen-
torum.

2. Aph. 14.

4. Aph. 11.

De vomitu. CAP. XXV.

Vomitum
quid.
Nausea.
Vomitum
commoda.

Quibus
vtilis vom-
itus.

Hactenus de purgatione differuimus: nunc ad vomitum, tertium vacationis genus, accedemus. Vomitum autem est vacuatio per superiora eorum, quæ in ventriculo continentur, illumq; grauant & molestant. Hunc præcedit nausea, quæ non est nisi inanis vomendi conatus. Vomitum autem non temere in cōsiderationem Medici venit, quod eius non contemnenda sint commoda. Qui enim frequenter vomunt, magna ex parte semper sani esse consueuerunt. Siquidem vomitus non bilem modo, sed & pituitam molestantem ventriculum educit, adeoque ne ille malis ac vitiosis humoribus impleatur, efficit. Cum vero a prauis humoribus vapores sursum ad caput ferant, præsertim ubi biliosi fuerint, non parum a vomitu etiâ caput ipsum subleuatur. Vtilis vero præ aliis est vomitus omnibus biliosis, quod bilis, utpote tenuis humor, facile sursum vergat. Præterea iis, qui cibis & poribus se nimium impleuerunt, vel parum recte concoxerunt. Si enim plus iusto quam ut concoqui possit, ingestum est, periculum imminet, ne in ventriculo corrumpatur. Nihil igitur conducibilibus, nisi ut priusquam quod assumptum est, corrumpatur, quæ via commode expelli potest, nempe per gulam, eiiciatur. Quanquam ne tum quidem quum corruptum est, intus sit relinquendum, quod ingestum est, sed quo cōmode pos-

test

A test expellendum. Ceterum singulis mensibus vomendum esse Hippoc. præcipit. Nam *lib. 1. de ratione victus* ita scriptum reliquit: *Consultius est, ut is qui singulis mensib. vomere consuevit, continuo biduo hoc agat, quam interpositis quindecim diebus: ita enim secundus dies prioris reliquias extrudit.* Quæ quidem sententia etiam in libro de salubri victu reperitur. Hanc Galenus *lib. 5. de usu partium, cap. 4.* confirmat iis verbis: *Recte igitur inquit, veteres Medici vomitus a cibis in singulos menses repeti præcipiebant, alii quidem semel, alii vero bis. Omnes autem hi qualitates ipsas eo casu comedendorum acres atque absterforias diligere consulunt, ut pituita omnis e ventriculo purgetur, neq. prauo succo corpus afficiatur.* Cauendum itaq. omnibus, qui recte valere & senescere volent, magnopere erit, ne vomitum prorsus negligant, sed illū, modo fieri possit, ex præscripto Hippo. adhibeant, singulis nepe mensibus, & duob. continuo diebus. Nec minori diligentia cauendum iis ipsis erit, ne quotidianum vomitum habeant. Quippe eius frequentia assiduusue vsus surditatem inducit, vsui obest, thoracis pulmonique venas dirumpit, dentibus nocet, & capitis dolores, modo ex ventriculi vitio nō sint orti, offendit. Non autem ab te paulo ante diximus, vomitum, si fieri potest, suo tempore adhibendum esse. Nam in ciendo vomitu magno studio Medico considerandum erit, qui ad vomendum faciles, quiq. difficiles sint. Qui enim nō nisi difficulter vomunt, ad vomitionem nequaquam cogendi sunt, sed per inferiora potius purgandi: difficulter namq. vomentib. vbi eos ad vomendum quispiam vrserit, venarū, quæ in thorace sunt, ruptionis periculū imminet. Porro difficiles & inepti ad vomendū sunt, mediocriter carnosī ac pingues, angustiq. thorace præditi. Cōtra faciles & idonei, qui natura tenues gracilesq. sunt, & amplū obtinēt thoracem. Priores n. plurimū pituitosi aut melancholici humoris habent, ideoq. per inferna, quandoquidem eo maxime iam dicti humores tendant, vacuandi sunt. Posteriores autem natura calidi & sicci, atq. adeo biliosi sunt, plurimum itaq. bilis coaceruāt: quare per superiora, quo maxime natura repit, vacuare eos oportet. Quæ singula Hippoc. in Aphorismis quoq. iis docuit verbis: *Graciles, & ad vomendū faciles, per superiora purgare conuenit. Qui vero ad vomendū difficiles sunt, & mediocriter carnosī, hos per inferiora purgare oportet.* Non temere autē dictum est, *Natura graciles.* Nam qui vi morbi tales sunt, veluti rabidi, iis vomitus inutilis est. De quibus sane locutus est Celsus *lib. 1. c. 3.* vbi inter cetera in eū scribit modum: *Vomitū inutilis est gracilibus, & imbecillum ventriculum habentibus.* Qui n. hac ratione graciles sunt, iis thorax angustus est, & vasa ruptioni obnoxia. Qui vero imbecillum habent ventriculum, ii vomitum, quod ipsum præcipue mirum in modum lancinet & conuellat, sustinere non possunt. Ceterum tempus vomitui aptissimū est æstas, vtpote in qua biliosi maxime procreantur humores, qui suapte natura, quod tenues admodum sunt, sursum feruntur, & nullo negotio vomitu reiiciuntur. Quod Hippocrates etiā cōfirmat, qui in Aphorismis inquit: *Æstate quidem superiores magis ventres, hyeme autem inferiores medicamentis purgare cōuenit.* Neq. obstat, quod Hippocrates, aut potius Polybius, in libello de victu salubri contrariū adstruere videatur, dum sex hybernis mensib. vomendum esse tradit: & hunc etiā secutus Cor. Celsus loco paulo ante citato, vomitum vtiliorem hyeme, q̄ æstate esse scribant. Nam vterque in iis locis de pituitæ vacuatione, quæ citra purgantia fit medicamēta, loquitur. Nemo vero est, qui nesciat, hyberno tempore pituitam, potissimum in ventriculo, magis q̄ alio tpre generari. Vt igitur vomitu expurget, necesse est. Vbi vero in vniuersum corpus medicamētis purgare consiliū est, æstate p vomitū, atq. superiorem ventrē: hyeme p deiectionē, ac ventrem inferiorē, ut in Aphor. relatum est, purgandum erit. Quid multis opus est verbis? Quū non vniuersum corpus exonerare constitutum est, sed ventriculum solum a pituita in eo coaceruata vindicare placet, vomitu illam eiicere licebit, imo plurimum conferet. Sin vniuersum corpus expurgare animus est, æstate per superiora, & vomitum, hyeme vero per inferiora purgandum erit. Deniq. ea, quæ per vomitum quouis tempor eiiciuntur, accurata op̄era Medico sunt considerata, quod ex his, perinde atq. ex alui excrementis, multa prædicere possit, quemadmodum *lib. 2. prædict. Aphorif. 38.* & sequentibus aliquot Hippocrates, & post eum in suis Commentariis Galenus luculenter & perspicue docuerūt. Quib. vero reb. & medicamētis vomit⁹ ciendus sit, alibi ostendimus.

De vrina excretionē. Cap. XXVI.

VRina excretio etiam inter vacuationum genera censetur. Quippe nō raro accidit, ut corporis superuacua per vrinā vacuentur, potissimū in laboriosis, hoc est, in qui-

Quoties vomendum.

Creber æ quotidianus vomitus cauendus.

Facilitas & difficultas vomendi.

Difficiles & inepti ad vomendum.

4 Apho. 4

Celsi locutus enarratus.

Tempus vomitioni aptissimum.

4 Apho. 41 Obiectio diluitur.

Quæ per vomitum eiiciuntur, Medico considerata. Natura superuacua corporis per vrinam vacuat. Laboriosus febrilis

6 Epidem.
sectio. 4.
apho. 2.
Quando
vrinæ pro-
uocatio-
ne, vt en-
dam.

Quando
ab vrinæ
prouoca-
tione ca-
uendam.

Vrinā pro-
uocantia
quo dici
tempore
danda.
Prouoca-
tia vrinā
medica-
menta.

Sudor
quando
prouoca-
dus.
Sudoris e-
liciendi
modi.

Feruenti
arena vt
eliciendus
sudor.

Quibus
siccō ca-
lore sudor
non est e-
liciendus.

bus lassitudinis sensus inest, febrib. quemadmodū in Aphorismis iis verbis testatur Hip. A-
pocrates: *Quibus spes est ad articulos futurum abscessum, eos liberat ab abscessu vrina multa, crassa,*
& alba prodians, vt in laboriosis febribus quarto die nonnullis exire incipit. Et in Epidemiis id-
ipsum exemplo quodam confirmat, inquit: *Vrina crassa & alba, qualis Amphigenis famulo*
prodiit, in laboriosis febribus, quando quarto die exit, ab abscessu liberat. Cum itaque natura in-
terdum corporis excrementa noxiosque humores in morbis per vrinæ excretionem
expurget, debet & ipse Medicus, qui huius minister est, & simia, in plerisq; morbis vri-
næ prouocatione vti. Hoc vero præsidio, tum potissimum vtendum Medico erit, vbi
obstructio, vel humorum redundantia circa iecur, eius præcipue gibba, item renes, &
vesicam fuerit. Nam anatomes ratio monstrat, quod ea, quæ in iam dictis partibus con-
tinentur, per nullū corporis locū commodius & expeditius, quam per vrinarios me-
tus vacuari possint. Non autem temere adiectum est paulo ante, *Eius potissimum gibba.* Si
enim in cauo iecoris fuerit obstructio, tum per aluum potius, quæ obstructionē efficiūt,
purgare oportet. Nam & id dissectionis ratio probat, & multis in locis, præsertim *lib. 7.*
Therap. meth. cap. vlt. & 13. eiusdem operis, cap. 13. & lib. 2. ad Glaucon. cap. vlt. Galenus docet in
hanc sententiam prorumpens: *Sicut iecoris cauum per aluum purgatur, ita gibba eius per ea, qua-*
modice vrinas mouent. In elicienda vero & prouocanda vrina, accurata diligentia inqui-
rendum erit, num phlegmone, aut exulceratio aliqua sit in renibus, vesica, & aliis vrinæ
instrumentis. Quippe si aliquid horum adsit, vrinam impuētibus, nequaquam vtendum
erit: quod tum a laborante particula longissime auellere, nequaquam ad eam trahere
conueniat. Id quod *lib. 13. Ther. meth. cap. 6.* Galenus, vt alia omnia, prudenter & doctē ad-
modum iis verbis etiam admonuit: *Præceptum, inquit, in contrarium auersionis, in omnibus*
commune est. Neque igitur, quum vel circa sedem, vel aliquam huic vicinam partem initium, phle-
gmones incidit, aluum deiicies: neq; quum in vesica, vel colo, vel renibus capta, medicamenta, qua v-
rinas prouocent, bibenda dabis. Nec si mulieri in utero, vel pudendo insedit, menses huic mouebis: sed
ad partes, qua maxime longinqua sunt, semper auersionem moliaris. Ceterum, quando vrinam
prouocare Medico consilium est, conuenientius ante cibum id efficiet, & eo magis, si
quæ vrinam proliciunt, admodum calida fuerint. Nam cum vrinam mouentia in censu
eorum sint, quæ valde distribuunt, nequaquam a cibo offerri debent, ne illum adhuc
crudum ad venas deducant. Quæ vero sint medicamenta vrinas mouentia, alibi dixi-
mus, & id ipsum ex professo Galenus *lib. 5. de simplic. medicament. facult. cap. 13.* docet.

De sudore. CAP. XXVII.

IN genere eorum, quæ corpus nostrum vacuant, sudor etiam commemorandus
venit. Cuius sane prouocatio, tum potissimū utilis & necessaria est, vbi noxius aliquis
humor interiora corporis infestat, vt in febribus, præsertim pestilentialibus euenit. E-
licitur vero sudor variis modis, principio, sicco calore laconici, de quo sequēti dicemus
capite, ignitorum lapidum, arenæ calidæ, solis, & exercitiorum. Commune n. omnium
est istorum, humorem corpori immersum, atq; redundantem, præsertim aqueum fri-
gidumque excoquere, elicere, consumere. Quare nonnulli feruentissima arena, maxi-
meq; marinā, quæ & falsedine & ariditate ceteris præstat, corpus defodiunt, quæ & sic-
citate & leuitate sua sitientissima humiditatem, & calore frigus corporis absumit. At
ita, vt adsint ministri, qui continuo nouam æstuantemq; corpori accumulent, priore re-
frigerata deiectaque. In qua & corpus circumuoluitur, & certis interuallis inuertitur, vt
vndiq; arenæ commodis fruatur. Verum sicubi maritima arena desit, fluuiali pro ea vti
licebit, sed corio denso instrata: propterea quod & hæc ipsa sit, & eius aer, ab euapora-
tionibus humectior, & corio subiecto, tum incalescit, a sole acrius, tum a vicino alueo-
minus commadesit. In quibus tamen hoc studiose obseruandum erit, non aridis cor-
poribus, siccis morbis, febribus, humoribus exsiccantibus & calidis, imo ne frigidis qui-
dem omnibus, nisi vitio iam inclinante, aut certe, neq; cum crassis, neq; cum lentis hu-
moribus coniuncto, quicquam horum, quæ arido calore opem præstant, congruere. Id
quod monendum esse duximus, ne arida vitia nimium exsiccarentur, & ne calida in-
flamarentur, atq; ne crassa lentaq; absumta tenui parte, admodum inspissaretur. Qua-
propter declinantib; iam frigidis humidisq; noxis, aut plane aqueis a caussis ortis, tuto
commodeq; superiora, & sicco calore opitulancia, vsurpabuntur. Alii sunt, qui se soli æ-
stuant obliuiscunt, atq; ita sudores eliciunt, quæ res hydropicorum maxime humores ex-
sugit.

- A** fugit. Sudor præter ea, quæ hætenus exposita sunt, et fomentis prouocatur. Quæ multis modis ipsa quoque institui possunt. Simplicissima vero sunt, quæ linteis calefactis sudor elicitur. Calor n. laxat, aperit, euocat, attrahit, discutit, post quæ plerumque sudor sequitur. Proxima sunt, quæ linteo aliquid retinendo calori, mouendoque accommodatū inuoluitur. Quæ, si arida expectas, milium facile est omnium suauissimum, aut defixi furfures, deinde arena, tū sal quoque. Quæ & torreret omnia, & linteis sacculisue includi arida, calidamque, vel aquæ cuiuslibet aptæ calidæque, immergi, corporique identidem applicari possunt. Duriora fortioraque sunt lateres, æra, ferræque pannis linteisque similiter inuoluta. Sin minus arida desiderent, oleo calido, aut aqua calida utrem, aut vasculū æneū, testaceū fictileue, vesicamque implere, & corpori adhibere conuenit. Sudorem quoque elicit chamæmelum aridum tritumque, & oleo inspersum, si summæ cuti valide infricetur. Item *Seseli, pyrethrum, anisum, similiter oleo inspersa*. Nitrum etiam tostum, & non omnino tenue, cum oleo infricatum, efficax est. Si humectiora expectantur, lana, aut spongia mollis in aqua simplicem calidamque, aut herbis, radicibus, seminibus, aliisque idoneis reb. incoctis permutatam, aut in oleum quoduis rei præsentis aptum immersa competit. Ad hæc salis flos oleo temperatus, & liquor Cyrenæicus aqua dilutus corporique infricatus, aut ciceris magnitudine epotus. Pari modo calamintha & pōta cū mulla, & extrinsecus cum oleo infricata. Ceterum, fomenta illa in morborū declinatione ante omnem cibum, veterique esca iam probe cōcocta, nec excrementis ullis intus abditis securissime, & cōmodissime applicantur. Sic Arthritidi iam inclinanti, sic colico dolori, sic pleuritidi magno compendio succurritur. Sic alias manibus, pedibus, lateribusque calefactis, sudor toti corpori excitatur. Sic denique cruciatus viscerum discutiuntur. Porro in eliciendis sudoribus ut in omnibus etiam aliis vacuationum generibus, vnice cauendum erit, ne is immodicus sit, & vires plane deiciat. Atque hinc est, quod Hippocrates in *Epidemiis* non temere monuerit, ut in sudore prouocando Medicus consideraret, ne nimium hunc eliciendo, & immodice vacuando vires deficerent, adeoque æger in summum vitæ discrimen perduceretur, quemadmodum accidit, quum sudorificæ febres, Anglicum sudorem vocabant, per omnem Germaniam anno Christi 1529. Autumno potissimum, grassarentur. Quippe tum imperitorum Medicorum, aut, ut rectius dicam, carnificum opera non solum plebei, sed & potentes multi, & episcopi aliquot immodica sudoris prouocatione interempti sunt. Quæ autem & qualia ex sudoribus prædici possint, suo dicemus loco.

De Balneis naturalibus. C A P. XXVIII.

- I**n genere eorum, quæ vacuant, esse etiam recensenda balnea, nemo est, qui nesciat. Sunt autem hæc ipsa duplicia: quædam n. naturalia, quædam vero arte confecta seu artificialia nominant. Naturalia, de quibus hoc capite differemus, sunt, quæ per se & sponte sua nascuntur naturaliterue proveniunt & scaturiunt. Hæc vñtato nomine, quod omnia propemodū calefaciendi vim obtinent, *therma* vocantur. Horum certe multa sunt genera, & Paulo quidem *Æginetæ lib. 1.* octo quidem præcipua recensentur: alia enim nitri, alia salis, quædam aluminis, quædam sulphuris, nonnulla bituminis, aliqua ferri, aliqua æris, alia auri naturam & qualitatem resipiunt. Nec temere diximus. *Præcipua*, sunt enim aliqui fontes medicati, qui ex nullo horum fiunt. Nam aliquas sponte natas mistas atramento sutorio, chalcitide, misy, & id genus aliis recenset Galenus. Sunt igitur aquæ etiam atramentosæ, ærugine fossili infectæ, & auripigmento, item cadmia fossili, chrysocollo, & melanteria. Præterea, quæ argenti viui venas lambunt, quas omnes Georgius Agricola, singulare Germaniæ ornamentum, & qui in iis rebus describendis omnem antiquitatem longe superauit, in libris de *natura eorum, quæ ex terra fluunt*, percensuit. Quædam ex pluribus horum mistis constant. Est autem in vniuersum omnium aquarum, quæ medicam præ se ferunt vim, *Galeno lib. 1. de Tuen. sani. cap. 6. attestante*, facultas exsiccatoria: atqui sunt ex iis, quæ cum exsiccatione egregie calefaciunt, quædam exsiccando constringunt. Atque idcirco prosunt intemperici frigida & humida, & morbis ex pituita natis. Speciatim vero, quæ nitrosæ sunt, potius aluum turbant, & pituitam trahunt. Vulvas præterea, quoniam eas abstergunt, faciunt conceptioni habiles, & strumarum tumores minuunt. Earum balnea malum corporis habitum, qui est ex pituita, emendant. Prosunt neruorum vitiiis, thoraci, qui destillationibus infestatur: omninoque easdem facultates habent, quas salis, sed multo efficaciores. Atramentum non adstringunt, sed abstergunt. Quæ

propter cutem emendant, & scabiem sanant. Adhæc instillatæ medentur purulētis auribus, earumq; inflationibus, & tinnitibus. Salæ multum, potæ, itidem, vt priores, aluum turbant, pituitam trahunt, & sanguinem concretum. Corpus præterea minuunt, & ad maciem ducunt. Sed pituita consumpta, ventriculū lædunt, intestina corrodunt, & exulcerant, pruritū, & scabiem, quia sua falsedine inficiunt sanguinē, gignūt. Sin parū fuerint salæ, & tardius eadē efficiunt, & non adeo offendunt ventriculū & intestina, atq; omnino minus totius corporis valetudinē perturbant. Tepidæ vero iniectæ pituitā extenuant: calidæ tollunt tormina. At balnea earundem malum habitum, qui est ex pituita, emendant: profunt neruorum vitiis, thoraci, qui destillationibus infestatur, ventriculo frigido & humido. Scabiem ex pituita natam sanant. Si nulla est, pruritū excitant, quem post aliquot dies rursus sanant. Feruētium vapor capitis grauitatem, & aurium dolores corrigit. Sed infusæ, tumores, tam eos, qui ex morbis remanserunt, quā ex pituita ortos, discutiunt. Profunt hydropicis, liuentia reducunt ad calorem. Aluminosæ adstringunt in vniuersum omnes. Potæ, ventriculū vomere solitū, reficiunt. Vlcera vesicæ curāt. Profunt mulierib. quæ nullo ordine, aut immodice purgantur, & iis, quæ non concipiunt, & sine manifesta causâ crebro abortire cōsueuerunt. Parum n. renacem vterum roborāt, & claudunt. Ore retenta, sanant eius vlcera, & tumorē gingiuarum sedant. Gargarizatæ, tonsillas tollunt. Sed earū balneæ etiam vitiis supradictis medētur, in primis vero externis vlcereb. quæ fluxionibus abundant. Sunt etiam neruis resolutis, & iis, qui tardius cōcoquūt, viles. Sanguinis eruptiones ex thorace & ano compescunt, nimium sudorē reprimunt. Veruntamē noxiæ sunt propensius ad febrem. Sulfuræ neruos molliūt & calefaciunt, igitur resolutis, tensis, contractis, tremulis, per quam viles sunt, & eorū dolores sedant. Artuum tumores euocant & discutiunt. Medentur ergo podagræ, chiragræ, coxendicum aliorumq; articulorū morbis. Pellūt et dolores iecoris, lienis, vteri, & eorundem tumores discutiunt. Sed ventriculū euertūt. Scabiem insuper & vlcera sanant, lentigines tollūt, impetigines & vitilignes emendant. Bituminosæ potæ interioribus corporū vitiis medentur. Earū balnea neruos sensim calefaciunt, & tps spatio emolliunt. Aeratæ. Sed caput implent, & sensū instrumenta, oculos potissimū lædunt. Æreæ seu eratæ ori, tonsillis, vix, & oculis excellēter profunt. Repurgant n. ea, q̄ claritati ipsorum officiūt. Ferratæ. Ferratæ viles sunt vētriculo, lienī, renib. Profunt colicis dolores articulorū pellūt, auxilium afferunt in exulcerationib. vesicæ. Vnde in Tuscia ad quinquagesimum ab vrbe lapidem ferratæ appellabantur vesicariæ. Attramentosæ, siue q̄ ipsum attramentū sutorium cōbiberunt, siue misy, siue chalcitida, siue sory, siue melanteriā, easdē vires habēt, quas aluminosæ, multo tñ efficaciores, q̄ multa acrimonia cum adstringendi vi sit coniuncta. Quæ de re vlcereb. quæ pascendo serpūt, profunt. Sed si nimīū fuerint acres, necant. Cæruleo, ærugine, & chrysocollo infectæ, potæ vomitiones mouēt. Earū balneæ medentur vlcereb. quæ pascendo serpunt. Auripigmento infectæ, calefaciūt & adstringūt. Itē Sandarachæ, sed hæ ipsæ vocē purgāt, & suspiriosis profunt. At q̄ fluunt p̄ filices aliosq; lapides frigore cōcretos, quia parū admodum inficiuntur, aut nihil, simplicis aquæ pene vires habent: plerunq; tñ minus frigidæ & crudæ sunt. Quæ vero alios lapides lambunt, si duri & macri fuerint, parū infici possunt: sin molles & pingues, multū, qualis est calcari⁹ lapis, eū in primis calidæ molliunt, deq; eo nō parū abradunt. Quod genus aquæ exsiccat, nec tñ mordet. Plumbeæ lædūt neruos & artus. Hos n. pituita implēt, & inflant: illos autē indurant, contrahūt, ac tendunt. Acidæ siue acidulæ, q̄ etiam ignē senserūt, vrinam potæ mouent, & calculosis medent, ebrietatemq; discutiunt. Earū balneæ idem præstāt, febresq; q̄ calorem restinguant, discutiunt. Aquæ argentum aurumue purum lambentes, cor reficere traduntur. Atq; hætenus de aquis & balneis vnius dūtaxat rei qualitate imbutis diximus. Nūc ad eas progrediemur, quæ duab. tribus, pluribusue rebus permixtæ sunt. Hæ omnino certe earum rerum, ex quib. sunt compositæ, vires habent. Verbi gratia: est aqua mistura salis & aluminis, ea pota calefacit & exsiccat: id n. vtriusq; cōmune est. Quod si plus in ea salis inest, q̄ aluminis, aluum quidem turbat, sed nec eam, nec intestina multū lædit, q̄ alumē eius vim reprimat. Sin plus aluminis, adstringit & aluum sistit. Ad eum modum de reliquis mistis iudicandum erit. Iam facillimum erit cuius omnīū thermarū, vt vocāt, modo misturas earū cognitās habear, vires diiudicare, q̄ quidē in orbe terrarū multæ sunt. Nos in studiosorū gratiam eas tñ, quæ Germanis nostris sunt

- A** sunt hodie cognitæ, & ab omnibus valetudinis tuendæ aut consequendæ causâ petunt, nominatim percẽsebimus, ac earundẽ, tũ misturas, tum facultates breuiter perstringemus. Principio aut, q̃ in Lotharingis sunt calidæ Plumbariæ nobis occurrũt, ita a copiosa plũbi mistura appellatæ. Quo respicientes Germani nostri, *Plũbersbad* vocant. Fers eas plũbi, aluminis, & sulphuris mistura cõstare. Quapropter malignis vlcerib. cancro, phagedænis, fistulis, elephatiæ recẽs cõptæ, & omnib. cutis vitiis opitulatur. Quippe vlcerũ curatio omnib. tribus, e quarũ mistura cõstat, cõis est. In Curiensi diocesi, nec longe a Curia Rhetiæ sitẽ balneẽ secundũ sibi vendicant locũ, a Germanis nostris *Pfeffersbad*, hoc est, *piperina* nominantur. Hæ quidẽ auro, sulphure, & nitro infectæ dicũtur. Capitis doloribus mirifice conferunt, memoriam confirmant, visum auditumque acunt: cerebri, neruorũ, aliarumq; partium obstructions nitri ratione, q̃ abstergit, auferunt: articulorum doloribus, vlceribus, fracturisq; ossiũ, sulphuris causâ opitulantur. Harum aqua non continuo & perpetuo, vt aliarũ, manat, sed certo tempore, nempe tertio Maii quotannis erumpit, ac subinde iterũ statò tempore, nimirũ 14. Septembris die, sese recondit, & in penetralia terræ subducit. Haud procul ab arce, quam Heluetii Badensem vocãt, aliæ salubres thermæ habentur, quæ ob id *Badenia* appellãtur. Hæ copiosi sulphuris, & exigui aluminis mistura constant. Quapropter frigidis & humidis capitis ac cerebri vitiis, lethargo, nimirũ, amissæ memoriæ, & id genus aliis profunt. Calefaciunt & exsiccant ventriculum, eiusq; concoctionem aluminis ratione iuuant, iecoris & lienis obstructions tollunt, detentos menses euocant, & sterilitatẽ adimunt. Mulieribus magis quam viris, q̃ sulphuris copia calidiores sint, conueniunt. E feruentiam n. sunt numero. Quippe earum aqua nõ modo coquit oua, sed et de alitum cute plumas eximit, de suilla feras, siue immergantur animantes, siue ea perfundantur. In finib. lacus Podamici, supra Constantiam thermæ sunt *Emsebad* dictæ, aluminis & nitri mistura participant. Quocirca capitis dolorib. destillationibus in thoracem, & suspiciosi, item neruorum resolutionibus a coli cruciatibus factis, & vlcerib. malignis conferunt. In Alsatia prope *Geberswilum* balneæ sunt aluminosæ, nitrosæ & ferratæ: quod maxime alumen repræsentent, deinde nitrum, postremo ferrum. Succurrunt lienosis, quartana laborantibus, vlceribus sordidis, & omnibus cutis vitiis. In ditionis Marchionis oppido *Bada*, quod ab ipsis nomen duxit, balneẽ mirẽ sunt efficaciz, quæ olim M. Aurelii Antonini dictæ, quarum **B** mistura ex sulphure, sale, & alumine existit. Conducunt difficile spirantibus, & asthmaticis, doloribus articulorum, anasarcæ, ictero, & podagræ a frigidis humoribus enatis, vteri morbis, albo potissimum fluori. Conceptionem iuuant, quod salis gratia vterum abstergant, ac sterilitatem remouent, & in summa, vteri vitiis frigidis & humidis, præ ceteris fere omnibus balneis, conueniunt. Vlceribus deniq; & cutis vitiis mirifice medentur. In ditione & ducatu Wirtenbergensi, non longe, ad vnum lapidem nimirum, a Chalbo oppido thermæ sunt, quæ Latine *Bildebada*, Germanice *Wildbad*, hoc est, ferinæ balneæ, & a Martiana sylua (sic autẽ Romani superiorem Hercinii nemoris partem vocãt) Germanis *Schwarzwaldbad*, id est, *nigra sylua balnea* nominantur. Harum mistura ex copioso sulphure, & exiguo alumine constare fertur. Sunt tamen, qui æris, salis, & nitri misturam accedere priori censent, atq; hi recte iudicant. Nam quum plurimum balneæ hæ oculis profint, vt æris aliquid habeant, est necesse. Vnice capitis vitiis frigidis, resolutioni nimirum neruorũ, cõuulsioni, stupori, & similibus auxiliantur. Instrumenta sensuum roborant, ea quæ oculorum claritati officiant, repurgant, tinnitum aurium, iecoris & lienis obstructions tollunt, malo habitu corporis, & ictero laboratibus, item anasarca seu leucophlegmatia correptis, renũ & vesicæ calculis, ventriculoq; frigido succurrunt. Appetentiam deniq; excitant, & propemodum omnia, quæ Badeniz Marchionis, præstant, nisi quod viris magis, quam mulieribus, quod non ita feruentes sint, competant. In ditione Marchionis Badensis, non ita procul a Phorcena appellato oppido, sitæ sunt balneæ *Cellenses*, ab oppidulo *Cella* paucis passibus ab illis distante, dictæ, quarũ mistura ex **F** alumine, cre, & exiguo sulphure: vel, vt quidam censent, ex alumine & ære tantũ cõstat. Succurrunt vlceribus diuturnis, & malignis, articulorum doloribus & caninæ appetentiz. Profunt quoq; febribus ex pituitosis simul & biliosis humoribus natis, adeoq; iis, qui calido & sicco temperamento sunt præditi, conueniunt: id q̃ mirũ non est. Quippe ex illis effectib. intelligitur esse acidulas. Nã hæ calorẽ restinguere possunt, q̃ in acidis ca-

Plumbariæ calidæ

Piperinæ balneæ

Badeniz Helueticorum

Emsebadæ

Balneæ Geberswilianæ

Badeniz Marchionis

Bildebadæ

Balneæ Cellenses

156 Operum Leonhard. Fuchsi Pars I.

lore exhalato frigiditas tanquā victrix permanet. Quum vero acida nō tm̄ in profundū penetrrent, sed etiam abstergant & mordicēt, nihil mirū has balneas calculorum quoq; vitia discutere. Similis fuit aqua fontis Tungrorum, cuius ineminit Plin. *lib. 31. c. 2.* ferruginei saporis, quæ corpora purgabat, tertianas febres discutebat, & calculorum vitia. In ditione wirttembergensi prope Geppingam urbem ad fluuium Vilsū, fons est alter acidus, quem Germani etiam *Satorbrunnen* vocant, quod aciditate iam dictum longe superet, & ob acidum suū saporē, in potum hominum illic degentiū magno studio hauritur & expetitur. Vt plurimū errent, qui fontem illū chalcanti siue atramēti sutorii venam habere putant. Aquæ n. sic infectæ, magnā acrimoniam habent, nec potui hoc nomine aptæ sunt. Ventriculū & iecur propter insignē adstrictionē iuuant, & corroborāt, hocq; nomine luxatis corporis partib. profunt. Cum vero acidulis penetrandi & abstergendi vis insit, iecoris lienisq; obstructions solvunt, adeoq; iſtericis & malo corporis habitu laborantib. succurrunt. Febres tertianas, propter causam paulo ante expositam, partim refrigerant & extinguunt, partim discutunt, & calculos frangunt. Vomitus biliosum restringunt, & vlcērib. medentur. Fons acidus tertius ad vnum ferme lapidem supra Rotenburgum ad Nicerū situm in pago *Au* reperitur, qui certe plus sulphuris obtinet, ideoq; minus est acidus, ac magis calidus. Efficaciori vi ea, quæ in partium cavitatibus delitescunt, exsiccat, & ad sananda vlcera utilis est. Prope Tubingam ad torrētem *Stainachium* balneæ sunt *Blasiana*, ab excelso illic a missariis sacrificis exstructo, & diuo *Blasio* dicato, appellatæ, non quidem celebres, sed ob præclaras virtutes nobis silentio non prætereundæ, quarum mistura haud dubie ex alumine, ferro, exiguo sulphure, & nitro, aut certe calcario lapide existit. Nam earū aqua igni admota turbida fit, postremo rubescit, quod de fonte ferruginei saporis, Plin. quoq; scriptum reliquit, vnde aluminosam & ferratam esse coniicimus. Alias misturas ex facultatibus deprehēdimus. Destillationibus namq; in thoracem, & asthmaticis, articulorū item dolorib. & tumorib. mirifice profunt. Scabiem & vlcera curatu difficilia sanant, & ea, q̄ fluxionib. infestantur, facile exsiccant, vt hinc partim aluminis, partim nitri & sulphuris mistura eluceat. Ad Venetū lacum in suburbio *Vberlingo* balneæ sunt, quarum mistura e plumbo, ære, & sulphure est: Sunt qui sulphur omittunt. Ventriculū roborant, & artus labore admodum debilitatos cōfirmant. Renū & vesicæ vitia calculosq; pellūt. In ipsa Martiana sylua iuxta *Oppenauam* oppidulum balneæ sunt, quæ nominātur *Anthegasta*, aluminis, nitri & sulphuris mistura constantes. Cerebrum, neruos, & renes purgant, corpusq; vniuersum excrementis vacuū reddunt. Vlcērib. sordidis ac diuturnis præ ceteris balneis medentur. Appetentiam tamen deiiciunt, ac supra modum siticulosæ sunt. In magna Germania sunt *Visebada* feruentes admodū, a veterib. Plinio præsertim *lib. 32. c. 2.* Mattiaci fontes appellati, quorum haustus tri duo feruere tradit. Harum balnearum mistura e sulphure, alumine, & exiguo nitro existit. Eisdem cū Baden sib. Marchionis vires obtinent. In Norico siue Baioaria sunt thermæ *Gastenia* nominatæ, quibus vehemens adstrictoria & exsiccatoria inest facultas, quo nomine corporis excrementa dissipant & absumūt, q̄ partim exprimendo, partim exsiccando efficiunt. Vterum humidum plurimum iuuant, ideoq; mulieribus imprægnandi facilitatem conciliant, atq; ne grauidę abortiant, efficiunt. Vt harum misturam alumine copioso & exiguo sulphure constare sit verisimile. In Vindelicia ad *Abudiacum* castellū Danubianū, supra *Rheginoburgum* balneæ sunt. *Abudiacæ* vocatæ, quæ sulphuris copiosi, aluminis, & vt quidam volunt, nitri mistura cōstant. Odorem n. insignē sulphuris efflant, adeo vt fere oua frixa referant. Neruorū vitiis articulorū dolorib. podagræ, & chiragræ medentur. Hinc est, quod Carol. 5. Romanorum Imperator superiorib. annis harum vsum expertus sit. Scabiem & vlcera sanant. In *Elboga* Sliconum oppido acidula est, quam *furiōsam* appellant, quod tanto sonitu feratur, vt ad passus centum, aut amplius resonet, non secus ac tonitru aliquod remotum. Sulphure, alumine & exiguo nitro constat. Sunt qui nitrum silentio inuoluant. Idem q̄ Cellenses fere balneæ potest: Calefacit n. exsiccat, & robur partibus corporis conciliat. Ceterum, q̄ ad vsum thermarum & aquarū sponte natarū attinet, eas certe sensim & paulatim ingredi oportet, nec nisi corpore prius vacuato. Cuius rei causæ e superioribus patent. Nec certum & statutum tempus, quantisper illis vtendum sit, omnibus ex æquo est constituendum, imo virtutis maxime habenda hic, vt in omnibus aliis vacationibus, est ratio. Tanti-

Fons acidus ad Geppingam.

Fons acidus in Au.

Balneæ Blasiana.

Balneæ Vberlingenses. Balneæ Oppenauenses, siue Anthegasta.

Visebada. Mattiaci fontes.

Gastenia.

Abudiacæ.

Elboga acidula.

Balneæ calidarū vsus.

A sper enim iis vtendum, donec virtus ferre commode potest. Nec nobis probatur, quod horis certis dimituntur Medici balneandi moram. Nam ita fit, vt pleriq; properent, non sine maximo corporis & virtutis incōmodo, pręscriptas sibi horas absoluerē. Pręstat enim dierum aliquem, intra quem balneandi finem faciunt, numerum pręscribere, nempe vigesimum quintum, aut trigesimum, aut trigesimum quintum, aut ad summū, quadragessimū diem. Ita enim paulatim ac sensim vis balnearum laxo & soluto corpore occurrere potest.

De balneis arte confectis. C A P. XXIX.

H Atenus qua potuimus breuitate sponte natarum balnearum misturas, ac vires enarrauimus. Nunc reliquum est, vt earum etiam, quę arte paratur, rationem exponamus. Vt autem veteres balnearum summum vsum habebant (quotidie enim, quo vel puluerem sordesq; abluerent, vel sudore prouocarent, valetudinis, voluptatisve causa, se lauabāt) sic quoq; quinq; ordine positas partes. Prima Gręce ἀποδυτήριον, ὁπδ τῷ ἀποδυθῆναι, quod est exuere, dicebatur. In ea enim balneaturi se exuebant, atq; nudabant. Latine tepidarium vocabatur: tepebat enim hac in parte aer, vel ex calidis ac siccis vaporibus ab igne delatis: vel calidis ac humidis ab herbis & stirpibus decoctis transmissis: vel ab aqua in ignitos lapides, aut candentes laminas infusa excitatis. Altera balnei pars Gręcis θερματήριον & ὑπόλαυσον, Romanis calidarium, Senecę sudatorium, aliis Laconicum, a Laconibus & Spartanis, quibus in vtu frequens fuit, appellabatur. Quod indicat lib. 6. Epigrammatum de Hetrusci thermis Martialis iis versibus:

*Ritus si placeant tibi Laconum,
Contentus potes arido vapore,
Cruda virginē, martiaq; mergi,
Quę tam candida, tam serena lucet,
Vt nullas tibi suspiceris undas,
Et credas vacuam miterē Lygilon.*

Ceterum virgo appellata est, vt obiter id etiam dicamus, quod quęrentib. aquā militibus puella virguncula venas quasdā monstrauerit, quas secuti qui foderunt, ingentem aquę modū inuenerunt. *Martia* vero ab Anco Martio rege, qui primus omnium eam in urbē ducere est auspicatus, nominata est. Galenus hanc partem multis in locis ξηρὸν θόλον, hoc est, siccā testudinem nominat. Siquidem fornitem habuit concameratum, seu locū in se recuruum, in quo succensus ignis calidos atque siccōs vapores emittebat, ad sudorem eliciendum. Tales certe fornices & testudines hodiernis etiam temporibus in nostris balneis conspiciamus, e quibus vapor siccus ad ciendos sudores egreditur, corporib. interim in tabulam quandam sedorem illum excipientem prostratis. Eādem certe partem lib. 3. de Tuen. sanis. idem Galenus βαλανίον vocauit. Hodie facientes medicinā, aerium nominant balneum, quod eo vtentes in aere degant calefacto. Tertia pars erat solium calidum. Solium autem nihil aliud fuit, nisi cisterna, aut piscina, aut vas, aut cupa, in quā homines confidentes abluebantur. Vnde Latinis & labrum, & lauacrum, vulgo etiā tina vocatur. Galenus ab insensu & descensu ἐμβαπν, κολυμβήσαν, καὶ δεξαμένην nuncupare solet.

E Posterior appellatio Homero quoque familiaris fuit. Quarta pars, frigidum solium erat, in quo corpus prioribus balnei partibus exhaustum, nimisq; laxatum & calefactum, refrigerabatur, densabatur, ac firmabatur. Veteribus Gręcis λυτήριον simpliciter vocabatur. Quinta ac nouissima pars, detergendo corpori dedicata fuit. Nam postquā cuncta iam rite peracta essent, post frigidū solii vsum iterum sudabant, vt omnia excrementa citra refrigerationis noxam vacuarentur. Proinde vt rādem sudorem iterum detergeret, opus fuit, quod quidem in postrema hac parte factum est. Ceterum Galen. lib. 10. Therap. method. cap. 10. quatuor duntaxat balnei partes, apodyterio pręterito, recenset. Plinius tamen lib. 5. epistola sexta, huius, & etiam aliarum omnium diserte meminit. Nostra quidem balnea aliqua ex parte antiquorum referrent, si prima & vltima partes distinctę, ac aliis continuę essent. Tepidarii enim vicem supplet ea pars, modo continua alteri sit, in quā nos nudamus, & vestes exuimus. Calidarium, in quo sudamus, veterum prope modum per omnia refert. Non desunt nobis solia, calida maxime. Frigidis enim hodie vti desierunt. Æstiuo tamen tempore Germani nostri non tantum se in frigida mergunt, sed multas horas fluuiis innatantes consumunt. Pars vltima itidem desideratur, cui tamen,

Balnearium artificiale quinq; partes,

Prima: Apodyterium. Tepidarium.

Altera: Theriacalium. Calidarium.

De virgine & martia quis, Plin. li. 3. cap. 3.

Βαλανίον. Aerium balneum.

Tertia. Solium calidum.

Tina. ἐμβαπν. κολυμβήσαν. δεξαμένη.

Quarta. Solium frigidum.

λυτήριον. Quinta.

Balnei par-
tem facul-
tates.
Prima.
Alterius

Tertia

Lib. 5. de Vt
supra:

Balneum
quibus in-
utile.

Quarta.

Balnea quo-
modo ho-
die a Medi-
cis parantur.

Formula
balnei.

vbi continuū est, tepidarium in quo denuo vestimur, aliquo modo respondet. Atq; ha-
cenus balnei arte parati partes enumerauimus, nunc quæ sit earundē facultas breuiter
commemorabimus. *Prima*, quasi quædam est ad alteram præparatio. Neq. n. satis tutū
est, a frigido aere statim in calidum admodum se transferre. *Secunda*, materias per totū
corpus tum calefacit, tum fundit liquatue, & quæ inæqualia sunt æquat, & cutem laxat,
& sub ea detenta vacuat. Quare nobis nō raro exercitii neglecti vices supplet. *Tertia*, quā
in aquam calidā descenditur, *Galenus lib. 3. de Tuenda sanitate, cap. 3. teste*, si mediā temperiō
sit, calefacit & humectat: si tepida fuerit, humectat & refrigerat. Vtraq; igitur in sicco
corporis affectu madorem vtilem solidis partibus immittit. Quod si vero iusto calidior
sit, calefacit quidem, sed nō perinde humectat: quippe horrere corpora, contrahique &
densari exiles eorum meatus cogit, ita vt nec madescere ab extrinsecus accedente hu-
more queant, nec excrementi, quod intus latet, quicquā vacuare & emittere. Quæ itaq;
moderate calida fuerit, madorem vtilem solidis partib. vt diximus, immittere potest,
fatigationem ac lassitudinē soluere, plenitudinē discutere, dolorē mitigare, discutere,
duras densasq. partes mollire, excrementū liquamētumve, si quod intus ad cutē heret,
euocare, flatus diffundere, somnumq; allicere. Tepidum vero febribus exsiccantibus,
& præsertim iis, quæ immodicam sitim excitant, vehementib. solis exustionibus, & sca-
biosis pustulis confert. Vt rectissime dixerit *Galenus, nihil esse, quod valido æstu occupatos
presentius refrigeret, aut magna affectos frigiditate promptius calefacere queat, quam balneum aque
dulcis moderate calidum*. Porro inutile est quibuscunque vel crudi humoris multitudo in
primis venis continetur, vel viscus aliquod, *ut iecur, ventriculus, pulmo, renes, mesenterium,
colum imbecille est*: adde pedes, manus, coxas, artus, & quamlibet, sine vitæ tamē pari peri-
culo, similiter infirmā particulam, vel deniq; quibuscunque horrorem aut cutis densitatē
adfert, vt fit in iis, qui acris humoribus abundāt, maxime si cutis etiā alicunde den-
sata est. Nam & liquata balneo excrementa in membra qualiacumq; infirma decum-
bunt, & cum impetu quodam irruūt, & cruda in corpus distribuuntur, deniq; horror vel
præsentem febrem intendit, vel sæpe, quæ ante fuit, magis incendit. Quarta balnei pars,
qua in frigidam immerguntur, vniuersum corpus firmat, ac robustum reddit, cutē den-
sat, & vires firmat. Quod sane optimum ad externa nocumenta arcēda præsidium est.
Quare si quis stagnis atq; fluminibus vti consuevit, minus habet periculi, præsertim si
non intempestiue adhibeatur. Sane repestiuium fuerit, *Galenus lib. 3. de Tuend. valetud. teste*,
si iis assuefactus, firmisq; viribus præditus, vbi in sole feruente fecerit iter, vel diu sub eo
versatus fuerit, iam aridus & squalore obsidus, vel in frigidū solutū descendat, vel in flu-
men aliquod se præcipitet. Nam is dicto citius omnem tum cū æstu ariditatem extin-
xerit. Si vero quis minus assuevit, iam multiplici cautione summaq; prudentia opus erit.
Quippe nō omnibus cōueniunt: neq; enim iis, quorum corpora adhuc augentur, quod
horum incremento aduersent, sed iis, qui inculpate sani sunt, & qui exacta victus ratio-
ne, ac laboribus, cibisq; commodissime vtuntur. Nō sit etiā eorum corpus eo die, nec
nocte ea, quæ præcessit, vlla re vires debilitante commutatum, non Venere, non vigilia,
non crapula, nō fatigatione, nō in edia, nō deniq; vllō excretionis genere: sed pristina
integritatem ad vnguē habeat, & bonis ac salutarib. cibis vtatur, sit iuuenis, animo præ-
sente, tum plane hilari, eo præcipue die. Prius etiam frictionibus præcalefaciendū cor-
pus erit, *ut fusi Galen. & lib. 3. ca. 178. Aetius docent*. Solis itaq; iuuenibus ac robustis, nō
mulieribus, & mediocriter carnosus, assuetis, nec omni tempore, sed æstiuo tantum, &
die ab omnibus ventis silentē, & quoad tempus fert calidissimo, atq; meridie. Cum itaq;
tanta cura ac cautione, vt quis tuto frigida se lauet, opus sit, nihil mirum, hodie in nume-
ros lædi, qui sine consilio ac discrimine sese in flumina coniiciunt, ac toto illic die se la-
uant. Porro potest interdum Medicus coniectis nōnullis in aquam dulcem rebus, ver-
bi causa sale, nitro, sulphure, alumine: aut in ea decoctis herbis, balnea, quibus discu-
tiendi vis insit, parare. Quorum tum præcipue vsus erit, vbi habitum corporis attenua-
re nobis consilium est, vt in pinguib. & obesib.: vel vbi totum corpus, vel pars eius ali-
qua in tumorem attollitur. Item, vbi humores in coxam, aliasque corporis partes decu-
buerunt. Sed præstat horum formulam aliquam subiicere, ad cuius præscriptum alia
parari possunt. Ad coxæ dolores hoc vti licebit balneo, quod habet *meliloti, chamameli,
anethi herbarum, seminum fenigraci, lini, singulorum manipulos duos. Absynthii vulgaris,
menthae*.

A mentha, pulegii, calamintha, abrotani, chamæpityos, stichadis Arabice vocata, betonica, sampsi-
chi, verbasculi odorati, salvia, chamædryos, singulorum manipulum unum cum dimidio. Bulliant in
cacabo aqua fontana, quoad tertia eiusdem pars dissipetur, dein colentur. Aqua colata adiciatur
sulphuris vini lib. semis. Nitri unc. 4. salis communis unc. 6. Iterum ferueant unica duntaxat ebul-
litione, ac colentur, & colata aqua vsui seruetur.

De hæmorrhoidibus. C A P. XXX.

Hæmorrhoides Venarum, quæ anum ambiunt, sunt explicationes, per quas natura
fæculentum ac melancholicum sanguinem statis temporum intervallis expurgat.
Vena vero illæ partim a vena porta nominata, partim a caua, vt alibi copiosius monstra-
uimus, oriuntur. Maior tñ copia fæculentioris sanguinis per ramū, qui a porta nascitur
vena, expurgatur, q̄ per eum, quia caua exoritur: quod aliene facillime ac breviori cō-
pendio is humor deorsum profluat. Proinde quum natura magnam fæculenti humoris
aliene non elaborati & confecti partim per hæmorrhoidas appellatas venas statis tem-
poribus excernat, omnibus perspicuum euadit; harum mediocri profluvium a multis
nos morbis tutos securosq; reddere. Hinc nō temere Hippocrates in Epidemiis de Hæ-
morrhoidibus ita scriptum reliquit: *Quib; hæmorrhoides profluunt, si neq; pleuritide, neq; pul-
monis phlegmone, neq; phagedena, neq; furunculis, neq; terminibus, pariter neq; lepra, neque vrisi-
ginibus albis corripuntur.* Ceterum non solum ea vis est hæmorrhoidum promanantium;
vt a morbis imminetibus tueantur ac præseruent, sed etiam ab iis, qui iam inuascent,
prorsus liberent. Quod palam quoq; in Epidemiis Hippocrates iis confirmat verbis:
Hæmorrhoides ab atra libeant bile, eo quod per has simile profluat. Et in Aphorismis, vbi in hūc
scriptum reliquit modum: *Melancholicis & renum malo laborantibus hæmorrhoides succeden-
tes bonum significant.* Et ibidem rursus: *In insanientibus si hæmorrhoides superuenerint, insania
solutio.* Cum itaq; hæmorrhoides non modo a futuris morbis tueri, sed & a præsentibus
aciarniam infestantibus liberare queant, diligenter ac sedulo Medico cauendum erit;
ne temere easdem supprimat. Quod nisi fecerit, multorum certe, & eorum sane non
leuium morborum, quibus ille, cui intempestiue & nulla vrgente necessitate suppressit,
corripietur, auctor erit. Quod dicimus, Hippocrates suo testimonio confirmat, qui in
Epidemiis ita inquit: *Mulsi intempestiue ab hæmorrhoidibus sanati, prædictu morbi mox corre-
pti sunt, & fuerunt perniciosi.* Et in Aphorismis: *Sananti diuturnas hæmorrhoidas, nisi vna ve-
licta fuerit, periculum est aquam intercutem, aut tabem succedere.* Nec dissentit Cornelius Cel-
sus, qui lib. 6. cap. 18. sic scribit: *Atque in quibusdam parum tuto supprimuntur, qui sanguinis
profluvio imbecilliores non fiunt. Habent enim purgationem hanc, non morbum. Ideoque curati qui-
dam, quū sanguinis exitū nō haberēt, inclinata in præcordia ac vīscera materia, subitis & grauissimis
morbis correpti sunt.* Porro emanantibus hæmorrhoidibus Medicus caueat, ne immodi-
cum sic earundem profluvium. Siquidem vt omnes aliz vacuationes, ita quoq; hæmor-
rhoides, vbi plus iusto profluxerint, virtutem vehementer deiiciunt, atque interdum
aquæ inter cutem, propter iecoris refrigerationem, quæ comitatur, causa erunt. Quod
cum omnibus sit manifestum, non est cur ea de re copiosius differamus, præsertim cum
in libris nostris de Medendi ratione id plenissime tractauerimus;

De Mensium profluvio. C A P. XXXI.

Vt virorum corpora per hæmorrhoidas; ita mulierum, statis etiā temporibus, per
menses expurgantur. Quo fit, vt iis moderate & legitimo tempore exeuntibus, sana
permaneant mulieres. Cōtra, vbi p̄ter naturā suppr̄imunt, hic haud dubie morbū patiūt.
Nec temere a nobis dictum est, *Præter naturam.* Si enim naturaliter retinetur, nulla inde
molestia aut noxa mulieri accidit. Naturaliter autē retinentur, vel ætatis ratione, q̄ sci-
licet iuniores aut seniores sint mulieres; quam vt illis emanare menses possint. Neq; u-
t plurimum, ante quartumdecimū annum menses erumpere solent: desinunt. aliis
quinquagesimo; aliis quinquagesimoquinto, paucissimis sexagesimo. Naturaliter et-
iam supprimuntur menses iis, quæ vterum gestant ac conceperunt: & extra conceptio-
nem iis, quæ lactant. Item salatricibus, calidioris temperaturæ mulieribus, exercitiis
viventibus, & agrestibus. Nam quicquid in iis est excrementi; hoc totum validus calor;
& exercitationis vehementia absumunt. Non est igitur, cur in prædictis; & omnibus
aliis, quibus menses naturaliter supprimuntur, Medicus de euocandis iis ipsis sit sollicitus:

Hæmos-
rhoides.

Hæmor-
rhoidum
ortus.
Hæmor-
rhoidum
commodi-
tas.

6. Epidem.
lectio 3.
Aphor. 29.

6. Epidem.
sectio 5.
Apho. 25.
6. Apho. 11.
6. Apho. 15.
Hæmor-
rhoides nō
temere sup-
primendæ.

6. Epidem.
sectio 3.
Apho. 29.

Cauendum
ne hæmor-
rhoides im-
modice pro-
manant.

Mensium
profluvii
utilitas.

Naturali
quando re-
tineantur
menses.

Præternaturam quibus menstrua deriueantur.

Neque enim si admodum conietur, euentus conatibus vnquam respondebit. Præternaturam autem detinentur iis primum, quæ iusto pinguioribus, aut graciliores sunt. Pingues enim ceteris mulieribus magis ex sanguine sunt, minimasque & angustas valde venas habent. Graciliores autem, & ob diuturnum aliquem morbum admodum extenuatae, nihil superuacui sanguinis obtinent, imo vix vnde alantur corporis partes, satis habent. Dein non profluunt menses, quibus sanguis crassus ac lentus est. Siquidem is ob suam crassitiam & lentorem vteri venas permeare non potest. Denique iis, quibus per alia loca delatus vacuatusque fuit, veluti per nares, aut sedem, aut thoracem, aut sectam aliquam venam. Sunt etiam aliae multae suppressorum mensium causae, quas libens prætereo, quod *lib. 3. de Medendis morbis, cap. 53.* eas omnes ordine per censuerimus. Ceterum menses non modo præternaturam suppressi, bonam corporis valetudinem destruunt: sed & ubi plus iusto permanant, ut testis est in *Aphorismis Hippocrates*, ita scribens: *Si, inquit, menstrua immodice fluant, morbi accidunt: & si supprimuntur, ex utero morbi eueniunt.* Quocirca si immodice manant, cōstringenda erunt: sin præternaturam diutius quam par sit retinentur, euocanda veniunt. In suppressis & euocandis mensibus prudentem sese exhibeat Medicus necesse est, ne scilicet citius aut tardius quam cōueniat, suppressere conetur. Sunt enim ex mulieribus, quibus natura etiam diutius menses profluentes quam ceteris durent. Quod diserte Hippocrates in *Epidemiis* iis significauit verbis. *Menstrua, ait, humidis mulieribus diutius durant. Quum vero non cito prodeunt, intumescunt.* Caueat etiam, ne ubi non oportet, euocare tentet. Ita enim non tantum ludet omnem operam, sed se etiam aliis doctioribus ridendum exponet. Atqui de mensibus in præsentia satis: plura enim de his loco iam citato in *Medendi nostra ratione* inuenient studiosi.

De vacuatione per nares. CAP. XXXII.

PER nares vacuantur ea, quæ in capite ac cerebro continentur, excrementa, idque sterutinationem cientibus, & errhinis vocatis medicamentis, de quibus copiose *lib. 2. de Compo. medic. hodie usitata, cap. 25.* diximus. Sæpe etiam sanguis per nares profluit. Quocirca quidem vacuationis genere natura multos corporis morbos curat, & iudicat, quemadmodum in *Prognosticorum, & Epidemiorum libris Hippocrates, & lib. 3. de Iudiciis, ac multis aliis locis Galenus docet.* Sanguinis autem ex naribus profluuium cerebri maxime obstructionibus, & a capite factis destillationibus confert, quod eum, qui in capite redundat, sanguinem potissimum vacuet. Ut vero in omnibus aliis vacuationibus Medico vnicuique obseruandum est, utrum nimium, aut parcius educatur: ita quoque in narium profluuium diligenter contemplandum erit, quando id ipsum sit cōstringendum, & quando minus. Cum enim ex sanguine omnes corporis partes alantur, & is veluti vitæ, quæ dicitur, thesaurus sit, non committendum, ut illum immodice vacuari etiā ex naribus sinat Medicus. Quapropter ubi immodicum esse sanguinis ex naribus profluuium cognouerit Medicus, ad ea, quæ illud restringere possunt, medicamenta, se confestim conferat. Vbi vero propter vitiosi sanguinis multitudinem profluuium sanguinis excitatum fuerit, minime cohibendum erit. Non enim sine magno incommodo eius, cui ex naribus sanguis permanat, noxii sanguinis vacuatio impediri potest. Proinde iuuanda potius natura in expellendis noxiis humoribus erit, quam in suo, quem recte instituit, motu impedienda. Cōstringendum autem sanguinis ex naribus profluuium, etiam si mediocre est, quando sanguis, qui vacuatur, bonus fuerit, virtusque laborantis imbecilla. Nec etiā perpetuo ei, per quem vitiosus vacuatur sanguis, acquiescendum, sed tantisper dum noxia vacuantur, & virtus ferre potest. Quæ singula fere Hippocrates breuissima sententia in *Epidemiis* cōplexus est, ubi ita scriptum reliquit: *Sanguinis ex naribus profluita, quibus parum acquieuiamus, sicco medicamento obstruere oportet. Aliis autem obstruentibus non est opus.* Vbi vero alba ex naribus profluxerint, sicco, ut galla, & alumine, obrurare conuenit. Reliqua quæ ad hoc institutum pertinent, ex *medendi nostra ratione* petenda sunt.

De Venere. CAP. XXXIII.

Veneris moderata & legitima commoda.

RETissime inter vacuationum genera Venus & concubitus recēsetur. Est autem huius, si legitimus, iustus ac moderatus fuerit, ita ut ex eius usu exolutio viriū non sentiat, ad prosperam valetudinem magna vis, & efficacia. Cōtra, si immoderatus fuerit, multorum malorum occasio erit. Recte itaque & uti decet, usurpata Venus plenitudinem exhaurit, corpus agile, auctum, & virile magis reddit. Durum corporis habitum emēdat.

Emol-

A Emollit enim instrumenta, meatus dilatat, atque a pituita expurgat. Quod ad animum pertinet, mentis ac rationis vim implicatam & impeditam explicat, ac soluit, ingentes iras & furorē remittit & mitigat. Proinde melancholicis, si quid aliud, opitulatur; alioque modo infanientibus sensuum integritatem, modestiam; ac sapientiam restituit. Conuenit etiam tristibus; & iis, qui hominū consortia ac cōuersationes oderunt, *μισεσθῶντος* Græci vocant. Morbis denique a pituita ortis magnā efficacia succurrit, quod Hippocrates in Epidemiis iis confirmat verbis: *Venus morbis e pituita natis utilis est.* Aristoteles *6 Epid. sc. 2.* *sect. problem. 15.* ratione in eius rei hanc affert, quod *feruor coeundi calefaciat, & exsiccet, multumque pituita detrahāt.* Quin & cibi, præter ea, quæ dicta sunt, appetitiam erigit, & eius cupiditatem recuperat. A crebris denique rei Venereæ imaginationibus, in somniisq; parum pudicis, liberat. Veneris igitur oportunæ & moderatæ tot tantaq; sunt cōmoda, *Aetio lib. 3. cap. 8. & Paulō lib. 1. cap. 35. testibus.* Accedit, quod nisi congressu semen excernatur, *Gal. lib. 6. de laborant. locis teste,* multa & graua mala & incommoda homines comitentur, quæ apud illum legant studiosi. Vi autem iam dictæ Veneris multa sunt cōmoda, ita vicissim immoderatæ nō pauciora sunt incommoda. Nam immodicus, & assiduus, ac intempestiuus vsus oculis plurimum nocet, omnibusque sensuum instrumentis, capiti, neruis, thoraci, renibus; lumbis, coxis, pedibus denique & artubus, præsertim si debiles fuerint. Omne namque hominis robur per immodicum coitubitum debilitatur. Calorem quoque innatum exstinguit, senectutemq; & mortem accelerat. Hincque adeo fit, ut ii, qui nimium Veneri student, libidinique immodice indulgent, & male concoquant, & pallidi fiant, & neq; visu, neq; auditu, nec vllō præter sensu quicquam satis integre percipiant. Obliuiosi præterea sunt, tremuli, articulorumque doloribus, coxendicum maxime, renum & vesicæ vitiiis laborant. Porro ex anni temporibus Veneri aptissimum Ver existit. Æstate autem & Autumno minus est utilis Venus. Tolerabilior tamen per Autumnum. Æstate enim, si fieri potest, Celso astipulante; in totū abstinendum est, ne æstu debilitatum corpus, & sudoribus, & multis transpirationibus imminutum solutumq; concubitu frangatur; rarefiat; magisque exhauriatur. Sed neque hyems, propter immodicum frigus, cōueniens est Veneri tempus. Minus tamen q̄ Æstate & Autumno hoc ipso concubitu, præsertim mediocri, uti nocet. Hora vero ad concubitum, *Galeno ca. 86. Artis Medica, teste,* optima est, quum in excessuum mediocritate corpus fuerit constitutum, vbi scilicet neque plenum, neq; vacuum exstiterit, neq; in calore, aut frigore, aut siccitate, aut humiditate excesserit. Ideoque in Venerem congressurus vitare debet recentes satietates ac cruditates, ebrietatem, famem, fagationem, vomitum, purgationem, & id genus alia corporis robur dissoluentia. Optimū autem de Pauli & Aetii sententia est *cōgredi cum uxore a cibo, & ante somnū,* quoniam ad robur sic conducit, & quia frigiditas, quæ euenire solita est, minus accidit, & quia mulier conceptum semen, subsequente quiete, ac somno, melius retinet. Hi igitur noxæ, quam adferre coitus solet, prospicere voluerunt. Minor namque, si quis a cibo concumbat, & ante somnū, moxque le quieti & somno det, viniū resolutio sequitur. Hippocr. *lib. 6. Epid. sc. 6. Aph. 5. & Galenus loco paulo ante citato, ac lib. 2. de Sanit. tuenda; cap. 1.* concocto iam cibo post somnū Venerem exercendam esse docent. Hippocrates namq; inquit: *Labor, cibus, potio, somnus, Venus, omnia mediocria.* Galenus vero mox subiicit: *Nam & modum ipsum singulorum definiuit; addito ad finem dictionis epitheto, mediocria; & tempus æque signauit ipso sermonis ordine. Quippe sanitatis tutela a labore auspicianda, quem excipere debet cibus, potio, deinde somnus, mox Venus.* Præstat igitur non a cibo statim; & ante somnū, sed cibo iam confecto; ac iam ferē sub auroram Venere uti, atqui ut mox nos iterum somno & quieti demus. Ceterum Venus non omnibus ex æquo conuenit. Inutilis enim senibus, a omnibus frigidis; iustamque ætatem nondum adeptis. Deinde ætate & autumno, parcē ac sobrie ad modū viuentibus; vel nunquam; vel raro ante coitum expertis. Nullis tamen æque atque iis, qui ex succo sunt corpore, exitialis, præsertim æstiuo tempore. Tutissima vero est temporibus & naturis calidis simul & humidis; & in primis, ut dictum est, Vere, ac Iuuentute:

De excreationibus. C A P. XXXIV.

EXcreatione vacuantur, quæ a capite in fauces destillant, & quæ in thorace redundāt excrementa. In iis autem vacuandis diligenter Medico, quæ sit eorundem consi-

stentia, considerandum erit. Si enim admodum tenuia fuerint, expelli per excretionē atq; tussim facile, quod a spiritus impetu diuisa retrofluant, haud possunt. Sin lenta & tenacia fuerint, adeo ut violēter inhæreant, pari ratione, q̄ auelli ab iis, quibus adhærent, nequeāt, excreationi resistunt. Quapropter si ea, q̄ a capite in fauces destillant, iusto tenuiora & aquea fuerint, excreari, & p̄ tussim educi nequeunt, nisi aliqua ex parte per naturā, aut Medici opera incrassent. Non a. temere adiectū est, *Aliqua ex parte*. Quia non supra modum sunt incrassanda, sed cōsistentia mediocria esse oportet. Vt hinc constet, quæ hac ratione crassa sunt, re vera esse cōsistentia mediocria, quod media sint inter ea, quæ admodum tenuia, aut supra modum crassa sunt. Quo sane modo, Hippocrates in Aphorismis vrinam crassam sæpenuero appellat eam, *qua mediocrius est cōsistentia*. Quæ autem in thorace continentur lenta & crassa, adeo ut mouentis aeris ac spiritus impetu pelli non possint, ea a Medico medicamentis, quibus extenuandi & incidendi facultas inest, attenuanda & incidenda veniunt. Proinde ad hanc vacuandi speciem Auicennæ præceptio, qua iubet, tenues humores esse incrassandos, & crassos extenuandos, referri commodissime potest: minime autem ad eam, quæ per purgantia medicamenta efficitur, ut cap. 19. huius libri quoque dictum est.

De somno vacuante. C A P. XXXV.

QUum a veteribus Medicis inter vacuantia præsidia etiā somnus numeretur, operipretium nos facturos existimauius, si hoc loco, de quo somno id ipsum accipiendum esset, explicaremus. Neq; n. quiuis somnus, nec quocumq; tempore factus, sed is principio, qui famescente iam corpore fit, vacuare potest. Siquidē natiuus calor per somnum interiora corporis petens, quū non inueniat cibū, quem conficiat, vtile solidarū partium corporis humiditatē absumit, adeoq; corp' ipsum necessario siccatur, extenuatur, vacuat. Id quod Hippocrates lib. 2. de *Victus ratione*, iis confirmat verbis: *Somni, inquit, ieiunum attenuant, & refrigerant, humidum quod inest vacuantes. Qui vero plus cal. faciunt, carnem colliquant, & corpus diffundentes exsoluunt, ac imbecillum reddunt. Saturum autem cal. facientes humectant, & alimentū in vniuersum corpus diffundunt*. Hæc ille. Dein vacuat & is somnus, qui ab exercitiis & matutinis deambulationibus fit, eadem plane ratione, qua in famescentibus, p̄fertim vbi multus fuerit. Vacuant n. corpus exercitia, ideoq; natiuus calor p̄ somnū interiora petēs, q̄ cōcoquat & cōficiat, haud inueniēs, in solidas corporis partes grassatur, easq; depascēs, corpus attenuat, & tabefacit. Quod idē etiā Hippocrates in Epidem. iis verbis innuere voluit: *Somnus, inquit, multus, immodice vacuatū exsiccat*. Et in lib. 2. de *Victus ratione*, vbi ait: *A matutinis deambulationibus somnus omnium maxime siccatur*. Præterea somnus a balneo vacuat. Quippe balneum suo calore cutem laxat, & quæ sub hæc contenta sunt, vacuat: ideoq; reuocato per somnum statim subsequētem calore natiuo ad corporis interiora, ea q̄ illic sunt, is ipse absumit, & dissipat. Quid multa? Somnus corpus nostrum immodice vacuat, siue id factū sit medicamentis, siue inedia, siue exercitiis, siue balneis, exsiccat, & attenuat. Quare obesis ea ratione admissus ex vsu est, minime v. exhaustis, emaciat, aut gracilibus. Hinc est, quod Galenus lib. 14. *Ther. method. cap. 15.* vbi ex professo obessorum curationem tradit, cibum illis nō statim a balneo, sed interposito somno exhibendum esse doceat. Id q̄ etiam facit lib. 6. de *Tuenda sanitate*, vbi eandem rem pertrahit, ut non sit necesse pluribus, quod dicimus, demonstrare.

De insensili perspiratione. C A P. XXXVI.

E Genere vacationum est insensilis perspiratio Latinis nominata, Græcis simpliciter διαπνοη, vel cum adiectione ἀδην & διαπνοη. Hanc interpretes aliquot Latini transpirationem, simpliciter quoq; , vel cum additione latentem transpirationem conuertunt. Hæc v. ut cap. 7. libri de *Differentiis morborum testis est Galenus*, non est nisi aeris per totum corpus introitus, & exitus. Fit a. ex naturæ nunquam quiescentis potentia. Nam q̄ medicamentis fit, Græcis διαφρησις, Latinis interpretibus nonnullis digestio, ab aliis euaporatio & discussio appellatur. Siquidem διαφρησις Græcis, & Latinis digerere, aut rectius discutere, non est nisi σκεδάειν, hoc est, *dispergere*, idq; per medicamenta calida & exsiccantia, quæ humores in aliqua corporis parte præter naturam accumulatos citra suppurationem solvunt, discutiunt, ac dissipant. Proinde digestio aut euaporatio nihil aliud est, quam humorum partem aliquam præter naturam obsidentium, vi medicamentorum per insensiles corporis meatus euaporatio, aut dissipatio. Quæ id ipsum præstare possunt, Græcis

A fame admissus somnus vacuat.

Ab exercitiis factus somnus vacuat.

6 Epidem. 31. Aphor.

Somnus a balneo vacuat.

Cap 7.

διαπνοη.

Transpiratio quid.

διαφρησις
διαφρησις.

Digestio.

A nominantur *discussoria, digerentia, dissipantia, & euaporantia*, quod illis *discussoria* discutiendi, digerendi, & per se insensibiles corporis meatus dissipandi facultas inest. Quapropter Cælius Rhodiginus, vir alioqui doctissimus, & de bonis studiis optime meritis, maiorem in modum errat, quam *lib. Antiquarum lectionum* 14. cap. 61. *discussoria* medicamentis ea, quæ aliū leuigant subducuntq; esse scribit. Ceterum ut aliorum localium in medicamentorum nullum plethorico seu pleno existente corpore adhiberi debet, ita etiam nullus discutientium medicamentorum tali in corpore usus esse debet. Nam *Galenus cap. 95. artis medica teste*, si calefacientibus corpore plethorico existente dispergere tētabimur, plus erit id quod vi caloris ad partem attrahetur, quam quod dispergetur.

De inedia. CAP. XXXVII.

B Inter ea, quæ corpus nostrum tam sanum, quam ægum vacuant, inedia a veterib. recensetur. Non certe, quod primo & per se vacuet, sed ex accidente. Siquidē nullo in eius locū, quod fuit vacuatum, accedente alimento, fit ut inedia vacuet, *quemadmodum Julius sect. 2. Aphor. Comment. 17. & sect. 4. Comment. 2. docet Galenus*. Inedia autem duplex genus existit. Vna, in qua nihil prorsus cibi aut potionis assumitur, quam priuatim, certioris discriminis gratia, Græci *inedia*, Latini *inediam indigentiamq;* vocant. Altera, in qua non nisi id, quod conuenit, & ad virtutis conseruationem satis est, ingeritur, quam proprie abstinentiam dixeris. Ut in vniuersum inedia non sit, nisi ex cibi potulq; defectu e suritio, aut sponte suoq; arbitrato suscepta abstinentia. Hippocrates vno nomine utramque, nimirum *ἀνδρ*, hoc est, *famem* appellauit. Est autem utriusq; non contemnenda utilitas. Nihil enim est, quod tum sanos, tum ægros magis iuuat, quam tempestiua inedia & abstinentia. Sani namq; non facile morbos incurrant, si abstinentia commode vtant. Quod Hippocrates, ut omnia alia, breuiter & concinne admodum in Epidem. iis innuere quoq; verbis voluit: *Sanitatis studium est, non satiari cibo*. Plinius etiam *lib. 18. c. 5.* longe vtilissimam esse ad sanitatis conseruationem in cibis temperantiam, scriptū reliquit. Ut autem tempestiua abstinentia summam in secunda valetudine partes sibi vēdicat, ita quoq; in aduersa plurimum momēti obtinet. Sanat enim plenitudinem, nimium obesos, tuitosos, vitiaq; ex pituita nata, apoplexiam, epilepsiam, commata, vertigines, cruditates, & id genus alia multa. Sed & ipsa nonnunquā plurimum incommodat. Incaute

Inedia ex accidente vacuat.

Inediae genus duplex.

Indigentia.

Abstinentia.

2. Apho. 26. Famca.

6. Epidem. sect. 4.

Aphor. 10.

D enim & stulte si adhibeatur, ventriculum pessimis humoribus, *Galenus etiā lib. 3. de Naturalibus facultatibus suffragante*, biliosis ac serosis succis implet, fastidia creat, ventriculi robur dissoluit & labefactat, appetentiam eripit, & deniq; atrocibus morbis totum corpus obnoxium facit. Siquidem biliosis & siccis corporibus animi defectiones, lyncopes, tabem, & marasmos conciliat. Sic ut non minus grauiā abstinentiæ, quam intemperantiæ incommoda existant. Quapropter Medicus in præcipienda inedia prudens, ac cautus sit oportet, atq; diligenter, qui hanc ferre, & qui minus possint, cōsideret. Nam exiguo sanguine præditi, sani etiam, diuturnam inediam ferre haud possunt, *quemadmodum libri secundi de Temperamentis cap. 5. Galenus testatur*, ubi ita scriptum reliquit: *Qui angustas venas habent, exigui sunt sanguinis, nec longam inediā ferunt. Quibus lata, vis copia sanguinis est. & citra noxam cibo abstinent.* Est præterea in præscribenda inedia, ætatum habenda ratio. Nam,

Abstinentia incaute adhibita incommoda.

Qui inedia ferre haud possunt.

E ut Hippocrates attestatur, qui in prima senectutis parte constituti sunt, facillime inediam ferunt: secundo loco, qui consistunt ætate: nullatenus adolescentes: omnium v. minime pueruli, præsertim qui inter ipsos fuerint alacriores. Qui vero in extrema senectutis parte constituti sunt, inediam ac famem tolerare nequeunt, ideoque crebro, paucis tamen cibis, sunt reficiendi. Inedia præterea non ferunt, ut comprehensum est, biliosi, & qui calorem ad igneam naturam propensiores habent. In iis enim febres accendit, succosq; biliosiores ac amarulēiores reddit, frequētes item cordis stomachique morsus, inquietudinem, omnia deniq; corporis excrementa aciora malignioraq; efficit. Contra inediam facile tolerant, qui crudis humoribus referti sunt, quod ex iis, ubi concoquuntur, corpus ali possit. Cum enim sint veluti ex dimidio cocti, parum alterati & in sanguinem transmutati, corpus nutrire possunt. Ceterum inedia non imperanda nisi iis, qui valentibus sunt viribus. Vires enim inualidæ, inedia adhibita, prorsus deiiciuntur. Vt iam Soloclarus sit, inediam tempestiue, & iis, quibus conuenit, adhibitam, mirifice conferre. Contra plurimum incommodare, si in tempestiua fuerit, & iis, quibus non confert, imperata.

1. Aphor. 27.

Qui inedia tolerant facile.

Quid generatim in vacationibus sit Medico considerandum.

CAP. XXXVIII.

Num va-
cuatione sit
utendum,
Medicus
consideret.6. Epidem.
sectio. 2.
Aphor. 1.Natura in
vacuandis
noxia iu-
uanda.
Aphor. 2.Quo vacua-
tionis ge-
nere sit uten-
dum Me-
dico.

6. Epid. sect.

Perturba-
tiones ani-
mi.
παθήματα.
Perturba-
tionum
animi ma-
gna vis.

Timor.

Ira.

Ira quid.
Timor
quid.

HActenus particulatim de singulis vacationum generibus, prout instituti nostri ratio tulit, differuimus. Nunc quæ generatim de vacationibus Medico sint consideranda, breuiter exponemus, & vna sermone, quem de vacationibus instituimus, finem imponemus. Initio autem Medico accurata diligentia expendendum venit, tam in sanis, quam in ægris, vtrum vacatione opus sit, an non. Siquidem sunt affectus corporis complures, qui, quod ex defectu nati sunt, adiectionem potius, quam detractio- nem, quæ per vacuatiâ sit præsidia, postulant. Verbi gratia, si gracile admodum fuerit cor- pus, aut atrophica laborauerit, nutrimentis potius reficiendum erit, quam vacuatio- nibus exhauriendum. Quod si sanum etiam corpus sit eiusmodi, ut eius substantia faci- le discutiatur, quale est infantium & puerorum, minime vacationib. est diuexandum, sed potius humorum generationi studendum. Non raro accidit, ut humor aliquis bo- nus vacuetur: tum constringendum sane, non vacuandum erit. Quæ singula Hippo- crates, suo more, breuissime in Epidemiis iis verbis etiam edocuit: *Dilatare, constringere oportet, hæc quidem, illa vero non. Humores hos quidem expellere, illos vero siccare, alios generare, huic quidem, illi vero non.* Contra sunt alii corporis affectus e plenitudine aut vitioforum hu- morum redundantia orti, in iis certe vacuantibus remediis Medico sine mora utendū erit, modo nihil illius conatibus obstet. Non solum vero Medicum vacuare oportet, sed sæpenumero naturam, sua sponte vacuantem noxia, ille iuuare debet. Naturam vero in vacuandis noxiis esse adiuuandam, Hippocrates etiam loco iam ostenso docet, ita scri- bens: *Alium humorem non exeuntem educere conuenit, exeuntem vero simul effundere, & simile operari oportet.* Ceterum, si vacatione opus esse Medicus cognouerit, magno studio, quo vacationis genere sibi utendum sit, & ex qua corporis parte sit vacuandum, item quale, quantum, & quo tempore, dispiciat. Quæ cum singula in curandis morbis plurimum momenti habeant, Hippocrates quoque, qui nullum præceptum Medico ad curandos morbos utile & necessarium silentio transiit, breuissima admodum sententia cõplecti voluit, dū in Epidemiis ita inquit: *Meat⁹ apertos esse cõuenit, veluti nares, & alia, quæ oportet, & ut oportet, & qualia, & qua parte, & quādo, & quantum oportet, veluti sudores, ac alia sane omnia.* Cuius quidem sententiæ vberiore enarrationem, & huic instituto conuenientem, ex nostris in hunc Hippocratis librum editis commentariis studiosi petent. Nam in præ- sentia hæc de vacatione dixisse satis sit. Porro ut hoc adiiciamus, posset quispiam ad redundantiam & inanitionem vniuersam Medicinam referre, ut quæ, de Hippocratis sententia, non sit, nisi adiectione & detractio.

DE ANIMI PERTVRBATIONIBVS. SECTIO VI.



PAS nos, Ciceronem secuti, perturbationes animi vocamus, Galenus & alii Græci παθήματα simpliciter, & cum adiectione παθήματα τῆς ψυχῆς nomi- nant. Interpretes aliquot Galeni Latini, *affectus animi*, appellant. Non sunt autem nisi turbidi concitatiq̃, & auersi a recta ratione, vel rationi non ob- temperantes, animorum motus. Diligenter vero animi perturbationes, siue contra naturam animi commotiones Medico sunt considerandæ, quod scilicet earun- dem magna vis sit, propterea quod corpus alterent, Galeno cap. 85. *Artis Medica teste*, & a naturali statu evertant. Nihil autem mirum, easdem corpora nostra alterare posse, cum in iis omnibus insignes natiui caloris ab anima motiones fiant. Per timorem namque spiritus & sanguis intro & ad scatebram suam reducitur contrahiturque: quo fit, ut par- tes algeant, corpusque palleat, tremor incidat, vox interrumpatur, & vires denique omnes conuellantur. Contra, in ira concitior est caloris motus, qui in extimas tandem partes cum impetu effunditur. Ira itaque intendit, & fundit calorem natiuum. Atque hinc est, quod in ira corpora fiant rubicundiora, concitiora, calentiora, confidentiora, & ad omne patrandum facinus promptissima. Rectissime igitur Aristoteles, & Gale- nus lib. 2. de Tuen. *sanitate* & cap. 1. de *Morborum causis*, iram caloris, qui circa cor est, fer- uorem esse dixerunt: veluti contra, timorem, ob subitam reuocationem metu impen- dentis mali factam, caloris extinctionem. Hinc est, quod iratis cordis & arteriarum

pusus

pulsus sint maximi ac validissimi, contra vero in timentibus, minimi, & perquā debiles. Verecundia
 Quemadmodum vero in horum altero refugit, in altero se pandit calor: sic certe in verecundia vtrunq; patitur: ita ut modo ad internā confugiat, modo sese foras diffundat. In primis n. ad interiorā caloris motio fit, sed rursus affatim ad exteriora cedit. Quod si non redierit, iam non verecundia, sed timor censerī debet. Quippe verecundia repente fit, animalī facultate nihil mali sperāte: vnde fit, ut recedat duntaxat ad interiora, veluti subterfugiens: idq; circa refrigerationē, excitante impellēteq; ratione patibilem animā partē. Redit vero, ferturq; foras eō maxime motionis modo, quo calor reuocat iis, qui frigida se lauerunt. Hincq; adeo fit, ut verecundia suffusis, etiā si maxime pallent, repente admodū genæ rubescant: q; certare secū calor videatur, & secum ipse cōtrario motu collidi. Mœstitia
 Quod a. in timore confestim, id in mœstitia paulatim patiunt homines, magnitudine duntaxat & vehementia, nō toto genere differentibus pathematis, tanto sane interuallo, quanto quod citatius est, & confertius, ab eo q; remissius & lentius, distare creditur. Quocirca ob timorem & immensū mœrorē nōnulli sublatis sunt, q; sc. debilis suapte naturā animula, sub valido affectu oppressa, cōfestim exstincta, & suffocata sit. Exstincta quidem, ob pturbationis, q̄ a refrigeratione oritur, naturā: suffocata a. eo quod vniuersus sanguis ad principium cōfluxit delatusq; est. Hac ratione Plinius P. Rutilium, nuntiata fratris in consulationis petitione repulsa, illico exspirasse memoriæ prodidit. Idem M. Lepidum vxoris caritate, adeoq; mœrore nimio post repudium, mortē obiisse tradit. Heli quoq; Iudæorum pontifex, ac iudex, ut sacræ restantur literæ, accepto tristi nuntio de clade, qua Palestini hostes capta arca, occisusq; ipsius filius Iudaicum exercitum affecerant, magno subitoq; mœrore oppressus, quum a regio solio supin⁹ caderet, effracta ceruice statim periit. Nihil vero tale in minori mœstitia accidisse legim⁹, utpote in qualentior ac mitior motus est. Neq; etiam in ira, ut per q̄ neq; refrigeratione calor exstinguatur, plus æquo nimirum accēsus: neq; animæ dissoluatur robur. Præ gaudio vero multos pusillanimes exspirasse, variis auctorum monumentis proditum est. Præ gaudio mortui.
 Non enim perinde atq; in ira, cum valido feruore ad exteriora fertur animata facultas: quin e contrario, si quid antea ei fuit roboris, id nunc exsoluitur, laxaturq;. Quum n. nimio gaudio laxata petit exteriorā, discutit, atq; dissipatur. Hoc modo Polycritā, nobile de Naxo insula sceminā, exstinctam esse refert Aristoteles. Nā quum ob eximiā formam prudentiamq; Diognito atq; Eriethonio persuassisset, ut Naxi obsidionē soluerent, ab exercitu in urbem reuertēs, vbi publico honore atque omniū lætitia exciperet, patrieq; liberatrix appellaretur, ac vrbis partem ingrederetur, repente mortua cōcidit. Philipides quoq; Comædiarum scriptor haud ignobilis, quum in certamine poetarū præter spem vicisset, & lætissime gauderet, præ gaudio subito mortuus est. Diagoras etiā Rhodius, Lib. 3. ca. 12. ut refert Gellius, qui tres filios adolescentes habuit, vnū pugilē, alterū pancratiasten, tertium luctatorem, eosq; oēs eodem Olympiē die vincere & coronari vidit: quumque cum tres filii amplexi, coronis suis in patris caput positis suauarentur, & quum populus gratulabūdos flores vndiq; in eū iaceret, ibi in stadio, inspectante populo, in oculis atq; manibus filiorum animā efflauit. Lib. 2. ca. 52.
 Plinius insuper Chilonem Lacedæmonium illū Philosophum, insignib. sapientiē titulis non inter moritura famā nobilitatum, dū victorem in Olympia filiū conspexisset, præ gaudio evita descessisse scribit. Idem Sophoclem & seniore Dionysium Siciliæ tyrannum, qui magna felicitate potitus modeste semper antea fortunā rulerat, accepto nuntio de victoria inter tragædos partā, gaudii exuberantia obiisse testatur. Valerius deniq; Maxim⁹ de mortibus nō vulgaribus, præ gaudio mortuas esse geminas mulieres scribit, quarū vna nuntiata clade, q̄ ad Trasimenū lacū inciderat, sospiti filio ad ipsam portā facta obuia, cōplexu eius exspirauit. Altera, quū mœsta domi federet, ad primum conspectū redeuntis filii exanimata est. Pudore etiam nōnullos esse exstinctos, literis mandatū est. Plinius namq; loco paulo ante citato, Diodorum Lib. 9. ca. 12.
 quendā Dialecticæ sapientiē professorem, quod lutoriā quæstionem a Stilbone propositam non protinus dissoluere potuerat, mortuum esse testatur. Valerius quoq;, eodem quo antea loco, Homerum, quia quæstionē a piscatorib. propositā soluere haud potuit, absumptum pudore tradit. Exiis itaq; quæ commemorauimus, repentinis animi & natīui caloris motionib. sæpenumero vitā auferri, dissolutis vtiq;, quæ in nativo calore cōsistunt, animę viribus, iisdemq; nimia refrigeratione exstinctis, perspicuū fit omnibus. Pudore mortui.

Proinde cum tanta sit perturbationum animi vis, debent Medico, quibuscunque artibus possunt, arceri ac corrigi. Ceterum sunt Medico animi perturbationes ideo diligenter considerandę, quod nō raro ex eis futuros prędicete, autiam pręsentes cognoscere morbos liceat. Si enim metus & męstitia, Hippocrate auctore, longo tempore perseuerent, melancholiam significant. Et in Epidemiis ita scriptum reliquit: *Animi perturbationes perpendenda, num scilicet ipse sponte sua sine instrumentis & causis tristetur, letetur, timeat, confidat, speret, desperetque.* Quorum quidem longiorem explicationem e nostris commentariis studioſi petent. Atque hactenus de *Animi perturbatione* sat nos dixisse arbitror.

INSTITUTIONVM MEDICINÆ LIBER TERTIVS.

LEONHARTO FUCHSIO AVCTORE.

DE REBVS PRÆTER NATURAM. SECTIO I.

De tribus affectibus præter naturam. CAP. I.

Res præter naturam.



Neo, qui hunc præcedit, libro, de iis rebus, quę corpus nostrum alterare possunt, egimus. In hoc tertio, de iis, quę corpori nostro aduersantur, & naturam eiusdem destruunt, ac naturę fines excedunt, naturalemve corporis statum labefaciunt, ac perdunt, atque ob id res præter naturam dicuntur, differemus. Galenus quidem *lib. 2. Therap. method. cap. 3. & cap. 1. libri*

Affectus trifariam sumitur.

de Symptomatum causis, affectus præter naturam nominare potius voluit, vocabulo affectus proprie pro omni in id, quod præter naturam est, mutatione accepto. Quod non ab re a nobis adicitur, quum affectus vox multa significet, adeoque varie ab auctoribus vsurpetur. Principio enim affectus, qui Gręcis *δυσάρεσις* appellatur, generatim accipitur pro omni eo, a quo corpus nostrum quomodolibet afficitur. Qua quidē ratione affectus ad oēs tum sanos, tum ægros, tum neutros pertinet. Nam quicquid est, id affici quodam modo dicitur, si modo quidpiā ab altero patiatur. Atq; ita nomen *δυσάρεσις*, id est, *affectus* a verbo *δυσάρεσις*, hoc est, *affici*, quodammodo deriuatur: quod similiter atque affectus, de multis dicitur rebus, nempe sanis, ægris, neutris, & inanimis, cātū nimirū, harmonia, & oratione. Afficiuntur n. secundum naturam sani, præter naturā ægri. Afficitur etiā corpus senum & imbecillū, q̄ reuera neutrum existit, utpote neutrius extremorū particeps, adeoq; saluberrimi & insaluberrimi corporis exquisite medium. Affectus sunt, cantus quoq; harmonia & oratio. Siquidē illis miris modis mortales afficiuntur. De cātū nihil attinet dicere, ut quę afficere homines nemo vnquam negauit, & quotidiana id ipsum cōfirmat experiētia. Harmonias, Phrygiam furorem & pugnas excitare: Lydiā, lamentationem: Doriā, honestatem: Ionicā, iucunditatem, testimoniis auctorū abunde comprobatum est. Oratio quid possit, quantumq; animos hominū afficiat, oratorū, Ciceronis maxime, satis cōprobant orationes, & historię multifariam testantur. Deinde affectus magis contracte, sumitur p̄ omni in id, q̄ præter naturam est, mutatione. Quā quidem ratione tres sunt in vniuersum corporis nostri affectus præter naturā, causa, morbus, & symptoma. Singula enim horū sunt, dū in corpore nostro mutationes eueniunt præter naturam, adeoq; illud etiā præter naturam afficiunt. Causę exemplū est plenitudo, vel corruptela. Morbi, phlegmone, vlcus. Symptomatis, malus color. *Tertio* loco pprie, sic enim maioris perspicuitatis ac doctrinę gratia loquimur, affectus accipit pro eo, q̄ factū est, ac permanet in realiqua, q̄ patitur, postquam alterans quieuit. Quā in significatione crebro a Galeno vsurpatur, ut videre licet *cap. 2. libri de Sympto. differentiis*. Et tum *δυσάρεσις* siue affectus idē atq; *κατασκευή*, hoc est, quod cōstitutio, significat, atq; ad ea tantum transferitur, q̄ ex permanentium cōstantiumq; numero sunt. Ex iis perspicuum esse omnibus puto, affectum proprie acceptum, Galeno esse quicquid factum est, postq̄ alterans iam quieuit, & agere desit, non curando num id ipsum quod iam factum est qualitas sit, an substantia. Quapropter Galenus aliter ac Aristot. *δυσάρεσις* vocem vsurpat. Hic enim pro qualitate tantum, quę facile subiecto dimouetur, *δυσάρεσις* accipit: Galenus vero pro constitutione, seu pro re permanente, firma, ac stabili, aut permanentem habente essentiam vsurpat. Differt itaque affectus ab eo, quod Gręcis *πάθος* vel *πάθημα* speciatim dicitur.

Pathos qd speciatim.

Nam

- A** Nam pathos, Platone etiam in *Timæo* ascriptante, est motus rei, quæ afficitur, vel omnis alteratio circa materiam: aut motus, qui adhuc fit. Proinde pathos non habet essentiam suam, nisi dum cōuertitur, alteratur, mutatur, mouet. Igitur pathos est in motione, affectus autem est permanens: illud fluxum, mobile, imperfectum, ac veluti ad affectum via: hoc fixum, stabile, perfectum, & illius finis. Differt itaq; pathos ab affectu, tanquam finis a medio, tanquam mobile ac temporarium ab eo quod stabile est ac permanens, tanquam perfectum ab imperfecto. Vt hinc perspicuum euadat, pathos siue pathema proprie loquendo non esse nisi id, quod alii morbum fientem nominant. Cum enim is non sit, nisi qui adhuc fit, suamq; in fieri essentiam habeat, a pathemate nihil differat necesse est, quod scilicet sit alteratio siue motus, qui adhuc fit, ut alibi fusius monstrauimus. Atq; hic
- B** sane est harum duarum vocum, pathematis nimirum & affectus, legitimus vsus, quem nisi in legendis Galeni libris, præsertim iis, quos de laborantibus locis inscripsit, diligenter quispiam obseruet, multis se difficultatibus inuoluat necesse est. Quod si igitur ad eum modum iis vtariis vocibus, intelliges sanitatem, morbum, & causas internas, quæ non sunt motus, esse proprie dictos affectus. Sanitatem quidem secundum naturam, morbum autem præter naturam, ut causam et internam, quæ, ut comprehensum est, motus non existit. Sanitas n. est affectus, qui actiones incolumes conseruat & tueritur. Morbus contra, affectus, qui eas impedit ac lædit. Causa, qui morbos præcedit. Nec temere paulo ante dictum est, *Causa interna*: externæ enim non sunt affectus proprie sumti, quod in fieri essentiam suam habeant, & post morbi generationem a corpore rursus separentur, ut vulneratio, seu gladius vulneras. Hinc est, quod Gal. lib. 2. *Ther. method. cap. 3.* non omnes etiã causas morificas ex permanentium & constantium numero esse scriptum reliquerit, sed eas duntaxat, quæ affectus vel habitus sunt. Nam internæ quoq; causæ non omnes affectus proprie dicti sunt. Siquidem motus expultricis facultatis osculorum vasorum apertione efficiens, causa quidem eiusdem est interna, minime tñ affectus proprie sumtus, quod scilicet ex constantium numero non sit. Vt v. non omnes causæ morificæ affectus sunt, ita quoq; non omnia symptomata. Quæ n. actionum offensæ sunt, pathemata, eo quod essentiam suam in fieri obtineant, & alterationes adhuc fiētes sint, non affectus dici possunt. Eodem modo & immo dicæ vel inactiones, vel retentiones, pathemata, minime a. affectus nominantur, quod sc.
- C** non sunt ex constantium & permanentium numero, sed eorum, quæ essentiam suam habent, dum adhuc fiunt. Quæ vero symptomata, sublati morbis aliquantulum, adhuc durant, ut vitiosus in ictero color, affectus sunt & dicunt. Ceterum *pathos* & *pathema* interdum generatim sumitur, p omni eo, quod præter naturam in corporibus nostris generatur: ut lib. 1. *Epid. cōstit. 1. Com. textus 23. auctor est Galenus*. Sic morbus, & alii affectus proprie etiã sumti, Hippocrati & Galeno non raro pathemata vocantur. Hinc est, quod in libro aduersus Iulianum phlegmonem pathos appellare voluerit Galenus. In libro etiam de *Laborantibus locis* inscripto, sæpe pathematis vocabulum generatim vsurpat. Quod monendum esse duximus propter imperitiores, ac parum in lectione veterum assuetos, qui hac distinctione recte animaduersa, e multis sese difficultatibus extricare possunt, cum promiscue nunc hoc, nunc illo modo pathematis vocem veteribus vsurpatam esse constet. Pathematis a. generatim accepti duo esse genera, animaduertendum erit. Vñ, quum per se, & nullo alio interueniente, pars aliqua corporis patitur. Verbi gratia, si caput propter humores in ipso contentos affligitur. Græci hoc *ιδιοπαθειαν*, id est, *proprium pathos* appellant: aut *πρωτοπαθειαν*, hoc est, *primarium pathos*, sed minus proprie vocant. Alterum, quum alio interueniente pars aliqua patitur: ut si caput, vbi vapores aut humores vitiosi a ventriculo sursum feruntur, dolet. Hoc Græci *συμπαθειαν*, id est, *pathos per consensum* nominant. Non ab re autem diximus, *ιδιοπαθειαν* improprie vocari etiam *πρωτοπαθειαν*. Nam proprie loquendo *ιδιοπαθεια* opponitur *πρωτοπαθεια*, *πρωτοπαθεια* autem *δευτεροπαθεια* vsq; *εσχατια*, ut lib. 1. de *Laborantibus locis* cap. 2. Galenus testatur.
- D** non sunt ex constantium & permanentium numero, sed eorum, quæ essentiam suam habent, dum adhuc fiunt. Quæ vero symptomata, sublati morbis aliquantulum, adhuc durant, ut vitiosus in ictero color, affectus sunt & dicunt. Ceterum *pathos* & *pathema* interdum generatim sumitur, p omni eo, quod præter naturam in corporibus nostris generatur: ut lib. 1. *Epid. cōstit. 1. Com. textus 23. auctor est Galenus*. Sic morbus, & alii affectus proprie etiã sumti, Hippocrati & Galeno non raro pathemata vocantur. Hinc est, quod in libro aduersus Iulianum phlegmonem pathos appellare voluerit Galenus. In libro etiam de *Laborantibus locis* inscripto, sæpe pathematis vocabulum generatim vsurpat. Quod monendum esse duximus propter imperitiores, ac parum in lectione veterum assuetos, qui hac distinctione recte animaduersa, e multis sese difficultatibus extricare possunt, cum promiscue nunc hoc, nunc illo modo pathematis vocem veteribus vsurpatam esse constet. Pathematis a. generatim accepti duo esse genera, animaduertendum erit. Vñ, quum per se, & nullo alio interueniente, pars aliqua corporis patitur. Verbi gratia, si caput propter humores in ipso contentos affligitur. Græci hoc *ιδιοπαθειαν*, id est, *proprium pathos* appellant: aut *πρωτοπαθειαν*, hoc est, *primarium pathos*, sed minus proprie vocant. Alterum, quum alio interueniente pars aliqua patitur: ut si caput, vbi vapores aut humores vitiosi a ventriculo sursum feruntur, dolet. Hoc Græci *συμπαθειαν*, id est, *pathos per consensum* nominant. Non ab re autem diximus, *ιδιοπαθειαν* improprie vocari etiam *πρωτοπαθειαν*. Nam proprie loquendo *ιδιοπαθεια* opponitur *πρωτοπαθεια*, *πρωτοπαθεια* autem *δευτεροπαθεια* vsq; *εσχατια*, ut lib. 1. de *Laborantibus locis* cap. 2. Galenus testatur.
- E** nunc illo modo pathematis vocem veteribus vsurpatam esse constet. Pathematis a. generatim accepti duo esse genera, animaduertendum erit. Vñ, quum per se, & nullo alio interueniente, pars aliqua corporis patitur. Verbi gratia, si caput propter humores in ipso contentos affligitur. Græci hoc *ιδιοπαθειαν*, id est, *proprium pathos* appellant: aut *πρωτοπαθειαν*, hoc est, *primarium pathos*, sed minus proprie vocant. Alterum, quum alio interueniente pars aliqua patitur: ut si caput, vbi vapores aut humores vitiosi a ventriculo sursum feruntur, dolet. Hoc Græci *συμπαθειαν*, id est, *pathos per consensum* nominant. Non ab re autem diximus, *ιδιοπαθειαν* improprie vocari etiam *πρωτοπαθειαν*. Nam proprie loquendo *ιδιοπαθεια* opponitur *πρωτοπαθεια*, *πρωτοπαθεια* autem *δευτεροπαθεια* vsq; *εσχατια*, ut lib. 1. de *Laborantibus locis* cap. 2. Galenus testatur.
- F**

De causis morborum. CAP. II.

H Actenus generatim de tribus affectibus præter naturam differuimus. Nunc de singulis speciatim verba faciemus, a causa morifica exorssi, de qua itidem generatim tractabimus. Cum autem generatim causa sit, quæ ad rei constitutionem quoquo modo aliquid confert, causa morbi recte sic definiti potest: *Causa morbi est, qua quotumque*

Pathos & morbus si-
cūs idem.

Cap. 1. libri
de Sympt.
differt.

Sanitas.

Morbus.
Causa.

Non omnes
internæ
causæ affe-
ctus sunt.

Nō omnia
symptoma-
ta affectus
sunt.

Pathos qd
generatur.

Pathema
generatim
acceptum
duplex.

συμπαθεια

Causa qd
Causa
morbi.

modo aliquid ad morbi constitutionem confert. Nam hac definitione tam causa per se, q̄ per accidens complectitur. Galenus cap. 1. libri de Symptomatum differentiis causam morbi ita definire voluit: *Causa morifica est, quæ suapte natura est, qui fit, morbo aliquam suam generationis partem confert.* Quæ sane in idem cum priore recidit. Quippe quum inquit, *Suapte natura*, vel, ut suis verbis utamur, *ἐκ τῆς αὐτῆς φύσεως*, nihil aliud significat, quam quod causa morifica sit, quæ propriis insitisque viribus morbum efficit. Quocirca hæc ipsa definitio, perinde atq; prior, non solum per se, sed etiam ex accidente & secundo, ut ita loquar, morbum efficientem causam complectitur. Verbi gratia: aqua aluminosa causa est dēfinitatis cutis, hæc vero febris: utraq; igitur morifica, hæc quidē per se & primo, illa vero ex accidente & secundo. In eodem quoq; loco causam morificā definit esse affectum B p̄ter naturā morbum præcedentē, eundemq; efficientē. Quæ quidem cū priorib; in idē non recidit, quod utrumq; genus causæ iam dictæ in se haud complectatur, sed tantum præcedentem, & immediate efficientem. Ceterū causa morifica, seu morbi efficiens aut a qua morbi efficitur, Galeno libro de Morborū causis, & primo Ther. method. & lib. 2. de Natura humana attestante, duplex est. Vna q̄ Græci προκαταρτικὴ & προκαταρχοντα, Latini præincipientem, vulgus Medicorum primitiuam appellant. Sica est vocata, Galeno lib. 2. de Natura humana testis, quod præcedentes vocatæ ab ea fiant, & originem trahant. Galen li. 1. Ther. meth. & lib. de Morb. causis ἐξ ὧθεν προκαταρτίσθαι αἰτίας, hoc est, extrinsecus aduenientem, nominat. Lib. 4. de Tuend. sanitate, μὴ δὲ ὅλως ἐνυπαρχουσιν, id est, eam quæ omnino non inest, vocat. Recentiores externam nuncupant. Veteres Græci interdum etiam, ut infra clarius dicemus, ἐπίφασιν, id est, manifestam appellauerunt. Extrinsecus autem aduenientem incidentemve, aut externam vocarunt hanc causam, non quod perpetuo extra corpus sit, sed quod a rebus externis, hoc est, a substantia corporis alienis, & diuersis rebus proueniat: aut quod ab anima, quæ alia est a corpore, oriatur. Ita enim Auicenna Fen. 2. Can. 2. doct. 2. summa 1. ca. 1. causam primitiuam definit. Animā itaque Auicenna, non inter ea enumerat, q̄ sunt extrinseca, ut nonnulli censent, sed inter ea, q̄ alia sunt a corpore. Sic rectissime ira, mœror, tristitia, & timor inter causas externas recensentur, quod nimirū ab anima, q̄ a substantia corporis diuersa est, proueniant. Verū præstat, ut dicamus præincipientes, interdum Galeno extrinsecus incidentes, vel omnino in corpore non existentes, ideo vocari, vel quod plurima illorum pars ab externis rebus proueniat: vel quod ita patient, ut non solum Medicis sint perspectæ, sed etiā plebeiis, quasi extrinsecus essent posita. Hinc Celso rectissime euidentes vocantur. Ut hinc omnib; pateat, Galeno præincipientem procatartica[m]ve causam proprie esse, ut metipse lib. 1. de Differ. feb. cap. 7. attestatur, q̄ est recens, & simul euidens, & quæ subinde præcedentem appellatā parit. Sic cruditatē, inter causas præincipientes numerat lib. 2. de Nat. humana, quæ tñ intra corpus est, quod a reb. externis, cibo & potu nimirum oriatur, & quod sit recens, simul & euidens, quod ab ea rursus alia, quæ præcedens nominatur, exciretur. Quanquam Galen. in lib. de Morb. causis, ubi proprie de causis illis loquitur, non omnes extrinsecus aduenientes procatarticas seu præincipientes morificas vocat, sed eas tantum, q̄ vehementer corpus alterant, & mutant: idq; veterum Græcorū imitatione, qui alias causas externas, q̄ suapte natura morbum inferre nequeunt, sed tum solū, ubi imbecillū, vel alio modo paratum ad suscipiendos morbos inuenerit corpus, quemadmodū metipse lib. 4. de Victu acū. morb. testatur, proprie ἐπιφάσεις, id est, occasiones, appellarunt. Non proprie autem hanc vocem usurpantes, omnes causas manifestas, ut supra dictum est, ἐπιφάσεις nominauerūt. Non sunt igitur omnes causæ procatarticae externæ, sed plurima ex parte: nec omnes externe sunt præincipientes, sed illæ duntaxat, q̄ vehementer alterant, ac mutant corpus, adeoq; morbos pariunt. Atq; si ad hunc modū de causa procatartica differas ac statuās, nihil pugnantiarū, quas tñ multas temere in Galeni definitionibus, quib; passim hanc causam explicat, pleriq; hodie temere cōfingūt, repies. Altera morifica causa Græcis ἀποπρογμῆν, Latinis præcedēs, iuniorib; antecedēs & interna, q̄ in animalis corpore consistat, appellatur. Quapropter hæc suapte natura est occulta, & nō nisi Medicis cognita, adeoq; merito Celso abdita vocata. Hęc p̄terea, ut testis est in libello aduersus Iulianū Galen⁹, nō solū principio morbos gignit, sed eos etiam augeat, & cōseruat. Verbi gratia, sanguinis calidioris cōflux⁹, phlegmones causa præcedēs, hæc veluti materia gignit, genitā augeat, & auctam cōseruat. Galen⁹ itaq; præcedentē morbi causam vocat eam, quæ in animalis corpore hæret

Causa morbi gemina.

Præincipiēs primitiua quare iunioribus vocata.

Externa causa cur nominata.

ἐπιφάσεις proprie quid.

Quorundā studiū improbat. Præcedens.

Abdita.

Causa morbi prima, antecedens vocatur Galeno.

- A** hæret ac consistit, affectuique ipsi functione lædenti proxima, & ut sic dicam, immediata, adeoque coniuncta est, ita nimirum, ut inter hanc, & morbum nihil interueniat. Quod phlegmones exemplo sit manifestissimum, quippe inter hanc, & causam suam præcedentem nihil interuenit. Siquidem inter sanguinem confluentem, & tumorem, quem ille excitat, quique phlegmone nominatur, nihil est, quod interueniat. Quod autem Galenus causam morbo proximam & coniunctam nominet antecedentem, vno & item altero loco in præsentia demonstrasse satis sit. Primus est in cap. 88. Artis medicæ, ubi ita scriptum reliquit: *Iam factum atque existentem morbum curare oportet: sed qui nondum quidem adest, at futurus est, eum ne fiat ab illo, qui est in corpore, affectu, prohibere conuenit. Eius autem, qui adhuc sit, quod quidem factum est, curare: quod autem futurum est, ne fiat, prohibere. Prohibetur vero sublatione eius affectus, a quo fieri consuevit. Huiusmodi autem affectus, causa præcedens seu antecedens vocatur.* Hæc ille. Si igitur sublatione antecedentis causæ fieri prohibetur affectus, qui functionem lædit, siue morbus, ut inter hunc & illam nihil interueniat est necesse. Si nihil interuenit, proxima morbo sit causa antecedens oportet. Alter locus est in libello aduersus Iulianum, paulo ante etiam a nobis productus, qui itidem conuincit, causam antecedentem ab ea, quæ est proxima morbo, & immediata, quod Iuniores tamen aliquot faciunt, non esse separandam. Si enim causa antecedens, quod diserte Galenus affirmat, efficere morbum incipit, eundemque auget, igitur huic sit proxima, & coniuncta oportet. Quomodo enim auget, si alia huic proximior, magisque coniuncta esset? Quum itaque iam demonstratum sit, causam præcedentem morbo esse proximam
- C** & coniunctam, plurimum hallucinari eos est necesse, qui contra Galeni sententiam, tertium genus morbificarum causarum, quam continentem & cõiunctam nominant, statuere conantur. Quippe quum Galeno, ut seq. cap. fusius docebimus, morbus non sit, nisi affectus præter naturam, actionem vitians, omnem profecto causam continentem respiciet. Affectus namque est morbus, non contracte duntaxat voce illa sumpta, sed & proprie, ita sane, ut ex permanentium & constantium sit numero, quemadmodum lib. 2. Ther. method. cap. 3. aperte admodum testatur Galenus. Si vero morbus est ex permanentium numero, eius essentia a sua causa non pendet, nec continetur, ideoque continens esse nequit. Siquidem causa continens est, quæ essentiam rei a se producta continet. Vel, ut auctor Introductionis & libri definitionum hanc definit, quæ presente, eius quoque effectus adest: & quæ desinente, etiam effectus eius euanescit. Quare hæc plane est causæ continentis natura, ut ea sublata, simul etiam, quod ab ea productum est, e medio tollatur. Cum vero nullus sit morbus, quin idem sit permanens, hoc est, manere possit, sua sublata etiam causa, consequitur causam continentem nullam in morbis esse posse. Morbos autem manere sublati suis causis, vno aut altero exemplo monstrasse sufficiat. Phlegmone iam facta manet, etiam si causa sua desit, & non amplius ad phlegmone obsessam partem sanguis confluit. Ideo vel suppurantibus, vel discutientibus medicamentis ad curationem eius, quæ facta est, phlegmones opus erit. Pari ratione obstructio, morbus quidem instrumentalis, manet sublata etiam sua causa. Quanquam enim facta iam obstructione aliqua in corpore, plenitudo omnis per venæ sectionem, aut crassi & visciidi humores affluentes per purgationem tolluntur, nihilominus tamen adhuc obstructio manet & perdurat. Hinc est, quod Galenus lib. 8. Ther. meth. c. 41. ubi ex professo de obstructionis curatione agit, post sublationem plenitudinis, & crassorum humorum obstructionem efficientium, ad detergendas obstructions Medico esse accedendum, hortetur. Quod illi faciendum non erat, si summota causa vna tolleretur obstructio, quod sane necessarium erat, si causa illa continens fuisset. Præterea, libr. iam citato 8. Ther. method. cap. 1. idem Galenus docet, primum submouendam, quæ febrem accendit causam, deinde vero extinguendam, quæ ab hac causa accensa est, febrem. Quod sane nunquam fecisset, si causam aliquam continentem febris esse statuisset. Tum enim satis erat monere, ut Medicus causam e medio tolleretur, utpote cum qua vna febris tolleretur. Quinetiam lib. 11. Ther. method. ca. 10. initio putredinem esse curandam, qua sublata, febrem tãdem extinguendam, manifestis verbis docet. Quod nũquam fecisset, si putredinem febris esse causam continentem, ut Auicenna, & eum sequentes hodie maxima Medicorum, pars censent, existimasset. Nam tum satis erat putredinem sustulisse, utpote cum qua vna febris necessario submota fuisset. Siquidem ea est continentis causæ conditio, ut eius, quod pro-

Nulla causa continens in morbis.

Causa continens quæ.

Morbis sit e numero permanentium & constantium.

Auicennæ error Fen. 2. c. 1. doct. 2. sum. 1. cap. 1.

duxit, essentiam ita contineat, vt ipsa sublata non possit amplius superesse, id quod ab ea productum erat. Et vt tandem finem faciamus, aduersarios nostros hoc vnum tantum rogatos velim, dicant nobis, si causam in morbis continentem statuit Galenus, qui fiat, *vt multis in locis Therap. Methodi* moneat tam diligenter, vt Medicus in omnium morborum curationibus initio consideret, num morbi causa adsit, an desierit. Certe si vlla est in morbis continens causa, frustra hæc monet Galenus. Quippe hæc perpetuo morbo cōiuncta erit, nec ab eo separari vllō modo potest. Præsente igitur morbo, & hæc ipsa adsit necesse est. Si autē perpetuo adest, quid opus fuit Gal. vt moneret Medicum, consideraret, num hæc adsit, an desierit? Nō possunt se hic, sat scio, explicare aduersarii, imo nec sinitate compulsi fateri cogentur, Galeno nullam esse in morbis cām continentem. Proinde vnus is locus ad conuincendam proteruitatem aduersariorum nobis sufficiet, nec plures proferre est necesse. Vt Valleriolæ stupiditatē mirari satis nequeā, qui post omnium suorum a me confutatorum argumētorum ruinam, tamen adhuc audet causam in morbis esse continentem affirmare. Sed hæc est mentis humanæ peruersitas ac pertinacia, vt errorem semel cōceptum, Satanae consiliis adiuta & obcecata, expuere nolit. Quare quum toties a me monitus Valleriola resipiscere recuset, per me deinceps ei licebit, vt tandē induratus in eo perpetuo hæreat errore. Et mirū mehercle est, quum Valleriola aperte fateatur, curationem proprię morbo conuenire, quandoquidem si aliqua eius sit causa continens, non morbi, sed causæ continentis potius curatio erit. Causæ nanq; continentis a motione, etiam morbus vna tollitur, quo certe sublato nulla amplius eius curatione opus erit. Quapropter causam in morbis continentem, tantquam commentum quiddam Auicennæ, & aliorum Arabum medicorū, a Galeni placitis alienum, imo medicinæ inutile, hodie etiam constanter reiicimus. Nec mouent me cur ab ea sententia discedam, quorundam argumenta, de quibus hoc potissimum loco agemus: aliorum enim alibi dissoluimus: vtpote quæ partim ridicula, partim languida valde sunt. Principio enim, inquit, Gal. passim causæ continentis mentionē facit, *vt in lib. de causis pulsuum, & de Diff. & caus. sympt. & sect. apho. 7. atq; etiam in lib. contra Iulianum. & secundo Methodi medendi, & infinitis aliis locis.* Quasi vero ita colligere liceat: Gal. causæ continentis mentionem facit, igitur causa continens est in morbis. Cui plane respondebit, si in eum modum colligas: Ioannes mentionem facit mille coronatorum, igitur Leonhartus mille coronatos suo habet in marsupio. Nō inficiari possumus, imo lubentes fatemur, Gal. in productis ab aduersariis locis causæ continentis facere mentionem: negamus tamen illi inter morbos relinquere locum, vt qui iis rebus duntaxat, quæ in generatione ipsa essentiam suam habent, causam continentem assignet, non iis, quæ absolute & simpliciter esse dicuntur, adeoq; ex permanentium sunt numero, vt esse morbum paulo ante monstrauius. Quod in libello aduersus Iulianum iis innuere verbis voluit: *Nos quidē multoties hos sequentes, ne de nominibus contendere videremur, causas quasdam sic vocari concedimus, non mehercle eorum, quæ absolute sunt. sed eorum, quæ in fieri essentia habent. In hoc sane sophismatis est dissolutio.* Hæc ille. Pergunt deinde aduersarii, & συνεκτικὴν, id est est, continentem causam, Galenum primam, siue proximam, & immediatam appellare dicunt. Id quod plane concedimus. Nam *lib. 2. Ther. method. cap. 4.* actionis primam causam continentem vocat, & *lib. 10.* eiusdem operis *vnā continentem causam* horroris esse inquit. Atq; hac quidē ratione antecedens causa, q. effectui quem produxit proxima & immediata sit, morbi causa cōiuncta, atqui haud continens nominari posset. Verum Galenus hanc appellationem in morbis, vt non satis propriam, *lib. 2. de Humana natura* notat. Proprio vero si quis vti nomine velit, *προηγμένην* vocandā esse docet. Tertio loco pro suæ opinionis confirmatione locum Galeni *ex lib. 6. Epid. sect. 3. comm. 17.* citant, vbi morificas causas in procatarticas, antecedentes, & coniunctas diuidit. Hunc vero locum quidam etiam, qui libellum de Causa continente, sed more suo satis obscurū, edidit, pro causæ continentis confirmatione producit. Quare non pigebit illū paulo fusius enarrare. Galeni verba sic habent: *Δείδειται δ' ἂν ὅτι τὸν αὐτὸν περὶ τῶν προνοσούντων τόπων, & τῶν συμπαθόντων αὐτοῖς ἐπιστάται τε καὶ διαγινώσκουσιν ἀκριβῶς ἐπὶ τῶν νοσούντων. ὡς περὶ καὶ περὶ τῶν αἰτίων ὅσα καὶ ἀρῶντες ἔχοντα καὶ ἄνευ, καὶ ὅσα προηγμένα, καὶ ὅσα συνεκτικὰ.* Quibus sane verbis Galenus innuit, se aliis in locis demonstrasse, quæ scire & exacte cognoscere oporteat Medicum in ipsis ægrotantibus, de laborantibus locis, & iis qui cum ipsis per consensum afficiuntur: veluti etiam

Quorundā
argumenta
diluuntur.

3

F

- A** etiam de causis, quas præincipientes, & præcedentes, & continentes vocant. Verum quum Galenus diserte dicat ἐν νόσῳ, & nequaquam ἐν νοσήματι, id est, in ægris, non in morbis, nihil hinc patrocinii ad aduersarios redire potest. Siquidem non in morbis cognoscendam esse causam continentem, utpote qui nullam eiusmodi habeant, Galenus docuit, sed in ægris. In quibus certæ causæ cōtinentis, etiam proprie dictæ cognitio necessaria admodum erit. Nam quum ægrotare incipiunt, & in generatione adhuc sunt morbi, & pathemata duntaxat ad sunt, causas plane cōtinentes cognoscere oportet, q̃ illis sublati prohibeatur ne morbus fiat. Nam vna cum causis, pathemata quoq; ipsa tolluntur. Posteaquam vero ægros iam morbi inuaserūt, statim symptomata succedunt, quæ & ipsa, modo sint actiones læsæ, & immodicæ vel inanitiones, vel retentiones,
- B** causas continentes habet morbos ipsos, q̃ illis summotis vna etiam symptomata summoveantur. Vt hoc nomine in ægris causæ cōtinentis cognitio necessaria sit, vel ratione pathematum, vel ratione symptomatum, quæ utraq; cum non nisi in fieri essentiam obtineant, causas habent continentes. Has enim ita ut appellemus, *Gal. in libello aduersus Iulian. ut paulo ante dictum est*, nobis cōcedit. Quod quarto loco aduersarii Galenum sub antecedentibus, vbi duarum duntaxat causarum mentionē facit, cōiunctas complecti scribunt, concedimus quidem, si per coniunctas intelligunt proximas, & immediatas. Sin cōtinentes proprie dictas, nequaquam. Nam nullas esse eiusmodi in morbis, *de Gal. sententia*, supra ostensum est. Proinde falsum est, quod aiunt, Galen. *in libro contra Iulian.* plenitudinem continentem, & simul antecedentem causam esse, scriptum reliquisse:
- C** imo ibidem diserte dicit, morbi esse causam duntaxat antecedentem. Id q̃ etiam facit *lib. 2. de nat. hum. Com. 1.* vbi negat, illam esse causam continentē, & recte quidem, q̃ non raro plenitudine sublata morbus tamen maneat, q̃ supra quoq; phlegmones exemplo demonstrauimus. Falsum itidē est, q̃ inquirunt, ex antecedentibus non omnes esse coniunctas seu immediatas. Nam inter antecedentē causam & morbum nihil interuenit, ut antea ostendimus: coniuncta igitur sit, seu p̃xima, est necesse. Proinde non sine errore, & certe contra Galeni sententiam, causas mediatas cum antecedentibus confundūt. Quæcunq; n. mediatæ sunt causæ, hæ Galeno p̃incipientes, minime aut̃ antecedentes seu præcedentes vocantur. Reprehensione præterea dignum, q̃ causæ cōtinentis nomine non vna, sed diuersa ratione vtunt̃, nunc pro prima, proxima, seu im̃mediata: nunc
- D** pro inherente ipsis effectibus, seu effectus essentiam continente, ita sane, ut positis effectibus, illæ etiam ponantur, & iis remotis, illi quoq; euanescant. Nam prima quidem in significatione causas in morbis continentes admittimus, in altera nequaquam. Quarto loco, causam continentem in morbis esse, ex *lib. 1. de Sympt. causis, c. 2.* ostendere conantur, vbi Gal. *amplitudinis vneæ tensionē, esse causam continentem*, non obscuris verbis scribit. Quasi vero amplitudinē pupillæ morbum esse concederemus, quū potius sit symptoma, quod aliud symptoma, nēpe tensionem, sequitur, a morbo, sicca, nimirum vel humida intemperie, procreatum. Non esse aut̃ amplitudinem pupillæ morbum, copiose in commentariis nostris super hunc Galeni locum demonstrauimus, ut non sit necesse hic repetere. Quod si vero rogat nos quispiam, *ex quo genere symptomatum sit vneæ amplitudo*: respondeo, *Ex eorum numero, quæ affectus corporis per immoderatas vacuationes & retentiones sequuntur*. Quippe quando vneæ natius humor absimitur & exsiccat, tensio sequitur, quam vneæ amplitudo excipit. Id q̃ etiam accidit, vbi ad hanc humores præter naturam confluunt. Prior itaq; amplitudo inanitionem, altera retentionē humoris sequitur. Vtraq; igitur symptoma est, q̃ affectus corporis per immodicas inanitiones, vel retentiones comitatur. Quinto loco Galenum pro continentis causæ confirmatione ex *lib. de Causis pulsuum* afferunt, vbi scribit, non solum in pulsibus, sed in aliis omnibus tria esse causarum genera. Sed qua fide hunc locum citent, facile deprehendes, si Galeni verba expendas, & hæc ipsa ad præcedentia, ut debent, referas. Nam intelliges plane Galenum hic loqui de cunctis alterationibus, quæ, ut metipse *lib. 2. Ther. metho.* testatur,
- F** essentiam suam nō habent, nisi in fieri. His enim quæ in generatione ipsa essentia suam duntaxat habent, veluti sunt pulsus omnes, causas etiam continentes, ut paulo ante ex libro aduersus Iulianum ostendimus, Galen. assignat. Atq; in eo certe, ut is ibidē inquit, sophismatis explicatio consistit. Tandem aduersarii multis ostendunt, medico necessarium esse, ut causam immediatam, & morbo coniunctissimam dignoscat, q̃ alioqui

Causæ cōtinentis in ægris necessaria est cognitio.

Amplitudo pupillæ nō est morbus, sed symptoma.

Pulsus causam continentem habet.

feri nequeat, ut morbum propulset. Id quod ipsi quoque affirmamus, nec Gal. diuersum A docet. Nam cum causa antecedens, quæ, quod inter hanc & morbum nihil interueniat, morbo cõiunctissima est, principio morbum faciat, & eundem simul adaugeat, fieri non potest, ut loco iam citato Gal. etiam ait, ut si illa remaneat, quod factum est morbi perficitur. Quare non animaduertunt hic aduersarii, quam confuse de causa continente disputent, ut qui iam improprie pro proxima & immediata, iam proprie pro inhaerente versantur. Qua certe in re aduersarii crebro delinquant. Sed de continente causa in presentia satis. Plura qui de ea scire volet, nostros in libris Gal. de Morb. & sympt. differen. & causis Commentarios adeat, & libellum nostrum de causa continente legat. Ceterum inter causas Gal. lib. de sympt. differ. recenset causam, sine qua non, eamque definit esse, quæ nihil perfectionis addit rei, quæ fit, ab illis tamen, quæ conferunt, seiungi non potest. Breuius ita finiri posset: Est sine qua res fieri nequit. Hæc omnibus fere in reb. inuenitur, & non raro etiam in morbis. Sic in vlcere curatione, puritas eius rationem habet causæ, quæ, sine qua non, nominatur. Nequit enim curari villo pacto vlcus, nisi prius purum, & ab excrementis mundum fuerit. Habet & ipsa cavitatis impletio, ad vlcus rationem causæ, sine qua non. Siquidem nisi cavitatis prius impleta sit, vlcus cicatrice induci non potest. Et ut etiam morbi exemplum afferamus, phlegmones causa efficiens, & plane immediata est confluxus sanguinis, utpote, quæ materiam, ex qua phlegmone nascitur, augetur, & conseruatur, suppeditat. Hæc tamen interdum causam, sine qua non, dolorem obtinet. Siquidem sine eo, phlegmone in corpore sano, & plenitudine vacante, fieri haud potest. Quapropter etsi dolor perfectionis nihil addit phlegmoni, tamen a confluxu sanguinis illam perficiente seiungi haud potest. Id quod Gal. lib. 13. Ther. metho. ca. 3. iis verbis significare voluit. Porro, inquit, in doloribus incipit quidem causa ab ea particula, quæ affligitur: sed quicquid est phlegmones, id superpositæ partes efficiunt. Hipp. causam, sine qua non, concausam appellare consuevit. Hæc enim talis est, ut etsi vi sua non queat generare morbum, alteri tamen, quod illum procreare potest, cohæret: quod doloris exemplo iam monstrauius. Alio nomine non inepte adiutrix causa nominabitur. Atqui finem tandem morborum causis imponemus, ubi prius monuerimus eas, præsertim præcedentes, proximas, seu immediatas vocatas, diligentia summa medico esse perscrutandas, quod sine harum cognitione, modo adhuc in corpore hæreant, morbus sanari non possit. Principio itaque causas simplicium morborum in partibus similaribus euenientium calidorum, frigidorum, humorum, & siccorum inquirat. Dein compositarum earundem partium calidorum & siccorum, calidorum & humidorum, frigidorum & siccorum, frigidorum & humidorum cum affluxu humorum, & citra materię affluxum. Post hæc causas etiam simplicium & compositorum morborum in partibus instrumentalibus notarum, conformationis nimirum, numeri, indecentis magnitudinis, & compositionis situsue perquirat. Postremo causas eorum morborum, qui tam similarium, quam instrumentalium partium communes sunt, scrutetur, quemadmodum Gal. in eo lib. quæ de Morborum causis inscripsit, breuiter & luculenter edocuit. Ad quem recte intelligendum nostros commentarios plurimum adiumenti allaturos studiosis speramus. Ex eo itaque libro, reiectis practicarum, ut vocant, ineptiis, morborum causas perdiscant medicinarum studiosi, quod illic methodum, in iis vero confusionem & immensas nugas sint reperturi.

De Morbi definitione. CAP. III.

Morbus quid.

MORBUS, Galeno lib. 2. Ther. Meth. c. 3. & c. 1. de Sympt. differentiis teste, est affectus, præter naturam, a quo primum vitatur actio. Quæ utique definitio ab omnibus usque in hunc diem Medicis, paucis admodum demtis, viris quidem eruditis, at nouitatis plus satis studiosis, recepta est, adeo sane, ut ne Auicenna quidem hunc aliter definierit. Siquidem Fen. 2. can. 1. doct. 1. cap. 1. affectum esse præter naturam, a quo primo leditur actio, tradit. Sed videamus, quibus rationibus morbi definitionem a Galen. allatam aduersarii Gal. conuellant. In primis, inquit, ambiguo utitur genere, in quo etiam sibi auctor consentire non videtur. Etenim in lib. de differen. symptomatum, scribit ille, non solum morbum ipsum, sed etiam symptomata, & causas affectus esse præter naturam. Miror profecto aduersarios, viros alioqui doctos, non animaduertere eius generis argumenta non esse tanti momenti, ut receptam hætenus definitionem morbi labefactare saltim, tantum abest, ut euertere possint. Quis enim est, qui ignoret Galen. affectus vocem interdum generatim

Causa sine qua non.

Concausa.

Adiutrix causa. Medico morborum causæ cur perscrutanda.

Aduersarium obiectiones diluuntur.

- A** ratim vsurpare, pro omni eo, a quo corpus nostrū afficitur: & item magis contracte, pro omni in id, quod prater naturam est, mutatione? Qua quidem ratione tres esse affectus prater naturam constat, morbum, causam, & symptoma. Atqui dicent, *quoniam ista ratione euiceris, causas & symptomata posse recte appellari affectus, tamen Galenum excusare haud poteris, quin nobis illum in morbi definitione, quandoquidem varie accipi affectus vocem fatearis, ambiguo usum fuisse genere concedas.* Minime gentiū: cum enim reliqua sit adhuc tertia acceptio, in qua affectus proprie sumtus, id quod iam factum est, & permanet in re, quæ alterationem perpessa est, denotet, quod sperant, nequaquā concedimus. Quippe cum Galeno affectus in definitione morbi idem quod constitutio significet, non possunt a nobis quod postulant impetrare. Idem autem significare affectum, quod constitutionem, ipsemet Gal. *2. lib. de Morborū differ.* scriptum reliquit. Et in *c. 1. de differ. Symptomatum*, morbum definit esse constitutionem prater naturam, a qua actio laeditur. Quod si igitur idem, quod constitutio, significat affectus vox in definitione morbi, & ad ea tantum transfertur, quæ ex permanentium & constantium sunt numero, iam non amplius esse ambigua potest, sed ad certam aliquam significationem contracta, quæ rebus constantibus ac permanentibus, e quarum numero morbus etiam existit, conuenit. Dein reprehendunt aduersarii, quod Galenus nomen affectus alterationē significare tradit stabilem. Quod cur faciant, non video. Nam iis verbis nihil aliud innuere voluit, quam quod id, quod in subiecto corpore alteratione absoluta permanet, adeoq; stabile est, affectus sit, vt alteratio permanens, siue, *vt Galeni verbis utar, ἀλλοιῶνς ἐν ποίησιν*, non sit, *vt metipse lib. 1. de laborantibus locis, c. 3 interpretatur, nisi ἀλλοιῶνς ἐν ποίησιν ἀπὸ τῆς φύσεως, id est, alteratio ad stabilem perueniens affectum, vt scilicet ab alteratione simpliciter dicta, quæ in ipso fieri, vt iam sæpe dictum est, essentiam suam possidet, discernatur. Quare affectus recte stabilis, permanensque alteratio dicitur, quod nimirum cessante eo, quod alterauit, alteratio ad stabilem iam peruenerit affectum. Atque hinc est, quod Galenus lib. 2. Meder. method. c. 3. morbum disertis verbis ex permanentium numero esse scribit. Vt hinc omnibus perspicuum euadat, δίδωσι Galeno aliter, quam Aristoteli vsurpari, quod illi sit constitutio, seu stabilis iam & permanens alteratio, seu affectus: huic vero contrarium significet, nempe qualitatem, quæ a subiecto facile dimoueri potest. Quapropter vox δίδωσι Galeno non pressa & adstricta significatione, quemadmodum Aristoteli, vt scilicet ab habitu disiungat, sed larga & ampla, pro omni corporis affecta cōstitutioneue, siue ea facile, siue difficulter amoueri queat, siue qualitas, siue substantia sit, vt alibi fufius monstrauius. Gal. itaq; δίδωσι idem quod ἐξὶς denotat, quod e multis Galeni locis liquet, in quibus vtraque voce vna in significatione vtitur. Sic lib. 2. Ther. metho. cap. 3. sanitatem & morbum δίδωσι, ἢ ἐξὶς esse inquit. Verum pergunt aduersarii dicentes: *Eam solum alterationem, qua stabilitatem quandam acceperit, morbum vocare, rationi artique nostra non apparet consentaneum, cum diariam febrem leuioraque alia corporis vitia, atque adeo etiā grauiora, vt apoplexiam, morbos nuncupemus, etsi minimo solum temporis spatio perdurent.* Atq; inquit iidem, in hoc omnino sibi repugnat Galenus, quippe cum scribat. *2. lib. Methodi medendi*, eos errare, qui morbum stabilem contumacemq; affectum esse definiebant, contenditq; permanentiæ nomen ab eius definitione penitus subtrahendū esse. Hactenus aduersariorum argumenta retulimus, quibus ostendere conantur, Galenum non recte affirmare morbū esse stabilem alterationem, cum multi sint morbi, qui non diu durent, & metipse permanentiæ nomen a definitione subtrahat. Sed ludunt lectorem aduersarii, atque homonymia illi imponere student. Nam Galenus stabilitatem ad morbi essentiam refert, vtpote quam talem esse dicit, vt sublata etiam sua causa, manere possit. Aduersarii contra permanentiam ad tempus transferunt, quasi Gal. hunc solum affectum esse morbum diceret, qui multis horis aut diebus duraret, cum tamen illi nihil tale vnquam, ne per somnum quidem, in mentem venerit, vt liquet ex iis, quæ lib. 1. Ther. method. c. ult. aduersus Olympicum scribit. Quapropter aduersarii omnia Galeni dicta captiose ad suum institutum torquēt, & ἀνολογίας illum temere insinulāt. Siquidem Gal. vbi morbum stabilem alterationem, aut permanentem affectum vocat, illi permanentem inesse essentiam innuit. Quapropter Gal. permanentiam, quæ temporis duratio est & circumscriptio, recte a definitione morbi excludit, vt qui id vnum tantū contendat, morbum esse ex permanentiū numero, hoc est, eorum, quæ sublati suis causis*

Alteratio
stabilis.

Alteratio
permanens.

δίδωσι vox
aliter Gale-
no ac Ari-
stoteli vsur-
patur.

manere & durare possint, non obstante, etiam si intra semihoræ spatium, aut citius desinant. Atque hætenus nos euicisse arbitror, Gal. in definitione morbi legitimo, & nequaquam ambiguo genere usum fuisse. Verum pergunt subinde aduersarii, & quæ reliqua sunt in definitione morbi sugillant. Nam initio Gal. parum memorem suæ definitionis, non solum inter morbos censere ac reponere ea vitia, quæ propter suam magnitudinem euidenter hominis actiones labefactant, sed & morbum statuere ipsum, *lib. 1. de Labor. locis*, quum primū corpus a naturali statu vel minimum egreditur, inquit. Sed non animaduertunt aduersarii, se ad morbum falso torquere, quod Gal. de pathematis dixit, quæ cum stabilem & permanētem essentiam nō habeant, nihil mirum, cur actiones labefactare nequeant. Siquidē, *Galeno metipso. c. 1. lib. de sympt. diff. teste*, duo hæc, quod morbus sit, necessario exiguntur, vt sit in genere affectus, & lædat actionem: quorum certe neutrum pathemati adest, ideoque merito inter morbos a Galeno haud numeratur. At instant aduersarii: *Illud etiam non esse verum putamus, quod morbus actionem primo lædat. Nam inter eum & actionē mediat vis corporis, ut intemperies primo causa est facultatis agendi, facultas autem ipsius actionis, hæc vero operis, quemadmodum ille lib. 1. de Naturalib. facultatibus, & alibi passim ostendit: corruuntq; hoc modo omnes libri, quos de facultatibus nostrum corpus regentibus conscripsit, si illæ inter morbum & actionem non ponantur.* Hæc illi. Sed quis vnquam veterum Medicorum intemperiem causam facultatis agendi dixit? cum hæc ipsa potius, ne facultas agere possit, impediat. Quod si temperiem facultatis agendi causam esse aduersarii Galeni affirmassent, excusari potuissent. Cum vero contrarium asserant, ac intemperiem primo causam esse facultatis contendunt, nullam hæc absurda loquendi ratio excusationem admittit. Vt autem plane cognoscāt studiosi, quam parum, quid dicant calumniatores illi, studio nouitatis omnino excæcati, intelligant, sciēdum erit, facultatem Galeno non esse, *veluti metipso lib. 1. de Simplific. medic. fac. cap. 1. & lib. 1. de Natur. fac. ostendit*, nisi certam quandam ac conuenientem quatuor elementorum temperaturam. Est igitur hæc ipsa operis siue actionis prima seu proxima, vt ille multoties affirmat, causa. Hanc autem facultatem, non raro naturam vocat. Sic enim *sect. 2. aphorif. Com. 51.* scriptum reliquit: *In elementorum cōmoderatione natura consistit.* Vt natura nō sit nisi naturalis constitutio, seu partium corporis natua temperies, & structura. Nihil igitur refert, siue facultatem, siue naturam, siue constitutionem naturalem, siue temperiē actionis causam dixeris. Vt autem temperies causa est actionis probæ, seu non impeditur, sic intemperies causa est actionis læsæ, quā primo & nullo alio interueniente, lædit. Quod iis vtiq; verbis Gal. quoq; *lib. 1. Ther. meth. c. 8.* innuit: *affectus*, inquit, *cum actione vna consistit, nec potest vsquam aut proba actio esse sine corporis naturali affectu: aut vitiosa, nisi quum corpus sit læsum.* Progrediuntur in cōuellenda morbi definitione aduersarii dicentes: *Præterea non separat Gal. hac definitione morbos a causis & symptomatis. Lædunt enim nonnullæ causæ suas actiones nullo interueniente morbo: veluti concoctio alimenti exsuperare illius copia labefactatur, nullo morbo interim affecto ventriculo, eo etiam auctore, sed euicta quodā modo statim ipsa facultate, quemadmodū per partis morbos contingit. Quamobrē si pari distantia cū morbis nonnullæ causæ actiones corrumpunt, eas quoq; inter morbos collocare oporteret.* Hæten⁹ aduersarii. Quis vero est, q̄ ex hoc etiā loco nō cognoscat, studiū nouitatis aduersariorū animū demētasse? Nemo n. est vnquam, qui alimentum concoctionis ventriculi causam esse, aduersariis illis exceptis, dixerit: cū in confesso sit apud omnes, facultates esse actionū causas. Neq; enim facultas aliud est, quā efficiēs rei cuiusq; causa, vel breuius, actionis causa. Si itaq; facultas est actionis causa, quomodo exsuperans alimentum concoctionis causa dici possit, non video. Non esse aut exsuperans alimentum concoctionis causam, ex causæ definitione satis liquet. Cū n. causa, vt Gal. in *lib. de causis procacitatis, & lib. de Diff. sympt.* est auctor, nō sit nisi quæ ad generationem rei conducit, non conducatur autem ad concoctionem exsuperans alimentū, igitur non sit eius causa oportet. Sed demus esse concoctionis causam, q̄ tamen absurditate haud vacat, quomodo causa posset suā ipsius labefactare actionem? Perinde enim esset, ac si quis diceret, facultas concoctrix lædit aut labefactat concoctionē, quæ certe loquendi ratione nihil portentosius aut mōstrosius excogitari posset. Non itaq; facultas, multoq; hac minus exsuperās alimentū actionem labefactat, sed facultas ipsa ab exsuperare & immodico alimento præfocatur & obruitur, haud secus, quam a multis lignis cōfertim impositis, ignis: adeoq; ab illo impeditur, quod minus

Duo ad
morbum
requisita.

Facultas
quid.

Natura ea-
dem cū fa-
cultate.

Exsuperans
alimentum
nō est cau-
sa conco-
ctionis.
Facultas
quid.

- A** minus actionem suam obire possit. Quod igitur facultas suam non exserit actionem, id non imputandum erit alicui morbo, qui illius actionem labefactaret: cum ventriculus nullo interim affectus sit morbo: sed exsuperanti alimento, q̄ tanquā externū aliquod erratum, vt *Galenus etiam appellat*, impedimento est, quo minus facultas agat, haud secus atq; solidum corpus interiectum inter fabrum & lignum impedimento est, quo minus artifex operari queat. Cum itaq; facultas, quæ actionis, vt ostēdimus, causa est, illa labefactata sit, extraq; omnē noxam posita, vt integra & illa labefactata causa, actio eius lædatur, fieri non potest. Si actio seu concoctio nō est læsa, quomodo exsuperans alimentū eam lædat, quæ nihil noxæ habet, non video. Exsuperans igitur alimentū, veluti quidā externus error, perinde atq; intēpestiua alimenti sumtio, brevis somnus, & id genus alia, quæ
- B** *lib. 3. de Sympt. causis cap. 1. recenset Galenus*, impedit, quo minus facultas, quæ tamen nullam in sua essentia noxam obtinet, agere queat. A scopo itaq; aberrat, & sua frustratur actione facultas concoctrix, non certe, quod vlla in eius, aut etiam ventriculi essentia noxa sit, sed quod ab externo aliquo, nempe alimēto exsuperante, impediatur. Nihil vero mirum, facultatem illa labefactatam & integram alimētum copiosius euincere nō posse, cum Galeno quoq; suffragante in *lib. 1. de diff. feb. c. 4.* causa nulla sine patientis aptitudine agere possit. Ineptū igitur cū sit largius alimentū, vt a facultate cōcoquatur, quid mirum, cur in illud non agat? Proinde exsuperans alimentū concoctionem per se, primo & nullo internueniente non lædit, quod aduersarii Galeni cōtendunt. Id n. si faceret, causam huius actionis, nempe facultatem cōcoctricem, q̄ prima est concoctionis causa, vt
- C** labefactaret, adeoq; huic noxam aliquā inferret, necesse esset. Nullā vero illi infert noxam, igitur vt eius quoque actio noxa vacet, oportet. Perspicuum itaq; euadit, alimentum exsuperans, cū nullam facultati noxam inferat, actionē labefactare nō posse. Illa læsa namq; causa, illa læsa quoq; maneat actio oportet. Impedit tñ ab eo facultas, perinde atq; artifices ab externis reb. quo minus operentur, impediri solent. Neq; tñ ita impedit, vt ventriculi, aut alterius partis morbi actiones earundē impediunt. Nam morbi impediūt, quia noxam aliquā, etiam si sunt instrumentales, facultati inferunt. Quod Galen. etiam ostendit *lib. 3. de Sympt. causis c. 1.* vbi ita scribit: *Facultatis noxa bisariam accidit, aut propter suā essentiam, aut aliquem instrumentalem morbum. Quæ in propria facultatis essentia noxa eueniūt, intemperies quædam sunt effectricium qualitatum. Quæ vero ab instrumentalibus morbis oriuntur,*
- D** *sunt erysipelata, & demata, phlegmone, scyrrhus, abscessus, carbunculi, & id genus alii. Per hæc vero omnia ventriculus male concoquit, facultate eius, quæ concoquit, læsa.* Hæc ille. Alimētum autem impedit concoctionem citra id, q̄ vel ventriculum, aut eius facultatem concoctricem lædat. Non esse autem læsam, hinc fit manifestum, q̄ hæc ipsa alimentum ea, quæ decet, mediocritate oblatum, exquisite cōcoquere possit. Impedit igitur tanquam externum aliquod erratum, q̄ nullam ventriculo aut eius facultati noxam infert. Impedimentum tamen hoc subinde cruditatis causa est, quæ varios parit morbos, quod in causa sit, cur vitiosi humores in corpore procreentur, vt in fine libri de Cibus boni & mali succi Galenus ostendit. Cruditas itaq; quæ exsuperans alimentum comitatur, causæ, non symptomatis rationem habet. Nam nullo præcedente morbo, perinde atq; illa, quæ ex vitiosis cibis efficitur, in corpore excitatur. Vitiosi namq; cibi, etsi ab eo, qui optime valeat, concoctricemq; facultatem robustissimam obtineat, assumantur: tamen alterari in familiarum animanti qualitatem, adeoque concoqui nequeunt. Longior forte fui, quam par erat, atqui aduersariorum hac in parte mirificæ argutiz breuib. dilui haud potuerunt. Pergunt aduersarii, & a definitione morbi, quam Galenus attulit, non excludi quādā symptomata aiunt. Nam cornea tunica præter naturam color, affectus est, laeditq; primo actionē. Hæc illi. Affectum esse corporis visile hunc colorē, negare haud possumus. Lædere aut eundem actionē primo, & immediate, id est, q̄ cōstanter negamus. Non n. color actionem lædit, sed morbus, cuius hic color præter naturā symptoma est. Morbus aut est humor ille, qui præter naturam ad corneā affluit, quiq; visum lædit, facitq; vt talia appareant visa, quale
- F** est mediū, per q̄ cernimus. Atqui non licet in præsentia singula aduersariorū argumēta excutere: si n. hoc conaremur, in iusti voluminis molem hoc caput exiret. Differemus itaq; horum pleniorē cōfutationem, donec cōmodiorem naſti fuerimus occasionē, q̄ nobis offeret, si Deus permiserit, vt nostrorū in libros Galeni de morborū & symptomatū differentiis cōmentariorū alterā editionē adornemus. Porro quū iā euicerim⁹, morbū esse affectū

Corneæ tunice color præter naturam, non lædit primo actionem.

Galenus
non tan-
tum qua-
litatem,
sed & sub-
stantias
morbos
appellat.

Aduer-
siorum o-
pinio cō-
futarur.

præter naturam proprie sumtū, id est, stabile quippiam & alterationem post actionem A
derelictam, liquido constat, Galeno non tantum qualitatem, vt Aristoteli, sed & sub-
stantias morbum appellari. Nam Galenus morbum nominat omnem affectum præter
naturam, qui naturalem corporis temperaturam & structuram immutat ac destruit, si-
ue is qualitas, siue substantia fuerit. Sic certe *ca. 8. libri de differe. morb.* lapidem in vesica, suf-
fusionem, & pterygium morbos expressis verbis nominat. Nemo autem erit, qui lapi-
dem vesicæ structuram labefactantem qualitatem nominabit. Neque erit, qui suffusio-
nem humoremue lentum & glaciei modo inter corneam & crystallinum humorem
concretum, visumque remorantem, adeoque morbum existentem, qualitatem esse di-
cet. Et quis eo stuporis perueniet, vt pterygiū, siue neruosam in adnata tunica procrea-
tam visumque impediētem membranam, qualitatem nuncupare audeat? Non solum B
vero in eo, quem iam citauimus, loco Galenus substantias morbos nominat, sed & *libr.*
14. Ther. method. cap. 18. vbi inter morbos commemorat atheromata, steatomata, melice-
ridas, ascarides, lumbricos, in articulis & pulmonibus procreatos callos, inq; renibus &
vesica calculos, & in hæc verba prorumpit: *Quippe in omnibus his morbis communis est sub-*
stantia generatio, quæ ante non fuit. Verum hic aduersarii iterum Galeni placita impugnant,
& lapidem in vesica, unguem in oculo, imo calorem præter naturam, nō esse morbos, sed morbi cau-
sas contendunt. Nam, inquit, si hæc morbi sunt, quam causam, quæso, erit causa proxima morbi? Es-
se autem morbi causas, non morbos ipsos, satis constat. Caloris enim excessus, temperiem vitiat, & la-
pis in vesica, unguis in oculo, & sextus digitus in manu, eo quod pars una addatur superflua, nume-
rum partium, & inde structuram corrūpit. Quod si calor ipse morbus est, quid erit ipsa intemperies, C
quæ ob calorem exsuperantem committitur? Si lapis, vel unguis morbus esse creditur, quid erit ipsa
structura partis natura contraria? Hactenus bona fide aduersariorū verba retulimus, e qui-
bus iterum perspicuum euadit, studium nouitatis ita præstrinxisse aciem oculorum eo-
rundem, vt quid dicant, videre nequeant. Quod vt clare cognoscant studiosi, breuiter
ipsorum verba excutiemus. Quum quærent, si hæc morbi sunt, quam erit causa proxima?
Respondeo, si causam proximam vocant eam, quæ proprie continens appellatur, nulla
prorsus eiusmodi in illis erit causa, quod præcedenti capite ostēdimus. Sin proximam
appellant immediatam, caloris præter naturam lædētis actionem, siue febris, putredo
erit causa. Lapidis in renibus & vesica, humores crassi & lenti. Unguis in oculo, utilis a-
licuius materiæ redundantia, vnde membrana illa procreatur. Sexti digiti, itidem utilis
materiæ abundantia est causa. Nam inter has plane causas, & iam dictos morbos, nihil
interuenit. Sed esse causas morbi, quos nos, Galenum secuti, morbos esse affirmamus,
quo pacto aduersarii ostendant, videamus. Caloris enim excessus, inquit, temperiem
vitiat. Quid audio? quis vnquam vel veterum, vel recentiorum Medicorum ita locutus
est, vt diceret, caloris excessum temperiem vitare? imo caloris excessus est ipsa tempe-
ries vitata, siue, vt vno verbo efferam, intemperies. Neque enim intemperies, nisi calor
exsuperans existit. Id quod certe innuere voluit Galenus *lib. 8. Therap. method. cap. 1.* vbi
ait: *ἡ δὲ ἀναιμία τῆς τοῦ πυρετοῦ δυνάμεως, ἐκ πλεονεξίας θερμότητος*: Excessus intemperiei febricitan-
tium, est in abundantia caloris: hoc est, intemperies febrilis immoderata, non est, nisi exsuperans ca-
lor, seu caloris abundantia. Non autem vt aduersarii interpretantur, febris est intemperies ex-
cessu caloris facta. Nam si aliquid tale significare voluisset Galenus, non ἐκ πλεονεξίας, sed ἀπὸ
τῆς πλεονεξίας, aut ὑπὸ πλεονεξίας dixisset. Sed ita torqueant in suam sententiam veterum dicta
neceffe est, qui noui dogmatis auctores esse cupiunt. Quum quærent deinceps, si lapis,
vel unguis creditur esse morbus, quid erit ipsa structura partis natura contraria? Respondeo, mor-
bus quiuis actionem vitians. Nam sicut Galenus *lib. 2. Therap. methodi* docet, vt constitutio,
siue structura, effectusue secundum naturam est causa probæ actionis, ita structura seu constitutio vi-
tiosa læsa actionis est causi. Quod igitur cōstitutionem naturalem vitiat, morbi causa est:
constitutio autem vitata, morbus. Verbi gratia, quicquid temperiem & legitimam
partium corporis structuram vitiat, est causa morbi: constitutio autem & temperies vi-
tata, siue intemperies actiones lædit. Cum itaq; lapis in vesica, & unguis in oculo toto F
genere præter naturam substantiæ sint, ideo causæ, quæ illas procrearunt, structuram
naturalem, tum vesicæ, tum oculi labefactarunt, & quæ ab illis nata est substantia, lapis
nimirum, cum actionem vitiet, morbus rectissime dicitur. Quod autem sextus digitus
non sit morbus in numero, aduersarii hac ratione monstrare nituntur. Si, inquit, par-

Atem ipsam numero excedentem morbum esse contendas, ut sextum digitum, concedas etiam oportet eam, quæ a naturali numero ablata est, ut digitum abscissum, inter morbos reponi. Respondeo, nequaquam: neq; enim, id quod e corpore sublatum est, actionem lædere potest, cum non amplius adsit: sed refertur rectissime morbus ad eam partem, unde digitus ille abscissus est. Nam sectio eius partem ademit, adeoque structuram vitiauit, quæ & ipsa nonnullius partis actionem labefactat. Secto igitur digito in corpore, relinquitur pars, unde ademptus est digitus: huius igitur iam morbus existit, haud secus, atq; abolito gurgulione, palati & spatii oris, quod remanet, est morbus. Proinde cum ad probam partium instrumentalium compositionem requiratur iusta conformatio, magnitudo, numerus, & cōiunctio similarium, ut aduersarii quoq; fatentur, igitur in iusta conformatione, magnitudine, numero, & positu sanitas consistit, ut contra morbus in indecenti conformatione, magnitudine, ac numero obseruatur. Sed hic definam, nec plures aduersariorum rationes attingam, quod ex iis facile, quid de ceteris eorundem argumentis sentiendum sit, studiosi cognoscent, nec fert instituti nostri ratio, nisi in maximam molem excrescere velim has institutiones, ut in iis diluendis progrediar.

De morborum partium similarium generibus, & differentiis. C A P. IV.

Postquam morbi definitionem abunde in eo, quod præcedit, capite enarrauimus, ut eiusdem genera & differentias nunc ostendamus, reliquum est. Sunt autem tria in vniuersum prima morborum genera. Vnum, quod in similaribus consistit partibus, ob id simile appellatum: alterum in instrumentariis, instrumentarium dictum: & tertium, quod vtriusq; commune est. Primi generis morbus, qui in similaribus consistit, Græcis *νενός* dicitur, Latini *morboſa intemperies* dicitur. Neq; temere fit, quod ita Græcis appelletur: est enim alia, quæ *νενός* dicitur, id est, *salubris intemperies* vocatur. Cū enim intemperies sit, vbi qualitates primæ, seu elementa ipsa a legitima symmetria comoderationeue deflectunt, duplex certe sit intemperies, necesse est. Vna salubris, seu sanitatis, quæ a media & optima temperie paululum abest, ita certe, ut nulla adhuc animalis functio manifeste sit læsa. Ut hinc pateat, sanitatis magnam esse latitudinem. Quantum enim interuallum est inter id, quod perfectissime functionem suam obit, & inter id, quod manifeste aliquam oblæsam actionem habet, tanta est profecto & sanitatis & intemperiei, quæ salubris est, & intra sanitatem consistit, latitudo. Quapropter si sanus quispiam imbecillius altero, qui secunda etiam valetudine præditus est, functiones obeat, nondum vero læsas obtineat, intemperantior, hoc est, maiori intemperie præditus sane est, sed nondum ægrotat. Quod si vero ex sanis alios temperatos, alios intemperatos dicere alicui minus placebit, is alterum duorum fateatur necesse est, vel omnes perpetuo ægrotare, vel vnam esse omnium temperiem: quorum certe vtrunque absurdum, & a veritate alienum existit. Proinde non absoluta ipsa tantum, & quæ infestilis, simul est & dicitur sanitas, sed etiam ea, quæ ab hac deficit, modo vñsibus nostris adhuc non sit inepra. Et profecto, nisi in eum modum de sanitate statuamus, *ἀναιδία*, hoc est, *perpetuam inualetudinem* inuenimus, ut *fufius lib. 1. de Tuen. ſanitate. cap. 5. & aliis quibusdam locis Galenus docet*. Altera intemperies morboſa nominatur, estq; ea, in qua animal intemperiei vicio ægrotat, adeoq; quæ longissime ab optima temperie recedit. Suntq; huius aliquæ differentię. Vna est, in qua corpora similia nudis qualitatibus alterantur, ut est ea, per quā caput a sole plurimum incalescit. Altera, in qua cum qualitatibus iam dictis substantia quædam vitioſa humorue aliquis ad ipsa confluit, ut euenit in omnibus præter naturam tumoribus. Primam nostri temporis Medici intemperiem sine materia, immaterialemue, alteram intemperiem cum materia vel materialem vocant: Galenus intemperiem cum affluxu humoris, & lib. 12. *Ther. method. cap. 7. ὁρμητικὴν* appellat. Ut admirationem nō leuem mereatur, quod Valleriola in suis locis communib. scribat, omnem intemperiem, siue ea nuda sit, siue cum affluxu humoris, similis partis morbum esse, nihilominus tamen neget, humorem morbi appellatione non venire. An nō hæc sibi maxime pugnancia esse omnes fatebuntur? Prior distribuitur in quatuor simplices, calidam tantū, frigidam tantū, humidam tantū, & siccam tantū. Simples autē appellantur, q̃ in singulis vna duntaxat qualitas a modo naturæ recedit. Totidē quoq; compositas, calidā scilicet & humidā, calidam & siccam, frigidam & humidā, frigidam & siccam. Compositz aut sunt dictæ, q̃ in singulis plures qualitates a naturali habitu & symmetria aberrāt. Est itē alia intemperiei morbo-

Tria sunt
prima
morborū
genera.

Intemperies quid.
Intemperies duplex.
Salubris.
Sanitatis
quædā est
latitudo.

Similia.
Morboſa.

Intemperiei morboſæ differentię.
Nudæ quæ
licitatis.

Cū affluxu humoris.

Simplex.
Compositæ.

Æqualis. *ſæ differentia, quod vna ſit æqualis, altera inæqualis. Æqualis intemperies eſt, ubi omnes corporis particula æqualiter ad aliquam intemperiem verſa, aut iuſto calidiores, aut frigidiores, aut ſicciores, aut humidiores, vel per coniugationem quadam calidiores ſimul & ſicciores, quadam humidiores pariter & frigidiores, quadam humidiores & calidiores, quadam ſicciores & frigidiores red- ditæ ſunt.* Inæqualis contra intemperies eſt, *ubi non omnes corporis partes æqualiter ad aliquam intemperiem verſæ ſunt.* Vel breuius, *eſt, quæ non omnibus intemperanter affectis corporis particulis ineſt.* Atque hæc non nunquam fit in vniuerſo animalis corpore, veluti in ea hydropis ſpecie, quæ *anaſarca* dicitur: & febribus iis, quas *hepialas* vocant. Nam in anaſarca crudus & pituitoſus, aut certe aquoſus ſanguis per vniuerſum corpus diſtribuitur, vnde ſolidæ corporis partes, ab aduentitio frigore alteratæ, in aquæ naturam reſoluuntur, totumque corpus inæquale redditur. In hepialis febribus vno & eodem tempore in toto corpore æger frigefcit, & caleſcit, maximaque inæquali intemperie vexatur. Nec eſt, cur quiſpiam miretur, *qui fieri poſſit, vt vno & eodem tempore, in quauis corporis parte, calidum ſimul & frigidum ſentiatur.* Cum enim calidum & frigidum contraria ſint, nequaquam in eodem ſubiecto ſimul eſſe poſſunt. Suapte namq; natura circa idem ſubiectum ſe inuicem expellunt contraria. Quippe calidum & frigidum in hepialis febribus eodem ſentiuntur tempore: atqui non velut contraria graduum excellentium, ſed ſicut contraria in remiſſis gradibus, adeoque alterantia, quæ adhuc in ſenſilem partem agere videntur. Non igitur a vero alienum eſt ſenſibilem partem eodem tempore & loco, & a contrariis qualitatibus alterari. Quæmadmodum enim oculus eodem tempore album & nigrum expedite videt: ita & in ſenſibili parte calidi & frigidi alterationem ſimul eſſe apparet. Fit vero & in vna qualibet parte, quum ea vel tumore aliquo præter naturam laborat, vel ſupra modum, aut caleſcit, aut frigefcit, aut ſiccatur, aut humectatur. Ceterum æqualis intemperies nullo dolore affligit, quod nimirum particulæ laboranti iam veluti acquiſititia natura adſit. Nullum autem corpus a ſua ipſius natura infeſtatur. Quippe, vt *Hippo. ait, in lib. de homine*, dum mutantur, & a ſua natura recedunt, corrumpunturue corpora, dolore afficiuntur, non quum iam natura mutata, aut corrupta eſt. Atq; hinc eſt, quod in Aphoriſmis etiam ſcriptum reliquerit: *Dum pus conſcitur, dolores accidunt magis, quam iam conſecto.* Inæqualis contra intemperies, quum in ea partes non ſint æque excleſatæ, aut refrigeratæ, adeoque ex illis nonnullæ adhuc mutantur, & alterentur, neceſſario dolorem inducit. Atq; hæcenus de ſimilarium partium morbo intemperie, de Galeni & aliorum Medicorum ſententia, diximus. Non me latet autem eſſe hodie Medicos, qui nimium philoſophantes, vſitaram hanc loquendi rationem, nouitatis ſtudio ducti perturbant, & non vnum eſſe in ſimilaribus partibus morbi genus, ſed præter intemperiem duo alia eſſe contendunt genera, quorum vnum ad materiam partium ſimilarium, alterum ad formam earundem referunt. Quæſi vero Galenus ſub nomine intemperiei non hæc omnia, maxime formam, complexus ſit. Quippe materiam partium ſimilarium eſſe dicunt, quæ illæ laxæ aut adſtriçtæ, molles aut duræ, craſſæ aut tenues, raræ aut denſæ, adeoque exactiore vel obtuſiore ſenſu præditæ ſunt. Proinde ſi pars aliqua laxior, adſtriçtior, tenuior, craſſior, rarior, deſior, mollior, duriorue efficitur, materiam vitari contendunt, eaq; vitiata, partis robur atque valetudinem infringi, adeoque morbo corripui, qui non ad intemperiem, quæ ex primis qualitatibus prouenit, ſed ad materiam potius refertur. Formam partium ſimilarium vocant earundem eſſentiam, totamue ſubſtantiam, a materia & temperamento diuerſam, illamq; a ſemine & diuiniore principio naſci, quod Auicenna quoq; exiſtimauit, & actionum cauſſam eſſe, ſtatuunt. Totam hanc ſubſtantiam perfectionem eſſe & integritatem, qua res vnaquæque conſiſtit, dicunt. Quare quoties hæc immutatur, & de perfectione decedit, morbum eſſe totius ſubſtantię aſſerunt. Sed Philoſophorum hæc *ἀπειρολογία* eſt, quam ſtudio Galenus, & qui huius ſectantur dogmata Medici euitare voluerūt, vt qui tum materiam, tum formam, vt illi nominant, ſub temperamento complecti maluerunt. Nam cum Galeno, vt metipſe multis in locis teſtatur, temperamentum idem ſignificet, quod natura, eaque ipſa non ſit, niſi vniuerſa eſſentia ac temperatura ex primis elementis, calido, frigido, humido, & ſicco conflata, neceſſe eſt fateamur, temperamentum ſimilarium partium nō ſolum eſſe elementorum qualitates, ſed eorundem etiam ſubſtantias ſiue eſſentias. Atque hinc eſt, quod in *lib. 1. de uſu partium cap. 9.* temperamenta propriam particularum eſſentiam

A tiam complere dicat. Nemo autem est, qui nesciat, essentiam partium non solum ex qualitatibus, sed etiam solidis & carnis compleri. Et libro 1. de elementis, non solum ex qualitatibus, quæ seorsum sine corporibus consistere nequeunt, gigni animalia, sed ex corporibus potius, quibus illæ qualitates summæ insunt, scribit. Quod vero interdum asserit Galenus, primas qualitates esse stirpium & animalium opifices, aut essentiam singulis a temperie quatuor primarum qualitatū accedere, id non alia de causa fit, quam quod solæ illæ in causa sint mutæ inter se elementorum transmutationis. Neque enim quum ex elementis animalium aut stirpium corpora generantur, talia, qualia sunt, remanent elementa, sed alterantur, & permutantur. Quod igitur partes quædam similes sint laxæ, aut adstrictæ, seu raræ aut densæ, id non fit, nisi ratione temperamēti, quod certe eiusmodi est, ut in hac plus sit terreæ, in illa plus aereæ naturæ. Hinc accidit, ut cordis, renum, & iecoris substantia sit densa, ac dura, pulmonis vero rara ac mollis. Quamquam autem elementorum corpora maxime efficiant, ut nonnullæ corporis partes raræ & molles, quædam vero densæ & duræ sint, tamen id non fit sine actione calidi & frigidi. Siquidem Aristoteles, & eum sequentes Philosophi, raritatem, densitatem, leuitatem, grauitatem, mollitiem, duritiem, & id genus alias qualitates, non nasci statuunt, nisi ex varia commistione humidi & sicci per actionem calidi & frigidi. Omnia namque mista varias formas, variosque essentia modos ex parte ipsius materia recipere tradunt, prout humidum & siccum, quæ ob id Aristoteli passiuæ dicuntur, in mistione per actionem calidi & frigidi patiuntur. Atque hinc est, quod omnes illæ qualitates ab iisdem secundæ nominentur, quia ex primis, quæ mutæ elementorum inter se, ut comprehensum est, actionis causæ sunt, procreantur. Quippe calidum non solum calefacit, sed & corpora eiusdem speciei & cognata congregat, diuersarum vero specierum separat: quod in metallis conspiciuntur euadit, quorum quæ cognata sunt, a calore congregantur: quæ autem inter se diuersa sunt, ab eodem dissoluuntur ac separantur. Idem rarefacit, attenuat, discutit, laxat, aperit, incidit & attrahit. Frigidum non tantum refrigerat, sed & congregat, adstringit, densat, obstruit, indurat, & incrassat. Cum itaque Philosophorum veterum etiam testimonio raritatis, densitatis, & id genus aliarum qualitatū procreatio non sit, nisi temperamento, ut iam ostendimus, accepta referenda, minus recte, nec satis candide faciunt, qui hoc nomine Galenum accusant, quod raritatem, densitatem, mollitiem & duritiem, non ad materiam, sed temperamentum retulerit. Atque ita etiam ut Galenum reprehendant, & suæ opinioni fidem faciant, falsis coguntur uti hypothesibus. Siquidem permultos videas præditos, inquirunt, optimo temperamento, qui neque calorem, neque frigus, neque laborem, neque ullam exsuperantiam perferunt hac sola ratione, quod molli, raro, laxoque sunt corpore. Sed non concedimus illis, quod assument. Neque enim mollis, raraque, corporis constitutio sola in causa est, cur corpora illa nullum excessum ferre possunt, sed vniuersum potius temperamentum, quod optime temperatum est, adeoque excessus omnis expers. Quare si in ista mediocritate perdurare debet, ab omni excessu sibi caueat est necesse. Inficias præterea imus, quod corpus optime temperatum possit dici molle & laxum: quod enim tale est, omnis excessus expers est, quare nec molle, nec laxum, nec gracile, nec crassum dici potest: sunt enim hæc omnia excessus nomina. Esse autem excessus nomina, notius est, quam ut demonstrari debeat. Et si non sunt excessus, qui fit, ut in genere medicamentorum sint, quæ indurent, constringant, rarefaciant, & condensent? Sed quod mollis & rarus corporis habitus sit vitiosus, adeoque cum optimo temperamento consistere non possit, ex ipsorum verbis euincemus. *Tale autem euasit*, inquirunt, *vel ex paucis imbecilloque semine, vel ex molliore delicatioreque vita, ex qua et molles solent appellari.* Quomodo vos quæso, ex paucis imbecilloque semine temperatum potest procreari? An non extrema est demeritæ, hoc ipsum affirmare, quod nemo sanæ mentis concedet? Annon mollior delicatiorque vita adscititi temperamenti causa erit? quæ certe id, quæ præcessit, optimū etiam si fuit, labefactat & perturbat. Falsum itidem est alterū, quod assument, nempe videri plurimos intemperatos, ut rusticos, qui tamen validi sint. Nam ut is validus sit, qui intemperatus est, rationi consentaneum non est. Concedimus quidem facilius ferre externas iniurias, qui partes similes firmas & densas habet, modo ita se habeat illorum et temperamentum, ut actiones non impediatur. Quapropter rectissime Galenus imbecillitatem intemperiei sobolem esse contendit. Non est igitur, ut aduersariis nostris concedamus raritatem &

2. de Orru
& inter.
cap. 2.
Secundæ
qualitates
Calidi ef-
fectus.

Frigidum.

densitatem partium robur & valetudinem infringere, adeoque morbos esse cum sint potius morborum causa. Siquidem raritas, ut Galenus c. 2. libri de morborum causis ait, si modum non seruat, discutiendo & dissipando natium calorem, corpus frigidius reddit. Non itaque raritas actionem laedit, sed frigida intemperies, quae illam necessario comitatur. Sic densitas corpus, eo quod transpirationem prohibeat, & fuliginosa excrementa intus retineat, calidius efficit, adeoque febrē excitat. Iam cōcidunt etiā ea, quae de exsuperante & deficiente, seu exquisito & hebeti sensu afferunt. Quum n. eius causam in raras, laxas, & molles, densas, adstrictas, & duras partes referant, quae hoc nomine dissolutae atque imbecilles, aut solidae, firmae, & robustae sint, in partium simul referunt temperamenta, quae in causa sunt, cur raras aut densae, quemadmodum ostendimus, in cōstitutione sua sint redditae. Hinc Galenus verissime in libello de cōstitutione artis medica dixit, ex quatuor elementis simul temperatis, corpus unum simile gigni, quod pro varia temperamēti ratione, aut particeps sensus, aut illius expertus euadit. Monstratum est nobis haecenus, Galenum sub temperamento complexū esse materiam, nunc in forma idem accidisse docebimus. Totius corporis formam, temperaturam, & non minime animam, Galenum statuere, e multis eiusdem monumentis est conspicuum. Id quod non alia de causa illum fecisse constat, quam quod temperaturae immutatione, actiones mutari, atque etiam animam ipsam a corporis temperatura vario affici modo, conspexit. Ut autem totius corporis, ita etiam singularum partium formam esse temperaturam dixit, non quidē solarum primarum qualitatum, sed & primorum corporum vi qualitatum trāsmutatorum, ex quorum quidem commistione proprietas quaedam temperamenti, ut libr. 3. de Temp. cap. ult. appellat, nascitur. Hanc alio nomine totam rei substantiam creberrime vocare solet, alii occultam aut specificam qualitatem. Et metipse etiam Galenus eam temperamenti proprietatem sepe numero qualitatis nomine donat. Hinc est, quod libr. 3. de simpl. med. facult. cap. 20. medicamenta purgantia substantiarū similitudine, lib. vero quinto eiusdem operis, c. 16. qualitatum familiaritate, attrahere ait. Nihil autem referre hoc vel illud dicas, ibidem non obscuris verbis innuit, inquiens: *Aliud est attrahentium medicamentorum genus, quod qualitatis familiaritate attrahit: id quod aliud est nihil, quam totius essentiae similitudine.* Proinde quum tota rei substantia perfectio est & integritas, qua res unaquaeque consistit, ac quoties illa immutatur, & de perfectione decedit; res tota cōtinuo perfringitur, nihil prohibemus illius decessionem, morbum totius substantiae appellari modo interea Galenus non reprehendatur, qui illum ad intemperiem retulit. Nam & ille intemperiem duplici modo essentiam rei corrumpere statuit. Vno, quum id ipsum manifestarum qualitatum sit occasione. Alio modo, quando id abditae cuiusdam causae ratione accidit, quae illam proprietatem temperamenti ex cōmmissione primorum corporum natam corrumpit. Atque hinc est, quod primum genus intemperiei, quam nos clarioris doctrinae gratia, manifestam vocabimus, per medicamenta, quae manifestis qualitibus illam oppugnant, curandam esse docet. Alteram vero intemperiem, quam occultam nominabimus, per ea, quae tota substantia, & temperamenti proprietate illi aduersantur, curandam tradit. Cum itaque, tum morbi, tum eorundem medicamenta nulla ratione cōstent, ac inueniri possint, sed sola experientia cognoscantur, ideo in lib. de morborū differentiis, ubi methodo & ratione morborum etiam similiarium numerus docetur, occultae intemperiei nulla facta est mentio, non certe quod nullas eiusmodi esse putaret: quomodo n. alias medicamenta esse docuisset, quae substantiae aut temperamēti proprietate, & non manifestae qualitatis alicuius ratione prodesse: sed quod eas methodo non subiacere existimaret. Ceterum non negamus aliquas qualitates, ut vocant, específicas, & vires peculiares corporib. a Deo Opt. Max. esse inditas, quas commistioni primorum corporum acceptas referre non possumus. Voluit enim Deus haud dubie remedia certis rebus contra certos morbos indere, ut in iis diuinæ prouidentiae essent testimonia, & hinc immensam erga nos illius beneficentiam agnosceremus, quod vitam nostram tot remediis datis tueri, & a morbis vindicare voluit. Hanc tantam Dei misericordiam ac clementiam erga nos homines cum Galenus, utpote nulla Christi cognitione donatus, ignorauerit, nihil mirum omnia mixturae primorum corporum tribuisse, praetertim, quum id suae professioni maxime conueniret. Sed ut finem tādē huic disputationi imponamus: cum Galenus diserte scribat, *temperamenta partium essentiam complere, & mixtorum essentia non constet, nisi ex materia*

Forma
corporis
de Galeni
sententia.

Forma
partium.

Tota rei
substantia

Intempe-
ries mani-
festa.

Occulta.

Qualita-
tes speci-
ficae.

Epilogus.

A materia & forma, quod Philosophi vno omnes ore affirmant rectissime, utraq; sub temperata nomine complexus est, utpote quò non solum primarum qualitatum, sed & primorum corporum, quibus illa insunt, missionem intellexit. Ideoq; & eos, quos alii ad materiam & formam referunt similium partium morbos, ipse ad vnam retulit intemperiem. Proinde in libri de morborum different. cap. 4. ita scriptum reliquit: Nullus primorum morborum, qui similaribus partibus proprii sunt, ratione curari potest, sine primorum elementorù contemplatione.

De generibus & differentiis morborum instrumentariorum partium. CAP. V.

Exposito primo morborum genere, quod in similaribus tantum sit partibus, ad alterum, quod in instrumentariis duntaxat consistit, transeamus oportet. Hoc certe a nostra ætatis Medicis mala constitutio seu compositio & morbus officialis nominatur.

B Ut autem domum recte constitutam iudicamus, quum omnes suas partes iusta magnitudine donatas habet, omniumq; earum iustam connexionem ac posituram est consecuta: ita quoq; partes corporis instrumentarias recte se habere dicimus, si probam conformationem, magnitudinē, numerum, & positum nactæ fuerint. Quatuor igitur sunt instrumentariorum partium morbi proprii, quorum vnus in indecenti cōformatione, alter magnitudine, tertius numero, quartus positura non conuenientib; cōsistit. Quam conformationem dicimus, Galenus sua lingua διάπλαση nominat. Tria autem hac voce significantur, figura, cavitās & soliditas, asperitas & lauitas. Cum itaq; eas partes malè efformatas dicamus, quæ vel indecentem figuram sunt cōsecutæ, vel solidiores iusto, vel perforatæ præter naturam, vel asperiores, vel læuiores effictæ sunt, tria certe morborum

Mala cōpositio.

Genera quatuor morborū propriarū instrumentariorum partium. Conformationis. Figuræ.

C genera in cōformatione consistent. Vnum in figura connata, vel aduentitia: alterum in cavitare meatuue immodice patente, aut solida obturataue, & tertium in asperitate & læuitate. Ac in singulis generibus alii nascuntur. Nam figura multis modis variatur, vt si partes, quæ natura recte esse debent, curuantur, quemadmodum in valgīs & vaciis accidit. Item si curuæ eriguntur, si rotundæ, quadratæ redduntur, si distorquentur, si distumpuntur, luxantur, aut quocunq; modo legitima earundem figura deprauatur. In partibus quas natura cavitatibus & meatibus quibusdam donauit, multiplices fiunt morbi. Vel enim prorsus perditæ sunt cavitates, vel angustiores, vel latiores, vel pauciores, vel plures sunt, vel in iis partibus reperiuntur, quas solidas esse oporteret. At in asperitate & læuitate vnicum solum genus statuitur morbi, exasperatis scilicet partibus, quas læues esse

Cauitatis.

Asperitatis & læuitatis.

D conuenit: & illis læuigatis, quas asperas esse oportet. Quæ cum omnia Galenus in lib. de morb. differ. exemplis aptissimis illustrauerit, non est, cur de illis longius differamus. Numero partium iusto corrupto, duæ nascuntur morborum differentię: aut enim pauciores sunt partes, aut abūdant. Exempla horum sunt sextus digitus, vnguis in oculo: item de truncatio auris, digitorū ablatio, & eius generis alia. In magnitudine itidem duo morborum consistunt genera. Vel enim supra modum excrescit partium moles, vel minuitur plus, quam ratio postulat. Incrementum vero duplex, nempe vel connatum, vel aduentitiū: quale erat, quod Nicomacho Smyrneo accidisse refert Galenus. Connatū est, vbi quis magno admodum capite nascitur. Minuitur in atrophia & alimenti defectu. In compositione, vel, vt nonnulli vocant, coniunctione partium bifariam morbi accidunt.

Numeri.

Magnitudinis. Compositionis.

E Primo, quum positus mutatur: id quod fit, si partes suo minime stent loco, & a suis sedibus recedunt: quemadmodum in luxationibus, ramicibus intestinorum & omenti articularumq; commotionibus euenit. Secundo, quū perperam connectuntur, vt si vincula fuerint laxa, aut intenta, aut abrupta, & vbi partes præter naturam coalescunt. Atq; hi sunt simplices corporis partium morbi. Cōpositi earundē morbi sūt, vbi cōplures ex simplicib; iā dictis particulā aliquā simul infestāt, vt si in oculo simul sit vnguis, & lippitudo.

Compositi morbi.

De continui solutione, similaribus & instrumentariis communi morbo. CAP. VI.

Continui vnitatisue solutionem tam similaribus quam instrumentariis partibus esse cōmunē, Galenus in lib. de morborum differentiis, hac ratione probat: Si quum secundum naturam se habent, aliquid similaribus & instrumentariis partibus inest commune, quod actionem præstat, omnino vtiq; si id ipsum corrumpitur, communis quidā ipsis morbus statuetur. Atqui cōmunis singulis partibus vnitās, qua vnaquæq; si prædita fuerit, vna esse, & vnam actionem, vel vnum usum perficere dicitur. Si vero hac ob aliquam occasionem soluat, ipsa illius partis morbus est. Hæc Galeni ratio plane euincit, continui solutionem esse vtriusq; partibus cōmunē morbū. Quippe nemo sanæ mentis inficias ibit, vnitatē esse id cōmunē, quod animalis functionē

Cap. 4.

Aduersa-
riorū Ga-
leni sen-
tentiam
impro-
bantium
argumen-
ta diluan-
tur.

Similariū
essentia
ut corri-
patur.

Obiectio.

Solutio.

præstat, quod in confesso sit, hac corrupta, confestim quoque actionem partium labefa- A
ctari. Ceterum instrumentariarum partium actionem lædi earundem vnitate corrupta,
notius est, quam ut demonstrari debeat, nec est hodie qui id ipsum in dubium vocet. Si-
miliarium vero non eadem est ratio: sunt enim, quorum sententiam nonnulli hodie Ga-
leni aduersarii magno conatu tueri student, qui vnionem & continuitatem partium si-
miliarium actionibus nihil prodesse, nec solutam obesse contendunt. Atqui huius opi-
nionis assertores initio meminisse oportuit, omnem substantiam, quæ generationi &
corruptioni subiecta est, vnitam esse, adeoque alterari posse, quod Hippo. certe affirmat,
& Galenus aduersus Epicurum, Asclepiadem, Democritum, & Leucippum, qui vacuita-
tibus quibusdam hanc interceptam esse afferebant, in *libr. de morborum, & tertio de Pulsuum* B
differentiis ostendit. Non est autem similariū partium vnio, ut Galenus in libello de constitu-
tione artis medica etiam testatur, nisi a natura, vel, ut ibidem etiam ait, ab elementorū com-
moderatione. Si itaque vnio similarium partium corrumpitur, necesse est earundem com-
modationem, adeoque partium similarium essentiam, constitutionemque, quam ex pri-
mis elementis consecutæ sunt, vitari. Hæc enim ita in similarium partium procreatione
mixta & contemperata sunt, ut vnitam earum substantiam effecerint. Neque enim nega-
re poterunt, similes partes ex quatuor elementis simul contemperatis esse procreatas.
Si vero soluta vnione corrumpitur earundem essentia constitutione, ut iam ostendimus:
igitur actionem quoque illarum, utpote quæ constitutionem necessario sequitur, adeoque ab ea veluti
a sua causa pendet, labefactari est necesse. Quum autem corrumpi similarium partium essen- C
tiam per continui solutionem dicimus, non intelligimus eam ita corrumpi, ut in alteram
speciem transferatur, & abeat: nam id solius est primæ qualitatis opus: sed quod vnita
substantia separetur. Sed aduersus illa quæ diximus, aduersarii ita instant: *Actiones simila-*
rium partium sunt, quæ naturales a medicis dicuntur, attractio, retentio, concoctio, & expulsio.
Pars autem vulnerata, nisi intemperies accedat ex affluxu humoris, attrahet, retinebit, concoquet, &
expellet, & denique nutrietur, & augebitur, non minus profecto, quam antea, dum omnino erat inte-
gra, quemadmodum videmus in carnis procreatione fieri, ubi non solum proba perficitur nutritio, sed
etiam quod ex vulneris concuitate est deperditum, actione partium diuisarum restituitur. Hæc illi.
Fatemur quidem naturales actiones vocatas omnibus similaribus adhuc integris inesse:
vulneratas autem & diuisas easdem actiones illabefactatas seruare, hoc est quod cōstan- D
ter negamus. Quod enim caro in vulneratis partibus procreatur, id non partibus diui-
sis acceptum referendū erit, sed subiectæ potius carni adhuc sanæ & integre. Ex ea enim
carnis generatio, Galeno lib. 3. & 4. *Ther. Method. teste*, ortum habet: ibidem namque inter
alia sic scriptum reliquit: *Subiecta carnis affectus causa rationem obinet ad id, quod efficitur.*
Quippe & hac, & per hanc, tum quæ dissident, glutinantur: tum quæ caua sunt, carne implentur. Qua-
re falsum est, quod in sua probatione assumunt aduersarii, id quod deperditū est, actio-
ne partium diuisarum restitui. Hæc nanque, utpote quarum constitutio iam corrupta est,
nihil vnquam sanguinis, vnde caro procrearetur, boni attraherent, quod constitutione
labefactata tum communes, tum proprias partium actiones lædi sit necesse. Sed iterum
instant aduersarii, inquentes: *Si pertinacius contendas impediri actiones similarium a solutione* E
continui, idem nobis concedis de aliis prædictis oportet, nempe figura, conformatione, magnitudine, &
connexu. Nam contortum os, aut alia pars male conformata, similes noxas experietur ob peruersam
conformationem iis, quas solutam vnionem inferre posse putas. Sic sane non minus, occlusis, aut pate-
factis, aut alio modo vitatis suis meatibus, pars similis proprias obire actiones prohibebitur, quam
si diuisionem aliquam patitur. Respondeo, Minime gentium, siquidem a figura, confor-
matione, magnitudine & connexu, similarium partium essentia ac constitutio non labe-
factatur: ideoque earundem quoque actionibus nullam inferunt noxam. In partibus igit
similaribus, quatenus similes sunt, qui in magnitudine, numero, & connexione con-
sistunt morbi haud generantur, quandoquidem nihilominus similes partes sanæ sunt
ac integre, quum male figuratæ sunt, aut iusto maiores, aut minores. Ad has igitur ea so-
lum ratione pertinent, quæ ad instrumentarias componendas requiruntur, quarum certe F
cōpositio viti at, nisi debita a cōuenienti figura, magnitudine, numero, & cōnexu illas
constituant. Hinc non temere Gal. in libello de Artis cōstitutione ita scriptū reliquit: *Cō-*
stat igitur, ligamenta magnitudinē quandam, figuram, numerū, & cōsitionē requirere. Siue n. mi-
uora, aut maiora, plura, aut pauciora, quā oportet, fuerint, siue aliam figurā habeant, aliq. loco inheren-
scant,

- A** *scant, non amplius inculpabilis articularum motus perficitur.* Vitiata itaq; figura & magnitudo, non ipsis similaribus, sed instrumentariis, quæ ex eis constituuntur, accidit. Nihil enim refert os, quatenus est pars similis, esse contortum, rectum, rotundum, quadratum, magnum, aut paruum, propterea, quod omnis generis talia in corpore humano reperiuntur: quatenus autem instrumentariam constituit partem, necesse est, ut in thorace sit reflexum & incurvum, in brachio & tibia rectum, in brachiali, quartum maxime rotundum, in pede cubiforme quadratum. Quam certe figuram, nisi in iam dictis partibus obtineat, earundem constitutio deformatur. Pari ratione in femorum constitutione magnum sit os oportet, in brachialis exiguum. Ut hoc nomine rectissime morbi, tum in figura, tum in magnitudine ad instrumentales duntaxat partes a Galeno, & aliis veteribus relati
- B** *sint.* Quemadmodum autem nihil refert partes similares, quatenus similares sunt, hac vel illa forma esse præditas: sic etiam nihil refert, cavitatem habeant, necne, quatenus similares sunt. Quod nervorum exemplo demonstrasse satis sit. Nam nervus quatenus est pars similis, neque solidus, neque cauus necessario existit: quia utriusque generis nervi in corpore animantis reperiuntur, & inter omnes forte, non nisi unus visorius scilicet appellatus, perforatus existit. Sic venæ & arteriæ, quatenus sunt partes similares, non necessario cavitatem donatæ sunt. Venæ enim, & arteriæ sunt, quod tunicis suis & membranis cōstent, quæ certe nutrentur, perinde, ut aliæ partes solidæ, etiam si non essent caux. Quatenus autem instrumentarias constituunt, necessario caux existunt. Neq; enim adeas, quibus hoc nomine insertæ sunt, partes spiritum & sanguinem, nisi caux essent, perferre possent. Quod si igitur obstructio in iis, ex crassis humorib. nascitur, non ipsarum certe, sed instrumentarium partium, quibus illæ insertæ sunt, morbus existit. Hinc est, quod Galenus *libr. 2. Therap. method. cap. 6.* obstructionem venarum, quæ in cavo iecoris habentur, ex lentis & crassis succis ortam, non venarum, sed ipsius visceris morbum esse dicat. Atque eius rei quoque causam subiicit, quia, inquit, nulla similarium eius pars ægrotat. Obstructio namque venarum essentiam, quatenus scilicet membranz quædam, aut tunicæ sunt, non lædit, sed manent integræ, & illarum, non obstante, quod in illis obstructio iam dicta sit orta. Obstructio igitur earundem actiones, quatenus caux sunt, lædit. Pari modo *lib. 1. de Symp. causis, cap. 1.* obstructionem accidere nervo visorio, ut est pars instrumentalis, inquit: nō certe, quod reuera sit pars instrumentalis (omnib. enim constat similem esse) sed quod instrumentalibus sit inserta, illisq; inseruiat. Quasi dicat Galenus, *obstructio in nervo visorio fit, non quatenus est similis, sed quatenus instrumentariam constituit, aut quatenus cerebri causa est perforatus, aut quatenus ad instrumentales pertinet.* Quare non est eadem ratio vnionis, conformationis, & magnitudinis. Nam vnio, quod etiam *Auerroes sect. 1. de sanitatis functionibus attestatur*, similaribus partibus, quam instrumentariis magis convenit. Hæ enim proprie loquendo non vnitæ, sed contiguz potius, illæ vere continuæ & reuera vnite sunt. Ut hinc Sole clarius sit, solutionem continui partibus similaribus verius, quam instrumentariis tribui, adeoque toto cœlo errare, qui pruritu novorum dogmatum laborantes, hanc partibus similaribus non esse communem, sed instrumentariis duntaxat propriam remere contendunt. Verum pergunt aduersarii. Si, inquit, *solutio continui similium actionem lædit, adeoque earundem morbus est, sequeretur nunquam posse reperiri morbum ex solutione continui in parte instrumentali, quin similares etiam ipsa morbo affligantur. Non enim potest solutio vnio partis instrumentaria, manente integra, & sibi continua similari, quæ ad instrumenti compositionem assumitur. At Galenus ipse* *in cōcordia* *morbos organicarum partium, & non similarium esse censet, nimirum, quod quæ relinquuntur partes similares, non minus exerceant sua officia, quam quum essent antea integræ: alioqui idem illud etiam similarium morbus esset.* Hæc illi. Sequelam haud agnoscimus. Nam in avulsione, quæ Græcis *ἐκσάρκωσις* vocatur, partium instrumentarium vnio soluitur, similaribus manentibus integris, & nullo morbo afflictis. Siquidem similares, quæ prius instrumentali cohærebant parti, iam ab ea avulsæ, nec ut antea parti instrumentariæ contiguz sunt, & vniuntur, adeoque ipsius vnio, quæ non est, nisi partium similarium coalitus, diuisa est. Similares vero partes manent integræ, nec quicquam illarum patitur essentia. Quapropter Galenus rectissime avulsionem ad instrumentarias partes retulit, utpote per quam earundem vnio soluitur, similarium vnitate illa befacta: ut hinc iterum perspicuum euadat, instrumentarium vnionem ve-

Solutio continui part. b. si. similaribus verius quam instrumentariis tribuitur.

in cōcordia

rius contiguitatem dici: quod si vera vnio esset, ab ea partes eius auelli non possent, nisi ipsa vna diuiderentur. Arteriarum autem vel ligamentorum omnimodani diuulsione dilanationemue Galenus recte & totius instrumenti, & diuulsæ particulæ commune esse pathema dixit, quod vtriusq; in ea soluatür continuitas. Totius quidem, quod partes eius amplius sibi inuicem, neq; cohæreant, neq; vniantur, adeoq; ipsum in se diuultum, & vnum nõ sit. Partis diuulsæ, quia non maneat vna, sed in duas dissecta sit. Sin ligamentum ex toto diuultum non fuerit, totius instrumenti morbus non est, quod videlicet eius partes adhuc instrumentali cohæreant & vniantur: sed solius, quæ perpeffa est continuitatis solutionem, partis. Quare par in vtroq; ratio, quod putant aduersarii, non est. Cum itaq; vnionis solutio, tam similarium, quam instrumentariarum partium cõstitutionem labefactet, adeoq; earundem vitiet actiones, morbus sit, non caussa morbi oportet. Ceterum, continuitatis solutio in similaribus facta, varias habet appellationes. Quippe in osse Græcis *ῥήγμα*, Latinis *fractura* dicitur. Nam ea, *Aristotele etiam libr. 4. Meteor. cap. 9. te-ssse*, proprie frangi dicuntur, quæ in magnas partes diuidi, distrahiq; possunt, quæque essentiam solidam & duram consecuta sunt. In carnosiss partibus communiter Græcis *ἔλκος*, Latinis *vlcus* nominatur. Proprie autem vnitatis solutio in carnosiss partibus ex vulnerando facta, *Galen. lib. 3. Ther. Metho. cap. 1. suffragante*, Græcis *τεῦμα*, Latinis *vulnus* vocatur. Ea vero, quæ citra vulnerationem ex humorũ malicia & acrimonia accidit, Græcis proprie *ἔλκος*, Latinis *vlcus* nuncupatur. Quæ in carnosiss musculorum partib. ex diffentione prouenit, Græcis *ῥήγμα*, Latinis *ruptio* vel *ruptura* nominatur. Quum vero fibræ similiter tensæ rumpuntur, Græcis *σάσμα*, Latinis *conuulsio cum ruptione* dicitur. Si autum & tenue fuerit id, quod vulnerat, Græcis *ῥύγμα* & *ῥύσις*, Latinis *punctura* & *punctio* vocatur. Quod si carnosæ partes, & mollia ossa, qualia sunt puerorum, a valido & graui aliquo ac duro corpore colliduntur, Græcis *θλάσμα* & *θλάσις*, Latinis *collissio* & *contussio* appellatur. Si cavitatis aliqua in parte, quæ collisa est, a re, quæ ferit, inducta est, Græcis *ἐμβλασις*, Latinis *illissio* nuncupatur. Ossium ab acribus humoribus *erosio*, Græcis *τερυδών*, Latinis *caries* vocatur. Solutio continui in capitis ossibus Græcis *ῥωγμή*, Latinis *sfissura*. Si vero caluarie diuissio ab acuto aliquo irruente & incidente fit, Græcis *ἰγχοπή*, *δισχοπή*, & *ἰδρα*, Latinis *incissio*, *intercissio*, & *sedes* dicitur. Solutio vnitatis in ligamento Græcis *δισπασμός* καὶ *διάσπασμα*, Latinis *diuulsio* nominatur. Vt hinc pateat, in Galeni codicibus excusis in principio quarti libri de Medendi ratione, mendam esse, vbi vnionem solutam in ligamento vocari *ἀπόσπασμα* scribit. Nam, ut paulo post dicemus, *ἀπόσπασμα* ad instrumentales perpetuo, nunquam ad similes, refertur partes. Cum itaque ligamentum sit pars similis, fieri non potest, ut *ἀπόσπασμα* eius diuissio appelletur. Quare pro dictione *ἀπόσπασμα* substituenda venit *διάσπασμα*. Hinc Galenus cap. 11. libri de Morborum differentiis, vbi de ligamenti diuissione loquitur, ait: *ὅτι δισπασται συνδεσμὸς, non ἀποσπᾶται*. Quod certe illi faciendum erat, si *ἀποσπᾶσμάτα* ad ligamenta tantum referre voluisset. Mirum autem a nullo interprete hoc ipsum hætenus esse animaduersum. Totigitur talesque differentiæ solutionis vnitatis sunt, quatenus similaribus partibus accidit. In instrumentariis autem partibus, non perinde vt similaribus, propria habent nomina, sed omnia vocantur *ἀποσπᾶσμάτα*, id est, auulsiones. Testis eius rei Galenus, qui in libello de constitutione artis medica, ita scriptum reliquit: *Ἐν ὁργανοῖς ὅ γινεταὶ τῶν ἐν τελεγεῖν γίγνεται συμφύσεις καὶ κλεῖται πάντα ἀποσπᾶσμάτα*. Quibus sane verbis innuit, omnia morborum solutæ cõtinuitatis genera in instrumentariis partibus fieri per cohærentias partium, quæ sunt diuersi generis, & vocari auulsiones. Nam partes similes, quæ sunt diuersi in instrumentariis generis, vt in capite sunt membranæ, ossa, venæ, arteriæ, & aliæ diuersi generis & naturæ sibi cohærent, quantisper vnitas instrumentalis seruatur. Quum vero, quæ prius cohærebant partes similes ab instrumentariis auelluntur, earundem vnio corrumpitur, ideoque auulsiones illæ merito, vt comprehensum est, ad instrumentales pertinent.

De Differentiis morborum generatim. C A P. VII.

Breues morbi. Peracuti. Exquisite vel simpliciter.

EX iam commemoratis tribus primis morborum generibus, alii breues, alii lūgi sunt. Breues duplici constant differentia: quidam enim *peracuti*, quidam *acuti*. Ex peracutis rursus alii exquisite vel simpliciter peracuti nominantur, qui ultra quartum diem non extenduntur. Hos barbaram sectantes medicinam perperacutos appellant.

Rectius

- A** Rectius autem peracutissimos hos omnes, qui intra quartum abeunt diem, morbos vocarent. Alii non exquisiti, vel non simpliciter peracuti sunt, qui quartum excedunt, & ad septimum non raro producuntur. Acuti trifariam diuiduntur. Nam quidam simpliciter, id est, sine adiectione aliqua, acuti dicuntur, qui Hippocrate *sect. 2. Aphor. Com. 23. aureo*, intra decimum quartum diem iudicantur. Quidam non simpliciter acuti, sed qui ad vigesimum vsque progrediuntur, vel intra vigesimum finiuntur. Alii vero sunt, qui acuti nominantur, hoc adiecto, quod quadraginta diebus iudicantur. Horum Hippocrates quidem *lib. 1. Progn. 28.* mentionem facit. Hi a Galeno alio nomine *ἐν μεταστάσει*, id est, *ex degeneratione, & mutatione in aliam speciem*, & a Galeni quibusdam interpretibus, *ex decidencia* acuti dicuntur: quod scilicet per imperfectas iudicationes ab vna morbi specie in aliam mutantur, vt si pleuritis in suppurationem abit. Longi seu diurni morbi sunt omnes, qui acutorum terminum transcendunt. Vt autem breues a calidis magna ex parte humoribus, sanguine nimirum & flaua bile: sic diurni a frigidis, pituita, & atra bile, nascuntur. Quod Hippocrates in Epidemiis, suo more, breuissime iis innuere verbis voluit: *In cratone antiqui dolores frigidi, noui vero calidi*. Præter has mulæ aliæ quoque morborum sunt differentię, quidam enim sunt communes, qui multos vno in loco inuadunt, hos Græci *παρκοινος* & simpliciter *κοινος* appellant. Contra alii sparsi, *σποραδικοί* Græci nominantur, qui non multos vniuersim & communiter, sed separatim sparsimque vnumquemque apprehendunt, vel, vt Galenus *li. 1. Epidem. præfatione*, inquit, qui vnumquemque priuatim inuadunt, vt quum hunc pleuritis, istum nephritis, illum tabes corripit. Comuniū morborum quidam *ἐνδημοί*, id est, *patrii & vernaculi* dicuntur, qui semper locum quēdam occupantes tenent. Alii *ἐπιδημοί* siue *ἐπιδημοί*, hoc est, *vulgares, qui anni tempore aliquo, in regione aliqua grassantur*: quorum qui perniciosissimi sunt, multosque occidunt, pestilentes vocantur. Differunt autem Endemii ab epidemiis, quod illi perpetuo eandem regionem obfideant, & causam habeant ambientem aerem ab inferioribus terrenis; causis infectum: hi vero minime, & quod causam habeant aerem, non ex loci ratione, sed potius ex cœli statu infectum. Sunt etiam dicti morbi *πάρδημοι*, id est, *plebei*, quod plebem tantum, seu vulgus corripiant. Est & morbus alius malignus, Græcis *κακοήθης* dictus, qui grauiam fert symptomata, vel, vt Galenus *desinit lib. 1. de Iudiciis, cap. 16.* cui adsunt grauiam indicia. Cui opponitur is, qui Græcis *εὐήθης*, hoc est, *benignus, mitis, seu placidus* vocatur, qui leuia fert symptomata: vel cui securitatis signa adsunt. Quidam *μεγας* est, qui vehementer corpus affligit & infestat, quiq; vim magnam obrinet: id quod accidit tribus potissimum de causis, quod scilicet in nobili & præstanti aliqua parte consistat, aut quod plurimum a naturali statu recedat, & periculosus sit, aut quod suapte natura, & propter suam essentiam magnus. Hic alio nomine veteribus Græcis *σφοδρος*, id est, *vehemens*, & *ἰσχυρος*, hoc est, *validus* noncupatur. Grauis autem, quem iidem *χαλεπὸν* appellat, est idem cum vehemēti, quamuis proprie periculosam significet. Nam qui vehemens est & difficilis, is etiam periculosus existit. Quare veteres Medici iis nominibus promiscue sunt vsi. Ceterum inter morbos, quos humoris vitium committit, quidam sunt *ἐξquisite*, qui scilicet in suo genere sinceri sunt, & mistione humorum non adulterantur. Hinc *legitimi* alio nomine dicuntur. Sic *tertiana exquisita* & *legitima* vocatur, quæ ex pura bile gignitur. Pari ratione *exquisitum erysipelas* nominatur, quod non est cum phlegmone, aut alio genere tumorum præter naturam commissum & adulteratum. His contrarii nothi spuriiue, non exquisiti, illegitimi & impuri nominantur, qui scilicet alterius humoris mistione adulterati sunt. Sic *tertiana*, quæ cum pituita miscetur, non exquisita, & *notha* vocatur. *Exquisitum* nomen etiam in compositis vsurpatur morbis, vt quum exquisitam semitertianam appellamus, quæ ex æquali mistione tertianæ & quotidianæ continuæ nascitur. Morborum quoque alii Græcis *ἐν ἔξει*, hoc est, *in habitu* dicuntur, qui difficile discutiuntur ac remouentur. Contra *ἐν ῥέσει*, qui facile abiguntur, ac discutiuntur. Ex morbis nonnulli simplices, quidam vero compositi sunt. *Simplex* autem morbus, apud Galenum non vno dicitur modo. Nam aliquando simplicem pro miti, placidoque vsurpat, idque Hippocratis exemplo, qui *in 3. Prognosticorum* placidissimas & mitissimas febres, simplicissimas vocauit. Nonnunquam pro vno capitur, vt simplex sit morbus, in quo simplex & vnus sit affectus. Hoc modo ei, qui compositus est, opponitur. *Compositus* vero est, quem *σύνθετος* Græci vocant, qui cum alio coniungitur mor-

Non exquisiti vel non simpliciter.

Acuti. Simpliciter.

Non simpliciter. ex mutatione.

Longi morbi. 6 Epidem. sect. 1. Aphor. 7.

Communes. Sparsi.

ἐνδημοί. Patrii. Vulgares. Pestilentes.

πάρδημοι. Maligni.

Benignus. Magnus.

Vehemens. Validus. Grauis.

Exquisiti.

Legitimi.

Nothi. Spuri. Non exquisiti.

In habitu. ἐν ῥέσει.

Simplices.

Compositi.

Cōplicati. bo. Ex compositis autem alii complicati siue implexi, Græcis *ἐμπλεκόμενοι* sunt dicti, qui A
Confusi. ita coniunguntur, ut eorum natura distincta sit, & diuersis horis inuadant. Alii confusi
sunt, qui ex mutua commissione ita coniunguntur, & inter se temperantur, ut illorum
natura minime distincta appareat, & iisdem horis inuadant, atq; ob id Græcis *κεκρυμμένοι*
Ordina- nominantur. Inter morbos etiam est, qui ordinatus appellatur, qui statis certisque tem-
tus. poribus affligit: ut *tertiana, qua tertio quoque die inuadit*. Contra inordinatus est, qui in-
Inordina- certo tempore, & minime secundum circuitum recurrit. Hic alio nomine errans, &
tus. erraticus, incertusque nuncupatur. Is vero, qui ordinem certum seruat, stabilis, & con-
Errans. stans vocatur. Sunt etiam ex morbis, qui *recurrentes, redeuntes* sue Latinis appellantur, Græ-
Stabilis. cis *ἐπανερχόμενοι*, qui parum quidem remittuntur, moderatioreque euadunt, sed rursus
Recurrentes. postea exacuuntur. Hippocrates *ἰσχυροὶ νοσήματα* alio nomine vocat, Latini *recidi-* B
Recidua- *uam* facientes. Morborum quidam sunt *primarii*, qui aliis non succedunt, nec ab aliis ex-
facientes. citantur, sed a suis causis primo gignuntur. *Secundarii* vero, qui ab aliis nascuntur
Primarii. morbis. Hi Græcis per *συμπέδαν*, nobis per consensum, & per *διωτεράδαν* constare dicun-
Secunda- tur: sicut priores per *πρωτοπέδαν*. Ex morbis aliqui per se dicuntur, qui primo & imme-
rii. diate partem occupant. Ex accidente alii, qui secundo loco vel secundo, ut hodie lo-
Perfe. quuntur, ad aliam pertinent. Sunt etiam salutare vocati, in quibus certo speratur salus,
Ex acci- aut qui, ut plurimum ad salutem finiuntur. Lethales vero, qui vel semper, aut magna ex
dente. parte perimunt. Possunt etiam multæ aliæ morborum differentiz a tempore humori-
Salutares. bus, & id genus aliis rebus desumptæ statui, quas nominatim percensere nihil attinet.
Lethales. Atque hæcenus generatim morborum differentias enumerasse ad eum, quem propo-
suimus, modum sufficiat. Nunc ad tertium præter naturam affectum, nempe sympto-
ma, ut progrediamur, ordinis ratio postulat.

De symptomatis definitione. CAP. VIII.

Sympto- **C**VM de causis morbificis, morbisque ipsis abunde pro instituti nostri ratione egē-
ma bifa- rimus, reliquum est, ut de symptomatis verba faciamus. Symptomatis vero vox, ut
riam vlti- in lib. de Symptom. differentiis auctor est Gal. bifariam vsurpatur, generatim scilicet, ac spe-
patur. ciatim. Generaliore significatione pro omni eo, quod præter naturam in corpore acci-
Genera- dit. Qua sane ratione & morbus, & morbi causa interna, symptomata dici possunt. Spe-
tim. ciatim, seu proprie, quicquid præter naturam, morbo, & eius causa exceptis, in corpore D
Specia- reperitur, symptoma vocatur. Atq; hoc modo sumtum symptoma, nihil aliud est, quam
tim. affectus præter naturam, qui morbos, veluti umbra corpus, necessario sequitur, illisque
ἐπὶ τὴν νόσον. succedit. Hinc est, qd id ipsum nonnulli Græci Medici, non symptoma, sed *ἐπὶ νόσον*, hoc
est, *succedens*, scilicet morbum, appellare maluerint. Quanquam *σύμπτωμα* quoq; nomen
illi pulcre quadrat, quod ei a verbo *συνπίπτω*, quod *simul cado* denotat, est impositum, nulla
Interpre- alia de causa, quam quod simul cum morbo eueniat. Interpretes aliquot Galeni casum,
tes Latini alii *accidens* vertunt. Priorum interpretatio, modo in hac significatione satis perspicua
Galeno & Latina esset, tolerari posset, posteriorū nequaquam: Nā Galeno *σύμπτωμα* diuersum est
tantur. ab accidente, quod ille *συμβεβηκός* vocat. Siquidem, ut *primò lib. meth. medendi. cap. 9.* ille te-
συμβεβηκός statur, proprie loquentibus, ea, quæ sanorum constitutionem sequuntur *συμβεβηκός*, id
Quorun- est, *accidentia*: quæ vero ægrotantium, symptomata dicuntur. Nec studiosos turbare de-
dum cauil- bent hoc loco quorundam cauillationes, qui aliter vocem symptomatis Galenum in
lationes *libro de optima secta* vsurpasse aiunt, vbi symptomata quædam esse secundum naturam, ut
diluuntur. nigrum colorem in Indis, diserte tradit. Nam non animaduertunt, aut certe dissimulat,
Galenum eo loci non ex sua, sed potius Methodicorum, contra quos ibidem disputat,
sententia loqui, qui symptomatis vocem ad omnia ea, quæ in corpore nostro accidunt,
accommodarunt. Miror autem vehementer, eiusmodi calumniis delectari hodie viros
eruditos, quorum certe erat veterum dicta potius candide, quod faciendum esse certe
studiose Galenus ipse iam pridem monuit, interpretari, quam ita insidiosè & hostiliter
ad suas cogitationes parum recte institutas detorquere. Sed accipient haud dubie pa-
rem mercedem, habebuntque, olim qui ipsos pro meritis tractabant, & qui eorum et-
iam optime dicta aliter ac ipsi dixerint, interpretabuntur. Non solum vero hoc nomine
reprehendunt generalem symptomatis apud Galenum acceptionem, sed etiā his ver-
bis, *Symptoma generatim est, quicquid animanti præter naturam accidit*: falsam affingunt,
inter-

A interpretationem. Nam præter naturam interpretantur, quod plurimū a naturali statu recedit: quum tamen Galenus, quicquid a naturali statu recedit generatim symptoma nominet. Sic *pandiculatio, palpitatio, sternutamentum, & tussis* inter symptomata, cum sint motus præter naturā, rectissime ab eo numerantur. Nam etsi parū admodū corpus, vel partem molestant: tamen quia præter naturam & a morbis actiones lædentibus eueniunt, symptomata sint oportet. Ceterum, quæ de sanguinis excretionē, vomitu, & aliis excretionibus, quæ toto genere præter naturam sunt, & a symptomatum tamen confortio seunguntur, adferunt, in nostris comentariis super librum *de symptomatum differentiis*, diluimus. Cum enim non morbi imperu, sed naturæ potius robore fiant, actiones naturæ, non symptomata sint, neque præter naturam accidant, oportet. Fiunt autem **B** robore naturæ, si tempestiue fiunt. Tussis autem, rigor, horror, singultus, sternutamentum, & id genus alia, perpetuo sunt actionum noxæ, & a morbis excitantur, ideoque symptomata sint, est necesse. Nec verum est, quod iidem Galeno affingunt: nihil eorum, quæ ad animalis commodum in corpore peraguntur, Galenum inter symptomata reputare. Nam, *ut recte colligunt*, hac ratione tussim, rigorem, sternutamentum, & id genus alios præter naturam motus, inter symptomata temere collocasset. Galeno itaque ne per somnium quidem in mentem venit, inter symptomata non reputari, quæ ad animantis commodum in corpore excitantur. Constat enim omnibus, nullum esse motum præter naturam in corpore, per quem non noxia expurgentur. Cum vero illi a morbis excitentur, adeoque actionum noxæ sint, rectissime symptomatis annumerantur. **C** Quod si vero robore facultatis & naturæ, animalisque præmeditatione, nō vi morbi, ac inuito animali fiunt, non symptomata, sed naturæ actiones rectissima ratione appellantur. Quod si animaduertissent aduersarii, non eo absurditatis prolapsi fuissent, ut symptoma pressius sumtum non solum a morbis, sed etiam a morborum naturaliumque rerum causis fieri dicerent. Verum de symptomatis definitione satis.

De Symptomatum generibus differentiisque. CAP. IX.

Symptoma proprie sumtum in tria partitur genera. Alia enim sunt functionum noxæ, alia corporis nostri affectus, alia quæ ad utraque per immodicas excretiones & retentiones sequuntur. Quæ propter promiscuā plane sunt, ut quæ modo ad affectus **D** corporis, modo ad functionum noxas sequuntur. Porro noxæ functionum nomine intelligimus debilitatem, deprauationem, atque etiam abolitionem, cuius duæ primæ sunt differentię. Vel enim animalium, vel naturalium functionum noxæ existunt. Rursus animalium functionum noxæ trifariam secantur. Vel enim sunt sensilium actionum, ut *visus, auditus, gustus, odoratus, & tactus* prorsus amissus, hebes vel deprauatus. Vel motricum, ut *est, partis immobilitas, & difficilis motus*. Vel principium actionum, ut *imaginationis, rationationis, & memoria abolitio, debilitas, & deprauatio*. Naturalium functionum noxæ sunt, *appetentia, concoctio, distributio, pulsus, attractio, alteratio, retentio, & expulsio abolita, imbecilla, vel deprauata*. **E** tiam & constantium, neque amplius in ipso fieri suam essentiam possident, atque ad eo vere subsistunt, quadruplici genere complectuntur. Sunt enim visiles affectus, ut colores præter naturam totum corpus, partem vnam, vel plures occupantes, ut est color in morbo regio, & vitiliginis generibus, aliisque partium malis. Nam si colores aliquādiu manent, nec ita subito cum morbis, a quibus procreati sunt, abeunt, imo interdū difficulter amouentur. Olfactiles seu odorabiles, ut fœtores aurium, narium, maxillarum, & aliarum putrescentium partium, ructus fumosi & fœtidi. Gustabiles, ut *sapores præter naturam, amarus nimirum, salsus & acris*. Tactiles, ut *cutis durities, tensio, ariditas, flacciditas, & rugositas*. Ex vero, quæ præter naturam vel a corpore excernuntur, vel in eo detinentur, in tres quidem, & primas secantur differentias. Vel enim tota substantia, vel qualitate, vel **F** quantitate a naturali habitu recedunt. In censu eorum, quæ tota substantia præter naturam sunt, sanguinis excretio, quæ Græcis *αιμορρῳγια* dicitur, numeratur, neque temere, siquidem per eam excernitur, quod corpori maxime familiare est, & quod in vasis, utpote naturæ vsui futurum, retineri debebat. Quæ qualitate a naturali statu recedunt, sunt ebrum, quæ excernuntur, colores, & odores præter naturam. Quanti-

Noxæ functionum,

Animalium. Sensilium.

Motricum. Principium actionum. Naturalium.

Affectus nostri corporis, Visiles

Odorabiles.

Gustabiles. Tactiles.

Quæ præter naturam vel excernuntur a corpore, vel in eo retinentur.

Quæ tota substantia præter naturam.

Quæ qualitate.

Quæ quan-
titate.

tate præter naturam sunt, ludor, qui immodice excernitur, aut indebite retinetur. Item A
vrina, & muliebri profluuium. Igitur iam dicta symptomata, ut comprehensum est, mo-
do ad affectus corporis, modo ad functionū noxas sequuntur. Ut sanguinis profluuium
immoderata excretio existens, læsam venarum actionē, nempe retentionis imbecil-
litatem, aut immodicum expultricis facultatis motum, sequitur. Idem etiam corporis
affectum comitatur, puta calidam intemperiem, vel vulnus, & id genus alios affectus.
Tussis præterea affectum interdum corporis, frigidam nimirum intemperiem lequi-
tur. Atque hæc est recepta hætenus symptomatum in sua genera & differentias diuisio,
quam tamē, ut omnia fere alia, aduersarii Galeni labefactare multis rationibus conan-
tur. Quas certe, nisi instituti nostri ratio prohiberet, ordine confutarem. Quod vero
nunc præstare nobis non licet, id Deo annuente, tum cumulatius præstabimus, quum
aliquando Commentarios nostros in hos Galeni *de Symptomatum differentiis & causis* li-
bros recognoscemus. Id quod ut faciamus, partim typographi negligentia & cerebri er-
rores, partim illorum, qui noua dogmata spargunt, temeritas nos coget. Quum autem
hætenus generatim morborum & symptomatum rationem exposuerimus, superest,
ut iam eorundem nomenclaturas, iuxta partium corporis, in quibus excitantur, ordi-
nem, propter eos, qui linguæ Græcæ imperiti sunt, exponamus, exorsī a febribus, ut quæ
totum occupent corpus.

Februm brevis & dilucida explicatio. CAP. X.

Febris quid.

Cum in hoc capite febrium rationem simus explicaturi, initio quid febris sit, ostenda-
mus necesse est. Febris itaque, est calor præter naturam, qui a corde prodiens, per arterias &
venas in vniuersum corpus diffunditur, actionisque eiusdem ladit. Quæ quidem extrema defi-
nitionis pars necessario addita est. Nam quantumuis homo nunc quam antea calidior
sit redditus, nondum tamen febris correptus dici potest, nisi calor eousque auctus sit, ut

Differentia
febrium.

hominem plurimum offendant, & actiones iam manifeste lædat. Ceterū, etsi variae sunt
febrium differentiae, partim ab essentia earundem, partim ab accidentibus sumptæ, ut

6. Epid. 6. &
s aph. 6.

patet ex iis, quæ *lib. 1. de Februm differentiis* tradit Galenus: tamen illa, quæ e materia, in
qua calor præter naturam accenditur, peti solet, omnium est vtiatissima. Quapropter

Tria prima
simplicium
febrium ge-
nera.

ut tria sunt, Hippocrate in *Epidemiis* teste, quæ corpus nostrum constituunt, continentia ni-
mirum, contenta, & imperum facientia: hoc est, solidæ partes, humores, & spiritus: sic

2. Aph. 6.
Diaria sim-
pliciter.

etiam tria sunt prima simplicium febrium genera. Quippe si immodicus & præter na-
turam calor in spiritibus accenditur, febris hæc Græcis *ἐφίμεια*, Latinis *diaria* nominatur.

Dies natu-
ralis.

Hæc assimilatur vento vtri calido incluso. Ut enim ille virem, cui includit, calefacit, sic
quoque spiritus plus iusto calefactus vniuersum in quo continetur, corpus accendit.

Plurium
dierum.

Diaria vero nomen hoc primū febris genus, quod in spiritibus accenditur, consecutum
est, quod vnicam tantum habeat accessionē, vno plurimum die, ex ipsius saltem natu-
ra, circumscripta. Desistit enim post primam accessionem, nec ultra vnum diem natu-
ralem appellatam, hoc est, viginti quatuor horas, porrigitur, si quis eam recte trahet. Et
hæc profecto vere, exquisite, simpliciterue, ac citra adiectionem *diaria* nominatur. Est

Synochus
6. putrida.

enim altera, quæ cum adiectione plurium dierum *diaria* nuncupatur, quod scilicet in
tertium vique diem, & interdum longius, *Galen. lib. 2. de Differ. febr. cap. 11. attestante*, nem-
pe ad quartum, vel quintum, sæpius etiam ad septimum vique extendatur. Hæc certe
alio nomine *Synochus* non putrida vocatur. Neque est, cur quispiam miretur, hanc fe-
brem a Galeno & aliis veterib. *diariam* esse dictam, cum de substantia eius *diariæ* voca-
bulum non sit, quando quidem ultra vnum diem duret ac protendatur. Nam etsi no-
men illi aduersatur, tamen quia huic eadem est, quæ aliis *diariis*, natura: vnam enim ac-
cessionem ab initio ad finem perpetuo manentem, in multos porrigit dies: ideo cla-
rioris simul breuiorisque doctrinæ gratia, potissimum cum proprio & conuenienti no-
mine destituatur, *diaria* rectissime dicitur. Aut igitur aliud, præter tria iam dicta, genus
esse in prima febrium diuisione, dicendum est: aut appellatione pro nihilo habita, *dia-*
riam ipsam nominare oportebit. Alterū febrium genus est putrida, quando in humo-
ribus putrescentibus calor immodicus accenditur, & ob id putrida appellatur. Hæc si-
milis est aquæ calidæ, vasi alicui infusæ. Ut enim hæc vas frigidum cui infunditur cale-
facit, ita etiam humores præter naturam calefacti, corpus. Ceterum putrescunt humo-
res, vel

- A** intra, vel extra vasa. Intra vasa vero bifariam putrescunt: nempe vel omnes simul, vel v-
nus duntaxat. Si omnes æquabiliter in omnibus maximis potissimum, vasis putrescunt,
synochus seu continens putrida nominatur. Siquidem Græci *συνοχος* febrem omnem, in
qua vna accessio ab initio ad finem perpetuo manens in multos porrigitur dies, Galeno
libr. 9. Ther. Meth. cap. 7. auctore appellant, vel breuiter, eam quæ omni mutatione magna
vsque ad iudicationem caret. Hanc Latine proprie *continentem* nominare licebit, est
que eius gemina natura. Quædam enim nullam prorsus putredinis notam obtinet, at-
que hæc ex diariarum febrium, vt paulo ante monuimus, est genere. Quædam vero ma-
nifestam putredinis notam habet. Prior Latinis dilucidioris doctrinæ gratia, *synochus si-
ue continens non putrida*: posterior autem *synochus seu continens putrida* vocatur. Neque e-
nim imitandi sunt hac in parte barbaram sectantes medicinam, qui hanc *synochum*, il-
lam vero fœminino in genere *synocham* nominant, cum Græci vtrumque genus vno
nomine *synochon* appellauerint. Ceterum earum febrium, quæ Græcis *synochi* vocantur,
tres sunt differentię. Nam quædam illarum a principio ad finem æquali magnitudine
ac vehementia perdurant, quas ob id illi *ἰσορροπὸς & ἀμειψιῦς*, hoc est, in eodem robore ac
vigore permanentes, nuncupant. Quædam vero semper augentur, & exiguum aliquid
adiiciunt, quas propterea *ἀρᾶντιος & ἐπαυμαστῆς*, id est, *incrementum accipientes, & inuale-
scentes* appellant. Aliæ contra paulatim minuuntur & decrescunt, ideoque Græcis *ὑπο-
μειψιῦς*, hoc est, *decrescentes* vocantur, vt *fusus lib. 9. Meth. c. 4. & lib. 2. de differ. febrium c. 2. &
lib. 2. de iudiciis, cap. 6. Galenus docet*. Porro si intra vasa vnus duntaxat aliquis humor pu-
trescit, febris excitatur, quæ Græcis *συνεχὴς*, Latinis vero *continua* dicitur. Sic vero est
nominata, quod ad quietem, & integritatem, vel, vt *hodie loquuntur*, ad infebrecitatio-
nem non desinat, remissionem tamen in singulis accessionibus obtineat. Vt hinc pa-
teat, quam inter se *συνοχος & συνεχὴς* febres differant. Nam in synocho seu continente
nulla fit feruoris remissio: syneches vero siue cōtinua in singulis accessionibus sensilem
habet declinationem siue remissionem. Præterea synochus vnicam duntaxat accessio-
nem ad finem vsque durantem obtinet: syneches autem plures. Quemadmodum ve-
ro iam dictis rationibus differunt, ita certe in eo conueniunt, quod neutra illarum ad
infebrecitationem perueniat, *veluti copiosius lib. 2. de iudiciis cap. 6. Galenus monstrat*. Cete-
rum, vt recentiores Græcorum medici, qui Hippocratis secuti sunt ætatem, aliquam
D inter has duas febres statuerent differentiam, solæcismum committere maluerunt,
quam formam ipsarum febrium sine nomine relinquere. Nam Græcè vtrique febris
appellanda fuisset *συνεχὴς*, & neutra *συνοχος*. Ideoque, vt in fine suorum *Commentariorum*,
quos in secundum Hippocratis de *Natura humana* librum exarauit, Galenus testatur, neque Hip-
pocrates, neque alius veterum Græcorum vsquam continentem nobis dictam febrem
συνοχος nominauit. A iunioribus itaque Medicis hæc vox excogitata est, cum veteres
vtrumque genus febris, nempe & id quod nullam vsque ad iudicium habet mutatio-
nem, & eam quæ multis particularibus circuitibus continentur, & remissionē aliquam
obtinere, sub *συνεχὴς* nomenclatura complexi sint, vt *clarius lib. 2. de differ. febr. capit. 2. &
lib. 2. de iudiciis, cap. 6. fusus ostendimus*. Febrium autem, quæ priuatim Græcis *συνεχὴς*, La-
tinis *continua* vocantur, tres sunt species. Quum enim flauabilis intra vasa putrescit, *ter-
tiana continua*, & priuatim Græcis *τρίτης*, Latinis *ardens* appellatur febris. Vbi autem pi-
tuita hac ratione putrescit, quotidiana continua nominatur. Si atra bilis, vel potius me-
lancholicus humor putredinem inter vasa contrahit, quartana continua vocatur. Ha-
bent itaque continuæ febres idem genus cum intermittentibus, de quibus paulo post
dicemus. Siquidem tertiana continua conuenit cum exquisita tertiana intermittente,
quod perinde atq; illa tertio quoq; die accessionem habet. Quotidiana continua, cum
quotidiana intermittente, q̄ scilicet singulis diebus accessionem obtineat. Differunt ta-
men etiam inter se continuæ & intermittentes, non obstante quod humore, qui vtra-
que efficit, communicent, idque duplici ratione. Primum, quod in cōtinuis putrescens
F humor intra vasa continetur: in intermittētib. autem extra vasa contentus, per seniles
corporis partes dispergitur. *Secundo*, quod intermittentes, eo quod dilationis impetu
ipsi per se expurgentur, & ad quietem, vel vt *Græci dicunt ἀναπαύειν*, id est, *infebrecitationem*
desinant: continuæ autem nequaquam. Hactenus genera febrium, quas humor intra
vasa putrescens excitat, commemorauimus. Reliquum est, vt nunc eas febres, quas hu-

Humores
bifariam pu-
trescunt.
Continens
putrida.

Continens.
Non putri-
da.
Putrida.

Barbaram
sectantium
medicinam
ineptiam.
Synochorū
differencia
tres.
*ἰσορροπὸς,
ἀμειψιῦς,
ἀρᾶντιος.
ἐπαυμαστῆ-
ς.*

συνεχὴς.
Continua.

*συνοχος &
συνεχὴς.*
Febres ve
differant.

In quo con-
ueniant.
Solæcism⁹
recentiorū
medicorū
Græcorum

Continuæ
tres species.
Tertiana.
Ardens.
Quotidia-
na.

Quartana.
Continuæ
idem genus
cum inter-
mittenti-
bus obti-
nent.

Continuæ
rum & in-
termitten-
tium diffe-
rentia.

Intermittens. mores extra vasa putrescentes accendunt, exponamus. Quando autem humores extra vasa putrescunt, *intermittens* vocata excitatur febris. Hæc vero sic est appellata, quod eius accessio non perpetuo duret, sed remissionem habeat, & vt comprehensum est, ad quietem, & integritatē desinat. Latinis alio nomine *interpolata* dicitur, quod nimirum suo tempore accessiones repetat, ac renouet. Sunt qui *deficientem* appellent. Huius tres sunt præcipuæ differentię. Vna enim *tertiana*, altera *quotidiana*, & tertia *quartana* nuncupatur. *Tertiana* rursus bifariam diuiditur, in *exquisitam*, *synceram*, *puramue*, & *notham*, *spuriamue*. *Tertiana* exquisita fit, quando *fluabilis syncera*, nullique alteri humori permista, extra vasa putrescit. *Tertiana* vero *notha* fit, vbi *bilis maxima* ex parte *pituita commista* extra vasa putrescit. *Tertiana* vero vtraque est dicta, quod *unum diem intermittant*, & *tertio redeant*. *Quotidiana* exquisita est, vbi *pituita dulcis* extra vasa putrescit. Hæc Græcis *πριuatim ἀρρηκτος* est nominata, quod singulis diebus reuertatur, & accessionem habeat. Quod si vero vitrea *pituita* non tota æqualiter, sed ex dimidio ipsius putrida fuerit, aut aliquæ ipsius partes putruerint, aliquæ vero nequaquam, Græcis *ἡπιάλ*, Latinis *Hepiala febris* dicitur. In hac febre simul ægrotantes febricitant & rigent, atque eodem tempore per vniuersum corpus, & in omnibus eiusdem partibus, Gal. lib. 2. de Diff. feb. cap. 6. & cap. 10. libri de Inæquali intemperie teste, ambo, nempe calorem & frigus immodicum, sentiunt. Partes enim humoris eius putredinem necdum expertæ, omnibus venis, vel etiam reliquo corpori communicatæ & sparæ, rigorem creant: putrescētæ vero calorem accendunt. Nihiligitur mirum, *pituitam* hanc, vbi modice putrescit, per omnes sensiles corporis partes, per quas mouetur, calorem & frigus inducere posse. *Hepiolos* autem dicta est, Paulo lib. 2. cap. 25. auctore, τῆς τοῦ ἡπιάλ ἀλαλάνης ὅπερ ἐστὶ θερμαίνων, hoc est, quod blande & leniter calefaciat. *Quartana* intermittens, ab humore melancholico extra vasa putrescente nascitur. Sic vero nominata est, quod duos integros intermittat dies, & quarto quouis die reuertatur. Præteriam dictas febrium intermittentium species, sunt etiam *quintana*, *sextana*, *septimana*, & *nonana*, quarum Hippocrates lib. 1. Epidemiorum meminit, ita nominatæ, quod quinto, sexto, septimo, & nono diebus inuadant, & reuertantur. Hæ rarissimæ sunt, adeo, vt Galen. lib. 1. Epid. Comment. 3. diserte scribat, se inde vsque ab ipsa adoleſcentia septimanum vel nonanum circuitum omnino non vidisse, nec clare nec obscure: *quintanos* certe conspexisse obscuros, sed non exquisite aut aperte, vt *quotidianos*, *tertianos*, & *quartanos*. Ex putridarum genere est *pestilentialis febris*, quæ sic dicta est, quod a venenata qualitate, adeoque a pestilentis ac venenati aeris inspiratione oriatur. Nam, vt lib. 1. de Differen. febr. cap. 5. attestatur Gal. ambiens aer a putrescibili euaporatione vitiat, humores etiam corporis putrescere facit. Ceterum *pestilentialis febris* non ex simplici putredine nascitur, sed accedit etiam causa alia, id est, venenata, vt iam dictum est, adeoque totius substantiæ proprietate pñicioſa qualitas, quæ totā corporis substantiā, seu, vt Gal. alias appellare solet, temperamenti totiusue substantiæ proprietatē offendit ac corrumpit. Quod certe confirmant ea, quæ lib. 2. de Natura huma. Com. scribit Galen. inquit: Ελλίπῃ τῷ ἰασπὶ ἔχαλε τῶν κοινῶν νοσημάτων, ὅταν ὑπὸ τῆς εἰρήνης γίνηται. Πολλὰ μὲν γὰρ ἀναδυμιάσεις πνεύς ἐξ ἑλῶν, ἢ λιμῶν, ἢ τιλμάτων, ἢ γῆς τοιαύτης αἰτίας γίνονται τῶν τοιούτων νοσημάτων· ὅς δ' ὅτε μόνη τῶν ἀερίων ἡ χάρις. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἀναδυμιάσεων ἰδίῃ τῇ μάλλινον ὕλην τῆς εἰσας, ἔχῃ ἀπλὴ τοιούτην λυμαινομένων τοῖς σώμασιν, ὁρῶς ἔχαλε τῷ διεσπείαν, εἰς διτλὸς ἀνάγον σκοπὸς, ἀμοιβῶν τε & χρεῖν, ἢ χρεῖαν ὀλίγης τῆς εἰσπνοῆς. ὑπὸ δ' τῶν ἀπὸ τοιούτων βλαπτομένων, ἢ μόνον ἢ διεσπείαν τῶν χειρότερων ἢ δὲ νοσημάτων, ἀλλὰ καὶ ἢ περὶ λακκὶ & μὴ δ' ὅλως συσπῶναι, διὰ τῶν ἐναντίων ἐσπῶν τοιούτων. *Morborum communium imperfectam sanationem* scripsit, vbi ab ambiente aere nascuntur. Frequenter enim *exhalationes*, ex paludibus, aut stagnis, aut lacubus, aut eiusmodi terra, talium morborum causæ sunt. Accidit vero interdum, vt sola temporum anni temperatura causa sit. Igitur in *exhalationibus* proprietate magis totius substantiæ, quam qualitate corpora ledentibus, curationem recte tradidit, in duos redigens scopos, loci scilicet mutationem, & exigua inspirationis usum. In iis autem, qui a qualitate offenduntur, non solum iam factorum morborum curatio, sed & præuisio ne omnino consistant, per contrarias qualitates fiet. E quibus sane verbis palam fit omnibus, Galenum non obscuris verbis confiteri, *exhalationes pestilentes excitantes febres*, proprietate totius substantiæ magis, quam qualitate seu intemperie corpora nostra ledere. Quapropter ex aere quoque maxime fiunt pestilentes febres. Quanquam n. contactu mutuaq; hominum communitate & vitæ societate contaminant: prima tamen illorum origo visq; maxima & validissima in aere, quem inspiramus, inest, illincque processit. Et certe venenum aeris haur-

- Aris haustu nos feriens, omnium præsentissimum est & efficacissimum, nec humore, nec crassiore materia, tanquam vehiculo indigens, ut in nos agat & commigret: sed tenuissimum quum sit, spiritum haustum celerrime, per pulmonē in cor, viscus vitæ nobilissimum, & in arterias, in omne deniq; corpus obrepit, primumq; spiritus, deinde humores, postremo ipsam partiū substantiam labefactat. Quod si venenata ac perniciofa hæc qualitas primum in spiritibus hæserit, eosque deuastrauerit, ac coruperit, erit tum febris pestilentialis diaria, quales fuere quæ in lueilla, quam sudorem Anglicum vocant, anno 1529. per vniuersam Germaniam grassabantur. Sin humores occupauerit, erit pestilentialis humoralis dicta febris. Nam facicilime hanc venenosam ac pestilentem qualitatem putredo, corruptionis opifex, sequitur. Si vero in substantiam cordis prædicta qualitas insilierit, eiusq; corpus putrefacit, hæctica pestilentialis erit. Pestilentialis autem febres, ut plurimum carbunculis, vel bubonibus se insinuant, & cor, iecur, cerebrum in furiam vertunt. Quæ singula commemorauimus, primum ut inde intelligant se nihil noui afferre, qui pestilenciales febres hodie magno fastu inter morbos totius substantiæ collocant. Dein, ut non solum iis, quæ putredinem sanant, sed & iis, quæ totius substantiæ proprietate contraria sunt, febres pestilenciales abigendas sciremus. Postremo, ut in iis febribus per os & nares valida exciteretur exspiratio, quæ & pulmones, partesque cordi vicinas venenato aere refertas, exinaniat, mox aer igni expurgatus, aut odoratus inspiretur. Sed ea de realibi forte plura proferemus. Hæc autem in præsentia de febribus, quæ putridorum humorum duntaxat occasione, citra partem aliquam laborantem, accenduntur, dixisse satis sit. Sunt enim aliæ febres putridæ, quæ occasione laborantium quarundam partium ac viscerum excitantur. Siquidem quæ propter phlegmonem internarum partium ac viscerum excitatur febris, ut lib. 2. Prognost. commen. 4. *Lipyria.* *autor est Galenus, Græcis λειπυρία nominatur. In ea quidem, ut idem cap. 10. libri de Inæquali intemperie, testatur, intus & in ipsis visceribus calor sentitur, in externis vero partibus vniuersis frigus. Phlegmones nanque vehemens calor, instar cucurbitæ, ex vniuerso corpore sanguinem ad se trahit, ideoque iis, qui ita se habent, viscera peruruntur: extremæ autem partes, propter sanguinis ad viscera se recipientis defectum, frigesunt. Quæ vero ex pulmonis, ventriculi, aut iecoris erysipelatibus nascitur, eodem Galen. lib. 2. de Iudiciis cap. 7. attestante, proprie καυσὸς κακότητος, ἢ κακότησεως, hoc est, ardens perniciofa, vel perniciosissima vocatur. Aerius febrem ex iecoris erysipelate ortam, typhodem appellauit: secus atque Galenus, ut paulo post clarius ostendemus. Est itaque lipyria genus ad omnes, quæ ex viscerum phlegmone excitantur, febres. Quod si vero etiam huius generis recensere velis species, eam quæ ex capite nascitur phreneticam, eam vero quæ ex membrana succingente costas pleuriticam, ex pulmone peripneumonicam, ex iecore iecorariam, & ita deinceps vocare licebit. Inter putridas continuas etiam numeratur febris, quæ Græcis τυφώδης, Galen. sect 7. aphor. com. 43. & in lib aduersus Lycum teste, alio nomine ἐλώδης, hoc est, humida vocatur, non alia quidem de causa, quam quod perpetuo madore sudoreque corpus exsoluat. Typhodes enim febris, Galeno iam citatis locis autore, est in qua a prima statim die ægri sudant, sudore ipso aut parum aut nihil iuuante. Ut hinc omnibus palam sit, typhodem febrem ab ea, quæ helodes nominatur, non esse diuersam. Sed præstat Galeni verba ex libello aduersus Lycum, quibus id ipsum clarissime confirmat, referre, in quientis: πῦρ ἐξ ἁτῶς ὑγρῶν, καὶ διὰ περ οἱ τυφώδης, ἢ ἐλώδης ὀνομαζόμενοι. Quare præter rationem Cardanus lib. 2. contradictionum, tract. 5. cap. 29. me erroris insinulat, quod typhoden & helcoden vnū & idem esse febris genus statuam. Facit autem id obscure admodum, ut solet, ut vix quid dicat assequi possis. Assuit autem interim multa quoque mendacia, de quibus principio dicam necesse est. Nam me febrem helcoden & typhoden vnā eandemque facere scribit, quasi vero ego mendosam Aldini codicis lectionem secutus, ἐλωδίου pro ἐλώδης dixerim. Et satis hinc apparet, Cardanum ignorasse falsum illic ἐλωδίου scriptum esse, & forte hac voce febres, quæ vlcera comitantur, significari putasse, ideoque in hanc venisse sententiam, ut eam a typhode diuersam esse affirmare voluerit. Dein non pudit illum constantur asserere, me in cōmentariis meis in Hipp. Aphorif. scriptis, vigesimi quarti primæ sectionis textus omnino oblitum fuisse, eiusq; enarrationē omisisse. Quā impudētē aut & mendaciter hæc mihi negligentiam*

adscribat Cardanus, omnes horum meorum cōmentariorum editiones palam¹ testan-
 tur, in quarum nulla hic Aphorismus, nec eiusdem etiam enarratio desideratur, vt ad
 conuincendum apertum mendacium non sit opus pluribus testimoniis. Quis vero est
 qui hinc non colligat, Cardanum omnem deposuisse pudorem, vt qui non veritus est
 constanter affirmare, quod res ipsa manifeste falsum & confictum esse loquitur? Potuis-
 set igitur, imo debuisset hoc loco sibi & mihi parcere Cardanus, nec mihi negligentia
 notam inurere, qua me vacare, nisi cœcus tum fuerit, ignorare haud potuit. Sed simili
 quoque ratione Manardum, aliosq; bonos & eruditione claros viros tractauit, vt nihil
 mirum sit mihi idem ab illo etiā euenisse. Sed ad typhoden reuertamur febrem. Quum
 differre inter se typhoden & helodem febrem contendat Cardanus, decuit certe illū,
 vt qua ratione inter se distarent, exponeret: sed tantum abfuit vt id faceret, vt potius se
 ignorare num typhodes & helodes febris, vnum febris genus, an diuersum esset, fateri
 coactus sit. Nam inter alia sic scribit: *Seu igitur typhodes, atque helodes vñ febris genus sit. seu
 diuersum, non nisi humidarum febrium typhodes genus est.* E quibus vtique verbis satis liquet,
 Cardanum non recte tenuisse, quale genus febris esset helodes & typhodes. Atque id-
 ipsum abunde confirmant quæ ibidem scribit, inquit: *Febres typhodes ex multa materia
 pituitosa gignuntur, sudorque qui in initiis earum apparet, longitudinem morbi significat.* Si ex pi-
 tuitosa materia procreatur, humida igitur sit oportet. Et humidam profecto esse copio-
 sus sudor declarat. Paulo tamen ante prædicta verba testimoniis e Suida, & Hesychio
 productis ostendere conatus est, typhodes febres esse incendentes, & igneas. Quod si
 verum est, humidæ vt sint fieri nequit, vt rectissime suos libros Cardanus *contradictionum*
 titulo ornat, siquidem multis modis in iis sibi contradicit, ac ita se & alios¹ contradi-
 ctionibus inuoluit ac implicat, vt ex illis neque se, neq; alios explicare sciat. Nihil igitur
 certius est, quam Cardanum prædictarum febrium rationē prorsus ignorasse, & tamen
 interea illum nihil puduit alios earundē naturam recte explicantes erroris insimulare.

Typhodes
 febris ge-
 mina.

Hoc quidem lubens concedam Cardano, *Typhoden febrem apud Græcos non vna ratione ex-
 plicari.* Sunt enim qui hanc vocem, pro febre quæ erysipelas iecoris comitatur, vsurpēt.
 Quo vtique modo ab Aetio lib. 5. c. 89. accipitur. Galenus cōtra, vt iam ostendimus, rectius
 pro humida febre vsurpat. Eam autem quæ iecoris erysipelata sequitur, lib. 2. de iudiciis.
 c. 7. καὶ σὺν κακοῖς δια, ἢ κακοῖς δέσπον, hoc est, *ardentem, perniciosam, malignamue, aut perniciosissimam,*
 nominat, vt dubium nullum sit, Aetium ab immenso ardore & incendio, quo hac fe-
 bre laborantes correpti sunt, Typhoden ipsam secus, quam veteres Græcos, appellare
 voluisse. Pergit deinceps Cardanus, & magno supercilio Hippocratis locum, qui est in
 lib. 2. Epidem. sect. 5. interpretatur, vbi ita inquit: *ὃ ἂν ἡ φλέψ ἐν ἀγκῶνι σβίῃ, μανικὸς καὶ ἐξιδυμῶ, ὃ
 δ' ἂν ἀτρέμεται, τυφώδης.* Principio igitur Latinos Hippocratis interpretes, Bartholomæum
 Syluanum & Cornarium reprehendit, quorum hic vocem τυφώδης *stupidus*: ille vero suc-
 censo *stupori obnoxius* conuertit. Meliorem igitur illis, si Diis placet, interpretationem
 allaturus, ita ait: *Sciens eos qui in fumo obuersantur, sensibus detineri, atque hebetudine quadam,
 huic similem affectum patientes, mente Typhodeos appellauit.* Bella mehercle interpretatio, &
 Cardano digna, vt pote cuius animus ac sensus perpetua caligine ac fumo ebducti, non
 nisi obscura & densissimis tenebris inuoluta depromere possunt. Quis enim facile in-
 telligeret, quinam essent, quos ille mente typhodeos vocat, nisi eos, quorum sensus de-
 tinentur, quique hebetes & stupidi sunt, hac loquendi ratione inaudiret? Atqui hanc
 interpretationem in Cornario, quem nominis qualitatem omnino seruasse inquit, re-
 prehendere ausus est. Quum itaque Cardani interpretatio ceterorum conuersionibus
 multo sit obscurior, breuiter quæ sit legitima Hippocratis verborum expositio, indi-
 cabimus.

Hippocra-
 tis locus e-
 narratus.

Τυφώδης
 contrarius
 ei qui μ-
 ανικός dici-
 tur.

in.

Ad verbum igitur præcitatum Hippocratis locum ita conuertere licebit: *Cui utiq;
 vena in gibbero pulsarit, furiosus & iracundus est. Cui vero quienerit, mutus.* Vt autem studiosi
 cognoscant, cur τυφώδης nobis *mutus* sit dictus, sciendum erit, quod τυφώδης Hippocrati
 plane contrarius sit ei, qui μανικός dicitur. Nam, vt Galenus in libello de interpretatione anti-
 quarum vocum Hippocratis auctor est, τυφώδης vox idem quod ἐρεῶ καὶ καθεζόμενος, id est, *mutus
 & sedens* denotat. Neque enim ἐρεῶ, Phanorino teste, Græcis est, nisi ἄφωνος, καὶ ὁ ἡλίδος, id
 est, *mutus, & stupidus.* Mutum vero in præsentia non intelligas eum, qui voce destitu-
 tus est, & loqui non potest, sed eum potius, qui ob morbum, quo iam infestatur, silet, &
 sedet,

A sedet, nec furiosi instar vociferatur, consurgit, ac exsilit, ut sunt ii qui lethargo correpti sunt. Quapropter τυφώδης a lethargico fere diuersus non est, utpote qui somnolentus, desidiosus, ignauus sit, & vix, aut tarde admodum quocunq; interpellatus modo respondet, contrarius autem furioso, ac phrenitico. Hinc τυφωμανία malum Græcis dicitur e lethargo & phrenitide mixtum & cōpositum, ut infra latius docebimus. Sed longius, ut Cardani impudentiam retunderem, ab instituto digressus sum. Maluissē autem hic & alibi continua orationis seriē docere, quæ ad institutū pertinebant: sed tanta est quorundam petulantia & malitia, ut non pariantur me in proposito hære, sed calumniis suis potius alio me traducunt. Quos si interdum acerbius excepero, non est cur quispiā mireretur. Neq; enim fieri potest, quin tandem tot calumniis irritatus, immodestius respondeam. Nemo enim tam patienti est animo, quin mendaciis motus, interdum acerbius aduersario occurrat, præsertim vbi mendaciis eiusmodi doctrinam & dogmata vera lectori suspecta facere studet.

Porro quam apud Hippocratē & Galenū crebro quoq; mētio fiat febriū τειταίεράν, præstat hoc etiam loco, quales hæ sint, breuiter exponere. Sunt igitur, Galeno li. 2. de Differēt. feb. cap. 4. auctore, quæ tertio quoq; solum die accessionem habent. Quibus quidē de febribus quum copiosē libro sexto Epidem. scilicet. 2. comment. 11. differuerim, non est cur nunc repetenda esse putem. Cæterum ex commemoratis putridis febribus, aliæ sunt typicæ seu ordinatæ, aliæ vero errabundæ seu inordinatæ. Typicæ sunt, in quibus accessio & remissio stas accidunt vicibus. Erraticæ iam dictis contrariæ sunt. Neque enim statim tempus, neq; vllum accessionum & remissionum ordinem seruant. Quales sunt, quæ ex atra bile in quibusdam partibus mota, in quibusdam vero immota manente, in aliis putrescente, aut feruere incipiente, Galeno libro tertio prognost. Commē. 29. auctore, oriuntur. Tertium primarium febrium genus sit, quādo in solidis humani corporis partibus calor præter naturam accēditur, Græcisq; & Latinis Hæctica, quod nimirum habitum totius corporis corripit, nominatur. Hæc profecto calido vasi adsimilis est. Vt enim hoc aquam illi infusam calefacit, ita quoque hæctica solidis inhærens partibus, ac quasi infixis, omnes corporis humores calefacit. Quod si febris illa sic increuerit, ut vniuersum corpus, omnesque solidas eiusdem partes colliquet atque consumat, marasmus dicitur. Si id per ætatem accidit, marasmus senectutis vocatur. Hactenus simplicium febrium genera summa, qua potuimus, breuitate perstrinximus. Restat igitur, ut compositas ac mistas pari breuitate percurramus. Bifariam vero compositz febres constituuntur. Primum, quando tertiana, quotidiana, & quartana citra aliquam partē laborantē, inuicem commiscētur. Secundo, quando febres ob partiū phlegmonem accēdunt inter se miscētur. In vtraq; autem harum differentiarum alteram rursus sectionem fieri cōtingit. Quæ circa alicuius partis phlegmonem consistunt, febres dupliciter commiscētur. Vel enim cōplicantur, vel per se in totum confundunt. Priorem misionem Græci επιπλοκή, Latini complicationē: alteram v. κρᾶσις Græci, confusionem Latini nominant. Est a. επιπλοκή seu complicatio, quando horis diuersis febres commissa inuadunt. Confusio, vbi eadem

E occurrunt hora, adeoq; ita inter se confunduntur, ut eas discernere non sit facile. Porro tertianæ & quotidianæ febris, quatuor sunt complicationes. Vna, quando tertiana & quotidiana intermittentes commiscētur. Altera, cum tertiana intermittens quotidianæ continuæ coniungitur. Atque hæc peculiari nomine Græcis ἡμιτεταῖα, Latinis semiterteriana vocatur, quod scilicet tota ei^a natura dimidia parte tertianam, altera vero dimidia quotidianam continuā habeat. Tertia complicatio, quando quotidiana intermittens tertianæ continuæ permiscetur. Quarta, vbi quotidiana & tertiana continuæ miscētur. Non solum vero febres differentes speciē, ut quotidiana tertianæ, & huic quartana: aut etiam genere, ut intermittentes cum continuis miscētur: sed etiam febres eiusdem tum generis, tum speciei cōplicantur, ut continuæ cum continuis, intermittentes cum intermittētib; item tertiana cum alia tertiana, quartana cum alia quartana, quemadmodum fufius lib. 2. de Diffē. febrium cap. 7. & 8. nec non li. 2. de Iudiciis Galenus docet, & nos in nostris super hos libros Commentariis ostendimus. Ut autem febres, ita etiam laborantēs partes misionem recipiunt, vel quia diuersæ propriam singulæ febrem accendant, vel uti lien, si ita accidat, & iecur: vel quia affectus, unde oriuntur, mistus est, ut phlegmone erysipelatoſa, aut erysipelas phlegmonosum. Cum itaque multifariam componantur

τυφωμανία

Febres
τειταίεράν

Typicæ.
Erraticæ.

Hæctica.


Marasmus.

Cōpositarū
febrium ratio.

επιπλοκή
κρᾶσις.

Cōplicatio.
Cōfusio.
Tertianæ &
quotidianæ
complica-
tiones.
Semiterteriana.

febres, in omnibus iis dignoscendis missionibus Medicum exercitari oportet. Quod fiet, si primum omnium, idque accurata diligentia, simplicium febrium species perdiscat. Nā nisi illas exquisitè teneat, fieri nō potest, ut vnq̃ cōpositas probe assequatur. Atqui cū cōpositarū cognitio sit plane difficilima, adeo ut in iis recte discernēdis nō raro ēt peritū Medici fallant, operā pretiū erit, ut Medicinā studiōsi diligenter, q̃ de febriū differētis duob. in libris a Galeno scripta sunt, perlegāt. Qui et si cognitu difficiles sunt, tñ a nobis ita sunt cōmentariis illustrati, ut ab omnib. fere intelligi possint. Ceterū ut studiosorum memoriā iuuaremus, simplicium febrium genera sequēti schemate complexi sumus.



Vitiōrum capitis brevis enarratio. CAP. XI.

Alopecia. Alopecia Græcis vitium est capitis, in quo deciduus capillus areas efficit. Sic a. appellatū est, q̃ vulpi, q̃ Græcis ἀλώπηξ dicitur, crebro accidat. Latini propria destituti nomenclatura cū Græcis alopeciam vocāt: Barbari, ut frequēter alias, vni⁹ immutatione literæ vocē deprauātes, alopeciā nomināt. Ophiasis Græcorū Medicis vitium est, q̃ leſam capitis partē serpētis modo, q̃ iisdē⁹ dicit, glabrā ostendit. Latini haud secus atq; Græci ophiasim appellāt: Barbari Medici Arabū doctrinā sectātes Tyriā nuncupāt. Tyri n. vocē oēs serpentes, potissimū a. viperas, intelligunt. Φαλάκρωμα & φαλάκρωσις vitium est, in quo vniuersi caluæ pili defluunt. Latinis caluities & caluitiū dicit. Πτυγίσις vitium est Græcis, in quo tenues ac furfuraceæ squamulæ ex capitis cute citra exulcerationē decidūt. Latinis, Celso potissimū, porrigo nominat. Barbarā excolētes Medicinā, furfures vocāt. Φθειγίσις pediculorū in capite aceruatim facta pcreatio est. Latinis pediculatio, & morbus pedicularis nūcupat. Αἰχμας vlcuscula sunt capitis, tenuissimis foraminib. cutē pforantia, e quib. glutinosa excernit sanies. Plini⁹ manātia capitis vlcera appellat. Nostræ ætatis Medici, a tinearū in vestib. similitudine, capitis tineas nomināt: ut n. hæ multo eoq; tenui morſu ac erosionē vestes pforāt, sic ēt capitis cutē achores. Auicēna Saphacū nuncupat. Pueros hoc malū maxime exercet. Simile huic aspectū & figura vitium est, q̃ Græci κήειον, Latini fauū nomināt, maiora tantū foramina habēs, in quib. humor melli similis continet, perinde atq; in fauis apū, vnde ēt nomē suū traxit. Κεφαλαλγία, capitis dolor ē recēs factus, haud diuturnus & inueteratus, nō curādo, an per se accidat, aut alteri⁹ affectus symptoma, & comes sit. Barbarā sectantes medicinā Sodā vocare Arabū more solent. Κεφαλαία v. diuturn⁹ & ægre cedēs, ac cōtumax capitis dolor est. ἡμιγυαία, vitium est in dimidia capitis parte dolorē inferēs, nunc dextra, nunc sinistra ortū, q̃ satūra per cranii lōgitudinē extēsa distinguitur. Σκότωμα vitium est, in quo obtenebrationes hebetudinesq; oculis obuēſātūr, & omnia circūagi ac rotari putātūr. Latinis vertigo tenebricosa dicitur. Alio nomine σκοτόδιον dicitur, ut scēt. 4. Ap. com. 17. Galen. testatur, dū ait, hoc vitium fieri, quū

A simul quæ cernuntur circumagi putantur, & derepente sensus, qui sit visu, perit, existimantibus, qui id vitii patiuntur, sibi offusas esse tenebras. Latinis proprie *vertigo tenebricosa* nominatur. Idem vitium etiam Græcis, Hippocrati maxime *ἰαγνῶ* appellatur, *ut testis est sect. 3. apho. com. 18.* idem Galenus, dum *ἰαγνῶ* interpretatur *σκοτοδιδία*. Differt a. ab eo vitio quod simpliciter *ἰαγνῶ* nuncupatur. Nam, *ut lib. 4. de Victu acut. morbo. com. 37. attestatur Galenus*, *ἰαγνῶ* est, quum caput circumagi videtur: ubi vero tenebricosa simul visio fuerit, *σκοτοδιδία* appellatur. Quare *ἰαγνῶ* non est nisi vertigo simpliciter. Qui barbaram colunt Medicinam, deprauata voce Scotomiā nominant. *ἰαγνῶ*, visio est circa caput perseverans a sole facta. Latinis visio solis appellari potest. *Σιγλαίσις*, Paulo lib. 1. c. 13. auctore, phlegmone est partium, quæ circa cerebrum & eius membranas sunt. Proinde a phrenitide nihil distare videtur. *ἰαγνῶ* enim Galeno lib. 2. de Symptom. causis cap. 11. teste, cerebri aut eius membranas est phlegmone. Sopor malum est phrenitidis contrarium. Quum vero soporis vox ambigua sit, ac Latinis vtrunq; somnum, & eū scilicet, qui naturalis, & eum, qui præter naturam existit, significet, non recte faciunt Latini Medicorum interpretes, quod hanc vocem ei duntaxat vitio, quod Græcis *κῶμα* dicitur, accommodant. Præstat enim ut Medici ad euitandam cōfusionem, somni vocabulum naturali, soporis vero non naturali somnio accommodent. Sopor igitur nobis non est, nisi somnus exsuperans, aut profundior quā par sit, a quo animal difficile excitatur. Cuius quidē quinque sunt species, nempe coma siue cataphora, catoche siue catalepsis, carus, lethargus, & apoplexia. Quomodo vero inter se differant, ordine explicabimus, & longius quidem, quam Institutionum ratio ferat: quod scilicet nemo, quod sciam, fere sit hodie, qui harum vocum significationes legitimas teneat. *Κῶμα* igitur, ut auctor est lib. 3. Epidem. cōment. 1. in textu septimi explicatione Galenus, non est nisi *καταφορά*, id est, delatio in somnum.

visio solis.
Σιγλαίσις.
Phrenitis.

Sopor qd.

Soporis species.

κῶμα quid.
καταφορά.
quid.

Delatio autem in soporem, eodem ibidem teste, est quū ægri vigilare nequeunt, oculosque minime apertos, sed cōfluētes potius habent: & vel profundo, vel tenui leuique sopore, vel vigiliis detinentur. Coma igitur reuera somnus non est, sed somni quoddā præternaturam desiderium. Quapropter Græcis a verbo *κωμάειν*, quod illis somnum appetere significat, *κῶμα* deductum est. Comatosi autem sunt, qui præter naturam dormire cupiūt, quanquam diuersa ratione. Alii enim in profundos aut leues tenuesve somnos incidunt: alii vero desiderio dormiendi frustrantur, & vigiliis detinentur. Ut hinc palā sit, Coma

κῶμα vnde dictum.
Comatosi qui.

Coma duplex.

D Hippocrati & veteribus aliis Græcis duum esse generum, nempe, *ὑπνῶδης*, id est, *somniculosum*: & *ὑπνῶδης, ἀγρυπνῶν*, hoc est, *non somniculosum, aut vigilans*. Commune quidē vtrisque est, non posse attollere oculos: statim enim grauantur, & dormire cupiunt: hincque adeo est, ut vtrunq; comatus nomen sortitum sit. Priuatim autem somniculosum id obtinet, ut in eo ægri dormiant, idque nonnunquā profunde diuque, ut difficile expergisci possint. Hoc Hippocrati li. 3. Epidem. cōment. 3. textu 64. *κῶμα βαρὺ*, id est, *coma graue, siue profundum* appellatur. Fit, Galeno textu septimo cōment. 1. libri tertii Epidem. auctore, ob multam cerebri humiditatem, ut nonnullis euenit inebriatis, sæpius autē ob solum eiusdem frigus, & interdum propter vtrunq;: præterea ob virtutis imbecillitatem ita iam extinguitur, ut palpebras sublata seruare ægri non valeant. Interdum vero in somniculoso comate somni leues, tenues, paruivale sunt, unde coma leue, tenue, siue leues aut tenues somnos obtinens dicitur. Hoc non a pura pituita, ut præcedens, nascitur, sed, ut Galenus li. 3. Epidem. cōment. 3. testatur, ubi tenuis humor, flaua nimirum bilis, cum pituita coniuncta est. Non igitur a puro humido & frigido, sed cum aliquo calore coniuncto, cuiusmodi est bilis cum pituita mista, ut diximus, aut putrescens pituita, procreatur. Quod autem id coma a calore frigori permisto fiat, attestatur idem Galenus, cap. 29. *Artis medica*, ubi de calidi & humidi cerebri notis agens, ita scribit: *ὑπὸ τῇ ἐπιρρίψατος ταύτης ἀνατομικῶς εἰσι, ἢ ἀγρυπνῶν*: id est, *Ad somnum autem conuersi, simul inclinationem ad somnū habent, & vigilant*, Quippe cerebri calor vigiliam, humiditas a. ad somnum inclinationem inducit. Alterum coma, quod Galeno *ὑπνῶδης, ἢ ἀγρυπνῶν*, id est, *non somniculosum & vigilans*, nuncupatur, fit, quando inclinatio ad somnum inanis est, ægerque vigiliis detinetur. Eo correpti, ut Galenus lib. 3. Epid. com. 3. textu 40. testatur, apertis oculis vigilare nequeunt, sed cōfluētes claudentesve oculos spe dormiendi, vigiles tamen permanent. Hi denique, ut idem in libello de Comate auctor est, vigiles se versant, alia post aliam imaginatione accedente, mentemque mouente, ac somnum intercipientes: unde semper qui-

Somniculosum.

Graue seu profundū.

Leue, tenue siue leues somnos habens.

dem vigilant, verum exsurgere non possunt, nec vigilantium obire munera, habentque A
deterius, quam si exquisite vigilarent. Graui namq; & ponderoso sunt corpore, obdor-
miscuntq; ita vt si somnum illis permittas, speres facile dormituros, quum tamē neque
dormiant, neq; se dormituros sperent. Hi, eodem Galeno lib. 3. Epidem. commen. 3. textu 40.
teste, in medio sunt tum exquisite vigilantium, tum dormientium: partim enim vigiles
sunt, nec tamen vigilantium munera obeunt: partim etiam inclinationem in somnum

Coma per-
petuo præ-
ter naturā.

Argenterii
lapius.

Galenus loci
conciliati.

Coma seu
cataphora
generatum.

Galenus ab
Argenterii
reprehē-
sione aser-
tus.

κατοχή καὶ
κατάληψις.
Detentio.

Cōgelatio.
Catoche &
catalepsi
non diffe-
runt.

Coma perpetuo esse præter naturam, quod nimirū soporis, adeoq; somni præter natu-
ram sit species, & ex morbosa causa excitetur, nec nisi iis, qui præter naturā affecti sunt,
accidat. Proinde plurimum errat Argenterius, quod coma non semper esse præter na-
turam dicat. Fallitur enim, quod putat Galenum in loco paulo ante ex Arte medicinali pro-
ducto, signa cerebri sani hominis docere, quum illic potius agat de cerebro, in quo calor
& humiditas plurimum excedunt. Id quod e verbis Galeni sit manifestissimum, q̄ sunt
eiusmodi: Si vero calor & humiditas plurimum excefferint, vocādes, id est, morbosum eris, & ex-
crementosum. Hec ille. Morbosi igitur etiam sunt, qui ea de causa comatosi & vigiles sunt,
necesse est. Si enim causa morbosa est, ideo etiam id quod ex ea procreatur, morbosum
sit oportet. Præterea Galenus cap. 3. libri de Sympto. Differ. coma siue cataphoram inter
symptomata & vitia primi sensorii recenset, & postea definit esse imaginatricis facul-
tatis motum infirmum. Quod sane vtrumq; recte dicitur. Quatenus enim coma sopo-
res, & vigilias inducit. primi sensorii symptoma est. Quatenus autem in comate somni-
culoso, graui præferim, imaginatrix vis patitur, eatenus principis facultatis, nēpe ima-
ginatricis, symptoma est. Nam propter assiduum & profundum somnū, itemq; frigidū
humorem cerebrum opprimitur, & intemperanter afficitur, ideoq; omnes eius vires
ac sensus, adeoq; etiam imaginatio, imbecilles fiunt, ac male administrantur. Quocirca
non recte Galenus hoc nomine, tanquam sibi contrarius, ab Argēterio accusatur. Atq;
hactenus de comate & cataphora proprie dictis, hæc retulisse satis sit. Sumuntur autem
hec vocabula interdum generatim pro omnib. vitiis, in quibus homo in somnum præ-
naturam καταρέται, id est, delabitur. Hac quidem ratione Galenus 2. commen. 1. Prorheti-
corum textus 29. explicatione, vt coma appellemus carū permittit, q̄ scilicet vtrumq; vitium
sit profundi, & excitatu difficilis somni genus. Et idem lib. 13. Thera. Method. cap. 21. inter
καταρεῖς β αἰείας, id est, profundas in somnum inclinationes, apoplexiam, carum, & catochem nume-
rat. Libro deniq; 11. de Simpl. Medicam. facul. capite de castorio, cataphoricos & lethargicos
affectus pro iisdem accipit, nempe pro soporoso affectu profundo, & excitatu difficili,
qui cum febre consistit. Generis itaq; vox καταρεῖς a omnibus soporibus cōmunis, lethar-
gi adiectione eo loci apud Galenum ad eum tantū soporem, quo cum febris coniuncta
est, contrahitur. Non recte igitur Argenterius Galenum accusat, quasi hæc duo inter se
cōfunderit nomina. Nō enim cōfundit, qui nunc pprie, nunc generatim vtitur vocibus,
quod scilicet id Galeno, & aliis etiā auctoribus solenne admodū sit. Quare Argenterius
suā orationē ad veterū potius rationē accōmodare, atq; ad illorū p̄scriptū loq. aut certe
eorundē scripta cādide interpretari, nō ita illis p̄petuo cōtemptim insultare, debuisset.

Κατοχή καὶ κατάληψις Græcis, detentio, apprehensio, vel occupatio Latinis dicta, vitium est in
quo tum mens, tum corpus sensu & motu priuatum detinetur, ægerq; in ea corporis per-
manet figura, in qua fuit correptus, siue sederit, siue iacuerit: siue clausis, siue apertis o-
culis perstiterit. Sopor itaq; est, qui nunc apertis, nunc vero clausis sit oculis. Quum ve-
ro hoc laborātes vitio, eo modo, quo qui a frigore congelantur & cōcrescunt, afficiunt,
recentioribus cōgelatio vocata est. Catochen autem & catalepsi idem significare, nec
quicquam inter se differre, Galen. multis in locis suorum monumentorum docet, præ-
cipue vero lib. 3. de Labor. locis, ca. 4. vbi inter cetera sic scribit: τῆς ὀνόμαζομένης ὑπὸ τῶν νεώτερον
ιατρῶν κατοχῆς τε καὶ κατάληψις: id est, nominata a iuniorib. Medicis catoches, & catalepsios.
Et iterum lib. 4. eiusdem operis, cap. 3. κατὰ τὴν τῶν κατάληψις τε καὶ κατοχῆς ὀνομαζομένης τὴν ὁπίσω πάσιν.
hoc est, In catalepsi & catoeche nominata posteriora patiuntur. Multo autem clarius in Isagoge
siue introductorio in pulsus, vbi ita scriptū reliquit: κατόχης γὰρ κατεχόμενος ἐκάλειν αὐτὸς οἱ πα-
λαιοὶ. κατοχὴν δὲ καὶ κατάληψιν οἱ νεώτεροι τὸ πᾶθος ὀνόμαζουσιν. Hoc est: Catochos namq; & catecho-
menos veteres ipsos appellarunt: iuniores autem vitium ipsum cathochen & catalepsi.

- A** proferre, & coaceruare. Et subscribit etiam Aetius, qui libro 6. cap. 4. sic scribit: *μίσον τῆς φρενίδος καὶ ληθάργωσθός ἐνρήσεις, ὅσιν ἔδωκε παρανοίας, ἢ παρακοπῆς. καλεῖν δὲ τὸτο ἡδίδησαν οἱ ἰατροὶ κατοχὴν καὶ κατάληψιν, ἐπὶ χυμῶ συμβαίνοντα μᾶλλον μελαγχολικῶ. καὶ ὅτε μὲν δοκῶσιν ὑπνώττειν, ὅτε δὲ ἀνεώγεται ἔχουσι τὰ βλέφαρα, ἢ τὸς ὀφθαλμούς, ἢ ἀκινήτους.* Id est: *Medium inter phrenitidem & lethargum vitium inuenies, quod species est delirii siue amentie. Medici autem hanc catochen, & catalepsin vocare consueverunt, ex melancholico humore magis contingentem. Et aliquando dormire videntur, aliquando autem palpebras apertas habent, aut instant, aut intente vident, & veluti fixos immobilesve obtinent palpebras, aut oculos.* Ex omnibus igitur iis quæ hæcenus diximus, perspicuum euadit, catochen & catalepsin idem esse Græcis Medicis vitium. Non est autem surda aure prætereundum quod Aetius dixit, catochen a melancholico magis fieri humore. Nam iis verbis tacite innuere voluit, hanc ipsam interdum ab alio quoque humore, pituitoso nimirum, fieri posse. Quod confirmat etiam Galenus, qui libro 13. Therap. Method. capite 21. ita scriptum reliquit: *In vitis quæ cum vigiliis coniuncta sunt, sopire ac stupefacere cerebrum oportet, quod supra modum incaluit refrigerando. In contrariis autem vitis excitare, ac noxii humoris, qui citra putredinem, & citra febrem cataphoras graues inuehit, crassitudinem insidere atque calefacere.* Tales Græci apoplexiam, carum, & catochum appellant. Et Paulus libro 3. capite 6. idem paulo clarius significauit, dum ita inquit: *τὸ δ' αὖ φλεγματώδους καταρρατὶντος χυμοῦ, κατωατώδους αὐθις καταφέρονται οἱ δὲ παλαιότεροι τῇ Γαλιῶν, κάτοχον τὸτο προσήγορον.* Hoc est, *Pituitæ foris dominante humore, iterum in profundum delabuntur somnum.* Vetusiores autem Galeno hoc vitium catochum appellant. Per vetustiores autem Ægineta Archigenem & Philippum intelligit. Hic enim catochum improprie eum quoque nominant, quem pituitosus humor procreat, & in quo oculi conuident, & clausi sunt. Cuius rei testis est Galenus, qui libro 3. Epidem. comment. 2. textu penult. sic inquit: *Nihil referre aiunt, vel catochum dicas, vel coma, non cognoscentes Hippocratem distinguere profundum comæ, a comate vigili. Profundum igitur coma communiter habet quandam comæ vocata ab Archigene & Philippe catochæ, non tamen cum vigilante.* Hæc ille. Habet autem coma profundum, ut id obiter etiam dicamus, & catochæ Archigenis & Philippi communiter, quod ab eadem causa, pituita scilicet, ambo vitia proueniant. Hinc igitur palam fit, Galeno & veteribus duplicem fuisse catochen. Vnam proprie dictam, quod scilicet in ea oculi aperti detineantur. Hæc ex melancholico, hoc est, frigido & sicco humore, generatur. Alteram improprie appellatam, quod nimirum in ea oculi clausi sint. Hæc ex pituitoso nascitur humore. Quod dicimus, comprobatur Galenus libro secundo Prænotionum, textu 56. ita dicens: *τὸς γὰρ ἰδίως κατόχος καλεῖται, καὶ οἱ περὶ τὸν Αρχιγένειον καὶ Φίλιππον ἰσταν ἀναπνεύσαντες ἔχοντες τὸς ὀφθαλμούς, ὥς κατωατώδους, καὶ οἱ καταρρακτοὶ καλεῖσθαι. ἐπὶ ἐκείνων μὲν γὰρ ὑγρότης αἰτία τῇ παθήματι ἐκλύεται τὸν τόπον τῶν νεύρων, ἐπὶ τῶν δὲ διὰ ξηρότητα τῆς γίνεται.* Quod est, *Proprie vocatos catochos seu detentos Archigenes & Philippus sciunt esse eos, qui habent oculos apertos, non, ut comatosi & cataphorici, clausos. In iis humiditas causa est vitii, quæ robur nervorum dissolvit. In illis autem propter siccitatem tensio fit.* Ex iis igitur palam fit, Archigenerium non recte confusionis & pugnantis accusare Galenum, quod lib. 4. de Labor. locis, cap. 3. catalepsin apertis palpebris fieri scribat, alibi vero dicat, eorum qui hoc malo laborant, oculos nunc apertos, nunc clausos esse. Quippe in libro de Laborantibus
- E** locis de catalepsi proprie dicta tantum loquitur. Alibi vero de vtrisque illi sermo existit. Hinc quoque perspicuum euadit, in errore versari eos, qui Archigenem & Philippum catochen appellasse vigilantem soporem seu coma vigilans arbitrantur, quum ex iam dictis constet, eos ita potius nominasse coma profundum, quod quidem ex pituitoso tantum fit humore, non id quod ex mixto cum bilioso nascitur, & coma vigilans vocatur. Quod non animaduertens Paulus Ægineta, auctorem vtiq; definitionum secutus, contra Galeni & veterum aliorum Græcorum mentem, triplicem lib. 3. facit catochen. Vnam cap. 6. a pituitoso humore natam, quæ non est nisi Archigenis, & Philippi catochæ. Alteram cap. 10. a melancholico ortam humore, quæ non est nisi catochæ proprie dicta. Tertiam compositam, hoc est, ex pituitoso & bilioso humore procreatam. Hæc non est nisi coma vigilans, id quod capitis inscriptio fati testatur, quæ est eiusmodi: *περὶ κατόχου, ἢ γὰρ ἀγρύπνου κόματος*: id est, *de catochæ, siue vigilante comate.* Paulo, ut modo dicere cepimus, astipulatur auctor definitionum, qui in hunc modum scribit: *ἔδωκε κατόχου τρεῖς. ὁ μὲν ὑπνώδους, ὅς παύεται ληθάργω. ὁ δὲ πρὸς*

Vetusiores autem qui.

Duplex catochæ veteribus
Proprie dicta.
Improprie vocata.

Galenus ætiniuria Archigenerii de sensus.

Error quorundam.

Pauli Æginetæ lapsus
Catochæ triplicem.

ἰσχυροῦς, ὃ παράκειται τέταν· τρίτον δὲ κατόχῃ, ὃν κ' αὐτὸς ἀσυνέτως κατόχον ὀνομάζει φρενιτικόν. γίνεται
 γὰρ ἐκ μίγματος ἀφροσημάτων κατόχῃ τε καὶ φρενιτικῷ. Quod est: *Tria catochi sunt genera. Vnus quidem
 somnolentus, qui lethargo accedit. Alter vero vigilans, distentioni similis. Tertium genus catochi,
 quem quispiam non inusitate phreniticum dixerit. Fit enim ex mixtis vitiis catochæ & phrenitide.*
 Quum vero obscuritate hæud vacet, quod catochen vigilantem tetano accedere dixe-
 rit, sciendum erit id ideo fecisse, quod in catocho, proprie dicto oculi tensi, aperti, & im-
 mobiles manent, hæud secus atq; ceruix in tetano riget, & immobilis permanet. Vrex
 iis quæ iam diximus, omnibus perspicuum euadat, Pauli & definitionum auctoris erro-
 rem secutū esse etiam Amatū Lusitanum, qui indē catochen cum comate vigilāte
 cōfundit. Hinc magna temeritate Centuria secūda, curatione decimaquinta me erro-
 ris insimulare ausus est, q̄ in medēdi meā ratione de catalepsi & catocho eodē in capi-
 te, tanquā de vno tantum morbo, egerim. Quasi v. vt ille cæcutiens sentit, diuersi sūt
 morbi, qui iis duabus vocibus significantur. Vtinam verō vnus tantum Lusitanus hoc in
 errore versaretur, & non alii quoq; multi doctissimi viri, huic impliciti essent. Idem n.
 quod ille Budæus, Copus, Iacobus, Syluius, Fernelius, & Langius in suis Medicinalib.
 epistolis sentiunt. Ita sæpe vnus error, multos etiam alios in errorem pertrahit. Quare
 hæud facile cuiusq; sententia amplectendā erit. Periculū enim est, ne crebro falsum p̄
 vero arripiamus, si aliis plus æquo credamus. Ceterum, ne id silentio inuoluamus, cata-
 lepsios generationis multæ sūt causæ. Fit enim interdum, *Galeno lib. 1. de Sympto. causis
 cap. 7. auctore*, per consensum cerebri cum ore ventriculi; quod minime quidem mirum
 est. Si enim hac quoq; ratione, *vt ibidem tradit Galenus*, melancholia fieri potest, & ea ma-
 xime melancholiæ species, quæ Græcis *κυσώδης καὶ ὑποχορδαία*, id est, *flatuosa & hypochondriaca*
 nominatur, quemadmodum *lib. 3. de Labor. locis cap. 6.* Gal. etiā testatur, nepe aura
 exhalatione vē quadam maligniore ac melancholica a ventriculo laborante sursum ad
 cerebrum transmissa: quid mirum, si etiam humore pituitoso, aut crasso vapore a ven-
 triculo sursum delato & cerebrum refrigerante, coma, & catalepsis impropria, aut certe
 etiam propria, si siccus halitus, aut humor cerebrum desiccās, sursum feratur, procreet?
 Quum n. neruorum a sexto pari cerebri ortorum interuentu ventriculus cerebro iun-
 gatur, eisq; hoc nomine maximus sit consensus, facilimus profecto hinc ad illud est trā-
 situs. Vt immerito ab Argenterio hoc nomine reprehensus sit Galenus. Nec reprehensionem etiam meretur, q̄ idem *sect. 2. Apho. comm. 3.* frigiditatem cerebri cū siccitate
 coniunctam causam catalepsios facit. Nam metipse Argenterius ab iisdem causis hoc
 vitium procreari scribit. Nec notari debuit Galenus, quod *lib. 2. Prenotionum* a sola siccitate
 vitium hoc fieri memoriæ prodiderit. Siquidem & ipse Argenterius a sola cerebri
 frigiditate catalepsin proprie dictam, nō semper ex aliquo humore fieri, fateatur. Quū
 itaq; a diuersis causis catalepsis nascatur, minime vitio Galeno ab Argenterio vertendū
 erat, quod variis in locis catalepsin a variis & differētibus causis procreari scribat. Im-
 merito quoq; Aetium erroris insimulare videtur Argenterius, quod is catalepsin nunc
 ab humore melancholico, nunc a sanguine copioso in caput irruente nasci pronuntiat.
 Nam si a frigido & sicco sit humore, *vt dictum est*, igitur etiam a melancholico sanguine,
 quod ille scilicet natura humor frigidus & siccus sit. Sed instat Argenterius: *Si melancholicus humor id vitium parere potest, cur igitur ij qui melancholia laborant, nō omnes fiunt cataleptici?*
 Recte utiq; facit Argenterius, quod non prorsus negat melancholia laborantes fieri
 catalepticos. Siquidē id non solum absurdum fuisset, sed & manifeste falsum. Cur a. nō
 omnes melancholici fiant cataleptici, epilepsiz exemplo *lib. 6. Epid. sect. 8. Aph. 44.* Hip-
 pocrates monstrat, inquiens: *Melancholici magna ex parte epileptici fieri consueuerunt, & cōtra
 epileptici melancholici efficiuntur.* Horum verō utrumlibet magis euenit, prout vel in hanc, vel
 in illam partem infirmitas repit. Si enim in corpus, epileptici: si vero in mentem, melancholici. Hec
 ille. Quibus utique verbis Hippocrates docet, cerebrum a melancholia bifariam affici.
 Vno modo, vt est pars instrumentalis, seu *vt Hippocrates vocat*, corpus. Id quod cetero
 accidit, si in eius cavitatibus melancholicus humor obstructionem excitat. Atque hac
 quidem ratione epilepsiam creat. Altero modo, vt est pars similis. Id quod fit, vbi ce-
 rebri temperamentum læditur ac mutatur. Hac quidem lege in mentem seu rationem
 repit, & melancholiam efficit. Simili modo etiam catalepsin proprie dictam efficit, vbi
 sc. melancholicus humor cerebrum supra modum exsiccat, eiusq; temperamētum im-
 mutat

Amati Lu-
sitanii error.

Causæ ca-
talepsios
variez.

Galenus ab
Argenterii
calumnia
absertus.

Aetius de-
sensus.

A mutat. Quod autem a sanguinis copia hoc vitium fieri Aetius scriptum reliquerit, non simpliciter esse intelligendum existimo, de quouis nimitum sanguine. Siquidem is qui vitio omni caret, nihil tale creare poterit. De melancholico igitur locutus est sanguine; qui quum frigidus & siccus existat, nihil mirum si catalepsi efficiat. Sed de catalepsi & catoche satis. *Kāp* proprie dictus Græcis a capite, quod illis *καπ* dicitur; parte nimirum in qua sit, & a verbo *καπνίζω*, quod iisdē aggrauari significat, nomē accepit. In hoc namq; vitio caput aggrauatur. Est autem Carus is, ut Galenus lib. 4. de Labor. locis, cap. 3. auctor est, vitium, in quo sensus & motus perit; respiratione tamē illæsa permahente. Qui igit carō laborant, ut lib. 6. ca. 5. ex Posidonio testatur Aetius, somno profundo detinentur: at si stimulentur, sentiunt quidem; non tamen loquuntur, neq; oculos aperiunt. Vnde perspicuum euadit, Carum Græcis vocatum vitium; Razi Mauritano Subeth appellari. Nam *Subeth* is in lib. 9. *Almansori inscripto*, cap. 5. Subeth iis describit verbis: Est Subeth, ubi aliquis quasi dormiens iacet, & tamen sentit, moueturq; sed oculos ut plurimum habet clausos, quos tamen, ubi cum clamore vocatur, aperit, quanquam statim iterum claudat. Hæc ille. Quum vero inquit; Tamē sentit & mouetur: intelligendum erit, ut omnes eiusdē expositores interpretant, si scilicet stimuletur. Mouetur præterea, non tamen vehemēti, sed leui admodū morū. Razis sententiam secuti sunt et Mōranus, & Syluius, qui itidem Carum cū Subeth eundem esse statuunt. Quare nō erat cur Argenterius me reprehēderet, quasi nulla ratione motus scripserim Subeth Arabibus idem esse vitium quod Carum. Eius n. rei in ea familiā

C Razem habui auctorem, quē in morborum appellationib. Medici recentiores barbari magis sectantur. Nō ignoro auctore Subeth Auicennæ & Serapioni nō minus coma seu cataphorā, quā Carum significare. Imo interdū Subeth nomine Arabibus etiā Lethargus intelligit. Ut hinc quoq; liquēdo appareat, doctrinā Arabū esse cōsulam. Ceterū non tēmere a nobis paulo ante dictū est, Carus proprie sumtus, Siquidē Carus Galeno, & aliis veteribus geminus existit; morbosus, & non morbosus. Carus nō morbosus est somnus profundus, qui nullū morbosum sequitur affectū, qualis certe est qui ex vini immodici portione fit, & in pueris aliquando, ppter maiore vaporum copiā oritur. Atq; is quidē improprie Carus nominatur. Hinc est q. Gal. pmittat improprie loquentib., ut Carū etiam simpliciter appellent. Proprie a loquentibus, q. a bono fiat humore, Carus simpliciter haud dicitur, sed potius profundus somnus; aut cum adiectione Carus bonus. Morbosus contra est, qui morbosum aliquē affectū sequitur. Atq; is iterū duum est generū; mitior nimirum, & perniciosus. Mitior, est somn⁹ pfundus, & excitatu difficilis. Atq; is a comate seu cataphora non distat, imo proprie loquēdo nō est, nisi coma. Perniciosus est, quādo immobilis & insensibilis homo tēpore aliquo iacet, etiamsi hunc stimules, ferias, aut clames. Hic quidē solus est, q. pproprie Carus dicit. Porro ut varia est appellatio & acceptio Cari, ita quoq; variz sunt eius causz. Prior, bonus dict⁹, fit a copia bonē humiditatis grauantis corpus. Alter morbosus mitior vocatus, a pituita humectate & refrigerante cerebrum. Tertius morbosus perniciosus nominatus, fit, quando caput iuxta temporales musculos vehemēter affligitur ac contunditur, & nōnunquā in accessionibus morborum febrilium, in quib. neq; eos q. pungunt, aut cōtundunt, & multo minus eos, qui clamāt, ægri sentiunt, aut audiunt. Quæ diximus cōfirmat Galenus li. 2. prænotionū, textu 29. vbi planissimis verbis Cari tum differentias, tum causas explicat. Quare immerito ab Argenterio reprchenditur; & cōfusionis insinuat. Quod n. Carum interdū cōprehendere somnū non morbosum ait; id de Caro improprie dicto intelligendū erit. Siquidē hunc metipse proprie somnum profundū appellandum esse affirmat. Quod vero Carū cum comate eundem esse ait, id ex aliorum sententia facit, quibus permittit ut somnū profundum, & excitatu difficilē, improprie Carum nominent, quum proprie loquēdo Coma vocetur. Præterea quod li. 3. de Temper. c. 3. Carum frigidū vitium nūcupat; de secundo Cari genere, nempe morbose mitiore, inaudiendum erit. Siquidem illic de immodica vini portione loquitur; q. quia ab innatō calore non vincitur ac superatur; crudum manentis; frigida vitia merito procreat. Quod autem Carū cap. 3. libri de Differen. Sympto. imaginatricis facultatis symptoma esse, ac veluti quandam illius resolutionē statuit, reprchensione omni vacat. Nam Carus hāc ipsam facultatem quasi resoluit. Quum n. sit sensus priuatio Carus; igitur etiā imaginationis, ytpote q. imaginatricis facultatis obiecta sua & imagines a sensibus nullas amplius recipientis actio existit, priuatio & resolutio

Kāp

Subeth

Arabū dē
Strina con-
fusa.
Carus du-
plex.
Non mor-
bosus sine
bonus.

Morbosus.

Mitior.

Perniciosus

Causz Cari

Galenus ab
Argenterii
reprchensio-
ne des-
sensu.

fit oportet. Vere etiam idem Gal. libro. 4. de Labor. locis, capite tertio, in Caro corpus neque sentire, neque moueri scribit. Nam illic de tertio Cari genere, siue de eo, qui proprie Carus dicitur, loquitur. Quare ut illum redarguendi occasionem haberet Argenterius, Galeni verba non nihil immutare voluit, & pro eo quod Galenus dixit, *In Caro*: ipse, *In omni caroso affectu, substituit.*

Cari caus.
se variz.

Reprehenditur quoque ab Argenterio Galenus, quod Caro diuersas assignet causas, nepe grauissimas aliquas, leues alias, nonnullas vero leuissimas, atqui minus recte. Vt n. tria sunt Cari genera, ita etiam eius triplices esse causas possunt. Grauissimæ, ut est ictus capitis vehemens, frigiditas morbose calorem innatum ad interna reuocans, & cerebri um grauans atque opprimens in pituitosarum febrium accessionum initis, cõfusio musculorum temporalium, ossis perforatio, & ventriculi cerebri attritio. Quæ quidem omnes causas Carum grauissimum & proprie dictum creant. Leuiiores vero, ut est affectus musculorum oculi, vsusque hyoscyami. Hæ Carum improprie nominatum siue coma excitant. Leuissimæ a. ut est vini potio, & in pueris nimia humiditas, Carum bonum appellatum, efficiunt.

Λιθαργος.

Λιθαργος vitium est phrenitidi contrarium, nomenque suum deducit ἀπὸ τῆς λιθῆς, ἧ ἀργῆς, id est, *ab obliuione & captura*: quanquam alii malunt id nominis deriuare ἀπὸ τῆς λιθῆς ἧ ἀργῆς, id est, *ab obliuione & inertia*: nonnulli ἀπὸ τῆς λιθῆς ἧ ἀργῆς, hoc est, *obliuione & otio*, nullo certe discrimine, quod scilicet eos qui hoc vitio laborant, omnium rerum obliuio capiat, & inertes ac otiosi iidem decumbant. Siquidem Lethargus proprie dictus, sopor est propter naturam, continuus, inexpugnabilem dormiendi necessitatem, ac obliuionem cum lenta febre pituitam in capite putrefactam comitante, inducens. Latinis *Veternus* appellatur. In hac quidem significatione sumitur lib. 13. *Thera. Method. capite 21.* vbi eius curationem ex professo Galenus docet. Idem libro quoque, 2. de Labo. locis, capite 5. vbi memorizæ & rationis vitium esse scribit: quod intelligendum erit de eo, quo ægroti adhuc laborant tempore. Perit enim in iis tum ratio & memoria, sanato tamen ac profligato morbo rursus nonnunquam restituntur. Habent etiam, qui lethargo correpti sunt, deficientes & infirmos motus, ut cap. 3. libri de Sympto. differ. testatur Galenus. Et cap. 10. libri de Sympto. causis, practicas, id est, motrices actiones, in Lethargo esse torpidas scribit. Sentiant etiam Lethargici, atque ægre. Neque enim prorsus in Lethargo sensus & motus abolerent, alioqui ab Apoplexia non differret. Et si igitur, ut Paulus lib. 3. c. 10. attestatur, Lethargici, somnolenti semper sunt, & ægre excitari possunt, tamen respondent quum interpellantur, & oculos nonnunquam aperiunt ad vociferationes, quod indicium est eos sentire, suosque motus seruare. Proinde quum Galenus alicubi scribit, lethargicos nec sentire, nec moueri, intelligendum est, ægre eos sentire, & infirmos habere motus, ut iam dictum est. Atque hæc tenus de Lethargo proprie vocato. Sumitur etiam interdum generatim & improprie, pro omni somno, qui difficilem habet expergefactionem. Sic non raro cum comate generatim sumto coincidit. Lethargus præterea, Galeno com. 1. libri Prognosticorum textu 1. auctore, interdum simplex, aliquando mistus existit. Simplex est, qui fit ex vno humore, nepe pituita cerebrum humectante & irrigante. Mistus, ex phrenitide & lethargo proprie dicto est compositus, qui alio nomine Græcis, maxime Hippocrati, τυφλωματῖα appellatur.

Lethargus
proprie.
Veternus.

Lethargus
generatim.

Simplex.
Mistus.

τυφλωματῖα
Galenus ab
Argenterii
calumnia
defensus.

Unde perspicuum fit, Galenum non recte ab Argenterio reprehendi, quod de Lethargo parum conuenientia prodiderit, & in eius referendis causis varius fuerit, easque negligenter, & confuse explicarit. Quod enim lib. 1. Epidem. Lethargum periculosum morbum esse tradit, id, ut ex iam dictis patet, de Lethargo proprie dicto inaudiendum erit. Quum enim in eo putrescat in capite pituita, periculo vacare nequit. Quod autem infirmum facultatis imaginatricis motum in libro de Sympto. differ. esse scribit, id recte ab eo dictum est. Nam ut in comate & caro, ita etiam in Lethargo propter assiduum soporem, quo ægri opprimuntur, imaginatrix facultas, quæ sensilium rerum imagines continet, deficit, & imbecilla est. Oppresso enim & intemperanter affecto a pituita cerebro, necesse est eius actiones quoque impediri. Quod vero lib. 3. de Labo. locis. cap. 6. scribit, Lethargum a vehementi frigore fieri, & intemperie frigida, id verum est, & hoc ipsum etiam affirmat Argenterius, qui aliquando ex phrenitide male curata, præterque modum refrigerato capite, hunc nasci ait. Verum etiam est, quod comment. 1. libri Prognosticorum text. 1. scribit Galenus, *Lethargum fieri quum pituita locum, in quo princeps anima pars residet, humedat, & irrigat*. Non enim ab eius humiditate tantum, sed etiam frigiditate fieri lethargum innuit. Pituita enim

nulla

A nulla est citra frigiditatem. Etsi interdum a sola humiditate, *ut li. 1. & 3. de Sympto. causis testatur idem Galenus*, lethargus generatim sumtus fiat. A nimia namque humiditate, *ut* metipse Argēterius fatetur, calor innatus intus veluti suffocatur, ac prodire ad exteriora impeditur. Quod *sect. 2. Aphor. comment. 3.* tradit, vehementem frigiditatem cerebri cum humiditate mistam efficere lethargum, non differt ab eo, q̄ ante ex lib. *Pranotionū* produximus. Intelligit enim pituitā humiditatē, quemadmodū seipsum *in libello de Attribile explicat*, vbi disertis verbis, *humorem lethargum procreantem esse lērum & crassum affirmat.* Quod *lib. 13. Therap. method.* humorem in lethargo vult putrescere, de proprie vocato lethargo inaudiendum erit. Ceterum quum postremo loco me quoq; erroris in simulet Argēterius, committere non potui, quin me etiam ab ipsi⁹ reprehensione vindicarem. **B** Reprehendit vero in me, quod lethargi causam esse dixerim pituitam nimio frigore & humore cerebrum imbuentem. Quasi vero non idem fecerit Galen. *lib. 1. Pranotionum com. 1. tex. 1.* vbi lethargum fieri ait τῆς ψυχῆς ἡ γερνὴ ὑπαίτιος τῆς διαβλητῆτος φλέγματος; id est quando pituita principem animā partem humectat & irrigat. Et *comment. 3.* eiusdem operis *tex. 31.* expressis verbis ait: φλέγμα τῶδες τὸ πλεονεχὲς αὐτῶν ἐργάζεται, hoc est, pituitosa plenitudo Lethargum efficit. Quod si itaq; hæc verba ad Lethargum proprie dictum referuntur, satis ex aliis Galeni locis constat, illā non esse de pituita simpliciter dicta, sed de putrefacta potius intelligenda. Vt minime necesse sit, id semper expressis significari verbis. Neq; ego in Medēdi ratione mea, simpliciter pituitā lethargi esse causam scripsi, *ut* mihi falso affingit Argēterius, sed statim subieci: *Putrescit n. in hoc malo pituita.* Vt hinc facile lector candidus quid voluerim intelligere potuerit. Sed Argēterio hoc vnicū est studiū, *ut* non tantum veteribus contradicat, sed etiam *ut* per aliorum ruinam emergat.

Auctor ab Argēterio reprehensione affectus.

Aποπληξία vitium est, vbi laborante cōmuni neruōrum principio, subito omnes corporis particulæ motum simul, & sensum amittunt. Aut est priuatio sensus & motus in vniuerso corpore, cum functionum a voluntatis imperio prodeuntium læsione subito superueniens. Latini *attonitum morbum* vocant. E *ἑτάτης* vitium est, vbi aliquis noctu se grādi mole opprimi, inuandit; ab alio credit. A Themisorie *πνιγάλιον*, a suffocando nuncupetum est, quod in eo malo ægotantes suffocari videntur. Latini *incubum & incubonem* appellant. E *πληψία* nihil aliud est, *ut lib. 3. de Laborantibus locis, cap. 5, auctor est Galenus*, quā vniuersarum corporis partium, non quidem perpetuā, sed quæ ex temporum fit interuallis, cum mentis & sensuum læsione, conuulsio. Hoc vero nomen huic vitio a Græcis est inditum, quod sensum capitis, atq; mentem pariter apprehendat. Latini *morbum comitiale* appellant, quod in comitiis, *ut* in aliis etiam concionibus & hominum cœtibus, eo correpti maxime infestabantur, frequenterq; detergebantur: quodq; eo quo quis cōcidisset die, comitia interrompebant. Alio nomine sacer nuncupatur morbus, propter suam magnitudinem & grauitatem, quandoquidē eo correptus homo subito concidat. Siquidem Græcis familiare est, *ut* ἐπεὶ, hoc est, *sacrum* pro magno vsurpent, *ut* dum sacrū os, & sacrū piscem, pro magno osse, & magno pisce efferunt. Et Virgilius imitatione Græca, *sacram auri famem*, pro magna dixit. Atq; hinc est, quod Hippocrates *in Epidemiis* E *μεγάλυνος*, id est, *magnum morbum* nominet. Dicitur Hætiāmerculeus, vel quod Herculi familiaris fuit: vel quod Herculis instar immēsus & magnus sit. Idem caducus, a crebro lapsu & casu vocatur. Lunaticus quoq; a nonnullis appellatur, vel q̄ Lunæ circumactionē sequatur: vel quod eum, qui interlunio natus est, hoc malo fere affici cōpertum sit. *Puerilem* denique & *Infantilem* nuncupant, quod teneram præcipue ætatem infestet, & pueris, quoad pubertatem accedant, peculiaris sit.

Apoplexia.

Attonitus morbus. ἑτάτης. Incubus. Epilepsia.

Morbus comitialis.

Sacer.

Magnus.

6. Epid. sect. 6. Aphor. 9: Hercules.

Caducus. Lunaticus. Puerilis. Infantilis.

Παράλυσις & πάρεσις, est malum, vbi alterum duntaxat latus, aut dextrum aut sinistrum, sensum simul & motum amittit. Alio certo nomine, & proprie quidē *ἡμιπληγία & παραπληγία*, Hippocrati & aliis Græcis dicitur. Nam sic tantum appellatur, *Galen. lib. 4. Victus via. acut. morbo. comment. 23. teste*, resolutio, quæ apoplexiam sequitur. Ceterum *παράλυσις* non raro generatim pro omni resolutione, & ex quacunque occasione facta sumitur. Sic membrorum resolutio ex colico dolore etiam paralyssis nominatur. Σπασμός, vitium est, in quo nerui atq; muscoli præter voluntatem conuelluntur, inq; eum veniunt affectum, quem in motibus secundum arbitrium factis assumerunt. Vel, *ut lib. 2. de Sympto. causis, cap. 2. definit Galenus*, malum est, quod neruos, musculosque ad eundem cogit affectum, in quem animali facultate, quum naturalem seruarent habitum, ducebantur.

Paralyssis. ἡμιπληγία. παραπληγία.

Convulsio.

Latini conuulsionem vocant. Eius autē tres sunt species seu differentię. Vna Græcis **κράσις** A
 Latinis nonnullis interpretibus simpliciter *distensio*, vel cum adiectione *distensio erecta*,
 Cornelio Celfo *rigor* dicitur. Hæc accidit, vbi ceruix vna cum reliquo corpore immo-
 bilis manet, & in neutram partem inflectitur, sed iuxta in vtramq; partē recta intendit.
Altera **ἐμπροδότης** Græcis, *distensio ad anteriora* Latinis nominatur. Fit, vbi caput, ceruix,
 & reliquum corpus in pectus & anteriora conuellitur. Tertia **ὀπίσθιος** Græcis, *distensio*
ad posteriora Latinis appellatur. Accidit, quādo caput & ceruix in dorsum & scāpulas cō-
 trahitur. **Μανία** vitium est, quod Latinis *insania* & *furor* vocatur. Hoc enim correpti fera-
 rum modo redduntur effrenes, ac furere consueuerunt, ita sane, vt non raro eos qui im-
 prudentius illis occurrunt, aut cum iis versantur, male tractent. A phrenitide distat, vt-
 pote cui adiuncta sit febris, cum mania citra febrem cōsistat. **Μελαγχολία** Græcis est men- B
 tis alienatio desipientiæve sine febre, ex melancholico humore cerebrum occupāte; ac
 temperaturam immutante, orta. **Παραφροσύνη** vero iisdem delirium appellatur, q̃ propter
 consensum cerebri, vaporibus nimirum acribus sursum elatis, accidit. **Λυκανθροπία** vitium ē,
 quo correpti sese in lupos esse conuersos imaginant. Proinde noctu egressi domo, lupos
 per omnia imitantur, & donec dies illucescat, circa defunctorum monumēta vagantur.
Quocirca minime fabulosum videri debet, quod Plin. lib. 8. c. 22. homines in lupos mu-
 tari tradidit. Est p̃terea furor ex amore natus, qui Græcis **ἔρωτις** nominatur. Quo fere
 oēs per adolescentiam correpti iuenculas depereunt. Furor a. quem Musæ & literarū
 studia pariunt, qui tamen hodie apud Germanos nostros rarus admodū est, **πρεσβυτις**
 Græcis nūcupatur. **Τρέμος** vitium Græcorum Medicis ex duob. perficitur motibus, vno C
 quidem, dum cogit mēbrum ob morbum & grauitatem ad inferiora repere: altero, dū
 sursum a facultate fertur. Latinis *tremor* nuncupatur. **Κατάρσις** & **κατάρσις** contracte Græ-
 cis malum dicitur, vbi ex capite humor ad os & fauces, Galeno lib. 3. de Sympto. causis cap. 11.
αὐτὸς, defertur. Latini *destillationem* nominant. **Κόρυζα** vero vitium est, in quo humor ad
 nares decumbit. Latinis *grauedo* vocatur. **Βράγχ** malum est, vbi ad guttur humor destil-
 lat. Latinis *raucitas*, nonnullis *raucedo* appellatur.

Vitiorum oculi succinēta explicatio. CAP. XII.

Quæ in oculis nascuntur vitia, vel ad totum oculum, vel ad eius duntaxat partes per-
 tinent. Quæ ad totum oculum spectant, hæc sunt: **Ατρεσία** vitium est, quod totum ocu- D
 lum minorem depresso remq; reddit. Celsus *imminutum oculum* lib. 6. vocat. Auicennæ inter-
 pres *fen. 3. canonis tertii, profunditatem oculi* appellat. **Εκπίσις** cōtrarium est priori malum.
 Siquidem in eo sic exprimuntur oculi, vt exserti perseverēt. Interpres Auicennæ *exitū*
oculi nominat. Latine *expressio oculi* nuncupari posset. **Στραβισμός** conuulsorius est muscu-
 lorum oculum mouentium affectus, per quem aut sursum, aut deorsum, aut in obliquū
 torquentur oculi. Distortio oculi, vel obliquus aspectus dici posset. Auicennæ interpre-
 ti Strabositas nuncupatur. Qui hoc vitio laborāt, Strabones Latinis vocantur. **Μυωπία**
ἡμυωπία, malum est, quo fit, vt ab ineunte ætate pusilla quidem prope videantur, remora
 vero, etiam si magna sunt, nō itē. Hoc correpti vitio lusciosi Latinis dicuntur. **Νυκταλονία**
 vitium est, quo quis interdū quidem videt, sole autem occidente obscurius, noctu vero E
 penitus nihil. Latinis *nocturna cæcitus* nuncupatur. Eo autem laborātes malo, **Νυκτιόσι**
 nominantur: **Ἀμβλυπία** est visus obscuritas, Latinis *hebetudo* appellatur: fit, vbi spiritus
 crassescunt, vel tunicæ densantur, vel oculorum humores lentiores fiunt. **Επιφορά**, est o-
 mnium humorū ad oculos impetuosior fluxus. Celsus *puita cursum seu impetum*, vulgus
 autem Medicorum lacrymam vocant. **Ρήξις** est ruptura ab ictu, vel alia quapiam causa,
 in alto subinde integras membranas diuidens, vt etiam humores, quib. videndi facultas
 administratur, effundat. **Παράλυσις**, est vbi obliquæ motiones, & quæ sursum ac deorsum
 fiunt, expediri non possunt, Latinis *oculi resolutio* nuncupatur. Atq; hætenus vitia ad v-
 niuersum perrinentia oculū percensuimus. Nunc reliquū est, vt de iis malis, q̃ oculi mē- F
 branis tunicisve accidunt, disseramus, exorſi ab iis, quæ in adnata fiunt. **Τάραξις** est humi-
 ditas oculi cū rubore & calore p̃ter naturā, non ex corpore, sed forinsecus adueniente
 causa aliqua, fumo, verbigratia, puluere, aut oleo oborta. Latinis *perturbatio oculi*, Auicennæ
 interpreti *conturbatio* & *vacillatio*, item *ophthalmia leuis*, vel non vera dicitur.
Οφθαλμία, membranæ, tunicæve adnatæ phlegmone est, q̃ Latinis *Lippitudo*, Auicennæ
 vero

- A** vero interpreti *ophthalmia vera* appellatur. *Χήμωσις* est, vbi vtraque palpebra ex vehementi phlegmone distorquetur, vt vix oculos operiant, & album oculi nigro sublimius fit, & rubrum, ac multam nigri partem occupat. Auicenna *Alguadenegi* vocat. Πτερίγιον nervosa est adnatę membranę eminentia, quę ab angulo maiore quidem orta, vsq; ad coronã seu irim oculi progreditur. Vbi vero augetur, pupillam etiam obtegit. Cellus in *septimo vnguem* appellat. Barbaram excolentes medicinam *ungulã* nominant. Quę autem in cornea tunica fiunt mala, hæc sunt: *Φλύκταινα* priuatim exiguę sunt pustulę, veluti quędã bullę supra corneam eminentes, quales iis potissimũ accidunt, qui exanthematis laborant. Sic dictę *ἀπὸ τῆ φλύν*, hoc est, *ab ebullitione & seruore, quem in oculi tunica excitat*. Celsus *pustulas*, Auicennę interpretes *vesicas*, vocat. Βόθειον, cauum, angustum, purumq; in cornea natum vlcus est. Latini interpretes *fossulam*, Auicennę interpretes *annulum* nuncupat. Κόιλωμα latius est botrio vlcus, sed minus altum. Cautas interpretibus Latinis dicitur. *ἀργεμα καὶ ἀργεμον*, vlcus est quod in iridis circulo nascitur, undiquaq; illum occupans, sic vt circa exteriorē iridis partem rubicundum, circa vero interiorem album appareat. Επίκαιμα, vlcus est fordidum, impurum, & crustosum, Latinis *inustio* vocari posset. Interpres Auicennę adustium nominauit. Αχλὺς vlcus est superficialium in nigro oculi apparens cæruleum, caliginoso aeri simile, nigri maximam partem occupans. Caligo latinis appellatur. Νεφέλιον eiusdem generis vlcus est, sed caligine profundius & angustius, colore candidas. Latinis *nubecula* vocatur. Πύωσις & ὕπερνθω est, vbi pus sub cornea nunc altius, nunc in summa superficie coaceruatur, humani vnguis specie. Atque hinc est, quod idem vitium Græcis *ὄνη* etiam appelleretur. Auicennę interpretes *sanīē in siphac* nominat. Καρκίνωμα priuatim malum est corneę tunicę, immensum dolorem & ruborem, punctoriumq; cruciatum ad tempora vlque protensum excitans. Latinis *cancer corneę* nuncupatur. Et hæc corneę sunt vitia. In vuea vocata tunica hæc eueniunt mala. Πέριπρωσις vuea est *procentia*, ab erosionē ruptioneue corneę accidēs. Hęc si exigua adhuc fuerit, vt muscę capitis formam præ se ferat, Μυοκέφαλον Græcis nuncupatur. Auicennę interpreti *formicalis ruptura* dicit. Vbi vero amplius & eousque succreuerit, vt acinum vueę representet, Græcis *σαφύλωμα* appellatur. Sunt qui vuationem dici posse putant. Auicennę interpreti *vwā* nominatur. Si autem sic augetur, vt extra palpebras emineat, *μῆλον* Græcis, Auicennę interpreti *clauialis ruptura* vocatur. Vbi vero obducta cicatrice obduruerit, & occalluerit, Græcis *ῥῆλον*, Latinis *clauus*, Auicennę interpreti *clauialis ruptura* dicitur. Foraminis vueę, quod Latinis *pupilla* nominatur, hæc vitia sunt. Μυδρίασις, vitium est, in quo pupilla colore quidem nihil euariat, sed multo quam consuevit latior fit, adeo vt interdum iridis circulo appropinquet. Latinis *pupilla dilatio & effusio*. Auicennę *Alintisar* nuncupatur. Θίσις priuatim contrarium priori malum est. In eo enim pupilla angustior, obscurior, rugosiorque fit. Latinis *tabes & imminutio pupille*, interpreti Auicennę *cōstrictio pupille* dicitur. Ὑπερχυσις & ὑπέκχυμα est, vbi humor lentus & glaciei modo inter corneam & crystallinum concretus circa pupillam subit. Latinis *suffusio*, Auicennę interpreti *aqua*, vulgo Medicorum *cataraçta* vocatur. Γλαύκωμα, est crystallini humoris vitium, in quo is ex humiditate in glaucum colorem muratur. Angulorum oculi hæc sunt mala. Αἰγίλωψ, est abscessus inter maiorem oculi angulum, & nasum factus, qui ruptus si negligatur, in fistulam ad os vsq; progredientem abit. Nostri fistulã lachrymalium angulorũ appellant. Αἰγίλωψ idem est abscessus, sed priusquã disruptus in vlcus abit. Vtrumq; Auicenna *Garab* nominat. Ἐγκανθίς, est naturalis circa maiorem oculi angulum carunculę supra iustum modũ excrecentia. Auicennę interpretes additionem carnis lachrymalium vocat. Ροίαις, vel potius *ρύαις*, eiusdẽ carunculę imminutio & decrementum est. Auicennę interpreti diminutio carnis lachrymalium dicitur. Επινυκτις, *Plinio lib. 20. cap. 6. auctore*, vlcus est aciẽ hebetans, & in oculi angulo perpetuo manans humore. Palpebrarum vitia sunt huiusmodi: Εφύσημα palpebrę laxus est tumor, & dolore vacans, atq; adeo œdematodes, Latini *palpebra inflationē* nominant. Quę certe appellatione Auicennę quoq; interpretes vsus est. Σκληροθαλμία durities est, & difficilis cū dolore ac rubore, citra humiditatē oculi & palpebrarũ, motus. Auicennę *Cresse* appellatur. Ξηροθαλμία est pruriginosus sine fluore palpebrarũ affectus. Latinis nonnullis interpretibus ariditas, siccitasve oculi & palpebrarum, aliis, & quidẽ rectius, arida lippitudo. Ψωροθαλμία pruriginosa palpebrarũ scabies est. Auicennę interpretes scabiem, & pruritum vocat. Πτίλωσις crassities est palpebrarũ callosa rubicunda, quibus

Εκτρέπιον.

ἀγκυλωσί-
φαιον.Λαγωφθαλ-
μοί.
Τράχημα.

σύνωσις.

σύνωσις.
υδάτις.

Χαλάζιον.

Κεῖθν.

πρόδια.
Φθειρίασις.Τεχίασις.
Μαδάρωσις
Μίλφωσις.
Δισυχίασις.

Φαλάγγωσις

Αθίασις.

ἰσπθ.
Nerui visio-
rii vitia.
ἀμείρωσις.

ἀπέρρηξις.

Παρεμπίω-
σις.Σύμπτωσις.
Adnatæ &
corneæ si-
mul vitia.
ἐπίσφαιμα
SuggillatioCicatrice.
Νεφέλια.

Αινωμάτα

Ὠταλγία.

Βαρυκοία.
Synismus.
Surditas.
Vermicu-
lætes aures.
Παρατίς.
Φύρα.
Κυφάλις.
Marmora-
ta.

sæpe etiam pilorum accidit defluuium. Auicennæ *Silac* nuncupatur. Εκτρέπιον palpebræ A
est inuersio propter cicatricem, aut carnis excrecentiam nata. Auicennæ interpretis in-
uersionem palpebræ nominat. Αγκυλωσίς & ἀγκυλωλέφαρον vitium est, in quo palpebræ cū
Albo vel nigro, vel inter se ita coalescunt, vt aperiri oculus non possit. Latinis interpre-
tibus *agglutinatio*, vel *coactio palpebrarum* dicitur. Auicennæ interpreti, inuiscatio palpe-
brarum. Λαγωφθαλμοί sunt, qui sursum retracta palpebra, oculis apertis perinde atq; lepo-
res dormiunt. Interpretes Auicennæ *leporinos oculos* appellat. Τράχημα, interna est palpebra-
rum scabrities & asperitas. Celso *aspritudo palpebrarum* dicitur. Eius duæ sunt species. Nā
vbi sic augetur & intenditur, vt veluti incisuras habeat, σύνωσις Græcis, quod scilicet gra-
norum ficus similitudinem referat, nuncupatur. Latini *ficofam palpebrā* vocant. Vbi vero
inueterata iam in callū abierit, Græcis τύλωσις, Latinis *callosa palpebra* appellat. Τδάτις, pin- B
guis quædā superioris palpebræ substātia est, pondere suo sic grauans, vt vix attollere o-
culum sinat, eoq; assiduas fluxiones excitat, palpebræq; in hoc vitio aquam intercutem
repræsentant. Hinc quibusdā interpretibus Latinis *palpebrarum aquositas* dicitur. Aui-
cenna *Alfarnac* nominat. Χαλάζιον rotundum & translucidum, huc atque illuc mobile in
palpebris est tuberculum. Latinis *Grando* vocatur. Κεῖθν, abscessus est exiguus & oblong⁹,
iuxta palpebræ cilium marginemve ortus. Latinis *hordeolum* nuncupatur, q̄ scilicet for-
ma grano hordei similis sit. Græcis alio nomine πρόδια, quod præputio, quod iisdē πρό-
dia dicitur, similis sit, appellatur. Φθειρίασις priuatim est, quando palpebrarū pilos exigui pe-
diculi infestant. *Pediculationem palpebrarum* nonnulli vocant. Τεχίασις est, vbi pili inutiles,
& oculos pungentes in palpebris enascuntur. Μαδάρωσις καὶ μίλφωσις pilorum palpebræ est C
defluuium. Latinis *glabrities palpebrarum*, Auicennæ interpreti *casus capillorum* nomi-
natur. Δισυχίασις est, vbi sub naturali pilorum palpebræ ordine, alius succrescit ordo. La-
tinis *prauitas aut turbatio ordinis* dici posset. Auicennæ interpretes additos pilos vocat. Φα-
λάγγωσις vitium est, in quo pilorum duplex triplexq; acies, vel in superiore, vel inferiore
palpebra prouenit. Hoc euenit, quando ciliū intrespicit, pilorum acie simul cum eo
inuersa. Phalāgosis etiam interdum dicitur in palpebris relaxatis, vbi naturales pili bul-
bum oculi compungunt. Αθίασις est, vbi in palpebris gignuntur candicantia quædam &
aspera, lapidis instar, oculum prementia, ἰσπθ., vitium existit ab ortu ipso nascens, pro-
pter quod instabiles semper sunt palpebræ. Nerui visorii vitia hæc sunt. Αμείρωσις nerui
visorii obstructio est, in qua omnimoda vel maxima ex parte visus interceptio, absque D
vlla manifesta causa circa oculum apparente, accidit. Pura enim & incolumis vndique
pupilla cōspicitur. Latinis *obfuscatio*, aut *obscuritas visus* appellari potest. Απέρρηξις est, quā-
do meatus a cerebro in oculum descendens ex ictu capitis, vel casu ex alto disruptus est.
Παρεμπίωσις est, vbi in meatum qui in oculum videndi facultatem defert, humor aliquis a-
perto vel rupto vase incidit, eundemque obturat. Latine forte *concidensia* dici posset,
Σύμπτωσις est, quando meatus ille ex rabe vel imbecillitate arctior fit, ac concidit. Latinis
Concidensia forte non inepte nominaretur. Adnatam & corneā simul hæc infestāt vitia:
Τπίσφαιμα & ὑπόπικον malum est, in quo propter ictum quendā fractis aut contusis vas, in-
tra tunicas oculorū sanguis coaceruatur, & in extima oculi parte veluti sanguinis pun-
cta apparent. Latinis *suggillatio* & *suggillata*, recentiorib. *macula oculi*, Auicennæ *Altarsati* E
vocatur. Οἰλαί, hoc est, cicatrices oculi sunt duplices. Nam quæ in summa oculi consi-
stunt superficie, Græcis νεφέλια, Latinis *albugines tenues* dici possent. Auicennæ interpreti
simpliciter *nebula* nuncupantur. Quæ altius radices agunt, Græcis λευκώματα, Latinis *al-
bugines crasse* appellantur. Interpretes Auicennæ albugines simpliciter nominauit.

Vitiis auris brevis enarratio. CAP. XIII.

Ὠταλγία aurium in vniuersum dolor est, qui vel ex phlegmone, vel vlcere, vel abscessu,
vel alia quadam occasione fit. Δυσηκοία & βαρυκοία est difficilis auditus, ἥχος & οὐκ ἰσπθ.
Græcis *aurium sonitum* significat, qui recentioribus tinnitus nuncupatur. Καφωσις, vitium F
est, in quo eger non solum grauius, sed prorsus nihil audit. Latinis *surditas* dicitur, Σκωλη-
κῶντα ὠτα Græci vocant aures vermiculantes. Fit enim in auribus tam tetrum malum, vt
haud secus quam ex corrupto cadauere illic prodeuntes vermes vidēre liceat. Πάφωσις,
phlegmone est, quæ in glandulis prope aures constitutis accidit φήρα, sunt prominētes
& oblongæ in glandulis eminentiæ, vt alibi *susius monstrauiamus*. Κυφάλις & κυφάλη sordes au-
rium

quæ grauiorem auditum reddit. Has quidem aurium sordes Latini *marmorata* nominant, iuniores *Cerumina*. *Θάσις* priuatim contusio & compressio foraminum, quæ in auribus sunt, appellatur. *Θάσις*.

Vitiorum narium explicatio. CAP. XIII.

O *Ζάινα* vlcus est narium profundum ac putridum, ex quo ingratus & foetidus exhalat odor. Sic vero a graueolentia & foetore dicta est. *Πολύπους*, tumor est præter naturam in naribus ortus, polypodis carni substantiæ proprietate assimilis. *Σάρκωμα*, est carnis præter naturam in naribus incrementum. *Μίξα*, humor e naribus fluens, Latinis *mucus*, & *pituita narium* appellatur. *Αιμορραγία* simpliciter & citra alicuius partis adiectione posita vox, sanguinis ex narib. profluuium significat. Alias enim fere semper cum partium, unde sanguis promanat, nomenclaturis cohæret. *Αιμορραγία*.

Vitiorum faciei explicatio. CAP. XV.

E *Φηλς*, est aspreo & nigrities in facie, ex ardore solis pronata. *φάκος*, mascula est faciei nigra, lentis similitudinem obtinens. Latinis *lentigo* nuncupatur. *Ιόνθ*, tumor in facie paruus & durus, ita quidem dictus, quod instar *Ιόνθ*, id est, fimi, faciem conspurcet, ac foeder. Latinis *varius* nominatur. *Ιφελς*.

Vitiorum dentium explicatio. CAP. XVI.

O *Δονταλγία*, omnem dentium dolorem Græcis denotat. *Οδοντισμός*, est pruritus is, qui conceptis iam intra gingiuas dentibus, & erumpere festinantibus sentitur, quo solent infantes relatis ad os digitis identidem eos mordere, & ipsi gingiuas suas confricare. *Οδοντοφυία* puerorum est dentitio, ubi scilicet iam e gingiuis prorumpunt dentes. *Αιμοδία* stupor est dentium, malum sane quotidianum, in quo acerbitate aut aciditate cibi alicuius, præsertim nondum maturi pomi, stupent dentes, nec alios cibos sine dolore commanducare ac conficere possunt. *Παυλς*, est phlegmone, Aetio *lib. 8. cap. 24.* *παυλς*, auctore, partis alicuius gingiuarum, quæ nõ soluta suppurat. *Επυλς* est carnis excrescentia a phlegmone iuxta intimum molarem dentem facta. *Ιπυλς*.

Vitiorum oris expositio. CAP. XVII.

B *Ατερχ* tumor est phlegmonodes sub lingua consistens, pueris potissimum accidens. Ranulam hodie facientes medicinæ vocant. *ἄφθα* vlcera sunt oris non adeo profunda, sed in eius superficie consistentia, igneæ caliditatis quippiam obtinentia. *ἄφθα*. *Barbaram* excolentes medicinam, *Alcolam* appellant. *παιδύμα* Græcis, *tonsilla* Latinis, Galeno *sect. 3. Aph. Comm. 26. teste*, tumores ac phlegmones sunt iuxta Isthmum locorum. *παιδύμα*. Isthmus autem, Galeno *ibidem* attestante, pars est, quæ os & guttur interiacet. Sic vero per metaphoram nominatus est ab iis, qui proprie *Ισθμῖ* dicuntur, ac terræ inter duo maria sitæ angustæ quidem transitus sunt. *Ἀγνάδες* glandularum, quæ in fine oris utrinque linguae appositæ sunt, e defluxu ex capite nati tumores ac phlegmones existunt. Vt inter paristhmia & antiades sit differentia, quam diserte Galenus *lib. 3. de Sympt. causis, c. 11.* iis explicat verbis: *Si in glandulis*, inquit, *quæ in fine oris utrinque sibi inuicem apponuntur, fluxio deriuatur*, *ἀγνάδες* efficit. *Si vero in partes illis adiacentes*, *παιδύμα*. *Σταφυλή*. Gal. *lib. 6. de Comp. med. local. cap. 3. teste*. non columellam, neque eiusdem phlegmonem, ut nonnulli putant, significat, sed quoddam illius vitium, in quo tota columella laxata, extrema sui parte maior est, & liuida, superna vero tenuis, ut similitudinem fructus vuae, unde nomen accepit, præ se ferat. Latini *vuam* vocant. *Συνάγχη* & *τυνάγχη* Græcis, proprie loquendo, non est nisi phlegmone, quæ in faucibus vel gutture sit. Ita vero dicta est, *ὑπὸ τῷ συνάγγχειν*, id est, suffocando, quod exitiosum & acutissimum malum sit, strangulatu præsentaneum vitæ discrimen inferens. Latinis *angina*, barbaram sectantibus medicinam *Squinantia* nominatur. Hippocrates tamen & alii quidam veterum medicorum, omnia vitia, quæ in iam dictis locis accidunt, & quæ spirandi comitatur difficultas, angina nomine complexi sunt. Ceterum angina quatuor sunt differenti. *Vna*, quum fauces phlegmone afficiuntur. *Alter*, ubi neque fauces, neque reliquæ oris partis, neque etiam extremarum partium vlla phlegmone laborare videtur, æger tamen suffocationis periculum in gutture sentit. *Tertia*, quando gutturis partes cum internæ tum externæ iuxta phlegmone infestantur. *Quarta*, ubi ad anteriorem ceruicis regionem vertebræ

luxantur, indeque cauus apparet locus ac dolorem, quum extra tangitur, sentit. Ex recentioribus Græcis Paulus Ægineta inter synanchen & cynanchen, item parasynanchen & paracynanchen discrimen facit, quod alibi etiam indicauimus. Verum Gal. *lib. quarto de Laborantibus locis, cap. quinto, & lib. 3. progn. Comm. 20.* hanc differentiam, utineptam ridet atque conuellit. Et qui anatomes periti sunt, facile animaduertent hoc discrimen temere esse excogitatum. Κυνιδὸς πασμός, oris resolutio est, quam in vtramlibet partem faciei deprauatio sequitur. Nostri seculi Medici torturam oris appellant, quod scilicet in hoc malo os cum quodam motu peruertatur. Αγκυλόγλωσσον, vitium est, quod interdum in vtero adhuc materno degentibus accidit, membranis nimirum linguam continentibus, durioribus & breuioribus statim a prima origine factis. Interdum ex acquisito, ob quampiam cicatricem duriorum sub ipsa ex Vlceris contractam. Qui hoc malo infestantur, tarde sermonem explicare incipiunt. Τεγυλῆς Latinis *blestus* dici potest. Qui hoc vitio laborant, τεγυλὶ Græcis, *Blesi* Latinis dicuntur. Sunt vero, qui certam aliquam literam exprimere nequeunt. Ψέλλοι vero sunt, qui pronuntiando literam vel syllabam, prætermittunt. Latinis *balbi* vocantur. Κατάρρεος vide c. 11. huius sectionis.

Vitiorum Thoracis enarratio. CAP. XVII.

Ασθμα, vitium est, in quo ægrotantes citra febrem crebro respirant, ut solent, qui citatiore cursu fatigati sunt. Qui eo laborant malo, Græcis ἀσματικοί, Latinis *anhelosi*, & *suspiriosi* appellantur. Οξυπνοία, vitium est, in quo nisi recta ceruice, propter suffocationis periculum, ægrotantes spirare nequeunt. Δύσπνοια omnis spirandi est difficultas: proprie tamen, ut *lib. septimo, de Compo. medica, local. cap. ultimo, Galenus testis est*, ea spirandi difficultas, quæ propter crassos & lentos humores pulmonis bronchia obstruentes accidit, dicitur. πνεύσις, proprie membranæ costas, & latera intrinsecus succingentis phlegmone est, Latinis *lateris dolor* interdum appellatur. Neque temere adiectum est. Proprie, quia, ut *Aetius libro octauo, capit. 68. attestatur*, nonnuquam etiam ex crudis, crassis, & lentis humoribus oritur, qui se repente in vacuum thoracis locum ingerunt, atq; sua multitudine latera succingentem membranam distendentes, dolorem inferunt. περιπνευμονία pulmonis phlegmone est, cū febre acuta. αἱμοπθῆσις vel rectius αἱμόπυσις, nihil aliud est Græcis, quam sanguinis reiectio, aut cruenta sputio. Latini sanguinis sputum, & cruentum sputum nominant. Εμπύημα non nisi purulētam excreationem significat. Latini *suppurationem* vocant. Hoc namque in malo in vacuo inter thoracem & pulmonem spatiosus consistit. Qui eo laborant, Græcis ἐμπνοὶ & ἐμπύικοι Latinis *suppurati* & *purulenti* appellantur. φθῆσις, etsi Græcis omnem corporis maciem & diminutionem significet: tamen Hippocrati & aliis Medicis eam tantum extenuationem denotat, quæ pulmonis insanabilia comitatur vlcerata, quam proprie φθῆσις Athenienses, *Galeno sect. 7. Aphorif. Comment. 16. auctore*, nuncupant. Latinis *tabes* dicitur. παλμός Græcis, *cordis palpitatio*, & *tremor* Latinis, motus est cordis deprauatus, in quo præter naturam dilatatur. Medici recentiores haud recte cardiacam nominant. Nam καρδιακή Græcis ad stomachum galamue, quam veteres καρδίαν, ut paulo post fusius ostendimus, vocarunt, refertur, nec aliud est, quam eiusdem morbus & etosio. συγκοπή καρδιακή, ut *lib. 12. Ther. method. capit. quinto, auctor est Galenus*, princeps omnium vitiorum lapsus cordis vitio eueniens existit. Quare ab animi deliquio, λιποθυμίαν Græci appellant, distat. Siquidem in eo non fit omnium virium lapsus, sed tantum spiritus exsoluuntur, manentibus illæsis in iis viribus, quæ cerebro, cordi & iecori sunt congenitæ. Atque hinc est, quod æger in animi deliquio seu lipothymia etiam num audiat, videat, loquatur, agnoscatque præsentem, in syncope minime. Nec diutius animi deliquium durat, nisi quoad noui spiritus fuerint procreati. Ita autem inter se differre syncopen & lipothymiam, loco iam monstrato etiam confirmat Galenus, ubi crudos humores syncopen inferre scribit, quando obstruunt ac onerant. Lipothymiam vero, quando nihil tale efficiunt, sed duntaxat in causa sunt, ut ægrotantes resoluantur. Ut hinc pateat lipothymiam spirituum esse resolutionem: syncopen aut virium lapsum, eo quod spiritus corrumpuntur, aut quia meatus obstruuntur: quorum alterum fit a putridis humoribus, malignis qualitatibus ac venenatis: alterum, quum spiritus concludunt, atq; ne ad partes corporis deliuari possint, impediuntur. απαράνσις malum est, in quo propter lactis redundantiam mam-

A mæ tumefactæ ita distenduntur, vt copiam hanc vix ferre queant. *Θεύβων* vitium est, in quo lac in mammis grumescit, & in casei formam transit. Latinis *grumescencia lactis* dici potest.

Grumescencia lactis.

Vitiorum ventriculi explicatio. CAP. XIX.

K *Ασθία* & *καρδία*, Græcis oris ventriculi dolor, morsus, & punctio existit. Siquidem prius os ventriculi, vt *sect. 2. Aphorif. Com. 17. & lib. 5. de Laborantibus locis cap. 5. & lib. 2. de Placitis Hipp. & Plato.* multisque aliis locis testatur Gal. *καρδία*, id est, cor nominarunt, quod nimirum in cōsensum cor ipsum rapiat. Vitium hoc Hippocrati alio nomine *καρδιαγμός*, id est, *cordis morsus* dicitur. Vt errare plurimum constet medicos recentiores ac barbaram sectantes medicinam, qui *Cardiogmon* pro *cordis palpitatione* vsurpant. *Οξύγυμνα* Græcis non est, nisi id, quod *acidum ructum* Latini vocant. Acidus autem ructus is est, qui acidum præ se fert saporem: qui, vt *lib. 3. de Symptomatum causis, cap. 1. auctor est Galenus*, fit, vbi cibi a frigore, aut pituitosis humoribus in ventriculo corrumpuntur. *ἔγναυς τὸ σπύχον*, vitium est, quod Latinis ab ardore quem excitat, *ardor stomachi* nūcupatur. Sentit namque is, qui hoc malo laborat, *Galeno lib. 8. de Compo. medica. local. c. 3. teste*, multum in gula & ventriculi ore ardorem & calorem. Germanis *der Sodt* vocatur. *Καύμα*, *Galeno sect. 4. aphor. Com. 17. auctore*, ætus est ventriculi: is vero accidit, vbi flaua bilis in ventriculi tunicis effluere scit. Differt itaque ab ardore, quod is ad gulam & os ventriculi, illud autem ad ventriculum pertinet. *Ἀνορεξία* ciborum est incommoda auersio, quam Latini *appetentia amissionem, & abolitam appetentiam* appellant. Hippocrati alio nomine *ἀνορεξία* nominatur. *Κυνόδυσ, ὀρεξίς* contrarium abolitæ appetentiæ malum est, eo namque laborantes, appetentiam cohibere nequeunt. Quapropter in cibis ingerendis modum excedentes, eorum copia grauari, illos paulo post euomunt, atque sic leuati rursus se expleant, ac iterum ad vomitum, perinde atque canes, reuertuntur, vnde Latinis haud secus atque Græcis *canina appetentia* dicitur. *Βέλιμος*, Græcis nihil aliud, nisi ingentem vehementemque famem significat. *β* enim particula aliis adiecta vocibus, earum significationem auget. *κίτλα*, vitium est, quod mulieres vitiosis refertas humoribus infestat, grauidas præsertim. Appetunt vero per hoc maxime acida & acerba, nonnunquam etiam acria, interdum cimoliam terram, cretam, testas, extinctos carbones, aut alios vehementer absurdos cibos. Latinis *pica* nuncupatur, a varietate huius auis plumarum, vel quia hæc ipsa hoc malo sæpenumero laboret, *Απεψία*, vitiū est, in quo nulla penitus ciborum fit alteratio, sed secundum omnes qualitates, tales permanet, quales assumpti sunt. Latini *cruditatem* vocant. *Ανορεψία* fit, vbi in alienam qualitatem cibi permutantur. Deprauatam alterationem & concoctionem Latini nominant. *Βεγδυρεψία* est, quando cibi in qualitatem animanti familiarem, sed longiori tempore, & vix permūtatur. Latinis *stardaconcoctio* dicitur. *Ναυτία*, irritus ad vomitiones conatus existit, Latinisq; *nausea* vocatur. *Αυγμός*, motus existit ventriculi deprauatus, qui est veluti eius conuulsio, ab expultrice facultate noxia extrudere cupiente excitatus. Neque temere adiectum est: Veluti eius conuulsio: non enim absolute conuulsio est, quæ hæc solis musculis accidat. Verum neque ventriculus ipse, neque ipsius ostiolū musculus est, igitur conuulsione corripitur nequit. Latini *singultus* nuncupatur. *συγχοπή σωμαχική* virium est lapsus, vitio oris ventriculi eueniens. *Χολίξ* imodica est ventriculi perturbatio, supra infraque erumpens, vel clarius, est excretio inferne per ventrem, superneque per os euomitio. Plinio aliisque Latinis *Cholera* dicitur. Barbaram sectantes medicinam, *cholericam & cholyricam passionem* appellant. Qui hoc afficiuntur malo, Græcis *χολειώντες*, Latinis autem *Cholerici* nominantur. Per cholericos itaque nequaquam, vt solet vulgus medicorum, biliosos, sed eos potius qui iam dicto malo laborant, Latini intellexerunt. *Κοιλία*, non omnis fluxio ventris Græcis proprie vocatur. Neque enim vbi crudi cibi inferne prodeunt, neque si corrupti, & in alienam qualitatem mutati exeunt, coeliace nuncupatur: sed quæ læuia liquidaque admodum egeruntur, ventriculo præ imbecillitate cibos concoquere nequeunte. Cornel. tamē Cel. *lib. 4. cap. 12. secus atque Græci hanc vsurpat*: Nam in hoc vitio ventrem indurescere, doloreque cruciari, aluumque adeo nihil reddere scribit, vt ne spiritum quidem transmittat.

Vitiorum intestinorum enarratio. CAP. XX.

Δ *ἰσπρία*, copiosius est sine exulceratione & phlegmone alui fluor. Latini *Diarrhæam* Diarrhæa.

- Linteria.** pellatione a Græcis mutuata, nominant. Interpretes aliquot Latini *profluuium alui* vo-
cant: *Διεντυρία* Græcis, vt nomen ipsum satis indicat, vitium est, in quo propter intesti-
norum leuiorem cibi non retinentur, sed priusquam permutatione & perfectam con-
coctionem admittant, dilabuntur, eaque qua assumti fuerunt forma, eiiciuntur. Hinc
- Dysenteria.** Latinis rectissime *leuor intestinorum* appellatur. *Δυσεντερία*, proprie intestinorum exulce-
Tormina. ratio dicitur. Latini *difficultatem intestinorum* vocant. Celsus *lib. 4. c. 15.* tormina, non alia
haud dubie de causa, quam quod in eo malo intestina vehementissimo torqueantur
dolore. nominat. Cruentæ autem dysenteria Gal. *lib. 3. de Symp. causis. ca. 8.* quatuor re-
Cruentæ dy- censet species. Prima, in qua sanguis, propter aliquam partem corporis præcisam, verbi
senteria gratia, crus, aut prioris vitæ exercitationem intermissam, certis circuitibus excernitur,
quatuor ut *fusus in Commentariis nostris super lib. Gal. de Labor. locus quintum ostendimus.* Altera, in qua
species. sanguis aquosus, hoc est, aquæ, in qua cruentæ ac recens maceratae carnes sunt ablutæ, si-
milis, deiicitur. Tertia, in qua & nigrior & splendidior eo, qui naturalis est sanguis, excer-
nit. Quarta, in qua paulatim & breuib. interuallis syncerus, nonnunquã etiã grumofus
cum pure sanguinis, vel ramenti intestinorũ, sæpenumero etiam densum stercus cru-
entis guttis respersum, deiicitur. Atque ea est, quæ proprie, vt diximus, dysenteria no-
Tenesmus. minatur. *Τενεσμός* assidua est, & quæ differri euitarique nequit, desidendi seu egerendi
cupiditas, qua tamen nihil præter modicæ cruenta, vel mucosa, egeritur. Sic dicta *ἀπὸ τῆ*
τένεσσις, quod est conari. Latinis *tenesmus*, barbaris nostri temporis Medicis *tenasmus*
Colicus do- nuncupatur. *Κολικὴ δόνησις*, dolor est, qui in laxiore intestino, quod Græcis *κόλον* dicitur,
lor. excitatur. *ἔλασθ* vitium est, per quod in tenuibus intestinis grauissimi & lethales dolores
nascuntur. Ita a doloris circumactione vocatum. *ἐλκεῖν* enim circumuolui & circum-
agi significat. Hinc rectissime Latinis *conuoluulus* & *voluulus* nominatur. Alio nomine
Conuoluul- Græcis *χόρδα* & appellatur, quod chordæ instar in hoc malo intestina cōuolui videan-
lus. tur. Barbaram excolentes medicinam, *iliacam passionem* vocant. Lumbricorum, quos
Χόρδαψος. Græci *ἐλμινδας* nuncupant, tres in vniuersum sunt differentia. Vna teretum seu rotundo-
Lumbrico- rum: altera latorum: & tertia eorum, quos *ascarides* nominant. Teretes lumbrici a forma,
rum tria quæ omnibus perspicua est, dicti sunt. Nam secundum crassitudinem rotundi sunt, lon-
genera. gitudine vero palmares, & nonnunquã longiores, aliisque frequentiores. Græcis *ἐλμινδαι*
Rotundi. *σέγγυλαι* appellantur. In gracilibus plerumque intestinis consistunt, & ventriculum sub-
eunt, ideoque crebro per eos reiciuntur, quibusdam etiam enaribus redduntur. Atq;
hoc quidem lumbricorum genus infantibus & pueris, atq; iis, qui ad pubertatē iam ac-
dunt, peculiare est. Lati, qui Græcis *ταίνια* & *κέειαι*, quod instar fasciarum & institarum
Lati. lati & longi sint, appellantur. Hinc Latinis *instita* & *fascia* vocantur. Tenia etiam nomi-
Instita, natae sunt, quod per tota circumuoluti extenduntur intestina, ac veluti corona, quæ
Fascia. itidem Græcis *ταίνια* dicitur, in seipsas ducuntur. Incredibilis interdum sunt longitudi-
nis. Nam, ut *lib. 11. c. 33. testis est Plin.* tricenum aliquando pedum visæ sunt, aliquando et-
ασκάριδαι. iam plurium. *Ασκάριδες* tenues & breues, vermibusque similes lumbrici sunt. In recto in-
testino, & in ani extremo magna ex parte inueniuntur. Hæc animalia ventris Hippoc-
Hæmor- vno nomine *ἡμεία* appellauit. *Αιμορροΐδες* venarum in sede partim a porta, partim a caua
rhoides. vena ortarum explicationes ac dilatationes sunt, a crebro sanguinis defluxu sic nomi-
Cæca. natae. Harum quidem alia sunt cæcæ, quæ nimirum intumescunt, & nihil aut parum
Apertæ. admodum sanguinis excernunt. Alia apertæ, quæ scilicet certis quibusdam tempori-
Ρυτίδες. bus panduntur, & sanguinem emittunt. *Ρυτίδες* scissuræ sunt, quæ in musculo anũ clau-
dente, quem *σφιγκτήρ* Græci nominant, aut in circulo & extrema ani corona fiunt, si-
miles iis, quæ in labiis ob Boreæ asperiores flatum accidunt. Latinis *rima sedis* dicun-
Κονδυλί- tur. *Κονδυλίματα* nodi sunt, & callosæ excretiones, vel verius eminentiæ siue excrecen-
ματα. tiæ sedis in callum coactæ: vel vel sunt rugæ circa anum intumescences. Reduplicatis e-
nim ani corpusculis, ruga quædam præter naturam insurgit, & intumescit. Cum enim
sinuosus sit anus, rugas annexas habeat, necesse est. *σύνον*, tuberculum in ano est vlcerof-
sum, rotundum, subdum, rubicundum, & dolorificum. Latini *ficum* & *mariscum* no-
Ficus. minant. Hinc est illud Iuuenalis,
Marisca. *Caduntur rumida medicoridente marisca.*

Proinde plurimum errant interpretes Latini, qui hæmorrhoidas mariscas inter-
pretantur.

Vitiorum iecoris expositio. C A P. XXI.

- A** Iecinorosi, quos Græci *παπιδες* vocant, Galeno libro 5. de laborantibus locis, capite 7. teste, di-
cuntur, qui iecoris facultates imbecillas habent. Vt non sint iecinorosi, nisi quibus iecur amissa aut languente facultate sua irritas proprias functiones obtinet, etiam si nullus neque dolor, neque tumor illis adest. *καχεξία*, Latinis *malus habitus corporis* appellatur. Is vero est, in quo alimenta omnia corrumpuntur. Hic aquarum cutem subeuntium principium existit. *ικτεός* bilis modo flauæ, modo nigræ, per vniuersum corpus effusio est. Sic vero Græcis hoc vitium est appellatum ab *αυε*, quæ illis *ικτεός*, Latinis vero *ictæris*. *galbula* nuncupatur. Hæc enim si spectetur, malum sanari, & auem mori tradunt. Vel, ut aliis placet, ab *αυε*, quæ *ικτεός* Græcis, Latinis *miluus* vocatur. Quippe oculi hoc vitio laborantibus miluinis oculis similes, hoc est, auricolores, videntur. Vel a mustela syluestri, quæ itidem auricolores habet oculos, & Græcis *ικτεός*, Latinis *viueria* dicitur. Atqui parum refert, vnde *ictæris* appellatio deducatur, modo res ipsa cognita sit, perspectumque habeamus, *ictæris* non esse, nisi bilis suffusionem. Latinis alio nomine *regius* vocatur morbus, quoniam mulso, quod genus potionis in regum deliciis erat, curabatur. Vel, quod eo correptos malo, & lecto & conclau cultiore, ludis & lasciuia uti perutile sit, per quæ mens ægrotantis exhilaratur. A Cornelio Celfo *aurigo* nuncupatur, ab auri haud dubie colore, quem bilis per vniuersum corpus diffusa refert. Sunt quibus *arquatus* nominatur, quod cœlestis arcus similitudinem, si colorem eius respicias, habeat. *ὑδρωψ*, *ma-* *Hydrops.* lum est, quod Latini *aquam intercutem* appellant. Eius tres sunt species. Vna Græcis *δυσίτης* *Ascites.* vocatur, & fit, vbi inter peritonæum membranam & intestina, plurimus aquosus humor coaceruatur. Ita vero Græcis nominata est, quod *δυσίτης*, id est, vtrius modo locus, qui inter peritonæum & intestina est, aquoso humore impletus sit. Latini *aquam intercutem vtricularem* nuncupare possent. Barbaricæ medicinæ cultores corrupta vnius literæ adiectione voce, *Asclitem* appellant. *τυμπανίτης* & *τυμπανία*, hydropis species est, qua flatu & spiritus superuacui plurimus in prædicto ventris loco coaceruatur. Hoc autem modo a tympano, omnibus notissimo instrumento, nominata est. Si enim venter pulsetur, tympani instar sonum edit. Tertia species *ἀνασάρξ*, *σαρκίτης*, *ὑπὸ σαρξ*, & *λευκοφλεγματία* dicitur. *Anasarca.* Fit quoties per vniuersam corporis molem humor pituitosus disseminatur, adeo ut instar spōgiarum aut papyri vniuersa caro permadida & laxa appareat. In hac itaq; totum corpus intumescit, ac mortuo simile euadit. *σπληνικοί* Græcis proprie nominantur, quib. *Lienosi.* lien, obstructo, obseptoq; in eo melancholico excremento, aut propter phlegmonem induruit. Latinis *lienosi* appellantur.

Vitiorum renum & vesicæ enarratio. C A P. XXII.

- N**ephritis vox Græcis bifariam accipitur. Vno modo generatim, pro quouis renum vitio. Altero priuatim, pro renum cum vehementi dolore phlegmone, quandoq; vero etiam difficili vrinæ transitu, in qua fibrosa & arenosa cum modico sanguine excernuntur. Pari modo nephritici sunt, qui vel ex renibus quomodolibet laborant, vel qui phlegmone renum afficiuntur. *διαβήτης*, diuturnum est circa renes consistens malum, in quo supra modum ægrotantes sitiunt, atq; subinde bibunt, exuberanter, id quod biberunt, a sua qualitate non mutatum per vrinam reddentes. Aliis *ὑδρωψ* *ὑδρωψ* *εἰς ἀμύδα*, id est, aqua inter cutem ad matulam: nonnullis vero *διάρροια* *εἰς ὕδρα*, hoc est, *urina fluor profluvium* nuncupatur. Latini instar Græcorum *diabete* vocant. *λιθίας*, priuatim renum, aut vesicæ calculus Græcis existit. *στεργυνεία*, vitium est, in quo paulatim & guttatim vrina destillat, atque assiduam ad mingendum irritationem excitat. Latinis *stillicidium vrinae* dicitur. *δυσουρία* vitium est, in quo vrina ægre & difficulter excernitur, Latini *difficultatem vrinae* nominant, *ἰσχυρία* malum est, in quo ægris in totum vrina supprimitur, ac cohibetur. Latinis *suppressio vrinae* appellatur.

Vitiorum genitalium explicatio. C A P. XXIII.

- Φ**ιμωξ & φήμων, vitium est quoddam masculorum, Celsolib. 7. cap. 25. auctore, in quo colis φήμων. glans ita cutis inuolucro tecta est, ut nudari non possit. Contrarium huic malum est, quando videlicet propter cutem decurtatam, aut retro abactam glans tegi nequit. Græcis *περίσπρωσις*, in iō rectius *φωξήμων* dicitur. *Πελαπιδες*, Galen. lib. 6. de labor. locis cap. 6. teste, *περίσπρωσις* est quum genitale, membrum & in longitudine & in latitudine augetur, nullo stimulante ad libidinem aut desiderio, aut acquisito calore. Deducta vero est denominatio a

Satyriasis. Priapo, quem suapte natura huiusmodi pudendum habentem finxerunt & pinxerunt homines. *Σατυρίασις* & *σατυριασμός* varie a Græcis medicis vsurpatur. Primo, pro elephantia, quod nimirum hoc malo correpti Satyris similes sint, ut cap. 5. lib. de causis morborum testatur Gal. ubi inquit, *In elephantia nasus simus, labra crassa, aures extenuata, atque in totum, qui sic laborant. Satyris similes existunt.* Et multo clarius in libello de Tumoribus præter naturam, ubi ita scriptum reliquit: *Hoc malum quum incipit (elephantiam intelligit) satyriasmus vocant, quia Satyris similes facie redduntur.* Dein Satyriasmus, Galeno loco iam citato auctore, pudendi extensionem haud remittentem, accedente quadam palpitatione, denotat. Hoc vero, ut præcedens, a Satyris in Venerem pronis nomen suum obtinuit. Tertio satyriasmus, Galen. ibidem attestante, pro ossium circa tempora eminentia & extuberantia sumitur. Postremo Galenus in libello de Antiquarum vocum Hipp. interpretatione, satyriasmum prominentem glâdularum iuxta aures tumorem esse scribit. *Τονόρρεια*, est seminis præter voluntatem, citraque pudendi lentiginem excretio. Vulgus medicorum deprauata & ridicula admodum voce *Gonorrhæam* appellare cõsuevit: Latini *seminis profluuium*. *ὀνερωγμός*. *ὀνερωγμός*, libidinis & rei Veneræ in somno imaginatio, seminisque per somnum profusio est. *Κήλη* Græcis, *ramex* & *hernia* Latinis, Barbaris medicinæ auctoribus *ruptura* dicitur. Fit vero variis modis, perque adiectiones rerum opplentium varias etiam appellationes accipit. Si enim peritonæo rupto intestina in scrotum deuoluuntur, *ἐντερικήλη* Græcis, *ramex intestinorum* Latinis nominatur. Vbi vero intestina supra in inguinibus hærent, *βοβονομήλη* Græcis, *inguinalis ramex* Latinis vocatur. Quod si otiosus & aquosus humor in parte aliqua membranarum scrotum implicantium colligitur, *ὕδερικήλη* Græcis, *aquosus ramex* Latinis nominatur. Quum vero intra testium tunicas dura increscit caro, *σαρκικήλη* Græcis, *carnosus ramex* Latinis appellatur. Si autem omentum in scrotum delabatur, *ἐπιπλομήλη*, hoc est, *omenti ramex*, nuncupatur. Si simul cum omento intestinum quoque descendat, *ἐπιπλοσεντερικήλη* Græcis, *omenti & intestini ramex* Latinis vocatur. Vbi venæ, quæ testiculos nutriunt, varicum modo repletæ glomerantur, Græcis *κυρσικήλη*, Latinis *varicosus ramex* dicitur.

Vitiorum uteri expositio. CAP. XXIII.

Fluor muliebri. *Πῶς γυναικεῖ*, fluor muliebris diuturnus, quo totum corpus sese per vterum expurgat, dicitur. Talem vero speciem id, quod per eum vacuatur, repræsentat, qualem humor ipse in corpore superas. *Πιζή ἐς ἐντὴν*, uteri ad superiora retractio est. Latinis *strangulatus* seu *præfocatio* uteri appellatur. *Μύλη*, *Aetio* & *Paulo* testibus, induratus est tumor, interim in uteri ostiolo, interim in ipso vtero prominens, ad tactum fere lapidosus: Galeno autem lib. 14. *Therap. meth. cap. 13.* caro informis in vtero consistens ita nuncupatur. Latini *molam* nominant. *Μύσις ὑστέρως* malum est, in quo margines ostii muliebris coeunt, inuicemque cõnuiunt. Latinis *præclusio uteri* dicitur. *φίμω* & *φίμωσις* osculi aut ceruicis uteri obturatio, coarctatio, compactioque est, ab exulceratione vel phlegmone indurata præcedente eueniens, quæ ea loca tam angusta redduntur, ut virile semen amplius non admittant, vel si admiserint, tamen non retineant. Præter iam commemorata, multa alia uteri sunt vitia, ut est phlegmone, cancer, scyrrus, condylomata, rhagades, & id genus aliarum partium communia mala, de quibus non est cur hoc loco priuatim dicamus, quod nimirum de iis in superioribus sit dictum: vel saltem in iis, quæ sequuntur, capitibus abunde tractabitur.

Vitiorum quæ in articulis accidunt, enarratio. CAP. XXV.

Anthritis. *Ἀρθρίτις*, proprie est, ubi imbecillitas in omnibus corporis articulis consistit, humorque a natura alienus ad eosdem confluit. Generatim tamen pro omni articulorum dolore vsurpatur. *Ποδάγρα*, est ubi imbecillitas atque humoris a natura alieni defluxio pedes occupant. *Ἰχίς*, grauissimus est dolor, qui iuxta articulum Græcis *ἰχίον*, Latinis *coxam* vocatam, euenit. Latinis perinde atque Græcis *ischias* dicitur. Idem tamen vna coxendicis appellatione interdum & locum, & dolorem nominant. Barbari decurtata & deprauata dictione *Sciaticam*, hoc quoque vitio correptos *Sciaticos* nuncupant. Rectius facturi, si *Ischiadicos* vocarent.

Tumorum præter naturam, & ulcerum explicatio. C A P. XXVI.

- A** **Φ**λεγμονή, vox Græcis bifariam sumitur. Generatim pro omni calido & dolorifico cum feruore tumore. Qua quidem in significatione idem Græcis, quod φλόγῃς denotat, quam Latine licet inflammationem aut efferuescentiam appelles. Hac sane ratione erysipelas, herpes, & carbunculus phlegmones dici possunt. Eo in significato ab Hippocrate, & aliis veteribus hanc vocem esse usurpatam constat. Proprie autem phlegmone, supra efferuescentiam & inflammationem, tumor est rubens, dolens, tendens, & tactui renitēs, ut libr. 13. Ther. meth. c. 1. Galenus docet. Vt itaque Latini interpretes hanc differentiam exprimant, præstat φλόγῃν inflammationem interpretari, & alterum tumorem, a Græcis mutata nomenclatura, phlegmonem vocare. ἔρπης, malum est, vbi tenuior flaua bilis sola & pura nulloque infecta alio humore, excreta in aliquā particulam decumbit. Latinis, itidē ut Græcis Herpes generis nomine, & simpliciter appellatur. Quod si bilis hæc substantia crassior acriorque fuerit, totam cutem ad subiectam vsq; carnem exulcerat, nominaturque Græcis ἔρπης ἐξιδύμειν, Latinis Herpes exedens. Si vero tenuis, & minus acris calidaque fuerit, exiguas pustulas milioque similes per summam cutem excitat, ob eamque similitudinem Græcis μυχγίαι ἔρπης, Latinis Herpes miliaris dicitur. ἑρυσίπτελος Græcis, Ignis sacer Latinis, Galeno lib. 2. ad Glauconem teste, geminum existit, non exquisitum, & exquisitum. Non exquisitum quidem tumor est ex feruente tenuique sanguine conflatus: vel ex sanguine & flaua bile calidiori, quā oporteat, mista fluxio. Quod si vero ex biliosa fluxione, vel sola bile nascatur, & parū infestet, ac per solam cutem diffusum fuerit vitium, nihil subiectam carnem molestant, quod quidem sæpius euenire solet, exquisitū erysipelas nominatur. Quod igitur subiectam carnem attingit, neque ex tenui solum bile consistit, non simplex erysipelas, sed iam affectus permixtus ex erysipelate & phlegmone existit, atque ab eo, quod in mistura exsuperat, nomen accipit. Si enim propria erysipelatis symptomata in eo exsuperant, ἑρυσίπτελος φλεγμονώδης, hoc est, erysipelas phlegmonosum nominatur. Si vero phlegmones symptomata superant, φλεγμονή ἑρυσιπτελατώδης, id est, phlegmone erysipelacea vocatur. Quod si neutrius symptomata exsuperauerint, sed æqualia fuerint, tunc erysipelas & phlegmone mista esse dicuntur, ut fusi in nostris annotationibus super librum 14. Galeni de medendi ratione, cap. 1. & 2. monstrauimus. ἄβρξ est, vbi sanguis crassus & feruescens in aliquam corporis particulam decumbens, cutim excusserit. Latinis carbunculus appellatur. Errant itaque plurimum recentiores & barbaram excolentes medicinam, eo quod anthracem & carbunculum diuersa esse corporis vitia tradunt, ut copiose admodum lib. 2. Parad. cap. 18. monstrauimus. Qui Arabum sectantur placita, idem malum prunam & ignem Persicum nominant. Incipit plerumque a pustula, interdum vero sine pustula. Qui hoc vitio corripiuntur, particulam laborantem omnino scabunt, vnde mox orta pustula quædam rumpitur, eaque rupta vlcus cum crusta gignitur. Οἰδήμα, proprie laxus quidam mollisue & dolore vacans tumor est, ex pituitoso humore in particulam aliquam influente exurgens. Latinis similiter ac Græcis Oedema dicitur. Barbari corrupta, ut solent, voce undimiam nuncupant. Hoc quidem modo a Galeno & aliis, qui hunc ætate sequuti sunt, Medicis usurpatur. Generatim autem oedema, omnem præter naturam tumorem, adeoque idem, quod ὄζυς, significat. Quo quidem modo ab Hippocrate sumitur, quod multis etiam in locis suorum Commentariorum testatur Galenus. Σκίρρῃς, Galeno auctore, duplex est. Exquisitus, verus, legitimusque, tumor est durus, sensus & doloris expers. Hicque omnem respuit curationem. Non exquisitus tumor quidem est perdurus, non tamen sensus omnino expers. Καρκίνῃς & καρκίνωμα inæqualis, liuescens, aspectu teter, & perpetuo fere dolore affligens est tumor. Cancer Latinis vocatur. Hanc autem nomenclaturam, ram Græci, quam Latini huic vitio a cancro fluuiiali indiderunt. Siquidem in eo implentur, & intenduntur venæ, cancerum pedibus a glomerē illo corporis descendantibus per similes. Nonnulli vero inde sic dixerunt, quod difficilime ab iis partibus, quas obfedit, euellatur, quemadmodum cancer fluuiatile animal. Constat n. hunc loco, quem semel apprehendit, quod illi pertinaciter adhæreat, facile auelli non posse. Quod si in partibus corporis in conspectu positis, ut sunt mammae, & id genus aliae, eueniat cancer, Medicis euident ac manifestus nominatur. Si in penitioribus & latentibus corporis partibus, sede nimirum, palato, & sinu muliebri nascitur, occultus appellatur. ἑλεφας & ἑλεφαντίας, vniuersi corporis cancer est, Latini elephantiam vocant. Sic vero malū hoc nomina-

Phlegmonē
ne gene-
ratum.

Phlegmonē
ne pro-
prie.

Herpes.

Herpes
exedens.

Herpes
miliaris.
Erysipelas.

Erysipelas
exquisitū.

Erysipelas
phlegmo-
nosum.
Phlegmo-
ne erysi-
pelacea.

Anthrax.
Carbun-
culus.
Recentio-
ram Me-
dicorum.
Pruna.
Ignis Per-
sicus.

Oedema
proprie.

Oedema
genera-
tim.
Scirrhus.
Exquisi-
tus.
Non ex-
quisitus.

Cancer.

Cancer eu-
idens.

Occultus.

tuin est, quod in eo cutis corio elephanti persimilis videatur. Nam maculis quibusdam
ad atrum colorem vergentibus inficitur, inæqualiterq; aspera, crassa, & veluti squamis
fœda, liuens, ferinaq; redditur. Dicitur alio nomine Galeno, *ut supra est expositum*, Saly-

Leontiasis riasis, aliis *Leontiasis*, a buccis & superciliis protuberantibus & flaccidis. Vnde omnibus perspicuum euadit, elephantiasin Græcis non esse aliud vitium, nisi id, quod Arabibus

lepra nuncupatur, ut li. 2. Parad. c. 16. demonstrauimus. Nec temere dictū est Arabū, quippe

Græcorū λέπρα malum multo mitius est, nec a scabie multum dissimile. Nam lepra profundius circularibusque erosionibus cutem depascitur, & piscium modo squamulas ex se remittit. λέπρα vero superficiem tantum & summam corporis cutem variis figuris ex-

edit, & furfuracea magis ex se corpuscula edit. *Aciditas* vitium cutis est, quod celeriter in le-
pram & scabiem, Paulo atrestante, transiit, asperitudinem in ea quandam pariens. Lati- B

nis impetigo nuncupatur, Germanice *Flechi*. Cornelius Celsus *lib. 5.* lichenas papulas, & lepram impetiginem conuertit, quod euitandę confusionis ergo hoc loco monendum esse duximus. Fufius autem eadem de re *lib. 2. Parad. cap. 17.* fcripfimus. Ceterum Galen.

lib. 5. de compoſi. medi. localium, cap. 7. foediffimæ cuiuſdam menti impetiginis meminit, quę pruritum excitat, & laborantes affligit, atque in diſcrimen non mediocre adducit. Nam interdum per vniuerſam faciem ſerpit, & ad oculos vſque procedit, & fere ſupremæ de-

Mentagra formitatis causa efficitur. Quæ quidem impetiginis descriptio, mentagræ Plinii per
Plinii. omnia conuenire videtur. Vt hinc palam fiat, feram impetiginem a mentagra non esse

diuersam, quæ tamen a mitiore impetigine plurimum differt. Nō parum autem errant, qui foedissimam hanc impetiginem, *mentagram* a Plinio appellatam, morbum eum esse C

arbitrantur, quem hodie vulgo *Gallicum*, *Neapolitanum*, aut *Hispanum*, vel, vt alii, *citra nationum odium & iniuriam*. Venericum nominant. vt *fufius lib. 2. Paradox. cap. 17. diximus*. Et

Vitiligo. quum hoc loco in vitia cutis inciderimus, præstabit singula alia subiecisse. *Vitiligo*, tædus cutis color est, ex malocuiusdam particulæ habitu proveniens, quæ nutrimentum sub-

Leuce. probe assimilare nequit. Huius quidem duæ sunt species. Vna Græcis λευκη dicitur, quod scilicet in ea color cutis ad candidum mutetur. Hec non sanum curam in se habet, sed alijs

scilicet in ea color cutis ad candidius mutetur. Hęc non tantum cutem inñcit: sed alius descendit, adeo vt carnem quoq; ipsam contingat, ac pilos coloret, qui in ea cani & lupini similes enascuntur. Iste in his hanc formamque Graecis λέω & λεύκητιλεον ούκ

nugini limiles enalcuntur. Latinis haud lecus atque Græcis *leuce*, & *alba vitiligo* nuncupatur. Quare errore non vacat, quod Latini Galeni & aliorum Medicorum Græcorum

interpretes, λευκὴν speciem passim generis voce *vitiliginem* conuertunt. Auicennæ & aliis Punicis fere omnibus hæc species *Alboras* nominatur. Altera vitiliginis species, Græ-

cis ἀφ' ὧν vocatur: cuius quidem generatio, etsi eiusdem cum leuce modi est, tamen carnem non attingit, nec in profundum descendit, sed summam tantum cutem inficit, cui

veluti squamulæ quædam vitiligines ipsæ infixæ adhærent. Latinis *alphos* perinde atque Græcis dicitur. Et sunt quidem Alphi duplices: albi, qui ex pituita: & nigri, qui ex me-

lancholico humore oriuntur. Sic autem hoc vitium appellarunt Græci, quod cutis colorem immutet. Quippe *ἀλφάνη* iisdem immutare significat. Hinc recte a Phauorino

scriptum est, ἀλφὼν πάλιν τὰ ἐν ἡλλάδι τῶν χειρῶν, dici. Avicenna & reliqui Arabes Morphea. Stigmata. pheam vocant. Στίγματα Græci inter vitia cutis numerant, & sic nominant non puncta.

sed maculas punctorum quantitate & forma, hominis cutem & superficiem decolorantes ac variantes. Vulgo *vermicata* appellantur. *ra' y saava*, malum est, in quo pars laborans

propter magnam phlegmonem emoritur, nondum tamen prorsus mortificata est. Latini instar Græcorum *Gangrenam* nominant. σοάειν autem Græcis malum dicitur, in

quo pars laborans, ob phlegmones magnitudinem, in totum & perfecte emortua, ac sensu vitæque destituta existit. Latini *Syderationem* nuncupant. Præterea *ut in libello de*

tumoribus præternaturam, Galenus auctor est, syderatio solidarum partium corruptela est, adeo ut nedum carni & vasīs, sed etiam ossibus in nascatur. Gangræna vero solidarum

Δσθίλω. corporum mortificatio est, sed ossibus non aduenit. Δσθίλω, phlegmonosus est tumor, et crassis humoribus in carnis partibus consistens, miris quidem, quum in sola cute coe-

Γάγγλιον. rit: malignus autem, ubi in altum radices fixerit. Latinis *furunculus* dicitur. Γάγγλιον ἐστὶν
peruorum concretio seu tumor, ex ignis aut lassitudine, in pluribus quidem corporis

Bubôn. huiusmodi concretion seu tumor, ex sanguinis aut lymphæ, in pluribus quidem corporis partibus, præsertim motui dicatis, nempe summis manibus & pedibus obortus. Auicenna glandulam vocat. *gūlân* tumor seu phlegmonæ est glandularum in discrimine sita

- A** guinum tantum glandulas tumefactas ac phlegmone affectas cōtrahunt. Latinis vitium hoc perinde, atque Græcis *bubon* dicitur. Vacat periculo, vbi propter ictum aut vlcus, quod in ceruice, capite, manus aut pedis digitis, vel vicina aliqua parte natum est, oritur. Periculosum vero, si per pestilentiam ingruit. *ῥοιγῆδες*, sunt glandulæ induratæ, vel, *ut Galenus lib. 13. Ther. method. cap. 5. definit*, duriores glandularum phlegmones sunt. In collo, alis, & inguinibus præcipue consistunt, vbi glandulæ vasis substratæ collocantur. Latini *strumas* nominant. Barbaram sectantes medicinam scrofulas a suis multiparis animantibus (numerosæ enim sobolis existunt, vt sues) atque eo vitio frequenter laborantibus mutuato nomine appellant. Scrofæ etenim, id est, sues colla habent glandulosa & magna ex parte strumola. *Φύμα* Græcis, *tuberculum* Latinis vocatum, bifariam accipitur. Generatim pro omni præter naturam e quacunque corporis parte erumpente tumore, *quemadmodum lib. 6. Epid. sect. 1. Comm. 12. Galenus testatur*. Quo utiq; modo a Paulo *lib. 4. cap. 22. usurpatur*. Speciatim pro glandularum phlegmone, quæ cito augetur, & ad suppurationem accelerat. Quæ in significatione a Galeno *lib. 2. ad Glaucon. cap. 1. accipitur*. *Φύγελλον*, Celsi *lib. 5. c. 28. auctore*, tumor est glandularum nõ altus, sed latus, in quo pustulæ quiddam simile est, panis similitudinem habens. Hinc est, quod tumorem illud Latini, Plinius maxime, *Pannum* nominent. Galenus loco paulo ante citato phygethlon in glandulis phlegmonodes erysipelas aut phlegmonem erysipelatofam esse, scriptum reliquit. Vt hinc pateat, aliud illi phygethlon, quam Celso, esse vitium. *Ἀπὸστημα* & *ἀπόστημα*, est vitium, in quo ab inuicem distant, quæ prius se contingebant, corpora. Spatium enim vacuum in medio relinquitur, quod substantiam quampiam vel flatuosam, vel humidam, vel ex vtrisque mistam comprehendit. Excoriat itaque hæc circumposita corpora, spatium videlicet sibi moliens vel inter duas tunicas, vel sub certis membranis. Latini *abscessum*, vulgus *exituram* appellat. Ceterum inveniuntur in abscessibus, vbi aliquamdiu perdurauerint, quum scalpello diuiduntur, proprietates, quædam non paucæ, non humorum modo, sed etiam solidorum quorundam corporum. Siquidem vnguibus, pilis, ossibus, testis, lapidibus, carbonibus, arenis, lignis, pororum fragmentis, limo, & sorditiei balnei, sæci, & amurcæ similia inuenta esse, Galenus etiam memoriæ prodidit. Quod quia vulgus ignorat, ideo incantamentorum vi, ac nescio quarum magicarum artium potentia hæc omnia esse procreata iudicat. Quapropter superstitione impulsus, ad magicas quoque curationes concurrit. Porro ab abscessu duplex genus est. *Vnus*, vbi phlegmone in pus conuersa, pus ipsum tanquam in sinu aliquo collectum continetur. *Alter*, quum nulla præcedente phlegmone, humor aliquis statim initio in parte aliqua coaceruatur. *Ἀπόστημα*, est, vbi humores loco quem prius infestabant relicto, ad alterum confluunt. Latini interpretes nonnunquam decucitum, interdum illapsum humorem ab vno in alium locum appellant. *Ἀθήρωμα*, abscessus est concolor & indolens, in membrana, seu nervosa tunica, lentum humorem pulvis similem continens. Neq; enim *ἄθηρα* vox Græcis aliud, quam pulvem, quæ ex farina decocta conficitur, significat. *Μελικεῖς*, abscessus est, in quo humor tenuis, & mellis substantiam referens continetur. Nonnullis Latinis *mellisanius* nominatur. *Στεάτωμα*, abscessus est, in quo humor seuo per similis, membrana inclusus subest. *Εμφύσημα*, est flatuosus spiritus alias sub cute, alias sub membranis, quæ ossibus circumfunditur, aut musculos, visceraq; aliquod ambientibus coaceruatur. Porro colligitur aliquando non parum et in ventriculo & intestinis, itemq; in medio spatio horum & peritonæi. Latini *inflationem*, vulgus Medicorum *apostema ventosum* vocat. *Επινυκίδες*, Paulo *lib. 4. cap. 9. teste*, sunt vlculicula sua sponte erumpentia, pustularum specie, & subrubra, quib; apertis cruenta sanies defluit, per diemq; non magnopere excruciant, per noctem vero graui magis, q̃ pro ratione vlceris dolore torquent. Celsus *lib. 5. c. 28. Epinyctides*, inquit, *pustulae sunt pessima, colore vel subliuido, vel subnigro, vel albo faba magnitudinem non excedentes in eminentibus partibus. vel in tibiis, & pedibus, maxime nascentes*. Circa has vehemens inflammatio est, & vbi apertæ fuerint, intus reperitur exulceratio mucosa, color est humori suo similis, dolor vero ex eis, supra earum magnitudinem est. Nomen acceperunt a nocte, vel q̃ interdum nõ multum, noctu vero grauiore dolore torqueant, vel, *ut Celsus voluit*, quod noctu fere oriantur. *Ἰδρωα* Græcis, *sudamina* Latinis, Plinio *papula sudorum*, Galeno *sect. 3. aphor. Comm. 21. teste*, ex sudamine genere sunt pustularum in summa corporis parte hæretium, quæ instar vlcerum cutem ex-

Strumæ.

Phyma.

Φύγελλον.

Pannus.

Απόστημα.

Abscessus
Exitura.

Abscessus
duplex ge-
nus.

Decubi-
tus.
ἀθήρωμα.

ἰδρωα.
μελικεῖς.

στεάτωμα.
ἐμφύσημα.

Inflatio.
ἐπινυκίδες.

Sudamine.
ἰδρωα.

asperant, proueniuntque, vt & nomen ipsum indicat, ob multos sudores, vel biliofiores, vel mordaciores, qui cutem mordent, & pruriginosam reddunt, ac per modum vicerum exasperant. *Φλύκταιναι* & *φλυκτίδες* generatim, exiguae sunt pustulae, veluti bullae, similes iis, quae in corpore a feruida aqua torrefacto contingunt. Hippocrati *φλύκταιναι* dicuntur. Singulae vero appellationes *ἀπὸ τῆς φλύκταιναι*, hoc est, *ab ebullitione & feruore sunt factae*. *ὑδράνες* & *ὑδράρες*, pustulae sunt parum supra summam cutem eminentes, bullis, quae ab igne excitantur, persimiles. Hae in capite praecipue nascuntur. *Ἐξανθήματα* Graecis generatim omnes sunt pustulae siue eruptiones sponte in cute florentes, sic dictae, quod turgentium ad florem in stirpibus gemmarum modo tumeant. Hippocrates 3. *Epid. libro* *ἐξανθήματα*, *ἀπὸ τῆς ἐκπύσεως*, hoc est, ab erumpendo, quod scilicet sua sponte a cute erumpant, in eaque florent, vocauit. Plinius *papulas*, & interdum *pituita eruptiones* nominat. Interpretes aliquot Latini *pustulas* appellant. Sunt autem duplicia exanthemata: praestat enim maioris perspicuitatis gratia, Graeca vti nomenclatura. Quaedam enim sunt sublimia, a calidiore ac tenuiore humore facta, pruritumque excitantia. Eius quidem generis sunt, quae in puerili aetate, maxime eueniunt atque erumpunt, & quas vulgus Medicorum, & barbaram excolentes medicinam, variolas, Germani *Kindtsblattern* nominant. Quaedam sunt lata & humiliora, a frigidiore ac crassiore humore orta, neque pruritum concitantia. Cuius utriusque generis sunt, quae itidem in pueris maxime erumpunt, ac recentioribus & barbaris Morbilli, Germanis *die Kindtsflecken* appellantur. *Τέρμινθος*, tumor est praeter naturam, siue enascentia nigri coloris, in tibia maxime consistens. Sic autem Graeci hoc malum dixerunt, quod in figura, colore ac magnitudine cum terebinthi fructibus similitudinem habeat. Paulus ex Orbasii sententia, Terminthum tuberculi speciem esse asserit, cui pustula nigra supra infraque adiacet, qua rupta, id quod subiacet, desquamato simile apparet, quo quidem dissecto, pus deprehenditur. Dioscorides autem Alexandrus, terminthum esse tradit eminentiam in cute consistentem rotundam, nigrouidem, terebinthi fructum referentem. *Θύμος* turgida quaedam est excrescentia, aspera, subrubra, oblonga, nunc in glande, nunc in praeputio, nunc in ipsa sede consistens. Sic autem Graecis vitium hoc nominatum est, quod thymi corymbis simile sit. Celsus *Thymion* appellat, sicque vocari scribit, quod super corpus, quasi *Verrucula* eminet, ad cutem tenue, supra latius, subdum & in summo perasperum. Idque summum colorem thymi floris repraesentare, & ei nomen inde esse tradit. Thymorum autem alii mites, alii maligni sunt. Mites exiguae sunt carnes, inaequales, eminentiis sensum latentibus, scabrae, colore candidae, aut subrubrae, dolore carentes. Maligni autem siue feri, scabriores amplioresque sunt, faeculentis, liuidi, dolorem inferentes, manuum praesertim tactu. De quibus fusius Aetius *lib. 14. cap. 4. tractat*. *Μυρμηκία* & *ἀνερχομένη*, tumores sunt exigui, seu humiles excrescentiae, callosae, & magna ex parte rotundae, quae instar monticulorum quorundam in cute eminentes, conspiciuntur. Latini apposite *verrucae* appellant. *Verruca* enim proprie editiorem montis partem significat. *Μυρμηκία* tamen, proprie verruca est ampla radice, seu latiore basi, & coactio capite constans, & quasi sessilis, similem vellicantis formicae sensum, dum atrectatur, inducens. Latinis *formica* nominatur. *Ανερχομένη* autem pensilis, & tenui angustioreque prope cutem basi est verruca, vt chordae nexu suspensa esse videatur. Hoc est, rotunda quaedam in cute eminentia seu excrescentia, quae basim, id est, partem imam ad cutem & radicem angustam habet. Latini interpretes, *verrucam pensilem* vocant. *ἄλσος* verruca est rotunda, alba, clauorumque capiti similis. Hinc Latinis *clauus* nuncupatur Germanis *Hünnerg*. In calcaneis & pedum plantis maxime nascitur, in gradiendo dolorem atque impedimentum afferens. A clavis non magnopere differunt calli, quos Graeci *πύλας* nominant: nisi quod per se dolore vacant, eodem quo cutis colore. Neque sponte, sed ex labore obturata cute gignuntur. *Πτερυγιον*, carnes iuxta ungues, tum manuum, tum pedum, partem eorundem operiens incrementum est. *Παρονυχία*, tumor circa unguis consistens est, quem Barbari nostrae aetatis Medici corrupta voce, vt alia multa, *Panaritium*, Latini *redunias* nominant. *Κίσθος* & *ιζία* tumor seu dilatio venarum a crasso sanguine facta, Latine *varix* appellatur. Fit aliquando in temporibus, nonnunquam in ima ventris parte sub umbilico, interdum etiam circa testes, frequentissime autem in cruribus. *Θλάσμα* fit, quum caro vel ossium aliquod molle sub irruente extrinsecus aliquo violento, valido, & duro corpore colliditur.

Φλύκταιναι.
φλύκταιναι.
φλύκταιναι.

Ἐξανθήματα.
ἐξανθήματα.

ἐκπύσεως.
ἐκπύσεως.

Papulae.
Pustulae.
Exanthemata.
Exanthemata.
Sublimia.
Variolae.
Latae.

Morbilli.
Terminthi.

Thymus.

μυρμηκία.
ἀνερχομένη.

Verruca.

Clauus.

Πτερυγιον.
Παρονυχία.
Κεδυνία.

Θλάσμα.

- A** collidit, ut partis læsæ externa facies integra permaneat, & in profundo sint multæ par-
 uæ diuisiones. Latinis *contusio* & *collisio* dicitur. *Εκχύμαμα* & *ἐκχύμασις* sanguinis est subter cu-
 tem effusio & coitus, Latini *effusionem* nominare possunt. Plurimum vna cum contusio-
 ne & ruptione incidit. Ecchymomatis species sunt *ἰσώπια*, quæ Latinis *sugillata* nuncu-
 pantur: & liuores, ex ictu prouenientes, Græcis *ὑποσφάγματα*, Latinis *vibices* vocantur.
Ανόισμα, tumor tactu blandus est, digitisq; cedens, e sanguine & spiritu contractus. Vel,
 ut Galenus definit, tumor ex vulnere arteriæ, tum oriens, quum incumbens ipsi arteriæ
 cutis ad cicatricem peruenerit: verum arteriæ vlcus, neque concreuit, neq; cicatricem
 recepit, neque carne obductum est. Barbaris deprauata admodum voce *Emborisma*, &
mater sanguinis nominatur. Apud Græcos nomen ab arteriæ dilatatione accepit. *Χείματα*,
B vlcera sunt, quæ hyberno tempore in manuum pedumq; digitis, nec minus in postero-
 ri calcaneo oriuntur, Latinis *permones* appellantur. *Νόμη*, vlcus est, cuius malitia adeo in-
 crescit, ut non modo ulceratas, atq; corruptas carnes, sed etiam sanas absumat depopu-
 leruræ. Latinis interpretibus *vlcus depascens* nuncupatur. *Φαγεδύνα*, vlcus est, quod huc at-
 que illuc serpendo curim ac subiectam illi carnem, sed extimam tantum & in superficie
 constitutam depascitur ac rodit. *Κακοήθη ἔλκη*, vlcera sunt ægre sanabilia, dolosa, malefica,
 contumacia, rebelliaue. Hæc si inueterata fuerint, & vix curationem receperint, cicat-
 tricemque difficilime contraxerint, *Χηρόνια*, quod propter suam malitiam Chirone me-
 dicinæ olim peritissimo, & Achillis præceptore indigeant, dicuntur. *Τελεφία*, vlcera sunt
 tātæ malignitatis, ut salutarem Achillis manum requirāt. Quippe Telephus Midorum
C rex huiusmodi vlcere consensuisse fertur, nec nisi noua medendi ratione ab auctore
 vulneris Achille sanari potuit. Quod Ouidius iis versibus pulcherrime expressit:

Vulnus Achillæo quæ quondam fecerat hosti,

Vulneris auxilium Pelias hasta tulit.

- Θηράση** vlcera sunt, quæ asperius sæuiunt. Latinis ferina a feritate vocantur. *Κόλπο*, vlcus
 est profundum & cauernosum, quod Latini *sinum* appellant, fit, quum adiacens vlceri-
 bus cutis multo spatio a subiectis corporibus separatur, ut coalescere ei nequeat. *Σύεργε*,
 arctus, oblongus, & callosus sinus existit. Latinis *fistula* nominatur. Sic vero metaphora
 a fistulis ex arundine, aut alia quapiam materia confectis sumpta, dictam esse nemo igno-
 rat. Nam in ea cavitates quædam deprehenditur arundinum cavitati similis. Magna ve-
D ro ex parte accidit, quando pus in abscessibus sic particulam excoriat, ut continentia a
 subiectis separet, & diducat. *Υπόνομα*, vlcera sunt, quæ pluribus transuersisq; itineribus,
 quasi canalibus per latitudinem putrescunt. Latini *cuniculosa* vocant. *Παρατέματα*, quæ Pli-
 nius attrita nominat, fiunt atterentibus, & vrentibus in itinere pedes angustis calceis,
 confricatisq; longa equi uestione feminibus, & in summa, ex mutuo partium inter se af-
 frictu nascuntur. Latini *intertrigines* nuncupant. Atq; hæc de vocibus, quibus vitia cor-
 poris significantur, dixisse, sufficiat.

INSTITUTIONVM MEDICINAE

LIBER QVARTVS.

LEONHARTO FVCHSIO AVCTORE.

DE SIGNIS MEDICIS SECTIO I.

De utilitate signorum. CAP. I.



- P** R I O R E libro eam medicinæ partem, quæ res præter naturam appellatas,
 inquit, & a Græcis *ἀνωρομένη* & *παθολογική* vocatur, absoluimus. Nunc
 ordinis ratio exposcit, ut eam partem, quam iidem *σημειοποιή* nomi-
 nant, breuiter percurramus. Sic vero appellant, ut lib. 1. etiam est dictum,
 quæ signorum rationem tradit, quibus præterita cognoscimus, præsentia
 inspicimus & futura prædicimus. In qua quidem medicinæ parte perdiscenda, Me-
F dicus strenuam nauare operam debet, quod nimirum nulla propemodum alia medici-
 næ pars ea dignior vtiliorque sit. Siquidem latentes affectus præsentis dignoscere, &
 quæ præcesserunt tanquam præsentia essent, commemorare, ac quæ post longum tem-
 pus futura sunt, prædicere, est quasi diuinam artem profiteri. Vtilis quoque multis mo-
 dis est signorum cognitio, & ad omnia Medici officia summopere necessaria. Quip-

Signorū
utilitas.11. Ther.
meth. c. 9.
2. Aph. 29.

1. Prog. 1.

pe ea medicinæ pars, quæ signorum rationem docet, tum sanitatis, tum morborum no-
tas tradit, quæ Medicum, quasi in rem præsentem ducunt, illiq; omnia iam dicta ob ocu-
los ponunt. Cum itaq; sine iis notis, nec ea, quæ secundum naturam in nobis sunt con-
seruare ac tueri liceat, nec imminentes morbos præcauere, aut præsentis profligare li-
ceat, summo studio adnitendum Medico erit, vt eam Medicinæ partem recte perdis-
cat. Ad hanc vero ipsam consequendam vnice conducent Galeni libri, quos de *laboran-
tibus locis* inscripsit. In iis enim, qua ratione cuiusq; corporis partis, eius potissimum, quæ
in alto corporis latet, adeoq; sensum fugit, vitia dignoscantur, methodo certa ac ratio-
ne docet. Atque hæc prima eius medicinæ partis, quæ signa tradit, vtilitas est. Altera,
quod quum homines, quæ illis eueniunt Medico præcognita vident, non solum artem
extollunt, illiusq; professores vnice admirantur, & inspicunt: sed etiam huic libentius
parent, & vt inquit Hippocrates, audentius se illi committunt, ad omniaque sustinenda
paratos se exhibent, & illum in oppugnando morco strenuo iuuant. Quapropter si vna
cum Medico ægrotantes morbis fortiter reluctantur, fieri non potest, quin salutaris se-
quatur curatio, atq; e corpore omnis propulsetur morbus. Tertia est, quia Medicus huius
partis peritus multo ante tempore, vt imminentibus malis corporis, obuiam eat, se pa-
rabit, adeoque ne quædam vitia prorsus accidant, prohibebit, nonnullorum autem ma-
nitudinem arcebit: in summa, singulis periculis, perinde atq; peritus nauta futura tem-
pestate, rectissime prospiciet. Quarta, quod remediorum auctoritatem conseruabit ac
retinebit, dum illis vtetur in iis solum, quibus ea profutura præuidet. In illis autem, quos
morituros prænoscit, ne ipsa infamet, haud vtetur, memor optimi istius Galeni consi-
lii, qui in quibus desperata omnino salus est, imprudentis esse consilii inquit, apud vul-
gum infamare præsidia, quæ multis, qui sanari potuerunt præsidio & saluti fuerunt. At-
que hinc est, quod idem etiam alibi monet, deploratos non esse curandos, sed ab iis po-
tius abstinendum, & morbi finem prædicendum. Quinta, quod vulgi infamiam & calu-
mnias mortisque crimen, quod illi ab imperitis imputabitur, facile euitabit Medicus,
qui in hac parte medicinæ probe instructus, omnes euentus morremq; prænuntiabit.
Cum itaq; ad consequendam laudem atq; admirationem Medico multum conferat, a-
liasq; non paucas ea vtilitates afferat hæc pars medicinæ, quæ signorum rationem docet,
præclare dixisse Hippocrat. constat, optimum esse, vt Medicus prouidentia vtatur, &
prædicendi scientiam sectetur: debetque hoc nomine in hanc curam incumbere, vt il-
lam exquisire discat. Id quod fiet, nisi Galeni libros de *arte medica*, *Temperamentis*, *Pulsib.*
Prognosticis, *laborantibus locis*, supra indicatos, & eos quos de *Iudiciis* inscripsit, diligenter
euoluat ac perlegat. Nam quamuis sparsim alibi signorum rationem explicet, in iis, ta-
men libris de signis ex professo tracta. Et præ ceteris eiusdem monumentis plus ponde-
ris habet ad prædicenda futura opus de *Iudiciis* posteritati relictum. Quod metipse
libr. 3. *Prognost. comment. 1.* iis verbis testatus est: *Cui libet exquisita ratione futura præsen-
re, huic Commentarii de iudiciis reuoluendi sunt.*

Quid signum, & signorum genera. CAP. II.

Signum
quid.

Signum, vt a nominis explicatione auspicemur, est, quod rem aliquam significat: vel
quod rei alicuius est significantium. Nihil autem refert, siue signum, siue dignotio-
nem, siue notam appelles: nam iis omnibus vocib. id quod Græcis σημεῖον significat, reddi
potest. Quicquid igitur aliquid eorum, quæ in corpore fiunt, ostendere potest, signi no-
mine continetur. Differt autem, Galeno 1. *Prognost. com. 41. auctore*, signum ab indicio pro-
prioloquendo. Siquidem signum ex obseruatione, indicium autem ex demonstratio-

Indicium:
σημειωσις.

ne sumitur. Indicium igitur, quod Græcis τεκμήριον dicitur, perpetuo eorum, quorum est,
naturam declarat, nec fallit vnquam: ideoq; certa Medicis dicuntur. Habent itaq; se tā-
quam genus & species, signum & indicium. Omne namq; indicium, signum recte habe-
tur: non autem signum omne, indicium dicitur. Quæ n. sæpenumero fallunt: nec idem

Signorū
etia pri-
ma gene-
ra:
Salubria.
Insalubria
Neutra.

semper declarant, signa quidem, sed non indicia censerī debent. Signorū autē tria sunt
prima genera, nempe salubria, insalubria, & neutra. Salubria sunt, quæ præsentem indi-
cant sanitatem, futuram prænuntiant, & præteritam ad memoriam reuocāt: Insalubria,
quæ morbum præsentem significant, futurum prædicunt, & præteritum in memoriam
reuocant. Neutra, quæ neutrum mediumq; inter sanitatem & morbum affectum ostē-
dunt,

- A** dunt, prænuntiant, & memoriæ tradunt. Ceterum, quæ etiam dictis præsentia demon- δῶναι
strant, Græcis *ἀγγισσιν*, Latinis *demonstrativa* nominantur. Quæ vero futura prænunti-
ant, Græcis *προγισσιν*, nobis prædictiones, præcognitiones, prælagia, vel præsentiones προγισσιν
dici possunt. Quæ autem præterita commemorant, Græcis *ἀναμνησιν*, Latinis *memorati-
ua* vocantur. Atq; is est proprius harum rerum usus. Veteres tamen, *ut cap. 7. artis medica*
auctor est Galenus, *προγισσιν* siue prædictionum nomen, etiam præsentia & futura signi-
ficare posse, tradiderunt. Prædicere enim idem est, quod præcognoscere. Vnde cum ea,
quæ præsentia sunt, vel præterita, quibusdam signis præcognoscimus, quasi videantur,
antequam sint patefacta, ea prælagire ac præsentire dicimur. Sunt etiam quædā signa,
quæ morbum, eiusq; naturam declarant: adeoq; vna cum illo inuadunt & desinunt, quæ
B Græcis *παθολογικὰ*, Latinis *vitium*, seu *morbum significantia* nuncupantur. Vt sunt in pleu- παθολογικὰ
ritide acuta febris, spirandi difficultas, tussis, punctio lateris. Hæc itaq; ut umbra a corpo-
re, a morbo separari nequeunt. Quæ autem incipientis vitii indicia sunt, proprie *προ-*
εἰρηνα dicuntur. Quæ vero non simul cum morbo inuadunt & incipiunt, sed subinde ap- προε-
parent & succedunt, *ἐπιφαινόμενα*, id est, succedentia aut superuenientia appellantur. Quæ ἐπιφαι-
autem morbi naturam veluti circumstant, non autem penitus coniuncta sunt, & inse- νόμενα
parabilia, Græcis *συνοποδύοντα*, id est, *circumstālia* nominantur. Opponuntur itaq; iis, quæ mor- συνοπο-
bi naturam patefaciunt, eo quod illa semper cum morbo sint coniuncta. Hæc autem a- δύοντα
liquādo cum morbo, nonnunquam post genitum morbum, modo ne omnino quidem
conspiciuntur, tantum abest, ut necessitate aliqua morbo coniuncta sint. Plerumq; tamē
C incidunt. Huius generis, ubi pleuritis torquet, sunt dolores, vel ad iugulum vsque, vel ad
hypochondria pertingentis. Sunt præterea cruditatis & concoctiones signa. Crudita- Crudita-
tis, quæ materiæ in morbis cruditatem significant, adeoq; vel omnino nullū iudicium tis.
futurum, aut prauum, aut dolores, aut diuturnitatem, aut recidiuam, *ut primo Epi. sect. 2.*
constit. 3. testis est Hippocrates. Concoctionis, quæ materiæ morborū concoctionem osten- Conco-
dunt, utraq; iam dicta signa ex alui excrementis, vrinis, & sputis maxime colliguntur. ctionis.
Atq; excrementa quidem alui, inferioris ventris vel concoctionem, vel cruditatē signi-
ficant. Vrinæ autem venosi generis aut sputa, excreationesque eorum, quæ in respiratio-
ni seruientibus instrumentis sunt, humorum coctionem aut cruditatem monstrant, *ut*
lib. 1. de Iudiciis Galenus copiosius docet. Proinde duo hæc signa stabilem propriamq; pote-
D statem semper habent, quocumq; morbi tempore apparuerint. Præterea sunt signa, quæ Salutaria.
salutem demonstrant, salutaria ob id nominata. Contra alia, quæ mortem portendunt, Lethalia.
lethalia dicta. Ea ex iis maxime, quæ cum vrinis, alui excrementis & sputis excernuntur,
colligi possunt, quemadmodum in prognosticis Hippocrates docet. Quædam insuper Bona.
sunt signa, bona vocata, quod scilicet bonum aliquid præsens, præteritum, aut futurum
ostendunt, ut est facilis spiratio, levis tolerantia, pulsuum bonitas, facilis somnus, facies
similima sanis, decens decubitus, totius corporis æqualitas, & alia, quæ tum in progn-
osticis, tum aphorismis recenset Hippocrates. Quædam contra mala, quæ malum ali- Mala.
quid præsens, præteritum, aut futurum indicant, ut difficilis spiratio, præsertim quæ sit Opuma.
frigido efflato spiritu, difficilis tolerantia, pulsuū malitia, & in summa prædictis cōtraria.
E Ac rursus inter bona, quædam optima, quæ semper bonum significant. Quædam valde Valde bo-
bona, quæ raro non indicant bonum. Inter mala quædā pessima, quæ semper mōstrant ra.
malum. Nonnulla valde mala, quæ raro non malum portendunt. Sunt alia iudicatoria Pessima.
nominata, quæ quidem duplicia sunt. Quædam enim horum veluti causæ & signa sunt, Valde ma-
hoc est, significant & efficiunt iudicium, ut est vomitus, alui deiectio, vinarum mul- la.
titudine, sudor, sanguinis e naribus profluuium, parotis, & abscessus. Aliqua vero signo- Iudicato-
rum tantum rationem habent, ut pulsuum inæqualitas & ataxia, deliriū, vigiliæ, comata, ria.
inquietudines, difficilis spiratio, obtenebrationes, difficilis sensus, dolores capitis, collis
& stomachi, temporum grauitas, aurium sonitus, splendores, lacrymæ inuoluntariæ,
vox absq; ratione molesta, labrum inferius agitatū, obliuio, astantium ignorantia, ve-
F hemens rigor, accessio anticipans, facies vna cum oculis & naso rubescens, hypochon- F.
driorum retractio, nausea multa, fastidiumue, æstus, & sitis vehemens. Omnia quæ iam
commemorauimus, quatenus subitam inutationem ac turbationem ostendunt, Græcis *κρίσιμα*, κρίσιμα.
Latinis *iudicatoria signa* vocantur. Quatenus vero morbos sequuntur, & secundū Sympto-
propriam suam substantiam considerantur, symptomata iudicatoria nominantur. Ha- ματι νο-
μινται.

Symptoma-
mata iudicatoria-

bentq; iudicatoria appellata signa nō semper stabilē ac firmā, vt cruditis & cōcoctio-
nis, potestatem, quocunq; morbi tempore apparuerint. Siquidem bona sunt, vbi post
concoctionē morbi, & in vigore apparēt. Mala vero, quū in morbi principio, & ante cō-
coctionē. Quod vt plenius intelligamus de temporib. temporū nūc differamus oportet.

Quid tempus morbi & tractationis de temporibus morborum usus. C A P. III.

Morbitē
pus quid.

Morbi tempus, Græce *χρῆς*, non est nisi pars, aut ætas morbi, quę successionis vicif-
situdine progressiue in aliū atq; aliū morem mutatur metaphora ab animan-
tibus sumta. Quemadmodum enim hæc ipsa genita ad vigorem vsque augentur, inde
iam contabescere incipientia, ad extremam vsque corruptionem declinant, si omnes
ætates pertransierint: ita quoque singuli morbi a prima eorum constitutione, ad vigo-
rem vsque increscunt, dum pro augmenti prioris portione decrecentes omnino dis-
soluantur. Tempora itaq; appellantur, quod successionē quadam, vt tempus suas partes
morbus acquirat. Vel, quod sint progressus quidam, quibus ab initio ortus sui, ad finem
vsq; varie egrum afficiunt. Ætates vero, quod quemadmodum ætatum cursu animal, sic
morbi temporum vicissitudine immutentur. Atq; horum temporum cognitionis vti-
litas varia & multiplex est. Nam quum curationem morborum in primis ob morbi tē-
pora variari contingat: alia enim in principio morbi, alia in eius incremento, alia deniq;
in aliis morbi partibus remedia conueniūt: nemo morbos recte curabit, nisi horū tem-

Vtilitas
cognitio-
nis tēpo-
rū morbi.

2. Aph. 29.

pura perspecta habeat. Neq; enim temere in aphorismis dixit Hippocrates: *Quū morbi
incipiunt, si quid mouendum videtur, moue, quum vero consistunt ac vigent, quiescere melius est.* Et

2. Aph. 24.

alio loco: *In acutis morbis raro, & in principijs purgantib. vtendū medicamētis.* Sanguis præterea
non mittitur pari vtilitate vigente morbo, vt incipiente. Quum autē morbus declinat,
nō solū superflue, sed et inutiliter extrahitur. Pari modo inter initia phlegmones reprimē-
tia, in augmento autē tepida & mediocriter adstringētia, in vigore, q̄ moderate cale-
faciunt & discutiūt, adhibemus medicamēta. In declinationē vero, quæ valenter rū ca-
lesciūt, tū discutiunt. Confert etiam hæc cognitio ad futurorum prædictionem. Nam
quo tempore mori possit, aut sanari, & quando periculū effugerit æger, prouidebit, qui
morbi tempora nō ignorabit. Neq; n. in quacunq; morbi parte finiri possunt morbi, aut
vita exstingui: cum nemo inuadere, aut inclinante morbo pereat. Quinetiam victus ra-
tionem in nullo morbo recte instituet, qui eius tēpora, præsertim vigore, a quo cibandi
consilium petitur, ignorauerit. Quod abunde patet ex iis, quę sectione secunda ab Hip-
pocrate scribuntur. Postremo, quod inde iudiciorum bonitas aut malitia cognosci pos-
sit, Nam vigor morbi, iudiciorum omnium regula est, quod in eo, non nisi optimum iu-
diciū fiat. Proinde quanto iudiciū vigori proximius, tanto melius est. Cōtra, quan-
to magis ab eo distat, peius, vt lib. 3. de Iudiciis, cap. 5. Galenus fufius docet.

Quot sint morborum tempora. C A P. IV.

Vniuersa-
lia tem-
pora.

Vniuersalia morborum tempora quatuor esse, tū veteres, tū recentiores Medici o-
mnes vno consensu statuunt, principium, augmentum incrementumue, vigorem
& declinationem. Non temere autem Græcis *ἐν τῷ πρῶτῳ & ἐν τῷ δεύτερῳ*, Latinis *vniuersalia tem-
pora* vocantur: hac enim appellatione a particularib. in quæ singulæ morbi accessiones
diuiduntur, discernere voluerunt. Ceterum, vt de singulis ordine agamus, Principiū va-
rie a Medicis vsurpatur, nempe trifariam. Vno modo, pro primo exquisito insultu, seu
prima morbi inuasionē, quam Græci *ἐπισημασία* nominant, quæ quidē simplex est, & o-
mnī latitudine caret. Id enim momentū insectile est. *Secundo*, pro eo, quod latitudinem
obtinēt, & ad tertium vsq; prorogatur & extenditur diem. Neutro autē horū modo-
rum sumitur in præsentia. *Tertio* modo, pro totius morbi parte prima, quæ non dierum
numero, sed concoctionis signis finitur, & determinatur. Duæ primæ significationes a
vulgari opinione desumptæ sunt. Vulgus enim vocat eos in principio morbi esse, quos a
primo morbi insultu correptos videt. Itē eos, qui in primis tribus diebus laborāt, adhuc
in principio esse putat, etsi nonnunquam eo tempore incrementum excesserunt. Tertia
solis Medicis nota est, cum per multos menses morbus sæpe numero duret, & nihilomi-
nus adhuc in principio sit, cuius quidem finis, tum certo adest, vbi cōcoctionis manife-
stæ notæ apparent. Alterum tempus, quod principium statim excipit, & ad vigore vsq;
durat, Græcis *ἀύξων, θίνων, & ἀνέβων*, Latinis *incrementum, augmentum, & ascensus* dici-
tur. Tertium, vehementissima morbi pars est, Græcis *ἀκμή*, Latinis *vigor, & sta-*

Principiū.

Incrementum.

Vigor.

- A** *tus* appellatur. Quartum & vltimum Græcis *παράκμῃ*, Latinis *declinatio* & *inclinatio* nomi-
natur. Atque hæc sunt vniuersalia morbi tempora, siue maiores morbi partes, in quas v-
niuersus morbus primum diuiditur. Particularia vero tempora sunt minores partes, in
quas singulæ accessiones diuiduntur. *Accessio* autem Græcis *παρεξυσμός* dicta, non est, nisi
tempus deterius totius circuitus, quod e prima inuasionem vsq; ad intermissionem exsi-
stit. Hoc itaque tempus quatuor partibus seu temporibus particularibus, principio ni-
mirum incremento, vigore, & declinatione definitur. Febrilis accessionis exemplò res-
clarior fiet. Huius certe principium est, quod extremis partibus refrigerationis sensum
præbet. Incrementum, vbi frigus desinit, corpus autem incallescere incipit, non tamen
exquisito calore. Vigor, vbi calor æqualiter in totum diffunditur corpus, minimasque
eius obsidet particulas. Declinatio, vbi calor imminuitur. Porro circuitus, qui Græcis
περίοδος vocatur, non est nisi repetitio, siue reditus ab eodem ad eadem per ordinem &
circulum quendam factus. Vel breuius, similis ad idem reditus: hoc est, vniuersum tem-
poris spatium a primo statim insultu vnius, vsq; ad insultum alterius accessionis. Cuius
quidem temporis duæ sunt partes. *Vna*, quæ deterius eius tempus comprehendit. *Alter*a,
quæ remissionem siue declinationem, & quietis tempus cõplectitur. Primam quidem
partem veteres Medici Græci *παρεξυσμός*, id est, *accessionem* priuatim nominauerunt. Qua
quidem ratione in se *accessio*, non nisi principium, incrementum, & vigorem conti-
net. Hac in significatione accessionis vox ab Hippocrate sectione prima aphorismo-
rum vsurpatur, quum inquit: *In accessionibus a cibo abstinere oportet*. Veluti fusius in nostris
super hanc Hippocratis sententiam commentariis ostendimus. Nec aliter in mox ibi-
dem sequente aphorismo duodecimo accipitur, quod in Commentariis suis iis verbis
Galenus etiam cõfirmat, inquiens: *Per accessionem te oportet inaudire deterius totius circuitus
tempus, quod est a primo insultu, vsq; ad tempus vigoris*. Quod certe accurate considerandum
erit, quod alias Medici, præsertim recentiores, *accessionem* vocant; quæ non solû in se
principium, incrementum, vigorem, sed & declinationem, quæ Græci proprie *παράκμῃ*,
ut diximus, nominant, cõplectitur. Alteram circuitus partem, id est, omne id tempus,
quod priorem partem siue *accessionem* vigoremq; vsque ad secundam *accessionem* se-
quitur, Galen. in lib. de Temporib. & alii veteres Græci *παρεξυσμός, ἀνεσις, ἐνδοσις, ἵφεσις, ἀσπίρεσις*, vel
διάκμῃ, id est, *declinationem, remissionem, submissionem, ablationem, vel interuallum* appellant.
- D** Proprietatem, *ut lib. 1. de iudiciis, cap. 3. auctor est Galenus, διάκμῃ*, id est, interuallum, tem-
pus est, quo in quietem febrē vacantem *accessio* desinit: aut breuius quietis, tempus,
quod in febribus peculiari nomine *ἀπορεξία*, id est, *infebricitatio*, si ita loquitur, dicitur.

Quot tempora vniuersalia unusquisq; morbus habeat. CAP. V.

- V** T non omnia animantia ad extremam & constitutam vsq; senectutem perueniunt,
adeoq; omnes ætates pertranseunt: ita nec omnes morbi, propter suam malitiam,
& ægrotantium imbecillitatem, singula sua tempora attingere possunt. Sunt n. morbi,
qui duo duntaxat tempora habent, vt qui incrementi tempore interficiunt. Sunt etiam,
qui tria tantum obtinent tempora, vt qui in vigore iugulant. Ex lethalibus vero morbis
nullus quatuor tēpora habet. Siquidē fieri nequit, vt vigore elapso diminutoq; morbo,
victaq; illius vehementia, homo in declinatione eius pereat, *ut fusius lib. 3. de iudiciis, capi-
te 5. Galenus ostendit*. Quanquam enim interdum morbus, quum moritur homo, leuior
esse appareat, non tamen, tum vera est declinatio, sed falsa potius & ficta, vt pote quæ
a natura vincente nequaquam accadat. Neq; enim alia de causa, tunc declinare videtur
morbus, quam quod virtus iam euicta, non amplius morboſis causis reluctetur. Et sunt
certe ex lethalibus morbis nonnulli, qui breui tempore & principium & augmentum
percurrunt, vt fere augmentum habere nullum videantur. Atque hinc est, quod Ga-
len. in libro de *ὀρίτῃ* secta, scribat, nonnullos morbos acutos, vt apoplexiam, simul at-
que inuadunt, vigorem assumere. Quod certe non ita intelligendum venit, vt quidam
hodie, qui omnia dicta Galeni malitiose peruertunt, & summo studio deprauant, inter-
pretantur, quod eiusmodi morbi nullum habeant incrementum, quando fieri neque-
at, vt ad summum aliquid, nisi ascendendo perueniat: sed quod tam celeriter ab inuasio-
ne ad vigorem perueniat, vt vix animaduerti possit augmentum, adeoque propemodum
insensibile sit. Atq; hoc ipsum sensibile Galenum, alius eiusdem locus plane cõuin-

cit qui est in libello de totius morbi temporib. in quo manifeste apoplexiā incrementū habere inquit, atq; adeo quid sentierit in lib. de optima secta, diserte exponit. Sed eiusdē verba subiiciamus: *ἐντα δὲ τῶν νοσημάτων δὴς εἰσβάλλειν ἀμάρτυρα, καὶ τὸ μὲν αὐτῶν ἀδυνάτων εἶναι. ὅτι γὰρ τὸ μέγιστον εἰσβάλλειν ἀμάρτυρον εἶποι περὶ αὐτῶν ἀποπληξίας, ὅτι γὰρ ἀπειρώς ὅτι τὸ τοῦτον, ἀλλ' ἐν μὲν βραχέει κέρει διεξέρχεται τὴν τε ἀρχὴν καὶ τὴν ἀνάβασιν, καὶ μὴ ἀναρχὴν τε δεῖ, καὶ εὐθὺς εἰσβάλλει τελευτάτα, ὥστε ὁ πῆς ἐπιλεψίας παρέρχεται. ὅτι γὰρ ὅτως ἀλλοιοῦται ἐξ αἰφνίδος τὸ συμπύκνωμα, καὶ ἀπὸ τοῦ οἱ τὸν τεράχλον ἀφαιρέμενοι, καὶ τὴν καὶ τῶν ἡ τομῇ πρῶτον πνέχοντες ἐχθρὸν, καὶ δυνάμει, καὶ τείτον, καὶ τέταρτον, ὥστε ἡ καὶ χύρως πῆς ὅπῃν τέμνεται.*

Quod est: Quidam morbi statim simul atq; vigent, inuadere videntur, quod ipsum quidem ex numero eorum est, quæ fieri nequeunt. Neq; enim repente inuadentem in vigore esse apoplexiam quispiam dixerit, quoniam talis exquirit non est, sed breui tempore & principium, & augmentum percurrit, non tamen absque principio est, neque statim absolutissime inuadit: quemadmodum nec comitialis morbi accessio. Nemo enim tam subito symptomate corripitur, vt ii quibus ceruix aufertur: quam horum quoq; sectio primum aliquod & secundum, & tertium, & quartum tempus habet, veluti etiam si chirurgus quamlibet partem incidat. Quæ verba Galeni etiam in propria lingua referre volui, vt hinc plenius lector eius cognosceret sententiam, & quam inique a lycophantis hoc tempore flagelleretur, qui singula propemodum eiusdem verba in diuersam, quam ille putauerit, partem interpretantur. Ceterum, qui salutare sunt morbi, quatuor interdum tempora obtinebunt, principium nimirum, augmentum, vigorem, & declinationem: idque accidit, si soluantur. Si enim adhibitis remediis curentur, pauciora habebunt tempora. Qui enim antequam crescant per conuenientia præsidia soluantur, augmento & vigore mutilantur. Si per iudicationem perfectam terminantur, non pauciora quam tria habebunt.

Tempora morborum ut discernenda. CAP. VI.

Principiū
morbi ut
dignoscē-
dum.
Ex morbi
natura.

Ex tempo-
rib. anni.

2. Aph. 25.

Ex ætate
& natura
ægro-
tantis.
Ex regione.
Ex victus
ratione.

Augmen-
ti cogni-
tio, e trib.
peder. re-
bus.

Ex hora
longitu-
dine.

CVm quatuor temporum vniuersalium morbi cognitio ad iudiciorū prædictionem vnicuique, ut dictum est, conferat, vt quomodo quispiam horū, quoad fieri potest, exquisitam consequatur notitiam, nunc monstremus, necesse est. Exorsi igitur a principio; de illis ita statuemus: Principii morbi finis adhuc futurus quinque deprehenditur modis. *Primo*, ex morbi ipsius natura & differentia. Quippe febres ardentes, pleuritis, viscerum phlegmones, & id genus alii morbi acuti, brevis temporis principium habent. Nam vt ipsi non sunt diuturni, ita neq; principium longo durans tempore obtinebunt. *Contra*, D epilepsia siue morbus comitialis, coxendicū & renum dolores, quartana & similes morbi diuturni longioris temporis principia habebunt. *Secundo*, e temporibus anni, in quibus morbi exoriuntur. Qui enim æstate accidunt morbi, breuius: qui vero hyeme inuadunt, longius principium habent. Hinc est, quod Hippocrates non temere in aphorismis dixerit: *Æstiuæ quartanæ magna ex parte breues sunt, autumnales vero longæ, præsertim, quæ hyemem attingunt.* Quanto enim breuior morbus est, tanto etiam breuius principium obtinet. *Tertio* ex ætate & natura ægrotantis. Nam si calidæ fuerint, morbi eas corripientes breuius principium habebunt. Citius enim in iis concoctionis signa apparent. *Contra* si frigidæ fuerint ætates, longius principii tempus obtinebunt. *Quarto*, e regione, in qua æger decumbit. Hæc enim, perinde atq; ætas & natura ægrotantis, vel breuius, vel longius principii tēpus efficiet. *Quinto*, ex victus ratione, quæ antecessit. Is enim si calidior & siccior fuerit, biliosus adeoq; calidius & siccius corpus reddet. *Contra*, si frigidior & humidior fuerit, pituitosum corpus efficiet. In biliolo autem corpore calidos procreari morbos, & in pituitoso frigidos, nemo est, qui nesciat. Habet autem calidi morbi breuius, vt frigidi contra longius principium. Ceterum perfecti & iam absoluti principii euidentissimum ac firmum admodum signum, concoctio manifesta existit. Atq; hæc tunc principii breuioris aut longioris, signa vnde petēda sint indicaui. Porro augmentum morbi trib. cognoscitur rebus, nempe hora, in qua fit accessio, eiusdē lōgitudine & magnitudine siue vehementia. Nihil enim refert magnitudinem aut vehementiam dicere. Duo enim hæc nomina, vt *sect. 1. aphor. Com. 12. testis est Galenus*, apud veteres Medicos vsitata, sæpius de vna eademq; re pronuntiantur. Ex hora quidem, in qua fit accessio, ita agnoscitur augmentum: Si accessio maturius inuadit, & plus quam proportio postulat anteuertit, certissimum hinc augmenti indicium colligitur. Ex lōgitudine hoc modo: Si accessio anteuertēdo in lōgius extenditur, tēpus augmenti notam esse nemo nō animaduertit.

A maduertit. Ex magnitudine seu vehementia hac ratione. Si accessio vehementius affli-
xerit manifeste augmentum morbi adesse coniecimus. Proinde accessio plurimo tem-
pore anticipans, hoc est, consuetam inuasionis horam antevertens, & longius, & multo
etiam vehementius affligens, effatu dignum ac certum morbi habentis accessionem,
& per circuitus redeuntis incrementum indicabit. Aliorum morborum augmentum
facile ex illorum vehementia seu magnitudine iam crescente cognoscitur. Vigor au-
tem indicatur, ubi hæc omnia in vtriusq; accessionibus æqualia, & sibi ipsis perquam si-
milima fuerint, ac in eodem statu manserint, perseverauerintq;. Declinatio autem co-
trariis augmento signis cognoscitur, nempe si tardius, quam consueuerunt antea, acce-
ssiones inuadant, si breuiori tempore durent, & prioribus, mitiores fuerint, minusq; af-
flixerint. Possunt autem alii morbi, qui per circuitus non inuadunt, ex symptomatum
vehementia, vel remissione, num in vigore aut declinatione sint, cognosci, iuxta illud
Hippocratis: *Quum incipiunt & finiunt morbi, symptomata omnia leuissima sunt, in vigore autem*
vehementissima. Quapropter ex symptomatum vehementia, non morbi malignitas, sed
tantum vigoris tempus argui debet. Siquidem symptomatum magnitudo & leuitas non
perpetuo morbi malitiam, aut bonitatem indicant. Interdum n. aut nullis, aut leuissimis
conspicis symptomatis, grauissimus tamen morbus existit, ut in quibusdam pestilentis
accidit. Nonnunquam vero vehementissimis & maximis symptomatis apparentibus,
morbi tamen salutes sunt, ut quibus naturæ conatu salutes crises accidunt. Vnde o-
mnibus perspicuum euadit, non raro euenire, ut et si in vigore symptomata sunt vehe-
mentiora, morbum tamen in iis, qui seruari debent, magis salutarem ac mitiorem esse:
& contra symptomata, si sunt mitiora, morbum tamen exitialem esse. Symptomatum
igitur magnitudo vigoris potius signum sit oportet.

Vigor morbi medico præ aliis temporibus potissimum dignoscendus. C A P. VII.

Hactenus quo pacto vniuersalia morborum tempora sint cognoscenda Medico, &
quod illorum notitia ad futuram crisin iudicationemq; prænoscentiam sit necessa-
ria, ostendimus. Nunc vero, quod præ omnibus aliis temporibus vigor potissimum Medi-
co sit præcognoscendus, tribus de causis docebimus. *Primo*, quod sine vigoris præcogni-
tione, utrum iudiciū futurum sit, necne, & quum sit, quale sit, scire nequeat. Nam quum
futura bona iudicatio, nisi ex præcedentibus exquisitis concoctionib. præcognosci non
possit, & hæc quidem, non nisi vigoris tempore appareant, consequitur hunc veluti, nor-
mam quandam esse iudiciorum, adeoque ut Medico præcognoscatur, summe est necessa-
rium. *Secundo*, vigor hoc maxime nomine præcognoscendus venit, quia nisi in vigore iu-
diciū morbi obtinuerint, ut in declinatione habeant, fieri nequit. Quicumque enim
morbi vigoris tempus semel præterierint, si certe sine iudicio perseverant, & paulatim
solauntur, nullum præterea elapso vigore mortis est periculum: quandoquidē experi-
entia testetur, nullum unquam in declinatione, vi morbi petiisse, ut antea quoque di-
ctum est. Sed magis ratio ipsa. Neq; n. accidit, ut simul atq; morbosæ causæ iam euitæ
ac concoctæ sunt, adeoque natura superauerit, æger moriat. Quapropter, si qui sunt, quos
in declinatione interiisse constat, si certe vel suis ipsorum, vel Medicorum errorib. mor-
tui sunt. *Tertio*, vigoris tempus Medico, ideo præcognoscendum, quod si moriturus est
æger aut non, nemo sciet, nisi vigoris tempus præcognouerit. Tunc n. primum mori æ-
grotantem est necessarium, ubi vires præ morbi violentia succubuerint. Vtrū vero prius
superabitur, scire non potest, si vigoris tempus incertum fuerit. Nam si iudiciū intra
vnum diem esse debeat, seruabitur æger antequam a morbo vires prosternantur. Si ve-
ro ante viginti dies, si sic accadat, nequeat aduenire iudiciū, fieri potest, ut interim na-
tura fatigetur, adeo ut si iidem appareant ægrotantes, alter quidem seruetur, alter ob fu-
turi vigoris tempus moriatur. Quare cum ex vigoris tempore Medicus sciat, nunquid
ægrī vires sufficiant necne, non potest etiam conueniens victus ratio institui, nisi qua-
les vires ægrotantis sint, præcognoscatur. Neque enim temere ab Hippocrate dictum
est: *Coniecere oportet, num æger possit cum victu perdurare ad vigorem usque, & nunquid ille prius*
desiciat, nec cum victu perdurare illo possit, aut morbus ante deficiat, ac retundatur. Duo nam-
que sunt, a quibus potissimum cibandi cōsilia petuntur, nempe morbi vigor, & ægrī vi-
res. Ratio itaq; ipsa docet, Medico in nullo sic esse exercitandū ac laborandum, atq; in
futuri vigoris præcognitione, quod fasius lib. 3. de iudiciis, cap. 5. Galenus monstrat. Cete-

Magnitudo.

Vigoris indicia sunt Declinationis.

2 Aph. 30.

Vigor morbi tribus de causis Medico cognoscendus.

Nullus unquam in declinatione mori.

2 Aphor. Duo sunt, a quibus cibandi petuntur cōsilia.

rum, cū iam sæpenumero iudiciorum sit facta mentio, ordinis ratio postulare videretur, A
ut tandem, quid sit iudicium, quot eius differentiarum, quibus notis quum præsens vel fu-
turum est deprehendatur, & quæ tandem sit dierum iudicatoriorum natura & vis, ex-
ponamus. Quæ singula in secunda, quæ sequitur, sectione ordine docebimus.

DE IUDICIIS. SECT. II.

Quid Iudicium. CAP. I.

regio.
Iudicium
varie ab
auctorib.
vsurpatur.

Solutio-
nes.

Turbatio
excretio-
nes & ab-
scessus an-
tecedens.

Vnde vox
crisis tras-
lata sit.

Galenus
iudicium
interdum
magnam
mutatio-
nem vo-
cat.

Absolutū
perfectū -
ue iudiciū

Imperfe-
ctum.
Fidum.
Firmum.
Certum.
Infidum.
Incertum.

QUOD Latinis Medicis iudicium vocatur, hoc Græcis *κρίσις* dicitur, varieq; Galen. *lib. de iudiciis, cap. 1. teste, ab auctoribus usurpatur*. Primo pro repentina & subita in morbo mutatione. Sic sanæ Gal. *lib. 3. Progn. Com. 1. sect. & aphorif. 2. Com. 13. & 23. & lib. 1. Epidem. Com. 3.* definitur. Nam in omnib. iam citatis locis crisis seu iudicium subitam & præci- B
pitē in morbis mutationem esse tradit. Quapropter eas, quæ paulatim fiūt mutationes, non crises seu iudicia, sed peculiari nomine *λύσεις*, hoc est, *solutiones* Galenus appellare consuevit: vnde palam fit, morbos tm̄ magnos & acutos iudicio terminari, exiguos aut & diuturnos sine iudicio. *Secundo*, iudicium a nonnullis sumitur pro inclinatione in melius, quæ tamen proprie loquendo non simpliciter iudicium, sed cum adiectione, deficiens iudicium, *Galen. lib. 3. de iudiciis attestante*, dicitur. *Tertio*, pro turbatione corporis, quæ excretionis & abscessus antecedit. Nam priusquam morbus per excretionem & abscessus finiatur, non mediocriter in ægri corpore fit turbatio. Hic namq; subito spiritum difficilius trahit, vel delirat, vel caliginem, vel splendores ob oculos sibi versari putat, vel lacrymas fundit, vel oculos rubentes habet, vel tēpora graua, vel in ceruice dolores C
percipit, interim vel caput dolet, vel nigra quædam oculis offundi quæritur, vel stoma- cho laborat, vel inferius labrum, quasi tremulum ac intro contractum obtrinet, vel rigore vehementi concutitur. Hanc itaq; turbationem subitam Gal. quoq; *lib. 1. de diebus iudicatoriis, ca. 2.* crisis iudiciumue vocat. *Quarto*, crisis pro omni morbi solutione, siue sub- ito, siue paulatim fiat, accipitur. *Quinto*, pro solutione, quæ ad bonum terminatur. Et si aut variis modis a veterib. iudicii, vox est vsurpata, *Galenus tamen, ut ex c. ult. lib. 1. de iudiciis abunde liquet*, non nisi pro subita in morbo mutatione, & multo magis pro ea, quæ hanc antecedit, turbatione sumitur. Porro vox *κρίσις* translata est eodem Gal. *lib. 3. de iudiciis, c. 2. teste*, a iudiciali foro. Ut enim in illo inter eum, qui accusat, & alterum, qui accusatur, atrocissima existit pugna, vnusq; tandem vincit, alter vero vincitur: sic etiam in iudicio D
morbus & natura corporis acerrime inter se pugnant, ut ægro nihil aliud, quam illis, qui in iudicio de morte aut vita audiunt sententiam, sit expectandum. Non igitur est, ut diximus, iudiciū, nisi subita ac præceps in morbo vel ad sanitatem, vel ad mortem mutatio. Et fit quidem natura separante a bonis mala, & ad excernendum properante. Quare ob talem, quæ iudicationem præcedit, perturbationem, ægri grauius se habent. Interdum autem non solū subitam, sed & magnam Galenus permutationem crisis vocat, & merito quidem, quod non sine certamine, *ut lib. 3. de iudiciis cap. 9. ait*, & cum magnis symptomatis, quæ Medicum terrent, iudicium fiat. Quapropter et si febris tertiana magnus morbus ac vehemens non est, tamen quum subito per vomitum, aut sudorem, aliamue excretionē iudicatur, ut nihilominus magna in ea fiat mutatio oportet. Si- E
quidem vomitū illū biliosum nausea, dolor stomachi, ac capitis, pulsus interdum carentia, animi deliquiū, & id genus alia symptomata, non certe leuia, præcedūt. Quod adiciendum erat propter eos, qui hac etiā in parte Galenū sugillare, ac flagellare, suo more solēt.

De Iudicii differentiis. CAP. II.

IUDICIJ, quod iam definiuimus, *Gal. lib. 1. de diebus iudicatoriis teste*, multæ sunt differentiæ. Absolutum & perfectum, siue optimum proprie & simpliciter iudicium est, quod ex morbo nihil reliqui facit, sed subito ab eo ægrum liberat. Vel breuius, quod morbosum nihil relinquit. Græcis *κρίσις τελεία* dicitur. Imperfectum seu deficiens, quod ex morbo quippiam relinquit: vel, *ut tertio de iudiciis definitur*, quod effatu dignam in melius mutationem efficit, non tamen integre morbum soluit. Græcis *ἀτελής* & *ἐμμελής* appellatur. Fi- F
dum, firmum, certumue est, quod nunquam reuertitur. Græcis *πιστή* & *βεβαία* & *ἀσφαλής* nominatur. Infidum seu incertum, quod cum morbi recidua fit. Græci *ἀπιστον* vocant. Alii fidum definiunt esse, quod naturæ beneficio paratur. Infidum, quod morbi ratione cō- tingit. Id quod certe in idem recidit. Nam quod naturæ beneficio paratur, & secundum

ratio-

Periculo-
sum.
Turum.
Securum.
Manife-
stum.
Evidens.
Obscurū.
Indicarū.
Non indi-
carum.
Bonum.
Malum.
Salutare.
Lethale.

Boni iudicii principia signa quatuor.

4.
Quæ con-
ueniens
cuiq; spe-
cici mor-
bi excre-
tio.
Ardentis
febris.

Febris ter-
tiana.
Quotidia-
na.

Phreniti-
dis.

Lethargi-
Peripneu-
monia.

Pleuridis.

Iecoris lie-
nisue phle-
gmones.

Sanguinem
per rectitu-
dine efflue-
re oportet.

Sudores o-
mnibus fe-
bribus sunt
proprii.
4. Apho. 36.

nisi ex flaua bile intra vasa putrescente, vt omnes iam dictæ excretiones, per quas vel bi-
liosus sanguis expurgatur, vel biliosa excrementa vacuantur, illi conueniant necesse
est. Pari ratione & febris tertiana per vomitum & deiectionem biliosam, & sudores bi-
liosus e toto corpore manantes iudicari solet. Quotidiana vero febris, vtpote non ex
bile, sed ex pituita nata, comodissime per crebras pituitæ vacationes, & sudores mul-
tos e toto corpore excretos iudicatur. Phrenitim sudor bonus, præsertim vbi e capite
multus & calidus fluxerit, iudicat, sudante simul reliquo corpore. Non autem ab re di-
ximus Bonus sudor: malus enim si fuerit, phrenitim non iudicat. Bonus est, si fit in die
iudicatorio, & e capite, tanquam parte laborante, non frigidus, sed calidus, neque pau-
cus, sed multus, vt dictum est, profluxerit. Accidit autem, vt interdum etiam per san-
guinis narium profluuium phrenitis iudicetur, quod hæc non sit nisi cerebri, aut eius
membranarum phlegmone. E sanguine vero procreari phlegmonem, notius est, quam
vt multis ostendi debeat. Nihil igitur mirum, si sanguinis excretionem e naribus finiat.
Porro lethargus sanguinis ex naribus profluuium non delectatur. Peripneumonia raro
quoque per sanguinis narium profluuium iudicatur, crebrius per alui deiectionem, aut
puris per vrinam excretionem. Inter iam dicta mala, nempe ardentem febrem, phre-
nitim, lethargum, & peripneumoniam, pleuritis medium obtinet locum. Quippe mi-
nus quam ardens febris & phrenitis, magis vero quam lethargus & peripneumonia,
profluuium sanguinis finitur. Iecoris vero & lienis phlegmone sanguinis narium proflu-
uium abunde iudicatur, quod scilicet horum viscerum phlegmones, febres quoque acu-
tæ, quibus hoc genus excretionis familiare est, concomitantur. Omnes denique cali-
dæ & acutæ hypochondriorum phlegmones, profluuium sanguinis ex naribus iudican-
tur. Oportet autem rum sanguinem e directo effluere, ex dextra quidem nare, iecore
laborante, vel iis quæ in dextro hypochondrio sitæ sunt partibus. Ex sinistra vero, lie-
ne, & quæ in sinistro sunt hypochondrio locis laborantibus. Porro, iecoris gibba phle-
gmone obfessa, tribus maxime excretionis modis obediunt, nempe profluuiis sangui-
nis e dextra nare, sudoribus bonis, vtpote reliquis etiam phlegmonis communibus, &
multis vrinis. Caua vero eiusdem, egestionibus biliosis & sudoribus, nonnunquam et-
iam vomitibus, humoribus scilicet ad ventriculum transmissis, parent. Multo autem
magis per vrinas expurgari expetunt, quam gibba iecoris, omnes partes quæ iuxta
thoracem & pulmonem sunt per sputa, quod nimirum hæc sint loca, per quæ harum
partium excrementa comodissime vacuantur. Sudores autem omnibus febribus,
præsertim ardentibus, sunt proprii. Hinc illud Hippoc. *Sudores febricitantibus, si euenerint
tertio die, & quinto, & septimo, & nono, & undecimo, & decimo quarto, &c. boni sunt.* Hi enim
sudores morbos iudicant. Iudicant vero etiam quotidianam, & quattanam, acceden-
tibus tamen vomitibus & deiectionibus pituitosis in illa: atris vero & variis in hac ipsa.
Semitertianas autem iudicant deiectiones, per quas biliosa & pituitosa vacuantur. Le-
thargos vero, & omnia capitis vitia, parotides iudicant. Nam impetus totius mali ad
glandulas illas, quæ auribus adiacent, vtpote spongiosas raræque, & ad suscipienda su-
peruacua habiles, conuertitur. Alii decubitus quoque omnes, diurnas febres iudica-
re consueuerunt. Ceterum vt rectius, an iudicii modus morbo cōueniat, intelligamus,
præter hæc quæ dicta sunt, ægrotantis quoque ætas & natura, necnon præcedens vi-
ctus ratio, locusque in quo æger degit, item tempus anni, & præsens temporis constitu-
tio, consideranda erunt. Si enim perinde atque morbus est biliosus, hæc etiam singula
biliosa fuerint, bilem in iudicationibus expurgari oportet: quemadmodum vbi pitui-
tosa fuerint, pituitam vacuari est necesse. Variis autem humoribus in corpore abūdan-
tibus, variam quoque esse excretionem oportet. Cum vero hæc vniuersa Medico fue-
rint explorata & cognita, tunc ex euentu reliqua assequuntur. Si enim æger, qui iudi-
catus est, a febre, aliisque symptomatis liberatus fuerit, & meliuscule pro vacationis
ratione fuerit coloratus, cum melioribus quam antea pulsibus, & ad surgendum robo-
re haud dubie optimum iudicium fuit. Si vero ex iam dictis aliquid desit, tantum ab op-
timo deficit, quanta eius quod deest vis & potentia fuerit.

Futurum iudicium quibus notis præcognoscendum. CAP. IIII.

Iudicium.

Hætenus quomodo sit præcognoscendum iam imminens iudicium ostendimus:
nunc

Anunc igitur qua ratione id, quod futurum est, præcognosci possit, breuiter exponemus. Quatuor autem modis id ipsum dignoscitur. *Primo*, ex morbi natura considerando scilicet num hæc biliosa, aut pituitosa, aut melancholica, aut ex iis mixta fuerit. Si enim biliosior ac calidior fuerit, tanto velocius mouebitur morbus, adeoque celerius iudicabitur. Contra, si frigidior fuerit, tardius mouebitur, & iudicabitur. *Secundo*, ex anni tempore, ægrotantis temperamento, & ætate, regione præsentis temporis cōstitutione, victu præcedente, & id genus aliis. Hæc enim si ad calidius declinauerint, morbum eo citius iudicatum iri, sicuti contra, ubi ad frigidius tetenderint, tardius, ostendent. *Tertio*, ex accessionum circuitibus, siue ii tertio quouis die, aut quarto, aut singulis diebus, aut nunquam fiant, veluti in continentibus febribus euenit. Siquidem hæc vnicam duntaxat accessionem habent, ab initio ad finem perpetuo durantem. Si enim festinauerint, ac semper consuetam anticipauerint anteuertentue horam, aut multo vehementius infestauerint, & per tertium occurfarint, cito iudicium subsecuturum denuntiant. Si vero lente moueantur, atque eadem inuadant hora, ac singulis diebus reuertantur & affligant, tardius futurum morbi iudicium ostendent. *Quarto*, quod præcipuum certe est, ex concoctionibus ipsis. Si enim in diebus indicibus appa-
uerint, tunc ægrum sequenti iudicatorio a morbo liberari denuntiabunt.

Iudiciū futurum quatuor præcognoscitur modis.

1

2

3

4

Optimi iudicii cognitio est certa, mali vero contra incerta. C A P. V.

Optimum iudicium, quod solum simpliciter & absoluto sermone iudicium dicitur, ut comprehensum est, non coniunctura artificiosa, quemadmodum reliqua, sed certa firmaque cognitione assequitur. In huiusmodi enim morbis statim ab initio omnia signa periculo vacant, ac securitatem pollicentur. Cum itaq; omnino secuta fuerint signa, in primo quaternario futurum iudicium nuntiabunt. Quod Hipp. in Progn. iis annuere verbis voluit, inquit: *Mitissimæ febres, & quæ cum securissimis signis sunt, quarto die finiuntur, vel prius.* Neque enim fieri potest, ut febris quæ signa omnia securissima habet, non primo quaternario finiatur. Quod si vero hæc a maxime salubribus ac securissimis signis parum declinauerint, huiusmodi febres septimam non transcendent diem. Accedit, quod in bonis iudiciis natura valida admodum & robusta est, ac materiæ noxiæ dominat, propriaq; ratione agit, atq; suo modulo operatur, neq; vllō casu interturbatur. Proinde ut rum definiti ac ordinati sunt eius motus, ita prænotiones etiam de iis motibus certæ sint oportet. Contra malorum iudiciorum prænotiones minus certæ ac stabiles sunt. Siquidem in iis natura est imbecilla, & a noxia materia vincitur, adeoque motus eius sunt incerti, & inordinati, atque incogniti. Quapropter prudente artifice, & exercitato medico mala iudicia indigent, qui sciat primum nunquid futura sint: secundo, quo die: & tertio, vtrum confestim ægrotantem interficiant, an duntaxat noceant. Quapropter cum in bonis iudiciis multum scientiæ ac certitudinis sit, contra in malis plurimum coniecturæ & incertitudinis, prius exercitari in optimorum iudiciorum prænotione medicum oportet, deinde in eorū, quæ etsi nō sunt optima, bona tamen existunt, atq; tandem ad malorum prænotionem progrediendum erit. Ceterum optima iudicia in vigore morbi, in augmento aut, si salus sit subsecutura, aut imperfecta, vel non secuta, fiūt. Neq; temere dictum est, *Si salus sit subsecutura*: in exitalibus enim morbis magna ex parte ægri in augmento, vel in principio moriuntur. Si igitur dies aliqua index futurum esse iudicium præostendit, simul etiam malum fore ostendit. Fac enim quarta die visam esse primum in vrina nebulam nigram, aut sublimamentū nigrum, aut aliud aliquid aliud huiusmodi: sunt vero & alia omnia signa ac symptomata perniciofa, morietur quidem omnino ægrotus ille, eo quod singula iam commemorata perniciem portendant, *ut ex sectione tertia, ubi de Vrinis agitur, patebit.* Verum si in imparibus diebus accessiones fiant, septimo die malum iudicium futurum est: si vero in paribus, sexto. Certiorem vero expectationem faciet tibi morbi motus. Si enim celeriter moueatur, iudicium accelerans fore contestabitur, hoc est, sexto die futurum esse iudicium significabit. Sin tarde moueatur, ad septimum differetur iudicium. Quum vero index dies nullum mali iudicii futuri signum dederit, eius quoque prænotio difficilis erit.

Optimum iudicium certe præcognoscitur.

3. Progn.

Iudicii mali cognitio incerta & instabilis.

In optimorum iudiciorum præcognitione primum exercitandum. Optima iudicia quando fiant. Mala.

Quæ ostendant quem finem sit habiturus morbus. C A P. VI.

Nunquid æger seruetur ex morbo, aut morietur, e tribus potissimum reb. dignosci

Exitus morbi e tribus cognoscitur. potest, nempe ex specie, magnitudine, & more morbi. Ex specie, dum consideramus A
num salutaris sit morbus, adeoque a natura, vel arte vinci possit: aut lethalis, qui naturæ vires, & artis præsidia separaret. Sic e diaria febre, tertiana intermittente, aliisque omnibus eius generis febribus, quod salutare sint morbi, ægros seruari facile est prælagiri. Contra, mori, ex vehemēti apoplexia, hydrope, peripneumonia, phrenitide, & id genus aliis morbis, quod suapte natura letales sint. Species autem morbi quælibet ex iis cognoscetur symptomatis, quæ propriam cuiusq; naturam complent. Verbi gratia, sufficiet enim exemplo rem declarasse, pleuritis ex dolore lateris pungente, spirandi difficultate, tussi, pulsuque duro & serratili, ac febris, quæ tamen illi est cum ceteris phlegmonibus communis, deprehenditur. Quare qui speciem morbi e propriis, ut iam pleuritidis exemplo monstratū est, symptomatis cognouit, is facile iudicabit, num hominem exstinguet, vel potius propelletur. Ex magnitudine seu vehementia etiam exitus morbi dignosci potest. Nam etsi interdum morbus suapte natura salutaris est, tamē ubi ingnē magnitudinē assumit, lethalis fit. Sic vulnera, quæ tamen suapte natura salutaria sunt, propter magnitudinē fiunt lethalia. Quod de vulneribus diximus, id ad reliquos etiam morbos propemodum omnes transferri potest, ut qui ob vehemētiā ac insignem magnitudinem lethales euadant. Cognoscitur autem hæc ipse multitudo & vehementia priorum symptomatum. E morbi more quoque, num æger seruabitur aut morietur, cognosci potest. Morem autem siue modum, *ἢ* enim & *τεῖνος* Græcis dicitur, non vocamus nisi essentiam, aut differentiam morbi, prout scilicet mitis placidusue aut malignus est: vel in summa, qualisnam futurus sit. Atque mos utique morbi plurimum momenti habet in prædicendo morbi exitu. Hinc si quis cancro, præsertim in membro nobili, laboret, quod sit malignus morbus, lethale esse dicimus. Pari ratione elephantiasim, phagedænam, rhelephiaque vlcera, lethū asferre propter suam malitiam pronuntiamus. Quid multa? morbi maligni fere omnes vitam adimunt, nisi eam partium ignobilitas tueatur.

Num iudicabitur morbus, aut minus, unde cognoscendum. CAP. VII.

NUnquid per iudicium, aut sine iudicio morbus finiatur, quinque e rebus maxime cognoscitur, nempe ex motu, magnitudine, & specie morbi, anni tempore, & aliis D
quæ eiusdem sunt ordinis, & huic cognata, veluti regio, ætas, victus antecedens, & huiusmodi, atque iis quæ morbo succedunt. Ex motu utique morbi, quod vel tertio, vel quarto, vel quinto fiet, iudicium sperari potest. Si enim is celeriter moueatur, tertio: si vero quodammodo tardius, quinto. Si continens fuerit febris, in quarto. Habet enim vnam accessionem, quæ ad quartum, magna ex parte, diem protenditur. Motus celeritatem adiuvat magnitudo, adeo ut si magnus fuerit morbus, & plurimum affligerit, per iudicium finietur. Sin exiguus, solutione. Item anni tempus calidum, ætas, regio, & alia quæcunque natura biliosa sunt. Tarditatem autem motus contraria, anni nimirum tempus frigidum, ætas, regio, natura, & victus ratio præcedens frigida, iuuant. Verbi gratia, si ætas fuerit, & laborans ætate adolescens, natura calidior, & vsus sit inedia, labore, cibis & potibus biliosis, tunc omnia hæc iuuabunt, ut tertio die iudicium fiat: præsertim si E
quæ præcessit temporis constitutio, & regio in qua ægrotat, natura fuerint calidiores. Quod si vero omnia contraria fuerint, & motus morbi tardior, neq; magnitudo morbi tardior, neque magnitudo morbi effatu digna, hybernū tempus, æger autem natura biliosus, aut ætate declinans, in quinti diei accessionem peruenturum esse iudicium sperabis: idque magis, si etiam regio frigida & humida fuerit, & temporis præsens constitutio similis, & iudicia, quæ passim fiunt, in quintum inciderint diem, & alia, otium scilicet, satietas, & victus præcedens pituitosus, accesserint, ut *susius lib. 3. de iudiciis. cap. 4.*
Specie morbi. *Galenus docet.* Ex morbi præterea specie. Quippe cum iudicia non sit nisi repentina, ut comprehensum est, mutatio, acutis tantum conueniat morbis necesse est. Non iudicantur igitur, nisi acuti morbi. Diuturni autem sensim & paulatim, non repente ac F
subito mutantur. Postremo, ex iis quæ morbo succedunt signis, non quidem omnibus, sed iis tantum, quæ cum iudicio iā incipiente inuadunt, aut parum ipsum anteuertunt. & proprie iudicatoria signa vocantur. Si enim illa appareant, necesse est morbū illum iudicari, & in propinquo certe esse iudicium.

A

Num per excretionem, aut abscessum futurum sit iudicium, ut cognoscendum.

C A P. VIII.

CVM ex iis, quæ dicta sunt, quod iudicium futurum sit Medicus prænouerit, deinceps quale hoc erit, hoc est, num per excretionem, aut abscessum, siue per translationem humoris ex vna parte in aliam fiat, hoc modo dignoscendum erit. Primum quidem, si acutus & calidus est morbus, & iudicium sit in primis circuitibus, necesse est, ut tale iudicium non per abscessum, sed potius excretionem fiat. Morbus enim calidus, & concoctus facilis, ut lib. 2. *Prognost. testis est Galenus*, eo quod ex calidioribus ac tenuioribus, adeoque ad excretionem paratissimis constet humoribus, per excretionem merito iudicatur. Facile enim eiusmodi humores expelluntur, & vias per quas extra corpus ferantur, inueniunt. Si vero diuturnus, ac tardus fuerit morbus, id est, concoctus difficilis, & ex crassiore, frigidioreque humore, qui nec vinci, nec expelli facile possit, per abscessum iudicabitur, quod scilicet ad excretionem humor ille sit ineptus. Id quod tum maxime accidit, quum æger plurimo tempore, *Hippocrate loco paulo ante ostenso attestante*, tenuem & crudam urinam minxerit. Docent id ipsum quartanæ, & quotidianæ febræ, & nonnunquam etiam tertiana spuria, quæ, reiecto ad pedes humore, per abscessum finiuntur. Si autem urina multam & bonam, hoc est, albâ, leuem, & æqualem subidentiam habuerit, adeoque tenuis haud fuerit, sed crassa, consentaneum est morbum paulatim coctum iri ac solui, & minime per abscessum finiri. Quod Hippocratis testimonio confirmatur, qui in Aphorismis ita scriptum reliquit: *Quibus spes est ad articulum futurum abscessum, liberat ab abscessu urina multa, crassa, & alba exiens*. Ceterum iis ita definitis, deinceps considerandum, si per excretionem morbus iudicabitur, nunquid profluuium sanguinis narium, vel vomitus, vel sudor, vel deiectio futura sit. Si vero per abscessum, qualis particula, vel quis articulus abscessum illum excipiet, exsequendum. In iis quidem morbis, qui per excretionem iudicabuntur, bifariam de excretionem, quæ futura est distinguere ac definire oportet: nempe ex propriis futuræ excretionis signis, si modo affuerint, & ex aliarum excretionum notis, si propriæ nõ adfunt. Certius namque sperabis eum, qui semper a suis præostenditur, iudicii modum, vbi nullus aliorum excretionum modorum te in diuersum distraxerit. Futuræ vero excretionis certissimum indicium est rigor. Cum enim is expultricis facultatis validus sit motus, ut eo excitato aliquas subsequi excretionem putemus necesse est.

Quale iudicium futurum sit, quo modo dignoscendum.

Comm. 34.

4. Aph. 47.

Rigor futuræ excretionis nota.

Quæ propria sint vniuersi cuiusque excretionis signa. C A P. IX.

CVM hætenus, quæ in vniuersum omnium excretionum sint indicia ostenderimus, reliquum nunc est, ut proprias vniuersi cuiusque excretionis notas, a sanguinis ex naribus profluuii exoriri, recenseamus. Primum igitur profluuii sanguinis e naribus signum sunt splendores ante oculos obuerrantes. Hi enim propter humorem profluxurum, qui flauus est, excitantur. Flauus enim color ad splendidum vergit, ut lib. 1. de iudic. c. 12. *fusus monstrat Galen*. Alterum est oculorum hebetudo, quod humor multus sursum elatus spiritus meatus obturet, adeoque visus hebetudinem conciliet. *Tertium*, oculi lacrymantes, propter fluxionis copiam. *Quartum*, oculi rubicundi. *Quintum*, malæ rubicundæ. *Sextum*, nares rubræ. Siquidem hæc omnia humorum ad caput partesque iam dictas morum & inclinationem denuntiant. *Septimum*, hypochondriorum sine dolore tensio. Hæc enim haud exiguum est sanguinis ad superiora vergentis indicium. Non autem abre dictum est, *Sine dolore*. Tensio enim hypochondrii cum dolore, non profluuii sanguinis, sed phlegmones potius ibidem excitare indicium est. *Octauum*, spirandi difficultas, quod sanguinem sursum per thoracem ferri monstret. *Nonum*, dolor capitis, non quidem omnis, sed qui grauis est, distendit, pulsatur, & calefacit. Hic enim sanguinis ad caput confluentis copiam portendit, ut potè quæ grauet, distendat multitudinem suam, qualitate autem pulset ac calefaciat. *Decimum*, viscerum in hypochondriis phlegmones. Hæc vero non solum signa, sed & simul causæ sunt, vbi scilicet per excretionem morbus iudicetur. Causæ quidem sunt, quæ sanguinem sursum tendentem suppeditent. Signa, quod hæc plerumque per sanguinis e naribus eruptionem iudicentur. Quod si ad hæc nares pruriant, iam statim sanguis erumpet, præsertim vbi vehemensior circa faciē & tempora dolor affuerit. Et si sano quoque fluere cōsuevit, iam spem propemodum certam con-

Profluuii sanguinis e naribus notæ. Splendores oculis obuerrantes.

1. Oculorum hebetudo.

2. Oculi lacrymantes & rubicundi.

3. Malæ & nares rubicundæ.

4. Hypochondriorum sine dolore tensio.

5. Difficultas spirandi.

6. Dolor capitis.

7. Viscerum phlegmones.

8. Nares prurientes.

9. 12. 13. 14. 15.

28 Operum Leonhard. Fuchsi Pars I.

Vomit.
indicia

1. Cordis
morsus.

2. Capitis
dolor.

3. Vertigo.

4. Tene-
brofa oculi
obuer-
fantia.

5. Labii in-
ferioris a-
gitatio.

6. Saliva
multa & te-
nuis,

6. Epidem.
sect. 1.
Aphor. 9.

Sudoris si-
gna.

Deiectionis
alui signa.

cipere oportet. Præter hæc omnia ætas florens, anni tempus, ver nimirum & ætas, re-
gio temperata, aut calida, ægrotantis natura similis, futurum esse sanguinis profluvium
prodere possunt. Vomitum autem signa sunt eiusmodi: Primum, *cordis siue oris ventricu-
li* (hoc enim præscior, ut alibi ostendimus, nominarunt) morsus. Nam biliosus ac mordax hu-
mor os ventriculi mordendo infestat, ideoque hunc natura per vomitum eiicit. Al-
terum signum est *capitis dolor*, qui partim propter consensum, qui est cerebro per nervos quosdam
satis magnos cum ventriculo, partim etiam ob biliosi humoris exhalationem nascitur. Tertium est
vertigo, quæ itidem propter biliosorum humorum ad cerebrum exhalationem oritur. Quartum,
tenebrofa & atra oculis obuersantur: flava namque bilis plenius calefacta, ac vehementer assata, atram
exhalationem seu fumum quandam exhalat, quæ ad oculos translata, turbulentior reddit in
eis humorem, naturæ purum ac splendidum. Hinc igitur exhalationem sentiens a cerebro ad oculos
permeans visorius spiritus, perinde atque per suffusiones, tenebricosorum atrorumue visa efficit.
Quintum est *labii inferioris agitatio*, quæ accidit, propterea quod bilis flava internam ventriculi
tunicam mordicans, intro gulam totam, & ad inferna conuellat. Constat enim ex dissectione, v-
nam esse omnem hanc tunicam vniuersam contiguam per omnia sibi, & toti ventriculo, gula, lin-
gua palato, & ori. Hæc igitur est, quæ labia agit ac commouet, quoties ab acriore bile collecta in ore
ventriculi gula mordetur ac conuellitur. Sextum est, quod saliva multa & tenuis per os defluit. Bi-
lis enim præ sua leuitate in superficie fluitat, eamque ob causam ad gulam ascendit, & os, fundum
ventriculi, eiusque cavitatem relinquens: ut mirum non sit, si tum crebro saliva tenuis & plurima ex
ore effluat. Num vero per sudorem, aut vrina excretionem morbus iudicetur, ita dignoscendum e-
rit. Vbi iudicio imminente vrina præter rationem supprimitur, vigorem initio iudicatorium exspe-
ctare oportet. Quod Hippocrates iis confirmat verbis: *Ante vigorem vrina suppressiones*. Quod
si itaque ex iam dictis signis sciamus, vigorem esse iudicatorium, definiendum subinde
erit, qualis ipsum secutura sit excretio, sudor nimirum, aut vomitus, aut alui deiectio,
aut horum aliqua, aut omnia. Si enim vrina & aluo suppressis, rigore æger correptus est,
sudor multus necessario consequetur. Nam cum serosa humiditatis in corpore collo-
catæ tria sint vacationis loca, quia vel per vrinam, vel per aluum, vel per sudorem vacua-
tur: ut duobus prioribus locis suppressis, per tertium, nempe sudorem, copiose admo-
dum vacuetur necesse est. Si vero sola vrina ante vigorem suppressa fuerit, consideran-
dum tum erit, nunquid ante iudicium plura alui excrementa, aut pauciora prodierint.
Si enim multo magis quam antea consuevit fieri, aluus excreuerit, vigor expectandus
non erit, sed cognoscere oportet inclinationem serosi humoris ad aluum factam esse,
adeoque vniuersum hunc humorem naturam per aluum excreuisse, ut mirum non sit
superuacuis omnibus per aluum eiectis, retentam esse vrinam. Sin pauciora per aluum
excreta sunt, inclinationem serosi humoris ad sudoris loca, adeoque cutem factam esse
coniiciendum erit, ideoque iudicatorium vigorem sudor subsequitur. Quod si vom-
itus etiam signa, quæ paulo ante recensuimus, affuerint, per ambas excretiones, hoc est,
sudorem & vomitum, æger iudicabitur. Et magis utique per earum alteram, cuius indi-
cia magis præualuerint. Verbi gratia, ver vomitum magis, si illius indicia, sudoris signis
præualuerint. Per viamque æque, si notæ harum æquales quodammodo fuerint. Si
autem vomitus indicia haud aderint, tunc post vigorem expectare tantum sudores o-
porteret: præferim si ægrotantes crescente accessione vaporibus sursum elatis deli-
rauerint: exterioresque corporis partes calidiores ac rubicundiores fuerint. Tunc enim
humorum ad eas fieri inclinationem ac motum certo monstrabunt, & multo quidem
certius, si vapor quidam calidus, qui antea non aderat, per eas partes exhalet. Siquidem
is vapor subsequens sudoris, quasi certus quidam nuntius esse solet. Quod si vero pul-
sus etiam vndosus fuerit, & insigniter mollis, adhuc magis sudores expectandi sunt.
Quid autem pulsus vndosus, & mollis sit, suo monstrabimus loco. Nihil autem mirum,
vndosum pulsum, cum non nisi propter humorum copiam fiat, quemadmodum etiam
mollis, sudoris esse certum nuntium. Porro, si humorum ad interiora motus & inclina-
tio præualuerit, vbi nulla vomitus signa affuerint, per alui deiectionem æger iudicabi-
tur. Si vero vomitus etiam signa affuerint, & venter insigniter excreuerit, tam per
vomitum, quam per deiectionem iudicabitur. Quapropter eius, quæ per aluum fit,
excretionis nec manifesta, nec propria signa existunt: sed ex eo, quod iudicii quidem
adiunt indicia, desunt autem vomitus, profluvium sanguinis narium, & sudoris, colligere
licebit

- A** licebit. Obseruandum præterea, an plura egerantur, quam ante iudicationem consue-
runt. Sic enim significatur illac potius impetum fore, detenta præsertim vrina. Quan-
quam autem nullum horum signorum adest, potest tamē non solum per alui deiectionem,
sed per hæmorrhoides, & in mulieribus per menses fieri iudicium. Non est autem
difficile, præsertim in mulieribus, definire vtrum per menses, aut alui deiectionem iudicium sit futurum. Si enim insignis lumborū grauitas, & tensio, & dolor fuerit certum
est humorum inclinationem ad vterum esse, ideoque tum iudicium per menses, & mi-
nime per alui deiectionem fiet. Quibus hæmorrhoides promanare certis & statis con-
sueuerunt temporibus, in iis non ita facile est distinguere, num per alui deiectionem,
aut hæmorrhoides iudicium fiat, quod scilicet per eundem locum vtraque excretio
prodeat, adeoque in ambabus humorum motus adanum fiat. Aliis autem omnibus,
quibus per consuetudinem hæmorrhoides non profluunt, vbi concoctionis & excre-
tionis notæ affuerint, vomitus vero, vel profluvii sanguinis narium, vel sudoris defuerint,
per ventris deiectionem omnino futurum est iudicium. Num vero ad abscessum ver-
tatur morbus, duplici signorum genere, communibus nimirum & propriis, cognosci
potest. Communia autem vocamus, quæ in quamvis partem futurum abscessum osten-
dunt, quæ quidem triplicia sunt. *Primum*, si æger salubriter se habet. *Secundum*, si sensim
& paulatim non soluitur morbus. *Tertium*, si vrina neque multa, neque multam sub-
sidentiam habens, sed cruda ac tenuis mingitur. Cuius rei testis est Hippocrates, qui in
Prognosticis ita scriptum reliquit: *Qui tenuem ac crudam multo tempore mingunt urinam si-*
quidem alia ipsis salubria signa adfuerint, iis abscessum ad loca quæ sub hypochondriis sunt, expectare o-
portet. Propria vero appellamus, quæ abscessum ad certam aliquam partem futurum ef-
se denuntiant, quæ quidem quatuor sunt numero. *Primum*, spirandi difficultas celeriter
incipiens, mox autem rursus desinens, quæ humores quidem sursum versus tendere,
adeoque abscessum in supernis sedibus erupturum denuntiat. *Secundum*, capitis dolor
& grauitas. *Tertium*, coma, & grauis sopor. *Quartum*, surditas. Hæc enim omnia humo-
rum motum ad superiora significant, & in glandulis post aures futurum abscessum de-
monstrant. Si vero morbus diuturnus fuerit, neque vllum ex iam dictis quatuor signis
apparuerit, sed grauitas, vel tensio, vel inflammatio, vel dolor in infernis corporis par-
tibus fuerit, motum humorum deorsum fieri, adeoque in illis partibus futurum absces-
sum nuntiabunt.

De diebus decretoriis. CAP. X.

- C**um iam abunde, quid iudicium, ac qua ratione prænosendum, qualeq; futurū sit,
ostenderimus, reliquum est, vt quo die illud sit expectandum, etiam explicemus.
Quod vt præstemus, dierum tum indicum vocatorum, tum decretoriorum, de Hipp.
& Galeni sententia rationem & naturam exponamus necesse est. Hippocrates igitur
& Galenus decretorios dies ideo nominarunt, quod in iis quid de morbo futurum sit
decernatur, inque iis morbus iudicetur. Ex vsu autem & experientia, quod etiam Gale-
nus constantissime affirmat, horum dierum ratio ab Hippocrate inuenta est. Diutur-
na namque obseruatione, vt ex Epidemiorum libris constat, certis que quibusdam diebus
E aduersus morbum insurgere naturā explorauit. Ex iam dicta igitur obseruatione Hip-
pocrates tres esse statuit septimanas, quarum duæ priores a se inuicem sunt seiunctæ ac
separatæ, tertia contra cum secunda cohæret, & coniuncta est: quapropter postrema
secundæ septimanæ dies, tertiæ quoque initium existit, adeoque instar duarum prio-
rum integra non est, sed vt integros habeat septem dies, vt infra fusius dicemus, sexta ma-
xime dici parte indiget. Quamobrem tres septimanæ non vnum & viginti dies inte-
gros, sed minus fere vnus tota dimidia parte cōsequuntur. Atq; hæc septimanarum ra-
tio p̄petuo ita est obseruanda, vt semper tertia septimana sex duntaxat integros obti-
neat dies. Necessarium enim est, vt prima septimana seiuncta sit a secūda, secunda con-
tra cum tertia cohæreat. Si enim prima cum secunda coniungeretur, vltimus iudiciumue
F in decimum nonum: si rursus omnes inter se disiunctæ essent, in vigesimum primum in-
cideret. Hanc vero esse septimanarum rationem ac ordinem, Hippoc. iis verbis in A-
phor. diserte docet: *Quartus*, inquit, *dies septenorū est index. Octauus alterius septimana prin-*
cipium existit. Est vero & undecimus cōtemplabilis, ipse enim quartus est alterius septimana. Con-
templabilis rursus decimus septimus, quippe quartus est a quarto decimo septimus vero ab ii. E qui-

bus ſane verbis perſpicuum ſit, primam ſeptimanam, diem quartum in duo æqua parti-
 ri ſpatia, ac oſtendere quid in ſeptimo futurum ſit. Patet itidem, quod altera ſeptima-
 nam, quæ perinde atq; prima integra eſt, & cuius initium dies octauus exiſtit, vndeci-
 mus in duo æqua diuidat, & quid in decimoquarto futurum ſit, monſtret. Siquidem
 quartus eſt alterius ſeptimanæ, adeoq; ita ſe habet ad poſtremum ſecundæ ſeptimanæ
 diem, qui eſt decimusquartus, vt quartus ad vltimam primæ ſeptimanæ. Palam deniq;
 ſit excitata Hippocratis ſententia, tertiam ſeptimanam ſex tantum integros, vt cõpre-
 henſum eſt, dies a prioris ſeptimanæ diebus diductos & ſeparatos, habere. Quare non
 eſt per ſe integra, ſed ſecundæ, vt diximus, copulanda erit, idque niſi faciamus, per qua-
 ternarios, vt priores, digeri nequit. Quod innuere volens Hippocrates dixit: *Cõtempla-
 bilis rursus decimusseptimus, quippe quartus, eſt a quartodecimo.* Nam quum inquit, *decimumſe-
 ptimum diem quartum eſſe a quartodecimo*, palam ſit omnibus, poſtremum ſecundæ ſeptima-
 næ diem eſſe tertiz initiũ. Vt igitur in prima ſeptimana dies quartus index eſt ſeptimi,
 & in altera ſeptimana vndecimus decimiquarti: ita decimusseptimus, qui eſt quartus a
 decimoquarto, index erit vigefimi, qui tertiz ſeptimanæ vltimus eſt dies. Etſi itaque
 Hippocrates manifeſtis verbis vigefimi diei nullam fecit mentionem: tamen tacite
 hunc ipſum eſſe indicatorium inſinuat, quum a decimoſeptimo illum indicari ait. Ad
 hunc igitur modum in quaterniones Hippocrates primus, & poſt illum Galenus *libr. 3.
 prognost. Cõment. 1. & in libris de diebus decretoriis* ſingulas ſeptimanas digeſſit. Quaternio-
 nes autem illos ſeu quaternarios ſua lingua *ὀκτώημις & δεκάημις*, hoc eſt, indices, & cõtẽm-
 plabiles, nominauerunt, quod ſcilicet dies decretorios indicatorioſue indicet: & quod
 in iis, qualis illi futuri ſint, Medicus cõtẽplari poſſit. Ceterũ vt ſtudioſi intelligant,
 qua ratione ceteri indices & decretorii dies vſque ad centeſimum digeri queant, ſche-
 ma quod ſubiiciemus intueantur oportet, in quo ſeptimanarum, quaternionum, indi-
 cum, & decretoriorum ordinem vſq; ad centeſimum diem perſpicue expreſſimus. Ex
 eo enim deprehendent, quartum diem ab initio morbi computando, finem eſſe primi
 quaternarii, initium vero ſecundi. *Octauus* autem tertii quaternarii initium eſt, qui tan-
 dem vndecimo die finitur. Is quarti quaternarii initium eſt, cuius finis decimusquartus
 eſt. *Quintus* quaternarius a quartodecimo inchoatur die, eiſque finis decimussepti-
 mus eſt. *Qui* itidẽ ſexti quaternarii initium exiſtit, cuius certe finis vigefimus eſt dies. D
 Conſtat igitur vigefimum diem tertii ſeprenarii, & ſexti quaternarii nouiſſimum eſſe.
 Sextæ autem ſeptimanæ quadrageſimum, nonæ ſexageſimum, duodecimæ octogeſi-
 mum, & decimæ quintæ centeſimum. Qui volet, ſimili ordine ad ducenteſimum vſque
 progredi poterit. Nobis hic ſubſiſtere placuit.

Schema ſeptimanarum, quaternionum, & dierum iudicatoriorum parti-
 tionem luculenter complectens.

Septimanæ tres.

Prima		Secunda		Tertia.		Quaternarii						Indi- ces.		Decre- torii.		Indi- ces.		Decre- torii.		Indi- ces.		Decre- torii.	
III.	III.	III.	III.	III.	III.	1	2	3	4	5	6												
4		5		6		7	8	9	10	11	12	4	7	11	14	17	20						
7		8		9		13	14	15	16	17	18	24	27	31	34	37	40						
10		11		12		19	20	21	22	23	24	Dies 44	47	51	54	57	60						
13		14		15		25	26	27	28	29	30	64	67	71	74	77	80						
												84	87	91	94	97	100						

Iudicium
turbantia.

Externa.
Interna.

Ceterum acuti morbi omnes intra quadrageſimum diem iudicantur. Qui vero
 quadrageſimum excedunt morbi, omnes ſunt diuturni. Iam itaq; dictis dieb. iudicato-
 riis indicantur morbi, ſi non quidquam externũ, nec internum interuenerit, quod na-
 ram vel concitat, vel in ſuis motibus impedit. Externa ſunt, Medicus, ægrotus, famuli,
 domus, vicinia, incendium, venti, tonitrua, & alia id genus non pauca. Interna, mor-
 bus, eorum cauſa, & acceſſiones. Medicus autẽ interturbat iudicia, dum ne nihil age-
 re videatur, ſemper aliquid agit, iam clyſterem iniiciens, iam ſanguinem mittẽs, aut cu-
 curbitulam admouens aut ſerapia, aut purgationem miniſtrans, aut vomitum ciens, aut
 fricans, aut vrinam eliciens: in ſumma, naturam non quieſcere, vt ſuos motus recte in-
 ſtituere poſſit, ſinens. Turbat etiam naturę ordinem non raro ægri mollities, atque in-
 dulgen-

- A** indulgentia, aut etiam ferox natura, ac plane rebellis: sicut & ministrorum incititia, vel negligentia, vel superbia. Sed & alia externa supra commemorata, plurimum in inturbandis iudiciis momenti habent. Præterea, morbus & morbi causa, sæpenumero prædictum decretoriorum dierum ordinem subuertunt, ac ut aliis diebus iudicium incidat efficiunt, qui quod indices & iudicatorios intercitant, a medicis intercidentes nominantur. Et ii quidē a decretoriis natura & usu distant. Natura, quod decretorii naturæ suæ ratione sint perfecti, & quod omnibus recte factis, nullisq; interuenientibus erratis, solius naturæ motu, nulloque alio impellente, in iis iudicia fiant. Proinde decretorii illi dies, qui per quaternarios ac septenarios digeruntur, maximam vim habent. Contra, intercidentes minus perfecti sunt, nec in iis naturæ motu & impulsu, sed morbi malitia,
- B** & morbificarum causarum vehementia, aut aliquo extraneo impellente, iudicia eueniunt. Hinc non inepte a quibusdā prouocatorii, quod scilicet in iis natura non sua sponte, sed prouocata & irritata pugnam aduersus noxios instituat, & adoriatur humores, sunt appellati. Quapropter multo minorem, quam decretorii nominati, vim obtinent. Differunt etiam inter se usu. Nam quaternionum circuitus ad futuri vigoris & iudicii notitiā conducit. Ad iudicium vero iam factum discernendum, num fidū aut infidum fuerit, intercidentium cognitio confert. Scire autem fidum, aut infidum fuisse iudiciū ad victus rationem iis, qui iam iudicati sunt, probe præscribendum non parum momenti habet. Porro naturam quoq; stimulant, & veluti prouocant, adeoque iudicia præsumunt (ita enim Hipp. appellat.) accessiones ipsæ, efficiuntque ut in imparib. quoq; diebus, tertio
- C** nimirum, quinto, nono, & id genus aliis diebus iudicia accendant. Cum itaque iudicia plurimum in accessionibus fiant, nihil mirum Hipp. sudores in febribus in imparibus diebus ortos, iudicatorios & bonos esse statuisse. Ita enim in Aphor. inquit: *Sudores febricitantibus si euerint tertio die, & quinto & septimo, & nono, & undecimo, & decimoquarto, & decimosextimo, & vigesimo primo, & vigesimo septimo, & trigesimo primo, boni sunt. ii enim sudores indicant morbos.* Hæc ille. Ceterum nō est hoc loco nec Asclepiadi, nec Celso lib. 3. c. 4. assentiendum, qui Hipp. aliosq; veteres Pythagoricis numeris falsos esse tradunt. Neque enim id priuilegii elogium; iam dictis diebus Hippocrates & post hūc Gal. Hippocraticæ sectæ acerrimus defensor, numerorum quodam studio & amore ascripserunt, ut illi existimauerunt: nec quia pares imparesue sint: sed quia non modo id usu, qui plurimum hic valet, iis diebus ita respondere, verum etiā ratione ab astris cæloq; dimanare compertum habuerūt, ut alii morbi paribus, alii vero imparibus salubriter & mouerentur, & finirentur. Quare tantum abest, ut Pythagoricos numeros sectati sint, ut Gal. subinde mirari se dicat, Pythagoram virum alioqui tam sapientem, numeris tantum tribuisse. Quod si Celsus nō ignorasset, nec Hipp. nugari, nec sui dissimilem esse, nec a numeris Pythagoricis deceptum asseuerasset: nec Asclepiadem, quem paulo ante dixerat vicem exhibuisse tortoris, Hippocrati, quem postea omnis medicinæ parentem esset appellaturus, temere ante tulisset. Sed ut intelligant studiosi, quod non numerus, sed potius Luna, quæ terrena immutat, auctor sit iudiciorum, & quod motuū circuitus ad hos numeros veniant, nō pigebit ea de re breuiter Gal. in tertio de dieb. decretoriis lib. c. 2. 3. 5. &
- E** 6. exponere sententiam. Prima omnium, quæ fiunt, principia duo sunt, nempe q̄ Græcis ἀτακτον, Latinis *inordinatum*, dicitur, & quod ordine ornatumq; semper procedit, ὡς μήτε ἡ κόρη ἀρτίστου ἀνδρὸς, Gal. nominat. Illud ex hac mundi materia proficiscitur, hoc e cœlestibus originem ducit. Cœlestium autem Sol veluti rex quispiam maximus est, qui hunc orbem exornat, & concinne disponit, qui & præsens diem, & absens noctem, & altus æstatem, & humilis hyemem, & mediocriter obliquus vtrunq; solstitiū efficit. Luna vero ut princeps non mediocris, inter illum & nos medius constitutus, terrestrem regionem merito gubernat, reliquos planetas non potentia, sed vicinitate superans, & cuiusque mensis dies disponit, ex Solis aspectu mutandi facultatem consecuta. Cum n. suapte natura opaca sit, nouum sortitur lumen, quum sole primum fruitur, tantaq; eius portio illu-
lucet, quantam Sol aspicit. Quapropter suo ad Solem accessu & recessu varias accipit figuras, & nunc surgat in cornua seu falcata sit, nunc æqua portione diuisa, διχότομον Græci appellant. nunc gibbosa, nunc plena, πλεῖστα vocant Græci. Dein iterum gibbosa, æqua portione diuisa, surgens in cornua seu falcata sit, coiens tandem sub solis lumine fertur, quæ & *Silens* dici solet, quod tum tota obscuretur, ac lumine vacua sit. Omnia ve-

Interciden-
tes dies.

Prouoca-
torii.

Accessio-
nes.

4 Aph. 36.

Asclepia-
dis & Celsi
error.


Lib. 3. de die-
bus decre-
tor. c. 2.

Ratio de-
cretoriorū
dierum e
lunariū cur-
su desum-
pta.
Sol.

Luna.

Lunæ figu-
ræ octo.

ro, quæ facere nata est, vbi falcis figurâ representat, languida fiunt: inualeſcunt, quum A plena fuerit. Surgit autem in cornua, vbi ſexaginta partes abest a Sole: diuiſa æqua por-
 1 tione, quum nonaginta gibboſa, cū centum & viginti plena, vbi centum & octoginta.
 2 Rurſus fit gibboſa, vbi centum & viginti: diuidua, quum nonaginta: ſurgit in cornua,
 3 cum ſexaginta: tandem coit cum ſole. Vt in vniuerſum Lunæ figuræ ſint octo. *Prima* eſt
 4 in ſexangulo mundi ſchemate, ſiue vt hodie loquunt, in aſpectu ſextili, die fere quar-
 5 to. *Secunda* in quadrangulo ſchemate, ſiue aſpectu quadrato, die ſeptimo. *Tertia* in trian-
 6 gulo ſchemate, ſiue aſpectu trino, die vndecimo. *Quarta* in diametro ſiue oppoſitione,
 7 die decimoquarto. *Quinta* in eodem cum tertia ſchemate, die decimoſeptimo. *Sexta* in
 8 eodem cum ſecūda ſchemate, die vigefimo. *Septima* in eodm ſchemate cum prima, die
 vigefimo quarto. *Octaua* in coniunctione, die 27. vt ex ſequenti figura liquet.



Mensis per-
 agrationis.

Ex hoc ſchemate perſpicuum euadit, quod Luna ſigniferi circulum, quem zodia- cum nominat, totum diebus viciſſis ſeptenis, & triente, hoc eſt, tertia vnius diei parte, quæ conſtat horis octo, pertranſit. Hoc quidem ſpatium in ſe complectitur quatuor ſeptimanas, hincq; adeo mensis peragratiōis dicitur, quarum tamen nulla integros ſeptem dies habet, ſed vnicuique quatuor deſunt horæ, hoc eſt, ſextans diei. Singulæ itaque ſenos dies cum horis viginti continent. Qua quidē ratione tres ſeptimane pariunt dies viginti cum horis duodecim. Quum igitur Galenus animaduertat, tres menſis peragratiōis ſeptimanas diebus viginti & media alterius diei parte hoc eſt, horis duodecim, compleri, adeoque non magis ad vicesimum, quam vicesimum primum, referri poſſe, hoc menſe relicto, ad eum qui illuminationis aut apparitionis nominatur, confugit. Quia vero hunc quoq; quod Luna non ſemper æquali dierum numero, poſt coitum cum ſole deliteſceret atque occultaretur, parum certum ac ſtabilem reperiſſet, & eo repudiato tertium menſem ex duobus prioribus compoſitum, quem ob id medium nominauit, conſingere coactus eſt. Præter iam dictos eſt etiam alius mensis, quem coitionis ſiue coniunctionis appellat, qui itidem vt priores quoq; tres, nihil ad intelligendam Hippocratis de diebus iudicatoriis ſententiam, eorundemq; rationem reddendam conſert, vt pleniffime ſect. 2. Aph. com. 24. demonſtrauiſmus, vbi etiā ordine & perſpicue quatuor horum menſium rationem explicauimus. Optimum igitur erit, vt dierum indicatoriorū rationem Hippocratis, quam Galeni & aliorum veterum obſeruatō & experientia comprobauit, ac certam eſſe deprehendit, ſequamur. Multo enim commodius eſt, in expultricem noxiarum facultatem, in morborum imperum atq; motum, in noxiarum humorum ſubſtantiam, modum, qualitatem, copiam, in naturæ morborum medicatrici vim ac poteſtatem, deniq; in arcanam & abditiorē quādam ſympathiam & conſenſum, hos decretorios naturæ incertis & ſtatis dieb. motus, quam in aſtrorum aſpectus & influxus referre. Quod quū doctē & copioſe Franciſcus Valleriola lib. 3. ſuorum locorum communium, cap. 7. oſtenderit, rationibus firmiſſimis Aſtologorum vanas ac futiles nugæ conſutauerit, non eſt cur longior hic eſſe velim aut debeam. Quæ ſane omnia nobis pluris faciendæ ſunt, quam ea quæ e lunari curſu ſumta eſt ratio, præſertim cum non ſit admodum exquisita, & hodie etiam ab Aſtologis multis cauillerur: quanquam

A quanquam neque ea, quam ipsi afferunt, eiusmodi sit, quæ nō fallat ea videntes. Præstat itaque, reiectis omnino incertis iis rationibus, vni Hippocratis aliorumq; veterum medicorum obseruationi & experientię fidem habere, quam vanis Astrologorum commentis autem præbere, quæ diutinam illam obseruationem peruertunt, & legitimum dierum decretorum ordinem perturbant, medicosque ad falsissimas & superstitiosas supputationes, a certissima obseruatione & experientia ipsa traducunt. Quum potius eam iudicatoriorum dierum rationem, quæ in schemate ab hinc altero a nobis est expressa, veram & legitimam esse, contra autem vana esse de iis Astrologorum dogmata, & cum experientia prorsus pugnantia, sibi persuadeant. Nobis valde hoc Leonidæ Astrologorum vanitatem notantis arridet:

B Μάντις ἀπερῆσαν ὅσι ζητῆτε κέλυσον.
 Ἐρροῖτ' εἰς αἷς ψευδολόγοι σφίσις.
 ὑμέας ἀπερσύνῃ μαινώσατο, τόλμα δ' ἔπικτε,
 Τλάμονας, ὃ δ' ἰδίῳ εἰδότες ἀκρίλῳ.
*Vatum sidereos quisquis scrutare meatus,
 Dispereas, mendax non nisi vana sonas.
 Obstetrix tibi stultitia est, audacia mater,
 O miser, & proprii non bene gnare probri.*

Quæ sint nota mortis citra iudicium futura. CAP. XI.

C Hætenus de iudiciis pro instituti ratione satis multa diximus. Nunc quæ sint mortis citra iudicium futuræ indicia exponemus, quorum sane hoc primum & maximum, præferim in lethali morbis, signum est, virium imbecillitas. Neque enim natura ita prostrata, viribusque suis destituta, ad pugnam aduersus morbum confurgit. Alterum, si nullum, vel minimum saltem concoctionis adsit indicium. Tertium, si magnus ac malignus fuerit morbus, celeriterque mouebitur. Fieri enim nequit, ut si malignus sit morbus, viresque imbecillæ, ut morbus concoquatur, adeoque iudicium sequatur. Tres autem sunt omnes eorum, qui citra iudicium moriuntur, modi. Primus quidem in accessionum inuasionibus fit. Siquidem plurimi tum moriuntur, idque propter magnitudinē phlegmones principem aliquam partem obsidentis: vel humorum multitudinem, crassitiem ac tenacitatem, qui spiritus meatus veluti obturant: vel propter repentinum humorum ad interiora motum, qui naturam veluti suffocāt & extinguunt, haud secus, quam si quis viridium lignorum copiam conferim flammæ iniiciat. Alter, in vigore accidit, natura a vehementia accessionis, & morbi violentia superata. Quia quidem de causâ etiam in augmento accessionū, quod tamen rarius accidit, moriuntur. Quippe tum quoque a vehementissimo morbo natura vincitur, & plane succumbit. Tertius modus in declinationibus accessionum accidit. Plurimi namq; in particularibus accessionum declinationibus moriuntur. Quod quum nonnulli vident, fieri etiā posse, ut in vniuersali declinationis tempore aliquis moriatur, arbitrantur. Quod tamen minime verum est, quandoquidem vigore præterito natura morbosas causas iam concoxerit ac deuicerit, alioqui morbus non declinasset: ut itaque quis, ubi natura morbum superauit, vi morbi moriatur, fieri nequit. Moriuntur tamen interdum in vniuersali declinatione ægotantes, atqui erroris, non morbi ratione. Quod vero in declinationibus accessionum moriantur, nequaquam mirum videri debet. Imbecilla enim virtus tempore principii, augmenti, & vigoris ipsius accessionis sufficere potest, quod tum adhuc sit veluti compressa, constricta, & vnita. Declinationis autem tempore, quum calor rursus a medio corporis ad extrema mouetur, discutitur ac dissoluitur habitus corporis, haud aliter quam ubi virtus nimio gaudio laxata exteriora petens dissipatur.

Mortis dies & hora ut præcognoscenda. CAP. XII.

F Mortis quidem dies præcognoscitur, ubi quando morbus naturam superet, considerabimus, & grauioribus accessionibus inspexerimus. Si enim morbus plurimum superauerit, & parum admodum vis naturæ resistere videatur, mors haud diu aberit. Si vero contra acciderit, ut morbus quidem virtutem superet, non tamen plurimum, & virtus admodum resistat, tardius mors sequetur. Sed demus excessum illum, quo morbus naturam superat, esse satis magnū, quomodo tūc scire poterit Medicus, num mors

Mortis ho- vnum diem, vel duos prærogetur? Ex accessionum utique circuitibus. Nam quo die fu-
ra. tura est accessio, eo etiam morietur æger. Porro qua diei hora mors eueniet, facile di-
gnosces, si quo morbi tempore moriatur æger memineris. Nam qui per accessiones af-
fligunt morbi, in principio, quando materiæ multitudo, & crassities ad interiora moue-
tur, occident, quod scilicet hoc tempore natiuus calor suffocetur. Si vero eo tempore ma-
gis infestent accessiones, quo iam ad exteriora morbus vergit, in augmento, vel vigore,
nempe quando morbus vehementissime molestat, ægrotus morietur. Quod si ex disso-
lutione mors continget, ea in declinatione expectanda. Quapropter eos, quos dete-
rius afficit prima accessionis pars, per febres, quæ cum rigore infestant, in ipso frigore
mors excipit. Qui autem grauius habent, quum calor affligit, in ipso augmento, vel vi-
gore accessionis moriuntur. In quibus vero emanant sudores perniciosi, aut per insen- B
sibilem transpirationem corpus discutitur ac dissipatur, in illis ubi calor se remittit, mors
accidit. Quod si accessionis tempora obseruentur, quonam die quauē nocte accessio
grauior ac maior fiat, & qua eiusdem hora grauius molestat, facile mortis hora prædi-
cetur. Ea enim die aut nocte, qua maior est accessio, ægrum perimet, & in ea accessionis
hora, in qua antea per alias accessiones illum grauius afflixit. At si morbi per accessio-
nes non vrgent, certius nihil sciri potest, nisi quod ea hora expectanda mors est, in qua
æger grauius se habere consuevit, & deteriora illi affuerunt symptomata. Sed de iudi-
ciis satis. Cum vero in hoc tertio libro tractentur ea maxime, quæ ad prædictionē per-
tinent, nihilque sit, quo hodie magis ad prælagendum vtantur Medici, vrinæ inspe-
ctione, vt de ea quoque, quantum instituti ratio fert, differamus, necesse est. C

DE VRINIS. SECTIO III.

Quid vrina, & quis eius vsus. CAP. I.

Vrina quid.

Cum de vrinis tractandum hoc loco sit, principio quid vrina sit, vt explicemus oportet. Vrina itaque non est nisi sanguis aut humorum serum in caua vena contentum, & areni-
bus attractum, atque hinc per urinarios meatus in vesicam delatum. Vel breuius, vrina est sangui-
nis colatura, siue seriosior eius pars arenibus attracta. Vt hinc omnibus perspicuum euadat, de
Quorū vi- na nota sit. iis quæ in iecore, valis, renibus, vesica, ac meatibus urinariis sunt, nullum plane neq; ma-
nifestum, neq; euidēs haberi signū, præter solam vrinam. Proinde ad iudiciorū digno-
tionem & prædictionem, quando quidem cōcoctionem aut cruditatem eorum, quæ in
valis continentur, ostendat, summe conferre solet. Vt non temere Galen. de Vrinis lib. 1. D
iudiciorum tractationem instituerit. Quapropter reprehensione digni sunt, quotquot
in vniuersum vrinarum inspectionem atque cognitionem tanquam incertam & inuti-
lem damnant. Hac enim ratione non tantum Hippocratem & Galenum, qui multis in
Error eorū, qui vrinæ in- Error eorū, qui vrinæ in- Error eorū, qui vrinæ in-
spec-tionem spec-tionem spec-tionem
prorū co- prorū co- prorū co-
temnuat. temnuat. temnuat.

locis harum mentionem faciunt, tanquam eos, qui rem nullius vsus toties attigerunt, &
interdum ex professo tractant, irrident, sed & rationi ac experientiæ aduersantur,
quæ vrinarum inspectionem plurimum in nonnullis morbis momenti habere testan-
tur. Atqui iam dictis non minus reprehensionem merentur magna nostri temporis
medicorum pars, qui nullum non morborum genus ex vrina cognosci posse censent.
Nisi enim hanc peruersam & risu dignam opinionem induissent, non ex vrina, tan-
quam olim ex tripode, de singulis corporis malis respondere in animum induxissent. E
Valde autē inepti sunt, qui ex vrinæ inspectione omnia prædicere conantur, quod sci-
licet inscitiam aut verius stultitiam suam hac ratione omnibus planam faciant: eruditis
primum & intelligentibus, vt qui eorum duntaxat quæ in iecore, valis, renibus, vesica,
& urinariis meatibus sunt, vitiorum notam esse vrinam sciant. Vt itaque merito riden-
tur, qui ex sputo de iis malis, quæ renes vel vesicam infestant, pronuntiant: ita certe ii
quoq; risu omnium digni sunt, qui ex vrina de thoracis vitis certi aliquid prædicere ni-
tuntur. Plebeis etiā pulcre se ridendos exhibent, dum non raro ea ex vrinæ inspectione
diuinent, aut certo etiam affirmant, quæ sciunt esse vanissima. Proinde qui pertinaciter
hodie etiā sibi persuadēt, nihil non ex lotii inspectione cognosci posse, adeoq; imperi-
tæ multitudini hac ratione spe lucri, parum certe liberalis, imponere in delitiis habent,
ii certe digni sunt, vt nouo etiam aliquo elogio ornentur, & nō vt olim ab Aristophane
καταφύγοι: hoc enim epitheto auaros & indoctos olim medicos ille dignatus est: sed po-
tius ἐπειράτοι appellent, & rectissime etiā in hos ipsos torquetur vsitātū vulgō cōuitium:
Stercus & vrina, Medicorum fercula prima.

καταφύγοι.
ἐπειράτοι.

A Quare eos qui veritatis amantes sunt, artemque sine ignominia exercere volūt, hortamur, ut legitimū vrinę inspiciendę vsum iterum introducere adnitantur, nec aliorum more illa ad sordidum quęstum abutantur. Quod facient, si ex illa tanquam tripode deinceps vaticinari desinent, & pro nota duntaxat vnica, & non quidem omniū, sed eorum, quę in iecore & vasis sunt, malorum corporis, vtantur. Reliquos impostores ac stupidos asinos, qui pluris sordidum quęstum, quem quotidie ex lotii inspectione ac diuinatione, cum summa ignominia coniuncta, faciunt, quam veritatē ipsam æstimant, nihil moramur, utpote quos ne Musę ipsę, ut alicubi Galenus dixit, sanare possint. Ad coruos igitur eant, qui ex lotio de omnibus omnium partium affectibus sese certa pronuntiaturos temere iactitant, & hac impostura præstantium Medicorum nomen sibi

B falso arrogant, miserisque ac simplicibus hominibus fucum faciunt, quum venosi tantum generis, partium iecoris, renum atque vesicę, vrinam indicium esse certissimum constet, aliorum minime. Quod autem serosi humoris pars, *ὑγρὰ τερεὴς* Hippocrates, id est, *vehiculum nutrimenti*, vocat, sanguinem crassiorem in angustiora loca deducat, Galenus lib. 4. & 5. de usu par. fusissime docet.

Quot in vrina consideranda, & qua ratione illa sit inspicienda. C A P. II.

C V M in vrina inspicienda quatuor potissimum sint consideranda, nempe color, consistētia, quantitas, & contenta, danda opera erit primum ægrotanti, ut hanc legitimo tempore colligat, perfecta nimirum iam concoctione. Citius enim si colligatur, nulla in ea contenta, utpote quę tertię concoctionis sint excrementa, erunt. Dein, ut vniuersum colligat, ut scilicet de singulis perfecte Medicus iudicare possit. Tertię, ut illam deferri primo quoque tempore ad Medicum curet, nec ultra sex horarum spatium id facere cunctetur: alias enim eius significatio minus certa erit, color enim mutabitur, subsidentia dissoluetur, consistentiaque immutabitur. Medico autem hæc cura incumbit, ut matulam, in qua vrina colligitur, aptam & idoneam habeat. Talis vero est, quę non e viridi, sed vitro potius albo & tenui constat, quod nimirum in ea colores cum consistentia vrinę exacte appareant, quod in viridi haud fit. Non nimium quoque pateat, ne quem locum altitudinis contenta obtinuerint, non recte discernatur. Præterea non sit inferna eius pars nimium lata & plana, sed deorsum extumescens, ut in ea commode contenta subsidere possint: nec minus arcta, ut scilicet contenta in se recipere queat. Dein Medico de vrina pronuntiandum prius non erit, quam in matella integre resederit. Citius enim de illa iudicare si perrexerit, de cõtētis nihil erit quod cognoscere possit. Quintę etiam priusquam omnia quę in vrina consideranda veniunt, contemplatus fuerit, vrinam vehementer non mouebit. Hoc enim nisi cauerit, multa in ea transponentur, & contenta concussa vi, proprias sedes deserent, ac bullę rumpentur. Locus præterea, in quo vrinam inspiciet Medicus, nõ sit obscurus, aut nimis lucidus. Hic enim ut remissiones sint colores efficit, ille vero non parum de coloribus tollit, neque ut plene intueri queant, prohibet. Magno denique studio cauebit, tum Medicus, tũ eger, ne vrina vento perturbetur, aut frigore congeletur, aut saltem immutetur, donec separatio contentorum in vrina fiat. Ut vel hinc etiam pateat, quam imperiti sint, & imposturę prorsus dediti,

E qui hodie ex vrinis aliunde allatis, sæpenumero triduanis, & inclementia aeris, ac crebra moratione vehementissime perturbatis, tamen proterue nullaque præmissa eius rei præfatione atque admonitione, iudicare, & tanquam in ea omnia, veluti in speculo quodam appareant, magno supercilio pronuntiare audent.

Vrina in omnibus mediocris Medico primum cognoscenda. C A P. III.

Q V I in vrinarum iudicio & inspectione se exercitari cupit, huic necessarium erit, ut primum omnium mediocrem & optimam vrinam, ad quam omnes reliquę, tanquam ad regulam & normam atque amussim, sunt comparandę, sæpenumero intueatur. Nisi enim quis initio saluberrimam & optimam vrinam, veluti scopum quędam in quem perpetuo intentus sit, & ad quam omnes reliquas exigat, sibi ob oculos ponat, ut

F de reliquis, quę a mediocri illa recedunt, recte iudicet, fieri non potest. Optima itaque, & hominis in omnib. temperati vrina est in substantia mediocris, ac quantitate potioni, quę assumpta est respondet, colore subrufa, & subflaua, sedimento albo, leui, & æquali. Nulla in ea innatat bulla, nihil inest capillis aut ramenti simile, & huiusmodi generis. Quę admodum igitur regula & amussis quũ adhibetur, ut ligna, curua, obliqua, & distorta sunt

Vrina quę do colligenda.

Quando ad Medicum deferenda.

Qualis esse debeat matula.

Quando Medico de vrina pronuntiandum. Vrina non vehementer mouenda.

Vrina quo in loco inspicienda.

Vrina ne ab ambiente immutetur.

Optima & saluberrima vrina quę.

ostendit: ita vrina, quæ ex omni parte mediocris est, eam, quæ magis vel minus a mediocritate declinauerit, demonstrat. Sæpius igitur, ut commemoratum est, vrina hæc optima, & per omnia mediocris, vrinæque sanorum similima, nouitio Medico inspicienda erit, ut scilicet, quum aliquam ab hac ipsa declinasse viderit, statim ab optima & exquisita sanitate hominem hunc cecidisse statuatur ac pronuntiet. Non temere vero adiectum est, *ab optima & exquisita*: quod nimirum hic non de ea, quæ latitudinem habet, sed de ea, quæ summa & inculpabilis est, sermo fiat, quæ vtique vrina ceterarum veluti scopus aut norma est, ad quam perpetuo sunt referendæ.

De colorum in vrina differentiis. C A P. I V.

Colorum
vrinæ sex
præcipuæ
differentiæ.
Alba vri-
na.
Crystalli-
na.
Niuea.
Aquea.
Lactea.
Glauc.
Charopa.
Subpalli-
da.
Pallida.
Subrufa.
Rufa.

Subflaua.

Flaua.

Subrubea
Rubea.

Vinea.
Pascea.

Veneta.

Viridis.

Liuida.
Nigra.
Oleacea.

Mutatio-
nis colo-
rum vrinæ
causæ.

CVm quatuor potissimum esse, quæ in vrinarum inspectione consideranda sunt, ex iis quæ paulo ante diximus, satis constet, ac inter ea primum occupet locum color, ordinis ratio postulare videtur, ut hoc loco colorum differentias exponamus. Præcipuorum autem in vrina colorum sex sunt differentiæ, *albus* scilicet, *pallidus*, *rufus*, *flauus*, *ruber* & *niger*. Si qui vero reliqui sunt, sub iam dictis comprehenduntur. Alba enim vrina varias alias sub se cõplectitur species. Inter albas enim est, quæ crystallina, quod crystallo similis sit, dicitur. Item niuea, quæ fere niuis candorem refert. Aquea, quæ aquæ similis est. Atque hæc quidem tres vrinæ intensæ sunt albedinis. A summe alba parum recedunt lactea, glauca, & charopa. Lacteam vero appellant Medici, quæ lacti assimilata est. Glaucam, quæ veluti cornu pellucida existit. Charopam, quæ subalbidis cameli pilis, aut vngui vocato lapillo similis est. Post albam vrinam *subpallida*, quam nonnulli *subspiceam* nominant, subsequitur. Cuius color similis est aquæ, cui spicei aut subpallidi humoris aliquid admistum est. Proxima huic est pallida, quam alii *spiceam* appellant. Hæc apparet, vbi plus bilis serosæ humiditati miscetur. Quum autem concoctio processerit, tum plus tincturæ accedit, & fit subrufa, quæ non puro auro similis est. Post hanc vrina est rufa, quæ auro puro similis est, alioque nomine aurea dicitur: Græci *πύρρον* nuncupant. Rufam sequitur subflaua, quæ aquam representat, in qua cnici seu cartami flos dissolutus est, aliisque subcrocea vocatur. Post eam est flaua, quam Græci *ξανθὴν*, Latini nonnulli *croceam*, quod referat aquam, in qua croci Corycei flos dissolutus est, appellant. Hanc subrubea comitatur vrina, quæ Armenici boli, aut verius Lemnii sigilli colorem exprimit. Deinde rubea, quæ Græci *ερυτὴν*, quod colorem rubeum, qui in malis, cerasis, & id genus aliis fructibus est, præ se ferat, nominant. Iam memoratæ succedit vinea appellata vrina. Hæc nomen a vino nigriore accipit, iecorisque plane colorem refert. Pascea seu cyanea intensior est vinea, passioque, quod ex vua nigra decocta fit, maxime similis est. Vel certe cerasi fructus, qui ad nigrorem declinat, colorem præ se fert. Veneta siue fusca est, cuius color ex puro albo & nigro æqualiter confusus natus est, qui *brunus* vulgo dicitur. Et si plane qualis venetus color sit, sensu nosse velis, cerussam, vel lectissimam calcem, vel aliud simile atramento, vel pici, vel bitumini æquis partibus misceas. Viridis vrina est, quæ colorem brassicæ, aut graminis, aut Smaragdi lapidis representat. Liuida, quæ plumbi colorem refert. Nigra, quæ extincti carbonis colorem obtinet. Oleacea, quæ colore oleo similis est.

Deus, quæ vrina colorem mutant. C A P. V.

HActenus omnes vrinæ colores breuiter admodum exposuimus: nunc ne quis de illis temere iudicando erret, quandoquidem in sanis etiam non raro de causa leuissima mutantur, mutationis eorundem causas, quæ sane multæ sunt, percontabimur. Prima est cibus ingestus. Is enim si corpori oblatum non probe transmutatur & conficitur, nec in sanguinem vertitur, similem sibi colorem vrinæ reddit: idque iis euenire solet, qui præter naturam sunt affecti. Nonnunquam etiam iis, qui secundum naturam se habent, id ipsum accidit, vbi scilicet cibi aliquo adscititio colore infecti similem sibi colorem vrinæ efficiunt, quemadmodum fit, vbi oleribus vescuntur. Idem contingit, si medicamenta colore aliquo infecta assumantur, quale est rheum barbarum vocatum. Altera causa, cur vrinæ color mutetur, potio existit. Retinet enim magna ex parte vrina eorum colorem, quæ in potione hausimus. Si enim aquam, aut vinum album & tenue affatim biberimus, alba quoque & tenuis vrina erit: sin crassum & nigrum fuerit vinum, nigrior & crassior erit. Tertia causa mutationis coloris, qui in vrina apparet, colliquatio eorum est, quæ in corpore sunt. Si quidem vrina nunquam non earum partium, quæ

- A** in corpore liquescunt, pinguedinis præsertim, adipis & similium colorem monstrat. Id quod iis verbis in Epidemiis significare voluit Hippocrates, inquit: *Vrina eiusdem cū cibo & potu coloris, & veluti colliquatio est humoris, qui in corpore continetur.* Quartum est sexus & ætas, quæ nō parum vrinæ colores immutant. Iuuenum enim vrina est subrufa & subflaua. Senum tenuis & alba cum exigua subsidentia ad cruditatem declinante, q̄ senum ætas, quantum procedat, tantum ad frigidum declinet. Quapropter innatus calor in iis marcescit, coctioque minuitur. Puerorum vt parum recedunt a subrufis & subflauis, ita substantia parum excellunt iuuenum vrinas, plurimamq; subsidentiam habent. Nam horum calor natiuus multus est, multa quoq; ingerunt. Quantū procedit ætas, tantum color intenditur, subsidentia vero minuitur. Mulierum, quæ temperatæ sunt, iuuentæq; vigentis, parum a subrufa & subflaua versùs albam declinant, consistentia tenues sunt, & subsidentiam coactam magis quam virorum habent. Calor enim iis natiuus, virorum respectu exiguus, debilis in illis concoctio & excrementorum copia. Labore præterea & otio vrinam mutari accidit. Nimio enim labore & exercitio vrina subflaua, & demū flaua fit, propter motum, qui calefacit, & bilem in corpore procreat. Otium & quies, albam reddunt vrinam. Somnus quoq; & vigilia, vrinæ colorem mutant. Qui enim per naturam dormierunt, minus albam vrinam stringunt, & subpallidam existentem. Nec temere adiectum est, *Per naturam*: qui enim ex affectu aliquo dormiunt, lethargo nimium aut comate, eorum vrina albicat. Eorum, qui vigilant, vrina ad album, & aqueum vergit. Vigilia enim cruditatem, teste Hippocrate, efficit. Inedia quoq; vrinæ colorem mutat. Nam qui ieiunarunt, horum vrina fit flammea & flaua. Contra eorū, qui plurimum comederunt, adeoq; cruditatem contraxerunt, vrina est alba. Coitus certe vrinam pinguiorem reddit. Sunt & alia præter ea, quæ iam dicta sunt, quæ vrinam immutant, vt vacuatio, timor & alia, quæ commemorare nihil attinet.

6. Epid.
sect. 5. A-
phor. 15.
Sexus &
ætas vrinæ
colorem
mutant.
Iuuenum
vrina.
Senum.
Puerorū.
Mulierū.

Laboris
& exerci-
tū.
Otii &
quies.
Somni.

Vigiliarū.
2. vict. acu-
aph 59.
le unii.
Coitus.

De consistentia vrina. CAP. VI.

- E**Xpedito primo, quod in vrina contemplanda consideratur, alterum, nempe consi-
stentiam, aggrediamur oportet: quæ quidem triplex est, crassa, mediocris, & tenuis. *Mediocris*, quæ neq; crassa, neq; tenuis, sed in harum medio existit. *Tenuis* aut, quæ a me-
diocri crassitudine discessit, & nōdum in liquoris naturam abiit, necdum reuera vrina,
sed potius aqua est, dicitur. Hæc enim reuera vrina est, quæ concoctionis eius, q̄ in venis
fit, excrementum existit, adeoq; substantiam, & colorem conuenientem obtinet. Eius
autem duæ sunt differentiz. Quædam n. tenuis, & pura excernitur, ac posthac semper
talis permanet. Altera vero tenuis quidē mingitur, at paulo post perturbatur. Est autem
vtraq; cruda, ac concoctione vacat. Differunt autem, q̄ prior nondū cœpisse cōcoctio-
nem, atq; adeo summā cruditatē significet, altera vero iam cœpisse denotat. Nec n. alia
de causa conturbatur, nisi quod flatuosi cuiusdam spiritus copia seroso liquori permi-
sceatur, veluti musto iam feruenti accidit. Nam id ipsum feruens iam perturbatur, adeo-
que concoqui incipit. Quapropter praua quoq; hæc altera vrina existit, quoniam lon-
giori tempore, & forti virtute ad concoctionem indiget. Crassa vrina est, quæ iusto cras-
sior est, & a mediocri crassitudine recedit. Eius itidem duplex est differentia. Quædam
enim crassa & perturbata mingitur, paulo post autem residet, ac tenuatur. Hæc quidem
bona est, propterea quod parum adhuc perturbationis superesse demonstrat. Quippe
quando flatuosus spiritus humorē perturbans separatur, tunc humor ipse clarus reddi-
tur, vt necesse sit in ea vrina, quæ statim post quā mixta est, subsidet, non multum pertur-
bationis inesse. Quædam vero contra, vt mixta est crassa, talis subinde permanet. Hæc
quidem bona etiam existit, sed non perinde atq; prima. Nam vigere adhuc eam, quæ in
sanguine est, agitationem & perturbationem ostendit. Vtraque igitur bonam significa-
tionem de se præbet. Prima, quod non ita multo post morbum, concoctum iri ostendit.
Siquidem crassiorum humorum quidem ebullitionem, & agitationem, sed tamen na-
turam incipere iam eorum secretionem indicat. Secunda, quia non omnino cruda est,
quandoquidem ex vigente perturbatione fiat.

Triplex
vrinæ cō-
sistentia.
Medio-
cris.
Tenuis.
Eius dif-
ferentia.


Crassa.
Differen-
tia eius.

De differentiis locorum contentorum in vrina. CAP. VII.

Contenta vrinarum, quæ Græcis *παρυσιμα* dicuntur, propterea quod in qualibet
altitudinis corporis vrinæ parte consistent ac contineantur, trifariam diuiduntur:

Contenta.

ut enim altitudo corporis vrine trifariam diuiditur, in fundum scil. matule, superficiem, A
 supremamue regionem, & vtrarumq; harum extremitatum medium: ita etiam tria cō-
 tentorum genera existunt. *Primum*, quod in summa vrinæ superficie natat, Græcis *νεφέλη*,
 Nube-
 la. Latinis *nubes* & *nubecula* vocatur: metaphora a terra desumpta, a qua nubes & nebula
 Subliden-
 tia. summe secedunt. *Alterum*, quod in fundum matule concedit ac descendit, Græcis *υποψιδν*,
 Sublime. hoc est, *subici*, Latinis *subsidentia*, *sedimentum* & *subiectum* nominatur.
 Tercium, quod æquis spatiis ab vtriusq; extremis discedit, & in medio altitudinis confi-
 stit. Græcis *μεσσηνία*, Latinis *sublatio*, *suspensio*, *sublime*, *sublimamentum* vocatur. Iam enu-
 merata, hæc figura clarius oculis subiiciet.



Expeditis iā vrinæ colorib. cōsistentia, & cōtentis, reliquū est, vt singulorū significa-
 tiones ostēdamus, quo illis ad p̄dicendū Medicus cōmode vti possit, a colorib. ordiētes.

Quid ex vrina coloribus sit pradicendum. CAP. VIII.

Albæ vri-
 næ signi-
 cationes.

Alba vrina cruditatis nuntia existit, ac cōcoctricis facultatis imbecillitatem signi-
 ficat. Quod si multa sit, maxime in sanis, multam vini, præsertim exilis, tenuisue, &
 oligophori, potionem indicat. Alba præterea vrina, frigidam iccoris intemperaturam,
 & magnam in vrinariis meatib. obstructionem nonnunquam ostendit. In acutis febr-
 bus, non raro delirium, aut phrenitim, bile nimirum ad cerebrum delata, portēdit. Hu-
 mor siquidē tingēs, vrinamq; inficiens, nō est, nisi bilis: ea itaq; ad cerebrum transmissa,
 4. Aph. 71. alba sit vrina est necesse. Hinc est, quod Hippo. in Aphorismis scriptum reliquerit. *Qui-
 bus vrina perspicua & alba sunt, male, præsertim vbi in phreniticis apparēt. Quo vero magis albus
 color intenditur, eo peior est existimandus.* Porro vbi est crystallina & aquea, omnimodā na-
 turæ cruditatē a frigiditate ortam, aut obstructionē maximā, præcipue meatuū vrinam
 sequestrantiū: aut bilē quæ tingit, alio trāsfluere, indicat. Quæ vero albedinē remissam
 ostendit, præsertim quæ vergit ad glaucū & charopum colorem, non ita facile ob flauæ
 bilis absentiam, & alio migrātis apparet, sed potius ob debilitatē virtutis alterātis, & cō-
 coquētis humores, pducit. Albę variantes nihil longo tpe, capitis morbos frigidos, ver-
 bi gratia, vertiginē, morbū comitalē, & id gen^o alios, ciborū præterea fastidia, artuū do-
 lores, nervorumq; resolutionē, prænuntiant. Hæc n. omnia sequūtur continuam crudi-
 tatem, vel frigiditatē, vel obstructionem, vel humorū trāspōsitionem. Albæ remissæ, vt
 lactea, glauca, charopa, in febrū initiis & incremētis, laborem significant. Nā multitu-
 dinē marerix putrefactæ præ se ferūt. In febrū vero declinatione, salutē ostendūt. Sub-
 pallida & pallida vrina, mancā adhuc concoctionē, sed minus tñ, q̄ alba, significat. Nā
 natu-

Subpalli-
 da & pal-
 lida.

- A** naturam, quasi iam indulgere concoctioni monstrat. Subrufa & rufa, item subflaua, & flaua vrinae perfectam concoctionem, & corporis totius certam sanitatem pollicentur, idq; in iuuenibus maxime. In senibus enim & mulieribus si eiusmodi vrinae apparent, vt maiores causae praecesserint oportet, nempe aetūs, vigilia, labor, ciborum aliarumq; rerum acriū vsus, quae bilem in corpore adaugent. Subruba & rubra apparet propter multorum ciborum, & acrium oblationem, item ob sanguinis ebullitionē & iram, ob iecoris calidam intemperiem, & id genus alias causas. Vinea vrina sanguinem assari, atq; in flauam vel nigram bilem transmutari indicat. Interdū etiam in sanis hominib. qui multum laborarunt, aut longum iter cōfecerunt, talis vrina, eo quod sanguis affetur, spectari solet. In vehementib. febribus sanguinis saniem abundare, putrescere & bilefcere insinuat. Passaea bilis adustionē notat. Hec si diutius permanserit, arquatū morbū adesse significat, cū multitudine & crassitudine corruptioneq; accumulare in iecore bilis. Viridis aut, biliosum humorem tm̄ ceteros humores antecedere ostendit, quantū ipse magis intensus fuerit. Quapropter prauissimae bilis quantitate & qualitate exaugetur excessum monstret. Hec si diu eiusmodi perseuerauerit, sitisq; assilua & aetūs affuerint, haud exiguus metus est, ne conuulsio a siccitate aegrum corripiat. In summa, viridis vrina exultam esse omnem natiuam humiditatem a calore febrili, demonstrat. Oleacea vrina caloris praeter naturā signum est, eoq; magis quo fuerit intensior. Pingui enim a calore caliquefacto, huiusmodi vrina apparet. Quod Hippo. 2. progno. 35. iis confirmat verbis: *Pinguedo telis aranearum similis innatans vrinae damanda est, colliquationis enim nota est.* Quod si igitur paulatim eiusmodi vrinae color processerit, multoq; tempore durauerit, ac confirmetur cum calore toto corpore diffuso, totius corporis colliquationem hecticamq; ostendit. Sin breui atque cumulatim appareat cum calore in renibus tantum excitatum, renum duntaxat colliquationis indicium est. Venera melancholici humoris fusionem, vel frigiditatem vehementem vel mortificationem quandam, potissimum vbi nulla praecesserit concoctionis significatio, & a prauis coloribus ad peiores mutata sit vrina, monstrat. Liuida eadem ostendit, interdum etiam plagas & verbera homini incussa. Alias semper frigiditatis, adeoq; caloris natiui mortificationis signum est. Nigra interdum caloris ad extremum profecti indicium est, & hoc quidem si viridis praecesserit. Interdum extremam frigiditatem portendit, idque vbi liuida antecesserit. Semper autem mortalis est, vitaeq; periculum praesagit, nisi vbi vitia, quae ab atra bile excitata sunt, praecesserint. Tum enim salutaris existit, quippe hunc humorem a natura expurgari significat. Quapropter si talis vrina in melancholico, lienoso, aut quartana, praesertim in febris declinatione visa fuerit, solui morbum notat.

Quid ex vrinae consistentia praedicendum sit. C A P. I X.

- V**rina tenuis innati caloris imbecillitatem, & frigiditatem dominantem, cruditatem item, iecoris, renum & vasorum vrinatiorum, propter causas paulo ante ostensas, obstructionem praenuntiat. Quapropter in quartanis febribus, in quib. melancholici humores crassitie sua meatus obstruunt, huiusmodi vrina saepenumero apparet. Quod si vrina non solum tenuis, sed & alba fuerit, extremam cruditatem significat. Si itaq; tenuis vrina diuturna fuerit, symptomata morbi incrementum, virtutē superari, nec morbū posse cōcoqui, vitaeq; discrimē notat. Nonnunquā tenuis vrina abscessum in iis partib. q̄ infra septū trāuersum sunt, portēdit. Cui⁹ rei testis est Hip. qui in Prognosticis ita scriptum reliquit: *Qui vrinā tenuē crudamq; diutius mingūt, si reliqua vt in conualituris indicia fuerint, in iis abscessum ad partes, quae infra septum trāuersum sunt, expectare oportet.* Crassa vrina excessum abundantiamue materiae, & humorū ventriculū, intestina, & iecoris cauas partes implētium ostendit. Hae si in febre spectetur, vbi tenuis praecesserit, statim futuram declinationē monstrabit. Namq; hoc casu videtur natura superasse materiam. Proinde eo melius ac tutius, quo citius vel plus crassitudinis inierit, symptomata dissoluentur, naturales excretiones augebuntur, vrinae ad proprium colorem & consistentiam reuertētur. Si vero vna cum febris accessione vrinae crassae apparuerint, quae aut semper aliquid crassitudini addant, aut saltem non attenuentur, conicere oportet virtutis imbecillitatem & humorum multitudinem, ita vt metus nō exiguus sit, ne natura penitus superetur & occumbat. Si vero iterum tenuetur, cum melioribus coloribus, remissio expectanda erit. Ceterum crassa & alba vrina maximam crudorū humorū copiam indicat.

3. c. 4.
Aphor. I.

4 Aph. 70.

1. Prog. 17

Multæ v-
rinæ in sa-
nis causæ.

4. Apho. 8

Paucæ v-
rinæ causæ.

Leuia cõ-
tenta.

Tenuia.

cat. Atq; hæc aliquando in laboriosis febribus apparens ab abscessu liberat, quemadmo- A
dum historia quadam in *Epidemiorum libro 6*. Hippocrates confirmat, inquit: Vrina
crassa & alba, qualis famulo Amphigenis erat in laboriosis febribus, quãdo quarto min-
gitur die, ab abscessu liberat. Crassa & lactea in fine veniens, calculos in vesica vel reni-
bus ostendit. Crassa charopos, & vt iumentorum turbida, dolorem capitis portendit,
Hippocrate attestante, qui in Aphorismis ita scriptum reliquit. *Quibus in febribus urina per-
turbata sunt veluti iumentorum, iis dolores capitis aut adsunt, aut aderunt.* Crassa & subrubea,
maxime si talem subsidentiam habuerit, longos portendit morbos, & a periculo im-
munes, vt in Prognosticis iis verbis testatur Hippocrates: Si, inquit, *urina subrubea fue-
rit, & sedimentum subrubeum & leue habuerit, diuturnior hic morbus quam primus, sed tamen sa-
lubrior. Indicat enim optimi humoris, nempe sanguinis, nõ exquisita ratione confecti abundantiam,* B
*adeoque sine periculo est. Tamen quia ad concoctionem longiori temporis spatio eget, ideo diuturnio-
rem quoq; fore morbum significat.* Crassa & rubea sanguinis copiam monstrat, veluti in con-
tinentibus febribus. Crassa & nigra, melancholici humoris vacuationem, præsertim si,
vt dictum est, in declinatione quartanæ & melancholiz apparuerit, ostendit.

Quid ex urina quantitate prædicendum sit. C A P. X.

V Rina si maior sit visa exiisse, quam pro ebibitorum portione, in sanis quidem corpo-
ribus multam vini, maxime aquosi, portionem aut liquidorum ciborum usum signi-
ficat. Multum quoq; redditur vrinæ propter usum medicamentorum vrinam cientium.
In ægris vrina copiosior exit, quando intemperies quædam aucti caloris circa renes ex-
sistit, vt accidit in diabete. In eo enim malo propter vehementem calorem renes sero- C
sam substantiam a iecore, omniq; venarum genere celerrime attrahunt. Multa etiam v-
rina erit, si aliud natura sicca fuerit. Nam si aliud, præ malo quod illi accidit, excremen-
ta, quæ alias, secundum naturam se habente homine, ad eam deferuntur, vacuare haud
poterit, ad vrinæ meatus, tanquam vicinum illi locum, impetu facto transferuntur. At-
que hoc est, quod Hippoc. in Aphor. iis innuere verbis voluit, inquit: *Mictio noctu co-
piose facta, exiguam deiectionem significat.* In hydrope, præsertim anasarca, multa quoq; vri-
na redditur, quod habitus totius corporis aquoso sanguine refertus sit. Multum deniq;
mingitur, vbi reliquarum corporis vacuationum, maxime ventris deiectione nulla præcessit.
His enim omnibus impeditis, vt ad vrinæ loca detrudantur est necesse. Contra, paucæ vri- D
na mingitur ob cibos sicciores, potus paucitatem, vehemens exercitium, & id genus alia, quæ
corpus quomodolibet exsiccare consueuerunt. Item, propter cibaria & medicamenta,
lentore participantia, atq; vrinæ meatus obstruentia. Præterea, propter humorum crassi-
tatem & tenuitatem obstruere potentium alui multam deiectionem. Cum enim natura
omnia totius corporis excrementa per consueta vacuationis loca excernat, si forte al-
ter alterum vacuatione superauerit, vt per alterum minus vacuetur necesse est. Febris
etiam vehementia in causa est, cur paucior exeat vrina. Hæc enim omnem corporis
humiditatem absomit, vt hoc nomine per vrinam multa excerni possit. Postremo, ob
excreticis, quæ in renibus ceterisque vrinæ excretioni famulantibus vasis est, facultatis
imbecillitatem, quæ functionem suam obire nequit.

Quid ex contentorum consistentia prædicendum. C A P. XI.

I N contentis haud secus atq; in liquore vrinæ tria sunt considerata, nempe substan-
tia, color, & quantitas: de quibus, a substantia orsi, ordine differemus. Contentorum
autem quorundam substantia mediocris, aliorum tenuis, nonnullorum crassa. Vrina-
rum namq; , quæ secundum naturam sunt, contenta consistentia sunt mediocria, alba,
leuia, & æquabilia. Leuia contenta sunt, quæ sibi continua sunt, & vnum veluti conti-
nuum & coactum corpus, neq; aliquo modo rugosum, huc & illuc compulsus, neque
dissolutum aliqua in parte. Quæ vero illis contraria sunt, aspera dicuntur. Leuia vero
continuaue contenta, nihil noui adferunt. Sin aspera ac veluti dispersa fuerint, non ex-
igua quædam in profundo corporis perturbatio significatur, quam violentus spiritus,
iustam concoctionem impediens, efficit. Quod si cum eiusmodi contentis aliquod val-
de crudum complicatum fuerit, non parui doloris subesse sensum indicat. Si vero constricta
sint contenta, crassitudinem partium materię, attestante lentoris qualitate, significant.
In quo igitur liquoris vrinæ loco immorantur, in eo corporis loco vitium morari osten-
dunt. Tenuia contenta, quæ pura sunt, nec facile matula commota assurgunt, magnam
naturæ

A naturæ in secunda cōcoctione imbecillitatem indicant. Fere enim cum albis & aqueis urinis apparent. Præterea, tenuia contenta crudos etiam humores, sed attenuatos monstrant. Siquidem natiuus calor roboratus omnem intra venas ex cruditate crassitudinem attenuat & dissipat. Crassa vero contenta, crassorum atq; crudorum humorum in venis copiam denotant. Talia quoq; interdum a iudicatione apparent: atqui a prioribus differunt, quod scilicet nullum malum colorem habeant, & a vigore morbi appareant. In principio namq; & augmento tanquā praua suspecta esse debent, præsertim si colores male accesserint. Priora autem contenta viscida & mucosa sunt, quapropter in urinariis instrumentis quandoq; detenta, non paruum homini dōlorē afferunt. Quinetiam puri similia sunt, viscositate tamen, & quod male non oleant, a purulentis distant. **B** Pus quū & ipsum viscidū aliquid habeat, dignoscitur tamen, quod dolor laborantis loci præcesserit, sanguinemq; prius mingi contigerit.

Crassa.

Quid ex colore contentorum sit prædicendum. CAP. XII.

Quod ad contentorum, quæ a mediocritate recedunt, colorem attinet, alia sunt vehementer alba, alia sup pallida, alia pallida, alia flaua, subrubea, cruenta, veneta, livida & nigra. Quæ vehementer alba sunt, hæc aut pituitosi humoris ramenta sunt, aut pus summe concoctum, quod ab aliqua parte interna laborante secretū est. Distingues autem illis notis, quæ paulo ante de puris, & crudorum humerum differentia diximus. Quæ autem mediocriter alba sunt, hæc sanguinis probe concocti excrementa existunt. **C** Sub pallida & pallida minus bona sunt, veluti ea quæ a colore, qui secundum naturā est, declinant. Flaua etiam mala sunt, ut quæ exauctam esse in secunda cōcoctione flauā bilem indicant. Subrubea & rubea cruditatē quandā, & defectum cōcoctionis, adeoq; morbi diuturnitatem innuunt. Visuntur etiā interdū propter sanguinis multitudinem: aut quæ retentrix facultas præ imbecillitate optimos humores effluere sinit. Cruenta nō elaboratū omnino esse a iecore sanguineum humorem, præsertim si copiosa sint, significant. Veneta, livida, & nigra omnium pessima sunt. Mortificationem facultatis vitalis, aut melancholicū humorē, qui vel aliunde in venas cōfluxit, vel in ipsis genitus est, significant. Orobea, hoc est, eruo ex coriato similis, tū apparet subsidētia, vbi absumto iā adipe caro consumi cœperit. Significat itaq; vel vniuersi, vel renū duntaxat colliquationē. Si n. in febribus talis apparuerit subsidētia, vniuersum corpus: sin citra febrē, renes tantum liquefcere indicat. Furfurea, quæ videlicet furfur tritici bene moliti refert, prædicta peior est. **D** Hæc namq; vbi febris vniuersum adipē, & maiore purtem carnis absumserit, atq; iam profunditatem carnis & vasorū obsederit, solidasq; corporis partes attigerit, apparet. Nunquam tamen solius vesicæ laborantis signum est, quemadmodū Hippocrates iis verbis in Aphorismis testatur inquiring: *Quibus in urina crassa fursurea simul prodeunt, iis vesica scabie laborat.* Discernuntur autem in eum modū. *Quæ totius corporis vitio eueniunt, cum febris & urina cruditate minguntur. Contra, quæ laborante vesica prodeunt, sine febre, & cum urina concoctione, non tamen absq; laborantis loci dolore, excernuntur.* **E** Laminea, Græcis dicta, squamis similis est. Laminæ enim appellantur, quæ latitudinem & longitudinem, citra tamen euidentem aut magnam altitudinem obtinent, adeoq; foliorum, stirpium similitudinem gerunt. Ut laminea subsidētia non sit, nisi quæ foliorum stirpium squamarumve piscium, aut laminarū instar lata & tenuis existit. Quæ certe fit, vbi aucta febris solidas corporis partes attingit. Apparent quoq; vesicæ ratione, veluti in Aphorismis Hippocrates testatur inquiring: *Si sanguinem, & pus, & squamulas mingat ager, grauisq; odor fuerit, vesica exulcerationem denotat.* Sed an vesicæ tantum, aut totius corporis ratione eueniat, febre, cruditate, & dolore, quemadmodū in superioribus dictū est, distinguendum. Similacea, hoc est, ea quæ fursuris ex male molito tritico cribratæ speciē exhibet, omnium pessima existit: fit enim vbi febris obsessa profunditate, longe lateq; substantiam incendit, adeoq; sanguinis affationem, vel solidarum partium colliquationem significat. Si itaq; candidæ fuerint, solidatum partium colliquationem: sin rubræ, sanguinis affationem monstrant.

Alba.

Sup pallida

& pallida.

Flaua.

Subrubea

& rubra.

Cruenta.

Veneta.

Droben.

Furfurea.

4 Aph. 77.

Laminea.

Lamina.

4 Aph. 81.

Similacea.

Mediocria.

Multa.

Quid ex quantitate contentorum prædicendum sit. CAP. XIII.

Si contenta quantitate mediocria fuerint, probantur. Sin multa, ut multū nutrimentum corpori distribui, ita robur quoddā alteratrici facultati adesse monstrant. Nam

Pauca.

Tenuia.

Crassa.

quādo multa est elaboratio naturæ circa alimentū, multa quoq; fieri excrementa est ne-
 cesse. Sæpe etiā accidit, vt q̄ per cutis aliosq; corporis meatus excrementa trāseunt, con-
 fueris viis præclusis, ad vesicam regurgitent, augeantq; excrementa. Pauca v. contenta,
 vel ob in ediam, vel exercitia, vel obstructions, vel tardas concoctiones reddunt. Sin-
 alimenta deficient, quod per in ediam accidit, excrementa quoq; deficere oportet. Ex-
 exercitia vero excrementa attenuant, ac vt per latentem transpirationem dissipent effi-
 ciunt, vt hoc nomine pauca esse contenta necessarium sit. Obstructions autem, vt te-
 nuia tantum transeant, & crassa remorentur & adhæreant, efficiunt. Per tardas autem
 concoctiones pauca fieri contenta, notius est q̄ vt multis doceri debeat. Tenuia cōtenta
 quantacūq; sint, caloris natiui debilitatē, vt contenta hoc nomine ad mediocritatem
 peruenire nequeant, indicāt, aut crudorum humorū, roborato natiuo calore, attenua-
 tionem. Vbi enim materiæ crassitudinem attenuauerit dissipaueritq;, eiusmodi cōtenta
 apparere est necesse. Quod ita cognosces. Nam si modice matulam vacuaueris, ipsa cō-
 tenta cito eleuātur, atq; leuitas dissimilis redditur. Non facile a. eleuātur, quæ ex caloris
 debilitate fiunt. Contenta multa aut crassiora in morborum initiis atq; augmentis, præ-
 fertim si febris non contemnenda adsit, humorum copiam arguunt, q̄ ad cōcoquendū
 firmitate virtutis, tempore, & fortuna bona indiget. Coniicies autem inde angustias
 meatuū esse circa thoracem, vtpote arctato a multitudine humorum septo transuerso.
 In vigore autem febris atq; declinatione, contenta illa salutaria & bona sunt.

Quid ex locis contentorum sit pradicendum. C A P. XIII.

Subsidentia quæ ad fundum matulæ sedere videtur, bona quidem & moderata, nihil
 noui significat. Cruda vero atque diuersa specie, prauitatem naturæ. Diuersa vero
 partium positione, ostendit segnitiam ipsius minus assurgentis aduersus rebellionē hu-
 morum nocentium, ita vt opus sit & tempore, & robore. Quod vero leue tenueq; tertiu
 contentorum locū occupauit, non mediocrem capiti lēSIONEM adesse significat, habēs
 rationem inter contenta nubium. Sublimia si praua sint, loci tamen differentia mode-
 stiora sunt, quam quæ ipsis subsident. Sin aliis rationibus bona fuerint, tum loci ratione
 sola recedunt a perfecta bonitate; quod a spiritu adulterino leuia redduntur. Nubium
 q̄ bonæ sunt omnino quæ nubes sunt; nō parum si recesserūt versus distantia a loco, qui
 est secundū naturā, multo quoq; indigent tempore. Quæ vero prauæ sunt, eo modestio-
 res videntur reliquis, quo magis abstiterunt a loco, qui secundū naturā est, quiq; subsiden-
 tiis secundum naturā debetur. Bona contenta, quæ inferius de cenderint, fando tamen
 excepto, eo meliora. Prava cōtenta, & q̄ ipsis insunt, quo superius cōcesserint, eo minus
 mala. Vbi contenta, quæ secundum naturam se habēt, fuerint ad superficiē vrinæ multo
 spiritu euecta, prauus in capite, neq; is quidem exiguus, affectus continetur. Sic in subli-
 mibus affectū nō sces adesse p̄ partes corporis simili positione habētes, habita p̄por-
 tione totius altitudinis vrinæ erga corporis altitudinē. Hæc autē sunt Hypochondria, vi-
 scera, & thorax, Spiritus, qui cum vrina excernitur, circa primam cōcoctionem genit⁹,
 si tenuis fuerit, & quantitate mediocri, bullas quasdam inflat in vrinæ superficie, mox a-
 refrigerata vrina dissipantur. Sin crassior & maior spiritus sit, bullæ non statim dissolu-
 untur, spirituum potius in ventre generatorum signa. In crudis & incoctis humoribus,
 si contenta apparuerint concocta, multis spiritibus generatis sublimātur, multo calore
 multam materiam densatam dissolvente. Vbi vero iam a natiua caliditate domita fuerit
 materia cruda, paulatim descendunt contenta. Spiritus alienus quo fortior fuerit, eo
 magis versus sublimes partes materiam propellit. In summa, altitudo vrinæ corpori p̄-
 portione respondet, ideoq; ad quas partes latitudinis vrinæ declinauere contenta, eas in
 corpore affici indicio sunt.

*Quid ex innatantibus in vrina ramentis, capillis, & aliis corpusculis in vrina
 sparsis pradicendum sit. C A P. XV.*

Ramenta.

Nonnunquam ramenta quædam cum contentis conspiciuntur, quæ ad colorem aut
 rufum, aut album vergunt. Quæ si multa fuerint, semicoctam materiam indicant,
 illum vero humorem in p̄ofunditate corporis abundare, ac cōcremari, cuius ramenta
 videntur cōtentiis cōnnatare. Si vero pauca sint, mitiorem huius humoris malitiam, atq;
 malorum ciborum vsum producere talia demonstrāt. Quo maiora fuerint ramenta, eo
 minorem esse concremationem humorum inuenis: quo minorem calorem arguunt.

Causa

- A** Causa horum ramentorum est nimius calor, qui humores ad spissitudinē, & veluti offis naturam redigit, vbi per meatus aliquos diu immorati, neq; dissoluti & extenuati, neq; cito per vrinas expulsi fuerint. In vrina quoq; interdū capillis similia natant, q̄ renum vehementem calorem, aut crassorum ciborum, casei nimirum, & nervorū vltimū significant. Capilli autem illi in iis vasis potissimum procreantur, quæ a renib; ad vesicā descendunt, adeo vt quanta vasorum internorū longitudo est, tāta humoris spissitudo, & assatio fiat, q̄ capillis similiter extenditur. Aliquando veluti carunculae in vrina natāt, quæ, vt lib. 6. de Laborantibus locis c. 3. Galenus attestatur, renum exulcerationem ostendūt. Id quod Hippocrates in Aphorismis quoq; iis cōfirmat verbis: *Quib; cū vrina crassa exigua caruncula, aut veluti capilli vna exeunt, iis arenibus excernuntur.* Plura ad institutū facientia in nostris super Hippocratis Aphorismos cōmentariis reperient studiosi. Si surfurea quædam exeunt cū vrina, vesicæ, vel venarū, vel vrinariorū meatuū scabiē indicāt. Quæ itā distingues: Si tenuis fuerit vrina, venarū scabies notat, quatū certe tunica ob febris vehementiā laborat. Si v. crassa, vesicæ tunica significat. Hinc Hippocrates loco iā citato scriptum reliquit: *Quibus in vrina crassa surfurea simul prodeunt, iis vesica scabie laborat.* Qui sanguinem repente, & sine causa manifesta mingunt, iis venulam in renibus ruptā esse ostenditur. Quibus in vrina arenosa subsident, iis renes, aut vesica calculo laborat. Qui sanguinem aut pus mingunt, aut squamulas, & grauis odor fuerit, vesicæ exulcerationē indicāt. Quæ certe singula Hippocrates in Aphorismis loco paulo ante ostenso, memorizā, p̄didit, & post hunc li. 6. de Laborantib; locis Galenus mōstrauit. Ceterū foetidus vrinæ odor, & graueolentia, putredinē maiorem aut minorem proportionē significant. Pus a vbi fuerit, euidēs alicuius internæ partis exulcerationis signum existit. Et si progressu temporis foetor ac pus minuatur, bonū est; sin augeatur, malum. Si foetori pus nō fuerit coniunctū, alicuius particulæ mortificatio portenditur. Quod si praua simul in substantia & contentis vrinarum signa apparuerint, mortificationem totius corporis p̄ se ferunt. Vrinæ interdum innatant veluti aranearum telæ, nonnunquā etiā in superficie feruntur puncta, tanquā ex oleo iniecta, quæ quidem colliquationis totius corporis, aut solorum, vt dictum est supra, renum signa sunt. Quod si parumper apparuerint, nihil graue: sin diu, principium colliquationis ostendunt.

Capillis
similia.

Capillorū
generatio
vbi fit.
Caruncula.

4 Aph. 76.

4 Aph. 77.

Sanguinea:
Arcuulæ.
Pus.
Squamulæ.

Odor foeti-
dus.
Pus.

Telæ arā-
nearum.

D *Quid ex vrina corona prædicendum sit. C A P. XVI.*

Coronam in vrina vocant lineā vmbra depictam, quæ ambitum superficiei vrinæ circumcurrit. Circulum alii appellant. Quod si noxii humores fuerint virtuti pares, & pari mensura vrinas tinxerint, nulla corona euidentē spectari potest. Verum si virtus vicerit, aut victa fuerit, coronæ etiā colores hoc vel illo modo apparebunt. Si humoris vrinæ color prauus sit, color autem in corona benignior appareat, signum est salutare. At si vrinæ quidē color rufus, rubeus, vineus, aut nō dissimilis fuerit color alba vero, vel albæ similis corona fuerit, bonum; nempe quod natura iam humorib; dominari incœperit, portendit. At in viridi & passæa vrina, si corona peioris sit coloris, contrarium & malū significat, nimirū iam prauos humores dominari, ac naturam superare. Si spūmea fuerit corona, sensuum internorū perturbationē, tenaces ac lentos humores, ac in ventriculis cerebri flatū ostendit. Sæpius coronæ colores ab vrinæ colore variāt, & declināt, interdum cum illo conueniunt. Si variant, & declinant ad bonos, vrinæ colore existēte malo; bonū indicant. Si vero deteriores sunt, quā vrinæ colores, mali existimādi sunt. Si igitur boni, natura humoribus cœpit dominari: sin mali, humores vincunt.

Corona
quid.

Quid ex bullis vrina prædicendum sit. C A P. XVII.

Bullæ, quæ adulterini spiritus signa sunt, aliquādo per omnem superficiem vrinæ apparent: aliquando vero in sola corona. Bullæ item singulæ, aut binæ, aut ternæ, aut alio numero sociatæ innatant. Bullæ igitur, quæ in sola corona integra serie circumstant, si colore humoris vrinæ tantę sunt, affectum doloremq; capiti inesse nō mediocrē denuntiant: toti quidem, si per omnem circumferentiam feratur: medietati dumtaxat, si per dimidiā coronā innatent. Quæ v. sparsim in corona manēt, hæc a debiliore causa generatur, atq; similiter dolores, sed mitiores mōstrant. Verum quo magis rufo aureo ve colore imbutę cōspiciuntur, tanto vehementiores capiti dolores adesse ostēdunt. Albæ vero in ambitu coronæ cōsistentes bullæ, nullum aut exiguum capiti dolorem adesse indicant. Quod si tales in vrina tenui, & absq; subsidetia apparuerint, renum potius obstru-

3. Aph. 34.

ationem arguunt. Id quod Hippocrates confirmat, qui in Aphorismis ita scriptum reliquit: *Quibus in urinis superstant bullæ, iis renum morbum, eumq; longum fore significant.* Bullæ autem, quæ a corona versus medium urinae concedunt, remissionem doloris capitis ostendunt. Aliæ etiam per urinae superficiem dispersæ, nihil eiusmodi super capite indicant, sed solum multam naturæ imbecillitatē, obstructions, & crudorū humorū abundantia. Sæpe numero bullæ visæ, cū pridem non apparuerint, iam naturam cōcoctioni indulgere monstrant. Proinde in febre, declinationem eius ex iis cōiciemus: nisi initio statim visæ apparuerint, processerintq;. Tum n. capitis non exiguos dolores portendunt, & si in tenui urina seu corona innatauerint, etiā periculosos. Cum crassa vero urinae substantia bullæ modestiores apparent, & minus graua significant. Interdum pro bullis nō apparentibus sufficiunt crassæ spumulæ, idemq; signant, præsertim in febris solutione. Bullæ versus mediam superficiē concedentes, remissiones doloris capitis, & fluxum ad pulmonem in sanis & ægris portēdit, materia scilicet iam euaporata, quæ dolorem excrabat, aut iam ad pulmones defluxa. Bullæ maiores & absque ordine per matulam diffusæ, dolores qui præcesserunt, diminui arguunt.

Quid ex urina contentis priuata prædicendum sit. CAP. XVIII.

Tenuissima urina, & vehementer alba sine subsidētia, aut obstructionem non contemnendam, aut immoderatam frigiditatē & cruditatē demonstrat. Si vero illa minora fuerint, etiam horum significatio modestior erit. Pallida & subpallida minorem obstructionem, non autem minorem cruditatem indicat. Similiter rufa & flaua. Nam in ipsis adulterina caliditas superare videtur. Possunt tamen eiusmodi urinae ob ingētes dolores, immensa exercitia, longas vigilias, & materiae defectum cōtingere. Quæ etiam ulterius quam superiores colorantur, humorum dominantium suis coloribus qualitatem, putredinem aliquā, & cruditatem in genere venarum significant. Est quando abscessus quispiam calidus principes partes oblidēs, huiusmodi urinas fundit, attracta illuc materia ab adulterino calore, tanquam a cucurbitula. Nunquam tñ bonum est subsidētia abesse, minus vero damnatur, si color & substantia parum a mediocritate abfuerint. Licet n. segnis in p'sentia natura sit, subsidētia tamen paulo post apparebit. Quod autem in cruditate nulla visantur contenta, causa est, q. secunda cōcoctio nō fiat. Sic etiā obstructio contenta, cum crassiuscula sint, per angustum nō transmittit. Inedia ciborum defectus, aut cibi cōcoctioni inepti, multæ ventris vacuationes, phlegmone alicuius loci, aut nimia caliditas accumulās sibi materiā, imbecillitas alicuius partis, ad quæ natura superuacua propellit, hæc inquam omnia cōtenta urinis ut absint efficere possunt. Atq; hæc quidē de urinae inspectione, & ex ea p'dictione, hæcenus nos dixisse satis sit. Quod si vero quispiam vberiore, & exquisitam plane eius rei tractationē desiderat, is Actuariū, inter recentiores Græcos non postremæ notæ auctorem, legat, qui nihil quoddam vniuersam hanc rem spectat, prætermisisse videtur.

Quæ ex egestionibus sint prædicenda. CAP. XIX.

Cum ex egestionib. multa & varia prædicere possit Medicus, quoad fieri potest breuissime earundem significationes exponemus. Principio autē egestio naturalis, & optima, ut de urinis quoq; iam antea dictum est, veluti regula quædā, penes quam reliquæ omnes iudicentur, nobis noscenda venit, quæ quidē in vtram partem deflexerit, cōcoctionis vitium declarat. Optima igitur egestio est mollis, compacta, concretave, eodem tempore, quo in secunda valetudine assuevit, reddita, & quæ iis quæ ingesta sunt, proportionē respōdet, ut in prognosticis testis est Hippocrates. Egestio itaq; optimatribus iudicatur, nempe cōcretionē siue consistentia, modo, & tempore, quo reddi solet. Consistentiā secundum naturam habet, quæ nec prorsus duræ, ut lapides: nec admodū liquide, ut diffluere possint: sed eatenus molles sunt, ut compactæ permaneāt. Esto a earum modus iis, quæ assumpta sunt, conueniēs, ac tēpus etiam quo æger excernere cōsuevit. Ad sint quoq; & color, & odor, qualis secundum naturā esse solet. Contra mala & præter naturam egestio, dura, liquida, aspera, nec ea hora, qua sanitatis tēpore cōsueuerat, excreta existit. Mala quoq; exq; site rufa, vel nullo modo rufa, sed alba, aut colore similis cibo ingesto. Hæc n. cruda est, & nihil bilis in intestina defluere, sicut in iis cernit, quæ regio morbo laborat: illa v. plurimū bilis in ventrē cōfluere denūtiat. Quod si itaq; circa initia rufa vehementer fuerit, biliosiorē morbū indicat. Sin in declinatione talis excre-

Egestio optima quæ a progn. 13.

Consistentia naturalis.

Mala.

Rufa.

A natur. corpus probe expurgari significat. Viridis egestio, æruginosa bilis nota est: sicut nigra, vel atra bilis, vel sanguinis in eo loco adaucti. Si vero liuida fuerit, internarū partū validū frig⁹, ac veluti mortificationē mōstrat. Pinguis, vbi nihil pingue fuerit assumtum, colliquatæ pinguedinis ab igneo calore, & cōsumptionis totius corporis indicium est. Viscida & glutinosa, nisi & hæc ex cibi natura talis sit, colliquationis indicium est. Sed q̄ quidem pinguis est, ex adipe fit liquato: quæ vero viscida, ex ipsis solidis animantis partibus cōtabescētibus, adeoq; priori deterior existit. Nimis fœtida haud exigua putrefactionē denuntiat, modo id illi ex cibo assumpto nō accidat. Quippe in iā dictis omnibus egestionib. attendendum, num vel cibi talis naturæ & qualitatis eas inficientes fuerint: vel intestina ob innatā sibi imbecillitatē defluxione laborare cōsueuerint. Stridēs egestio, q̄ sica sono seu crepitu, q̄ inter egerendū excitat, dicta est, flatuosi spiritus in eo, q̄ egestū est, copiam cū tenui aliqua humiditate, instrumenta v. in vnū coacta, & quodam modo cōpressa, atq; in angustia redacta ostendit. Hinc est, q̄ Hippocrates dicat: *Optimū est flatum absq; sono & crepitu exire*. Sed eum tamen p̄stat cum sono prodire, quā ibi reuolui. Et sic quidem p̄diens hominē vel dolore affligi, vel delirare arguit, nisi ipse fortassis de industria crepitum emittat. Siquidem doloris magnitudine adiguntur, vt ea, q̄ nolint, faciāt. Delirium in causa est, vt ad ea, quæ faciunt, non aduertant. Ceterum, si flatus nec minimum abūdat, & vasa per quæ fertur admodū ampla sunt, in iis sine crepitu egredit. Spumosa fit, vbi aliquid quod feruet, vel flatuosus spiritus cum humiditate pugnat. Id q̄ manifestum fit ex iis, quæ elixantur, & ex mari quod a vento violenter agitur. Nam in hoc vehemens ventorum flatus, aquam in multas tenues partes illam cōcutiendo atterit: in illis nimius calor spumam excitat. Varia egestio, corpus variis ac multiplicibus affectionibus obnoxium esse, & iis quidem diuturnis & malignis, significat. Quare temporis spacium ad confectionem requirunt, vt *fusus lib. 1. de iudiciis c. 11. Galenus docet.*

Quid de sputo prædicendum sit. C A P. X X.

C Vm ea, quæ in thorace & pulmone cōtinētur superuacua, non nisi per sputum commodissime, vt anatomes ratio mōstrat, vacuentur, omnibus palam fit, sputa tum potissimum Medicis esse consideranda, vbi pulmo aut thorax morbis infestatur. Non solum vero in ægris, sed & in sanis sputa expendenda veniunt. Si enim sputum exquisitè illi, quod secūdam naturam est, simile fuerit, tunc integram instrumentorū, quib. spiratio ipsa perficitur, sanitatē significat. Si vero aliqua ratione impediatur, & a naturali recesserit habitu, tantum ea læsa esse demonstrat, quantum de naturali forma amiserit. In morbis vero thoracis & pulmonis sputum ideo maxime considerat, q̄ præter alia morbi tempora ex eo dignosci possint. Quippe si nihil omnino in iis exspuitur, summæ cruditatis nota est. Sin humida educi incipiunt, exquisitè tamen cruda, subobscura adhuc & inconstans est trāsmutatio, desinitq; tunc prima morbi pars, q̄, vt supra ostensum est, principiū dicitur. Vbi v. pauca concocta exspuunt, continuoq; subinde plura, & facili⁹ leuiusq; educuntur, tum morbi incrementum instat. At vbi iā plane cōcocta plurima & facillime exscreantur, ad vigorem morbum peruenisse iudicandum erit. Vbi tandē simili modo exquisitè cōcta sine omni molestia exscreantur, sed pauciora, amoto ē dolore, ægerq; facile spiret, leuiterq; morbum ferat, tum manifesta declinatio adest. Porro sputū subflauum, subrufum, leniter spumās, & tenue, solā cruditatem, malum v. insigne nullū denuntiat. At syncere flauum, rufum, spumosum, pallidum, viscidum, rotundum, atque iis adhuc magis nigrum, prauum est. Nā syncere flauum fit ppter flauā bilem puram & syncerā. Omnis a. humor purus, excepto sanguine, vitium quoddā subesse testat, quippe qui ab inflammato calore ducat originē. Flauum itaq; purum sputum fit, humore ipso syncere bilioso existentē. Syncere rufum itidē a bile fit, cui plurimū serosi humoris torrefacti admistū est. Si vero plus ei⁹ bili mistū fuerit, pallidū apparet. Spumosum, viscidū, & rotundū, a pituita adusta fiunt. Atq; hinc est, q̄ Hippoc. 6. Epid. sectio 3. Aphorif. 28. rotundū sputū delirium portendere dixerit. Neq; enim tale fit, nisi vbi a nimio calore humor lentus assatur, aduciturq; . Nimium autem calorē delirium efficere posse, demonstratione nō est opus. Nigrum vero bilioso supra modū torrefacto humore, qui sanetūc nigra bilis pessima, & exedentissima euadit: aut crasso sanguine æque resiccato: aut propter excretionē atq; frigiditatē prouenit. Ceterū nō solū color, sed & excretionis sputorum modus Medico attendendus erit. Nam si cito & leuiter exscreantur, liquido

Viridis.
Nigra.
Liuida.
Pinguis.

Viscida.

Fœtida.

Stridens.

Prognost.
24.

Spumosa.

Varia.

Sputa quæ
do Medicis
expendenda.

Morbis
tempora ex spu
to dignosci.

Sputi colo
res quid si
gnificent.

Rotundum
sputum.

Modus ex
cretionis
sputorum.

1. Aphor. 12. constat talia salubria esse. Quæ enim cito educuntur, morbi breuitatem indicant. Quod A in Aphorismis confirmat Hippocrates inquiens: *In pleuriticis sputum si cito appareat incipiente morbo, eū breuem fore ostēdit.* Quod leuiter, i. prompte & facile educitur sputum, quod neq; dolor thoracem vllus vehemens affligat, & quod neq; imbecilla sit facultas, ostendit. Siquidem dolor impedit, quo minus thorax actionem suam perficere possit. Quod igitur album, leue, æquale, & consistentia neq; tenue liquidumve, neque crassum fuerit, absolutæ & perfectæ concoctionis nota est. Contra, quod nigrum, tenue, aut crassum est, malum portendit. Nam tenue liquidumve cruditatem portendit summam, & ægre circum spiritum diffuens; exspuitur. Crassum, non nisi magna difficultate attolitur, adeoq; longiorem affectum necessario inducit, inq; angustis quibusdam viis sic intercluditur, vt quosdam suffocauerit. Lentum ita partibus adherescit, vt inde non B possit eximi, ac sepe sublatum intra pulmonis fistulas glutinis modo adhærēs detinetur. Sed de sputis satis.

Quid ex sudore prædicendum sit. C A P. XXI.

Sudor duplex est.

Indicatorius.
Symptomaticus.
1. Progn. 29.

Sudorem esse excrementum eius, quæ in singulis animalis partibus sit, concoctionis, Galenus lib. 1. de Tuenda sanitate demonstrat. Quapropter is humorū, qui in vniuerso corporis habitu abundat, nota est, atq; eos, qui illic sunt, affectus demonstrat. Duplex autem esse sudorem, initio sciendum erit. Qui cum signis iudicationis excernitur, iudicatorius nominatur. Qui vero citra iudicationis signa educitur, symptomaticus dicitur. Prior bonus est, alter vero malus. Qui autem bonus, qui contra malus, in prognosticis Hippocrates luculenter monstrauit iis quidem verbis: *Sudores in omnib. acutis morbis optimi sunt, si in diebus decretoriis proueniunt; & febrem prorsus auferunt. Boni quoq;, qui e toto corpore manant, faciuntq;, vt homo facilius ferat morbum. Qui vero nihil eorum effecerint, haudquaquam commodi videntur. Pessimi autem sunt frigidi, & qui circum caput tantum, & faciem, & ceruicem oriuntur. Isti enim cum febre quidem acuta mortem, cum mitiori vero morbi longitudinem denuntiant.* Hec ille. In qua vtriq; sententia omnes sudorum differentias complexus est Hippocrates, nempe optimum, pessimum, bonum, & malum. Ad hos enim alii omnes referuntur. Prædictas autem differentias distinguit penes diem, in qua fiunt, locum a quo excernuntur, qualitatem eorundem, & tolerantiam. Penes diem, quod optimi sint, qui diebus decretoriis eueniunt, & integre febrem finiunt. Atq; has duas optimi sudoris notas, tertia, quam Hippocrates, quod necessario priores consequatur, prætermisit, vt toto e corpore manet, necessario sequitur: fieri enim non potest, vt sudor iudicatorio fiat die, & egro febrem prorsus adimat, nisi e toto exeat corpore. Penes locum, quod boni sint sudores, qui toto corpore prodeunt, & partem aliquam morbi adimunt; adeoq; vt æger facilius ferat morbum efficiunt. Mali, qui nihil eorum effecerint, id est, neq; e toto corpore profluxerint, neq; vt æger postea morbum facilius ferat, effecerint. Vt perspicuum sit, sudores illos, quibus nihil tale acciderit, deteriores esse: quibus vero alterum tantum, meliores. Ex iis rursum meliores esse illos, qui morbum reddunt tolerabiliorem, quamuis toto corpore non diffuant: deteriores vero, a quibus ingrauescit morbus, etsi toto corpore sudetur. Atq; ita penes tolerantiam sudores distinxit. Ceterum, omnes ii sudores calidi sunt, eamq; ob causam, dum tres eos ordines statueret Hippocrates, id ipsum non expressit: quippe qui ea, quæ necessario aliqua consequuntur, quæq; facile eorum, quæ subiiciuntur, oppositione intelligi possunt, prætermittere consueuerit. Pessimi autem sunt, qui prioribus opponuntur, frigidi. Atq; ita penes qualitatem distinguit. Porro simul cum pessimis sudoribus malos etiam commemorat, qui circum caput tantum, & faciem, & ceruicem oriuntur, etiam si frigidi non sint. Hi namq; animi deliqui minitantur. Qui sane in partibus istis, si frigidi videantur, omnium pessimi sunt. Neque enim amplius tuturam syncopen, sed iam incipientem ostendunt. Ceterum ex febris vehementia etiam distinguuntur sudores. Nam si febris acuta est, tam frigidi illi sudores, etiam si toto corpore prodeunt, quam alii qui ceruicem tantum atq; caput, quamuis forte calidi, occupant, perniciem adferunt. Sin mitis est, tandem vires vitiosos humores spatio concoquere poterunt, modo ne prius vehementia febris pessundentur:

Optimus sudor.

Bonus.

Malus.

Pessimus.

DE PULSIBVS, SECTIO IV.

Quod pulsus rationis partes, quidque pulsus, & quot eiusdem genera.

CAP. I.



Vv m pulsus perinde atque vrina, sit e numero rerum, e quibus Medici futura in morbis præsagunt, operæpretium me facturum arbitror, si breuiter quæ ad pulsus rationem attinent, perstrinxero. Eius autem rationis quæ de pulsibus tractat, quatuor sunt partes. Vna quæ φυσιολογικῇ Græce nominatur, ea quidem est, quæ pulsuum genera & differentias ordine perccenset. Alte-

Pulsus ra-
tionis qua-
tuor partes.
Physiologi-
ca.
Diagnosti-
ca.
Actiologi-
ca.
Prognosti-
ca.
Pulsus quid

ra διαγνωστικῇ dicta, quæ quâ ratione singuli pulsus cognoscendi & discernendi sunt, docet.

B Tertia αἰτιολογικῇ vocata, quæ singulorum pulsuum causas rimatur, & inquirat. Quarta προγνωστικῇ, quæ ex pulsibus futura præsagire docet. Has ordine prosequemur, vbi primū quid sit pulsus, & quis eius vsus, exposuerimus. Pulsus itaq; vt nonnulli definiunt, est motus cordis & arteriæ sensibilis, quo attolluntur, & submittuntur. Alii pulsus finiriunt esse cordis & arteriæ indiuisibilem sublationem & submissionem. Veteres optime & perfectissime pulsus ita finire voluerunt: Pulsus est actio propria, primo cordis, secundo arteriarum sublatione & submissione motarum, a vitali facultate, propter natui caloris commodationem conseruandam, & animalis spiritus in cerebro pcreationem. Quæ quidem definitio, iuxta Dialecticorum præceptiones, genere & differentia constat. Genus a. est actio. Nihil autem refert, motionem, an actionem dicas. Siquidem hæc actio non

C est nisi cordis & arteriarum motus: Differentia, quod in definitione sequitur, cordis & arteriarum, quæ sublatione & submissione mouentur. Hæ enim propriæ cordis & arteriarum sunt actiones. Et si enim alias in corde & arteriis reperire licet actiones, nempe alimentia attractionem, retentionem, & id genus alias: hæc tamē illis non sunt propriæ, sed aliis partibus corporis quoq; communes. Ceterum sublatio siue dilatatio is motus siue ea actio est, quæ Græcis διαστολὴ dicitur, quando nimirum cor & arteriæ attolluntur ac dilatantur. Submissio autem, Græcis συστολὴ, est motus, in quo cor & arteriæ submittuntur ac contrahuntur. Non abs re autem in definitione additur: *Primo cordis, secundo arteriarum.* Cordi enim & arteriis facultas vitalis, quæ prima siue effectrix pulsus causa est, non eodem modo inest. Quippe cordi insita, arteriis nequaquā, sed in tunicas earūdem a cor-

διαστολὴ
συστολὴ.

D de dimanat. Causæ etiam in hac definitione exprimuntur. Effectrix: dum ait pulsus a vitali facultate fieri. Instrumentales duæ, cor & arteriæ. His enim duobus, veluti instrumentis, ad sublationem & submissionem vitalis facultas in efficiendo pulsu utitur. Finales itidem binæ, nempe aeris frigidi attractio, & humidum excrementum expulsio. E quibus manifestum sit, geminum esse pulsus vsus. Quippe per sublationē, aer frigidus attrahitur, qui vitale robur excitat & recreat. Submissione autem seu contractione arteriæ, quod ex humorum deustione in toto animante veluti humidum excrementum contractum est, expellitur. Nihil autem mirum, arterias, quum se aperiri ac dilatant, ad se vndiq; trahere: quum vero contrahuntur, in omnem partem expellere. Nā vis in ipso cordis corpore, vnde contrahitur & dilatatur, in omnes arterias ex eo ortas, per tunicas earūdem influēs, sic eas cogit, aperitq; quemadmodum etiam ipsum cor. Vt igitur illud, quum dilatatur, ea quæ osculis suis appropinquant, trahit: quum contrahitur, expellit: sic quoq; arteriæ, quum se aperiri, ad se vndiq; trahunt: quum contrahuntur, in omnem partem expellunt. Numerosi namq; meatus in arteriis partim veluti spiramenta in earū sunt tunicis, partim osculorum specie in intestina, ventriculum, & externam hanc cutem finiuntur, per quæ aerem frigidum attrahunt, & humidum excrementum expellunt. Vt hinc pateat, vnum respirationis & pulsuum vsus finemq; esse, nempe caloris natui

Causæ pul-
sus.
Effectrix.
Instrumen-
talis.
Finalis.
Vtus pulsus
duplex.

E in qua; parte custodiam. Quod autem ex respiratione vni cordi præstat, id ex pulsu calori, qui est in toto animante accedit. Vt enim in respiratione per immisum & inspiratum spiritum natuius, qui in corde est, calor refrigeratur, idemq; per emissum & expiratum purgatur, humido scilicet excremento expulso: ita dilatata in pulsu arteria, calor qui est in toto animante natuius, refrigeratur: submissa autem & contracta, humidum excrementum eiusdem expellitur. Cuiusmodi igitur respirationis instrumentis est inspiratio, eiusmodi arteriis est dilatatio. Et cuiusmodi est illis expiratio, eiusmodi arteriis est contractio.

Vnus respi-
rationis &
pulsus v-
tus.

Simplicia

Pulsus alii sunt simplices, alii cōpositi, aliz sunt pulsuum relationes. Simplicium pulsuum prima genera sunt quinque, nempe quantitas diastoles seu sublationis, qualitas siue tempus motus, quantitas temporis quietis, qualitas siue robur virtutis, qualitas seu corpus arteriz. Adiciunt quidam quantitatem infusionis, & qualitatem caloris. Quantitatis autem sublationis species sunt, pulsus magnus, mediocris, paruus, prout arteria, quæ mouetur, dū distenditur, magnū occupat, secundum omnes demēssiones, spatium, vel minimum vel moderatum. Rursus autem, quia omnis magnitudo triplicē habet dimensionē, longitudinis scilicet, latitudinis ac profunditatis, quidā ex hac putāt nouē exurgere specificas differētiās, ab istis trib. distēssionis speciebus, accepras. Sūt autē

<i>Longus</i>	<i>Breuis</i>	<i>Moderatus</i>
<i>Altus</i>	<i>Humilis</i>	<i>Moderatus</i>
<i>Latus</i>	<i>Angustus</i>	<i>Moderatus</i>

Compositi.

Relationes
pulsuum.

Ex his vero nouem ad inuicem mixtæ 27. prodeunt, quas studio omittimus. Qualitatis siue temporis motus, celer, mediocris, tardus. Temporis quietis, creber, mediocris, rarus. Roboris virtutis, vehemens, mediocris, languidus. Corporis arteriz, mollis, mediocris, durus. Vt hac ratione singulis quinque generibus in ternas species dissectis, simplicium pulsuum species seu differentiz sint numero quindecim. Compositi autem pulsus sunt, qui ex simplicibus constant, quorum plurimæ sunt differentiz ex simplicibus speciebus compositæ. Relationes pulsuum intelligere oportet, dum pulsus alii ad alios, vel partes eorum ad alias partes referuntur, quarum quidem quinque sunt genera, aequalitas, inæqualitas, rhythmus, ordo, & ordinis perturbatio. Relationes autem vocantur, quod de numero eorum sunt, quæ ad aliquid dicuntur. Quod a. aliqui quindecim tantum simplicium pulsuum differentias esse statuunt, nullo alio sit nomine, quam quod ii vtilis tantū Medico sint, & ab eo cognoscant. Plenus igitur & vacuus, quia tactu putant esse imperceptibiles, ideo omittunt. Pari modo calidus & frigidus, quæ ex iis nihil cognoscatur, neque illis ad prædicendū vtantur Medici, itidē prætereunt.

De pulsuum generibus, & differentis. C A P. III.

Primus pul-
sus g. aus.

Longus.

Latus.
Altus.
Magnus.

Breuis.

Angustus.

Humilis.

Paruus.

Similitudo.

Figura ar-
teriz.

Circularis.

Angularis.

Depressa.

Pulsuum genera seu differentias nunc ordine explicabimus. Primum quidem genus quantitate diastoles siue sublationis dilationisve arteriz, hoc est, motus quantitate, metitur. Vt enim cuiuslibet corporis tres sunt dimensiones: ita & arteriz, nempe D longitudo, latitudo, & profunditas. Huius itaque generis differentiz octo erunt, longus, latus, altus, magnus, breuis, angustus, humilis, paruus. Longus pulsus est, qui longitudine mediocritatem excedit: vel qui præter naturam in longitudine auctus inuenitur. Latus est, qui latitudine mediocritatem excedit. Vel qui naturali pulsu latitudine maior reperitur. Altus, qui profunditate mediocritatem excedit. Magnus est, qui in omnibus mediocritatem excellit: hoc est, longitudine, latitudine, & profunditate auctus est. Contrarii secundum diminutionem cuiuslibet dimensionis appellantur. Breuis igitur est, cui decedit longitudo infra mediocritatem: vel qui in longitudine naturali minor est. Angustus, cui latitudo mediocris decedit: vel qui in latitudine præter naturam minor est. Humilis, cui altitudo naturalis decedit. Paruus, qui omnibus tribus dimensionibus imminutus est. Ceterum magnum & paruum pulsum Medicis rectius haud deprehendent, quam vesicarum, follium fabrorum, vtrium, vterorum, ventrium, & omnium corporum, quæ aliqua cauitate prædita sunt, inspectione. Magnas eorum esse dilataciones distensionisve censemus, quando nimium extenduntur, ita vt nulla partium laxitas in eis deprehendatur. Paruas contra, quando partes laxæ supersunt, quæ adhuc distendi possunt. Reliquæ differentiz ex arteriz figura, quæ teres & rotunda, fere semper, hincque adeo Græcis *κύκλος τῆς διαστολῆς*, id est, *circulus dilatationis*, nuncupatur, eo quod circuli circumferentiam representat, cognoscuntur. Interdum tamen arteria est acuminata siue angularis. Nonnunquam etiam iam dictis dissimilis, depressa scilicet, vel plana. Exprimuntur autem hæ tres arteriz figuræ iis tribus characteribus & notis:

1. Circularis, 2. Angularis, 3. Depressa, Circulus igitur dilatationis si multis partibus tactui se offerat, altum & latum significat pulsum. Eodē autē modo profundus, quo latus, cognoscitur. Si vero figura angularis ad tactū multū se extulerit, altum & angustū indi-

cat

A cat pulsum. Sin parum emineat, humilem & angustum. Depressa a. arteriæ figura, latum & humilem mōstrat. Alterum pulsum genus ex motus arteriæ tactui nostro occurrētis tempore, quo arteria mouetur, sumptum, tres differentias obtinet, nempe celerem, tardum, & mediocrem. Celer igitur pulsus est, quū modico tempore arteria mouetur: Vel qui breui tempore motū suum finit ac perficit. Dum igitur ad tactum senseris arteriam quū mouetur non diu morari in locis suis, sed celeriore impetu ferri a superficie in superficiem, q̄ pulsus sit naturalis, is celer erit. Tardus vero est, quando lōgo tempore arteria mouetur. Vel qui multo tempore motū suum perficit. Dum igitur lentus p̄murat superficies, ac diutius in locis suis remoratur, tardus dicitur. Atq; hic notandum venit, modicum seu paucū & multum tēpus non simpliciter esse inaudiendū, sed collatione ad spaciū, per q̄ fit motus. Paucum sc. tempus ad magnum spaciū, dum celer fit motus: multum vero tempus ad paruum spaciū, dum tardus fit motus, comparando. Vt verbi gratia si equus vnus vno die octo miliaria itineris conficiat, alter vero viginti, vtrumq; quidem paucō tempore cursum suū peregrisse dicimus, nempe vno die. Celērem tamē iudicam⁹ cum, qui tantillo tēpore viginti miliaria cōfecit: tardum vero, qui octo. Moderatus siue Mediocris est, qui medio modo se habet. Tertiū genus pulsum est, quod quantitate tēporis quietis metitur. Quies autem Græcis *ἡσυχία, ἡσυχία, ἀσυντομία, & διάσπυμα, i. interuallum & immobilitas* dicitur. Est autem motus priuatio, siue id tēpus quod inter duas arteriæ percussiones siue duos ictus intercedit. Huius tres sunt differentiæ, creber, tardus, & inter hos mediocris. Creber siue densus aut frequens: nam omnib. iis nominibus Latinis appellatur: est cui breuē quietis tempus est, vel quum paruum interpositū est interuallū. Vel in quo arteria crebro distenditur. Vel quando breui tēpore quiescit arteria. Rarus, quū diuturnum est quietis tempus. Vel quum lōgo tempore quiescit arteria. Mediocris est, qui in medio horum cōsistit. Vt a. huius generis differentiæ rectius cognoscantur, animaduertendum erit duplicem esse quietē: vnā verā, quum l. motus nō sit, nec sentitur: alterā apparentē, dum motus quidē sit, sed a sensu non percipit⁹. Est itē quies altera supera seu externa, altera infera siue interna. Supera est q̄ post distentionem, antequam incipiat cōtractio, existit: Infera vero quies est post cōtractionē, antequā incipiat dilatatio seu distentio. Vt a. duplex est quies, ita etiā duplex varietas & crebritas, altera sc. secundum quietē superā, altera secundum inferā. Si n. arteriæ tunica moratur in vltimo loco, in quem distensione ingressa est, antequā contractionē incipiat, diutius q̄ pulsus naturalis, rarus pulsus: sin breuius moratur, creber secundū externā quietē erit. Si diutius v. deserit tactus quam in naturalibus pulsibus, rarus: si vero breuius, creber secundū inferā quietem erit. Quies a. verā infera seu internā, q̄ sc. inter dilationis principium & finem cōtractionis intercedit, ac media est, nunquā sincera sentiri potest, Ceterū ad quietem externā cognoscendā applicatio manus suspēsa aptissima est: nullā enim motus partē impedit. Contra internā cōprimētē applicatione manus melius percipitur, suspēsa nequaquā. Tantū autē comprimendū, quantū per pulsus præsentiē vehementiam licet, tactu sc. p̄sequendo contractionē quoad possis, vt scias vbi deferatur. Quartū pulsum genus in robore virtutis consistens, treis differentias obtinet, nempe vehementem, languidum, & inter vtrumq; medium. Vehemens est, qui tangentis Medici manū valide ferit ac pullat. Nihil autem refert, validum, robustum, aut fortem eundē dixeris. Languidus, debilis, remissus, resolutus, siue imbecillis, est qui inualide, & imbecilliter manum pullat. Mediocris siue medius, qui in horum medio consistit: vel qui mediam quandā ad vtrumq; proportionē seruat. Alii vehementem potius ita definire malunt, vt sit qui in comprimētē applicatione euertat tactum nostrū, i. cūtim in pulpīs digitorū Medici. Languidū, qui a tactu in eiusmodi applicatione euertit⁹. Medius est, vbi neutrum fit, vt scil. nec euertat tactū, nec ab eo euertatur. Quinti generis a corpore arteriæ sumti differentiæ sunt tres, durus, mollis, & moderatus pulsus. Durus est, quū durior ac veluti ficci⁹, cori⁹q; modo, rigidior in occurſu apparet arteria. Mollis, quando arteria in occurſu mollior, ac veluti carnosa sentitur. Mediocris, qui medio modo se habet. Porro de numero relationū prima & secūda est æqualitas, & inæqualitas, q̄ aut simpliciter seu absolute, aut certi alicuius generis dicuntur. Æquales absolute seu simpliciter pulsus sunt, qui nullā habent in suis differentiis inæqualitatē, adeoq; magnitudinē, neq; celeritatē, neq; frequentiam, neq; vehementiam, neq; molliē immutarunt, sed in iis sunt perseverantes. Vel breuius, qui serie continua sibi sunt æquales. Illi vero, qui iis omnibus immutati

Secundum pulsum genus. Celer.

Tardus.

Paucum & multum tempus.

Tertiū pulsum suū genus. Quies. Interuallū.

Creber.

Rarus.

Quies duplex. Vera. Apparent. Supera. Infera.

Duplex varietas & crebritas.

Vera quies infera.

Quartū pulsum suū genus. Vehemens.

Languidus. Mediocris.

Medius.

Quintū pulsum suū genus. Durus.

Mollis.

Mediocris. Relatio prima & secūda.

Æquales simpliciter siue absolute.

Te pul.

inæquales sunt, & diuersi a prioribus, non perseverantes in pristino suo statu, inæquales absolute seu simpliciter dicuntur. *Æquales* certi alicuius generis, qui vel magnitudinē, vel celeritatem, vel vehementiā seruant, appellantur, verbi causa, magnitudine æquales, celeritate æquales, vel in alio quouis genere. Qui vero nō in iis omnibus simul, sed aliquo ex iis vel duobus, vel tribus generibus variantur & immutantur, cū nomine eiusdē generis inæquales nominantur, verbi gratia, magnitudine inæqualis, celeritate inæqualis, vel in alio quouis genere. Vtraq; autem harū inæqualitatū, & hæc q̄ est certi alicuius generis, & illa q̄ absoluta dicitur, in duas partitur differentias, nempe in singulārē, & collectitiā siue congestitiā. De posteriore hac, veluti manifestiore, primo dicemus. Collectitia itaq; vel vt Græci nominant συστηματική, id est, accumulata, vel congestitia inæqualitas est, quæ in congerie seu agmine multorum pulsū reperitur. Hæc duas primas obtinet species, æqualem, & inæqualē. *Æqualiter inæqualis* est, in qua pulsus æqualiter inæquales sunt, vt si primo pulsus secundus sit paulo minor, & tanto tertius secundo, & quartus tātō etiā tertio, & pari modo reliqui, donec ad plures ventū sit. Eiusmodi autem pulsus Græcis Medicis μύρις, quasi dicas *cauda muris*, & μυρίζων; Latinis *decurtatus* & *mutillus* dicitur. Alii nullo tamen discrimine hunc pulsū μέτρον vel μετρίζοντα, id est, imminutum, q̄ cōtinuo minor spectetur, quando quidem primo pulsus secundus paulo minor, & tertius secundo, & quartus tertio minor sit, idq; ad plures vsq; perueniat, nominant. Nomē hoc accepit, quod eius magnitudini continuo aliquid detrahitur, quemadmodū caudæ muris crassities magis ac magis quanto longius protenditur, minuitur. Eius autem generis pulsus iterum bifariam diuiduntur. Alii enim sunt, qui non cessant diminui vsq; ad defectiōē, id est, donec ad quietem ac immobilitatem prorsus finiunt ac recidunt; & ii Græcis μύρις ἐκλείποντες, Latinis *Myuri* seu *decurtati* deficientes, appellantur. Alii sunt, qui cessant diminui ante defectiōem, priusquam scilicet arteria moueri desistat. Et hi in duas iterū secantur differentias. Alii enim sunt qui perseverant in eadem paruitate, ad q̄ sensum deciderunt. Hi proprio destituuntur nomine. Alii non perseverant in eadem paruitate, sed denuo augentur. Hi μύρις παλινδρομῶντες Græcis, *decurtati reciproci recurrentes* vt Latinis vocantur. Redeunt autē ad pristinā magnitudinē, aut ad minorē aut ad maiore. Atq; hæ sunt inæqualium æqualiter fientium pulsū differentia. Nec est cur quispiam miretur, quod pulsus inæquales fieri æqualiter dicamus. Quatenus enim æqualitatem mutant, inæquales dicuntur: quatenus autē æqua mutatione alter ab altero sensim & gradatim decedit, æqualiter fieri dicuntur. Inæqualiter inæquales pulsus sunt, qui inæquales existentes, inæqualiter etiam fiunt, id est, non sensim gradatim vt, nec seruata ad inuicem æqua distantia. Hi sæpiissime ægrotis accidunt, & multæ sunt eorum differentia. Alii enim magnitudine dilatationis inæqualitatem efficiunt: alii celeritate & tarditate: alii crebritate & raritate: alii vehementia & debilitate: alii duritie & mollitie. Atq; ii sunt ἀνόμοιοι, id est, proprio nomine destituti. Quidam v. ppria nomina habent, qui numero quatuor sunt, intermittēs, intercides, intercurrens, & deficiens & deficiēs reciprocus. *Intermittens*, qui Græcis διαλείπων dicitur, fit quando non solum in vno, aut pluribus etiam magnis vnus minor apparet, sed nonnunquam totus quoq; motus aboletur. Inæqualis igitur est propter raritatem, quia deest pulsus ictus vt vnus, vel duo, vel tres, vel plures. *Intercidens* vel *intercurrens*, Græcis παρεμπιπών vocatus, iam dicto plane contrarius est: fit enim quando expectata quiete in medio tanquam superuacaneus aliquis ictus intercidit. Inæqualis igitur est crebritate ac frequentia, quia inter duos ictus intercurrit tertius, veluti superuacaneus. *Deficiens*, qui Græcis ἐκλείπων nominatur, est quando arteria motu destituitur, ac immobilis manet. *Deficiens reciprocus recurrentis*, Græcis ἐκλείπων παλινδρομῶν appellatus, est in quo iterum agitari & moueri arteria incipit. Hic affinis est intermittenti, hoc tamen discrimine, quod deficiens reciprocus post longius fit temporis intervallum, quo arteria immobilis permanet. Intermittens autem vno, vel duobus, vel tribus, ad summum quatuor pulsibus, raro quinque, omissis, alios repetit. Atq; hæ sunt collectiæ seu systematicæ inæqualitatis veræ differentia. Superest inæqualitas singularis, quæ in vno fit pulsus. Hæc siue absoluta, siue certo aliquo in genere, vt exempli causa, in celeritate & tarditate, duas primas habet differentias. Nam altera est in vna parte arteriæ, altera in pluribus partibus, quas plures digiti attingunt. Quæ in vna parte, sub vno scilicet digito, tres gignit differentias. Prima est, quando motus fit inter-

- A**nterisus, seu interruptus quiete interpellante. Hæc facit pulsus, quos Græci διαλείποντες <sup>Intermittē-
tes in vno
pulsu.</sup> *διαλείποντες*, Latini *intermittentes in vno pulsu*, nominant. Secunda, quando motus est continuus, nulla intercisus quiete, transiens a celeritate in tarditatem, aut contra. Hic pulsus Græcis ἀνισοταχὺς, Latinis *impar citatus*, aut simpliciter impar dicitur. Tertia est, cū motu retrocedente, & redeunte. Hæc facit pulsus qui Græcis δικροτοί, ἀπὸ τοῦ δικροτεῖν, a bis pulsando, & Latinis *bis pulsantes*, appellantur. Nam a dilatatione recurrunt, & antequam perfecte submittuntur, secundo pulsan, id est, nondum perfecta distensione contractio fit, & mox dilatatio & ictus alius sequitur. Differunt ab illis, qui Græcis δις πλῆθοντες, <sup>Bis feriētes,
δις πλῆθον
ταρ.</sup> *Bis ferientes*, Latinis *bis ferientes*, quod duos ictus ad digitum faciant, nuncupantur. Nam etsi omnis bis pulsans, etiam est bis feriens: tamen non omnis bis feriens, est bis pulsans. Nam bis pulsans facta dilatatione, tactum primo ferit, mox submissione exigua facta, iterum post illam dilatatus secundo pulsat: licet igitur bis pulset, non tamen vlla est media cōtractio inter primum & secundum ictum. Bis feriens autem post vnū ictum, paucula interposita quiete, quæ motum dilatationis dirimit, iterum tactum secundo afficit, complens dilatationē. Vt bis feriens non sit nisi is, qui a dilatatione recurrit, & antequā perfecte submittatur, secundo tactum ferit. Exemplo res planior erit. Sint duo qui femur punctim vulnerēt, quorū alter quidem primo statim imperu ense ad os vsq; intruso pungat, eoq; mox modice retracto, nō in exempto & educto, secūdo eo quo prius modo pungat: alter autem itidem ense impacto, atqui eius mucrone ad mediū tantum femoris penetrante, pungat, paucula vero morā interposita ense haud retracto, secundo profundius, & ad os vsq; pungat. Hic quidem vterq; istorum bis feriendo pupugit, sed ille contrariis motib. est vsus, pupugit enim bis, sed retractione interueniēte: hic quoq; bis pupugit, atqui citra vllam retractionē, modice in medio vulnere remoratus. Galenus simile affert de incude & malleo, quod minime quadrat, ita ab Archigene deceptus. Quare illud lib. 2. de *Præcognitione ex pulsibus* damnat, & sui erroris palinodiam canit. Atq; hæcenus de ea inæqualitate, q̄ in vno pulsu fit, & in vna parte arteriæ, diximus. Nunc de ea inæqualitate, quæ in vno fit pulsu, sed in diuersis arteriæ partibus, id est, quas plures contingunt digiti, duo videlicet, vel tres, vel quatuor, differemus. Hæc bifaria primo fit, nunc quidē quū morus continuus manet, & arteria iuxta quosdam digitos citius, iuxta quosdam v. tardius mouetur. Cuius quidē multæ sunt differentiæ. Nūc vero motus interciditur, seu p
- D**quietem interrumpit, vt scilicet nonnulli digiti motum apprehendāt ac sentiant, nonnulli vero non. Atq; hic iterum multæ exoriunt differentiæ, quas nominatim recensere nihil attinet. Vt in qualitate motus sunt inæqualitatis differentiæ, ita etiam in qualitate virtutis, nempe in vehementia, debilitate & mediocritate. Nam aut vnam occupat partem, aut plures. In qualitate etiam arteriæ, in diuersis arteriæ partibus inæqualitas esse potest. Idem etiā in qualitate diastoles seu sublationis accidit, in qua in diuersis arteriæ partibus secundum magnitudinem & paruitatem inæqualitas accidit. Ex quo genere sunt qui *μυρῶν*, i. decurtati in vno pulsu vocant, & illi qui Græcis ἐπινευκότες καὶ περιανευκότες, Latinis *eminuli & prominuli*, siue nutantes & circumnutantes dicunt. Si enim sub digito tangentis fit pulsus magnus, sub secundo autem minor, sub tertio qui est ad ægroantis pollicem adhuc minor, æqua proportionē imminutus, *myr* siue decurtatus in vno pulsu, ob muris caudæ similitudinem, quod scilicet eius modo minuat, dicitur. At si iuxta medios digitos magnus, & qui in gibbum eleuetur occurrēs pulsus, vtriusq; minuat minor apparens, Archigeni nutans & circumnutans, aut *eminulus & prominulus* appellat, manifeste significare volens distentionis dilatationisve paruitatem, cū vtrorumque extremorū nutatione ac depressione. Nō n. vtabicissis confertim vtrinq; partibus, sed veluti inflexis in arcū angustumq; cōtractus est, decurtatus magnitudine in vtriusq; partibus existens. Porro in tempore quoq; quietis inæqualitas est, q̄ in aceruo multorum pulsuū cōsistit, dum quætes partim sunt maiores, partim minores, & singulares, in vno sc. pulsu in diuersis arteriæ partibus: dum sc. non omnes simul mouent, nec simul quiescunt sed aliæ prius, aliæ posterius motum incipiunt aut desinūt. Huius inæqualitatis quatuor sunt differentiæ recens a Galeno excogitatæ, quas veteres, vtpote inuiles, omiserunt. Neq; n. ad tactū prōptē & exacte percipi possunt, sed tantū cogitatione. Nec si percipiuntur, aliquid ex iis serii p̄dici potest. Quare nō est cur in illis indagandis multū operæ ponam. Iā simplices omnes inæqualitates pulsuū, in omnib. quinque eorū primis generi-

Simili

Galenus sui erroris palinodiam cecinit. Inæqualitas vnius pulsus, sed in pluribus partibus arteriæ.



Inæqualitas pulsus in reliquis generibus.

Decurtatus in vno pulsu.

Nutans, & circumnutans. Eminulus & prominulus.

Inæqualitas in tempore quietis.

Inæqualitas in huius arteriæ. Pulsus celsus. bus absoluiimus. Præter has vero est adhuc alia in situ arteriæ, ubi scilicet partes eius non. A
 nunquam sursum, nonnunquam deorsum, prorsam, retrorsum, dextrorsum, sinistrorsum trahuntur. Quod ubi fit, efficiuntur pulsus, quos Græci *τέινοντες*, Latini *tensos*, alii *cōtortos* vocant. Præteriam dictas pulsuum inæqualitates simplices, quæ quidem Medico
 Infusio quid. viles sint, aliæ non reperiuntur. Galenus tamen extra prædictas esse quandam inæqualitatem ab infusione arteriæ sumptam refert. Infusionis autem nomine non intelligit, nisi arteriæ infusam substantiam, id est, humorem in ea contentum, propter quem fit ut
 Plenus pulsus. plenæ sint aliæ partes, aliæ vacuæ, idque nulla alia de causa, quā ut eius ætatis Medicis gratificaretur, inter quos tum magna de pleno & vacuo pulsu contentio erat. Plenum autē, ut Archigenes illum definiuit, esse dicebant eum, qui solidiorem exhibet arteriā, & occursum ipsius humore refertum, adeo ut is non sit nisi qui multum remittitur, ita ut si pre- B
 Vacuus. matur etiam arteria a manu, non moveatur. Vacuum, quod bullosam arteriæ sublationem efficit, ita ut digitorum impressioni per vacuā ingressus occurrat. Vel clarius, eū qui parum renititur, ita ut si premat arteria a manu moveatur. Mediocris est, quū vas medio-
 Mediocris. criter se in infusione habet. Galenus quidem in eo libello cui titulū fecit, *Introductiones in pulsus*, hoc genus pulsus omisit, quod falso ab Herophili sectatoribus sit introductum, sicut alia multa, quod tactu a Medico dignosci nequeat, idque tribus de causis. Una, quoniam arteriæ tunica crassa admodum est. Altera, quod cutis eam tegens, itidem crassa sit. Tertia, quia motus arteriæ perpetuus est, qui omnem in ea contentorum notitiā perturbat & ob- C
 Pulsus plenus & vacuus perperam a sectatoribus Herophili introductus. scurat. Non potest igitur quod in arteriæ cavitate continetur tactu dignosci, quod tunica eius compressione, ob suam crassitiem, cavari nequeat, nec sonitum ullum percipiamus, nec ullam fluctuationem sentiamus. De inæqualitate autem calidorū & frigidorū pulsuum, non est cur multa dicā. Quippe hos pulsus cognoscere Medico parum cōfert, imo eos scire operæpretium non est. Nam ad calorem & frigus cognoscendū magis Medico conducit tangere ægri thoracem, dorsum, axillas, hypochondria, volas manus, & plantas pedum, quā arteriam. Sed de inæqualitate simplici hactenus. Nunc cōpositas pulsuum inæqualitates, & eas præsertim, quibus Medici nomina indiderunt, quæ decem differentiiis cōplectuntur, quas ordine explicabimus, persequemur. Primus pulsus Græcis *κυματώδης*, Latinis *undosus fluctuosus*ve dictus est, quem duæ potissimum inæqualitates simul iunctæ faciunt, magnitudo scilicet dilatationis diuersa in diuersis arteriæ partibus. D
 1 Undosus *κυματώδης*. & crebritas diuersa. Fit enim, ubi non vniuersa simul dilatatur arteria, sed initio pars ei prima, deinde secunda, mox tertia, ab hac quarta, motu non continuo, sed interrupto, manente, in modum vndarum fluctuumve sese eleuantium. Ut enim semper altera vnda priorem excipit, sic etiam in undoso pulsu aliquarum partium arteriæ altitudo, aliarum humilitas est. Adest illi & remissionis in virtute inæqualitas, quod aliæ partes validius, aliæ debilius feriunt. Nec celeritatis par est progressus, sed aliæ celerius, aliæ tardius ci-
 2 Vermiculans. *σινυειδής*. entur. Si undosus totus in paruitatem delabatur ac tarditatem, Græcis *σινυειδής*, Latinis *vermiculans*, quod vermis gressui ad similis sit. Nam vermes, quos lumbricos terre nominant, in modum vndarum mouentur ac progrediuntur, rependo, non currendo. Ut vermiculans non sit, nisi quando arteria reptantem vermem, atque vnde instar subfiliem E
 Differentia undosi & vermiculantis. nobis representat. A vermiculante igitur undosus differt dilatationis magnitudine. Undosus enim cum magna, vermiculans autem cum parua & exigua dilatatione accidit. Formicans, qui Græcis *μυρμηκίζων* dicitur, ex iisdem inæqualitatibus, ex quibus vermiculans, constat. Fit ubi multis motibus abolitis & amissis, in vnum eumque plane exiguum terminatur. Nomen inuenit a similitudine, quæ sibi cum animæ formica existit, tum ob paruitatem, tum ob motus speciem. Est enim is pulsus omnium minimus, creberrimus, similiter & languidissimus, non tamen, ut Archigeni visum est, celer. Deceptus est autē eius crebritate, & paruitate. Nā sicut formica crebro pedes mouet, sed parū promouet, quoniam exile spatium vix iusto tempore transcurrit: sic pulsus formicans paruum mo-
 3 μυρμηκίζων. Formicans. tum egre, licet crebro conficiens, falsam celeritatis speciem præbet. Is vero qui Græcis
 Archigenes deceptus. *δορκιδίζων*, Latinis *caprifans* dicitur, ex duobus quoque cōpositus est inæqualitatibus. Ut enim sit caprifans, sola celeritatis inæqualitas non sufficit, nisi accedat & vehementia secundi motus maior priore. Est enim quiete intercisus, ac deinde velocior apparet. Sic autem a caprea, quæ Græcis *δορκας* vocatur, nominatus est. Quippe quemadmodum illa inter
 4 Caprifans *δορκιδίζων*. saliendum, sublimis hæret, atque secundum motum inopinatum priore celeriorē moli-

- A** molitur: ita hic pulsus, quum aliquantulum intercissus videtur, deinde multo citatior apparet. Pulsus vero is, qui Græcis *εμπείων*, Latinis *serratus* vel *serrans* nuncupatur, illam in primis inæqualitatem sortitur, quæ in vno est pulsu, sed in diuersis arteriæ partibus, motu intercisso. Fit enim, vbi alia arteriæ pars dilatata, alia vero minus propter ipsius duri-
 tem esse videtur. Sic dictus vero est, quod is, qui huiusmodi pulsus tangit, imaginem cuiuspiam rei, quæ tactum serrat, percipit. *Conuulsorius*, qui Græcis *σασμώδης* dicitur, est, qui vtrinque ab extremis retractus, & protensus, conuulsusque videtur, instar chordæ ali- cuius tensæ sensum præbens. Sunt qui illum retortum nominent. *Turbulentus* seu *vibra-
 tus*, Græcis *καλονώδης* vocatus, est in quo nihil tale reperitur, sed maior in eo est sublatio: vt partium arteriæ hæc quidem sursum, hæc vero deorsum vno eodemque tempore ferantur.
- B** Quod ita accipiendum erit. Arteria in vibrato pulsu exsilit supra, ad cutem scilicet. quam & secum affert ex sede sua, iterumque intro retrahitur, quod nec constituto tempore ser- uat, nec interpollatim, sed vno eodemque momento, alia pars eius fertur supra ad cutem, veluti circulata: alia intro ferri videtur, veluti a quopiam retracta, atque validius ferit, alia remissius, alia tardius, alia celerius. Quid multa? pulsus conuulsius similis est, dum dila- tatur, lineis incuruatis modice, vtrinque tēsis, hoc modo  Vibratus vero lineis mul- tum inflexis in altum, & acuminatis hac lege.  Pulsus hecticus est, qui semper sui si- milis manet. Quemadmodum enim hectica febris semper sui similis est, ita quoque pul- sus hecticus, qui mutationem nullam subit, sed constanter idem manet. Vt igitur hecti- cus sit, constantia & perleuerantia opus est. Nihil autem refert cuius generis, vel speciei, vel differentiæ sit. Ceterum cor & arteriæ in sanis nullo alio cientur motu sensibili, quam distentione & contractione. In ægrotis autem sæpenumero tremere & palpitare vide- tur. Quum itaque ad motum cordis & arteriarum proprium, qui pulsus dicitur, accedit vel tremor, vel palpitatio, erit tum motus ex vtriusque compositus, qui a Græcis *σασμώδης* ἢ *τρεμώδης*, a Latinis *palpitans*, aut *tremulus* appellatur. Hic inter inæquales compositos nu- merari potest, quod tremor & palpitatio inæquales variationes magnitudinis, vehemē- tiæ & crebritatis efficiant. Meminit Galenus & strepentis pulsus. Hic maior & vehemē-
 tior est, cum quodam veluti strepitu sub digitis, fitque interdum cum tensione arteriæ, interdum sine tensione, non tamen absque duritie. Atque hæc de primis duabus relatio- nibus dixisse satis sit. *Tertia* relatio rhythmus appellatur. Est autem rhythmus geminus: vnus Herophilus, sic dictus, quod illum Herophilus excogitauerit, Philosopho magis quam Medico aptus. Alter Galenicus, a Galeno repertus, Medico vtilis. Rhythmus au- tem Herophilus, est eorum quæ in pulsu sunt temporum ad inuicem proportio. Pro- portio vero, Euclide teste, est duarum eiusdem generis quantitatum, vnus ad alterum habitudo. Quum autem tempus sit e genere quantitatis, si conferas quantitatem vnus temporis ad quantitatem alterius, ex illa collatione constabit, vtra alteram excellat, an vero sint pares. Fuerunt autem de iis temporū proportionibus, quæ ex collatione vnus ad alterum noscuntur, tres apud veteres opiniones. Vna erat eorum, qui contractio- nem pulsus se percipere posse negabant: altera eorum qui contractionem sentire se di- cebant: tertia eorum, qui etiam contractionem prædicabant. Pro quibus rectius intelli-
 gendis sciendum erit, in quouis pulsu esse quatuor tempora. *Primum* est tempus dilata- tionis, id est, tempus quo arteria dilatatur. *Alterum* tempus contractionis, id est, quo ar- teria contrahitur. *Tertium* tempus, quietis superæ. *Quartum* tempus, quietis inferæ. Quæ autem sit superæ & inferæ quies, supra ostensum est. Primæ opinionis assecle tempus di-
 lationis conferebant, cum tempore interualli, quod Græcis *διάστημα* vocatur. Hoc autem erat tempus omne post dilatationem, quod in se tēpus quietis superæ, cōtractionis, & quie- tis inferæ complectitur. Igitur de horū sententia proportio tēporis dilatationis, ad reli- qua tria tempora, quæ illi vno vocabulo interuallum vocabant, rhythmus erat. *Alterius* o-
 pinionis homines tempus dilatationis cū tēpore cōtractionis cōparabant, & iuxta hos ipsos rhythmus erat proportio temporis motus dilatationis, ad tempus motus contra-
 ctionis. *Tertia* opinioni addicti conferebant tempus dilatationis cum tempore contra- ctionis adiuncto vtrique motui tempore quietis, quæ ipsum sequitur, ita vt quies supra si- mul in tempore dilatationis pars vna in collatione fuerit: quies vero infera cum tempo- re contractionis pars altera. Celebriores autem præ ceteris erant ii, qui secundam tue-
 bantur opinionem, & proportionem temporis dilatationis ad tempus contractionis

5. Serratus
εμπείων.

6. Cōuul-
sorius.

σασμώ-
δης.

7. Turbu-
lentosus.

καλονώδης.
Vibratus.

8. Hecticus.

9. Palpitans
ac tremens.

10. Streptens.

Relatio
tertia.
Rhyth-
mus.

Quatuor
in quoli-
bet pulsu
tempora.

1.
2.
3.

4.
1. Interual-
lum.

διάστημα.

2.

3.

Rhyth-
mus æqua-
lis
Inæqualis.

rhythmum esse censebant. Hi eius duas differentias faciebant, alterum pari proportio-
ne constantem: alterum impari. *Pari*, quando tempus dilatationis æquale est tempori
contractionis. *Impari*, quando alterum excedit alterum. Hic igitur vocatur *Rhythmus in-
æqualis*: ille vero *æqualis*. *Æqualis* sane rhythmus, qui sanis hominibus competit, magnam
latitudinem habet: alius enim longorum temporum, alius breuium, alius plus, alius plu-
rimum, omnes tamen æquales, quoniam neutrum tempus alterum excedit. Varius est
igitur rhythmus in pulsu secundum varia temperamenta, sexus, ætates, anni partes, re-
giones. Quod si temperamentum, sexus, vel ætas rhythmum proportionem suam serua-

Eurhyth-
mus.

Arythmus

uerint, *ἁρμονίον*, hoc est, *concinnum* seu *bonum rhythmum* pulsum habere dicetur. Si vero la-
befactat rhythmum proprium ætas aliqua, vel sexus: vel temperamentum, desciscendo
scilicet, & deflectendo a proprio rhythmico, *ἀρρυθμίον* pulsum habere dicetur, id est, malum
rhythmum, non qui omni orbetur rhythmico. Fieri enim non potest, ut sit ætas vel sexus,
vel temperamentum omnino sine rhythmico. Quilibet enim pulsus, qualiscunque sit, a-
licuius rhythmici sit necesse est. Ut igitur *ἀρρυθμίον* dicimus esse eum, quia a propria desciiuit
voce, & malam nactus est: ita arhythmus vitium est natiui pulsus, non absoluta abolitio.
Eurhythmus igitur vnus & indiuisus manet, quum sit secundum naturam: A rhythmus
autem in tres partitur differentias. Alius enim est, qui destruit suæ ætatis rhythmum, a-

Pararhyth-
mus.

Hetero-
rhythmus.

Ecrhyth-
mus.

Propor-
tio multi-
plex.

Propor-
tio super-
partialis.

Occultū
tempus.

Tempus
primum

Herophi-
li.

lium tamen vicinæ ætatis mutuatur, qui *Pararhythmus* dicitur. Alius est, qui non vicinæ
ætatis, sed cuiusvis alterius rhythmum mutuatur, & heterorhythmus vocatur. Alius,
qui nullius ætatis rhythmum retinet, & hic ec rhythmus nominatur. Alius autem est
cum manifesto & certo excessu, alius cum occulto & incerto. Si est cum manifesto ex-
cessu, id fit aut cum proportionem, quam musici Græci *πολλαπλάσιον*, Latini *multiplicem* ap-
pellant, cuius species sunt, dupla, tripla, quadrupla, quintupla. Aut cum proportionem,
quam Græci *ἐμπύρεον*, Latini *superpartialem*, quam etiam numeri ad numerum appellant:
cuius species sunt hemiola, sesquitercia, sesquiquinta, sesquisepta. Occulto autem ex-
cessu trifariam fit. Aut enim tempus dilatationis, aut contractionis, aut vtrunque occul-
tum est. Occultum tempus seu incertum est, quod Græci *ἄρρητον* vocant, quod adeo est
diminutum, ut nulla nota musica, ne minima & exprimi possit. Herophilo tempus pri-
mum vocabatur. Iam vero singulatim quodq; tempus, contractionis scilicet ac dilata-
tionis, occultum vel adauctum aliquantulum vel diminutum, plus vel plurimum. Sed

fatis de Herophili argutiis, quæ parum fructus, at multum laboris lectori afferunt. Nam
Galenus in libro de dignoscendis pulsibus tertio, manifeste ait, *rhythmorum Herophiliorum ra-
rissimum, aut nullum fere esse posse usum apud Medicos, proinde suos longe faciliores, & utiliores ad
cognoscendum plurima, quæ in morbis scire expedit*. Qui quales sint, iam dicemus, modo quid
ille rhythmum vocarit, prius exposuerimus. Rhythmus, de Galeni sententia, est quali-

Rhythmici

Galenici.

Qualita-
tes motus

tatum modus dilatationis & contractionis ad inuicem proportio. Qualitates autem
motus intelligit celeritatem, tarditatem, & inter vtrasq; mediocritatem. Non n. solum
certæ sunt quantitatatum, de quarum genere tempus est, proportionem, sed etiam quali-
tatum ipsarum. Quippe sic dicimus ex calidi, frigidi, humidi, & sicci proportionem con-
uenienti, constare sanitatem. Sic dulcem saporem ex certa proportionem qualitatum, sic
acrem ex alia, amarum ex alia. Sic denique & in viridi colore, cæruleo, puniceo, diuer-
sa dicuntur albi & nigri, ac luminis in mixtura proportionem. Nihil igitur absurdi est, si
celeritatem & tarditatem dilatationis & contractionis ad inuicem, ac earum collatio-
nes seu aptitudines varias, proportionem seu rhythmos nuncupemus. Cuius quidem rei
testis est Galenus, qui lib. 1. de spirandi difficultate ita scriptum reliquit: *Quum inspirationem
expirationi conferimus, ut in pulsibus dilatationem contractioni, rhythmum appellamus*. Distant
igitur inter se tempus motus, & qualitas motus. Hæc enim ex loco arteriæ, illud vero
ex figura eiusdem, ut supra dictum est, cognoscitur. Rhythmus igitur seu proportio
qualitatis motus distensionis dilatationis & contractionis, alia est par seu æqualis,

Qualitas

motus.

Rhythmici

differe-
ntiæ.

Æqualis.

1. alia impar siue inæqualis. *Æqualis* tres sunt differentiæ. *Primus* est, in quo dilatatio
2. celeris, & contractio celeris est. *Alter*, in quo dilatatio & contractio moderata ex-
3. sistit. *Tertius* rhythmus æqualis, in quo dilatatio & contractio tarda est. Inæqua-
1. les rhythmici sex sunt. *Primus* est, in quo dilatatio moderata, contractio autem ce-
2. leris. *Alter*, in quo dilatatio tarda, contractio celeris. *Tertius*, in quo dila-
3. tatio celeris, contractio moderata. *Quartus*, in quo dilatatio tarda, contractio
moderata.

- A** moderata. *Quintus*, in quo dilatio moderata, contractio tarda. *Sextus*, in quo dilatio celeris, contractio tarda, atq; haecenus de rhythmo Galenico. Restat, ut de ordine, & ordinis perturbatione dicamus. Pulsus aequalis semper est ordo adiunctus: inaequalis vero alii sunt ordinati, alii inordinati. Ordinati sunt, qui in multis pulsationibus suam diversitatem observant. Inordinati sunt, qui non servant diversitatem suam. Diversitas vero est vel magnitudinis, vel celeritatis, vel crebritatis, vel vehementiae, vel omnium, vel aliquorum ex iis. Ut verbi gratia, sunt octo pulsus continuo vehementes, nonus sit debilis: si rursus post nonum sequantur octo vehementes, & nonus iterum debilis, & sic ordine deinceps alii, si pulsus in uno genere, vehementia nimirum inaequalis est, sed ordinatus, quoniam servat eandem diversitatem. Post octo enim pulsus vehementes sequitur continuo nonus debilis.
- B** At si haec diversitas varietur, & perturbetur huiusmodi processus erit, tum quoad vehementiam inaequalis, & inordinatus. Eadem ratione si pulsus sint undecim magni, duodecimus parvus: & iterum undecim magni, duodecimus parvus: ac tertio undecim ex a quo magni, & duodecimus parvus: erit hic pulsus inaequalis magnitudine collectitia inaequalitate, sed ordinatus. Quod si confundatur iste pulsuum progressus, ita ut sint: quidem nonnulli magni, & aliquis inter eos parvus, nunc octavius, nunc sextus, nunc quartus, erit hic pulsus inaequalis, & inordinatus. Simili modo & in aliis pulsuum differentiis, in quibus omnibus simul si sit inaequalis non servata continuo eadem diversitas in processu, erit pulsus absolute inordinatus, sicut & absolute inaequalis. Porro inter omnes pulsus oppositos omnium generum, de quibus ante egimus, sunt alii medii, qui mediocres nuncupantur: aequali autem & inaequali nullus est medius, neque etiam inter ordinatum & inordinatum medius existit, nisi eum qui circuitibus ordinatus est, medium dicere velimus. Est vero huiusmodi pulsus, quando, exempli causa, quatuor magnitudine continuo impares sunt, quatuor alii sequentes proportionem pares prioribus, ita ut quintus primo, sextus secundo, septimus tertio, octavius quarto respondeat, & aequetur. Tales enim pulsus, quatenus ordine continuo destituuntur, inordinati sunt: quatenus vero circuitus similes observant, eatenus ordinati circuitibus dicuntur, qui medii quodammodo sunt inter ordinatos & inordinatos. Talis etiam est, si accidat, ut fiant duo magni, & duo parvi, deinde tres magni, & tres parvi, & quatuor magni, & quatuor parvi: & rursus tanquam reflectentes, duo magni, & duo parvi, tres magni & totidem parvi, & deinceps similiter. Nam is quoque pulsus, quatenus ordine continuo destituitur, inordinatus est: quatenus autem circuitum quandam observat, ordinatus secundum circuitum dicitur.

De pulsuum causis. CAP. II.

- C**ausae pulsuum aliae sunt primariae seu generationis, aliae secundariae, siue alterationis, & mutationis. *Primariae* seu Principes sunt tres, facultas, instrumentum & usus. Alio nomine continentur dicuntur, quod pulsuum essentiam contineant. Haec n. vis & natura est causarum continentium, quod nulla mutari potest, quin etiam effectus immutetur. Facultas, a facultate efficiendi pulsus, ita nominatur. Instrumentum, est arteriae corpus, quod densis ac spissis constat tunicis, & intus cavum est. Usus, finis est, gratia cuius pulsus fit. Fit autem tum propter nativi caloris conservationem, quae efficitur dilatatione refrigerante ac flagellante, contractione vero quod fuliginosum est, excernente, tum propter spiritus animalis nutritionem, ad cuius generationem dilatio idoneam materiam, id est, aerem trahit. Facultatium autem alia est robusta, alia imbecilla. Instrumentorum alium molle, aliud durum, aliud mediocre. Usus alius est augmentus, alius diminutus, alius mediocris. Ceterum e numero causarum secundariae sunt, quae non generationis, sed mutationis siue alterationis iam genitorum pulsuum causae existunt. Vel quae pulsus efficere non valent, alterare possunt. Alterandorum itaque pulsuum non generandorum, secundariae dictae sunt causae, veluti aetas, sexus, anni, tempora, regiones, balnea, cibi, potus, exercitationes, somnus, vigilia, & alia id genus, quas Medici res non naturales vocant, item morbi & symptoma. Has pulsuum causas Galenus in externas, & praecedentes digerit. *Externas* vocat, quae extra corpus positae, aliquid eorum, quae in corpore sunt, alterant, ut frigus, calor, vinum, cibis, & iis similia: praecedentes, quae corporis affectus sunt, & causas continentis movent, ut cutis densitas, retentio evaporationis, & febris, quia haec omnes alterant usum pulsuum. Porro causae primariae aliquae edunt pulsus Graecis *idius* & *idius*, Latinis *proprius* & *inseparabiles* dictos: & praeter hos etiam familiares, quos Graeci *oikos* vocant. Aliquae

De ordine, & ordinis perturbatione.

Ordinati, inordinati.

Pulsus circuitibus ordinatus.

Causae Primariae, Continentes.

Facultas, Instrumentum, Usus.

Secundariae causae.

Externae.

Praecedentes.

Pulsus
proprii,
insepara-
biles
Famili-
ares.
Facultatis.
Magni,
vehemen-
tes puri,
celeris,
crebri, ho-
rumq; cō-
trariorum
causæ.
Instrumenti.
Vfus.

aurem familiares tantum edunt. Proprii & inseparabiles sunt, qui ab vna & eadē caus-
sa primaria proficiuntur. Familiares vero, qui a plurib. primariis causis nempe duab.
vel tribus nascuntur. Facultas robusta proprium & inseparabile pulsum edit vehemen-
tem: cū hoc vero alios familiares magnū, celerem, rarum. Imbecilla facultas proprium
efficit pulsum languidum: cū hoc vero alios familiares, paruum, tardum, crebrū. Instru-
mentum molle, proprium edit pulsum mollem: cum hoc alios familiares, magnum, ce-
lerem, rarum. Durum instrumentum generat proprium pulsum durū: familiares vero,
paruum, tardū, crebrū. Vfus auctus, id est, calor in corde exsuperans & increescens nullū
proprium edit pulsum: familiares tñ habet magnū, aliquādo magnū & celerē, nonnū-
q̃ magnum & celerem simul & crebrum. Vfus diminutus, proprium nullū itidem obti-
net: sed ei familiares sunt parui, interdū parui, simul & tardus, aliquādo parui simul
& rarus. Dum itaq; vsus augetur, primū quidem magnus fit pulsus: vbi vero magnitudo
vsus non suffecerit, mox etiā celeritas ei accedit. Quod si nec hæc cum magnitudine
satis fecerit, statim frequētiā assumit. Decrescente vsu, primum recedit crebritas, se-
cundo celeritas, postremo magnitudo. Contrarius enim est recessus pulsuū familiariū
aduentui. Primū igitur erit perspicua raritas, deinde si magis adhuc imminuatur vsus, tar-
ditas apparebit: sin adhuc maior, paruitas succedet. Hæc aut accidunt, vbi per solum
vsus auctū vel imminutū pulsum fit alteratio, nulla alia causa primaria vel continēte
a pristina natura suā descenscente. At vbi non solū vsus, verum etiā facultas mutatur, &
a mediocritate recedit, quatuor tum in vniuersum differentiarū sine coniugationes di-
uersæ erunt. Prima, si facultas admodū imbecilla sit & vsus multum auctus, parui & tardi
pulsus creberrimi q; fiunt, & languidi. In modico excessu, in magnitudine & celeritate
moderati, crebri, & languidi. Secunda, vbi facultas est imbecilla, & vsus diminutus, pul-
sus parui & tardi, sicut prioris cōiugationis, sed nō æque vt illi, creberrimi fiunt. Quod si
facultas omnino prostrata sit, pulsus minimi, intermittētes, & deficientes prodibūt. At
si modice infirma sit, valida q; refrigeratio, seu admodū imminut⁹ vsus, creber minime
euadit pulsus, utiq; quod sufficiat eiuscemodi facultas vsui. Tertia cōiugatio est, si facul-
tas valida cū diminuto vsu coierit, pulsus, magnitudine moderati, sed tardiores & ma-
nifeste rari, maxime vbi p̃pollēt refrigeratio, fiūt. Nā quū sit paruus tū pulsuū vsus, vni-
uersumq; magnitudo dilatationis facile tueat, recte sane diutissime quiescit arteria. At
nec tarditas multū eadē de causa pollet. Siquidē valēs facultas, naturalē motus mensu-
rā seruat, etiā si nō postulat vsus. Omnino n. vt manifeste pulsus minor euadat, magno-
pere dissolutū oportet vsus esse, frigore admodū superāte. Quarta coniugatio, quū si-
mul robusta facultas, & vsus auct⁹ est, pulsus magni, celeres, crebri, & vehemētes comi-
tantur. Quod si plurimū calor increseat, maximi, celerrimi, qm̃ crebri cū magnis nō sa-
tis faciūt tā tē necessitati, pulsus fiūt. Porro vbi vsus cū instrumentō a statu naturali mutat⁹,
quatuor ēt cōiugationes diuersæ fiūt. Prima, vbi vsus est auctus, instrumentū molle, fiūt
pulsus magni & celeres, non statim tñ crebri, verū vbi generādorū eorum vsus superet
magnitudinē dilatationis. Si mollitudo præster, magnitudo ēt vincet celeritatē. Si ab-
undet calor, vt vsus actio cōplere nequeat, celeriores vt fiāt necesse est, q̃ maiores pul-
sus, simul ēt crebri. Vbi veronaturæ satis faciat vsus, æque magni ac celeres fiūt. Secūda,
qm̃ vsus diminutus, instrumentū durū est, fiūt pulsus minores & tardiores. Si superat du-
rities, minores q̃ tardiores. Sin refrigeratio, tardiores, q̃ minores. Ad eundē modū cre-
briores, si durities refrigeratione superior sit. Sin vincat refrigeratio, rariores. At si par-
fuerit vtriūsq; a natura recessus, tāto reddet minores, quāto tardiores, a raritate vero &
crebritate naturali non abducat. Tertia coniugatio, vbi vsus auctus instrumentum durū,
in modico a natura recessu facit pulsus magnitudine moderatos, celeres, crebros. In
magno vero vtriūsq; recessu, celerrimos, creberrimos, & minores iusto, non minimos,
nisi facultas simul laboret: sed hic de trium causarum concursu non agitur. Si immodi-
cus calor sit, & instrumentum non magnopere durum, erūt pulsus maiores, celerrimi,
creberrimi. Si n. verū est, q̃ antea ostendimus, duro instrumento familiarē esse paruum
pulsum: ægre n. dura dilatantur corpora: aucto vero vsui familiarē esse magnū, merito
maiores in isto statu fiūt pulsus: sicuti quum præpollēt durities parui. Semper n. pulsus
similior est causæ in cōiugatione vincēt. Quarta cōiugatio est, vbi vsus imminutus in-
strumen-

Duarum
causarum,
nempe fa-
cultatis &
vsus muta-
tio
quos faci-
at pulsus.
Prima ad-
iugatio.
Secunda.
Tertia.

Quarta.

Instrumenti
& vsus
mutatio
quos habet
pulsus.
Prima.
Tertia.
Magni &
celeris,
Secunda.
Minoris
& tardioris.
Rariores.

Instrumentum molle, in ea pulsus fiunt magnitudine moderati, rari, & tardi. Quando facultas una cum instrumento a natura recedunt, quatuor erunt coniugationes. Prima facultas robusta cum instrumento molli, pulsus facit maiores, tardiores, rariioresque. Secunda, facultas imbecilla cum instrumento duro, paruos pulsus, tardos & crebros concitat. Tertia, facultas robusta cum instrumento duro, immodico & æquali vtriusque causæ recessu, facit pulsus in omnibus generibus moderatos, hoc excepto quod sint duriores. At si excellat durities, parui, celeriores, crebri. Quarta, facultas imbecilla cum instrumento molli, in paruo vtriusque causæ recessu, facit pulsus in omni genere moderatos, præter hoc, quod sint molles ratione arteriæ. In recessu vero immodico paruos, tardos, crebros. Quod si mollities præpolleat, pulsus proxime ad moderatos accedent. Facile enim est paulo imbecilliori facultati molle vas vndiquaque extendere, & cito loco mutare. At si durities vincat, impeditur distensio, & necessario sunt crebriores, propterea quod paruitas dilatationis non sufficiat vsui. Restat, ut iam dicamus de recessu a natura omnium trium causarum continentium. Harum quidem octo sunt coniugationes. Prima, facultas robusta, vsus auctus, arteria mollis: hæc facit pulsus magnos, celeres, crebritate mediocres. Ceterum, etsi non diximus vehementes & molles, hoc tamen semper statuendum est, a facultate robusta edi pulsus vehementes, a tunica arteriæ molli, molles. Quod si immodicum sit vsus incrementum, crebri quoque pulsus fiunt. Secunda trium continentium causarum coniugatio, facultas robusta, vsus auctus, instrumentum durum. Parua si durities est, pulsus nascuntur maiores, celeriores, crebriores. Si autem æquo vtraque causæ intervallo deflexerit a natura, eoque modico, fiunt magnitudine naturales, celeriores, crebriores. Tertia, facultas imbecilla, vsus imminutus, instrumentum molle, facit pulsus minores, tardiores, crebritate moderatos. Quod si facultas magnopere sit læsa, & plusquam aliæ, erunt pulsus parui, tardiores, crebriores. Quarta, facultas imbecilla, vsus diminutus, instrumentum durum, edunt pulsus paruos, tardos, crebros. Non tamen horum pulsum paruitas, tarditas, & crebritas perpetuo similis est, sed pro excessu vnius causæ vario, vel duarum, vel trium erunt variae alterationes intensiores, vel remissiores. Si n. duæ causæ, vel tres plurimum a natura aberrant, in hoc quidem casu nihil mirum est, si pulsus sint minimi, tardissimi, creberrimi. Fiunt autem tales etiam pulsus, si facultas sola summe lædatur. Nam per vnam causam, quæ prorsus læsa est, pulsus sæpe extrema alteratio accidit, quod copiosius libr. 1. de causis pulsuum Galenus monstrat. Quinta coniugatio, facultas robusta, vsus imminutus, instrumentum molle, pulsus efficit magnitudine moderatos, tardiores, rariiores. Si vero admodum sit remissus vsus minores, tardi, rari fiunt pulsus. Sexta, facultas valida, vsus diminutus, instrumentum durum, facit pulsus minores, celeritate & crebritate moderatos. In magno vero vsus & instrumenti recessu minores tardiores, rariiores, duritie vero instrumenti superante magnū vsus a natura recessum erūt parui tardiores crebri. Crebri autem ideo, quod paruitas necessitati non satisfacit. Septima, facultas imbecilla, vsus auctus, instrumentum molle, præeunte vsu ante alias duas causas, creat pulsus maiores, celeriores, crebriores. Mollitie vero superante reliquis duas causas, moderatos, magnitudine, celeritate & crebritate. Facultate vero præ ceteris laborante, paruos, tardiores, crebros. Octava, facultas imbecilla, vsus auctus instrumentum durum, pulsus efficit paruos, tardos, crebros. Insigniter omnibus tribus causis læsis, minimi, tardi, creberrimi. Tardi, ob imbecillam facultatem: minimi eandem ob causam, & propter instrumenti duritiem: creberrimi, quia necessitas urget. Vsu vero ante alias duas causas modice aberrantes præeunte, pulsus fiunt maiores, aut moderati magnitudine, celeriores, crebri. Maiores, & non magni, propterea, quod durities instrumenti magnitudini multum resistit. Celeriores vero, quoniam facultas paulo imbecillior, cogente vsu celeriores facit motus, prout potest, non tamen celeres. Crebri, ideo ut necessitati satis fiat. Et quanto maior imminet necessitas, labascit autem facultas, tanto magis viget crebritas. Paruitas autem tanto insignior nascitur, quanto instrumentum est durius, & facultas imbecillior. Hactenus magni, vehementis, duri, celeris, crebri, horumque contrariorum causas exposuimus. Superest igitur ut alti, humilis, lati, angusti, longi, & brevis pulsus causas explicemus. Causæ igitur horum singulorum sunt vnius, vel duarum continentium a natura recessus, cum aliquibus concausis. Concausæ autem sunt, quæ non faciunt, nec constituunt effectum, sed sine

Facultatis
& instru-
menti mu-
tatio.
quæ faci-
at pul-
sus.
Prima.

Concaus-
æ quæ

illis tamen effectus non fit. Tales autem causæ in generatione iam dictorum pulsuum **A** sunt quinque, nempe crassities & gracilitas corporis, locus seu spatium circa arteriam, grauitas superiacentium, & formationis proprietas. Alii igitur pulsus causa est facultas robusta, vsus auctus: concausæ crassities corporis mediocris, locus circa arteriam strictus. Quippe dum spatium in quo mouetur arteria, fuerit ob corporis crassitiem exile, necessitas autem cogat magnam fieri dilatationem, facultate non refragante, arteria quum non habeat, quo se libere dilatat, nisi cutem versus, pars eius, quæ cute tantummodo obducta est, liberius præ ceteris extendetur, aliæ autem adnata carne vel adipe impediuntur. Quare quatenus est arteria soluta, & cute duntaxat obducta, non poterit illius motus non præstare ceteris, quod nihil aliud est, quam altum fieri pulsuum. Quod si igitur facultas robusta, vsus etiam auctus, locus vero circa arteriam contra amplius fuerit, pulsus non **B** altus, sed magnus, quoniam libera est arteriæ in longum & latum distensio, nascetur. Humilis pulsus causa continens est facultas imbecilla: concausæ crassities corporis. Adeps enim & caro profunde demergunt arteriam se debiliter attollentem. Fit etiam sæpius pulsus & in macilentis & obesis corporibus ex naturali formatione, quia natura profunde inseruit arteriam, ut extrema eius pars vix attingatur, obliqua nequaquam. Lati pulsus causa est facultas non ultra modum languida. Concausæ vero locus amplius, & grauitas superiacentium partium. Quum enim facultas robore suo destituatur, & amplum sit circa arteriam spatium, sublimis vero pars arteriæ deprimatur pondere cutis incubentis, quia rugosa est, ut in senibus: vel tunica arteriæ, quæ supra modum irrigua est, ac maderet, & copioso humore imbuta est, ut accidit in hydropicis: oportet ut partes arteriæ **C** sublimiores delabatur demittanturque, partim in cavitatem arteriæ, partim in obliquum. Quatenus igitur deorsum demittuntur, eatenus ascensu prohibentur. Quapropter augetur latitudo, diminuitur autem altitudo. Angusti & longi causæ facultas infirma durities instrumenti: concausæ vero gracilitas corporis, subtilitas cutis, & siccitas, languida enim facultas non potest distendere arteriam duram in latum: angustus igitur & longus instar fidis, fit pulsus. Gracilis autem corporis habitus, & cutis subtilitas longitudinem eius detegit. Brevis, fit propter pinguedinem, & corporis carniūque crassitiem. Restat, ut quæ sunt inæqualitatis causæ exponamus. Collectitiæ igitur inæqualitatis causæ continentur sunt facultas, imbecilla, instrumentum læsum, vel ineptum, vel vtrumque. **D** Vfus vero alteratio nunquam causa eius est. Fieri enim non potest, ut tam sub:to vsus pulsus varietur, quam subito inæqualitas pulsuum tactu percipitur, quemadmodum copiose ab initio libri secundi *de causis pulsuum* Galenus monstrat. Porro instrumentum trifariam ineptum redditur. Primo propter compressionem seu adstrictionem, quæ fit, dum loca, in quibus mouentur arteriæ, occupantur humoribus, quos ut molestos facultas studet vehementibus, magnis & celeribus motibus propellere: aut propter tumores præter naturam. Si enim loca arteriæ circumiecta, quæ in hoc creata sunt, ut eam dilataram excipiant, aliud corpus infederit, non possunt per illud arteriæ restrictæ & compressæ satis dilatari. Quapropter iam violenter & vehementer agere facultas cogitur, reicere & propellere student illa, quæ suum instrumentum obfederunt, ac motu prohibeunt. **E** *Secundo*, propter obstructionem a crassis & viscidis humoribus, qui arteriis ac magnis oris earundem insignibus, qualia sunt in illis locis, ubi ex magnis arteriis diuersi rami propagantur, impacti sunt, factam. Tum enim liber transitus spiritibus per suos canales haud datur, proinde variam inæqualitatem nasci est necesse. *Tertio*, propter plenitudinem siue sanguinis copiam in venis, aut arteriis contentam. Nam copia illa in venis contenta, arterias, utpote venis adiacentes, haud secus ac tumor præter naturam, premit & constringit. In arteriis autem contenta, spirituum liberum transitum impedit. Tunc enim quia nec allicere spiritum, nec reddere valent, diuersas simul ac difficilimas faciunt imbecillitates. Facultas autem inualida ad suum opus redditur tribus modis. *Primo*, quia in omni onere grauatur, adeoque plenitudine ad vires vocata oneratur, licet ex se sit satis robusta. Atque tum facit pulsus inæquales anonymos. *Secundo*, quia est distracta seu irritata. Distracta vero fit per duplicem cordis intemperiem, vel alios diuersos affectus, quos moleste fert facultas. Reperiuntur enim nonnunquam partes cordis, vel aliorum membrorum, aliæ calidiores, aliæ frigidiores: illæ magnos, celeres, crebros, vehementes exposcunt: hæ vero paruos, tardos, raros, languidos. Fit itaque vicissitudo omnium pulsuum

Alii pulsus causa.

Humilis.

Angusti & longi.

Collectitiæ inæqualitatis causa.

Instrumentum trifariam ineptum redditur. Compressione.

Obstructione.

Plenitudine.

Facultas trifariam imbecilla & inualida fit ad opus suum.

- A** suum, & inæqualitas. Prodeunt & dicroti. *Tertio* in firma facultas efficitur, propterea quod temperamentū vel cordis, vel membri, cuius pulsus attrectas, dissoluitur in tem-
perie. Quod si igitur modica sit intemperies, sunt pulsus parui, tardi, rari, languidi. In
maiore, myuri reciproci: in maxima, myuri non reciproci. Ultra quam si adhuc receda-
tur, prodibunt intermittentes: in longinquiore recessu deficientes: ultimo asphyxia, id
est, pulsus priuatio, vel vera, vel apparens. Vera aut est, quando motus arteriarum perit. Pulsus pri-
uatio.
Hæc in viuū animal non cadit. Apparens, quando tactui nostro nusquam arteriæ motus
offertur, imo omnis in omnibus membris occultatur. Inæqualitatis singularis duo esse
genera diximus, alterum q̄ fit in vna parte arteriæ, alterum in plurib. partibus. Quod in
vna parte arteriæ sit, tres habet species intermittentes in vno pulsu; impares citatos, &
B dicrotos. Causæ omnium intermittantium sunt eadem genere, quæ & inæqualiū col-
lectitiōrū, sed efficaciares multo, & deteriores. Nā si quæ cōpressiones, obstructiones,
aggrauationes, multiplices intēperies, & infirmitates ipsis adsunt, oportet esse maiores.
Nam he nō sinunt nedū integros pulsus, quales videre est inter intermittētes collecti-
tios, confici, sed ne partes quidē eorum integras: dilatationes n. ipsorum quientib. admi-
xtis intersecantur. Quamuis aut prauī sint omnes intermittētes singulares, sunt tamen
eorum prauitatis excessus intensiores ac remissiores. Quorū enim motus vterq; , ante
quietē scilicet, & post quietem, sunt celeres, optimi sunt: pessimi, tardi: mediū bonitate
moderati. Qui vero intercedunt inter medios & extremos vtrosq; tantum bonitate vel
prauitate pollent, quantum cum eis participant. Nā posterior pars motus si fuerit tar-
C da, prior celer, indicat plus grauari facultatem humorum abundantia, si hæc fuerit eius
caussa, quam si vterque motus fuerit celer, qui attestatur facultatē reniti & repugnare,
ac sese attollere aduersus copiam humorum. Additur aut ad bonitatē bonorum, si non
solum fuerint celeres, sed etiam magni, & vehementes. Præterea si quies, quæ eos disse-
cat, fuerit exigua. Hæc enim declarāt facultatem strenue contendere cū morbo & eius
caussis. Prauitatem vero auger paruitas, debilitas, & diutina quies eos dissecans. Hæc n.
omnia si affuerint vni pulsui intermittenti, ab humorū diluue prosterne facultatem de-
nuntiant, si causa fuerint eius inæqualitatis: vel obstructionem insignē prope cor esse,
vel compressionem maximas vel plurimas arterias obsedis. Hoc vero intermittētib.
singularibus additur, q̄ vsum seu necessitatem vrgentem semper comitem habent. Nisi
D enim vsus adauctus vrgeret ac cogeret, facultas multitudine humorū onerata, aut ob-
structione impedita, aut cōpressionē obfessa, aut ex resolutione languida, nunquā co-
nareretur secundū motū post intersecantem quietē aggredi. Pulsus inæquales singulares Impariū
citorum
caussa.
in vna arteriæ parte, absque quiete intersecante, dum scil. priores partes motus sunt ce-
leriores, posteriores vero tardiores: vel econtra priores tardiores, posteriores aut cele-
riores motu continuo perseverante, non intersecto per intermediā quietem *ἀνισότυχος*,
id est, impares citatos, appellari diximus. Atq; horum alii æqualiter suā inæqualitatem
conficiunt, alii inæqualiter. Hi omnes easdē causas, quas intermittentes singulares ob-
rinent, sed nō tot numero, nec tam læuas & insignes. Oriunt n. ex obstructionibus, vel
cōpressionibus, sed minus difficilibus, q̄ intermittentes: ab onerata etiam facultate, sed
E minus quam intermittentes. Non enim æque malū est alterari motū, & interrumpi vel
dissecari quiete media. Non temere aut dictum est, easdē istorum esse causas, sed non
tot numero, quot intermittētiū. Nam a re soluta seu debilitata facultate sepe intermit-
tentes fiunt, aut impariū citatorum nullus: siquidē omnes magni sunt. Quoniā vero ex
impariū citatorum numero quidā sunt, qui motū dilatationis, subito ad contrarium
mutant, vbi scil. prior pars motus fuerit celer, secunda tarda: vel e diuerso, prior tarda,
posterior celer: scire oportet, eiusmodi pulsus nō simplices inæqualitatis causas habe-
re, sed compositas. Id est, nō tantum a grauata facultate proficisci, sed a desse simul ob-
structionem vel adstrictionem instrumētorum, non equidē fixam, sed facile permuta-
bilem. Qui n. fieri posset tam magna & subita mutatio ex solo grauamine facultatis, q̄
F paruo momento temporis reiici non potest? Dicrotorum pulsuum causa est, inæqualis
cordis intemperies: vel arteriarum, non qualiscunq;: siquidem eius est magna varietas. Dicrotorū
caussa.
Partes præterea cordis quædam sunt multum calidæ, mundæ tamen: quædā vero mul-
tis fumosis vaporibus refertæ, id est, immundæ. Atq; tum ad oppositos fit prouocatio.
Calidæ enim partes mundæ, refrigerationis indigæ, cordis dilationem appetunt. Im-
rietas.

mundæ vero, vt se expurgent, eodem tempore contractionem desiderant: fiet igitur dilatatio & contractio diuersimode, pro diuersa alterutrarum partium victoria. Vincen-
 tibus enim calidum partibus mundis conficitur dilatatio: sed conceditur nihilominus
 aliquantula etiam contractio immundis partibus. Tum autem dicuntur vincere partes,
 dum vel plures sunt, vel intemperatiores multo. Contractio autem vel retrahit dilata-
 tam arteriæ tunicam antequam perfecte distendatur, vel dum non perfecte dilatata est,
 vel toto dilatationis tempore: aliæ partes tunicæ nituntur dilatari, aliæ eodem tempore
 contrahi, superantur tamen a dilatantibus contrahentes, quæ remorantur dilatatio-
 nem. Sic igitur diuersæ partes cordis diuersimode affectæ dilatant & contrahunt sese,
 arteriarumque tunicas dilatari ac contrahi cogunt, prout refrigeratione vel expurga-
 tione indigent. Sed præter causam calidam mundam, & calidam immundam, reperi-
 tur alia, quæ non simplex, sed duplex est, dum scilicet partes cordis aliæ sunt calidæ, aliæ
 frigidæ. Hæ inoliuntur paruos, tardos, raros pulsus: illæ vero maiores, celeres, & crebros.
 Quæ igitur plures sunt, & potentiores multo, cogunt totum cor & arterias pro sua ra-
 tione moueri. Est & tertium genus inæqualis intemperiei cordis, quæ etiam duplex est,
 non vnica, dum scilicet substantia cordis est calida, contenta vero in ventriculis eius ma-
 teria frigida: vel econtra, substantia cordis frigida, contenta vero in eo materia calida.
 Quando igitur tanta est caliditas substantiæ cordis, quanta frigiditas contentorum: vel
 econtra, tanta est frigiditas substantiæ cordis, quanta caliditas contentorum, fiet pulsus,
 magnitudine, celeritate, & crebritate moderatus. Si vero intemperies substantiæ cor-
 dis & contentorum non æquos gradus habeant contrariarum qualitarum, sed excellat,
 modice tamen, vel cor, vel ea, quæ in corde continentur, nascentur pulsus inæquales,
 collectitii & singulares. Sin supra modum excellat, fiet pulsus continuus, pro ratione vin-
 centis. Eadem ratio est vicinorum cordi, nempe pericardii, pulmonis, arteriæ magnæ,
 & membranarum, quæ in corde contentorum. Ceterum inæqualitatis singularis in di-
 uersis arteriæ partibus causæ sunt vel facultas imbecilla, vel copia humorum, vel extre-
 ma instrumentorum mollities, vnum ex iis, vel plura. Facultas enim imbecilla ex corde
 in arterias deriuata, & promanans, nõ potest pari firmitate totum vas attollere, sed pro-
 pinquiorem scaturienti fonti, id est, cordi partem magis & citius attollit, ac vehemen-
 tius: remotiorem autem tardius & minus, & debilius, donec vis, quæ in priore parte e-
 rat, permeet etiam ad posteriorem: quæ aucta robore ex minore in maiorem, ex tardio-
 re in celeriolem, ex debiliore in fortiolem motum profilit. Copia autem humorum im-
 pedit facultatem remorando, detinendo, dirimendo, & scindendo continuũ eius pro-
 gressum. Non enim sinũt æqualem esse motum pulsus humores, ac eo potissimum loco
 quo affluunt. Quapropter fit, vt in quibusdam partibus motus maior, celerior, & vehe-
 mētiore: in quibusdam minor, tardior, languidior: in quibusdam etiam minimus, vt sen-
 su percipi nequeat, ac veluti quiete interruptus appareat. Instrumentum autem supra mo-
 dum molle, quod tunicæ arteriarum, tum multa humiditate sint imbutæ, non potest æ-
 qualiter omnibus partibus dilatari, propterea quod flaccidum corpus ineptum sit ad
 motum æqualem. Partes enim eius cordi proxime attolluntur, aliæ vero interim flectũ-
 tur, non attolluntur. Pulvis myuri singulares causam habent imbecillam facultatē, quæ
 remotioribus partibus a corde parcius affunditur, propioribus vberius. Quapropter pro-
 piores cordi magis distenduntur, remotiores minus: & quanto partes longius distant a
 principio, tanto minores motus edent. Atq; hæc quidem causa eorũ continens est. Cõ-
 causa vero gracilitas est corporis, quæ in longum detegit arteriam, alioquin caudã mu-
 ris non repræsentaret. Eminulorum seu prominulorum causa est aliquando inæqualis
 intemperies partiũ arteriæ. Facultas n. a corde diffusa in arteriarum tunicas, temperatis
 quidem partibus melius & expeditius ad motũ vitur: intemperatis vero deterius. Nam
 ab eadem & æqua facultate pars arteriæ temperata, q̃ debitum calorẽ & humiditatem
 retinet facilius & magis mouetur: quæ vero supra modum est sicca, vel humida, vel cali-
 da, vel frigida, difficilius & minus. Quando ergo pars arteriæ inter atreſtantes digitos
 mediæ, fuerit melius temperata, vtrinque vero partes intemperatæ, maior erit dilatatio
 mediæ, quam partium vtrinque adiacentium. Est & altera eminulorum pulsuum causa,
 quæ sæpius comperitur in ægrotis quam prior: facultas scilicet imbecilla, & macies par-
 tium, quæ ambiunt arterias. Quæ igitur in parte est tenuissima cutis, proptereaq; leui-
 ssima:

Vincere
quando
dicantur
partes.

Inæquali-
tatis sin-
gularis in
diuersis ar-
teriæ par-
tibus causæ.
Facultas
imbecilla.

Copia
humorũ.

Instrumentũ
supra
modum
molle.

Myurorũ
singulorũ
causæ.

Eminulo-
rum pro
minulorũ
causæ.

- A** *firma* : est autem hæc media, cui nulla caro ad nascitur : vbi plus se arteria exserit : in partibus autem vtrinque mediæ parti adiunctis, quia non sola cutis est, sed caro etiam, licet marcida, necesse est, minorem fieri dilatationē. *Ægre enim ferunt debiles arteriæ* Inæqualitatis in firmis *onus superiacentis carnis. Tenduntur arteriæ*, quoniam tunicæ earum trahuntur. *Trahunt autem partes sibi vcinas*, non solum arteriarum tunicas, tumores omnes præter naturā, phlegmones, scirrhi, apostemata, & cruda tubercula. Sicut enim chordæ dum exarescunt, sic & arteriæ trahuntur. *Frigus quoque immodicum, instar gelu contrahit* : item conuulsio, & calida ac sicca intemperies. Ceterum æqualitas semper habet ordinem adiunctum sibi comitem : inæqualitas vero, aliquando sibi adsiscit ataxiam, nonnunquam ordinem. **B** *Ordo igitur in qualibet æqualitate fixa, stabilita, & firma causa* Ordo. *inæqualitatis fit, quæcumq; illa sit ex numero earum, quas huc vsq; recensuimus. Ataxia* Ataxia. *vero fluxilem, mutabilem, & infirmam comitatur. Reliquum est vt vndosorum, vermiculantium, & formicantium pulsum causas exponamus. Hos autē procreat facultatis imbecillitas, vel humorum copia, vel summa instrumentorū mollitudo. Quia vero vndosus maior est, & celerior, quam vermiculans, idcirco vndosum a copia humorū enasci certum est : vermiculantem vero ab imbecilla facultate, quæ arteriam vno eodemq; tempore totam attollere nequit, sed attollit partem post partem, eamq; exiguam, non sicut in vndoso magnam. Dum aut vndosus in vermiculantem degenerat, hoc euenit, quia facultas, quæ prius erat grauata in vndoso, nūc & grauata, & dissoluta est in vermiculante. Non semper tamē vndosus degenerat in vermiculantem : sæpe enim transmutatur etiam in intermittentem, & in variam inæqualitatem. Fit quoque vermiculans sæpe, licet eum vndosus nō præcedat. Quum vero vermiculans cōmutatur in formicantem, tanto magis dissolutam facultatem esse coniiciendum erit quanto formicans est minor. Formicantis igitur eadem est causa, quæ vermiculantis, sed auctior. Caprifantis causa est facultas valida, impedita aut copia humorum, aut compressione, vel obstructione arteriarū, vt continuum motū efficere nequeat. Cogit n. paulisper remorari ac cōsistere in ipso motu sed re collectis viribus, dū conatur obstaculū suū superare ac eicere, vehementiorē adhibet motū secundū q̄ primum. Comitatur etiā caprifans* Formicantis. Caprifantis. **D** *pulsus interdū inæqualē cordis intemperie, quæ distensionē impedit. Serrantis pulsus* Serrantis. *causæ sunt facultas onerata, instrumentū durum, vsus auctus. Si n. facultas grauata non esset, nec ipsa inæqualitas singularis. q̄ in serrante pulsu reperitur, adesset. Instrumentū vero durum in eo est, non ex siccitate arteriæ, sed ex tensione. Tendi n. oportet arterias in hoc pulsu ob phlegmonem, quæ partes neruofas obsidet : partes vero neruofæ magnā cum arteriis cōiunctionem habent pp fibras, quæ ex neruis ad arterias enascuntur. Quia vero alię partes arteriarum magis sunt appositæ phlegmoni secundum rectitudinē, alię minus, idcirco aliæ plus, aliæ minus tendunt. Vfus vero auctus, id est, calor augmentatus, cogit arteriam multum attolli, q̄ ob duritiē fieri nequit, partim etiam ob affectam facultatem. Proinde alię partes attolluntur plus, alię minus. Quoniam aut eodem redduntur tempore vniuersæ, prodit illa imago serrati tactus. Conuulsiui pulsus causa* Conuulsiui. **E** *est neruorum conuulsio. Nam dum nerui cōtrahuntur, contrahunt & arteriæ. Magna enim est neruorum & arteriarum societas, non solum q̄ fibras arteriæ a neruis accipiāt, Vibrati.* *sed etiam q̄ singuli ramuli arteriarum & neruorum inuicē sint coniuncti. Fere n. cuilibet arteriæ infra, vel supra, vel ad latus neruus adheret. Vibratum pulsum tres causæ simul efficiunt, facultas valida, instrumentum durum, necessitas ingens, id est, vsus auctus. Vfus autē auctus non est, vt diximus, nisi caloris augmentum, vel animalis spiritus exhaustio. Quum enim alterū horum adsit, vel vtrunq; maxima distensione opus est : dum vero nihil aliud repugnat, quo minus magna distensio fiat, præter duritiem arteriæ, modo valida facultas sit, necesse est vt flectatur in altū, & veluti frangatur arteria dura : ac qua in parte frangitur, eatenus acuminatur. Iam vero acumen aliud attollitur, aliud demittitur, quia facultas potens, urgente necessitate, loco maximæ & æqualis distensionis, quam in molli arteria facile præstaret, nunc hanc, nunc illam partem arteriæ duræ, in acumen flexæ, sursum eiacularur. Palpantis pulsus causa est flatuosa. Siquidem palpitatio non fit, nisi a flatu in membro occluso, qui exitum querit, & agitatur secum continentia membra tam diu, donec vel resoluator, vel violenter explosus in cognatum sibi aerem exspiret. Tremantis pulsus causa, est facultatis imbecillitas. Hæctici* Palpantis. Tremantis. Hæctici.

Strepentis.

Iosephus Struthius.

De pronidencia ex pulsibus.

Magnus. Pulsus. Paruus.

Paruus.

Celer.

Tardus.

Crobet.

Rara.

Vehemens.

Languidus.

Mollis. Durus. Rhythmus.

Intermittens systematicus. Deficiens. Asphyxia.

Intercurrentes.

Intermittens singularis. Myurus. Dicrotus. Ordo. Ataxia. Vndosus.

pulsus causa, est affectus in solidis partibus fixus, qualis est marasmus, tabes, pulmonisue vlcus, & hectica febris. Strepentis pulsus causa est durities arteriarum, vacuitas eius, & facultas valida: concausa vero est spatium, in quo mouetur arteria, aere, non humore refertum. Quemadmodum enim fides, si molles sunt & vuidæ, non sonant ad citharam: sic & arteriæ molles. Sunt vero arteriæ repletae spiritibus, aere & sanguine tenuissimo, sed aliis plus, aliis minus. Quod si parum sanguinis in se habeant, amplum erit spatium spiritibus, & aeri interno. Facultas autem valida ictum faciens vehementem, aut saltem non languidum, quatiens aerem, & spiritum, strepitum excitat. Atque hactenus causas pulsum continentis, ac concausas qua potuimus breuitate percensuimus. Restat nunc, ut causas secundarias commemoraremus. Quum vero has ipsas Galenus lib. 3. de causis pulsuum, ordine & perspicue admodum tradiderit, & Iosephus Struthius (e quo, ut ingenue fateor, multa mutuatus sum, quod in compedium ea quæ Galenus diffuse docuit, redegerit) librum hunc commentariis illustrarit, non est cur hic de iis verba faciamus, sed ad eam patrem, quæ ex pulsibus futura prædicit, accedamus. Duplex autem est prouidentia ex pulsibus. Vna secundum genera pulsum, dum docetur, quid quilibet pulsus singulorum generum significet: altera secundum loca, qua docemur, quem pulsus edere solet quilibet locus affectus. Magnus pulsus permanens ac perseverans, morbum inesse calidum significat. Vbi ex robore facultatis proficiscitur, magnus est simul & vehemens. Si ex mollitie instrumenti, magnus & mollis existit. Si ex aucto calore, magnus, sed caret vehementia, & mollitudine. Paruus pulsus, si a facultatis imbecillitate prodit, erit paruus simul & languidus. Si ab instrumento duro, erit paruus simul & durus. Si neutrum adsit, nec durities, nec languor, caloris immutationem significat. Celer in sanis sine magnitudine, significat exercitia immoderata, vel balnea immodica, vel quampiam aliam nimis calefacientem causam, quæ vires attriuit. In ægrotantibus vero morbum calidum, qui iam vires labefactauit. Tardus pulsus imbecillam esse facultatem, si simul est languidus, significat. Simul durus est, si instrumentum durum fuerit. Vsum vero diminutum, si tardus duntaxat fuerit, indicat. Creber in sanis calidas temperaturas: in ægrotis vero morbos calidos. Sæpe etiam imbecillam facultatem, quæ magnos & celeres pulsus edere nequit. Nonnunquam etiam instrumentum durum, quod distensionem ineptum est. Rarus pulsus in sanis frigidius temperamentum: in ægrotis autem frigidus morbos significat. Ingentem igitur cordis frigiditatem, vel spirituum & sanguinis, qui in sinib. cordis continentur, præ se fert: qui si diutius durent, vna paruus efficit. Vehemens pulsus robur facultatis significat: & quo est vehementior, eo melior asperanda erit. Si tamen vehementiæ limites excedas naturales, non vigorem virtutis, sed irrationem annuntiat. Languidus contra, debilitatem facultatis demonstrat: & quanto est languidior, tanto maiorem virium defectum ac destitutionem esse attestatur. Mollis pulsus, arteriæ humiditatem significat. Durus vel siccitatem, vel congelationem, siue adstrictionem ex frigore, vel tensionem præ se fert. Rhythmus æqualis moderatus significat corpus bonis succis refertum, ac temperatum. Præter hunc vero alii rhythmici tanto impuriore & minus temperata indicant corpora, quanto ab eo magis desciscunt. Intermittens systematicus debilem facultatem denotat. Qui duorum pulsum tempora intermittendo transigit, est perniciosissimus, & vix quicquam liberatur ex huiusmodi discrimine. Deficiens pulsus altiorum gradum, & periculosiorem debilitatem facultatis indicat. Asphyxia, & omnimoda priuatio pulsum, omnium symptomatum est horrendissimum, & certus mortis nuntius, modo a momentaneis causis non enascatur. Intercurrens pulsus omnium ex systematica classe securissimus est. Fit autem, dum a copia humorum oneratur cor, vel arteriæ: aut dum hæc obstruuntur, vel comprimuntur. Promittit intercurrentes bonas iudicationes in morbis, & affuturæ salutis fides est testis, si alia consentiāt. Intermittens singularis proximam denuntiat mortem, præsertim qui prauior est. Myurus, defectum virium, & gracilitatem corporis. Dicrotus, impuritatem & putredinem humorum, a qua fuliginosorum vaporum plurimum effertur, denotat. Ordo certus index est boni, vel mali. Boni quidem, in bonis pulsibus, vel bonis inæqualitatibus. Mali vero, in contrariis. Ataxia siue ordinis perturbatio incertus est index boni & mali. Omnis enim eius reputatio ex bonitate eius, cui adest, vel malitia pendet. Vndosus pulsus morbos nimio humore solidas partes irrigantes: quales sunt

- A** sunt febres pituitosæ, quotidianæ, & typhodes, id est, madidæ: hydropes, præsertim anasarcas, in quibus nullo scyrrho induruerunt viscera, indicat. Vermiculans corpora spiritibus esse inanita ac destituta, ex nimia aliqua vacuatione, denotat. Significat & pulmonem nimia scatentem humiditate, non ab initio, sed attritis iam viribus, atque putrescente pulmonis substantia. Formicans multo vermiculante est perniciosior. Nam in febribus quæ diuturnitate temporis exhausterunt vires, certus est mortis nuntius. In febribus igitur lentis ac paruis formidabilis omnino est. Caprifans superiorem esse naturam morbo indicat, & victoriam de ipso promittit. Serrans quanto est manifestior, tanto deterior. Manifestiorem autem ipsum faciunt, nimia tensio, & durities. Hæc ambobus ingentem tumorem phlegmones esse testantur, quæ longa coctione indiget. Conuulsivus, qui a nimia vacuatione euenit, deterior est: qui repente & statim ab initio morbi fit, minus malus. Vibratus in sanis non est incommodus. Inuadit subito a somno expectatos, vel perculsos, & a quopiam terriculamento irritatos. In ægris vel magnam phlegmonem, vel tenacissimam obstructionem, vel conuulsionem portendit. Palpitans, in pituitosa febre laborantibus, sine tamen omni periculo, apparet. Tremens, synopes, & postea mortis omen est. Hecticus morbi longitudinem significat, ut nomen ipsum prodit. Strepens semper durus est, inanitionem, & vacua vasa demonstrat. Ceterum nunc restaret, ut quos quilibet singularum corporis partium affectus, quibus cor consentiens miris modis pulsus immutans, edat pulsus, explicaremus. Verum quia hoc perspicue Galenus libide *Prædictione ex pulsibus* tradit, non est cur hic actum agamus. Satis autem erit, si breuitatis ergo, qui in febribus pulsus sint, commemoremus. Distinguntur autem febres caloris subiecto. Nam aut in spiritibus consistit, & vocatur diaria: aut in solida cordis substantia, & hectica nominatur: aut in humoribus, & putrida dicitur. Diariæ pulsus sunt magni, celeres & crebri. Febris igitur omnis a magnitudine pulsus incipiens, est diaria. Hæc quia facultati parum incommodat, vehementiam morus a pulsu non adimit, nisi ex accidenti, dum scilicet vel in stomacho humor aliquis mordax existit, vel copiosus cibus, aut moror facultatem debilitans. Hecticæ pulsus sunt parui, celeres, crebri, languidi, hectici. Nam in hectica facultas ob intemperiem cordis ægre valet, & usus augetur. Quare ut aucto vsui satisfiat, celeritas præsto est, laboras autem facultas magnum & vehementem pulsus fieri non sinit. Putridæ febris proprium & inseparabile est, Galeno teste, ut arteriæ submissio siue contractio celerior efficiatur. Quum itaque in diariis & hecticis febribus, dum simplices sunt, & solæ, purus sit calor, ideo solum exposcit refrigerium, quod distensio dilatatione suppeditat. At putridarum calor, quia fumosus est, qui & refrigerium requirit, & fumosorum ac fuliginosorum excrementorum expulsionem, ideo distensionem facit quidem celeriore, sed contractionem longe celeriore, adeoque rhythmum in pulsu destruit, eumque inæqualem reddit. Multo enim contractio celerior est, quam distensio. Proinde rectissime Galenus impares citatos pulsus in febribus putridis nasci, quos sæpius propriam febrium inæqualitatem esse scribit. Quid multa? Inæqualitas rhythmici, & externa crebritas proprium est signum, & inseparabile putridarum febrium. Impares vero citati pulsus, proprium etiam earundem signum, sed separabile: quoniam nec semper, nec omnibus inest. Licet autem omnes putridæ febres, propter auctum calorem, ut in augmento accessionum magnos, celeres, & crebros edant pulsus necesse est: tamen pro humorum putrescentium diuersitate non ex æquo eiusmodi sunt. Biliosæ enim febres habent pulsus magnos, celerrimos, creberrimos, aliarum comparatione. Melancholicæ minores, tardos, rarissimos, respectu aliarum. Pituitosæ minimos, æque tardos, ut melancholicæ, sed non æque raros, molles. Magnitudine igitur & celeritate excellit alia febris biliosa, paruitate ac mollitie pituitosa, raritate melancholica. In omnibus autem febribus pestilentialibus propter ferocitatem spiritalis efficaciam, quæ infringit vires, necessario fiunt pulsus parui, languidi: tantum vero celeres & crebri, quantum vrget auctus calor, & permittit facultas. In diariis tamen & humoralibus febribus pestem redolentibus, pulsus minus languidus, imo sic aliquando robustus, ut det spem bonam salutis. Atque hæc hætenus pro institutionum ratione sufficiant. Qui plura desiderat, is Galenum, qui omnia ad pulsus rationem spectantia accuratissime tradidit, consulat.

Vermiculans.

Formicans.

Caprifans.

Serrans.

Conuulsivus.

Vibratus.

Palpitans.

Tremens.

Strepens.

Febrium pulsus.

Diaria.

Hectica.

Putrida.

Pestilentialium.



BSOLVTA ea medicinæ parte, quæ præteritorum, præsentium, & futuro-
rum prædictionē tradit, atque Græcis *σημειωτική* appellatur, ad ultimam eius-
dem partem, quæ *θεραπευτική* iisdem nominatur, eo quod curandi metho-
dum seu rationem doceat, nobis progrediendum erit. Cum autem omnis
medendi ratio ac methodus per indicationes fiat, & ab indicationibus initium sumat,
principio, quid sit indicatio, trademus. Est igitur indicatio, *ut lib. 2. Methodi medendi, c. 7.*
docet Galen. sequentis, siue agendi insinuatio: aut brevius, ordinis repræsentatio, vel ex-
plicatio rei agendæ. *In lib. de optima secta* indicationem definit esse comprehensionem
seu cognirionem iuuantis, vna cum comprehensione nocentis, cum re iudicâre simul
aduenientem, idque sine obseruatione & ratiocinatione. Quo vero pacto hæc defini-
tio sit intelligenda, *lib. 1. harum Institutionum sect. 1. cap. 8.* copiose a nobis môstratum est.
Ad hunc igitur locum, ne de vna & eadem re bis nobis differendum sit, lectorem able-
gamus. Differt itaque maxime indicatio ab obseruatione & ratiocinatione: quod ea,
quæ per indicationem comprehenduntur, in præcedente aliquo, *ut lib. 2. Methodi me-*
dendi testatur Galenus, nempe in natura rei sunt designata. Percepta enim natura eius, q̃
nos ad agendum mouet, protinus etiam vna cum eo quid agendum sit, & quid fugien-
dum, ex consequenti quodam intelligimus, quasi digito ostēderetur, quod quærimus.
Vnde certe indicationis nomen deductum est. Vt enim qui digito quid agendum, &
qua via sit incedendum ostendit: sic etiam natura rei cognita, cuius gratia ad aliquid
faciendum impellimur, quid eligendum, quidue vitandum sit, & quid primo, secundo,
tercio, & sic deinceps moliendum sit, demonstrat. Ergo ex ipsa rei natura ordiri, atque
ab ipsa, quod sequens sit, citra obseruationem siue experientiam, & ratiocinationem
inuenire, id est, indicatione inuenire. Verum experientia siue obseruatio, rerum natu-
ram non expendit, sed longo rerū vſu se tueretur. Ratiocinatio tum superuacua est, quod
rei natura proposita, statim quid conferat, aut quid obſit, citra mediam vllam ratioci-
natioem agnoscamus. Analogismo autem id quod iuuat percipitur, quando causa
quidem ignoratur, nullaque obseruatio habetur, sed affectus quam similimus ex sym-
ptomatis est. In huiusmodi enim ab indicatione quod confert, colligi nequit, causa e-
nim ignoratur. Obseruatione autem nulla facta, symptomatum similitudinem intuen-
tes, ad simile transire coguntur. Per analogismum igitur quid iis expediat, de quibus a-
gimus, ex aliorum similitudine colligitur. Neque enim analogismus, *Galenus in libr. de O-*
ptima secta auctore, est nisi comparatio & perceptio causarum iuuantium per similitudi-
nes. Vt analogismo inuenire, non aliud sit, quam ex aliorum similitudine inuenire. Sic
profecto quum Gallicus morbus primum grassari cœpisset, & propria eius natura atque
vis, propter rei nouitatem, Medicis ignota, nec propria præſidia adhuc illis perspecta ef-
ſent, ea experiri, quæ morbis ex humorum corruptione ortis conueniunt, quibus hic
similimus eſſet, voluerunt, adeoque eius morbi remedia initio per aliorum affectuum
similitudinem, & analogismum inuenerunt. Coindicatio est, quæ simul aliquid cum
ea, quæ a rei natura ſumitur indicatione, indicat. Coindicant itaque vires, temperies
corporis, ætas, anni tempus, regio, consuetudo, & ſi qua ſunt id genus alia, Græcis *συμπε-*
κρίμενα, id est, coindicantia vocantur. Siquidem nō primo indicant remedia, sed quate-
nus cum morbo ſunt coniuncta. Non igitur per ſe, ſed cum morbo ſimul indicant, &
quasi modum & quantitatem demonſtrant, vt ex iis, quæ deinceps dicemus, pateſiet.
Contraindicatio est, qua impeditur fieri, quod ab indicante primo ſuggeritur. Et con-
traindicantia, vel, vt Græci nominant, *ἀντενδεικνύμενα* ſunt, quæ cōtrariam indicationem
habent. Verbi gratia, plethora ſeu humoris multitudo indicans eſt, quod eſſe vacuan-
dum oſtendit: virtus autem imbecilla contraindicans, vt quæ vacuationi repugnat &
reluctatur. Recte itaque quæ talia ſunt contraindicantia dicuntur, quippe horum indi-
cations

Indicatio
quid.

Indicatio
vnde dicta.

Indicatio-
ne inueni-
re.
Experien-
tia.

Analogif-
mus.

Coindica-
tio.
Coindicā-
tia.
συμπε-
κρίμενα.

Contrain-
dicatio.

A cationes primis indicationibus repugnant. Ceterum quum Galenus interdum scopum curationis, nonnunquam vero etiam indicationem curationis appeller, quæ natura & differentia indicationis & scopi sit, explicandum quoque nobis erit. Est itaque ^{Scopus} id quod sibi quisque proponit, seu quod cuique est propositum. Scopus igitur non est nisi propositum, quod primo intuemur, aut id quod nobis proponimus assequendum, vel quod nos ad agendum mouet, vel terminus in quem dirigitur actio. Proinde quod hor- ^{Propositū.} ratur medicum ut agat, scopus est, vel, ut Latini appellant, propositum, vulgus medico- rum intentionem nominat. In summa, scopus est id quod sibi Medicus assequendum proponit. Scopus igitur ab indicatione non nihil differt. Indicatio enim ratio agendi est, ^{Intentio.} siue ratio quæ quid agendum sit, insinuat. Scopus autem propositum in artificis mente ^{Scopus ab indicatio- ne quomo- do differt.} ad quod actio omnis dirigitur existit, quodque indicatio tandem consequitur. Proinde indicatio ex scopi contemplatione oritur. Tot igitur erunt indicationes, quot nacti erimus scopos, ut non multum referat indicationem curationis, an scopum dicas. Finis autem est terminus, in quo omnis acquiescit actio. Finis igitur medicinæ, ^{Finis.} ut in lib. de Sectis, Gal. testatur, est sanitatis possessio fruitioque: scopus autem sanitas. Proinde prima indicatio, quæ ex rei sanitatem perturbantis natura sumitur, quid agendum sit, ut scopum, id est, sanitatem, consequamur, ostendit. Hac vero consecuta, in ea, tanquam in fine, omnis acquiescit actio. Quid multis opus est verbis? Scopus est, quod primum sibi proponit Medicus, licet id perpetuo non assequatur. Finis autem est, id in quo omnis actio Medici acquiescit, sanitatis nimirum adeptio.

C Tres esse Rationalis curationis indicationes simplices, & quibus uniuersalis metho- ^{Cap. II.} dus constat.

Q Vum triplex sit omnium morborum curatio, empirica scilicet: quæ experientia con- ^{Triplex o-} stat, & imperfecta est: methodica, quæ communicatibus perficitur, adeoque manca ^{mniū mor-} & impossibilis est: & rationalis, quæ ex indicationibus e natura rei sumtis petitur, atque ^{borum cu-} perfecta existit: duabus primis præteritis, de tertia tantum dicemus. Huius itaque in- ^{ratio.} dicationes simplices quidem tres sunt. Prima, quid agendum sit, insinuat. Altera, an id ^{Indicatio} quo tendimus sperari possit, docet. Tertia, remedia inuenit, quibus assequi possumus id ^{simplex pri-} q̃ prima postulat, & secunda docet. Prima itaq; indicatio a natura rei, quæ vel præter na- ^{ma.} turam est, vel secundum naturam, sumit. Præter naturam vero res sunt tres, causa, morbus, & symptoma. Secundum naturam duæ præcipue existunt, temperamentum tam conge- nitum, q̃ visu partum, & virtus, q̃ aduersus morbum certat. Atq; hæ duæ res sui custodiam, ut priores tres sui ablationem indicat, causa quidem præcautione, morbus & symptoma curatione. Secunda indicatio, quæ insinuat an id q̃ prima docuit sperari possit necne, ^{Secunda.} cuiusque particulæ substantiâ, actione, usum siue officium, & situm æstimat. Substantiam, ^{Substantia} quatenus scilicet æqualiter, vel inæqualiter intemperata. Quæ n. æqualiter intemperata est, hæc non, aut certe vix posse præstari q̃ speratur, insinuat. Quæ vero inæqualiter, hæc posse præstari quod speratur, indicat. Item substantiam quoq; æstimat quatenus est so- lida, carnosa, aut spiritalis. Solida enim, si sit insigniter læsa, sanitas restitui nequit, præ- fertim si nervosa fuerit. Hinc est q̃ nervosa septi trāsuerſi pars, intestina tenuia, ventri- ^{Actio par-} culus, præputium, tenuis buccarum pars scopum quem indicant non recipiant. Ceterum ^{tium.} actio, per quā vitam habemus, si perierit, aut vehementer læsa fuerit, restitui non posse indicat. Actio autem siue qua vitam habemus, si perierit aut vehemēter læsa fuerit, itidem q̃ restitui non possit, monstrat. Ut vox adempta vitam non tollit, tamē prorsus amissa restitui haud potest. Actio, per quam meliorem vitam habemus, si perierit, aut vehemēter læsa fuerit, quamuis præstari posse q̃ speramus insinuat, tamen noxam maiorem futuram suc- cessu temporis pollicetur: ut excisi testes vitam non tollunt, deteriore tamē reddunt. Vfus & officium partis ad vitam necessaria si perierint, non posse præstari id q̃ speramus, ^{Vfus & offi-} monstrant. Si non necessaria perierint, potest præstari id q̃ speras. Situs partium ad quas ^{cium.} remedia peruenire nequeunt, præstari id quod speramus non posse indicat. Earum vero ^{Situs.} ad quas remedia peruenire possunt, præstari posse quod speramus, monstrat. Præterea, an perficere liceat id quod indicatio a rei natura petita, etiā ex natura ipsa siue tempe- ramento, magnitudine, more, ac duratione morbi, ut omnibus liquet, intelligi potest. Tertia indicatio inueniēs remedia quibus assequi possumus quod prima indicat, & se- ^{Tertia in-} cunda sperat, latissime patet, & omnium longe difficillima est, q̃ scilicet remedia quibus ^{dicatio.}

Medicina morbus abigitur, ostendat. Omnia vero remedia, imo tota medicina in quatuor rebus **A**
tota adeo- versatur: ad mouendis, educendis, faciendis, & extrinsecus incidentibus. Ad mouendo-
que reme- rum nomine intelligitur cibus, potus, & si quid medicamentorū intra sumitur. Facien-
dia omnia dorum vero, frictio, ambulatio, vectio, equitatio, denique motus. Quod si non quouis
in 4. ve: fa- motus exercitatio est, sed solū qui valēior, adiciatur motui exercitatio, vt sint facien-
tur. da tum motus, tum exercitatio. Referuntur ad hūc ordinem somnus, vigilia, & Venus.
Ad mouen- Educendorum nomine inaudiuntur omnia corporis excrementa, tam ea quæ in ven-
dis. triculo, quam ea quæ in iecore, arteriis & venis, & quæ in singulis corporis partibus cō-
Faciendis. tinentur: in summa, quicquid præter naturā in corpore continetur. Foris incidentium
Educendis. e genere primus est ambiens aer, deinde quæcunq; lauantium vngentiumue cuti pro-
Foris inci- pinquant: vt sunt aquæ sponte natæ & calētes, item omnia quæ extrinsecus illita corpus **B**
**dentibus. ingrediuntur. His itaq; remediorū quatuor generibus, quicquid ad morbi curationem
 adhibetur, complectitur. Principio namq; vt singulis morbis conueniens victus ratio
 adhibeatur oportet. Nisi enim cibis & potionibus, quæ morbi ratio exigit æger vtatur,
 nulla sanitatis consequēda spes erit. Dein aut motu, aut quiete, prout morbus postulat,
 ægrum vti oportet. Somno præterea, vigiliisue pro morbi diuersitate ægro vtendū erit.
 Medicamentis insuper vel alterantibus, incidentibus, vacuantibus, constringentibus,
 prout morbus exigit, vti oportet. Excrementa quoque corporis, quouis tempore expur-
 ganda erunt. Aere quoque conuenienti, balneis, & vnguentis pro morbi ratione vtien-
 dum erit. Quatuor igitur iam dictis, omnes res a iunioribus dictæ nō naturales cōple-
 ctuntur: quibus quum non solum corpus a morbo vindicetur, verum etiam ne in vllum **C**
 morbum incidat prohibeatur, rectissime a nobis dictū est, vniuersam artem in ipsis ver-
 sari: vniuersa enim medicina digeritur in eam quæ incolume corpus conseruat, & in
 eam quæ morbos demolitur. Porro quum iam abunde satis quæ sint primæ & simplices
 rationalis curationis morborum indicationes, indicauerimus: reliquum est, vt quibus
 rebus vniuersalis methodus constet, explicemus. Constat autem vt Galenus *lib. 1. de Cu-*
ran. ratione ad Glauconem auctor est, ex recta remediorum adhibendorum ratione: quæ eo-
 rundem qualitate, quantitate, modo vtendi, & occasione, quæ omnium difficilima est,
 perficitur. Qualitas igit ab affectus specie sumitur. Si enim morbus est calidus, refrige-
 rare: si frigidus, calefacere: quemadmodū si siccus, humectare: si humidus, siccare eum
 oportet. Ad eundē modum de aliis qualitatibus q̄ ex primis nascuntur, sentiendū erit: **D**
 vt scilicet q̄ præter naturam emollita sunt, ea quæ indurāt rarefactis, quæ densant, & reli-
 quis pari modo adhibeantur, contraria curando contrariis. Non sufficit aut hęc tan-
 tum scire, sed quantitātē eorum quæ adhibētur præsidiorum, metiri oportet. Nā si quis
 nouerit, verbi gratia, refrigerandū esse, nec sciat quantū refrigerandum sit, falli eū circa
 curationem est necesse. Quotquot n. quantitatem ignorant, & maiorem q̄ conuenit
 præsidiorum copiam adhibent, hi in contrariam intemperie corpus imprudentes du-
 cunt. Sin prædiis imperfectius vtunt, excessum nō tollunt. Quantitatē aut definiunt
 magnitudo affectus, propria corporis aut particulæ natura, viriū robur, & partis labo-
 rantis conditio. Oportet etiā vt vtendi modum præsidiorū sciamus. Verbi causa, ven-
 triculo laborante cognoscendū erit quomodo præsidia sint adhibēda: intrinsecus scilicet **E**
 an extrinsecus. Sæpenumero n. ventriculus ita est cōparatus, vt nullū intus adhibitum
 medicamentū sustineat, & admittat. Tum n. bene cum ægrotante agitur, si extrinsecus
 remedia adhibeantur. Pari ratione in dysenterię curatione, si vlcus est in tenuib. inte-
 stinis, per præsidia quę superius ingerunt, curationem molimur: vbi in crassiorib. est, iis
 quæ per inferna iniiciūtur vtimur. Ceterū vtēdi modum ostēdunt humoris natura, via
 per quam educitur humor ipse, locus cui medicamenta adhibent, medicamenti vehe-
 mentia, & morbi cōditio, quorum omnium, vt etiā prædictorum, exempla particularis
 curandi ratio suppeditat. Verum præ omnib. iis occasio, id est, temporis pars, quæ in se
 reialicuius idoneam faciendi aut non faciendi oportunitatē habet, q̄ momentanea sit,
 sicuti in Aphor. Hipp. pronūtiavit, cognitu necessaria est. Quum enim semper fluant **F**
 nostra corpora, & variis subinde modis se habeant: præsidia etiam in ipsis diuersa esse, &
 alia singulis occasionibus necesse est: Verū quū de occasione in enarratione iam citati
 loci Hipp. multa diximus, nō est cur hic longiores nos esse oporteat. Quū ergo quatuor
 sint in vniuersum, quib. vniuersalis methodus subfiguratur: duo ex iis quidē communia
 sunt,**

A sunt, tum idiotis etiam cognitu facilia, modus scilicet vtēdi, & qualitas. Quis enim nescit calidum refrigerandum esse, & frigidum calefaciendum. Quin & vtendi modus, quamuis difficilior percipitur quā qualitas, tamen non omnino captu difficilis est. Reliqua duo tum propria medicorum, tum difficilia sunt: quantitas nimirum, & occasio. Nec affectum illum præter naturā amoliri poterit, qui hæc quatuoriam dicta neglexerit: q̄ scil. per ea necessarium sit fieri curationem, neq; sanatio sine iis perfici possit.

Contrarietas indicatio curationum maxime generalis est. CAP. III.

Communis curationis indicatio, *Gal. lib. 9. de Med. meth. auctore*, est contrarietas. Hæc enim qua ratione & affectibus sit medendum, & ad symmetriam sanitatisq; mediocritatem perueniendum, indicat. Nam cum perspicuum sit omnibus, sanationem non esse aliud quam præsentis in corpore vitiosi affectus in naturalem habitū mutationem, atq; horum quidem vnum alteri esse contrarium: vt per contraria fiat eorum alterius in alterum translatio, est necesse. Si n. verbi gratia, calidior aliquis fuerit affectus, refrigerandus erit: si frigidior, calefaciendus. Pari modo, si quis ad siccius inclinatur, humidandus: si ad humidius, siccandus. Rursus quoq; is q̄ humidus & frigidus est, pariter siccandus & calefaciendus erit. Siccandus pariter & refrigerandus, qui humidior & calidior euadit, & in reliquis duabus coniugationib. ad portionē. Semper n. pro eo q̄ exsuperat, inducendum eo vsq; contrarium est, quoad particulam in symmetriam, & naturalem habitum vindicauerimus. Vt rectissime ab Hipp. dictum sit, hodieq; in Medicorū scholis

Contrarietas quid indicet. Sanatio quid.

Celebretur, contraria contrariorum esse remedia. Verum non satis est, scire, contraria contrariorum esse remedia, nisi in contrariis quoq; inueniatur modus. Neq; enim satis est calido affectui ad mouisse frigida, nisi id debita fiat mensura: quum alioqui metus sit, si intra modum id fiat, ne morbi reliquū quippiam relinquatur: si modus excedatur, contrarium genus morbi inducatur. Quippe qui calidum morbum supra quam par est refrigerat, is sanitatis mediocritate transgressa, alium excitabit morbum, qui sit frigidus.

Contraria contrariorum remedia.

Ceterum contrarietas non tantum indicat, qua ratione morbis & affectibus præter naturam sit medendum, & ad symmetriam perueniendum: sed quum generalis & communis sit, ad alia quoq; referatur oportet. Est itaque contrarietas communis tum morbo, tum temperamento, tum aeri ambiēti indicatio. Morbus namq; vt comprehensum est, q̄

Contrarietas communis tum morbo, tum temperamento, tum aeri ambiēti indicatio. Morbus. Temperamentum.

D sibi contraria sunt adhibenda esse indicat, aut sui ablationem per contraria esse molendam insinuat. Morbus igitur præcipue curationē, quæ per contraria fit, indicat. Temperamentum autem laborantis, vna cum morbo contrarietatis mensurā definit, adeoq; contrarium eo vsq; esse adhibendum in morbi curatione indicat, donec ad symmetriam & sanitatis mediocritatē sit peruentum. Ambiens vero aer vna quoq; cum ipso morbo indicat se vel esse vtendū, vel amoliendū. Si enim cōtrarius est morbo, se esse vtendum, quod ad morbi abolitionem conferat, indicat: adeoq; contrarietatis nomine, quæ non

Contrarietas quid.

est nisi id q̄ contrarium morbo adhibendū esse indicat, rectissime complectit̄. Si vero similis est, morbum potius augeat, & non præsidii, seu causæ sanantis, sed potius morbificæ rationem habet, nec contrarietatis nomine comprehenditur. Atq; in hanc quidem

E sententiam, contrarietatem Galenus communem & generalem curandi indicationem esse docuit. Verum hic obgannunt quidam Galeno, contrarietatem ipsam nec indicare, nec indicationem aliquam esse dicētes: modo verum sit, quod ille *initio 3. lib. Medendi methodi* scribit, absurdum esse, aliud constituere quod curationem indicet, aliud vero quod curetur. Nihil autem indicare poterit eorum quæ ad curationem pertinent ipsa contrarietas, quod morbus non sit: & plane ridiculū erit, si contrarietatem curari dicamus. Et certe tantum abest, inquiunt illi, vt curationem indicet contrarietas, vt nihil aliud quicquam indicare possit. Nam si indicare est inuenire, quod iuuat, aut lædat ea quæ indicant: quid quæso ipsa indicare poterit contrarietas? Qua enim re opus habet vt iuuetur, vel lædatur? In hunc sane modum Galeni de contrarietate communi

Galenus ab iniuria quorundam vinctus dicitur.

Indicare quid.

F curandi indicatione præcepta illi conuellere conantur. Sed mehercule quum ita rationantur, non nisi fucum faciunt lectori, q̄ scil. contrarietate secus atq; Gale. vsurpent, adeoq; non nisi λογισμῶν hic & multis aliis in locis instituant. Quippe cōtrarietatis nomine ipsi intelligunt id q̄ morbo est contrarium, adeoq; indicatur. Gal. contra appellat contrarietatem id, quod contrarium indicare potest, quemadmodū paulo ante est

Contrarietas quid.

Morbus
est contrarietas.

Tempe-
ramentū.
Aer ambi-
ens.
Similitu-
do quid.

dictū. In hac itaq; significatione morbus erit cōtrarietas, propterea q; contrariū indicat, A vel quia curandi rationem per contraria præscribit. Atq; in hūc sensum recte dicitur curari contrarietas, id est, morbus. Recte etiam indicare, id quod iuuat, vel lædit. Contrarietas quoq; temperamentum laborantis erit, quia cōtrarii, quo morbus curatur, mensuram indicat. Contrarietas etiam hac ratione aer ambiens erit, quia contrariū se morbo esse indicat. Proinde communis sit cōtrarietas, tum morbo, tum temperamento, & aeri ambiendi oportet. Vt igitur hæc tria contrarietatis nomine accipiuntur, quod contraria affectui præter naturam esse adhibenda ostendunt: ita similitudinis nomine complecti possunt consuetudo, ætas, natura, regio, anni tempus, & status cœli, vbi temperata sunt, eo quod similia semper præsidia indicent, siue valeant homines, siue ægrotent. Sed de contrarietate abunde satis. Nunc vt ad particulares indicationes propius accedamus, ordinis ratio postulat.

Tria esse in vniuersum, circa quæ omnis medendi opera versari debet. CAP. IV.

Natura.

6. Epide-
sect. 5. aph.
1.

Subiectū.

Morbus.

Morbi
tria gene-
ra.

Fluxionū
diuersitas.

PRiusequam ad indicationum particularem tractationem accedamus, sciendum erit, tria esse in vniuersum, circa quæ omnis eius, qui medetur, opera versatur, & in quæ perpetuo fixis oculis intueri debet: morb⁹ nimirū, subiectum & natura. Morbus autem profligandus, subiecto sanitas inducenda, natura tutanda iuuandaq; erit. Depellitur aut morbus contrariis, iuxta tritum hoc Medicorum axioma: Contraria cōtrariis curantur. Sanitas similibus conseruatur. Hæc tamen frustra tentabit Medicus, si natura ipsa non adiuerit, atq; cum primis officia sua exercuerit. Vt præclare & sapienter Hippocrates dixerit: τῶν νόσων ὅσους ἰνέει, ὅσους δὲ ὑπεγένηται ἰνέει, *Morborum Medici natura sunt, natura autem minister Medicus* Natura itaq; est, quæ in corporibus nostris omnium functionum auctor existit. Quapropter vt sciat Medicus quid, quando, quantumq; agere conueniat, ad naturam illi respiciendū erit. Tantum enim a Medico eodemq; modo agendum est, quantum quoq; modo a natura agitur. Si enim naturam fortiter morbo reluctari cernit, reluctandum quoq; vbi videbitur, illi erit: eoq; nitendum quo natura fert, & victoriæ spes erit, tantumq; alterationi, vacuationi, alteriue alicui motioni mutationiq; indulgendū, quantum natura probe perficere possit. At si naturam miseris modis afflictā ac morbo pressam, nullo conatu se mouere conspiciat Medicus, nec illi mouendū quicquam erit: præterquam n. quod operam luderet, subiret quoq; speciē eius vt occisi, quē fors ipsius interemit. Quocirca naturā semper ob oculos, quoties mederi cōsiliū est, habeat oportet Medicus. Post naturā ē subiecti, hoc est, humani corporis ratio habenda est, q; id non eiusdem semper, sed diuersissimi sit temperamenti, quod variis animi motibus perturbetur, varios mores, cōsuetudines, atq; vitæ instituta habeat: quod varias item regiones sortitū sit, ac pro variis anni temporib. cœli, soliq; diuersitate, varie affectū alteratumq; sentit: cuius membra laborantia quandoq; ea sunt, quæ in abdito ac profundo sui, quandoq; ea, quæ in summo posita sunt. Nec minus affectus, pro causæ maioris minorisue ratione, plus minusue a sani eius temperamento recedunt. Quapropter non omnibus eodem modo, ne si eodem morbo laborauerint quidem, eodemq; gradu a temperamento recesserint, medendum est: quanto magis, si modo graduq; morbi variauerint, varianda medicina est. Nec cum varii locorum laborantium, vt dixi, positi sint, eidem semper loco remedia applicanda: sed pro circumstantiarum affectusq; ratione variis modis, variisque locis & occurrendum & admouendum præsidium. De morbo, qui inter ea, quæ semper præ oculis habenda admonuimus, tertium occupat locum, cuius naturæ, quarumq; partium sit, considerandum. Est enim affectus præter naturam, vt suo loco plenissime monstrauius, a quo primum viriatur actio: ideoq; vt illa restituatur, quoad eius fieri potest, citissime e corpore profligandus. Eius autem tria sunt genera: id quod suo quoq; loco ostensum est: intemperies, mala compositio, & solutio continuitatis. Igitur intemperies, siue simplex, siue composita, si sicca fuerit, contrariæ qualitatis modis atque rebus pro ratione curanda venit. Pro ratione dico, quod simplex sicca, quæ duobus gradibus, verbi gratia, a naturæ modo recesserit, duum medicamentum contrariæ qualitatis simplicis retundenda est: composita duarum qualitatum ex aduerso respondentium præsidio restringēda. Vt si cui decem quidem numeris a naturali constitutione calor auctus fuerit, septem vero siccitas: ex salubribus causis aliquid, quod decem numeris frigiditate, & septem humiditate par sit, adhibendum erit. Sin cum affluxu materiæ, videndum est, sanguisne sit, quod affluit, an pituita, flaua

A bilis, an atra: fluxeritne tenue, crassum; mordax, putridum, flatulētum, an tenax? deniq; num redundantia tanta sit, vt aut vasa distendat, aut virtute grauet? cōsiderandum præterea, num ad partem imbecilliorē aut copia sui, aut facultate membri mandantis, & exonerantis se, nec copiam, nec qualitātē molestā ferētis vi, aut parte laborante prolectante atq; ad se trahente humor defluere cogatur? Vbi iam ex signorum indicis humorem elicietis, exempli causa, bilem esse qualitate tenuem atq; fluidam: reliquū est, vt membri recipientis & mādantis naturam æstimes, sitne extra, an intus positum. Si intus, primum cuius substantiæ sit, disquire, laxæne, vt pulmo: an solidæ, vt membrana, os, neruus, caue, vt renes, vesica, an secus, vt neruus, cartilago, copiosi sanguinis, vt iecur, an exigui, vt intestina, vesica, multorū vasorū, vt iecur: an paucorū, vt vesica: aut nullorū,

Partium corporis diuersitas.

B vt neruus. Dein, cuius actionis, largientisne aliis, vt ceret rū, cor, iecur, vētricus: an accipientis, vt intestina pleniora, vesica, caro, cutis: nobilissime, vt cor, iecur, cerebrum: an ignobilis, vt cutis. Postremo cuius situs, vt in summone fluitet, an in imo residat: mēbro ne aut ignobili adhæreat? Quæ omnia vt in membro fluxum excipiente ac mandante, ita in quauis laborante parte peruestiganda sunt, si curandi indicationes recte inuenire cupias. His cognitis, cum fluxio nulla sit, quæ non aut per vasa, aut meatus atq; vias quædam, quæ materiam fluentem acceptā alio transmittant, fiat: sintne ex ample, an angustæ, rectæ an obliquæ, venæ, an arteriæ, an nerui, vastæ cauitates, an exigua foramina, peruidendum. Etenim pro horum varietate, medēdi indicium variatur. Ergo vbi mor-

Profligandum ut morbus qui non ostendat an gerendum ut.

C tum, quo modo, tempore, & loco. Sed priusquam hæc ordine exponamus, an agendū sit, prauis ante ostendemus. Sæpe enim vsu venit, vt tū vel maxime agendum videatur, quum tamen citra graue periculum agere non conceditur, ac proinde ne agendum quidem. An igitur agendum sit, natura formaq; naturalis ægri indicium facit. Nam si natura facultatib; instrumentisq; suis integra & illæsa fuerit, si attrahere, retinere, conficere, expellere, assimilare, ceteraq; vitæ munia obire valeat: nulla in re de natura sollicitus, ad medendum recta progreditor. At si natura laborat, & fracta fuerit: non tñ deplorat: primaria ratio cura; naturæ succurrendæ esto, sine qua ne agere quidem omnino licet. Tantum n. agendum, quantum viribus concessum est. Ad hunc modum an agendum sit, vbi æstutus fueris, proximum est, vt quid, quantum, quo modo, loco, & tempore agendum sit,

D inuestiges. Ad quam rem indicationes particulares, quæ indicia quædam sunt omnia recte exsequendi, & veluti statar mercuriales ad scopum omnia dirigendi, plurimum faciunt. Hæ autem ex his fere locis sumi consueuerunt, natura morbi, temperamento, ægri viribus, consuetudine, vitæ proposito, regione, anni tempore, ætate, cœli constitutione atq; loci laborantis natura. Quam rursus deducimus in réperaturam, substantiam, functionem, dignitatem, sensum, positum, situm, & figuram. De quibus ordine, breuiter tamen, differemus.

Indicationes particulares quæ, & quor.

Morbi natura, & temperamentum quid indicent. CAP. V.

H Atenus generatim, quomodo curandi indicationes inueniendæ sint, ostendimus: nunc particulares excutiemus, orsi ab ea, quæ a morbi natura sumitur. Hæc n. quid agendum sit in curatione, indicat. Quippe cum morbus sit ex eorum numero, quæ præter naturam sunt, se pellendum esse ostendit. Nihil vero pellitur, nisi p contrariā: igitur morbus, qui calidus est, frigidis medicamentis: frigidus contra calidis se pellendū esse indicat. Idē sane de altera oppositione intelligendū erit. Pari ratione si ex humorū redundantia natus est morbus, vacuatione se demolendū esse ostendit: si ex eorundē defectu excitatus est, refectione esse opus indicat. In summa morbus perpetuo contrariis se esse oppugandum insinuat. Non tñ satis est id scire, contraria contrariis pelli, nisi et ad quem modum, quantitatemq; ea adhibenda sint, perpulchre nouerimus. Nihil n. iuuat, morbis calidis frigida ad mouisse, nisi conuenienti aptoq; pro re nata, modo id faciamus. Etenim si infra modū ea adhibeamus, periculū est, ne remaneant morbi reliquæ

Morbi natura quid indicet.

Modus & quantitas contrariorum noscenda.

F quædā: sin vltra, ne nouū morbi genū priori contrariū importune inducamus. Nā qui morbum calidum nimiam refr. gerat, q; sanam symmetriam & commodationem cecedit, morbum frigidū gignit. Quod ne fiat, corporis, q; morbo laborat, naturam probe caillere vel in primis oportet: vt cognito quantum a vera symmetria morbus declinat, medicamento q; refrigerando erit, modum cōstituas. Sed fieri nequit, vt recessus decli-

Corporis laborantis natura cognoscenda.

clinationem inueniamus, ignorato ad quem vsq; modum, quum sanum eſſet, corpus calidum frigidum, humidum, vel ſiccum fuerat: quantumq; iam in morbo coſtitutum, ab eodem in ſe ſano variauerit. Quo cognito, expedita eſt curatio. Nam ſi morbus a naturali corporis habitu longe abſceſſit, validis intenſiſque contrariis indiget: q; non ita multum, imbecillis remiſſioribuſq; quippe catenus redeat ad naturam eorum quodq; neceſſe eſt, quatenus a natura reſceſſit: ac veluti quadam via retro feratur, quæ in diuerſum agat ei, quæ facta eſt in ipſo, tranſmutationi. Multum aut reſceſſit a corporis partiſq; eiufdem ſymmetria morbus frigidus in corpore parteq; calidis: contra calidus in frigidis: minus calidus morbus in corpore ac partiſq; calidis, aut frigidus in frigidis. Quæcunq; igitur calidiores natura partes ex frigore laborant, hæ & liberalius & diutius caleſceri poſtulant: ſicut etiã quæ frigidiores natura ſunt, ſi ex calore laborent, refrigerari: & ſicciores, ſi ex humiditate male habeant, ſiccari. Ad eundem modum, & humectari, quæ humidiora naturaliter ſunt, vbi ex ſiccitate laborant, tum vberius, tum diutius poſtulant. Contra vero, pars quæ calidior natura eſt, ſi calido morbo ægrotat, exigua breuiſque temporis refrigeratione eget: ſicuti quæ frigidior eſt, calefactione. Ad quẽ modum in humidis quoq; & ſiccis ſe habet. Siquidem brevis eſt eiufmodi, in id quod præter naturam eſt, lapſus: & ruruſ, in id quod ſecundum naturam, reditus. Vt rectiſſime dixerit Hipp. *In morbis minus periclitantur, quicunq; cognato nature ſua morbo laborant.* Ergo ſi morbus intemperies fuerit calida & ſicca, nuda ſeu ſine materie affluxu, frigidis & humidis pro ratione obſiſtendũ. Sin cum affluxu, & illa quidẽ ex redundantia, vacuatione leuandum. Nam quicunq; morbi, *vt Hipp. dixit:* ex redundantia ſiunt, eos vacuatione ſanat. Si vero ex cõpoſitione vitiũ ſit, idq; ex obſtructione, extergētibus, & obſtructionem demolientibus medicamentis curandum. Sin ex aſperitate, lenientibus: ſi ex magnitudine, minuentibus morbo obuiandum. Si autem in ſolutione continuitatis, & ea quidem ex diſſectione ſit, vnione & conſolidatione ſubueniendum. Quam ſi quid, vt affluxus, vel humor aliquis redundans impediuerit, q; affluxum eſt, vacuandum: humor autem iis, quæ ſiccandi poteſtatem habent, abſumendus. Atque hætenus, quomodo priores duæ indicationes, quæ a morbo & temperamento peruntur, ſint tractandæ, expoſuiſmus.

Vires quid indicent. C A P. VI.

Indicatio a viribus petita, omniũ prima. Vires etiam paulo ante inter ea, quæ indicat, commemorauimus. Siquidem hæ non ſolum ſuam conſeruationem, verum etiam *quid, quantum, quomodo agendũ*, ſed etiam, *an omnino ſit agendum*, monſtrat. Quapropter prima omnium eſt, quæ a viribus ſumitur indicatio, non ita tamen prima, vt quæ curationem doceat: cũ ex numero curatricium indicationum non ſit, verum vitalium. Nam neque vt valeamus, nec vt a morbis liberemur, ab ea quicquã primum ſumimus, ſed vt viuamus. Maxima igitur dignitas ipſarum eſt virium, quando viuere ipſum nobis ex harum cuſtodia conſtet. At vita ipſa nihil eſſe prius in corpore poteſt, propterea quod nec ſanos eſſe citra vitam licet. Virtus ergo omnium prima cuſtodienda eſt hominibus, quando hæc morbo ceu aduerſatrix ſit oppoſita. Vires autem num omnino agendum ſit indicare, vnico argumento monſtraſſe ſatis ſit. In febribus namque continentibus primum omnium ſanguinẽ eſſe mittendum, in conſeſſo eſt apud omnes, & quidem vſque ad animi defectionem. Verum an ita omnino in iis febribus ſit agendum, vires maxime indicant. Validæ namq; ſi fuerint, audacter agat quod indicatur Medicus: ſi imbecilles, nequaquam. Quantum præterea ſit agendum, ægri vires indicabunt, ſiue rerum mole, ſiue gradu agas. Nam virtus quantum mole exhibendum ſit monſtrat, *an uncia, an drachma, vel cibi, vel medicamenti.* Sæpe enim copioſo cibo, multiſque medicamenti opus foret, niſi virium infirmitas reclamaret, niſi moli quantitatique demere præcepiſſent. Hinc nõ temere in aphoriſmis monet Hipp. *diligenter conſiderandum eſſe, quibus ſemel aut bis cibi ſit offerendus, & plurane an paucior a particularim ſint exhibenda.* Idem quoque in vacuationibus quantum vires ferre poſſint, perpetuo eſſe expendendum hortatur. Qua de cauſſa pro virtutis viriumq; ratione moderandus tum cibi, tum medicamentum eſt. Verbi gratia: ſi duobus gradibus calefaciendum ſit, ne virtus laborantis corporis ex tanta calefactione exſoluatur, ſeruato quidem contrarii gradu, medicamenti moles minuenda eſt. Item, ſi bilis libræ duæ ſcammonii ſcrupulo vno educendæ eſſent, viribus ægri id non ferentibus, bilis uncias

A vncias tantum sex, totidem scammonii granis recte eduxeris. Satius enim est, repetita vacuatione, ac minuatim agendo virtutem conseruare, quam semel & confertim eandem prostertere.

Consuetudo quid indicet. C A P. VII.

C Vm maxime a consuetudine petatur indicatio, non erit vlla ratione a Medico prætereunda. Quippe hæc victus medicamentorumq; inuentionem & in morbis, & in conualescentibus indicat. Gaudent enim naturæ consuetis semper: *vt & Hippocrates e-* Naturæ consuetis gaudent, aph. 18. & sequentibus.
videntissimis argumentis in libro de acutorum victu adstruxit: & in omnibus, qui se secundum naturam habent, manifeste apparet. Consuetudinis enim cum natura tanta est consensio, vt earum altera in alteram transeat. Quod enim consuetum est, id ipsum iam naturale euasit. Vt commodissime a veteribus dictum sit, consuetudinem acquisititiam esse naturam: hoc est, vim quandam & facultatem, non quidem ingenitam, sed vsu comparatam, quæ naturæ nostræ perinde est familiaris, vt ea ipsa esse videatur: nisi quod hæc ab externo principio, illa ab interno & ingenito manauit. Victus autem rationem ostendere consuetudinem, vnus Hippocrates satis monstrat: qui ea, quæ ex longo tempore consueta sunt, etsi deteriora sunt, insuetis minus molestare, scriptum reliquit. Consuetudo igitur, quum ægrotant homines, semper similia indicat. Siquidem consuetudo, tamen si praua est, tamen non est, nisi per summam sanitatem, & quum a negotiis maxime vacat, *vt fufius lib. 1. de tuenda sani. cap. 8. Galenus docet,* mutanda. Non parum etiam ad remediorum inuentionem, veluti quoq; ad sanitatem tuendam consuetudo conducit. Nemo enim est adeo stupidus, vt magnopere ex frigida potione læsus, hanc in diutinum duxisse vsum velit: propterea q, læsus interim atq; ægrotans ab ea desister. Quod si vero quis frigida potioni insueuerit, nec aliud, quo minus bibatur, obstitit, audacter illam febricitantibus Medicus exhibebit. Ergo sicut alia nō pauca quidam Medici præter communes notiones, ita illud quoq; effuderunt, quod nulla nec salubris inueniendi victus, nec ægrotorum curationis ex consuetudine sumatur occasio. Videtur enim non sicut alia quædam exiguam leuemq;, sed plane maximam, ac maxime principalem potestatem habere, vt quæ singulorum corporum naturam ostendat. Est enim ipsa consuetudo, altera, vt dicitur, natura. Præterea non parum momenti etiam in assumendis medicamentis consuetudo obtinet. Si enim æger medicamentis assueuerit, quiduis citra nauseam facile admittit. Sin minus, mille artibus agendum, mille fucis commendandum medicamentum est, ne alioqui æger Medicum aut oderit, aut fugiat. Sed de consuetudine, de qua antea quoque diximus, satis.

Ætas, regio, anni tempus, & cæli constitutio quid indicent. C A P. VIII.

Eodem autem modo & ea, quæ ab ætate præbetur, quo ea quæ a consuetudine sumitur, tractanda. Nam, cum ex iis sit quæ natura nobis insunt, similem sibi victum postulat. Quod Hippocrates in aphorismis iis innuere verbis voluit: *Humidus victus omnibus febricitantibus est idoneus, potissimum autem pueris, & aliis qui ita cibari sunt assueti.* Ipsa quoq; temperamenti interuentu indicationem præstat. Nam quæ calida est & humida, veluti puerorum, hæc promptius discutitur atq; exhalat: quo minus vacuantis præsidii eget, cum habeat ex seipsa vnde naturaliter vacuetur. Fit autem profecto & propter calidam siccamq; regionem, & tempus æstiuum ob constitutionem cæli impense calidum & siccum, notabilis per cutim vacuatio. Itaq; huius etiam causa, iis qui sanguinis detractione egent, aut prorsus non secamus, aut parum detrahimus. Pari ratione de aliis quoque vacuationibus sentiendum erit, vt horum occasione vel plane nullas, aut parce saltem adhibeamus. Verum cum ea de re in præcedentibus quoq; libris a nobis abunde dictum sit, non est, cur nunc longiores simus. Porro interdum necessarium est, vt si regio, anni tempus, constitutio cæli calida fiat, ita morbo postulante, frigidis: & contra si frigida, calidis demulceantur. Quod qua ratione possit consequi, supra aeris exemplo est ostensum, vt non sit opus nunc de iis copiosius differere: præsertim cum Galenus de

F iis omnibus copiosissime in *medendi ratione* scripserit.

Laborantis loci natura quid indicet. C A P. IX.

Laborantis loci natura quo modo agendum sit indicat: a sua temperatura, substantia, functionū nobilitate, sensu, positu, situ & figura. A temperatura: vt si calida & sicca naturaliter fuerit, earundemq; qualitatum aduentitiarum tantā accessionē habuerit, vt iam

Temperatura laborantis partibus.

a naturali temperamento diſceſſerit, hominemq; ægrum reddiderit, medicamenta tot gradib. frigida, humidaq; eſſe exhibēda, quot calorem ſiccitate m̄q; ſupra naturale temperamentum membri aucta eſſe coniectura erit: addita etiam re aliqua, quæ pro membri temperamento facit, ſecundumque ſit. Ita enim & medicamentum efficacius feliciuſque vires ſuas proferet, & a membro, quam ſi nullo prorsus ſecundo adiecto admo- ueretur, facilius admitteretur. Exempli cauſſa, vbi cor ſupra modum calefactum refrige- rare velis, non nihil calidi præſidii admisceto: vbi cerebrum calefacere, aliquid de frigi- do. Frigidum enim cerebro, calidum cordi ſecundum amicumq; eſt. A ſubſtantia: vt ſi durum ſolidumque membrum ſit, quo aditus penetratioque detur, medicamento ali- quid, quod tenuis ſubſtantia ſit, adiungemus. A functionum nobilitate: vt ſi pro corde aut ventriculo aut iecore medicamentum componas, quorum hæc concoctionis, nobi- liſſimæ ſane functionis, illud vero ſpiritus quo viuimus, & caloris, quo fouemur auctor eſt: memineris cordis medicamento ſemper odora, ventriculi & iecoris adſtringentia ad- iicere, etiam ſi morbus horum nihil poſtulauerit. Nam odores ad calorem innatum, ſpiritusq; vitales fouendum recreandumq;, adſtrictio ad continendum roborandum- que, adeoque concoquendum, maxime conducunt. Præcipue autem adſtringentibus vtendum eſt, vbi in iecur aut ventriculum ſuperuacuum profluit: quando & e primori- bus admodum hæ partes ſunt, & munus ſuum obeant, vel in iſſis morbis, eſt neceſſum. Non eſt autem exiguum eorum munus, qualeque eſt reliquarum partium, quibus illud modo negotium eſt, vt id quo nutriantur conficiant: verum quod tantopere animalis interſit, vt ſi neq; in ventriculo probe alimentum fuerit concoctum, nec in ſanguinem in iecore mutatum: vtique quod in fame nobis accidit, vt cibi penuria exigere in abſti- nentia cogamur, idem tum omnibus animalis partibus accidat. Non enim ex iis, quæ deuorant quis, ſed ex iis, quæ in iam dictis viſceribus confecerit, alimentum toti corpo- ri ſuppeditatur. Atq; ob hæc nimirum impenſius quam cetera membra, ventriculus & iecur adſtringentia deſiderant. Ergo quum ea, quæ iam infixæ ſunt, euocandi tempus eſt, tum quoque modice adſtringi poſtulant. Quod enim adſtrictionis in principio lon- gius iis, quam ceteris partibus adhibetur, id ſeruandum aſſidue eſt, nimirum manente, qui id indicet, vſu. Vſus vere eſt, vt diximus, nutrimenti confectio, quemadmodum fu- ſius *lib. 11. Ther. meth. cap. 15.* Galenus oſtendit. A ſenſu. Nam quæ acuti ſenſus pars eſt, eam quam maxime circa dolorem, initioribuſque curare tentandum. Quæ vero parum acri & obſuſo ſenſu eſt, hæc ſi affectus ita ſuadet, valentiora remedia recipit: quippe quæ faci- le ſentiunt partes, acria medicamenta non tolerant, ſicuti neque humores. Verbi gra- tia: quum acris humor in ventriculi ore continetur, ſæpius animi defectionem accerſit. Quod ſi mediocriter afficiatur, anxietate & nauſea premuntur: aliquando inſeſtū qui- dem humorem vomentes: aliquando vero fruſtra enitentes: quod in iis poſſimum af- fectibus accidit, quibus ventriculi os vitioſo imbuitur humore. Eodem vtique modo, quum in oculos eiufmodi humor inſluit, maximum affert dolorem, vlcerofaſq; puſtu- las, & curatu difficiles excitat. Quapropter neq; oculi acrium medicamentorum con- tactum, ob ſentiendi præſtantiam ſuſtinent, quemadmodum nec os ventriculi. Neque vero quod deſtrauet, ſi foris imponas, eiufmodi partes tolerant, minusque ventriculo o- culus, vtpote qui nonnunquam ab iis, quæ illinuntur, medicamentis moleſtatur. Partes vero, quæ hebetioris ſunt ſenſus, tum grauia cataplaſmata, tum mordentia medicamēta ferunt. Quid multa? omne medicamentum contemnunt, quæ tardi ſunt ſenſus, et- iam ſi non leuiter mordeant. At quæ acuti ſunt ſenſus, eorum vires dolore reſoluuntur. Expedi igitur has, nec confertim, nec ſemel valentibus remediis mederi ten- tes, ſed tuto potius in tempore. At vbi tardus eſt ſenſus, in iis etiam celeriter obire quod iuſtum eſt licet, ſemel vſis remedio, quod ſit idoneum. A poſitu indicatio eſt Medico quidem chirurgico, quo modo ligandum, incidendum, inurendum- ue ſit: medicamentario vero, quemadmodum, inungendum, fouendum, & medi- camentum exhibendum. Veluti vbi morbus membrum, quod alte poſitum eſt, occu- pat, quo id medicamenti, cetera tum re, tum qualitate pro morbi ratione confecti, viſ penetrare facile poſſit, deligenda ſunt ea, quæ tenuium partium ſunt: aut admiscendum eſt aliquid, quod ſubſtantia tenuitate, id quod craſſiuſculum eſt, in intimas partes de- ducat, vt pro eo eſſe poſſit, ac ſi tenuium partium eſſet. Nec minus indicio ſitus profun- dum,

Subſtan-
tia.
Functio-
num no-
bilitas.

Ventricu-
lus & ie-
cur impē-
ſius quam
cetera ad-
ſtringen-
tia deſide-
rant.
A ſenſu.

A poſitu.

Situs.

- A** duse est medicamento : ne eundo iustas vires amittat , tantum ex auxilio est adiungendum , quantum in itinere discessurum coniicimus . Quæ igitur in superficie constitutæ partes intemperie laborant , medicamēta efflagitant , qualia affectus ipse requirit . Quæ vero in imo latent , iis non , qualia nūc sunt medicamenta , adhibenda sunt , sed quæ affectui profutura sunt , dum ad eum peruenierint . Pari modo externis phlegmonib. abunde faciunt , quæ solū laxare possunt . Internæ vero , qualis est membranæ , quæ costas cingit , acriora desiderant . Lienis vero & iecoris , omniumq; peritonæi partiū phlegmones eadem ratione curantur . Pulmo autē omniū poscit vehementissima medicamēta . Considerare namq; oportet , quot numero partes permeat medicamentū , quod pulmones fertur . Primū quidē per os transit , deinde fauces , & stomachum , postea ventriculū ipsum ,
- B** & quædam ex graciliorib. intestinis , deinde ad mesenterii venas , post ad iecoris partiū simarum , a quib. ad gibbarum seu cōuexarum venas , ab iis vero ad cauā , post quā ad cor , tandem ad pulmones peruenit . A situ & figura partiū : vt si quas vias pars habeat , p quas in alia membra pertinētes , iisdem fluxu molesta esse possit , si in principes partes hæc du-
- C** eunt , intercludendę sunt , atq; ad ignobiles auertendę . Itidem si longa & præceps fuerit , vt gula : hic , si illam exulceratio exercet , nō semel , nec tota simul medicamēta adsumenda , sed sensim & assidue . Siquidē ex transitu & contactu exulcerationi , quæ hic est , vitiatas accedit , nō ex circumeundo , & diutius adhærendo , sicut huic , quæ est in ventriculo . Quinimo & quod crassiora hæc , & magis lenta sint adhibenda , id quoq; a positu figuræque indicatur . Nam quoniam gula , transitus quidem comestorum bibitorumq; est , idcirco remediōrū eget , quę adhærere , & vndiq; quasi concrescere & agglutinari possint , non aut quæ elui ac defluere sint prompta . Ac circa partes eius veluti concrescunt , quæ crassa sunt : agglutinantur , quæ lenta sunt . Quæ vero vlcera in crassis sunt intestinis , iis q̄ per sedem iniiciuntur remediis magis egent , quippe cui magis sunt propinqua . Quæ in tenuibus habentur , quoniam & longinquiora sunt , & medio situ posita , ambo requirūt , & quæ superne sumuntur , & quæ per sedem infunduntur . Iam ad vacuationes quoque non nihil figura & situs indicant , dum societatem laborantis particulę cum aliis docent . Nam nisi illud cōmpertum haberemus , quod cauo iecinoris subiicitur ventriculus & ieiunum , tum quod ieiuno ipsi tenue intestinum succedit , id vero colon excipit , ac colon quod appellant rectum : vtiq; inuenisse illud nō licuisset , quod iecur & per aluum , & per vomitum expurgari possit . Ceterum aptior est prior vacuatio , tanquam vsu iam callentibus intestinis iecoris superflua tolerare . Si igitur in crassiore intestino vitium fuerit , vt causam elidas , clysterem subter iniecisse prodest . Si vero in tenuiori , medicamēto ore assumpto : si in vetriculo , itidem , ac propterea vomitu : si in iecoris parte gibba , vel renib. vrinam mouēdo malum auferes : si in capite , vel per palatū , vel per nares , vel per vtrumq; si in thoracis spatiis latioribus , per fauces simul cum tussi . Quæ in vesica , per vrinam .
- D**

Contraria indicationes vt tractanda. CAP. X.

- Q** vando contrarię indicationes coeunt , diligentissime expendendum Medico erit , quæ magnitudine præstant , & quæ dignitate excellunt . Perpetuo namq; eligendæ ex indicationes erunt , quas digniora maioraq; indicantia præscribent . Magnitudo autē
- E** eorū bifariam æstimatur , nempe vel propriæ substantiæ ratione , vel declinationis a naturali habitu . Dignitas vero eorundem vel vitæ , vel sanitatis respectu . Nisi n. quis ita indicationum potestates examinet , nequeat sane victus mensuram , neq; alia ad curandi rationem inuenire . Verbi gratia : quum refrigerandum & humectandum esse febris perpetuo indicet , reliquorum si itidem cōcors indicatio est , nullum exhibetur negotium : vbi discors , pro pluribus ac potioribus formari victus ratio debebit . Siquidem ex eo , quod aliquis febricitat , communis refrigerantium & humectantiū indicatio præstatur , non tamen ex ceteris : sed cuius tum ætas , tum temperamentum vna cum cōsuetudine , tum regio , tum anni tempus , & cœli constitutio , humectantia refrigerantiaq; exhibēda indicant : hunc haud dubium est , nō solum humectandum refrigerandumq; esse , sed etiam nec leuiter hæc , nec vtrumque facienda esse : imo plane magnopere ac vehementer , omnibus scilicet indicationibus idem dicantibus . Cuius vero reliqua omnia refrigerantem quidem humectantemq; victum , quemadmodū febris , nō indicant , sed contrarium ipsi , calefacientem scilicet ac siccantem : vtiq; ambiguitas pugnaq; indicationum inter se oritur . Quo casu magnopere opus est , tum numerum indicationum , tum

A situ & figura partium.

Magnitudo bifariam æstimatur. Dignitas.

Exemplū.

magnitudinem simul conferat Medicus. Quippe quæ a febris sumitur, ea reliquis, quando omnes contrarium faciendum præscribunt, numero quidem inferior est magnitudine tamen, quæ ex dignitate, aut potestate, aut quomodocumq; appellasse libet, spectatur, utiq; superior est, potissimum si longe a natura recessit. Quippe duplex tum magnitudo illi accedit, & quæ ex febris genere provenit, quæ omnibus communis, & quæ propria, suaq; ipsius est. Siquidem & quia febris plus ceteris omnibus sollicitos nos habet: & quia præterquam quod febris est, etiam magnitudo illi notabilis accessit: idcirco contrarias indicationes inducit atq; obumbrat. Sin parua fuerit, fas est reliquas omnes una coniunctas cum ea conferri, atq; expendi. Ac si quidem pares videantur, neq; febris indicatio præferatur, sic ut humectandum & refrigerandum sit: neq; etiam reliquorum, sic ut calefaciendum ac siccandum sit: imo media victus ratio, ubi ita se corpus habet, eligenda erit. Sin altera indicatio exsuperet, tantum recessisse a temperato & medio victu par est, quantum ea, quæ pollent, sua contraria superant. Ergo tum exercitatum in iis omnibus, tum natura prudentem esse Medicum conveniet: quo cuiusq; indicationis potestate diligenter considerata, omnibusque inter se collatis, unam idonei victus summam, quæ laboranti sit commoda, comparet. Pari ratione, si accadat, ut cum viribus imbecillibus corruptela humorum incidat, statim duæ, & hæ quidem contrariæ oborientur indicationes. Una, quæ a corruptela petitur: altera, quæ a viribus sumitur. Prior esse vacuandum dicat, propterea quod quicquid corruptum est, id a natura alienum sit, adeoque se auferendum indicet. Quapropter affectus ipse vacuandum esse præcipit, idq; vel vena secta, vel purgatione. Posterior autem iis remediis, quæ affectus indicat non esse vitendum docet, quod cum virtutis custodia pugnent. Neutram enim duarum vacuationum imbecillæ vires ferent. Quapropter in eiusmodi indicationum repugnantis incerta, aut perplexa saltem est succurrendi ratio. Oportet autem, ubi indicationes ita aduersantur, & paulatim quod vitiosum est vacuare, & paulatim vicissim quod salubre est pro eo reponere. Nam hac ratione utrisque indicationibus satis fit, quod ita vires imbecillæ reficiantur, & quod corruptum est, citra noxam vacuetur. Atq; hinc perspicuum fit, magni quidem fieri indicationes summas tum a morbi natura, tum etiam viribus: sed multo pluris æstimari, quæ ab iis, quam quæ ab hoc ducuntur: neque id quidem temere. Morbi namq; dignitatem sanitate metimur, virium autem vita ipsa: qua nihil est, neque dignius, neque homini carius & antiquius. Quapropter quando accidit, ut indicationes inter se ex aduerso pugnent, committendum non est, ut dum alteri nimium sis intentus, alterius omnino obliuiscaris, sed utriusque memor, quoad licet utrunq; misceas. Sed de indicationibus satis.

Medendi præcepta unde discenda. CAP. XI.

CV M multos esse constet tum Græcorum, tum Arabum, Mauritanorumue, tum etiam recentiorum, qui de curandi ratione præcepta continentes Cómentarios post se reliquerunt, in illis certe delectus aliquis habendus erit, ne scil. deteriores pro optimis, ut fere fieri solet, arripiamus: adeoque ex iis ea, quæ ad ægri potius interitum quam salutem conferunt, præcepta hauriamus. Fuerunt ante paucos annos, & sunt hodie pro dolor, Medici haud exiguo numero complectendi, qui in eam dementia sunt prolapsi, ut sine Arabibus Mauritanisue, praxim frigidiuscule exerceri credant: & medendi præcepta ac rationem curandi morbos nullis aliis auctoribus, quam Arabibus, disci posse credant: nullis aliis adducti rationibus, quam quod illi rem hanc perspicue, & ordine sane optimo tradiderint. Quantum vero, qui ea in opinione versantur, cæcutiant, quamque nihil eorum, quæ vel Græci, vel quos ipsi vnice admirantur ac in oculis ferunt, Arabes scripserunt, intelligant, eruditi satis perspectum habent: omnibusque perspicuum euadet, si quæ illi blatterant, paulo diligentius examinent, & cur hoc aut illud inter medendum faciant, ab ipsis requirant. Nam tum eos vel piscibus magis mutos fore deprehendent: aut si quid dicent, consuetudinem saltem, aut experientiam, quam tamé nullam omnino habent, illis obtrudent. Quasi vero errantium multitudo, aut diuturna consuetudo, illorum errori patrocinari possit: aut statim audito experientiæ nomine, a nobis impetrarint, ut illis concedamus, quod se esse consecutos sibi falso persuaserunt. Quod si enim, quæ ad experientiam veram, quam perpetuo iactitant, requiruntur, Galeno didicissent, nihil minus quam experientiam sibi vendicare auderent. Quam parum

Aliud exemplum.

Corruptio lecuratio.

Medendi præcepta non ex Arabibus discenda.

- A** parum vero teneant ea quæ scripserunt Arabes, quorum se æmulos esse gloriantur, expedit cognoscere, si ut controuersos, qui in iis reperiuntur locos tibi explicent, ab ipsis postulaueris. Nam ibi senties eos plus, quam pueros fore, & non habituros, quod dicant, aut respondeant. Neque mirum, quod scilicet Arabes nunquam, vel per transennam tantum inspexerint: & quisque sibi ex recentioribus aliquem, cuius placita præ ceteris sequatur, delegerit. Et cum fontes suos, Arabum intelligo lacunas, non degustauerint: quid est, quod in iis enarrandis, eos præstare posse speres? Sed fac quosdam etiam abunde degustasse: quid aliud inde haurient, quam pestilentissima, & ægris certissimè afferentia exitium præcepta? Cum enim quem Principis nomine dignantur, infinitis erroribus refertum fateri cogantur: quid ex aliis, qui omnia sua ex illo ad verbum transcripserunt, haurire possint, quiuis coniciet. Refertum autem esse Auicennam multis & capitalibus plane erroribus nos alibi, & plerique etiam alii viri doctissimi satis demonstrarunt, ut non sit opus nunc illos nominatim per censere. Vnum saltem in præsentia, & hunc certe omnium maximum, ceteris adieciisse satis sit: quod ex vnico illo, quantum in reliquis ei fidendum sit, quiuis facile cognoscet, & inde qualis is scriptor sit, veluti leonem ex vnguibus æstimabit. Siquidem is *Fen. decima canonis quarti, tractat. 1. cap. 40.* vbi asthmatis curationem ex professo docet, Arsenicum ex aqua mellis in potu dandum esse manifeste præcipit. Nemo vero est e numero eorum qui vel leuiter medicinam degustarit, quem lateat, Arsenicum toto genere naturæ nostræ aduersari, adeoque præsentissimum esse venenum, ita ut ne halitus quidem, qui ex eo trito spirat, innoxius nobis sit. Quotidiana quoque experientia attestatur, perditos quosdam homines, tum sibi, tum aliis Arsenici vsu consciuisse mortem. Auicenna tamen iis nihil motus, illud bibendum in sanando asthmate esse hortatur: ut mirum sit, hunc carnificem, Medicorum paulo ante ab omnibus fere principem nominatum esse. Cum itaque principem eiusmodi habuerint Medici, quales fuisse putemus, qui sub eo stipendia facere voluerunt? Non alios certe, quam is fuit, quem hoc nomine dignati sunt, & cuius singula verba instar oraculorum habuerunt. Verum non ignoramus, quid pro hoc capitali errore tuendo allaturi sint eius patroni ac defensores. Nam quod alias solent, ita nunc quoque in interpretem culpam transferent: atque illum, locum hunc parum fideliter conuertisse causabuntur. Atqui quam belle illi principem suum excusent, & ab errore vindicent, eiusque auctoritatem asserant, si quibus scripta eius paulo melius quam illis patronis cognita sunt, norunt. Hi enim sciunt, quod Auicenna *cap. 49. canonis secundi*, vbi Arsenici facultates omnes percenset, idem quod locoriam producto doceat: nempe quod Arsenicum ex hydromelite siue aqua mulsa potum asthmaticis, tussientibus, sanguinemque exspuentibus conferat. Ut mirum sit, illum immemorem plane fuisse eius, quod in eodem capite paulo ante hæc verba dixerat: nimirum omnibus Arsenicis putrefaciendi, & erodendi vim inesse. Si itaque erodendi facultas inest, cur tussientibus, & sanguinem exspuentibus bibendum exhibet? Cur intra corpus, cum venenum sit præsentissimum, assumendum hortatur? Non est igitur cur in interpretem culpa transferri possit, ut qui vtrunque locum optima fide transtulerit. Atqui fidem in interprete hoc loco non posse desiderari, hinc omnibus perspicuum euadit, quod Mesue, qui & ipse Mauritanus, & Auicennæ similia fuit, in curatione asthmatis ad verbum, ut alia multa, hunc locum transcripserit: & perinde ac Auicenna, Arsenicum cum aqua mulsa, vel melle asthmaticis in potu exhibendum esse, non obscuris verbis hortatur. Quod si n. secus in Auicennæ codice scriptum fuisset, haud dubie Mesue non iis, quibus nunc legitur, sed aliis plane verbis in suos libros locum hunc retulisset. Ut meridiano sole clarius sit, interpreti non esse hunc errorem imputandum, sed ipsi potius Auicennæ: quæ quidam verissime dixit iugulare, non curare homines. Sed demus aduersariis, & veteris inscitæ propugnatoribus. Auicennæ aliorumque Arabum, Mauritanorumue scripta vacare erroribus, quod tamen in perpetuum non docebunt: nihilominus tamen illis commode ad faciendam medicinam uti haud possent, quod scilicet barbare, inepte, spurce, & fœde, quod metipso fatentur, atque hoc nomine errata omnia in interpretes transferunt in Latium translata sint: quodque nullis neruis, nullis demonstrationum legibus, sed puris nudisque verbis singula persequantur, ut quauis multa dicant, per pauca tamen doceant. Verum fac optime esse in Latina linguam conuersos Arabes: tamen prodigiosum hoc & horridum sermonis genus, quo illi vsi sunt, eiusmodi est, ut Latini sermonis proprietatem respuat, atque etiam si maxime adnitaris, tamen ut intelligas fieri non potest. Et si igitur optimum interpretem nacti fuerint, tamen is Arabismos

Auicennæ
imensus
error.

Obiectio
diluatur.

Arabum
prodigio-
sum & hor-
ridum ser-
monis ge-
nus.

nunquam recte Latina oratione exprimer. Cui rei fidem facit maximam Mahometi A
 Alcoranus: in quo tam prodigiosa & distorta est oratio, vt hunc legens non hominem,
 imo ne bouem quidem, sed Plutonem ipsum ex infernalibus tenebris boare, ac feralem
 edere vocem putes. Nec sane melior est Auicennæ oratio, sed immensa quoq; caligine,
 ac pene Cimmeriis tenebris inuoluta & obscurata. Quæ certe caussa est, vt eius senten-
 tia multis in locis vix accipi & intelligi possit, vt merito ingenia ad melius doctrinæ ge-
 nus assuefacta, isto obscuro ac monstroso plane sermone offensa, ab eius lectione resili-
 ant. Neq; mirum sane, hominem hūc præ ceteris etiam Mauritanis magis balbutire, &
 prodigiosa oratione vti: quū constet, illum (hoc n. qui ipsum vnice admiratur, & in deli-
 tiis habet, inter præcipuas eius laudes referunt) decimo ætatis suæ anno, sui Mahometi B
 Alcoranum memoria tenuisse vniuersum. Quid n. aliud sonaret, aut quo alio sermonis
 genere vteretur, q̃ ille, cuius lectione rãtopere est delectatus, vt hunc dignū æstimaret,
 cuius singula verba ita animo infixæ haberet, vt eorum obliuisci non posset? Cum igitur
 Arabes, & horum maxime principem Auicennam, neq; mentē, neq; linguā satis puram
 habuisse constet, (cōmuniter n. fit, vt cum erroribus, & phanaticis opinionibus coniun-
 cta sit orationis confusio, & deformitas) præstat certe hos prorsus non attingere, quam
 sine iudicio in eorundem lectione versari. Imo, si quid iudico, non est permittendum
 iis, qui artem medicam addiscunt, necdum sibi solidum ex optimorū auctorum lectio-
 ne pararunt iudicium, vt vel leuiter attingant Arabes: quod metuendum sit, ne errores
 quibus illorum scripta referta sunt, ita imbibant, animisq; suis infigant, vt posthac nulla
 ratione elui ac eximi possint. Tenaciter enim hærent, quæ rudibus annis hauriuntur: & C
 hæc ipsa magis pertinaciter hærent, quæ deteriora sunt. Vt n. odor quo recens testa se-
 mel imbuta est, elui non potest: ita ægerrime ea quæ a teneris, vt aiunt, vnguiculis auide
 didicimus, extirpantur. Nec melior est conditio barbarorū, & recentium Medicorū:
 vt qui sua omnia ex Arabib. transcripserint, adeoq; ab exquisita veterum docēdi & me-
 dendi ratione plurimū absint. Igitur præter summam barbariem, quæ lectori fastidium
 parit, & immensus est detestandorū errororū in eorundem scriptis aceruus, quæ illi ab
 Arabibus, perinde atq; infans ex matris mammis lac vitiosum, suxerunt: q̃ singula lecto-
 ri sermonis impuritatem fastidienti, & veritatem cōsectanti, parū iucunda, & inutilia pla-
 ne sunt. Quanquam & hoc hominum genus, propter rerū quarūdam inutiliū tractatio-
 nem lectori, præsertim rudi, magnas remoras obiciat. Cū itaq; res ita cōparata sit, præ- D
 stat vt reiectis plane & posthabitis Arabib. barbarisq; prioris ætatis scriptorib. ex Græco-
 rum Medicorū, qui syncere, pure, & exquisitissima methodo artē tradiderunt, scriptis,
 veluti limpidissimis fontibus, ea, q̃ ad medicinā faciendam necessaria sunt, discamus. Vt
 n. in Arabū doctrina, omnia sunt impura, barbara, scabra, intricata, foedissimisq; errorib.
 conspurcata: ita contra Græcorū omnia sunt pura, tersa, nitida, politaue, aperta, nullisq;
 erratis contaminata. Et vt in cōfesso est apud omnes, è fontib. potius quā lacunis esse bi-
 bendum: ita nulli dubium esse debet, e Græcis potius, quam Arabib. medicinę præcepta
 haurienda esse. Nihil n. habent Arabes, quod non vel ex veterib. vel posteriorib. Græcis
 descripserint, demptis tantum erroribus qui illis proprii sunt. Verum quod dicimus, ef- E
 se deprehendet, qui scripta Arabum cum Græcorum monumentis contulerit. Nam is
 comperiet, eos omnia e Græcis, etiam Galeno posteriorib. quos magis imitati sunt, cō-
 pilasse: vtpote qui casiam nigram, moschum, nucē vnguentariam, ambrā, caphurā, la-
 cham, Santala, & id genus alia veterib. indicta, longe verius & exquisitius quam Arabes
 descripserint: ita vt neq; horū medicamentorū cognoscendorum gratia, Arabum ope
 egeamus, cum abunde hæc ipsa Græci posteriores depinxerint. Quū vero aliorū Græ-
 corum Medicorū scripta omnia ceuriuuli quidā ex Galen. tanquā vberissimo fonte pro-
 manarint, ex hoc magis quam aliis præcepta de *tuenda ac restituenda sanitate* petēda erūt:
 vtpote in quo nihil est perplexū aut sophisticū, sed omnia aperta, cādida, & optima me-
 thodo tradita. Præ reliquis aut suis libris vnice ad recte curādos morbos cōducūt ii, quos
 de medendi ratione inscripsit: in quib. indicationes curandi perfectissime docuit. Nam F
 principio curandi rationē morbi simularium & instrumentaliū partium cōmunis, nem-
 pe vnionis solutæ, libris tertio, quarto, quinto, & sexto eius operis absolutissime tradi-
 dit. Dein eius qui in solis simularib. consistit, intemperici nimirum, medendi rationē in
 septimo, octauo, nono, decimō, & vndecimo, perspicue & copiose tractauit. quod si vero
 quis-

Barbari
ac recen-
tiores me-
dici.

Ex Gale-
no præce-
pta de tu-
enda & re-
stituenda
valerudi-
ne petēda.

A quispiam eorum quæ in iam dictis libris docet, compendium affectat: is primum, quem idem Galenus scripsit *de Curandiratione ad Glauconem*; diligenter legat. Quo vero pacto symptomatis sit prospiciendum, in duodecimo eius, quod de Medendi ratione edidit, libro monstrauit. Quæ denique ad tumorum præter naturam curationem cognitu necessaria sunt, ea omnia in decimotertio & decimoquarto eiusdem operis, & altero de *Curandiratione ad Glauconem*, exquisitissime ostendit. Et si autem non desint hodie qui hos libros calumniari ac sugillare audeant: tamen si quæ illi aduersus hanc methodum afferunt, diligenter expendas, nihil aliud quam quod ille in iis libris docuit, eos afferre deprehendes: nisi quod sophistica quædam admiscant, quibus illius ordinem; si diis placeat, lectori suspectum reddere conantur. Non solû vero Galenus curandi indicationes docere contentus fuit, sed etiam præsidia quibus morbi abiguntur, multis in libris monstrauit. Nam etsi obiter præsidia illa in medendi libris attigerit, plenissime tamen eadem in libris, quos de *Simplicium medicament. facultatibus*, & de *compositione medicamentorum tum generalium, tum localium* inscripsit, edocuit: ita ut nihil ab eo, quod ad hanc rem recte intelligendam facit, requirere possis. Galeno tamen si quis adiungat Paulû Actiû, Actuarium, & Alexandrum Trallianum, non est cur nobis reprehendendus veniat: cû in iis nonnulla, quæ illi ex Galeni libris, iniuria temporum amissis, transcripserunt, inueniet. Non est etiam contemnendus Nicolaus Myrepsus, quem nos Latio donauimus: Nam is multum ad componenda medicamenta momenti afferet. Iam dicendi finem faciam, quod vniuersæ Medicinæ capita quam potui breuissime & perspicue; quinque iis libris perstrinxerim, & aditum quædam, qui vnicus meus fuit scopus, ad recte legendam & cognoscendam veterum scripta parauerim.

Aduersus
Galenî ca-
lumniato-
res.

F I N I S.

LEONHARTI FVCHSII D E

Humanî corporis fabrica Epitomes Pars Prima.

LEONHARTVS FVCHSIVS CANDIDO
LECTORI S. P. D.

SEMPER optavi aliquam exstare Epitomen qua nobis partium corporis humani rationem ita explicaret, ut cuiusq; partis functionem & usum, ipsius quoq; situm, figuram, magnitudinem, colorem, substantia naturam, & ad ceteras partes connexum, breuiter & perspicue nobis ob oculos poneret, hocq; nomine in scholis Medicorum ad enarrandum recte proponi posset. Atq; ut id ardentius cuperem me in primis impulsit, quod hanc Medicina partem, qua tamen ad artis tractationem summe est necessaria, ab omnibus fere Germania nostra Medicis neglectam esse perspectum haberem.

Anatome
Germaniæ
Medicis co-
temta, & ne-
glecta.

Constat enim omnibus paucissimas hæcenus fuisse in Germania publicas scholas, ubi tamen præcipuum tenere locum debuisset, in quibus anatomes doctrina tradita sit. Cuius quidem rei nullam aliam fuisse causam arbitror; quâ quod tû pauci admodû, aut fere nulli fuerint in scholis illis professores, quos eius rei cura tetigerit, aut qui partes humani corporis, quod harum nullam plane cognitionem haberent, enarrare potuerint: aut certe quod idoneo scripto, quod suis auditoribus explicandum proponerent, fuerint destituti. Nam omnibus palam est ante paucos annos nullum in hoc genere scriptum, præter id quod Mondinus parauerat, exstitisse. Hoc enim etsi initio ab omnibus ambabatur, quod dicitur, manibus, maximoque plausu exceptum est, & dignum quod omnibus in scholis enarraretur iudicatum, tamen quum paulo post a nonnullis clarè sit deprehensum, illud non paucis erroribus esse refectum, nec ullam in eo velosum, vel muscutorum, itemque neruorum historiam haberi, sensim existimationem suam amisit, & despiciatû duci cæptum est. Nec quo minus id fieret, Carpus cauere potuit, qui proluxissimis commentariis illud Mondini scriptum illustrare conatus est. Nam tantum absuit, ut a contentu illud vindicaret, ut proluxitatis nomine plus odii & contemptus ei conciliaret, præsertim quum multa parum necessaria, & nihil ad institutum facientia admiscuisset, nec errorum rationes satis detexisset, sed hos potius ineri voluisset. Nec compendium suum, quod post commentarios hos suos edidit, propter eosdem admissos errores, in magno honore habitum est, sed a plerisque neglectum. Atque extra hos duos, Mondinum nimirum & Carpum, multis

Mondini
de anatomo-
me scriptû.

Carpi in
Mondinum
comentariis.

An e Gale- subinde annis inter Medicos nemo fere qui ex professo tractaret anatomen, repertus est. Quum au-
 tem ob causas iam expositas illorum scripta parum idonea ut publice in scholis explicarentur visa
 commode sint. Non ita multo post exorti sunt nonnulli qui dissectionem ex Galeno, ut qui omnium iudicio,
 peri possit inter eos qui tum exabant, optimus ac veluti anatomicorum xopuqat esset, potius discendam esse
 putarent.

Galenus a-
 tomica qui
 in Epitome
 redegerint.
 Anderna-
 cus
 Vuillichius

Ceterum quum is non uno in libro, sed sparsim in multis, idq. prolixè admodum, dissectionis ra-
 tionē tradiderit, nec illum qui in scholis ad enarrandum proponeretur satis aptum esse iudicauerunt.
 Quo nomine factum est, ut hunc in Epitomen plerique redigere conati sint. Atq. in eo prestando
 primus, quod sciam, Ioannes Guinterius Andernacus sudauit, nec sine diligentia laude. Et hunc
 suum laborem non parum commendat ordinis, quem secutus est, ratio satis concinna. Post hunc saxum
 hoc Iodocus Vuillichius voluere cepit, nec defuere complures alij, quos nominatim recensere nihil at-
 tinet, qui idem præstare sunt annexi. Verum quum nemo illorum integram humani corporis historiam
 sit complexus, & singula sua ad verbum fere ex Galeno omnes descripserint, parum attenti quid ho-
 mini, quid ceteris animantibus competere, vicumque breuitatis ac ordinis nomine laudem non
 mediocrem eorundem scripta mererentur, mihi certe ut in scholis ijs ad docendam hinc anatomen u-
 terer satis apta visa non sunt.

Vesalii de fa-
 brica hu-
 mani cor-
 poris com-
 mentarij.

Quapropter, ut ingenue dicam quod sentio, quum demptis Vesalii nostri de fabrica humani cor-
 poris commentarijs, plane doctis, & singulari industria elaboratis, nullum reperirem scriptum, quod
 mihi per omnia facis faceret, & quo commode ad docendam humani corporis historiam & dissectione-
 nem vi off. in, diu multumque cogitavi quid mihi faciendum esset, ut & hæc artis pars in Germa-
 nia scholis prorsus neglecta postliminio rediret, & passim publice in scholis etiam nostris doceretur.
 Videbam enim Vesalii de fabrica humani corporis libros esse prolixiores, & exquisitiores, quam ut ab
 omnibus intelli. & in scholis ad enarrandum, præsertim in ista paucitate professorum qui anatō-
 men callent, proponi possent. Epitomen autem, quam ille conscripsit, succinctiorem, quam ut ab ijs
 qui iam nominatos eiusdem libros non probe tenent, assequi queat. Ne itaque scholam nostram hæc
 commoditate recte discendi humani corporis historiam, & dissectionem perpetuo fraudarem, cepi
 ipse ex Galeni & Vesalii scriptis concinnare Epitomen, quam subinde aliquot annis auditoribus hæc
 excipientibus dictavi, ut leuem saltem aliquam inde anatomes consequerentur notitiam. Quum
 autem scribendi & excipientis provincia plerisque molesta esset, eamque agerrime sustinerent, ut qua
 concinnaram excudenda curarem maiorem in modum rogauerunt. Non potui itaque crebris horum
 efflagitationibus non concedere locum, sed qua mihi pro auditorio paraueram, in horum gratiam ty-
 pographo nostro imprimenda dedi, non quidem vniuersa, sed initio duos duntaxat primos libros,
 quorum unus ossium, alter vero musculorum historiam tradit. In secundo certe Vesalium per omnia
 sum secutus, ut qui solus inter omnes qui hactenus Anatomem scripserunt humani corporis muscu-
 los descripserit. Et ne calumniatores furci nos insimulare possent, passim in marginibus loca vnde
 quævis excerpimus nominatim indicauimus, & expressimus. Ut itaque æquus lector hos duos libros
 aquo & hilari animo suscipiat, oramus; daturi etiam paulo post, Deo annuente, reliquos. Et spe-
 ramus hoc saltem nomine futuros gratos, quod horum in scholis, saltem docendo, aliquis esse usus
 possit.

Vesalij
 vobis huma-
 ni corporis
 musculos
 descripsit.

Compendio-
 rum scri-
 bendorum
 ac legendo-
 rum ratio.

Nemo tamen velim existimet nos hanc Epitomen ideo exarasse, ut abiectis Vesalii commentarijs,
 ea tantum anatomes studiosis utendum esse censeam. Si enim hoc animo nostram hanc Epitomen,
 aliasque omnes quispiam excipere voluerit, sciat his nihil esse posse nocentius. Quando constat eos
 qui hac lege compendia sectantur, nunquam ad absolutam & perfectam rerum cognitionem perue-
 nire posse. Nam ijs duntaxat addicti, nihil præterea degustant, sed perpetuo in ijs herent, tanquam
 ad Caucasum alligati. Quare si hac compendiorum ratio esset, nihil ijs in omnibus sciendijs plus di-
 spendij afferre posset.

Vesalii laus
 eximia.

Sunt itaque alio plane nomine legenda Compendia, hoc nimirum, ut nobis adminiculo sint, & ad
 perfectam rerum consequendam cognitionem nobis quasi viam quandam struant, & ad maiora, ad-
 eoque ea in quibus omnia perfecte traduntur discenda nos veluti manuducant. Nec alia de caus-
 sa hanc nostram Epitomen concinnaui, quam ut lectori ad facilius intelligendos Vesalii com-
 mentarios viam aliquam pararent. Cuius anatomica tantum abest ut contemnenda putem, ut il-
 lum omnibus aliis, Galeno etiam ipsi præferam. Nihil enim dubito hunc diuinitus excitatum, ut
 hanc Medicinæ partem pene extinctam, & infinitis erroribus contaminatam in lucem renouaret
 illustraretque.

- A** *Quamquam enim Galenus non parum hanc partem iuuit, tamen constat illum simiarum & canū potius quam hominum texuisse historiam, id quod quivis deprehendet, si oculos in testes adhibere, & suis manibus sectionem exercere voluerit. Vesalius autem unus inter eos qui nostra atque descripserunt hominis fabricam exquisita diligentia, & concinno ordine descriptam literis mandavit. Et nisi huius commentarii exstarent, multarum partium humani corporis vera historia destitueretur. Ut mirari satis non queam quorundam insolentiam, qui huius viri conatibus tam perditè obstrere audent, eumque multis & mendacibus conuictis proscindere non verentur, lacerantque nullo alio nomine, quam quod Galeni anatomica parum quadrare humano corpori ostendit. Quin potius laudandum hoc eius in eruenda veritate studium erat, illique gratia agenda, quod in hac artis parte restauranda tantum sudare voluerit. Abstineamus itaque hortor omnes deinceps ab eiusmodi conuictis, & mutuas potius tradamus operas, ut artem nostram ab omnibus erroribus repurgemus, efficiamusque hac ratione ut pristinum tandem nitorem illi restituamus. Quo sane instituto longe maiorem gloriam consequemur, quam si conuictis mutuo nos exagitemus. Interea vale, & nostrum studium boni consule. Tubingæ quarto Idus Ianuarij. ANNO M. D. L. I.*
- B**

Galenus si
marum &
canum hi-
storiam de-
scripserat.

LEONHARTI FVCHSII

MEDICI DE HISTORIA HVMANI CORPORIS,

sive dissectione singularum hominis partium, Liber primus
offibus dedicatus.

- C** *Quid anatome, & quis eiusdem usus. CAP. I.*



A *NATOME est singularum partium corporis tam interiorum, quam exteriorū scientia contemplatrix. Quippe substantiam, magnitudinem, figuram, situm, connexum, functionem, numerum, & usum harum omnium vestigat. Substantiam, quando carneane sit, an membranea, an ossea, an cartilaginea, tenuis, an crassa pars corporis inquirat. Magnitudinē, dum quantum in corpore*

Anatome
quid.

spacium occupat, considerat. Figuram, quum qua sit forma prædita, expedit. Situm, quando quo in loco corporis collocetur, observat. Connexum, quum quæ illi sit cum aliis com-

D *munitio & societas attēdit. Functionem, quum quodnam sit illius munus, & officium, perspicit. Numerum, ubi totius membri partes perquirat. Usum vero, quando eius ad utendum aptitudinem quærit. Ut hinc omnib, perspicuum sit immensam esse huius partis Medicinæ tum utilitatē, tum necessitatem. Neq; enim Medicis & philosophis tantum, sed & Theologis, Iuriscōsultis, Historicis, Poetis, deniq; omnibus qui eruditionis ac sapiētiae laudem affectant, honesta, pulchra, utilis, & omnino necessaria est. ¶ Nā anatome scientiæ dux est, aditumq; ad Dei agnitionē præbet. Dum n. huius ductu & adminiculo admirandam humani corporis texturam rimamur, singulaq; eius partes propius intuemur, ac oēs huius angulos perreptamus, & illustris illius ædificii admirabilem structurā & compagem oculis contemplamur, ibiq; apte & concinne omnia disposita admiramur, confestim ex ipsa opificii ratione, hominem nō casu exstitisse, sed ab æterna quâdam mente conditum esse, quæ singulas partes mirando consilio distribuit, & ad certos fines destinauit, coniectamus. Quapropter mira quâdam summi opificis Dei providentia sese tum ostentat, dum intelligimus hanc non frustra in formando homine adeo esse occupatā voluisse, sed hoc ipso significasse, hominū gen^o sibi curæ esse. Ut rectissime a Galeno lib. 2. de usu par. ita scriptum sit. Si unquam alius quivis opifex equalitatis & proportionis magnam habuit providentiam, certe natura habuit in formandis & costruendis animantium corporibus, adeo ut hanc Hippocrates nō temere iustā nominaverit. Quū itaq; nusquam certius quam in humani corporis structura sese expresserit Dei providentia, debet hoc potissimū nomine anatomes studiū nobis esse commendatū, ac gratum, quod nos in Dei cognitionē, primo statim eius aditu, ducat rapiatq; ¶ Porro quum ad vitam recte instituendā p̄cipuum sit nosse seipsum, p̄fecto in anatome cognoscenda multū operæ ponendū erit. Hæc enim efficit ut velut in speculo teipsum cōtemplari, & domiciliū illud animæ, quæ admodū Plato dixit, prorsus introspicere queas. Præterea ad formādos mores summe ut. hic est anatomes cognitio: quippe plurima ū virtutum imagines impressas ipsius partib. humani corporis ostendit, dum sic vicissim unā alteri consentire ac inferuire cernimus. Quātus n. est cerebri cum ventriculo & corde, ut alia omittamus, contentus? Tantus nūmi-*

Anatomes
usus & ne-
cessitas.

Dux ad Dei
cognitionē

E *conditum esse, quæ singulas partes mirando consilio distribuit, & ad certos fines destinauit, coniectamus. Quapropter mira quâdam summi opificis Dei providentia sese tum ostentat, dum intelligimus hanc non frustra in formando homine adeo esse occupatā voluisse, sed hoc ipso significasse, hominū gen^o sibi curæ esse. Ut rectissime a Galeno lib. 2. de usu par. ita scriptum sit. Si unquam alius quivis opifex equalitatis & proportionis magnam habuit providentiam, certe natura habuit in formandis & costruendis animantium corporibus, adeo ut hanc Hippocrates nō temere iustā nominaverit. Quū itaq; nusquam certius quam in humani corporis structura sese expresserit Dei providentia, debet hoc potissimū nomine anatomes studiū nobis esse commendatū, ac gratum, quod nos in Dei cognitionē, primo statim eius aditu, ducat rapiatq; ¶ Porro quum ad vitam recte instituendā p̄cipuum sit nosse seipsum, p̄fecto in anatome cognoscenda multū operæ ponendū erit. Hæc enim efficit ut velut in speculo teipsum cōtemplari, & domiciliū illud animæ, quæ admodū Plato dixit, prorsus introspicere queas. Præterea ad formādos mores summe ut. hic est anatomes cognitio: quippe plurima ū virtutum imagines impressas ipsius partib. humani corporis ostendit, dum sic vicissim unā alteri consentire ac inferuire cernimus. Quātus n. est cerebri cum ventriculo & corde, ut alia omittamus, contentus? Tantus nūmi-*

F *conditum esse, quæ singulas partes mirando consilio distribuit, & ad certos fines destinauit, coniectamus. Quapropter mira quâdam summi opificis Dei providentia sese tum ostentat, dum intelligimus hanc non frustra in formando homine adeo esse occupatā voluisse, sed hoc ipso significasse, hominū gen^o sibi curæ esse. Ut rectissime a Galeno lib. 2. de usu par. ita scriptum sit. Si unquam alius quivis opifex equalitatis & proportionis magnam habuit providentiam, certe natura habuit in formandis & costruendis animantium corporibus, adeo ut hanc Hippocrates nō temere iustā nominaverit. Quū itaq; nusquam certius quam in humani corporis structura sese expresserit Dei providentia, debet hoc potissimū nomine anatomes studiū nobis esse commendatū, ac gratum, quod nos in Dei cognitionē, primo statim eius aditu, ducat rapiatq; ¶ Porro quum ad vitam recte instituendā p̄cipuum sit nosse seipsum, p̄fecto in anatome cognoscenda multū operæ ponendū erit. Hæc enim efficit ut velut in speculo teipsum cōtemplari, & domiciliū illud animæ, quæ admodū Plato dixit, prorsus introspicere queas. Præterea ad formādos mores summe ut. hic est anatomes cognitio: quippe plurima ū virtutum imagines impressas ipsius partib. humani corporis ostendit, dum sic vicissim unā alteri consentire ac inferuire cernimus. Quātus n. est cerebri cum ventriculo & corde, ut alia omittamus, contentus? Tantus nūmi-*

Ad sui ipsi
us cognitio-
nem.

Ad mores
formādos.

rum ut etiam minima propemodum eius mala, utrumque principium sentiat. Sed partium A
humani corporis inter se consensum, atque cuiusque ministeria, suo loco fusius docebimus.

¶ Ceterum ut uno atque altero exemplo quomodo ad formandos mores anatomes co-
gnitio conducat, plenius intelligas, primum instrumentorum concoctioni famulantiū mo-
dum expendito, ut is ad temperantiam horretur. Quemadmodum enim quum hæc im-
modice cibo ac potu ingesto onerant, suas functiones parum recte obeunt, atque adeo con-
coctio ipsa impeditur, & subinde corpus vitiosis impletur humoribus: sic ad functiones
omnes civiles ineptos facit assidua crapula, & immoderatus cibi & potus usus. Quapro-
pter qui se ad civilia munia obeunda, & ad serviendum reipublicæ aptum exhibere vult,
is temperantiæ studeat: quod ut faciat, instrumentorum concoctioni famulantiū diligens B
inspectio hortatur. Dein si membra atque vasa generationi destinata contemplantur, eaque
tantâ diligentia & arte constructa & munita esse, varioque, ve in illis quoad perfecte sit mu-
ratum semen cōseruetur, anfractus habere cōspicimus, ad præcreandos liberos nos cōditos
esse, & ad continentiam, qua vagi vitantur cōcubitus, monent. Ut hoc nomine detestandum
hoc & modis omnibus exterminandum sit hominum genus, quod castitatem simulat, & in-
terim nullo non libidinis & vagi cōcubitus crimine se polluit. Insuper quum videmus fortum
in utero materno tanta cura, sedulitate, ac sollicitudine ali & tot inuolucris muniri, ma-
gno furore percitos esse discimus eos, qui temere nocet hominibus. eosque leuibus & nulli
momenti, imo non raro nullis de causis, interficiunt, quos tanto studio architectrix na-
tura fouit & præxit. Ipsa denique partium humani corporis distributione Deus imaginem C
quandam politicæ ac ciuitatis proposuit. Nam ut tres sunt in vniuerso corpore præcipuarum
functionum, ventres, quorum quidem infimus nutritioni & generationi feruit. Medius,
in quo cor est, motus & defensionem ciuitatis, tertius in quo cerebrum continetur, maximarum
rerum continet notitiam: sic in ciuitate bene constituta prima cura esse debet moderato-
ris reipublicæ ut ciues victum habere possint. Deinde ut defendatur aduersus iniustam vim.
Tertia ut etiam ad sapientiam, & notitiam Dei, & aliarum honestarum rerum instituantur.

¶ Ita sane hominis partes monstrant, quæ res præcipue expetenda sint, quæque actiones sus-
cipiendæ, & illustrant imaginem legitimi imperii, seu recte constitutæ ciuitatis continet.

¶ Quare quum nos ipsos intuemur, ad quæ actionum genera, & priuatim & publice de-
stinati sumus discimus. Ut hinc omnibus palam sit doctrinam de partibus humani corporis, D
& earum usu & officiis præcipuam partem esse philosophiæ, eius etiam quæ de moribus forman-
dis tractat. Quam quum Galenus in diuinis illis quos de usu partium corporis humani inscrip-
sit libris plenissime tradiderit, debent hoc nomine non solum Medicinæ studiosis, sed
omnibus, et philosophiæ amatoribus in deliriis esse, ac perpetuo manibus illorum teri.

¶ Porro quum passim apud veteres tum poetas, tum historicos, aliosque omnis generis scriptores
partium humani corporis mentio fiat, cōfert & hoc nomine plurimum ad eorundem scripta
plenius intelligenda anatomes cognitio. Præ omnibus a. aliis Medico certe non solum
utilis, sed & necessaria est. Quod enim intelligere singularum partium naturas, actiones,
officia, & usus, plurimum ad tuendam valetudinem conducat, notius est, quam ut pluribus, am-
ostendi debeat. Ad rectam v. curandi rationem anatomes peritia ita est necessaria, ut sine
hac nihil vnquam laude dignum in arte sua efficere possit Medicus. Quippe quum Galeno
etiam ipso libro primo de laborantibus locis, capite primo, teste, curandi ratio pro labo-
rantium partium natura variet, quo quæso pacto illas probe curabit qui earundem sub-
stantiam, figuram, magnitudinem, numerum, actiones, usus, ac mutuam inter se connexionem
ad amussim non perspectum habuerit.

¶ Quam denique ratione aculeos, telorumque cuspides
extrahet, ossa excindet, luxura reponet, abscessus incidet quæ non omnium corporis partium
motus, situs varios & connexiones exacte tenuerit? Non raro certe is ordinem magnum,
aut neruum insignem, aut arteriam, aut venam aliquam subiacentem dissecabit, interdum
quoque partis sensum, nonnunquam motum, aliquando utrumque abolebit.

¶ Quapropter
quum veteres in rebus agendis prudentissimi anatomem ad diuini opificii admirationem
ad morum temperandorum iudicium, ad humane nature penitiorum contemplationem, ad
tuendam bonam valetudinem, ad curanda corporis mala, denique ad scriptorum exquisitiorem co-
gnitionem utilem & necessariam esse intelligerent, pueros domi apud parentes uti lectione &
scriptura, sic etiam cadauerum cōsectionibus exercebant, quo scilicet subinde instructiores ad ar-
tis discenda præcepta venirent. Neque enim fieri posse putabant, ut non tenacissime
hære-

Libri Gale-
ni de usu
part. diligē-
ter legendi.

Medico a-
natomes
cognitio &
vtilis, & ne-
cessaria est.

Veteres
pueros in
cōsectioni-
bus exer-
cuerunt.

A haerent quæ a primis, & teneris annis didicissent. ¶ Optimo igitur consilio ut anatomen haud secus atque primaliterarum elementa, mox ab ineunte ætate addiscerent, censuerunt. ¶ Eisdem quoque rationibus impulsu veteres philosophi in ea perdiscenda curam & industriam non vulgarem posuerunt. Quam enim anatomes studiosus fuerit, ut vnum & item alterum producam, Plato ille diuinus, ad Hippocratis philosophandi genus proxime accedens, Timæus eiusdem palam testatur. In eo namque, qua ratione corporis singule partes digestæ sint diligentissime enarrat. Aristotelem etiã huius discipulũ in libris quos de animalium historia edidit, partium humani corporis prolixam cõmemorationem, earumque prope omnium nomẽclaturas ex professo legentium oculis subiicere non puduit. ¶ Neque vero philosophi tantum, ut quibus forte magna est cũ Medicis studiorum societas & cõiunctio, anatomes studio incensũ fuerunt, verũ etiã reges, ac principes aliquot viri. Siquidem literis proditum est, Ægyptiorum reges mortuorũ corpora, quo abditos plane scrutarentur morbos, suis etiã ipsorũ manib. dissecuisse. Marcus præterea Antoninus, optimus Imperator, ex corporum sectionibus, ut erat vir prudens, corporis sui constitutionem ac temperamentũ adamussim intellexit. Flavius etiã Boethius Romanorũ consul, ut Galenus testatur, anatomicæ speculationis amore ita flagrauit, ut nemo mortalium qui vixerunt vnquam magis. Hinc est quod oēs nõ modo Hippocratis, sed etiã Galeni de anatome libros inexplabili legendi desiderio perlustrauerit. Id quod Paulum quoque, Sergium Romanorum pfectum, virum tum rebus, tum disciplinis philosophicis per omnia pceptum fecisse, idem Galenus auctor est. Constat etiã duos hos viros, doctrinã, & rebus bellicis clarissimos, Galeno dũ dissectiones administraret, non raro adfuisse. Quum itaque tantum habeat rũ in tuenda valetudine, tum in pfigandis ac curandis morbis momenti anatome, & sit veluti totius Medicæ artis fundamentũ, quo sublato cetera quoque omnia collabi necesse sit, valde iniqui, imo amẽtes, prius sunt, quos immẽsa eius vilitas ac necessitas, addẽ etiã tantorũ virorũ exempla, ad huius studium non inuitant, pertrahunt, & inflammant. Sed cur eam artis partẽ nõ contemneret, quod nullã et aliarũ probe ne dicã didicerint, sed ne a limine quidẽ salutauerint? His itaque relictis, ad partium corporis curationẽ progrediamur, ab ossibus exordio sumto.

Philosophi
veteres ana-
tomes stu-
diosi.

Reges &
principes
viri anatomes studio
incensi.

Cur ab ossibus humani corporis historia sit auspicanda. CAP. II.

D QVemadmodum bonus ac peritus architectus totius edificiũ fundamenta in primis ponit, postea parietes, tabulata, tigna, & reliquas quæ illis innituntur partes: sic in texenda humani corporis historia initio ab ossibus auspicandum erit. Quippe hæc sunt veluti fundamenta quædam ad vniuersam corporis substantiam sustentandã ac suffulciendã subiecta, quibus omnia adnascuntur stabiliunturque. Quod n. in tentoriis præstãt pali, & in ædibus parietes, id certe in animalibus ossium substantia. Nam ad horum imitationem cetera in animante solent effingi mutarique: ut si animali caluaria sit rotunda, necessario cerebrum tale fuerit: quemadmodum etiã si oblonga sit, talem quoque figurã huic ipsi animali cerebrum induet. Iam v. si maxillæ parvæ, faciesque tota existat rotundior, necessario quoque ipsarũ musculi parui erunt. Pari ratione si longæ, longa statim huiusmodi animali erit tota facies, eiusque musculi tales apparebunt. Hi n. ossibus foris adhærent, p-
E tensique sunt: quare etiã tum magnitudinem ipsorũ, tum figuram imitantur. Hos rursus arteriæ, venæ, & nervi sequuntur: & hæc sane ossium, sibi similitum formã referunt. Quod Hippocrates etiã iis verbis innuere voluit, *Ossium naturam ex capite estimare oportet, deinde nervorum, venarum, carniũ, & reliquorum humorum, supernorum & inferorum ventrium, mentis ac morũ.* Quoniã igitur corporis formã ossibus assimilatur, & iis aliarum partium natura respondet, exactam in primis ossium cognitionem peritiãque indipsi, nec obiter ea spectare conuenit. Præterea nisi ex ossibus singula per se qualia sint, tum quæ inuicem structuram habeant, Medico perspectum sit, nunquam ea quum vel franguntur, vel sua sede dimouentur recte curabit. Necesse enim est, quod pluribus tamen lib. 2. methodi medendi, cap. 4. Galenus monet, ut in omnibus quæ ad medicinam pertinent, id quod secundum naturã est, primum cognoscatur. Nam cui id ignotum est, is neque vbi a sua natura læsa loca distrahuntur, neque qua ratione ad id, quod secundũ naturã est adduci debeant, intelliget. Huc accedit quod Medicus nullius partis, præsertim musculorũ, venarum, arteriarũ, & nervorum historiã, nisi singula prius ossa nota habeat, exacte discere

Galenus li-
bro primo
de anatomi-
cis ad-
ministratio-
nibus.

6. Epi. par. 6.
apho. 26.

Quoniam
tota de ossi-
bus. In primo
libri de os-
sibus.

282 Operum Leonhardi Fuchsi Pars I.

possit. Neq; enim exortus, neq; insertiones musculorum vnquā assequetur, nisi cui vniuersa ossium structura perspecta est. Quomodo a. processus neruorum intelliget, nisi capitis & vertebrarum exquisitam habeat notitiā? Nec venarum, nec arteriarum, in caluariam distributionem vnquam recte cognoscet, nisi prius singula, per quæ ingrediuntur foramina capitis in numero habeat. Quū itaq; sine ossium absolutā cognitione historiam humani corporis nemo assequi possit, iustissimo ordine ab eorundē descriptionib. hāc ipsā ordiemur, pri^o tñ obscuriorib. quib. in hoc libro vsuri sum⁹ nominib. explicatis.

Obscuriorum nominum passim in hoc libro occurrentium explicatio. C A P. III.

Obscuriora
nomina
eius in tio
explicanda.
Ex p^omo
libri de os-
sibus.

Σκελετός.

σκέλεω.

συνάγειν τὸ

ἐκείνου.

σκέλεται

αἰσέω.

ὁσέω λόγια.

Ἐπίφυσις.

Appendix.

Veial. libro

primo, ca

pice tercio.

OPortet de iis nominib., quibus in hoc libro vsuri sumus, initio differere, ne dū ossium historiam enarramus nominibus sine declaratione vtētes, imperito lectori caliginem offundamus, vel seriē doctrinæ interrumpere, quicquid occurrerit explicare semper volētes, cogamur. Hinc a. quam optime initium sumemus. Humani corporis ossium inuicem cohærentium vniuersa cōpactio Græcis σκελετός, hoc est, *Eadauer ossificatū* dicitur. Hinc nonnulli qui de ossibus differuerunt libros suos περί σκελετῶν, id est, *de arida ossificataq; ossū cōpositione*, anscribere. Alii ὁσέω λόγια, hoc est, *ossū interpretationes* vocarunt. Quidam simpliciter, vt nos fecimus, de ossibus inscribunt. Nominā vero, quibus in ossū descriptione ppetuo vtendū est, hāc fere sunt. Ἐπίφυσις, quam Latini *appendicem*, *additamētum*, & *adnascentiam* reddunt, est vbi os cum osse ad vnionem coit: vel est os alteri ossi adnatum, & peculiarem obtinens circumscriptionē, neq; illius ossis cui committitur, vera portio. Hæc qualis sit facile vbi vituli, aut hœdi, aut agni, aut alterius iunioris animalis pars aliqua cocta mensa apponitur, disces. Nam a carne emundato femore, humero, tibia, aut vlna, aut alio iis simili osse, & validius attrēctato, ab illo veluti aliud os decidere cōspiciamus, appendicis nomine donatum. Atq; appendices in iunioribus dūtaxat intuemur. In prouectis siquidem ætate hæc adeo pertinaciter suis ossibus adnascūtur, vt ab iis auelli haud possint, vixq; coniunctionis lineam exprimant, & veræ suorum ossū portiones esse videantur: cum interim in nuper natis magnam cartilaginis portionē inter appendicem & os cui ea adnectitur intēcedat, quæ appendicem glutinis modo ossi cōnectit. Coactus hic non leui plana q; superficie perficitur, verum os cui appendix committitur, sinibus quibuscūq; & asperitatib. abūdat, quibus appendicis tubercula sinusq; mutuo ingressu validius accommodantur. Ἀπόφυσις, quem Latini *processū* vertunt, est ossis pars nihila suo osse differens, quam quod tuberculi seu gibbi instar ex osse procedit, quemadmodum ex arboris trunco radices ramiq; extuberare ac procedere videntur. Eiusmodi pcessus in ossibus sunt quamplurimi, vt suis locis docebimus. Longum enim esset singulos in præsentia recensere. Conferunt autē processus præcipue ad commodam articulationē, & ossium commissuram, deinde ad multarum partium exortum, aut insertionē. Quinetiā pcessus propugnaculi vice esse, scapularum & vertebrarum processus testabuntur. Κορὼν seu κροῶν, & κροῶν, Latinis quibusdam *cornix* alis *corona* dicta, Galeno in p^omo libri de ossibus, & alijs veteribus & Græcis, est acutus, & in mucronem desinens processus, qualis vtrinque in inferiore maxilla habetur. Similitudinem autem sumserūt ab arcus cornu, cuius summum, & incisionem vbi nervus sedet, κροῶνν etiam appellant. Κεφαλή & κεφάλιον, Latinis *caput*, est ossis extremum siue tuberculum crassum & orbiculatum, quod alterius ossis causū articulationis motusq; arbitrarij occasione subintrat, quale est femoris, quod coxendicis ossis sinui inseritur. Depressa vero capita, quæ adeo obscure tubere gibbove prædita sunt, vt num caput, num sinus ea vocari debeant, non satis constet, dissectionum periti κόνδυλους, Latini *nodos* vocant, qualia sunt femoris inferiora & iuxta genu capita. Atque id κόνδυλον significare Galenus libro primo de motu musculorum quoque testatur. Τράχυλος & Αιχμή, Latinis *ceruix*, tenuis est ossium processus, quorum extremum crassū redditum in ossis caput finitur. Talis conspicitur in femore iuxta elatissimum ipsius caput coxēdicis ossi inarticulatū. Κοτύλη, Latinis *acetabulum*, vulgo *Pyxis*, sinus est, qui altius profundiusve descendit, ac ossiū capita excipit. Eiusmodi sinus obseruatur in coxa, vbi femoris caput admittitur. Τάλην, autem, quæ vox Latine reddi nequit, ab ocularis sinus forma, dicitur sinus, qui leuiter & superficie tenus tantū cauatus est, ac talis occurrit, vt ignores num aliud os admittat, aut aliud os subeat, haud secus quam si duo plani leuigatiquē asseres inuicem imponerentur. Atq; sic glene depressio respondet capiti, quod κόνδυλον, vt comprehensum est, dicitur. Tales habentur in tarso ossibus qua pedii ossa ipsis coarctantur. Porro vt sinus & capita

Απόφυσις.
Processus

Vfus pro-
cessuum.

Κροῶνν.

Cornix. Li.

bro de ossi-

b. & p^omo

de motu

muscul.

Galeno.

Κεφαλή.

Τράχυλος.

Αιχμή.

Κετύλη.

Acetabulum.

Τάλην.

Glene.

Acapita articulorum gratia constituuntur, ita quoq; ἵπτες, ὀφρύες, ἀμφότες & χεῖλη, quæ Latinis ^{ἵπτες.} ^{ὀφρύες.} ^{ἀμφότες.} ^{χεῖλη.} supercilia, & labra nominantur. Non sunt autem nisi processus ad sinuum orbē, instar labrorum, prominentes, & sinus profunditatem augentes. Quominus enim ossa promte luxentur, supercilia in primis conducunt. Hinc in coxendicis ossis sinu, cui femur articulatur maxime prominentia videntur supercilia, ut sinum impenitus cauum redderent, femorisq; luxationem accuratius prohiberēt. ^{Βαθυΐδες.} ^{Lib. 2. de.} ^{ἵπτες.} ^{ὀφρύες.} ^{ἀμφότες.} ^{χεῖλη.} ^{supercilia.} Βαθυΐδες sinus sunt, qui basis firmamenti que ritu, ultra quam animanti ex usu sit, os moveri haud quaquā sinunt. Tales in anteriori humeri, & in posteriori sedibus, singulos vlnæ processus excipientes inveniuntur. Anterior namq; sinus priorem vlnæ admittit processum, quando cubitus extreme flexitur, posteriorem autem sinum posterior vlnæ processus in cubiti extensionibus ingreditur. Quoniam vero posterior in anteriorem non est peruius, hi vlnam ultra quam expedit nequaquam moveri sinunt.

De commissuris ossium. C A P. IV.

HActenus nomina, quibus in ossium descriptionibus utendum erit, percensuimus. Nunc eadē breuitate voces quib. commissurarum ossium differentia indicant, explicabimus. Connectuntur a inuicem ossa primū quidem voluntarii motus gratia per articulum. Articulum autē quem Græci ἀρθρον, & ἀρθρῶν, hoc est, articulationem nominant, Galenus in libro de ossibus, naturalem ossium compositionem esse tradit. In libro autē duodecimo de usu partium, capite primo, articulationem ossiū esse compositionē, ppter motum voluntarium comparatam, scribit. Ut articulus non sit nisi ossiū commissura ad motum parata. Ab Hippocrate v. alterius ex coherentibus ossibus extrema pars, articulus frequenter nuncupatur ea scilicet quæ orbiculata est, ac in proximū cauum inseritur, capitisq; nomine dicitur. Ceterum motus in omnibus articulis non eadem est ratio. Alius n. manifestus & euidentis est, atq; neminem latet, ut capitis super collum, femoris in osse coxendicis, extremæ manus ad cubitū. Hæc articulationis species Græcis διαρθρωσις, id est, laxa ^{Διαρθρωσις.} ^{Lib. de art.} ^{articulis.} dearticulatio dicitur. Hippocrates eam ἀπαρθρῶν, quasi ab articulatione appellauit. Alius articulorum motus neq; validus, neq; manifestus, sed obscurus & obseruatum difficilis est, adeo ut is neutiquam a singulis promte deprehendi possit, ut post brachialis ossium ad brachialis ossa coarticulatio, calcis cum talo. Harum namq; commissurarum ne obscurissimam quidem morā, nisi mente sedulo adhibita, animaduertes. Vocata v. est hæc articulationis species Græcis συνάρθρωσις, quasi coarticulationem dixeris, solius motus quantitate a dearticulatione discrimen recipiens. Porro vtriusq; eius nimirum quæ manifestum, & eius quæ obscurum edit motum structuræ triplex est species seu forma a vetustissimis Græcorum, qui libros suos a pueris dissectionis rationē docebant, triplici voce donata, enarthrosi videlicet, arthrodia, & ginglymo. ^{Ενάρθρωσις} ^{arthrodia} ^{ginglymo} autem est articulationis species, in qua excipientis ossis cauum sinuue altius & profundius admodum est, caputq; quod in id inseritur oblongum & extuberans, ut est ea qua femur cum coxa, & humerus cum scapula, & post brachiale cum primis digitorum ossibus, & tali caput cum nauiformis ossis sinu inarticulatur. ^{Αρθροδία} ^{arthrodia} articuli species est, quæ cauum sinumve leuiter & in superficie exsculptum, & caput ossis depressum adipiscitur, & veluti planarū superficierum connexu fit. Qua quidem specie prima vertebra ad secundam, & tarsi ossa cum pedii ossibus connectuntur. ^{Τρίγλυμος} ^{triglymos} Tertia dearticulationis species γίγλυμος dicta, fit quando ossa sese inuicem ingredientia coniunguntur: ita ut vnius gibba, alterius ossis caua subintrent, & rursus vnius ossis sinus alterius gibba admittant. Sic autem appellata est, quod admodum cardinis fenestrarum aut ostiorum fiat. Nam veluti ostiorū cardines, etiam ginglymi aliquas quidem cavitates, aliquas vero eminentias obtinentes, cavitatibus eminentias eorum quæ sibi applicantur excipiunt, eminentias a. in illorum cavitates ingrediuntur, fenestrarum instar in genu occurrit. Tibiæ n. os duobus donatur sinibus, in quorū medio tuberculum prominet, femoris autem pars inferior duo exigit capita, tibiæ ossis sinus ingredientia. Dein in capitum medio sinus visus, tibiæ ossis tuber excipiens. Ostiorum a. ad imaginem fit ea quæ in humero & vlna est articulatio. Vlnæ enim tubera humeri sinus subeunt, & rursus vlnæ sinus humeri tubercula excipit. Eorum autē ossium quæ nullum penitus habent motum, connexio, quadruplex est species, nepe gomphosis, futura, harmonia, & symphysis. ^{Γόμφωσις} ^{gomphosis} est cum instar clauis os ossi infigitur. Hac dentes ad vnum cœs maxillarum alucolis impinguntur, ut ne tantillū quidem moueantur. ^{Ράχη} ^{Latinis} ^{Ράχη.} ^{Connectus} ^{ossiū} ^{quæ} ^{nulū} ^{motum} ^{habēt.} ^{Γόμφωσις.}

Sutura. *sutura*, compositio est ad consutarum rerum similitudinem facta. Hanc nonnulli quum explicare student serratam eompagem structuramq; , alii in vnguē commissurā esse definiunt. Sed illi in memoriā reuocant, mutuū ferrarū contrario occurso ingressum, quodentatq; alterius serræ partes, in alterius sinus inseruntur. Hi vero quæ in vnguē committi dicuntur, quum gibbæ videlicet partes ad vnguē figuram structæ, in sinus quibus apte excipi possunt subeunt, quæ connexus serie, arcarum asseres subinde inuicem compinguntur. Eiusmodi futuris ossa capitis magna ex parte, & nonnulla maxillæ superioris cōpinguntur. *Apuroia* ossium structura est per simplicem lineam, citra omnē tuberris, sinus & asperitatis mutuū ingressum cōmissa. Ad hunc modū quædam maxillæ superioris ossa, & præsertim nasi inter se veluti simplices lineæ mutuo cōpactæ iunguntur.

Σύμφοις. *Σύμφοις* nō est nisi naturalis ossiū vniō. Quæ sane commissuræ forma humiliora pectoris ossa inter se & appendices suis ossibus connascuntur, *ut paulo post fusius dicemus*. Ceterum omnes iam dictæ ossium structuræ species, aut alicuius, aut nullius corporis interuentu cōmittuntur. Nullius partis beneficio, in natu grandioribus, vbi ossa iā sicciōra sunt redita & induruerē, appendices ipsorum ossibus coalescunt. Nam adeo illis vniunt, ut coalitus lineā vix conicere queas. Omnes quoq; futuræ, quemadmodum etiā harmoniæ absq; corporis alicuius auxilio connectunt. Alicuius v. corporis ope & interuentu cōmittuntur ossa trifariā. Aut n. cartilaginis medio cōnectuntur, ut pubis ossa, & in minoribus natu humiliora pectoris ossa. Præterea appendices in prima adhuc ætate cartilagine glutinis modo interueniente suis ossibus ut capite præcedenti dictū est, connascunt.

Συνχόνδρωσις. *Συνχόνδρωσις* hæc a. connexus species a cartilagine *συνχόνδρωσις* dicitur. Aut ligamentorum beneficio cōmittuntur, ut in vniuerso ossiū qui motu voluntario polleat, & vertebrarū corporum nexu. Hic ossium connexus ligamētorum auxilio cōmissus, Græcis *συνέπυσις* appellatur. Nervi interim voce ad ligamenta proprie dicta, & ad tēdines, nervosq; qui a cerebro, & dorsali medulla prodeunt, deducta. Hæc namq; omnia veteres nervi nomine intellexerunt. Aut carnis & musculorum ope connascuntur, ut omnes articuli musculis obducti. Musculi n. quum ab vno osse, aut alio corpore principiū ducentes alteri inferantur, vinculorum ē loco iure habentur, ossaq; inuicem connectunt. Quia vero musculi veteribus quibusdam, præsertim Aristoteli, carnis nomine appellant, cōnexus qui per musculos fit, *συνάγκλωσις* merito Græcis nominatur. Atq; hæc est legitima, & q̄ nihil habet calumniæ commissurarum ossium distinctio, a Galeni tamen sentētia in præcæmio libri de ossibus, nonnihil discedens. Nam is synarthrosi, perinde atq; nos, obscurum & nō manifestū tribuens motum, non debuit futuram, gomphosin, & harmoniā inter eius differentias numerare, utpote quæ nullum penitus habeāt motū, nisi cum auctore libelli introductorii seu Medici inscripti, *συνάρθρωσις* ad stabilitatem factam esse dicere voluisset, quod tamen pugnasset cum iis quæ insequentibus, aliquot capitibus, *libri de ossibus* scribit, præsertim *cap. 13.* vbi connexionem costarum cum pectoris osse *συνάγκλωσις*, quod harum sit exiguus, adeoq; obscurus motus, diserite appellat, ut ante nos Vesalius, summus noster amicus, *ca. 4. lib. 1. de fabrica humani corporis*, animaduertit. De Symphyfi quoq; Vesalii rationē secuti sumus, ut quæ sit expeditior, & minus calumniis pateat. Quanquā enim Galeni sentētia de symphyfi in *libro de ossibus* defendi potest, si dicamus eum vocem illam improprie, pro quauis coherentia, vlurpasse, tamen quum *σύνεπυσις* proprie loquendo non sit nisi vbi partes natura distantes in se inuicem coalescunt, non recte quæ ligamenti ope perficit *συνέπυσις*, neq; musculorum auxilio factam *συνάγκλωσις* sub symphyfi seu coalescētia complecti potuit. Neq; enim qui per ligamentum connectuntur, aut per musculum cōmittuntur articuli, coaluerunt. Quare multo rectius *σύνεπυσις* inter species commissurarum q̄ nullum penitus habent motū recensetur, & tres, quas illi Galenus affinxit differentiæ ad vniuersas ossium structuras, ut nos fecimus referuntur. Quod nō animaduertisse Carolus Stephanus; lū Stephanum in suis de dissectione partium corporis humani libris plurimum miror. Mihi sane, quod sibi pugnantia in hoc exiguo de ossibus libro Galenus manifeste scripserit, suspicio haud exigua oritur, hunc nō esse legitimum, aut saltem multis in locis deprauatum, quod mihi persuadet locus e Græco codice de ginglymo a Ioanne Caio Britanno citatus, qui in Latinis longe aliter se habet.

- A** **O**s est pars corporis similis durissima & siccissima, maximeq; terrestris & frigida, ac sensus, Os quid.
demptis solis dentibus, expers. Nō temere a Summo rerū Opifex tali substantia ossa do- Ossū vsum
navit. Nā quā hęc vniuerso corpori tanq; fundamēta q̄dam subiicienda erant, vt solida
& dura essent cōueniebat. Quomodo n. alias q; in tentoriis pal., & in ædib. parietes, id in
animalib. p̄staret ossū substantia, nisi dura & sicca esset: Ossium a. alia roboris nomine, Ossium dif-
vt essent sc. tanquam corporis fulcra ac stabilimenta p̄creata sunt, vt tibiā ac femorū ferentia ab
ossa. Alia reliquis partib. veluti p̄pugnacula ac muria natura obiciunt, vt caluaria, tho- vsum.
rax, & vertebrarum spinæ. Alia quorundā ossium articulis p̄ficiuntur, ne illi plus satis Lib. 16. de
laxe inoueantur. Hoc nomine ossicula *Sesami* seminis magnitudinē referentia formata vsum partium
sunt. Verū cuiusq; ossis vsum & officiū, singulorum priuatim capita mōstrabunt. Variāt cap. 2.
- B** vero inter se ossa etiā magnitudine, quod nonnulla sint magna, vt femur, os tibiæ, & hu- Differentia
merus: nonnulla parua, vt brachialis ossa, dentes, & sesamina. Alia rursus ampla, vt ossa sacri a magnitu-
ossis laterib. conuictata, & scapula. Alia angusta, gracilia, & longa, vt fibula, radius, & ulna. Pre- dine.
terea euariant etiā substantia & cōstitutione. Sunt n. quædā plane solida, neq; villo pacto A substantia
effracta, cauernulis tñ sinibusve intus repleta, vt duo nasi ossa. Aliqua vero extrinsecus, & cōstitu-
quasi cōtinua crusta aut lamina obducentur solida apparent: effracta a. quædā exiguis tione.
tantum cauernulis cōpactissimæ spōgiæ, aut leuissimi pumicis foramina referētibus, in-
tus op̄leta vident, quandā fungi specię exprimentes, vt brachialis, tarsi, pectoris, & ver-
ticis ossa. Quædā v. p̄ter cauernulas, nulla serie aut numero positas, ampliū aliquem & Sinum &
insigniter cauū obtinent sinū, vt femur, tibiæ os, humerus, & alia nonnulla. Maiores vero cauernula-
isti sinus, & cauernule illæ ossib. cōiungunt, tñ vt motus gratia leuiores redderent, tum vt rum ossium
medullā p̄prium ip̄orum nutrimentū, quemadmodū plenius lib. 3. de naturalib. facultatib. ca. vsum.
ultimo, & li. 11. de usu par. c. 18. Galenus docet, illis cōtinerent: aut priuatim aerē, vt frōtis os,
p̄ter medullā amplecterentur. Neq; solū in maiorib. iis ossium sinibus medulla repo- A forami-
nitur, verū spōgiæ etiā modo exstructæ cauernulæ, nō minus q̄ insigniores maiorum os- nibus.
sium sinibus, medulla infarciuntur. P̄ter cauernulas & sinus, quib. ossa intus scatent, nō-
nulla quoq; amplis foraminib. sunt perita, vt occipitis os, vertebræ, & pubis ossa. Alia v.
exiguis perforant foraminib. vt pleraq; capitis ossa, venis, arteriis, & neruis viā p̄bentia,
& os odorum nomine cribri instar perforatū. Aliqua exterius & in superficie nullum q;
sensu dignoscitur foramē p̄ se ferunt, vt brachialis ossa, & dentes. Non paucis a. ossib.
- D** foraminula accidunt, q̄ exterius ac in superficie sunt cōspicua, non tamen vniuersum os
penetrant, sed tantum venis & arteriis crassiora ossa subeuntibus p̄parant. Eiusmodi
foramina in calcis osse & talo, & osse sacro passim occurrunt, q; scil. hęc crassiora sint, q̄
vt a vasis ip̄orum duntaxat superficiem perreptantibus, nutrimentū cōmode assumere
possint. Ab ossium sensu leuis admodum sumitur differentia. Dētes n. soli sensu p̄diti
sunt, reliqua vero omnia ossa sensus expertia, quemadmodū in libello de instrumento odora- A sensu
tus, & multis alijs locis Galenus attestatur. Quod vero reperiuntur qui non omnem sentien- Obiectio
di vim adiungunt ossibus, id non alia de causa accidit, quam quod omnibus propemodū nis solutio
ossibus membrana quædam obducatur, quā πειρίστω ob id Græci, quasi ambientem ossa: Πειρίστω
vocatūt, cuius quidem gratia ossa nonnullis sensu p̄dita esse visum est. Quapropter q;
alia a dentibus ossa sentiant, id non p̄pria, sed membranæ potius hęc ipsa ambientis ra-
tione euenit, vt abunde testantur quæ lib. 2. de labo. locis cap. 2. scribit Galenus ita inqui-
ens. *Membranae quæ ossibus obducuntur dolores & profundi sunt, id est, in intimo corpore sen-
sum excitantes, & ossium ip̄orum veluti dolentium, imaginem inducunt. Hinc est quod y. a quam
plurimis ossibus, hoc est, ossium dolores laboresve nominantur.* Libro quoque 3. de tuenda sani-
tate cap. 4. πειρίστω dictum esse Græcis scribit, non quod in eo ossa doleant, sed ob penitio-
rem potius sensum, ad partes scilicet, quæ in alto maxime corpore sunt posite, nomen
transferentes. Quippe summum locum cutis occupat, secundum ab ea muscoli habēt,
vtiq; circum ossa positi, at tendones ipsis ossibus adhærent. Quare consentaneū est, quū
hi quicquā patiuntur, in imo, & circa ipsa ossa affectū hære videri. Lubens iā p̄tereo
eas q; a forma, appendicibus, processibus, capitibus, superciliis, sinibus, tuberibus a
missurarū specie, & cartilaginib. petunt differētias, vt q̄ partim pri^o sint expositæ, partim
q; sine integra ossium historia recte assequi nequeant. Numerus ossiū, quē Galenus lib. 9.
de placitis Hippocratis & Platonis, plura esse trecentis tradit, facillime e singulis huius libri
capitib. ab vnoquoque colligi potest, vt propemodū nō sit op^o hūc in p̄sentia recēdere.

Tamen ut illum omnes statim in promptu habeant, non pigebit nos singula ordine, a capite, tanquam parte omnium longe nobilissima, exorsis, commemorare. Caluariæ quidē ossa viginti sunt numero, octo capitis, superioris maxillæ duodecim: præteritis tamē & priuatim non enumeratis iugalibus, ut quorundam illorum viginti ossium partes tantum sint: auditus instrumenti quatuor, dentes triginta duo, inferioris maxillæ magna ex parte vnicui, ossis Hyoidis siue referētis ossicula fere sunt undecim. Vertebrae viginti quatuor, sacri ossis plurimum sex, coccygis quatuor. Costæ viginti quatuor, pectoris tria, Galeno septē recēsentur. Scapulæ duæ, totidem clauiculæ, humeri duo, vlnæ duæ, radii duo, brachialis sedecim, vtriusque scilicet manus octo: post brachialis octo, in utraque manu quatuor. Digitorum ossa triginta, in utraque scilicet manu quindecim, sesamina ossicula viginti quatuor, in singulis enim, ut minimum, manibus sunt duodecim. Ossa sacri ossis lateribus commissæ duo, femora duo, tibiae duo, fibulae duæ, totidem patellæ, duæ calces, totidem tali, navicularia ossa duo, tarsi octo, in utroque enim pede quatuor, pedii decem, in utroque pede quinque, viginti octo digitorum pedis ossa, cuiusque videlicet pedis quatuordecim, pedis sesamina ossicula, perinde atque in manibus, viginti quatuor. Quod si hæc omnia cummulata in unum conieceris numerum, vniuersa erunt trecenta & tria, aut si Galenum in pectoris ossis diuisione imitatus fueris, trecenta & septē. Non vero sine causa ac temere humani corporis ossa non instar vnius continuique ossis, lapideæ cuiusdam statuae modo, Summus rerum Opifex efformauit. Nam etsi ita quidem hominis structura iniuriis minus erat obnoxia, & ipsius ossa firmiorem ac stabiliorem sedem adepta erant, neque luxari, neque excidere, ac distorqueri potuerant, tamen quia homo motui: qui animanti maxime, si quid aliud, proprius censetur: neuiquam destitui debuit, & quum motus citra ossium diuisiones, commissurasque fieri nequeat, hominem e multis ossibus constructi plurimum conduxit. Non autem motus tantum gratia, sed & perspiratus, aut transitus cuiusdam, aut partium discriminis, aut securitatis, aut patiendi difficultatis, ipsorum constructio existit. Propter motum quidem digitorum ossa inuicem connectuntur, vlna & radius cum humero, humerus cum scapula, & in summa, omnes aliae de articulationes. Perspiratus autem, nepe fuliginosorum cerebri excrementorum, aut transitus alicuius corporis, scilicet vasorum quorundam, causa, capitis suturas factas fuisse commemorabimus. Quinetiam & patiendi difficultatem quandam ac securitatem, omnibus iis quæ ex multis constantur, tum in iis quæ de futuris prodemus, tum in aliis plerisque demonstrabimus. Ob discriminē vero seu differentiam partium, verticis ossa utcumque mollia duris temporum ossibus committi, in eorum ossium commissurarum sermone docebimus.

Capitis structura ratio, & eiusdem varia figura. CAP. VI.

Caput quæ
de causa
factum.
Lib. 8. de
vitiis part.
cap. 5.

Quum caput pars corporis omnium longe sit nobilissima, ut comprehensum est, ab eo potissimum nobis exordium erit. Humanum a caput oculorum causa esse factum, cancrorum, scarabeorum, & quorundam aliorum quæ capite destituuntur animalium oculi manifeste demonstrant. His enim oculi ceruicibus prælongis insunt, neque imi, quemadmodum os, nasus, & aures ipsis in pectore absconduntur. Nam illorum actio æditum locum postulabat: quæ causa etiam fuit, ut qui hostium aut prædonum infestos incursus a longe speculantur, muros aut altas turres, aut montes quosdam conscendant. Nauræ quoque qui nauium malos ascendunt, terram prius intuentur, quam vectores, quam in eadem sunt naui. Nam qui in excelsum aliquem locum conscendit, plura loca prospicit, quam qui in loco est humiliore. Prædictis igitur animantibus testacea & dura cute obiectis, non difficile factum erat, oculos in prælongis ceruicibus tuto reponi, ut qui deriores essent futuri, & tunica extrinsecus obduci poterant, quæ ab illorum animalium cute, præcreata, simul durissima, & testacea esset. Homini vero, propter corporis substantiam, & mollem tenuemque qua oculi inuestiuntur membranam, æque ac reliquā cutē, totos oculos necessario molles habituro, prælongis ceruicibus prominentes oculi, citra periculum, imponi nequiverunt. Postquam igitur in imo hominis oculos locare eorum functioni non erat commodum: nudis autem ceruicibus imponere haud erat tutum, nolebat sane Natura neque ullum oculorum usum impedire, neque securitatem tollere, ideoque partē extruxit aliam, & oculos ab iniuriis pulcre vindicantē. Supra enim supercilia, os frontis, & cilia collocauit, infra vero præter palpebras, malas, internis autem partibus, nasum muri instar, externis, ossis

A ossis processum, quod *ζυγωμα* Græci, nos iugale appellamus, de quo suo dicemus fusius loco, apposuit, adeo ut excelsis & prominētibus vndiq; partibus oculi sepiantur, vtiliterq; veluti in sinuosa valle latent. At horū congeries nondū est caput, possuntq; esse alicubi sine capite. Cur igitur fuit necessarium hic quoq; alias partes poni, quarū cōpositio caput nominat? Singula sensus instrumenta, neruū postulant mollē: neruum quidē, q̄ is sensuum fit instrumentū: mollem a. quia ut sensus fiat, ab extrinsecus occurrente sensoriū ipsum efficiatur quodam modo necesse est, ac patiat. Porro q̄ molle est, ad patiendū: quod a. durum ad agendum est aptius. Proinde sensoria mollibus; reliquæ v. partes voluntario præditæ motu, duris neruis indiguerunt. Quum itaq; oculi mollib. cerebri neruis indigebant, molliaq; omnia si vltius procederēt diuulsa facile frangerent, offenderēturq; iure cerebrum non procul ab oculis poni debuit. Nunc itaq; quod principio de capitis structuræ ratione inquirebamus, inuentum est, nempe cerebrū in capite locatum esse, propter oculos; reliqua vero sensoria omnia, propter cerebrū. ¶ Ceterū capitis, q̄ Græcis *κεφαλή* dicitur, naturalis figura, Galeno cap. 1. de ossibus, & lib. 9. de vsu partiu cap. 17. & cap. 11. artis Medice teste, est veluti sphaera quædam oblonga, & vtrinq; leuiter in anteriora & posteriora compressa, ita sane ut synciput & occiput aliquantulū emineāt. Quum n. cerebro cerebellum posteriori in parte subiiciatur, & dorsalis medulla illac e capite procidat, priorj autem cerebri sede processus ad oculos, & ad odoratus instrumenta progrediantur, rectissime caluaria, utpote q̄ cerebri est receptaculū & ppugnaculū, prælongam sphaerā refert. ¶ Oēs a. reliquæ ab hac euariantes figuræ, nō naturales, & indecētes censentur. Galeno auctore, capitis non naturalis figuræ potiores, quatuor existūt. Prima ei q̄ naturaliter se habet plane contraria est, in qua ambæ capitis eminentiæ, prior sc. frōtis, & posterior occipitis, amissæ sunt, caputq; ad amissim instat exquisitæ sphaeræ rotundum est. Hac figura Theristes ab Homero donatus fuisse tradit, vbi ait *ποδὸς ἐν κεφαλῇ*, *Acuminato erat capite*. Nihil itaq; mirum hunc omniū aliorū qui Troiam venerant fuisse, ut idem ait Homerus, *ἀσχις*. Nam eiusmodi figura capitis, utpote naturali prorsus contraria, ineptissimæ etiam mentis indicium, propter impeditam omniū virtutum functionem, erat. Pleriq; tamen, omnes capitis acuminata figura præditos *πόδας*, & *ὀξυκέφαλους* appellant. Ita Pericles, qui ut *Quintiliani verbis* utar, non loqui & orare, sed fulgurare ac tonare visus est, oblongiore & acuminatiore capite fuisse dicitur. Hinc a capitis mensuræ congruo & longiore, Atticis poetis *κρονόκεφαλοι*, & *σχινοκέφαλοι*, quod nimirum *Scillam* quæ illis *σχις* vocatur, referret, est cognominatus. ¶ Altera non naturalis capitis figura est, quæ in syncipite fronteve nullam habet eminentiam, posteriorem, & quæ in occipite est seruata. ¶ Tertia, q̄ huic omnino contraria est, nullam in occipite eminentiam obtinet, anteriore tamen manente. ¶ Quarta species est, quando caput ad vtramq; aurem prominentius, quam in fronte & occipite, efficitur. Hæc quidem rarissima, adeo ut Galenus hanc excogitari quidem, non tamen in rerum natura consistere posse affirmauerit. Hoc ipso sane eius figuræ raritatem, ac quam sit plane monstrosa, & humanæ vitæ inutilis innuere volens, quando constet tali capitis figuræ præditos præter formam nihil habere cū reliquis hominibus commune. Atq; hinc est quod Vesalius noster puerum Venetiis multis partibus deformem, & admodum amentem hac figura conspici testes, ut rectissime huiusmodi capitis specie donatos Galenus, quum illis ratio desit, quæ sola homines a brutis differre facit, monstra esse putauerit.

De caluaria, & cur donata sit futuris. CAP. VII.

Quam cerebrum sit rationis sedes ac domicilium, ideo summus rerum Opifex illud tuto quodam munimento custodire voluit, & vndiq; os ipsi instar galeæ circumposuit, quo Græcis nomine *κεράσιον*, Latinis *calua*, & *caluaria*, vulgo testa dicitur. Verum quum omnibus partibus corporis velut tectum quoddam, calidæ domui caput sit superpositū, atque hac de causa omnia quæ a subiectis partibus sursum efferuntur fuliginosa ac vaporosa excrementa excipiat, adeoq; largiore vacatione egeat, galeam siue caluariam cerebro inductam non ex omni parte solidam, sed cauernosam, futurisq; intertextam idē parens rerum effinxit. ¶ Cauernosam quidē ac fistulosam ideo, quia si vniuersa densa solidave simul ac tenuis fuisset, nihilo plus securitatis ex ea constructione subiacentes partes fuissent affecutæ: quæ q̄ os illud vulnerāt, ob viæ breuitatē, intro prōte penetrare potuissent. Si v. crassa simul ac dēla creata fuisset, homini oneri esset, haud secus q̄ si quis

Capitis naturalis figura.

Lib. 9. de vsu part. c. 17. Prima non naturalis capitis figura. Theristes illud.

Lib. 2. ca. 7. Pericles.

Secunda.

Tertia.

Quarta.

Lib. 8. de vsu part. cap. 9. Kεράσιον. Galea. Kεράσιον. Caluaria. Lib. 9. de vsu part. c. 1. Caluaria cur cauernosa. Ibidē ca. 2.

nunc capiti suo sarcinam aliquam alliget, perpetuoque illam gestet. ¶ Reliquum igitur erat tertium, ut neq; tenuis, neq; densa, sed crassa, rara tamen & cauernosa esset caluaria. Hoc enim modo neq; grauatura erat, neq; viam in cerebrū breuē ipsam vulnerantibus datura. Sutura autem intertextā efformauit principio securitatis gratia, ne quādo mora vehementer diducatur & diffiliat. Ne igitur si capiti vehemens aliquis ictus incutitur, prius rumpatur, ipsiusq; ruptura in longiores rimas ducatur, ac veluti per fictile vas in totam caluariā procedat, sed inhibeatur, illicq; cesset, vbi & sauciū ipsum os suturis terminatur ac desinit, caluariam ex multis offib. compingi, & crebris donari suturis, vtile fuit. Necessaria insuper visa est huiusmodi suturarum ratio ad fuliginosorum ac vaporosorum excrementorum transpiratum. Quū itaq; suturarū beneficio fiat, ut caput præ dictis excrementis, & noxiis vaporibus sursum elatis exinaniatur ac liberetur, eas non parum corporis valetudini cōferre perspicuum est. Quod sane Hippocratis etiam cōfirmat testimonium, qui in libro de hominē ita scriptum reliquit. *Saniores capite sunt, qui plures suturas habent.* Vt in maximo versari errore Cornelium Celsum necesse sit, qui lib. 2. cap. 1. capita suturis carentia a dolore esse tutissima, atq; eo capitis valetudinem esse cōmodiorem, quo pauciores sunt suturæ, scribit. Quo etiā errore se contaminauit Carolus Stephanus, vir alioqui doctus, dum libro 1. cap. 8. *sue dissectionis*, hæc Celsi verbatanquam a veritate nequaquam dissidentia producit. ¶ Conducit quoque suturarum in caluaria ratio, ut per eas crassa membrana cerebrum vestiens offi capitis alligetur, vasaque excidant, alia quidem intro, alia vero extra, ut suis locis latius patebit. ¶ Constructæ deniq; fuerūt suturæ pericranii, pducendi gratia. Quippe crassæ seu duræ mēbranæ vincula seu fibræ vna cū vasorum quorundā finib. p suturas foras exciderēs, mutuo sibi occurrunt, & coaptant, ac coalescunt, communemq; ex se ipsis mēbranam pereant, quæ Græcis, eo quod extrinsecus cranion ambit, *περικρανιον* appellatur. Horum autē vinculorum ope accidit, ne cerebri ventriculi, aliaq; nonnulla corpora, quæ distendi & eleuari oportuit, in se collabantur ac concidant.

Quales sint, & quot numero suturæ. C A P. VIII.

Lib. 9. de vfu par. c. 1. **O**ssium quæ ad suturæ generationem adaptantur, vtrumq; eminentiam habet & cavitatem, non vna serie, sed situ alternantes. Est a. eminentia quidem figura vnguib. digitorum potissimum adsimilis: cavitates vero sedes est, huiusmodi figuræ, ut dictū est capite quarto, cōmensurata. Vtrumq; igitur os suis cavitatibus alterius eminentias excipiens, totā figuram articulationis efficit duabus ferris dentes pectinatim, & certa compositione in mutuas cavitates immittentibus simillimam, q̄ Græci *παρὰ*, Latini *suturā* dixerunt. Capitis a. suturæ pro eiusdē figuræ diuersitate variat. ¶ Quippe naturalis capitis figura suturas quinque obtinet, quarū quidē tres veræ dicuntur, ferratiles n. sunt, dentatisq; pectinatim cōpagibus coeunt, & harū duæ vtiq; trāsuerse, quarū altera in syn- cipite est, Græcisq; *σφαγιτια*, Latinis autem *coronalis*, q̄ coronæ in ea potissimū capitis parte collocent, vocatur: Altera in occipitio est, quæ a maiusculæ literæ *A*. imagine Græcis *αμφοδεδής*; & ab v. similitudine *αμφοδής* nominatur. Tertia a mediō posterioris, siue eiusq; in occipite consistit, per capitis longitudinē ad mediū vsq; anterioris suturæ extēditur: hincq; adeo Græcis *δελαια*, vulgo *sagittalis*, q̄ vetu sagittæve instar recta, & satis longe incedit. A virgæ quoq; ductu *παλδεδής* nonnullis appellari cepit. Harū vtiq; trium suturarū figura, Hippocrate quoq; in libro de capitis vulneribus teste, fere H maiusculæ Græcorū literæ similis est. Nec vlla, etsi secus Aristoteli in suturarū enarratione profus aberranti visum est, viris ac mulieribus hac in parte differentiā apparet. Non vacat etiam errore, quod idem Aristoteles eodem in loco scribit, canibus continuam, nec vllis futuris distinctam esse caluariam, quū diligenter horum capita intuenti commemoratas iam suturas, & quas deinceps enumerabimus omnes propemodum, canum caluariæ eleganter exprimant. Ceterum minime mirandum est quod Herodotus scriptum reliquit, inuentum esse inter cadauera Persarum caput nullis prorsus futuris interstinctū, ac ex vno offe solidum, & quod Aristoteles caput viri sine vlla sutura visum esse tradit. Nam valde senum caluariæ suturarum duntaxat situm, idque per quam obscure referunt, nulla interim suturæ imagine conspicua. ¶ Præter iam dictas tres suturas, sunt aliæ duæ, quas *fixas* siue *mendosas* nonnulli iuniorum anatomicorū appellant. Non sunt autem nisi duæ a sagittali sutura quodā modo eque distantes lineæ, per capitis longitudinem vna vtrinque supra

- A** aures porrectæ. Principium harum ab humilima suturæ Δ referentis sede est, quæ hæc prope occipitii inferiora vix amplius suturæ imaginem satis refert. Hinc non nihil præfentes lineæ recta, quodammodo feruntur, & mox sursum ascendentes, instar semicirculi quodā modo ad coronalis suturæ finem prorepunt. Hæ aut sunt duob. mutuo sibi incumbentib. cohærentibusq; ossibus, non p suturam quidē, sed paulatim syncipitis os descendens, instar squamæ attenuatur, atq; in id os, q; infra ab aurib. ascendit, similiter in squamam attenuatum, subintrat, vtriusq; ossibus qua inuicem compinguntur, asperitatem quandam mutuam nanciscentibus. Vnde quum non suturarum speciem, sed veluti duarum inuicem incumbentium squamarum effigiem referant, neq; Hippoc. neq; aliquis aliorum qui accurate rem expendere, suturarū nomine eas dignatus est, sed a squamarū similitudine *λεπτοσύνεσσι μεσοκολληματά*, id est, *squamosas conglutinationes* nominauerūt. a Galenus & alii nonnulli euidentioris doctrinæ studio suturas *νεστροφίας*, hoc est, *temporales* vocarunt. Porro, hoc loco monendū erit, esse quosdam, in quorū etiam numero est Carolus Stephanus, qui coronalem suturam inter fictas mendosasq; falso numerent, nulla sane alia de causa, quam quod Galeni locum qui est in *cap. 1. de ossibus* nō recte intelligāt, vt qui non vniuersum syncipitis os, sed tantum fines eius qui cum temporum osse compinguntur in squamam attenuatos esse tradat. Hactenus quinque peculiare, nulliq; alteri ossi quam capitis naturalis figura præditi ossib. communes suturas duas quidem transuersas, coronalem scilicet, & eam quæ Δ imaginem exprimit, ac vnā quæ recta per capitis longitudinem fertur: duas item ab hac æque distantes, quas *squamosas conglutinationes* nuncupant dissectionum periti enumerauimus. In capitū vero figuris a naturali structura euariantibus ad hunc modū. Galeno teste, se habent. Vbi anterior capitis eminentia abest, sutura coronalis perit, seruata ea quæ Δ refert. Vna cū sagittali, quæ tunc ad medium vsq; superciliorum porrigitur. At posteriori eminentia deficiente, sutura Δ exprimens deperditur, manente coronali, & sagittali interim per occipitii mediū ad caluarię vsq; basim ducta. Quapropter si hanc capitis figuram occipitio inniti sinxeris, vtrāq; remanentium suturarum effigies T. literæ similis erit: quemadmodū & primæ quoq; non naturalis figuræ capitis, suturæ T. referunt, quū illa fronti inniti. Vtrāq; vero eminentiā deperditæ geminæ, q̄ sole seruantur suturæ bifariam se inuicē interfecantes, X. literæ similitudinē referunt. Nā altera quidē transuersa ab vnius auris ad alterius auris regionē
- D** p mediū caput deducitur. Altera vero a parte posteriore, nempe foramine in occipitis osse dorsalis medullæ gratia inciso, p capitis longitudinē ad summū vsq; nasi pertingit, illius ritu q̄ sagittalis appellatur. Hæc n. semper seruatur: reliquæ aut duæ cum totius capitis figura variantes intercidunt. Quarta non naturalis figura capitis omnino pugnantibus cum non naturali suturas obtinet. Transuersæ namque seu coronalis, & illa quæ Δ refert per capitis longitudinem procedunt, recta interim seu sagittali transuersim lata.

De ossibus capitis. CAP. IX.

- R** Eliquum est vt capitis ossa quæ futuris circumscribuntur, simulq; capitis amplitudinem, qua cerebrum continetur, efformant, separatim percuseamus. Sunt autem hæc Galeno septem numero, duo syncipitis, vtrinque nimirum vnum, frontis vnicū, occipitis similiter vnum, duo infra, ad vtranque; videlicet aurem vnum, septimum cuneiforme. Nos clarioris doctrinæ gratia octauum adiiciemus. ¶ *Syncipitis*, quod Græcis *βελγυα* dicitur, ossa duo in vtroque; capitis latere posita sunt, veluti quidam parietes, vnde etiam parietalia vulgo dicta. His ea sutura cōmunis est, q̄ recta per capitis longitudinē ducta, illa ossa inuicem dirimit. In anteriori autē sede, coronali sutura: in posteriori Δ referente ab aliis discernuntur. In inferiori vero, squamæ similibus conglutinationibus terminantur. Hęc quadrilatera sunt, vndiq; sibi similia, nisi vbi instar squamæ attenuantur, temporumq; ossa subeunt. Hic n. tenuissima sunt, sed solida, ac neutiquā, quemadmodū reliqua ipsorū parte, qua temporalib. non obteguntur musculis, fistulosa cauernosaq; inter suas squamas cernuntur. Dein qua frontis ossis cōmittuntur, tenuiora q̄ iuxta occipitii
- F** os apparent. Inter omnia vero capitis priora sex ossa, syncipitis, eo q̄ cauernosa & rara sunt, infirmissima esse solent. ¶ *Frontis*, quam Græci *μετωπον* appellant, os coronali sutura, & ea quæ octauum capitis os terminat, circumscribitur, & illa quæ frontis ossi cum superiori maxilla communis est. Incipit autem hæc a temporum cauo, ac per medium oculorum ducta ad superciliorum vsq; congressum fertur, ac frontis os a maxillæ superio-

290 Operum Leonhard. Fuchſii Pars I.

Vesalius
libr. I. ca. 6.

Mollissi-
ma calua-
riæ pars:

Cui parti
capitis re-
media ad-
hibenda.

Occipitis
os 4. Gale. ca. I.
lib. de offi.
Addita-
menta su-
turæ &
imitantis.

Vesalius
vbi supra.

ris ossibus separat. Est vero frontis os quodam modo orbiculare, nullibi tenuius quam A
vbi superiorem oculorum sedis regionem constituit, & octavo capitis ossi committitur.
Hic enim veluti duobus tenuibus efformatur squamis, in medio vacuis, & aere oppletis,
vbi etiam cavitatis gratia reliqua ipsius parte crassissimū est, ac veluti pruberat. In tem-
poribus id tenue quoque est, ac solidum, minimeque cavernosum, præterquam vbi cū syn-
cipitis osse inibi iungitur. In fronte aut paulo supercilia, & reliquam dein ipsius sedem,
quæ excarnis est, nullam cavitatem ostēdit notabilem, & multo crassius spissiusque quam
syncipitis ossa esse conspicitur. Qua tamen illud iis cōmittitur, & sagittalis futura in co-
ronalem incidit, frontis os tenuius infirmiusque est, quā in ipsa fronte. Atque hæc pars qua
dictæ iam futuræ inuicem committuntur, totius caluariæ pars mollissima rarissimaque ex-
sistit. Quippe ea plane est quæ in nuper natis infantibus adhuc membranea, ac recenti B
caseo similis tangentibus occurrit, & quæ in puerulis quū manducant, & respirant, mo-
ueri & palpari videtur. Neque mirum certe nondum exacte firmatis & resiccatis iis ossi-
bus, cerebri pulsum ac motū ostendi. Ceterū quoniam hæc sedes inter capitis excarnes
partes tenuissima est, & futuræ nusquā laxius hærent, ideo merito ad hanc maxime par-
tem applicant omnes Medici capiti irrigationes, celeriter n. horum præsidiorum vis in-
tro penetrat, veluti fufius Galenus lib. 13. *methodi medendi, cap. 20.* ostendit. Parum tamen
tuto huic loco quidam cauteria vulgo dicta adhibent. ¶ Occipitis quod *ἰπὸν* Græci vo-
cant, os futura & simili, & eiusdem futuræ additamenti, & linea hæc additamenta iun-
gente terminatur. Additamenta vero hæc non sunt, nisi prædictæ futuræ extrema, quæ
iuxta occipitii humiliora non amplius exactam futuræ compagem exprimunt, versusque C
capitis basim protenduntur, ac per mediam basis sedem, quæ præruptæ rupi, & imagine
& duritia similis est, & qua caput primæ cervicis vertebræ articulatur, in anteriora pro-
repunt, mutuo sensum appropinquantia. Proinde occipitis os quinque quodam modo
lateribus constat. Duobus quidem a & referentis futuræ cruribus efformatis, & aliis duo-
bus, quæ ab eiusdem futuræ additamenti sepiuntur, ac demum quinto a linea quæ occi-
pitis ossi & cuneiformi communis habetur, descripto. Hoc os in crassitie inæquale ad-
modum est, neque omni ex parte sibi responderet. Quicquid n. ipsius in occipitio excarne,
& a musculorū exfortibus insertionibusque liberum est, insigniter crassum cernitur, tanto
scilicet osse frontis crassius, quanto illud syncipitis ossium crassitiem vincit. Neque enim
tota excarni parte, æqualem adipiscitur crassitiem, sed ad eius partis radicem in medio D
longe crassissimum est, ea videlicet regione, qua duos maximos duræ cerebri membranæ
sinus, sanguinem & spiritum vitalem venarū arteriarumque instar, cōtinentes, iūgi, aliof-
que duos sinus educere, libr. 6. dicemus. Quippe apparet naturam ossis crassitie huic si-
num concursui prospexisse, tum quod ex ipsius læsione summum homini impenderet pe-
riculū, tum quod hanc occipitii sedem oculis destitutam, subinde percutiendam, ac crebro
in terram variis casibus illidendam non ignoraret. Crassissima occipitis ossis pars intus
cauernulis est oppleta, vtrinque valida obductis squama. Reliqua vero occipitii pars, soli-
da admodumque densa, sed perquam tenuis, neque cauernulis donata est. Hanc aut partē
cerebellū implet. Ne vero propter insignē illam tenuitatē ossis robori male consultum
esset, in huius partis medio, oblongum & lineæ instar exporrectū eminet tuberculū ossis E
robur inibi plurimū adaugēs. Quoniam vero id in internā caluariæ amplitudinē vergit,
duos quasi sinus, vtrinque videlicet vnum efformat, quos *cerebellum* implet. Ceterum habet
hoc ē os maximum, quod sunt in capite foramen dorsalis medullæ gratia exsculptum, *ut suo
in loco latius dicemus.* Ab anteriori aut parto eius foraminis occipitis os maxime in angu-
stū cogitur, atque id sensim ita erassescit, ut insigniter quoque crassum videatur, qua cunei-
formi ossi cōmittitur. Ad latera vero huius foraminis duo habet capitula, quod primæ cerui-
cis vertebræ articulantur, quorum ope caput flectitur & extenditur. Occipitis denique os
intus læue, minimeque asperum est, perinde ac extrinsecus tota ipsius parte excarni. Par-
te aut huic subiecta, & vbi nō minimam capitis basi portionē constituit, id egregie aspe-
rum inæqualeque se offert, ut cōmodius ab ipso ligamenta & musculi quidam pronalce- F
rentur, & rursus alii quidam tutius firmitusque illi infererentur. ¶ Temporū, quod Græcis *νεβ-
ρα* dicuntur, ossa in superiori sui parte circumscribuntur squamosis conglutinationib.
In anteriore vero parte, futuræ quæ cuneiforme os terminat intervallo. In posteriori su-
turæ quæ & refert additamenti. Hæc bina esse constat, vtrinque enim vnum ad suam
aurem

Temporū
ossa 5. 6. Gal. cap. I.
lib. de offi.

- A** aurē positum. Porro quia petræ speciem præ se ferunt, ut Galeno visum est, aut quia lapideam duritiem habent, *λιθοειδής*, hoc est, *petrosa lapideae* nominantur. Donatur autē temporis os tribus processibus quorum vnus oblongus, tenuisque, & per quam solidus est, qui ab acus similitudine Græcis *βελονοειδής*, styli vero scriptorii specie *γερρανοειδής*, & *στυλοειδής*, ac dein a galli calcaris imagine *καλκαριον* vocatur. Ut errare toto cælo necessarium sit Carolū Stephanum, qui *lib. 1. suæ dissectionis cap. 9.* hunc processum pollicis crassitudinem æquare, contra Galeni etiam, omniumq; aliorum anatomicorum sententiam, & manifestum visus iudicium, affirmat. Hic processus etsi solidus est, tamen quū tenuis existit, & admodum prominet, leuissima de causa abruptitur. Alter processus qui in osse temporis habetur, vaccini vberis papillæ imaginē refert, ideoq; Græcis *μυσοειδής*, Latinis autem
- B** *mamillaris*, appellatur. His duobus alius adhuc in temporis osse accedit processus neutriusquam infimus, qui mediam ossis iugalis partem efformat, de quo sequenti cap. latius dimus. Ad huius processus radicem ante auditorium meatum, qui huic ossi, *ut suo fufius loco docebimus*, insculptus est, sinus imprimitur, cui inferioris maxillæ capitulū inarticulat. Reliqua ossis amplitudo fyncipitis os spectans, ampla & tenuis admodum, sed solida & cauernulis destituta est. Exterius læuis, intus vero inæqualiter extuberans. Ad basim vero capitis asperum & insigniter inæquale videtur. Septimum os Græcis a cunei similitudine *σφηνοειδής*, Latinis *cuneiforme*, quod veluti cuneus inter capitis, & maxillæ superioris ossa immittitur, nominatur. Hoc vnicum ac cōiugis expers est, a nōnullis inter capitis, ab aliis inter superioris maxillæ ossa, quum inter vtrāq; mediū sit, numeratur. Multo autē
- C** rectius ossib. capitis, quam superioris maxillæ ascribitur, quum non minimam caluariæ amplitudinis, qua cerebrum reponitur, partē cum reliquis ossibus, quæ ab omnib. anatomicis capiti attribuuntur, constituat. Sed cuiusnam id formæ sit, ac quantæ magnitudinis, quibusq; futuris circumscribatur, nūc recensēbimus. Extrema A referētis futuræ, quæ non amplius exactā futuræ cōpagem exprimūt, ab vtroq; latere versus capitis inferiora basimue protenduntur, ac per mediam basis sedem, & qua caput primæ ceruicis vertebræ articulatur, ut comprehēsum est, in anteriora prorepūt, mutuo sensim appropinquātia. Quum vero iuxta nariū foramina oris amplitudinē spectantia peruenerint, exigua quadam transuersa linea simul iunguntur. Ab hac vtrinq; in latera per temporum caua, obliquis anfractibus sursum ducitur versus anteriorem squamosarum conglutinationum sedem. Hanc postquam attigit in priora modice deorsum ad coronalis futuræ extrema ducitur. Hinc rursus parumper deorsum repit, quousq; superioris maxillæ cōtingat os, q̄ extremum oculi angulū constituit. Hinc decliuus p̄ caua quoq; temporum incedit, inde ad postremos dentes ducta, ad palatum vsq; procedit, & p̄ totam nariū amplitudinem transuersum fertur. Proin Galenus *lib. 11. de vsu partium, cap. 19. & 20.* os palati crebro appellat. Hoc si quod aliud, insigniter varium. Proinde veteres merito id ipsum a multiplici forma *πολύμορφον* nominauerunt. Ad latera n. & in temporum cauis, tenue, & perquam solidum est. In medio autem capitisq; basi qua occipitio heret omnium caluariæ ossium longe crassissimum apparet, & intus paruis cauernulis tenuissimi pumicis modo oppletur. Vnde vulgo *Basilare* dictum est, quod scil. cerebro substernatur, illiusq;
- D** veluti basis sit, aut q̄ alia caluariæ ossa ei innitantur. Præterea cuneiforme os in vacuitatis suæ parte duo grandia ostēdit antra, tenui quopiam osseo septo interstincta, in cuius inferiori etiam sede, exiguum conspicitur antrum. Duo hæc antra singulis foraminib. in narius amplitudinem pertinet, inter spirandum aerem ex narium amplitudine assumentia. Cuneiforme deniq; os vbi ita crassum est, & internam caluariæ partem respicit, sinu quodam donatur, cui natura glandulam, de qua *lib. 6.* latius dicemus, defluxum pituitæ excipientem, imposuit. Ab hoc quidē sinu vtrinq; duo leues meatus, pituitā deferentes, ut copiosius *cap. 15.* & loco iam citato ostendemus, deducuntur. Habet quoq; cuneiforme os in externa parte ad caluariæ basim quatuor processus, vtrinq; binos, & vesperilionum alarum modo prominentes, vnde etiam Græcis *αεγυργιδής* appellantur.
- E** In duarum alarum medio cauitas conspicitur, a qua validus enascitur musculus, qui in ore delitescens, maxillam inferiorem sursum trahit. Huius itaq; musculi exortus gratia hi processus extuberant, tum vt is aptum ex illis duceret principium, tum etiam vt principium ab illistūto custodiretur. *Octauum* capitis os in frontis ossis basi contentum, sutura illa circumscribitur, quæ id a frontis osse, & *Cuneiformi* terminat, & illa etiam quæ

Processus
tres ossis
temporis.βελονοειδής.
Primus.
βελονοειδής.Acus.
Stylus pē-
na.Στυλός,
columna
pertica.Mamilla-
ris.
Secundus.
Tertius.Cuneifor-
me.Os palati.
Vesalius.Os basi-
lare.Sinus cu-
neiformi
ossi inscul-
ptus.Processus
alis simi-
les Gale-
nus cap. 1.
libri de os-
sibus.Octauum
os Eth-
moides.

A tuitam transmittere scriptum reliquerit, quum tamē id ipsum ne per somnium quidem, ut ex iis quæ diximus satis liquet, ipsi in mentem venerit. ¶ Quin error ille magis in imperitum librarium transferendus erit, qui quum vocem *συν* parum forte manifeste exaratum legere haud potuisset, in *συν* dictionem nulla alia de causa mutauit, quam quod paulo post ibidem ossis *συν* fieret mentio. ¶ Atque hanc nostram coniecturam esse veram hinc patet, quod in Aldino Græco codice non *συν*, sed *συν* scriptum sit, quā tñ lectionē, omnes Græcæ linguæ leuiter ēt periti, non esse grammaticā sciunt. Sed desino.

De osse iugali, & ossibus quæ rupi præruptæ assimilantur. C A P. X.

I Nter corporis ossa quædam propriis circumscriptionibus terminisq; destituta, non secus quam si peculiaria essent ossa dissectionum peritis describuntur, inq; ossium numerum cum reliquis referuntur. Cuius quidem generis est os, q. Græcis *ζυγωμα*, *ζυγωδης* & *ζυγος*, Latinis *iugale* nulla alia de causa nuncupatum est, quam quod utraq; ossi, sunt enim utring; singula: boum equorumue iugis a dissectionis professoribus assimilantur. Contat autem os iugale ex duorum ossium processibus inuicem transuersa futura coeuntibus. Posterior autem eius pars tēporis ossis, quod iuxta aures habetur processus est: anterior vero pars illius ossis processus existit, quod partem supercilii extremam, ac vniuersum oculi externum paruumue angulum efformat, ac superioris maxillæ primum os numerabitur. Ut hinc omnibus palam sit, iugale os propriis destitui terminis, aliudq; nihil esse quam duorū processuum mutuo futuræ adminiculo commissorum regionem. Quare vulgus anatomicorū nō ita inepte os paris appellat. Medullæ præterea expers est, solidū, durū,

C atq; instar lapidis ad patiendū pertinax. Huiusmodi n. a natura efformari decuit, q. temporali musculo propugnaculū futurum erat, & illi operimenti ritu proponendū fuerat. Quippe ne ab extrinsecus ipsi incidentib. quæ scil. contundere atq; incidere solent, læderentur, natura ossa dura in orbem, quasi septum quoddam, circumiecit. Natura verō hoc propugnaculo minime cōtenta, temporale musculū in capitis ossib. magna ex parte occultauit, sinū ossib. in sculpens musculo recipiendo apprime idoneū, cauumq; hūc receptū velut antrum cōparans, & hunc vndiq; adiacentium partium tuberib. tanquam promontoriis quibusdam, circūsepiens, ut nimirū hac ratione, quoad maxime liceret, conseruaret, exiguaq; ipsius pars supra ossiū septū extaret. Neq; aut temere omnia hæc natura molita est. Nā inter omnes musculos hic potissimum si læsus fuerit, cōuulsiones,

D febres, caros, & deliria infert: eo q. neruorum principio est proximus, solumq; ipsum os a cerebro, membranisq; eius dirimit. Huc accedit q. plures ēt neruorum furculi quinq; nimirum ut suo dicemus loco, temporali musculo inseruntur. Si igitur veluti Hippo. dixit, quæ propinqua, quæ cōmunia, & quæ prima sunt, maxime lædūtur: nihil aut propinquius cerebro quā temporales muscoli, neq; quiuis aliū musculū per plures neruos cerebro communicat, consentaneum est principium quam celerrime sentire ipsorū mala. Ob eam igitur causam Hippoc. recte dixit *lethales plagas, & caros in temporibus fieri*. Ceterum veteribus, ut c. 1. libri de ossib. testis est Galenus, *συν* ossa vocabantur, quæ petram & effractam rupem non duritia modo, verum etiam imagine referunt. Huiusmodi autem in basi inferioriue capitis sede sunt, qua dorsalis medulla e caluaria delabitur, ac vbi mammillares, & stylum scriptoriū referētes temporum ossiū processus exoriuntur. Præterea hæc ossa omniū vniuersi corporis durissima & solidissima existunt, atq; commodi musculorum exortus & insertionis gratia, præruptæ asperæ rupi ac petræ quam simillima, ut hoc nomine merito veteribus anatomicis petrosa lapideæue appellata sint.

De organo auditus, & ossiculis huius constructionem ingredientibus. C A P. XI.

A Mpla & anfractuosa cavitas temporis ossi auditus organi gratia insculpta est, quæ tortuoso foramine in capitis amplitudinem, cerebri sedē, pertingit: & alio longe ampliori minusq; tortuoso, in externam capitis partē versus aurē exporrigitur. Deinde ab hac cavitate alia duo deducūtur foramina, quorū alterū cæcū nuncupatur, alterum vero eodem quoq; nomine appellari posset, verum nō similiter ipsū cæco anfractuosum angustumq; est, ut cap. 14. huius libri susius docebimus. In foramen itaq; quod capitis amplitudinem spectat, quinti paris alter neruus subintrat, ac præter ramos per angusta illa tenuiaq; foramina ab ipso digestos, insigniori sui portione cavitatem temporis ossi incisam membranz instar vestit, non quidem vniuersam, at quibusdam duntaxat partibus, perinde ac si ea nerui portio in plures diuideretur membranas, aliquot eius cavitatis re-

ζυγωμα
Nomina.
Numerus.
Forma.
Galenus capite 2. libri de ossibus.

Gal. lib. 11. de usu partium cap. 3. Vfus.

Quomodo natura temporali musculo prospexit.

Ossa præruptæ rupi similia.

Organū auditus. Vesalius lib. 1. ca. 6.

Officulu
incudi
compara-
tum.

Officulu
malleo-
mille.

Vesalius
anatomia-
corum fa-
cile prin-
ceps.

Libri de
offi. cap. 3.
Et lib. II.
de usu par.
cap. 19.
Cur ma-
xilla supe-
rior plu-
ribus con-
stitit ossi-
bus.
Nume-
rus ossiu
maxillæ
superio-
ris.
Primum os.
Vesal. lib.
I. cap. 9.

Secundu
os.
Gal. cap. 3.
de offib.
lib. 10. de
usu par.
cap. 11.

gionibus obductas. Atque inter ceteras cavitatis sedes, quæ variæ sunt, & alicubi planæ, A
alicubi pumicis modo foraminulæ, vna est orbicularis & plana, osseo circulo parum-
per extuberante circumdata. Ad huius circuli quinti paris nervo obducti exteriorem,
atq; auri proximam sedem, officulum existit, quod duob. tenuibus acutisq; processib.
tanquam cruribus, huic osseo circulo stabilitur, superius, vbi crura ipsiuscoeunt, spissius
crassiusq; incudis instar effectum. Quod si vero hoc ipsum, quia binis tantum donatur
cruribus, incudi assimilare minus placuerit, molari denti duab. tantum radicibus orna-
to, id conferre licebit. Ceterum inter bina quib. firmatur hui⁹ officuli crura, exterius & au-
ti vicinior, est brevius, & crassius, latiusque, ac in acutum definit apicem. Alterum crus
quod interius consistit, & membranæ orbicularem illam cavitatis sedem succingenti
magis quam exterius crus innascitur, longius nonnihil & tenuius visitur, ipsiusq; extre- B
mum quasi in vinculum cessat, quo membranæ cavitati temporis ossis obnatæ implica-
tur, firmitusque innectitur. Officuli huius pars extra membranam prominens, superius
partim plana, partim rotunda, cernitur, veluti minores incudes effingi solent, quarum
amplior pars plana est, altera, quæ quasi in mucronē definit, instar coni rotunda. Gran-
diores n. incudes omnino planæ depressiæ, & quadrangulæ sunt. Alterum officulū au-
ditus instrumenti constructionem ingrediens, a priori plurimum variat, & alteri mem-
branæ innascitur. Foramen enim cavitatis in temporis osse incisæ quod aurem spectat,
ea parte qua amplitudini cavitatis vicinum est, membranula tenuissima & pellucida ad-
modum obtegitur. Huic membranulæ aliud officulum, vti comprehensum est, innasci-
tur, quod vt validius firmaretur, oblongū tenuemq; processum obtinet. Hoc officulum C
a membrana intorsus abscedens, in rotundū caput definit, q. læue est, & superiori parti
alterius officuli, quod incudi assimilamus, aut molari denti, ita tenuissimarum membra-
narum interuentu committitur, ac si malleus incudi laxè alligaretur, idq; non secus, q. si
officulum, postremo enarratum malleoli præstaret munus: alterū vero incudis vicē ge-
reret. Horum ossium delineationem, vt alia multa, Vesalio nostro, inter dissectores pri-
mario, debemus. Nusquam enim in iis libris, qui hodie existant, Galenus horū officulo-
rum mentionem facit. Quod si tamen hoc sermone prædictorum ossium effigiem non
affecutus fueris, vituli, aut agni, aut alterius animantis cap. in mēsam posito, temporum
os diuidito, vt illorum officulorum constructionem plenius cognoscas. Præstat aut hæc
in crudo capite, quam cocto examinare, & in homine potius quam alio quouis animali. D

De maxilla superioris ossibus. CAP. XII.

SUPERIOR maxilla, quæ Græcis ἡ ἄνω maxilla, aut ἴρις dicitur, Galeno etiam teste, non vni-
co, sed pluribus constat ossibus, idq; sane non temere, vt nimirum ad patiendum fiat
pertinacior, ne statim vna eius particula laborante, vniuersa affligatur, sed quo malum
ipsum vna cum osse, vt capite 5. huius libri dictum est, desinat. Insuper quum non omnes
eius partes æque solidas, densas ac duras fieri oportuerit, illam quoq; ex pluribus consti-
tui ossibus fuit necesse. Sunt aut hæc, præter tenuia quædam fungosa & veluti membra-
nea ossicula, quæ in narium amplitudinis summo in exsiccatis caluariis impenſe cartila-
ginea obseruatur duodecim, utroq; scilicet latere sena. ¶ Primum maxillæ superioris os,
alteram ossis iugalis partem constituit, & nonnihil temporis, superciliq; ac sedis oculi, E
totum scilicet exteriorem angulum, in se complectitur, & ad eam vsq; partem, quæ mala
vocatur, procedit. Committitur autem hoc os temporis ossi, interuentu futuræ, q. duos
processus ossis iugale efformantes iungit. Dein committitur ossi cuneiformi, eius futuræ
beneficio, quæ per caua temporū decliuus ducta, etiam in oculi sede conspicitur, huicq;
primo maxillæ ossi, & cuneiformi communis est. In superiori parte nequitur frontis ossi,
ea sede qua supercillii extremum habetur. Inferiori aut parte in signi amplitudine quar-
to ossi compingitur, futura quæ tribus locis conspicitur: in cauo nimirum temporū sub
osse iugali, in anteriore maxillæ regione iuxta malam, & in oculi sedis inferiori sede. Ad
hunc igitur modum primum os circumscribitur, quatuor, vt cōprehensum est, ossibus
commissum, temporis scil. ossis processui alteram iugalis partem constituenti, dein cu- F
neiformi, & frontis, & quarto maxillæ ossibus. ¶ Secundum maxillæ os reliquis omnibus
minimum, & squamæ modo tenue, in interno, siue magno oculi angulo consistit vbi fo-
ramen habetur, cui caruncula præest internū oculi angulum occupans: quæ in hoc crea-
ta est, Galeno teste, ne quid pituitosi excrementi a cerebro ad oculos expurgati, in genas
defluat,

- A** defluat, sed totum per id foramen in narium amplitudinem procumbat. Officulum hoc superiori parte modico interuallo suturæ terminatur, frontis os a superiori maxilla distinguens. Hinc suturæ illius interuentu id ipsum frontis ossi committitur. Ab hac sutura alia per posterius officuli latus descendit, quæ per ipsius officuli inferiora repens, per anterius ipsius latus sursum in eandem futuram quæ frontis os a superiori maxilla dirimit, denuo ascendit, ac in orbem pene fertur. Contingit itaq; præsens officulum superiori parte os frontis posteriori tertium maxillæ os, inferiori vero, anterioriq; quartum maxillæ os. ¶ *Tertium* superioris maxillæ os similiter ac secundum tenue, & squamæ modo pellucidum cernitur. Quum effringitur intus sinibus aere oppletis amplisq; scatere videtur. Paulo minus toto quadrangulum est, in interno latere oculi repositum. Superius terminatur sutura frontis ossi, & superiori maxillæ communi. Anterius communem futuram cum secundo maxillæ osse adipiscitur. Posterius cum cuneiformi osse futuram communem obtinet. Inferiori parte cum quarto maxillæ osse cōmuni sutura donatur. Vnde quatuor ossibus tertium hoc os connectitur, superius nimirum frontis ossi, anterius secundo maxillæ ossi, posterius cuneiformi, inferius quarto maxillæ ossi, Galenus secundum & tertium iuncta pro secundo numeravit. Vnius itaq; ossis loco duo illa de Galeni placito recensentur. Fuerunt nonnulli anatomici qui tria hæc ossa, ut ibidem Galenus testatur, vnum esse os tradiderunt: q; scil. varias quibus distinguuntur suturas vel omnino non viderint, vel rāquam exiguas dedita opeta prætermiserint. ¶ *Quartum* superioris maxillæ os reliquorum ipsius ossium longe maximum, superiorum alterius lateris dentium alueolos sibi insculptos habet, ac variis futuris circūscribitur. Primum n. terminat sutura illa, q̄ primum os a quarto discernit, hoc est, ea q̄ simul in cavis temporum & in anteriore maxillæ regione, & in oculi sede conspicitur. ¶ *Deinde* futuris secundum & tertium maxillæ superioris ossa ab ipso separantibus, quæ per vniuersam oculi sedis longitudinem in inferiori eius sedis parte, & anteriore regione secundi maxillæ ossis ducuntur. Supera iuxta superciliorum medium quartum os sutura finitur, superiorem maxillam a frontis osse dirimente. Hæc ducitur ab anteriori sede secundi ossis, ad exterius latus ossis nasi. Per longitudinem vero ductus foraminum nasi, quartum maxillæ os ab illorū foraminum septo sutura interstinguitur, per humilimam septi partē prorepente. In posteriori autē sede præsens os a cuneiforme disiungitur, tum in oculorum sede, tum etiā iuxta intimum dētem, vbi sutura cuneiforme os a superiori maxilla finiēns cōstitit. In palati siue versus interiora quartum os transversa sutura a sexto osse distinguitur. His futuris alia accedit per palati longitudinem prorepens, nō solum in palato, sed & in narium amplitudine conspicua. In anteriori quoq; maxillæ sede hæc sutura sub naribus ea parte videtur, vbi superioris labri sulcus cōstitit. Præsens os magna ex parte latera, & inferiorem sedem narium constituit, & ad hæc latera admodum cauum est, & neutiquam solidum, sed cereis imaginibus intus vacuis persimile. ¶ *Quintum* maxillæ superioris os ex duobus nasi ossibus alterum est, officulum videlicet durum, solidum, latum, tenue, oblongum, & quadrangulo potius, quam triangulo simile. Superiori enim partē non in acutum desinit angulum, verū adeo obrusum est, ut inibi duob. donetur angulis. ¶ Terminatur autem illic sutura quæ frontis os a superiori maxilla dirimit. Externum ossis latus communem futuram nanciscitur cum quarto maxillæ osse, quæ secundū nasi latus tantum decliuis pertingit, quanta quinti huius maxillæ ossis est longitudo, q̄ in homine multo quam canibus & simiis breuior existit. Internum autem ossis latus quo coniugi suo committitur, futuram obtinet harmoniæ nō admodū dissimilem, ac vtrisq; nasi ossibus communem. ¶ Hæc a medio superciliorum ex sutura frontis ossi & superiori maxillæ communi incipiens, decliuis per ossium nasi longitudinē porrigitur. Inferiori autē parte hoc quintum os sutura non intercipitur, neq; alteri ossi iungitur, sed vna cum suo coniuge asperum inæqualeq; est, & in cartilaginē finit deorsum progredientem eoq; molliorē, quo longius ad nasi apicē defertur, quas quidē cartilagines suo priuatim loco prosequemur. ¶ *Sextum* maxillæ superioris os, cum suo pari, non minimam palati & narium amplitudinis portionē cōstituit. Situm n. est ad palati extremū, quare nares in fauces, vel (ut Galenus ait) narium foramina ad palatū, tendūt. Estq; os tenue, sed solidū, latumq; Id posteriori sede partim cuneiformi cōmittitur ossi, partim liberum est semiparenthesis (formam referens. Vbi cuneiformi ossi committitur illa circumscriptum est sutura.

Tertium os.

Cap. 3. lib. de ossibus.

Quartum

Quintum.

Sextum.

cap. 3. libri de ossibus.

ra, quæ iuxta posteriorem intimi dentis sedem fertur, maxillamq; superiorē a cuneiformi osse dirimit, ea potissimū parte vbi cuneiforme os suos educit processus vespertilionum alis similes. Anteriori parte & externo latere futura terminatur ipsi & quarto maxillæ ossi communi, ac transuersim in palato ductæ. Interiori autem latere quo se coniugi suo iungit, futura quadam dirimitur, quæ vtriusque lateris sexto ossi dūtaxat communis est, portioque illius est, quæ per palati longitudinem prorepens, quarta maxillæ ossa inuicem separat. Hactenus sex alterius lateris maxillæ ossa descripsimus, quæ si senis alterius lateris cōnumerentur ossibus, in vniuersum maxillæ superioris ossa duodecim erunt. Atq; hæc est maxillæ superioris in capite humano descriptio, quæ ei nequaquam per omnia respondet, quam *c. 3. libelli de ossibus* Galenus, vel quisquis tandem huius scripti auctor fuit, refert, vt pote quæ partim canino, partim humano capiti congruit. Nam vt cetera omnia præteream, hoc certe omnibus est manifestissimum, nō esse in humano capite peculiaria ossa, quibus incisorii dentes, vt auctor iam citati libri diserte affirmat, infiguntur. In canibus autem, simiis, porcis, aliisque animantibus quibus canini vocati dentes validi exertique contigerunt, duæ manifeste videntur futuræ, aut potius harmoniæ, quæ ab ea parte qua quintum maxillæ os, quod nasi alterum vt diximus, existit, a quarto distinguitur, oblique deorsum inter caninum & incisorium canino proximum dentem deducuntur. Quod cur non animaduernerint Carolus Stephanus, & alii quidam, valde miror, nisi quod putē anatomica sua sine *autoptia* ex aliorum commentariis magna ex parte contexuisse.

Carolus Ste-
phanus.

De inferiori maxilla. CAP. XIII.

Lib. 4. de
admi. ana-
tomi.

Maxilla ho-
mini, cur
breuissima.
Lib. II. de v-
su par. c. 20.

Numerus
ossium ma-
xillæ infe-
rioris c. 6.

Lib. II. de v-
su par. cap.
vlt.

Duo vtrin-
que maxil-
læ inferio-
ris proces-
sus. Galenus
ibidem.

Vesal. c. 10.
lib. I.
Peculiaris
in maxilla-
rum articu-
lo cartila-
go.

Maxillæ in-
ferioris fo-
ramina.

INter omnia animantia, Galeno etiam attestante, homo inferiorem maxillam, quæ Græcis *ἡ κάτω σιαγόνη*, ἡ γένυς vocatur, pro totius corporis mole breuissimam adipiscitur. Homini namque facies obtigit rotunda, non longa, vt ceteris animantibus, quæ quoniam manibus carent, cibum sumtura inclinantur. Duram vero vt ceteris animantibus fieri decuit, quod sola mobilis sit, & varios ac fortissimos in mordendo, mandendoque, ac corpora dura comminuendo, motus sustineat. Ceterum ne sic dura solidaque nimio pondere ipsam mouentibus musculis incommodo foret, sinus & cavitates notatu dignas, medullaque infarctas obtinet. Sinus hi non adeo in posteriore maxillæ parte, veluti in quadrupedibus exsculpuntur, sed antrorsum magis versus menti, quod Græcis *γενυς* dicitur regionem, & ad maxillæ latera. Plurimis animalibus maxilla inferior duobus constat ossibus, in summo mento, vbi maxilla illis in acutum desinit, mutuo per vnionem nexis. Homini autem, vnico conformatur osse, ac in summo mēto lata, neq; vt in ceteris animantibus, acuta cernitur. Nullaque parte maxilla difficilius, quam in mento discinditur. Quod vero auctor libri *de ossibus*, tradit, *maxillam inferiorem non esse os simplex, quod coctum in summa menti extremitate laxetur ac dissoluatur*, de aliorum animantium maxillis intelligendum erit. Canum enim bouumque, & asinorum maxillis, etiam citra coctionem inuicem modico conatu nonnunquam diuelluntur. Nisi quis cum Galeno, diuisionem illam, propterea quod hæc duo ossa in adultis per coalitum ac symphyin firmissime annexa sint, non esse perspicuam dicere velit. Quo haud dubie respexerunt, qui geminum eius esse os in homine statuerunt. Desinit inferior maxilla vtrinque in duos processus, quasi bicornes, quorum alter infra latior, deinde in mucronem finiens, vertice ipso tenuatur, musculi temporalis tendinis insertiōem validissime excipit, totus ab illo tendine complexus. Alter, qui posterior est, in capitulum trāsuerim oblongum finit, quod sibi correspondenti sinui inarticulatur, qui ad iugalis ossis radicem, & anteriorem auditus instrumenti sedem in temporis osse incisus est. Huic sinui, vt etiam capitulo maxillæ, cartilago crustæ modo obducitur. Verum præter hanc cartilaginem omnibus articulis pariter communem, inter sinum capitulumque, alia reponitur cartilago læuis, tenuis & mollis, ligamentiq; naturæ, quod ad substantiam pertinet, non nihil compos. Hæc ossibus nusquam adnascitur, sed tantum ligamenti articulum in orbem cōtinentibus, istius cartilaginis ope, durorumq; præsentis articuli ossium imperus exsoluitur, & quo minus mutuo affrictu inualidis assiduisque maxillæ motib. ossa rumpanitur, pulchre præstat, vna cum cartilagine sinui & capitulo obnata. Insuper inferior maxilla duobus vtrinque donatur foraminibus, atq; alterum quidem in interiori ipsius regione,

A

C

D

E

F

- A** regione, non procul a nunc commemoratis processibus, cernitur: alterum vero, in exteriori sede ad labri inferioris radicem, latiusque. Interius quidem, quod & amplius, & inæquale seu asperum est, per longitudinem maxillæ tendens, viam præbet portioni nervi tertii paris nervorum cerebri ad dentium radices dispersæ, vna cum venula, & arteria, quæ dentibus & inferiori maxillæ nutriendis, hoc foramen subeunt. Exteriorius vero, eius nervi sobolem ex maxilla in humilior labrum sinit procidere, estque longe minus interiori. Porro si setam exsiccata maxillæ interno foramini indideris, eam ab hoc foramine ad externum vsque leui opera ferri conspicias. Et vbi maxillam effregæris, continuum iter ab vno foramine in alterum canalis modo cælatum obseruabis. Præter iam dicta foramina in maxillæ externa superficie alia prorsus nulla reperies, nisi forte
- B** alueolos, præsepiolaue, quibus dentes infiguntur, illis annumerare velis. Ceterum maxilla vbi dentes ipsi non infiguntur, eaque sede qua commemoratos nuper educit processus, latissima, & si latera spectes, tenuissima, intusque ac exterius quasi amplo & in superficie tantum cauato sinu insculpta visitur, quo aptius muscoli maxillæ, præter temporalem musculum attollentes, insertionem molirentur, isque qui illorum in ore delitescit, minus sua crassitie ac mole faucium angustiam infarciret, ita vt intus magis quam foris, maxilla merito insinuetur. Quinetiam huic latiori maxillæ, sed id separatim accidit, quod aspera inæqualisque cernitur, idque potissimum iuxta huius sedis inferiorem posterioremque regionem. Quod etiam musculorū insertionis occasione rerum opifex machinatur, non ignorans asperis inæqualibusque locis promptius aliquid adherere, adnascique, quam planis & glabris. Hac etiam gratia interior maxillæ sedes ad mentum aliquot tuberculis asperitatibus extuberat, vt musculi, quorum ope ipsa deorsum trahitur, suam insertionem validius conficerent, ac deniq; nonnulli linguæ peculiare musculi hinc aptius enascerentur. Tale quid etiam vsu venit in externa inferioris maxillæ sede, ad summi menti regionem, vt hac ratione labri humilioris musculi commodius illinc, pronascerentur.
- C**

De Dentibus. CAP. XIII.

- D**entium, qui Græcis *ὀδόντες* dicuntur, substantiam esse osseam, adeoque eos in numero ossium esse habendos, notius est, quā vt demonstrari a nobis prolixè debeat. Horum tamen durities, sicut in molari lapide, maior est, quam in ceteris ossibus, vt ad conterendos cibos sufficerent. Hi vero, ne nudi magis horrore, quam ornamento essent, gingiuis mollioribus, ac dein labiorum tegminibus honestati sunt. Inter ossa autem solos
- D**entes natura sentiendi facultate, vt multis locis Gal. præsertim vero lib. 5. c. 8. de compos. medicamentorum local attestatur, præditos esse voluit. Quippe eorum radicibus applantantur molles quidam neruuli, a tertio nervorum cerebri pari, vt præcedenti capite dictum est, propagati, quorum gratia euidenti inter ossa sentiendi facultate donantur: Nouerat enim rerum Opifex hos crebro occursuros iis quæ secant, vel frangunt, vel rodunt, vel valide excalefaciunt, aut refrigerant, vel alia quauis occasione alterant. Quapropter si nulla sentiendi vi præditi essent, a dolore homo neutiquam admoneretur, neque denti succurreret, quod infestat amoturus, priusquam molestati dentes vitiarentur. Dentes
- E** prætereane continuo ciborum attritu consumantur, perpetuum fere incrementum accipiunt, possuntque de Galeni sententia vsq; ad quintum & quadagesimum annum crescere & enutrirī, mutarique fere intra septimum annum solent. Sunt autem plurimum dentes numero triginta duo, vna serie in ytraque maxilla, tam superiore, quam inferiore, sedecim. Priores quaterni, quia secant, Græce *τομαῖς*, Latine *incisores* appellantur, sunt enim acute ac lati, quo oblatum ipsis cibum mordendo cultri instar promte incidant, & confringant. Vocantur etiam *διχασμοῦ*, quasi *diuisores*, quod scilicet cibum diuidant. Item *κτῆνες*, id est, concisores, quia comminuunt cibum. Et *μαλακιστοί*, quod inter ridendum nudentur ac detegantur. Horum vero lateribus adiacent in qualibet maxilla duo alii, Græcis *κυνόδοντες*, Latinis *canini* dicti, quod exsertis canum, qui hos insignes habent, dentibus similes sint, inferiore quidem basi, gingiuis proxima, lati, parte autem superna acuti, vt si quid propter duritiem ab incisoriis non scinderetur, hoc illi frangerent. Post hos sunt Græcis *γόμφιοι*, Latinis *maxillares* dicti, quin ab utroque latere plurimum, asperi, duri, ampli, & magni, vt incisa ab incisoriis effractaque a caninis in læuorem exactum terere queant. Si enim læues prorsus

Dentes esse ossia. Cap. 5. libr. de ossibus.

Dentes sensu præditi.

Dentes crescant, & nutriuntur.

Dentium numerus. Lib. 11. de v. su partium, cap. 8. Incisores octo. Διχασμοῦ. Diuidō. Τελόδοντες. Canini 4.

Maxillares 20.

creati fuissent, manus suam obire minime potuissent, ab asperis enim, & inæqualibus omnia melius comminuuntur. Hinc est, quod molæ etiam, quibus fruges moluntur progressu temporis diuque minuendo ac terendo læuigatæ, rursus incidantur, & aspererentur. Neque si asperi essent, non autem duri plus commodi ex iis esset, ut qui prius cotererentur quam cibos in læuorem comminuere. Quinetiam si asperi & duri essent, non autem ampli, neque tales plus commodarent, siquidem ea, quæ leuissime comminui debent, læti & amplis basibus, firmata esse oportet. Incisorii enim & caninis nihil, propter strictam & angustam eorum aciem, comminuitur. Quod si hæc omnia molares haberent, parui autem essent, nonne & in hoc solo reliqua quoque ipsorum vilitas labefactaretur? quod longissimo tempore ad atterendos comminuendosque cibos nobis opus esset. Hos sane non solum a loco cui infixi sunt maxillares, verum etiam

Molares
cur dicti.

Græcè *μύλας*, & *μυλέτας*, Latine autem *molares*, quod videlicet iis cibi veluti cereales fruges molis tenuantur & atteruntur, appellare consueuerunt. Ceterum dentes ad vnum omnes in vtriusque maxillæ sinibus clauorum ritu infiguntur, adeoque per gomphosim illis committuntur, qui sane sinus, siue ossa quibus continentur propter similitudinem quam cum brutorum præsepibus obtinent, Græcis *πράσπια*, Latinis *præsepia* nuncupantur. Singulos namque dentes *præsepia* hæc circundant, hosque stringunt, atque adeo exacte continent, ut non facile vel tantillum concutiantur, ac commoueantur. Neque paribus radicibus omnes suis inseruntur præsepibus. Quippe paruis vna radix, maioribus vero duæ, maximis tres, & quatuor obtigerunt. Incisorii enim singulis nituntur radicibus. Canini quoque radices singulas habent, qui incisorum radicibus multo altius infiguntur, tantoque maiores sunt, quantum caninorum robur excedit. Quanquam & inter incisorios duo medii insignioribus hæcant radicibus, quam duo laterales, caninis proximi, nimirum quæ medii latiores grandioresque sunt. Molares radicibus inter se variant. Nā qui inferiori maxillæ infixi sunt, binis radicibus: qui superiori, ternis subinde infiguntur. Differunt tamen & hi interdum. Qui namque supra sunt, quaternis, qui infra, ternis radicibus niti aliquando deprehenduntur, præsertim duo, denti intimo proximi. Deinde frequentissime duos molares superiores canino denti succedentes, duabus tantum infigi radicibus spectabis, tres reliquos ternis, sic & duos inferiores canino proximos vna radice tres reliquos duabus. Porro incisoriorum & caninorum dentium numerus, raro in hominibus, ut molarium, mutatur. Interdum enim in vtroque latere quinque molares occurrunt, interdum quatuor, nonnunquam quatuor a sinistris, quinque vero a dextris, vel contra in sinistris quinque, ex dextrisue quatuor: vel infra quatuor, supra autem quinque. Hanc differentiam potissimum pariunt postremi dentes, quos quia sero gigni solent, omniumque vltimi & nouissimi sunt, *Genuinos* nominarunt. Hi omnium sunt reconditissimi, ac propemodum gingiuis operti. Hinc illi, qui clanculum obtreçant, lacerantque, *Genuino mordere*, aut *Genuinum insigere* dicuntur. Post pubertatem, Venerisque usum hominibus, ac maximis cum cruciatibus emergunt. Vel, ut *Aristoteles lib. 2. de historia animalium cap. 4. & lib. 5. de generat. animalis. cap. vlt. ac Plinius lib. 11. cap. 37. auctores sunt*, circa vigesimum annum, multis etiam octogesimo anno, non sine maximo dolore, ut dictum est, prodeunt. Quo circa Græcis *σπερσισσίνες*, quod scilicet eo tempore quo sapere solemus producantur, ut *libro 2. Iulius Pollux testis est*, & *δύστροι*, hoc est, serotini, & *καρτίτες*, quasi *ætatem perficientes, ac complentes*, appellantur. Vulgo *dentes sensus & sapientia* dicuntur. Ceterum fossulæ siue alueoli, quos dentes subeunt Græcis *βόδεια*, a foueæ similitudine vocantur. Præter vsus paulo ante dictos, ad vocis etiam modulationem iuvant dentes. Ad literas enim exprimendas plurimum conferunt primi & incisorii dentes, ut *lib. 3. de partibus animalium, cap. 1. Arist. fusius monstrat*. Dentes præterea puerorum imperfectis & mollibus, ac quasi medullosis constant radicibus, dentiumque pars extra gingiuas conspicua, dentis radici appendicis modo committitur. Quare diligentissime expendendum est, ne pueris effracti alicuius ex casu dentis reliquam portionem vnquam eruamus, sed duntaxat appendicem, in cuius locum alia, modo radix seruetur, promte succrescet.

De ossium capitis, & maxillæ superioris foraminibus. CAP. XV.

QUum in venarum, arteriarum, & neruorum historia foraminum capitis ignorantia non parum obscuritatis pariat, ideo, ut hoc loco prius quam a capite digressi, alias partes

Molares
cur dicti.

Quo pacto
et dentes
maxillis in-
figuntur.

Dentium
radices.
Lib. de Ossi-
b. c. 5.

Genuini
dentes.

Κεραία &
Κεράτω,
perficio A-
uicenna.
Fen. 1. cap. 1.
Usus den-
tium.

- A** partes attingamus, de iis accurate differamus operæpretium erit. Ut autem in vasorum, & neruorum, quarundamque membranarum cerebri enarratione dissectionis, studio-
 si huc recurrentes singula foramina; quorum tum mentio incidet, prompte inuenire
 queant, ea ordine quodam complectentes percensebimus. *Primum* foramen ad me-
 dium supercilii incisum est, quo ramus minoris tertii paris neruorum cerebri radice
 ex oculi sede ad frontis musculosam cutem dispergitur. Hoc in utroque latere non sem-
 per perfectum orbiculareque existit, sed subinde sinus duntaxat semicirculi ritu excul-
 patus apparet. Aliquando in vno quidem latere foramen, in altero autem semicircula-
 ristantum sinus, cernitur. Foramen hoc frontis ossi proprium est. *Secundum* foramen
 est, quo dictæ minoris tertii paris neruorum cerebri radice soboles, ex oculorum sede
 in genas ad superioris labri, & alarum nasi musculos procidit. Præsens foramen instar
 oblongi meatus in quarto superioris maxillæ ossis insculptum est, & in anteriori maxil-
 læ sede foraminis huius ductus penitus in osse cæatur. Per oculi vero sedem, tantum
 tenui ac squamæ simillimo osse tegitur. *Tertium* nunc dicto amplius, quod ex magno
 internoue oculi angulo in narium cavitatem recta deorsum pertinet, secundo superio-
 ris maxillæ ossi, & quarto pariter commune. Istud portiunculæ minoris tertii paris ner-
 uorum cerebri radice viam præbet, & nonnihil pituitæ ex cerebro ad oculi sedem con-
 fluentis, ad nares transmittit. *Quartum* foramen omnium, quæ in oculi sede conspiciun-
 tur facile maximum, commemoratæ iam sæpius minoris tertii paris neruorum cerebri
 radice ramulo, in temporalem musculum & manforium ex oculorum sede porrecto
 viam præbet. Neque huius duntaxat neruuli nomine patens illud, oblongumque for-
 amen exsculptum est, sed musculi temporalis exortui hinc quoque robur accedit. Pi-
 tuitæ etiam, ad grandius in narium cavitatem perringens foramen, defluenti, viam dat.
 Ceterum quum hoc profundius latet, & haud facile in conspectum veniat, ideo pe-
 culiare illi numerum assignare nolimus. Rima hæc, seu oblongum foramen, ad Cu-
 neiforme, & quartum superioris maxillæ os pertinet. *Quintum* foramen in sedis oculi
 radice seu vertice elatissimum, & in cuneiformi osse incisum, quod foris qua oculi se-
 dem spectat, prorsus orbiculare cernitur, neruo visorio, cuius gratia exsculptum est, am-
 plitudine respondens. Verum interius ubi cerebro propius accedit, iuxta externum ip-
 sius latus, exiguum eundemque acutum angulum obtinet, qui venulæ cum visorio ner-
 uo hac excidete paratur. Huic sinui cuneiformi osse inciso, visiorum neruorum coi-
 tus immittitur. *Sextum* cuneiformi osse insculptum, ac humiliori sui parte, paulo minus
 toto orbiculare est, elatiori vero in acutum longumque & angustum angulum definit,
 foramen hoc nervi visorii foramen amplitudine vincit. Celatur gratia secundi paris
 neruorum cerebri, in oculi sedem ad mouendos oculi musculos progredientis. Dein
 causa minoris tertii paris neruorum cerebri radice, quæ frontis cuti, superis maxillæ
 in facie musculis, in nares & musculos inferiorem maxillam attollentes, digeritur. Hæc
 quidem per humiliorem foraminis sedem procidunt, vna cum insigni soporalis arte-
 riæ, quam reticularem plexum in homine quidam efformare comminiscuntur, ramo.
 Verum per elatiorem foraminis sedem, quæ in angustum longumque cogitur angu-
 lum, vena ex oculorum sede, ab illis quæ temporalem adeunt musculum, duræ mem-
 branæ hic distribuitur. Neque nervis his duntaxat, & venæ, & paulo ante dicta insigni
 arteriæ amplum id foramen excauatur, verum etiam pituitæ ex cerebro in oculi se-
 dem, & hinc in narium amplitudinem promananti. *Septimum* foramen orbiculare, &
 in osse longius quam duo proxime commemorata procedens, & arctius quoque, in cu-
 neiformi osse cum reliquis neruuli gratia exsculptum, qui non procul a præcipua ma-
 ioriue quinti paris radice pronascitur. In *octauo* capitis osse multa, sed exigua spe-
 ctantur foramina, odorum, & aeris inspirationi ad cerebrum ingressus nomi-
 ne, incisa. Hæc non ut hætenus ducta, ampla sunt, sed cribri, spongiarumque fo-
 raminiibus similia. Inter reliqua tamen utrinque vnum est rectum & grande satis, quod
 primum quodammodo est, & anticæ frontis ossi sede proximum, venam ad duram
 cerebri membranam ex narium amplitudine exporrectam transmittens. His certe
 nunquam nisi oppleto cerebro, quod Galenus etiam abunde testatur, pituita excolatur,
 & leuissima pituitæ copia hac defluente, ea foramina obturantur, aliaque grauedinis
 symptomata inducuntur. Hæc quia varia ac multa sunt, ut comprehensum est, ideo in

Vesalius
lib. I. c. 12.
Primum fo-
ramen.

Secundum.

Tertium.

Quartum.

Quintum.

Sextum.

Septimum.

Foramina
odorum &
aeris ingres-
sus nomi-
ne incisa.

Lib. 8. de v.
su partium
cap. 6.

300 Operum Leonhard. Fuchsi Pars I.

numero eorum, quæ vno in latere vnica sunt, haud comprehenduntur. Cavitas præter. A ea quædam est inter duas frontis os constituentes, squamas reposita, aerem adoratui mirifice necessarium in se concludens plurimū. Hinc est quod iis quibus Gallico morbo anterior frontis ossis squama eroditur, aut vulnere perfringitur tanto impetu in expiratione aer ex cavitate illa propellatur, vt etiam is candelæ lumen promptissime extinguat. Qam itidem in foraminum numero non censebimus. Rima denique talis formæ, qualem vnguis apice quis ceræ imprimeret, duræ cerebri membranæ hic formandæ extruitur. Necesse enim erat, non hic solum, vbi ea membrana multis foraminibus peruia est, verum etiam aliis compluribus locis caluariæ alligari, & duram membranam, fibras, vinculaque per caluariam transmittere. Et hanc quod foris nusquam compareat, in foraminum numero nō recēsemus. Sinus quoq; illic in cuneiformi osse inci-

Sinus glandulam continens.

sus, ac glandulam, cui ex cerebro defluens pituita instillat, continens, apparet. Ab hoc quidem sinu vtrinque duo deriuntur ductus, sinuum modo exsculpti, quorum prior superiorue ad sextum foramen in oculi sedis radice constitutum tendit, & pituitam in oculi sedem, & hinc per foramen tertium, & aliud cuius in quarti foraminis enarratione mentionem fecimus, deferit. *Inferior posteriorue* sinus ad asperum inæqualeque foramen seu rimam potius deorsum porrigitur, qua pituita ori palatoue potissimum influit, & aer quoque inter spirandum caluariā petit. Rima hæc temporis ossi & occipitii communis est, & in capite nostro N notata. Hæc itidem, quia foraminis ritu rotunda nō est,

Octauum.

in foraminum numero nobis non comprehenditur. *Octauum* foramen ad latus inæqualis asperæque rimæ versus anteriora magis occurrens, ac cuneiformi ossi incisum, læue est, & non adamussim orbiculare, sed circulo vtrinq; modice in longum compresso respondet. Hac enim in effigie foramen in sinuari decuit, quod duo rotunda corpora, inuicem membranis connexa: erat transmissurum. Tertiū namque paris neruorum cerebri crassiori, & præcipuæ radici, simul cum quarto pari, viam præbet. *Nonum* ad externum foraminis iam dicti octauī latus in cuneiformi osse existit, multo priori minus, & exacte orbiculare, quo internæ iugularis venæ portio a soporali abscedens arteria, caluariam subintrat. *Aliquando* exiguum foramen ad internum latus foraminis octauī, duo paulo ante commemorata neruorum paria transmittentis, observatur, eiusdem venulæ ramo paratum. Verum id in vno caluariæ latere raro visitur, atque adhuc multo rarius in vtroque. Atq; hoc ordine *decimum* erit. *Vndecimum* foramen in externa caluariæ

Nonum.

Decimum.

Vndecimū.

basis parte obuium, & oblique versus exteriora protensum, in auditorii instrumenti cavitatem temporis ossi insculptam definit. Efformatur autem id, vt viam porrigat quintæ coniugationis neruorum cerebri ramulo, ab auditus organi cavitate hac ad musculos inferiorem maxillam attollentes excurrenti. Hoc quoque foramine iugularis interna soboles, auditus instrumentum petit. Ac aer etiam in temporis ossis antrum auditus instrumento proprium, per id foramen fertur. *Duodecimum* insigne foramen est, maiori soporalis arteriæ ramo caluariam ingredienti excauatum, quod non recta caluariam perforat, sed instar oblongi meatus ex posterioribus oblique introrsum in priora temporis ossi insculpitur. Ossis pars hoc foramine peruia, vbi deorsum ad fauces spectat, instar pumicis aspera inæqualisque visitur. Hunc vero obliquū & in osse longo tramite procedentem ductum, natura effinxit longioris obliquiorisque arteriæ soporalis progressus gratia, nimirum vt vitalis spiritus hoc errabundo ductus itinere, cerebro exquisitus præpararetur. Galenum, hoc foramen latuisse videtur, vt qui per foramen octauum soporales arterias caluariam ingredi in suo de *Simia venarum arteriarumque dissectione libro* scriptum reliquerit. Quæ res illi etiam occasionē dedit, vt mirabilem illum

Duodecimum.

Decimumtertium.

Decimumquartum.

reticularem plexum in hominibus quoque esse putauerit. *Decimumtertium* a regione foraminis iam dicti, ac finis qui caluariæ amplitudinem respicit, inchoatur, recta, antrorsum in narium vsque amplitudinem, meatus oblongi modo protensum in narium vsque amplitudinem, meatus oblongi modo protensum, & arteriæ ramo viā exhibens, qui soporalis arteriæ maiori portione caluariam ingrediente, ad nares vsque exportigitur, inibi cum aliis eo porrectis arteriæ furculis pulsum edens sensibilem. Hoc foramen cuneiformi ossi peculiare est. *Decimumquartum* quinti neruorum cerebri paris meatus, auditoriusq; porus, cuius principium interius in caluariæ amplitudine existit. Exteriorem autem eius partem auris excipit. Meatus iste etsi intus, in medio præsertim sui, am-

- A** sui, amplius cauiusque est, adeo tamen tortuosus & anfractusus, ac impense varius inuenitur, ut non nisi rarissime impulsam transmittat setam, ut non parum erreret Aristoteles, Aristotelis
qui lib. 1. de histor. animal. cap. 11. ab aure ad cerebrum nullum esse meatum, sed in oris
palatum usque semitam pertingere, & venam de cerebro eodem descendere, scribit. In
caluariæ enim amplitudinem auditorius meatus pertingit, & venam quoque admittit, non quidem illam a cerebro deducens, verum ab interna iugulari caluariam ingrediendi ad auditus instrumentum assumit, & uti ante monuimus, quinti paris nervorum cerebri ramulo viam præbet. *Decimum quintum* foramen ex auditus instrumenti amplitudinis medio exoritur, ac illinc in posteriora porrigitur. Hoc anfractuū & labyrinthorum occasione, & quia in internam caluariæ sedem non penetrat, inmissam non transmittit setam. Vocatur vero omnibus dissectionis professoribus Græcis *τετταδον*, Latinis autem *cacum* & *monoculum*, non quod verus peruiusque meatus non sit, sed quod Gal. libr. 9.
de vlu partium. c. 10. vix ad auditus instrumenti amplitudinem usque funiculum, aut porcinam setam per ipsum traicere queas. Præparatur autem hoc foramen ramulo nervi quinti paris, quem quum natura indurescere voluerit, admodum callide hunc per durissimi siccissimi que ossis anfractuosum foramen deduxit. *Decimum sextum* foramen occipitis & temporis ossibus commune, ac sexto pari nervorum cerebri, & maiori internæ iugularis ramo, minori que soporalis arteriæ soboli exsculptum est. Istud quia hac transeuntia instrumenta grandiora sunt, amplum visitur, transeuntium corporum formæ respondens. Non enim adamussim circulari est, sed quodam modo geminū intortumque, & ipsius una pars quæ interior est, nervo ex caluaria antrosum quodammodo elabenti paratur, altera vero quæ exterior est, venæ & arteriæ caluariam ad posteriora ingredientibus subseruit. *Decimum septimum* in occipitii osse gratia nervi septimi paris nervorum cerebri incisum, quod quidem orbiculare est, sed ductu oblongum obliquumque. Ex posterioribus enim interna que caluariæ parte declivæ fertur, quo citius septimi paris nervus hoc ductus foramine, sexto pari committeretur, unaque ambo simul hærentes, deorsum tuto descenderent. *Decimum octavum* vnicum ceterisque omnibus facile maximum, quod Decimum-
octavum.
Decimum-
nonum. occipitis ossi insinuatur, gratia dorsalis medullæ ex cerebro pronatæ. *Decimum nonum* non insigniter amplum foramen, quod ab externa caluariæ sede, ex posteriori nimirum parte capitis occipitii ossis, quod primæ cervicis vertebræ articulatur, incipiens, in internam caluariæ sedem longo ductu per os fertur, in elatiori parte foraminis sexti paris nervorum cerebri, hoc est, decimiseptimi cessans. Hoc venæ & arteriæ gratia calatur, per transuersos vertebrarum cervicis processus sursum conscendendum. In quibusdam vero caluariis id foramen in altero latere nonnunquam deficit, interdum etiam in utroque. Verum tunc huius foraminis vices gerit decimum sextum foramen, quod non adamussim orbiculare cernitur, sed oblongum, nervo simul cum vena arteria que transmittendo idoneum. *Vigesimum* foramen ad posteriorem regionem processus mamillaris, iuxta suturæ Vigesimū. referentis latus in temporis osse calatur, & transuersim caluariam ingrediens, viam externæ iugularis venæ ramo hac caluariam petenti, offert. Hoc quoque foramen interdum in altero latere, modo in utroque deest. *Vigesimum primum* amplum est narium Vigesimum
primum. foramen, septo quodam insigni ab altero interstitum, & in faucium amplitudinem e naribus tendens. Hoc etsi homini ad plurima conducit, tamen præcipue naturali inspirationi vocique idoneum est. *Vigesimum secundum* foramen iuxta posteriorem dentium incisivorum sedem ex palato in narium amplitudinem definit, quartisque maxillæ superioris ossibus commune habetur. Hominibus vnicum adest, equis vero & canibus geminum. Paratur autem gratia connexus consensusque tunice palatum succingentis, cum illa quæ narium amplitudini obducitur. Portiuncula enim illius tunice simul cum venula, & item arteriola id pertransit. *Vigesimum tertium, & vigesimum quartum* ad palati finem iuxta maxillæ superioris sexta ossa, utrinque duo videntur foramina, vnum quidem altero prius & amplius. Prius enim & anteriùs notatu dignæ est amplitudinis, ex Vigesimum
tertium, &
vigesimum
quartum.
- F** palato sursum in posteriore ad oculi sedis verticem radicemue properans. Posterius autem est exiguum omnino, & sursum ascendens, aliquando in idem foramen cum anteriori terminatur. Interdum vero peculiarè terminū in sutura cuneiformi ossi & quarto superioris maxillæ communi adipiscitur. Præter foramina hæcenus exposita, si caluariam in manus sumseris, alia quæ plurima, sed exilia, esse observabis, venis transmitten-

dis, & membranarum nexibus exsculpta, quæ lubens prætereo, utpote nullis nervis emittendis parata. Satis itaque sit potiora, & quæ alicuius momenti sunt dixisse.

De osse hyoidi. CAP. XVI.

Situs.
Nomina.

Forma.

Vesalius
lib. 1. c. 13.

Latera hy-
oidis ossis.
Humiliora.

Superiora.

Numerus
ossium hy-
oidis.

Vsus.

Supremæ laryngis gutturisq; parti ad linguæ radicem, os unitatis nomine donatum, sed variis, pluribusque ossiculis cõtextum, præponitur, quod Græcis à litera, figura, *voedis* qua voce delusus Andernacus lib. 4. de anatomicis administrationibus Galeni non sine risu os suum referens conuertit: & *υψιλον* appellatur. Aliis à λ imagine, ut lib. 3. cap. vlt. testis est Theophilus, *λαμβδωδεις* nominatur, ut lib. 2. Julius Pollux attestatur, id os quoque *σφαγην*, id est, adstitem, quod linguæ, aut laryngi, aut faucibus apponatur, vocavit. Non desunt qui propterea quod in faucibus consistat, *φαρυγγατεον* nuncupauerint. Ceterum homo hoc os longe aliter, quam quadrupeda exstructum obtinet. Maximum eius ossiculum est latiusculum, & foris gibbum, priuatoque tubere prominens, intus autem, seu posteriori parte, cauum. In anteriori sede superius quasi in trãsuerfum sinum deprimitur, pro figuræ nimirum ipsi idoneæ, & musculorum ligamentorumque illi commissorum ratione. Superiori enim sinui tertius & quartus huius ossis peculiare musculus, ut suo loco fusiùs dicemus, inseruntur. Ad tuberis vero hac in parte conspicui latera, quæ quodammodo in gibba sede sinuantur, duo primi huic ossi proprii musculi im plantantur. Ex posterioris autem partis cauo, musculi duo priores linguam mouentes præcipue nascuntur. Grandius id ossiculum supra laryngem paulo consistens, tangētib; occurrit, ipsius interim lateribus penitus fere latitantibus. Huic enim latiori grandiorique ossiculo vtrinque alia duo vniuntur. Atque horum alterum humilius est, alterum elatius. Humilius ossiculum nonnihil breuius latiusque superiori est, nullique alteri committitur, quam lateri medii ac latiusculi hyoidis ossis ossiculi, ad quod cartilaginis ligamenti que cartilaginei interuentu valide, & notatu digna amplitudine necitur. Verum extremum ipsorum superiori processui cartilaginis quæ scuti imaginem exprimit, colligatur. Inferius hoc ossiculum seu latus vna cum suo coniuge, qui in altero consistit latere, humilior hyoidis ossis latus merito appellamus, aliquot musculis admittendis & producendis aptum. Atque hæc humiliora latera simul cum medio grandiore uel ossiculo, uel imaginem pulcre conficiunt. Superiori ossiculo seu lateri, quod magis teres uisitur, alia rursus oblonga rotundaque ossicula tantisper continua serie vniuntur, quousque ipsorum fines propter radicem processus temporis ossis, qui scriptorii styli formam ostendit, temporis ossi inserantur. Hæc ossicula superioribus hyoidis ossis lateribus commissa, non pari semper obseruantur numero, plurimum tamen terna quaternaq; vtrinque cernuntur. Ut magna quidem ex parte ossis hyoidis cum tribus ossiculis, superioribus lateribus vtrinque commissis sint ossicula vndecim. Interdum tamen, id quæ in mulieribus maxime, ossicula cum superiorib; ossis hyoidis lateribus commissa, simul cum ipsis superiorib; lateribus omnino desunt, & ipsorum vices teres quoddã, validũ & oblongum ligamentum gerit, hyoidique ossi, & styli referenti processui colligatur. Præterea os hyoides non adeo firma basi, ut reliqua ossa, nititur, propriis tamẽ musculis id ipsum in omnem positionis differentiam ita trahitur, ut neque in latera, neque sursum aut deorsum, neq; prorsum, aut retrorsum, prompte ex sua sede dimoueri queat, quemadmodum lib. 2. cap. 16 fusiùs dicemus. Porro quamuis os hyoides homini minimum obtigerit, maximos tamen & oportunos, Gal. lib. 7. de usu partium. c. 19. attestante, vsus præstat. Quippe musculorum linguæ bona pars, ut lib. 2. cap. 17. dicemus, ab ipso enascitur, linguæque fundamenti tutissimæque basis modo subiicitur. Hincque adeo fit, ut hoc os nonnullis linguæ fulcrimen appelleretur. Musculorum etiam laryngis quædam principia, ut lib. 2. cap. 18. demonstrabimus, porrigit.

De spina. CAP. XVII.

Spinæ vsus
& nomina.

Spina, quæ Græcis *σπίς*, & *σπον* nominatur, ut libro duodecimo, de usu part. cap. decimo restatur Galenus, homini velut catinã quandam fundamentũq; corporis & instrumentorum ad vitam necessariorum natura terum parens molita est. Eius enim ope & beneficio recte ambulare, & erecti consistere valemus. Non cum vero solum huius vsum esse vo-

- A** esse voluit, sed ut illa alias vna constructione partis ad multos variosque alios simul usus abuti consuevit, ita hic quoque industriam suam ostendit. Primum enim vertebrae, quas Graeci *σπονδυλὸς* vocant, omnes intus excavauit, idoneam & opportunam viam spinali medullae per ipsam descensuram praeparans. Secundo autem osseam, atque non ex vno simplici atque incomposito osse vniuersam spinam constituit, quanquam ad spinalis medullae sedem tutam ac firmam id vtilius fuisset, quum neque luxari, neque distorqueri, neque eius generis affectum quemuis incurrere, nisi ita varie esset articulata, potuisset. Verum si tantum, ut difficulter pateretur rationem habuisset, neque in partibus construendis alium scopum spectasset digniorem, haudquaquam aliter quam prorsus simplicem, aut prorsus incompositam ipsam effecisset. Quippe si quis lapideum, aut lignum animal effingit, non aliter spinam quam vnica continuaque parte fabricat. Satius enim est stabilimentum vnum osse per totam spinam porrectum, quam plurima exigua, & ea articulata diuisa. Homini vero qui partibus suis esset usus, pedibusque suis ambulaturus, ac manibus apprehensurus, dorsumque inclinaturus & erecturus, non erat melius totam spinam vnico osse fabrefieri. Quinimo quum spinam ope hominem multis ac variis motibus uti oporteat, satius fuit hanc ex pluribus ossibus constitui, utcumque etiam hoc nomine iniuriis magis redditur obnoxium. Quapropter natura, actionis potius, quam securitatis rationem habens, spinam non ex vnico, sed pluribus efformauit ossibus. Nam si vnicum totius spinam os fecisset, iis partibus animal immobile fuisset velut veru quodam traiectum & confixum, aut palo affixum. Cur autem spina non ex duabus, vel tribus, vel quatuor, sed ex pluribus, & varie mutuo articulatis & commissis sit efformata vertebris, nunc dicemus, a parte omnium quae sunt in spina praecipua narrationis initio sumto. Est autem haec quam Graeci *σπονδυλὸν μυελόν*, Latini *spinalem medullam* vocant. Eam vero existere fuit necesse, neque positionem meliorem ac tutiorem ea quae est ad spinam habere potuit. Si enim omnino non extitisset, duorum alterum accidisset, aut enim partes omnes animalis, quae sunt sub capite, immobiles omnino fuissent, aut in earum singulas neruum a cerebro deduci oportuisset. Verum si immobiles omnino fuissent, quod antea diximus, verum esset, nempe quod animal non amplius esset animal, sed velut lapidea, aut lutea statua. Quod si a cerebro neruus exiguus in partes singulas esset deductus, opificis id esset, securitatis eorum rationem prorsus nullam habentis. Neruum enim tenuem qui frangi, ac contrudi potest, magno intervallo deducere non erat tutum. Proinde satius erat spinalem medullam veluti fluuium quendam, ex cerebro tanquam fonte manantem, locis omnibus quae praeterit, neruum semper immittere, tanquam sensus ac motus riuulum. Quod sane ita manifesto accidit. Semper enim propinquis quibusque partibus ex parte spinalis medullae propinqua productus neruus immittitur. Quum itaque spinalis medulla velut alterum quoddam cerebrum partibus omnibus quae sunt sub capite extiterit, eamque non aliter quam cerebrum sepro ac munimento quodam duro, atque ad patiendum difficili muniri oportuerit, satius fuit spinam, quae instar carinae humano corpori subiecta est, atque sane ossea, eam parte interna exsculpi, ac cauam fieri, ut iter simul ac firmum spinali medullae esset praesidium ac veluti vallum quoddam. Quid multa? quum veluti carina sit, & totius animantis stabilimentum, spina ob eam causam ex ossibus conflata est, & iis duris. Quia vero spinalis medullae est iter, ob id intus est caua. Quod vero illi instar valli ac muri est, ideo multis propugnaculis in orbem est munita. Quia autem motus est instrumentum, propterea ex pluribus ossibus per articulos inter se commissis constitit. Ceterum quum spinalis medulla magnam, eamque subitam, & angularem flexionem perferre nequeat: spina vero ipsa per magnos ac laxos articulos, multumque diffisos moueri sine noxa & molestia haud possit, melius fuit ex multis paruis, quae singula paulum ad motum conferunt, quam ex duobus, aut tribus ossibus longis & aequae ac in manibus quidem est brachium & vna, in cruribus autem tibia & femur, totam spinam conflari. Sic enim flexio non angularis, sed circularis fiet, noxamque ex spinali medulla compressa, aut contusa, aut rupta effugit. Porro vertebris non par adest magnitudo, neque omnibus foramen spinalem medullam transmittens aequa amplitudine exsculpitur. Coordinationis enim occasione melius fuit superiores vertebrae semper fieri minores. Siquidem quod gestatur minus esse oportet eo quod gestat. Quae causa fuit cur natura omnium spinarum ossium

Gal. libr. 12.
de usu par-
rium. c. 11.

Spina cur ex
multis ver-
tebris con-
stituta.

Spinalis me-
dullae neces-
sitas.

Gal. vbi sup.
c. 12.

Spina cur
non ex duo-
bus aut tri-
bus longis
ossibus.

Spinarum ver-
tebris non
par magni-
tudo.

Gal. vbi su-
pra c. 25.

infimum, quod sacrum dicitur, fecerit maximum, ipsum veluti basim fundamentumue A
quoddam viginti quatuor vertebra subiciens. Secundum vero magnitudinis locum
habet, si a sacro osse sursum ascendas, vertebra sacri ossi coarticulata, quarta quidem &
vigesima post primam sita, ipsarumque in lumbis ordine quinta. Reliquæ quantum situ
ab infima discedunt, tantum a magnitudine cedunt. Atque hæc magnitudinis dimini-
tio usque ad ipsum caput fit, præterquam si quando vertebra paulo maior adiacentibus
non sine magno usu interueniat, ut est prima, quæ reliquis cervicis vertebra latior est,
quemadmodum etiam secunda, quæ tertia est validior & grandior, ut paulo post fusius
dicemus. Ceterum ut hoc etiam obiter moneamus, vertebra, quæ Græcis *σπονδυλον*, vo-
catur, quodvis spinæ os est, quod verticilli, quo mulieres fusos aggrauant, formam refert. B
Quia vero natura nullius occasione, vertebra in posteriori suorum corporum, sede ex-
sculpit, quam ut iter spinali medullæ pararet, oportuit sane internam ipsarum capaci-
tatem spinalis medullæ crassitie esse æqualem: quæ quum in singulis vertebra sit im-
par, & in primis maxima: gignendis enim nervis, Galeno etiam ca. 8. libri de ossibus teste, sen-
sim constringitur & attenuatur: optimo iure superiorum vertebra foramen infe-
riorum foramine amplius est. Iam vero si amplo foramine donari has ob spinalis me-
dullæ, quæ illic est, crassitiem, læues autem, quod omnibus superiaceant & innitantur, effi-
ci par erat: perspicuum est, quod statim tenues quoque esse necesse erat. Nam qui fieri
posset ut læues essent, si latæ simul ac crassæ fuissent factæ. Primæ igitur vertebra pro-
pter hunc usum, amplæ quidem internis suis cauitatibus, tenues autem corporis mole
existenterunt. Ceterum spinali medullæ non duntaxat viâ in vertebra exculpitur, ve- C
rum etiam triginta nervorum paribus in homine a spinali medulla principium ducen-
tibus tutissimæ viæ foraminaque in vertebra lateribus calantur, ut fusius libro sexto,
docebimus. Quum igitur spinalis medulla velut alterum cerebrum partibus omnibus,
quæ sunt sub capite, esset futura, & spina simul facilis viâ, & firmum tutumque præsi-
dium ei esset parata, propterea natura alia permulta admirandaque circa vertebra
machinata est. Quippe ex medio posteriorum partium spinam produxit, quam Græ-
ci priuatim *σπονδυλον* nominant, quæ esset veluti vallum quoddam & propugnaculum to-
ti spinæ opposita, quæ prius ipsa frangeretur ac contereretur, modisque omnibus pate-
retur, quam vlli vertebra noxa inferatur, & spinalis medulla lædatur. Vertebra ita-
que processus in corporis posteriora exferri, aculeoq; & spinæ perfimiles Græcis *σπονδυλοι*, D
Latinis vero *spina* priuatim nuncupantur. Atque hinc est, quod totam etiam vertebra-
rum compagem *σπονδυλον*, & spinam nominemus. Posterioribus iis processibus in pluri-
mis vertebra appendice donatis cartilago obnascitur, idoneum subiectorum propu-
gnaculum, ut quæ nec frangi, nec rumpi, quemadmodum dura & friabilia, neque inci-
di & contundi, perinde ac mollia, & carnosa queat. Præterea singulorum processuum,
qui spinæ modo extuberant, magnitudo in omnibus vertebra æqualis non est, id quo-
que natura admirabili quadam prouidentia fabricante. Nequaquam enim in iis locis,
in quibus eundem situm cum spinali medulla pars quædam princeps habebat, negligere
ipsarum spinarum magnitudinem & dignitatem æquum erat: neq; in locis, in quibus
medulla erat sola, prælongas efficere spinas iustum erat: sed neque e parvis vertebra E
longam producere spinam, neque e magnis breuē. Merito igitur quum in thorace cor
esset locatum, magna; arteria spinæ incumberet, natura longissimas in iis dorso partib.
qui spinam constituunt, fecit spinas, in aliis vero partibus omnibus breuissimas. Verte-
brarum quidem lumborum corpus grande est, illisq; intus magna arteria & caua vena
suffulcitur. Sed ossis sacri moles est maior & insignior, nullum tamen interim præci-
puum ei subiacet instrumentum. Par igitur erat posticos processus in vertebra thoracis,
maximos in lumbis educi, in sacro autem osse breuissimos. Cervicis vero vertebra
quum omnium tenuissimæ sint, non potuerenancisci longos simul, & innoxie iniu-
riis ferendis aptos, quum ii leui occasione propter tenuitatem rumperentur. Recte igitur
natura molem vertebra, atq; instrumentorum spinæ adiacentium discrimen in-
tuita, inæquales ipsarum in spina fecit processus. Quemadmodum autem prædicti pro-
cessus spinam efficientes propugnaculi usum præstant, ita & alii processus transuersi ver-
tebris sunt duo, qui simul quidem lateralibus ipsarum partibus simile præbent præ-
sidium, simul autem velut sedes quædam sunt musculis spinæ internis & externis.

Omibus

Galen. loco
cirato c. 14.
Spinalis
medullam
transmittē-
tia forami-
na curinæ
qualia.

Foramina
nervis emit-
tendis pa-
rata.
Vertebra
spina. Gal.
vbi supra.
cap. 15.

*Argyda.

Gal. c. 8. lib.
de ossi.

Cartilago
spinarum
apicibus
obnata.
Gal. l. b. 12.
de usu par-
tium. c. 15.

Transuersi
processus.
Gal. ibidem
ap. 16.

- A** Omnibus enim iis vertebrarum processibus musculi incumbunt cum arteriis, venis, ac nervis, adipos & periplos delatis. Est alius quoq; tertius vsus transuerforum thoracis vertebrarum processuum, ad aptam videlicet costarum articulationem, quæ maxime ad respirationis actionem est necessaria. Quia vera dorsum instar vnus corporis ex vertebris efformari debuit, quod simul firmum, & forte, & ad motus promptum esset, natura Vertebrarum coarticulatio.
- B** corporibus mutuo non connascantur, & postica sede non obscuris articulis sint distinctæ. Ob eam sane causam antrorsum valde inclinari possumus, retrorsum vero nequaquam. Rumpes enim, si coegeris membranea, quæ vertebrarum corpora colligant, anteriora ligamenta, cum alio cartilagineo ligamento inter vertebrarum corpora reposito, itaque corpora connectente, ut vertebræ non admodum a connatis differant, laxamentumque in spinæ posteriora reclinantibus exiguum indulgente. Sed de ligamentis *in sequenti libro* tractabimus. Quoniam vero non æque tutum erat dorsum antrorsum retrorsumque flecti, ita enim infirmum, ac instabile, & laxum penitus esset, natura quod melius erat elegit. Ad vniuersas enim actiones vitæ commodius est dorsum in priora flecti. Dein hæc quoque flexio vasis dorso ibidem incumbentibus, magnæ scilicet arteriæ, & causæ venæ, minus molestiæ infert. Rumperentur enim, si extrinseca plurimum, dum spinam totam retrorsum flecteremus, fuissent. Quia igitur oportuit dorsum anteriori sede ad amissum stringi, merito vertebræ in posteriore sede laxius articulantur. Ceterum spinæ partes sunt quinque, nempe ceruix, thorax, lumbi, os sacrum, & coccyx. De singularum itaque vertebris ordine differemus. Comodius fuit dorsum flecti antrorsum.
- C**

De ceruicis vertebris. C A P. XVIII.

- C**eruix siue collum, quod Græcis ἀρχὴ καὶ ῥέχνα dicitur, pulmonisque gratia, ut *lib. 8. de vsu partium, cap. 1. Galenus monstrauit*, homini creatum est, capiti adnectitur, septemque vertebrae continet. Prima reliquis omnibus dorsii ossibus solidior, densior, Ceruicis vertebrae septem.
- D** sed per longitudinem tenuior est, & forma a ceteris plurimum differt. Foramen namque ipsi spinalis medullæ gratia incisum habet maximum, quod & eo loci sit spinalis medulla crassissima. Deinde ipsius corpus interiori sede exsculpitur, & sinum in posteriori sui corporis sede leuiter incisum ostendit, qui cartilagine incrustatus secundæ vertebræ dentem excipit. Corpus enim primæ vertebræ hac ratione cauatur, ut dens ille in primam vertebra inibi reponi queat. Ceterum ne prima vertebra hoc modo in suo corpore exsculpta, & corpore propemodum destituta, plus æquo imbecillis, inualidaque redderetur, processu quodam, & tuberculo in anteriori sede exiguo augetur, cuius beneficio illa crassescit, robustiorque euadit, præterquam quod ipsum etiam tuberculum accommodum est suscipiendæ insertioni primi dorsum mouentium musculorum paris. Porro prima vertebra ad latera cavitatis, qua secundæ dentem admittit, est validissima & crassissima, ac vtrobiq; vnum ostendit sinum, quo sui lateris occipitii ossis capitulum excipitur. Sinus hi vtrinque singuli, ut prædictis capitulis exquisitè responderent, oblongi sunt, & exterioribus lateribus sursum educti, internis vero profundi. His primæ vertebræ sinibus occipitis capitula excipiuntur, atque in illis flectuntur & extenduntur, seu antrorsum retrorsumq; rectissimo ducuntur motu. Ad exteriora sinuum occipitis ossis capitula excipiuntur latera, prima ceruicis vertebra vtrinque vnum exserit transuersum processum, procerius multo quam ceteri vertebrarum ceruicis processus eductum, ac latiusculum, non tamen æque in hominibus, ac canibus, caudatisque simiis instar alæ cuiusdam latum. Educuntur autem illi processus insignius, ut opportu-
- F** nam præter reliquos transuersos ceruicis processus, duorum, quinti nimirum & sexti musculorum caput mouentium paris insertionem acciperent. Hi processus magno perforantur foramine, per quod arteria & vena hic caluariam petentes feruntur. Ad posteriorem sinuum, quibus caput inarticulatur, sedem, sinus vtrinque in prima vertebra exsculpitur illi respondens, qui in occipitii osse ad posteriorem capitulorum se-

dem cælatus est. ¶ Ambo enim sinus, occipitis ossi nimirum & primæ vertebræ, simul
viam præbent primo pari neruorum quod e spinali medulla elabitur. Canib. vero in pri-
ma cervicis vertebra non sinus, sed propriū foramen hac elabenti neruo insculpitur, &
illis prima vertebra admodum ampla, lataq; sit. Porro hic hominis vertebræ sinus, etiam
ad posteriorem foraminis partem pertinet, quo transuersus perforatur processus, ita vt
sinus ille non neruo dūtaxat, sed venæ arteriæq; et cedat, quas per foramen ad radicem
capitulum occipitii ossis exsculptum, caluariam adire capite decimo quinto diximus.
Præterea posteriorem processum quum *spinam* vocant, omnes vertebræ, prima dunta-
xat excepta, obtrinet, idque ideo, quod is aliquot musculorum paria aculei modo vulne-
rasset, neque illis & præcipue tertio musculorum caput mouentium pari, aptum iter aut
sedem tribuisset. Ea tamen parte, qua aliæ vertebræ in spinam desinunt, hæc aspera est,
& veluti acuta linea extuberat, quo facilius quartum caput mouentium musculorum
par hinc principium duceret. In inferiore primæ cervicis vertebræ regione, sub duobus
quibus caput excipitur sinibus, alii duo insculpuntur sinus leuiter ac in superficie caui
γληνοειδής ob id ab ocularis sinus similitudine vocati. Horum circumferentia orbicularis
est in medio vix aliquid, quod diiudicari possit, caui obtinens, sed exteriora sinuum su-
percilia longe inferius, quam interiora descendunt, idque si hanc vertebram in erecto
corpore secundæ inniti singas. ¶ His sinib. cartilagine ob crustatis, duo secundæ cervicis
vertebræ excipiuntur tubercula, quæ ad latus corporis eius vertebræ habentur mini-
mum prominentia, vt & sinus primæ vertebræ leuiter excauantur. In medio autem tu-
berum secundæ vertebræ, ex superiori mediaque sui corporis regione, processus qui-
dam insignis & altus, admodumq; durus & solidus enascitur, quem, quod denti, ac po-
tissimum hominis, canino, assimilatur, Græci δοντοειδής id est, *dentiformem* & δόντι hoc est,
dentem vocant, quo etiam nomine in *libro de articulis* Hippocrates totam secundam ver-
tebram nuncupauit, non autem primam, vt *lib. 2. Iul. Pollux, & post eum lib. 2. c. 32. antiqua-
rum lectionum Cælius, putauit.* Hunc processum alii quod turbinata sit figura, seu nucis pi-
neæ imaginem referat, γληνοειδής, alii quod culpidis, seu nuclei, pyramidisue modo extube-
ret, πύκνιον & πυκνιοειδής appellarunt. ¶ Hic processus primæ vertebræ cauitatem subit, quæ
illic est, vbi primæ vertebræ corpus deberet consistere, & vbi eiusdem sinus insculpitur,
qui cartilagine oblitus, anteriorem dentis partem læui & lubrico tubere prominulam
excipit. Posterior dentis pars, e regione tuberis, quod est in anteriore sede corporis pri-
mæ vertebræ posita, magis extuberat, crassiorque est quam vbi primum is a secunda ver-
tebra producit. Hic enim vtrinque ad latera sinus singulos, & tertium in posteriori
sede obtinet. Qui in lateribus conspiciuntur, inter dentis radicem, & secundæ vertebræ
tuber consistunt, vnaque cum primæ cervicis vertebræ sinibus, qui iis respondent, fora-
men vtrinque parant, neruulis transmittendis aptum, quos interdum hac in musculos
cervicem flectentes procidere contingit. Sinus autem in posteriori dentis sede conspi-
cuus in hoc exsculptur, vt ligamentum validum transuersum ei circumdatum ipsi fir-
mius obuoluatur, dentem accurate in cauitatem primæ vertebræ alligans, ac stringens,
ne a sua sede aberrans, hic spinalem medullam comprimat. Porro vt ligamentum id a-
ptius enasceretur, prima vertebra ea sede quæ id originem ducit, siue inseritur, aspera
inæqualisque est, & foramen quoque non alte penetrans habet, quod firmius ligamen-
tum explantari inferiue sinit. Nihil enim interest, siue ligamenta inseri, siue enasci di-
cas, quum ligamentum pariter ad vtrunque os pertineat. Superior dentis pars, seu ipsius
apex in mucronē testudini capitis modo exacuitur, vt altius extra primæ vertebræ pro-
minens, ex se robustum tereque ligamentum educeret, quod occipitis ossi ad eam se-
dem alligari possit, quæ in anteriori foraminis spinalem medullam transmittentis aspe-
ra, leuiterque extuberans conspicitur. Atque eiusmodi certe primæ vertebræ cum se-
cunda contextus perficitur, duobus nimirum latis secundæ vertebræ tuberibus, toti-
demque primæ sinibus, & vno rursus primæ sinu, cui dentis tuberculum committitur.
Præterea secunda cervicis vertebra in posteriori tuberum quibus illa primæ vertebræ
committitur sede leuiter exsculptur, vt commune cum prima vertebra foramen vtrin-
que constituat, quo secundum spinalem medullam par neruorum in posteriora elabitur.
Verum huius foraminis maiorem portionem prima efformat vertebra, insigniter satis
ad posteriorem sedem sinuum quibus secundæ articulatur sinuata. Reliqua in secunda
cervicis

Gal lib. 13.
de usu par-
tium ca. 3.

Gal cap 8
libri de
ossibus.

Secunda
vertebra.
Vesalius
ibidem.

Dens.
Galenus
ibidem &
lib. 12. de
usu partiū
cap. 7.
Pollucis
& Cæli
erratum.
Κωνο-
ειδής
nux pi-
nea.
πύκνιον
nucleus.
Gal. lib.
12. de usu
partium
cap. 7.

Foramen
secundum
par spina-
lis medul-
læ trans-
mittens.

- A** ceruicis vertebra commemoranda, ceteris etiam quinque inferioribus magna ex parte sunt communia. Hæc enim similiter atque illæ posteriori donatur processu, qui hoc priuatim in ceruicis vertebra sibi vendicat, quod suo mucrone bipartitur, ac præcipue secundæ vertebræ triumque sibi subiacentium. *Sexta* enim vertebra admodum obscure sui processus diuisionem ostendit, atque adhuc multo minus septima; quæ priuatim hoc cum sexta sortitur, quod ipsius processus plerumque donetur appendice, ac procerius educatur, quodammodoque ad superiorem thoracis vertebrarum processum imaginem suo mucrone accedat, nisi quod ille his obtusior ampliorque relinquatur. Ceterarum vero ceruicis vertebrarum processus appendicibus carent, & lati, inæquales, asperi, & quodammodo ramosi, inferiorique sede caui, ac superius gibbi cernuntur, ac
- B** utrinque modice depressi. Quod extuberans linea facit, quæ per processus longitudinem porrigitur: quemadmodum etiam inferiori processus parte, quæ caua est, quidam lineæ instar ductus, per processus longitudinem ferri videtur. Prominet autem in gibba sede, linea, ut ligamentum ab hac in cauæ sedis medium perducatur, quod secundum processus seu spinæ longitudinem porrectum, vnum spinam alteri colligat, dextrosque musculos a sinistris dirimit, *ut libr. 2. fufius dicemus*. Ut autem musculi in posteriori ceruicis sede repositi promptius principium ducerent, & validius quoque in vertebrarum spinas insertionem molirentur, hæc spinæ in processulos diriguntur. Atque id natura in iis colli vertebra peculiariter machinata est, quia non adeo longas spinas a paruis illis vertebra, atque a thoracis lumborumque vertebra producere tutum erat. Deinde maior musculorum copia in ceruicis posteriori sede, quam in aliis dorso partibus collocatur, *ut 2. lib. clarius docebimus*. Porro transuersi processus in reliquis ceruicis vertebra non admodum exporriguntur, & in primis secundæ vertebræ, cui brevis & simplex utrinque transuersus obigit processus. Hi processus semper perforati sunt, septima eademque vltima excepta, quæ in canibus & similibus frequenter absq; foramine inuenitur. Huiusmodi foraminibus solæ ceruicis vertebræ ornantur, in hoc perforatæ, ut venam arteriamque sursum ducant, quæ spinali medullæ, ac tandem ipsi cerebro sanguinem spiritumque deriuant. Præterea quatuor vertebræ, quæ statim secundam sequuntur, hoc etiam peculiariter sibi vendicant, quod illarum transuersi processus ampli & bifidi sunt: non tamen interim, ut earundem spinæ, asperi & inæquales. Transuersi enim processus forma inuicem respondent, & interior ipsorum pars semper latior est, elatiusque ipsa posteriori effertur. Spinæ autem partim impar in omnibus quasi vertebra est forma, & illæ perpetuo variis modis protuberant, atque exasperantur. Hæc transuersorum processuum amplitudo & bipartitio, eadem ratione accidit, quia spinas bifidas esse diximus, nimirum musculorum ortus, insertionisq; gratia. *Septima* vero ceruicis vertebra transuersos processus latos quidem exserit, sed obscure admodum bipartitos. Quum enim ampli, procerique sint, nulla incumbit necessitas, eosdem quoque bifidos fieri, præcipue quando musculi collum in latus ducentes, non adeo valide septimæ ac ceteris committantur, quod hæc illis veluti basis in dicto colli motu subiaceat, atque obscure perinde atque thoracis vertebræ in latus moueatur. Ascendentes & descendentes processus quibus vertebræ mutuo articulantur, in omnibus ceruicis vertebra secundæ subiectis similes sunt, & secunda quoque descendentes processus obtinet aliarum processibus non dissimiles. Quæ itaque deorsum spectant, & subditæ committuntur vertebræ, orbiculari sinu nihil minus quam alte inciso & ab anteriori sede insigniter oblique deorsum in posteriora ducto, ornantur. Ascendentes autem processus qui incumbenti articulantur vertebræ, tuberculum orbiculare habent, quod adeo leuiter superficiemque extuberat, ut ignores sinuumne id, an capitum numero ascribere debeas. Hoc tuberculum ascendentium processuum sinui congruit, & cartilagine haud secus quam sinus in crustatū, ab anteriori sede deorsum in posteriora admodum oblique fertur. Id quod non obiter considerandum est. Nam obliquus ille ductus in ceruicis vertebra, quæ thoraci propiores sunt, minor semper, ac secundum corporis longitudinem rector euadit, quæ illæ vertebræ non adeo laxæ ac superiores moueri, atque ob id et non tam laxæ articulari debeant. Ascendentes itaque processus suo tuberculo sinui descendenti processuum tubingrediuntur, atque id secunda ceruicis vertebra, tertię duplici articulo alligat, ut tertia quartę, & sic reliquæ omnes ad thoracem usque consequentes. Septima n. ceruicis, primę thoracis ascendē-

Vesalius
ibidem.
Spina seu
humilio-
rum cerui-
cis vertebra-
rum.

Transuersorum ceruicis vertebrarum processuum natura.
Gal. cap. 8. lib. de ossi-
bus.

Ascendē-
tium &
descendē-
tium pro-
cessuum
natura.

Corporū
cervicis
vertebra-
rum con-
textus.

Processū
numerus.
Gal. lib. 13.
de vit. par-
tium ca. 2.

Forami-
num ner-
vos in la-
tera trans-
mittentiū
ratio.

In cervi-
cis verte-
bris Gal.
lib. 4. de la-
bo. locis
cap. 6. &
lib. 13. de
vfu part.
cap. 3.
In lum-
borū ver-
tebris.

In thora-
cis verte-
bris.

Nomina.
Galen. lib.
13. de vfu
part. cap. 7.
Gal. cap.
9. lib. de
ossibus.

Gal. lib.
13. de vfu
partium
cap. 2.
Vesal. lib.
1. cap. 16.

tes processus excipit. Natura autem non solum cervicis vertebrae laxiores communica- A
uit articulos, sed ut commodius aptiusque quam reliquæ dorsi partes collum insigni, &
quo maxime indigem⁹ vfu moveri possit, ipsa aliud quoq; propriū colli vertebrae adhuc
elargitur. Quum enim vertebrae thoracis & lumborum corpora invicem planis mi-
nimeque extuberantibus committantur superficiebus, ad eumq; modum, quo duo læ-
vigati, ampliq; asseres mutuo incumbant, natura inferiorem cervicis vertebrae cor-
poris partem oblongam, capitique alicuius articuli ad motum evidentem facti ritu ex-
tuberare voluit, ac superiorem corporis vertebrae partem amplo sinu ita excava-
vit, ut oblongum superioris vertebrae corpus in hunc subditæ vertebrae sinum ingrediatur,
vertebraeque compago ad movendum promptior consurgat. Atque hæc compatio-
nis species in secundæ vertebrae cum tertiâ, & deinde aliquot subiacentiū vertebrae B
nexu magis est conspicua. Colli autem septimæ, primæ thoracis quasi omnino plana in-
nititur superficie, ac etiam ipsius corpus elatiori sede non adeo atq; superiorum verte-
brae excavatur: quod præcipue accidit, quia superiores laxius inferioribus moveri,
ex vfu fuit. Porro vertebrae cervicis processus vñdecim numero sunt, duo in supe-
riori corporis sede, vtrinque; scilicet unus ad latus sinus, cui incumbentis vertebrae oblon-
gum corpus insidet. Duo item ascendentes, qui incumbētē subeunt vertebrae. Duo
dein descendentes, quibus subditæ vertebrae ascendentes processus excipiuntur. Qua-
tuor transversi processus, vtrinque enim sunt singuli, ac illi rursus gemini, bifidiq;. Vñ-
decimus itaq; erit ipse posterior processus, seu spina. Quam tuto autem vertebrae inui-
cem ligamentorum ope colligentur, quamque studiosè laxis his ossium cōnexibus pro- C
spexerit natura, muscoli, & vertebrae ligamenta in 2. libro abunde monstrabunt. ¶ Ce-
terum foramina in vertebrae lateribus nervis a dorsali medulla transmittendis, &
venis quoq; ac arteriis ad illam admittendis parata, eadē serie sub secunda cervicis ver-
tebra ad sacrum vsque os constituuntur. Inter latus enim posterioris sedis corporis ver-
tebrae, & ascendentes, descendentesque processus, sinus quidam supra infraque in am-
bobus lateribus exsculpitur, qui cum proximæ vertebrae sinu commune foramen, quo
profilit nervus, efformat. Isti sinus in omnibus vertebrae nō pari se habent modo. In cer-
vicis enim vertebrae semicirculus in superiori vertebra, & semicirculus in inferiori ex-
sculpitur, vtrique vertebra parem operam ad foraminis constitutionem præstante. Aut si
quis ad amussim singula excutiat, inferior vertebra in ceruice paulo maiorem portio- D
nem foraminis constituit, ipsa superiori. ¶ In lumborum vertebrae prorsus contraria est
ratio. Superior enim vertebra superiorem foraminis sedem, lateraque efformat, infe-
riori interim vertebra inferiorem foraminis illius partem, seu veluti tertiam circuli
partem duntaxat constituyente. Sinus enim in illis vertebrae inter corpus ac descenden-
tem processum exsculptus, multis numeris eius cavitatem superat, qui in superiori ver-
tebrae parte inter corpus & ascendentem processum calatur. Thoracis autem vertebrae
medio se habent modo. Quæ enim in illis cervici propius accedunt, cervicis vertebrae
hoc nervorum foramine respondent. Quæ iuxta lumborum vertebrae consistunt, lum-
borum etiam vertebrae in foraminis forma assimilantur.

De thoracis vertebra. CAP. XIX.

D Orsi pars thoracem constituens, quam nonnulli simpliciter *Dorsum* vocauerunt, E
Græci vero, quod veluti post septum transversum consistat, *μετάσπινον*, in homine
quidem magna ex parte duodecim habet vertebrae. Aliquando tamen, quanquam ra-
ro, aliquibus vel deest una, vel superest. Sed deesse rarius, quam superesse inuenitur.
Homines vero plerumque a canibus una thoracis vertebra superantur. Neque etiam
lumborum cervicisque vertebrae numerus tam crebro, atque thoracis variatur. Est
autem in iis vertebrae non mediocris differentia. ¶ Primum enim thoracis vertebra-
rum corpora tantum magnitudine inter se discrepant, quantum una, alia cervici vici-
nior existit. Deinde corpus primæ superiori sua sede, qua septimæ cervicis connecti-
tur, non omnino planum est, sed modice vtrinque ad latus extuberat, cervicisque verte- F
brae corpora obscura imitatur. Inferior autem huius corporis pars, plana constat su-
perficie, quemadmodum & inferior, superiorque omnium thoracis vertebrae cor-
porum superficies. Adhæc primæ secundæque thoracis vertebrae corpus non adeo an-
teriori parte rotūdum, seu orbiculare prominet, atq; reliquarum thoracis vertebrae
corpora

- A** corpora, quæ multo magis quam supremarum corpora ad circuli seu Cliteræ conuexi imaginem accedunt proceriusque in thoracis amplitudinem protuberant. Videntur enim duæ superiores thoracis vertebræ, ceruicis vertebrarum modo, in anteriori corporis sui sede depressæ, multoque ampliores quam profundiores. Quod ipsis priuatim cum articulationis laxo motui aptæ gratia, tum musculorum collum flectentium occasione accidit. Musculi enim illi, ita vtrinque primarum thoracis, omniumque ceruicis vertebrarum corporibus insternuntur, vt liquido constet, ea corpora ab illis comprimi. Reliquarum autem vertebrarum corporibus huiusmodi musculi neque adnascuntur, Vesalius ibidem. neque etiam incumbunt. ¶ Præterea omnib. thoracis vertebrarum corporib. hoc commune accidit, quod vtrinque sinus habeant, quibus duodecim costarum capitula inarticulantur. Ex sinibus quibus costæ articulantur discernantur.
- B** Verum vt costarum capitula in illo articulo variant, ita etiam iisdem omnino sinibus non omnes vertebræ donantur. Vbi enim prima thoracis secundæ committitur, & secunda tertiæ, atque ita deinceps ad nonæ vsq; cum decima connexum, sinus quidam in ambobus lateribus iuxta foramina neruorum nomine parata insculpitur, qui vtrarumque inuicem colligatarum vertebrarum corporibus communis existit, ac partim in superioris vertebræ corpus, partim inferioris excinditur. Quanquam interim huius sinus grandior portio ad inferiorem vertebram potissimum pertineat. ¶ Ceterum prima thoracis vertebra hoc proprium cum vndecima & duodecima habet, quod vtrinque peculiarem ostendet sinum aliis vertebis non communem in ipsius duntaxat corpore incisum. Ad superiorem enim sedem corporis primæ thoracis vertebræ, sinus vtrobiq; Ex corporum substantiis.
- C** exsculpi rotundus, & satis insigniter cauus, ac deniq; cartilagine oblitus, cui primæ thoracis costæ radix rotundo capitulo inarticulatur. ¶ Deinde ad inferiorem huius sinus sedem alius insigniter profundus conspicitur, asper & inæqualis, & foraminibus quibusdam oppletus, neque cartilagine incrustatus, a quo validissimum prodit ligamentum costam in suo sinu robustissime stringens. Pari ratione sinus in duodecima vertebra duodecimæ costæ gratia insculptus, ad inferiorem ipsius sedem alium quoque asperum, sed minus quam primæ vertebræ sinus, profundum adipiscitur, qui ligamenti duodecimam costam firmitus vertebræ adnectenti nomine cælatur. ¶ Postremo thoracis vertebrarum corporibus etiam substantiæ ratione quædam accedit differentia. Quanto n. cuiusq; vertebræ corpus grandius est, tanto etiam minus apparet solidum, sed fungosum, & multis inæqualibus variisque foraminibus incerta serie interstinctum, in quæ venæ arteriæque corpus vertebrarum enutrituræ subintrant. Nisi enim vasorum surculi crassorum ossium substantiæ insinuarentur, impossibile esset mediam, intimamque & a superficie remotissimam ossis substantiam sibi nutrimentum allicere. Inter cetera huius generis foramina, nullibi insigniora se offerunt, quam in posteriori corporis vertebrarum sede spinalem medullam respiciente. Vbi in plurimis vertebis vnum peculiare cernitur foramen, pro vertebræ mole magnum & asperum, ac in multa desinens foraminula. ¶ Insuper omnibus thoracis vertebis vtrinque vnus transuersus obtrigit processus, qui magnitudine in nouem superioribus vertebis vix quicquam differt. A duodecimo vertebis. Decima vero vertebræ transuersi processus minus quam superiorum vertebrarum extuberant,
- E** vt etiam decima, quæ ipsi committitur costa, admodum parua, spuriaque est. Vndecima autem vertebræ transuersi processus minores, breuiioresque adhuc decimæ sunt, & duodecimæ processus adhuc minores ipsius vndecimæ, quod scilicet non tantus horum processuum vsus, atque superiorum vertebrarum processuum sit. Ceteris enim omnibus costæ articulantur, quarum gratia thoracis vertebræ validissimos crassissimosq; processus transuersos sibi vendicant. Duodecima vero & vndecima transuersis processib. costæ non articulantur. Duæ enim infimæ vtriუსq; lateris costæ, vnica tantum ad vertebrarum corpus articulatione committuntur, reliquis interim ad vertebrarum corpora, & transuersorum processuum apices dearticulatis. Ad apices namq; transuersorum processuum nouem superiorum thoracis vertebrarum sinus cartilagine incrustati videntur, quib. costarum capitula articulantur. In transuersis aut decimæ vertebræ processib. eiusmodi sinus aut nulli aut interdum obscuri conspiciuntur. In duarum vero infimarum processibus nulli prorsus occurrunt. ¶ Præterea sinus in transuersorum processuum apicibus sculpti, omnes quidem anteriori processuum sede habentur, verum alii superiorem, alii inferiorem, alii mediam magis occupant. Primæ enim vertebræ deorsum spectant, nonæ vero

A spinæ
differen-
tia.

Spinarū
ductus.

Galenus
cap. 9. de
ossibus.

Transver-
sorum
processū
ductus.
Vesalius
ibidem.

Differen-
tia ab; a-
scenden-
tibus &
descen-
dentibus
processi-
bus.

fursum, mediz autem medio se habent modo. Insuper omnes transuersi thoracis pro- A
cessus qui supra decimā sunt, prima excepta, deorsum spectant: qui infra fursum. ¶ Porro
natura omnibus thoracis vertebris spinam toto ductu simplicem minimeque bifidam
largitur. Atque huius spinæ in omnibus vertebris non eadem forma esse videtur. No-
uem enim superiores longissimas exserunt spinas, non admodum amplas, attamen ex
ampla basi in mucronem sensim desinentes, triangulique imaginem referentes. *Decima*
thoracis vertebra non ita longam atque superiores vertebræ spinam exserit, neque hæc
triangularem illam imaginem adeo scite commonstrat. Præterea spinæ huius mucro
obtusius ampliusque est, non ut superiorum vertebrarum spinæ acutus, & strictus. *Vnde-*
cima vertebræ spina, adhuc minus quam decimæ exporrigitur, & vtrinque magis depri-
mitur, ampliorque efficitur. Deinde inferior ipsius superficies in lineam insigniter ex- B
tuberat, neque amplius depressa, sed arcuata & aspera visitur, huiusq; spinæ mucro admo-
dum obtusus est ac spissus. *Duodecima* spina, adhuc magis a superiorum vertebrarum spi-
nis variat, ad lumborum vertebrarum spinæ imaginem magna ex parte accedens, quæ
vtrinque admodum depressa est, & si summum, imumque spectes, valde lata & ampla.
¶ Ceterum ut omnibus vertebris non eadem spinarum forma accidit, sic etiam spinæ
ductu inuicem discrepant. Nouem namque superiorum thoracis vertebrarum spinæ,
ut etiam ceruicis sexta & septima, insigniter decliues feruntur seu a summo ad imum tē-
dunt. *Decimæ* autem thoracis vertebræ spina minus superiorum spinæ deorsum con-
niuet, magisque recta retrorsum fertur. *Vndecimæ* spina adhuc rectius erigitur, & huius
rectitudinem *duodecimæ* spinæ vincit. Verum interim harum nulla adeo recta fertur, C
quin ipsius mucro semper magis deorsum quam fursum vergat. Quod etiam omnium
in lumbis vertebrarum spinis accidit, deorsum magis quam fursum spectantibus. Atque
hæc in hominis dorso subaudienda sunt. ¶ Canibus & simiis, aliisque fere quadrupedi-
bus contraria est ratio, Galeni dogmatibus pulchre quadrans. His enim *vndecimæ* tho-
racis vertebræ spina neque deorsum, neque fursum vergit, & duæ deinceps quæ statim
decimæ subiiciuntur, spinam habent obscuræ superiora suo mucrone spectantem. Re-
liquæ vero has subsequentes spinas exserunt ab imo fursum porrectas, longe profecto se-
cus quam homo, cui ne vnus quidem vertebræ spinam fursum magis, quam deorsum
inclinare, nemo vere asserturus est. Transuersos enim in homine ceruicis processus, si
non perfunctorie consideraueris, externo seu posteriori eorum latere, deorsum respi- D
cere; interno autem seu anteriore latere, quod posteriori latius est, fursum tendere, di-
ces. Transuersi autem nouem superiorum thoracis vertebrarum processus, toto ipso-
rum corpore retrorsum & fursum magis, quam deorsum feruntur. Verum superior pars
gibba videtur, inferior caua, & nonnihil sinuata, quasi hæc ratione descensus ad inferio-
ra speciem processus illi referrent. Transuersi autem processus *duodecimæ* thoracis
vertebræ non solum fursum conuiuent, verum etiam egregie retrorsum ducuntur, quem-
admodum & *vndecimæ*, & *decimæ* processus nonnihil fursum spectant. Lumborum
transuersi processus admodum obscure fursum ducuntur, quanquam vertebra sacro ossi
cōmissa paulo manifestius suos processus fursum efferre cernitur. In canibus autem trans-
uersi processus ceruicis perquam conspicue & manifeste deorsum tendunt. Thoracis
autem processus, aut non deorsum feruntur, aut admodum leuiter. Verum lumborum,
insigniter in altum oblique porriguntur, & Galeni descriptionibus ad amussim quadrant,
si modo vertebrarum numerum exceperis. Nam plures lumborum vertebræ canibus
& caudatis simiis obtigerunt, quam hominibus, qui etiam plerumq; a canibus vna tho-
racis vertebra, ut comprehensum est, superantur. Ad eum igitur modum transuersi po-
sterioresque thoracis vertebrarum processus constituuntur. Illi vero qui ascendentes
descendentesq; vocantur, ea quæ iam subiicietur serie disponuntur. ¶ Omnis vertebra
quæ supra sacrum os habetur, duabus tantum demptis, vna parte suscipit, altera suscipi-
tur. Prima enim ceruicis vertebra, & superiori & inferiori sede suscipit. Superiori qui-
dem occipitis ossis capitula, inferiori autem secundum ceruicis vertebram. *Duodecima*
vero thoracis vertebra vtrinq; suscipitur, nullam interim suscipiens. Ascendentibus e-
nim suis processibus *vndecimæ* thoracis vertebræ descendentes subit, ipsaque ab *vnde-*
cima excipitur. Descendentibus autem sinus ascendentium processuum primæ lumbo-
rum vertebræ subit. Quapropter quum & hæc *duodecimam* excipiat, liquet hinc duo-
decimam

D

E

F

- A** decimam, ut dictum est, supra infraque suscipi. In omnibus itaque vertebris hac superioribus ad primam usque cervicis, superior semper inferiorem excipit, ut decima thoracis vnde decimam. ¶ Quæ autem sub utrinque suscepta seu duodecima locantur, superiori quidem sui parte superiacentem excipiunt, inferiori autem parte subiacentem ingrediuntur, atque ita prima lumborum vertebra a secunda excipitur. Thoracis vertebra supra utrinque susceptam repositæ, eandem in ascendentibus descendentibusque processibus speciem cum cervicis vertebris obtinent. Sunt autem hæ thoracis vertebrae, de Galeni in lib. de ossibus sententia, novem superiores aut alicubi in libris de usu partium decem. Is enim hic vnde decimam, illic vero duodecimam thoracis suscipi tradit, uti in simiis & canibus vidit. Nunquam vero aut rarissime saltem, decima utrinque suscipi in homine cernitur, sed plurimum duodecima. Aliquando namque vnde decima utrinque suscepta occurrit. ¶ Ceterum vnde decim thoracis vertebrarum processus ascendentes in homine protuberant, ac in exteriori posterioriue sede notatu digna, ac prope in odum orbiculari circumferentia cartilagine incrustantur. Atque horum processuum tuber adeo leuiter ac in plana superficie extuberat, ut num sinus, num tuber censendum sit, vix inter noscas. ¶ In canibus autem omnes, quæ sub decima locatæ sunt vertebrae, quod etiam loco iam citato testatur Galenus, ascendentes processus cauos, descendentes conuechos habent. Ob id planis quidem a subiectis vertebris suscipiuntur, ascendentibus autem superiores excipiunt. Ut hinc etiam omnibus palam fiat Galeni in libris de usu partium descriptiones vertebrarum canib. potius quam hominib. quadrare. ¶ Descendentes autem processus interna anterioriue ipsorum sede, qua foramen spinalis medullæ gratia cælaturum respiciunt, sinum quoque adipiscuntur amplum, & quodam modo orbicularem, & cartilagine incrustatum. Porro inter utriusque lateris ascendentem & descendentem processum, insignes nobis obseruandæ sunt asperitates, inæqualiterque protuberantes processuli, in hoc sane parati ut valida hinc pronascerentur ligamenta, tanto robustius firmitusque thoracis vertebra colligantia, quanto obscuriori motu thoracis vertebra, quæ cervicis moueri ex usu fuerit. Omnes autem thoracis vertebrae septem donantur processibus, duobus nimirum transuersis, duobus ascendentibus, totidemque descendentibus, & vno posteriori, seu spina.

De lumborum vertebris. Cap. XX.

- D** Lumborum, qui Græcis ὀστέα, ἰσθμὸς, & ὀστέον dicuntur, vertebrae in hominibus numero quinque sunt, omnium maximæ & crassissimæ, ob quod etiam ipsarum corpora multis opplentur, quæ non peruia sunt, ac duntaxat valorum nutrimentum afferentium occasione parata. In canibus vero & caudatis simiis plures lumborum vertebrae existunt. Foramen vero dorsali medullæ in iis exsculptum tanto minus est incumbentium vertebrarum foraminib. quanto iam toto progressu spinalis medulla gignendis nervis tenuior, graciliorque euasit. Quo n. spinæ medulla in gignendis nervis magis consumitur, & atrenuatur, eo inferiorum vertebrarum foramina magis et minuuntur, quorum vnum quodque medullæ quæ complectitur crassitudini æquale est. Foramen emittendo nervo, & admittendæ venæ arteriæque in ambobus vertebrarum laterib. cælaturum fere vniuersum ad superiorem referatur vertebra, quæ eius foraminis superiorem sedem ac latera constituit, quum interim subiecta, inferiorue vertebra duntaxat humilioris foraminis sedem efformet. ¶ Lumborum autem vertebrae in hominib. septem donantur processib. vno scilicet posteriore seu spina, quæ iis est valida & crassa, atque ipsarum mole, non admodum procera, aut longa. Si dextrum, sinistrumque in ea spectes, ipsa tenuis est. Si autem superiora inferioraque consideres, latissima. Spinæ mucro appendice, ut & thoracis vertebrarum spinæ donatæ, & valde obtusus est, ac quodam modo triangulum refert. ¶ Duob. præterea transuersis: utrinque, nimirum & multo tenuiorib. dorsum vertebrarum transuersis processib. constat. At interim admodum procere educuntur, quasi costarum usum in lumbis essent præstaturi. Prima quidem & quarta lumborum vertebra breuiorib. transuersis donantur processibus, quæ alia. Præterea nullius vertebrae transuersi si processus sic sursum manifeste assurgunt, ut quinque, quib. quo minus transuersum aliorum modo porrigantur, illi omnia obstant, quæ illius vertebrae corpori vicinior accedunt, quam mediarum in lumbis vertebrarum transuersorum processuum est longitudo. Deinde duob. ascendentibus & descendentibus processib. lumborum vertebrae donantur. ¶ Ascendentes processus interno latere, quo se inuicem regione spectant, sinum adipiscunt satis profundum, & veluti oblongum. Descendentes processus insigniter decliues ferunt, & externo ipsorum latere in ob-

Gal. cap. 10. de ossibus. Corpora vertebrarum lumborum. Foramina. Gal. ubi sup. cap. 8. Vesal. lib. 1. cap. 7.

Lumborum vertebrarum processuum numerus. Spina.

Transuersi processus.

longum tuberculum desinunt, quod magis vertebræ anteriora, quā posteriora respicit. A Tubercula hæc in subiectæ vertebræ ascendentes processus subeunt, adeo ut in lumborum vertebris inferior vertebra suis sinibus superioris admittat capitula, secus quam in ceruice, & thorace, ubi superior suis sinibus inferioris vertebræ tuberculo excipit. Simiæ adhuc duos, vnum utrinque acutos processus ex abundanti habent, ad inferiora vergentes, iuxta foramen sitos, quo nervus a spinali medulla principium ducens prolabitur. Canibus quoque duæ humiliores thoracis vertebræ, quemadmodum etiam lumborum superiores quinque, eiusmodi processibus ad transuersorum processuum radicem consistentibus donati sunt. Quorum certe Galenus in cap. 10. libri de ossibus, iis meminit verbis: *Lumborum, inquit, vertebra processu quodam abundant ad inferiora vergente: isque iuxta nervi ortum situs est. Hunc nonnunquam vertebra lumborum omnes habent, in postremis aliquando vel pusillus admodum, vel nusquam cernitur. Idem supra positis vertebris, non secus ac duabus dorso postremis semper inest.* Hæc ille. Quæ quidem verba, ideo citanda esse nobis duxi, ut hinc clare omnes intelligerent descriptiones libri de ossibus, simiis, & canibus magis, quam hominibus convenire. In homine enim ne signum quidem eius processus vlla in vertebra, nisi in duabus thoracis postremis, reperitur.

De sacro osse. C A P. XXI.

Gal. li. 12.
de usu par-
tium c. 12.
Nomina.

OS Græcis ἱερόν appellatum, Latinis *sacrum*, quod scilicet grande magnumque sit, dicitur. Quippe veteres Græci, quicquid ingens ac præclarum haberi volebant, *sacrum* vocare consueverunt. Sic sane Homerus ἱεγρόθαλασσας, ἱεγρόν ἡλίω, & ἱεγρόν ἰαίον, *sacrum mare, sacrum piscem, & sacrum Ilium*, pro magno dixit. Quinetiam Latini *sacrum* nominant, quod magnum est. Ita Virgilius *sacram auri famem*, hoc est, magnam cupiditatem, appellavit. Sunt qui *sacrum* ea ratione nominari putant, quod partus tempore diuinitus, citra musculorum auxilium, huius cum ilium osse connexus referetur, ac denuo occulto naturæ artificio committatur, quod tamen falsum esse constat. Vocatur etiam πλατύ, hoc est, *latum amplumque*, quod eius amplitudo facile reliquarum vertebrarum, quibus instar basis

Gal. ibid.
cap. 15.
Numerus.

tutissimique fundamenti subiicitur, amplitudinem vincat. ¶ Ceterum in homine plurimum sex partibus, seu ossibus, inuicem valide nexis, si a simiis, & canibus, tribus constituitur. In canibus enim & simiis, quibus Galeni descriptio eleganter & scite congruit, sub infima lumborum vertebra os quoddam reponitur tribus efformatum ossibus, ita inuicem commissis, ut in anteriori sede iuxta eorundem medium talem connexus speciem ostendant, qualem vertebrarum corpora mutuo compacta exhiberent, si quando ita coaluissent, ut ne tantillum quidem moveri possent, & ex ipsorum medio omnis cartilago temporis progressu iam evanuisset. ¶ Tria hæc ossa inuicem ad hunc modum coalita *sacrum*, seu *amplum, & latum os*, Galeno dicuntur. Sunt n. hæc a lateribus ampla, continuæque. Nam quum vertebrarum imaginem quodammodo exprimant, hic amplos, latoque transuersos efformant processus, qui inuicem continui in se insignem & inæqualem asperum; sinum in externo latere leuiter cauum & excisum gerunt, in quem ilium ossa ingrediuntur. In posteriori parte hoc os tres exiguas efficit spinas, non admodum sursum spectantes. Sacrum præterea os superius inferiusque magna ex parte lumborum vertebris proportionem respondet. Superior namque pars, superiori etiam vertebrarum sedi: inferior autem inferiori as-

Canis simiæque ossis sacri descriptio Vesal. lib. 1. cap. 18.

Gal. ca. 11. libri de ossibus. Transuersi processus.

Ascendentes.

Foramina nervis transmittendis incisa.

similatur. Superior enim ossis sacri pars tanta amplitudine protuberat: & appendice donatur, quanta est inferior corporis infimæ lumborum vertebræ pars, quæ sacro ossi eadem prorsus ratione committitur, qua lumborum vertebræ inter se coarctantur. ¶ Præterea sacri ossis superior pars duos obtinet ascendentes processus, eodem modo insinuat, quo ascendentes in lumbis vertebrarum processus cælantur. His excipiuntur infinitæ lumborum vertebræ descendentiū processuum tubercula. ¶ Porro inferior sacri ossis pars, quæ tertiæ & angustissimi trium ossium sacri ossis humilior sedes est, descendentes habet processus, quibus sibi subdito ossi coarticulatur, orbiculari quoque protuberat corpore lumborum vertebrarum corporibus forma admodum simili. Nulla enim ratione illud ab iis variat, quam quod sacri ossis corpus lumborum vertebrarum corporibus tanto minus sit, quanto hoc corpus mole ab illis vincitur. Præsens sacri ossis corpus vni committitur ossiculo, quod ex tribus ossibus coccygis ossibus, sequenti capite, primum enarrabitur. Quinetiam foramina nervis transmittendis incisa, Galeni in libro de ossibus descriptioni pulchre quadrant. Tria enim nervorum paria ab ipso sacro ossi tribu-

- A** tribuuntur, quorum primum id censetur, quod inter primum ipsius os & infimam lumborum vertebram elabitur, cui foramina ad eum modum inciduntur, quo in lumborum vertebris ea haberi iam pridem proditum est. At secundum & tertium par non a lateribus, primi paris ritu, exsiliunt. Quum n. sacri ossis latera articulatione cum ilium ossibus præpedirentur, impossibile fuit & hic quoque per latera nervos excidere. Quocirca in anteriori & posteriore ossis sacri sede foramina in ossium compage cæstantur, ut hac naturæ industria, ab illis nervorum paribus, quemadmodum & a ceteris fere omnibus, antrorsum retrorsumque, soboles opportune dirigerentur. Atque hoc est, quod Galenus ait, *non ab utroque latere, sed intrinsecus & extrinsecus prosilire nervos*. Ac secundo quidem pari foramina in primi ossis cum secundo compage excinduntur. Tertio autem pari via paratur, qua secundum ossis sacri os tertio coalescit. ¶ In homine v. sub lumborum vertebris quinque; vel sex plurimum ossa sacrum os nominatum constituunt, quæ inuicem ita committuntur, quæ admodum tria ossa canis sacrum os efformantia. In medio n. anterioris sedis connexus ostendunt, qualem vertebrarum constituerent corpora, si ita coaluissent, ut nihil cartilaginis in horum ossium unione viseretur, nisi forsitan in infantibus, quibus ossa adhuc prorsus non coaluerunt. ¶ In lateribus quoque; anterioris partis, ubi transversus horum ossium processus inuicem uniuntur admodum obscura connexus apparet species. In posteriori autem sede, unio prorsus in adultis aboletur, unumque os ex illis sex efformatum conspicitur. Nulla enim hic unionis se offert linea, nisi interdum in primi ossis cum secundo coalitu. ¶ Quippe non raro primum os secundo posteriori sede ea articulationis formam committi spectatur, qua ascendentes descendentesque, in lumbis vertebrarum processus articulari solent. Verum etsi illi processus ita iunguntur, transversus tamen eius ossis processus, omni ex parte secundi ossis processibus coalescunt, & omnes isti connexi adeo sunt validi, ut primum os ne tantillum quidem super secundum moveri queat. ¶ Aliquando tamen sacra ossa in cæmeteriis obvia, primum os abruptum ostendunt, idque ac si lumborum esset vertebra seorsum reperitur. Nisi n. id primum os crassis & amplis donaretur transversis processibus, a lumborum vertebris forma vix discerni posset. ¶ Porro in pueris quinque; vel sex horum ossium coalitus etiam in posteriori sede conspicuus est, quemadmodum in anteriori parte est spectatissimus. Deinde ut in nullis hominibus in anteriori sede coalitus omnino obliteratur, ita etiam perpetuo in posteriori sacri ossis sede ea coalitus species se offert, quæ ossium corporibus perficitur. Si enim foramini spinali medullæ in sacro osse inciso, animum accommodaveris, per foraminis progressum ossium corpora ita liquido coaluisse cernes, atque in anteriori sede. Præterea quinque; vel sex horum ossium series tribus ossibus, quæ canis sacrum os efformant, respondet. Quemadmodum enim his supremum maius est medio, & medium maius est infimo, ita quoque hominis ossa tanto minora videntur, quanto humiliorē in sacro osse sedē occupant. Hinc est, quod primum etiam os inter reliqua ossis sacri ossa amplioribus, crassioribusque & antrorsum retrorsumque magis prominentibus, transversis constet processibus. Primi præterea seu supremi ossis superior pars, omnino superiori sedi cuius lumborum vertebræ respondet. Ut enim hæc appendice donatur, & amplitudine protuberat, ascendentesque processus obtinet, ita etiam sacri ossis pars superior. Et corpus etiam quintæ lumborum vertebræ ita primo ossi adaptatur, ut lumborum vertebræ superioris vertebræ processuum tubercula suscipiunt. Sexti v. seu postremi ossis humilior pars insigniter ab inferiori sede tertii canum ossis differt. Hominis enim os nullos descendentes adipiscitur processus, quibus sibi subdito ossi coarticularetur: sed duntaxat in orbiculare, sed paulo latius, desinit tuberculum, quod primo ossi coccygis in homine ossis, eo modo committitur, quo vertebrarum corpora inter se, aut potius quo caudarum ossa mutuo coarctantur. Quinetiam transversus humani ossis sacri ossium processibus in externo latere, parumper versus posteriora sinus exculpit, cui alterius lateris illius os validissime coarctatur. Est autem hic sinus admodum asper, & inæqualis, ac primum
- F** quidem per ipsius longitudinem in medio extuberantem habet lineam, aut amplioris lineæ modo prominens tuberculum, quod sinu rursus in anteriorem & posteriorem sinus dirimit. Anterior utrinque simplex est, asper tamen, & inæqualiter admodum incisus. Posterior altius cavatur, verum in medio processum ostendit transversum, extuberantem, quod sinu posteriorem denuo in anteriorem & posteriorem interfecat. His sinibus aptissime respondent illius ossa, mutuis tuberculis sinibusque donata. Sinus hi & tubera cartilagine aliorum sinuum modo non obducuntur.

Hominis
sacri ossis
descriptio
Vesal. loco
citato.

Sinus in la-
teribus sa-
cri ossis.

Foramina
nervos in
sacro osse
transmit-
tentia.

Anterior &
posterior
sacri ossis
pars cuius-
modi.

Coccygis
canis de-
scr. p. 10.

Cap. 12. de
ossibus.

Galenus
ibidem.

Quum enim alia tubera & sinus læui continuaq; & plana cartilagine incrustentur, isti sacri ossis sinus nihil præter cartilaginea educunt ligamenta, sacrum os robustissime ilium ossi connectentia. Hi sinus præterea ad tria potissimum superiora ossa sacri ossis referuntur. Inferiora n. processus transversos habent tenues, at amplios interim, & inter se continuos, ex quibus musculus ille nascitur, qui femoris motorum quartus est. Verum transversus quinti ossis processus ea parte, qua transversus sexti ossis unitur processui, tuberculum exserit, utrumq; prominens & crassum, in hoc formatum, ut oportune duo ligamenta hic sacro ossi implantarentur, de quibus lib. 2. fusius agemus. ¶ Foramina nervis transmittendis in sex aut quinque istis ossibus exsculpta, imagine, non numero, illis omnino conveniunt, quibus tribus canis ossibus inciduntur. In anteriori enim sede quatuor aut quina utrinque iuxta corporum compagem foramina cælantur, & totidem in posteriori sede, adeo ut hæc ossa quinque vel sex nervorum paribus viam præbeant. Primum namque inter primum os, & quintam lumborum vertebram perinde egreditur, ac reliqui nervi ex lumborum & thoracis vertebrarum lateribus profluentes. Secundum par inter primum ossis sacri os, & secundum, & alia hæc serie deinceps ita elabuntur, ut excidens par ad subditum os perpetuo referatur. Præter hæc foramina nervis exsculpta, in posteriori sacri ossis sede alia apparent, inter spinas ossium, in viam quæ spinali medullæ parata est spectantia. Hæc foramina ligamentis opplentur, perinde ac intervalla, foraminaque inter spinas reliquarum vertebrarum conspicua. ¶ Ceterum hæc inter sacri ossis spinas intervalla, interdum continua apparent, neque ullis foraminibus perinde ac in canibus fere peruia. Verum integrim ossis sacri ossibus spinæ obtigerunt, tanto in singulis ossibus proceriores, quanto os ipsum unde prodeunt grandius superiusque est. Tota v. sacri ossis posterior sedes gibba est, & curva, quod ita tutius propugnaculi modo eas, quibus præest, partes tueretur, & ab occurrentibus muniret. Anteriori autem sede lævæ est, neque asperum, sed limum, cauumque, quo aptiorem illis organis quæ cum aliis ossibus instar pelvis cuiusdam complectitur, sedem efformet. Ad hunc sane modum hominis sacrum os se habet, quod interdum, ut dictum est, quinque tantum ossibus constat, & tunc in anteriore sede duo desunt foramina, in posteriori tamen perpetuo sex nervorum coniugis iter paratum cernitur.

De osse coccyge. CAP. XXII.

OS sub sacro osse locatum veteribus anatomicis Græcis *ὀστέον τῆς οὐρᾶς*, a forma obliquitate, & in *μυκρον* ductu ac rubore, appellatum fuit, quod illi hoc ipsum ad cuculi rostrum pueris suis, quos anatomen docuerunt, referrent. Sunt qui illud etiam *ὀστέον τῆς οὐρᾶς*, quod proprie *caudam volucrium* significat, nominant. Vulgus Medicorum *caudam* vocat. Hoc itaque os sub sacro locatum osse in canibus tribus ordine invicem succedentibus, & lumborum vertebris in conformatione non dissimilibus ossibus concinnatur. In nullo namque ab illis imagine differunt, nisi quod transversos processus deorsum magis quam sursum coniuventes habent, deinde spinam aut nullam, aut perquam exiguam a se porrigunt. ¶ Corporum quoque forma penitus illis respondet vertebris, nisi forte pro ossiculorum modo hæc aliquis ampliora esse adstruat. In ascenduntibus autem & descenduntibus processibus ne minimum quidem differunt. Horum enim trium ossiculorum supremum suo corpore tertio sacri ossis ita coarctatur ossi, ut lumborum vertebræ inter se. Quippe suis ascenduntibus processibus, descendentes sacri ossis processus excipit. ¶ Igitur tria hæc ossicula Galeno haud dubie coccyx appellantur. Nam inter hæc tria ossicula, & inter horum supremum, & sacri ossis inferiorē partē, non minus intervenit cartilaginis, aut potius cartilaginei ligamenti, quàm inter lumborum vertebrae, quàm inter tria sacri ossis ossa nihil cernat cartilaginis, præsertim in ætate puerilibus. Præterea in canibus & similibus a tribus illis ossibus musculus femur mouentium quartus, quem Galenus lib. 2. de anatomicis administrationibus a coccyge osse nasci scribit, principium sumit.

Ceterum tribus a coccyge osse in canibus pullulantibus nervorum paribus foramina perinde ac in lumborum vertebris exsculpunt. Quum enim horum ossium latera, ut ossis sacri ossium, articulatione non occupentur, satius fuit eandem hic foraminum serie obsequare, quæ in aliis vertebris laterali articulatione non præpeditis sit. Primum itaque par in utroque latere vno incilo foramine inter tertium sacri ossis os & primum coccygis prodit. Secundum vero inter primum coccygis os, & secundum. Tertium autem par inter secundum & tertium os egreditur. Iuxta tertii ossis extremitatem quæ reliquum est dorsalis medullæ, simplex

- A** simplex coniugisve expers, & nulli associatum excidit. Singulis enim ossibus sacri ossis & coccygis ossis dorsali medullæ via exsculpi, medullæ hic crassitie respiciens. Extremo tertii ossis coccygis ossis in canibus & caudatis simiis solida & non perforata ossa, oblonga, & superius inferiusq; crassiuscula, in medio autem tenuia quadam continua serie annectunt, caudamq; constituunt. Interdum v. neq; id frequenter, in multis canum & simiarum speciebus etiam plura trib. videntur ossis coccygis ossa, eiusdem prius cum tribus superioribus formæ. Atq; ita quoq; illis tunc plura neruorum paria ab illorū ossiū lateribus p̄siliunt. Non caudatis simiis infimo ossis coccygis ossi cartilago tantum adnascit. Vt hinc omnibus pateat Galeni in libro de ossibus descriptionem canibus perbelle conuenire. ¶ Porro in homine Coccyx os crebro quatuor exstruit ossiculis, quorum supremum sinū habet, quo sexti ossis sacri ossis tuberculū excipitur, quod ipsi corporum vertebrarum modo, ligamenti ad modum cartilaginei interuentu committit, nulla interim alia accedente articulationis specie, nisi forte quinq; tantum ossibus sacrum os constituatur. Tūc enim ad foraminis cuiusdam in posteriori sede constitutionem neruumq; sexti in sacro ossi coniugii deducendum ac defendendum primū hoc os coccygis in posteriori sede duos acutos educit p̄cessulos, qui sursum spectantes, quinti ossis sacri ossis processib. valde coalescunt. Porro primū coccygis os, quando sex sunt ossis sacri ossa, quod frequentissime, vt dictum est, accidit, eiusmodi nullos educit processus. Verū ad sinus ei⁹, quo sexto sacri ossis coarctatur, latera superiori ipsius sedelati⁹ adtransuersa extuberat: inferiori autem parte sensim angustat, ac rursus secundo ossi, ita omnino committitur, vt id sexto ossis sacri ossi committi dictum est. Huic deinde tertium & quartum succedunt, eodem penitus modo inuicē commissa, tantoq; minora quanto vniū quodq; in ipsa serie humiliorem locū obtinet. Quatuor iis ossiculis nullū foramen, quo spinalis medulla prepat, aut ex quo vlli exiliat nerui, inscinditur. In sexto enim ossi sacri ossis spinalis medulla terminatur, neq; ipsius extremum in coccygis os descendit. Hæc ossicula fungosa sunt, & pectoris modo rubicantia, ac in pueris admodum cartilaginea, vniuerso contextu ex ampliori basi in mucronem desinunt, cuculiq; rostri modo introrsum curuantur. Infimum ossiculum suo mucrone, quo recti intestini posticam infimamq; sedem contingit, in cartilaginem degenerat, eiūsdē vsus occasio-
- B** ne qua vertebrarum spinis cartilagine obnasci cap. 17. retulimus.

Coccygis ossis in homine delineatio. Vesalius ibidem.

De thoracis ossibus, CAP. XXIII.

- C**ossæ Græcis Medicis dicitur quicquid costis utrinque interceptum circumscriptumque est, secus atque Aristoteli, qui libro primo de historia animalium ca. septimo, vniuersum corporis truncum a ceruice ad pedēda vsq; protensū ita nominauit, inueniens. τὸ ἀπὸ ἀνθρώπου μέχρι αἰδοίων καὶ τὸ ἐκ αἰδοίων μέχρι θώρακος. Anterior v. thoracis pars iisdē στήθος, & στήθρον, Latinis pectus appellatur. Quare cauendum diligenter erit, ne, quod non raro Latini Galeni interpres faciunt, has tres voces inter se confundamus. Est autem thorax veluti septum aliquod præualidum tutelæ gratia cordi & pulmōni circumdatum.

Galenus li. 6. de vſu partium ca. 1. & libro 8. admi. ana.

Pectus quid.

- Atque in eo creando admirabilis Summi Opificis rerum elucet industria, propterea q̄ non totus osseus, neq; carnosus ab eodē factus sit, sed os cū mulculis vicissim alternatimq; commutatum. Si enim ex solis ossib. factus fuisset, motū penitus amississet. Sin contra ex musculis solis, inciderent pulmōni & cordi, nemine eos expellente. Vt igitur simul quidem spatium quoddam an̄ptum intus esset, simul autem totum instrumentum moueretur, musculi ossibus alternatim fuerunt interpositi. Quæ res etiam ad cordis ac pulmōnis securitatem momentum habet non mediocre. Magis n. nunc muniantur, q̄ si soli musculi facti fuissent. Quam itaq; neq; respiratio neq; vox absq; thorace fieri possit, ac dein thoracē primum quidē cor, insuperq; cum ipso pulmōne muniti debeant, in thoracis constructione rerum opifex ad quatuor veluti scopos attendere voluit, vocem nimirum, quæ absq; thoracē fieri nō potuit, respirationem, cordis & pulmōnis magnitudinem. ¶ Thorax enim, qui quodammodo ouali constat figura, tam amplius est, quantam pulmōnis molem esse oportuit. At pulmō interm thoracis sequitur formam, non autem thorax pulmōnis. ¶ Ceterum thoracis ossa sunt ex spinā duodecim dorsī vertebræ, costæ totidē, & os pectoris. Quam veto vertebras eiūsdē antea descriperimus, reliquum est, vt a costis nunc exordiamur sermonem. ¶ Costæ igitur, quæ Græcis στήναι dicuntur, viris & mulieribus ab utroq; latere plurimum duodecim

Natura in creando thorace industria. Gal. 7 de vſu part. cap. 21.

Figura Thoracis ossa. Gale. cap. 13. libr. de ossib. Gal. lib. 8. ana. admi.

sunt. Rarissime siquidem decimatertia visitur, atq; hac adhuc rarius vndecima; adeo ut inter mille vix vnum tali costarum numero reperias. Singulis enim thoracis vertebis, singulæ in ambobus lateribus costæ articulantur. Ut ridiculum plane sit, ac quorundam male feriatorum hominum, monachorum nimirum cōmentum, viros costa quapiam in altero latere destitutos, atq; vnus costæ numero a mulieribus superari. Aristoteles lib. 1. de historia animalium, cap. 15. haud dubie ex aliorum relatu, homini octo tantum costas tribuit, concessurus etiam quosdam gentis Turdulorum, cuius illic meminit, septem costis creari: si modo id alicuius probati auctoris testimonio ipsi cōstitisset.

Costæ verae. ¶ Sunt itaq; plurimum vtrinque, ut dictum est, duodecim costæ, ac septē superiores pectoris ossi & vertebis dorsi articulantur, ideoq; Græcis *πρωτα*, Latinis *vera*, *perfecta*, & *legitima* dicuntur. Quinque autem inferiores solis vertebis annectuntur, ad pectoris vero os haud pertingunt, sed in thoracis lateribus desinentes, suarum cartilaginum finibus inuicem committuntur, duodecima duntaxat excepta, quæ ab vndecima penitus dehiscit, neq; aliqua ex parte ipsam contingit: id quod & vndecimæ nō raro vlu venit, decimæ cartilaginem tunc non attingenti. Quum itaque istæ costæ pectoris ossi, ut comprehensum est, non articulentur, sit ut Græcis *ψευδα*, *ψευδα*, Latinis *spuria*, & *tenuiores*, *illegitima*, *imperfecta*, ac *mendosa* vocentur.

Omnibus costis commune est quod ossea cartilaginosaq; substantia cōstent, quodq; appendice ea sede, qua vertebrarum corporibus connectuntur, & in capitula protuberant, donentur. Ossea vero costarum substantia non omni ex parte sibi similis est. Vbi enim costæ vertebis articulantur, ac vbi dorsum efformant, solidiores, multoq; duriores sunt, quam in thoracis laterib., & iuxta pectoris regionem, vbi magis fungosa exstruuntur substantia, quæ tenui squama seu lamina obducitur, atq; hæc illic demum tenuissima est, vbi in cartilaginem degenerat. ¶ Cartilago quoq; non parum vndique ostendit speciem. Inferiorum enim costarum cartilago mollior est, vnde etiam fortassis nōnulli illegitimas costas *χόνδρους*, quasi cartilagineas dicas, vocari tradunt. Proin partes supra umbilicum vtrinq; ad latera iam dictis spuris costis subiectæ, Græcis & Latinis *Hypochondria* nominantur. ¶ Superiorum autem costarum cartilago durior est, solidiorque, ac in senibus intus ossea efficit. Id quod in canibus, simiisq; adeo est manifestum, ut Galenus verarum costarum cartilagineas osseas, spuriarum vero exquisitas cartilagineas dixerit.

¶ Præterea non est omnium costarum par longitudo. Prima namq; & duodecima brevissimæ sunt, mox secunda & vndecima, quæ omnes brevibus donantur cartilaginibus. Sexta v. septima, & octaua longissimæ sunt, ac longissimos etiam obrinent cartilagineas. ¶ Primæ costæ cartilago amplissima est, quemadmodum & prima costa ceteras quoque amplitudine superat, mox hanc secunda, & deinde tertia subsequuntur. Duodecima vero, & vndecima omnium sunt tenuissimæ, & in tenuissimas quoq; terminantur cartilagineas. Mediæ autem medio se habent modo, quarum cartilagineas subinde in progressu ab ossea costæ substantia latiores efficiuntur. Quum enim cartilagineas sex superiorum costarum intervalla efforment, totoq; ductu ab inuicem æque distet, sextæ, septimæ, octavæ, & nonæ interdum costarum cartilagineas varie in progressu lateſcunt, inuicemque continuatæ intervalla ipsarum suamet substantia implent. ¶ Ad hæc quinque spuriarum costarum cartilagineas in acutum mucronem delinunt. Verarum autem haud item. Primæ enim costæ cartilago suo fine, qui pectoris ossi valide connascitur, amplior sit, quam qua primum ab ossea costæ substantia educitur. Secundæ ac tertiæ, triumq; subsequentium costarum cartilagineas modice in progressu arctantur, & singulæ in tuberculum finiunt, quo pectoris ossi articulantur.

Costis non omni ex parte eadem adest leuitas. Interna enim sede, qua membranam ipsam succingentem spectant, omnes læues, minimeq; asperæ apparent. Tertia tamen, & illam ad decimam vsq; subsequuntur, in interna ipsarum sede versus humiliora sinu ostendunt, ipsis secundum earum longitudinem exsculptum, non quidem per vniuersam costæ longitudinem conspicuum, sed maxime ea sede qua primū a vertebis abscedit, atq; in thoracis latera ferri incipiunt. Sinus iste paratæ venæ caux ramo, quæ vena cōiugata carens costis exporrigit, deinde etiam hac vehitur arteriæ magnæ lobolæ, & nervus a spinali medulla pñatus. Verum quia hæc vasa in mediis costis grandia sunt, ac pari semper feruntur serie, in tribus autem superioribus minima & errabunda dicuntur, non

mirum

- A** mirum est medias costasiis sinibus ornari, superiores vero non item. Porro tres costæ humiliores, etiam si magna illis attenduntur vasa, quum tamen tenues & interna sede deprellæ cernantur, etiam citra huiusmodi sinuum operam, illis vasis tutum iter præbet. Hic sinus vasis deducendis cælatus, inferiorem costæ partem acutiorem, tenuioremque efficit, quam sit superior, quæ obtusior, magisque ueres videtur. ¶ Externa costarum sedes, quæ gibba est, non omni ex parte læuis occurrit. Ea enim parte qua costæ vertebris alligantur, præterquam quod tubercula & capitula efformant, quibus vertebrarum inarticulantur sinibus etiam asperæ inæqualesque sese offerunt, quo aptius hinc ligamenta educantur costas vertebrarum corporibus, & transuersis earundem processibus colligantia. ¶ Præterea in hac externa costarum sede, ubi primum a transuersis vertebrarum
- B** abscedunt processibus, tuberculum quoddam asperum inæqualeque visitur, tendinibus undecimi dorsum mouentis musculi excipiendis paratum. ¶ Deinde quæ costæ adhuc magis a transuersis vertebrarum abscedunt processibus, in hac posteriori externaque ipsarum sede, asperæ inæqualesque sunt, ac etiam veluti tubere quodam modice prominenti donantur, ut in illas apta insertionis sedes eius musculi efficeretur qui in homine thoracem mouentium quartus est. Dein hæc asperitas non duntaxat illius musculi insertioni idonea est, imo etiam externi intercostales musculi hinc enascunt, qui hac iuxta vertebra regione non solum ab inferiori sede superioris costæ in humilioris costæ elatiore enascuntur partem, verum etiam ab externa vnius costæ sede ad externam alterius hic exportiguntur. ¶ Reliqua vero regione costæ leues æqualesque sunt, nisi forte quispiam eas modice asperas in superiori & inferiori parte esse contenderet, a qua intercostalium musculorum pender origo, in quamque eorundem etiam insertio perficitur. Prima costa superiori sede, qualatissima est, priuatim aspera inæqualisque cernitur, ut musculis dorsum mouentium quattuor hinc principium opportune sumat. ¶ Costis omnibus non par ad vertebra obtrigit articulatio. Nouem enim superiores duplici coarctantur articulo, vnde decima autem & duodecima simplici, quemadmodum & decima quoque rarissime duobus articulis suæ committitur vertebræ. ¶ Ceterum costæ duobus nodis articulatæ duo habent tubercula, vnum quidem, quo sinui vertebrarum corporibus inciso inarticulantur; alterum autem, quo internæ sedi apicis transuersi processus firmantur. Atque
- D** hæc tubercula sinibus qui vertebris insculpti sunt respondent. ¶ Prima igitur costa rotundo tuberculo primæ thoracis vertebræ corpori inarticulatur, ac deinde transuersum eiusdem vertebræ processum tantisper ascendit, quousque ipsius apici alio capitulo tuberculo ve articuletur. ¶ Secunda vero costa & septem subsequentes communi semper duarum vertebrarum corporum sinui non rotando, sed instar obtusi anguli protuberante capitulo inarticulantur. ¶ Transuersis autem processibus pari modo cum prima coarctantur costæ. Quamquam & hic quædam in articulis, propter sinus non eadem sede in transuersis processibus exsculptos differentia consurgat. ¶ Superiorum enim vertebrarum transuersi processus, suos sinus in humiliori parte internæ illarum sedis incisos gerunt. Inferiorum autem, in superiori parte. Mediarum vero vertebrarum sinus medio se modo habent. ¶ Porro trium inferiorum costarum articulatio, quæ ad vertebrarum duntaxat corpus perficitur, sinibus quoque non admodum alte cauatis, neque valde protuberantibus capitulis fit. Atque hac ratione costæ vertebris committuntur. ¶ Ceterum pectoris os, quod Græcis, ut comprehensum est, στήθιον & στήθος dicitur, aliam
- E** in quadrupedibus animalibus, aliam vero in homine constructionis rationem habet. ¶ Quippe in canibus, simiis, & aliis quadrupedibus pectoris os septem constat ossibus, non admodum inter se forma differentibus. In canibus tamen porcis, & ouibus inuicem conueniunt: in simiis vero & sciuris, propter clauicularum articulationem, primum supremumque os aliquantulo ceteris amplius videtur. ¶ Septem hæc ossa latiora, quæ profundiora crassiorave sunt, & qua inuicem committuntur non nihil latiora, quam in
- F** ipsorum medio existunt. Horum connexus cartilaginis interuentu interdum tā laxè perficitur, ut a vertebrarum compage modice differat. In harum commissurarum lateribus sinus utrinque exsculpiuntur, cui cartilaginis, in quam costæ degenerant, tuberculum aliquod inarticulatur. Ad primi enim ossis cum secundo contextum, secundæ utriusque lateris costæ cartilago articulatur. Ad secundæ ossis cum tertio commissuram, tertiæ utriusque lateris costæ cartilago ipsius serie suorum ossium commissuris

Costarum
asperum tu-
berculum.

Costarum
ad verte-
bras arti-
culatio.

7. 8. 9.

Pectoris
ossis descri-
prio.
Quadrupedum.

Lib. 7. ana.
admi. & ca.
13. libri de
ossib. Caro-
li Stephani
commentū
exploditur.

Humani pe-
ctoris ossis
descriptio.
Vesib. ibi.

Primum os.

σφαγι.
Iugulum.
Furcula
superior.

Secundum.

Tertium.

coarctatur. Verum primi ossis lateribus prima costæ cartilago adarticulatur, aut potius adnascitur. *Septimum* autem os, quod reliquis gracilius, magisque teres est, in cartilagine exacuitur, ipso osselatiorem, ensisq; mucroni quam similitudinem. Atque huiusmodi sane pectoris ossis in canibus & similibus ratio est, quam Galenus spectauit. Neque est cur quispian hoc loco aures præbeat Carolo Stephano, qui Galenum conficta quadam ratione excusare conatur, hac nimirum. Galenus antiquo more os pectoris totum in longum ad mucronatam usque cartilaginem in duas partes dissecuit, ideoque tria ossa in homine iam sex erant, quibus septimum adiecit, quod *ensiformem cartilaginem* appellauit. Nam si hac ratione ossa numerare licebit, ex unoquoque in corpore humano osse, duo, tria, vel plura etiam efficies, prout scilicet singula vel in duas, tres, aut quatuor partes dissecueris. Sed hanc numerandi ossa pectoris rationem Galeno ne per somnium quidem venisse in mentem, satis conuincit locus, qui est in capite libri de ossibus iam citato, ubi inter cetera sic scriptum reliquit. *Ossa pectoris sunt numero septem, sicuti costæ quæ cum ijs articulantur.* Quibus verbis diserte innuit septem ossibus pectoris, septem quoque costas articulari, quod fieri non posset, si tria tantum, ut Carolus putat, essent. Tres namque cum tribus illis ossibus duntaxat costæ articulantur. Quare de ossibus simiarum ac canum loquutum esse Galenum fateamur oportet, in quibus ut sunt septem a se inuicem distincta pectoris ossa, ita etiam illis septem costæ articulantur. ¶ Verum si humanum pectoris os intuitus fueris, quemadmodum id cum aliorum animalium ossibus collatum breuissimum est, ita etiam multo aliter se habet. Nam in adultis tria tere tantum conspiciuntur ossa, prorsus inter se varia. ¶ Primum quidem insigniter amplum est, & nonnihil etiam crassum, ita tamen ut ipsius crassities ab amplitudine plurimum vincatur. Os id interna seu posteriori sede, qua thoracis respicit amplitudinem, modice cauum est, in anteriori autem gibbum, & in medio per ipsius longitudinem longe crassius, quam in lateribus. Vides enim in anterioris sedis lateribus depressum, atque ut apte primæ costæ cartilaginis crassities responderet extenuatum. In medio autem roboris gratia trianguli modo protuberans. Superior etiam ossis pars crassior ampliorque est inferiore, & utrinque uno sinu longo, ac versus posteriora inciso, & cartilagine incrustato donatur, cui clauiculæ caput inarticulatur. In horum sinuum medio, prope extuberantiam illorum interiora latera, hoc primum os in superiori hac sede lunatum cernitur, & veluti foueam ostendit, quæ Græci σφαγιον, Latini proprie *iugulum* vocant, vulgo autem *furculam superiorem*. Inferior ossis pars utcumque aspera est, & secundo ossi cartilaginei ligamenti interuentu adeo laxè committitur, ut nunquam horum ossium lateat connexus, imo & ipsius quoque motus in magnis respirationibus interdum animaduertitur. ¶ Secundum os multo amplius est, quam crassum, superiori sede qua primæ connectitur ossi, strictius est, quam prope inferiorem. At nullibi interim eque amplum cernitur, atque primi ossis elatior sedes. Quæ utique parte hoc os primo committitur, in utroque connexus latere sinus insculpitur, ambobus ossibus communis, & cartilagine incrustatus, cui secundæ costæ cartilago instar obtusioris trianguli verticis protuberans inarticulatur. Præter hunc sinum, præsens os utrinque alios multos obtinet pari modo, instar obtusioris anguli insinuos. Verum hi paribus interuallis ab inuicem nequaquam distant. *Primum* enim in altero latere huic ossi propius sinus, qui tertiæ costæ cartilagini paratur, a sinu secundæ costæ gratia inciso longius distat, quam secundus huius ossis peculiaris sinus, quartæ costæ gratia cælatus. Rursus plus interualli consistit inter secundum sinum & tertium, quam inter tertium & quartum. Adeo ut sinus sextæ & septimæ costarum nomine in hoc osse sculpti, se inuicem contingant, vixque mutuo remoueantur, & non tam alte, atque superiores excavaentur. Suscipit enim hoc secundum os priuatim tertiæ, quartæ, quintæ, sextæ, & septimæ costarum cartilagine, secundæ costæ cartilaginis modo protuberantes.

Præsens os in pueris ex plurimis efformatum videtur ossibus inuicem symphisi seu unionem, cartilaginis interuentu cõtextis. ¶ In cõmeteriis secundum os integrum, & a primo disiectum fere semper effoditur. Et si fortuito in secundo osse aliquam cõpaginis speciem, ac si ex pluribus constaret, obseruabis, ea potissimum apparebit, ubi tertiæ costæ cartilago ossi articulatur, & deinceps ubi quaratarum costarum cartilagine pectoris ossi adiunguntur. ¶ *Tertium* v. os exiguum est, & inferioris secundi ossis sedi interna parte eadem ratione committitur, qua primum secundo iungitur, illicque secundo ossi necitur, qua septimæ

- A** septimæ costæ cartilagine infimæ secundi ossis sedi articulantur. Hoc os modo amplius est ac tenue, humilioriq; sede in mucronatâ cartilaginē degenerat. Verum id nō infrequenter deesse reperies, & mucronatâ inde cartilaginē enasci cōspicies, vbi septimarū costarū cartilagine mutuo coeūt, secūdoq; pectoris ossis articulāt ossi. Tria hæc pectoris ossa simul iuncta manubrii alicuius gladii imaginē representāt. *Primi* namq; ossis superior pars, quæ lata admodū est, illi manubrii parti respōdebit, quæ sub paruo digito in apprehensione consistit. *Secundum* autem os illi parti congruet, quam manus tota intus complectitur, in qua sinus costarum cartilaginibus parati instar fouearum erunt, quib. digiti firmari possent. Atque huiusmodi foueæ cum p̄starent vsum, quem in gladiis ex manubrii asperitate quærimus, quoties in tortis nodisq; funiculis, aut scabra piscis cute, manubriū obduci curamus. *Tertium* os vna cū cartilaginē, reliquæ gladii parti posset assimilari. Hinc est quod nonnulli vniuersam hanc ossium struem *Exponēs*, ab ensis imagine vocarint. Alii, qui canes potius, ac similes, quam homines spectarunt, mucronatam cartilaginē duntaxat hoc nomine dignati sunt, quod hæc scilicet gladii mucronis formæ accedat, ipsumq; canum pectoris os, ensis imagini non ita apte ac humanum os, cōferri queat. Barbari autem sectantes medicinam *malum granatum*, quod scilicet vnius balustii apicis imagini accedat, item scutum, clypeum oris stomachi, scutalem, cultralem, epiglottalemque, quod speciem laryngis operculi referat, appellant. ¶ Pectoris ossis substantia admodum fungosa mollisq; est, & anteriori sedemagis continua squama, q̄ posteriori obducit. Posterior enim sedis squama multis, inæqualibusq; donat foraminibus, quæ haud peruia sunt, sed valis solum viam præbent, quibus id os nutrit. Atque hæc foramina in primo osse tanto magis sunt conspicua, quanto huius crassities secūdi crassitiem vincit. ¶ Est autem pectoris os illis costis, quæ orbiculatim thoracis amplitudinē efformant, stabiliendis p̄creatum. Propugnaculi etiam vicem habet, eosq; vsum homini præstat, quos thoracis ossa. ¶ Cartilago v. in quam pectoris os exacuit, oris ventriculi, & partis septi transversæ, quæ illic est, postea quoq; cordis propugnaculū existit. Porro costarum ossa quum primum a vertebra abscedunt, in posteriora deorsum obliquātur, & hinc ad thoracis latera deorsum semper oblique versus anteriora declinant, quousq; in cartilaginē desinunt oblique ac circulatim sursum in anteriora porrectam; adeo vt costæ vbi cartilaginē primum educunt arcuatim, & in angulum quodammodo sursum flectantur.

Tertiu os
interdum
desideratur
Forma.

Gal. ca. 13.
li. de ossib.
Exponēs.

Barbaræ
appellatio-
nes.

Pectoris
ossis sub-
stantia.

Vsus.
Mucronatæ
cartilagine
Gale. lib. 7.
de vsu par-
tium ca. 27.
Costarum
ductus.

De osse cordis. CAP. XXIV.

- O**ssiculum quoddam ad basin cordis inuenit, vbi aortæ, venæ arteriosæ, earundemque membranarum habentur radices. Quare si quis detecto sinistro cordis sinu, & in longum toto arteriæ magnæ p̄cessu aperto, radices, aortæ & membranarum sequat, facile ipsum reperiet. Hoc tamen non vniuersis animantibus exactum os est, sed cartilago. In minutis enim leuiter cartilaginolum est, in grandioribus exacta cartilago, in valde grandib. cartilago ossea. Et quanto animantis genus corporis mole grandius vastiusq; fuerit, tanto plus ossis substantiæ cartilago sortita est. Atq; in maximis vbi plus ossis substantiæ gignit, conuenit ipsum tunc appellare os cartilagineū, nō cartilaginem osseam. Eximie quidem magnitudinis os Galenus a corde elephantis Romæ iugulati se exemisse tradit. ¶ Vesalius noster hoc os nihil aliud esse censet, quam magnæ arteriæ, & arterialis venæ radices, a corde principium ducentes. Hæ enim vasorum radices perinde ad se mutuo sunt contemine, ac si duos circulos in puncto inuicem committeres cōtinuaresq; ita vt dexter circulus venæ arterialis esset radix, sinister v. qui amplior esset magnæ arteriæ. Vbi a. circuli mutuo committerent, is locus esset, quo hæc vasa suis orbibus simul connascuntur vniunturq; ac vbi optima cartilagine consisteret portio, quæ oblonga & veluti teres esset, tota nimirum sede qua illæ radices inuicem committunt, & reliquæ interim circuloꝝ portiones essent resectæ. ¶ Vt toto cœlo errent, qui cordis os instar aut efformatum esse sibi persuadet. Proinde ossiculum illud quod e ceruorum cordibus exemptum officinæ seplariariorū iactitat, aliud nihil esse Vesalius noster putat, quam grandius agni hyoidis ossis ossiculum, quod continuum est, & a similitum nisi quod dextram crus etiam transversum in hunc modum, & sinistru decussatim secet, & alterum crus altero breuius sit. ¶ Nostra ætas in cordis malis tanquam eximio aliquo medicamento ceruini cordis osse vitur, idq; nullo veterum Græcorum exemplo.

Gallib. 7.
ana. admil.
Os cordis
vt inuesti-
gandum.

Vesal. li. 1.
cap. 20.

Dexter.
Sinister.

Figura ossis
cordis, & a-
natomico-
rum lapsus.
Os cordis
officinariū
quale.
Vnus Medi-
cus ossis
cordis.

¶ Posteriores autem Græci. Actuarius præsertim, & Nicolaus Myrepsus, crebro in suis A compositionibus ceruini cordis mentionem faciunt, perinde atq; Arabes ipsi, qui oēs vno ore cor humanum, totius substantiæ similitudine, os illud roborare fatentur.

De scapulis. CAP. XXV.

Q Væ Græcis ὀμοπλάτυ, ἐπὶ τὸ πον, & simpliciter πλάτυ, Latinis *Scapula*; plerumque etiam humerus, Celso *scoptulum apertum*, & simpliciter *Scoptulum*, vulgo & Barbaris *Spatula* dicitur. Scapulæ autem vtrinque singulæ posteriori thoracis regioni versus superiora innituntur, & occipitis ossi, ceruicis, thoracisque vertebris, costis, & ossi hyoidi, musculorum duntaxat interuentu copulantur. ¶ Occipitis quidem ossi beneficio secundum scapulam mouentium musculus, qui etiam hanc multarum vertebrarum spinis committit. Tertiū vero scapulam mouentium ope, ceruicis vertebris necitur. Quintus vero scapulam mouentium illam aliquot thoracis, & ceruicis vertebrarum spinis firmat. Costis scapulam committit primus illam mouentium musculus, & thoracem mouentium secundus. Ossi autem hyoidi, septimi eius ossis peculiariū musculorū ope scapula copulatur. In hominibus, simiis, ac sciuris, & si quæ alia clauiculis donantur, ex abundanti ligamentorum auxilio, scapula clauiculis coarticulatur, clauiculæque contermina est. ¶ Porro scapula inæqualis admodum est, omniq; ex parte sibi dissimilis. Quippe præter varios ipsius processus, sinus, tubera, appendices, eiusq; generis reliqua, e quibus ossium sumuntur differentiæ, trianguli differentibus lateribus efformati imaginem quodammodo exprimit. ¶ Primum namq; ipsius latus, quod basim scapulæ vocabimus, ea scapulæ sedes est, quæ secundum dorsū longitudinem thoracis vertebrarum spinis proxime exporrigit. Basis hæc obliqua constat linea, quæ superius & inferius, versus corporis latus oblique veluti in circuli connexum inclinata, in medio autem crebro paululum lunata cauaque visitur. ¶ Huic basi plerumq; duæ adnascuntur appendices, vna quidem quæ grandior, crassiorq; & longior est, ac perpetuo apparet, ad basimq; inferiorem consistit angulum insigniter obtusum, ac veluti orbicularem. Altera vero appendix aliquantulum sub superiori habet angulo, illiq; basis sedi coalescit, a qua scapulæ spina principium ducit. ¶ Præter has appendices etiam basi mollis quædam cartilago adnascitur, eius cartilaginum generis, quod ossium extrema nulli ossi commissa augeri solent. Atq; ita primū scapulæ latus basim se habet. Duo autem reliqua, inter se variant. Inferius enim ab humiliori basis sede admodū obliquo sursum in anteriora ducitur: superius vero deorsum non nihil in exteriora fertur, quodammodo transuersim procedens. Duo hæc latera in angulum coeunt, & latiusculam scapulæ partem suis extremis finibus continent, in qua ceruix scapulæ sinusq; conspicitur, humeri caput excipiens, adeo vt hæc sedes tertius scapulæ angulus futura sit: quandoquidem primum angulum superiorem basis angulum numeramus, secundum vero humiliorem. ¶ Ceterum duo hæc latera suis finibus tertium angulum constituentia, non solum ductu & breuitate inter se discrepant, verum etiam crassitie. Inferius enim latus quo altius a basi sursum conscendit, eo crassius & insigniter spissum efficit. Natura enim huius lateris beneficio scapulæ alioquin tenui & infirmæ magnū robur additum voluit, ac deinde secundario quibusdam musculis commodi exortus locum præparauit. Præter id enim quod musculorum quorundam gratia huius lateris crassities internam scapulæ sedem cauiorem reddit, & in externa sede seu gibbo, veluti sinum efformat, ipsum quoq; in sua externa sede prope inferiorem basis scapulæ angulum compressionē obtinet, ac deorsum quadantenus educit, vt musculus illic principium sumeret, cuius ope brachium veluti a pectore reflexū, retrorsum ducitur. Quintum etiam interna huius inferioris lateris sede iuxta ipsius elatiorem partem, qua id scapulæ ceruicem terminat, etiam oblongus aliquantulum asper, inæqualisq; conspicitur sinus musculo principium porrigens, qui a scapula enatus cuti extensionis auctor est. ¶ Ceterum inferius scapulæ latus, inferiorem costam veterum Græcorum more appellabimus, qui superius inferiusq; scapulæ latera, πλευράς vocauerunt. Superius autem scapulæ latus tenue, minimeq; crassum est, ad eam vsq; sedem, qua scapulæ ceruicis superior regio consistit, interiorq; processus scapulæ exoritur. Hac namq; sede superius scapulæ latus impense crassescit. Deinde priuatim huic lateri iuxta interioris scapulæ processus radicem, sinus quidam seu mediū foramen instar semicirculi insculpitur, vix porrigēs nerui quinti paris

Scapulæ nomina. Situs. Numerus. Nexus. Galen. cap. 14. lib. de ossibus. Vesal. ca. 21.

Forma. Galen. ibidem.

Primum latus. Vesal. ibidem.

Basis appendices.

Spina scapulæ. Basis cartilago. Inferioris superiorisq; laterū differentia.

Tres scapulæ anguli. Inferius latus.

Inferior costa. Superius latus.

- A** hac vna tum vñcula arteriaq; posteriorem scapulæ sedem adeunt. Porro scapulæ ceruix, quæ inter superioris & inferioris scapulæ costarum fines habetur, crassa est, ipsaque scapula ex ampla tenuique sede inibi coarctata, & per latitudinem incrassata cernitur. Insignius adhuc extrorsum ducta ceruix, dilatatur, & ut ipsa oblonga est, ita etiam oblongum efformat sinum, inferiori parte circulari circumferentia terminatum, superiori autem parte in acutum magis exporrectum. Atq; id propter impressionem accidit, hic internæ cervicis sedi factam, tendinis eius musculi ducendi gratia, qui intro antrorsumq; brachium circumuertit. Præterea sinus cervicisq; scapulæ superior pars, in hoc præterius extuberat, quo aptius hinc duo validissima huius articuli pronascerentur ligamenta, & externum quoq; caput eius musculi commode hinc principium duceret, qui cubitū flectentium anterior censebitur. Hic scapulæ sinus cartilagine reliquorum articuli sinuum modo incrustatus, non admodum alte celat. Neq; etiam huius longitudo, & amplitudo respondent humeri capitis, q; ipsi inarticulatur, longitudini & amplitudini. Quod sane in hoc articulo natura peculiariter machinatur. Quum autem natura hunc scapulæ sinum satis leuiter, laxorum motuum gratia, exsculpsisset, illumque non valde amplum longumque creasset, præter peculiaria huius articuli ligamenta, *de quibus suo dicemus loco*, & quosdam scapulæ processus, quos paulo post explicabimus, cartilaginem quandam ligamenti substantiæ compotem in hoc sinu crebro effingit, quæ sinum auget, profundiorēq; efficit, nimiamque luxandi promittitudinem multum corrigit, parum interim laxissimos differentesque brachii motus, quibus maxime indigemus præpediens, in ambitu enim huius sinus ea cartilago ponitur, scapulæ interim, neque etiam humero connata, sed tantum ligamentis articulum in orbem amplexantibus adnexa. Huius itaq; cartilaginis quotiescunq; reperitur, beneficio, sinus scapulæ profundior euadit, & interim cartilago impetui compressioniq; ossium facile cedit, laxum huius articuli motum minime cohibens. Processus vero quibus præsentī articulo Natura prospexit, duocensentur: quorum superior veteribus Græcis *ἀγρῶπιον*, Latinis *summus humerus* appellatur. Siquidem Græci, procul dubio, brachii ossis cum scapulis articulum, *ἄγιον* nuncuparunt. Ac proinde *ἀγρῶπιον* hunc processum, quod articuli superiorem constitueret sedem, vocarunt. Superior hic processus a scapulæ spina pronascitur, atque ab ea discedens sensim magis magisque augetur ac tandem a scapulæ dorso iuxta scapulæ cervicem abscedens, teretisque quodammodo apparens, modice antrorsum fertur, insigniterque supra scapulæ cum humero articulum latus fit, & ampla donatur appendice. Eius pars omnis anterior, & posterior, & humilior, lævis, minimeq; aspera cernitur: superior autem ipsius sedes neutiquam lævis est, sed rudis, & foraminulis quibusdam non peruiis donata, musculorum quorundam, qui inibi inferuntur gratia. In anteriori processus sede sinus adeo leuiter & superficietenus insculpitur, ut num capitulum, num sinus sit ægre diiudices. Huic sinui modice prominens claviculæ tuberculum articulat, validissimisq; ligamentis cōstringitur. Interueniente hic plerunq; peculiari cartilagine illi prorsus simili q̄ in maxillæ inferioris cū superioris articulis inuenit. Is sane processus humeri ad superiora luxationem prohibet, & tutissimum humeri articulo operimentum ac propugnaculum est. Si enim ibi nihil ante articulationem esset locatum, nullo negotio a quouis extrinsecus incidente læderetur: facile quoq; caput brachii seu humeri ad scapulæ cervicem transcenderet, ut quod nec profundam in se habet concauitatem, nec supereilia magna. Præterea musculorum insertioni & exortui eleganter famulatur. In hoc etiam iuuat, ut accedente clavicula humeri articulum a thoracis lateribus & costis quam longissime deducat, illumq; in eo situ conseruet, quo maxime ad suos motus, quos varios differentesq; admodum molitur, indiget. Inferior interiorve & minor processus, qui ampla radice ex superiori sede cervicis scapulæ principium ducit, & hinc in latus antrorsum fertur, anteriori articuli parti versus superiora magis oppositus. Inferior huius processus pars exacte levis est, ac instar antiquæ Græcorū literæ C cauius, ob idq; *πυκνός* illis appellatus. Alii vero ab imagine quam obtinet cum altera anchoræ parte, quæ terræ infigitur, *ἀγκυροειδής* est nominatus. Nonnullis autem, quod corniculæ rostri modo inclinatus *κορνικουειδής* vocatur. In superiori vero parte asper & inæqualis est. Nā in elatissima sui principii sede crassior est, & inæquali tubere prominet, cui clavicula fere incumbit ac innititur, & valide alligatur. In apice vero ubi appendicem habet, etiam asper est,

Cervix scapulæ. Sinus humero excipiendo paratus.

Cartilago scapulæ sinu crebro augens.

Scapulæ processus duo. Gale cap. 14. libri de ossi Superior *ἀγρῶπιον*.

Σημειώδης

Ἀγκυροειδής.

Κορνικουειδής.

ut aptius internum anterioris cubitum flectentium musculi caput ab ipso exoriret, & ligamentum humeri articulo peculiare hinc principium obtineret. Inter apicem vero & tuberculum, quo clavicula pene suffulcitur, hæc superior processus sedes quoque aspera existit, quo rectius ligamentum educeretur, hinc ad superiorem scapulæ processum pertinens. Quemadmodum autem hæc superior processus sedes in hoc aspera est, ut opportune ligamenta illa, & hoc musculi caput produceret, ita etiam scapulæ cervix orbiculatim foraminula quædam non peruia obinet, ex quibus commoda validorum huius articuli ligamentorum pendet origo. ¶ Porro scapula interiori internave sede summa cauaque est, ut commode costarum convexis respondeat, ac super ipsas stabilita debite moveatur. Deinde etiam, ut opportuna hic sedes aptaretur musculo, qui totam anteriorem scapulæ sedem implens, intro antrosumque brachium circumvertit. Cava hæc scapulæ sedes levis quidem est, sed non ex omni parte æqualis. Nam iuxta inferiorem ipsius sedem tubercula quædam habet, modice instar obliquioris lineæ extuberantia, quæ quodammodo sinus constituunt, ac si thoracis costæ, quibus scapula hac sede incumbit, temporis successu in scapulam comprimerentur, ipsaque scapula illarum effigiem cedendo assumeret. Hi enim sinus, tuberaque in senibus apparent magis, quam aut in pueris, aut iuuenibus, quibus omnia nitius conspicue protuberant, excresecuntque. Ad hæc scapulæ anterior sedes ad radicem elatioris anguli basis scapulæ non nihil protuberat, aptamque regionem efficit, cui alter scapulam attollentium musculorum valide inseritur. Preterea scapulæ anterior sedes, qua summæ humeri radici scapulæve spinæ respondet, insignis quæ alibi excavatur. Inter reliquas interim scapulæ cavitatis sedes, ea maxime caua se exhibet, quæ iuxta scapulæ cervicem existit. Præter id enim, quod in posteriora a scapulæ spina extracta colligitur, hic etiam scapulæ collum impense crassum & introsum protuberans, hanc cavitatem insigniter auget: quemadmodum & inferior scapulæ costa, quæ quum crassa sit, huius quoque sedis cavitatem profundiorē reddit. ¶ Posterior seu externa scapulæ sedes insigni processu, veluti spina, adornata, si obiter videatur, gibba est; quæ hæc figuram iniuriis citra noxam ferendis accommodatiorem Natura haud ignoraverit. Verum si pressius hoc scapulæ gibbum contemplemur, duæ in ipsa cavitates occurrunt, musculis suscipiendis aptissimæ. Una sub scapulæ spina inter spinæ inferiorem sedem, & extuberantiorem, crassiorēque inferioris scapulæ lateris partem consistit. Altera vero inter superiorem scapulæ spinæ sedem, & superius scapulæ latus habetur. Atque hanc quidem musculus occupat, qui brachium circumvertentium tertius est. Inferiorem cavitatem musculus, qui brachium circumducentium secundus est, opplet. Porro etsi hæc externa posteriorve scapulæ sedes, tum scapulæ spinæ, tum ipsius laterum gratia, duas has cavitates ostendat, nihilominus univèrsa, quoniam extuberare videtur, scapulæ dorsum a veteribus, similitudinem a vero hominis dorso sumentibus, nuncupata est. Processum autem qui ab hoc scapulæ dorso enascitur, spinam vocarunt, ad vertebrarum posteriorum processuum siue spinarum imaginem respicientes. Hos itaque sequentes, externam scapulæ sedem dorsum nuncupavimus. Summi vero humeri radicem, seu processus scapulæ superioris partem quæ a scapulæ dorso enascitur, Spinam scapulæ vocabimus. ¶ Ceterum in omnibus animantibus brachii os seu humerus scapulæ articulat. Proinde si scapulas ex animali exemptas animo finxeris, neque amplius esse nullam rationē inuenies, qua humeri articulum constituas. Nam necesse omnino erat, si brachium erat futurum, ipsius caput cavitatem ingredi, cuius cavitatis gratia & cervix scapularum est enata, & quidam in eius extremo insculptus est sinus, magnitudine raris, quanta capiti brachii articulando esset aptissima. Atque hic sane primus ac præcipuus usus est, propter quæ natura scapulas fecit. Ex abundanti v. alius quidam accedit, nec ipse quidem exiguus, thoracis videlicet, quod illic sunt ac costis interstarum partium munitio & custodia. Nam partes ipsius anteriores tuemur, multo ante quæ occursum nocituraque sunt, prouidentes, & anticipantes vel transilire, ut id quod ingruit declinemus, aut propugnaculum aliquod ante pectus obicere, aut manibus quicquid quo defendamur assumere. Plerumque autem solas ipsas vel nudas periculo obicimus, sicut esse rati ipsas parte quavis vulnerari, aut frangi, aut conteri, aut abscindi, quam quæ læsurum sit ad pectus perungere concedamus. Porro quum posteriori thoracis sedi, & anteriori æquale ab occurrentibus periculum impèdeat, corum v. quæ obesse possunt præcognitio in anteriori & posteriori regio-

Anterior
seu costis
proxima
scapulæ se-
des.

Posterior
scapulæ se-
des, seu dor-
sum. Spina.

Dorsum
scapulæ
spina.

Scapulæ
usus. Gal. li.
13. de usu
partium c. 20.

A regione nequaquam par sit, quum illic oculi non essent: oportuit sane & hic quoque Naturam artificium quoddam machinari, posterioremque thoracis sedem neutriquam negligere. Quocirca primum quidem quasi multiplex vallum vertebrae thoracis ac dorsum compegit, & scapulas deinde tanquam duos clypeos & scuta, firmissimosque muros obiecit, quemadmodum fufius Galenus loco monstrato docet.

De clauiculis. CAP. XXVI.

IN vtrisque lateribus *clauae* siue *clauicula*, quae Graecis *κλαίδες*, Latinis vero *furcula*, & *iugula* nominantur, singulae consistunt, pectoris ossi & summo humero, seu superiori scapulae processui coarctatae. Clauiculae autem dicuntur, quod pectori & scapulae vtrinq; iunctae, brachia clauium instar confirmant, claudunt, ac retinent, ne motu quodam inordinato facile dissilire, ac loco moueri possint. Pectoris vero ossi in illis articulantur sinibus, quos in primi ossis summæ sedis lateribus exsculptos capite 23. diximus. Ac quemadmodum sinus illi oblongi sunt, ab anterioribusque partibus deorsum in posteriora ducti, & antica sede quam postica latiores, internoque latere profundiores quam externo cernuntur, ita quoque se habent clauicularum capita pectoris ossi connexa. Hæc enim sinuum modo oblonga sunt, ac depressa. Et si quis accuratius eorum circumscriptionem animaduerneret, illam quodammodo triangulam iudicaret. *Vnus* enim angulus in anteriori capitis parte ad humiliora consistit vtrinq; obtusus. *Secundus* etiam obtusus est, in superiori capitis parte non nihil versus posteriora conspicuus. *Tertius* acutior, longiorque est, in posteriori sede repositus, deorsumque declinans. Porro clauiculæ caput multa cartilagine incrustatur, læueque est, cartilagine tamen vna cum tenuissima appendice effracta, caput asperum inæqualeque cernitur. Verum etsi caput cartilagine non minus, quam & pectoris ossis sinus abundet, nihilominus tamen Natura hic cartilaginem effinxit, qualis priuatim in inferioris maxillæ ad superioris articulis reponitur. Inter pectoris enim ossis sinum, clauiculæque caput cartilago quædam adeo ampla interuenit, atque capitis & sinus est amplitudo. Hæc tenuis vndiquaque est, atque æqua omni ex parte consistit, & qua sinum respicit, admodum læuis est & vinctuoso humore perfusa, sinuique seu pectoris ossi nusquam connata. Item qua cartilago clauiculæ contingit caput, pariter læuis est, & lubrica, capiti interim non connata, sed tantum ligamenti articulum in orbem amplexantibus: adeo ut hæc quoque cartilago non minus triangula sit, quam clauiculæ caput pectoris ossi articulatam. Clauicula ab hoc cum pectoris ossis articulo, non recto tramite ad alterum ipsius porrigitur articulum, quo scapulae superiori processui connectitur. A pectoris enim ossis, procedens, extrorsum sensim curuatur, & anteriori parte gibba, posteriori vero concava efficitur. Verum ilico post medium ipsius longitudinis contrario ductu procedit. Introrsum namque curuatur, & gibba fit, anteriori autem sede concava videtur, in anteriora insigniter illic prominens, ubi superiori scapulae processui proxima est, adeo ut bis gibba, bisque caua reddatur. Pars enim ipsius pectoris ossis contermina, & *παρὰ τὴν* Graecis dicta, retrorsum seu ad thoracis interiora magis pertinet. Quæ autem superiori scapulae processui articulatam, ac *ἐπὶ τῷ* Graece, *Iulio Polluce auctore*, nuncupatur, antrorsum vergit, & ab interna thoracis sede extrorsum remouetur, clauicula interim in medio ductu obliquata. Est itaque gibba anteriori sui parte, in anteriori nimirum pectoris sede, non procul ab ipsius cum pectoris ossis articulo, cauaque est parte sua interna. Non procul vero a summo humero anteriori parte insigniter, breuique flexu caua cernitur, posteriori autem parte, gibba & conuexa. Sed animaduertendum hoc loco erit, nos paulo ante, quum de Epomide ageremus, non temere adiexisse, *Iulio Polluce auctore*. Is enim citato loco ait, *κλαίδων τὸ μὲν πρὸς ὀρθοστάτας, ἐπὶ τῷ* *Clauicularum pars qua scapula articulatam, epomis dicitur*. Galenus vero lib. 1. de articulis, comment. 4. non clauicularum, sed scapulae partem superiorem ad ceruicem protensam ita nominat. Verba eius sic habent, *ἐπὶ τῷ δὲ τὸ ἐπὶ τῷ ὀρθοστάτου μέρει ἐπιτείνεσθαι ὡς ἐπὶ τὸν τεράχην*. Iulius autem Pollux eodem in libro eminentem quoque brachii partem *epomida* vocat. Sed præstat eiusdem verba subiicere, *τὸ μὲν ὑπερέχον, inquit τοῦ βραχίου ἐπὶ τῷ λήγῃ*. Iudico autem illud per eminentem brachii partem scapulae superioris partem intelligere. Quare si non fallor, idem per epomida, quod Galenus intellexit. Id quod monendum esse duximus, ut lector in Epomidis descriptione non per omnia veteres convenire sciret. Porro horum, quæ diximus, nullum temere de

Gal. cap. 13.
li. de ossib.
Nomina.

Clauicularum ad pectoris ossis articulationem. Vesal. lib. 1. cap. 22.

Peculiaris cartilago articulationis clauicularum cum pectoris ossis.

Clauiculæ curvitas & figura.

Gal. ibid.

Παρὰ τὴν

ἐπὶ τῷ
lib. 1. onom.
masti. con.

Curvitas
vſus. Vela
lius ibide.

Cur clau-
cula ſcapu-
lae ſuperiori
proceſſui
connexa.

Gal. libr. 13.
de vſu par.
ca. 10.

Claviculæ
ad ſummū
humerum
nexus.
Vefalius.

Claviculæ
ſubſtantia.

Capita.

Asperitates

Læuitates.

Foramina.

Lib. 8. ca. 1.
Nomina.
Superior
humeri
pars.

frustra a rerum opifice factum est. Vbi enim clavicula iugulum spectat, merito posteriori seu interiori parte caua est, quum hac asperam arteriam, stomachum cum sexti paris nervorum cerebri nervis, & in primis insignes nervorum series a spinali medulla axillam petentes ferri oporteret: quibus potissimum nervis clavicula viam porrigit: & propugnaculi etiam loco præfigit. Quia v. a iugulo, aut potius a suæ longitudinis medio clavicula in posteriora porrigit, neq; alicuius vſus gratia hæc in anteriori sede gibba esse debuit, necessario rursus iuxta superiorē scapulæ processum antroſum vergit, vt scil. processus illius partem cōtingat, & eidem apte coarticulet. ¶ Tantum autem hic antroſum porrigit, quantum retrorſum abſceſſerat ipſi⁹ gibba parte in illius posteriore sede, quæ non procul a summo humero distat. Si enim clavicula a suæ longitudinis medio duntaxat in posteriora tenderet, ad colli latera prorepens, neque elatiori scapulæ processu apici articulet, nihil profecto prohiberet, quo minus os latum scapularum nusquam stabilitum ac firmatum thoraci incideret, coarctaretque ibi humeri articulum, multosq; brachii motus impediret, quod varie ob id potissimum potest moveri, quod a thorace plurimum ipsius cum scapula articulus distet. Si enim articulus ille thoracis costas contingeret, vel quavis ratione ipsis proxime, quemadmodum in quadrupedibus, locaret, ipsas manuum circulationes & iactationes ad pectus, dorsum, collum, & ilia nequaquam moliremur: sicuti accidere nouimus, quum luxatus humerus in costas procidit, vel scapula instar alæ ob effractam claviculā dependet. Ne igit̃ adeo necessariis destitueremur muniis, Natura humeri articulū a thorace plurimū distare voluit. Quod sane pſtitit superiori scapulæ pceſſu, qui ita producit, vt claviculæ beneficio a pectore detrusus, sustē- tet ac stabiliat, ipſeq; articulus hac occasione procul a thorace diſiungit̃. Articulus v. clavicula huic pceſſui nimium extuberanti tuberculo latiori q̃ longiori, & nonnihil obliquo: talisq; hic cōſurgit articulatio, vt quodnā os suscipiat suscipiaturq; diiudicare vix queas. Claviculæ pars, q̃ superiori scapulæ pceſſui cōnectitur, latiuscula ē, veluti & pceſſus quoq; lat⁹ ampluſq; cernit̃. Præterea hæc claviculæ pars, vt & illa, q̃ pectoris offi committit̃, intus fistulosa, magisq; rara est, quam reliqua claviculæ portio: q̃ videlicet hæc partes etiam crassiores spissioresque sint, & ossa intus tanto semper fungosiora, quanto crassiora, & ampliora cernant̃. Ipsa enim clavicula in suæ longitudinis medio solidissima est, q̃ etiā hic sit tenuissima, quodammodoq; teres. In humiliore n. ipsius parte veluti lineam p̃tuberat, q̃ incipit non procul a claviculæ capite, quod pectori articulat̃, iuxta medium posterioris & anterioris eius capitis angulorū. ¶ Pertingit a. hæc linea paululū ultra claviculæ longitudinis mediū, in hoc parata, vt musculus thoracē mouentium primus ab ipsa principiū duceret. Iuxta huius lineæ principium prope caput claviculæ asperitas sinuosa cōspicitur vnde validū p̃gnascitur ligamentū claviculā pectoris offi illic colligās, qua ipsū primæ thoracis costæ cartilago cōnascitur. Quinetiā ad aliud huius lineæ extremū altera occurrit asperitas, & veluti asper sin⁹ quidā, quo claviculæ tuberculo radiciq; interioris scapulæ processus pene incūbit, ac a quo ligamentū promitur claviculā illi tuberculo pertinaciter colligans. Porro inferior hæc claviculæ sedes, vbi linea illa definit, claviculaq; ampla viſitur, sinuosa fit, & aspera, idq; potissimū iuxta cōnexum claviculæ ad superiorem scapulæ processum, vbi ligamenta articulū hunc continentia validiora quam superiori sede enascūtur. Superior claviculæ totius regio læuis omnino est, præterquam iuxta ipsius articulos, vbi ligamentorum & musculorum producendorum gratia, nonnihil aspera est. Ad hæc in anteriori claviculæ sede, vbi retrorſum inflectitur, & vbi non procul ab ipsius cum superiori scapulæ processu articulatione caua viſitur, etiam asperitas notatu digna consistit musculo brachiū attollenti parata, cuius principii magna pars hinc pronascit̃. In posteriori claviculæ sede nihil q̃ nō dictū sit, in qua le occurrit, p̃ter quoddā tuberculum hic protuberans vbi clavicula inibi maxime gibba est, idq; tuberculū veluti illi⁹ gibbæ sedis angulum constituit, ligamentumq; ad anteriorem scapulæ processum educit. Porro interdum duo, interdum tria in maxime solida claviculæ parte, & potissimum in posteriori ipsius sede videntur foraminula, in hoc parata, vt venulas transmittant claviculam enutrientes.

De humero, seu brachij offe. CAP. XXVII.

Humerus, vt Celsus nominat, seu Brachii os, est id os, quod scapulæ & cubito articulat̃. Græcis βραχιον, Latinis brachiū, Barbaris Adiutoriū brachii appellatur. Summa eius

- A** eius pars, quæ id scapulæ articulat, admodum magna constat appendice, quæ in duo ^{Velal. lib. 1. cap. 23.} dirimitur capita. Quippe hæc interna ipsius sede amplum, & in ambitu orbiculare, & paulo minus quam medi globi modo protuberans efformat caput, quod lævæ & quæque est, & cartilagine incrustatum scapulæ sinui articulat. Hoc caput appendicis internum latus constituit. Ceterum appendicis externum latus, quodammodo in aliud asperum & inæquale protuberat caput non quidem articulationi cuiuspiam erectum, sed duntaxat collis modo prominens, in quem valida multa; ligamenta humerum scapulæ necessitanti implantantur. Caput itaq; internum articulationi subseruit, externum autem ligamentis excipiendis adaptatur. Hæc vero duo capita amplius quidam, patulusq; sinus orbiculatim ab inuicem dirimit. In quem utique sinum orbiculatim ductum, & in anteriori humeri sede magis, quam in posteriori patulum, seu amplum profundumque tanquam in vallem ligamenta inseruntur. In caput vero externum, quod hoc sinu ab interno distinguitur, ligamenta veluti in collem & promontorium aliquod insertionem moliantur. Quemadmodum autem omnium ossium sedes, in quibus aliquid inseritur, aut principium ducit, asperæ inæqualesq; sunt: sic quoque & præsens sinus vna cum externo capite asper inæqualisq; cernitur. Porro præterquam, quod hoc externum caput inæqualiter prominet, variumq; est, alio quodam sinu veluti in duo rursus capita dividitur, in anterius nimirum, & posterius, quod anteriori multo grandius est. Sinus iste paululum versus exteriora in anteriori appendicis sede cælatus, insigniter profundus, longus, & secundum cavitatem ad amussim teres perinde est ac corpus cuius gratia insculpitur, quod externum caput est musculi cubitum flectentium anterioris. Ceterum hic oblongus sinus non tantum ad appendicem pertinet, verum etiam ad eam humeri ossis sedem, cui appendix coalescit, & quæ humeri cervicem perquam breuem, & impense crassam constituit. Atque ita superior humeri pars scapulæ cõtermina se habet.

Inferior
humeri
pars.

- Inferior autem eiusdem pars, quæ duobus in cubito existentibus ossibus vlnæ nimirum & radio articulat, longe magis varia est, tum sinuum, tum capitum, ac tuberum copia, & imagine. Quippe primum in medio inferioris humeri sedis, sinus cum suis tuberibus talis prorsus conspicitur, qualem in trochleæ rotula est cernere, ad quam funes voluuntur. Quemadmodum enim rotula trochleæ rotunda, orbicularisq; in ambitu est, in lateribus autem plana & lata: sic etiam in hac humeri sede orbicularis rotundaque conspicitur pars, quam nullæ imaginì propius, quam rotulæ assimilaueris. Deinde ut rotula in ambitu, cui chorda, funisue aduoluitur, sinu quodam tereti & læui, ac lubrico extulpsitur, & sinus huius latera utrobique protuberant, funemq; in se quo minus aberraret amplexantur: ita etiam hæc humeri pars in medio sinuata est, & utrinque protuberat. In hoc tamen ab exquisita rotulæ tuberibus differt, quod perpetuo fere sinus rotulæ latera æqualiter exporriguntur. Hæc autem humeri pars interno latere admodum insigniter prominet, & ad amussim rotulæ respondet, externo interim latere multo minus educto. Ad externum enim latius aliud caput constituitur, cui radius inarticulat, quod muri vice censerì potest, prohibentis vlnam extrorsum a sua orbita luxari. Est & aliud humeri rotulæ cum veris discrimen, quod non ad omnem ipsius partem vlna similiter ac funis ad rotulam circummoueri queat. Etsi enim in superiori medioq; orbitæ sede humeri os insigniter sinuatum sit, longeq; tenuissimum, & squamæ modo pellucidum, tamen nequaquam est peruium, idque magni usus gratia. Summus enim rerum Opifex ad hanc humeri orbitam vlnam flecti & reflecti voluit, ita sane rotulam parauit, & ipsi etiam vlnæ sinus; tuberaq; & processus elargitus est, ut cubitum flectere & extendere possimus, & tamen in iis motibus robore non destituamur: quod sane periret si in superiori rotulæ sede humerus esset peruius, nihilq; esset in quo vlna in extrema extensione firmaretur, sed funiculi modo citra renixum, basimq; & obstaculum obuolueretur. Exculpsit itaq; natura in superiori rotulæ huius sede duos insignes sinus, vnum quidem anteriori in parte, alterum vero in posteriori, qui multo amplior, profundior, & quouis modo insignior est anteriori. Sinus ii quasi squama duntaxat dirempti, vlnæ acutos processus, quos *ροτάνας* Græci, quod scilicet *rotundi* ^{Gal. lib. 2. de usu partium cap. 14.} *sint*, vocant, excipiunt. Atque horum anteriorem, quum cubitus flectitur, anterior sinus admittit, cum vero extenditur cubitus, posterior sinus posteriorem vlnæ processum ^{Gale. cap. 16. libr. de ossi.} excipit. Qui vero præsentis sinus in cubiti motibus, veluti bases, & obstacula sunt, quæ

Gal. lib. 2.
de usu par-
tium, cap.
15.
Inferioris
humeri
capita.
Vesalius.

vlnam non vltro ferri sinunt, Hipocrates eos *βαθμίδες* nuncupavit. Humeri vero orbi-
ta a quadam cardinum imagine eidem *γυλμοσίδης* dicta est. ¶ Ad externum humeri orbi-
tæ latus rotundum & oblongum quodammodo habetur caput, quod similiter atq; orbi-
ta, cartilagine incrustatum & læue, radii cum humero articulationi subseruit, & in radii
superiorem sinum subintrat, radiusq; ad id caput in pronum & supinum mouetur. Dein-
de capitis longitudo, quæ a superiori ipsius parte ad inferiorem secundum humeri lon-
gitudinem metitur, in causa etiam est, quod in cubiti extensione ac flexione, caput ida
radii sinu, qui rotundus, non autem oblongus est, haud elaboratur aberretue. Atq; hac et-
iam occasione tota capitis pars cartilagine obducta, anteriorem humeri sedem spectat,
nihil prorsus in posteriora erectum, quod in nulla cubiti extensione radius posteriorem
humeri sedem adeat. Verumtamen ad externum huius capitis latus, humerus insigni-
ter protuberat, montis rupisq; imaginem ostendens, in hoc paratam, vt quam plurimi
musculi hinc opportune principium ducant. Ab hac enim humeri sede, & acuta linea
quæ ab hoc tubere sursum aliquo vsque secundum externum humeri latus conscendit,
sex enascuntur musculi, qui suis locis in secundo recensentur libro. In posteriori hu-
ius externi humeri tuberculi seu tuberis sede iuxta externum latus orbitæ humeri sinum
obtinet, qua quartus brachium adeuntium nervus vehitur. ¶ Ceterum vt externum hoc
humeri latus protuberat, ita quoq; & internum latus musculorum quoq; & nervorum
ratione insignem acutumq; processum seu tuberculum adipiscitur, nullius articulatio-
nis gratia, veluti externum cui radius articulatur, prominens. Nam præter musculos,
quorum suis in locis mentionem faciemus, duobus cubitum adeuntibus nervis hoc tu-
berculum internum idoneam efformat sedem, ipsisque propugnaculi loco censendum
est. In anteriori enim ipsius sede iuxta humeri orbitam, sinum leuiter exsculptum ostē-
dit, quo tertius brachium petentium nervus dirigitur. In posteriori autem ipsius sede,
alio sinu, quintum brachii neruum deducit. ¶ Porro mediæ humeri partes secundum lon-
gitudinem teretes quodammodo sunt, verum posteriori sede magis, quam anteriori
ampliores & depresso. Anterioris enim sedis medium, quodammodo secundum lon-
gitudinem protuberat, & vtrinq; hæc anterior sedes compressa videtur. Latera vero hu-
meri magis, vt & anterioris sedis medium, protuberare quam deprimi conspiciuntur;
idq; accumbentium musculorum ratione. Ex abundanti autem, in posteriori humeri se-
de iuxta ipsius longitudinis medium, quædam apparet compressio, ad quam nervus
manum adeuntium quartus ab interno brachii latere per posteriora in externum latus
oblique deorsum repit. Asperitas autem, quæ in anteriori humeri sede versus exteriora,
& supra medium ipsius longitudinis consistit, in hoc parata est, vt validior musculorum
brachium mouentium hic succederet insertio, & posterior cubitum flectentium mus-
culus hinc idoneum educeret principium. Præter hanc asperitatem alia occurrit iuxta
sinum quo externum musculi caput vehitur, qui cubitum flectentium anterior est. Fo-
ramina notatu digna in humero nulla occurrunt, præter pauca iuxta sinuum & tuber-
culorum supercilia, in hoc facta, vt hinc ligamenta validius educerentur, aut eadem hic
implantarentur. Sunt etiam nonnulla, sed rara foramina, in humeri longitudine con-
spicua, & venis admittendis potissimum in ipsius interno latere cælata, atq; in amplum
medullæ asseruandæ gratia sinum, & ossis leuitatis occasione paratum, pertinentia.

Decubiti ossibus, vlna, & radio. CAP. XXVIII.

Galenus
cap. 17. li-
bri de of-
sibus.
Cubitus.
πῦξ,
Vlna.
Vesal. li. 1.
cap. 24.
Vlnæ ad
humerum
articula-
tio.
Vlnæ pro-
cessus duo

VNiuerſa pars inter brachia, humerumue, & brachiale sita Græcis *πῦξ*, ὠλένη, καὶ
ὠλένη, Latinis *cubitus* nominatur. Hæc duobus ossibus, inuicem incumbenti-
bus & coarticulatis constat, quorum inferius, quod & longius est, Græcis quoque
πῦξ, Latinis *cubitus* vocatur. Ne autem homonymia nobis aliquid obscuritatis pari-
at, præstabit integram e duobus illis ossibus exstructam partem *cubitum* appellare, pri-
uatim vero inferius quidem os *Vlnam*, superius vero, quod *radius* Græcis dicitur, *Ra-
dium*. ¶ Vlna barbaram sectantibus medicinam *focile maius*, contra Radius, *focile mi-
nus* vocatur. Duo hæc ossa longa sunt, & omni propemodum ex parte inter se va-
ria. Vlna enim ad humeri orbitam rotulamue apertis in hoc exsculpta sinibus, & ido-
neis donata processibus articulatur. In superiori namque ipsius sede, qua ad-
modum crassa, solidaque est, duos insignes adipiscitur processus, quos *πρῶτος*

- A** *vas* Græci, ut comprehensum est, vocant, gibberosos quidem foris, cauos vero intus. Galenus ibidem & lib. 2. de vln partiu cap. 14. Minor seu anterior. Maior siue posterior. Vnum sane ex anterioribus & supernis eius partibus, qui minor certe est, & sinum in anteriori humeri sede ad elatiorem rotulæ regionem exsculptum spectat, suisque tuberculis illi ad amussim congruit. ¶ Alterum verò ex posterioribus & inferioribus partibus ipsius, priore multo crassior & amplior, sinum in humeri posteriori sede ad elatiorem rotulæ regionem exsculptum profundiorē & ampliorem subintrantem. Quem quidem Athenienses *ἀλέκτρον*, Hippocrates vero *ἀγκύρα*, Latini nonnulli interpretes *gibberum* nominauerunt. Quas certe omnes diligenter considerare oportet voces propter Latinos Galeni interpretes quosdam, qui magno horum conuersiones legentium incommodo, illas mirifice confundunt, dum vnica cubiti voce non solum hunc maiorem processum, sed & vlnam, & totam inter brachium & brachiale repositam partem, & humeri cū radio articulationem, reddunt. Ceterum in horum vlnæ processum medio, qua se inuicem e regione spectant, grandis exsculpsitur sinus humeri rotulam excipiens, similis literæ Græcorum C, aut nostræ C, imaginem referens, qui ob id veteribus Græcis *στροφοῖς* est nuncupatus. ¶ Sinus autem iste non obiter tantum C, modo exsculpsitur, verum ad amussim humeri rotulæ ut responderet, in ipsius medio tubere obtuso amploque protuberat, quod secundum sinus illius longitudinem fertur, & vtrinque ad latera ita comprimitur sinuaturque, ut funi chordæque, quæ ad trochleæ rotulam voluitur, possit conferri. Quemadmodum enim teres chorda, rotulæ sinui pariter secundum concavum tereti inuoluitur, ita quoque hoc vlnæ sinus tuber sinui rotulæ conuenit, & depressa sinuataque rursus tuberis latera, rotulæ sinus extuberantibus equantur lateribus.
- C** Vniuersus hic vlnæ sinus læuis est, & cartilagine in crustatus, & vna cum suis processibus rotulæ ita comparatus, ut si vel minimum quid, aut magis extuberare, aut profundius insculpi, aut ampliari, aut stringi illum sinxeris, ilico vniuersam læseris articulationem, in hoc duntaxat affabre constructam, ut eius ope ac beneficio cubitus flectatur, & extendatur, citra luxationis periculum. Ad quod non solum spectatu iucundissimus ille qui mutuo ingressu perficitur ossium contextus opitulatur, verum etiam ligamentorum articulum stringentiū robur. Vt enim valida articulum ambirent ligamenta processuum sedes sinum non respiciens, aspera inæqualisque est. Quamquam non ligamentorum tantum, sed & musculorum nomine processus asperi cernantur, qui quales sint, libro secundo exponemus. Ad hæc ut validioribus ligamentis hic articulus amplexaretur, in infima vlnæ sinus C, literam referentis sede, vtrinque ad latera sinulus instar anguli cuiusdam imprimi cernitur, & ipse sinus a sua circumferentia inibi definit, asperque redditur, non alia sane occasione, quam ut ex hac vlnæ parte foraminulis non peruiis obstita, ligamentorum fortium pederet exortus. Atque in hunc modum vlna humero articulatur. ¶ Radius autem, vtrinque tenuis est, & ex oblonga tenuique ceruice in amplum orbiculatumque porrigitur capitulum, quod ea parte qua humerum spectat, sinum habet rotundum, & non ample cauum, quem humeri caput subintrat. Ad hoc caput radius in pronum supinumque agitur, atque interim quo minus cubitus flectatur, extendaturque radii cum humero articulus nequaquam obstat: quinimo radii sinus ad id humeri caput quoque inflectitur, & extenditur, ad quod præcipue iuuat humeri capitis longitudo: amplaque ipsius sedes cartilagine in crustata, quæ nunquam a radii sinu in cubiti motibus abscedit. Ceterum vlna a suo cum humero articulo deorsum recta quodam modo versus brachiale fertur, sensim gracilescens, tenuiorque tantisper facta dum ad brachiale usque pertingat. Illic enim ex tenui longaque ceruice rursus non nihil aucta, appendice donatur instar capituli cuiusdam rotunda, sed interim varia. Hæc namque inferiori ipsius parte processum obtinet, quem quia in acutū procedit, Græci dissectionis periti, a scriptorii styli, aut columnæ imagine *γερροῖς*, & *στυλοῖς* nominant, in hoc formatum ut sinum adaugeat, quo brachiale ad cubitum articulatur, utque ab ipso ligamentum articulum continens pronascatur. ¶ Inferior igitur vlnæ appendicis sedes brachiale respiciens, ad internum latus acuti illius processus inæqualem quendam nanciscitur sinum, in quem cartilago firmatur, quæ a radio pronata magna ex parte ita inter brachiale & vlnam reposita est, ut neque brachiali, eoque vlnæ adnascatur, eiusque generis cartilago est, quæ priuatim in maxillæ inferioris ad superiorem articulis, & in clauicularum cum conterminis ossibus nexu continetur. Porro si sinum illum adpendicis vlnæ exceperis, tota sedes

Sinus Sinuoceder. Vesalius.

Processuum aspectus.

Radius ad humerum articulationem. Galenus cap. 7. libri de ossibus.

Vlnæ ad brachiale ductus.

Galenus ibidem. Γερροῖς styli. Στυλὸς, columna Vesalius.

brachiale ſpectans, ad eum modum cartilagine in Cruſtatur, quo ſinus capitæ articulo-
rum obduci læuigarique ſolent. ¶ Præter hunc ſinum appendix vlnæ, in externa ipſius
ſede ſinum ſibi inſculptum gerit, qui oblongus, & teres eſt, tendini paratus, eius muſculi
qui poſtbrachiali ante paruum digitum inſertus, brachialis extensionis auctor habetur.

Qui vlna
per ipſius
longitu-
dinem ſe
habeat.

Radii ob-
liquas.

Radii ad
vlnam ar-
ticulatio.

¶ Ceterum præter hanc appendicem, vlna per ipſius longitudinem impreſſiones quaſi-
dam, muſculorum gratia factas & trium linearum inſtar tubera, quæ ligamentorum er-
go hinc pronascentium creata ſunt, obtinet, de quibus omnibus in ſecundo libro diſſe-
remus. Studio autem nunc omiſimus, quod breuibz explicari nequeant. His igitur
præteritis, ad radii enarrationem accedamus. ¶ *Radius obliquus* eſt, quatenus vlna recta.
Iſnamque ſupra infraque vlnæ committitur, in medio autem, ac per reliquam longitu-
dinem ita arcuatim obliquatur, vt ad modum ab vlna dehifcat. Quod partim motus ra-
tione perficitur, vt obliquo ſcilicet ductu radius vlna ſuffultus, in prorum ſupinumque
promte ageretur: partim quo apta ſedes & fundamentum muſculis cōſtitueretur, quos
neceſſario internam externamque cubiti ſedem occupare oportuit. ¶ Articulatur au-
tem radius vlnæ ſupra infraque differenti omnino articulo. Supra enim vlna radium ex-
cipit, infra vero a radio vlna excipitur. Ad externum itaque latus anterioris vlnæ iuxta
humerum proceſſus, ſinus quidam inſtar quartæ circuli partis tranſuerſim exſculpitur,
læuis & cartilagine in Cruſtatus. Huic ſinui internum latus capitis radii, cui ſinus inſcul-
pitur humeri externum caput excipiens, appoſite congruit, ac læue & orbiculatum ſic
factum, in illo ſinu voluitur. Infra autem iuxta brachiale, vbi radius craſceſcit dilatatur-
que & inſigni appendice donatur, huius appendicis humillimæ ſedi ſinus inſculpitur, il-
li non abſimilis, quem paulo ante in vlnam in Cruſtum retulimus. ¶ In hunc ſinum cartila-
gine in Cruſtatum ſuperior appendicis vlnæ ſedes capituli modo protuberans, cartilagi-
neque obducta, reuoluitur: hacque ratione radius vtriuſque articuli beneficio tantum-
modo in prorum ſupinumque agitur. Non procul a ſuperiori articulo, vbi radii ceruix
conſiſtit, radius aſperum abruptumque educit proceſſum, qui internam cubiti ſedem

Radii per
ipſius lon-
gitudinem
læuigat &
aſperitas.

reſpicit, & inſertioni anterioris cubiti flexentium muſculi aptam ſedem parat. Rur-
ſus reliquo ab humero verſus brachiale ductu, radius nō omnino teres & læuis eſt. ¶ Ve-
rum per ipſius longitudinem humiliori ſua ſede acutam & inſigniter extuberantē pro-
ducit lineam, quæ tertiam vlnæ lineam reſpiciens, ligamentū admittit membranæ vali-
diſſimæ ritu ambo cubiti oſſa, qua inuicē dehifcūt, colligans. Externum huius lineæ la-
tus perinde ac internum quoque, compreſſum ſinuatumque eſt, vt hoc internam cubiti ſe-
dem occupantibz muſculis illud vero iis, qui externa cōſiſtunt cedat. Porro internū lar-
gus externo aſperius eſt, quod priuatim muſculus tertium pollicis os flexens, non inſimam
ſui exortus portionē ab illo latere ſibi aſciſcat. Deinde ſuperior radii ſedes e directo di-
ctæ nuper lineæ conſiſtens, pene teres eſt, & iuxta medium ſuæ longitudinis aliquouſque
aſpera occurrit, vt in hanc duo muſculi validiorem mōrētur inſertionem: quoru alter
radius in ſupinum agentium breuior eſt: alter vero radius in prorum ducentium ſu-
perior, cuius potiſſimū occasione aſperitas illa cælatur, q̄ ipſe nerueam potius q̄ carneā
inſertionem efficiat, longiuſque in oſſe producat. ¶ Iam radii ſede brachiali contermi-
na, quam craſceſcere dilatarique dictum eſt, conſiderandum venit, quod hanc partem ita
augeri oportuit, vt tādē apta cōſtitueretur ſedes cui brachiale articulari queat. Neceſ-
ſum etenim erat, brachialis cū cubito articulum, in hominibz paulo minus toto ad radi-
cem referri: ſi modo quieſcente ad humerū vlna ſumma manus radii beneficio & ſecū-
dario in prorum ſupinumque agi debuit. Si namque in radio & vlna ſinus, cui brachiale arti-
cularetur, æqualis portio exſculperetur, & ipſe interim ſinus ſuperiorē brachialis ſedē
imitatus neceſſario tranſuerſim oblongus eſſe deberet, impoſſibile profecto fuiſſet & ra-
diū, & ſummam manum in prorum ſupinumque ferri, vlna interim ad humerum quieſ-
cente, ac veluti huius motus baſi ac fulcimento. Pars enim brachialis quæ vlnæ ſinui in-
fereretur, inarticularetur, clauī modo obſtaret, quo minus vel tantillū radius immo-
ta vlna moueri poſſet. Operæpretium igitur fuit, inferiorem radii partem adeo craſceſ-
cere, vt efficiendo ſinui, cui brachiale articularetur, apta eſſet. Verum quia tenuis os ni-
miū craſceſcere nequaquam expediebat, natura ēt brachialis portionē ab vlna ſuſtineri
voluit, at ita vt vix puncto vlna brachiale contingeret. ¶ Contingit autem acuto ipſius
proceſſu quem ſtylo diſſectionum periti aſſimilant. Ne enim vlna reliqua ſui appēdicis
ſede

Inferioris
radii par-
tis hiſto-
ria.

- A** sede, brachiale citra alterius corporis interuentum contingeret, natura ab inferiori sede sinus in radice appendice brachialis gratia exsculpti cartilaginem deduxit: quæ vlnæ appendicem ascendens, illam a brachiali dirimit. Itaq; articulum hūc aptat, vt vlna brachiale quiddam sustineat: verum proxime non cōtingat, totusque sinus ad radium spectet. Radii præterea pars, cuius appendix ipsius coalescit, ipsaq; appendix interna parte sinuata, & leuiter caua videtur, tum vt musculo cederent radium in prouum ducētium inferiori, tum vt exactum iter tendinum seriei apraretur, qui cubito exporrecti digitorum flexui famulantur. Externa autem huius radii sedis pars gibba est, quod ita iniuriis ferendis pertinacior reddatur. Ne tamē musculorum cubito exporrectorum tendines summam manum hac petentes, & gibba illa sede deducti, hinc inde aberrarent, implicarenturq; sinus multi huic sedi inculpuntur, quibus tendines transuersis obducti ligamentis, tanquam per annulos traiciuntur. Sunt autem huiusmodi sinus numero quatuor. Ac primus quidem amplius est, tendinibus paratus, qui indicem, medium & annularem extendunt. *Secundus* tendinem transmittit, indicem & medium a pollice in latus abducentem. *Tertius* quodammodo geminus, bicornē transmittens tendinem alterius musculi brachiale extendentium, vna cum tendine musculi pollicem versus indicem euertentis, extendentisue. *Quartus* sinus leuiter admodum exsculptus est, vixque sinus nomen meretur: asper tamen locus est, qui ligamentum transuersum tribus tendinibus obuolutum educit, quorum vnus brachialis ossi pollicem sustinenti inseritur, secundus primo ossi pollicis, tertius autem tertio pollicis ossi. Verum quarti sinus sedes, ligamenti illius gratia non duntaxat aspera est, protuberatq; verum etiam vt tendo illi validius implantetur musculi longissimi radium in supinum ducentis. Et præter hos sinus, etiam in externa articuli, quo radii appendix iuxta brachiale appendici vlnæ articulatur sede, sinus consistit, quo musculi tendo vehitur, cuius potissimum beneficio paruus digitus extenditur. Atque is sinus & vlnæ & radio communis censetur.

De Brachiali. C A P. XXIX.

- E**xtremæ summæue manus, quæ Græcis *ἀκρότης* dicitur, partem cubito articulatam iidem Græci *ῥαχιαία*, Latini *Brachiale*, Barbari *Rasetam* appellant. Extrema vero manus, vt obiter id quoque explicemus, ea pars dicitur dissectionum peritis, quæ a cubito ad extremam vsq; digitorum aciem progreditur. Ceterum brachiale ex octo duplici ordine distinctis ossibus construitur. Quæ quidem in natu grandioribus dura sunt omnia & minuta, intusque parum fungosa. Haud parem omnia sortiuntur magnitudinem, vt nec formam etiam, neque situm: quum ex omnibus nullum sit, quod alteri omnino respōdeat, & singula priuatim aliquid adipiscentur, quo prompte ab inuicem discerni queant. ¶ Porro vt cunque sint varia, nihilominus mutuo tam concinne adaptantur, ad tantamq; compositionis harmoniam accedunt, vt eorum numerus non admodum inuentu facilis sit. Nisi enim validissima cartilagine atque ligamenta, quibus obducuntur, simul cum membranis reserueris & accurate abaseris, vnum esse tibi omnia videbuntur, aut cum Celso ipsa incerto constare numero opinaberis. ¶ Ceterum cuncta nec ueis his cartilaginosisque nexibus simul constricta, non autem, vt nonnulli putant, connata, duas integras superficies vna efformant, exteriori quidem regione, quarum manui ex usu est, gibbam: interiori autem sinuatam, quantumque & hoc manui expedit, concavam. Atque hæ tantum superficies ligamenti obuinciuntur. Superius enim qua ossa cubito committuntur, læuia sunt, & cartilagine incrustata quemadmodum & inferius, qua postbrachialis ossibus, & primo pollicis ossi coarctantur. ¶ Quinetiam vbi ossa se inuicem contingunt, non vndique aspera & inæqualia, ac ligamenti oppleta visuntur, verum omnibus apti læuesque sinus incisi sunt, qui cartilagine læui & lubrica illiti, aliorum ossium tubercula capitaue similiter læuia, cartilagineque obducta excipiunt. In medio enim contactu nullorum brachialis ossium ligamenta membranæ interueniunt, nisi in inferioris ordinis ossium connexu, vbi non nihil, sed vix animaduersione dignum, ligamenti cartilaginei veluti in puncto intercedit, & vbi ossa inferiora non adeo conterminantur inuicem atq; superiora sunt compacta. ¶ Quod etiam merito natura molitur, in hoc potissimum duos brachialis ossium ordines coniungens, quod superior cubito, inferior autem alia prorsus ratione postbrachiali & primo pollicis ossi debuerit committi. His namque vt distinctis diremptisque coarticula-

Cartilago
brachiale
ab vlna di
rimens.Sinus ra
dii dedu
cendis lo
candisque
musculis
& ipso
tendini
bus a pti.Nomina.
Extrema
manus.Gal.ca.18.
libri de
ossibus.
idem libr.
2. de usu
partium
cap. 8.
Veslibr. 1.
cap. 25.

lib. 8.ca.1.

Gal.ca.17.
li. de ossi.
Brachialis
ossa quib.
sedibus, li
gamentis,
& cartila
ginibus
obducun
tur.Cur duo
Brachialis
ossium or
dines.

tur ossib. cubito autem vnus ossis modo: sicut iure superioris ordinis ossa, vicinius pro-
 pinquiusq; ac nullius corporis interuentu inuicem coarticulentur, quam inferioris or-
 dinis ossa. ¶ Ceterum in superiori brachialis sede, aut ordine, qui cubitum spectat, qua-
 tuor reponuntur ossa, quibus ex ipsorum qua ordinantur serie, nomina non ab re impo-
 nuntur. *Primum* est, quod superioris ordinis internum constituit latus: *secundum* vero,
 quod huic subsequitur, atque magis ab interno abscedit latere: *tertium*, quod secundo
 ad externum latus proximum est: quartum vero, quod externum latus iam omnino oc-
 cupat. Quatuor pariter inferioris ordinis ossa, ac postbrachiali contermina existunt,
 quintum, textum, septimum, & octauum. Tria prima ossa inuicem validissime proxi-
 meque committuntur, & vno ordine iuncta, ac si vnum essent os, superiorem brachia-
 lis sedem ita efformant, vt instar vnus alicuius ossis lati, oblongique capitis, in radii vl-
 naeque sinum, ea concinne articulentur. Tria igitur prima brachialis ossa, superiori se-
 de ita simul iunguntur, protuberantque, vt veluti vnum brachialis caput laeue & cartila-
 gine incrustatum constituent, quo id cubito articulatur, multisque & vehementibus
 motibus, ac si vno gradi esset efformatum osse, agitur. ¶ *Primum* autem os, praeterquam
 quod radio articulatur, etiam secundo brachialis coarticulatur ossi, amplo vtrunque tu-
 berculo in secundi ossis sinum subiens. Dein alio tubere multo ampliori, atque ab infe-
 riori sua sede protuberante communem sinum ingreditur, quem quintum brachialis
 os cum sexto efformat. Insigni praeterea, quem in ipso celauit natura sinu, quo vna cum
 secundo brachialis osse, cui is sinus quoque communis est, septimi ossis omnium facile
 maximi grande, rotundumque caput excipit. ¶ *Secundum* os connectitur primo ossi, &
 septimo, vt iam dictum est. Tertio autem amplo connexu per arthrodiam constringi-
 tur. ¶ *Tertium* os modice protuberante, sed amplo tuberculo, in sinum octauum ossis subit.
 ¶ *Quartum* brachialis os vnam haudquaquam contingit, at superiori sua sede eam huius
 articuli ligamenti portionem admittit, quae ab acuto vlnae appendicis processu enasci-
 tur. Hoc os id sibi etiam peculiare vendicat, quod vni tantum brachialis ossi iungatur,
 quodque omnium brachialis ossium minimum sit, reliquisq; minus protuberet, sinue-
 turque. Est enim quodammodo rotundum, sed paulo longius quam crassius. ¶ *Quin-
 tum* os, quod inferioris ordinis primum est, superiori sua sede in sinum sibi exsculptum
 primi brachialis ossis capitulum excipit, & externo latere sinuatum quoque sexti ossis
 capitulum admittit, primumque pollicis os sustinet. In inferiori namque ipsius sede si-
 num adipiscitur patulum & oblongum, ac in interna externaque sede magis, quam la-
 teribus ac medio exsculptum, cui primi pollicis internodii capitulum ea articulationis
 specie committitur, quae motum edit omnibus manifestum, aliter multo quam bra-
 chialis ossium inter se connexus, cuius motus ita latet, vt vix diiudicari queat. ¶ *Sextum*
 brachialis os duobus committitur postbrachialis ossibus, illi nimirum quod indici prepo-
 nitur, & obscure illi quod medio digito subiicitur. Brachialis autem tribus commit-
 titur ossibus. ¶ *Primum* enim os suo sinu excipit, & suo tubere in quinti ossis sinum
 subintrat. Dein septimo ossi leuissime protuberante capitulo, aut potius plana superfi-
 cie articulatur, estque inferioris ordinis minimum, quemadmodum septimum maxi-
 mum: quintum autem & octauum medio se habent modo. ¶ *Septimum* os suo capite ro-
 tundo ac impensius protuberante, in communem primi & secundi ossis sinum subit,
 hacq; ratione duobus illis ossibus committitur. Ab interno autem latere sexto ossi arti-
 culatur octauo ossi ampla admodum articulatione, quae depresso fit capite, sinuq; in su-
 perficie tantum celato. Septimum in summa os quatuor brachialis ossibus, connecti-
 tur, primo nimirum, secundo, sexto, octauo, & postbrachialis ossi medium sustinenti di-
 gitum. ¶ *Octauum* os cunei quodammodo ritu septimum & tertium subintrat, illis-
 que duobus committitur. Praeter haec duo brachialis ossa, duobus etiam postbrachia-
 lis coartatur ossibus, quae annulari & paruo subiiciuntur. ¶ Quibus subinde par-
 uulum accedit ossiculum ex illorum numero, quae *Sesami* seminis imagini assimi-
 lantur, ideoque *os sesamoides* Graecis nuncupantur, de quibus *fusus capit. 32. dicemus*. Ad ex-
 ternum enim latus coarticulationis postbrachialis ossis paruum sustinentis digitum cum
 octauo brachialis osse, eius generis reponitur ossiculum, sedem quasi oppleturum: quae
 ideo hic quodammodo vacua relinquitur, quod hoc postbrachialis os sua superiori par-
 te totum octauo brachialis osse inniti nequeat, atq; in externum latus abscedat. ¶ Vide-
 tur

- A** tur itaque id ossiculum, quando adest priuatim hanc articulationem firmare, ac postbrachialis os paruum sustinens digitum nonnihil suffulcire. ¶ Quinetiam hoc adhuc octauum os sibi proprium vendicat, quod ipsius interna sede, qua manus volam quodammodo spectat, notatu dignū educit processum, ab externo latere versus internum latus inclinantem, & interno suo latere C modo exsculptum, vt aptam constitueret sedem, qua tendines musculorum digitos flectentium, qui ex cubito procedunt, opportune vehi, continerique possent. ¶ Vt vero tanti tendinum moli sedes hæc aptior redderetur, etiam quintum brachialis os interna sua sede processum educit, versus externum latus vergentem, & in externo latere pariter exsculptum, eiusdem omnino vsus, quo octaui ossis processus gratia, nimirum vt tendinibus illis via exhiberetur, ac postmodum ex processuum illorum apicibus validissimum ligamentum enasceretur, quod transuersum tendinibus circumdatum, ipsos ne a sua sede aberrrent exsurgantue, contineret, amplectereturque.

Octaui
ossis pro-
cessus.

Quinti
ossis pro-
cessus.

De postbrachiali. C A P. XXX.

- P**ars summæ manus a brachiali ad radicem vsque digitorum deducta Græcis *μετακάρπιον, κτείρ, κτένον, & ἀνδρῶν* nominatur. Nonnullis interpretum Galeni *palma*, aliis *pecten*, ac *manus pectus* appellatur. Verum quia palmæ vocabulum latius patet, & brachiale quoque in palma Celso & plerisque aliis complectitur, ac reliquis rursus palma idem quod *volā* denotat, & quum pedis pedis, pectinis & pectoris seu *σῆτος* vox etiam accommodetur, ad euitandam confusionem præstat *μετακάρπιον* postbrachiale interpretari. Ceterum brachiale quatuor ossibus constat, quæ reliquis digitorum ossibus longiora, & magna ex parte rotunda. Longissimum indici præponitur, atque ita sensim fiunt breuiora, vt omnium facile breuissimum, tenuissimumque paruo præponatur digito. Omnia supra, infraque appendice donantur, & superiores quidem brachialis ossibus coarctantur, ipsaque ossa hic externa sede nonnihil latiora, quam interna sunt, vt postbrachiale vna cum brachiali superficiem exterius gibbam, intus vero cauam aptius hic efformaret. Quinetiam appendices hæ lateribus se inuicem contingunt, & cartilaginei ligamenti interuentu inuicem alligantur. Inferiores vero appendices grandes quoque sunt, & in rotundum, ac ab externa manus sede in internum oblongum caput desinunt: quod cartilagine obductum, primi digitorum ossis sinum subintrat. Hæ appendices lateribus etiam se contingunt, sed non adeo pertinaciter atque superiores, quæ brachiali coarctantur. Nihilominus tamen qua inuicem respiciunt, sinuatae sunt, ligamenta quoque cartilaginea educunt, quorum opera valide connectuntur. In medio autem ductu, & secundum postbrachialis longitudinem quoniam ossa suis appendicibus multo tenuiora sunt, inuicem dirimuntur, & digno notatu interuallo inuicem dehiscunt: atque id magni cuiusdam vsus gratia. In quolibet enim trium interuallorum, quæ quatuor postbrachialis ossa constituunt, duo reponuntur muscoli ex octo illis, qui primum quatuor digitorum os flectunt. De quibus suo dicemus loco. ¶ Porro postbrachialis ossa per longitudinem angulosa, & lineis quibusdam pulchre extuberantia videntur. Superiori quoque sede exasperantur, vt trium brachiale flectentium musculorum opportunam insertionem excipiant. Sinum etiam intus oblongum medullæ respondens aptum sibi vendicant. Porro postbrachiale iustissime quatuor ossibus efformatum esse, quatuor qui ipsis stabiliuntur digiti liquido demonstrant, quibus quintus veluti opponi debuit, si modo manus commodum futura erat apprehendendi instrumentum. Quod vero Celsus *lib. 8. cap. 1.* quinque ossibus efformari postbrachiale scribit, contra quam Galenus fecerit, minime mirum. Quippe is pollicis primum os, quod quinto brachialis ossi, vt præcedenti cap. dictum est, articulatur, postbrachiali adnumerat, Galenus autem digitorum ossibus adscribit.

Nomina.

Galenus
lib. 2. de
vfu par-
tium, cap.
8 & 9.

Appendi-
ces.
Vesalius
lib. 1. ca. 26.
Mutuus
in lateri-
bus con-
nexus.

Gal. lib. 2.
de vfu par-
tium, ca. 9.
Obiectio-
nis solu-
tio.

Gal. cap.
19. lib. de
ossibus.
Nomina.
Numerus.

Vesalius
lib. 1. c. 27.
Lib. 1. de v-
fu part. ca.
15.

De digitis manus. C A P. XXXI.

- O** mnes manus digiti, qui Græcis *δάκτυλοι* dicuntur, & numero quinque sunt, ternis constant ossibus, quæ Græcis *φάλαγγες, κάρυδοι, σφαλλίδες*, Latinis *agmina, aciesue, intermedia, & articuli* nominantur. Quæ si singula coniungas erunt utique numero quindecim. Atque hæc ossa dura sunt ac densa, non tñ medullæ, vt Galeno visum est, prorsus expertia. In singulis n. sinus est oblongus, medullæ asseruandæ gratia, vt in postbrachialis ossib. paratus.

Gal. lib. 1. de
vfu par. c. 14.

Quod vero neque plura ossa, neque pauciora trib. fieri digitis omnino ex vfu fuerit, vel hinc promptissime colligitur, quoniam si illum excederent numerum, præterquam quod nulli auxiliarentur functioni: abunde enim omnes trium ossium ope obimus: perfectam, validamque digitorum extensionem vitaret, hanc minus firmā, quam nunc sit, efficientia. Quæ enim ex pluribus construuntur partibus, leuiori negotio fatigantur, lassantur, & a suo robore exsoluuntur, quam quæ paucioribus efformantur. Verum si paucioribus ossibus digiti constituerentur, in tot tamque varias & pugnantibus figuras digitos agere nequiremus. Vt igitur varie mouerentur, patiendique promptitudinem declinarent, trium ossium numerus sufficit. Quandoquidem autem prælocatum os postposito, aut vehens vecto maius esse opere pretium sit, merito natura quoque primum cuiusque digiti os grandius secundo, & secundum rursus tertio maius fabrefecit, non solum inferiora ossa longitudine, sed & crassitie & latitudine minuens, hæcque ratione potissimum digitos ex ampliori basi sensim in mucronem coarctans, & digitorum formam extruens. Non tamen eandem formam digitorum ossibus, & digitis ad-

Gal. ibidem.
Iusta ossiū
digitorum
magnitudi-
do.

Decens in-
tegrorum
digitorum
& ossium
forma.

huc vnguibus ac cute obductis largitur. Totos enim fere digitos teretes Natura efformauit, quod eiusmodi figuram reliquis omnibus iniuriis minimum obnoxiam sciret: ut quæ nulla extuberet eminentia a foris occurrantibus frangenda collidendaue. Quod enim digiti extrinsecus quidem exquisite gibbi sunt, intus autem & in lateribus magis compressi, alicuius etiam vsus gratia factum est. Interna namque sua regione digiti molliunt, terunt, subigunt, & apprehendunt: quæ omnia deterius fierent, digitis inibi gibbis exsistentibus. Quum vero externa digitorum regione neque horum aliquid tentemus, neque alio quouis munere fungamur, rationi consonum fuit, digitos ad solam patiendi pertinaciam ad amussim gibbos construi. Quum autem digiti in lateribus minus essent iniuriis obnoxii, quumque inuicem adducti, constringi, ac in ipsorum medio nullam sedem vacuam relinquere debebant, ipsos in lateribus gibbos fieri haud-

Cur digito-
rum ossa su-
pra infraque
crassiora.

quaquam ex vfu erat. Nullum autem digitorum os se offert, quod non supra infraque crassius & spissius sit, quam secundum ipsius longitudinem. Quod non temere factum esse putabis. Si enim vndique pari constarent crassitudine, homini pondere, moleque admodum incommodarent, ipsique articuli, nisi amplioribus basibus concinne adaptarentur penitus infirmi essent. Si vero digitus in lateribus ossium imitaretur imaginem, quemadmodum in macilentis ac parum obesis videre est, inter digitorum latera, vacua consisteret sedes, quæ liquorem digitis complecti non mediocri incommodo prohiberet. Ceterum vnumquodque digiti os externa sede teres & gibbum est, si modo primum os pollicis hinc exceperis, quod externa sede amplum magis planumque & depressum, non autem aliorum ritu gibbum videtur. Ad hæc tertia digitorum ossa, sede externa quidem gibba sunt, sed ab ipsa articulatione qua secundis articulantur ossibus deorsum ducta, non ita atque reliqua ossa extrorsum protuberant, sed vngui quodammodo cedunt. Interna cuiusque ossis sedes depressa prorsus, & sinuata est, multo aliter quam externa digitorum sedes: dummodo & hinc quoque primum pollicis os secluseris, quod brachialis ossibus interna ipsius facie responderet, adeoque gibbum est, magisque intus quam foris acutum. Quod certe natura haudquaquam fortuito, casuque machinatur. Secundi enim & tertii pollicis ossis internæ sedi, quemadmodum & tribus quatuor digitorum ossibus teretes tendines exporrigi debuerunt, qui profecto nisi ossium interna sedes ampla depressaque & veluti sinuata esset, in ossibus nequirent subsistere: non magis quam teretia corpora inuicem nunquam inniti cernimus. Neque etiam teretes illi tendines ipsis duntaxat applicari debuerunt, imo operæpretium fuit, & ex hac ossium sede ligamentum nasci, per longitudinem ossium tendines illis ossibus committens, ipsosque ne ab osse exsurgant declinentue complectens. Latera etiam ossium nequaquam digitorum ritu compressa lataque sunt, neque vlla pollicis paruique digiti ac indicis ossium, hac ex parte cum reliquorum digitorum ossibus est differentia. Respondet enim ossium latera, teretis corporis dimidiæ partis lateri. Quamuis interim ab hac figura primum pollicis os tantum discrepet, quanto minus reliquis digitorum ossibus interna sede compressum amplumque cernitur. Porro digiti numero quinque sunt, quorum primus ac maior Græcis ἀρτίχων, id est, promanus dicitur, quod scilicet reliquis quatuor sibi oppositis æquiualeat, atque adeo pro tota manu sit. Hip-

Digitorum
numerus.
Pollex.

pocrates

A pocrates hunc *μῆγαν*, id est, *magnum*, nominat. Latinis *Pollex*, quod *vi ac dignitate polleat*, vocatur. Eo enim deperdito omnes ceteri potestate interciderunt, quum absque huius openihil agere possint. *Alter* digitus Græcis *ἀρχανδρ*, Latinis ab usu *Index* appellatur. *Ter-*
tius Græcis *μέσος*, Latinis *Medius*, *impudicus*, *infamis*, & *verpus*, a verrendo podice dictus est. Hinc illud Martialis,

*Ostendit digitum, sed impudicum,
Alconti, Dasioque, Symachoque.*

Et Perfei Saryra secunda.

*Frontem atque vda labella,
Infami digito, & lustralibus ante saluis,
Expiat.*

B Quemadmodum vero ii duo situ post pollicem, ita etiam usu secundi sunt. Parua enim corpora iis apprehendimus, omniumque artium opera ipsis præcipue confici-
mus, & si quid violentum agere oportet, illos potissimum in opus adsciscimus. *Quartus*
Græcis *ἀναγκύς*, Latinis *annularis*, quod nimirum veteres in eo digito annulos gesta-
rent. Hunc Græci etiam *ιατρικόν*, Latini *medicum* nuncupauere. *Quintus* Græcis *μικρός*, La-
tinis *minimus* & *paruus*, atque auricularis, quod scilicet eodem aurium sordes expurge-
mus, dicitur. Hi duo digiti minorem quidem usum aliis præbent, sed istamen manife-
ste in iis apparet, in quibus amplectendum corpus circulo comprehendimus. Si id enim
humidum & exiguum fuerit, digitos ad amussim constrictos, ipsi circumflecti expedit.
C Quo in opere paruus quoque est accommodus, operculi modo aliis adiectus. Si vero
durum & magnum fuerit apprehensibile, digitis a se inuicem quamplurimum distan-
tibus, ita illud comprehendatur oportet. Adde quod id pluribus digitis apte compre-
henditur, pluribus suis partibus digitis accedentibus commissisque. Quam ob rem au-
tem digiti omnes inæquales sunt facti, & medius longitudine reliquos vincit, Galenus
loco citato copiose tradit, ideoque ut hoc loco longius narremus non est opus. Ceterum
iure exstructos esse quinque digitos, cuius palam sit, qui ad quæ officia illi nobis ex usu
sint expendere voluerit. Si enim pauciores essent, permultæ actiones imperfectius obi-
rentur. Pluribus vero in nullos usus indigemus. Atque hinc est, quod artificiosa Natura
non concedat homini senos digitos, nisi prodigiose quandoque nobiscum iocetur, ut
D fecit in Volcatio egregio vate, qui ob id *Sedigitus* est nominatus.

*De ossiculis sesaminis extrema manus. CAP. XXXII.**

Natura manuum articulis, veluti auctarium, securitatis gratia, ut scilicet implerent,
stringerent, ac quo minus luxationi redderentur obnoxii, ossicula quædam com-
posuit, quæ a Sesami leguminis seminis minuti specie, Græcis *σάμμιος*, Latinis vero *Ses-*
famina vocantur. Sunt autem in singulis manibus duodecim. Primum in interna sede
secundi pollicis articuli, quo primum ipsius os secundo articulatur, duo reponuntur os-
sicula utrunque rotunda & solida, & non multum ab orizæ seminis forma discedentia.
Sunt enim paulo quam semen ipsum breuiora. Verum ut orizæ semen vna parte de-
pressum visitur, sic & horum ossiculorum pars depressa, modiceque cavata, & cartila-
gine ea parte incrustata est, qua primo pollicis ossi ambo incumbunt. Vnum vero ossi-
culum latus externum interioris sedis primi ossis capitis, alterum vero internum latus
eiusdem occupat. Adhunc sane modum in primis reliquorum digitorum internodiis duo
quoque ossicula reperiuntur, eodem situ posita, tantoq; pollicis ossiculis minora, quan-
to ad paruum digitum propius accesseris. Illius enim primo articulo, aut potius capiti
postbrachialis ossis paruum sustentis minima & quodammodo cartilaginea adne-
ctuntur ossicula. Ceterum hæc omnia coniuncta numero octo existunt, quibus si pri-
mum quod descripsimus adiunxeris, vniuersa nouem erunt. Præter tamen ea, quæ iam
dicta sunt, in senibus, &, ut sic dicam, ossibus hominibus, vtrumque aliquando in interna
F tertii pollicis articuli sede collocatum ossiculum animaduertitur. Eiusmodi quoque
ossiculum nonnunquam in singulis digitorum secundis & tertiis internodiis occurrit, sed
adco exiguum ut vix milii seminis magnitudinem æquet. Huius etiam generis ossicu-
lum notatu dignæ magnitudinis illic plerumque obseruatur, ubi postbrachialis os paruum
digitum suffulciens octauo brachialis ossi articulatur.

Gal. lib. 2. de
usu par. c. 22.
Index.
Medius.

Annularis.

Minimus.
Galen ibidi-
cap. 23.

Digitus cur
inaequales.
Cap. 24.
Quinque
digiti iure
exstructi.

Gal. lib. 2.
de usu par-
tium, c. 12.
Vesal. lib. 1.
cap. 28.
Numerus:

Ibidem.

Sunt igitur extremæ manus officula ſeſamina, vt comprehenſum eſt, vt minimum A
 puodecim, interim enim plura reperiuntur. Senſim namque & temporis progreſſu illa
 obſeruare oportet. Atque hinc eſt, quod Galenus eorundem numerum ab anatomicis
 eſſe præteritum ſcribat. Vt hoc nomine noſtrum ſeculum plurimum Andreæ Veſalio
 debeat, qui vnus inter omnes anatomicos horum offium numerum obſeruare voluit.

De offibus ſacri offis lateribus commiſſis. C A P. XXXIII.

Gal. cap. 20.
lib. de offi.Ilium os.
Coxediciſ.

Pubis.

Offium ſa-
cri offis la-
teribus co-
miſſorum
uſus.
Veſal. c. 29.
lib. I.Ilii offis ſe-
des ſacro
offi comiſ-
ſa qualis.Ilium offis
pars retror-
ſum magis
quam ſacri
offis tranſ-
uerſi pro-
ceſſus ex-
porrecti.
Ilium offis
appendix.
Spina.
Dorſum.

Oſſis ſacri tranſuerſis trium ſuperiorum offium proceſſibus, vtrinque vnum conne-
 ctitur os, cui integro nullum nomen inditum eſt. Quanquam enim cōtinuum eſt,
 tamen a diſſectionis profeſſoribus in tres veluti ſedes diſtinguitur, ac peculiari nomine B
 donatur. Lata namque ipſius, & ſuperior ac poſterior, ſacroque offi commiſſa pars Græ-
 cis λαγώνων, Latinis *Ilium os* appellatur. Altera eius ſedes mediaq; ad femoris ingreſſum
 poſita. Græcis ἰχίον, Latinis *coxendiciſ os*, aut ſimpliciter *coxa* vocatur. Tertia ſedes ante-
 riorque qua in pubis regione cum alterius lateris offe committitur ampliterque perfo-
 ratum eſt, Græcis ἡβης, Latinis *pubes*, & *pectinus os*, nuncupatur. Adeo vt vnus lateris os
 non ſecus denominetur, quam ſi tribus propria circumscriptione terminatis offibus
 extrueretur. Hæc offa in hoc præcipue ſunt accommodata, vt ſcœmora ipſis articulen-
 tur, horumque ope humo erigatur & ſedeat. Eſt etiam horum offium nequaquam infi-
 mus uſus, quo communi offium modo, reliquis corporis partibus inſtar fulcrorum ſub-
 iiciuntur, reliquaſque corporis partes continent & amplexantur. Duo enim hæc offa
 ſimul cum ſacro offe veluti peluim quandam efformant, quæ inteſtina concinne ſuſti- C
 net, & veſicam, & in ſcœminis vterum elegantiffime continet, ac demum eas, quas am-
 plectitur partes tuto munit. Porro ilium offis ſedes ſacri offi commiſſa egregie varia eſt.
 ſingulis namque proceſſuum ſacri offis ſinibus, ilium offis tubera, & eorundem pro-
 ceſſuum tuberibus, ilium offis ſinus correfpondent, vt variis partibus mutuo ingreſ-
 ſu ilium os ſacro committatur. Vt enim tranſuerſi proceſſus ſacri offis primum ob-
 longo ſinu donantur, ita etiam ilium os oblongum tuber ſinui congruens obtinet. Et
 quia proceſſuum ſinus anterior pars, ſinulue ſupercilia, ſatis inſigniter protuberant, por-
 rigiturque, ilium etiam offi ad anteriorem oblongi ſui tuberis ſedem ſinus inſculpū-
 tur, quos protuberantes illæ proceſſuum partes ſubeunt. Vbi autem humilima eorum
 ſinuū ſedes conſpicitur, ilium os quaſi in cultri modum exacuitur, vt eandē cum quarti D
 offis ſacri offis tranſuerſo proceſſu ſuperficiem conſtituat. Rurſus oblongo ſacri offis
 tuberi, quod inſtar ſpinæ in proceſſuum ſinibus eminet, oblongus etiam ilium offis ſi-
 nus conuenit, tuber id adamuſſim ſulcapiens. Porro duobus proceſſuum ſinibus ad po-
 ſteriorem dicti nunc tuberis ſedem conſiſtentibus, & tuberi tranſuerſim in illorum ſi-
 nuum medio prominenti, ilium os non æque concinne reſpondet, quum ſcilicet non
 adeo procere extuberet, atque illi proceſſuum ſinus alte celantur: Atque vt ſemel di-
 cam, ſacrum os ilium offi non admodum hac ſede, vbi duo illi ſacri offis proceſſuum ſi-
 nus conſpiciuntur, conterminum eſt, ſed plurima cartilago ligamenti natura partici-
 pans, hæc offa intercedit, totam amplitudinem, qua inuicem offa dehuſcunt, infarciens.
 Vniuerſa igitur ilium offis ſedes ſacro commiſſa, aſpera eſt, ac inæqualis, & inſigniter E
 craſſa: quemadmodum & reliqua offa illis ſedibus, quibus inuicem compinguntur am-
 pla craſſaque ideo ſunt, vt validiorem amplioremque connexum efficerent. Atq; hæc
 craſſa ilium offis pars impoſteriora longe magis quam tranſuerſorum ſacri offis proceſ-
 ſum amplitudo porrigitur, prominetque tum quod ilium os ampliſſimum latiſſimum-
 que ſcapulæ modo eſſe oportuit, vt femur mouentes & alios plerofque muſculosa ſe
 pronafci ſinat: tum ad poſteriorem ſacri offis ſedem aptum conſtitueret locum, a quo
 quartus hominis thoracem mouentium muſculus principium duceret: vna cum dor-
 ſum mouentium vndecimo, & alii ſuo loco a nobis commemorandi. Porro reliqua
 ilium offis amplitudo plane ſemicirculari figuræ non abſimilis, ſuperiori ſua ſede per
 totam ſemicirculi circumferentiam appendicem obtinet, quæ aſpera inæqualisque F
 eſt, & interno externoque latere compreſſa, ideoque veteribus ſpina ilium offis dicta.
 Ipſi namque dorſum *ilium offis* vocarunt, externam ſuæ amplitudinis ſedem, quia hæc
 ampla eſt, & ſi cum interna conferatur, quodam modo gibba. Appendix autem ſemi-
 circularis ſedes quæ extrorſum prominet, veluti illius dorſi ſpina iure cenſetur. Com-
 pumitur

- A** primitur autem interna sede appendix, ut hæc inibi amplior euadat, & carnosam tranſuerſi abdominis muſculi partem, illinc aptius educat. Externo vero latere cõprimitur, ampliorq; fit, ut potiſſima oblique aſcendẽtis abdominis muſculi carnea pars hinc principium ſumat, & oblique deſcendẽs muſculis illi inferatur. Adhunc ſane modum offis ſacro offi commiſſi ampla, & quæ ilium os dicitur, pars ſe habet. Media vero parte, quæ Coxendicis os. coxendicis os appellatur, hoc os craſſius validiusq; fit, ut vniuerſum corpus vni innitens cruri, fortius ſuſtineat, aptaq; ſedes fiat, cui ſinus articulãdo femore idoneus incidatur. Quippe huic coxendicis offis ſedi amplius rotundusq;, & omnium corporis ſinuum cui Acetabuli femori articulando paratum. offa articulantur profundiffimus ſinus, qui ut ceteri quoq; acetabulum dicitur, inſculpitur, non omni ex parte læuis, lubricaq; cartilagine incruſtatus. In anteriori n. ipſius ſede non modica portio altius quam reliqua illius circumferẽtia inciditur, ac aſpera cãciſq; foraminulis quibuſdam oppleta cernitur, ligamenti producendi gratia, & teres in medium, ſeu verticem femoris capitis inferitur. Deinde præſentis ſinus ſupercilia in anteriori ipſius ſede leuius, quã in poſteriori protuberant, quod ſcilicet femur ſedentibus magis in angulum ſecti oportebat, quam ſtantibus, aut aliud quid agentibus extendi, aut in poſteriora duci. Præterea in humiliori coxendicis acetabuli ſinus ſuperciliorum ſede, ſupercilia non continuo ductu orbiculatim feruntur, ſed inciduntur ac intermittuntur, ut ſcilicet iter parent venulæ hæc in aſperam & cartilagine non obductam acetabuli ſedem exporrectæ, articuloque alimentum ſuppeditanti, a quo viſcidus humor, quem in hoc articulo plurimum coaceruari decet, adapteretur, cuius demum auxilio articulus promte mobilis euadat. Ne tamen ſinus huius in ſupercilio inciſi ratione articulus luxationi obnoxius redderetur, natura validum cartilagineumque ligamentum orbiculatim ſuperciliis adnexuit, quod nullibi intermiſſum apparet, ſinumque adhuc magis quam ſupercilia adauget, & venulæ illi viam præbet, inter os & poſteriorem ipſius ligamenti ſedẽ prorepẽtis, ut vena ſimul tuto feratur, & ſinus ille luxandi promptitudinem non adiuuet. Atque hinc eſt, quod paſſim in coxendicis offis acetabuli ſuperciliorum externa ſede cœca foraminula ſint parata, ut ſcilicet validiſſimũ ligamentum orbiculatim femur coxendicis offi colligans, educant. Quin etiam in hoc offe ſinus inter ilium offis anteriorem partem, quæ ſacro offi committitur, & poſteriore coxendicis regionem conſpicitur, in hoc exſculptus, ut neruo viam præbeat, qui crus aduentum quartus, omniumque corporis neruorum ex pluribus compoſitus maximusque exiſtit. ¶ Eſt quoque hic obſeruandus coxendicis offis acutus proceſſus, qui ligamentum educit, in tranſuerſum proceſſum quinti ſacri offis pertinens. Neque prætereundus venit ſinus coxendicis offis poſteriori internæque regioni ſub dicto iam proceſſu exſculptus, ad quem naturæ ſolertia veluti ad trochleæ rotulam decimus femur mouentium muſculus refleſcitur. Inſuper non perfunctorie coxendicis offis appendix indagabitur toti infimæ ipſius ſedi, cui ſedentes innitimur, adnata. Appendix hæc offis, cui coaleſcit, amplitudinem ſeruat, quod tum roboris gratia, tum muſculorum exortus cauſa inſigniter craſſum, & vtcunque amplum viſitur. Ab hac enim appendice, ut nimum, quatuor grandes exoriuntur muſculi, nempe tibiam mouentium tertius, quartus, & quintus, ac femur mouentium quintus, ut ſuo loco oſtendemus. ¶ Præterea in elatori coxendicis offis ſede ſinus inciditur amplius, qui in mundato offe foraminulis quibuſdam in hoc oppletus cernitur, ut is ligamentum educat, cuius beneficio os inibi læue lubricumque, ac veluti inunctum videtur, ut recte adhuc ſinum ſeptimus ille femoris muſculus, vna cum ſexti muſculi tendine, refleſci & conuolui poſſit. Vtrinque ad huius ſinus latera, vnum inſigne quod externum dicitur ſatis prominet tuberculum hunc ſinum augens, ac quo minus hæc deſcendentes muſculi ex ſinu declinent, prohibens. *Alterum* vero tuber, internum iam dicti ſinus latus conſtituens, plurimum ad coxendicis offis robur confert, quod neceſſario craſſum validumq; eſſe oportuit, tum articulationis roborisque nomine, tum etiam quod id totius corporis altiffimo ſinui cui femur ſemper articulatur, celandum fuerat. Atq; huius uſus quoq; occasione, ilium os interna ipſius ſede ad elatiorem ſui cum ſacro offe connexus regionem, craſſum validumque redditur, & veluti ad ſecundi tuberculi internam ſedem continuo tubere porrigitur. Atque in eum modum media eius quod deſcribimus offis pars, quam coxendicis os nuncupauimus, ſe habet.

Sinus quo craſſiſſimus corporis neruus fertur.

Coxendicis offis acutus proceſſus.

Sinus ad quem decimus femur mouentium muſculus voluitur.

Appendix coxendicis offis.

Sinus coxendicis offis ſuperiori ſedi inſculptus.

Sinus tubera.

Pubis ossis
historia.

Ossium fa-
cro ossi co-
nexorum
in viris &
mulieribus
differentia.

Cur pubis
os maximo
foramine
peruium.
Libr. 3. de
adm. ana. in
fine.

Anterior vero pars, quæ *Pubis os* dicitur, tenuis utcumque cernitur, & dextrum os A sinistro cartilaginis interuentu quasi vnionis modo committitur. Quo enim homo ætate fit prouectior, eo semper connexus iste minus cartilagine oppletur, minusue cartilaginis ostendit. Atque id viris pariter ac mulieribus commune est. Neutiquam enim ob vulgi opinionem arbitrandum est, pubis ossa viris esse continua, mulieribus autem in hoc cartilaginis interuentu compacta, ut partus tempore remitti, atque inuicem dis- iungi queant. Parturientibus namq; mulierib. hæc ossa inuicem haud disiungit. Verum id mulierculæ in hoc ossium coalitu peculiare sibi vendicant, quod ipsis non tam lon- ga linea, atque in viris, committitur. Deinde coxendicis ossiū infimæ partes, dextram dico & sinistram, in mulieribus mutuo longe magis distant, quam viris. Præterea infi- mæ pubis ossium partes inuicem sub ipsorum connexu diremtæ, multo etiam magis B mulieribus quam viris seiunguntur ac distant. Adeo ut in mulierum ossibus vacua sedes inter coccyx os & internas regiones infimarum partium coxendicis ossium, multo am- plior quam in viris occurrat. Hæcque differentia tam est insignis, ut vel ipsa abunde doceat, pubis ossa in partu non recludi. Quo autem minori negotio leuiusque vterum ge- rerent, ilium ossa mulieribus multo ampliora sunt, ipsorumque spina in latera longe magis quam viris educitur, & etiam illa ossa extrorsum insignius cauantur, & commo- dam gestando foetui sedem efformant. Ceterum pubis os maximo totius corporis os- sium foramine, quod propter magnitudinem ab ostii imagine, Galeno teste, *Superius* nuncupatur, peruium est, ne interim frustra grauaret animal, sed ut leue esset, quando- quidem hoc os amplam & aptam sedem educendis musculis fieri oportuit. Neque est, C quod per hæc foramina aliquis vasa seminaria, aut maximas crurū venas & arterias, aut etiam nervos deduci arbitretur, quemadmodum multi credunt. Quippe hæc instru- menta aliā nanciscuntur viam. Maxima enim crus petens vena, arteriaque, simul cum secundo crus adeunte nervo, proprium sinum obtinent in superiori pubis ossis sede in- sinuatum e regione elatioris sedis dicti foraminis. Seminariis autem vasis elatius quam pubis os prominet, in abdomine iter paratum esse suo dicemus loco. Porro ingens illud, pubis ossis foramen valida membrana impletur, quæ musculus internæ foraminis sedi proximum ab illo dirimit, qui externam foraminis sedem occupat. Neque profecto a- liquid foramen hoc transit, præter venam, & arteriam, nervumque non ad genu vique D ramorum serie digestum. Præterea hæc vasa non per foraminis medium feruntur, sed in elatiori foraminis sede sinus celatur, illis vasis deducendis paratus. Quod vero supe- rior pubis ossium pars, qua inuicem committuntur aspera est, ideo contingit, quod re- ctos abdominis musculos hinc nasci naturæ visum fuerit. Deinde anterior quoque os- sium sedes inibi aspera est, ut nervosum caput secundi tibiæ mouentium musculi hinc rite pronasceretur. Adhæc in anteriori pubis sede a coxendicis ossis acetabuli interno latere, ad pubis ossium commissuram usque, tuber & veluti quædam prominentia con- spicitur, a qua octauus femur mouentium musculus principium ducit. Quemadmo- dum vero hæc anterior pubis ossis sedes protuberat, ita quoque posterior acutā osten- dit lineam, a qua musculus femur mouentium decimus sui exortus portionem assumit. E His omnibus accedit pubis ossis crassities, iuxta infimam pubis ossium cōnexus sedem, & magni illius foraminis internum latus, ubi pubis os quodammodo teres crassumque ob hoc visitur, ut ipsius ossis robur adaugeatur, utque hinc præter quosdam penis mu- sculos alterum corpus eorum quæ penem constituunt, originem duceret.

De femore. CAP. XXXIII.

Nomina.
Gal. ca. 22. de
ossibus.
Femoris su-
perius ca-
put.
Vesalius li.
1. cap. 30.

FEmur, quod Græcis *μῦς* dicitur, os est, quod a coxis incipit, & ad genua finitur. Ma- gnitudine autem cunctis humanæ fabricæ ossibus præstat. In auiibus vero, & omnib. fere quadrupedibus tibiæ ossi & fibulæ longitudine cedit. Hoc supra coxendicis ossi, infra vero tibiæ ossi articulatur. Superiori parte, qua similiter atque inferiori appendi- ce donatur, robustissimum caput obtinet, prolixæ quidem ceruici ad interiora inclina- F tæ adnatum, coxendicisque ossis acetabulo exquisitæ congruens. Vniuersum hoc ca- put læue & cartilagine incrustatum visitur. At in sui medio non nihil inferius quam ipsius verticis centrum existit, angustum profundumque & inæqualem commōstrat sinum, cui teres ligamentum a coxendicis ossis acetabulo enatum, validissime implan- tatur.

- A** tatur. ¶ Inferiori autem sede femur insigniter crassum est, & in duo capita omnium totius corporis ossium capitum maxima dirimitur, quæ in posteriorem femoris sedem, longe magis quam in anteriorem porriguntur, quemadmodum ipsorum cum tibiæ osse cuius sinus subeunt, articulo ex usu fuerat. Hæc namque ossi tibiæ mutuo ingressu ad eum modum articulantur, ne tibia duntaxat flecti extendique possit. Quamuis autem hæc in anteriori eorundem sede sinum ostendant, utriusque capitibus communem, & impenso parulum, leuique cartilagine incrustatum, tamen is aliquo tibiæ ossis tubere excipiendo paratus non est. At os orbiculare & breui scuto non ab simile apto tubere sinum illum, *ut capite ab hoc altero fusius dicemus*, subit. In posteriori femoris sede capita hæc magno intervallo inuicem dirimuntur, atque in ipsorum medio amplum, profundumque sinum utcumque asperum, & cartilagine nequaquam obductum habent, qui asperum inæqualeque tibiæ ossis tuber excipit. Iuat etiam sinus iste, deducendo totius corporis maximoque neruo hac simul cum vena & arteria in tibiam contendenti. Humiliora enim femoris capita, quum tibiæ motum gratia adeo in posteriora ducantur, etiam id præstant, ut in illorum medio neruum illum simul cum vasis tutissimo deorsum repere sinant, atque etiam processum modo aliquor muscutorum pedem mouentium, de quibus suo dicemus loco, principia porrigant. Atque ita anterior & inferior posteriorque horum capitum sedes se habent. Latera vero eorundem multis cæcis foraminibus opulentur, ut validissima genu articulum continentia ligamenta hinc apte pronascantur. Porro externum exterioris capitis latus, priuatum sinum obtinet oblique ipsi iuxta posteriorem eius lateris regionem insculptum, ac quarti tibiam mouentium musculi tendini paratum, quo minus scilicet hac oblique reflexus, a suo ductu aberraret. At internum latus interioris capitis, etiam si ad id plures reflectantur tendines, tamen nullum eiusmodi sinum adipiscitur. Verum iuxta posteriorem lateris sedem compressio apparet, qua tuto tendines deferri queant, a sua sede tuberis beneficio, quod in medio dicti nunc lateris late protuberat, non reclinantes. ¶ Ad femoris ossis ceruicem, cui superius femoris caput adnascitur, duo conspiciuntur processus, quorum alter extremum femoris latus occupat, ac omnium corporis processuum nulli alteri ossi commissorum facile maximus est, insigni quoque donatus appendice, externa sui sede gibbus, interna autem qua femoris caput respicit, sinuatus, quatuor compressiones sedesque habens. *Qua-*
- D** rum *prima* ampla & gibba in posteriori processus sede primi femur mouentis musculi insertioni seruiens, apparet. *Secunda*, in anteriori ipsius consistit latere, magis quam prima aspera & inæqualis. Secundi femoris motum auctoris musculi insertioni famulatur. *Tertia* ad superiorem processus sedem visitur, inter primæ & secundæ elatiore sedes consistens, tertii femur mouentis musculi insertionem excipit. *Quarta* in apice processus se offert, reliquis tribus longe arctior, quarti femur mouentis musculi tendinem admittens. Alter minor est, multoque inferius in interno femoris latere non nihil versus posteriora conspicuus, & similiter appendice adactus, modice oblongus, neque admodum inæqualis. Ambos Græci *ροτατορες*, quasi *rotatores* appellant. Hunc autem priuatiorem, & minorem rotatorem nuncupant, illum vero exteriorem
- E** ac magnum, quem etiam propter amplitudinem, & quandam cum natibus imaginem Græci *μακρὸν* nominant. Hi duo processus in hoc parantur, ut collis ritu muscutorum insertionem probe admittant, aliisque musculis eleganter sui principii sedem præbeant. Quod vero ad reliquam femoris formam spectat, vniuersum femur anteriori ipsius parte, & in lateribus teres & leue est. In posteriori autem sede femur in acutum quodammodo fertur, & lineam insigniter protuberantem & asperam, inæqualemque ostendit, quæ a femoris processuum radice aliquo usque ultra medium longitudinis femoris prorepat. Ad inferiorem huius lineæ sedem, ac iuxta inferiorum femoris capitum radicem, femur amplum depressumque cernitur, quo tutius hac maxima tibiam petens vena, cum arteria, & neruo fertur. Ceterum femoris ductus non recto a tramite
- F** coxendicis ossis acetabulo deorsum tenditur. Verum ceruix eius a capite ipsius valde extrorsum oblique, & quasi transuersim fertur, & hinc femur rursus reliquo ipsius corpore oblique versus interiora ad genu descendens procedit. Quæ quidem figura laudatissima est, adeo sane, ut omnes quibus a prima conformatione femur rectius, quam homini ex usu est, *contigit, vati seu valgi ad genu redduntur*.

Duo femoris inferiora capita.

Duo femoris processus, seu rotatores. Gal. c. 21. de ossibus. Maior.

Minor.

Vtus processuum.

Femoris per ipsius longitudinem forma.

Gal. lib. 1. de usu partium, ca. 9. & ca. 8. li. de morbo. causis.

Gal. c. 12. li.
de offi.
Nomina.
Vesal. lib. 1. c. 31.
Tibia.
Gal. lib. 3. de
usu part. c. 9.

Fibula.

Crea.

Sura.
Tibiae ossis
& fibulae ap-
pendices.
Vesal. ibid.
Sedes cui
femur ad
tibiā ar-
ticularur.

Cartilagi-
nes quibus
tibiae ossis
sinus auge-
tur.

Fibula ad
tibiae os ne-
zus.

Vbi fibula a
tibiae osse
dehiscit.

VNiuerſa pars cruris, quæ inter talum genuque poſita eſt, Græcis *κνήμην*, Latinis *tibia*, *focile maius* dicitur. In ea perinde atque in cubito bina reponuntur oſſa, quorum al-
terum, nempe interius & grandius, totius membri nomine *κνήμην*, id eſt, *tibia* vocatur.
Alterum vero quod exterius locatum eſt, & interiori craſſitie admodum cedit, Græcis
quidem *πρῶτον*, Latinis autem *fibula*, vulgo *focile minus*, nuncupatur. Adeuitandam ita-
que conſuſionem, & clarioris doctrinæ gratia craſſius os, *tibia os*, appelletur, vt hac ratio-
ne a tibia, id eſt, toto membro, quod prædictis oſſibus, muſculis, venis, arteriis, neruis, &
cute hæc omnia ambiente conſtituitur, diſtinguatur. Gracilius autem os *fibula* nomi-
necur. ¶ Ceterum anterior tibiae pars tenuis, excarnis, & inſigniter gibba, Græcis *κρέα*, B
& frequentius *μεσσηνίον* & *ἀντικνήμιον* dicitur. Poſterior vero pars, quæ tibiae quaſi pulpa
eſt, Græcis *πᾶς ἐξωνυμία*, quod ſcilicet veluti tibiae venter ſit. Latinis vero *Sura* dicitur. Ti-
biae autem oſſi & fibulae ſupra infraque appendix coaleſcit. Ac ſuperior quidem tibiae
oſſis appendix admodum craſſa lataque eſt, ac in anteriori tibiae regione magis quam
in poſteriori deorſum ducitur. Huic duo oblongi inſculpuntur ſinus, inuicem aſpero
inæqualique tubere diſtincti, & lubrica cartilagine in cruſtati. His ſinibus inferiora fe-
moris capita excipiuntur. Tuber autem ſinus diſtinguens, grandem ſinum ſubit, fe-
moris capita poſteriore in ſede dirimentem. Porro tuber hoc ex ſuperiori mediaque
ipſius ſede, quæ aſpera & ſinuata, neque vlla cartilagine iuncta viſitur, validiſſimum e-
mittit ligamentum, iam dicto femoris capitum in ueruallo ſinu iue inſertum. Adeo ſane C
vt media huius tuberis ſedes in hoc aſpera ſinuataque ſit, quo felicius ligamenta in fe-
mur porrigat, hæc e maxime protuberante ſua ſede, & deinde ex poſteriori ipſius re-
gione educens. Ab anteriori namq; tuberis regione, quæ minimum prominet, etiamſi
illa ſimiliter eſt aſpera, ac late ſinuata, nullum tamen ligamentum femori inſeritur, ſed
ligamenta inibi producuntur, quæ cartilagineſ anteriori huius tuberis ſedi colligant.
Quum enim duo tibiae oſſis ſinus femoris capita admittentia quodammodo ſuperficie
tenus inſculpantur, Natura mirabili artificio ſinuum profunditatem adauxit. Quippe
præter lubricas cartilagineſ tibiae oſſis ſinibus, & femoris capitib⁹ cruſtæ modo obdu-
ctas, vtriſque ſinui vnā adhibuit cartilaginē, neq; femori, neq; tibiae oſſi aliter quam
ligamentorum beneficio connexam. Hæc namque orbiculatim ligamentiſ genu arti- D
culum amplexantibus ſolum connaiſcitur, & præterea ligamentiſ interuentu anteriori
poſteriorique ſedi tuberis ſinus tibiae oſſis dirimentis, connectitur. Harum cartilagi-
num figura lunaris, quemadmodum interioris ſinus internum latus, & exterioris ſinus
externum. Atque hoc ſane modo tibiae os femori articularur.

Fibula vero non adeo alte conſcendit, vt femur contingat, verum ſuperior ipſius
appendix in interno illius latere ſinum gerit leuiter admodum inſinuatum & amplum,
cui minime protuberans tibiae oſſis appendicis tuber coarticularur, quod ad externum
tibiae oſſis latus verſus poſteriora conſiſtens, cartilagine, ſimiliter atque ſinus fibulae, in-
cruſtatur. Porro ima ſede fibula tibiae oſſi diuerſa articuli ratione, quam ſupra coarctat-
tur. Externum enim tibiae oſſis latus, oblongum habet ſinum, cui protuberans inter- E
num fibulae latus immittitur, quod aſperum non nihil eſt, quemadmodum & tibiae oſſis
ſinus aſper quoque, & cartilagine neutiquam in cruſtatus cernitur. Sinus enim ille fi-
bulam leui contactu non excipit, verum qua hæc oſſa inuicem committuntur, validum
intercedit ligamentum, non ſolum in circuitu ipſa connectens, verum etiam vbi mu-
tuo ſe contingunt. ¶ Porro per reliquam tibiae longitudinem fibula a tibiae oſſe pluri-
mum dehifcit. Non quidem, quod hæc radii modo oblique ducatur, ac veluti a tibiae
oſſe foras obliquetur, ſed quod tibiae os ſupra infraque adeo craſſum ſit, & in reliqua
ipſius longitudine gracile, vt fibula illis tibiae oſſis ſedibus, quibus craſſum cernitur, cō-
miſſa, facile a tota tibiae graciliori ſede multum diſtet. ¶ Quamuis tanto adhuc minus fi-
bula a tibia dehifcat, quanto minus recta cōſpicitur. Fibula n. paulo ſub medio longitu- P
dinis tibiae introrſum ac verſus tibiae os non nihil curuatur, externoque ipſius latere ſi-
ma, ſeu concava redditur. Superior itaque tibiae oſſis appendix, ad eum quem diximus
modum femori ac fibulae coarctatur. Anterior autē eiufdem appendicis ſedes vtrū-
que depreſſa aſperaque cernitur.

- A** Inferioris tibiae ossis & fibulae appendices, simul sinum sedemque efformant, cui talus mutuo quasi ingressu articulatur. Sed de talo suo dicemus loco. Sinus autem in inferioris tibiae ossis appendicis sede amplius admodum est, & quodammodo geminus. In medio enim amplo, sed modice prominente tubere interstinguitur, liquidoque altius ad tuberculi latera excavaatur. Ad internum huius sinus latus inferior tibiae ossis appendix, valido magnoque processu deorsum fertur, qui externo ipsius latere, quo sinum respicit, cauus & similiter, ac sinus ipse laevis & cartilagine incrustatus est: interno autem latere alterum crus respiciente gibbus est. ¶ Et quum excarnis sit, nullisque musculorum partibus obiectus, in nobis tactu facile percipitur, estque interior malleolus, quem Graeci *σφυον* nominant. Processus hic in infima ipsius sede versus posteriora sinum obtinet, ex quo ligamentum prodit, cartilagineum tibiae ostalo colligans. Atque eiusmodi etiam ligamenti producendi gratia, anterior appendicis inferioris tibiae ossis sedes, in humilima ipsius parte etiam sinum obtinet transuersum oblongum & asperum, & inaequale, a quo ligamentum prodit, tibiae ossi ceruicem tali nectens. Posterior etiam huius appendicis sedes, ubi primum internum educit malleolum, depressa est, sinusque ostendit, qui transuersus obducti ligamenti musculorum tendines hac pedem adeuntes, ne suis sinibus aberrerent, ferri sinunt. Sunt autem numero tres, quintus scilicet pedem mouentium, & duo digitorum flexui famulantes. ¶ Externum autem inferioris appendicis tibiae ossis latus nullum educit processum interno malleolo respondentem. Verum appendix fibulae externo tibiae ossis lateri adnexa, impense hic crassescit, deorsumque magis quam interior malleolus fertur. Tanto enim fibula hic declinius ipso tibiae osse descendit, quanto altius tibiae os ad femur supra porrigitur: adeo ut fibula ne minimum quidem longitudine a tibiae osse vincatur. Inferior hac fibulae appendix, externum latus sinus constituit talum excipientis. Verum appendix interno ipsius latere adeo protuberat, & cartilagine incrustatur, ut eam a talo verius suscipi, quam eundem excipere merito quis dixerit, etiam si tali externum latus appositae tegat, atque in eum modum una cum interno malleolo talum comprehendat, ut nusquam in integris hominibus talus contingi, ut paulo post clarius dicemus, possit.
- B** Porro una fibulae pars talo commissa, externoque suo latere gibba, & nulla prorsus musculi parte obiecta, exteriorem constituit malleolum, quem simul cum interiori permulti, Galeno quoque teste, perperam talum appellant. Nam si iis utrinque talus continetur, & undique contegitur, ut ne eum quidem tangere in integris hominibus & ante dissectionem, (ut dictum est) queas. Tibiae enim ossis appendix superiorem ipsius sedem tegit, & internum quoque ipsius latus. Fibula vero inferiori sua appendice externum tali latus occupat. Anterior tali sedes, quae in nuda ossium copage oculis subiicitur tendinibus occultatum per pedis superiora ad digitos deductis. Ita etiam posterior ipsius sedes non minus in nudis sceleris conspicua tendinibus in calcem insertis, & quibusdam hac pedis inferiora lubeuntibus. Porro error confundendi talum cum malleolo ad nostra usque tempora durauit. Nam sunt non pauci Galeni Latini interpretes, quibus familiare est, ut *σφυον*, hoc est, malleolos, subinde talos interpretentur. Externum itaque exterioris malleoli latus gibbum excarneque est, similiter atque interioris malleoli internum. Posterior autem exterioris malleoli sedes amplum ostendit sinum, qui transuerso obductus ligamento, sexti & septimi pedem mouentium musculorum tendines deducit, illos quo minus a sua sede reclinent continens. Internum eiusdem malleoli latus in infima ipsius sede versus posteriora profundum asperumque ostendit sinum, ex quo ligamentum prodit cartilagineum hic fibulam talo validissime connectens. ¶ Ceterum si fibulam examinaueris, eam secundum ipsius longitudinem ductum triangulam esse conspicias, atque id potissimum iuxta ipsius longitudinis medium. In anterioris enim fibulae sedis medio, acuta & insigniter protuberans linea apparet, primum fibulae angulum constituens. In posteriori autem ipsius sede, depressa est & plana, atque utrinque ad posterioris sui sedis latera una demonstrat lineam, quae insigniter satis protuberans, alium fibulae angulum efformat, adeo ut ea quae internum latus posterioris fibulae sedis occupat, secundus fibulae angulus appellari possit: quae vero externum eius sedis latus habet, tertius. Atque iis tribus lineis angulisue, tria fibulae conti-

Tibiae ossis & fibulae sinus ac tubera quibus talo articulatur.

Interior malleolus.

Fibulae cum talo articulatione.

Exterior malleolus.

Cap. 22. lib. de ossibus.

Talum ante dissectionem tactui non occurrere.

Fibulae per ipsius longitudinem figura triangula.

Tibiæ ossis
per ipsius
longitudi-
nem for-
ma.
Spina tibiæ.

nentur latera. ¶ Tibiæ quoque os similiter ac fibula in suæ longitudinis medio qua-
dantenus triangulare est. Prima enim ipsius linea in anteriori ossis sede consistit, insi-
gniterque prominet. Vnde etiam *Spina* anatomes professoribus appellatur. Secunda
& tertia tibiæ ossis lineæ posterioris suæ sedis latera constituunt. Ac tertia quidem in-
ternum eius sedis latus efformat, parū acute educta, sed obtusa admodum, & quasi te-
res. Secunda vero paulo est acutior, ac externum posterioris tibiæ ossis sedis latus effor-
mat. His tribus lineis, tria tibiæ ossis conficiuntur latera. Ac primum quidem prima se-
cundaque linea terminatur, sinuatumque est ac planum. Secundum vero latus prima
tertiæque linea terminatur, & insigniter gibbum est, nulloque prorsus obtectum mu-
sculo, Græcisque ut dictum est, *xpta* appellatur. Tertium tibiæ ossis latus, secunda & ter-
tia circumscriptum lineis, non valde depressum est.

De Patella. C A P. XXXVI.

Situs & for-
ma.
Gal. c. 23. li.
de ossibus.
Idem lib. 3.
de usu part.
cap. 15.
Vesal. lib. 1.
cap. 32.

ANte tibiæ cum femore articulum os quoddam præponitur orbiculare rotundum.
& breui scuto non ab simile, quod Græcis *μύλη, ὀπμυλῆς & ὀπμωπῆς*. Latinis *mola, patella,*
& *genurotula* vocatur. Hoc posteriore sua sede, qua femur spectat, læui, lubricaque car-
tilagine, magna ex parte obductum visitur, apto tubere sinibusque anteriori interio-
rum femoris capitum sedi affabre congruens. Secundum namque ipsius longitudi-
nem tubere amplo & mediocriter prominenti extuberat, quod patulum femoris ca-
pitum sinum in anteriori illorum sede exsculptum subit. Vtrinque ad tuberis huius la-
tera vnus habetur sinus, prominentis & cartilagine incrustatas femoris capitum sedes
excipiens. Verum ut exterius femoris caput antrorsum magis, quā interius caput por-
rigitur, & ampliori sede læui cartilagine obducitur: ita sane exterior patellæ sinus ad tu-
beris sui externum latus consistens longe amplior, latiorque interiori sinu occurrit.

Patella igitur illa parte, qua femoris os contingit, levis & lubrica cernitur. Ante-
riori autem ipsius, & in lateribus aspera, & cæcis quibusdam foraminulis obsita specta-
tur: quemadmodum etiam in posteriori ipsius sede, vbi infima sui parte tanquam acu-
to quodam processu deorsum ducitur, tibiæque ossis elatiorem partem respicit, aspera
etiam & foraminulis illis ornata est, quo aptius firmitusque tendinibus tibiā exten-
dentibus innascatur. Vniuersa enim patella, tota ipsius amplitudine sedeque, vbi lu-
brica cartilagine non obducitur, tendinibus illis innascitur, nec femori, nec tibiæ aliter
quam tendinum beneficio commissa. Hoc enim priuatim patella sibi vendicat, quod
alteri ossi ligamentorum ope non alligetur, sed tendinibus illis genu articulum tran-
scendentibus innata, ad femoris os validissime constringatur. ¶ Patellæ substantia in
natu grandioribus impense dura & solida est, idque non solum in hominibus, verum
etiam in bobus, ouibus, & ceteris quadrupedibus, quorum etiam genu articulo rerum
opifex patellam præposuit, multo quam in hominibus lōgiorem & angustiorē, quem-
admodum in plerisque auibus latiorē & breuiorem. Data est patella, ut prohibeat, ne
in tibiæ flexu femur ex tibiæ ossis sinibus in anteriora luxetur. Non exiguam quoque
ne cadamus, præsertim quum per decliua loca & gradus descendimus, ac vbi totum
corpus nutat, commoditatem præbet.

Patellæ sub-
stantia.

Patellæ v-
sus.
Gal. lib. 3. de
usu partium
cap. 15.

De pedis ossibus. C A P. XXXVII.

Numerus.

Tali histo-
ria.
Gal. cap. 24.
lib. de ossib.
Vesalius ca.
33. lib. 1.

PES Græcis *πῆξ* dictus, sex donatur ossibus, talo nimirum, calce, nauculari osse, tarso
planta, & digitis, quæ singula ordine describemus, a talo exorsi. ¶ Talus, qui Græ-
cis *ἀστέρας, & ἀσείας*, vulgo *Balista* os vocatur, quod nucis balistæ formam referat, ab imis
tibiæ ossis, & fibulæ appendicibus, magna sui parte, ut dictum supra est, comprehenditur.
Elatior namque tali pars, quæ sursum quoties totus pes terræ innititur, spectat, insigni
admodumque læui prominet tubere, lubrica cartilagine incrustato, ac denique quar-
tæ rotulæ cuiusdam parti non ab simili. Est namque hoc tali tuber rotulæ illius partis
modo orbiculare ac leue, & quatuor lateribus seu costis terminatum. Ac prima qui-
dem & secunda, ad tuberis latera secundum ipsius longitudinem, veluti in orbem
ducuntur, tertia, secundum anteriorem tuberis terminum, quarta vero, secun-
dum posteriorem terminum feruntur. ¶ Quum itaque hoc orbiculare tuber qua-
drangulare quodammodo sit, ob id Galeno, aliisque Græcis *τέτραγων*, Latinis *quatria-*
nuncupatur. Neque vero lateribus duntaxat præsens tuber quartæ illi rotulæ parti
correspon-

Ibid. Tirpa-
c.

- A** correspondet, sed rotulae modo, ad quam funis reflectitur, sinu quodam in ipsius medio donatur, qui laeuitate admodum cælatus, ad latera utrinque magis protuberat, illi sedi exactissime congruens, quam in ima tibiae ossis appendicis sede talo excipiendo paratam diximus. Præsentis tali ad tibiæ nexus ope pedem flectimus, & reflectimus, ac nimis quam obscure in latera ducimus. Ad hæc tali tuber ad latera quibus malleolus contingit, comprimitur, laeuique cartilagine incrustatum cernitur, quamuis non pari modo utrinque. Siquidem in interno latere parua amplitudine & superficietenus tantum comprimitur, quod scilicet inferioris tibiae ossis appendicis processus anteriorem malleolum constituens, & hoc tali latus comprehendens, non admodum amplo spatio laeui cartilagine incrustetur. Externum vero tuberis tali latus ampliter sinuatum, & maiori interuallo cartilagine incrustatum apparet, ut aptam sedem constituat, cui internum exterioris malleoli latus concinne congruat, qui magis deorsum, quam interior malleolus exporrigitur. ¶ Quemadmodum vero internum interioris malleoli latus asperum sinu habet, ex quo ligamentum cartilagineum talum tibiae ossi colligans pronascitur: ita quoque eius ligamenti recipiendi gratia internum tali latus aspero sine insculpitur, perinde ac externum ipsius tali latus similiter cælatur, ut ipsi ligamentum inferatur ab interno exterioris malleoli latere eductum. Huiusmodi quoque ligamentorum ratione posterior tali sedes ad tuberis ipsius, seu quattrionis radicem consistens aspera est, ut inibi ligamenta admitteret a tibia principium ducere, & rursus alia in calcem porrigat. At præter eiusmodi asperitatem posterior quoque tali sedes, sinus ostendit, musculorum tendinibus qui hac pedis inferiora subeunt, vehendis parati. Atque ad hunc modum talus tibia articulatur, & tali quoque superior ac posterior sedes, lateraque ita se habent. Ab interiori vero ipsius tali sede, idque magis ab huius sedis interno latere oblonga producitur ceruix, quæ aliquousque progressa, in caput rotundum, lubricaque cartilagine incrustatum desinit, quod navicularis ossis alto sinui inarticulari inferior tali pars duplici articulo calcis ossi articulatur, illiq; totus insertitur. Ac vnus quidem articulus in posteriori consistit regione, ubi calcis os amplo latoque prominet tubere: amplius profundumque tali sinum ingrediente. *Alter* vero articulus anterior est, ac versus internum pedis latus vergens, secus atq; posterior articulus se habet. Calcis enim os oblongo sinu exsculpitur, qui cartilagine incrustatus humilior tali capitis sedem excipit. ¶ Tali namque caput naviculari ossi articulatum inferiori sua sede qua calci innititur, depresso tubere, dicto iam calcis sinui adamussim adaptatur. In horum articularum medio talus & calx pariter exasperantur, profundosque obtinent sinus, ex quibus cartilaginea pronascuntur ligamenta talum calci validissime cōnectentia. Atq; isti asperi horum ossium sinus ita profunde cælantur, ut in repurgatis ossibus, & deinceps inuicem commissis, magnum inter talum calcemq; inibi pateat interuallum, in uiuentibus prædictis cartilaginosis ligamentis oppletum, quæ adeo pertinaciter talum calci colligant, ut vix tantillum is supra calcem moueatur, ac sua inferiori sede tam sit immobilis, ut superiori, qua tibia articulatur, versatilis volubilisque obseruatur. ¶ *Calcis os*, quod Græci *ῥέγων*, Latini *calcaneum* & *calcem* vocant, omnium pedis ossium facile maximum est, parique cum talo constat substantia. Ea parte qua ingredimur leuiter teres, sed tuta formationis gratia quoque latiusculum existit. Verum interim asperum & inæquale inibi cernitur, idque quorundam musculorum occasione. Primum enim in inferiori ipsius sede transuersim iuxta posteriora prominet, ac asperum educit processum, qui terræ propinquius, quam reliquum calcis corpus, accedit, quo minus musculorum illic ortorum capita inter calcandum cōprimantur. ¶ Superior calcis sedes, quæ a posteriori tali parte, ad posticam vsque ipsius sedem ducitur, teretis corporis speciem refert, priuatim nihil præter exiguam asperitatem monstrans, in quam tibiae ossis & tali ligamenta inseruntur, quæq; a musculorum exortu & insertionem, & articulationem libera est. ¶ Posterior hæc calcis sedes, tibiae ossis rectitudinem admodum excedens, in hoc in posteriora educitur, ut tibia oportune instar perpendicularis lineæ in pedem, tanquam in aliam lineam transuersim ductam fulciri possit, utq; totius corporis robustissimus tendo posteriori calcis parti inferatur. Huic enim depressa & utcumq; asperæ calcis parti tendo implantatur ex primo, secundo, & quarto pedis mouentibus muscularibus conflatus. In quadrupedibus autem, ut canibus, ouibus, & equis, posterior hæc calcis

Tali cum
osse nauic-
ulari arti-
culus.
Cervix tali.
Tali ad cal-
cem cōnect-
ens.

Sinus inter
tali cū cal-
ce commissu-
ras appa-
rens.

Calcis ossis
sedes teretis
aspiciens.
Galen. ibid.
Vesal. ibid.

Superior
calcis sedes
extra tibiae
rectitudinem
retrosum
ducta.

Internum
calcis la-
tus quale.

Externū
latūs.

Anterior
calcis
pars.

Os navi-
culare.
Galibid.
& lib. 3. de
vſu part.
cap. 7.
Veſa. ibid.
Anterior
naucula-
ris offis
ſedes.

Superior.

Inferior.

Quibus
pedis offi-
bus nullū
in manu
reſpōdet.
Taruſ.

Tria tarſi
oſſa inte-
riora.

Quartum
& extremū
oſ.
Κύβη-
τεſſera.

offis ſedes ex abundanti ſinum quendam oblongum ſibi vendicat, quo tuto tendo is ve-
hitur, qui in illis animantibus ſecus ac in homine latum tendinem plantæ cuti ſubnatum
procreat. ¶ Ceterum calcis laterum, quæ ampliter ſunt depreſſa lataque internum la-
tus læue & inſigniter ſinuatum cōſpicitur, vt aptam conſtituat ſedem muſculorum ten-
dinibus hac pedis inferiora petentibus, atq; ad internum hoc calcis lateris tutiſſimo re-
flexis. Hi tendines potiſſimum ad poſteriorem proceſſus calcis ſedem conuoluuntur,
cui natura ſinum inſculpiſit tali caput excipientem, & anteriorem tali cum calce conſti-
tuentem articulum, adeo vt proceſſus in internum pedis lateris protuberans, internum
calcis lateris impenſe ſinuatum efficiat, quemadmodum & protuberans, poſterioris cal-
cis ſedis internum lateris hunc quoq; ſinum ampliter auget. Externum autem eius lateris
non ſinuatur, ſed aſperum & inæquale ac ex carne eſt, ſi modo humiliorem ipſius ſedem
exceperis, quæ muſculum educit paruum digitum a ceteris in externum lateris abducen-
tem. Dein anterior huius lateris ſedes aliqua ex parte læuis, modiceq; admodū in ſuper-
ficie ſinuata cernitur, vt tendinibus ſeptimi & octauī muſculorum pedem mouentium
cedat. Anteriorum eius partium ea, quæ e regione magni digiti habetur, & proceſſus
modo in internum calcis lateris excedit, talo articulatur, vt comprehenſum eſt, nulli in-
terim alteri offi contigua. ¶ Accalcis anterior pars minimo digito ſiru reſpondens, in
anteriori ſua facie læuis eſt, & lubrica cartilagine incruſtatur, depreſſo amploq; promi-
nens capite, quod offis teſſeram imitantis ſinui articulatur, qui ſimiliter lubrica obdu-
ctus cartilagine dūtaxat ſuperficietenus inſculpitur. ¶ *Nauiculare* ſeu *nauiſorme os*, poſte-
riori quidem ſede admodum profundo donatur ſinu, cavitatemque naui ſimilem obti-
net, vnde etiam a cymbæ imagine Græcis *μακροειδής*, Latinis *os cymbam referens*, & vt dictū
eſt, *naiculare* nominatur. Sinus iſte tali caput excipit. Anterior offis cymbam referentis
ſedes lubrica cartilagine incruſtatur, & tres admodum leuiter prominentes common-
ſtrat ſuperficies, tribus tarſi offibus, quæ ipſi articulantur, paratas, adeoque modice pro-
tuberantes, vt num ſinus, num capita ſint pene diiudicare nequeas. Harum ſuperficie-
rū intima & interno pedis lateri proxima, reliquis duab. amplior eſt, & inſignius quam
illæ, ideo prominet, quod tarſi os ipſi coarticulatum maius & amplius ſit, & profundius
quoque ſinuetur, aliis duobus tarſi offibus, quæ reliquis duabus offis nauicularis ſuperfi-
ciebus committuntur. Læues has, adeoque obſcure protuberantes ſuperficies diſſectio-
num periti cubos vocant, quoties tria tarſi oſſa cubis eius offis quod cymbam refert co-
arctari docent. Superioris huius offis ſedes gibba, & quodammodo rotulæ modo orbi-
cularis eſt, & vtrinque aſpera, quo feliciter ligamenta educat id os talo & tarſi offibus con-
nectentia. Inferior pars vtcunque ſima viſitur, vt hac parte cavitatem pedi magnopere
neceſſariam adaugeat. Verum hæc offis pars ſuperiori parte aſterior & inæqualior cer-
nitur, quod hinc validiora, quam ex ſuperiori ligamenta enaſci debuerint. Præterea in-
ferior hæc ſedes iuxta internum ipſius lateris ſinum obtinet ad quem ſexti pedem mo-
uentis muſculi tendo appoſitiſſime reſſectitur. ¶ *Nauiformi* itaque offi, vt neque etiam
calci, neque talo, in manu nullum proportionale os conſiſtit. Quæ vero adhuc in pede
reſcenſenda ſuperſunt, extremæ manus partibus aliqua ex parte correfpondent. ¶ Ce-
terum Græcis *μακρός* dictus, Barbaris autem *Ράφα* pedis, non obſcuram ad brachiale pro-
portionem habet. Ex quatuor enim offibus tarſus conſtat, ex duplicati autem brachia-
le. Ex pluribus namque comprehendi organum componi debuit, ex grandioribus autem
paucioribuſq; gradiendi inſtrumentum. Tarſus itaque non eſt niſi quatuor pedis offium
ſeries, quorum tria nauiculari coarctantur, quartum vero quod teſſeræ aſſimilatur, cal-
ci. Quamuis Græci interim, vti etiam Galenus in libris de adminiſtrandis ſectionibus
facit, frequenter tarſi nomen nō iis ſolum offibus accommodant, verum etiam vniuerſam
pedis ſuperiorem partem eo nomine intelligunt. ¶ Tria igitur tarſi offium interio-
ra planis quodammodo ſuperficiebus nauiculari offi coarctata, proprio carent nomi-
ne. At nonnullis ſimul omnia *χαλκοειδής* vocantur. Quartum autem extrinſecus ſitum, a
cubi ſeu teſſeræ forma: quum quaſi octo habeat latera: *κυβοειδής* appellatum eſt. Atque v-
num ipſius lateris poſterius eſt, quo calci committitur. *Secundum* anterius, quo continua
ſuperficie duobus pedii offibus coarctatur. *Tertium* interius eſt, quo ipſi proximo tarſi
offi coarticulatur. *Quartum* pedis exterius reſpicit lateris, vixque lateris nomen meretur,
quum admodum obſcure planum ſit. *Quintum* ſuperius eſt, nulli etiam nexum offi, ſed
pedis

- A** pedis superiora spectans. *Sextum* terram respicit, nulli similiter ossi commissum, ceterisque lateribus longe inæqualius, & priuatim oblongo sinu donatum, ad quem maxima naturæ solertia septimi pedem mouentis musculi tendo reuoluitur. Quia vero aliquot huius ossis latera obscura & inæqualia sunt, adeoque non ad amissum cesseræ imagini accedit, Arabes ab inæquali effigie, & quadam grandinis imagine, id grandinosum nuncupauerunt. Alii rursus a multiplici forma illi idem nomen cum *Cuneiformi* osse capitis indiderunt, id *πολύμορφον* nominantes. Hoc tarsi os, ut comprehensum est, calci coarticulatur, terræq; innititur. Reliqua vero tria ossa simul cum naviculari sursum a terra subleuantur, ut pedem hac sede cauum, altumq; constituent. ¶ Tarsi ossa, ut & brachialis, figura & quantitate inter se discrepant, nec superiori, nec inferiori parte æqualiter porriguntur. Os enim cubum referens, & primum os interius pedis latus occupans, duobus quæ in medio habentur multo maiora sunt. Atque illorum duorum rursus grandius est quod cubum referenti necitur, quemadmodum & cubum referens intimo osse grandius quoque videtur. Quia etiam os cubum referens posterius, ad calcem scilicet, vergit: intimum vero os antrorsum versus pollicem multo magis quam cetera eminent. ¶ Ex mediis, quod intimo ossi proximum est, breue cernitur, non adeo antrorsum, atque id quod cubum referenti committitur productum. Omnia simul iuncta superiorem eorum superficiem gibbam orbicularemq; efformant, inferiorem vero cauam. Duo media cunei accedunt imagini. Quæ enim pedis superiora spectant, lata orbiculataq; nonnihil sunt, quæ vero plantam constituunt, non secus acuta videntur, quam si cuneorum ritu inter intimum & extimum tarsi ossa iniicerentur. Deinde tarsi os ossi cubo simili coarctatum, priuatim acutius & demissius in pedis inferiora porrigitur, quam secundum tarsi os intimo commissum, quod ipsius huc deducto processui tendo quinti pedis mouentis musculi validissime inferatur. Tarsi ossa, ubi lateribus inuicem committuntur, tota connexus amplitudine læui lubricaque cartilagine non obducuntur, sed duntaxat in posteriori laterum sede ossi cymbam referenti proxima. Quippe in reliqua parte nonnihil mutuo distant, cartilaginorum ligamentorum interuentu inuicem copulata. ¶ Planta, quæ Græcis *πῆλη*, id est, *planum*, Hippocrati a costarum fortassis serie, *πῆλη* appellatur. Latini nonnulli *pedem vestigiumque* vocant. Planta vero quinque ossibus conformatur, quæ postbrachiali respondent, ac pari articuli connexu tarsi ossibus vna serie committuntur. Siquidem pedi ambulandi organo, stabilitatis securitas maxime conuenit, quæ in vno ordine locatis indiget ossibus. ¶ Plantæ quidem ossa tarsi ossibus læuibus & in superficie tantum protuberantibus capitibus coarctantur. Et pedii quidem os pollicis præpositum intimo tarsi committitur ossi, quod indicem suffulcit secundo, quod medium sustinet tertio ossi articulatur. Duo autem reliqua ossa cubum referenti coarctantur. Quemadmodum autem articuli, quo postbrachialis os minimum digitum sustinens brachiali necitur, externo lateri ossiculum quoddam apponitur: ita etiam in pede ossiculum visitur, ad externum latus articuli positum, quo quintum pedii os cubiformi ossi articulatur. Porro ut tarsi ossa non eadem linea anteriore parte finiunt, sic etiam pedii ossium aliud alio magis in posteriora porrigitur. Pedii ossa illic ubi tarso committuntur lateribus sibi proxima crassaque sunt, & aliqua ex parte planis læuibusque superficiebus inuicem coarctantur. Quæ vero a tarso ad digitos abscedunt, tenuiora sunt, atque in illorum medio interualla efformant, quibus musculosa reponitur substantia, cuius auxilio primi digitorum articuli flectuntur. Atque ut pedii ossa illi substantiæ aptiorem sedem porrigant, non adeo acuta tenuiaque superiori parte, atque ea quæ quæ terram spectant, visuntur. Vbi autem digitis articulantur, omni ex parte postbrachialis ossibus respondent, & appendice donata in rotundum desinunt caput, sinum primi digitorum ossis subiens. Pedii os pollicis præpositum ea parte, quæ tarso articulatur, in ipsius inferiori sede terræ contermina processum obrinet, cui septimus pedem mouentium musculus inferitur. Ita quoque pedii os minimum sustinens digitum, quæ tarso articulatur, insignem ostendit processum in externum pedis latus excedentem, in quem octauus pedem mouentis musculi tendo insertionem molitur. ¶ Pedis digiti pedii ossa subsequentes ex tribus ossibus omnes ad eorum, qui in manu sunt, similitudinem exstructis constant, pollice tantum excepto, qui inter alios duplici tantum ossibus, ut anterior pedis concauitatis sedes firmitus terræ innitatur, ad quod et-

Grandi-
nosum.Tarsi os-
sum for-
ma & quæ-
ritas variaPedii hi-
storia.
Planta
quinque
ossibus
constat.Plantæ ad
tarsum ar-
ticulatio.Pedii os-
sum in-
terualla.Ad digi-
tos articu-
latio.Pedis di-
giti.
Gale. cap.
25. libr. de
ossib.

Sesamina
ossa.
Ves. lib. I.
cap. 28.

Magorū
commen-
tum.

Gal. lib. I.
de usu
partium.
cap. 7.
Cui digiti
vnguibus
donati.
Etiā vngu-
ibus pueri
dantur.

Vngues
cur me-
diocriter
duri.
Galenus
ibidem,
cap. II.

Vngues
cur totū
di.

Vngues
quare au-
gentur.

Cartilago
quid.

Cartilagi-
num vius.
Vesalius
lib. I. ca. 2.
Primus.
Alter.
Galenus
lib. I. de
usu part.
cap. 15.

iam plurimum iuuant ossicula sesamini semen referencia, quæ itidem, vt in manu, in pe- A
de quoq; reperiuntur. Vnum quidem, vt plantæ os paruum digitorum sustinens tesseram
imitanti ossi coarctetur. In primis vero pedis digitorum articulis huiusmodi ossicula
difficuler præterquam in pollice obseruantur. In senibus tamen, quod maiuscula sint,
promptius se offerunt. In secundis autem & tertiis articulis rarissime inueniuntur, præter-
quam in secundo pollicis internodio, cui grande satis ossiculum subiicitur. Quanquam
quæ primo pollicis internodio subiiciuntur, multo insigniora ossicula sunt, & horum
internum externo longe grandius est, quod magi & occultæ philosophiæ sectatores
nulli corruptioni obnoxium esse affirmant, & tantisper in terra asseruandum nuga-
tur, cum id resurrectionis tempore instar seminis hominem producat. Est sane vtrunq;
os, sed potissimum, exterius mundato cicero perquam simile, si modo ad mediam cice- B
ris partem referas: aut si vtrunque os iunxeris integrum cicero effeceris, quantum scili-
cet ad imaginem pertinet. Deinde in grandioribus hominibus internum id ossiculum
etiam tantum est, vt tessera ex ipso promte paretur.

De Vnguibus. C A P. XXXVIII.

MAnuum pedumque digiti vnguibus ideo a Deo rerum omnium opifice decoran-
tur, vt ipsis firmamenti vice apponerentur. Digiti enim suis ipsorum solis partibus
carneis mollia corpora apprehendunt: dura vero, & propter hoc carnis naturam pel-
lencia, violenter a se cognita, sine vnguium adminiculo apprehendere digiti nequeunt.
Ipsorum enim caro reflexa subuersaque firmamento eget. Præterea si vngues summita- C
tibus digitorum, vt testatur etiam Hippocrates lib. I. 25. interpretor, id est, de Medici officio, aphorif-
mo 20. neq; longiores fuerint, neque breuiore, commoderatam magnitudinem habe-
bunt, ideoque ea, quorum gratia facti sunt, tunc maxime præstant. Siquidem multa alia
ad res agendas commoda ex iis homini accedunt, veluti si radere quid, aut scalpere, aut
excoriare, aut euellere oporteat. Nam in tota prope vita; omnibusque artibus, & iis po-
tissimum, in quibus sunt exquisitæ manuum operationes, quæ Græcis χειρουργία appellan-
tur, iis nobis opus est. ¶ Porro vnguium duritiem natura effinxit mediocrem. Si enim
duriore, quam nunc sunt, instar ossium facti fuissent, ita quidem ad apprehendendum
minus essent idonei, vt qui ne minimū quidem flecti possent, rumperentur enim prom-
tissime, sicut & alia dura vniuersa. Eorum igitur securitati ac robori natura providens, D
illos mediocriter duos effecit, vt neque vsui, cuius gratia facti sunt, quicquam incom-
modaret, neq; ipsi, quum eorum, quæ extrinsecus incidunt, vim exsoluunt obtundunt-
que, promte patiantur. ¶ Rotundi vero sunt, & gibba superficie constant, quod sola hæc
figurarum ad vix patiendum comparata sit, vt quæ nullum expositum angulum frangi
potentem obtineat. ¶ Verum quoniam scalpendo, vel aliud quid vnguibus agendo, ex-
teri debebant nobis eorum extremitates, solas has animalis particulas semper augeri
potentes natura construxit, quamuis iam totum corpus augeri desierit. Augentur au-
tem non vt aliæ partes in longum & latum, & profundum, sed pilorum ritu in longum
solum, subnascantibus aliis semper vnguibus nouis, & veteres propellentibus. Neque
hoc otiose natura instituit, sed vt in locum eius, quod assidue in ipsorum extremitate ex-
teritur, sit aliquid, quod sufficiatur. Sic igitur ad summam naturæ prouidentiam perue- E
nit vnguium constructio.

De Cartilaginibus. C A P. XXXIX.

Cartilago, quæ Græcis χόνδρον nominatur, particula est similis, aliarum omnium
durissima, solo autem osse mollior; alba, læuis, molliter flexilis, nullis foraminibus
cauernulisque ossium modo intus oppleta, & sensus ac medullæ expers. Huius vsus per-
quam varius est. ¶ Primum namque idem præstat, quod ossa, quum velut fulcrum quod-
dam sit, cui proximæ partes adnascantur, & adstabiliuntur. Pari modo multæ cartilagi-
num ossium vicem subeunt, vbi nullo osse locato in eas mûsculi suam insertionem ten-
rant. ¶ Alter cartilagini vsus in articulis est, vt hæc ossibus occasionem præbeat, quo
minus in continuis, frequentibusque motibus attritu vitentur. Ossium namq; commis- F
suræ motus gratia exstructæ, propter ossium siccitatem ex mutuo contractu, leui opera
rumperentur, nisi vtræq; commissuræ ossa tota sede, qua se inuicem contingunt, articu-
lumque formant, cartilagine quadam veluti crusta seorsim obducerentur, & hæc suo in-
duritie, mollitieque temperamento ossium impetui resisteret, & vna incidentis vim ce-
dendo.

Adendo leuiter exsolueret, ac suo lauore ac planitie efficeret, vt promtissime ossis caput in suo voluatur sinu, nullaq; asperitas motus promtitudinem impediatur, accedente huc viscido lubricoq; humore, & veluti vnctione quadam quo rotulas, vt ad reflectendum fiant aptiores, oblinimus. ¶ *Tertius* vsus est, vt in plerisque ossium commissuris non ad motum institutis, cartilago quasi glutinis vice interueniat, vt in pubis ossium commissura fit. ¶ Præterea rerum Opifex nudas & prominentes corporis particulas, & ossium fines alteri ossi non commissos cartilagine adauxit, vt tali constarent substantia, qualis neque frangi propter mollitiem, neque rumpi propter siccitatem queat. Variæ autem sunt cartilaginum differentia pro partium ad quas pertinent ratione, quas singulas, quemadmodum in ossibus hæcenus fecimus, ordine describemus.

E De palpebrarum Cartilaginibus. CAP. XL.

Palpebris, quæ Græcis βλέφαρα, τὸ ὁράει, καὶ ἰμάτιον εἶναι βλέπει, id est, quod oculi sint indumentum, dicuntur, vtrisque tam inferiori nimirum, quam superiori, vna adnata est cartilago, vtcunque mollis & longa, inq; palpebrarum extremo, qua illæ inuicem conuiuent, locata, & inter cutem & membranulam palpebras intus succingentem reposita. Huic cartilagini palpebrarum pili, qui Græcis βλέφαρῶδες, Latinis *Cilia* nominantur, inserti sunt, in illaq; tanquam in durius quoddam solum inserti eriguntur. Nam hæ cartilagine quæ ab illa pilorum serie, remorumq; in lōgis nauibus, seu vt vocant galeris, similitudine, τριῶν nominantur, ideo potissimum creantur, vt pilosillos erectos, neque ceterorum pilorum modo flaccidos dependentesque contineant. Deinde vt musculorum palpebras mouentium insertioni inseruiant.

De auri cartilagine. CAP. XLI.

Auris cartilago, quæ auris formam refert, in hoc formatur, vt cute vestita auris corpus instar vanni constituat, deniq; commode sustineat, ac erectum seruet. Est autem hæc cartilago mollis & tenuis, tanto semper a capitis osse versus auris extrema mollior euadens, quanto auris orbiculo propius accedit, & quo minus sustinere aliquid debet. Ac proinde etiam in auris pinnula seu fibra huius cartilaginis nulla exporrigitur portio, quod scilicet hanc propendentem, neque erigi, neque suffulciri oporteat. ¶ Porro ad temporis os hæc cartilago durior sentitur, & vt firmiori radice hæreat, crassior. Enascitur enim ex orbiculo foraminis auditus meatui in temporis ossis celati, cuius circumferentia ideo exasperatur, vt promtius auris cartilaginem educat. Non temere autem natura ex huiusmodi cartilagine aurem constituit. Nam quum mollis sit mediocriter, facile occurfantium impetui cedit, eorumque violentiam exsoluit. Si vero dura omnino esset, æque ac ossa, vel mollis instar carnis, duorum sane alterum necessario fieret, aut enim frangeretur, ac omnino rumperetur, aut omnino contunderetur.

De nasi cartilaginibus. CAP. XLII.

Ab inferiori nasi ossium sede, qua hæc aspera & latiora, quam superiori parte sunt, duæ enascuntur cartilagine, quæ deorsum in anteriora exporrectæ, inuicemque coniunctæ sensim molliores euadunt, ac in nasi extremo veluti in cartilagineum ligamentum degenerantes, totam anteriorem nasi regionem cōstituunt, quæ a nasi ossium inferiori sede ad nasi terminum apicemque pertinet. Ab osseo autem septo narium foramina dirimente, alia enascitur cartilago, mollis quoque, ac ligamenti naturæ compos, quæ a tota anteriori septi illius sede antrorsum procedens, internæ duarum primarum cartilaginum regioni, per ipsarum longitudinem adnascitur. ¶ Hæc pari ratione in ea nasi parte, quæ veluti ex faciei planitie porrigitur, nasi foramina interdiuidit, quæ admodum ossium illud septum ipsa foramina inibi disiungit, qua super palati regionem a naso ad fauces vsque ducuntur. His tribus nasi cartilaginibus aliæ duæ, vtrinque nimirum singulæ accedunt, quæ magis adhuc aliis cartilaginibus ligamentorum naturæ participant, & orbiculatim singulæ vnum nasi foramen constituunt. ¶ Cartilagine hæc internis suis lateribus inuicem colligantur, & aliarum nasi cartilaginum extrema integunt, solæque motu donantur voluntario, cuius ope sursum deorsumq; & inrorsum extrorsumque velluntur, propriis in hoc donatæ musculis. Harum cartilaginum latiores mollioresq; partes in nasi lateribus consistunt, ac nasi ala pinnulane, Græcis πτερυγα nominantur: quod quasi alarum modo nares occludant, referentque, ita homini inter respirandum insignem vsu præbent.

Galenus
lib. 7. de
usu part.
cap. 11.
Prima gut-
turis car-
tilago
Euphrasii
Vesal. libr.
I. cap. 38.

Secunda
laryngis
cartilago
Gal. ibid.
Vesal. loco
citato.

Innomi-
nata.

Tertia la-
ryngis
cartilago.
Gal. ibid.
Vesal. loco
citato.

Gal. ibid.
cap. 16.

Epiglot-
tis.

CAput asperæ arteriæ, quod Græcis *ἀσπυγξ*, Latinis *guttur* dicitur, ex tribus magnis cō-
stat cartilaginibus: quarum prima anterior maximaque & amplissima est, toris qui-
dem gibba, intus autem caua, scuto quodammodo similis, non rotundo vndiq; sed præ-
longo, quod scilicet proprie *scutum* appellatur, qualique veteres in præliis vsos, & Tur-
carum aliquot adhuc, in nauibus præsertim, vti cernimus. Vnde hanc cartilaginem dis-
sectionum periti *θυρεοειδής*, id est, *scuti formem*, seu *scuto similem*, vocarunt. Quippe *θυρεός*, Græ-
cis *scutum* dicitur. Vulgus autem Medicorum *scutalem*, & *peltalem* nominat. ¶ Cartilago
hæc in homine superiori sede amplior, quam inferiori conspicitur, secus multo quam
in bobus & porcis, quibus inferiori sede latior, superiori autem multo strictior est, mi-
nusque in acutum, quam hominis larynx antrorsum expōrrigitur. Quod tamē ad ima-
ginis speciem spectat, hominis cartilago superiori & inferiori sede sibi responder. Su-
pra enim infraque ex suis lateribus binos educit processus, vtrinque singulos. Ac ho-
rum quidem duo superiores procerius inferioribus educti, membranis vinculis ossis
hyoidis humilioribus lateribus alligantur. Inferiores autem lateribus secundæ cartila-
ginis versus posteriorem ipsius sedem vniuntur. Tam viris denique, quam mulieribus
antrorsum magis prominet, tactuique magis exponitur, & subinde gemina, idque po-
tissimum in viris obseruatur. In ipsius enim medio, vbi cartilago homini breuissima est,
maximeque antrorsum extuberat, secundum suam longitudinem crebro linea duci-
tur, quæ ad amussimam membranulis emundata, duas cartilaginis partes mutuo com-
missas etiam ante sectionem fuisse arguit. Boum autem cartilago plurimum ab hominis
cartilagine variat, ac propugnaculi, quod bombardarum ictibus retorquendis compa-
ratum est, formæ accedit. ¶ *Secunda* cartilago minor est prima, & maior tertia, maxima-
que sui parte in posterioribus laryngis sedibus reponitur, qua stomachus gulaue deor-
sum a faucibus fertur. Porro quantum scutiformis cartilago a perfecti circuli figura de-
ficit, hoc ipsa adiicit, & superiori posteriorique eius parte supplet. Ima enim ipsius parte
perfectū conficit circulum, cuius anteriorem partem sub scutiformis radice, tactu in an-
teriore laryngis sede percipimus. Interna eius amplitudo læuis est, posterior autem
ipsius sedes stomachum spectans, longa extuberat linea, secundum cartilaginis longi-
tudinem, quasi spinæ modo exporrecta. Superior huius cartilaginis sedes, qua postero-
rem laryngis regionem efformat, in duo desinit tubercula oblonga, vtrinque singula, quæ
tertiæ cartilaginis sinibus inarticulantur. Inferior vero eius cartilaginis pars, vbi laryn-
gis posteriora constituit, non nihil tenuis visitur, deorsum magis quam reliqua ipsius in-
ferioris partis sedes porrecta. Huic cartilagini nullum nomen est inditum, id circo pe-
culiari nomine Innominata vocari potest. Si quis tamen sedulo eius effigiem inspe-
xit, atque cuius rei formæ illam conferre, tandemque huic ipsi appellationem indere vo-
luerit, haud aliud ei magis conforme inueniet, illo Turcarum annulo, quem sagittantes
dextro pollici imponunt, ut eius annuli ope arcus neruum robustius trahant. ¶ *Tertia*
cartilago Græcis *ἀσπυγξ* dicitur, quod quum integra est, & membrana, tunicaue a-
speram arteriam intus succingente adhuc obducitur, illi ollarum parti, qua aquam ma-
nus lauaturis affundimus, similima sit, quam *ἀσπυγξ*, id est, *gutturium*, appellant. Hæc
cartilago membranis suis liberata gemina esse videtur, duabusque constituitur cartila-
ginibus, quarum vna dextro secundæ cartilaginis lateri, altera vero sinistro innititur, si-
num læuem, & alte satis cælatum obtinens, quo secundæ cartilaginis tuberculum exci-
pit. Vtriusque cartilaginis basis ampla est, & anteriori sede in longum processum finit,
in interiora laryngis exporrectum. Superiores vero harum partes lenim a basi inuicem
dehiscences, ac dein molliores tenuioresque & adiposæ redditæ, mutuo vniuntur, & dex-
træ cartilaginis superior pars sinistræ cartilaginis parti coniuncta, eam laryngis sedem
construit, quæ illi vasorum parti congruit, qua aquam manibus affundi paulo ante com-
memorauimus. Atque hæc laryngis sedes adeo mollis flexilisque est, ut vomentibus in
internam laryngis amplitudinem antrorsum reclinetur, asperamque arteriam ita ex-
quisite integat, ut ne minimum quidem ex vomitu arteriæ ipsi illabatur. ¶ His tribus
igitur laryngis cartilaginibus alia quædam mollis, & substantia tertiæ cartilaginis supe-
riori parti prorsus similis accedit, quæ laryngis perelegās efficitur operculum, accurate
prohibens, ne quid cibi aut potus in laryngem defluat. Hoc quidem Græcis *ἐπιγλωττις*
non

- A** non alia de causa nominatur, quam quod *laryngis rima*, quæ Græcis *γλωττις*, Latinis *lingua* *Γλωττις*.
dicitur, incumbat. Enascitur autem hoc laryngis operculum ampla, & antrosum cur- *Vesalius*.
uata basi ab interiori scutiformis regione iuxta partem ipsius elatiorem. Hinc intror-
sum procedens, trianguli imaginē exprimit, cuius basim operculi a scutiformi cartila-
gine exort⁹ aut ipsius cū ea cartilagine cōnexus efformat. Trianguli vero vertex ea pars
est, q̄ introrsum veluti ad stomachi regionē pducitur. Corpus hoc, qua palatū respicit,
gibbū est ac mollius: qua vero laryngi innitit, cauū, sinumq; ac multo q̄ superiori parte
durius. In extremo autē ipsius, quo stomachū spectat, insigniter molle est, pinguiq; ob-
ductum membrana ligamenti quodammodo naturam refert. Qua vero scutiformi cō-
mittitur cartilagini, etiam multa abundat adipe, neq; inibi adeo durum atq; in sui me-
B dio cernitur. ¶ Proinde *ἐπιγλωττις* non est Galeno, & aliis Græcis, nisi *laryngis operculum*
lingula impositum, ne quid inter edendum & bibendum in eam decidat prohibens. Lin-
gula vero, quam iidem *γλωττιδα* vocant, laryngis rima est, quam duo tertiæ cartilaginis *Lingula*.
processus in media laryngis amplitudine pingui membrana obducti constituunt. Sic
vero dicta est ab ea lingularum similitudine, quæ ex arundinum laminis inuicem com-
pactis ribis accommodatur. Atq; hæc sane primum ac maxime proprium vocis instru-
mentum, *Galeno etiam teste*, existit, nequaquam vero epiglottis, ut plerique Medicorum
falso existimant. Qui sane error aliunde natus non est, quam quod non sine maxima
inscitia nota *γλωττιδα* & *ἐπιγλωττιδα* confuderint; quum tamen hæc duo vocabula Galeno
& aliis veteribus anatomes professoribus diuersas corporis partes significent, ut iam o-
C stensum est, nempe *ἐπιγλωττις* operculū laryngis, *γλωττις* autem eiusdē rimam. ¶ Atq; hoc
loco Celsi auctoritatē plane contemnere oportet, qui illud laryngis operculum *lingulam*
appellauit nulla alia de causa, quam quod humanæ linguæ imagini satis accedat, quum
tamen cōstet veteres non ad humanam, sed fistularem magis linguam in eius partis ho-
menclatura respexisse. Atq; hunc quidem errorem non solum Latini Galeni interpre-
tes secuti sunt, sed & Græci codices, librorum vitio deprauati, creberrime *ἐπιγλωττις*
pro *γλωττις* legunt, ut *plenius nostris in Commentariis libr. 1. de laborantibus locis demonstrauimus*.
Quinetiam Celsi errore, doctissimus etiā vir Theodorus Gaza delusus est, eo q̄ in Arist.
ἐπιγλωττιδα lingulam est interpretatus. Porro reliquæ asperæ arteriæ cartilagine C nostri
formam exprimūt, ut suo loco *fusus dicemus*. De cartilaginibus costarum, & aliarū quarū-
D dam partium antea est abunde dictum, ut non sit necesse hic denuo de illis verba facere.

DE LIGAMENTIS ET MUSCULIS VOLUNTARII MOTVS INSTRUMENTIS, LIB. II.

Quid ligamentum, & quis eius usus, ac differentia. CAP. I.

- P** R I O R E libro vniuersam ossium & cartilaginum humani corporis stru-
cturam explicauimus. Præsens ligamentā, quibus ossium articuli cōtinen-
tur ac constringūtur, & ea mouētes musculos enartabit. Ligamentū itaq;
& Græcis *σύνδεσμος* dicitur, nonnullis Latinorū *vinculum* corpus est simila-
re ex osse, aut cartilagine, aut quauis duriore membrana principium ducens sensus ex-
E pers, durum, sed tñ cartilagine mollius, album & ex sanguine, cavitatisq; expers. ¶ Varios
autem in colligando, continendo, obtegendo, & musculis constituendis homini vsus
præbet. Nisi n. ossium & cartilaginum articuli ligamētis tenerentur, nihil sane prohibe-
ret ossa, aut cartilagine in quolibet motu luxari, & a sua naturali sede dimoueri, modo
huc, modo illuc a sua naturali situ deflectentia. Quod ne accideret, natura omnium ossium
cartilaginumq; articulationem in orbē ligamētis circūdedit validis quidem, sed q̄ laxari
possent, non in minimū quoq; extendi. ¶ Et sane admirabitur hic quispiam Summi Opifi-
cis industriam, q̄ corporis substantias ad vsus multum discrepantes inuenerit idoneas.
Vt n. ossa simul ad amissim, tutaq; colligatētur, & articulata cōtinerentur, neq; facile in
vehementiorib. motibus a se abrumperentur, ligamentum q̄ maxime potuit durū, atq;
ab iniuriis remotissimū efficere oportuit. Vt aut ossibus cartilaginibusq; a musculis tra-
F ctis promte obsequerent, molle rursus esse oportuit, atq; ob id ipsū imbecillū. Atqui for-
te contrariū est valido, & duro imbecillū ac molle. Quanam igit fuerit Opificis rerū so-
lertia, q̄ corp⁹ quoddā fabrefecit, q̄ cōmoditatē vtrinq; q̄ satis esset, haberet, idemq; ab
iniuriis tutū esset, ex ipsa anatome discas licet. Inuenies n. ligamentū omne durū, adeo
ut valide simul colliger, neq; motū, quantū suo articulo ex vsu est, impediat, neq; facile

Quid li-
gamentū:
Gale. lib. 1.
de vsu
pār. ca. 17.
E. lib. 6.
the. meth.
cap. 4.
Vtus liga-
menti.
Id. lib. 1. de
adm. ana.

Ligamen-
torū sub-
stantia.

Gal. lib. 1. ana. adm. Vef. lib. 1. cap. 1. *Εννεμηρια*. Annularia. **A**brumpatur, molle vero eoque quoad non frangatur. Atq; hic præcipuus primariusque ligamenti vsus est, a quo etiam nomen mutuatur. Alter ligamenti vsus est, vt tendines suis quibus vehuntur, sinibus contineat, ne ex ipsis declinent, aut ab illis eleuentur. Huius autem generis ligamenta, quia transuersim tendinibus obducuntur, vel potius orbiculatim annuli instar amplexantur, Græcis *εννεμηρια* fuere nuncupata, Latinis autem *transuersa* & *annularia* appellari commodè possunt. ¶ Hæc quoq; ligamenta non solum tendinibus extrinsecus obducuntur, verum etiam velut stratum ipsis fiunt. Quippe ossis duritiem correctura inter os & tendines sese insinuant, vndique in orbem tendines, citra omnem prorsus connexum, amplexantia, & vt annulus habenam transmittentia. *Tertius* ligamentorum vsus est, quod illa instar indumenti & propugnaculi corporibus quibusdam, nempe tendinibus secundum ipsorum longitudinem, obducuntur. *Quartus* vsus ligamentorum est, quo septi aut interstitii alicuius vice illa musculos intercedunt, & iisdem durum ossis modo renixum præbent. *Quintus* est, quo musculorum constitutionem subeunt, eisque non infimam substantiam suppetunt, vt sequenti ostendetur capite. ¶ Ceterum ligamentorum differentia sumuntur ab vsu, qui omnium non est idem. Etiam in ortu variant, quod alia e solis cartilaginibus principium ducant, vt laryngis ligamenta: alia a solis ossibus vt genu, cubiti, humeri, & reliqua fere corporis ligamenta. Alia vero & cartilagini & ossi communia sunt, vt quæ pectoris os illi insinuat cartilaginib. adnectunt. ¶ A partibus, quas connectunt, sumuntur differentia, quod quædam solas necant cartilagines, vt *laryngis*, & *nasi*, quædam ossa duntaxat, vt *humeri*, *coxendicis*, *genu*, & *reliquorum fere articulorum*. Quædam cartilaginem ossi committunt, vt costarum cartilagines pectoris ossi necantia. Alia aliam partem quampiam ossi aut cartilagini committunt, vt corporis membranæ ad vnam fere omnes, atq; hæc semper duabus sunt partibus communia. Alia vni duntaxat ossi priuata censentur, vt sex cubiti exteriorum ligamentorum, quæ transuersim ducuntur quinque. Primum enim quod vlnæ radioque commune est, non ad vnicum tantum os refertur. ¶ Substantia denique alia constant molliori, magisque membranea, vt omnia fere quæ in orbem articulos ambiunt, alia vero dura sunt, mediamque inter ligamenta, quæ articulos ambiunt, & cartilagines naturam sortiuntur, vnde etiam Græci hæc *μεσημερηια* dicunt, quasi *cartilaginea ligamenta* dicas, appellant, vt sunt generatim omnia, quæ inter ossa latent. ¶ A situ quoque sumitur differentia. Alia enim extrinsecus ossibus obducuntur, vt molliora illa: alia autem inter ipsa ossa vbi se inuicem respiciunt & contingunt, sita sunt, vt cartilaginea propemodum vniuersa. ¶ A forma quoque differentiam mutantur. Sunt enim quædam prorsus lata, membranea, & tenuia, vt illud, quod secundum cubiti longitudinem inter vnam radiumque conspiciamus, & alia quædam: alia vero crassa sunt, & ex iis quædam teretia, vt ligamentum ex dente secundæ vertebræ in occipitis os procedens. Alia ampla, lataq; sunt, vt tertium peculiare humeri articuli ligamentorum. Rursus quædam continua, & nullo foramine peruia cernuntur, quorum magna est in corpore multitudo, quædam aut aliquid transmissura perforantur, vt ligamenta annuli modo ligamenta transmittentia. ¶ Commune autem omnibus ligamentis est, quod nullo, aut saltem obtuso sensu prædita sunt, ne propter crebrum frequentemque motum, & continuum affectum dolore vexentur. Eadem fere ratione, quum scilicet natura sicca sunt, ne ocysus exsiccetur, ligamenta quæ articulis sunt peculiaris, mucoso quodam lentoque humore, vt etiam articulorum cartilagines oblinuntur.

Quid musculus, vnde dictus, de eius partibus. C A P. II.

Musculus qui Græcis *μῦς* dicitur, pars corporis est instrumentalis, voluntarii motus instrumentum ex ligamento in fibras plures diuiso, & carne has continente formanteg. fabricatum, nervorum, venarum, & articularum in se surculos recipiens. Ligamenta, ad robur, nervos, vt animalium spiritum non secus quam ad sensuum organa continue deferat, venas, vt nutriatur, arterias autem, vt calor ipsius natiuus recreetur, ad eumq; vita deferatur. ¶ Non temere autem natura musculos ex ligamentis, & nervis creauit. Quippe per solos nervos nulla particula mouetur, neque per ligamenta. Nervus enim sensitivus quidem est, quatenus mollis: inualidior autem, quam vt moueret, & transferret totum membrum. Ligamentum vero ruto quidem colligare, & interim membrorum motibus non obstare poterat, ipsum tamen motus voluntarii organum per se nequit produci, quum originem

- A** riginem ex osse aut cartilagine, non autem nerui modo, ex voluntarii motus fonte, obtineat. Nemo enim ambigit huiusmodi principii corpus molle oportuisse fieri, quandoquidem neque ex molli perfecte durum, neque ex duro molle quicquam enasci possit. Ea igitur de causa natura neque solis ligamenti uti ad motus voluntarios potuit, quoniam neque sensu, neque motu prædita sunt, ut quæ animæ principatus sedes non continentur. Neque nervis etiam solis, quum ii propter mollitiem tenuitatemque transferre tam magna pondera minime valerent. ¶ Permixtum itaque ex ambobus oportuit aliud quod creari motus instrumentum, quod omnino nervo esset durius, & ligamento mollius, & ideo quoque participare sensu, minus quidem quam nervus, magis autem quam ligamentum. Insuper decuit & id quoque in medio roboris & imbecillitatis, aliorumque;
- B** contrariorum, quæ ligamenti & nervi insunt, existere. Atque hac occasione motus instrumentum, utrisque ipsum componentibus substantiis communicat, non tamen exacte alteram, neque solam, neque eam impermixtam obtinet, sed ex ambabus commiscetur. Verum quum nihil alicui per totum confundi potest, non conflatum prius in minimas particulas, necessarium fuit utrunque, nervum scilicet & ligamentum, in fibras quoddam exiles discindi, deinde sibi inuicem eas copulari ad voluntarii motus instrumenti generationem. Perficitur autem nervi ac ligamenti in fibras distributio in hunc modum. Nervus accedit ligamento, ac simul commista in fibras duas quodammodo digeruntur, illæ rursus singulæ in alias, & hæ iterum in plures tantisper diuiduntur, donec tenuissimas membranasque fibras procedant. Postquam hæ ad extremum diffusionis pervenerunt, rursus ut diuise fuerunt, mutuo concursu coalescentes, & commiste in unum colliguntur. ¶ Ceterum musculus tribus partibus constant, *principio, medio, & fine*. Principium quidem, quod caput musculi vocant, prima diuisio constituit. Id enim est, quod nervum maxima ex parte recipit, vel in quod inseritur nervus. Neque temere adiectum est, maxima ex parte. Non enim omnes musculi nervi insertionem, etiam si quando in ipsorum substantiam nervus porrigitur, in capitis exortu adipiscuntur. Sed subinde multo inferius, quam caput habetur, & in medio sui quodammodo ductus & longitudinis, ut in progressu historiæ musculorum abunde patebit. Medium vero carnosius, in quo diuisionis series consistit, hoc est, ubi nervus & ligamentum multiplici diuisione sic confusa sunt, ut vix discernantur, ventrem vocant. Qua vero parte se tandem colligunt, atque in unum refluunt
- D** nervorum ac ligamentorum exiles, fibræ, finis, cauda, & extremum dicitur, Græci ἀπορροή, id est, *eneruationem* appellant. Alio nomine iisdem τένων, Latinis *tendo* nominatur. Mutuari autem sunt hæc nomina a mure & lacerta, quibus pellem & pedem demeris. Quippe musculi caput muris lacertæque capiti contulerunt, ventrem autem, hoc est, crassam & carnosam partem, ventri, & tendinem, id est, partem carne destitutam, caudæ. ¶ Ceterum tendines & eneruationes, seu nerveæ tenuitates illæ quas caro destituit, non in omnibus musculis reperiuntur, sed in illis tantum habentur, qui longo ductu feruntur. Hi enim modo interetendinem, modo latum, & veluti membraneum, modo breviorum, modo longiorum desinunt. Breves autem tendine carent, & vndique carnosii sunt.

Musculū
inter liga-
mentum
& nervū
natura
medium.Ligamen-
ti & nervi
permix-
tio.
Galenus
ibidem.Musculo-
rum par-
tes tres
Caput.

Venter.

Finis.

ἀπορροή
τένων.Tendines
quando
musculis
dentur.**E** De musculorum differentiis. CAP. III.

- D**ifferentiæ musculorum primo a substantia eorundem petuntur, quæ sane ex venis, Arteriis, nervisque in primis pendent. Nullum enim in corpore musculum reperiens, qui non aliqua ligamenti portione in fibras, desecta & carne illas continente firmanteque constituatur. Verum præter hæc alii nervum, arteriam, & venam in suum corpus quoque diffundi sinunt. In alios nervus nullus, neque vena, neque arteria inseritur. Qui vero solam nanciscitur arteriam, nullus occurrit. ¶ Ceterum adeps, qui interdum musculorum fibris per carnem digeritur, in macilentis non reperitur. In ortu magis adhuc musculi variant. Nam non omnes ab ossibus suum principium mutantur, vero alii ab osse ipsorum ligamenti originem sumunt. Alii a cartilagine ipsorum ortum obtinent. Alii a membrana quapiam enascuntur. Alii a membrana tendines obvolvente prodeunt. Alii ab alio quovis ligamento originem ducunt. Alii veluti ex altero musculo prodeunt. Alii rursus ex nullo principium ducunt, verum membraneæ partes aliqua sui sede carneæ, ac musculosæ, seu musculi fiunt. Ceterum non omnes musculi ab una dentaxat parte originem sumunt, per multi enim ex pluribus ossibus nascuntur. Alii ab eiusdem pluribus processibus oriuntur. ¶ Ab in-

Vesalius
lib. 2 ca 3.
A substan-
tia.

Ab ortu.

A forma. A forami-
 nibus. A magni-
 tudine. A colore. A situ. A fibris. A muscu-
 lorum ca-
 pitibus. A ventri-
 bus. Impres-
 siones musculo-
 rum. A tendi-
 nibus. Ab offi-
 cio.

A foramine item petuntur differentiarum. *Alii* enim in os inferuntur. *Alii* in cartilaginem. *Alii* A
 in cutem. *Alii* in aliud in quoduis. Præterea quidam a pluribus partibus enati in vnicam
 inferuntur. *Quidam* vero ex vno offe exorti in plura inferuntur. *Quidam* etiam a pluri-
 bus enati ossibus in plura quoque inferuntur. ¶ Forma quoque omnium musculorum
 haud eadem est. *Quidam* enim sunt, quos muri aut lacertæ apposite conferre liceat. Nō-
 nulli sunt, qui illorum animalium effigiem nulla ex parte referant. Sunt enim *alii* figura
 triangulari. *Alii* quatuor constant angulis. *Quidam* etiam quinque angulos exprimunt.
 Sunt qui pyramidem & turbinem referunt. Annulis alii respondent, & orbiculares sunt.
Alii latum obtinent principium, & sensim coarctati in acutum feruntur. *Alii* ortum in-
 fertioni æqualem nanciscuntur. *Quidam* longi & graciles sunt. *Alii* breues & ampli. B
Quidam instar simplicis lineæ principium obtinent. *Alii* rursus non simplicis lineæ mo-
 do, sed latæ superficiei ritu nascuntur. ¶ Porro ad formam quoque foramina spectare
 videntur, quæ quibusdam musculis insunt. *Alii* foramine nullo sunt peruii. ¶ In magni-
 tudine quoque musculi variant, quod alii maxima constant mole, alii magni sunt, alii
 minimi. ¶ Omnibus musculis fere communis obigit color, vbi enim carne vacat, ner-
 uosorum corporum modo albet, quod in principiis & enervationibus præcipue acci-
 dit, vbi autem carne abundant, carnis quoque modo rubent, cui fibræ nerueæ permif-
 centur. Porro ea parte qua rubent, interdum candorem vna obtinent, quod illis muscu-
 lis vsu venit, qui tendinem prius, quam caro definat, in sui etiam ventris medio educere
 videntur. *Alii* musculi aliqua sui parte prorsus liuidi plumbeiue conspiciuntur. Li-
 uor autem iste musculis accidit, peculiaris ipforum membranæ gratia, quæ interdum adeo C
 crassa est, vt prorsus non videatur pellucida, vnde quum crassa neruea sit, & caro sub-
 tus rubeat, aut nigricet potius: facile color ex nigro & albo permixtus consurgit. ¶ Par-
 etiā situs omnibus musculis non contrigit, quoniam alii ad corporis habentur superficiem,
 cutique accumbunt. *Alii* penitus reconditi delitescent. *Alii* rursus secundum membri
 longitudinem locantur. ¶ A fibrarum ductu etiam petuntur differentiarum, quum aliæ de-
 orsum in priora feruntur, aliæ sursum oblique in priora, aliæ rectæ, aliæ orbiculatim trās-
 uersimque. Præterea fibræ non in omnibus musculi partibus æque collectæ, & tenues sunt.
Alii enim tenuissimæ sunt. *Alii* in principio & origine plures, & magis diffusæ, laxio-
 resque obtingunt fibræ, quam in fine. *Alii* in ortu magis constringuntur, quam in ipsa
 insertionem. *Alii* propemodum æqualis vndeunque fibrarum est ratio. ¶ In musculorum D
 capitibus exortibusque quæ plures consurgunt differentiarum, quarum prima a forma crassitieque
 musculorum desumitur. Altera a substantia, quæ alii penitus carnei in exortu appareant, fibris
 duntaxat raris & incompactis interstincti. *Alii* nerui in ortu conspiciuntur, & rursus in
 ipsius ossis contactu carnei euadunt. *Quidam* longo ductu nerui permanent. *Alii* vni-
 co quidem capite oriuntur. *Alia* namque principii pars aliquo vsque neruea apparet,
 alia prorsus carnea. *Alii* duo habent capita, vnum nerueum, alterum vero carneum. A
 ventribus ita sumuntur differentiarum, quod quibusdam musculis in ipso exortu ventres
 habentur. *Alii* ad finem, ac ad insertionem magis, quam ad caput. *Alii* venter longius
 ab ortu conspicitur. *Alii* per vniuersum musculi corpus permanet. *Alii* venter ad
 ipsam vsque insertionem seruant. *Aliorum* ventres longe admodum ab insertionem di-
 stant. *Alii* rursus geminum ventrem ostendunt. Sunt nonnulli quibus ex abundantia
 quædam transuersim ductæ impressiones insunt, quæ illos musculos ita exornant, ac si
 pluribus ventribus efformarentur. ¶ Huiusmodi vero impressiones seu lineamenta, &
 circumscriptiones, quas Græci *πνευματὶς* vocant, sunt veluti albæ quædam lineæ, in mul-
 culi alicuius substantia impressæ. ¶ A tendinibus quoque sumuntur differentiarum. Qui-
 dam enim in tendinem enervationemue prorsus non definunt. *Alii* tendines habent.
 Tendinum autem quidam lati, membrancique sunt. *Alii* omnino teretes: *Alii* paulo
 minus teretes, & nonnihil latiores, quam profundiores. Et alii tendines breues sunt. *Alii*
 autem longissimi. Rursus vnus musculus plures educit tendines, singulos quasi ex pri-
 uatis sui ventris carnosus propaginibus educens. *Alii* vnum quidem educunt tendinem. F
 At is postmodum in plures discinditur. Præterea plures musculi vnum efficiunt tendi-
 nem. ¶ Sic etiam a musculorum officio differentiarum petuntur, quum alii rectis præstent
 motibus. *Alii* duntaxat obliquis subministrant motibus. *Alii* vtrinque præstant motum.
 Sed hæc de musculorum differentiis in præsentia dixisse satis sit. Si quidem ex iis omni-
 sum est, id perspicue ex singulorum historia in progressu sermonis discetur. De

De cute, & cuticula. C A P. IV.

- A** **Q**Uum cutis omnium corporis partium sit veluti operculum quoddam, ac natium regumentum, præstat de ea hoc loco verba facere prius, quam ad musculorū historiam perueniamus. Cutis itaq; non duntaxat omnium hominis partium, sed vniuersę substantię quę generationi corruptionique subiecta est, duritię ac mollitię media existit. ¶ Est enim cutis veluti sanguine præditus nervus, qui inter neruū & carnem quiddam plane medium est, perinde ac si ex mistis vtriusq; constitueretur. Ceterum nervus omnis ex sanguis est & frigidus. Caro multo sanguine prædita, & calida. Media inter vtrunque est cutis, nec plane ex sanguis, vt nervus: nec sanguine abūdans, vt caro. Cutis hæc in homine, boum & equorum tergoribus, ex quibus coria adaptantur, responder, hincq; ad-
- B** eo Græcis *ἔρμα*, eo quod *ἔρμα*, hoc est, excoriari queat. Latinis *corium* dicta est. ¶ Porro cutis non pari ratione omnibus ipsi subiectis partibus adhæret. Secus enim in manus vola, & pedis planta subditis partibus adnascitur, aliter rursus in fronte sibi subditę musculosę substantię, & aliter in labris, palpebris auribus, naso, ano, ac pudendo, & aliter per vniuersum corpus, substratis partibus cutis committitur, ac inter secundum, diuersa ratione a subditis aufertur. ¶ Deinde in omnes cutis regiones non æqualis est neruorum distributio, nec cutis etiam vndecunq; eadem est crassities. Internę enim manuum cuti, plurimę neruorum fibrę porriguntur, verticis vero cuti paucissimę. ¶ Quinetiam faciei cutis mollior, & tenuior, verticis autem, & plantę pedum durior visitur. Quę internam summę manus sedem inuestit: nisi labore callosior euaserit: ex-
- C** sitissime in duritię mollitięque inter reliquam cutem, & omnia prorsus corpora, media est, quam proxime æquali ad pondus tēperamento accedens. Vt cunq; vero sit, cutis homini pro magnitudine corporis tenuior, q̃ animantibus quadrupedibus obtrigit: quam etiam homini in vertice, dorso, cruribus, & pedis planta admodum crassa est, sed non omnib. æqualiter. ¶ Quinetiam alię cutis partes prorsus immobiles sunt, & circū-actu pertinaces, vt volę & plantę cutis. Alię versatiles quidem sunt, sed nullo aguntur voluntario motu, vt totius corporis cutis, eę excepta quę mouetur, vt est frontis & faciei vniuersa, & quę anteriorem colli sedem, lateraq; cōplectitur. Atq; hæc motu participat, aut propriis in hoc famulantibus musculis, vt frontis, colli, genarū, & labiorum: aut vicinę ipsius cutis gratia, vt malarum cutis, q̃ musculis destituta, simul cū proxima cute
- D** mouetur. ¶ Præterea alia cutis sedes pilosa, vt verticis, axillarū, pudendorū, in viris mēti. Alia vero pilis orbara, vt interna manus, & plantę cutis. ¶ Porro cutis perpetuo cōtextu efformata est, nisi quod tenuibus foraminulis ad fuliginosorum excrementorum expulsiōem, & pilorum generationē paratis peruia sit. In palpebris deniq; naso, auribus, ore, ano, pudendo, & vbi vnguibus, viam præbet, interpellatur, & perforata, cōspicitur. Ex cetera cutis regione, interna summę manus cutis, vt & pedis plantā vestiens, maxime cōtinua, minimeq; perforata visitur. ¶ Ceterū cuti alia tenuis cuticula, & prorsus ex sanguis obducitur, supernasciturq; , ceparum propemodū tenuioribus ac pellucidis respondens inuolucris, nisi quod alicubi, & præsertim in vola, & pedis planta, crassior duriorq; visitur. Hęc quum cutis quędā velut efflorescentia sit, Græcis *ἐμδερμῖς*, quasi sum-
- E** ma cuticula, aut extrema superficies vocatur. Quod si aliquando attritu in scabie, aut ignis ad motione, aut feruentis aquę infusione, aut alia quadam de causā auferatur, & interdum vesiculę instar a cute abscedat, promptissime, secus ac vera cutis, renascitur. ¶ Ceterum vera intimaue cutis sola sanguinis & vitalis spiritus compos est, ob quod venarum arteriarumque alicubi, & neruorum tenuissimę partes, finesque ad eam conflunt, sensum illi suppeditantes. Neque enim quemadmodum in singulos musculos nervus peruenit, ita & ipsius cutis proprius aut definitus est, sed ex partibus subiectis fibrę quędam ad ipsam perueniunt, quę simul ipsam cum subiectis partibus connectunt, simul etiam sensum ei suppeditant. ¶ Non est itaque audiendus Aristoteles cutem sensu destituens, ac si carnis cuti subditę duntaxat beneficio sensus tactus perficeretur: quum
- F** quotidiana experientia diuersum doceat: nempe cutem a subiectis musculis, quos carnem Aristoteles appellat, aut ossibus quoque auulsam, & postea scalpello istam vnguibusque compressam etiam sentire. Verum quum Vesalius copiose hunc errorem confutauerit, non est cur plura adiiciamus.

De membrana carnosā, & adipe inter hanc, & cutem reposita. C A P. V.

Galenus
in libr. de
morborū
caulis.
Idem libr.
1. de tem-
per. cap. 8.
Cutis sub-
stantia.Aëpgo.
Idem libr.
2. de vſu
partium,
cap. 6.
Cutis dif-
ferentia.
Vesal. libr.
2. cap. 5.
A conne-
xu.A neruo-
rum co-
pia.
A molli-
tie.

A motu.

A pilis.
A forami-
nibus.
Gal. lib. 2.
de tempe-
cap. 6.

Cuticula.

Gal. lib. 14.
the meth.
cap. 2 & 4.
aph. com-
77.Emdermῖς.
Cutis ve-
nas, & ar-
terias, ac
neruos
porrigi
ipsamque
sensus esse
compo-
rē. Idē li-
16. de vſu
part. ca. 2.
Aristote-
lis error
libr. 2. de
anima. ca.
11 lib. 2.
cap. 5.

Veslibr. 2.
cap. 5.

Cur car-
nosa dicta
sit.
Pannicu-
lus carno-
sus.
Vesibid.
Adeps seu
pinguedo.

Pinguedi-
nis gene-
ratio.
Gallibr.
2. de temp.
cap. 5.
Vesalius
ibidem.

Quibus
copiosior
pingue-
do.
Color.
Vfus.
Galenus
libr. 16. de
vfu part.
cap. 2.

Cur per vniuersum corpus membrana subiacet, quæ cuticula longe robustior cras-
siorque est, & fibris quibusdam raris, iis qui subternuntur illis musculis adhæret,
connasciturque, cuti vero pertinacius committitur. Hanc quam plurimæ venæ, & pau-
cissimæ tenuissimæque arteriæ, cutem nutriendas, & neruorum propagines cuti sensum
(vt dictum est) communicantes, permeant. Hæc non eandem in vniuerso corpore cras-
sitiem obtinet, verum quibusdam corporis sedibus, carnosus adaugetur fibris, & crassior
reddita, addo carnosus efficitur, vt musculi nomine donetur. Huiusmodi regio in tota
colli amplitudine habetur, & in fronte, vt *sequenti patebit capite*. ¶ Porro hæc membrana,
quam aliarum membranarum nomine Græci *ἐμύνα* vocant, non temere carnosus Arabi-
bus dicta est. Nam inter reliquas corporis membranas, hæc sola carnosus apparet. Hinc
vulgo & barbaris non inepte panniculus carnosus nominatur. ¶ Sunt itaq; tria vniuer-
sum hominis corpus perpetuo cingentia, nimirum cuticula, cutis, & membrana hæc
carnosus. Quibus & quartum hominem ambiens accedit, ipsa scilicet pinguedo seu a-
deps, *πυμὲλι* Græcis dictus, qui nisi extreme homo emacietur, vndique propemodum in-
ter cutem & carnosam membranam copiosissime continetur. Etenim propter com-
plures venas & arterias e quibus plurimus refudat sanguis, membranam perreptantes,
atque inter illam ac cutem propagatas, membranæ frigiditate, calorisque inopia con-
crescit, & in pinguedinem degenerat. ¶ Natura vero accuratissime cauit, ne pingue-
do nasceretur vbi noxia, inutilisque esse potest. Non enim cerebri membranis illam
obduxit, non testium inuolucris, non internæ sedi cordis inuolucris, quamuis cor hæc
non destituatur, non internæ ligamentorum sedi, quæ tendinibus transuersim obuol-
uuntur, neq; etiam palpebrarum, aut frontis, aut penis cuti pinguedinem subiecit, ne-
que adeo multum quoque summæ manus pedisque externæ sedi. Copiosissimam autem
clunibus obduxit, vt illa adipe, puluinaris vice vterentur. ¶ Ceterum pinguedo frigidis,
humidisque animantibus, vt homini, & porco, plurima colligitur: siccis vero & calidis,
vt leonibus & venaticis canibus, nulla, aut perquam exigua. ¶ Albet autem pinguedo,
quod membranæ cutisque, & alia quibus adhæret, corpora alba, neque carnis instar ru-
bra sint. Omnia enim quæ in nostro corpore ab aliquo emutantur, mutantis alterantil-
que colorem quoque sortiuntur. Adfusa pinguedo siccis ac tenuibus corporibus, vt il-
la perpetuo natiua pinguedine humectet, quæ alias in diuturnis inediis, ac vehementi-
bus exercitationibus, & caloribus immodicis exsiccantur, atque indureſcunt. Ea vero
quæ inter cutem membranaque collecta est, eundem quem vestis caroque simplex v-
sum præbet. Siquidem frigoris tempore calefacit, & si Soli exponitur homo, vestis quo-
que instar refrigerat, calorem quo minus penetret inhibens. Vt rectissime dicatur a
Germanis nostris, eodem præsidio & frigus, & calorem arceri.

De musculoſa ſubſtantiâ frontis cutem mouente. C A P. VI.

Carneam membranam vniuersæ cuti subiectam in nonnullis corporis partibus car-
neis fibris augeri, & in musculi naturam degenerare, præcedenti capite dictum est.

πυμὲλι
libr. 11. 2.
Gal. libr. 2.
de vfu par-
tium c. 14.
Frons cur
volunta-
rio motu
prædita.

Frontis
musculo-
ſa ſubſtan-
tia.

Idem libr.
5. de vfu
par. ca. 15.

Nunc itaq; cur, & quonam pacto, id sub frontis cute, quam Græci *μετωπιδον*, Iulio Polluce re-
ſte, nominant, accidat, monstrabimus. Siquidem hanc motu voluntario esse præditam pro-
pter oculos necesse fuit. Oportebat enim eos multum posse aperiri: id quod fit superci-
liis sublatis, quum externa multa vno tempore intueri conantur, ac rursus dum clau-
duntur, cogi ac constringi ad vnguem ab omnibus circumiacentibus, quum alicuius
incursum contra sese metuunt. Ad utrosque igitur vsus natura cuti omni ipsi cir-
cumfusæ, tum ei quæ supra in fronte est, tum ei quæ infra est ad malas, motum vo-
luntarium adhibuit, vt alternis extensa, tum rursus in seipsam replicata, aperire o-
culos, & claudere queat. ¶ Quum autem fieri haud possit vt sine musculo pars
quæuis voluntario agatur motu, musculosam quandam substantiam, cuius benefi-
cio mouetur, frontis vniuersæ cuti, quæ depilis est, & nasi cuti, natura subiecit.
Carnosus namque membrana totius frontis, & nasi cuti subtenſæ carneis fibris
(vt dictum est) quam plurimis aucta, musculosaque reddita, plures neruorum
propagines mutuatur. Præterea frontis, nasique cuti membrana hæc tenacius,
& citra alicuius adipis, aut perquam modici, interuentum, quam per reliquum
corpus cuti adnecti consuevit, connascitur, haud secus, quam si vnum corpus
membra-

A membrana cum cute esset efformatura. Quod nonnullis Anatomicis ita imposuit, ut arbitrati sint frontis cutem, carnosam musculosamque substantiam esse. ¶ Porro huius musculosæ compaginis fibræ mutuo ad latera accumbentes, a nasi summo usque ad mediam frontis sedem, quæ inter primas capillorum radices, & supercilia consistit, & ad huius quoque loci latera carnosiores videntur, omnes sursum recto tramite procurrêtes, si modo interim perquam raras exceperis, obliquo ductu exporrectas. Atque hæc quidem recta fibrarum series, non obiter a Medicis est expendenda, ne in fronte transuersas porius, quam rectas moliantur sectiones. ¶ Fit enim quum transuersim quandoque sectionem inibi & maxime iuxta supercilia, ubi carnosiores fibræ sunt, ut comprehensum est, aliquis tentat ad palpebrarum radices, tum supercilia, tum contiguam ipsis cutem deorsum conuolui & oculos, quibus incumbant, aggrauare, ut neque aperiri ex sententia valeant, neque libere suo fungi officio. ¶ Non temere autem depilis est creata frontis cutis, duabus nimirum potissimum de causis. Vna, quia frons a pilis capitis quantum volumus tegitur, ut ea certe de causa propriis pilis ipsi non sit opus. Altera, quod si pilos produxisset, tondere ipsam assidue nobis necesse fuisset quod pili alias oculis incumbèrent.

Ves. libr. 2. cap. 8. Fibrarum series.

In fronte sectiones transuersæ non tendant.

Frōis cutis cur depilis.

Gal. lib. 17. de usu par. ca. 14.

De musculis palpebrarum. CAP. VII.

Palpebras utrasque tam inferiorem scilicet, quam superiorem, *βλεφαρῶν* Græcis, dicitur, efformat membrana, quæ a caluariam ambiente membrana, quam Græci *περιεγκεν* & *περιόστειον* vocant, principium ducit, & vnum continuum cum adhærente albaue oculi tunica corpus existit, dein & cutis quoque cum carnea membrana. ¶ Atque hæc simul ad palpebrarum fines, & ubi cartilago cilia erigens consistit, firmissime vniuntur, adeo sane ut quatuor hæc, cutis nimirum duæ membranæ, & cartilago illa, quam *τάρον* nominauimus simul vnita, palpebram, corpus quoddam rarum, & nulli alteri in homine parti respōdens, constituent. ¶ Ceterum per reliquam palpebrarum regionem, cutis carnosæ membranæ, ut in ceteris fere omnibus corporis partibus, quod ad connexum attinet, committitur, & nullus interim adeps, sed vntuosus duntaxat quidam humor, inter cutem & membranam iacet. In superiori quoque palpebra per vniuersam ipsius amplitudinem ex abundanti, carnea membrana musculosis adaugetur fibris, ac velut duos efficit musculos, in medio cutis, & eius membranæ quam adhæret albaue oculi tunicæ continuam esse diximus, repositos. ¶ Moueri enim oportebat motu voluntario superiori palpebram, alioqui nullus ipsius erat usus. Quippe frustra nobis esset a natura largita, si quum vis quædam extrinsecus in oculos irrueret, quæ ipsos læsura esset, claudere volentes, non possemus. Quum autem partes omnes, quæ motu voluntario sunt præditæ, duobus ut minimū indigent musculis, sibi ipsis oppositis, altero scilicet extendente & altero flectente, duos quoque musculos tenues, latos, membraneos, ac substantia prope modum omni ex parte sibi similes, natura miro quodam artificio in palpebra superiori, inferior n. prorsus est immobilis, produxit: *Knum* quidē in maiori oculi angulo, qui ad nasum est, alterū in minore, qui iuxta tempora est. Qui portionē maioris anguli occupat, ex media anguli sede inibi ad nasi latus incipit, suo principio ēt superciliōrum partem naso proximam cōtingens. Huius finis amplius, quemadmodū totus ēt musculus, cartilagini, in quā pili firmanantur, applantatur, mediam ipsius sedē, quæ maiore respicit angulum, vniuersam occupans. *Alter* vero musculus totū minorem angulum amplectitur, ductū quodammodo circularē obtinens. A medio namque inferioris palpebræ ortus, per minorem angulū circumducitur: & in superiorem palpebram ascēdens, in reliquā cartilaginis dimidiam sedē sese inserit, priorique musculo, non ad cartilaginē tantū, sed ēt per reliquam superioris palpebræ longitudinē committitur, adeo sane, ut nisi fibris ambos disiunxeris, vterque vnus esse apparebit. Fibræ n. secūdi nostri C, quum palpebra sursum ducta est, respondent: ea vero conniuenta acutum magis efficiunt angulū. Prioris vero musculi fibræ minus oblique conspiciuntur, & velut ex duplici ducuntur principio, nimirum ex angulo maiori, & superciliū parte naso cōtermina. ¶ Horum musculorū beneficio superior palpebra & attollitur, & deprimitur. Prior n. qui interiorē maioremue angulum sibi vendicat, ipsam ad superiora contrahit: posterior qui minorem perreptat angulum, ipsam deorsum agit. Quod si vterque musculus eodem tempore tendant iuxta palpebram, sursum quidem ea pars, quæ est ad magnum angulū trahetur: quæ vero paruo vicinior est, ea deorsum trahetur. Quare accideret, ut oculus non magis sit apertus quā

Palpebrarum constitutio. *μελερῶν* *πὸν καὶ* *περιόστειον*.

Ves. libr. 2. cap. 10.

Duo palpebræ superioris musculi.

Gal. ibid. cap. 9.

Ves. ibid.

Vnus musculus.

Gal. ibid.

Alter.

Vfus.

2. Præf. 15. clausus, eaq; palpebræ figura est, quam Hippocrates *καμπύλαν*, id est, *curuam, reflexam, aut A*
retortam appellauit: quam in morbis magni mali signum numerat. Firq; affectus is utroq;
 musculorum conuulso, partemq; tarſi ſibi continuam ad ſeipſum trahente. Quod ſi al-
 ter quidem musculus agat, ad ſeipſumq; palpebram trahat, alter aut prorsus ceſſet ape-
 riri, tunc ac claudi totam palpebrā contingit. Trahit n. ſemper pars altera tarſi quæ mo-
 uetur, vna ſecū & reliquam. Cauſſa aut huius rei eſt durities tarſi. ſi n. eſſet membrano-
 ſus, aur carnoſus, aut quouis alio modo mollis, nō utiq; partē motā altera ſequeretur. Id
 quod præuidens natura, durum ac cartilagineū tarſum ipſi palpebræ innexuit, in quem
 vtriuſq; musculi fines infererentur. Quemadmodum enim, ſi baculum quendam obli-
 quum & retortum vtra voles parte apprehenſum attraxeris, totus ſequitur: ita etiam tar-
 ſus totus vtriuſuiſ musculi tractum ſequitur. Porro cur inferior palpebra immobilis ſit, **B**
 copioſe *libro iam commemorato* Galenus exponit.

De oculorum musculis. C A P. VIII.

Lib. 10. de
viſu partiū
cap. 10.
Oculi cur
mobiles.

Galenus
ibidem,
cap. 8.
Oculi cur
duo faci.

Oculorū
motus.

Veſalius
lib. 2. c. 11.

Musculi
oculorū
primi (ex
Galenus
ibidem.
Veſalius
ibidem.

Q Vum neque ex obliquis ac lateribus, neque ex poſterioribus, neque ſuperioribus,
 vel inferioribus ſedibus, neque omnino aliter quam ſecundum pupillæ rectitudi-
 nem, oculorum viſio perficiatur, pauciſſima ſane cerneremus, ſi oculi penitus immobi-
 les exſtitiffent. Ob eam ſane cauſſam ab opifice rerū ita conditi ſunt, vt poſſent plurimū
 circumagi, & cū ipſis totum ē collum ad motus habile reddidit, qua etiam potiſſimū de
 cauſſa duo facti ſunt oculi, a ſe ſe notabili interuallo diſſiti. Ceterū ſi eos motu volūtario
 oportebat eſſe præditos, ipſis quoq; musculos, eius motus inſtrumēta largiri neceſſum
 fuit. ¶ Poſtquam igitur oculorū motus ſunt tres, vnus quidē quō intro verſus naſum ad-
 ducuntur, & quo extra ad paruum angulum aguntur, alter quo ſurſum verſus ſupercilia **C**
 tolluntur, & quo deorſum verſus malas trahuntur, tertius quo obſcuro admodum mo-
 tu circumuertuntur: cōſentaneum fuit & musculos qui motuū illorum duces eſſent to-
 tidem, creari, atq; ſingulis motib. qui in geminos paruri poſſunt, binos adaptari muscu-
 los. Duos quidem in laterib. ſingulos ſcil. ad vtrunq; angulum: alios autem duos, vnum
 quidem inferne, alterū vero ſuperne, quintū vero & ſextū vt circumactionis motui præ-
 eſſent, poſitione obliquos effecit, ſingulos in ſingulis palpebris verſus minorē angulum
 ſupra & infra extenſos. ¶ Porro ex iis ſex numero musculis primi quatuor, quemadmo-
 dum rectis oculi motibus præſunt, ita quoq; rectum ſitum obtinent, & omnes omni ex **D**
 parte ſibi ſimiles ſunt. Capita n. ipſorum, velut ex dura cerebri membrana neruum viſo-
 rium obregente, & e neruo ſecundi paris neruorum cerebri ſtatim in viſorii nerui e cal-
 uaria elapſu, originem ducunt. Dein ipſorū venter amplior, quam profundior, attamen
 teres propemodum viſitur, & poſteriori oculi regioni, viſorioq; neruo, ſecundū ipſius a
 caluaria in oculi vſq; radicem ductus longitudinē, incumbit, & vbi prope mediam oculi
 ſedē, vbi is latiffim⁹ eſt, venter pertigerit, in latā membraneamq; enervationē finit. Quæ
 vltra mediam oculi ſedē terminat, & duræ oculi tunicæ tanquā in mouendo oſſe, recta:
 ſed ſecundum corporis lōgitudinem ducta, linea inferitur, iuxta iridē, maioremue ocu-
 li circulum, in anteriori oculi parte conſpicuū & nigrum ab albo dirimentem. ¶ Porro
 musculi circumductionis oculi opifices forma quidē ac ortu priorib. illis reſpondent, at
 minores & ductu inſertioneq; ab illis euariant. Prior namq; a dura cerebri membrana, **E**
 viſorium neruū ambiente, e regione minoris anguli originē ducit, & in humiliorē oculi
 ſedem neruoſa ſua tenuitate inferit, obliqua linea iuxta iridē reliquorum quatuor mo-
 do. Alter vero a viſorii nerui membrana, e regione maioris anguli naſcitur, & duræ ocu-
 li tunicæ neruoſam ipſius tenuitatē, obliquiori linea, ad ſuperiorē oculi ſedem inferit.
 Atq; hinc ſit ſex iſtos oculi musculos ſolo ſitu, & in durā oculi tunicā inſertione, idq; ad-
 huc modice variare. Primi n. quatuor (vt dictū eſt) prorsus recti ſunt rectaq; linea inſerū-
 tur: alii duo obliquiores vident, obliqua linea inſertionē molientes: q; etiam ſi circūuer-
 ſioni cōducant, attamen & ſurſum deorſumq; oculum agunt. Atq; omniū neruoſarum
 tenuitatū ductus, inter durā oculi tunicam, & adhærentē medius conſiſtit. Efformant
 itaq; ſimul oēs musculi, dū propriū adhuc ſitū ſeruant, turbinatā figurā, cui⁹ conus ipſe- **F**
 rum eſt exortus, baſis vero eorundem inſertio. Breuiſſimo n. ductu neruo cōnectuntur
 viſorio, quum in illorum, quam vna conformant capacitate multus contineatur adeps
 duriuſculus, & albus admodū, atq; is ruſus alteri cuidā obuoluitur musculo. Quid mul-
 taſiam

A tiam dicti sex musculi ex cerebri dura membrana neruum visorium obtegente pro-
nati, in anteriorem duræ oculi tunicæ sedem iuxta iridis latera orbiculatim membra-
neis tendinibus inferuntur. Atque primus, qui est in magno angulo, intro versus na-
sum trahit. *Alter* qui in paruo est, versus eundem angulum abducit. *Tertius*, qui infra
est, deorsum versus malas. *Quartus* qui supra, versus supercilia. *Quintus & sextus*, oculum
quoque versus circumagunt. ¶ Præter commemoratos sex oculi musculos, alius est
quidam musculus magnus, vndeunque ab illis occultatus, & eo quem diximus adipe
circundatus, constringens ac muniens visorium neruum, solusque similem figuram,
quam priores sex simul efformant, constituens. Nam musculus iste principium quoque
a dura membrana, neruum visorium inuolvente assumit, at paulo antè, quam sex
priores. Estque id principium carnosum, vt etiam reliquū totius musculi corpus, quod
orbiculatim visorium ambit neruum, ac a principio in priora porrectum, instar turbi-
nis tantisper dilatescit, dum posteriorem oculi sedem contingat, illique circuli modo
implantetur. Atque hanc insertionem molitur, non quidem visorio neruo proximam,
sed fere vbi oculus amplissimus ferri incipit. Oculum distendit, ac leuat hic musculus
sursum & deorsum, & vna conuertit.

Septimus
Galenus
ibidem.

De labiorum, buccarum, & nasalium musculis. CAP. IX.

L abiorum labiorumue substantia sola eius modi extitit, vt eam vt musculum pro cu-
te, aut cutem musculosam iuste vocites. Nam & moueri ipsam motu voluntario o-
portebat, multoque aliis musculis esse duriorē, vnde ex cute ac musculo ipsam rem-
perauit. ¶ Bucca vero quæ Græcis *πύλον* dicitur, vtrumque faciei latus est, quod spiri-
tu retento inflatur. Quum autem labiorum & buccarum motus dicimus, illi intelligen-
di veniunt, quos, quiescente etiam inferioris maxillæ ossē, obimus. Aliis enim musculis
maxillæ os, aliis vero buccæ, labiaque motu voluntario aguntur. Quatuor vero vtrinque
labia & buccas agentes musculi sunt. Duorum autem primorum in vtroque latere, sin-
guli membranei & ampli admodum sunt. Hi enim ex omni via vertebrarum ceruicis
spinarum regionibus, deinde scapularum, & clauicularum, & pectoris ossis sedibus ori-
ginem ducunt, vsque ad faciei medium protensi. Sunt vero hi aliud nihil omnino, præ-
terquam carnea membrana, carneis fibris in anteriore potissimum colli parte, & facie
ad malas vsque adaucta musculosaque facta. Fibrae autem hæ carnosæ a pectoris ossis se-
de, mediaque clauicularum regione pectoris os spectante sursum, versus faciē conscen-
dentes secundum colli longitudinem recto tramite protenduntur. Quæ autem ex reli-
qua clauiculæ sede, & summi humeri, & scapularum sedibus ad ceruicis vsque spinam in-
cipiunt, oblique sursum contendunt, tantoque obliquiores videntur, quanto ceruicis
spinæ sunt propinquiore. Omnes enim fibræ a ceruicis vertebrarum spinarum sedibus
prorepentes, vna cum eius partis neruorū furculis transuersim feruntur, atq; ideo ma-
gis, quo musculus occipitio vicinior existit. ¶ Porro eiusmodi fibrarum ductus, in cer-
nice admodum cōspicius est, nullaq; fibrarū interfectio, vt neq; etiam in summo men-
to, & in inferioris maxillæ iuxta aurem regione sese offert. Verum vbi iam labia contin-
gunt, fibræ inter se adeo confunduntur, vt rectas & obliquas, & transuersas iam amplius
distinguere prorsus arduum & impossibile sit, atq; id præcipue secundum totam infe-
rioris labri regionem accidit. Labri enim superioris latera ad alas vsq; narium duntaxat
fibræ porriguntur. ¶ Posterius itaq; huius musculi initium a spinæ ceruicis sede omnino
promitur, deinde secundū occipitii ossis basim fertur, mox sub aurem, vt ipsius radicem
perreptando contingat. Imo interdū hic adeo ascendit, vt & auris huius beneficio qui-
busdam hominibus, non etiam stupidis, aut asinis, moueatur, vt nobis in nobili quodam a
Gumpenberg videre licuit. Porro præsens musculus ab aure in faciē ductus, illum quem
massetera vocant, de quo seq. dicemus cap. musculū contingit, & paulo validius ossi in malis,
quam alibi in reliquo ipsius ductu connascitur, hinc ad nasi vsque radicem pertingens.

Numerus
musculorū.
Primus al-
terius late-
ris, vel si-
mul omniū
primus &
secundus.
Vetalius li.
2. c. 13.

Flatera simul cum superiori labio abducunt, aut reliquam faciei cutem, quæ a musculo-
sa frontis & nasi substantia, & palpebræ musculis non mouetur, circumagunt. ¶ Secundus
musculus similiter membraneus, & varia fibrarū specie intertextus, totamq; eam buc-
carum sedem complectens, quam inflamus, & a tota fere superioris maxillæ longitu-
dine in inferioris longitudinem ad gingiuarum radicem inseritur. Huius musculi

Secundus
alterius la-
teris seu
omniū 1.
& 4.

internam superficiem oris amplitudinem succingens tunica oblnit, ipsique adeo con-
nascitur, vt nullo prorsus modo illacera a musculo, aut musculus ab illa auferri queat.
Imo secundus hic buccarum musculus, vix aliud est quam carnosarum fibrarum imple-
xus admodum tenuis, ac quodammodo membraneus. ¶ Is ad buccarum motum, quo
nunc in oris amplitudinem voluuntur, nunc autem extrorsum, nunc sursum, nunc
deorsum, nunc prorsum, nunc retrorsum ducuntur, conducit. *Tertius* a maxillæ supe-
rioris osse, vbi mala consistit, carnosio principio enatus, deorsum oblique in priora
quousque se in superioris labii inserat latus, fertur. Sedes autem ad nasi latera mali in
modum prominens ac rubens, Græcis *μῆλον*, Latinis *mala & gena* vocatur. *Quartus*, ab
inferioris maxillæ humiliori parte ad menti quasi latera carneus exoritur, hinc sursum
oblique in priora protensus, in mediam humilioris labii sedem implantatur. ¶ Sunt
itaque omnes iam dicti musculi quatuor lati, ac quodammodo, quod ad fibras attinet,
duplici donati initio, ipsorumq; fibræ circa insertionem X literæ modo sese interfecant
pertinaciter. Quatuor aut iis musculis duodecim motus vt minimum obimus, quatuor
quidem obliquos, in vtroque labro duos, & alios octo rectos, in vtroque labro quatuor.
Duo sane ad amussim recti fiunt, quando labra plurimum a se inuicem diducuntur, hoc
quidem a duobus musculis sursum agentibus ad nares tenso, altero autem deorsum ad
mentum ducto, dum duo inferiores musculi laborant. Dein quando ad se labra retra-
huntur, & inuicem coeunt, vno ex superiore loco deorsum, altero ex humilioris sursum
protenso. ¶ Ceterum ab internis horum musculorum fibris, labia introrsum conuer-
tuntur, & subimplicantur, ab exterioribus vero foras euelluntur, vt ita & duo alii in sin-
gulis labiis recti consurgant motus, qui paulo minus toto ad obliquos quasi referendi
sunt. Quatuor vero obliqui motus, vnicò duntaxat laborante musculo, reliquo interim
laxato, celebrantur. Si enim dexter superioris labii musculus remisso sinistro contra-
hitur, dextra labii pars obliquo motu, sinistra dependente, attollitur. Vt vero validius
adhuc superius labrum moueretur, atque secundum totam ipsius substantiam musculis
participaret, illi alia portio musculi elargita est, qui narium alas extrorsum sursumque
agit. A malis enim iuxta proprium superioris labii musculum carneus quidam, sed te-
nuis membraneusque nascitur musculus, qui in ipso modice versus priora descensu,
in duas portiones partitur, vnam nasi alæ radici, alteram superioris labii parti, quæ Græ-
cis *μύσαξ*, & Homero *ἰπῖμι*, Latinis *barba superioris labii* vocatur, inferens. ¶ Verum præ-
ter hunc alæ musculum alius in interna narium amplitudine habetur, ad suæ cavitatis
externum latus, sub tunica illam amplitudinem succingente, reconditus. Est autem hic
tenuis & membraneus, interiori alæ regioni insertus, illamque intro trahens. Sunt itaq;
enumerati in hoc capite musculi duodecim, si omnes vtriusq; lateris iunxerimus, duo
quidem lati ex carnea constantes membrana, duo admodum varii ex vna maxilla in al-
liam pronati, & quatuor labiis proprii, & totidem alarum nasi.

De musculis inferiorem maxillam mouentibus. CAP. X.

NON homini tantum, sed reliquis etiam animantibus ad vnum omnibus, *excepto*
Crocodilo, cui vnico superior maxilla mobilis visitur, inferior, quiescente interim,
immotaq; superiori, motu agitur voluntario. ¶ Ceterum inferior hominis maxilla tri-
bus ducitur motibus, quorum vnus quidem in mandendo perficitur, quo ad latera, &
antrorsum, & retrorsum maxilla agitur, ac circumfertur: alius in ore aperiendo fit. Mo-
tus autem ii omnes propriis obeuntur musculis, qui vtrinq; habentur quatuor. Primus
a mandendo Græcis *μανσῖνις*, Latinis *manforius*, vel *mandibularius* dictus, est ille quem ad
posteriorem maxilla inferioris sedem, sub osse iugali manu amplecti possumus. In equis spectatissi-
mus est, quem crebro in illis complectuntur, qui num carneus, aut nerueus equus sit
obseruaturi sunt. ¶ Nerueo & amplo validissimoque principio ab ea malarum sede ex-
oritur, qua infima pars futuræ illius consistit, quæ maxillæ superioris os, totum minorem
oculis sedis angulum occupans, mediamque ossis iugalis sedem efformans, maximo e-
iusdem maxillæ ossi contingit, quod dentium præsepiola continere, ac narium ampli-
tudinem magnâ ex parte constituere præcedenti libro diximus. Deinde a malis prin-
cipium hoc in posteriora ducitur, e tota inferiori, interiorique ossis iugalis sede ad au-
rem vsque pronatum. Ex tota enim longitudine ossis iugalis, quæ a malis ad aurem vsq;
pertinet

Vfus:
Tertius al-
terius late-
ris, vel o-
mnium 5. & 6.
Mala.

Quartus in
altero late-
re, vel o-
mnium 7. & 8.

Vfus.
Gal. ibidem
cap. 16.

Alarum nasi
musculus
alterius la-
teris 5. aut
omnium 9.
& 10.
Vesalius,
ibidem.
In altero la-
tere 6. aut
omnium 11.
auris.
Musculorum
epiloga.

Inferior ma-
xilla super-
iori quie-
scente mo-
uetur.
Gal. lib. ad-
mani ana. 4.
Maxillæ in-
ferioris mo-
tus.
Maxillæ
musculorum
nomina.
Vesalius
cap. 15.
Manforius
alterius la-
teris 1. aut
omnium 1.
& 2.

- A** pertinet, huius musculi principium enascitur, quod nerueū in malis esse diximus. Hoc enatus principio deorsum tendit, totamque inferioris maxillæ amplitudinem, in externa posteriorique ipsius sede conspicuā amplectitur, illi validissime partim carneus, partim nerueus latissima insertione implantatus. Totus quodammodo triangularis est: vnum enim ipsius latus versus iugalis ossis extremitatem porrigitur: alterum a malis ad infimam maxillæ sedem retrorsum ducitur: tertium ab aure in anteriora deorsum fertur. Vnde etiam ilico fibrarum ipsius ductum variare necesse est. Quæ enim ab anteriori principii sede prodeunt, oblique deorsum in anteriora feruntur: quæ autē a posteriori principii sede prodeunt, oblique deorsum in anteriora repunt. Variis motibus maxillam circumagit, & antrorsum retrorsumque mouet, adeoque ad mandendū molendumque cibum præcipue cōducit. Neque enim alia ratione dictus est manforius, quam quod sibi ita applicent & committant dentes, vt quicquid inter hos medium adiacet, frangatur, & tanquam a mola ad læuorem comminuetur. Secundus Græcis *χρονίος*, Latinis *temporalis* appellatus, a verticis, & tēporis, & frontis, & *cuneiformi ossibus*, & eo osse, quod minorem sedis oculi angulum amplectitur, seu maxillæ superioris osse primo principium ducit. Instar semicirculi enim primum, & præcipue a verticis ac frontis osse multo elatius enascitur, quam commissura squamæ formis consistit, temporis os verticis ossi cōmittens. Hinc sensim crassescens, & carnosior redditus arctatusque, in cavitatem ibi in capitis ossibus exsculptam descendit. Quum vero ad iugale os vsque pertingit, ad nodumque crassus, sed angustus interim euasit, superiori quoque iugalis ossis sedi adnascitur, masseteri adeo continuus, vt vix immerito temporalem & manforium vnum esse musculum quis contēderet. Vniuersum autem temporalis musculi corpus ad iugale vsque os carneum est, exteriori sede, propter membranæ propriæ crassitiem perquam liquidum, idque potissimum ad exortus sui initium & ipsius os iugale connexum. Interna vero sede, qua ex ossibus ampla illa lataque explantatione enascitur, carneus est, & acutum inferioris maxillæ processum contingens in breuem, sed insigniter validum, nerueumque finit tendinem, sua amplitudine acutum illum maxillæ processum amplectentem, illique validissime insertum. Ad tendinem hunc omnes temporalis musculi fibræ, ex semicirculo velut ad circuli centrum procurrunt. Hic os potissimum claudit, & dentes inter se vehementer committit. Eius certe ingens robur est, quoties
- D** aliquid vi mordemus, & aliquid impetu dentibus confringere aduitemur, aut ingens aliquod onus histriones quosdam lenare conspiciamus. Vtunque tamen temporalis musculus sit validus, multisque neruorum propaginibus donatus, ac suæ nobilitatis gratia ossuosis vallis interceptus, aptisque sinibus inclusus, nihilo minus tamen illi alterum quoque musculum, similiter robustum & neruosum, ac in ore delitescentem Natura associavit, tertium ordine, eiusdem cum musculo temporali functionis auctorem. Huius principium perquā neruosum, ex tota cavitata sinuue exoritur, qui in ossis cuneum referentis processibus vespertilionum alas exprimentibus inculpitur, quem vbi excesserit, carneus, amplius, & crassus efficitur, ac in internam maxillæ, vbi hæc latissima est, sedem implantatur. Hic sane musculus, vt duo præcedentes, sursum maxillam inferiorem trahit, illamque superiori iungit, & in latera prorsum retrorsumque agit. Verum mandibulario id priuatim committitur, vt mandibularium anterioribus principii partibus contractis inferior maxilla prorsum ducatur, mentumque in anteriora promineat. Posterioribus vero principii sedibus tensis, retrorsum ac velut ad aures maxilla retrahatur, adeo, vt duo hac ratione motus mandibulariorum beneficio peragarur, quibus manducantes indigemus. Atque huic etiam motui suppetias fert temporalis musculus, prout has, illasue sui principii fibras tendit, aut remittit. Deinde mandibulariorum, & in ore delitescentium musculorum opera, in latus maxilla ducitur. Dextro enim mandibulario duntaxat, & sinistro in ore delitescente musculo contractis, maxilla in dextrum latus agitur. At sinistri lateris mandibulario, & dextri lateris in ore delitescente musculo, vna contractionem molientibus, inferior maxilla in sinistrum latus fertur.
- F** Quartus os aperiens vocatus cum suo coniuge, sunt enim vtrinque singuli, maxillam deorsum trahit, gracilisque, & oblongus est, ex prominentibus temporum essum processibus, qui scriptorii styli imaginē referunt, originem ducens. Hinc vtiq; membraneo, latiusculoque capite exortus statim car-

Gal. libr. 11.
de usu part.
cap. 4.
Ves loco citato.

Galen. ibid.

Tempor-
lis seu. alter-
ius lateris
secundus.
Ves. ibid.

Gal. libr. 4.
anx adm.

In ore deli-
tescens seu
alterius la-
teris ter-
tius.
Ves. ibid.

Os aperiens
alterius la-
teris quar-
tus. aut o-
mnium 7.
& 8.

Gal. libr. II. de vſu part. cap. 4. noſus, teretſque fit, ac verſus priora maxillæ, vbi ſummu mentum habetur, procurrēs, interiori eius parti adnaſcitur, & dexter muſculus ſiniſtro hic ad inſertionem vnitur, in ea ſane inferioris maxillæ parte, vbi vel horum muſculorum gratia maxilla exaſperatur, & proceſſulos inæqualiter extuberantes odinet. Hic muſculus vbi in ſe colligitur, os aperit, quemadmodum præcedens claudit, & ductus maxillæ (vt dictum eſt) ad inferiora auctor exiſtit.

De muſculis offis hyoidis. CAP. XI.

Offis hyoidis duplices muſculi.
Gal. libr. 7. de vſu partium cap. 19.
Propriorū munus.
Veſal. libr. 2. cap. 17.
Propriorū numerus.
Propriorū primum par. ſeu lateris primus.
Galenus ibidem.
Secundum par. Veſalius ibidem.
Tertium par.

Muſculorum, qui offi hyoidi, quod in faucibus ſuperiori laryngis ſedi prælocatur, & radici linguæ fundamenti vice, ſuper quod eam moueri oporteat, exiſtit, vt li. bro 1. cap. 16. dictum eſt, committuntur, alii quidem ipſi ſunt proprii, & ſolius huius offis gratia creati, qui omnes ex aliis offibus principium ſumentes, huic offi inſeruntur. Alii autem ex hoc offe prodeuntes, aliis organis famulantur. Qui igitur offi hyoidi proprii ac peculiareſ ſunt, hoc potiſſimum præſtant, ne hyoidis os non admodum ſtabili firmatum baſi, hinc inde ad latera, vel ſuſum, aut deorſum, vel antroſum aut retroſum, conuellatur, & ex ſua ſede præmte dimoueat. Sunt autem ii ad minimum reducti numerum, ſeptem, ad maximum autem octo, vtrinque nimirum quatuor, vt vniuerſi quatuor conſtituant paria. ¶ *Primus* ceteris validior & craſſior, biſidus aut geminus eſt, ſcutiformi laryngis cartilagini, & aſperæ arteriæ in collo exporrectus. Lato namque & carneo principio ex ſumma pectoris offis ſede, ad partem magis internam exoritur, rectaque ſuſum tenſus, ac parem ſemper ipſi origini latitudinem ſeruans, in anteriorem & gibbam hyoidis offis partem inſeritur, carnoſo innexu totam amplitudinem medi officuli, cui hyoidis offis latera firmantur, apprehendens. Huic muſculo ſecundum ipſius longitudinem in medio linea incifa eſt, cuius occasione, ex duobus muſculis ille conſtare non inepte dicitur, ac duorum muſculorum, ſeu vnus paris vice enumeratur. Hi os hyoides deorſum, ſi quando violentius tum a ſuperioribus muſculis, tum a ſcutiformi cartilagine ſuſum vellitur, retrahunt, ſimulq; propugnaculum ſunt, & aſperam arteriam coarcent, & dirigunt. ¶ *Tertius & quartus*, vtrinque enim vnus eſt, iis duobus opponuntur, ampli, breues, ac omni ex parte carnei, a maxilla inferiori, ſub ſummo mento interius enaſcuntur. Hinc procedētes, ac modice arctiores reddit, & deorſum protenſi, hyoidi offi duobus primi contermini inſeruntur, eandem prorsus inſertionis latitudinem, in anteriore offis ſede cum illis exigentes. Hi os hyoides ſuſum, oppoſito duobus primis ſeu inferioribus motu, deinde & modice in exteriora, protrahunt.

Quintus vero, ac *ſextus*, ab vtroque enim latere ſinguli, admodum graciles, teretſque ſunt muſculi, qui ab offis temporis proceſſuum radicibus, quos ſtylum & galli calcaria libro primo, diximus referre, explantari, hyoidi offi inſeruntur, ad latus amplitudinis, quam primi quatuor muſculi occuparunt. Eſt autem hæc regio, vbi offis latera cum medio officulo coeunt. Muſculi hi toto ductu illis muſculis exterius attenduntur, qui maxillam inferiorem deorſum trahunt, qui etiam ab eiſdem ſtylum imitantibus proceſſibus, ſed paulo humilius, quam ii offis hyoidis muſculi oriuntur. Porro iis duobus muſculis, ne os hyoides in dextrum, aut in ſiniſtrum reuellatur, munus conceditū eſt. Præterea illud quoque ſuſum non nihil, introſumq; contrahunt. ¶ *Septimus & octauus* huius offis muſculi, vtrinque enim ſinguli, graciles longique viſuntur. Nullus enim vniuerſi corporis iis ſimul & gracilior & longior occurrit. In medio ipſorum ductu carnei eſſe deſinunt, tendinis aliquoſque naturam oſtendentes, a qua denuo carnei euadunt, ac veluti duos muſculi ventres nanciſcuntur. Principium enim carneum ex elatiori ſcapulæ coſta, iuxta ipſius ceruicem, & proceſſus anchoram referentis radicem obtinent, & ſub muſculo ſcapulam ad occipitium trahenti occulati, ſuſum oblique protenduntur, ſub muſculo a pectoris offe & clauicula, in mammillarem capitis proceſſum inſerito, qui hos hyoidis muſculos adeo comprimit, vt carnoſi ſub illo eſſe deſinant, tendinisque ſpeciem oſtendant, perinde ac ſi digniori illi caput mouenti muſculo cederent. Vbi illum ſuperauerunt, ruſus carnei apparent, quoſque in eam hyoidis offis regionem implantentur, in quam ſextus & ſeptimus inſeritur. Hi muſculi deorſum & vtrinque ad latera hyoides os detrahunt. Hiſ muſculis neruulus applantatur, vbi ſcapulæ committuntur, nequaquam autem vbi hyoidi inſeruntur. Sunt itaque

A itaque octo musculi solius hyoidis ossis occasione efformati, in hoc scilicet, ne hinc inde ex sua sede id turbaretur, fundamentumque plus satis infirmum linguæ, & ipsi quoque laryngi efficiatur. Musculorum vero qui hyoidi ossi proprii non sunt, ex ipso origine in suam mutuantes, quatuor quidem laryngi, alii vero linguæ porriguntur, de quibus mox dicemus.

De linguæ musculis. CAP. XII.

Linguæ quæ Græcis γλώττα dicitur, caro est rava, fistulosa, & mollis. Eius moles ori ad amissimam adaptata cōgruit. Quippe in omnem eius partem pertingit, quod sane si minor esset, haudquaquam potuisset. Neque rursus præ oris angustia impeditur, quod facillime ei accideret ab immoderata magnitudine. ¶ Ceterum quum ipsam in omnem partem promte & ex nostra voluntate moveri conveniebat, qui enim alias masticatio, transglutitio, ac sermo perficerentur? hanc musculosam fieri necesse erat. Quoniam vero ipsam sursum ad palatum attolli oportebat, & deorsum ferri, & ad latera circumagi, postremo antrorsum, retrorsum, & hinc inde reflexam ac in se collectam moveri, operæpretium fuit multos illam habere musculos, qui variorum motuum auctores existerent. Linguam autem fortem & magnam ad basim stabilitatis ac firmitudinis gratia, tenuem vero ad extremitatem mucronemue, ut celeriter moveretur, facta est. ¶ Musculi autem linguam mouentes numero novem sunt, paria nimirum quatuor, & unus promtus differentia datus, quo in omnem partem lingua ipsa promte movetur. Duo quidem sunt recti, & impense crassi, obscureque ab invicem, ac si plures duobus essent aliquot locis discreti, qui maximam linguæ radices partem constituunt, & ex media, superiori-que ossis hyoidis parte, carnei, sed utcunque fungosi principium ducunt, ac secundum linguæ longitudinem protensi, ipsius medio recta inseruntur, quam contracti recta intro, & velut ad posteriora ac deorsum trahunt. ¶ Tertius & quartus, ex duobus superioribus ossis hyoidis ossiculis oriuntur, quæ ad ipsius latera habentur, & ad processus capitis stylum referentes desinunt. Quanquam etiam interdum ii musculi ab humilioribus ossis hyoidis lateribus, quæ superioribus scutiformis cartilaginis processibus colligantur, principium sumant, tunc nimirum, quum superiora ossis hyoidis latera non plane ossea, cum ligamentorum natura aliquid commune nanciscuntur, quod frequenter, & potissimum in mulieribus observatur. Musculi igitur illi enati, & oblique quodammodo procedentes, linguæ lateribus inseruntur. Si horum alter vno remisso laxatoque tendatur, lingua, & potissimum sua radice, in latus deorsum trahitur. At si simul uterque agat, lingua in neutram partem inclinans deorsum, versus interiora quoque movetur. Quintus & sextus, similiter carnosi & utcunque crassi, duobus iam dictis opponuntur, atque a temporum ossium processibus qui styli imaginem referunt, enati, linguæ radici ad iam dictorum fines innascuntur. Hi quoties ambo contrahuntur, versus interiora linguam sursum agunt. At si alter duntaxat in se colligatur, lingua sursum tracta ad alterum latus inclinatur. Septimus & octavus, intorquentes & resupinantes nonnullis nominati, quod scilicet linguam ad inferiora contrahant, & ad latera inuoluant, a lateribus inferioris maxillæ iuxta molarium dentium radicem utrinque lato, & utcunque mucoso principio exoriuntur, linguæ per longitudinem usque ad ligamenti finem quo illa faucibus colligatur, sese inferunt, non quidem prorsus in linguæ medium, sed duorum primorum musculorum latera. Horum altero tantum suas fibras colligente, conspicua ante sectionem linguæ pars in contracti musculi latus conniuet. At utroque latere laborante, pertinaciter lingua faucibus recto motu adigitur. Nonus, carnea quædam moles est, ab interna quoque inferioris maxillæ sede iuxta summum mentum enata. Præsens moles sursum retrorsumque ad fauces ducta, in linguæ radicem amplam insertionem molitur, quemadmodum etiam lato principio originem sumit. ¶ Hæc moles linguam extrorsum agit. Iam enarratorum musculorum historiam, ut alia multa in anatomis, Vesalio nostro acceptam referre oportet. Nam pars librorum Galeni de administranda sectione, in qua linguæ musculos proculdubio recensuit, una cum libris de musculorum sectione temporum iniuria, & hominum incuria perit, aut ab invidis hodie suppressitur. ¶ Porro uniuersum linguæ corpus ante sectionem nobis apparens, ex duobus musculosis corporibus, ligamento, accurrentibus venis, arteriis, & nervis

Musculi hyoidi ossi non proprii.

Linguæ substantia. Magnitudo. Gal. lib. 12. de usu part. cap. 10. Lingua muscularis eget.

Figura.

Musculi linguæ. Vesal. lib. 2. cap. 19. Duo primi.

Tertius & quartus.

Quintus & sextus.

Septimus & octavus.

Nonus.

Vesalii industria.

360 Operum Leonhard. Fuchsi Pars II.

Membrana
linguæ du-
plex.

Fibræ lin-
guæ.

Ligamen-
tum.

Calenibid.

Gal. lib. 7. de
vfu par. c. 11.

Proprii la-
ryngis mu-
sculi 12.

Vfus pro-
priorum.
Propriorū
1. 2. 3. 4.
Vefalius
lib. 1. c. 20.

Propriorū
3. 6. 7. 8.

conformatur, quæ omnia integrit duplex membrana, vna quidem quæ interior est, o-
mnibus musculis communis, altera vero, quæ eius tunicæ pars est, vniuersam oris am-
plitudinem succingens, & eadem continuaque cum interna asperæ arteriæ, ac stoma-
chi tunica existens, priuatimque tertii paris neruorum, *vt lib. 6. clarius dicemus*, cerebri
præcipuas portiones sibi insertas vendicans, quarum beneficio lingua gustatorium in-
strumentum efficitur. ¶ Quum autem ceteri corporis musculi vnicum fere fibrarum
genus, aut rectum scilicet, aut obliquum aut transversum duntaxat obtineant, duo cer-
te hæc musculosa corpora ante sectionem conspicua, triplex fibrarum genus, rectas ni-
mirum, obliquas, & transversas, adepta sunt, quæ inuicem adeo permiscuntur, vt eas in-
ternoscere sit quam difficilimum. Inter has tamen obliquæ transversæque plurimæ in
corporum iam dictorum medio reperiuntur, rectæ vero pauciores sese offerunt, omnes
propemodum in externa eorum superficie excurrentes. ¶ Ceterum ligamentum eius
est id, quod ad palatum reflexa lingua, apertoque ore sub ipsa conspicitur. Magni au-
tem vsus gratia efformatum est. Hinc enim fibræ linguæ firmantur, adeoque ossis vice
datum est. Præterea nisi id esset ligamentum, lingua nimium aliquando retrorsum in se
colligeretur, nec facile exserta intro retraheretur. ¶ Non obtineret etiam stabilem &
firmam sedem, vt quæ vndique esset soluta. Vtroque igitur munere fungitur, nimirum
vt basis linguæ sit firma, & linguæ finis promte, ac libere quoquo versum perueniat.
¶ At si ligamentum hoc paulum progredieretur, & in modicam linguæ portionē pro-
cederet, minus quidem, sed æque fere ac si factum omnino non fuisset, linguæ incom-
modaret. Sin idem longissime progredieretur, & ad plurimum linguæ spiritum perue-
nirer, haudquaquam ad palatum, neque ad superiores dentes, neq; ad alias multas oris
partes lingua extenderetur. Tam igitur exacta & certa est istius vinculi seu ligamenti
commoderatio, vt si vel tantillum adieceris, aut ademeris, totius instrumenti actionem
vitiaueris.

De laryngis musculis. CAP. XIII.

Q Vum larynx siue guttur (*vt lib. 1. dictum est*) ex tribus sibi mutuo copulatis, vt apte
claudatur, aperiaturque, constructa sit cartilaginibus, & quia inspirationis atque
expirationis, totiusque respirationis, inhibitionis, & efflationis, vocisq; occasione mo-
tu voluntario hoc moueri oporteat, merito musculos cartilaginum motores rerum o-
pifex ipsi communicauit, quorum quidam laryngi duntaxat proprii sunt, quidam vero
aliis partibus communes. Proprios humana larynx duodecim obtinet, quatuor qui pri-
mam cum secunda cartilagine connectunt, laryngis rimulam seu lingulam arctantes:
alii quatuor qui secundam tertiæ copulant, rimulam aperiunt: & alii duo, qui primam
tertiæ committunt, rimulā claudentes: & alii duo in basi tertiæ cartilaginis, qua secun-
dæ coarticulatur, sedem habent, rimulam coarctantes ac constringentes. Vt omnibus
hinc palam sit, proprios hos musculos nullo alio nomine ab Opifice rerū esse procrea-
tos, quam vt lingulam laryngis aperiant, claudantue. ¶ Porro priorum quatuor pri-
mam cartilagine secundæ iungentium, ad inferiora laryngis vtrique duo habentur,
in priore ipsius parte versus latera locati. Atque ii breues sunt, sed lati, tenues, ac carno-
si, vnusque alteri incumbit, ac vtrique se inuicem fibris ad X literæ imaginem interse-
cant. Exterior namque ab inferiori primæ cartilaginis sede fibrarum originem ducit,
quæ deorsum oblique in priora procedentes, secundæ cartilagini parti, priora laryngis
spectanti inseruntur. Interior huic subiectus, ac in ortu fibrarumque ductu exteriori o-
mni ex parte similis, a secundæ cartilaginis sede, quæ primæ subiicitur, originem ducit,
primæ cartilaginis huiusmodi sede insertus. Huius fibræ ex postica parte oblique in an-
ticam ascendunt. Quatuor isti musculi, vtrique enim duo sunt, intercostalibus muscu-
lis, de quibus suo dicemus loco, apprimè respondentes, primam, secundamque cartila-
ginem inuicem adducunt, laryngis rimulam (*vt comprehensum est*) clausuri. Ad hunc
sane modum quatuor ii musculi frequenter locantur. Interdum tamen vnus dunta-
xat vtrique reperitur. ¶ Ex quatuor vero musculis secundæ tertiæ committentibus,
duo quoque vtrique habentur: ac vnus quidem exacte in tota posteriori secundæ car-
tilaginis sede, secundum ipsius longitudinem, qua stomachum spectat, locatur, qui car-
neo principio ab infima secundæ cartilaginis parte enatus, ac deinde recta sursum pro-
cedens, tantisper latefcit, donec tertiæ cartilaginis radici, qua secundæ articulatur, ner-
uosa

- A** uosa vtrunque in fertione implantetur. ¶ Huic musculo per secundæ cartilaginis longitudinem, qua fertur, sinus exsculpitur, tantus quidem, vt musculo vtriusque lateris ablato, secunda cartilago in acutam lineam, & veluti dorsi vertebrarum spinam, inibi desinere videatur. Alter musculus nūc dicto contiguus, & omnino carneus, a secundæ cartilaginis sede enascitur, quæ primæ cartilaginis internam regionē respicit, primæq; cartilaginis inferiorem processum admittit. ¶ Ex hac itaque sede ortus, carnosus, latumque principium ducens, ac sursum oblique protensus tertiæ cartilagini inseritur, totam sui lateris tertiæ cartilaginis radicis sedem occupans, a priori musculo non amplexam. ¶ Hi quatuor musculi, tertiam cartilaginem vtrinque ad exteriora laryngis retrorsum euertunt, lingulam aperientes. Atque duo quidem primi posteriorem cartilaginis secundæ sedem occupantes id recto motu præstant: reliqui autem, vt obliquo situ præditi sunt, ita quoq; tertiam cartilaginem in posteriora oblique reuellunt. ¶ *No-* Propriorū
9. & 10.
- B** nus & decimus, qui tertiam primæ copulant, etiam vtrinque sunt singuli lati, & vt ceteri laryngis, carnei. Enascuntur autem inuicem continui ex media primæ cartilaginis sede, secundum totam ipsius internæ sedis longitudinem. Hi velut triplex sui principium ostendūt, propter quasdam ipsorum inscriptiones adeo illis impressas, vt harum occasione quilibet eorum triplex esse musculus videatur. ¶ A principio oblique sursum ascendunt, & tertiæ cartilaginis partis anteriori sede implantantur. Duobus iis tertia cartilago primæ adducitur, illorumque beneficio duæ tertiæ cartilaginis partes, contractis nimirum musculis conuiuent, ipsaque lingula horum potissimum auxilio comprimitur. ¶ Hi sane musculi omnium totius corporis cum temporalibus, pro ipsorum mole, validissimo funguntur munere, quum tot musculis expirationem molientibus, in spiritus retentione opponantur, quanquam & huc quoque reliqui laryngem arctantes musculi faciant. ¶ *Vndecimus & duodecimus*, in basi tertiæ cartilaginis cōsistunt, Propriorū
11. & 12.
- C** ea nimirum regione qua stomacho larynx committitur, tertiaque cartilago secundæ coarticulatur. Sunt autem ab utroque latere singuli, qui ex radice tertiæ cartilaginis, qua hæc primæ proxima est oriuntur, & secundum basim tertiæ cartilaginis modice sursum protensi, ad tertiæ cartilaginis medium, vbi duæ inuicem partes colligantur, finiunt, se mutuo inibi contingentes. Sunt etiam breues, & exterius quodammodo pyri modo rotundi, intus vero omni ex parte cartilagini tertiæ cōnati, & vbi se inuicē contingunt, latiores, crassioresque sunt, quam statim in ipsorum exortu. Ambo musculi tertiæ cartilaginis basim constringentes, atque duas eius cartilaginis partes inuicem comprimentes, lingulam claudunt arctantque. ¶ Ex duodecim itaque laryngis propriis musculis octo laryngem claudunt & arctant, quatuor scilicet primam secundæ cartilagini necantes, & duo primam tertiæ committentes, ac demum duo in basi tertiæ repositi: quatuor vero ipsam referant & aperiant, illi nimirum qui tertiam secundæ necant. ¶ Ceterum communes sex musculi, qui laryngē ipsam corporibus quæ sunt in circuitu colligant, alterius motus duces sunt, per quem totus spiritalis meatus lingulae amplificatur, & comprimitur. Horum primi duo, vtrinque enim singuli, ex tota propemodum inferiori hyoidis ossis sede principium ducunt, ac lati & carnei, & in-
- D** ternis lateribus inuicem proximi, contiguique videntur. Hinc deorsum protensi, & mutuo internis lateribus abscedentes, singuli in sui lateris inferiorem primæ cartilaginis sedem implantantur, tanta latitudine atque ipsorum originum est latitudo. Hi musculi primam cartilaginem a posterioribus sursum quodammodo abducentes, meatum rimulamue dilatant. ¶ Ad præsentium musculorum insertiones, quæ non minus quam eorum origines carneæ existūt, alii duo musculi æque propemodum ampli primæ cartilagini implantantur, ab interiori regione ossis pectoris in iugulo carnis, sed non latis principiis pronati, qui sursum secundum anteriorem asperæ arteriæ partem protensi, ac sensim latiores reddit, primæ cartilagini inseruntur. Hi prioribus contrariam functionem adipiscuntur. Nam primæ cartilaginis humiliores partes contrahunt, easdemq; deorsum vellūt, non nihil vna cōtrahentes, ac constringentes asperam arteriam, ne quicquam in ea re dupliciter, neque etiam plurimum dilatetur, quam animal vocem edit.
- E**
- F**

Quintus & sextus communium laryngis musculorum transuersi sunt, & ipsorum vtrinque singuli habentur gulæ amplexantes. Hi enim ex stomachi, gulæue posteriori-

re parte vertebraſ ceruicis reſpiciente, ſecundum gulę longitudinem enaſcuntur, adeo
 inuicem continui, vt vtrorumque muſculorum idem vnumque principium eſſe pro-
 pmodum dixeris. Hinc ampli & carnoſi verſus priora protenſi, lateribus primę carti-
 laginis ſecundum ipſorum laterum longitudinem inferuntur, tota amplitudine qua
 gulam contingunt, impenſe ipſi cōnati, & continui. Hi quidem ad poſteriora contra-
 hunt primę cartilaginis latera, ſecundę eam ita applicantes, vt lingulam quoque coar-
 ctent. Pręter hos ſex alii duo ſunt propemodū teretes, ac ex media interiori offis hyoi-
 dis ſede explantati, & vtrinque ſinguli, radici eius corporis quod laryngis cenſetur o-
 perculum inferri. Munus illorum eſt, vt epiglottin, ſeu laryngis operculum cibis potu-
 que depreſſum denuo eleuent. ¶ Quippe ipſorum principiis verſus os hyoides tractis
 operculum illud erigi videtur. Galenus horum muſculorum nō meminit. Quanquam
 enim hos octo eſſe dixerit, tamen interim ſex tantum deſcripſit. ¶ Ceterum muſcu-
 los qui duobus iam dictis oppoſito munere fungerētur Natura nullos creauit, eo quod
 cibus & potus ſua mole euerſum eleuatumque laryngis operculum facile comprimant.
 ¶ Quinetiam ipſummet pondere ſuo grauatum, laryngi prompte applicatur. ¶ Porro
 larynx peculiare ligamentum prorsus nullum obtinet, pręter membrana articulos or-
 biculatim cingentia. Deinde in ipſius etiam medio lingula, rimulaue, ſeu fiſſura conſi-
 ſtit, quę Gręcis (vt cap. ult. prioris libri dictum eſt) γλωττις appellatur, quę ex cartilaginum
 articulatione, & pręcipue tertię cartilaginis partibus, quę primam cartilaginem acutis
 proceſſibus ſpectant, mox & eas colligante ligamento, & pingui totam laryngem ſuc-
 cingente tunica.

De muſculis caput mouentibus. CAP. XIII.

Vefa. lib. 2.
 cap. 28.

Primū par
 muſculorū,
 aut caput,
 aut primā
 vertebram
 mouentiū.
 Gal. lib. 4.
 ana adm.
 Forma hu-
 ius paris
 triangula-
 ris.

Secundum
 par admo-
 dum variū.

In numerum caput mouentium muſculorum illi quoq; reſciuntur, qui primam cer-
 uicis vertebram priuatim mouent. Vt enim eleuato brachio cubitus vna attollitur, ac
 eques cum equo promouetur: ita quoq; motū ceruicem caput neceſſario ſubſequitur.
 Ac proinde quorū propriis motib. ceruix agitur, totidē etiam ſecundariis caput mouet.
 ¶ Sunt autē vniuerſi muſculi iam dictis motib. ſeruietes: paria ſeptem, q; nimirum vtro-
 biq; totidem enumerantur muſculi. Sex vero horum muſculorum paria in poſteriori
 ceruicis ſede locata, partim capitis, partim primę ceruicis vertebrę motib. famulantur.
 Duo poſtrema in anteriore ſede collocantur. ¶ Primum itaq; capitis muſculorū par, v-
 trinque n. ſingulis conſtat muſculis, ex quinq; ſuperiorū thoracis vertebrarum ſpinis e-
 naſcitur, ſenſimq; extrorſum oblique aſcendens, occipitis offi inferitur. ¶ Ceterū illius
 muſculorum ab inuicē reſeſſus, forma triangularis exatē viſitur, ſi modo vnā lineam
 tranſuerſim ad occipitium, ab interno vnus muſculi latere, ad internum latus alterius
 duxeris, & deinde alias duas ab eius lineę terminis, ſecundū vtriuſq; muſculi internum
 latus ad tertię ceruicis vertebrę ſpinam veluti trianguli verticem porrexeris. ¶ Rurſus
 ſinguli muſculi triangulari forma cōſtant, ſi lineā ſecundum ſpinę longitudinē ad oc-
 cipitium vſq; ductam vnus lateris loco habueris, & ſecundi lateris vice lineā ſecundum
 externū muſculi latus exporrectā, & tertii lateris loco lineā q̄ tranſuerſim muſculi in-
 ſertionem ad occipitium deſcribit. Fibrę horum muſculorū a ſpinis vertebrarū ſurſum
 oblique, quaſi ad tranſuerſos ſuperiorū vertebrarum proceſſus tantisper ducūtur, dum
 ſimul omnes in occipitium ſiniant. Pręſentes n. muſculi modicam prorsus & exiguam
 in tranſuerſos vertebrarum proceſſus inſertionem moliantur. ¶ Secundū muſculorum,
 par, q; non duobus, ſed pluribus efformari videtur muſculis, variumq; admodū conſpi-
 citur. Apparent enim quam plurimi vtrinque muſculi, ſerie multiplici inuicem com-
 miſti, & occipitio inferri. Non tamen eodē omnes modo principium ducunt, & inſer-
 tionem moliantur. Illico enim atq; primum muſculorum par ſubducitur, muſculus oc-
 currit, qui acutum principium ex medio tranſuerſorum quartę & quintę thoracis ver-
 tebrę proceſſum educit, & ſtatim ab exortu carneus apparens, muris & laterę for-
 mam adipiſcitur. Quum vero ſurſum ad ceruicis initium perrepat, carnoſus eſſe deſi-
 nit, ac veluti in teretis tendinis naturā ceſſat. Qua vero ceruicis radicē ſuperat, carno-
 ſus denuo eſſe incipit, quouſq; in occipitii medium inferitur. Verum priuſquam inferi-
 tur, cum ipſo alius coit muſculus ex ſeptimę ceruicis vertebrę ſpina neruo teretique
 principio enatus, qui ſurſum aſcendens, carnoſus quoque euadit, dictoq; muſculo ante
 ipſius in occipitium inſertionem cōmiſcetur, vna cum illo in occipitium implantatus,

Atque

A Atque in hac insertione dextri lateris musculi sinistri lateris musculis contigui sunt, neque ab inuicem, vt primum par, remouentur. Alius deinceps occurrit, qui veluti alterius lateris tertius esse possit, ac ex apice transuersi secundæ thoracis vertebræ, & primæ etiam processus, partim carneus, partim nerueus, enascitur, & sursum versus exteriora oblique ex porrectus carneusue, ac latior redditus, occipitio ad radicem mamillaris processus valde inseritur. Subiis magna moles carnea consistit, quæ a transuersis vertebrarum processibus oblique sursum ad spinas ex porrecta occipitio inseritur, fibras obtinens ab exterioribus sursum intro oblique repentes.

Atque huiusmodi secundum musculorum par in homine existit. Nunc autem cuius integrum erit vtrinque in hoc pari quatuor musculos collocare, primum scilicet, secundum & tertium, tres illos ante carneam molem enarratos, & quartum, ipsam carneam molem. Præstat tamen vt vnicum tantum ex iis omnibus, & vnum duntaxat vtrinque musculum statuamus, quum cetera paria duobus duntaxat conformentur musculis, & omnes huius secundi paris musculi eiusdem functionis gratia procreati sint. Hoc enim par, vt primum quoque capitis, & obscure admodum, cervicis quoque extensionem, aut in posteriora ductum perficit. Si itaque musculi vtriusque lateris tendantur, caput rectissime extendent. At si alternatim, seu ex altero duntaxat latere egerint, circumuersionis capitis motui famulabuntur. ¶ *Tertium par* duobus gracilibus constat musculis, neutiquam prædictis mole respondentibus, qui ex secundæ cervicis vertebræ spinæ extremo enascuntur non admodum neruei, sursumque extorsum parumper oblique porrecti, in occipitii medio teretes inseruntur, in ipsa insertione minus, quam in ortu inuicem contigui, ab ipso enim non nihil oblique sursum (vt comprehensum est) ducuntur, sensum mutuo abscedentes. Hi simul tendantur, caput quoque in posteriora solum agunt. At si alter tantum in se colligatur, ductus ratione, circumuersionis capitis, vt duo priora paria opifex erit. ¶ *Quartum par* sub tertio occultatur, illi quæ ad substantiam, formam, ductumque attinet simile. A posteriori n. primæ vertebræ sede, vbi aliæ in spinam desinunt, vtrinque ad tuberculi processusue eius latera vnus enascitur musculus gracilis, & omnino carneus. Ambo huius paris musculi in exortu contigui sunt, at sursum porrecti, modiceque ab inuicem remoti occipitio inseruntur. Hoc par extensioni capitis præfectum est. ¶ *Quintum par* forma & substantia duobus prædictis paribus respondens, iuxta externum latus tertii paris ab occipitii osse principium obtinet, atque illinc deorsum oblique descendens in apicem transuersi primæ cervicis vertebræ processu inseritur, dexter quidem musculus in dextrum processum, sinister vero in sinistrum. ¶ *Sextum par* a spina secundæ cervicis vertebræ exoritur, & oblique sursum procedens, in transuersum quoque primæ cervicis vertebræ processum implantatur, pari prorsus cum quarto pari ratione & forma. Sunt enim vtriusque paris musculi oblongi, carnei, & paulo minus toto teretes ac graciles. ¶ Porro quinti & sexti parium munus est, vt primam cervicis vertebram vna cum capite supra secundam circumuertant, & in gyrum ducant. Vtriusque enim paris dextris musculis ad suum principium contractis, prima vertebra in posteriora sinistrorsum circumuertitur: sinistris autem laborantibus, in posteriora dextrorsum motus perficitur. Atque adhuc modum posteriores capitis musculi, qui numero duodecim sunt, nisi in plures duobus musculis secundum par diuiseris, habet. Anteriores vero hac ratione. ¶ *Septimum par* insignius est, vtrinque enim a pectoris ossis media summa regione, & clauiculis qua illi ibidem coarticulatur, vnus amplo & neruoso, membraneoque capite musculus prodit, quod oblique versus superiora procedens, carnosum densumque & paulo latiore, quam profundiore efficit musculum, qui carnosus admodum sine, mamillari in temporis osse processui inseritur, illum sui amplitudine vniuersum amplexus. Ambobus iam dictis musculis tensis contractisque, caput in anteriora, siue rigida, siue inclinata ceruice flectitur. Quum autem alternatim laborant, circumuersionis auctores efficiuntur. Si enim dexter duntaxat contrahitur, caput in anteriora sinistrorsum circumuertitur. Sinistro autem solum laborante, caput in anteriora dextrorsum circumagitur.

De capitis & primæ secundæque cervicis vertebrarum ligamentis. CA. P. XV.

Q Vando quidem primam cervicis vertebram capiti copulari necessum fuit, merito vniuersum articulum ambiens ligamentum, quod & ceteris articulis commune censetur,

capiti com-
mittens.
Gal. libr. 1.
de vtu part.
cap. 4.
Secundam
vertebram
capiti con-
nectens li-
gamentū.
Gal. libr. 4.
ana. adm.
Ligamentū
transuersum
denti ob-
ductum.

validum robustumque Natura procreauit, rarum tamen nihil, aut peculiare, præter ro-
bur crassitiemque, id ipsum adipiscitur. Quod vero secundam cervicis vertebram capi-
tis ossi committit, teres ac validissimum est, & cartilaginis naturam participat. Hoc ex
vertice secundæ cervicis vertebræ seu dentis ortum, occipitis ossi inseritur, qua ante-
riorem foraminis regionem, quo dorsalis medulla elabitur, constituit. Id ligamentum
firmissime secundam vertebræ occipitis ossi colligans, vna cum dente veluti axem effor-
mat, secundum quam caput primæ vertebræ inreruentu in gyrum ducitur. ¶ Verum ne
dens ille internam primæ vertebræ sedem occupans, & dorsali medullæ ibidem prælo-
catus, quandoque ex suo sinu in vehementioribus capitis motibus deuict luxeturue, at-
que tunc dorsalem medullam comprimat, aut frangat, aliud ligamentū egregie robu-
stum, nervosumq; rerum Opifex creauit, quod ex vno latere interioris regionis primæ
vertebræ prodiens, alteri lateri inseritur, posteriori dentis sedi transuersim obductum.
Hoc certe ligamentum quod inter dentem, dorsalemq; medullam locatum est, aptissi-
me dentem in sibi priuatim exsculpta cavitare, ne vacillet, luxeturque, continet, dorsa-
liq; medullæ firmissimum & rurum propugnaculum efficitur, & interim quo minus
prima vertebra simul cum capite super secundam circumuertatur, haudquaquam pro-
hibet. Reliquum est aliud adhuc ligamentum primam vertebram secundæ colligans,
membraneum quidem, & eiusdem cum ambientibus ceteros articulos ligamentis na-
turæ & vsus. Necesse enim erat primam secundæ articulari. Si enim vna hæ vertebræ ca-
pitis ossi ad nascerentur, prohiberetur sane motus mutuos. Ea namq; quæ quiescit, velle-
ret ac detineret agentem, nunc autem vicissim vtraq; potest suo motu agi, alia interim
sua sede firmata.

De musculus dorsum mouentibus. CAP. XVI.

Quot mo-
ribus dor-
sum agatur.
Vel. lib. 2.
cap. 38.
Sedecim
dorsum mo-
uentes mu-
sculi.
Primum
par.

Quatuor in vniuersum simplices sunt dorsii totius motus, flexio scilicet, extensio, ad
dextrum & sinistrum latus inclinatio. Ad hos autem obcūdos motus musculorum
operam requirit, qui omnes vtriusque lateris simul in minimum numerum redacti sunt
sedecim, octo nimirum Paribus cōplexi. ¶ *Primum par* a quintæ thoracis vertebræ cor-
poris lateribus, vbi ipsi costis coarticulantur, principium sumit, quod carneum, tenue-
que, & acuti instar anguli visitur, & sursum oblique ad primam vsque cervicis vertebram
conscendens pertingit, gulæ subiectum. Hinc est quod veteres hos duos *musculos sub*
stomacho, gulaue latitantes appellasse videntur. Hi in exortu tantum ab inuicem distant,
quanta corporis vertebræ est latitudo. Atque hanc seriem, vt scilicet ex inferioris ver-
tebræ corporis latere, principium seu explantationem ducant, atque magis versus me-
dium superioris vertebræ corporis intertionem moliantur, perpetuo seruant, quousq;
sensim mutuo appropinquantes, ad anteriorem primæ cervicis vertebræ sedem vsque
conscēderint, cuius ibidem extuberanti processui nervosa insertione simul ambo co-
eunt, tanquam trianguli vertice inseruntur, non admodum manifeste in occipitis
ossi, ad anteriorem dorsalis medullæ foraminis sedem implantati. Duobus his musculis
cervix proprio motu, & obscure caput ipsum, dorsique superior pars flectitur. Si enim
vtriusque musculi partes simul omnes egerint, recta efficietur cervicis flexio, vertebris
scilicet mutuo sese succedentibus. At si alteruter tantum in se colligatur, in cōtracti la-
tus cervix inclinabitur. ¶ *Secundum par* a prima thoracis costa carnosum, amplumque
pronascitur, sensimque arctatum internæ transuersorum omnium cervicis vertebra-
rum processuum sedi inseritur, fibras sursum oblique intro producens. Triangularum
autem figuram hoc par musculorū plane refert. Huicque pari id priuatim obigit, quod
foramine peruium sit, quo axillari venæ, & arteriæ in brachium excurrentibus, iter ex-
hibet. Huius functio est vt cervicem in latus, sed magis antrorsum inclinet. ¶ *Tertium*
par principium in dorso assumit ex transuersi sextæ thoracis vertebræ processus radice,
ad primum eius vertebræ posterioris processus seu spinæ exortum. Hinc ascendens ex
reliquarum quinque superiorum thoracis vertebrarum transuersis processibus enasci-
tur, sensim crassior validiorque redditus, quousque admodum pertinaciter in exter-
nam sedem transuersi processus septimæ cervicis vertebræ inseratur. Huic enim pri-
mum implantatur, & deinde reliquarum omnium cervicis vertebrarū transuersis pro-
cessibus, ad exteriorem eorundem sedem, etsi inuolidam, insertionem molitur. His
duobus musculis cervix in posteriora ad latus magis inclinatur, recto quidē ductu, vtrius-
que mu-

Secundum
par.

Tertium
par.

- A** que musculis, vna laborantibus: obliquo autem, alterutro duntaxat se colligente. *Quartum par* a septimæ thoracis vertebræ spinæ radice, deinceps & a reliquarum succedentium vertebrarum spinarum quoque radicibus, vbi inuicem vertebræ articulantur oritur. Vbi sensim ad ceruicem exporrectum, infimam ceruicis vertebram contingat, a reliquorum subinde transuersorum processuum radice noua semper initia educens, perpetuo fibras, spinæ superioris vertebræ tantisper inferens, donec validissime in totam inferiorem spinæ secundæ ceruicis vertebræ sedem inseratur, dexterque musculus sinistro coniungatur, vti & toto per ceruicem progressu mutuo accumbunt, hærentque, duntaxat vertebrarum spinis inuicem diremti. Horum musculorum fibræ, non prorsus recta sursum cõscendunt, verum ab exterioribus sursum modice intro feruntur, quare etiam obliquis motibus præsumt. Si enim vterque contrahitur, recta ceruicis peragitur extensio. Sinistro autem laborante, & quiescente dextro, sinisterum extensio fiet, & vice versa. Atque hi omnes musculi, ceruicis potissimum famulantur motibus, ac inter musculos caput mouentes subinde recensent, etiam si caput secundo duntaxat mouent. *Quintum par* vtrinque etiam habet musculus, ab ilium ossis cavitatis posteriori, superiori; sede, quæ e regione superioris sedis primi sacri ossis transuersi processus est, deinde ex totâ illa ossis sacri quoque parte, carneo crassoque admodum principio pronatum, in transuersos lumborum vertebrarum processus, & infimam thoracis costam inseritur, figuraque quadrangulum existit. Hi musculi ex illorum musculorum numero habentur, qui Græcis *ῥοι*, & *νευρομήτρες*, & *ἀλώπικες* dicuntur. His inferioris dorso partis, lumborum scilicet vertebrarum flectendi munus concreditum est, ipsique ambo duntaxat illius motus auctores sunt. Sed quum horum vtrinque (*ut comprehensum est*) vnus consistat, & is obliquis donetur fibris, præsentibus musculi obliquam quoque flexionem molientur, prout hic, illeue solus in se colligitur. Sola itaque inferior dorso pars, proprios musculos flexionis opifices habet. *Sextum par* ex longioribus totius corporis musculis est ab infima sacri ossis sede incipiens, & deinde ex spinis quinque vertebrarum lumborum, nerueo validoque admodum principio enascitur. Hinc sursum ascendens carnosius paulatim ad externum ipsius latus efficitur, transuersis lumborum vertebrarum processibus insertum, ac veluti teretis musculi imaginem exprimens. Externa ipsius sede laue, æqualeue est, interna autem parte, propter suæ carnosæ partis crassitiem, & neruosa tenuitatem, secundum ipsius longitudinem sinus quodam modo illi incisus videtur, quo decimo tertio musculo cedit, & locum porrigit. Vbi verò ad vndecimam thoracis vique vertebram conscendit arctius longe redditum, neque reliquis superiorum vertebrarum spinis adeo connatum, sensim ad primam vsque thoracis angustius efficitur, transuersis omnibus thoracis vertebrarum processibus innixum, quibus singulis ex interna sua sede, tendinem instar ansulæ cuiusdam insertum dispargit. Huius partis ambobus musculis contractis, tota illa dorso pars, cui præsentibus musculi inseruntur, in neutrum latus vergens, extenditur. At alterutro tantum protenso in ipsius latus spina mouetur. *Septimum par* sub sexto occultatum a posteriori sacri ossis sede acutum principium ducens, ac sursum ascendens modice latius redditum, ad vndecimam vsque thoracis vertebræ spinam conscendit, omnibus intermediis spinis assertum, & gracilius tenuiusque factum, inibi ad vndecimæ thoracis vertebræ spinam in acutum finitur angulum. Præsentibus duo musculi inuicem contigui sunt, inuicemque committuntur. Vtriq; enim sese inter spinarum interualla insinuantes internis lateribus inuicem committuntur, tantum ab inuicem dehiscences, quanta est ligamenti crassities, quod inter spinarum interualla reponitur. Horum musculorum fibræ ab inferioribus sursum versus interiora oblique assurgunt, & ex inferiorum vertebrarum transuersis processibus, & spinarum radicibus enatæ in totam superiorum vertebrarum in posteriori sede amplitudinem perpetuo sese inserunt. Quocienscunq; igitur vtriusque lateris musculus in se colligitur, suasque fibras contrahit, lumborum vertebrarum, et si quæ thoracis sub vertebra vtrinque suscepta reperiuntur, spinæ ad se inuicem conuiuent, earundemque interualla constringuntur adeo, vt simul contracti musculi totam illam spinæ partem cui committuntur, appositissime extendant. At altero in se tantum collecto, in obliquum hæc dorso pars extenditur. *Octauum par* ab vndecima thoracis vertebra ad primam vsque ipsius protenditur, totam spinarum amplitudinem, quæ ab ipsarum radice ad apicem vsque consistit, amplexans,

Quartum par, vel 7. & 8.

Quintum par, vel 9. & 10.

Gal. lib. 4. anat. ad. ministr. Iulius Pol. lux. libr. 2.

Sextum par vel 11. & 12.

Septimum par vel 13. & 14.

Octauum par vel 15. & 16.

illis ita committitur, ut septimum par illis quibus adnascitur spinis. Hi duo musculi ad duodecimam thoracis vertebra[m] tenues sunt, ad sursum exporrecti paulatim crassescunt, quousque ad quintam thoracis vertebra[m] spinam ascendunt. Hic enim tota sua mole crassiores euadunt, & sursum tensi, denuo extenuantur. His quoque musculis interualla spinarum opplentur, & inuicem ibi contigui sunt, quum inter illos nihil mediet, præter membraneum ligamentum a superiori spina, in inferiorem porrectum.

Functio horum musculorum præcipua est, spinas quibus inferuntur mutuo colligere, atque ita eam dorsi partem cui adnascuntur cum reliquis musculis extendere. Sed ut præsentibus musculi inter reliquos dorsi motuum auctores rectis fibris magna ex parte donantur, ita quoque ipsi admodum modice obliquis motibus præsent.

De vertebrarum ligamentis. CAP. XVII.

Ligamenta
vertebrarum
corpora com-
mittentia.
Vesalius li.
2. cap. 40.
Cap. 8. libri
de ossibus.

Ligamenta primam vertebra[m] capiti, & secundam primam, & secundam rursus capiti colligantia supra enarrata sunt. Quæ autem reliquas vertebra[s] inuicem committunt, nunc ostendemus. Inter secundam itaque & tertiam vertebra[m] ceruicis, ac deinceps inter reliquarum omnium vertebrarum corpora cartilagineum quoddam ligamentum, quod Galenus *cartilaginem* vocat, vertebrarum corpora interueniens existit, quod a veteribus dissectionis proceribus *νευροχονδρῶδες σύνδεσμον* appellatum est, cuius interuentu vertebrarum corpora colligantur. Sed & aliis adhuc ligamentis vertebrarum corpora committuntur. Per totam enim dorsi longitudinem validissima ligamenta tori vertebrarum corporum ambitui obuoluuntur, quæ etsi vndique crassa spissa, & robusta, sed mucoso interim humore oblita sunt, attamen in anteriori corporis sede ad utrumque latus, ob sui crassitiem conspectiora euadunt. Hæc quidem obstaculo sunt, ne in extensione dorsi nimium porrigatur incutieturue. ¶ Si enim dorsi plurimum reflecteretur, gulæ, arteriæ magnæ, & cauæ venæ fuisset summe noxium, plerumque enim hæc extensa frangerentur. Et si plus satis laxa, & ad extendendum prompta hæc Natura creasset, in dorsi flexu in se complicarentur. Est itaque ligamentum hoc, si vnus nomine omnia complecti velis, ita in duritie temperatum, & suo mucore imbutum, ut tantum extendi dorsi permittat, quantum homini sit ex usu, & ut toto simul vertebra[s] colligeret, & spinam ex tot ossibus conformatam vnus corporis modo efformet. ¶ Rursus ex singulis transuersis processibus in singulos, membraneum ligamentum tota interualli amplitudine porrigitur. ¶ Sicut etiam in spinarum interuallis, ab vna spina ad alteram, membranea ligamenta continentur, spinas inuicem colligantia. At in vertebrarum apicibus hæc membrana adeo crassescunt, ut ad apicem simul coeuntes quasi toti dorsi spinæ ligamentum constituent, cartilaginis etiam Naturæ compos. Deinde vbi ascendentes vertebrarum processus descendentes coarticulantur, membranea quoque ligamenta articulum vndique ambiunt.

Galenus li.
12. de usu
par. c. 15.
ligamenta
aliis sedib.
quæ ad cor-
pora verte-
brarum pos-
ita.
Vesalius
ibid.

At priuatim quoddam, idque subflauum ligamentum, omnibus corporis ligamentis si non robustius, profecto saltem non inualidius, inter singulas vertebra[s] habetur. Ex interna enim sede foraminis vertebra[m] quod spinali medullæ exsculptum est, ad radicem spinæ posteriorisue vertebra[m] processus inter duos ascendentes, aut descendentes processus ligamentum exoritur, quod semper in subsequenti vertebra eandem inferitur sedem.

De musculis brachium mouentibus. CAP. XVIII.

Brachii mo-
tus quot.
Vesalius li.
1. cap. 23.
Primus bra-
chium mo-
uentium.

Brachium antrorsum ad pectus, & retrorsum versus dorsum, & sursum ad ceruicem caputq; & deorsum ad thoracis latera mouetur: & præter hos motus quodammodo in gyrum quoq; agitur. Ad hos itaq; obeundos motus septem Natura creauit musculos. ¶ Horum primus a media clauiculæ sede pectoris ossis proxima, & pectoris ossis latitudine, & ipsi insertis cartilaginibus, deinde quoq; ex septimæ & octauæ costæ cartilaginibus enascitur, ac quodammodo in angulum arctatur. ¶ Principii pars a clauicula procedens omnino carnosæ apparet, quæ vero ex pectoris ossis secundum dextrum sinistramq; medio pascitur, alteriusq; lateris musculi initio cõtigua est, neruosiior, membranosiorq; & minus crassa visitur. Quæ vero ex ossis pectoris latere, ipsique in articulis cartilaginibus enascitur, penitus iam carnosæ existit. Quæ vero priuatim ex septimæ octauæq;

F

- A** octauæque costarum cartilaginibus iuxta mucronatam cartilaginem exoritur; membrana, & tenuis aliquousq; conspicitur. Ex iis principiis prodiens, & paulatim crassior redditus, sensim arctatur, atque in acutum tantisper procedit, quousque amplo & neruo, admodumque robusto, sed breui tendine, humero seu brachii ossi secundum ipsius longitudinem inseratur. Fit vero tendinis huius insertio subter humeri capitis ceruicem, in interiore ipsius regione, nonnihil interim in priora vergens. Huius musculi fibræ inuicem variant, & paulo ante tendinis productionem, adhuc in carnea musculi parte, deinde & secundum totam tendinis amplitudinem ad X. literæ similitudinē sese decussatim intersecant. Hic certe musculus aliis atque aliis pectoris regionibus brachium admovent. Si enim superioris ipsius fibræ a clauicula, & superiori pectoris ossis sede eductæ contrahantur, versus pectoris superiora, & clauiculam brachium adducitur. Si vero inferioris fibræ tendantur, humilioris brachii ad pectus adductionis fit opitex. Si quidem ad mucronatam cartilaginē, & spurias costas brachium allicietur. Sin utraq; laborauerint fibræ in neutram partem brachium inclinans pectori adigent. ¶ *Ceterum* quum hic musculus amplum, atque ex variis natum ossibus principium obtineat, & fibras sese intersecantes, contrariaque serie ductas, & adhuc motus etiam differentes adipiscatur, nihil obstat, ipsum geminum pronuntiare, ac duorum loco cum aliquot anatomicis enumerare, quanquam vnus duntaxat vice nobis recensatur. Et præter hunc musculum nullus alius brachium pectori admovent. Nam quem Galenus inter brachii musculos primum enumerat, & brachium ad pectus adducere scribit, in summa abundat, atqui in homine neutiquam reperitur. ¶ *Secundus brachium mouens musculus* ex medio clauiculæ parte secundum ipsius longitudinem, quæ scapulam spectat, musculo pectori adducendi brachium contiguus, & dein, ex summo humero ubi is clauiculæ committitur, & tota quoque scapulæ spinæ regione principium nerueam sumit, quod vix bene prænotatum ilico carnosum, crassumque admodum, & extuberans efficitur. Mox a principio carnosus permanens sensim in angustum, tanquam in trianguli verticem tantisper porrigitur, donec humero tendine amplo, & ex carne neruosaq; substantia misto robustoq; ad humeri ossis latitudinem non modice sub ipsius ceruice implanteretur. Totus quidem hic musculus, si quis illum obiter intueatur, trianguli imaginem præ se fert, ac proinde a similitudine Græcis, *Δελτοειδής* est appellatus. Quem admodum etiam ob id quod humeri, brachiiue ad scapulam articulo, quem *δύοι* Græci nominant, insternitur, illumque quodammodo regit, *Επωμύς* idem musculus a dissectionum peritis vocatur. Hic brachium ad superiora attollit. Si enim musculi pars quæ a clauicula principium ducit tensa fuerit, brachium sursum ad anteriora colli, & faciem attolleretur. Si vero fibræ a summo humero, & clauiculæ sede ipsi commissa originem ducentes contrahantur, brachium recta, & in neutram partem vergens assurgit. At si posterior musculi pars, ex scapulæ spina prodiens in se colligatur, ad posteriora ceruicis, ipsumque occipat brachium agetur. ¶ *Tertius* carneo principio ex inferiori scapulæ costa prodit, ex medio enim costæ illius longitudine, basi scapulæ propinqua, & ab externa gibbae humilioris basi eius anguli sede, continua, carnosaque origine prænotatur. Ad medium igitur longitudinis inferioris costæ, a scapulæ osse hic musculus secedit, & modice sursum in priora tensus humerum accedens, in validum breuemque, sed latum tendinem cessat. Is musculus brachium recta ad dorsum agens, contrario munere illius musculi fungitur, qui omnibus suis contractis fibris brachium pectori admovent. ¶ *Quartus* magnus quidem est, admodumque latus musculus, qui a spinarum apicibus, quæ a sexta thoracis vertebræ spina ad ossis sacri usque medium habentur principium sumit. Quod ubi musculos dorsum mouentes perreptauit, eamque costarum regionem contingit, quæ maxime in dorso, versus posteriora extuberat, carnosum, densumque efficitur, & vniuersus musculus ad eum modum auctus in angustum tantisper procedit, donec tendinem latum, validum, sed breuem humero, inibi ubi tres commemorati musculi insertionem longe sub ossis capite scapulæ articulo moliuntur, inserat. ¶ Hic musculus itidem triangularis est, sed plane inæqualibus conformatur costis, ac duas quidem longissimas habet, vnā quæ secundum dorsi longitudinem porrigitur: alterā quæ ab osse sacro per ilia, & inferiorem thoracis partem, sursum ad tendinis insertionē cōscendit. Tertia costa a sexta tho-

Axillariū
cauitas,
ſeu vallū.

racis vertebræ ſpina ſuper angulum ſcapulæ, quem baſis humilior pars oſtendit, ad in-
ſertionem rēdinis vehitur. ¶ Atq; hæc tranſuerſim quodam modo repens, reliquis dua-
bus coſtis multo breuior eſt. Muſculus iſte motus brachii deorſum opifex eſt, nō quidē
id ſimplici motu, ſed cōpoſito, pro fibrarū varietate, præſtans. Quippe prout ſuperiores
fibræ, aut inferiores in ſe colligunt, contrahūturue: ita quoq; deorſum, nūc ad ſuperiora,
nunc ad inferiora, brachiū verſus dorſum deprimitur. ¶ Ceterū inferior primi muſculi
brachiū adducentis ad pectus pars, & inferiores fibræ præſentis quarti deprimentis bra-
chium, axillæ cauitatē efformant. Atq; has duas partes Hippocrates *in lib. de articulis* ten-
dinū nomine nuncupauit, quemadmodū & veteres, qui ēt tendines vocarūt muſculos
Quintus. occipitis oſſi connexos, ac in medio foueam efformantes. ¶ Quintus vniuerſum ſcapulæ
ſinū, qui inter ſuperiorē ſcapulæ coſtam, & ipſius ſpinam, ſeu magni illius proceſſus ra-
dicem, viſitur, occupat. Procedit n. a ſcapulæ baſi, & omnino carnoſus totam ſcapulæ ca-
uitatem implet, oſſi ſemper valide ac ſi ab ipſo toto proceſſu pronasceretur, connatus.
Quum vero ad ſuperiorē cēruicis ſcapulæ ſedē pertingit, ſub ligamēto validiſſimo, ſum-
mum humerum interiori ſcapulæ proceſſui, qui anchoræ aſſimilat, colligante, in ante-
riora cōtendit, & in amplū validumq; ceſſans tendinem, articulum humeri ad ſcapulam
ſuperat, eius articuli ligamento pertinaciſſime, obliqua quodam modo inſertione im-
plantatus. Eſtq; hic muſculus oblongus, & exterius gibbus, intus aut illi reſpondet cau-
tati, quam implet: deinde fibras ſecūdum ſui longitudinem exporrectas habet, q̄ ſi bra-
chium attollentis muſculi ſecundiue fibris conferantur, tranſuerſæ prorsus exiſtunt.
Sextus. ¶ Sextus admodum eſt carnoſus, ac concauam internamq; ſcapulæ ſedem opplet, ex ba-
ſi totius ſcapulæ carneam originem deducens, & in trianguli verticem, ad ſcapulæ for-
mam tantisper arctatus, dum in interiorē articuli regionem pertingat cui amplo ten-
dine, quaſi in ſemicirculū implātatur. Huius muſculi ſuperius latus quinto muſculo ad-
modum continuū exiſtit, adeo ſane vt niſi diligenter animū adhibueris, vterq; vnus ti-
bi eſſe appareat. ¶ Septimus vniuerſum ſcapulæ gibbum, q̄ ſub ipſius ſpina habet implet.
Septimus. Carnoſus enim ex ſcapulæ baſi exoritur, deinde arctior ad ſcapulæ formam redditus,
tandem articuli ligamēto tendine amplo & breui inſeritur. ¶ Porro hi tres muſculi am-
plis inſertionibus in ligamenta humeri articulum ambientia implantātur, ita vt horum
tendines in orbem quaſi vniuerſum articuli ligamentum amplexentur. Brachii autem
circumactus opifices ſunt, quamuis ſextus ad brachii eleuationem aliquid auxiliari vi-
deatur. Hi igitur ſeptem ſunt muſculi brachium mouētes, quibus ſi alterius lateris ſep-
tem coniunxeris, numero erunt quatuordecim.

De ligamenti humeri ad ſcapulam articuli. C A P. XIX.

Veſa. libr.
2. cap. 25.

Reliquis
articulis
cōmune.
Gal lib. 13.
de uſu pa-
cap. 12.
Tria pro
pria.
Primum.

Secundū.

Tertium.

QVÆ humerum in ſcapulæ acetabulum connectūt robuſta ligamenta, præter com-
mune omnes articulos inſtar membranæ, nunc tenuioris, nunc craſſioris ambiens
vinculum, tria ſunt. Quod amplū & membranofum eſt, omnibuſq; articulis cōe orbicu-
latim ex ſuperciliis cēruicis ſcapulæ principium aſſumit, ac totum articulū ambiens, in
radicē interni capitis humeri q̄ articulationis gratia creatū eſt, primum inſeritur: & de-
inde totius exterioris capitis, quod inſertionis ligamentorū cauſa factum eſt, amplitu-
dini, ac vtriuſq; cēruici implātatur. ¶ Aliorū vero trium, duo quidem ad amuſſim inſtar
neruorū rotunda viſuntur, tertiū vero nonnihil amplū. ¶ Enaſcitur aut primum ex api-
ce interioris proceſſus ſcapulæ, & hinc procedens, internis anterioribuſq; partibus ex-
terioris humeri capitis circumtēditur, validiſſime huius capitis ſedis impreſſioni adna-
tum. ¶ Alterum vero, quod craſſius maiuſq; iſto eſt, ex cēruicis ſcapulæ ſuperiori parte,
vbi ſummo humero ſubmittitur, ortū ducit, & interius humeri caput ſuperans, inſeritur
toti illi exterioris capitis regioni, quæ ad externum latus eius ſinus extruberat, qui exte-
rius caput muſculi, cubitum ſelectentiū, anterioris viam præbet. Huius ligamēti anteriū
latus, poſteriori primi ligamenti connasceſcit lateri, ac ſimul ambo velut tranſuerſum li-
gamētum efformant, caput eius muſculi in ſuum ſinū ſeruans. ¶ Reliquū vero terū,
ex eadem cū ſecundo regione principium nanciſcitur, ac oblique hinc porrectum inſe-
ritur, in totam poſteriore exterioris capitis humeri ſedem, adeo vt præſens ligamen-
tum poſteriore articuli ambiat inſertionem. ¶ Ceterū præter hæc tria, quæ præcipue
humerum, ne deorſum, extrorſumq; ab acetabulo ſcapulæ labatur continent, aliud eſt
adhuc ligamentum, humerum ſuſum & in anteriora, ad mediam nimirum inter ſum-
mum

A mum humerum, & interiorem scapulæ processum sedem luxari prohibens: quod similiter validum, ab interiori quoque processu scapulæ, sursum oblique ad summum humerum porrigitur, articulum humeri cum scapula nusquam contingens.

De musculis scapulam mouentibus. CAP. XX.

Scapula iisdem cum brachio agitur motibus, si illum tantum exceperis, quo brachium vel lib. 2. circumuertitur. Mouentes autem hanc musculi numero quatuor sunt. ¶ *Primus* ex cap. 26. secunda, tertia, quarta, quinta, & interdum sexta, superioribus thoracis costis, paulo antequam in cartilagine finiant, nascitur. Hinc ad exteriora porrectus angustior, sed crassior efficitur, quousque ad humeri cum scapula articulum in latum nerueumque tendinem, carne mistum cesset, quo trianguli modo in internum scapulæ processum anchoræ imaginem referentem inseritur. Huius musculi fibræ sese non decussatim interfecant. Si utiq; altiores eius fibræ contrahantur, elatius scapulam pectori admovent. Inferioribus, verò in se contractis, versus pectus demissius scapula adigitur. At totius musculi fibræ una laborantibus, scapula in neutram partem declinans, pectori adducitur. ¶ *Secundus* rarè præ- Secundus ter ceteros corporis musculos figuram sortitur. Ab occipitio transuersa linea, quæ ab eius ossis medio, versus auris porrigitur radicem, pronascitur, & dein secundum cervicis longitudinem ad octauam usque thoracis vertebræ spinam a vertebrarum spinarum apicibus principium sumens, in scapulæ spinam, summumque humerum, & clauiculæ portionem eius nimirum latiorè partem, inseritur. Hic tota sua parte, quæ in ceruice consistit scapulam sursum trahit, ea vero quæ sub ceruice in posteriore thoracis sede habetur, monachorumque cucullis respondet, scapulam deorsum vellit. ¶ *Tertius* validus a transuersis primæ, secundæ, Tertius tertiæ, quartæ, & quintæ cervicis vertebrarum processibus exoritur, quasi disjunctis constaret principiis, uno nimirum, quod primæ cervicis vertebræ deberetur, altero autem, quod tribus secundæ vertebræ proxime subiectis ascribitur. Quanquam et interdum a transuerso secundæ quoque vertebræ processu musculus hic, sed parua origine nasci visus sit. Principia hæc simul atque ex reliquis cervicis vertebrae amplexantibus musculis emergunt, una coeunt, & validum efformant musculum nonnihil latiorè, quam profundiorè, qui lata, sed carnea in insertione in internam superioris anguli scapulæ basis sedem inseritur. Hic quidem scapulam sursum versus anteriora cervicisque latera trahit. ¶ *Quartus* amplius & tenuis, Quartus sed omni ex parte carneus visitur, qui a quintæ, sextæ, & septimæ cervicis vertebrarum, ac trium primarum thoracis vertebrarum spinis principium ducens, toti propemodum scapulæ basi carneus, & æque ut in exortu latus inseritur fibras obtinens non prorsus transuersas, at nonnihil oblique a dorso deorsum ad scapulæ basim ductas. Quadrilateris est hic musculus, & scapulam retrorsum ad dorsum spinam, versus superiora nonnihil agit.

De musculis thoracem mouentibus. CAP. XXI.

Thoracis siue respirationis motus minime est naturalis, sed voluntarius, ideoque musculis perficitur, qui in hominibus, extra abdominis musculos, de quibus sequenti agemus capite, octoginta unus, utrinque scilicet quadraginta, & unus utriusque lateri communis. ¶ *Primus* qui brevis est, sed amplius ac tenuis, ac omnino carneus, ex inferiori interiorique clauiculæ regione, secundum ipsius longitudinem, qua primam respicit costam, exoritur, principium carnosum obtinens, & carnosum quoque termino primæ costæ, qua pectoris ossi committitur, anteriori parte inseritur. Fibras sortitur impense obliquas, propemodumque transuersas, quæ a clauicula antrosum procedentes, supremæ thoracis costæ & nonnihil pectoris ossi, qua eius costæ cartilagine excipit, implantatur. Huius ope prima costa sursum versus exteriora retrahitur, hacque ratione ibidem thorax dilatatur. ¶ *Secundus* Secundus musculus grandis est, carnosum principio ex tota scapulæ basi interiori in parte pronatus, hinc carnosus perpetuo procedens, admodum latefcit, tenuior tantisper redditus, donec, primæ, secundæ, tertiæ, quartæ, quintæ, sextæ, septimæ, & octauæ, aliquando, & nonæ thoracis costis, tanquam digitis quibusdam logis antea quam in cartilagine degenerent, inseritur. ¶ *Tertius* Tertius Huius musculi fibræ, si quando ad suum principium tendant, versus exteriora vellunt thoracem dilatantes. ¶ *Tertius* ex trium inferiorum cervicis vertebrarum, ac primæ thoracis vertebræ spinis, membraneum latumque principium ducit. Dein ubi primam thoracis costam contingit, in latera sensim oblique ductus, ternis veluti digitis, tribus quatuor superiorum costarum intervallis sub scapulæ basi inseritur, quas sursum oblique ducens, thoracem di-

Quartus. stendit. ¶ *Quartus* ex posteriore ossis sacri regione, & interiore ilium ossis sede incipit, A
 fursumq; ad ceruicem ductus, tam pertinaciter toto per lumbos ductu vndecimo dor-
 sum mouenti musculo cōmixtus connatusq; vt merito ipsius pars cēseri queat. Quum
 primum vero vterq; duodecimam thoracis respicit vertebram, costis qua primū a verte-
 bris discedunt, inseritur. Infimas thoracis costas, & omnes reliquas deorsum trahit, eas-
 que comprimit, ac deniq; thoracem arctat. ¶ *Quintus* in posteriori thoracis sede, secū-
 dum inferiora collocatur, ex spinarum apicibus duarum infimarum thoracis, & aliquot
 etiam primarum lumborum vertebrarum spinis, membraneus, latusq; enascitur. Prin-
 cipiū hoc musculus dorsum agētib; & quarto thoracis substernitur, transuersum recta
 in priora porrectum. Vbi hos musculos transcendit, costarumq; ossibus cōmittitur, sta-
 tim carneis adaugetur fibris, & tandem velut in aliquot diuisus digitos, nonæ, decimæ,
 & vndecimæ, & duodecimæ costarum interuallis, ipsiq; costis vbi in interiora reflectū-
 tur, & multo ante, q̃ in cartilaginē cessant, sese inserit. Musculus iste retractionis earū,
 quibus inseritur, costarum opifex est, vnde etiam thoracem dilatantium numero meri-
 to adscribitur. ¶ *Sextus* in thoracis cauitate repositus, per vniuersum pectoris ossis latus,
 sub tota verarum costarū cartilaginū regione exporrigitur, propemodum costarum
 os, exteriori ipsius latere cōtingens. Est autem musculus iste triangularis, ex duob; lon-
 gissimis lateribus, & vno breui constructus, & tenuis, omniq; ex parte carnosus. Thora-
 cem arctat & cōstringit, costarū cartilagine inuicem colligans. ¶ Superfunt adhuc in-
 tercostales dicti musculi, qui in duodecim costarū interuallis vtrinq; duo & viginti sunt.
 In singulis enim costarum interuallis, quæ vndecim in altero latere sunt, bini producun-
 tur musculi, vnde & intercostalium musculorum nomen mutuati sunt. Horum quidem
 alii exteriores, alii vero interiores sunt. ¶ Exteriores in singulis costarum interuallis, si-
 mulatq; costa a transuerso vertebrarum processu, in anteriora oblique prorēpit, princi-
 pium obtinent, ac fibris constant ex superiori costa, in inferiorem oblique in priora de-
 orsum prorēptantibus. Hunc fibrarum ductum per vniuersa spuriarum costarum inter-
 ualla, tam quæ inter ossa, q̃ quæ inter cartilagine consistunt, exteriores illi musculi ser-
 uant, & verarum costarū partem qua in cartilaginē finiunt, eam quoq; retinent. Vbi
 autem verarū costarum ossa in cartilaginē degenerant, mox fibrarum ductus variat. Ab
 inferioris namq; costæ cartilagine sursum in priora oblique versus superioris costæ car-
 tilaginē fibræ inibi procedunt, donec in hac parte exterior musculus pectoris ossi cō-
 mittitur. Externis iis intercostalibus musculis id priuatim accidit, q̃ longe magis ner-
 uosi, excarnesq; visuntur in ea costarum sede, quæ a vertebris primū abscedit, q̃ per reli-
 quam interualli lōgitudinem. Deinde non solū ab inferiori sede superioris costæ, in su-
 periorem humilioris costæ sedem ducuntur, verum et ab externa superioris costæ inci-
 piunt sede, & in externam inferioris inseruntur. ¶ Internorum intercostalium muscu-
 lorum fibræ, prædictis contrarium obtinent situm, & exteriores ad X literæ similitudi-
 nem interfecant. Hi enim qua vertebrarum corporibus proximi sunt, ex inferioris cō-
 stæ superiori sede, ad superioris costæ inferiorem sedem fibras oblique in priora protē-
 sas mittunt. Hæc fibrarū seriem interiores musculi per singula spuriarum costarū inter-
 ualla retinent, & in verarum quoq; interuallis, ad eam vīq; costarū sedem, vbi in cartila-
 ginē degenerant. Ibidem n. illico ac interni eo deueniunt fibrarū ductum emutant.
 Nam a superioris costæ cartilagine in inferioris, fibræ in priora deorsum oblique protē-
 duntur. Quod si itaq; istum fibrarum ductum respicias, in sex legitimarum costarū in-
 teruallis quaterni sunt musculi, adeoq; priori numero duodecim accedunt. Quod ani-
 maduercentes Arabes, vt *Auicenna*, in singulis interuallis nō duos, sed quatuor esse mus-
 culos, veterum quorundam anatomicorum modo tradiderunt. Quamquam de sex tan-
 tum verarū costarum interuallis id vere affirmant. ¶ In spuriarum n. costarum interual-
 lis bini tantū musculi numerari possunt. Quapropter vniuersi lateris intercostales musculi
 hac ratione quatuor & triginta, ad vnum omnes arctando, & *de Galeni sententia*, laxando
 thoraci præfecti. Atq; numeratis hætenus in vno latere thoracis quadraginta musculis,
 alii totidem in altero latere congruunt, vt sint in vniuersum octoginta. ¶ His vnus vtri-
 que lateri communis accedit, quem *Greci* *ὁ πλάγιος*, & *ὁ ἀντιπλάγιος*, & *ὁ ἀντιπλάγιος*, Latini vero *Se-*
pium transuersum, *Plinius*, & illum sequentes nonnulli alii præcordia vocant. Hic qui-
 dem neque situ, neque forma vlli totius corporis musculo responder, siquidem amplius,
 & or-

Interco-
stales mus-
culi vtrin-
que vigin-
ti duo.

Exterio-
res inter-
costales.

Interio-
res inter-
costales.

Gallibr
ano. ad
mini.

Pen. 1. pri-
mi doct. 5.
summa 2.
cap. 16.

In libello
de causis
respira-
tionis.
Musculus
vtriq; la-
teri com-
munis,
seu septū-
transuer-
sum.

- A** orbicularis est, & in ipsius medio caput suum, principiumue gerit. Hic enim ad amplam latitudinem exquisitè membraneum existit, ex quo fibræ instar linearum ex centro ad circuli circumferentiam excurrunt, iis quibus septum inseritur partibus exportetæ. Hæ carne simplici adauctæ, reliquam musculi partem carnosam efficiunt, quæ paulatim in progressu densior, carnosiorq; pro fibrarum ductus longitudine redditur.
- B** Infimæ pectoris ossis, & spuriarum costarum cartilaginibus, & vertebriis lumborum excarnibus inseritur. Est autem in medio (*ut comprehensum est*) nerueum in circuitu ventro ad insertionem carneum, ut sanguificationi, nutritioniue, ac generationi subseruientia organa a cordis & partium ipsi subministrantium sede dirimat, thoracemq; proprio munere dilaret.
- C** Vniuersum itaque septum transuersum paulo minus toto orbiculare est, situm vero obliquum habet. Nam a pectoris osse per spuriarum costarum extrema ad lumborum vertebrae excarnes (*ut dictum est*) protenditur, situmque ob id a prioribus deorsum ad posteriora vergentem obtinet.
- D** Quinetiam duos sortitur circulos, vnum membraneum, qui caput ipsius putatur, alterum hunc succingentem, qui carneus est. Verum quemadmodum hic semper quo costis propinquius accedit carnosior efficitur: ita ille quo septi centro vicinior est, membranosiore vadit, non tamen ambo exacti circuli imaginem referunt, sed talem, qualem quis latum esse diceret, & vna parte in acutum angulum cessare. Membraneus enim sursum, atq; in anteriora acutum porrigit angulum, carneus autem deorsum.
- E** Ceterum vniuersum septi transuersi corpus duabus vestitur membranis, quas Galenus *indumenta* nominat, totam inferiorem ipsius amplitudinem, qua nutritionis organa spectat, peritonæum succingit. Superior vero vniuersa latitudo cor pulmonemque respiciens, tunica costas succingente obducitur.
- F** Quinetiam contra aliorum musculorum fere omnium naturam septum transuersum natura tribus foraminibus est peruium.
- G** Vnum, ubi ab inuicem deducuntur ligamentorum aut tendinum principia, quæ arteriam transmittunt, & finem venæ paris carentis, quæ costas enutrit, & ramos deinde sexti paris neruorum cerebri, qui ad costarum radices, sub membrana costas succingente propagantur, ac postea iecori, lieni, renibus, intestinis & omento numerosa serie inferuntur, Galenus iis vertebrae adnumeravit, quanquam improprie admodum vertebrae septum præbere viam videatur. Imo vix apposite via qua arteria fertur foraminis nomine donatur, quum hæc potius semicirculum in septi transuersi circumferentia exsculptum, quam foramen referat, septumque vertebrarum corporum superiori seu anteriori parti, non autem lateribus committatur.
- H** Secundum foramen ad septi transuersi medium est, versus dextrum tamen consistit, & venæ causæ in thoracem reptanti exstructum, cuius corpori septum firmissime membranarum ipsi obnatarum beneficio connascitur.
- I** Tertium foramen paulo inferius, quam media septi sedes est, ad sinistrum latus modice vergens habetur, quo gula, & sexti neruorum paris rami, ad ventriculi osculum dimittuntur.
- K** Septum transuersum inter musculos thoracem mouentes ad respirationem, & ad propellenda ventris excrementa in primis conducit. Non autem nisi naturalis inspirationis & expirationis auctor septum transuersum est. Abunde enim ipso contracto, tensoue thorax dilaturatur, inspiratioq; perficitur. Rursus ubi laxatur, thorax sua gravitate promte concidit, exspiratioque fit. Naturalem vero vocamus respirationem, quæ non est violenta, quæque nulla fit, nisi naturali urgente necessitate. Quæ vero vehemens, ac violenta, huicque contraria est, Græcis *ἐκπνεύουσα*, Latinis *efflatio* dicitur.
- L** Naturalis itaque respiratio citra intercostalium musculorum opem perficitur. At si aut cordis caloris qualitas increseat, aut ad vocem, aliudue munus maiori indigeris aere, mox primus, secundus, tertius & quintus, & interiores, intercostales musculi vtrinque cum septo operabuntur. Si vero maioris expirationis efflationisue ad vocem, clamores, tibias ac tubas, & id genus instrumenta inflanda necessitas ingruerit, exteriores intercostalium musculi agent.

De musculis abdominis. C A P. XXII.

- M** Vsculi abdominis, quod Græcis *ἐντρίχειον* dicitur, octo, vtrinque nimirum quatuor, existunt, quatuor quidem obliqui, duo recti, & totidem transuersi.
- N** Obliqui in vtroque latere bini sunt, qui inuicem incumbunt, & contrarias, seque mutuo decussatim, seu ad similitudinē X Græcæ literæ interfecantes fibras obtinēt. Superiores n. fibræ deorsum versus priora oblique procedunt, quæ huius fibrarū ductus gratia descendente

Inferio
septi tras
uersi.Septi fi
gura.
Galenus
lib. 13. de
vlu partiu
cap. 5.
Septi cir
culi.Septi in
branz.Septi fo
ramina.
Primum.

Secundum.

Tertium.

Septi tras.

Naturā
lis respi
ratio.
Efflatio.
Galenus
in libello
de causis
respira
& de mo
tu muscu
lorum.Numerus.
Gallib. 5.
anato ad
min. lib.
5. de vlu
part. cap.
14. & de la
bo. l. cis
cap. 6.

Obliqui. Descendentes. Ascendentes. Recti. Transuersi. Oblique descendentes ortus. Vesalius libr. 2. c. 31. **A**

vulgo nominant. Inferiores vero fibræ, sursum oblique ad anteriora tendunt, qui ob id ascendens vocatur. ¶ Rectorum ab utroque latere vnicus est, qui quum fibras secundum corporis longitudinem extensas habeat, rectus appellatur. ¶ Transuersus similiter vtrinque vnus est, cui id nomen, quod eius fibræ secundum corporis latitudinem, aut a dextris, ad sinistra, nullo obliquo ductu ferantur, inditum est. ¶ Oblique descendens ceteris abdominis musculis superstratus est, & ex sexta, septima, octaua, & nona costis, priusquam in cartilagine finiant, carnosum principium sumit, prope musculum qui ex scapula basi pronatus octo elatioribus thoracis costis inseritur, secundusque est eorum qui thoracem mouet. Ille enim musculus costis quasi digitos singulos porrigendo inseritur, ex quorum interuallis prominentiores oblique descendentes musculi partes digitorum ritu enascuntur, non secus quam si sinistra manus interuallis, dextrae manus digitos inferas, & musculum thoracis motibus famulantem sinistrae manui, dextrae vero oblique descendentes assimilares. ¶ Verum musculus sensim carnosior, crassiorque euadens, deorsum in priora fertur, ilia, quæ quasi inania inter ilium os & infimam costam, *κενέωνας, & λαγύρας* Græci appellant, carnosam ipsius parte amplectens, quousque ad ilium os prorepserit, cuius summitati secundum totum ipsius appendicis spinæ ductum carneus inseritur. ¶ Quum vero carnosam ipsius pars ex ilium regione ad anteriora, mediaque secundum abdominis longitudinem properat, in nervosam exilitatem membranae quam simillimam degenerat, quæ sextæ & septimæ cartilaginibus, & pectoris ossis mucroni, & rectis musculis expanditur, firmissimeque superioris ossis coxendicis, & pubis regioni implantatur, tota illa nimirum sede, quæ ab ilium ossis appendice, seu spinæ anteriori parte, ad pubis usque ossium cartilagine protenditur. ¶ Obliquus huic substratus ex superiori ossis ilium regione pronascitur, ac simul tenuem membraneamque originem a lumborum vertebrarum, & ossis sacri spinis assumit, quæ in musculi progressu, carnosas fibras tandem adaugetur. Musculus iste sursum tendens, ilia carnosam sui parte integit, & quatuor inferiorum costarum, quas spurias vocant, finibus carnosus & hic quoque inseritur. Vbi autem abdominis priora & medium conscendit, in nervosam desinit exilitatem, quæ inter rectum musculum, qui ipsi subiicitur, & oblique descendentes membraneum tendinem media intercedit, pubisque ossi, & mucronatæ pectoris ossis cartilagini inseritur, per reliquam vero abdominis longitudinem cum alterius lateris oblique ascendentes musculi tendine sic vnitur, ut ex vtriusque lateris musculo, simul quoque toti abdomini tegumentum quodammodo efficiatur. ¶ Sub obliquorum nervosis tenuitatibus recti musculi reconduntur, singuli que ex media ossis pubis regione duplici quodammodo principio nati, vno quidem superiori interiorique, altero inferiori atque exteriori, non quod hæc principia, singulis musculis disincta incontinuaue sint, sed ipsa musculi origo, diuersam substantiam ad hunc modum exprimit. Superior principii pars introsum nonnihil vergens, exquisita carnea est, ac ex lato in angustum desinens. Inferius vero, quod & extrorsum paulo magis prominet, nervosum est, carnis omnino expers, verum sursum porrectum sensim dilatescit, totumque rectum musculum producere conspicitur. ¶ Recti itaque musculi, duobus eiusmodi principijs singuli ex pubis osse nati inuicem contigui sunt, recta sursum porrecti, donec ad vmbilicum peruenerint, ibidem nonnihil mutuo distantes, modiceque ampliores facti, ad pectus usque feruntur, cui supra mucronatam cartilagine, ad ossis pectoris latera, illique connexas cartilagines, lati carnosique implantantur. Musculi hi non vno fibrarum ductu secundum totam longitudinem ferri videntur, sed singuli in abdominis regione diuersa delineamenta seu inscriptiones, Græci *μετρηγας* vocant, transuersim, & incurua albaque linea, ipsis inductas exprimunt, non sane aliter, quam si rectorum singuli plurius numero essent habendi. Non enim recta ab osse pubis ad pectus fibræ nusquam inclinantes feruntur, sed ad nunc dictas circumscriptiones, impressionesue nonnihil implicate obliquantur, atque ex aliis aliæ produci quodammodo apparent. Istarum impressionum duæ plurimum supra vmbilicum consistunt, & interdum vna sub vmbilico, aliquando et tres supra vmbilicum. ¶ Distinguuntur autem recti musculi linea candidiore, quæ a mucronata cartilagine per medium vmbilicum usque ad pubem apparet. Hæc autem merito ambientibus candidior videtur, quia illi nulla subest caro. ¶ Omnibus nunc commemoratis musculis transuersi subsunt, vtrinque vnus, qui ex transuersis lumborum vertebrarum processibus tenui, membraneoque principio enascitur, deinde in progressu ex dorsum mouen-

Ilia.
Κινώρες.
Αναγύρας.

Oblique
ascendentes
ortus.

Recti musculi
origo

Candidior
linea.
Transuersi
musculi
ortus.

- A** mouentibus emergens musculis, & carnosus adactus fibris, superiori ilium ossis regioni, & spuriarum costarum finibus exacte carnosus connascitur, carnosus ipsius parte vniuersa inuestiens ilia. Vbi vero versus abdominis medium ad exteriora rectorum musculorum latera vsq; prorepit, in neruosam exilitatem finit, quæ pubis ossi & mucronatæ cartilagini implantatur. ¶ Per reliquam inter hæc extrema longitudinem, iste membranosus tendo, neruosæ exilitati alterius transuersi muscoli continuatur, ac simul ambo tunicae instar vniuersum abdomen circumcingunt. His quidem musculis Peritonæum Peritonæum membrana subnascitur, de qua lib. 3. cap. 2. agemus, cui certe transuersi muscoli adeo connascuntur, vt difficile sit illos ab hac in homine illaceros liberare. ¶ O
- B** nis muscoli præter communem omnium musculorum vsum, quo corpori calefaciēdo Abdominis musculorū vsum. Galenus li. 5. de vñu partium, cap. 14. auxiliantur, & propugnacula ac munimēta quædam sunt partiū subiectarum, primario vsu thoracis motibus præstant. Obliqui enim descendentes si tendantur, admodum humiliorem thoracis sedem comprimentes, thoracem arctant. Recti vero cum oblique ascendentes costas deorsum trahunt, thoracemq; non parum cōstringunt. ¶ *Transuersi* autem costas intro adducentes, ad arctandum thoracem faciūt. Deinde homini ad duorum excrementorum expulsionē aptissime subseruiunt. Quādo n. omnes simul tensi laborant, septo transuerso interim ex spiritus retentione depresso, ita intestina simul cōprimunt, vt ex angusto loco in ampliorem, qui inferior est, ræces protrudāt, expellātq; & rursus ad ventriculum superiora vellas deferri præcauent haud secus, quam si duabus
- C** ad brachiale tantum iunctis manibus, & semper magis magisq; sensim ad extremam vsque digitorum aciem distantibus, madentem spongiam imponeres, & manibus paulatim coeuntibus, aquam exprimere nitereris. Abutitur etiam iis Natura ad magnæ efflationis, & vocis generationem. Denique ad partum edendum, foetumq; propellendum conferunt, atq; ad spiritus cohibitionem.

De musculis cubitum flectentibus, & extendentibus. CAP. XXIII.

- M**usculi cubitum flectentes duo sunt, quorum vnus & anterior, duobus validissimis primus flectentium. Vel. lib. 2. cap. 46. & mutuo distantibus principiis exoritur: vnum quidem exacte nerueum, & ad amissum teres, ab elatiori parte cervicis scapulæ, seu ex superiori ipsius acetabuli supercilli sede, enascitur. Alterum a radice interioris processus scapulæ, qui anchoræ cōparat, duplex quodammodo exoritur, non quidem disinctum, sed duplicem substantiæ speciem exprimens, & dicto iam principio multo latius. Principii n. pars ab apice processus initium ducens, exquisita, vt exterius muscoli principium, neruea est, & crassa, & propemodum teres. Pars autem huic continua, ac ex reliqua processus sede prodiens, carnea, lataq; visitur. Neutrum istorum principiorum statim ab exortu deorsum tēdens, humeri ossi adnascitur. Verum aliquantulo sub humeri capitis ceruice, vbi ambo inuicem coitura vnum efformare musculū incipiunt, carnosus pars interioris principii ab interno scapulæ processu enata, humeri ossi lata & vtcunq; carnea insertionē adnascitur. Postquam vero hic anterior cubitum flectentium musculus, ex duobus illis efformatus principiis, hanc
- E** insertionem in humerum molitus est, ab humero iam abscedens, & ad amissum teretis carnosiq; musculi effigie, ante resectionem in macilentiorib. conspicuam præ se ferens, alium conscendit musculum, ipsi toto progressu subrensum, non amplius enim primus hic musculus brachii os cōtingit. Ceterū paulo supra cubiti articulū, neruosior, ex carnisq; redditus, in robustum & crassum, & ad amissum teretē finit tendinē, q. articulo expāsus, & subdito ipsi musculo suffultus in interiorem radii partē modice latefcens inseritur. ¶ *Secundus* flectentiū posterior huic omnino succumbit carnosus, & nusquam insigniter nerueam ostendens substantiam, longe quoq; primo breuior, multoq; iuxta humiliorem ipsius partē latior existit, a brachii ossis exteriorē latere carneo, latoq; principio, quod bicornē est, & in sui medio obtusum angulū exprimit, enat⁹, sensim obliq; in priora humeri tendēs, crassior, carnosiorq; efficit, deorsum recte, prensus, & humero validissime adnatus, ex ipsoq; exortus sui robur toto descensu tanuisper assumens, quousq; cubiti articulum contingat, quem sua amplitudine, carneaq; substantia in tota anteriori sedē integens, validissime articuli ligamento, & anteriori vlnæ & radii sedi ampla insertionē implantatur, sua sede qua articulum transcendit, montis speciem appositissime representans. ¶ Ceterum vt huius musculi ductus recto perficitur tramite, ita quoq; prorsus

Extendentiū primus.

Carnis pars qua primus extendentiū augeatur, quem secundum constitueret.

Tertius extendentiū.

rectas habet fibras, quemadmodū etiam primus. Sunt autem utriq; flexionis cubiti auctores. ¶ Porro extendunt cubitum musculi, si hos in maximum numerum redigas tres, quorum quidem primus valido latoq; & nerueo principio, ex humiliore scapulae costa non procul ab eiusdem ceruice exoritur, peculiarem illic, unde prodit, sinum obtinens. Is paulo post exortum carne adauctus, recta deorsum ad internū posterioris sedis humeri latus fertur, medio internilateris humeri & medio posterioris sedis humeri tantisper adnatus, dum partim carneus, partim nerueus amplissime in internū latus posterioris vlnę processus inseratur. Integrum igitur est, hunc musculū vniuersum, aut vnum dicere, aut duos. Vt vnus quidem a scapula enascatur, alter vero ab humero, qui cum illo confunditur, cui scapula principium præbet. Hi itaq; musculi in descensu inuicem connascuntur. ¶ Tertius extendentiū, qui in vniuersa cubiti musculorum serie quintus est, a posteriori sede ceruicis humeri, ad capitis ipsius radicem neruosus enascitur, & sensim recta deorsum descendens, externamq; sedem posterioris humeri regionis occupans, carnosus euadit, & pertinacissime humero adnatus ab ipso sui principii vigorē mutuatur. Priusquā v. medium longitudinis brachii hic musculus superauit, duobus paulo ante dictis ita commiscetur, & cum ipsis adeo coit, vt nullo prorsus pacto in hominibus discerni queant. Quamuis interim tertius musculus suum, quem a principio habebat, ductū obleruat, atq; validissime in externum latus posterioris vlnę processus partim carneus, partim nerueus inseritur. Vt cunq; v. inter se musculi hi concurrant, nullus tamen ab initio inceptum fibrarum ductum deperdit, sed recte oēs deorsum, nusquā implexæ, neq; sese decussatim interfecantes ferunt, & eandem omnes functionem obtinent, qua cubitū in neutrum latus inclinantem extendunt. Liquer igitur, tres hos musculos vnus loco recenseri posse, qui ex tribus principiis esset conformatus: aut duorum, si videlicet primum & secundum vnus loco habueris.

De musculo, neruosa sua exilitate media vola, & interna digitorum cuti subnato.

CAP. XXIV.

Gal. libr. 2. de viupartium ca. 4. Vesl. lib. 2. ca. 41.

Toti ppe modū depili, nudæq; manus regioni, dilatescente neruosa ipsius exilitate, musculus quidam subeditur, q. neruoso teretiq; principio ex interioris humeri tuberculi apice enascitur, medio duorum brachiale flectentiū musculorū, qui ex eodem tuberculo prodeunt, incumbens adnatusq; nō tñ in illorū capitū medio, vt nōnulli tradunt, repositus. Principium hoc illico carnosum, crassiusq; redditū, musculi ventrē non impense crassum cōstituit, q. priusq; ad medium lōgitudinis cubiti obliq; nō nih. versum mediā cubiti amplitudinē ductus pperierit, rursus tenuis, gracilisq; factus, in tendinem angustū, sed ampliorem quā pfundiorē, & neutiquam prorsus teretē cessat. Hic ad brachialis vsq; radicē pertingēs, sensim in brachialis interiori sede latescere incipit, ac summæ man⁹ cuti ad extrēmā vsq; digitorū aciē subnascitur. Atq; id fibrosis nexib. adeo validis continuisq; perficitur, vt internā manus cutem a neruosa tendinis tenuitate, vel et acutiori nouacula liberare arduum sit. Hic a. toti depili manus summæ cuti in hominib. non subnascitur. Siquidem tendo mediæ volæ cuti in palma tantum subnascitur, non a cutem contingit, quæ obducitur musculo, qui paruum digitorum a ceteris in obliquū abducit, neq; etiam cuti subtenditur inuestienti musculosam carnem, q. primo pollicis articulo incumbens, ex plurib. musculis, de quib. suo dicemus loco, constituitur. Adhuc nullæ huius tendinis portiones in digitorum latera excurrunt; quinimo perquam obscure internæ etiam digitorum regioni obnasci visitur. ¶ Ceterum vt id nō præteream⁹ silentio, interior sedes manus caua, ac variis mōticulis septa, multisq; lineis interstincta, Græcis κοίλον τῆς χειρὸς, Latinis *vola* dicitur. Musculus tendinem hunc producens gracilis est, atq; in cubiti medio super reliquos huius regionis, vt dictum est, exporrigitur, nulloq; peculiari ligamento vlla ex parte amplexus, in summa tantum manu dilatescit. Huius beneficio cutis versatilis & circumactu pertinax depilisq; ac proinde ad tangendum, & accuratius sentiendum aptior efficitur. Decebat namq; vt manus comprehensoriū instrumentū existens, hanc internam ipsius cutem adipiscens, non modo ægre versatilis, tum ob alia quædam, tum maxime ob exactiorem tutioremq; paruorum corporū comprehensionem: sed & cutem totius corporis reliqua cute sentitū exq. sitiori præditā internæ manus sedi merito obduci decuit. Non n. aliud quidē oportebat esse apprehensoriū, aliud autem tangens instrumentum: neque aliud quidem externā corpora, leuando & trans-

Gal. ibid. cap. 6.

- A** transferendo, & omnino pertractando assumere, aliud vero posthæc de apprehensorum calore, frigore, duritie, & mollietate, ac aliis quæ tactu percipiuntur qualitatibus iudicare ex usu erat. Sed mox ubi manus quidvis apprehendit, satius fuit hanc apprehensam una naturam cognoscere, idque internis duntaxat partibus, quibus quoque est apprehensorium instrumentum, iure manus eisdem partibus tangens, quibus apprehendens instructa est. Quanquam non huius tendinis beneficio manus exquisitum tactus sensum nanciscitur, sed plurimum nervorum auxilio, ex quibus ad singulos digitos quatuor furculi propagantur, ut suo monstrabimus loco. ¶ Confert autem non parum ad exquisitam tactilium qualitaturn dignotionem, depilem esse interiorem manus cutem. Si enim admodum pilosa & hirsuta esset, sibi appropinquantia nequaquam tangeret, quod nimirum pili tangendo corpori ante cutem occurrerent, illiusque contactum prohiberent. Quoniam autem tendo iste huius etiam regionis cutem duram efficit, manifestum est omnibus, & id ad plurimos usus nobis conducere. Ob eas itaque causas tendo internæ manus summæ cuti subnatus est.

Cur de pilis
cutis ma-
nus.

De carne substantia interiori digitorum regioni, ipsorumque radicibus, & media volæ manus superstrata. CAP. XXV.

- I**nter tendinem prædictum, & cutem in manu, veluti etiam pede adeps plurimus continetur, quem anatomici *carneam substantiam* vocant. Per universam enim quatuor digitorum, & secundi tertiiq; articuli pollicis longitudinem, ac quatuor manus monticulos, quos Chiromantici ad quatuor digitorum radices reponunt, & ad volæ medium, carnea quædam substantia inuenitur, quæ inter latum tendinem & cutem partim interiacet, partim tendini, sed minori portioni, subiicit. ¶ Ceterum hæc substantia non quidem quemadmodum in musculorum ventribus, exacta, simplexve caro existit, sed substantia quædam subalba, & duriori nervosq; ut sic dicam, adipi respondens. Præterea pinguedo hæc frequentibus nervorum fibris, venarumq; terminis adaucta, medium quippiam inter carnem & induratum pinguedinem adipiscitur. ¶ Ceterum Arabes hallucinantur, hanc substantiam extra musculi corpus, simplicem immistamq; carnem esse affirmantes illorum modo, qui simplicem carnem in gingivis ac pene collocant. Non enim expenderunt innumeras nervorum fibras, & capillorum modo tenues venas, hanc substantiam intercurrentes, illamq; nec colore, vel substantia, nec æqualitate continuitateve etiam musculorum carnem quæ alioquin tot fibris implicatur, referre. ¶ Rerum Cōditor, huiusmodi substantiam, quam rectissime duriusculæ conglobatæque pinguedini, ad amissim assimilaveris, tanquam stratum aliquod, aut terram præparavit, cui apte infiniti nervulorum furculi implantentur, quos ob exquisitum tactus sensum, a maioribus nervorum propaginibus, internam manus sedem adeuntibus diffundi vndiq; oportuit. ¶ Ceterum etiam hæc pinguedo durior, admodumq; nervea sit, nihilominus in rerum substantia mollis est, ac proinde occurrentibus cedit, & ad aliud quippiam, neq; id minimū conducit. Media nam inter digitum flectentes tendines, ne aut premantur, aut contendantur munit. ¶ Ossium quoque rectitudinem tunc corrigit, quando in circulum manus quippiam est comprehensura. Proinde externæ digitorum regioni hanc Natura minime communicavit, ut quæ ibidem inutile pondus afferret, adeoque onus fuisset superfluum, quum hæc regio neq; illo absolutissimo indigeat tactus sensu, neq; quicquid in obliquum apprehendat, neq; toties subulas, aliaq; id genus artium instrumenta propellat. Quinetiam in interna manus sede, ipsis quidem articulis minimū, in partibus vero inter articulos mediis: plurimum huiusmodi substantiæ rerum Opifex produxit. Neq; enim carnis adiutorio tali, quale ossibus est necessarium, aliquis articulus indigebat: quum flecti natus sit, & carnea substantia præter quod nihil commodi præstaret, impedimento motui fieret, tum gravans ut superflua, tum etiam internæ articuli spatium excludens, occupansque. Latribus autem digitorum tantum eius substantiæ adnasci fecit, quantum mediū inibi spatium vacuum explere potuit, ut & inde manus, non solum ut divisum in multas partes instrumentum, sed etiam ut omnino indivisum agere possit. ¶ Adductis enim ad se invicem digitis, ita eorum totum mediū spatium ab hac substantia oppletur, ut si quid etiam liquidorum corporum manu supina continere volueris, id effluere non permittat. Quatum vero huiusmodi substantia ad corpora summis digitis apprehendenda auxilii præter, nemini non perspectissimum est, quæ haud latet, si ossium finibus, nihil quod cederet appositum

Carnes sub
stantia. Vef.
lib. 2. ca. 42.

Arabum
error.

Vfus.

Galenus li.
1. de visu
part. ca. 13.

Galenus
ibidem.

fuiſſet, ea facile rumpi debuiffet, nec illis potuiſſe plurima corpora eleuari quod modo huius ſubſtantię, & renitentiũ illi vnguium opera feliciffime obuius. Atq; eiufmodi ſunt huius ſubſtantię proprii vſus. Communis vero quem cum carne adipeq; parẽ habet, is cenſetur, vt propugnaculum ſit aduerſus æſtum & frigora, *vt ſuſius loco citato ex Platone Galenus docet.*

De muſculis radium pronum & ſupinum conſtituentibus. CAP. XXVI.

Quatuor
radiũ pecu-
liariter agē-
tes muſculi.
Gal. lib. 1.
ana. admi.
& libr. 2. de
vſu part. c. 4.
Primus.
Veſalius li.
2. cap. 45.

MVſculi radium peculiariter agentes, per quos prona, ſupinaq; manus efficitur, ſunt vtrinq; quatuor, duõ quidẽ ſuperiori radii extremo ſubſeruietes, reliqui autem duo inferiori: atq; ex iis duo cubiti internam ſedem, alii duo externam occupant. Interiores radium in pronum mouent, exteriores eundem ad ſupinum conuellant. Interior & inferior, qui radii partem brachiali proximam in pronum mouet, ſecundũ vlnę longitudinem, ex tota amplitudine interioris ipſius ſedis enaſcitur, qua brachiali proxima eſt. Hinc carneus ad interiorem radii regionem tranſuerſim procedens, ipſi adhuc carneus inferitur. Habet itaq; hic muſculus, ſi cum reliquis ſecundum cubiti longitudinem expanſis conferatur, fibras tranſuerſas, ex vlna nimirum in radium recta conſcendentes. Præterea ſecundum cubiti amplitudinem, totam interiorem radii vlnęq; ſedẽ cõplectitur, & ad amuſſim quadratus eſt. Tantam enim obrinet longitudinem, quanta eſt latitudo interioris cubiti regionis, quam ſimul cum radio vlna conſtituit. Deinde tã latus viſitur, quam longus, inſtarq; puluinaris ipſum tranſcendentibus ad digitos tendi-
nibus ſubſtratus. Fibrę huius muſculi, radii partem quę brachiale ſpectat introrſum tra-
hentes, radium in pronum agunt. ¶ Exterior ac longior muſculus cõtrarii motus auctor
ab externa humeri regione principium lōge ſupra exterius humeri tuberculũ incipiẽs,
ducit, hinc deorſum expanſus, & latus, validuſq; apparens, radio inſternitur, ſuperiori
lateri muſculi biſido tendine brachiale extendentis contiguus. Vbi vero ad radii finem
cui brachiale coarctat pceſſit, in exquiſitum ſinit tendinem, qui membranę modo la-
teſcens, radii appendicis ſuperiori regioni inferit. Muſculus iſte interiorem partem, q̃
brachiali committitur, in exteriora trahens, radium ſupinum efficit. Porro muſculi ſu-
perio-
riorem radii finem humero proximum in pronum, ſupinumq; ducentes, ita ſe habet.

Tertius.

Interior & ſuperior, ex interioris humeri tuberculi radice, & ex interiori vlnę latere, qua humero articulatur, carnoſo validoq; principio pronafcitur. Hinc admodum oblique internam radii ſedem conſcendit, carnea inſertione ante medium ipſius longitudinis inſertus. A carnea hac inſertione, neruea implantatio ad medium vſq; radii longitudinis exporrigitur, radiiq; ſuperiori regioni hic validiſſime inferit, peculiarem inibi in radio alperitatem, cui interat, ſibi vendicans. Muſculus iſte quoties contrahitur, intro radium ducens, illum conſtituit pronum. ¶ *Exterior*, qui peculiariũ radii muſculorum quartus eſt, ductu figuraq; iam dicto propemodum par, oritur ab exteriori articuli cubiti regione ab articulum ambiente ligamento, valide etiam ex vlna in poſterioris ſui proceſſus, quem *ἀλῆξ, αὐτὸν* Græci vocant, *externum latus*, *principii ſui portionem ſumens*. Hinc ad radium in priora conſcendit, & radio prope interioris muſculi inſertionem ap-
plantatur. Huius tamen inſertio non æque atque interioris neruoſa eſt, neque adeo in radii longitudinem producit. Attamen ductus breuitas hos duos exacto tendine de-
ſtituit. Muſculus hic ſuperiorem radii partem extrorſum oblique conuellens, radium ad ſupinum agit. Ex iis igitur conſtat totum radii os, internorum muſculorum beneficio pronum, exteriorum autem ſupinum effici, ac deinceps radii ope, ſummam manum eoſdem oſtendere motus.

De muſculis motuum brachialis opificibus. CAP. XXVII.

Primus bra-
chiale mo-
uens mu-
ſculus.
Veſalius li.
2. ca. 44.

BRachiale quatuor p̃cipuis agit muſculis, quorum primus ex interno humeri tuberculo ex carnea nerueaq; ſubſtantia miſtum principium aſſumit, hinc totius vlnę longitudini adnatus, internam huius ſedem magna ex parte amplectit, quemadmodum
& medium quoq; ſedis ipſius inferioris, toto fere vlnę ductu occupat, quo ſcribentes in-
pitimur. Vbi ad vlnę vſque finem prorepiſit, paulo ante cubiti cum brachiali articulum, in validum & quodammodo teretem tendinem ceſſat, carniſormi ſemper ſubſtantia ad
brachiale vſq; auctum, qui dum articulum tranſcendit, proruſus ex carnis eſt, validiſſima inſertione, inferiori quarti brachialis oſſis ſedi implantatur.

- A** *Secundus brachiale mouentium musculus*, ex interiori quoque humeri tuberculo enascitur, *Secundus* & obliquo ingressu ad elatius primi digiti flectentis musculi latus cōtendit, ipsi magna ex parte infiltratus, & radio exporrectus. Ante brachialis autē radicem in exquisitē tere-
tem degenerat tendinem, qui simulatque brachialis internam sedem præterit, latefcens in postbrachialis ossis quod radici præponitur, radicem inseritur. ¶ Duobus autem in-
ternis iam dictis alii duo externi respondent, vnus, qui tertius est brachialis musculus, *Tertius* ab exterioris tuberculi humeri radice principium capit, atque hinc prodiens, humiliorē
exterioremque vlnæ regionem amplexatur. Quum vero brachiali appropinquat, in tere-
tem finit tendinem, qui sinui in appendice vlnæ ad p̄cessus stylium imitantis internum
latus exsculpto, innititur transuerso ligamēto, quod vnicum vlna proprium nanciscit,
B obductus. Quum primum ligamento superato, brachiale superuehitur, latior factus *Quartus*
postbrachialis ossi minimum iustineti digitum non procula brachiali inseritur. ¶ Alter
exteriorum, qui ordine quartus est, latiusculo principio lōge supra exterius humeri tu-
berculum enascitur, vbi humerus velut in oblōgam acutiem prominet. Hinc carnosus,
& longa vtcunq; linea prodiens, radio insertitur, & prope illius longitudinis medium,
in robustum deinit tēdinem, qui bicornis bipartitusve statim ab ortu visitur, & progre-
diens tandem in postbrachiale amplis insertionibus implantatur. Vna quidem pars in
radicem ossis indicem sustinentis; altera vero in radicem eius cui medius innititur digi-
tus, intertionem tentat. Duo primi interioresve simul brachiale flectant, alii duo exter-
ni, tertius nimirum & quartus, si ambo tendantur, id extendunt. Verum primo simul
C cum tertio tenso, brachiale in internum latus agitur. Secundo autem & quinto vna la-
borantibus, id in externum latus inclinatur.

De musculis manus digitos mouentibus. CAP. XXVIII.

- D** Igitos manus mouentes musculi sunt viginti octo. *Primus* horum principium teres, *Primus*
& statim ab exortu grande, ac ex carne, nerueaque substantia mistum ex interiori
humeri tuberculo nanciscit, ilque a crasso alioquin suo exortu latior efficitur, atque
versus vlnæ radiique medium perreptans, perquam obscure ab ipsis principii sui portio-
nem assumit. Hinc exacte carnosus & teres, in amplitudinem tamē modice depressus,
ad brachiale prorepat. Antequam vero brachialis radicē contingat, notabili satis a bra-
chiali intervallo, ipius vter in angustum magis coactus, in quatuor carnosas partes di-
D uiditur, quæ singulæ nervosiores angustioresque factæ, illico in exactos tendines, q̄ secū-
dis quatuor digitorum internodiis inserunt, cessant. Hi ad amissim teretes simul com-
muni mēbrana vtcunq; & mucosa inuoluti, brachialis cum cubito articulum, ipsumque
brachiale transcendunt, communi oēs ligamento in brachialis sinu obducti. Est autem
id ligamentum validum, & transuersum, ex vna brachialis parte in alteram pronatum,
annuliq; formā, q̄ ad eius cavitatem spectat, præcipue referens, & totam brachialis am-
plitudinem, qua ex ipsa originē ducit, succingēs. Munus autem ipsius est, secundū qua-
tuor digitorum os flectere, illud brachialis medio vbi inuicem adhuc ipsis colligantur
tendines, quam potest proxime admouens. ¶ *Secundus* musculus primo subiectus ab ea-
Secundus dem sede cū primo, hoc est, ab interiori humeri tuberculo, sed magis decliue, sub primi
E nimirum capite, originem ducit. Hinc prodiens, exquisitē carnosus & teres, nonnihil
tamen latus, & vt primus modice depressus, euadit, & mediam cubiti sedem compre-
hendens vlnę adhuc adnascitur. Vbi vero parum vltra mediam cubiti longitudinem de-
scendit, aliquanto angustior redditus, in quatuor carnosas portiones similiter ac primus
finditur, quæ ante brachiale in teretes cessant tendines, qui primi tendinibus subiecti,
ante secundi digitorum internodii radicē eos tendines findunt ac perforant, tandemque
in tertia quatuor digitorum ossa insertionem molientes, ea flectunt. ¶ *Tertius* carneo *Tertius*
teretiq; principio pronascitur, ex vlnæ sede, qua hæc radii capitulum in proprium sinū
F amplectitur, ac vbi radius ab vlna primum dehiscit. Hinc vniuersæ radii propemodū
longitudini adnatus & expansus vbi ad brachiale properat, in teretem cessat tendinem
peculiari membrana, quam mucor imbuat, obtectum, qui tandem tertio pollicis ossi,
articulo ve inseritur, ipsius flexus auctor euadit. Neque enim prædicti musculi non nisi
suorum, quibus inseruntur, ossium flexionis opifices censendi sunt. Tres itaque nunc
dictos musculos ex diffitis regionibus, per totam nimirum cubiti longitudinē Natura

Naturæ in
musculis
digros fle-
ctantibus
industria.

produxit, ne si forte in extrema manu principium assumerent, eam carne obruentes, A magnam ponderosamque redderent, quod ad varia quæ manu obeuntur munia valde incommodum futurum erat. Deinde robur in flexione maius requirebatur, quæ quod breuibus musculis præstari valebat, qui ex proximis iis quæ mouenda erant ossibus principium ducerent. ¶ Porro tendinibus transversa ligamenta secundum digitorum ossa obducuntur, ne quoties secundum aut tertium digitorum os inflectimus, tendines tanquam recti, protensiq; funiculi, & virgulæ secundum ossium flexionem non incuruatæ, a flexo iam osse ad cubitum tensæ exsurgerent, & eam in miram altitudinem eleuantes, manus volam turpiter implerent. ¶ In vola vero & brachialis sede mucosis membranis tendines induuntur, quo tutiores procederent, easq; membranas tanquam propugnacula & muros sortirentur. Quum itaq; secundum quatuor digitorum internodium B a primo musculo flectatur, tertium autem a secundo & tertium pollicis a tertio, oportu- num erit vt musculos prima quatuor digitorum ossa, & primum secundumq; pollicis flectentes aggrediamur. ¶ Sunt autem ii omnes numero tredecim, ad singulos nimirum quinque digitorum primos articulos bini, & ad secundum pollicis terni. Omnes vero ii musculi in extrema manu reponuntur. ¶ Horum octo, qui quatuor digitis seruiunt, recta secundum postbrachialis longitudinem digitos adeunt, omni propemodum ex parte carnei, ac postbrachialis ossibus connati. Inferuntur autem lateribus interiori in sede primorum ossium. Duorum igit paruum digitum flectentium vnus ab exteriori latere superioris partis postbrachialis ossis quod paruo digito prælocatur, carnosio principio oritur, & non nihil inibi adnatus brachiali. Hinc recta digitum accedens, ad primum vsq; os digiti carnosus manet. Vbi vero os contingit, latiusculo redine exterioris ossis lateri, versus interiora tamen inferitur. Alter ex interiori eiusdem postbrachialis ossis latere, ad superius iuxta brachiale extremum, originem ducit, & inter id os & sibi proximum ad digitum tendens, carnosum quoque permanet, donec membraneo tendine interiori lateri primi ossis parui digiti implantetur. Quando utriq; musculi colliguntur, primum digiti os, in neutrum latus vergens flectitur. Si vero exterior egerit, interiori quiescente, digitus in exteriorem partem non nihil inclinans flectitur. At solo interiori laborante ad interiora conueniens digitus flexionem experietur. Ad hunc sane modum aliorum trium digitorum musculi habent, adeo vt bini in singulis postbrachialis ossium internodis, quæ tria sunt, reponantur. ¶ Duo autem ex iis qui pollicis primum internodium flectunt, vna cum musculo qui pollicem a ceteris digitis abducit, carneam mole constitunt, quæ ad pollicis radicem reposita, montem quem Chiromantici modo *Veneris*, modo *Martis* appellant, effingit. ¶ *Primus* itaque & maior pollicis musculus ex superiori transuersi brachialis ligamenti sede carneus nascitur, & toti primi pollicis ossis longitudini interna regione attensus, perpetuo carneus illi inferitur, perquam obscure secundum pollicis contingens internodium. ¶ *Secundus* iam dicto prorsus occultatur, longeque minor est, ex transuerso quoque ligamento, & osse brachialis pollicem fulciere pronatus, in primi pollicis ossis radicem implantatur, non ultra medium longitudinis primi eius ossis pertingens. Sunt itaque ii duo pollicis musculi inter digitorum motores duodecimus & decimustertius.

Porro tres qui secundum pollicis os flectunt quodammodo transuersi cernuntur. ex vola enim e quarta circuli parte principia sortiuntur, nimirum ad eius lineæ circumscriptionem, quæ *Vitalis* & *cordis* Chiromanticis appellari solet. ¶ *Primus* itaq; musculus obliquum, latumque principium ducit, ex postbrachialis osse, cui medius innititur, modice subter ipsius capitulum, quæ sinu primi ossis digiti subingreditur. Hinc carnosus, prepens non nihil angustior redditur, & membraneo tendine, secundi pollicis lateri, quæ indicem spectat versus interiora se inferit. ¶ *Secundus* superiori suo latere iam dicto musculo contiguus, ex media sede postbrachialis ossis, quod medio præponitur digito, originem ducit non nihil tamen & os, quo annularis fulcitur contingens. Origo huius tenuis laraque est, & statim carnea ad insertionem vsque conspicitur, quam in medio interioris partis secundi pollicis internodii tentat. ¶ *Tertius* huic inferiori ex parte contiguus, ex postbrachialis ossis, quo annularis sustinetur radice, quæ brachiali coarctatur, originem pariter latiusculum sumit, & oblique pollicem accedens, lateri interiori secundi pollicis internodii, versus priora implantatur. Isti tres musculi dum vna tenduntur

Transuersorum ligamentorum usus.

Musculosarum membranarum usus.

Tredecim posttertiū ordine in numero succedentes. Octo qui quatuor digitis seruiunt.

Duo qui pollicis primo ossi famulantur. Mons Veneris Vel Martis.

Tres qui secundo pollicis ossi famulantur. Linea vitalis. Primus.

Secundus.

Tertius.

- A** fortissime secundum pollicis internodium flexunt. Primo autem duntaxat agente, ad superiora versus indicem pollex dirigitur. Dū vero secundus solus contrahit, ad medios digitos pollex flexitur, quemadmodum infimo ad suū principiū contracto, pollicis ad inferiora, & magis versus paruum digitum flexio perficitur. Atq; hæcenus sedecim digitos mouentes musculos recensuimus. ¶ *Decimus septimus*, qui digitos extendentium primus erit, principio ex carne nerueaq; substantia misto, & utcunq; lato, ab elatori sede exterioris humeri tuberculi enascitur, & per mediam cubiti sedem magnus & carnosus, & paulo minus toto teres porrigitur, nullo alteri connatus ossi. Quum v. prope radii extremum, cui brachiale inarticulatur, pertigerit, atq; tior redditus, in quatuor breues carnosas portiones, in musculi substantia non procul diremptas, finditur, q̄ simul cōmuni membranea indutæ, fibrisq; tenuibus inuicem cohærentes, atq; in tendinē illico ab ipsorum a musculi ventre deductu degenerantes, per sinū in radii exteriori sede exsculptum, ad brachiale cōtendunt. Huic itaq; sinui utcunq; amplo, quatuor ii tendines incumbentes, transuerso ligamento ipsis peculiari obuoluuntur, ne aliquando ex sinu declinent. Quod ubi transcenderunt, brachiali iam incumbentes, latelescentesq; ab inuicē deducti, singuli ad vnumquemq; quatuor digitorum, indicem, medium, ac annularem præcipue præpunt, eosq; extendunt. Tres n. tantum tendines, ut plurimū, exhibet hic musculus, etsi quatuor Galeni nomine illi largiti simus. ¶ *Decimus octauus*, musculus gracilis longusq; est, inferiori lateri decimiseptimi secundum cubiti longitudinē exporrectus. Ab exteriori enim humeri tuberculo principiū sumit inter decimiseptimi caput, & principiū alterius musculi, qui post brachialis ossi, quo minimus digitus fulcit, insertus, brachialis extensoris dux censetur. A principio secundum latūs decimiseptimi carnosus fertur, quousque cubiti finē attingit, ubi in duos tendines bipartitus, cōmuni radio & vlnæ sinu, & ligamento vitæ. Tendines statim atq; brachiale superarunt, inuicem dirimuntur, & vnus ad paruum, alter annularem frequenter contendit digitū, ac singuli in suo digiti primum os inferuntur. Frequentissime tamē vnicū duntaxat tendinem in paruum digitū ferri cōspicias. Parui digiti extensionis primarius auctor est hic musculus, abductioni etiam versus exteriora non nihil subseruit. ¶ *Decimus nonus* duob. vltimo iam enarratis substratus, obliquo ductu donatur. Ab vlnæ osse vltra medium ipsius longitudinis, versus brachiale exquisite carneus pronatus, obliq; radii appendicem petit, ac priusquā hunc cōtingit, in duos inuicem cohærentes tendines finitur, qui proprio sinui in radii appendice incumbentes, & peculiari ligamento transuersim obuincti, super brachiale expandunt. Atq; hic dirempti, illorum superior indici, inferior autē medio exporrigitur, exteriori, inferiorive digitorum lateri versus posteriora inserti. Quod v. præsens musculus a pollice abductionis eorū quib. inseritur digitorū auctor sit, situs ipsi, insertioq; liquidissime commōstrant. Ceterum is non semper in indicē & medium digitos, sed duntaxat in indicē, tendines porrigit. Horū iam enarratorū trium, nepe decimiseptimi, decimioctauī, & decimioctauī musculorum tendinib. ubi post brachiali membranulis & fibrosis nexib. committantur, priuatim id accidit, ut singuli latelescentes velut in plures diuidantur, ut iam latiores multo, & tenuiores redditī, ad digitorū radices, mirabili neq; semper eadē serie inuicem misceant, vnius digiti tendinis portione etiam cōspicua ad alterius digiti tendinem pertinente. ¶ *Vigesimus* brevis, sed validus, a quarto brachialis osse pronascitur, & per lunæ monticulum ad paruum digitum perges, toto ductu carneus vitæ, muris seu lacertæ formam eleganter exprimens. Quippe musculus iste in exortu utcunq; tenuis, in medio teres, crassusq; est, in insertionē autem, q̄ in externo primi ossis parui digiti latere molitur, gracilis, tenuisq; & nerueus euadit. Hic quidem paruum digitum in latūs abducit. ¶ *Vigesimus primus* ab vlnæ exteriori sede, iuxta ligamentum membraneum inter cubiti ossa, qua inuicem dehiscunt, consistens, & iuxta medium longitudinis cubiti enascitur, versus radium oblique properans. Priusquam vero radii inferiorem cōtingit appendicem, in paulo minus toto teretem cessat tendinem, qui externo lateri exterioris pollicis regionis indicem spectantis ad tertium vsq; articulum inseritur. Hic pollicis versus indicem extensionis auctor est. ¶ *Vigesimus secundus* ab vlna paulo superius quam nuper dictus principio utcunque amplo prodit, longaue satis linea enatus, & oblique super radium conscendens, illi insertitur musculo, qui bicorni tendice brachiali inseritur. Simulatque vero parte sua qua iam dictum musculum integrit in duas portiones

Decimus
septimus.Decimus
octauus.Decimus
nonus.

Vigesimus.

Vigesimus
primus.Vigesimus
secundus.

scinditur, a sese nullo interuallo distantes, sed mutuo incumbentium musculorum ritu A
inuicem hærentes, superior portio aliquamdiu carnea permanēs, in tendinē quodam-
modo teretē cessat, insertū exteriori brachialis ossis sedi, q̄ pollicem sustinet. Inferior a,
principii portio, statim ac aliquousq; in anteriora præsit, in duas rursus carneas partes
distinguit, q̄ singulæ in tendinem finiunt, ac cum superioris portionis tendine, proprio
sinu in radii appendice leuiter inciso insidēt. Postquam v. inferioris portionis tendines
brachiale superarunt, vnus in primi pollicis internodii radicem implātur, illic in ex-
ternam ipsius regionem iuxta internum latus finiens. Alter tendo membranoso
tantum nexu primi pollicis ossis longitudini adhærens, in secundi ossis radicē exteriori
sede, versus internum latus inseritur, neq; is inibi totus desinit, verum ad summum vsq;
pollicis apicē, secundo & tertio pollicis ossibus perrinaciter quoq; adnascitur. Horum B
tendinum beneficio pollex introrsum versus extenditur. ¶ *Vigessimus tertius* ab anteriori
sede ossis brachialis, cui pollex innititur, nerueo principio, quod statim carneum eu-
adit, enascitur, ac deorsum protensus, primo pollicis ossi membraneo tendine inseritur.
Hic musculus vna cum duobus primum pollicis internodium flectentibus, quibus iste
infernitur, carnosam volæ partem efformat, quæ ad pollicis radicem consistit. Muscu-
lus iste quam maxime pollicem ab indice remouet, & abducit. ¶ *Vigessimus quartus* ex in-
teriori latere, versus posteriora tamen, ossis postbrachialis indicem suffulcientis, initiū
ducit carneum, & secundum totam eius ossis longitudinem enatum. Carnea vero im-
plantatione toti externo lateri primi pollicis ossis inseritur, membraneum tendinem
radici quoq; secundi ossis porrigēs. Huius musculi auxilio pollex indici proxime addu-
citur, & accommodatur. ¶ Superiunt adhuc quatuor musculi graciles & teretes, singu-
lis quatuor secundi digitos mouentium musculi tendinibus, qui quatuor digitorum ter-
tium os flectunt, exporrecti. Enascūtur enim ex membraneo inuolucro, tendines illos,
quum brachialis sinum, & transuersum ipsius ligamentum perreptant, induente. Hinc
simul singuli cum singulis tendinibus ad digitos pcedentes, ac interiori tendinis lateri
attenti, in digitorum radicem primum os inseruntur ad internum eorundem latus, ver-
sus interiora insertionem membraneam moliri. Præsentibus musculis hoc sane rarum,
perinde ac oculi musculis obuenerit, quod nō ex osse aut cartilagine, sed ex membraneo
tendinum inuolucro originem sumserint. Iam dicti quatuor musculi digitos in latus ad D
pollicem adducunt reclinantque.

De ligamentis manus. CAP. XXIX.

Manus qd.
Vesl. lib. 2.
cap. 47.

MANUM appellat Hippocrates, quicquid a scapula ad extremam vsq; digitorum aciem pro-
tenditur, cuius nunc ligamenta nobis enarranda veniunt. Horum igitur alia inuicem ossa
colligant, alia subditis corporibus munimenta existunt, instar tunicarum musculis ob-
ducta. Alia adhæc, tendines in suis sinibus ita continent, vt quocūq; modo tracti fue-
rint, sua sede ne tantillum quidem vagari queant. Quippe singulis tendinibus per bra-
chiale, & volam ad digitos reprætibz obuolutæ sunt membranæ, mucore quodam im-
butæ, & ligamentorum ritu tendinibus obductæ. ¶ Quæ v. subditis corporibus muni-
menta, & ne ex ipsorum cauitatibus declinent vincula censent, trāsuerſa sunt ligamēta, E
tendines in suis sinibus cōtinentia. Siquidem vniuersę interiori sedi quatuor digitorum
vnum exporrigitur, & pollicis etiam secundo & quasi tertio internodio vnum eius ge-
neris expandit. Atq; hæc omnia eundem præstāt vsum, quo tendines digitos flectentes
amplexantur, & annuli modo continent. ¶ In interna brachialis regione vnū conspicif
oēs digitorum tendines, qui hac præpunt, cōstringens. Atq; hoc latum est, & ceteris om-
nibus huius generis robustius, sed interim neq; postbrachiale, neq; cubitū cōtingens.
Ceterum in externis cubiti partibus qua brachiali articulatur, sex transuersa ligamenta
sefe offerūt, quorū beneficio tendines in ossiū sinibus reseruant. At hæc si in superficie
tantum spectentur, vnicum esse videbunt, totius cubiti latitudini expansum, q̄ dissectū
sex spectandos offert annulos, transeuntibus tendinibus obductos. Primum ex vlna in F
radius procedit, atque ad communem vlnæ radiique sinum refertur. ¶ Secundum ad
externum primi ligamēti latus repositum, soli vlnæ, illiq; musculo peculiare est, qui an-
te paruum digitum insertionem tentans, brachiali extensionis opitex existit. ¶ Tertium
ad internum primi ligamenti latus habetur, solique radio proprium est. ¶ Quartum ad
internum latus tertii positum, angustissimum efficit annulū, vt & tendo, quæ trāsmitit,

gra-

Ligamenta
annulorum
modo ten-
dines con-
tinentia.

- A** gracilis est. ¶ *Quintum* bicorni tendini, quo brachiale extenditur, & illi qui pollicem versus indicem evertit, viam largitur. ¶ *Sextum* tres tendines transmittit, quorum vnus brachialis ossi ante pollicem, alter primo pollicis ossi, tertius autem secundo, & tertio inferitur: Interdum tamen pollicis musculo priuatum quoq; ligamentum obducitur, & tunc septem ligamenta in externa cubiti sede reponuntur. ¶ Præter hæc ligamenta per vniuersam cubiti longitudinem, omnibus musculis valida membrana obnascitur, musculos inuicem committens, atq; ne sua sede illi dimoueantur, atque inter sese implicentur, transuersa alicuius ligamenti ritu continens. ¶ Porro ligamenta quæ ossa inuicem colligant, in omnibus sunt articulis, nullam nisi paucissima, peculiarem naturam a ceteris articulos ambientibus ligamentis sortita. Membraneis enim & articulum solum circumdantibus ligamentis digitorum necantur internodia.

Membrana
musculis
obnata.

Ligamenta
ossa inuicem
committē-
tia.

- B** Postbrachiale autem brachiali, validis ligamentis per exteriora etiam ductis colligatur. At postbrachialis ossa, qua mutuo in ipsarum radice iuxta brachiale se spectant, cartilaginis naturam referentibus ligamentis inuicem committuntur, quæ non orbiculatim tantum ambiunt, verum & in ipsorum medio habentur, qua ossa se inuicem respiciunt. ¶ Brachialis ossa validissimis ligamentis cartilaginis naturam referentibus, simul vnita hærent, atq; hæc ligamenta ipsis vndiq; obducunt, & quibusdam etiã sedibus illa intercedunt: idq; potissimum in illorū ossium interuallis q̄ in secundo ordine reponuntur, quibusq; postbrachiale coarctat. Quæ cubitum, seu radius, vnamq; brachiali colligant, membraneis reliquorum articulorum ligamentis respondent. Radius v. & vlna, prope brachiale & cubiti cum humero articulum, ligamentis validis, in circuitu ossa ambientibus alligatur. Per totam longitudinem, qua inuicem radius & vlna dehiscunt, validum & membraneum habetur, ab acutiori vlnæ linea in radii lineam insertum. Radius humeri exteriori capiti validis, sed membraneis ligamentis, perinde ac ceteri articuli, alligatur.

De peculiaribus penis virilium testium, & muliebris uteri musculis. C A P. XXX.

- P**ENEM quatuor mouent musculi, quorum duo carnei quidē enascuntur ab anteriori sede musculi rectū intestinum orbiculatim amplectentis, de quo suo dicemus loco, inuicē sibi proximi, & internis lateribus mutuo committuntur, rectaq; sursum in priora ad vrinarii meatus sub illis corporibus ad superiora reflexum ascendentes, eius meatus lateribus inferantur, & inuicem dirempti, corpora penis non nihil digitorū modo amplexantur. Alii duo vrinæ, habentur singuli, ab appendice ossis coxendicis paulo inferius, quæ penis corpora principium ducentes, quod carneum est, & gracile, & oblique sursum procedentem efficit musculum, qui carnosus permanens, sui lateris corpori non procul ab exortu inferitur. ¶ Quatuor his musculis penis radix voluntario impetu trahitur, hinc & eiectionis quandam vim præter naturalem ipsi facultatem insitam, obtinet. Quanquam priores duo musculi in vrinæ, seminisq; excretionibus communē illum vrinæ, seminisq; meatum veluti digitis quibusdā aperire videntur, ne meatus in obliquo hoc reflexu restrictus, eiusmodi humorum expulsionem prohiberet, & potissimum seminis, cuius eiactationem Natura impetu perfici voluit. Nisi enim ii musculi inferiorem meatus sedem in hoc reflexu deorsum vellerent, in penis tencigine rotus meatus occluderetur, quod ipsius pars superior a distentis corporib. adeo pertinaciter huc illuc alliceretur. ¶ Porro ad vnumquemq; testem singuli musculi graciles admodum pertingunt, ex ea vasorum seminalium & testis tunica efformati, q̄ a peritonæo principium ducens, vasa simul cum teste continet. Hæc enim in posteriore ipsius sede illico, in ipso a peritonæo exortu, longis rectisve, ac inuicem sibi proximis, carneisq; fibris ita adaugetur, vt fibræ illæ gracilis oblongiq; musculi naturam expriment, qui illi testis tunicæ semper innatus deorsum protenditur, ac tandem iuxta infimam testis sedem, vna cum illa tunica vasi ei seminario applantatur, quod a testibus iam paratum semen assumit, idque sursum in peritonæi amplitudinem deducens, in vesicæ ceruicem se profundit. Neque al. qua prorsus parte, testibus, aut seminariis vasis tunica illa pertinaciter adnascitur, quam vbi simul cum musculosa ipsius substantia insertionem ad semen deferentis vasis inflexum molitur, quia ad infimam testis sedem reflectitur adeo, vt musculus ipse nusquam restem contingat. ¶ Horum quidem musculorum ope, testes viri oblique ac modice sursum velluntur, ne plus æquo laxati, & ad anteriora pendentes, nimio oneri

Penis mus-
culi.
Vesicæ
cap. 50.

Vfus

Viriliū re-
stium mus-
culi. Vasa
seminaria
cap. 33.

Gal. lib. 2.
de semine.

Arabum
error.

Musculi
muliebris
vteri.

feminariis vasis sint. Hinc est quod Græcis *νεφροσπέρ* sint dicti. ¶ Prædictum vero vsum A musculi illi in coitu potissimum præstant, si enim testes vasis feminariis oneri semper essent, atq; hæc ad inferiora protracta perpetuo arctarentur, non adeo commode semen eiacularent atque modo, quum testium a musculis iam attractorum pondere subleuata, magis patefcent. ¶ Ceterum ii musculi nullum sortiuntur muscolum, contrarii motus auctore. Nullus enim qui testes ad inferiora reuellat exstructus est, quandoquidem testes, quos non nisi recta deorsum, nec in vllam partem inclinantes prolabi decebat, abunde a naturali ipsis indita grauitate dimittuntur, idq; subinde adeo, vt ne minimum quidem sursum ægris, senibusq; allici possint. Vt errasse Arabes hinc euidentissimū sit, qui binos in viris cuiusq; testis musculos, in mulieribus autem vnicum haberi scriptū B reliquerunt. ¶ Porro mulierib. Natura similiter musculos largitur, quos in peritonæo, vt reliqua ipsarum generationis instrumenta, recondidit. Ea enim peritonæi pars seu processus, qui vtiq; a lateribus ad vterum instar mesenterii pertingit, venasque & arterias vtero deducit, & demum cum alterius lateris peritonæi processu, exteriorē vteri tunicam procreat, carnosus quoq; adaugetur fibris, ex ilium regionibus deorsum oblique, ad vteri latera perreptantibus, adeo sane, vt & mulieribus vtrinque singuli sint musculi, illis specie similes quibus viri testes donantur. Et plerunque sunt graciles, neque admodum carnei. His leuiter vterus ad superiora versus ilia contrahitur, quod mulieres tunc facile percipiunt, quum ilia trahere, colligereq; conantur, & vteri ceruicis os, totumq; vterum, penitus in peritonæi amplitudinem allicere student. C

De ceruicis vesicæ musculo. CAP. XXXI.

Virilis vesicæ musculus.
Vesalius lib. 2 cap. 50.
Gal. lib. 5.
de vtu part. cap. vtri.
Muliebris vesicæ musculus.
Vtus.
Galenus ibidem.

AD virilis vesicæ finem vbi in ceruicem finitur, glandosum quoddā corpus ipsi obnascitur (de quo tertio agemus fusius libro) inter quod & reflexum, quem vesicæ ceruix sub pubis osse primum molitur, musculus vnus, totam fere hanc meatus sedem orbiculatim ambiens, nascitur, qui oblonga annuli, aut oblongi rotundiq; meatus effigiē exprimit, fibris transuersim circularibus intertextus, & superius iuxta glandosum corpus crassior, quam inferior. ¶ In mulieribus vero, quarum vesicæ ceruici eiusmodi corpus glandosum non adnascitur, musculus totū meatum ambit, qui a vesicæ corpore in superiore sedem ceruicis vteri non procul a pudēdo subiugreditur. Et quanto hic musculus in mulieribus prolixior est, tanto etiam tenuior visitur. ¶ Eundē vsum in viris & mulieribus præstat. Siquidē primario a rerum Opifice conditus est, vt meatui vesicæ præficeret, obstaculo futurus ne transuersæ vesicæ fibræ motu suo naturali vrinam præter voluntatem excernant. Necesse enim fuit egerendise corpore excrementis motus præesse voluntarios. Si enim naturali duntaxat motui excrementorum expulsio committeretur, continuo promanarent, atque id præterquam quod foedissimum censeretur, ad plurimas actiones, quas tota vita subimus, insignes noxas inferret.

Quo minus igitur circulares vesicæ fibræ, vrinā quoties ipsa aut copia, aut mala quapiam qualitate hominem grauat, etiam citra hominis imperiū, ppelleret, Natura meatui vesicæ hunc muscolum præfecit: quo laxato vrina transuersarum vesicæ fibrarum vi E pressa excernitur, interdum etiam huic functioni auxiliantib. abdominis musculis, & septo transuerso spiritus compressu ad inferiora (vt suo diximus loco) depulso. Quum vero vrina defluxit denuo musculus constringitur, quicquid ex vrina reliquum meatui adhuc inhæret propellens. Relinquuntur autem tres quatuorve guttulæ, quæ emissæ iam vrina promanare solent. Atque ita constat duos esse præcipuos præsentis musculi vsus, vnum quidem, vt ori vesicæ claudendo opituletur: alterum vt nihil in vrinario meatu relinquatur. Tertius vsus est, Galeno attestante, vt ad excretionis promptitudinem, velocitatemque, nō quidem eius vrinæ quæ est in vesica, sed illius quæ est in vrinario meatu, cōferat. Neq; enim tam velociter vt nunc vrina mordax vrinarium meatum pertransiret, nisi hunc muscolum extrinsecus ei meatui, qui abunde obliquus est, Natura circūposuisset. ¶ Atq; hanc quidem Galeni fuisse sententiam verba eiusdem palam testantur. Ait enim, Ne vero id omne, quod ex vesica comprimente hoc musculo, in meatū vrinarium tortuosum admodum inciderit, diutius ibi insideat, muscolum hunc qui ex fibris transuersis conflatu est, extrinsecus ipsi circumiecit, qui prorsus & ori ipsius vesicæ clausioni subsidio futurus esset. Et paulo post inquit. Porro quæ ipsam iniectionem excipit eius quod reliquū est guttatim expressio, ac potissimum

Ibidem.

quum

A *quum urina mordax admodum fuerit, a nullo superiorum instrumentorum, sed ab hoc solo perficitur musculo.*

De recti intestini musculis CAP. XXXII.

Natura recti intestini extremo finive, anum vocant, tres musculos largita est. *Vnum*, Anus. Vesalius li. 2. cap. 51. qui immaturam inuoluntariamq; excrementorum egestionem prohibet: & alios duos, qui post egestionem protrusum recti intestini finem alacriter sursum reuellunt. Hi itaq; lati & tenues, neq; admodum carnosii aut rubentes sunt. A ligamentis ex pubis ossibus, & coxendicis osse, & sacro exortis, quæ huius regionis musculis obducuntur, ipsaq; demum peritonæi infima sede, vtrinq; singuli enascuntur musculi, qui deorsum protensi, rectum intestinum amplexantur, extimq; tertiæve ipsius tunicæ inserti. **P**ræ-
Bsentes musculi cum lati admodum sint, & suis finibus totâ intestini latitudinē ambiant, ipsorum portio radici quoque penis, mulieribus vero vteri cervici adnascuntur.
Horum utiq; musculorum (*ut comprehensum est*) munus esse solet, ut sedem illico ab excretionem sursum reuellant, quæ deorsum in musculorum abdominis, & septi transversi, auxiliantibus etiam subinde omnibus thoracem arctantibus spiritumq; continentibus musculis, propellebat. Nullus autem illis, qui anum sursum ducunt e regione opponitur contrariæ functionis opifex, qui nimirum deorsum trahat, *quemadmodum in multis alijs partibus musculi opponi consueverunt.* Sciebat enim Natura interdum a musculis abdominis vna cum septo transverso, sedem adeo protrudi, ut ne a relatis quidem duobus musculis promte queat retrahi, sed manibus egeat auxiliatricibus. ¶ Ab horum fine tertius præ-
Cterea musculus existit, qui orbiculatim extremum recti intestini ad cutem vsque amplexitur. Hic præ dictis similiter non admodum carneus est, & mucore quodam oblitus, fibras tamen transuersas adipiscitur. Elatiori parte quæ dictis musculis connascitur crassior, quam inferiori est: quæ vero cuti permiscet, peculiare cū ipsa corpus efformat. ¶ Cohæret autem fibrosis nexibus meatui vesicæ in viris, in mulieribus v. cervicis vteri principio. Quanquam etiam duorum musculorum, quib. in viris principium porrigit, interuentu, peni committitur. Ceterum posteriori suâ regione, quatuor coccygis ossiculis adnascit. Ex lateribus connectitur teretibus ligamentis a sacro osse in coxendicis ossibus. ¶ Præsens musculus non adeo, ut pleriq; arbitrantur, brevis est, sed longus, & secundum magnum recti intestini longitudinis intervallum exporrectus visitur. Quod
Dnon perfunctorie ab illis venit expendendum, qui sedis fistulas, & excrescentias, quas *σφιγμάτια, καὶ κονδυλίδια* Græci appellant, subinde præscindere verentur, huius musculi muneris abolendi metu. Licet enim musculi portio aut ferro diuidatur, aut quavis alia occasione diuisa laceretur, tamen quum latior secundum intestini longitudinem sit, eius munus non ita promte aboleretur. ¶ Musculus iste circulatim intestinum rectum ambiens, eius orificium stringit, ne præter voluntatem intestina naturali suo motu excrementa assidue egerant, sed ut tempestive, dum aut mole, aut vitiata qualitate hominem molestant, laxatus instar fidi ianitoris ea transmittat. Hinc rectissime Græcis *σφιγξ*, quasi dicas *constrictor*, nominatur.

De musculis femur mouentibus. CAP. XXXIII.

Femur decē, aut si in maximū redigant numerū, quatuordecim propriis agit musculis, qui id extendunt, flectunt, introrsum alteri cruri adducunt, extrorsum in latus amouent, & circumagunt. Flectitur itaq; femur ad inguina, quū ipsum attollimus, & sursum ferimus. Exteditur a. quū id deorsum, & ad terrā deprimimus. Summā v. extensionē habet, quū stamus. Proinde Natura iure optimo fortib. multis ac magnis musculis actionē hanc, nepe extensionē, comisit. ¶ *Primus* igitur femur mouentiū muscul⁹, sub summa cure consistens, alteriusq; lateris natem præcipue efformas; ab iliū ossis posteriore parte lato & carnosio admodū principio, & sacri ac coccygis ossis posteriori sede, velut ex semicirculo enascitur, & in corporis lat⁹ non nihil obliq; deorsum perreptat, toti coxendicis articulo superuectus. Vbi v. articulo insternitur, gracilior, angustiorq; tãtis per efficitur, donec in latum & validum finiatur tendinem, quo exteriori magni femoris processus sedi, & eius quoq; radici ampla insertionē innascit. ¶ *Secundus* magna ex parte sub primo recoditus, ac admodū liuidus, præsertim in musculosis, & nõ valde obesis, ab anteriori superio-
Friq; ossis iliū spinæ regione lato quoq; & carneo exortu enascitur, totam fere ilium ossis

spinæ sedem occupans, a qua primus initium non mutuauit. Hinc deorsum obliq; non-
 nihil ad latus descendit, vt sensim arctior redditus, primum musculus totum subeat, ar-
 ticulū quoq; coxendicis integens, e cuius regione in membraneum, sed validum tendi-
 nem cessat, q; elatiori magni femoris p̄cessus parti implātur, anteriore quoq; p̄cessus
 regionem aliquantulum comprehendens. ¶ *Tertius* secūdo longe minor, tanto scilicet
 quanto secundus primo, ac sub ipso penitus occultatus, ab ilium osse iuxta posteriorem
 coxendicis acetabuli sedem, lato & semicirculari, & vt duorum priorum carneo crasso-
 que initio pronascit̄. Dein in priora modice deorsum procedens, coxendicis articuli
 ligamentis fibrosis nexibus hæret, & arctior redditus, in latum, robustumq; cessat ten-
 dinem, qui maiori femoris processui expansus, anteriori ipsius parti, atq; adeo apici in-
 feritur. Hic musculus admodum liuidus apparet, præcipue in musculosis, & non valde
 obesus, in quibus secundus etiam (vt dictum est) qua tertio incumbit, liuet. ¶ *Quartus*
 musculus magna ex parte liuidus quoq;, & paulo minus totus teres, non autem dictorū
 modo amplius existit, a lateribus trium inferiorum sacri ossis vertebrarum, quib. ilium
 ossa non coarctantur, carneo latoque principio exoritur. Hinc in latus seu extrorsum
 ab osse sacro scilicet ad femoris magnum processum transuersim excurrrens, carneus a-
 liquousq; permanet, & tandem arctior redditus, priusquam femur contingat in teretē
 cessat tendinem, posteriori maioris femoris processus sedi implantatum, iuxta ipsius
 summum & apicem. ¶ *Quintus* omnium corporis musculorum maximus, pluribus par-
 tibus a coxendicis ossis appendice ad pubis ossis vsq; regionem principium partim ner-
 ueum, partim carneum ducit, & deinde statim parui, internive femoris p̄cessus radicē
 ad posteriorem ipsius regionem amplectit̄, & ab hac in acutam, asperamque femoris
 lineam continuo inseritur, quæ in posteriori femoris sede secundum ipsius longitudi-
 nem deorsum a parui processus radice protenditur. Quemadmodum autem musculi
 huius principii continuus est ortus, ita quoque continua eiusdem visitur insertio, si mo-
 do posteriorem musculi partem excipias. Hæc enim a coxendicis appendice neruo
 exortu pronata, musculus quodammodo per se efformat, qui in miram ventris ampli-
 tudinem dilatatus, deorsum recta per femoris posteriora fertur, donec denuo gracile-
 scens, teretē tendinem in internum femoris caput inferat. Quapropter potest hic mu-
 sculus aut vnus, aut duorum, aut trium, prout cuiq; visum fuerit, numerari. Nā et si duas
 habere partes, anteriorem nimirum, & posteriorem videt̄, tamen quia hæc sibi adnatæ sunt,
 licebit vnum esse dicas musculus. Aut si placuerit vtrasq; partes duorum musculorum vice
 numerato, vt sc. vnus sit qui femoris interno capiti tendinem porrigit: alter v. quia acu-
 tæ femoris lineæ implantatur. Aut si maiori adhuc numero delectaris, anteriorem par-
 tem in duos musculos subdiuidito, p̄pter nimirum fibrarum ductum, & insertionē di-
 uersam. Atq; sic quidem tres erunt musculi. Portio namq; anterioris partis, quæ pubis
 ossium commissuræ proxima est, admodum obliquas, & fere transuersas habet fibras, q̄
 ab exortu retrorsum ad radicem parui femoris processus contendunt, & superiori parui
 acutæ femoris lineæ inseruntur. Reliqua v. anterioris partis portio quæ ad internā ma-
 gis coxendicis ossis sedem principium ducit, obliquas obinet fibras, sed propemodum
 rectas, & inferiori asperæ prominentisq; lineæ sedi continuo implantatas. ¶ Hactenus
 cōmemoratis quinq; musculis tensio femoris primario cōcredita est, iidemq; motui ei-
 usdem qui in latus, & in circumactu sit seruiunt. ¶ *Primus* n. validam, & in neutram par-
 tem vergentē extensionē efficit, amplo ipsius principio, & lato tendine femur reuellēs.
 Si v. elatiorem duntaxat sui principii partem tetenderit, aut humiliorem, non quidem
 in neutrum latus inclinantem efficit tensionem, verum in hoc illudve latus vergentem.
 ¶ *Secundus* autem extendit simul, & sursum versus exteriora trahēdo femur, ipsius caput
 intro in coxendicis ossis acetabulū adigit. ¶ *Tertius & quartus* femur quoq; modice sur-
 sum trahentes tendunt. ¶ Dein & quartus foras etiam circumagit, tertius autem femur
 circumuertit, paulo magis in posteriora tendens, quam sursum trahens. At vtriq; mul-
 to infirmius motui qui in gyrum sit subministrant, quam musculi, quibus hoc propriū
 munus delegari paulo post dicemus. ¶ *Quinti* musculi fibræ posteriores, seu musculi il-
 lius posterior pars rectis donata fibris, crus firmum stabilit, ac terræ affigit, femur ex-
 tendens. Anterioris autem partis posterior portio, non minus idiplum suis fibris præ-
 stat, cum modica tamen femoris ad interiora adductione. Altiores vero fibræ, quæ
 ossis

Galenus
ibidem.

Tertius.

Quartus.

Galenus
ibidem.

Quintus.

Quinque
primorum
femoris
musculorū
munus.

- A** ossis pubis cartilagini vicinæ sunt, aut potius anterioris musculi partis prior portio, introrsum ducit femur, & fibræ huius portionis altiores, ita femur ducentes, illud quoque sursum reuellunt, flexionisq; quodammodo auctores euadunt. Nunc enarratis quinque musculis flectentes opponuntur, qui illis pauciores sunt, nempe tres duntaxat proprii, sextus nimirum, septimus, & octauus. ¶ *Sextus* ex undecimæ, & duodecimæ thoracis, & Sextus. primæ, secundæ, & tertiæ lumborum vertebrarum lateribus, carneo enascitur principio quod simulatque prodiit, musculum teretem constituit, deorsum oblique versus exteriora descendentem. Vbi ad eam ossis pubis regionem deuenit, qua coxendicis ossis nomen assumit, in validum & teretem tendinem cessans, tandem interiori; seu minori femoris processui inseritur, elatiorem processus partem occupans. ¶ *Septimus* ex tota Septimus. interioris ossis ilium regione tanquam ex semicirculo carnosam quoq; originem accipit, & hoc ductus principio, paulatim arctior, crassiorq; redditur, deorsum in priora corporis procedens. Hic per altiore ossis coxendicis regionem vectus, adhuc carnosus ad minorem femoris processum descendit. Vbi vero processui vicinior appropinquat, in teretem quoque cessat tendinem, qui humiliori eius processus parti, prædicto nunc tendini proximus implantatur. ¶ *Octauus* musculus ex tota pubis ossis linea ab anteriori coxendicis ossis acetabuli sede ad os pubis usq; commissuram extuberantem principium ducit, quod ad posteriora admodum oblique descendens, atque amplum tantisper asseruatur, donec breui, sed amplo tendine, femoris ossi inferatur. ¶ It vero Octauus.
- C** ipsius insertio e regione parui femoris processus in interiori femoris lato, oblique deorsum versus posteriora tendens. Tribus iis musculis natura ut simul femur flecterent, & introrsum versus alterum crus admouerent, commisit. *Sextus* enim sursum valide femur attrahit, flectitque ad interiora id agens. *Septimus* similiter femur sursum attollendo flectit, & paulo insignius sexto, versus interiora admouet. *Octauus* modice sursum femur contrahit, infirmæque flexionis auctor censetur, verum adhuc magis septimo introrsum vellit. Ita profecto ut flectentes & extendentes musculos, duobus quoq; reliquis ad interioraq; motibus Natura præfecerit. Porro tribus flectentibus, musculus quem inter tribus motores nonnum enumerabimus, aliquid auxilii suppeditare videtur. ¶ Ceterum duo adhuc supersunt musculi femur contorquentes, quos nonnum & decimum numerabimus.
- D** ¶ *Nonus* itaque liuidus, & ut ceteri huius articuli, carnosus visitur, & transuersim in exteriora protensus, totum pubis ossis foramen exterius contegit. Deinde per exteriori ceruicis femoris sedem productus, valido satis & utcunque amplo tendine insertionem molitur in magni femoris processus sinum, qui femoris ceruicem, & caput ossis coxendicis acetabulum subintrans e directo respicit. In anteriora femur circumagit, & circumuertit. ¶ *Decimus* posteriorem, internamve dicti iam foraminis sedem occupat, nono longe validior. Huius principium, quod latum & carnosum est, & Decimus. veluti tribus lineis seu inscriptionibus insignitur, a linea exoritur quæ ab interna illius ossis sede, qua primi ossis sacri transuerso processui committitur, per internam coxendicis ossis & pubis regionem, ad pubis usq; os commissuræ elatiorem partem protenditur, sensim tamen adeo arctatur, ut eius amplitudo coxendicis intervallum non vincat, quod inter acutum ipsius processum, & posteriorem suæ appendicis sedem habetur. Ad hoc enim intervallum, quod amplum sibi insculptum gerit sinum, musculus iste reflectitur extrorsum, magnum femoris accedens processum. Atque hunc sane reflexum magna conditoris industria molitur musculus. Quæ enim ad sinum hunc circumuoluitur, externa parte carnosus est, ea vero parte qua sinum tangit, omnino nervosus conspicitur, & veluti tres teretes comonstrat tendines, serie quadam ad sinum reflexos. Vbi sinum superarunt inuicem collecti in vnum finiuntur tendinem, qui sinui maioris femoris processui inferitur. Porro ut solo rotulæ sinui funem non committimus, sed rotulam in trochleo aut furcula, ne ex sinu funis labatur, firmamus: ita hic quoq; Natura ossium sinu
- F** non contenta, a superiori sinus parte vnum, & ab inferiori alterum eduxit musculum, qui ambo vna cum decimo porrecti, illum quo minus sua sede declinaret, asseruant, & & cum decimo in sinum magni femoris processus insertionem moliuntur.

Ceterum ab interna regione, ubi iam flexus non amplius obliquatus ad femur ducitur, carnosæ etiam substantia a coxendicis osse pronascitur. In tuo igitur est arbitrari, aut hos musculos, aut carneam molem tendines excipientem decimo iungere, atq; ita proprios

Quorū femur mouētes musculi constitui possint.

femoris musculos decem enumerare. Aut si mauis, vtrunq; distingues, & duodecim recensebis. Quod si quintum in tres digesseris, omnes erunt quatuordecim. ¶ Decimus autem in nostro numero vna cum duobus illis gracilib. femur in posteriora circumagitur.

De musculis tibiā mouentibus. C A P. XXXIV.

Primus tibiā mouentium musculorū. Vef. lib. 2. cap. 53.

Tibiā mouentes muscoli nouem sunt, quorum quidem primus ab anteriori ossis ilium spinæ sede, aut ab ilium ossis appendicis anteriori extremo, nerueo & modica carne commisto principio enascitur. Hic nō procul ab origine totus carneus euadit, ac modice dilatescens gracilis permanet, hancq; formā ad tendinis vsq; productionem retinet, quā ab ilium spina deorsum obliq; versus interiora sensim prorepat, vt internum femoris latus tandem iuxta mediam femoris longitudinē exquisitè occupet. Hinc adhuc magis in interiora retrorsum paulatim procedens, e regione interni femoris capitis iuxta genu consistit, ad quod veluti obliquo ductu reflexus, antrorsum descendit, tendinem in anteriorem tibiæ sedem, ad internum latus acutæ illius lineæ secundū ipsius longitudinem exporrectæ, adamussim teretem inserit. ¶ *Secundus* amplo, & prorsus nerueo principio ex pubis osse enascitur. Vbi enim pubis ossa inuicem cartilagine comittuntur, secundum commissuræ longitudinem duo sibi contigua oriuntur musculorum principia, quorum alterum ad dextrum crus, alterum vero ad sinistram defertur, secundum hunc muscolum constituens. Non procul ab origine strictior, crassiorq;, & carnosus prorsus hic efficitur musculus, vt eius latitudini crassities vix cedat, & paulo minus toto teres euadat deorsumque per femoris interiora descendens sensim gracilior tantisper euadit, vt iam inter femoris caput non procula genu articulo contingens, in exactum, teretemq; tendinem finiat, eadem sede qua primi musculi tendo tibiæ innatum,

Secundus.

Tertius.

sed tanto interius, seu posterius, quanta primi musculi est crassities. ¶ *Tertius* ex infima coxendicis ossis sede oritur. Ab elatiori enim & maxime posteriori eius appendicis sede nerueus, gracilisque enascitur, hinc deorsum descendens aliquantulum sub origine carneus, teresq; quodammodo fit. Postea deorsum per femoris posteriora prorepat, aliquantulum oblique tantisper ducitur, donec ad posteriorem sedem interni femoris capitis prope genu pertingat. Ibidem enim attenuatus, & in teretem tendinem degenerans, in tibiæ anteriora reflectitur, eadem regione tibiæ qua prædicti insertionem molitur. ¶ *Quartus* ex coxendicis ossis appendice, non ita lato vt tertius principio, exoritur, ac paululum sub exortu primum carneus efficitur, exacti musculi formam multo quam tertii crassiorem referens, ac per femoris posteriora sensim deorsum, versus exteriora descendit. Vbi vero femoris mediam longitudinem superauit, tenuior redditæ, & externa sua sede nerueus admodum, quasi tendinem educturus, apparet. In interna autem sede, alia pars carnosā hic ex femore pronata ipsi vbi tendinem videtur producturus, ita adnascitur, ac si alius hic oriretur musculus qui quartum augeret: atq; simul ex ambobus vnus efformaretur musculus, qui denuo crassescens carnei cuiusdam musculi imaginem exprimit, & deorsum protæsus exterioriq; parte admodum neruosus, insigni tendine fibulæ implantatur, validam insertionem in processum superioris appendicis fibulæ pertinaciter molitur. Ceterum siue quartum hunc muscolum vnus loco, aut duorum enumeres, nihil interest. Ordinis tamen gratia, vnicum oportunius statues.

Quartus.

Quintus.

¶ *Quintus* a coxendicis ossis appendice sub tertii & quarti musculi capitibus, neruosum principium ducit. Vbi tamen ad mediam femoris longitudinem musculus iste descendit, exacte carnosus efficitur, delatusq; per femoris posteriora, secundum posteriorem interioris femoris capitis sedem reflectitur, & simulatque elatissimam tibiæ partē pertingit, in teretem cessat tendinem, interiori lateri anterioris tibiæ partis insertum, in eam nimirum regione, in quam primum, secundum, & in tertium tibiā mouentes musculos ipsorum tendines porrigere relatum est. Verum huius quinti musculi tendo non æque deorsum atque tertii musculi tendo in tibiā prorepat. Huic musculo ex abundanti sinus quidam oblongus accidit, in posteriori ipsius sede statim ab exortu ad mediam femoris vsque propemodum longitudinem ipsi insculptus. Totus hic sinus liuidus admodum est, & musculi tertii gratia incisus. Is enim sinui incumbit, ipseque sinus illius moli accurate congruit. ¶ *Sextus*, qui rariorem inter reliquos musculos naturam adipiscitur, a latere primi musculi externo, ab ilium ossis spina enascitur, intus acutum, carneumque caput obtinens, quod muris, lacertæve modo latefcens, deor-

Sextus.

- A** deorsum ad regionem coxendicis articuli fertur. Vbi rursus caput id seu musculus angustior redditur, & priusquā magnū exterioremq; femoris processum perreptet, non amplius carneus conspicitur. Adeo ut hic musculus nihil aliud erit, q̄ longissima & latissima membrana tendinis naturam referens. cui nūc descripta & carnei, exactiq; musculi formam representans pars innascitur. Statim enim ab initio in exteriori parte instar latæ membranæ in conspectum venit, aliquousq; coxendicis articulū amplexantib. musculis obductæ. Quum vero membrana magnum femoris processum superavit, totam anteriorem femur amplexantium musculorum sedem, deinde & posteriorem, & exteriorem cutis quasi modo tantisper integit, quousq; ad genu articulum descendat, quem
- B** ubi similiter quoq; membrana obuoluit, ipsa in anteriorem tibiæ sedem, & externum illius latus inserit. ¶ *Septimus* neruea lataq; & ampla origine ab externo femoris ossis latere pronascitur, totam radicem magni femoris processus in orbem amplexus. Origo hæc statim ab initio crassa carnosaq; efficitur, & illico a femoris osse abscedens, octauo insternitur musculo. Is namque aliqua sui portione huic septimo subtenus in causa est, quo minus septimus tota femoris longitudine ipsius ossi, quemadmodum octauus, adnascatur. *Septimus* itaque musculus sua amplitudine totum externum femoris latus citra omnem, præterquam in exortu, ad os connexum amplectitur, magnam etiam anterioris & posterioris sedis femoris partem occupans. Hic toto descensu carnosus visitur, paulo supra molam aut patellam in amplum tendinem desinens, q̄ octavi musculi
- C** & noni tendinibus commistus, simul cum illis patellam apprehendit, atque tandem in anteriorem tibiæ sedem inseritur. ¶ *Octauus* totam propemodum femoris ossis amplitudinem succingit, a femoris ossis ceruice exoritur nerueus, sed sensim carne adauctus, a femoris quoq; magni processus radice ipsius portio ita enascitur, ac si ciliis obliqui ductus gratia, duo principia obtinere non inepte diceretur, ac vnum femoris ceruici, alterum magno illius processui acceptum ferendum esset. Obliqua & ampla hac origine pronatus deorsum descendit, femoris os adeo ambiens, ut duo ipsius latera in posteriori femoris regione paulo min⁹ toto sint contigua. Quo v. magis descendit, crassior semper, carnosiorq; efficitur, quousq; ad internum latus anterioris in femore regionis, quodammodo in crassum & admodum semicirculum prope patellā extuberat, ex quo
- D** latus, validusque enatus tendo patellam amplectitur. Hinc musculus tota ipsius longitudine e directo semper carnei illi⁹ semicirculi, & ceruicis femoris carnosior, crassiorq; apparet, quam quā septimo musculo substernitur. Sub illo enim tenuior euasit, attamen carnosus inibi quoque permanet. Quum vero secundum femoris longitudinem in anterioris ipsius sedis interno latere octau⁹ muscul⁹ procerius extuberat, & septimi quoq; anterior parte directo lateris femoris exterioris eius sedis femoris quæ anterior est, exporrigitur, in medio anterioris femoris sedis septimus vna cum octauo sinum efformat impense liuidum, cui tota femoris longitudine musculus nonus innitur. ¶ *Nonus* autem musculus ex ilium ossis tuberculo in anteriori ipsius regione super coxendicis ossis acetabulum prominente, principium nerueum, acutumq; assumit, quod deorsum recta in femoris anteriora descendens, lacertæ, murisque formam adipiscitur carnea substantia auctus, & illi sinui in eum bēns quem septimus cū octauo efformat. Priusq; vero medium longitudinis femoris descendendo superarit, arctior, graciliorque sensim efficitur, ut multo supra genu articulum in tendinem finiat, utcumque amplum, sed tenuem qui recta patellam accedens in anteriori ipsius sede denuo dilatatur, tendinibus septimi & octavi musculorum permistus. Atq; hic ex tribus postremo iam enarratis musculis vnus tendo conflatur, cui patellæ corpus vniuersum innascitur. Nihil enim ipsius patellæ tendine non obducitur, præter interiorem ipsius superficiem, quæ leui cartilagine incrustata, sinum inferiorem femoris capitum respicit, mutuoq; ingressu cum illo responderet. ¶ Quum vero tendo iste ad eum modum patellā amplexus, & interna ipsius sede quæ femoris ossi non connascitur, multo adipe, & mucoso, viscidoq; humore imbutus, genu articulum transcendit, arctior, & crassior efficitur, validissime in anteriorem tibiæ sedem, non procul sub articulo implātatus. ¶ *Primus, sextus, septimus, octauus, & nonus* tibiæ extensionis opifices habentur. Secundus interim, tertius, quartus, & quintus tibiā liquido flectunt.

Vesalius
lib. 2. ca. 55.

EX ligamenti femur tibiae connectentibus, de quibus suo dicemus loco, vnum in externo genu articuli latere habetur, admodum validum, & crassum. Ab huius itaque posteriori parte nerueum musculi principium exoritur, quod sua amplitudine in exteriori latere posteriorem genu articuli sedem contingit, atque ex tota hac ligamentorum regione prodit. Hinc carnosus ad auctum fibris admodum oblique deorsum versus interiora descendit, musculum efformans paulo longiorem quam ampliorem. Finis enim huius seu insertio, iuxta radicem appendicis tibiae ossis consistit, in ipsius posteriore parte adeo ampla, atque totius musculi visitur latitudo. Deinde ut musculus hic obliquus est, obliquam quoque molitur insertionem. A posterioris enim tibiae, sedis interno latere, deorsum versus internum latus oblique ita descendit, ut minima huius musculi pars genu ligamenti, maxima vero tibiae committatur. Neque solum huius insignior pars in tibia consistit, sed tibiae quoque ossi prolixa & ampla (ut dictum est) insertionem implantat. Femoris autem ossi nullibi connatus est, multoque minus ab hoc originem ducit. Praesenti musculo alius nullus, aut in exortu, aut in insertionem subiicitur, sed articuli ligamenti & ossibus proxime attensus, sub illis musculis occultatur, qui ab inferioribus femoris capitibus enati, suram cum tertio quodam musculo efformant. Adeo ut non iniuria hunc in poplite occultatum & latitantem Galenus vocauerit. Is etiam arbitratur hunc praecipuum flexionis tibiae auctorem esse.

Lib. 2. ana.
adminif.Vesalius
ibidem, ca.
59. Primus
pedem mouentium.

PEdem quem perinde ac extremam manum flectimus, & extendimus, & deinde in latera ducimus, mouentes musculi nouem sunt, quorum primus ab interno femoris capite iuxta genu articulum vnico nascitur principio, si modo ipsius continuitatem spectes. Si autem substantiae animum attenderis, id principium duplex apparebit. Vnum quidem superius, & magis iuxta femoris medium interius: alterum vero inferius, & non nihil exterius. Superior autem huius musculi principii pars carnea, lataque est, & deorsum protensa, paulo sub genu articulo cum reliqua initii parte confunditur, quae exacte neruea liuidaque in exortu erat, & recta deorsum per genu articuli posteriora descendens, valde carneum, crassumque efformat musculum. Priusquam vero ad medium tibiae longitudinis iam angustior redditus pertingit, carnosus esse desinit, & ex suae inferioris partis amplitudine tendinem latum educit, in cuius medium aliquandiu adhuc carnosam musculi pars porrigitur. Et hic sane musculus in interno latere posterioris tibiae sedis ducitur. ¶ Secundus autem musculus in externo latere consistit, qui ab externo femoris capite pronatus deorsum fertur, omni ex parte primo musculo similis. Quum vero utriusque musculi iam dicti a femoris capitibus deorsum tendentes, non procul ab exortu se contingunt, inuicem fibrosis nexibus haerentes. Et quo magis deorsum prorepunt, eo validius connascuntur, ut iam tendo quem singuli producunt, vnus omnino sit ab utrisque enatus musculis. Interior tamen, seu primus musculus non nihil diutius carneus, quam secundus deorsum ducit. Duo autem in supra prominentes musculorum ventres, carnea pars sunt praesentium musculorum. Tendo autem ab utrisque enatus paulo angustior redditus, non multo sub carnosam musculorum sedem, cum quarti pedem mouentis tendine congregiendi, in posteriorem calcis sedem inserit. ¶ Tertius insigniter gracilis est musculus, ab externo femoris prope genu articulum capite teres nascitur, iam iam in ipso exortu carneus, & gracilis. Ab ortu tamen non ita procul dilatescit, exacti musculi ventrem utcumque crassiusculum referens. Verum mox sub poplite venter iste gracilescens, summe gracilem, tenuemque educit tendinem, qui sub duobus iam commemoratis musculis occultatus, & super quartum expansus, sensum oblique deorsum prepit, quousque ad internum duorum primorum musculorum tendinis latus elaboratur, ubi is quarto musculo validissime connecti incipit. Hinc deorsum ad internum usque calcis latius fertur, iuxta posteriorem eius sedem ipsi implantatus. ¶ Quartus pedem mouentium suramque constituentium, ac tibiam amplexantium maximus est, ex posteriori sede coarticulationis fibulae ad tibiam, nerueo & valido initio pronatus nascitur, quod deorsum ductum adeo dilatescit, ut latitudinem tibiae ossis & fibulae vincat. Praesens tamen musculus non itaque crassus, ac latus amplius est. Ex hac vero amplitudine priusquam medium tibiae longitudinis superauit, sensum arctatur, & paulo supra calcis regionem in validissimum, & cras-

Secundus.

Sura.

Tertius.

Quartus.

- A** & crassum tendinem definit, cui duorum primorum tendo vnitus, simul cum ipso vniuersæ posterioris calcis sedi implantatur. ¶ *Quintus* in posteriori etiam tibiæ sede locatus, sub duobus musculis adhuc occultatur, digitorum pedis flexui famulātibz, quos simul cum quatuor cōmemoratis iam pedis musculis priusquam ille in conspectum veniat ademptos esse oportet. Principiū itaq; quinti musculi a tibiæ osse, & fibula, quæ hæc ossa inuicem dehiscere incipiunt, exorit, & statim ab exortu carneus, latusq; vitæ, eadē prorsus latitudine ad inferiorem vsq; tibiæ ossis appendicē p̄grediens. ¶ Ceterum illico atq; hanc appendicem contigit, & propemodum æque latus adhuc atq; in media tibiæ sede conspicitur, ab interno ipsius latere teretem profert tendinem, q̄ iam aliquousque in musculi carniformi substantiā incipere videbatur. Vbi igit̄ tendo is prorsus excarnis est, deorsum fertur, sinui incumbens in posteriori sede appendicis tibiæ, p̄cellus, qui in teriorem malleolum constituit, exsculpto. In hoc sinu transuersum ligamentum tendini obducitur, hinc obliq; pedis interiora subeunt. Sub omnibus enim musculis inferiorem pedis sedem occupantibus præsens tendo tantisper prorepat, dum in inferiorem tarfi ossis sedem valide inserat, q̄ cubum, tesseramq; imitanti ossi proximū est. ¶ *Sextus* in anteriori tibiæ sede positus, oraniū hui⁹ regionis anterior, ab anteriori sede coarticulationis fibulæ cum tibiæ osse p̄nascitur, illicoq; dilatus suum ostendit ventrem, non nihil latiore, quam profundiore. Priusquam vero medium longitudinis tibiæ superat, sensim arctat, & multo supra pedem in teretem finit tendinem, qui deorsum per tibiæ anteriora prorepens in transuersum ligamentum a tibiæ osse in fibulam pronatum subit, & simul atque id ligamentum superauit, deorsum in pedis interiora descendit, & tantisper vehitur, quousque ad internum latus pedii ossis pertingat, quod pollicis præponitur. ¶ Illi enim ossis peculiari processui inferitur valida sane applantatione ossis pedii tarfi commissuram apprehendens. *Septimus* a fibulæ appendicis externo latere, & ligamenti ossa hic connectentibus nerueum, validamque principium ducit, totiusque fibulæ externo fere lateri attendit, nec ita multo ab origine carneus factus dilatescit, exacti musculi formam exprimens. Ad hunc modum ita carnosus paulo ultra medium longitudinis fibulæ recta decliuis fertur, in exteriori ipsius sede non exquisitè carneus. Quandoquidem hic musculus istud sibi priuatim vendicat, quod in externa ipsius sede etiam supra medium lōgitudinis tibiæ vtrinq; ad latera carneus sit. Verum inter duo illa latera validissimum tendinem monstrat interna sede, & a lateribus carne nutritū. Vbi vero digno notatu interuallo musculus medium longitudinis fibulæ superauit, tot⁹ excarnis efficitur, teretem procreans tendinem, qui sensim obliq; retrorsum versus fibulæ posteriora contendit. Is posteriorem inferioris fibulæ appendicis sedem adit, hic sinum proprium & transuersum quoq; ligamentum obtinens. Ligamento itaque hocq; a fibula in calcem procedit inuolutus, deorsum in priora versus pedis plantā ducit, adeo sane inflexus, vt in radicem pedii ossis inseratur, quod pollicis præiacet, quod in externo ipsius latere processum obtinet, cui septimi huius musculi tendo apte implantetur. Aliquando tamen nō in hoc pedii os septimus musculus insertionem molitur, sed in radicem pedij ossis medium digitum suffulcientis. ¶ *Octauus* sub septimo, excepta tendinis ipsius anteriori sede, prorsus occultatur, atq; ex fibulæ superiori appendice totus quoq; prodit, ad amissim carneus deorsum prorepens. Quum autem medium longitudinis fibulæ aliquousque superauit, in teretem etiam cessat tendinem, qui tandem processui ossis pedii validissime inferitur, quod tesseram referēti ossi adnexum, paruum pedis digitum sustinet. Verum hic tendo aliorum hæctenus dictorum ritu, nō simplicem insertionem perficit, sed nonnihil ante insertionem ipsius tendo bicornis redditur, duplici insertionem dicto ossi implantatus. ¶ *Nonus* portio est eius qui in anteriori tibiæ sede locatus quatuor pedis digitos extendit carnosus, iuxta medium tibiæ longitudinis externo ipsius latere enata. Quæ deorsum ducta in tendinem degenerat, qui transuersum anterioris tibiæ sedis ligamentum subit, & superiori pedis regioni exporrectus, fibrosisque nexibus subditis musculis commissus, in duas portiunculas bipartitur, quas pedii ossi ante paruum digitum positi inserit. ¶ Ex iam dictis musculis primus, secundus, & quartus qui suram seu tibiæ ventrem (vt diximus) præcipue efformant, atque in posteriori tibiæ sede locati, validissimum fere corporis tendinem simul constituunt, robustissimi pedis motus auctores sunt. Calcem enim sursum in posteriora trahunt, pedemq; terræ vsus;

firmant, seu in posteriora deorsum reflectunt. His certe quintus suppetias fert, pedem quoque terræ adinueniens, & interdum ut summi tantum digitis erigi queamus, in posteriora ducens. Tertius musculus inualide pedem extendit, illumque in obliquum versus interiora agit. Sextus, septimus, octauus, & nonus, contrarii motus, quum simul tenduntur, duces sunt. Pedem enim sursum ad tibiæ anteriora flectunt; motu sane non æque atque posteriores digno ac valido. Si vero alternatim cum posteriore tibiæ sedem occupantibus musculis contrahuntur, in hoc, illudve latus pedem agent. Atque ita qui flexionis, extensionisque auctores sunt, etiam motus in latera appositissime obeunt.

De musculis pedis digitos mouentibus. CAP. XXXVII.

Vesal. lib. 2.
cap. 60.
Primus pedem mouentium.

Pedis digitos mouentes musculi sunt decem & nouē, vel si ad maximum numerum redegeris, duo & viginti. Primus totus infernam pedis sedem seu plantam occupat, vniuersæ ipsius carnosæ substantiæ pertinaciter subnatum ligamentum habens, quod lati in manu tendinis (ut infra dicemus) vices gerit. Ab inferna itaque calcis ossis sede & anteriori illius calcis tuberculi parte, quod terræ innititur partim nerueus, partim carnosus pronascitur, ab exortu tamen illico carnosus euadens sensim dilatat, multo latius, quam crassius redditum. Quum vero mediā pedis longitudinem ad digitos repens superauit, in quatuor carnosas portiunculas dirimitur, quæ inuicem diductæ, & æquales constituentes angulos, singulæ vnū producunt tendinem, ad sibi præpositum digitum excurrentem.

Secundus.

Huius quidem beneficio musculi, secundum quatuor digitorum flectimus articulum, eum quam possumus proxime ad calcem recta linea protrahentes. ¶ *Secundus* non in pedis planta reponitur, sed in tibiæ posteriori sede locatus, totam illius longitudinem perreptat. A posteriori enim sede connexus fibulæ ad tibiam enascitur, statim ab orru carnosus, & latus utcumque versus tibiæ extremum prepens. Toto hoc progressu, maximo sursum efformante musculo contegitur: anteriori autem parte qua tibiæ posteriorem sedem respicit, fibulæ posteriori parti attendit, ipsi etiam aliquandiu adnat: deinde quod ordine tertius futurus est, externo suo latere ipsi secundo hic quoque subiicitur. Illico vero atque ad infimam hic secundus musculus tibiæ sedem descendit, ab interno ipsius latere tendinem edit teretem, qui prius aliquandiu in carne pronasci videtur. Hunc sinus qui ad internum calcis latus vbi talum excipit, insculptus est, & transuerso ligamento obductus, tutissime deducit. Postquam tendo ligamentum id superauit, pedis inferiora oblique subit, a quo utique exigua portio tendinibus commiscetur indicis & medii tertium internodium flectentibus, reliquis autem totus in secundum pollicis os inseritur, illius inflexionis auctor. ¶ *Tertius* qui quinto pedem mouentium insertitur, cui etiam forma perinde atque secundus similis est, pari ratione cum secundo in tibiæ posteriori sede locatus, totam illius longitudinem perreptat, ad internum tamen latus magis quam secundus respicit, longe enim magis tibiæ ossis, quam fibulæ innititur. Externo autem suo latere, secundo musculo subiicitur. A fibulæ autem ad tibiam nexu enascitur, & quum ad calcem fere descendit, atque adhuc latus conspicitur, ab interno ipsius latere teretem promittendinem, qui plantam pedis subintrans secundi musculi tendini versus plantam eutem magis subiectus, & cum illo X literæ imaginem efformans, modice dilaturatur, ac in quatuor alios tendines digeritur, quos singulos quatuor digitorum tertius ossibus inserit, primi musculi tendines, perinde atque in manu sunt perforantes, atque ossa flectentes. Atque ita sane tres digitorum pedis primi musculi habent, quorum primus secundum quatuor digitorum flectit internodium. Secundus vero & tertius musculi, tertii quatuor digitorum & secundi pollicis articuli flexionis opifices sunt. ¶ Decem musculi iam dictis succedunt, qui insigniter mutuo implexi sunt, ac pedis ossibus adnati. Quare in pede ita exacte ut in extrema manu distinguere nequeunt. Rudis enim, indiget itaque moles in planta conspicitur, quæ ad amissimam carneam est, & fibris rectis intertincta. Deinde secundum pedis longitudinem ducta, & illius quoque interualla opplens, in quinque digitorum radicem implantatur, vtrinque ad primi internodii latus versus interiora infertionem tendens. Integrum tamen exit propter obscuras impressiones, & quandam cum manus musculis imaginem, & parem quoque functionem, hic decem musculos quinque digitorum primos articulos flectentes enumerare, ut nimirum bini ad singulos digitos referantur. ¶ *Decimus quartus* musculus in anteriori tibiæ sede collocatus, & sub sexto pedem mouen-

Musculus
4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. &
13.

Decimus
quartus.

A mouentium musculo occultatus, a tibiae ossē qua fibula sub genu articulo connectitur nerueum sumit principiū, quod illico ab orru carneū euadens, recto tramite deorsum versus pedē descendit, in medio propemodū ductu carnosam sui portionē ab externo latere diffundens: quē deorsum protensa, ea est quam nonū inter pedem mouentes musculos recensuimus. Postquam vero hanc eduxit portionem carnosus adhuc deorsum fertur tantisper, dum transuersum ligamentū a tibia in fibulam pronatū, anterioremq; tibiae sedē occupans, contingat. Ibidem enim in tendinem degenerat, qui per id ligamentum veluti per annulū prorepit, & priusquam ligamentū prætergredit, in quatuor alios tendines dirimitur, qui quatuor digitis inserti, eorundē extensionis auctores sunt.

B *Decimus quintus* ad pollicem spectat, & in anteriori tibiae sede collocatus, partim iam cō-
memorato musculo subiicitur, partim vero illius interno lateri exporrigitur. A tibiae enim ossis externo latere, vbi membraneū ligamentum tota tibiae longitudine fibulam tibiae ossi colligens, ab ipsa educitur, hic musculus principium sumit, quod carnosum in ea sede incipit, qua iam tibiae os a fibula dehiscit. Hinc deorsum protensus, anteriorem tibiae ossis sedem adit, ac in tendinem finiēns per transuersum ligamentum in anteriori tibiae regione consistens ducitur. Dein per pedis superiora ad pollicem prorepens, toti ipsius longitudini inseritur. Huius musculi ope pollex in neutrum latus insigniter vergens extenditur. ¶ *Decimus sextus* in superiori pedis sede reponitur, huic regioni secundum longitudinem obductus. Iuxta latus enim tali, vbi calcis ossi tesseram referens os

Decimus quintus.

C coarticulatur, ab huius sedis ligamento ampla moles carnea enascitur, quæ antrorsum oblique versus digitos porrecta, in quatuor carnosas partes dirimitur, quæ singulae tere-rem efformant tendinem. Horum quatuor tendinum vnus, isque intimus externo lateri superioris sedis pollicis inseritur. Secundus ab hoc, indicis externo lateri implantatur, tertius vero medii digiti, quartus autem annularis, adeo vt solus paruus huiusmodi tendine destituatur. Horū tendinum beneficio, quatuor digiti illis donati, in externum latus abducuntur. ¶ *Decimus septimus* in externo latere pedis reponitur, ab exter-

Decimus sextus.

D no calcis ossis latere, vbi id tuberculū quoddam gerit, neruo eo principio pronatus, quod non procul ab exortu carnosum efficitur, exquisiti musculi formam exprimens. Priusquam vero ad primum parui digiti articulū pertingit, in teretem finit tendinem, externo lateri primi illius ossis insertum. Hic musculus quū validus admodū sit, etiam si par-

Decimus septimus.

E uus digitus a decimo sexto nullum tendinem recipit, eius digiti abductionem a ceteris plus satis perficit. ¶ *Decimus octauus* interno lateri secundū totam ipsius longitudinem protenditur, muris quoq; effigiem proximē exprimens. A ligamenti calcem talo connectentibus nerueum assumit principium, quod crassius, carnosiusq; effectū, tandem in teretem degenerat tendinem, externo lateri prioris articuli pollicis insertum. Huius musculi beneficio pollex introrsum a ceteris digitis abducitur.

Decimus octauus.

Ceterum post decimum octauū in homine quatuor tantum adhuc musculi, quatuor digitos in internū latus ducentes, qui similiter atq; in manu, illis tendinibus exporriguntur, qui tertium digitorū flectunt internodium. Nam in planta pedis carnea consistit moles & substantia, a ligamenti ossa tarsū posteriorib. pedis ossis colligantib. enata, inq; quatuor graciles dissecta portiones tendinibus adhaerentes, quorum ministerio tertiae quatuor digitorum ossa flectunt. Hæ portiones interno quatuor digitorum lateri ad primum articulum insertæ, eorum ad pollicem adductionis auctores habentur. Si itaq; carnem hanc molem quatuor musculorum loco habueris, omnes pedis digitorum in homine musculi duo & viginti erunt. Si vero vnus loco id corpus numeraueris, tantum erunt decem & nouem.

Quatuor musculi digitos quatuor pollicis adducētes, seu 19. 20. 21. 22.

De ligamenti ilium ossa sacro colligantibus, & coxendicis ac genu articuli, deque reliquis omnibus qua in tibia & pede habentur ligamentis.

CAP. XXXVIII.

F Ligamentum ilium os sacri ossis lateri colligans robustum est, & membraneum, vniuersam commissuram ambiens. Portio tamen ipsius in medio, vbi inuicē ossa committuntur sese inserit, ac ita valida, crassaq; efficitur, vt cartilaginei ligamenti naturam prorsus repræsentet, cuius beneficio, & demum cartilaginis quoq; interuentu ilium os sacro validissime necitur. Præter hæc sacri ossis ligamēta, aliud ex latere cōnexus quinti ossis sacri cū sexto quodammodo teres enascitur, atq; in acutū processum coxendicis

Ligamentū sacri ossis cum ipsis adhaerens. Vef lib. 2. cap. 61.

Membrana
pubis ossis
foramen
occupans.
Femoris ad
coxendicis
os.

Cartilagi-
neus ac-
uus.

Ligamenta
genu arti-
culi.

Ligamenta
fibulam ti-
biæ ossi cō-
mittentia.

Pedis liga-
menta trā-
uersa.

Alia pedis
ligamenta
ossa tantū
cōmittentia.

ossis inseritur. Quinetiam ab eodem sacri ossis latere, in ossis coxendicis appendicem aliud ligamentum enascitur, quod vna cum prædicto ossa hæc firmiter connectit, & præterea recti intestini, & musculorum ipsius fulcrum existit. ¶ Postremo in pubis ossis foramine membrana visitur illi omnino similis, quæ secundum cubiti longitudinem radium vnæ colligat. Substantia enim huic adamussim responder, & fibris constat deorsum in latus oblique procurrentibus. ¶ Ligamenta femur coxendicis ossi adnectentia duo magis præcipua censentur, vnum orbiculatum articulum amplectens, cuiusmodi etiam alius articulis est commune. Ceterum ne aliquando femoris caput luxaret, quoties variis motibus femur magnam corporis molem, sustentans mouetur, ligamentum hoc crassissimum, & robustissimum euasit, nulli ligamento ex iis quæ articulos circumdant, crassitie secundum. Et tanti momenti vsusque id ligamentum Græci esse putarunt, vt etiam totius articuli nomine illud *ισχίον* appellare non dubitauerint. Adhæc, præterquod coxendicis ossis sinus admodum cauatus est, aliud adhuc ligamentum orbiculatum sinus supercilio adnascitur, quod sinum non solum adauger, sed etiam in causa est, cur minus ossis supercilium in vehemētibus femoris motibus, quum fragile sit, abrum-patur, & eorum ligamentorum naturæ participat, quæ cartilaginea sunt. ¶ Porro aliud coxendicis articulo peculiare ligamentum teres est, & adeo durum, vt cartilagineus neruus merito ab aliis appellatus fuerit. Hoc ex medio capitis femoris enatum, non in acetabuli centrum inseritur, sed in humilissimam ipsius sedem vbi adeps, non autem cartilago sinui oblinitur. ¶ In genu autem articulo, præter commune ligamentum omnibus obductum articulis, alia quædam valida, robustaque rerum Opifex creauit. Quum autem quinque genu articuli sint regiones, anterior, posterior, interior, exterior, & media, singulis peculiare quippiam Natura præposuit. Anteriori enim quæ membraneo ligamento prorsus destituitur, mola patellæ simul cum illam continentibus tendinibus prætenditur. Quæ quum abunde articulum stringit, nullo hic opus erit ligamento. Posteriori similiter laboratur robustum, neruosumque ligamentum præponitur, quæ ex media posterior, tibiæ regione originem capiens, recta sursum fertur, & bifidum utrorumque femoris capitum posteriori sedi, qua maxime illa dehiscunt, implatur. Mediæ regioni Natura validissimum & cartilagineum largita est ligamentum, quod ex tota prominentiori inter duos tibiæ sinus parte enatum femoris posteriori parti, qua ipsius capita maxime inuicem distant, cum paulo ante dicto inseritur. Exteriori regioni iniuriis magis quam interior patenti, teres quoque obductum est ligamentum, femoris & fibule tibiæque os inuicem colligans. Interior genu regio, quæ ceteris omnibus, & minus erat motibus famulatura, & iis quæ cruri lædendo occurrant minus obuiatura, ligamentum nanciscitur iam dicto tum gracilius, tum mollius. ¶ Ligamentum fibulam tibiæ iuxta genu articulum colligans, forte quidem est, sed vt in aliorum ossium commissuris, ab exteriori tantum parte ossium connexum circundat. Qua vero tibia, fibulaque inuicem dehiscunt, per totam ossium longitudinem ligamentum membraneum habet, illi par quod in cubito repositum est. Atque id a tibiæ osse in fibulam porrigitur fibris intertextum a tibiæ osse deorsum oblique in fibulam excurrentibus. ¶ Pedis ligamenta transuersa quæ tendinibus obducuntur, tria existunt. ¶ *Primum* in anteriori tibiæ sede ad ipsius cum pede articulum consistit, & ad tibiæ os & fibulam refertur. Hoc ossa connectit, & plurimos tendines transmittit. ¶ *Secundum* ab interno malleolo in calcis os inseritur, atque ossium alligationi auxiliatur. ¶ *Tertium* transuersum pedis ligamentum, a fibula in calcem fertur, atque ad ossium ita colligationem iuuat. Adhæc in inferna pedis digitorum regione transuersa ligamenta, perinde consistunt, ac in manu. ¶ Verum præter transuersa hæc ligamenta in pede permulta alia habentur. ¶ *Primum* ex tibiæ osse in fibulam procedens inferius tibiæ ossi fibulam colligat, membraneum similiter ac aliorum articularum ligamenta existens. ¶ Deinde & aliud quoque reliquis articularum ligamentis responder, quod vniuersum articulum tibiæ cum talo amplectitur. ¶ Post hæc quatuor sunt ligamenta cartilaginosa, ex quibus alia in alto conduntur, alia exterius ossa ambiunt, quæ simul omnia talum quatuor quibus firmatur ossibus connectunt. ¶ *Primum* ex internis tali partibus originem ducit, tibiæ os talo nectens. ¶ *Secundum* exterius est, fibulam talo colligans. ¶ *Tertium* ceteris robustius ab inferiori tali sede principium ducit, & calci inter duas quibus talo coarticulatur commissuras innascitur. ¶ *Quartum* tali caput ossi nauiformi con-

A connectit. Ex tali enim cernicis termino originem ducens, iam dicto ossi inseritur, vniuersumque ambit articulum.

Verum præter cartilaginea hæc, membraneum aliud ligamentum omni ex parte calcis cum talo obducitur articulo. Et validū quoq; aliud a tali ceruice in tesseram imitans os implatur. Quemadmodum vero in manu brachialis ossa inuicem durissimis, cartilagineisq; ligamentis colligantur: ita quoq; tarsi ossa tum inuicem committuntur, tum etiam ossi cymbam imitanti adnectuntur. Validissimum autem & peculiare vinculum in inferiori parte tarsi ossa obtinent, quod non solum extrema vincit, imo penitus singulis insertum, ossium quoq; media inuicem constringit. ¶ Pedii vero & digitorum pedis ligamenta, iis quæ in manu sunt ligamentis respondent. Sunt enim omnia membranea, iis tantum exceptis quæ superiori pedii ossis interuallorum parti immittuntur. Illa siquidem cartilaginea sunt, & in profundo articuli genu repositi ligamenti naturam referunt. Atq; hæc pro epitomes ratione de ligamentis ac musculis dixisse hactenus sufficiat.

LIBER TERTIVS DE INSTRVMENTIS NUTRITIONI, QVÆ CIBO POTVQVE PER- ficitur, famulantibus.

Nutritionis, instrumentorumque nutritioni famulantium, qua in corpore triplicia sunt, necessitas. C. A. P. I.



V M tota moles hominis, ut Lib. 1. de tuend. sani. cap. 1. testatur Galenus propter insitum ipsi calorem in perpetuo fluore sit, nisi altera similis substantia pro ea quæ defluxit, restituta sit, euaporabitur certe & dissipabitur vniuersa. Quare factum ut summus rerum Opifex, non homini duntaxat,

Nutritio-
nis necessi-
tas.

ceterisq; animantibus, verum etiam stirpibus insitas quasdam vires eius quod deficit & desideratur semper appetentes, ab initio statim indiderit. Non enim fugere, vesci, bibere, aut respirare a quopiam vsquam discimus, sed statim a principio facultates in nobis habemus, quæ hæc omnia citra docentem perficiant. Hinc li. 6. Epid. par. 5. Aph. 1. Hippocrates eleganter admodum dixit: Ipsa mei natura non per rationem ad suas actiones instinctum inuenit: siquidem a nullo est edocta, neque ea quæ conueniunt efficere didicit. Cibo autem quicquid siccioris substantiæ effluxit restituimus, portione quicquid humidioris: atque ita ad pristinam commensurationem ambo reducimus. Ita vero & aeræ ignæque substantiæ commoderationem respiratu arteriarumque pulsū tuemur. Porro quum id quod singulis partibus defluit, tale natura sit, qualis ipsa est particula, nihil autem eorum quæ eduntur bibunturve eiusmodi profus est: necessarium naturæ fuit, prius ea mutare & concoquere, & quam maxime fieri potuit corpori alendo restituendoque similia efficere, ac demum recrementa quæ Græcis *συνεχόμενα* & *συνεχόμενα* dicuntur, quorum generatio necessario has mutationes subsequitur, expel-

Instrumen-
torum nu-
tritioni
subseruien-
tium neces-
sitas.

lere. Hac quidem potissimum ratione, Natura nutritionis instrumenta, ut testis est lib. 6. de anatom. administra. & libro primo de naturalis facul. capite decimo Galenus, in corpore triplicia instituit. Quædam prima ratione ad concipiendum alimentum elaborandumque, & in totum corpus deferendum. Alia secunda ratione, quæ excrementorum sunt receptacula. Reliquas autem particulas tertia ratione struxit, quæ horum excretionibus transmittendis, & ne intempestive profluant cohibendis, suoque tempore expellendis subseruiunt. E priorum numero sunt, ventriculus qui alimentum recipit, iecur, quod maximam alimenti in ipsum permeantis mutationem molitur, & venæ quæ confectum alimentum in totum corpus deriuant. E secundorum censu sunt intestina, quæ siccius excrementum excipiunt, vesicula bilis, quæ tenuius & leuius, lien, qui terrestris & crassius, renes, & vesica, aquosum excrementum excipientia. E tertiorum, musculi: ii enim excrementis egerendis subseruiunt. De his quidem omnibus eo ordine, quo ipsa nutritioni famulantur dicemus, orsi a peritonæo, quod etiam horum instrumentorum commune sit inuolucrum.

Nomina.

Ziphac:
Peritonæū
vnde dictū.Substantia
peritonæi.Nonū dor-
sum, & 6. ac
7. femur
mouentes
intelligit.
Ortus.

Forma.

Ipsius su-
perficies
cuiusmodi
Peritonæi
processus.Peritonæi
non eadem
vbiq; crassi-
ticia.Quib. par-
tibus peri-
tonæū per-
uium sit.

LAtini peritonæi vocem a Græcis mutuuntur, quibus equidem varie, nēpe *περιτόναιον*, vel *περιτόναιος*, & *περιτόνιον*, quod circumtendatur, nominatur. Neque ita absolute tantum, sed a nonnullis tota hæc appellatio, *Galeno lib. 6. ana. admi. attestante*, inditur, *περιτόναιος ὕμην*, id est, *peritonæos membrana*, nomine videlicet a substantia eius ducto: a quibusdam autem *περιτόναιος χιτών*, id est, *peritonæos tunica* nominatur. Sunt qui etiam illud *περιτόναιον στέπασμα*, hoc est, *peritonæum tegumentum* ab usu, scilicet appellant. Arabes cōmuni membranarum nomine *Ziphac*, & *Zimphac* id ipsum nominant. Peritonæi vero nomen inde sumsit, quod omnibus nutritionis instrumentis, *Galeno loco citato teste*, quæ inter septum transuersum & erura habentur, obductum obtensumq; sit, eaque conceptaculi ritu amplectatur. Membrana autem est tenuis substantiæ, latis & continuis araneorum telis similima, nullis omnino fibris intertexta. Quapropter ex simplicium & primorum corporum, quæ similia etiam nuncupantur, numero censetur. Estque inter ceteras corporis simplices membranas amplissima & maxima. Ex ligamenti vero, quæ lumborum vertebrae connectunt, & quæ sacrum os ilium ossibus committunt, peritonæum vtrinque principium ducit, membranæ latæ modo ab illis enascens. Mox ab utroque latere ascendens, lumborum musculis, & ijs qui internam ossis ilium sedes occupantes, femorum motibus præsumt obducitur: & fibris, quibus inuicem musculos committi videmus, illis adhærescit. At vbi musculos, qui ternario numero vtrinque complectuntur peritonæum superauit, internæ transuersorum abdominis musculorum, & vniuersæ inferiori septi transuersi sedi subtenditur, pertinacissime ipsis, potissimum vero neruosis illorum tenuitatibus connatum. Quod si igitur seorsim peritonæum absque omnibus iis quæ id contingunt inspicere voles, oblongum oui instar vutrem sphaeram aliquam, cuius longitudo pertinet a septo transuerso ad humilimam amplitudinis sedem, quam sacrum os cum ossibus ipsius lateribus commissis efformat. Est etiam peritonæum externa ipsius parte, vt aptius musculis vndiquaque hæreat, asperum & inæquale. Interna autem parte impense læue & tersum, ac veluti aqueo humore oblitum secantibus occurrit, adipis interdum copiam sibi adnatam obtinens. Præterea interna hæc peritonæi sedes portiones quasdam seu processus iis quæ continent instrumentis porrigit, illisque ea inuicem colligat, & sibi quoque adnectit, ac singulis præter peculiare ipsorum tunicas, aliud etiam inuolucrum obducit. Atque hinc est, vt iis instrumentis quæ duas peculiare sortiuntur tunicas, ternæ attribuantur: quæ autem vnam duntaxat tunicam peculiarem habent, binæ, verum instrumenta nulla peculiari donata tunica, vt iecur & lien ea quæ ipsis obducitur a peritonæo adipiscuntur. Quonam pacto autem, quibusque ex locis hosce processus peritonæum educat, in cuiusque instrumenti enarratione oportune recensebimus. Præterea non omni ex parte peritonæum æque crassum & robustum est. Quæ enim ex vertebrarum ligamenti pronascitur crassissimum est: deinde quæ lumborum incumbit musculis, crassum quoque cernitur. Anteriori vero parte, quæ a mucronata pectoris ossis cartilagine ad pubem vsque pertinet, peritonæum tenuius, gracilius, & inualidius reperitur, quam in lateribus, & lumborum regione. Crassius autem merito circa instrumenta ea quæ aliquando repleta in tenuiorem attollunt creatum est. Necessesse enim erat vt ipsum cum iis simul extenderetur. Atque hinc est quod viris iuxta mucronatam cartilaginem Peritonæum crassius validiusq; quam iuxta pubis sedem sit. In mulieribus vero ad pubem crassius validiusque. Ceterum peritonæum in viris ad inguina vtrōque seminariis vasis viam præbet, foraminibus enim peruium est, & tunicam vtrique testis priuatim offert, quo is & ipsius vasa seminaria tuto obuoluuntur. In viris deinde pariter & in mulieribus Peritonæum quæ septo subducitur, tria cum septo quoque communia obtinet foramina, primum quo venam cauam, secundum quo gulam cū ipsi hærentibus neruis, tertium quo magnam arteriam vena coniuge experte, & aliquot sexti paris nervorum cerebri ramis concomitatam, deducit. Præterea vmbilici quoq; vasorum gratia, & in mulieribus finis vteri ceruicis: in viro autem ceruicis vesicæ, in vtrisq; vero podicis nomine Peritonæum perforatur, ac demum multis venis, arteriis & nervis crus petentibus, deinde illis, quæ maxima portione in rectos abdominis musculos sursum tendunt, & aliis nonnullis quæ dorsi & abdominis musculis, & cuti a vasis lumborum

- A** botum vertebris incumben-
tibus distribuuntur, Peritonæum iter præbet, ab iisdem vasis
sibi furculos assumens. Ceterum Peritonæum vna cum illis quæ transmittit organis, fre-
quentibus quoque nervis viam offert, a quibus etiam furculos adipiscitur, ab iis potissi-
mum qui abdominis exporriguntur musculis, ut hoc nomine sensus expers, quemad-
modum nonnulli putant, non sit. Porro Peritonæi usus complures Galenus *lib. 4. de usu*
par. cap. 9. enumerat. *Primus* quidem ut omnes subiectas partes, ventriculū nimirum, *Peritonæi*
intestina, omentum, mesenterium, iecur, lienem, renes, utramque vesicam, uterum, *usus.*
& quæ sub septo sunt vasa contegat. *Secundus*, ut omnia quæ amplectitur ab ex-
trinsecus ambientibus musculis interstinguat, ne quando tenuium intestinorum ali-
qua in media inter ipsos spatia incidunt, & dum musculos premunt, aut ab illis premun-
B tur, arctant aut arctantur, dolore afficiunt, aut afficiuntur, *intestina motum* illorum im-
pediant, accrementa intestinis complexa difficilime deorsum *transmittantur.* *Tertius*,
ut sicci *alimenti* excrementa septi transuersi accedente opera, propellat. Nā peritonæū
superioribus extremitatibus ad pectus, & spurias costas eodem, quo septum transuersum
perueniens, non nihil compressorio ventriculi & intestinorum motui auxiliatur. Si qui-
dem a Peritonæo & septo, veluti a duobus quibusdam manibus, superne quidem con-
iunctis & unitis, inferne autem distantibus, arte quæ in medio sunt comprimuntur,
pellunturq; deorsum cibi excrementa. *Quartus*, quo veluti tegmen seu inuolucrum ex-
quisite circumdatum constingat omnia, ne leui occasione laxior ventriculus, aut inte-
stina etiam flatibus infestentur. Nam quum hæc imbecilliora & infirmiora sunt, quam
C ut facile circumfundantur contrahunturque, ex quibuslibet cibis vaporoso flatuosoq; spi-
ritu implentur. Constat quoque cibum necessario interea concoctione destitui, & di-
stributionem eius in corpus tardari. Quum vero robusta sunt omnia, & ventriculus, &
intestina, & peritonæum contrahuntur, cibus etiam si flatulentus admodum ingestus
est, concoquitur tamen, & facile distribuitur. *Quintus* & postremus præcipuusq; peri-
tonæi usus est, ut omnia, quæ sunt sub septo transuerso, viscera & vasa, ab eo continean-
tur, & veluti a pelle quadam singula priuatim tecta tuto colligentur, suisque sedibus fixa
hæreant. Nam si eius continuitas violatur, non parum affert periculi, potissimum si quid
interiorum vna sit vulneratum. Solo autem rupto, malum quod Græcis *ῥήγξις*, Latinis
Ramex dicitur, consequi solet.

D

De omento. CAP. III.

- O**mentum quod Græcis *ἐπίπλοον* & *ἐπίπλοον*, quod scilicet ventriculo & intestinis, *Gale-*
nol. lib. 4. De usu par. capite undecimo teste, incumbat, & veluti innatet, Arabum inter-
preteribus, & nostræ ætatis Medicis *Zirbus* dicitur: membrana est nullis fibris implicita,
simplexque: sed multis abundans venis, arteriis, nervis, & aliqua sui regione glando-
sum sibi innatum habens corpus, & multum quoque adipem. Eius figura proxime mar-
supii, aut sacculi, aut peræ imaginem refert, quæ orbiculatum habet orificium, poste-
riori sua parte elatius quam anteriori ascendens. Ad eum namque modum vnam
E Omenti partem superiorem anterioremve membranā, & alteram rursus inferiorem
seu posteriorem dicimus. Etiam si Omentum reuera duntaxat vnica est membrana,
atque id potissimum in canibus anteriorque pars posteriori incumbit, & continua est,
& Omentum quoque sacculi modo cavitatem, quæ repleri potest, constituit. Id au-
tem sic habere euidentius deprehendes, si ipsum a spinæ partibus & fundo vesicæ ab-
scissum, & nulla alia parte vel perforatum, vel diuulsum cupias implere aut liquida, aut
solida substantia: ab ea siquidem totum si integrum sit, & sibi continuum marsupio-
rum modo replebitur. Omentum in peritonæi amplitudine positum, mox anteriori *Sinus*
illius sedi subiicitur, & super intestina extensum, ad lienem quoque & iecoris cauum,
F ac posteriorem ventriculi sedem propemodum vniuersum eiusque fundum exporri-
gitur, illisque sedibus perpetuo attensum proximumque reperitur. At non ita
omnibus obductū intestinis ad pubis usq; os, ut in canibus propemodū semper in ho-
mine reperit. Nam ipsius quæ intestinis obuolui debeat portio raro ultra umbilicū de-
scendere conspicit, sed maxima sui parte sinistrorsum lienē versus retrahi & cōuolui. Ma-
gnū tñ inter animātia omentū sortiunt homines *Galenol. 6. an. adm. teste*, ut inde nonnulli

Omentum &
conexus.

ὀμπλοκωμίσαι, quasi dicas Omentigestores appellentur. Porro instar circuli orbicularis a dorso medio sub ventriculi posteriori sede incipiens, per iecoris cauum seu portas secundum fundum ventriculi, a cuius tertia tunica inibi pronascitur, ad lienis cauum, & sic ad dorso medium suo veluti initio defertur. Totus igitur semicirculus inferior a lienis cauo per dorsum ad ventriculi usque dextrum latus perueniens inferiorem Omenti membranam constituit. Superiorem vero ea circuli pars, quæ a ventriculi dextro latere per fundum ipsius ad cauum lienis sedem ducitur, format. Hinc ambæ mutuo sibi incumbentes deorsum super intestina subque Peritonæo ducuntur, atque ea anteriori parte ac in lateribus obtegunt, & ad pubis usque os humiliori suo extremo pertingunt. Si vero intestinorum duntaxat sedem quæ supra umbilicum consistit operiant, illæ sese reuolutæ admodum, & veluti in spiras collectæ visui offerunt: Membranæ hæ nullis nexibus intestinis connascuntur præter inferiorem membranam, quæ in hominibus colo intestino pertinacissime continuatur per totam eius intestini sedem, quæ secundum ventriculi fundum prorepat. Neque id segniter in homine obseruandum venit, quum inferior Omenti membrana mesenterii loco ipsi colo sit, qua id ventriculo exporrigitur. Colum enim toto illo ductu nullam exigit mesenterii partem, secus multo quam in canibus & simiis. Omentum namque canibus nulla ex parte colo alicuiue alteri intestino adnascitur. Simiis autem medio se habet modo, licet illæ adhuc ad canis constructionem potius quam hominis accedant. Venæ Omento implicitæ, & retis imaginem facientes, solius venæ portæ sunt soboles. Nulla namque a caua in Omentum pertinet. Ab eo autem portæ trunco disparguntur cuius præcipua portio in lienem exhauritur. Ab illo igitur venarum innumeræ soboles in Omenti membranam, non quidem recto prorsus tramite, sed obliquo quodammodo & errabundo, vbi retium funiculi implicari cernimus, excurrunt. Proinde etiam Græcis Omentum γαγγαμὼν σαγλίον, vt & vulgo, rete, & reticulum dicitur. Arteriæ omenti ab illis pendent, quæ ventriculo, lien, iecori, & bilis vesiculæ distribuuntur. Has namque omnes haud secus ac venas Omentum tuto deducit, ac ab illis suarum peculiarium venarum coniuges adeo numerosas adipiscitur, vt quam paucissimi venarum surculi, citra arteriæ consortium, ipsum perreptent. Sic neruis quoque illis Omentum intertextitur, qui a sexti paris cerebri neruorum portionibus secundum costarum radices exporrectas iecori, lien, & ventriculo implantantur. Ceterum adeps quo Omentum abundat, in obesis & præpinguibus hominibus plurimus, in macilentis modicus inuenitur, præter adipem qui ambabus Omenti membranis communis est inferior ipsius membrana posteriori ventriculi sedi substrata, priuatim glandosum quoddam corpus impense magnum habet: quod quæ in canibus rubet, simplicisque carnis speciem quodammodo exprimit, Græcis vt lib. 4. *De usu par. cap. 11. & in libello De disse. vena. Galenus attestatur, καλλιέργας & πάγχεας* appellatur. In homine autem hoc corpus magis album quam rubrum cernitur, venæ portæ, arteriarum & neruorum ramis inibi attensum, vt scilicet illorum diuaticatio inferiori membrana Omenti duntaxat suffulta, reddatur securior, vtque ventriculo etiam instar substerniculi ac puluinaris subiiciatur. Quippe omnia vasa, *Galeno lib. 5. de usu par. cap. 2. teste*, qua diuariantur diuidunturve facile læduntur, ita vt si eorum quoduis mali quidpiam propter violentum motum esset incursum, id vbi diuaticatur scinditurve, potissimum incurreret. Magno igitur indigebat locus hic præsidio, quo vasa in ipso distribuenda ac diuaticanda munirentur. Proinde natura glandosum hoc corpus, vt diximus, fabricata substrauit, ac in orbem omnibus circumdedit, diuaticationesque repleuit, vt nullum ipsorum facile iam findatur, aut sine fulcramento sit: sed quum in molli & mediocriter cedente corpore conualescant, si motu cieantur paulo vehementiore, quia tamen corporibus minime duris ac retinentibus, sed leuiter ea excipientibus paulatimque ob id violentiam motus exsoluentibus occurrunt, illæ saltem, inconcussa, infraque perpetuo conseruantur, vt in capite *De mesenterio latius dicemus*. Ceterum πάγχεας dictum est hoc corpus, quasi totum carneum, quod ex carne glandulosa contextum sit. καλλιέργας vero quod elui sit iucundum. Hinc vulgo *dulcem morsum* seu bolum, & *buccam saporitam*, Barbari *Eucarum*, inepta voce, quasi *suauem carnem* nominant. Omenti non postremus usus est, vt secure ramos portæ

Venæ omenti
impli-
cantes.

γαγγαμὼν
Omenti
arteriæ.

Nerui
menti.

Adeps.

Pancreas.

Vsus glandosi
corporis.

Pancreas
vnde dictum.
Vsus Omenti.

A portæ in lienem, ventriculum, & duodenum intestinum, ac coli non infimam partem ex porrectos suffulciat, ac ipsi implexos deducat. Neque vero hos duntaxat ramos, verum etiam ut arterias quoque & nervos iam dictis partibus inserendos sustinet & tueatur. Deinde Omentum dorso ventriculum colligat, & rursus iecur lienemque ventriculo vna cum vasorum nervorumque interuentu connectit. Ex accidente vero velut quoddam intestinorum inuolucrum tegumentumque efficitur, ipsorum calorem instar penicilli cuiusdam fouens ac continens. Quocirca quibus Omentum aut pars eius aliqua abscissa est. Si omnes frigidiores sentiunt ventriculum, minusque concoquunt; ac pluribus operimentis extrinsecus egent, & maxime quando insigni fuerit magnitudine, quod abscissum est, ut ex historia gladiatoris vulnerati, quam recitat Galenus lib. 4. de v. sup. cap. 9. patet.

De intestinis. C A P. IIII.

Intestinorum, quæ Græcis *ἰντῆρες* dicuntur, nomine, ductus ab inferiori orificio ventriculi ad podicem vsque perueniens, qui vlnas, ut plurimum, Italicas quatuordecim & dimidiam longitudine æquat, nunc comprehenditur. Hæc substantiam habent membraneam, verum non vndiquaque pariter aut crassam, aut tenuem; talē tamē quæ facile ea quæ continet amplectitur, & rursus quæ a contentis distendi apta est. Duas quoque peculiāres tunicas, & tertiam ad has a peritonæo ortam obtinent, ut iniuriis innoxie ferendis magis sint idoneæ: Nam interior aliquando in dysenteria, ut

C testis est in fine lib. 4. De v. sup. Galenus, aliisque diuturnis malis putrescit; exteriorē salua: vnde & ægroti nonnulli euadunt. Porro interior intestinorum tunica durior membraneaque est, Galeno lib. 4. Aphor. com. 26. teste, verum interiori ventriculi tunica mollior, quod nulla aspera intritaue illa, sicut hic, recipiant. Exterior vero intestinorum tunica tenuior, magisque carnea; tamen interiori ventriculi tunica minus carnosa est, quoniam distributionis potius quam concoctionis instrumenta sunt. Cæterum tunica crassorum intestinorum tanto gracilium intestinorum tunica interiore durior est, quanto illa materiam continet duriores, & a succo magis liberam. Quæ enim gracilibus continentur intestinis, liquida, fluida aqueaque; adhuc sunt: quæ vero crassæ, duræ. ¶ Intestinorum vtraque tunica transversas seu orbiculares sortitur fibras, ut ocyus quod in illa defluit propellant, & ita cito vniuersus succus ad iecur exsugatur. At externa recti intestini & coli tunica, rectas quoque fibras obtinet, ut hæc velut vinculum circulariū fibrarū efficerentur, ne forte quum illæ duræ excrementa crebrius protrudunt, inuicem abscedant diuellanturque. Atque hæc potissimum de causâ recto intestino, ut quod sicciora excrementa amplectitur, eius generis quam plurimæ tribuantur. ¶ Tertia intestinorum tunica secundæ veluti propugnaculum est & copula, cuius beneficio intestina mesenterii interuentu dorso connectuntur: Oritur autē hæc, ut cōprehensum est, a peritonæi membranæ vasa ad intestina secure deferentibus. Hæc namque vna cū vasis ad causam intestinorū sedem pertingentes dilatantur, tertiaque tunica intestina induunt. Cauam autem partem intestinorum vocant Anatomici,

E quam vasa primum attingunt, seu quæ intestina respicit; gibbam vero huic contrariā. Forma autem tereti in hoc intestina creantur, ut sint capaciora, minusque iniuriis occurrantibus exposita. Cæterum venæ arteriæque non omnibus pari numero ac frequentia distributæ sunt, quod non in omnibus intestinis eadem exsugenda succorum copia sit. Quo enim intestina ventriculo in cōtinuitate viciniora sunt, eo plus optimi cremoris continent, ac proinde frequentiora vasa gracilioribus deferuntur, pauciora crassis intestinis. Nervis autem intestina donantur, ut infestantes humores dignoscant. Nam si sensus penitus expertia essent, nihil obstaret, quin ex flaua bile aut alio mordaci humore intestina penitus subinde corroderentur, priusquam homo sentiret. ¶ Porro etsi intestina continuum idemque sunt corpus, tamen quum in varios ac multiplices

F & figura differentes anfractus spirasque circūducantur: neque omni ex parte eandem situs, substantiæ & formæ naturam sortiantur, ac denique alia alii hominis parti contigua efficiantur, neque præcipuus omnium vsus par sit, ac si pluræ essent, dissectionis periti hæc enumerant, primumque in tenuia & crassiora ipsa diuidunt, atque ex ijs singulis retnarium numerum, ut sex sint vniuersa, cōstituunt, nempe duodenum, ieiunum, tenue, cæcum, colum & rectum, de quibus ordine dicemus, vbi prius quod

Intestinorum nomen quid complectitur. Substantia.

Tunica

Fibra

Figura

Venarum arteriarumque ratio.

Nervorum ratio.

Causa intestinorum pars. Intestina duplicia.

Tenuium
intestinarum
vñus.

fit tenuium & crassiorum intestinarum munus explicauerimus. Tenuia enim intestina in hoc potissimum, *Galenus lib. 4. de vsu par. c. 17. teste*, sunt efformata, vt horum beneficio quicquid est succulentum in cibo ventriculi opera elaborato, id ad iecur, sanguinis officinam, ducatur. Dein vt fæces, & quæ vt sugantur inepta sunt, debite excernantur. Postremum etiam coquendi alterandiq; vi modica non nihil intestina profunt, vt scilicet a ventriculo prius confecta absolutius paulum mutarentur. Negandum enim non est, quod cibus in ipso per intestina transitu magis concoquatur, sicut & in venis omnibus sanguis. Quemadmodum igitur venis, quas distributionis instrumenta natura fecerat, facultatem sanguinis generatricem indidit, ne lationis per ea tempus frustra periret: eadem ratione & intestinis tenuibus, distributionis eius quæ in venas est gratia factis, facultas quædam concoctrix, ciborum inest. Idcirco pluribus etiam flexuosis orbibus ac anfractibus variis intestina tenuia implicauit, vt si quid alimenti in transitu primi anfractus vasorum ora in internam intestinarum sedem hiâtia effugerit, in secundo contingat. Sin hunc quoque præterlabatur, tum omnino tertio aut quarto, aut quinto, vel alio eorum anfractu, qui frequentes numerosq; subsequuntur. Quocirca ob angustos & longos transitus, pluresq; anfractus & orbis, quælibet cibi pars tandem vasis ori appropinquare cogitur. Siquidem totum intestinum passim in orbem innumerabili quadâ multitudine orificiorum intro peruenientiū pertusum est, a quib. rapitur quod ex prætereunte alimento vtile est. Vnde fieri nequit, vt succ^o

Orbium &
anfractuū
intestinarum
vñus.

vñus nutriendo animali idoneus fallat, atq; ex animali elaboratur. ¶ Orbis itaq; & anfractus intestinalium ideo facti sunt, vt quidquid alimenti concoctū esset, ad vnguem distribueretur, ne scil. alimento celeriter permeante, atq; subinde exeunte, corpus exemplo, fame urgente, in necessitatem sumendi de integro alimentū adigeretur, adeoque semper animum in patinis habentes, *ἡ φιλοσοφία τῶ ἀνθρώπου*, vt *Plato dixit*, vitam ducant homines. Nam animantia quib. nulli sunt anfractus, sed intestinum a ventriculo vsq; ad anū simplex ac rectum præsum habent, insatiabilia omnia ac gulosa, & in perpetua edendi cupiditate sunt. Prudentissime igitur ea anfractibus circumduxit natura, vt succo quæ ex ventriculo permanatē excipiunt, in mora essent, eumq; tantisper complexu suo retinerent, quoad venæ mesaraicæ exfugerent, & ad iecur conueherent. ¶ Crassa vero intestina et si ipsa quoq; ad succorum distributionem conducunt, peculiariter tamen quia magna est illorū amplitudo, adeoque multa colligere possunt, eo conferunt, ne continuo, sed p longa interualla egeramus. Hæc n. tanquam venter aliquis siccis excrementis subiiciuntur. Vnde etiam *inferiorem ventrem* ea nonnulli appellant. Proinde si tenuium intestinarum suctionem aliquid præterfugerit, quum longiore mora excrementa in crassis intestinis resideant, ipsoꝝ vasa id exugunt. Nunc seorsim breuiter tamen, de singulis intestinis, initio a supremo sumpto, differemus.

Crassorum
intestinarum
vñus.

Venter inferior.
Situs.

De Duodeno. CAP. V.

Situs.

Nomen.

PRIMUM quidem tota ea intestini pars est, quæ ventriculo substrata, ab inferiori ipsius orificio recta quodammodo eousque descendit, vbi intestinum in anfractus orbisque primum conuolui incipit. Hoc intestinum quia duodenum digitorum longitudinem in viro, vt plurimum, æquat, ideo Herophylo potissimum, & aliis Græcis *δωδεκαδάκτυλον*, Latinis *Duodenum* dictum est. Sunt qui non intestinum, sed *ἔκφυτον*, hoc est *exortum seu processum intestinalium* appellant. Duodenum autem etiam si id fuisset vtile, in nullos tamen anfractus ducitur, quod sub ventriculo, quæ ferretur, nullam omnino vacuum sedem obtineat, in qua apte in gyros flecti queat. Deinde quod portæ venæ a iecoris caua prodeunti cedere oportuerit, vt *fusus libr. 5. De vsu partium, cap. 3. Galenus monstrat*. Oritur itaque ex inferiori ventriculi orificio, quod pyloron, vt *capit. 12. dicemus*, vocant, ab eoque diuersum est. Hinc rectissime *Galenus libr. 4. de vsu part. capit. 7. ait, duodenum seu exortum intestinalium non esse ventriculi partem, sed aliquid aliud illi connexum*. ¶ Quare errant plurimum qui duodenum a pyloro nihil differre censent, vt *libro 3. paradox. cap. 1. fusus monstrauimus*. Duodenum venam & arteriam peculiare habet, secundum ipsius longitudinem recta deorsum ductas.

Duodenum
a pyloro
diuersum.

Vena.
Arteria.
Nervi.

¶ Ac vena quidem a portæ venæ priusquam mesenterio inferatur, principium obtinet. Arteria autem ab ea quæ iecori offertur. Neros, si quos habet, ab illis, qui inferius ventriculi orificium, & dexteram fundi sedem adeunt, accipit. Præterea duodenum

A num intestinum priuatim id sibi vendicat, quod meatus bilem flavam ad intestina deferens, illi implantetur, ut scilicet bilis suo influxu intestina stimulans, eorum actionem vehementer adiuuet, ac pituitam ipsis insidentem, *ut infra latius dicemus*, expellat. ¶ Errant itaque barbari Medici qui in alia intestina hunc inseri tradunt. *quemadmodum copiosissime lib. 3. para. cap. 3. ostendimus*. Idem intestinum in hominibus, & adhuc magis in canibus glandosum corpus, de quo in capi. vndecimo fufius differemus, peculiariter sibi subitratum possidet, ad suffulcienda vasa ei intestino propria ac amplitudinem eius lento humore irrigandam.

Meatus bilem deferens insertio.

De Ieiuno. C A P. VI.

B SECUNDVM intestinum illic incipit, vbi primum in anfractus gyrosue conuoluitur, & *ut in Græcis, Ieiunum Latinis*, quod inter disseccandum reliquis intestinis inani & magis vacuum reperiatur, dicitur. Galenus tamen *lib. 6. ana. adm.* ideo sic esse dictum tradit, *quod perpetuo inane & vacuum cibo inueniatur*. Nam suum quem recipit cremorem ocyslime transmittit. Quippe dum bilis adhuc cremori non mixta intestina lateribus affluit, sua acrimonia id magis stimulans, ad ea quæ in eo continentur velocius propellenda inuitat. Aliæ inanitatis ieiuni causæ, ut succorum optimorum copia, frequenter venæ, proximus iecori situs, & ante hæc omnia deorsum recta tendens intestini ductus, duodenum magis ieiunum esse, uti sane etiam reperitur, documento sunt. Ieiunum mediâ ventris sedē iustissime occupat, q̃ inibi mesenterii centro sit proximum, breuissimoq; ductu & venæ portæ rami, & arteriæ magnæ propagines illi hic diffundi possint. Ex iam dictis palam fit Rhazen, Mundinum, Alexandrum Benedictum, & quosdam alios Medicos toto errare cælo, quod ieiunum intestinum, ut postremum omnium, quod *Rectum* appellatur, nullis anfractibus implicitum esse scribant, *quemadmodum lib. 3. para. cap. 4. abunde monstrauimus*. ¶ Ieiunum frequentes venas & arterias suas nasciscitur ab illis quæ mesenterio a portæ vena, & ab arteriæ radice supra renum arterias a magnâ originem ducente exporriguntur. Pauci enim rami in graciliora intestina ab arteriæ propagine diffunduntur, quæ a magna arteria post seminalium arteriarum ortum originem sumit. Neque etiam vasa, quemadmodum in duodeno, secundum ieiuni longitudinem sub ipso deducuntur, sed velut ex mesenterii centro ex alto sursum tendunt, rectaq; antrorsum in illud pertingunt, in quod numerosa sobole arboris radicum modo, in cauâ præcipue ipsius partē implantantur, osculis suis in internam intestini sedem hiantia. Ieiunum neruos quoq; obinet deriuatos a ramis sexti neruorum cerebri paris, qui costarum radicibus exporriguntur. Dux enim ab illis propagines vtrinque singulæ ad mesenterium, & dehinc ad intestina frequenter vtcunq; sobole discinduntur. ¶ Cæterum hic eorum meminisse oportet qui temere meatus bilem deferentem in hoc intestinum inseri iugantur. E quorum numero est Auicenna *Fen. 10. tertii tract. 1. capi. 1.* Valescus, & alii hunc imitantes. Videntur autem huius erroris occasionem sumpsisse ex loco Galeni

Nomina.

Ratio nominis.

Situs.

Rhazis. Mundini & aliorum quorundam erratum. Venæ & arteriæ.

Nerui.

E non satis intellecto. Quare operæ precium me facturum puto, si breuiter quis sit eius loci legitimus intellectus exposuero. Locus vero iste est *in libr. 13. Thera. method. capit. 13.* vbi in hunc modum scriptum reliquit Galenus. ¶ *Expelli e iecore oportet quicquid in eo tum amaræ bilis, tum saniei, quæ ex phlegmone prouenit, est collectum. Id vero fieri nequit nisi & vasa quæ sunt in viscerē detergeantur, & meatus qui in ieiunum bilem demittit sit apertus.* Linacer quidem satis obscure conuertit, *ad ieiunum pertinet*. Galenus enim non vult hunc meatus ad ieiunum ita pertinere, ut ei inferatur, sed illi tantum suppeditare aut depromere bilem. Nam hoc loco idem quod *in eadem*, hoc est. *suggero, suppedito, immitto, iniicio*, aut *in eadem*, id est, *promo, profero* significat. Hoc ipsum autem significare, verba Galeni de alica statim sequentia euidentissime coniungunt. Ait enim *καὶ οὐκ ἐπὶ τὸ πρὸς τὸν πύλον τῆς κοιλίας*. Hoc est. *prohibet bilem in intestinum descendere*. Quomodo vero descenderet, nisi ex altero quod eo superius est, & cui meatus bilem deferens inseritur, deflueret? Porro per intestinum Galenū intelligere ieiunum, aperte monstrat locus qui est *in libr. 6. de laborantib. loc. c. 2.* vbi ita scriptum ab eodem est: *Omnia intestina a ventriculo ordine quodam descendunt, atque omnium supremum ieiunum est: deinde quod tenue vocatur, &c.* Loquitur n. hoc

Galeni locus clarior.

Καὶ οὐκ ἐπὶ τὸ πρὸς τὸν πύλον τῆς κοιλίας.

loco ex eorum sententia qui Duodenum, quod in orbes & anfractus non conuoluitur, inter intestina non connumerant. Non connumerari etiam inter intestina a nonnullis duodenum *lib. 6. ana. admi.* diserte scribit. Quod vero prædictorum verborum Galeni is sensus sit quem diximus, ex alio eiusdem loco euidentissime conuincitur, qui est *in libr. 2. de temp. c. 8.* ubi meatum bilem euomentem, duodeno nequaquam ieiuno insertum esse tradit. Et paulo post, hæc verba subiicit. *Quibus autem unicus est meatus, is tota bilis &c. id est, deorsum fluit in ieiunum.* Accedit quod *li. 5. de usu par. cap. 3.* manifestis verbis scribat meatum bilem deferentem ex orto seu duodeno inferi, quod verum esse etiam *autopsia & dissectio ipsa monstrat.*

De Tenui. C A P. VII.

Nomina.

ἰλιον.
ἰλεον.
quid.

ἰλεον.
Conuolutus.
Situs.

Vasa.
Lactes.

Error lactes
Mesenterii
putantium.

Nominis
ratio.

Forma.

TERTIVM intestinum Galeno, Iulio Polluci, & aliis Græcis *λεπτή*, hoc est, tenue aut gracile vocatur. In sinus orbesque flexuosos varios, perinde atque ieiunum implicatum est hinc alio nomine *ἰλιον* Græcis, quasi *obuolutum* dicitur, *ἰλιον* enim illis *circum uoluere* significat. Sunt qui hoc intestinum *ἰλεον* nominari Græcis etiam putent, quod quam recte faciant ipsi viderint. Phauorinus certe nomen morbi, nempe *intestinorum vellicationem*, significare tradit. Hippocrates etiam *in aphorismis*, & passim aliis in locis pro morbo usurpat. Constat etiam Galenum ubiq; *potissimum etiam libr. 6. de laborantib. locis cap. 2.* *ἰλεον* non intestinum, sed malum quoddam quod grauissimos & lætales sublimioribus intestinis excitat dolores, appellare. Atque ita quidem dictum est, a circumactione doloris. Quippe *ἰλεον* *circumagi & conuolui* significat. Ideo *conuolutus* etiam Latinis hoc malum nominatur. ¶ Mediam ventris sedem, ut ieiunum iisdem de causis occupat & in crassi intestini principium definit. Vbi vero principium suum obtineat, vix certo explicari potest. Neq; enim a ieiuni intestini initio, ad tenuis vsque finem, manifestum aliquod indicium observatur, quo ieiuni fines, ac tenuis initium internosci possit. Tamen ieiuni initium rubicundius est, tenuis finis magis albicat. Venas, arterias, & nervos hinc nanciscitur, unde duodenum. Atq; hæc particulatim de gracilibus intestinis, quæ, *Plinio li. 11. c. 12. auctore*, lactes in homine & oue tantum appellantur, dixisse satis sit. Sic dicta forte propter mollitiem, aut suauitatem. Plautus tamen aliorum quoq; animantium gracilia intestina *lactes* vocat. Et Persius hæc etiam intestina, quod pingua admodum sint *lactes unctos* dixit. Accedit quod Sueto. quoq; in Vitellio, lactes murenarum vocat; sicut Spartianus luporum. Quod ideo nobis commemorandum fuit, ut inde error eorum deprehenderetur, qui lactes esse mesenterium putant. In quo errore quidem Theodorus Gaza, vir alioqui doctissimus, etiam fuisse cognoscitur.

De Cæco intestino. C A P. VIII.

QUARTVM intestinum, inter crassiora quidem primum hætenus numeratum, Græcis *πεπλον* Latinis *cæcum* nominatur. Sic vero a veteribus dissectionum professoribus est appellatum, quod vno tantum sit donatum ore. Et Celsus quidem ita esse dictum tradit, quod in sinisteriorem partem peruium sit, in dexteriorem minime. Hinc est quod Auicen, *16. tertii tract. 1. cap. 1.* & recentioribus etiam aliquot Medicis rectissime sit nominatum orbem & monoculum. Plurimum igitur errant, qui non vnum cum veteribus Græcis in cæco orificium esse, sed duo sibi proxima afferunt. Hæc enim duo quæ imaginantur orificia non sunt in cæco vocato intestino, sed in colli initio extuberantiore. Hoc enim in sinistro suo latere duo habet orificia, quorum vnum altius tenui intestino continuum eiusq; terminus est: alterum vero humilius eius quod cæcum dicitur initium.

Cæcum itaque intestinum in homine ceteris omnibus intestinis est breuius, atque arctissima omnium intestinorum parte multo angustius strictiusque, & crassiori lumbrico in orbes conuolutum potius quam intestino simile: adeo ut vix intestinorum appendicis loco ac proinde minus in crassiorum intestinorum numero habendum esse videatur. Hinc Iulius Pollux optime hoc intestinum cognouisse videtur, quod *libr. 2.* ita scriptum reliquerit. *Tenue intestinum in duos desinit fines, quorum alter Colum vocatur. Qui vero ex altera parte tenui intestino desinenti annexus est, cæcum vocatur intestinum.* Eo enim quod *συνδεδημένον*, hoc est, *annexus est* dicit, appendicem verius quam intestinum esse innuit. Quapropter toto cælo errant, qui cæcum intesti-

Anum veluti ventrem quendam amplum & crassum, excrementis excipiendis idoneum esse aiunt, eaque de causa *Sacci* nomine donant. Hi sane Galeni nostri freti auctoritate id ipsum asserunt, sed nesci quod ille ad suas caudatas simias, quæ hac appendice destitutæ sunt, potius quam ad hominem respexerit. Canibus etiam cæcum intestinum multo quam homini contigit amplius. Quinetiam sciuri cæcum intestinum hoc adeo amplum habent, ut amplitudini ipsorum ventriculi, facile respondeat, facibusque turgidum in dissectione observatur. Quocirca prædictorum animalium intestinum cæcum, *Sacci* nomen recte accipit. Secus vero in homine, in quo quidem gracilis illa intestini portio & appendix mesenterio non annexa, sed sibi ipsi in orbem conuoluta, & fibrarum beneficio hærens, cæcum intestinum existit, quod scilicet, ductu, situ, & forma, licet non amplitudine, prædictorum animalium cæco intestino congruat, vnumque, unde etiam, ut comprehensum est, cæcum primo dici cœpit, nanciscatur orificium. ¶ Sed dicet forte quispiam, qui præfatos Medicos a calumnia vindicare conabitur, hos non tantum appendicem illam, sed crassioris intestini etiam initium, quod instar globi cuiusdam præmagni extuberat, adeoque recte succus dicitur, cæcum appellare intestinum. Verum videat is quomodo illi deinceps cæci nomenclatura accommodari queat, quum sit ita consideretur, non vnum, sed duo, imo tria obtinebit orificia, vnum tenui intestino continuum, & alterum in appendicem seu cæcum tendens, & tertium quod cum reliqua parte coli continuum est, ut certe hac ratione illi ab errore vindicari non queant. Cæcum intestinum in homine ex sinistra magis coli initii sede, quam dextra, principium ducit. Porro coli initium, de quo mox dicemus, in homine cæci intestini usum abunde supplet. Nam id ipsum sinu suo tanquam altero ventriculo, alimentum ad futuram necessitatem continet, idque vicinis partibus in ieiunis ex diutina fame, distribuit.

Obiectio
nis solutio

Situs.

De Colo intestino. C A P. IX.

QUINTVM intestinum Græcis *κόλον*, *δοτὶ τὴν κόλιν*, hoc est, a torquendo, ut *Julius Polux* testatur, dicitur. Quippe dolores immensos in ipso fieri constat, ubi pituita, aut crasso spiritu obstruendum fuerit. Sunt ex Medicis qui simpliciter crassum & laxius intestinum nominant. In dextro autem ilio ad humiliorem dextri renis sedem instar globi cuiusdam præmagni extuberans illud amplum & rotundum coli principium habetur, quod hinc sensim recta ad iecur sursum contendit, iecorisque causæ parti non nihil substernitur, ac bilis vesiculam in homine contingit, cuius etiam contactu flavo colore hic quandoque tingitur. Hinc *Mundinus* & illum imitatus *Valescus lib. 5. cap. 1. Alexander Benedictus lib. 2. cap. 7. & alii sumpta erroris occasione*, colum peculiarem meatum e bilis vesicula prodeunte excipere falso admodum tradiderunt. Erroris enim eos convincit *avτοψία*, & ocularis inspectio. Colum a bilis vesicula ex dextro latere secundum inferiorem ventriculi sedem in sinistrum fertur, ventriculi fundo attentum, haud tamen, ut quibusdā visum est, eū conscendens. ¶ Hinc accidit, ut noxius huius intestini humor sit *Galeno lib. 2. De labo. lo. 2. 3. teste*: in consensum ventri. Eculū rapiat, ut & appetentia, & cōcoctio deterior euadat. Et interdū etiā ira afficit ventriculū, ut sæpe animi defectione cōcidunt ægri in sella dū aluū deicere conātur. Quū primum vero ad sinistri ventriculi latus pertingit, sup̄ demissiorem lienis partem anfractus quosdā leuiter inflexos obtinet, ac paulatim supra sinistram renē pilium sinistram decliue fertur, secundum peritonæi latus ad pubis vsq; os descendens. Quū itaq; sinistram renē pertingat, nihil mirū dolorem eius interdum imponere Medicis, ita ut dolorem ipsius non ad colum, sed ad renes potius pertinere possent, & contra renum cruciatum ad colum referant, ut *fusus li. 6. de laborantib. locis c. 2. Galenus docet*. Hinc rursus colum ad sinistram latus quasi ad umbilici sedem, ac anfractum hic constituens, ad ossis vsq; sacri initium prorēpit. ¶ Cæterum ut grandior dexteræ venæ portæ truncus breviori ductu gracilib. intestinis infereretur, ac succinctiori viā cibum ad iecur transferret colum intestinum gracilib. cedit, ac veluti per distantia maxime a mesenterii centro loca procedit, atq; hanc etiam ob causam id præcipua sua portione sinistram corporis sedem occupat. ¶ Colum præterea in hominib. secus ac in canib. nō ad amussim teres est, verū per vniuersum ipsius ductum superius inferiusq; depressum visitur, ad latera vtrinq; quadam serie, velut in medios globos cellulasq; extube-

Nominat.

Situs.

Recentior
medicorum
error.

Cur colici
in sella aluū de-
icere animi
defectione
incurrant.

Forma.

Vafa. rans. Colo quidem intestino toto progressu, qui a dextro ilio ad sinistrum fere renem A
pertinet, venæ & arteriæ, quemadmodum ieiuno & ileo, implantantur, ex alto scilicet
sursum seriatim conscendentes: ac parti ipsius inferiori a sinistro rene ad rectum vsq;
intestinum ductæ venæ arteriæq;, quemadmodum duodeno porriguntur. Nervos
colum, vt alia crassiora intestina, cum gracilibus communes habet.

De recto intestino. CAP. X.

Nomina. **S**EXTUM & omnium infimum intestinum Græcis *ἐκπυρματόν* & *δεξιόν*, Latinis *Longan*
vel *Longanon Rectum*, & *Princeps* dicitur, *Rectum* vero vocatum est, quod nullis or-
Situs. bibus implicitum sit. Quicquid est crassioris intestini ab initio offis sacri in vi-
ris sub vesica, in mulieribus autem sub vtero ad anum vsque & podicem, sedemue, B
quam Græci *ἰσχυρὸν* nominant, descendens recti intestini nomine comprehenditur.
Inferior huius intestini ora a musculis in orbem circumfusis *σφιγγεται* id est, *constringi-*
tur clauditurue, quapropter nomen ei, *Galeno lib. 4. de vsu part. cap. 19. teste σφιγγήτης*, id est,
compressorem nonnulli imposuerunt. Nostræ ætatis Medici & corrupta & barbara
σφιγγήτης voce *Phicterim* vocant. Porro *σφιγγήτης* nomen etiam sibi vindicat musculus orbi-
σφιγγήτης cularis sedem claudens, *eadem Galeno lib. 6. ana. admin. autore, vt lib. 2. dictum est*. Postre-
σφιγγήτης ma huius intestini pars Iulio Polluci *σφιγγήτης* nuncupatur, quod inuersa coronæ
speciem exhibeat. Venas & arterias a portæ & magnæ arteriæ ramis accipit. Ner-
uos cum aliis intestinis communes habet. Rectum intestinum musculos voluntariæ
excrementorum excretioni præfectos sibi priuatim vindicat, quos secundo libro C
narrauimus.

De mesenterio. CAP. XI.

Nomina. **C**ORPVS Græcis *μεσεντέριον* & *μεσεντέριον* nuncupatum, quod Theodotus Gaza, vt di-
ctum est capit. 7. non recte lactes vocauit, & Cicero in *tertio de Deorum natura* me-
dium intestinum non satis recte conuertit, commodissime instar Græcorum nobis
etiam *Mesenterium* & *Mesaraum* nominabitur. Vtrunque autem nomen ei ab ac-
cidentibus est inditum. Mesenterium autem a situ dictum est *Galeno lib. 7. de anā.*
admi. teste, quod medium inter intestina situm sit, adeoque illa quasi vinculum com-
plectatur. Mesaraum vero a propria substantia, omnes enim venas ex iecore in ipsum
descendentes, vna cum vicinis arteriis & nervis in orbem complectitur. Vnde venæ D
illæ dictæ sunt mesaræ, & mesaraicæ. Ciceronem securus Macrobius, & Alexander
Benedictus falsè inter intestina Mesenterium rerulerunt, vt lib. 3. *paradox. cap. 7. fusius*
demonstrauimus. Ad posteriorem itaq; intestinorum sedem locatum est vinculum, cu-
Situs. ius beneficio intestina inuicem vt ad dorsum colligarentur, futurum. Vt vero id tantū
Substantia. homini vsu securius præstaret, dura membranaq; constat substantia. Ex duabus e-
nim mutuo attensis & accumbentib. membranarum a peritonæo originem ducētib. me-
Forma. senterium conformatur. Non tamen ex vna eademq; peritonæi sede iis membranarum
origo est, verum ex varia pro mesenterii ipsius nimirum forma, quam fere intestina
fungunt, a mesenterio colligata. Nam vt non intestinorum omnium par anfractuū ductū
est, ita quoq; non eadem vndecunque mesenterii effigies. Quam certe Galenus in
Tria me- libello, *de venarum dissectione* videtur animaduertisse. Nam etiam si omnino conti-
senteria. nuum est mesenterium, nihilominus tamen tria mesenteria recensuit, vnum quidem
Medium. dextrum, alterum vero sinistrum, tertium autem medium. ¶ *Medium* vero appella-
re illum apparet, mesenterii partem, ieiunum tenueq; intestina dorso colligantē, quæ
Dextrum angusto orta principio, in miram amplitudinem latitudinemq; ducitur, vt omnibus
Sinistrum. ieiuni tenuisque intestini connasceretur anfractibus. ¶ *Dextrum* vero & *sinistrum*
nominauit fortassis, quod colon intestinum, & rectum dorso alligat, dextrum qui-
dem in dextri ilii regione, sinistrum vero in sinistri, collocans. Mesenterii itaq; pars
gracilibus intestinis peculiaris, similem omnino cum inferiori membrana omenti
fortitur exortum. Ex magnæ enim arteriæ & venæ caux tunicis, quas ea vasa secundū F
vniuersum suum per lumborum vertebrae ductum a peritonæo obtinent, membra-
næ fibræ admodum frequētes exsurgunt, statim in duas degenerantes membranas,
dextræ quidem in dextram, sinistræ autem in sinistram. Hisce membranarum mutuo ad-
nexis mesenterii pars gracilia intestina dorso colligans efformatur: partes autem co-
lon rectum dorso connectentes, ab illis peritonæi regionibus principium ducunt, se-
cundum

A cundum quas hæc intestina exporriguntur, peritonæo semper fibras quasdam, quæ in mesenterii membranas degenerent, illic emittente. ¶ Neque profecto mesenterii substantia in hoc solum quo validius intestina dorso adnecteret, membranea est; verum etiam alterius magni cuiusdam usus gratia, quo venas omnes ex iecoris portæ & arteriæ propagines a magna arteria ad intestina excurrentes tuto colligaret, ac ne illæ dum homo salit aut cadit, contundantur & disrumpantur, tuto secureque admodum suffulciret, *ut latius Galenus lib. 4. de usu par. cap. vlt. docet.* Grandior enim venæ portæ truncus, quæ mesenterium iuxta renum regionem a dorso pronascitur, inter duas mesenterii membranas ducitur, arteriam habens comitem, quæ a magna arteria priusquam hæc ad renes ramos dispergat, in hoc ut in intestina diffundatur, originem ducit. Huc quoque pertingunt duo nervi, utrinque nimirum singuli, ab illis pronati ramis, quia sexto nervorum cerebri pari costarum radicibus exporriguntur. Adeo ut ingensis venæ portæ truncus, & dicta nuper arteria cum duobus illis nervis simul mesenterii centrum subeant; atque inter duas ipsius mesenterii muro coherentes membranas ingrediantur, ac tuto postmodum per uniuersam mesenterii sedem numerosa sobole ad intestina perferantur. At præter commoratum arteriam, aliæ quædam magnæ arteriæ propago eam mesenterii partem ingreditur, quæ sub renum regione a dorso principium obtinet. Atque huius propaginis exortus paulo sub feminalium arteriarum principio a magna pendet arteria. ¶ Porro ut homo copiosa vndeunque abundat pinguedine, sic mesenterium quoque præpingue adipiscitur, sanguine hic ex vasis resudante, membranarumque vi in adipem mutato: quum enim id quod in sanguine pingue est, *Galen. lib. 2. de tempe. ca. 3. teste*, extra se venæ transiiserint ubi in frigidas particulas incidit, quod genus membranæ sunt, in iis concrevit, ita ut præter vasa & nervos, multum adipem mesenterii membranæ in sui medio contineant. Sed extra adipem aliud quoque mesenterio accedit. Præter enim frequentem illam vasorum sobolem; natura glandosum corpus, quod Græcis *πάγκρεας*, *ut dictum est supra cap. 3.* singulis vasorum scissionibus ita vndiquaque substruxit simul & circumposuit, ut nulla ipsarum inualida fieri, aut per motum quassari posset. ¶ Ac proinde ad mesenterii centrum, ubi prima fit vasorum distributio corpus hoc glandosum exstruitur, insigniores, ac primos vasorum ramos secure admodum deducens. Per reliquam vero mesenterii sedem; singulis prope vasorum diductibus natura glandulam quoque aliquam interiecit, diuisionis robur simul ac firmamentum futurum. Adeo ut simul glandulis illis accedentibus, mesenterii membranæ vasa versus intestina tutissime deferant, intestinaque omnia dorso quam aptissime colligent, ac demum tertiam intestinorum tunicam efforment. Quum enim mesenterii membranæ vasa ad cauam intestinorum partem deducunt, ipsis intestinis simul cum vasis adnascuntur, atque hic inuicem abscedentes singulæ per suum in intestina latus ascendunt, ac in tertiam intestini tunicam degenerant; hac occasione fortius intestina ligantes, & validius vasorum propugnaculum constitutæ.

De stomacho & ventriculo. C A P. XII.

E VENTRICVLVS, quem Græci *στάσις* & *στάσις* vocant, pars est corporis in quam animantia cibum recipiunt. Proinde veluti præptuarium quoddam est, quod esculenta poculentaque suscipit, eaque primum concoquit ac mutat. Sub thorace & septo transuerso inter iecur & lienem medius statim ponitur, viamque ab ore cibos ad se deferentem obtinet, quæ *Galen. lib. 4. de usu par. cap. 1. teste*, ab usu *στάσις* nuncupatur & etiam illis communi nomine quo omnem angustum ductum, seu collum isthmi modo alicui ampliori ventri præpositum vocitant, *στόμαχος* dicitur; Latinis vero *Gula*. Hæc via linguam ad radicem eius hærens excipit, ac vtræque parte tonsillas attingens, a palati extremo principium sortitur, ac agitatione motibusque linguæ depulsum; & quasi detrusum cibum suscipiens, illum deorsum pellit partibus ipsius quæ sunt infra id quod deuoratur dilatatis, quæ vero supra contractis. Nervosa enim membranea, ut facile dilateretur, prompteque rursus concidat, effecta est: & fibris suo numeri fabulantibus intertextitur, ac reliquorum denique corporis ductuum modo, teres & intus accurate lævis lubricaque cernitur. Duabus enim, *Galen. lib. 3. de natural. facul. & lib. 4. de usu par. cap. 8. teste*, propriis constat tunicis; substantia, duritie, crassitie, & fibra-

Substantia
mesenterii
ratio & v-
sus.

Mesenterii
adepts.

Pancreas.

Nomina.

στάσις, *στόμαχος*,
στόμαχος,
Gula.

Substantia

Tunicæ.

rum ſpecie variantibus. Harum quidem interior neruoſior, durior, & paulo tenuior, A
 ac totius oris palatiquę tunica continua eſt, & rectis fibris manuum inſtar ciborum
 attractioni ſubſeruientibus, donatur. Exterior vero craſſior, mollior, propemodum-
 que muſculorum natura participans carnoſior viſitur, & tranſuerſis duntaxat circula-
 ribus abundat fibris. ¶ Duabus itaque iis ſolum fibrarum differentiis ſtoma-
 gulae indiguit, vt recte quidem cibum, & potum attraheret, tranſuerſæ autem aſtan-
 tes pellerent. Nam ſi obliquæ acceſſiſſent, cibus in ſtomacho longiori mora hæreret:
 quod non ſolum homini inutile, ſed & importunum ac moleſtum eſſet, quod ſtoma-
 chus cibo plenus, ita prolixius diſtenderetur, aſperæque arteriæ ac pulmonibus, &
 magnæ itidem arteriæ, dum ea dilatantur, diutius obſtaculo eſſet. Natura enim ſto-
 machum tuto, & illa quæ iam nominauiſus organa minus moleſtaturum, per cerui- B
 cem thoracemque ad ventriculum porrigens, exacte ſupra mediam ceruicis verte-
 brarum & quatuor primarum thoracis ſedem, in neutram partem inclinantem aſpe-
 ræque arteriæ ſubtenſum deducit. Ad principium vero quintæ thoracis vertebræ ſto-
 machus vt ampliori magnæ arteriæ trunco ſecundum doſi vertebraſ, inferiora cor-
 poris petenti cedat, non nihil in dextrum latus a media vertebrarum regione abſce-
 dit, arteriæ illi proximæ ad nonam vſque thoracis vertebram repens: quo ſimul at-
 que pertingit, ab eius vertebræ eleuatus corpore arteriam elatius, ne illa forte a de-
 uorato cibo comprimatur, aſcendit neruoſam ſepti tranſuerſi partē verſus ſiniſtrum
 latus penetrans. Non enim ſtomachus eodem cum arteria magna hic ad inferiora
 prolabenti foramine vtitur, verum peculiari, quod ipſi neruiſque cum illo deſcen- C
 dentibus *lib. 2.* dum ſeptum deſcriberemus, præparatum eſſe diximus. Porro ad nonā
 thoracis vertebræ initium ſtomachus vertebrarum a corporibus interuentu membra-
 nularum ex ligamentis vertebrarum originem ducentium committitur, atque ab il-
 lis membranulis tertiam tunicam nullis omnino fibris interſtinctam, & velut ſecun-
 dæ ipſius inuolucrum poſſidet. Quod vero iuxta quintam thoracis vertebrā ad dex-
 tra potius arteriæ quam ad ſiniſtra ſtomachus explicetur, in cauſa ipſa eſt arteria,
 non adeo tyranni ritu doſi mediam ſedem occupans ſed quum a ſiniſtro cordis ſinu
 ortum ducat, & per reliquum ipſius ductum verſus ſiniſtrum cauæ venæ ſubiiciatur,
 ſiniſtrorſum maiore ſui parte neceſſario vergens, ac proinde aliquantulum ſtomacho
 cedens, communicatorem, ac velut ſocium ſedis vertebrarum admittit, adeo vt ſto- D
 machus & minus obliquetur, & firmiorem adhuc ſedem quam in ſiniſtro latere repe-
 rire poſſet, obtineat. ¶ Porro ſtomachus non dextram ſepti perforat ſedem, rectaque
 in ventriculum ex dextro doſi latere porrigitur, ſed arteriæ ſuperuectus, obtuſoque
 obliquatus angulo ſiniſtram petit, ne ſtomachus ventriculum adeundo, iecur vniuerſam
 dextram ſedem inferioris regionis ſepti occupans, perforare cogatur, ſed eam
 ſepti partem adinueniat, quia minor iecoris pars ipſi facilem aditum præbitura con-
 ſiſtit. Talis ſane eſt tenuior totius iecoris portio ſiniſtræ ſepti ſedi hic ſubtenſa, cui in
 poſteriori regione qua ſtomachus ſeptum permeat, ſinus inſtar ſemicirculi inſculpi-
 tur, ſtomacho, cuius anteriorem ſedem inibi amplectitur, proportionē congruens.

Glandulæ ſtomacho crebro adnatae. ¶ Cæterum non ſufficiebat naturæ ſtomacho in eum modum obliquo ad velocem E
 ciborum tranſitum eas quas diximus tribuiſſe fibras, verum vt ipſius concauitas ſem-
 per humecta ac velut vncta eſſet, glandulas adiunxit alias quidem ad fauces, ſtoma-
 cho & laryngi communes, quæ ſaliuam humoremque illis organis ne exſiccantur,
 præparantes, Latinis *tonſillæ* appellantur. ¶ In medio itidem propemodum ſtomachi
 ductu, qua iſa aſperæ arteriæ in duos truncos ad pulmones diuiſæ ſubiicitur, binas alias
 ſæpe ſtomacho non opponit modo, ſed & in poſteriori ipſius ſede & ad latera adne-
 ſcit, illis plane reſpondentes, quas veſicæ ceruicis initio in viris natura circundedit.
 Quemadmodum vero hæc vrinæ ſeminisq; genitalis meatum irrigant & humectant,
 ſic etiam glandulæ ſtomacho adnatæ illius amplitudinem irrorant, ac ne ob ſiccita-
 tem difficilius in ventriculum cibus prolabatur ſaliuali quodam humore imbuunt. F

Ventriculi ſitus. ¶ Cæterum de ſtomacho hæc dixiſſe ſatis ſit, nunc ventriculi hſtoriam perſeque-
 mur. Statim ac ſtomachus ſeptum in ſiniſtra neruoſæ ipſius partis ſede penetrat, con-
 tinuum cum ventriculo corpus efficitur, quod in ſiniſtro latere amplam ſepti ſedem
 contingens, totam regionem inter iecur & lienem vacuam complectitur. In dextro
 autem

Autem latere ventriculus nusquam septum attingit, sed iecoris duntaxat concauo sub-
 tensus, tota ipsius parte superiori, & ex dextro item latere a iecore occultatur, tan-
 tumque a dextra septi sede passim abscedit, quanta iecoris est crassities, quum interim
 magnam septi sedem sinistro suo latere contingat. Quid multa? ventriculi forma
 in homine talis cernitur, ut maxima ipsius quoque portio in sinistro collocetur. ¶ Ven-
 triculus figura rotundus, & a dextro in sinistrum oblongus, aut secundum latitudi-
 nem quodammodo teres est. Rotundus quidem, quoniam rotunda omnia sint ca-
 pacissima, & iniuriis minime obnoxia. Oblongus vero, quod id sedes qua continetur;
 & deinde bina ipsius orificia, exigere videantur. In sinistro etiam latere multo am-
 plior rotundiorque, & ad inferiora prominulus cernitur, ac dein hinc versus dextra
 vergens, paulatim in angustum cogitur, & superiori quidem sui parte descendere;
 inferiori autem ascendere conspicitur; adeo ut in dextro latere multo quam in sini-
 stro gracilior euadat. Sic quoque superiori sui parte, quæ ab vno orificio ad alterum
 pertinet, strictior angustiorque est, inferiori lator, ampliorque. Anteriori parte æ-
 qualiter vndique gibbus occurrit, nulla ex parte deformatus. Posteriori sede duos
 quodammodo gibbos commonstrat, vnum sinistrum eundemque magnum proce-
 riusque extuberantem: alterum dextrum, minorem depressumque magis. Atque
 hos gibbos sinus quidam impressione, parat, secundum corporis longitudinem po-
 steriorem ventriculi sedi impressa. Qua enim ventriculi dorsi vertebrae, ipsisque ex-
 porrectos venæ caue & arteriæ magnæ descendentes truncos respicit, ac sedi quam
 fortitur ut cunque sese adaptat, posterior ipsius regio introsum quasi ad eius amplitu-
 dinem nonnihil imprimitur. Quamuis ventriculus e corpore auius inflatusque,
 eiusmodi sinum non ostendat. ¶ Duo ventriculus orificia habet e quibus vnum quo
 cibis & potus assumitur, in elatissima sinistra ventriculi partis sede ob hoc consistit,
 quod stomachus inibi septum commodè perforans; illic primum ventriculo con-
 nasci, commune cum ipso corpus fieri potuit. Hoc Græci veteres *καρδια*, Latini
superius os ventriculi nominant. In sinistra vero etsi parte habetur, propinquius ta-
 men mediæ ipsius sedi quam sinistro lateri accedit. Hinc Galenus *lib. 7. de usu parti. cap.*
21. sub mucronata cartilagine hoc ipsum situm esse veluti sub quodam propugnacu-
 lo & munimento scribit. Alterum ventriculi orificium cibos in cremorem mutatos
 ad intestina transmittit. Vnde Græcis *πυλῶς*, nobis autem *ianitor, & inferius os ventricu-*
li; barbaris *Portonarius* appellatur. In dextra eius sede consistit. Hoc orificium inte-
 stinorum principium constituit explantatque. Hinc est quod primum intestinum
 duodenum vocatum, exortum plerique *ut capite s. huius libri dictum est*, nomina-
 runt. ¶ Porro ventriculi orificia non situ duntaxat inuicem variant, sed inferius
 quoque superiori arctius est, quod rudes, non rritas, duras, magnasque moles, *ut*
ait Galenus, subinde deuoret homo, ad quarum ingressum amplam ventriculi
 viam esse oportuit. Infra e contrariò nihil magnum, durum, non versum in suc-
 cum, crudumque transit. Quanquam non adeo sane angustum sit inferius ven-
 triculi os, ut solum cremorem transmittat, quandoquidem non pauci quam pluri-
 ma fructuum ossa, impense etiam magna, crebro deuorata innoxie excernunt.
 ¶ Ceterum in plerisque animantibus in inferiori illo orificio Galeno *lib. 4. de usu par-*
ca. 7. auctore, velut glandulosa quædam caro sita, angustiam auget, præsertim ubi ven-
 triculus retentoria facultate vitur, concoctioni intentus. Tunc enim vtrunque
 ostium arctissime coactum commissumque clauditur. Porro non solum in inferiori
 ventriculi orificio, sed & in superiori substantia ventriculi crassior spissiorque est, ac ori-
 ficia velut in interiora extuberantiorē instar circuli partem obtinent, ventriculi
 substantiæ penitus respondentem: quæ quidem inter dissecandum integro adhuc
 ventriculo tactu percipitur, aperto autem inuersoque in conspectum venit, ac mani-
 feste ventriculi initium stomachi finem, & duodeni intestini originem common-
 stratur. Videntur enim stomachus, & duodenum ex ipso ventriculo enasci, aliarque
 omnino quam ventriculus ipse, partes esse. Hæc autem crassior ventriculi portio in hoc
 potissimum facta est, ut ora ipsius robustiora densioraque, quam reliquus eius corpus
 euadat, ne forte a trāscentium impetu diuellatur, rumpaturque. ¶ Quemadmodum vero
 exterior ventriculi superficies læuis & plana vndique est, sic & magis adhuc interior

Ventriculi
forma.

Duo ven-
triculi ori-
ficia.

Καρδια

Πυλῶς

Glandulosa
caro.

Ventriculi
superficies.

ipſius concavitas, modo duo iam dicta tubera circulatim prominentia excipias: ven- A
trculus enim inibi nihil præter rugas quasdam, ſi vehementer conſtrictus repeſiatur,
oſtendit: quamvis interim obſcuſum, & quaſi nubeculis intenſe rubentibus interſtin-
ctum colorem exprimat, quum tamen exterius omnino pene albicer. ¶ Quãtitas au-
tem ventriculi varia admodum eſt. Nam ſi veſicæ modo inflatur, haudquaquam mirabe-
ris tantam ciborum vim, viniq; copiam vno tempore poſſe abſumi. Porro quum is cõ-
ſtrictoria vi utitur, quamlibet exiguum multumve ſit quod continet, totum id vndiq;
complectitur, nullam vacuum ſedem relinquens, *ut cap. ſ. libri de diſſe. ſimp. Galenus expo- nit.* Huic quidem actioni ipſius congruit ſubſtantia, quæ membranea eſt, ut commo-
de uſu poſtulante dilatari, & rurfus ubi opus eſt, conſtringi queat. Conſtat enim ven-
trculus duabus latis tenuibuſque tunicis ſibi inuicem iunctis, perinde ac gula, ſed B
nonnihil diſſimilibus. Nam interna ventriculi, ſimiliter atque interna ſtomachi, ner-
uoſa membranaque eſt; & totius ſtomachi, oris & labiorum, vti ſane & inteſtino-
rum internæ tunicæ continua, duritie tamen ab oris ſtomachique tunica modice
differt: quod duriores aſperioresque cibos, priuſquam in ventriculum decendant, ore
conficiamus, a quibus oris amplitudo contunderetur & raderetur, niſi dura denſa-
que eiufmodi tunica euaiſſet. Atque idcirco tunica ori, & ſtomacho, & ventriculo
communis, ſenſim ad ventriculi fundum accedens, mollior efficitur. ¶ Fibris hæc du-
plicibus intertexta eſt, quo etiam ab interna ſtomachi variat. Interior enim tunica
pars ventriculi cavitatem reſpiciens, rectis iſdemque plurimis donatur fibris. Attra-
hat namque ventriculus cibos & potus per ſtomachum oportet, huiusmodi fibris, C
ceu manibus alliciens: quæ quum contrahuntur, ſtomachum ventriculumque bre-
uiant, adeo ut inter deglutiendum larynx deſcendente ſtomachi initio, ſurſum con-
ſcendat, quod mutuus ſtomachi & laryngis ſit connexus, & interior vtriuſque tuni-
ca continua cernatur. At ſecundum fibrarum huius interioris ventriculi tunicae ge-
nus obliquarum eſt, in externa tunica ſede, qua ſecunda illam amplectitur, ſitum.
Quemadmodum enim cibi potuſque attractio, eorundem neceſſario præcedit re-
tentionem, ita rectas fibras interius obliquis natura coordinavit. Deinde ut reten-
tionem ciborum iam confeſtorum ſuccedit expulſio, ita quoque ſecunda exterior-
ve ventriculi tunica tranſuerſas fibras obliquis exteriores merito nanciſcitur, non-
nullis interim obliquis fibris etiam implicata. Exterior enim tunica, quæ interiore D
crasſior & mollior, minusque compacta eſt, tranſuerſis fibris abundat, ſecundæ ſto-
machi tunicae reſpondens, niſi quod paulo minus quam hæc carnoſior eſt, & aliquot
etiam obliquis intertextitur fibris. Duabus iis ventriculi tunicis tertiæ accedit inſtar o-
perimenti & propugnaculi cuiuſdam tunicae exteriori circumdata, & a peritonæi, qua
id ſepti partem ſtomacho iter præbentem integit, pronata. Huic enim peritonæi
portio primum elatiori ventriculi orificio, deinde vniuerſo ipſius corpori ad duode-
ni uſque inteſtini originem obducitur. Atque hæc a peritonæo procedens tunica, o-
mnium quas id reliquis exporrigit organis, facile crasſiſſima cernitur, ſuperiorique
membranae omenti, *ut capite tertio dictum eſt,* originem præbet. ¶ Hæc tunica primum
omnes ventriculum petentes venas, arterias & nervos excipit, firmatque. Ac iſtæ qui E
dem venæ omnes a ſola portæ vena originem ducunt. Nulla enim vel quantumvis
exilis a caua, ventriculo ſubſtrata, ventriculum adit. Arteriæ autem vniuerſæ ab illis
oriuntur, quæ a magna arteria in humiliorem omenti membranam primum dige-
runtur, ac ipſid & iecur, & bilis veſicuſam, & lienem, & in ventriculum denique i-
pſum deriuantur. ¶ Ac prima ventriculi vena a portæ vena priuſquam in duo gran-
des ipſius truncos diſcindatur, principium habet, ad inferius ventriculi orificium
conterminaque ipſi ad poſterioreſ eius ſedem loca excurrans. Arteria autem huic
venæ coniunx, propago eius eſt arteriæ, quæ ſecundum portæ ductum iecoris cauum
adit. ¶ Secunda vena coniugem vndeunque habent arteriam toti dimidiæ inferiori
ventriculi parti ſubtenditur, a qua & anterior & poſterior fundi ventriculi dextra ſe-
des ſurculos mutuatur. Oritur ex dextra venæ portæ regione, qua in duos grandiores
ipſius truncos ſinditur. Arteriæ vero ab illa pronasſcitur, quæ in iecur deriuatur. ¶ Ter-
tia ventriculi vena impenſe gracilis eſt, comite arteria carens, & a venæ portæ graci-
liori ſiniſtrove trunco enata, in poſterioreſ ventriculi ſedem pauca ramulorum ſe-
rie diſ-

Ventriculi
quantitas.

Ventriculi
ſubſtantia
quibus for-
metur tu-
nicis.

Fibræ veni-
triculi.

Ventricu-
lum peten-
tes venæ &
arteriæ.

Arie dispergitur. ¶ *Quarta* vena ab eodem trunco prodiens, toto progressu arteriam sibi coniugem asciscit, omniumque ventriculū ascendentium venarum, vt & arteria arteriarum, facile præcipua, atq; in numerosos ramos diuisa. Ab hac vena dextrum oris ventriculi latus ambiens propago editur, secundum elatiorem ventriculi sedem ad ipsius humilioris vsque orificium pertingens. Porro arteria præsentis venæ coniunx ab ea depromitur, quæ per inferiorem omenti membranā in lienem contendit.

¶ *Quinta* vena comite arteria non priuata, sinistram ventriculi fundi sedem amittit, & superiori membrana omenti suffulta ramos elatori suā sedem in ventriculi anteriora posterioraque emittit. Huius principium dependet ab ampliori venæ portæ ramo, lienis infimæ sedi inferendo: & arteria, venam eam concomitans, ab arteriæ ramo pululat lienem hic accedente. Galenus lib. 4. de usu par. cap. 15. hanc venam maluit vocare *venosum quendam meatum*: vel, vt in lib. 5. de usu par. capit. 4. ait, vas breue per quod melancholicum humorem lien in ventriculū eructet, vt suo loco latius dicemus.

¶ *Sexta* ea demum vena est, quæ ab illis quæ lienī exporriguntur, pronascitur, sinistri-que ventriculi lateris sedem lienī proximam accedit: inter quas ea solet esse præcipua quæ a maiori venæ portæ ramo altiori lienis parti inserto principium ducit, a qua minus quam rana surculi pilorum modo graciles, quasi ad superius ventriculi orificium pertingunt. Quanquam, vt ex anatome obseruatur, non vnica, sed plures venæ sint, quæ a liene ad sinistram ventriculi sedem deriuantur. Ceterum prædictis venis; sinistram ventriculi latus accedentibus comites perpetuo iunguntur arteriæ. ¶ Com-

Venarum
ventriculi
officium.

Cmune autem omnium ventriculi venarum munus est, vt & alimentum ipsi adferant, & succulentioris ab illo confecti cremoris ad iecoris cauum non aliter ac intestinorum venæ, deducant. Quintæ autem & sextæ potissimum venarum officium est, vt per illas lien in ventriculū melancholiam eructet ac fundat, quo omnes ventriculi functiones, quæ amplexu quodam consistunt suā saporis qualitatē, quæ acerbæ & acida est, adstringendo, & in seipsum contrahendo roborat; ac proinde ne priusquam plene confectus sit a ventriculo cibus elabatur, prohibeat. Atque hic sane melancholici humoris ad ventriculū legitimus ac verus vsus est, Galeno etiam lib. de

Melancholici
humoris
vsus.

usu part. teste. Vt hinc omnibus palam fiat errare Auicennam, & complures alios nostræ ætatis Medicos, eius placita mordicus tenentes, qui prædictum humorem hoc potius nomine ad ventriculū deriuari tradunt, vt famem & appetentiam naturalem excitet; quemadmodum in nostris in sextum Hippocr. Epide. librum commentariis, & annotationibus in librum primum Galeni de tuen. sani. & aliis locis copiosissime demonstrauimus.

¶ Porro frequentes ventriculi arteriæ; innatum ipsius calorem recteant. Præter iam dictas venas & arterias ventriculo nullum aliud vas implantatur, & si forte meatuum bilem deducentium aliquis in ventriculi fundum venit id sane quam rarissime fit, id quod etiam lib. 2. de temper. cap. 8. Galenus testatur. ¶ Nervi

Arteriarum
vsus.

Eneruorum haud exilium par ex cerebri coniugatione sexta ad ventriculū deferretur. Postquam enim recurrentes, de quibus suo loco, diffuderunt nervos; ramulosque cordis in uolacro, & pulmonibus communicauere; deorsum ad stomachum properant, dexter quidem ad dextrum latus, sinister autem ad læuū. Simulatque vero aliquantisper nervi eum stomacho descenderunt; fibrarum duntaxat interuentu illi commissi, vterque nervus bipartito scinditur, & dexter quidem suis ramis obliquis in sinistram fertur: sinister autem in dextrum, atque ambo stomachum concomitati septū transuersum permeant, nullam interim septo sobolem offerentes. Vbi autem quatuor duorum nervorum rami elatius ventriculi orificium cōtingunt, multiplici propaginum serie id amplexantur; surculos notatu digno interuallo recta deorsum promentes. A sinistro sexti paris nervo dextram ventriculi oris regionem implicante, insignis vtrunq; ramus secundum elatiorem ventriculi sedem ad ipsius vsque inferius orificium deducitur, qui & si in progressu aliquot diffundat propagines, ventriculi que inferius orificium surculis quibusdam implicet, non tamen inibi absumitur, sed in iecoris cauum protegit. Ceterū humiliores ventriculi partem alii duo accedunt nervi, a sexti nervorū cerebri paris propaginibus, secundū costarum radices deorsum deductis principium obtinentes; ac illarum arteriarū cōiuges, quæ superiori membrana omenti suffulta, in ventriculi fundum digeruntur. Inter hos tam varios nervorum quos ventriculus exigit surculos, nulli

Nervi ven-
triculi.

Nervorum
ventriculi
vsus.

profecto Naturæ tantam ostendunt prouidentiam, atque superiori ipsius orificio in-
 ferti. Non enim duntaxat id vt noxam a bilioso eiusque generis humore aliquo indu-
 ctam sentiat, adeo frequentibus scætet neruis, sed vt per illos veluti riuos & ductus, a-
 nimalis vis ipsi in primis dispensaretur, ac cibi potusque indigentiam ventriculus sen-
 tiret, ad sumendaque cibaria incitaretur, quemadmodum copiosissime Galenus lib.
 4. de usu par. cap. 7. ostendit. ¶ Ventriculum vndiquaque, velut lebetem ingentes foci,
 circumdant organa excalefacientia, vim ipsius concoctricem non parum iuuantia.
 Totam enim superiorem eius regionem versus anteriora & dextrum ipsius latus, &
 in posteriori sua sede dextrum gibbum, iecur complectitur. Elatior vero ipsius pars
 ad superioris sui orificii posteriorem sedem consistens, & sinistrum eius latus vniuer-
 sum, septo ambitur, excepta solum ea regione quam lien ad sinistrum ventriculi latus
 humiliori posteriorique parte occupat. In posteriori autem sede ventriculus inferio-
 rem omenti membranam, & quæ in illâ excurrunt vasa proxime subtenſa obtinet.
 Dein sub hac posteriori eius sede septi transuerſi pars, & vena caua, & magnæ arteriæ
 truncus, præter dorsum ipsiusque musculos consistunt. Magna vero anterioris ven-
 triculi sedis regio, neque iecore, neque septo transuerſo, neque omento, neque liene
 obducta, aliud hic obtinet subsidium, in calefaciendo omento haud dissimile. Præter
 enim peritonæum, & octo abdominis musculos, vena ab vmbilico iecori deducitur,
 qua foetus alimentum accipit, quæque post partum exanguis inutilisque efficitur.
 Huic quidem venæ qua peritonæo nexa ventriculo insternitur, in circuitu adeps
 multus adnascitur, qui vt & ventriculus suo in coquendo munere alacrius laboret, a-
 liquid auxilii præbet.

De iecore. CAP. XIII.

Nomina. IECUR, quod Græcis *ἥπαρ* dicitur, *facultatis appetitricis seu concupiscilis*, quam iidem
ἡπαρ Galeno lib. 4. de usu par. cap. 13. teste, sedes, venarumque omnium principium,
Situs. ac primum sanguinis generandi instrumentum. ¶ Sub septo iecur statim collocatur,
 maximam inferioris septi sedis regionem occupans. Etenim totam dextram septi
 partem contingit, parum admodum illius partis intactum relinquens, qua septum
 vndecimæ duodecimæque costis adnascitur, suæque ligamenta quibus vertebris col-
 ligatum porrigit. Media autem septi parti vniuersæ iecur subtenditur. Sinistræ vero
 parti non itidem: quanquam huius quoque magnam sedem teneat, totam videlicet
 anteriorem ad eam vsque partem, qua sinistrum septi latus costarum medio, quod
 ab ipsarum radicibus ad finem vsque eorundem meitur, incumbere incipit. Maio-
 rem autem sui partem humanum iecur in dextro latere extensam habet, propter lie-
 nem qui ipso dignitate multo inferior, sinistram sedem erat occupaturus. Vt igitur
 corpus redderetur æquilibre, sagax Natura minorem iecoris partem in sinistra de-
 duxit. ¶ Iecoris forma varia est, & suis quibus accumbit organis respondens. Nam &
 supra & retro omni ex parte qua septum spectat, gibbum læueque admodum visitur,
 nullis omnino extuberans processibus, & cavitati septi, quæ in inferiori ipsius sede
 necessario constituitur, ad amissim, congruens. Ne vero venæ caudex secundum po-
 steriorem iecoris sedem protensus, aut huius gravitate, aut septi transuerſi motu com-
 primeretur, tantus sinus posteriori iecoris sede exculptus est, quantus amplectendo
 innascendoque cauæ caudici sufficiat. ¶ Cæterum inferiore sede iecur admodum a-
 mice ventriculo cedit, ac ab illo cauum efficitur, & læue quidem hic existit, sed non
 vndecumque processibus tuberibusque & sinibus liberum. Quemadmodum enim organa
 quibus iecur caua sui parte incumbit, simplici quadam superficie nequiquam gibba
 sunt: ita quoque iecur vnica superficie haud sinuatū est, sed rupis præcipitio, vel vt Gal.
 lib. 6. ana. admi. ait, distantibus a se inuicem montium rupibus aliqua ex parte acce-
 dit. Qua namque duodenum exporrigitur intestinum, & vena portæ a iecore prodit,
 iecur quodam tubere prominet, sedem quam hic vacuā reperit adimplendum. Præ-
 terea vbi bilis vesicula cauæ iecoris regioni innascitur, sinus in illa exculpitur, mediū
 eius vesiculæ corpus eleganter excipiens. Adhæc iecur quoque ea parte sinum adipi-
 scitur, qua stomachum tangit, ipsique septum tranſeunti, & superiori orificio ventriculi
 continuando, locum præbet. A deo sane vt iecur nullam peculiarem formam obtineat,
 sed eam, quæ a conterminis partibus ipsi imprimitur. Iecur itaque superius poste-
 riusque

Ariusque qua septum spectat, præter sinum venæ cauz caudici paratum, exacte gibbum & lævæ, sed qua ventriculum amplectitur, omni propemodum ex parte cauum cernitur. Rursus vbi posteriori ventriculi sedi & dextro ipsius lateri attēditur, crassissimum est: qua vero superiori orificio ventriculi eiusque sedi superiori versus sinistrum incurrit, tenue apparet, & sensim illic in acutum fertur angulum. In dextra vero parte rotundum quodammodo & orbiculare observatur, & nusquam tenuius est, quam in ambitu, & præcipue in anteriori ipsius sede, vbi sane tenuissimum visitur, interdum inibi impressiones quasdam obtinens, sed omnes exiguas, præter vnam patulæ sectionis modo anteriori ipsius parti inductam, a ca mucronata pectoris ossis cartilagine parum in dextrum iecoris latus vergentem, & veluti foramine quodam ad eam iecoris sedem penitus pertinentem a qua portæ venæ caudex principium ducit. Atque hæc sectio seu foramen est, quo vmbilici venia iecori implantatur.

Fibras num
iecur ha-
beat.

Bcoris sedem penitus pertinentem a qua portæ venæ caudex principium ducit. Atque hæc sectio seu foramen est, quo vmbilici venia iecori implantatur. ¶ Et hæc nus quidem humani iecoris formam descripsimus, quod in tot & tam magnas fibras *λεβους* Græci vocant; vt porcinum non discinditur, sed vnicum continuumque præcipua ipsius substantia, corpus iecur hominis est. Hinc rectissime Herophilus *ut lib. 6. tina. admi. auctor est Galenus*; in quibusdam animantibus ne fibras quidem habere, sed ex toto rotundum esse, minusque rectum: in quibusdam duas, in aliis plures, in multis etiam quatuor obtinere scripsit. Porro quum Græci *λεβους* omnia *ἀνέγ*, hoc est, extrema dixerint, factum est vt iidem iecur etiam humanum fibras habere scripserint. Nam duplicem fibram ista ratione iuxta scissionem qua venia ex vmbilico proficiscens excipitur, statuerunt. Propter portiunculam etiam iecoris sub ortu venæ portæ extuberantem fibris constare prædicta ratione nonnulli dixerunt. Item iuxta sinum quo iecur stomacho cedit, & in sinistra maxime eius parte qua iecur septo connectitur fibram fortasse quis non inepte constituere potest. Habet itaque fibras ista ratione iecur etiam humanum, sed longe alias, & multo minores quam porcinum: Atque huc respexisse puto Hippocratem dum in *lib. de ossium natura* iecoris quinque esse fibras tradit. Et *lib. 8. Epide. par. 8. aph. 41.* vbi cuidam iecoris fibram complicatam fuisse commemorat. ¶ Ceterum in hominibus, si ad alia quædam animantia conferas, perquam magnum est: maius gulosis & timidis, *vt loco antea citato Galenus auctor est.*

Αἰσθη...

Cficiscens excipitur, statuerunt. Propter portiunculam etiam iecoris sub ortu venæ portæ extuberantem fibris constare prædicta ratione nonnulli dixerunt. Item iuxta sinum quo iecur stomacho cedit, & in sinistra maxime eius parte qua iecur septo connectitur fibram fortasse quis non inepte constituere potest. Habet itaque fibras ista ratione iecur etiam humanum, sed longe alias, & multo minores quam porcinum: Atque huc respexisse puto Hippocratem dum in *lib. de ossium natura* iecoris quinque esse fibras tradit. Et *lib. 8. Epide. par. 8. aph. 41.* vbi cuidam iecoris fibram complicatam fuisse commemorat. ¶ Ceterum in hominibus, si ad alia quædam animantia conferas, perquam magnum est: maius gulosis & timidis, *vt loco antea citato Galenus auctor est.*

Magnitudo.

¶ Iecoris substantia rubra mollisque nuper concreto sanguini quam simillima, nisi *παγίγχομα*, hoc est, *effusionem* vocat, quod sanguinis instar ex venis effusi vas circumfundatur. Præsens substantia iecoris vasa, de quibus postea dicemus continet, & amplectendo suffulcit, totam propemodum iecoris molem constituens. Hæc perquam tenui obuoluitur tunica seu membrana, a ligamentis pronata, quibus iecur peritonæo, qua id septo subditum est, affirmatur. ¶ Sunt autem hæc duo præcipua, vnum quidem densum & insigniter validum, sed membranæ modo tenue, quod peritonæi pars inferiorem septi sedem succingens paululum a latere dextro mucronatæ cartilaginis educit, recta ex anterioribus in posteriora protensum. Alterum vero, qua iecoris sinistra pars in acutum definit angulum, a peritonæo nascitur. Hic enim fortissimo & quodammodo

Substantia.
παγίγχομα.

Eteretiligamento iecur peritonæo alligatur. Dein qua cauz venæ caudex seprum permeat, & dein secundum cauz periecoris posteriora deductum peritonæum iecori adnascitur, ipsumque peritonæo iecur colligat. Quinetiam cauz iecoris sedi vbi portæ est principium, omenti quoque portio adnascitur. Præterea iecur anteriori peritonæi sedi connectitur beneficio venæ ab vmbilico in ipsum iecur pertinentis. Hæc enim foetu e matre exeluso arefcit ac instar validi efficitur vinculi, ipsum, *vt iam dictum est*, peritonæo colligatis. Porro ex iis omnibus vinculis quibus iecur peritonæo adnectitur, tenuem suam & sibi peculiarem fortitur tunicam, in quam duo quoque, ne stirpis modo sensus expers esset inferuntur nerui. Vnus quidem a sexti paris cerebri neruorum ramis, elatiori orificio ventriculi implantatis. Alter vero a sexti eius coniugii pro-

Iecoris liga-
menta.

Connexus.

Nerui ieco-
ris.

Fpaginibus discinditur, quæ costarum exporriguntur radicibus. Hic in iecoris tunicam raris modicisque sureculis dispergitur, priore in iecoris quoque substantiam pertingente. ¶ Arteriæ autem cauz duntaxat iecoris sedi exiles & in corpus iecoris excurrentes, ab ea diffusæ, quæ dextræ sedi inferioris omenti membranæ a magna arteria offertur exporriguntur, vt huius calorem temperent. Ceterum vt sanguis diutius in iecore

Arteria.

Vena.

moram traheret, ac perfectam elaborationem experiretur, vtque totus iecoris sub-
stantiæ appropinquaret, non vnum ventrem illi veluti lagenam quandam rerum opi-
fex indidit, verum venas illas omnes infinita ramorum serie & in arctiſſimos ductus
digeffit. ¶ Meatus autem bilis, de quibus poſtea fuſius, inter vtraſque venas locum ob-
tinent, vt commodò ipſorum ſitu prius expurgatus ſanguis, in venæ cauæ ramos abſu-
meretur. ¶ Per vniuerſum autem iecoris corpus ad humiliorem eius ſedem venę por-
tæ propagines diffunduntur. In ſuperiorem vero ipſius partem venæ cauę lob. les nu-
meroſæ ſparguntur, quas omnes ſuo deſcribemus loco.

De venis generatim. C A P. XIV.

Vena quid.

VT recte quæ nobis de venis dicenda ſunt intelligantur, primum quid vena ſit ex-
ponemus. Eſt itaque vena pars instrumentaria, teres, fiſtulæq; inſtar cauata, & vni-
uerſo corpori ſanguinem partes enutriturum deferens. Hæc vnica peculiari propria-
que conſtat tunica, quæ colore craſſitie & forma membranis reſpondet, ſed alias ab
illarum natura plurimum diſcrepat. Membrana namque ſimplex ac ſimilare corpus
exiſtit, & omni ex parte quomodocunque diſcerpatur, perpetuo membranæ nomen
retinet. Venæ autem tunica, quod ex membranis & fibris, *Galeno etiam cap. 2. libri de in-*

Tunica ve-
narum pro-
pria.

æquali in tempeſte, conſtet, corpus eſt instrumentarium. ¶ Triplici autem genere fi-
brarum quæ Græciſ^{is} dicuntur conſtituitur, rectis nimirum, obliquis & tranſuerſis.
Rectæ quidem attractioni conducunt, obliquæ autem retentioni, tranſuerſæ ex-
pulſioni. *Rectæ* ſunt, quæ ſecundum organi longitudinem expanduntur. *Obliquæ* autem
quæ ſecundum obliquum ducuntur. *Tranſuerſæ*, ſecundum latitudinem corporis lo-
cantur. Rectis itaque fibris ſanguinem in ipſius cavitatem vena allicit. Quia vero ſan-
guis ad ſubſequentem venæ partem tanquam per riuum propulſione opus erat tranſ-
uerſis quoque fibris donata eſt. Ne vero ſtatim vniuerſus ſanguis in proximam venæ
partem citra moram ex alia aſſumeretur propellereturve, obliquæ etiam fibræ venarum
corporibus impliciæ ſunt. Ex tribus itaque fibrarum generibus venæ corpus in-
ſtar albæ membranæque ſeu neruæ tunicæ conſtatum eſt, diſtendi & rursus in ſe

Aſciſſiue
narum tu-
nica.

collabi aptum. Præter hanc peculiarem tunicam, vena aliam ſubinde aſciſcit, pleriq;
etiam corporis partibus communem. Quandoque enim venæ longo tramite aliquo
ducuntur, aut offi, aut duriori cuiſpiam corpori incumbunt, aut alicubi ſuſpenduntur,
tum membrana illis veluti alia peculiaris tunica obtenditur. Huiusmodi tunica venæ
per vniuerſum corpus induuntur, quoties extra viſcus aliquod, aut muſculi corpus e-
minent, nec viſceri aut muſculo intexuntur. Tunc enim ſemper ex cõterminis mem-
branis alia quædã tenuis tunica ipſis obuoluitur, tum tutioris ductus, tum ad vicinas
partes firmioris nexus gratia. Ceterum venæ corporibus quibuſdam inſertæ, ac in illis
propagatæ, huiusmodi tunica nequaquam indigent, quod abunde in illis corporibus
firmentur quodq; ea tunica impedimento eſſet, quo minus prompte ſanguis ex venis
ſudaret, aut ſanguis in venis collectus, ſubſtantiæ alicuius viſceris vim tardius experi-
reretur. ¶ Hoc quidem nomine in nulla corporis parte, venæ neq; tenuiorem adipiſcū-
tur ſuam peculiarem tunicam, neq; in plures diſfunduntur ſoboles, quam in iecoris
ſubſtantiæ, quæ ſuccū in venis contentum in ſanguinē mutatura, ſuiſq; recrementis li-
beratura erat. ¶ Omnes venæ primaria ratione vt ſanguinē ſingulis corporis partibus
deferant, creatæ ſunt: quanquā quibuſdam earum ramis, vt portæ venæ propaginibus
ad cibi in ventriculo elaborati ad iecoris portas attractionē, ceu aliis ad excrementorū
expugnationem, vt ſunt quæ in renes ſeoriſum deferunt ſanguinem, abutatur, quas om-
nes ſuo loco recenſebimus. Porro in natis abſolutiſq; hominibus omnes, vt plurimæ
venæ quaternario numero comprehenduntur, quæ ceterarum omnium radices ſunt.

Venarum
vſus.Venarum
numerus.

¶ *Vna* ex caua iecoris ſede prodiens in bilis veſiculam ventriculum, lienem, inteſtina,
meſenterii & omentum excurrit. ¶ *Secunda* ex gibbo iecoris, in reliquum corpus, ſolis
exceptis pulmonibus, innumera ramorū ſerie diſpergitur. ¶ *Tertia* e dextro cordis ſi-
nu enata, frequenti admodū propagine in pulmones digeritur. Verum hæc vena id ſi-
bi peculiariter vendicat, quod arteriarū conſtet corpore, vnde etiam *Arterialis*, vt ſuo
loco dicemus, vena nuncupatur. ¶ *Quarta* ab umbilico in iecur producitur, ac ad fœtus
nutritionem dūtaxat animali famulatur. Ab iis itaq; venis reliquæ omnes quæ in cor-
pore occurrunt originem mutuuntur, eiſq; continuæ ſunt.

De vena porta et eiusque propaginum serie. C A P. XV.

A **O**RBITA LATIM ex omnibus extremis iecoris partibus infiniti venarum furculi, capillorum modo tenues prodeunt; quæ versus iecoris medium porrectæ, sensim in maiores soboles, & inde in grandiores adhuc tantisper coeunt, donec omnes in quinque, interdum etiam in pauciores ramos colligantur, qui in caua iecoris regione versus eius medium, ad interiora tamen & posteriora iuxta dorsum magis vniti, grandem & impense amplam constituunt, venam quæ Græcis *σπληνική*, hoc est *caudex seu truncum referens* appellatur. Ingressum etiam & ascensum in hanc regionem ex multis angustis iam dictis viis vium factum, veterum quidam, *Galenus lib. 4. de usu par. cap. 2. teste*, naturæ operum peritus ante Hippocratem *Πύλας*, id est, *portam* nominauit, non alia sane de causa, quam quod per hanc, veluti portam aliquam, succus in ventriculo, & intestinis elaboratus iecori inuehatur, a quo in hunc vsq; diem *portæ venæ* nomen ad nos manauit. Ideoque, *ut Galenus lib. 6. de placitis Hipp. & Pla.* a nonnullis *portæ iecoris*, ab aliis *lanitrix* vocatur. *Portæ vena* a quibusdam etiam iecoris manus nuncupatur, quod iecur ea ad elaborati in ventriculo cibi attractionem tanquam manu vtatur. Dicitur etiam *Galenus lib. 5. de usu partium ca. 2.* *vena magna*. Hæc ad eum modum ex iecoris cauo enata, versus sinistrum procedens, in multos venarum sarculos, ad bilis vesiculam, ventriculum, intestina, lienem, mesenterium, & omentum, vt dictum est, sparsos, digeritur. Primum duos valde exiguos ramulos ex superiori, seu anteriore sui corporis parte bilis vesiculæ ceruici distribuit, qui tandem in sarculos capillorum modo tenues diducti, in vniuersum vesiculæ corpus excurrunt. Post hos aliquanto inferius ab anteriore quoque *venæ corporis sede*, versus dextrum tamen latus magis, alius emergit, ramus iam commemoratis insignior, qui humiliter ventriculi orificium, & ventriculi portionem huic iuxta dorsum proximam, aliquot ramulis adit.

¶ De in *venæ portæ caudex* deorsum magis protensus, postquam hos diffudit ramos, in duos maximos bipartitur truncos, quorum elatior & sinister propemodum vniuersus in ventriculum, & omentum, & quandam coli regionem, quæ secundum humiliorem ventriculi sedem fertur, deinde & in lienem absimitur. Alter humilior, gradior & dexter, totus penè in mesenterium & intestina exhauritur. Ab huius namque dextro latere iuxta ipsam caudicis *portæ* in duos truncos distributionem, vt curi que insignis *vena ventriculo* exporrigitur, quæ omenti membrana superiori suffulta, & sub dextra ventriculi fundi sede transuersim producta, exiguas frequentesque venulas ventriculo diuariat, quæ & anteriorem & posteriorem fundi ventriculi regionem multa sobole intertextum, dextro quoque latere *venæ portæ caudicis*, *venæ* quædam originem ducit, quæ duodenum numerosa sobole implicat, & paulo ultra renum principium exporrigitur. ¶ Sinister *portæ truncus* inferiori membrana omenti intextus, ab elatiori ipsius regione *venam* germinat, quæ in dextram regionem gibbi ventriculi qua, id dorsum respicit, aliquot sarculos diffundit. Ab humiliori autem eius sede, alia diducitur *vena*, iam dictæ quodammodo in ortu respondens, quæ deorsum in dextram inferioris omenti membranae regionem, & colum intestinum, qua hac omenti membrana id continetur, ramulos aliquot deriuat. Porro vterius in sinistri trunci versus lienem progressu, præter exiguas soboles quas priuatim glandoso corpori inferiori membranae omenti innato elargitur, ab elatiori sua sede *venam* promit omnium ventriculum adeuntium facile capacissimam. Hæc obliq; sursum prorepens ventriculo duos communicat ramos, vtrinq; singulos, multis furculis in ventriculum dispersos. Reliquum *venæ* sursum ad elatius ventriculi orificium per ventriculi posteriora exporrectum, ad dextrum orificii latus ad anteriora ipsius orificii emergit, & totam anteriorem sedem ambiens, secundum sinistram eius latus denuo in posteriora reflectitur, ac coronæ modo ventriculi orificium superius perreptat. Ab hac quidem *venâ* vtcunq; insignis pronascitur, quæ a posteriori ventriculi regione secundum dextrum orificii latus antrosum cõtendit. Hæc inferius ventriculi adit orificium, id frequentibus vtcunq; venis amplexans. Iam commemoratæ *venæ* multis propaginibus in ventriculum pertingenti, alia responder, ab humiliori sede sinistri *venæ portæ trunci* prodiens, ac inferiori omenti membranae implicita, quæ non ita longe ab initio in duos plurimum ab inuicem discedentes bipartitur ramos

Portæ ramorum in iecoris substantia series.

Nomina.

Portæ venæ vnde dictæ.

Portæ caudicis extra iecur distributio.

Portæ caudicis in duos principales ramos truncosque diuisio. Dextri trunci series.

Sinistri trunci series.

ex quibus denuo plures furculi deorſum prorepunt, & in coli partem excurrunt. **A**
 ¶ Ceterum poſtquam ſiniſter portæ truncus commemoratas produxit propagines
 ad lienem tranſuerſim accedens, in duos ramos ſecatur, qui ruſus in alios partium-
 tur, atque ii tantisper in alios dirimuntur, quouſque numeroſa ramorum ſerie in ca-
 uam ſimamve lienis ſedem recta linea ſecundum totam lienis longitudinem inferio-
 ri membrana omenti perpetuo ſuffulti implantentur, atque infinita ſobole venulas
 perquam graciles inuicemq; implexas, per vniuerſum lienis corpus digerant. Ab inſi-
 mo ramo lienis inferiora petenti priuſquam ſiniſter portæ truncus in frequentiffi-
 mas ſoboles illas diſpergatur, interdum tenuis vena prodit, quæ in ſiniſtram inferioris
 omenti membrana ſedem vno atq; altero furculo diſpenſatur. Præterea a ramo quo-
 piam ex illis qui ad ſuperiorem lienis regionem repunt, quum iſ iuxta lienem conſi-
 ſtit, vena exoritur, quæ dextrorſum lata, atque omenti membrana ſuperiori intertex-
 ta, in eam ventriculi ſedem pertingit, quæ elatiori lienis ſedi propinquior viſitur. Hæc
 quandoque, ſed rarius, in ventriculi tunicas adeo excurrit, vt non admodum procul
 a ſiniſtra ſede ſuperioris oriſicii ventriculi diſtet, nunquam vero illud contingit.
 Quemadmodum vero hæc iuxta eminentiorem lienis partem principium ducit, ſic
 a maiuſculo ramo imam lienis ſedem accedente, alia exſurgit vena vtcunque in ſigni
 amplitudine donata. Hæc periinde atque prædicta dextrorſum retorquetur, & ſini-
 ſtram ventriculi fundi ſedem perreptat, vt per eam lien in ventriculum melancholi-
 cum ſuccum eructet. Atque ad hunc modum frequentiffime ſiniſtrum portæ ve-
 næ truncum abſumi videbis. Nonnunquam autem ex ſingulis venis concava lienis **C**
 regioni iam inferendis, ſingulas venas in ventriculum ad eum modum digeri, ac
 lienem pertinaciter colligari comperies, quo duas iam commemoratas a venis lienem
 accedentibus propagari diximus. ¶ Dexter venæ truncus, qua primum meſente-
 rio a dorſo naſcenti committitur, in tres præcipuos diſcinditur ramos, qui in alias de-
 nuo innumeras venarum ſoboles diuaricati, inter duas meſenterii membranas pro-
 ducuntur, atque inferiorem poſterioremve inteſtinorum partem quæ meſenterio
 alligatur, & quam cauam vocant, amplectentes, in ieium, tenue, cæcum & dextram
 coli partem, quæ id dextro reni & iecori adiacet, finiuntur. Quot vero ab iis diſcin-
 dantur ſoboles, nemo facile, quum proſus innumerae ſint, explicabit. Neque etiam
 omnibus eandem diſtributionis ſeriem exhibent. Priuatim vero a tertio dextri por-
 tæ trunci ramo, qui in ſiniſtram partem medii meſenterii potiſſimum diſcinditur, in-
 ſignis vena in ſiniſtrum meſenterium, quod colon a liene ad rectum vſque inteſti-
 num dorſo alligat, porrigitur, atque nunc diſtis venis in inteſtina diſfuſis ſimiliter in
 plures deriuata furculos, eam coli regionem, quæ a ventriculi ſiniſtra ſede ad rectum
 vſque inteſtinum pertinet adit. ¶ Inter omnes ſiniſtri meſenterii venæ ramos, vnus
 in ſigni magnitudine inter duas ſui meſenterii membranas intertextus, ſecundum
 coli ſinem deorſum ſub recto inteſtino prorepat multas venulas ex ſuperiori antero-
 rive ipſius ſede ad eam inteſtini partem, qua porrigitur depromens. Præſens ramus
 quum ad recti inteſtini extremum vſque contendit, non amplius recta ſub inteſtino
 deducitur, ſed in plures vtcunq; exiles diſfuſos ramulos, ſinem recti inteſtini orbicu-
 latim amplectitur. Hunc certe ramum, ad fœculenti ſanguinis per ani venulas, hæ-
 morrhoidas dictas, ſanguine interdum manantes, expurgationem plus conducere
 quam eos ramos qui a caua vena orti in minores tandem ac capillares venas diſtribu-
 ti, in ſedis cutem & muſculum *σφυγτική* vocatum inſeruntur rationi conſentaneum
 eſt. ¶ Quum enim lien melancholicum ſuccum expurget, ab eo facillime & bre-
 uiori compendio ad ſedem deorſum iſ ſuccus perfluat. Nam ſi per cauam vniuer-
 ſus vacuaretur, per portam in icor ſinum regurgitare ipſum neceſſe eſſet. Dein per
 anguſtiſſima oriſicia venæ portæ in minimos caua ramulos, modo ad gibbum iecoris
 illi rependū eſſet, aſcendere. Inſuper ex caua principio iecorisq; gibbo, longo tramite
 ad os ſacrum confluere deberet, hinc in alias venulas paulo minores, donec per ſedem **F**
 excerneretur. Attamen expurgatur etiam per ramos a caua ortos quicquid eſt eius
 ſanguinis fœculenti quod a liene non eſt attractum, & expurgatum. Eſſi autē frequen-
 tiſſimi ſunt trium nunc dictorum dextri portæ trunci ramorum ſoboles, tamen plures
 numeroſioresque in gracilia quam craſſiora inteſtina diſtribuuntur. Quo enim in-
 teſtina

Dextri cau-
 dicis portæ
 trunci ſe-
 ries.

Hæmor-
 rhoides
 portæ venæ
 ortæ.

A testina ventriculi fundo sunt magis continua, eo pluribus venarum implicantur surculis quoniam ex illis plus succi quam ex sedi vicinioribus sit exsugendum. Quemadmodum vero nonnullis venarum portarum ramis corpora quaedam glandulosa atque ad amussim quodammodo carnea attenduntur circumducunturque: sic etiam ramorum per mesenterium ad intestina diffusorum sectionibus glandulae quaedam interiacent, proportionem in magnitudine cum distributis propaginibus seruantes. In grandioribus enim propaginum diductibus magnae reponuntur glandulae, in subsequenteribus vero horum ramorum diuarcationibus graciliores minoresque. Huiusmodi quoque glandulae capillorum modo praetenuis venulas, a venis quas interiacent mutuuntur.

¶ In has igitur propagines portarum vena digeritur, quae omnes aut ad nutritionem, aut excrementi alicuius expurgationem, aut in ventriculo excocti cibi in iecoris portas inductionem propagatae sunt. Quippe quae bilis vesiculae offeruntur alimentum illi subministraturae ad eam excurrunt. Pari modo propagines numerosa sobole in omentum diffusa duntaxat, ut illud enutrient, a portarum vena deriuantur. Propagines lienem petentes factae sunt, ut simul lienii alimentum deferant, atque ex iecore foeculentum sanguinem seu melancholicum succum in ipsum expurgent. Quippe lien per venas ab illis quam lienii inseruntur in ventriculum profusas, quod ipsi ex foeculentiori sanguine reliquum est, neque sibi concoquere ac adaptare valet, in ventriculum eructat. Attamen non, ut dissectionum professores aliquot censent, in superius ventriculi orificium diffundens, sed ad fundum praecipue, quo maior vena a venis lienem aduentibus exorta in ventriculum, *ut diximus cap. 12. huius libri pertinet.* **¶** Surculi capillorum modo tenuis ad glandia in hoc rerum opifice deducuntur, ut illa a portarum ramis alimentum colligant. Reliquae omnes portarum propagines in ventriculum & intestina digestae, duplici nomine exstruuntur, partim ut illis nutrimentum subministrent, partim ut suis finibus, & osculis in ventriculum, & intestina hiantibus confectum a ventriculo cibum ex ipso, & intestinis exsugant, atque ad iecur tanquam sanguificationis officinam toti corpori communem transferant. Nunc ad *Cauam venam* leuiorem est accedendum.

Venarum portarum ramorum visus.

De cauae venae ortu & eius partis quae supra iecur consistit distributionis ordine. CAP. XVI.

D QVEMADMODUM ab extremis iecoris partibus orbiculatim ex ipsius concava sede exiguae venularum propagines paulatim ad iecoris medium versus posteriora contendentes inuicem coeunt, maioresque venas constituunt, & deinde ex maioribus illis rursus grandiores tantisper efficiuntur, quousque omnes illae soboles in venarum portarum caudicem finiunt: ita ad cauae venae generationem ex summis orbicularibusque iecoris finibus, in gibba ipsius sede, innumerarum venularum propagines exoriuntur, quae sensim versus medium posterioris sedis, iecoris prorepentes, in insigniores venas coeunt, atque hae rursus in ampliores eousque colliguntur, donec tandem in elatiori iecoris parte, qua dextram vertebrarum sedem respicit, in unam congregiantur venam, quae ab insigni amplitudine Graecis *Κοίλη*; Latinis *caua* nuncupatur. Porro

Cauae in iecore series.

E venarum ramulorum extrema osculis inter se conuiuent, ut cauae propagines optime citissimeque sanguinem iecoris beneficio in portarum ramis elaboratum, ac bile flaua foeculentoque sanguine expurgatum, transsumant, & postmodum vniuerso corpori ad partium enutritionem deducant. **¶** Venae autem cauae pars quae supra iecur consistit ita habet. Nervosam septi transversi partem in dextro ipsius latere peculiari foramine vena caua permeat, una etiam cordis inuolucrum perforans, quod insigni amplitudine tum alibi septo continuatur, & conuascitur, tum potissimum ubi caua septum transit, ac septo duas non vulgares propagines offert per vniuersi septi sedem multiplici serie excurrentes, & ramulos quoque cordis inuolucro, qua id septo committitur, diffundentes. Quum primum vero caua septum superauit, modice versus

Venae cauae quae supra iecur consistit distributionis series.

F sinistram cordisque basis dextrum latus procedens, sinistro ipsius latere adaperitur, atque in dextrum cordis sinum pertinet. Non quidem aqua propagine aut ramo quopiam, verum duntaxat foramine quodam seu scissione ampla. Anteriori cauae venae parti hic dextra cordis auricula conuascitur. A posteriori vero cauae ad cor connexus sede, insignis vena promitur, quae secundum cordis posteriora, & fini-

Coronalis
vena.

Qui venam
coniugis ex
pertem a ve
na caua edu
ci oportue
rit.

Vfus venæ
coniugis ex
pertis.
Nominis
ratio.

Glandium.

Cauæ cau-
dicis in iu-
gulo bipar-
tito.

Venæ sub
pectoris of-
ſe deorſum
repentes.

ſtrum latus ita porrigitur, vt cordis baſim coronæ modo ſuccingat, adeoque *coronaria*, hoc eſt, coronalis dicta ſit, ac ab inferiore ipſius ſede ramos deorſum ad cordis vſque mucronem diſpergat, quorum præcipui ſunt qui cordis ſubſtantiam illic petunt, vbi hæc eſt craſſiſſima. Hæc vena interdum gemina viſitur, grãdiore quidem a poſteriori ſede oriſicii cauæ initium ducente, minori vero ab anteriori ſede. Vena caua a cordis baſi ſurſum aſcenſura gracilior fit, & cordis inuolucrum perforat, & verſus cor-
poris medium ſenſim ducta magnæ arteriæ innititur. ¶ Quum vero ſeptum tranſuerſum impedimento ſit, quo minus caua vbi ſub iecore exporrigitur, ac renibus ſoboles diſpenſat, vertebris coſtiſque propagines tribuere queat, & deinde quum cordis baſis adeo vt vertebris eleuetur, & vaſa in pulmones diſfuſa cauam a verte-
bris ita ſubleuent, vt etiam hinc ad ipſa caua nullos deriuare ramos poſſit, rerum Opi-
fex a caua magnam eduxit propaginem, poſtquam hæc cordis inuolucrum tranſcendit, atque pulmonis dextræ partis cum ſiniſtra connexum, qui vaſorum pulmonis interuentu perficitur, ſuperauit. Hæc propaga a dextro cauæ latere pronata deorſum ad quartæ propemodum thoracis vertebræ corpus contorquetur, & decliuſ ſecundû dextrum vertebrarum latus porrecta ſuo ſine vna cum magna arteria ſub ſepto tranſuerſo ad aliquot lumborum vertebras pertingit. Hæc vena cauæ vicem toto progreſſu gerit, quo ipſius caudex vertebras ita arque in lumborum regione nequiuir contingere, ac geniculatim ramos ad vertebras ipſaſque adeo dorſi partes offerre. ¶ Porro caua, hanc ſine coniuge, & pari venam a ſe tam grandem deprompſit, vt arteriæ magnæ ritu vtrinque ad coſtarum interualla ramos germinare poſſet, quos quidem a lateribus non diſſudit, ſed ex media regione poſterioris ipſius ſedis, quæ vertebris innititur. Quia vero coniuge priuatur, neque in altero latere parem aſciſcita caua propaginem *ἀντι* Græci, Latini *venam abſque coniuge, & paris expertem* nominamus. Ab hac vena vtrinque geniculatim pullulant propagines, ſingulæ ad vnum nouem coſtarum inferiorum interuallum perrepantes, quæ in verarum quidem coſtarum interuallis ad eam vſque ſedem contendunt, vbi hæ in cartilaginem degenerant, ac poſtmodum in dorſalem medullam & in muſculos vertebris ipſiſque coſtis inſtratos, ac etiam membranas thoracis amplitudinem interſepiens ſurculos depromit. ¶ Ceterum ex ortu illius venæ cuius perſpicuum ſit, in Pleuritide quæ in tribus ſuperioribus, & inferioribus nouem dextri lateris coſtis conſiſtit, ex dextera axillari mittendum eſſe ſanguinem. Si vero in tribus ſuperioribus ſiniſtri lateris pleuritidis fuerit, ex ſiniſtra. Contra ex dextera, ſi in inferioribus coſtis phlegmone conſtiterit, eo quod hæ coſtæ a coniuge carente vena, quæ cum axillari dextera rectitudinem habet, nutriantur, *vt copioſius capit. 16. libri de curatione per ſang. miſſio. diximus.* Vena caua poſtquam ſine pari venam a ſe diduxit, ad iugulum recta ſub pectoris oſſe conſcendit, membranæ thoracem interſepientibus eleganter ſuffulta, molleque & glandoſum corpus hic in iugulo paſſim adſtratum obtinens, quod Græci *θυρεός*, Latini vero communi glandularum nomine *Glandium* vocant. Eſt autem glandium id in elatiſſima thoracis ſede exſtructum, vt ab omni noxa frequentiſſimas vaſorum diſtributiones hic ſuſpenſas immunes ſeruaret. ¶ Vena enim caua inibi primum in duos inſignes truncos diſcinditur, a quibus omnes venæ cauæ partis ad elatiora corporis porrectæ ſoboles pendent. A ſiniſtro namque trunco, quemadmodum & a dextro, grandis vena promitur, quæ primæ thoracis coſtæ innixa, poſtquam aliquot a ſe diſperſit ramos, ſub clauicula in axillam properat. Ab huius radice exilis vena enaſcitur, deorſum per coſtarum radices ad tertiam vſque coſtam exporrecta, & exiguas ſoboles tribus ſuperioribus coſtarum interuallis, aliquando duntaxat duob. deriuans. Ab anteriori vt plurimum ſede illius magnæ in iugulo bipartitionis, duæ prodeunt venæ, quæ introrſum ductæ, ad elatiore pectoris oſſis ſedem contendunt, & ſub pectoris oſſe deorſum perrepantes numeroſas a ſe diſſundunt ſoboles. Siniftra, quod & de dextera intelligendum erit, ſecundum læuum pectoris oſſis latus, vbi coſtarum cartilagineſ ipſi coarctantur, decliuſ ad abdominis ſuperiora tendit, in progreſſu ad ſex ſuperiorum ſeptem coſtarum interualla ſingulas propagines & demum thoracem interſepientem ſui lateris membranam diſtribuens, quæ ad terminos oſſis coſtarum vbi venæ coniuge
caren-

A carentis rami finiunt. A venis ad cartilaginum interualla disseminatis, ramuli notatu digni in musculos pectori incumbentes, ipsaeque adeo mammillas propagantur. Quod ex venis sub pectoris osse deductis reliquum adhuc est, ad latus mucronate cartilaginis deorsum in carnosam rectorum abdominis musculorum partem distribuitur. Venae enim e thoracis amplitudine prolapsae, sub rectis musculis ad mediam usque abdominis sedem feruntur, ramulos quosdam in proximas partes utrinque transmittentes. Quorum praecipuus ad abdominis cutem subit, atque oblique secundum costarum cartilaginum terminus propagatus, in gracillimas, & capillorum modo subtiles venulas exhauritur. Ceterum insigniores venarum rami, sub rectis musculis exporrecti, in plures surculos supra umbilici sedem cessant, qui rectorum musculorum substantiae implexi, illarum venarum terminos finesque spectant, quas in progressu sermonis ab imo prope genitalia sursum sub rectis musculis conscendere dicemus, per quas utero cum mammis est communitas. Porro vena axillam ascendens, quanto humeraria grandior ampliorque visitur, tanto etiam in frequentiores numerosioresque soboles dispergitur. Nam priusquam e thorace procidit, non ita procul ab ipsius initio ex elatiori sede venam utcunque amplam promit, quae sursum oblique in posteriora tendens, ad transversos vertebrarum cervicis proceffus deducitur, & per foramina illis priuatim exsculpta sursum conscendens in musculos vertebris proxime adnatos, soboles spargit. At praeter illas, certo ordine & veluti geniculatim singulas soboles vnicuique foramini neruorum exortibus in cervicis vertebris inciso deriuat, dorsali que medullae ipsisque adeo vertebris alimentum suppeditat. Quod vero eius venae reliquum est, in caluariam contendit, peculiare sibi cum coniuge arteria foramen obtinens, quod ad posteriorem occipitis ossis capitis sedem excavatum est. Vbi vero vena in caluariae amplitudinem pertingit, in sinistram durae cerebri membranae sinum, *ut suo latius dicemus loco*, exhauritur. Praeter hanc venam aliam adhuc ab illa quae ad axillam contendit priusquam e thoracis cauitate elabatur, ex ipsius posteriori regione oritur, quae in musculos humilioribus cervicis, & thoracis elatioribus vertebris adnatos, ac capitis dorsique & thoracis motibus famulantes, dispensatur. Simulatque vero axillam petens vena inter primam thoracis costam & clauiculam ex thoracis cauitate progreditur, musculumque perforat qui secundi paris dorsum mouetium alter est, non semel humeralem dictam venam promit & illico atque decliuus ducta glandulas ad firmam vasorum distributionem a natura procreatas contingit, aliquot propaggines a se emittit. Primum utrinque singulas promit venas, ad thoracis quidem anteriora vnam, ad posteriora vero alteram. Quae antrosum exporrigitur, in musculos a pectoris osse & costis, ad brachii os, & scapulum pertingentes diffunditur, & pectoris cutem simul & mammillas frequenti admodum ramorum serie in mulieribus adit. Vena autem retrorsum proficiscens in musculos cauum scapulae sedem occupantes, vicinasque sedes multiplici etiam sobole digeritur. Ceterum nonnunquam a priori, & quae pectus accedit vena interdum vero ab ipso qui in axilla consistit trunco alia grandis utcunque vena exoritur, quae deorsum secundum thoracis latus exporrecta, potissimum absumitur in musculum cuius beneficio brachium in decliue dorso admouetur. Praeter hos ramos, maior vena quae in axilla habetur, exiguos ablegat surculos glandulis & membranis, quae inibi vasorum distributionibus eorundemque colligationibus praesunt. Duae itaque venae a caua in manus propagantur. Vna quidem quae, quod sub summo humero ipsa, quae adeo clauicula in externam brachii sedem procedat, humeraria, & gibberii exterior dicitur. Altera autem quae, quod per axillam internamque brachii sedem prorepat, axillaris interna quae gibberii vena nuncupatur. Humeraria itaque ab externo latere iugularis exterioris, & interdum a communi cum axillari trunco, qua is

E dem contorquetur, ac sub summo humero prorepens, inter internum latus musculi brachium attollentis, & validum tendinem musculi brachium ad pectus ducentis in brachium procedit. Dein carnea membrana sub cute suffulcitur, deorsumque porrecta etiam ante sectionem in omnibus euadit conspicua, nisi forte graciliores omnino venas homo habeat, obefiorue sit. Porrigitur itaque recto tramite per ante-

Axillaris
vena.

Humeraria

riorem brachii regionem, secundum exterius latus musculi cubitum flectentium A
anterioris. In descensu vero ad cubiti vsque articulum, graciles duntaxat ramos v-
trinque in cutem sibi proximam anterioremque musculi cubitum flectentium prio-
ris sedem dispensat, qui partim recta, partim oblique & transuersim in cute prorepunt
vt interdum versus internam brachii sedem ad axillaris venæ soboles in cutem dige-

Humeralis
series iuxta
cubiti arti-
culum.

stas pertinere, cum illisque coire videantur. ¶ Quando humeralis cubiti attingit, arti-
culum, iuxta exterius humeri tuberculum in tres diducitur venas amplitudine in-
terdum æquales, nonnunquam vero vna cæteris ampliore. ¶ *Prima*, quæ frequen-
tissime in hominibus deest, penitus obliqua deorsum ad medium flexus cubiti arti-
culi deferitur, atq; sub musculorum secundos tertiosque digitorum articulos flecten- B
tium, hincque ab humero & vna originem sumentium capitib; in aliquot ramos di-
gesta cessat. ¶ *Secundus* humeralis ramus cæteris plerumq; crassior est, & obliquus quoq;
sub cute ad cubiti cum humero articuli flexus medium descendit; ac cum axilla-
ris venæ ramo coit, vnaque ex ambobus ramis vena conflatur. ¶ *Tertius* humeralis ra-
mus, cum musculum, qui radio iuxta brachiale insertus, radii in supinam motus au-
ctor est, conscendit, & paulatim deorsum prorepens, obliquus per radium iuxta me-
dium, ipsius longitudinis in externam cubiti regionem perfertur, quam vbi attingit,
furculos quosdam in proximam sibi cutem depromit. Ceterum hic ramus sensim
oblique versus vlnæ appendicem, brachialis radicem prorepens, tandem alteri cui-
piam inibi commiscetur venæ, hacque adauctus externam brachialis sedem con- C
scendit, & in aliquot furculos errabundo ductu sparfos dissectus, regionem intercur-
rit, quæ ante paruum digitum & annularem habetur, externa etiam illorum digito-
rum sede soboles quasdam sibi vendicante. ¶ *Axillaris* autem quum primum axil-

Axillaris in
brachio co-
sistens se-
ries.

lam superat, brachiumque subingreditur, inter musculos brachii os amplexandos de-
litescit, præcipue vero inter anteriorem sedem primi seu interioris cubitum extēde-
tis, & posteriorem sedem tendinis musculi, quo brachium rectori admouetur, & dein
iuxta cubitum flectentium musculorum posteriorem. Hæc primum capitib; muscu-
lorum, quorum ope cubitus extenditur propaginem offert, illis venulis e regione e-
ductam, quæ ab axillari in glandulas hic repositas digeruntur. Post hanc sedem missus
ex posteriori ipsius sede venam iisdem musculis dispensat a qua mediocris etiam ma- D
gnitudinis soboles in externæ brachii sedis cutem disseminatur. Ab externo latere
auxillaris venæ, alia notatu dignæ amplitudinis ppago diffunditur, obliqua deorsum sub
humero ad externum vsq; ipsius tuberculum descendens, ac sub musculis cubitum
extendentibus occultata, musculorumq; capitibus ab externo humeri tubere pna-
scentibus, ramulos quosdam exhibens, ac demum aliquousq; in externam cubiti sedē
simul cum neruo qui brachium petentium quartus est prorepens. Has propagines a-
xillaris adhuc in alto latitans edit, ipsaq; in duos quodammodo partes truncos discin-
ditur, quorū alter interius atq; in profundo toto suo ductu submergitur, ac arteriæ in
manum exporrectæ perpetuo attensus, eadem fere cum ea distributionis serie dige-
ritur, simul etiam cum neruo brachium aduentium tertio concomitatus. Inter duos
enim cubitum flectentes musculos deorsum ad mediam sedem flexus articuli cubiti E
porrigitur, illis musculis, & dein membranis quibus nerui induuntur ramulos spar-
gens. Quando autem cubiti articulum superauit, atq; inter musculos digitorum fle-
xus auctores in alto reconditus ferri incipit, in duos dirimitur ramos, qui modice ab
inuicem recedentes, ac musculos quos perreptant surculis implicant, vna cū ten-
dinibus internam summæ manus sedem petunt, qui per ligamentum in interna bra-
chialis regione annuli modo conspicuū porriguntur. Rami inibi in alias soboles par-
titi sub tendine feruntur, qui latescens volæ cuti subnascitur, atq; hinc ita in internam
digitorum sedem digeruntur, vt binæ soboles pollicis, & totidem indici, & vna me-
dio offerantur, a ramo qui secundum radium per cubitum porrigitur. Ab illo autem
qui vlnæ exporrigitur binæ soboles anulari & minimo, & vna medio exhibentur, ab F
illoque ramo surculus musculos adit, qui externam volæ sedem occupant, atq; ita ab
altero ramo surculus, in musculos penitus pertinet, qui primo pollicis ossi connascū-
tur. In hunc igitur modum axillaris truncus sub cute nusquam prodit, totusque in
altis & delitescens sedibus absorbetur. ¶ Alter truncus sensim ex alto ad internæ
brachii

A brachii sedis cutem emergit, versus humeri interius tuberculum properans, ac ante sectionem sub media cubiti longitudinis sede non minus quam humeralis supra cubitum conspicua. ¶ Vbi autem anteriori tuberculo humeri incumbit, ad elatiorem eius tuberculi sedem paulo elatius quam cubiti cum humero articulus consistit, in duas magnitudine pæmodum æquales partitur venas, quarum anterior cuti substrata, oblique deorsum ad mediam cubiti articuli flexus sedem repit, ac cum secundo humerariæ ramo ad humiliorem mediamque flexus illius sedem coit, vnaque inibi ex ambabus confurgit vena, quam *Communem*, quia ex axillari & humeraria constituitur, merito appellamus. Vulgus Medicorum *Medianam* vocat, & *nigram*. Posterior autem vena huius axillaris iuxta interius humeri tuberculum bipartitionis, frequentes ramos deriuat inferioris cubiti sedis cuti, & interioris itidem exteriorisque sedis humiliorum, ac secundum vnam sitarum regionum cuti inter præcipuos ramos huc excurrentes, vnus secundum vlnæ inferiorem sedem, ad exteriora tamen magis declinans, versus brachiale porrigitur. Huius rami soboles cum humerariæ ramo huc contendenti coiens, simul cum illo, digeritur, & Arabibus aliquod ac barbaris *Sylen* & *Saluatella* nominatur. Præter hunc ramum posterioris illius axillaris trunci venæ primarium, alius ex illa cutem adit, qua posterior cubiti articuli sedes induitur, atque is ramus in externam cubiti sedem non admodum præcul perreptat. Verum alij etiam rami ab hac posteriori vena in internæ cubiti sedis cutem digeruntur, qui vario & admodum incerto implexu permiscetur & coeunt, furculos ab insigniori illo ramo qui vlnæ exporrigitur assumptes, aliosque rursus ipsi furculos impartientes. His furculis & propaginibus in eum modum per cubiti interiora reptantibus, alia frequentissime accedit non contemnenda, quam axillaris venæ ramus communem venam cum humerariæ ramo efformans, ab humiliore sede & medio ductu emittit. Hæc interdum recta ad brachiale contendit, interdum vero errabundo ductu perfertur, aliisque huius sedis propaginibus commiscetur, quæ adeo graciles sunt varique inuicem implicantur, vt interna cubiti regio non minus frequenter quàm tibia venter seu sura varicibus molestetur. Propagines hæc neuiquam ad brachiale terminantur, sed partim oblique, partim recta, partim transuersim, & modo inuicem commixtæ, modo rursus diremtæ totam summæ manus internam cutem perreptant, ipsi cuti passim connatæ, & inter cutem carneamque membranam consistentes. Porro harum pæpaginum quæ pollicis radicem accedunt, priuatim id sibi vèdicant, quod ipsis ramus ab illis venis permiscetur, quæ a communi vena in externam pollicis regionem diffundi iam dicemus. ¶ Communis enim vena ilico atque duabus illis axillaris & humerariæ propaginibus conflatur, oblique deorsum ducitur, ad elatiorem cubiti sedem paulatim contendens quousque radium paulo ultra ipsius longitudinis medium hinc inde transcendat: neque id eodem semper modo ramos diffundens, & interdum aliunde ab interna cubiti sede alios assumptens, ac tandem in externam cubiti sedem peruenit, perpetuo cuti substrata. Vbi itaque hanc sedem euicit, priusquàm mediam radii appendicis sedem accedit, supra radium aliquanto ante illius cum brachiali articulum, in duos ramos communis venæ diffunditur. Quam quidem sectionem alij Græcorum *Γ*, alij vero *Υ* & *Α* referre scripserunt. Alter istius sectionis ramus, qui elatior est, portiunculam ad internam brachialis sedem versus pollicis radicem dispensat, quæ dictis nuper hanc sedem perreptantibus furculis commiscetur. Quod vero elatioris rami reliquum est, exterius inter pollicem & indicem sursum ascendit: atque hic in varias soboles inuicem aliquando vnitas, aliquando autem rursus seiunctas dispergitur. Alter ramus qui inferius *Γ* aut *Υ* caput constituit, indicis & medii, & aliquousq; annularis sedem petens, in varias quoq; soboles exhauritur, vocaturq; *Auicenna Sylen*. ¶ Vnde omnibus perspicuū fit, nostri temporis Medicos recentiorum placita sectantes, plurimum errare, qui quoties venam inter pollicem & indicem aperiunt humerariam: & axillarem vbi venam inter annularem & minimum, aut vt alijs placeet, inter medium & annularem, se incidere existimant: quum tamē ramus pollicem & indicem accedens a communi vena & is qui minimum & annularem petit ab axillari & humeraria simul oriatur. Iam ad iugulum rursus sermone conuerso, ceteros truncorum magnæ illius in iugulo diuisionis ramos aggrediamur. Vena itaq; cauā ad

Communis
venæ con-
stitutio.
Nigra, me-
diana.

Saluatella:

Communis
venæ sericeæ.

Auicenna
Sylen.
Error: Me-
dicorum
nostri tem-
poris deter-
ctus.

σφαγιδης.
Interior
iugularis.

Exterior
iugularis.

eum quem diximus modum priusquam pectoris ossis summum transcendat in duos A
deducitur truncos, ac statim a diuisione illa axillaris, & nonnunquam etiam hume-
raria, principium obtinet. Quod autem alterius diuisionis illius trunci adhuc super-
est, a media primæ thoracis vertebræ corpore sede modice recedens; sursum extra
thoracem protenditur, & simulatque clauiculam pectorisque ossis summum supera-
uit, in duos impares ramos scinditur, quas Græci *σφαγιδης* Latini *iugulares*, Arabes *Gai-* B
dez, barbari *iuueniles. subeticas*, *apoplecticæ* & *somni venas* appellant. Interior namque
exteriori gracilior, & secundum asperæ arteriæ latus ascendens, nonnullas venas in
speciem capillorum, *Galenô libro primo, de laborantibus locis capite primo teste*; exiles a-
speræ arteriæ conterminisque membranis communicat. Hæc interior iugularis, B
quæ cum sui lateris soporali arteria versus cerebrum fertur, ac in ascensu graciles
ramulos membranulis sexti neruorum cerebri paris in collo, & in faucibus etiam
septimi paris neruos colligantibus digerit, vniuerso ductu soporariæ arteriæ ad
caluariæ usque basim commissa. Quo cum peruenit, in duos inæquales amplitudi-
ne ramos discinditur, ac amplior oblique retrorsum, secundum caluariæ basim du-
ctus, caluariam simul cum quodam soporalis arteriæ ramo ingreditur, foramine v-
tens sexti neruorum cerebri paris gratia exsculpto. Ab ampliori hoc iugularis in-
ternæ ramo quum is in posteriora & secundum caluariæ basim contendit, propago di-
dugitur, in elatiorem sedem musculorum pertinetis, qui anteriorem cervicis verte-
brarum regionem occupant, stomachoque subiacent. Gracilior vero internæ iugula- C
ris ramus soporali arteria penitus relicta, priuato foramine caluariam subit, quod iux-
ta foramen tertio & quarto pari neruorum cerebri commune celatum diximus. Pri-
usquam vero ramus ille in duram cerebri membranam digeratur, totusq; in caluariam
mergatur, sobolem non admodum insignem ad auditus organum depromit, eam per
foramen quoddam transversum mittens, quod huic soboli & neruulo euidam quinti
paris neruorum commune est. ¶ Porro exterior idemque grandior supra clauicu-
lam factæ diuisionis ramus, ab exteriori ipsius latere postquam musculorum dorsum
mouentium secundi paris alterum perforauit, insignem a se diducit venam, quæ de-
orsum versus clauiculam reuoluta ad summum humerum ipsumque adeo brachium
contendit. Antequam tamen huc pertingat, non procul ab ipsius ortu ramum edit, D
qui in cutem posteriori cervicis sedi obductam, & externos eius sedis musculos, nu-
merosa serie digeritur. Præter hunc vena sub clauicula brachium petens, alium
quoque grandiozem depromit ramum, in gibbum scapulæ sedem frequenti etiam
sobole dispersum. Deinde quando ad summum pertendit humerum, atq; sub illo
in brachium prorepat priusquam penitus demergitur, in summi humeri cutem pro-
pagines deriuat: quarum præcipue in cutem digeruntur, quæ musculum integit, cu-
ius ope brachium attollimus. Eiusmodi propagines interdum, idq; potissimum in mu-
lierib. ad mammillarum usq; cutem excurrunt, deorsum in priora secundum clauicu-
lam errabundo progressu deductæ, & ante sectionem in plerisq; mulierib. virescente
quodammodo, aut cerulæo colore apparentes. Qua autem serie eius venæ brachium E
adeuntis reliquum quod humerariam venam constituit, in manum digeratur, paulo
ante dictum est. Ceterum maior ramus, quem supra clauiculam haberi, atque ab ex-
terno suo latere humerariam germinare diximus sub cute ac lato buccas mouente
musculo, secundum colli latus ad fauces porrigitur. Quum vero ad fauces usq; iuxta
inferioris maxillæ humiliorem sedem sub auriû regione contendit, sui portionem ad
oris interiora & duram cerebri membranam transmittit, reliquum vero ipsius in faciei
cutem & illius musculos, & ad tempora posteaures & vniuersam breuiter capitis cutem
transfunditur. Portio interiora oris subiens in primis suis scissionib. glandulas quæ
sunt in faucibus inferiores, *de quibus quinto dicemus libro, exigit*. His itaque glandulis
ab interiori externæ iugularis portione ramuli dispensantur, mox notatu digni in F
laryngem & glandulas ipsi proxime adnatas, & musculos ossis hyoidis, & linguæ, &
ad omnes faucium sedes surculi deriuantur, quorum insignis sub lingua per ipsius
longitudinem prorepat, in multiplices & errabunda serie prorepentes ramulos scis-
sus, qui subleuata lingua conspiciuntur. Quinetiam ab hac iugularis portione
præter grandem ramum qui in caluariam per foramen subit, ad posteriorem mam-
millaris

A millaris processus sedem coelatum, rami etiam in palatum & tunicam ampliudini obductam digeruntur, a quibus postmodum non negligendæ soboles caluariam petunt. Vna per foramen quod secundo cerebri neruorum pari insculpitur, caluariam accedens, in duram membranam aliquot surculis excurrit. Quemadmodum & altera soboles duræ membranæ offertur, caluariam ingrediens per grandius foramen illorum quæ in octauo capitis osse odorum gratia exculpuntur. Hæ soboles quum caluariam ingrediuntur, surculos quosdam oculo elargiuntur, in frontis cutem interdum disseminatos. Exterior externæ iugularis portio per capitis exteriora passim repēs, perinde atque interior mox glandulas suis distributionibus præfectas obtinet, quæ inibi reponuntur, vbi inferior maxilla superiori articulatur. Præsens portio inter

B has glandulas bipartitur, & vno ramo in buccas, narium alas, & ad frontem varie exporrigitur: altero autem tempora, & aurium sedem adit. Hic enim ramus rursus in duos præcipuos surculos diuisus, vnum in sui lateris tempus admodum errabundo & inuoluto ductu digerendum offert: alterum vero post aures & ad occipitis cutem diffundit. Adhæc per exigua verticis ossium foramina & suturas gracillimæ venulæ in caluariam procidunt, de quibus *lib. 6.* vbi cerebri vasorum seriem priuatim persequemur dicemus.

*Vena caua portiois ad partes infra septum transuersum locatas distributa
series. C A P. XVII.*

C POST QUAM caua vena per posteriorem iecoris sedem deorsum prorepens, non amplius iecori connascitur, non nihil obliqua ex dextris quodammodo corporis partibus introrsum, ad medium videlicet dorsi fertur, ilico ramum non admodum grandem ex sinistro latere promens, qui potissimum numerosa venularum serie in pinguem membraneamque sinistri renis tunicam digeritur, quæ a peritonæo pronata, renem inuestit, eundemque dorso colligatum continet. Hic ramus raro ex dextræ caudicis latere venam coniugem adipiscitur. Quandoquidem vena dextri renis pinguem tunicam conterminatq; peritonæi sedes accedens, non a cauæ caudice principium ducit, sed ab elatiori regione eius venæ qua dextro reni serosus sanguis deportatur. Caua enim vena ab utroq; latere amplissimâ ppaginem, vbi iam mediæ vertebrarum sedes innititur, in renes distribuit, dextram quidem propaginem dextro reni, si-

Ad sinistri renis membranam venæ.

Ad dextri renis membranam. Ad renes venæ.

D nistram autem sinistro deriuans. Hæ serosum sanguinem ad renes deferunt serosusq; humor quodammodo ab ipsis emulgetur, ideo vulgo *Emulgentes* nuncupantur. Atq; vt situs renum varius est, ita quoque harum propaginum exortus e directo sibi neutiquam respondet. Quum enim dexter ren, vt plerumque accidit, sinistro elatius locatur, dextri lateris propago altius quam sinistri renis principium ducit. Si vero sinister ren dextro superior sit, quod etiam nonnunquam accidit, propago quoque in ipsum a caua transuersum quodammodo repens, elatius quam dextra propago principium ducit. Venæ autem hæ ad vtrunq; renem protensa grandes admodum sunt, ac quam primum concavam renum sedem contingunt, hominibus in duos ramos partiuntur; ac dein in renum substantiam admirabili quodam artificio digeruntur, vt suo loco

Emulgentes. Dexter ren magna ex parte elatior.

E clarius exponemus. Ceterum priuatim ab humiliori sede venæ eius, quæ sinistram renem petit, iuxta ductus ipsius fere medium, vena pronascitur in viris ad sinistram testem tota excurrens præterquam quod graciles exiguosque surculos in peritonæum, qua porrigitur, ac in membranas tunicae sue sinistram testem, & feminaria ipsius vasa ambientes, producat. Hæc enim vena peritonæo, qua id lumborum carnib. insertitur adnata, deorsum super pubis os fertur. Quod quum superauit, atq; ex magni peritonæi amplitudine elabitur, in varios anfractus gyroq; conuoluitur, quorum basis superior testis sedi connata, ramulos in tunicam testis substantiam proxime continentem, digerit, & aliis frequentioribus ramis in testis substantiam passim disseminantia. Vena hæc sinistram testem accedens, aliquando propaginem a cauæ caudice

Sinistræ seminalis venæ series.

F ce sub vena ad sinistram renem exporrectæ principio enatam alciscit quam nō pcul ab exortu sinistrorsum decliuus prorepens cū illa coit, vnaq; seminalis vena ex ambabus confurgit. Vena autem dextrum accedens testem, non a vena in dextrum renem protensa originem sumit, sed a cauæ caudice aliquanto inferius, quam venæ renib. exporrectæ principium ducunt. Huius seminalis venæ exortus, non vt reliquarū fere pro-

Seminalis dextræ exortus.

Mulietis
ſeminalium
venarum
ſeries.

Cauæ rami
lumborum
vertebris
carnibusq;
oblati.

Quomodo
caua arteriæ
magnæ ſu-
pra ſacri
offis initiū
ſubiiciatur.

Hæmor-
rhoides e
caua ortæ.

Hymen
quid.

paginum in cauæ conſiſtit latere, verum ex ipſius eminentiori ſeu anteriori ſede, ver-
ſus dextrum latus hæc ſeminalis vena extuberanti, ac veluti rotunda origine enaſci-
tur, præſenti venæ ramulum quoque ex ea quam in dextrum renem procurrit acceſ-
ſiſſe ac ſimul cum ea coiuiſſe, Galenus *in libr. de ven. ſect.* ſibi ſemel obſeruatam teſta-
tur: In mulieribus alia eſt harum venarum diſtributio: Quamuis enim illis par cum
virorum venis ſit exortus, ipſæ tamen magna ex peritonæi amplitudine haud elabun-
tur, neque ad pubis oſſa pertingunt: Verum ad mulierum teſtes pinguibus membra-
nis ſuffultæ porriguntur, non vniuerſæ in ſeminaria vaſa degenerantes, aut totæ in te-
ſtes exhaustæ: ¶ Nam priuſquam ad teſtes deueniunt, vtriuſq; lateris vena bipartitur,
ac vna portio venæ virorum teſti implicite modo, ſeminarium vaſ efficitur. Altera
vero in membranas quoque pingues intertextæ, in vteri latera digeritur, elatiorem i-
pſius fundi ſedem potiſſimum implicans. ¶ Præter ſeminales venas caua vbi lumborū
vertebris ipſique magnæ arteriæ colligatur, ab ipſius inferiori ſede qua vertebraſ ſpe-
ctat, venas geniculatim diffundit; per foramina neruis in vertebrarum lateribus ex-
ſculpta ad dorſalem medullam digeſtas, & ramos dein a ſe ſpargētes in muſculos ver-
tebris adnatos, a quibus rurfus aliæ ſoboles in abdominis muſculos orbiculatim ad
abdominis vſque latera conſcendentes, & illis quas perreptant ſedibus alimentum
ſuppeditantes. ¶ Quum primum vero caua ad ſacri oſſis vſq; ad ſummum deſcendit,
atque iam magnæ arteriæ quæ ipſa prius ad ſiniſtrum ſubiiciebatur, tanquam digniori
organo cedit, ac quo minus arteria oſſis ſacri duritia in dorſi motibus moleſtaretur,
caua ipſi arteriæ ſe ſubſternit, in duas æquales partitur truncos, quorum hic dextro
cruri, ille ſiniſtro offertur. Siniſter truncus, quod de dextro etiam intelligendum erit,
ſtatim in ipſa partitione, aut potius vbi caua in duos truncos ſupra os ſacrum diuiditur
ab exteriori ipſius latere venam præmittit maiorem iis quæ ad lumborum vertebraſ &
abdominis muſculos diſſeminantur, tranſuerſim in peritonæum, & lumborum car-
nes abdominiſq; muſculos diſtributam. Poſtquam hanc deriuauit venam, obliq; de-
orſum verſus exteriora fertur, figuram cum dextri lateris trunco A literæ aut X aut V
inuerſi conſtituens, & aliquod ſurculos ſuperioribus ſacri oſſis foraminibus offerens.
Deinde mox in progreſſu in duos impares ramos ſinditur: interior nanque gracili-
or eſt exteriore: ac mox duas edit propagineſ, quarum alteram anteriorem, alteram
exteriorem manifeſtioris doctrinæ gratia appellabimus. Exterior propago tota quo-
dammodo inter ſacrum & coxendicis os, qua maximus neruorum crus petentium
ducitur, in exteriora tranſuerſim fertur, & numeroſa ſerie in omnes muſculos ab ili-
um oſſis externa ſede pronatos, femoriſque motibus famulantes, *de quibus lib. 2. dixi-
mus*, diſpenſatur. Interior autem propago ab interiori ipſius latere exiguas ſoboles
ſacri oſſis quoque foraminibus diſpenſat, & alias hiſ maiores in recti inteſtini muſcu-
los, cutemque orbiculari ſedis muſculo obnatam digerit, quæ fœculentum ſanguinē
per anum purgant, ſi quando iſ per venam portæ non integre fuerit expurgatus, &
ſubinde per cauā venam huc decumbat. Deinceps hæc interior propago notatu di-
gnū diffundit ramū, qui in viris dextrum veſicæ latus amplectitur, & in plures ſciſſus
ſurculos, veſicæ ceruicem, ſeu penē adit, in eumque numeroſe digeritur. ¶ In mulie-
ribus vero præſens ramus ab interna diductus propagine pingui membrana ſuffulci-
tur, ac quibuſdam ſurculis veſicam quidem adit, verum frequentioribus inferiorem
fundī vteri ſedem intercurrit, ramulos quoq; ſpectabiles in vteri ceruicem diſpergēs,
per quas virginibus, & nonnullis mulieribus quæ primis menſibus vtero gerunt, *Gale-
no libr. 6. de laborantibus locis c. 5. & ſect. 5. apho. com. 60. teſte*, menſtrua purgationes colantur.
Porro Arabum nonnulli quinque numero venulas in medium longitudinis vteri
ceruicis diſſundi affirmant, & dextrarum venarum ora cum ſiniſtrarum oris con-
nuere committique, ac in illis puellarum hymen, Latini interſeptum virginale vocāt,
conſtitui docent. Quod vero interioris rami ſiniſtri trunci eiſ ſupra os ſacrum fa-
ctæ diuiſionis adhuc reliquum eſt, ad pubis os contendit, & ab externo ramo trunci
venæ cauæ ſobolem aſſumit, quæ cum eo interioris rami reliquo congreſſa, vnā cum
ipſo venā efformat, quæ primum peritonæum, ac dein deeimum femur mouentium
perforat muſculū, & oſſis pubis foramen permeans in cr^o emergitur, p^prium ſinum in
elatori eiſ foraminis ſede ſibi vendicans, quo ſimul cum ſua coniuge arteria ac item
neruo

- A** neruo fertur, ac foraminis eius membranam & nouum femoris motus auctorem musculum transiens, illis quos perreptat musculis ramos porrigit. ¶ Quando autem in crus pertendit, in musculos a pubis osse principium ducentes digeritur, in elatiorem videlicet secundi tibiae mouentis musculi sedem, qui a pubis ossium commissura enascitur. Humilior enim eius musculi pars a maiori crus petenti vena ramos sibi asciscit. Dein ab hac pubis ossis foramen transeunte vena, rami in quinti femur mouentis musculi partem a pubis osse pronatam, ac postmodum in octauum femur mouentem musculum, & penis etiam musculos digeruntur, a quibus furculi nimis quam exiles in femoris internae sedis cutem in inguinum regione prodeunt. ¶ Præter ramos autem illis musculis & cuti exporrectos, vnus etiam articulum coxendicis accedit, proprio sinu coxendicis ossis acetabulum priuatim subiens. Et vtrunque multifariam hæc crus petens vena digeritur, rarius medium longitudinis femoris superat, sed interdum præcipuus ipsius ramus quinto femur mouenti musculo dispensatus, propagini commiscetur, quæ huc pertinet a maiori vena in crus deducta. ¶ Exterior venæ causæ trunci ramus, quum oblique crus accedit, priusquam peritonæum perforat, ab elatiori ipsius sede venam mediocri magnitudine expromit, quæ sursum ad abdominis anteriora per peritonæum ducta, ipsi ramulos quosdam vtrobique communicat. Vbi hæc ad istum modum, peritonæo connexa ad rectum abdominis musculum conscendit, peritonæum perforans in internam posterioremue recti abdominis musculi sedem inseritur, & vtrinque varias soboles in transuersum abdominis musculum, & ipsi incumbentes obliquos reliquasque proximas sedes distribuit, recto tramite sursum sub recto musculo protensus. Vbi vero ad abdominis medium paulo supra vmbilici regionem prorepsit, ipsius extremum in plures furculos disseminatur, qui ramulos spectant, quos a vena sub pectoris osse ab elatiori thoracis sede delata diffundi commemorauimus. Huius venæ interuēru mammillis cum vtero communio est. Nam eius beneficio ex mammillarum venis in vterum quum foetus enutritur, sanguinis retractio: quum autem mulier lactat, ex vteri venis in mammillarum venas mentrui sanguinis reuulsio perficitur. Vena autem ab imo sursum conscendens non ita procul ab vteri venis originem ducit. Deinde alteram venam in ortu quasi coniungem sortitur, ad pudendum excurrentem. Exterior enim venæ causæ sinistri trunci ramus, quando supra coxendicis os in femur procidens peritonæum transit ab interiori ipsius regione aliam promit venam, quæ ad pubis ossium medium, quæ inuicem cartilaginis interuentu hæc vniuntur accedens, viris in penis inuolucrum & scrotum, mulieribus autem in pudendi colliculos seu prominentes & coriaceas, cuticulae sue carunculas, quas *νυμφήν* vocant, vicinasque sedes numerosa ramorum serie digeritur. Porro vena sub recto abdominis musculo sursum exporrecta, nullam parem adipiscitur, quæ in vterum descendat, sed illa ab iis, quæ in vterum distribuuntur non ita multum, vt dictum est, distat. Nam ipsius principium ab exteriori ramo sinistri trunci venæ causæ pender, illis ab interioris eius trunci rami interna propagine originem ducentibus, atque in vteri cervicem ipsiusque fundi humiliorem sedem diffusis. ¶ Præter causæ propaginem per posteriorem coxendicis ossis sedem in femur, aliquousque propagatam, ad crus duæ descendunt venæ. Vna quidem angustior, quam per pubis ossis foramen ad quosdam anteriorem femoris sedem amplexantes musculos perrepentem, supra femoris medium cessare diximus. Altera vero maior, ceterarumque venarum in crus sinistrum excurrentium caudex, ab externo ramo sinistri trunci venæ causæ supra os sacrum partitionis pender. Præsens vena simulatque a peritonæo elabatur, elatiorem coxendicis ossis sedem ad internum latus sedis qua sextus & septimus femur mouentium musculi descendunt, in inguinalibitur, ac anteriorem femoris regionem subit, & nullo occultata musculo sinui insidet, qui in inguinē efficitur a longo gracilique musculo tibiae mouentium primo, vna cum octauo femoris motuum auctore. Vena itaque huic sinui seu cavitati incumbens, in plures ramos discinditur. Quo
- F** autem iniuriis minus redderetur obnoxia, primis suis distributionibus natura frequentes glandulas, vt in axilla fit, hic circumposuit, quam firmam stabilemque venæ propagationem redderent. Prima vero huius venæ crus petentis propago insignis est, ac ab interiori venæ latere principium ducens, ad anteriorem femoris cutem properat, atque in internam femoris sedem deorsum per genu quoque interiora, & hinc rursus,

Mammillarum cum vtero communio est. Hippo. s. apho. 38. Si mulieris grauidæ mammae repente extenuantur, abortit.

Venæ causæ soboles in crus digeruntur.

Cavitatē in inguinib. glandulae expleant.

per internam tibiz regionem versus malleolum interiorem sub cute exporrigitur, & A
 deinde in pedis superiora descendens, varie inibi digeritur, aliis huc pertinentibus ve-
 nis commixta. Hac qua interiori exporrigitur malleolo, vniuersim non eundem ser-
 uat ductum. Interdum enim ab interna tibiz sede secundum anteriorem malleoli re-
 gionem ad pedis superiora excurrit: aliquando vero, sed rarius, sub malleolo contor-
 queretur, illac pedis superiora conscendens. Deinde in ramorum ad pedis digitos & su-
 pra pedion serie, plurimum variat. Aliquando enim aliis quibusdam ramis hic com-
 mixta, ad minimum digitum ipsique proximum præcipue deducitur, aliquando versus
 pollicem & indicem excurrit. Breuiter in eodem homine, vix parem vnquam reperi-
 as huius propaginis ramorum in vtrisque pedibus seriem. Rami quoque quos in descensu pro-
 fert, rarissime inuicem aut numero, aut amplitudine correspondent, si quidem in ordi- B
 nate ad cutem permeant. Vt plurimum autem in superiorem internæ femoris regionis
 cutem, non procul a suo ortu, vtrōbique vnā emittit sobolem, ac interior quidem fe-
 moris interiora & inguina, ipsumque *Perineum* seu *interfemineum* accedit. Sic autem vo-
 catur *sedes*, quæ inter anum & testes aut pudendum muliebri consistit. Exterior autem
 soboles, quæ & crassior est, femoris anteriora & exteriora sub cute perreptans, similiter
 ac interior in surculos digeritur: Quum grandis hæc propago ad medium femoris lon-
 gitudinis quasi deuenit, notatu dignos ramos hic etiam in cutem spargit, & inter cete-
 ros vnum gracili longoque musculo porrigit, qui tibiam mouentium primus est. Cete-
 rum quando ad genu articulum velut ad posteriora orbiculatim ea propago non nihil
 conuoluitur, duas quoque emittit soboles mutuo quidem mole pares, sed exiguas. Vna C
 in anterioris genu sedis cutem secundum patellam dispergitur: altera interioris genu
 sedis versus genu flexum, cutem accedit. Ad interioris sedis tibiz cutem a magna hæc
 propagine, & antrosum & retrosum ramuli diffunduntur, qui impari numero sparsi,
 rursus cum proximis venis varie coeunt, inuicemque rursus dirimuntur. Atque hæc pro-
 paginis per internam cruris cutem diductæ distributio est. Præter hanc maxima in crus
 subiens vena e regione iam dictæ propaginis, venam promit, quæ extrorsum ducta in
 anteriorem articuli coxendicis cutem, & eius sedis musculos distribuitur. ¶ Post-
 quam vero maxima vena has edidit propagines, penitus inter musculos femoris os
 amplexantes immergitur, & insignem ramum septimo & nono tibiam mouentibus
 musculis communicat, a quo etiam tenues surculi in cutem deriuantur. Deinceps D
 aliam magis in profundum distribuit venam, iam commemorata ampliorem, quæ per
 quintum femur mouentem musculum digeritur, ramosque in octauum tibiz motuum
 auctorem musculum dispensat. Ab hac etiam plures venarum soboles in vniuersos pro-
 permodum os femoris ambientes musculos propagantur: inter ceteras autem præcipua
 finem eius venæ, quam per pubis ossis foramen in femur delabi dictum est, ad se assumit,
 ideoque adaucta, deorsum magis ad genu vsque quodammodo inter musculos occulta-
 ta descendit. ¶ Ceterum maxima vena sensim ad femoris os versus posteriora contorta,
 dein aliam emittit propaginem, quæ in posteriorem femoris cutem excurrrens surcu-
 los, etiam sursum cutem subeuntes deriuat. Huic propagini frequenter a ramo, quem
 in quintum femoris musculum dispensari diximus, soboles quædam accedit, quæ vna E
 cum ipsa commiscetur, & vena ex duabus confluens cutem adit. ¶ Crebrius tamen due
 a grandi vena enascuntur propagines, vna humilior altera. Hæ in progressu inuicem v-
 nitæ, eam constituunt venam, quæ hic in cutem promitur, ac vbi ramulos sursum in po-
 steriorem femoris cutem germinauit, recto tramite deorsum per mediam flexus genu se-
 dem seu poplitem ad suræ cutem descendit, ipsi numerosam ramulorum seriem porrigens,
 quibus in omnibus minime correspondet. Verum ramulorum alii recte, alii oblique, alii trans-
 uersim in cutem excurrunt, & denuo nonnulli inuicem coeuntes permiscuntur ac vniuntur.
 ¶ Atque vt semel dicam, huiusmodi hic venarum implexus digestioque conspicitur, vt cu-
 tem suræ varicum affectu crebrius implicari mirum non sit. Præsens vena per genu flexus
 cutem in suram descendens, aliquando ad calcem vsque prorepens inibi cessat, aliquan- F
 do aliis ramulis per tibiz exteriora huc pertinentibus commiscetur, & secundum
 exteriorem malleolum porrecta pedis superiora adit, non nunquam vero & inferiora
 nullibi interim in altum a cute demersa. Ceterum grandis vena femoris ossi ac-
 cumbens, adeo ipsi aduoluitur, vt iuxta genu articulum mediam inter duo humi-
 liora

Perineu.
Interfe-
mineum.

Poples.

Varicum
osius.

- A** liora femoris capita sedem occupet. Hic in duos impares ramos deducta, interior: qui exteriori multo gracilior est, ad suræ musculos, præcipue vero ad pedem mouentium primum & secundum, deorsum mittit, furculis quibusdam horum superficiem implicans, & subinde etiam furculos in progressu ad internæ tibie sedis cutem dispergens. Quum vero interior hic ramus ad tibie humiliorem usque appendicem perreperit, atque in dictam iam cutem furculos diffudit, sub interiori malleolo reflexus, internum pedis latus ad pollicem usque accedit, inibi in cutem ut plurimum absumitur. Exterior ramus magnæ illius in poplite latitantis partitionis non procul ab exortu in binas rursus dividitur propagines, quarum maior eademque interior penitus inter musculos posteriorem tibie sedem occupantes immergitur. ¶ In hoc descensu interior hæc propago illos quos perreptat musculus ramulos offert, a quibus nulli, aut profecto longe paucissimi in cutem subeunt. Iuxta medium fere longitudinis tibie præsens interiorque propago in duos partitur ramos, quorum interior tali cum tibia articulo ramulum offert, ac totas quodammodo una cum tendinibus a posteriori tibie sede ad pedis inferiora reflexus inter calcem & tibie os pedis inferiora subit, & sub musculo secundos quatuor digitorum articulos flectente propagatus, duos furculos pollicis & item indici, medio autem digito unicum præbet, itaque absumitur. Quamquam frequentissime hic interioris illius propaginis ramus in omnes digitos digeritur, nullo ramo inter fibulam & calcem huc pedem accedente. Verum alter ramus qui eius diuisionis exterior est, quam paulo ante ad medium longitudinis tibie fieri diximus, fibulæ exporrigitur: &
- C** quum ad infimam tibie sedem pertingit, atque ligamento membraneo, quod tota tibie longitudine fibulam tibie ossi committit, proximus est, sobolem a se dispergit, quæ ligamentum perforans, una cum tendinibus per tibie anteriora pedis superiora ad euntibus in pedem fertur, ac musculus pedis digitos in exteriora abducentibus furculos offert, quibusdam etiam ramulis in cutem sparsos. Quod autem alterius rami illius reliquum est, cum septimi & octauæ pedem mouentium musculorum tendinibus in pedis humilia proficiscitur, atque in minimos digitos dispensatur: nisi forte interior ramus inter tibie os calcemque pedis inferiora petens, omnibus digitis furculos exhibeat. ¶ Reliqua est adhuc exterior propago exterioris rami magnæ in poplite diuisionis quæ ad superiorem fibulæ appendicem fertur, a qua interdum ramus inter sextum & septimum pedem mouentium musculos prorepat frequenti sobole digestus in musculos anteriorem tibie ossis sedem occupantes. Alias in exterioris tibie sedis cutem potissimum frequentibus furculis dispergitur, & præcipuo ipsius furculo vnus nunc antrosum nunc retrorsum ad interiorem malleolum reflexo, pedis superiora accedit, & potissimum externum pedis latus perreptat aliisque huc pertinentibus venis commiscetur, nusquam in altum mergens. ¶ Ceterum quum iam constet omnes pedis venas, quæ numero quatuor sunt, ab eodem trunco, qui scilicet per inguina crus subit, principium ducere, parum certe refert utram incidamus. Tamen quum longe grauiori periculo in pedis superiori sede, tum neruorum, tum tendinum occasione venæ secantur, præstat eas quæ in interna regione genu atque malleolos consistunt incidere.
- E** Galenum quoque & alios Græcos venam, quæ internam genu regionem perreptat, poplitis nominatam, & quæ malleolos ambit, secuisse constat.

De bilis flauæ vesicula. CAP. XVIII.

- V**esicula flauæ bilis conceptaculum, Græcis *κύστις χοληδόχου* dicta in caua iecoris parte sedem obtinet. Iecori enim qua dextrum ventriculi latus amplectitur, sinus insculptus est, ut cap. 13. diximus, qui mediæ bilis vesiculæ portioni exquisitè congruit. Illi namque sinui media superior eius vesiculæ portio secundum ipsius longitudinem innascitur. Inferior autem extra iecoris substantiam deorsum prominet a nullo cui innititur corpore grauius pressa. ¶ Forma eius oblonga rotundaque est, sensim ad ipsius fundi usque apicem longioris cuiusdam pyri modo dilatescens, adeoque angusto ore & fundo ampliore constat. Quum enim, ut reliqua corporis receptacula, capax esse debuerit, neque tum globi modo ad amissim rotunda fieri potuerit ipsius cavitatis sua longitudine adaucta fuit: ita nullo a ventriculo affecta incommodo, ipsoque iecore non nimis insinuato. Ut autem inanita apposite subsidere, ac impleta vicissim extendi possit, membranea nerueaque constituitur substantia. Quippe simplici & vnica peculiaria.

Nomina

Forma

Substantia

Venæ ar-
teriarum &
nerui.

Meatus
exci-
pien-
da & e-
mittenda
bili parati

Meatus
duodeno
inferus
an propa-
ginem ven-
triculi of-
ferat.

Error Ra-
zis, & re-
centiorum
Medico-
rum.

Bilis in in-
testina flu-
xus vili-
tas.

constat tunica, tenui quidem, sed densa & firma, ac triplici fibrarum genere intertexta. Rectas quidem fibras intimas habet, quibus succedunt oblique, sed rectas multo pau-
ciores, extimæ vero orbiculares transuersæ sunt. Huic tunicæ alia a iecoris tunica, non toti vesiculæ, sed illius duntaxat parti, quæ extra iecoris corpus propendet, ob-
tenditur, solaque propugnaculo, & inuolucro indiguit. ¶ Vesicula etiam si iecori san-
guificationis officinæ innascatur, a portæ venæ tamen caudice, duas graciles admo-
dum assumit venulas, ea serie in ipsius tunicam diffusas, qua in adhærentem oculi
tunicam venulas digeri conspiciamus. Ab arteria quoque caua iecoris exporrecta,
ramus admodum gracilis vesiculæ illi offertur, ad ipsius vsque fundi extremum ex-
currens. Neque neruulis destituitur ne sensus sit expers. Nam iecoris neruus per
humiliorem omenti membranam a dextra sexti neruorum cerebri paris propagine
costarum radicibus exporrecta, diductus, etiam huic vesiculæ furculum promit, in
macilentis vix minus quam ipsius arteria conspicuum: Meatus quibus vesicula bilem
allicit, rursusque alio depellit, *πύλος χολδόχης* Græci vocant, ita se habent. Cervix ve-
siculæ fundo ipsius durior paulatim in angustum desinit meatum, ad eam iecoris par-
tem protensum, vnde vena portæ principium ducit. Quo quum peruenit, in duos di-
ducitur, hunc quidem sursum, illum autem deorsum porrigens. Qui sursum fertur,
anteriori venæ portæ sedi innitens, in iecur conscendit, & in duas primum dissectus
propagines, vnā dextrorsum, alteram sinistrorsum in iecur porrigit. Hæ propa-
gines singulæ in ipso iecore rursus in alios furculos: & hi in alios rursus tantisper digerun-
tur, donec innumeram ramorum constituent seriem, per iecoris corpus inter portæ
venæ ramos & cauæ propagines diffusam. Atque hi furculi sunt, quorum ope bilis in
vesiculam deferitur. At processus meatus vesiculæ qui deorsum porrigitur, inferiori
membrana omenti suffultus, parumper oblique deorsum properat, ac duodeno in-
testino non procul a ieiuni principio, *ut dictum est, capit. 5.* implantatur. Hic processus
expulsam e vesicula bilem in intestina deferit, interim nihil ab illis neque cremoris, ne-
que flatus ipsius denique quam deduxit bilis regurgitantis quippiam admittens. Quod
nō solum tortuosi in intestinum ingressus, sed & duarum membranarum beneficio fit,
quæ vtrinque ad orificii latus laxæ propendent, influentis bilis ponderi facile ceden-
tes, & ne quid in meatum regurgitare possit, iter præpedientes, quod scilicet colle-
ctæ, ac primum meatus os subeuntes id occludant. ¶ Ceterum is meatus intestino
insertus magna ex parte simplex vnicusue est, in paucissimis vero geminus seu bi-
partito scissus. Vbi vero in duas dissectus fuerit propagines, maior duodeno, minor
autem graciliorue ventriculi fundo, *Gal. libr. 2. de temp. capit. 8. teste*, paulo supra pilo-
rum seu ianitorem inseritur. Inuenitur etiam, atqui in paucissimis, superior maior,
inferior, vero minor. Quibus equidem maior est, cum iis infelicitèr admodum a-
gitur. Quippe illis in ventriculam quotidie non exiguum bilis effunditur, quam &
euomant ante cibum oportet, & nisi ipsam faciant, læduntur, quemadmodum li-
quet ex historia quam *cap. 74. artis medicæ* Galenus refert. Errare itaque plurimum
abunde constat Razem, Mundinum, Valescum, Carpum, & id genus alios Arabicæ
factionis auctores, qui meatum euomentem bilem perpetuo, & in omnibus esse ge-
minum tradunt. Nam si ventriculo bilis influeret, tum ille, *ut Galenus libr. 5. de usu*
par. cap. 4. affirmat, huius mordacitate perpetuo ad excernendum irritaretur: neque
tantisper dum cibus probe confectus esset, retentrice sua facultate fungeretur: & bi-
lem illam respuens, eiusque occasione nauseabundus, quod sibi offerretur, minus quam
decer ambitèr amplectereturque, *ut copiosius etiam libr. 3. paradox. cap. 10. docuimus*. ¶ At
quo minus in intestina bilis influeret, nihil omnino obstitit. Hæc namq; pituita, quæ in
gracilibus illis ductibus ex intestinorum munere coaceruatur plurima, incidit, deter-
git, atque expurgat. Deinde intestina irritans, & mordicans ad fæces excernendas inui-
tat, ac stimulat, & ipsa quoque vna cum excrementis nullam noxam, sed vt liquet, sum-
mum vsum præstans, e corpore tandem propellitur. Merito igitur intestinis, & non
ventriculo meatus ille bilem deferens implantatur, neque obiter cuius intestinorum
sedi sed fere duodeni termino, quod id primum intestinorum sit, quodque in eo bilis
citius suum, quem intestinis præstat vsum conferat, *ut iussus libro 5. de usu par. cap. 4. Gale-
nus monstrat.*

De Liene. CAP. XIX.

- L**ien, qui Græcis *σπλιν* dicitur, ad sinistram ventriculi sedem secundum inferiora ma-^{Situs.}
gis, & posteriora consistit. Innititur sinistra parti septi transuersi medius fere inter
sinistram vertebrarum corporum sedem, & spuriarum costarum cartilagine. Formam ^{Forma}
adipiscitur sedi suæ proportionem respondentem, ac iecoris modo a vicinis partibus si-
bi impressam. Qua enim septum contingit, ut id leniter inibi cauum est, ita etiam lien
leniter gibbus cernitur. Qua ventriculus lieni quodammodo innititur, ut amplius ille
& instar grandioris globi hic extuberat, sic quoque lien humanus modice ac in superfi-
cie duntaxat, cauus occurrit. Porcis enim, canibus, ac bubus, quum longior, sed arctior
lien obtigerit, ac ventriculi gibbo longiori interuallo in iis obtendatur magis quoque
B cauus magisque quartæ circuli partis modo ventriculum complectitur. Homo autem
crassum & magnum & latum, sed breuiorem quam vilius generis animantia lienem ha-
bet, non tamen exacte quadratum. Longitudo namque latitudinem ipsius impense su-
perat, humilior quoque eius pars ad corporis anteriora magis protensa, in obtusum de-
finit angulum: superior autem in obtusorem adhuc angulum comprimitur. Sinistrum
latus leuiter gibbum est, dextrum vero duabus quodammodo leuibus impressionibus
modice sinum lienis cauum profundiori linea secundum eius longitudinem ducta, quæ
recta quidem ducitur & inæqualiter extuberans sinuataque lienis vasa admittit. Præ-
terea in homine hoc viscus atro quodam & perquam obscuro colore nigricat, in cane ^{Lienis co-}
autem splendidius plerumque ipso iecore rubet. Sues albicantem magis lienem obtinent. ^{lor.}
C Substantia lienis crasso nigroque admodum, sed solidioris spongiæ atque leuioris pu- ^{Substan-}
micis modo, raro concretoque sanguine constat, frequentibus vasorum fibris filamen- ^{tia.}
tisque non insigniter validis duntaxat implicita. Rara autem & instar spongiæ laxa est,
ut succos crassos ex iecore facile trahat & excipiat. Hisce itaque vasorum tenuibus & ca-
uitate carentibus ramis seu fibris vndecunque implexis, fœculentus, crassusque admo-
dum sanguis obducitur, quem Erasistratus *σπέρχυμα*, quod vasis quemadmodum in ie- ^{σπέρχυμα}
core circumfundatur, appellauit. ¶ Porto venæ, & arteriæ neruique lienis sic se habent. ^{venæ.}
Minor seu sinister venæ portæ truncus, interiori omenti membrana suffultus transuer-
sim ad lienem, ad eum qui *supra cap. 15.* expositus est modum tendit. Arteriæ itidem fre-
quenti serie lieni implicite ortum ab illa ducunt arteria, quæ a magna arteria supra re-
D num regionem pronata, inferiori omenti membranæ innascitur, ac sinistrorsum lieni ^{Nerui.}
potissimum offertur, pari prorsus serie cum venis in lienem pertinentibus. Nerui lienis
a sexto neruorum cerebri paris sobole pendens, quæ sinistri lateris costarum exporrigi-
tur radicibus, & furculum humiliori membranæ omenti mittit in lienis potius tunicam
quam substantiam spargendum. Lien præterea non minus quam iecur tenui quadam ^{Tunica.}
& simplici obducitur tunica ab omenti membranis, quæ lienis rectæ lineæ innascun-
tur, orta. Hæ namque membranæ lienis cauo insertæ, in ipsius degenerant tunicam. Et
quia a peritonæo originem ducunt, eorundem beneficio interuentuque peritonæum ip-
sum lieni tunicam offerre merito dicimus. ¶ Sed præter lienis ad dorsum & ad ventri- ^{Nexus.}
culum omenti auxilio nexum a peritonæo qua septum succingit, tenues interdum fi-
E bræ impari numero lienis gibbo adnectuntur, ipsi quoque septo lienem ita colligantes.
Interdum etiam accidit, ut lienis gibbus exteriori renis sinistri inuolucro, quod multa
abundat adipe, fibrarum quarundam medio firmetur, potissimum si ren lieni, ut fre-
quenter fit, magna ex parte substernatur. Hoc autem nomine a natura factus est lien, ut ^{vsus lie-}
lutosi & fœculenti sanguinis in iecore confecti esset receptaculum. Quemadmodum ^{nis.}
enim tenuiori leuiori que recremento bilis vesicula reficitur, ita lien limoso, crasso & me-
lancholico humori suscipiendo exstructus est. Hunc autem lien ad se per portæ venæ
truncum, multiplici sobole, ut comprehensum est, eum adeunte tanquam familiarem
sibi allicit exsugitque. Ceterum attractum non confestim excernit, sed prius multa cu-
ra studioque elaborat, conficit, ac suæ nutritioni aptum, rarum & spongiosum effici-
F ens reddit. Ad quod præcipue opitulantur frequentes in lienem insertæ arteriæ suo ca-
lore ad exactam sanguinis illius elaborationem strenue auxiliantes. Si quid tamen ela-
borationem refugit & nutritioni illius ineptum est, suæque substantiæ adaptari nequit,
in ventriculum magni vsus cuiusdam gratia *ut supra 12. cap. 15. abunde diximus*, euomitur.
Quippe quum acerbum & acidum sit melancholicum excrementum functiones illius

omnes quæ in amplexu consistunt, adstringendo & contrahendo iuuat, adeoque cibos exquisitos comprehendere cogit, ac proinde ne in confectis a ventriculo elabantur, prohibet. Atque hic quidem vnicus & præcipuus est humoris melancholici ad ventriculum confluentis, *Galeno lib. 5. de usu par. cap. 4. attestante, vsus.* Vt hinc euidentissimum sit Auicennam & huius affeclas plurimum errare, qui hunc humorem ideo ad ventriculum deriuari, vt vim eiusdem appetitricem, adeoque famem excitet, huiusque præcipue vsus gratia venam aut meatum a liene in superius ventriculi orificium inferi, imaginatione solum, non sectionibus ita edocti, tradunt, *quemadmodum copiose in commen. nostris in 6. Hippo. Epid. librum, & annotationib. in lib. 1. de tuen. sanit. demonstrauimus.*

De renibus. C. A. P. XX.

Numerus

Situs.

Renes cursu discrepent.

Forma.

Magnitudo.

Venæ renibus oblata.

Arteria.

Renes qui sanguinem in cauam venam ex iecore missum serosa aqueaque humiditate, quæ bilem ipsam, & fœculentum sanguinem copia superat, colant, Græcis *νεφροί* dicti, bini sunt a natura facti. Quo ocyus autem humorem hunc serosum, quem urinam & lotium vocamus, sanguini adimant, quam fieri potuit proxime ambo iecori allocati sunt. Dexter enim superiori sua parte humilimam iecoris portionem contingit. Sinister vero adeo altam sedem occupat, vt & lieni aliqua ex parte substernatur. Vterque autem iuxta vertebrarum corporum latera, humiliori septiledi incumbit, quæ id decimæ & vndecimæ, & duodecimæ costis obducitur ea potissimum parte, quæ costæ in posteriora impensius obliquantur. Is enim costarum in posteriora flexus, opportunitatem renibus sedem offert, vt & tuto vallentur, & ne in anteriora vel minimum prominentes, ceterorum nutritionis organorum sedem occupent. Ceterum quum lien demissius quam iecur descendat, vterque autem ren venæ cauæ, quæ sub iecoris corpore ducitur, vicinus esse contendat, merito dexter sinistro plerunque elatior est. Non raro tamen etiam sinister dextro esse elatior obseruatur, in iis præcipue quibus lien minor, & iecur maius obtigit. Contrarium autem hunc renibus non tam loci, quo apte locari possent occasione, quam ne e directo vtriq; serosum sanguinem attrahant, ac alter in contrarium reuellens alterius munus prohibeat, accidisse videtur. Vt cunque autem renes situ inter se discrepent, neuter tamen alterius latitudinem, quanta media est illorum longitudo, superat vnquam. Sunt enim humani renes oblongi, & minus lati, omnique ex parte æqualiter crassi. Anterius namque & posterius comprimuntur renes, & in latere exteriori ad amussim orbiculares & gibbi: in interiore autem, quod exteriori breuius est, partim caui. In media enim interioris lateris sede sinum sibi profundius impressum habent, superius inferiusque velut in acutum angulum desinentem, in medio autem extuberantem. Superiori parte paulo quam inferiori latiores sunt renes, & parum admodum exterius, quam interius crassiores. Magnitudine ea donantur, quæ probe quantum sanguini ex vsu est, seroso humore illum emundant. Superficiem iecoris gibbo similiter impenselæuem & lubricam sortiuntur, vt & colorem intense rubram & resplendentem. Substantia namque constant carnea, densa, admodumque solida & dura, parumque a cordis substantia variante, præterquam quod nullis omnino fibris intertextitur. Renum enim substantia fibrarum, vt & iecoris pulmonumque substantia, expers est, vasorum per ipsam diffusorum fibris ad attractionem, retentionem & expulsionem famulantibus. Quum enim sanguinis serum renes excolare oporteret, neque commode venæ cauæ magnæque arteriæ corporibus, vti iecur ad cauam venam adnasci potuerint, insignes rami a vena & arteria in ipsos deducti sunt. Ac a caua quidem duo grandes rami, vtrinque nimirum singuli ad singulos renes enascuntur, qui non e directo inuicem prodeunt, sed pro renum situ, origine variant, dexterque ramus elatius sinistro principium possidet, si quidem ren dexter altius collocetur. Si vero sinister superiorem dextro sedem sibi vendicet, sinister quoque ramus elatius dextro a caua pronascitur. Has venas emulgentes vulgus appellat. Et par quidem arteriarum est ratio, quæ sub venis protensa vna cum illis transuersim ad renum sinus, quos in interno ipsorum latere gerunt perferuntur. Quam primum in hominibus ad illum alterius renis sinus vena & arteria peruenerint, in duos ramos priusquam renem subeant, ambæ diuiduntur, vnum ramum superiori eius sinus angulo, alium inferiori offerentes. In ipso autem vasorum ad renes progressu, admodum raro a se ramulos arteriæ diffundunt, sed totæ in renes absumentur, quum interim a sinistri renis vena, seminalis vena si-

- A** vena sinistram petens testem depromatur. Ab ea autem quæ dextrum renem adit, ramus in pinguem membranamque renis tunicam numerosa sobole spargitur, quod & sinistra interdum vena imitatur, dum ren sinister elatiorem dextro sedem occupat. Nunc valorum ductus, ac per renis corpus distributione, vna cum renis sinibus explicabimus. Sinus rebus duo.
- B** Ceterum duos in renibus sinus, secus multo quam nostri arbitrantur Medici, Natura formavit. Vena enim & arteria in renis corpus subeuntes in vnum degenerant corpus, arteriarum tunicis duritia crassitieque respondens. Hoc cauum & venæ arteriæque modo per renis corpus distributum cernitur. Primum enim paulatim latefcens, in duas quodammodo partes diducitur: quænam vnam quidem anteriorem, alteram vero posteriorem vocabimus. Anterior vna serie vnoque ductu, modo sex, modo septem, modo plures etiam æque crassos producit ramos, in quos etiam anterior hæc membranei corporis siue primi sinus pars finitur. Præsentibus rami per anteriorem renis partem æqualiter a se inuicem secundum renis formam abscedentes, versus exterius renis latus properant, non quidem ad externam vsque lateris eius superficiem, sed interius multo in renis corpore permanent. Hic in aliquot propagines rursus dissecti, corporis membranei posterioribus ramis commiscuntur. Posterior enim corporis eius pars eodem modo quo & anterior in ramos digeritur, ad externum renis latus cõtendentes.
- C** Quum vero hi eousque quo anteriores deuenerint, mutuo posteriores rami cum anterioribus coeunt, ac singuli singulis, ac si vnum idemque corpus essent, vniuntur, mutuamque cauitatem constituunt. Elegans iste ramorum coitus instar semicirculi ad exterioris renum lateris formam perficitur. Porro membraneum cauumque istud cum suis ramis corpus, non vndeunque renum adnatam habet substantiam. Corpori enim ipsi priusquam in ramos digeratur, antèrius posteriùsque, & ad internum ipsius latus non autem ad externum, renis substantia adnascitur. Ramis vero anterioribus duntaxat antèrius, posterioribus autem posteriùs renis substantia adnascitur, quousque ad mutuum coitum rami ducantur. Hic enim ubi in plures ramos singuli diuiduntur, ac interiores cum posterioribus coeunt, renis substantiam adnatam vndique habent. Quamquam inter ramos ipsos quæ nihil adnascitur ad renis interiora, velut septum quoddam procedit, ramis non connatum, & ab illa renis substantia prodiens, quæ ramis dum coeunt cõnascitur. A deo ut hic inter anteriores posterioremque corporis illius membranei ramos, alter quidam renis sinus exsurgat, quodammodo bipartitus. Quæ n. is exterius membranei corporis latus, ubi primum ramos germinat, respicit, vnicus esse apparet: quum autem secundum septum ex renis substantia pronatum, velut ad exteriora fertur, geminus conspicitur. Vna n. eius pars inter septum & ramos anteriores, altera inter idè septum & posteriores ramos porrigitur. Sinus hic inter disseccandum subhumidus ex sanguine omnino occurrit, corpus autem illud membraneum cum suis ramis omnibus, aut primus sinus, si ita corpus id appellare visum est: sanguine plenus semper inuenitur. Homines ut passim pinguedine scatent, secūdam sinum quoque adipe duriusculo, & quasi seroso humore enutrito oppletum habent, qui non solum humanorum renum speculationem, disseccantibus obscurauit, sed quibusdā accurate sectione aggredientibus ita imposuit, ut hunc adipem vrinarii meatus operculum quoddam esse, & vrinæ in renibus excretionem seu excolationem præfici, & quoddam velut colatorium esse scriptum reliquerit, quem Vrinarii meatus initium & explantationis.
- E** admodum fusius And. Vesal. summus noster amicus in suo de humani corporis fabri lib. monstrauit. Porro initium vrinarii meatus ex altero renis sinu pendet, non quidem ex humiliori ipsius sede, sed ex interni lateris secundi istius sinus medio. Incipit enim meatus ille ab externo latere membranei corporis, ubi primum in ramos scinditur. Deinde per eius corporis medium præcedens, ex renum medio in internum renis latus venæ cuiusdam instar procedit. Ceterum serosus sanguis renum substantiæ vi, & fibrarum membranæ corporis rectarum beneficio attrahitur. Non tamen vnigerum renes alliciunt, sed Renū medium sinus. sanguis ad fluxum per venarum cauitates aptior sit, eius humoris portio cum eo per reliquum adhuc corpus ducitur, ideoque Hipp. ut testis est lib. 4. de usu par. 6. Gal. & vna terçis. ὁ ἅμα τὸ φῶς. nominatur. Quin etiā manifestum euadit, renum substantiam a sanguine non solum in vena caua, sed & in arteria magna contento aqueū illum humorem, & si quid biliofi excrementi adhuc ipsi sit admixtum colare, atque in alterum illum sinum protrudere, cumque inde per vrinarium meatum ad vesicam huic humori instar lagenæ subditam sen-

ſim deſſuere. Renibus præterea binæ ſunt tunice, ortu ſubſtantiaq; variantes. Prima quæ exterior eſt, renum corpori pertinaciter non adnaſcitur, nihilominus ipſi inſtar inuolucricum circumquaque obducitur, & hinc etiam renis fascia vulgo nuncupatur. Hæc a peritoneo humiliorem ſepti tranſuerſim ſedem ſuccingente principium ducit. Quæ enim ipſi renes incumbunt membraneas quaſdam fibras producit, in membraneam tunicam, quæ renes ipſi colligat, degenerantes. Præſens tunica frequentibus venis inſtar omenti intertextitur, multa pinguedine, vt & illud, abundans, renumque actionem penicilli, hoc eſt, tegumenti cuiuſdam ritu ſouens. Dextri quidem renis tunica a vena ad ipſum renum pertingente propaginem exigit, in membranam frequenter ramorum ſerie excurrentem. Sinistri autem renis tunica venam adipiſcitur a ſiniſtro venæ cauæ latere, elatius quam renis vena enatam: aliquando etiam contraria eſt in eiufmodi tunicas implicantium venarum exortus ratio. ¶ Porro altera renum tunica tenuior eſt, & nullis venis, neq; etiam pinguedine obſita, & vt iecoris & lienis tunica rerum ſubſtantie conſtata. Hanc procreat tertia renum petitis arteriæ tunica, & venæ item altera. Nam dum hæc vaſa reni implantantur, hæc tunice ab eis aſcendentes, in præſentis renis tunicam dilatantur. ¶ Ceterum renis neruus gracilis eſt, neque venæ, neque arteriæ renis proportionem reſpondens. Ille enim alterius uſus quam nutriendi caloriſq; inſiti recreandi gratia reni offeruntur. Neruum autem ſenſum dūtaxat obtuſum præſtare oportuit, ac proinde a ſexti paris ramis, qui coſtarum exporriguntur radicibus, natura ſingulos ad vtrumque renum diffudit, in internam ipſorum tunicam potius, quam in corpus illos diſpergens.

De veſica & meatibus vrinariis. C A P. XXI.

Vefica quæ eſt aqueæ ſuperfluitatis receptaculum, in quo ſenſim a renibus id collatum, ne frequenter & perpetuo, ſed raro & repente ac ſimul vrina nobis reddenda ſit coaceruatur, Græciſque *κύστις* & *κύστη* dicitur, eam ſedem merito obtinet, qua commodè, dum vrinæ copia aut qualitate moleſtatur, eam excernere poſſit: quem locum non decuit ab eo quo ſicca excrementa emittuntur procul abeſſe. Deinde elatiorem ſedem alia nutritionis organa, veſica longe nobiliora, altamq; ſedem expetentia ſibi occuparunt, adeo vt iure quodam veſica non minus quam inteſtinum rectum humilius locata ſit. Ad poſteriorem enim pubis offis ſedem veſica reponitur, elatiori ſui parte ſuperiorem pubis offis ſedem modo plus, modo minus prout vrina diſtenditur, excedens. ¶ Eſt namque oblongæ ſphæræ inſtar aliquantulum rotunda, & elatiori parte, quam fundum ipſius proprie vocamus, apparet amplior, id quod ſitus occasione accidit. Quamquam enim vt capacior iniuriisq; ferendis minus obnoxia redderetur, figura ad amuſſim globi modo rotunda, magis ipſi conueniſſet, attamen oblongiorem, ſuoque fundo ampliorem natura machinata eſt, non quod eiufmodi commoditatem negligeret, ſed ne pubis os rectumque inteſtinum poſteriori veſicæ ſedi in viris, vt & vterus in mulieribus attenſum, eius diſtentionem nimium arctarent. Quod ſane neceſſario accidiſſet, ſi quam ex longitudine fortitur capacitas etiam in latitudine inter pubis os & rectum inteſtinum adiecta fuiſſet. Sed & fundo quoque tanto eſt humiliore ipſius parte, quæ in cernicem anguſtumue meatum deſinit, amplius, quanto commodius id pubis os excedens, propter cedentes abdominis muſculos, diſtendi dilatarique poſteſt. Veſicam enim amplam & extendi promptam fieri oportuit, quo rarius, vt dictum eſt, vrina nobis reddenda ſit. ¶ Proinde membraneo nerueoque conſtat corpore, quod dilatari poſſit commodè, & rurus cum nihil cōtinet, ſubſidere. Etenim veſica leui, dura valida, membraneaque conſtat tunica, quæ modo craſſior, modo tenuior viſitur, prout nimirum aut impenſius diſtenditur, aut arctatur. Peculiariter hoc ſibi vendicans, quod in elatiſſima ſui fundi parte, & qua in cernicem deſinit, ob meatuum quorundam implantationes & explantationes durior craſſiorq; ſit. Hanc triplici fibrarum genere intertextam, vel pueri nouere, vnguibus dum veſicam inflant, vt promptius diſtendatur, illam fricantes, ac eiufmodi fibras diuellentes. Etenim nulla corporis tunica occurrit triplex hoc fibrarum genus exactius oſtendens, quam ſi veſica inflatur. Ceterum veſicam implicantibus fibræ eadem qua fibræ ventriculi & bilis veſiculæ collocantur ſerie. Rectæ enim intimæ ſunt, extimæ tranſuerſæ, mediæ vero obliquæ, pro functionum ordine ſitus ſeriem adipiſcentes. Expulſionem namque præit retentio, & hanc rurus attractio. Duram ve-

Aro & crassam vesicæ tunicam fieri oportuit, quod hanc in magnam sæpe molem distendi sit necesse, quodque urinae acrimonia & ulceribus ac calculis idque generis malis aliis frequenter vexetur: quæ nisi dura esset, eam facile lacerarent, eroderent ac perforarent.

Vt autem validiora adhuc efficiantur hæc, *peritonæum* illi densum robustumque involucrum peculiariter circumdedit, quod secunda vesicæ tunica censetur. Hanc *peritonæum* ipsi offert, qua supra pubis os vesicæ fundum anteriorque ipsius sedes uniuersa *peritonæo* in hominibus secus multo quam in canibus adnascitur. In hominibus etiam sedes vesicæ posterior rectum intestinum & uterum respiciens, laevis & lubrica, & aqueo humore oblita est. Ceterum quum urina vesicæ ad nutritionem inepta sit, venas, & quibus illius calor refocilletur arterias natura illi distribuit. Ac primum utrinque in ceruicis vesicæ latera, unam venam, & arteriam unam, a caua venæ & arteriæ magnæ ramis per pubis ossis foramen crus accedentibus deriuauit, quæ hinc sursum per corporis vesicæ longitudinem conscendentes in tenuissimos pilique modo graciles surculos dissipantur. Neque neruis itidem, quibus obtristantium sensationem maxime indiguit, vesica destituitur. Quantumuis enim urina vesicæ, ut bilis minori vesiculæ tantquam familiare quippiam influat, neque quum naturalis est ullam ab illa noxam patiatur, ea tamen interdum tantum biliosi excrementi admixtum habet, mordaxque & acris redditur, adeo, ut nisi urinae qualitatem vesica perciperet, illam diutius continens, grauitur plerumque afficeretur. Proinde inter ceteras corporis partes neruos non minimos sensus tactus duntaxat gratia vesica obtinuit, eos a sexti paris ramis costarum radicibus exportectis, & ab infimis spinalis medullæ paribus exigens. Præter hæc vasa & neruosa ex elatione mediaque fundi parte meatus exoritur, qui per umbilicum & intimum foetus involucrum, quod a foraminis specie nomen inuenit, quum adhuc uterogermur, urinam deducit.

Secunda vesicæ tunica.

Venæ & arteriæ.

Nerui.

Meatus foetus urinam educens.

Quin etiam vesicæ lateribus duæ attenduntur arteriæ vitalem spiritum ex uteri arteriis foetui deferentes, quæ in natis non minus quam meatus urinam deducens, exarescunt, inutilesque redduntur, nisi quod vesicæ ad *peritonæum* ligamentorum vicem abunde gerant, vesicamque erectam contineant, *ut sequenti libro fusius dicemus*. Porro in humiliorem vesicæ sedem præter suos neruos & venas & arterias in cavitatem usque ipsius, alii duo meatus inseruntur ex renibus urinam deducentes, quos Græci ab officio *urinae*, & *urinae*, atque *urinae* appellant. Hi vero non temere a natura sunt formati. Quum enim renes, quam proximi iecori necessario allocentur, vesica autem humilem sibi sedem vendicat, meatus quosdam effingi oportuit, urinam ex renibus in vesicam deducturos. Atque hos venarum corpori quam similimos natura efformauit. Quippe simplici constant tunica, venarum tunica paulo duriore, paucioribusque quam illa fibris obliquis intertexta. Ita enim meatus illi iniuriis ferendis redduntur aptiores, & tendi subsidereque facile possunt, & oblique fibræ quo minus in vesicam urina ocys delabatur, nihil interim præpediunt. Explantantur autem isti ex secundo renum sinu, eos per medium primi sinus deducente. Hinc *peritonæo* super lumborum musculorum supertensi, securissime deorsum ad vesicam prorepunt. Adnascuntur enim in progressu *peritonæo*, & ab illo fibras quasdam adepti, alteram assumunt tunicam, venulis & arteriis ut *peritonæum* intertextam.

Arteriæ foetus peculiæ res vesicæ commissæ. Meatus urinam erentibus in vesicâ deducenti histeria.

Porro ductus ipsorum, quum itineris longitudo nihil commodi adferre hic possit, quam minime anfractuosa est. Ex renum enim sinu deorsum modice versus interiora, ut ad vesicam pertingant, deducuntur. Ne vero parum firmati, & omnino peniles vesicæ insererentur, aut obliquum nimis ductum efficerent, non elatissimæ parti vesicæ, ex qua meatus urinam foetus extra umbilicum deferens pender, implantatur, sed illi vesicæ sedi, quæ posteriori *peritonæi* regioni, ad quam meatus toto ductu secure adnascuntur, vicinior est. Est autem ea regio in posteriore vesicæ sede paulo antequam in ceruicem desinat, cui utrique meatus primum adnascuntur, & obliquo anfractu vesicæ tunicam a *peritonæo* pronatam penetrantes, tandem in vesicæ cavitatem alteram quoque tunicam penetrantes aperiuntur ingrediunturque, modo sane quam similimo, quo bilis meatus in duodenum inseri retulimus: laxis nimirum

Artificiosa
meatuum
vriam de-
ducentium
insertio.

Vesicæ cer-
uix.

membranulis vtrinque ad meatus foramen ex vesicæ corpore appendentibus, nō aliter A
quam si vesicæ internæ tunicæ tenues huiusmodi processus, inibi adnascerentur. Ho-
rum vsus, membraneorum processuum bilem deducenti meatui adnatorum vsui re-
spondet, vt scilicet vrinz quidem ex meatibus in vesicam defluenti cedant, & dum
vesica distenta vrinam rursus in eosdem meatus regurgitare volet collecti illi meatum-
que opplentes, vrinz transitum præpediant. Id quod adeo commode præstant, vt ve-
sica vel flatu plurimo repleta, nihil plane spiritus per hos meatus reddere queat, *vt libr.*
s. de vsu par. Galenus fusiis docet. Verum quod obliquus ille in meatuum insertione ductus
ejdem vsui famuletur, vesicæ dum inflantur, exquisitè demonstrant. Eadem in follibus
indies experimur: nam per foramen quod a tergo illis adhibetur, aer quidem attrahi-
tur, sed quum follis comprimitur, propter asserculū impetu aeris foramini appressum, B
nihil venti expirat. Vrinariorum itaque meatuū insertio ad inferiorem posteriorem,
que regionem vesicæ non procul ab ipsius ceruice consistit. Hic enim humilima vesicæ
pars in angustum finitur meatum, quem ipsius ceruicem collumue nuncupamus, a-
liter in viris quam mulieribus protensum, & aliis quoque in illis quam in his adnatum
coagmentatumque partibus, & vsum denique ambobus diuersum præbentem. Com-
mune enim est vtrisque huic ceruici seu meatui vrinam ex vesica deferenti muscolum
orbicularim circumduci, quo cauetur ne vrina præter voluntatem nostram effluat, de
quo abunde in secundo diximus libro. Deinde & viris & mulieribus per illum meatum
vrina excernitur, sed viris ad seminis quoque ei aculationem ille auxiliatur. Propterea C
peculiariter hi glandosum illud corpus adnatum habent, semen deferentium vasorum
insertionem suscipiens, quo corpore vrinz meatum humectante, & irrigante mulieres
destituuntur. Quin etiam mulieribus super vteri ceruicē meatus hic seu vesicæ cer-
uix fibris membraneis illi adnatus extenditur, ac vbi primum sub pubis osse cum vteri
ceruice sursum inflecti cōperit, in illius cavitatem cessat. Viris autem vltra porrigitur
ac prominet. Nam quamprimum humilimam pubis ossium commissuræ regionem
superauit, penis corporibus subnatus ad elatiorem vsque pubis ossium commissuræ se-
dem sursum fertur, & hinc rursus prout rigidus flaccidusue est penis, sursum spectat aut
propendet, nunc C Græcorum, *Galen. lib. s. de vsu par. cap. ult. teste.* nunc f Latinorum e-
lementum exprimens. Sed de iis omnibus copiosius libro sequenti tractabimus.

FINIS LIBRI TERTII.

LIBER QVARTVS DE INSTRVMENTIS PRO- pagandæ speciei famulantibus.

De testibus virorum. CAP. I.

Cur vir &
mulier cre-
ati.



V M materia occasione hominem producere immortalem Naturæ ne-
gatum sit, *vt lib. i. de tuen. sani. cap. i. Galen. copiose admodum monstrat,* ipse quod
licuit ad immortalitatem auxilium Opifex rerum machinatus est. Quip-
pe initio ad humanæ speciei conseruationem duos homines extruxit, vi-
rum quidem vt fœtus principii rationem exporrigeret: mulierem vero vt E

id apte conciperet, infantulumque ex hoc pronatū tantisper enutrirer, donec is vali-
dior redditus, ingredi per se posset. Atque iis muniis idonea peculiariaque instrumen-
ta vir ac mulier obtinuit, de quibus omnibus ordine exorſi a testibus virilibus, agemus.
¶ Testium autem, qui *ὀρχη* Græcis vocantur, in viris situs nulli non conspicuus est, vt
& binarius ipsorum numerus, vnde *διδυμοι*, hoc est gemini, appellantur: quamuis inter-
dum vnus tantum, interdum etiam tres simul reperiantur. Nam vt & nonnulli alii, sic
etiam Franciscus Philelphus *τελεβοχης* fuisse dicitur. Sunt vero testes rotundi, sed Paulo
admodum oblongiores, quam aut lati, aut profundi: dein humiliore parte nonnihil ob-
tusiores amplioresque quam superiori sede videntur, verum id admodum obscure. In
externa superficie nullum penitus sinum impressionemue, aut inæqualitatem obti-
nent. Substantia constant alba, lactea, molli, & sibi vndecunque simili ac continua, nisi
quod venulis frequentibus iisdemque exiguis tenuissimisque oppleta sit, ob idque ra-
ra cauernosaque, quemadmodum lienis substantia esse videatur. Cauernosi autem
sunt, *Galen. lib. 14. de vsu par. cap. 10. teste,* vt humorem qui in vasis cœptus erat concoqui
excipien-

Testium
situs.
Numerus.
Forma.

Substantia,

- A** excipientes ipsi rursus percoquant, perfectum quidem ad animantis generationem, ac calidiorē efficiētes. Testes pluribus tunicis seu inuolucris integunt: ac alius quidem vtrique testi communibus, aliis autem priuatim singulos testes inuoluentibus. Testium tunicarum communes.
- A**mbos enim testes vna cum ipsorum peculiaribus tunicis & seminariis vasis, cutis ipsa & membrana, quam carnosam vocari, *libro secundo*, diximus, perinde atque vniuersum corpus amplexantur, & duas vtrisque testibus communes effingunt tunicas: Cutis quidem vnā, quæ reliqua corporis cute tenuior est, & velut sutura quadam & rugis interstingitur, Græcisque ὄρχην, *scrotum* Latinis nominatur. Alteram vero communem tunicam membrana carnosā efformat, hic perinde acutis, longē quam in reliquo corpore tenuior, sed venis frequentibus intertexta. Scrotum.
- B** membrana aliud peculiariter hic, vtrinque fronte, & pene sibi vendicant, quandoquidem nullus inter ipsas interueniat adeps. ¶ Porro vtrumque testem priuatim inuoluentes tunicæ, amplitudine, conformatione, tenuitate inuicem admodum variant. Vna enim quæ exterior est, testem cum suis vasis ad eam vsque sedem, qua magnæ peritonæi amplitudini committuntur, induit, valida quidem, sed tenuis, venisque abundans. Quæ enim venam & arteriam seminales, ac dein vas semen a teste sursum ducēs, ex peritonæi magna amplitudine in inguinum regionem ipsumque scrotum ducitur, illic peritonæum præfens inducit inuolucrum, quod peritonæi pars processuque merito censetur, ita enim ab ipso peritonæo prodit, vt scrotum a cute producit. Hæc tunica exteriori superficie, qua hanc carnosā membrana cōtingit, fibris quibusdam membranæ illi connascitur. Præterea qua dexteri testis tunica sinistri tunicam contingit, fibris quoque ambæ tunicæ mutuo committuntur, ideoque externam superficiem non admodum leuem habere videntur, sed membranarum inuicem cōnatarum modo asperam & fibrosam. Interior autem huius tunicæ superficies, qua testem ipsiusque vasa respicit, læuis, & aqueo humore obducta est. Hæc præterea tunica aliquid cum carnosā corporis membrana commune nanciscitur. Vt enim hanc carnosam quibusdam fibris, aliqua sui parte augeri intertextique, ac in musculi naturam degenerare *lib. 2. cap. 4.* dictum est, ita hæc quoque testis tunica, secundum totam ipsius longitudinem posteriori in sede, a peritonæo vsque ad humilimam testis partem, carnosas fibras obtinet, & longi strictique cuiusdam musculi naturam refert, quem membranæ seu ipsi tunicæ innatum cernimus, nusquam a tunica abscedentem, sed vna cum illa a peritonæo incipientem, & etiam inferiori parti vasis a teste semen deferentis, simul cum tunica adnatum, *quemadmodum copiosius lib. 2. diximus.* Tunica hæc præterquam, quod testem commodissime integit, illumque suspensum continet, musculi etiam illius beneficio, quasi voluntario motu testem sursum allicere sentitur. ¶ Porro musculi huius occasione, quæ scilicet ruber vt reliqua caro sit, ea tunica Græcis ἐρυθρεϊδης priuatim appellatur. Aut etiam ob venarum gracilitatem, quæ id ad eunt, vt comprehensum est, frequentiam, quæ illi tunicæ ruborem etiam aliquem conciliant. Sunt tamen nonnulli qui tunicam hanc, quod velaminis seu putaminis vaginæ uel formam habeat, ἐρυτρεϊδης nominatam fuisse contendunt. Si quidem Articorum more ἔ. pro λ. ponitur, vt idem scilicet valeat quod ἐλυτρεϊδης. Est autem hæc vox ἀπὸ τοῦ ἐλυτρεῖς quod velamen, receptaculum, & putamen significat, & ἄδης quod speciem denotat, deducta. Atque horum sententia verior esse videtur. Altera priuata tunica præter testis corpus substantiamque nihil omnino amplectatur, testis figuræ ad amulum respondens, aut potius illam efformans. Quippe dura & crassa, ac valida admodum membrana est, testis substantiam vtrunque mollem & sequacem inuoluens. Atque is sane præsentis tunicæ præcipuus vsus censendus est. Deinde in hoc conducit, vt ipsius interuentu & medio, vasa testi committenda, ipsi adnascantur. Nam tunica laxior, tenuior, molliorque inibi cernitur, qua vasa illi connascuntur, quam per reliquam circumferentiam. Et elatiori quidem huius tunicæ parti vena, ac arteria testi sanguinem spiritumque deferentes adnascuntur, ac quam plurimi ramuli eam tunicam hic perforantes, in testis substantiam exporriguntur. In posteriori vero sede tunica hæc per vniuersam ipsius longitudinem, validissime adnatos, habet omnes deferentis semen vasis anfractus testi obductos, inibi etiam vndecunque tenuibus ac visum fugientibus foraminibus pertusa. Per reliquam exteriorem ipsius superficiem, læuis & aqueo humore perfusa, nullique penitus parti connexa est. Interiora
- Priuatæ vtriusque testis tunicæ. Exterior.
- Testis muscularis seu exteriori ipsius tunicæ innatus.
- Intima testis tunicæ.
- Vnus.

de testibus. vero superficie, qua testis substantiam hæc tunica continet, vnde cunque illi substantiæ **A**
 conuascitur. Hæc tunica veteribus Græcis *σπέρμα*, appellata est: Primi etiam anatomes
 professores, qui testem *σπέρμα* nominauerunt, hanc etiam tunicam *σπέρμα*, quasi super
 testem, huic enim, vt comprehensum est, innititur ac proxime incumbit: vocauerunt.
 Et procul dubio Galenus caput testis nihil aliud præter elatiorem huius intimæ testis
 tunicæ partem nuncupauit, vt plurimum errare constet eos, qui aliam affinxerunt par-
 ticulam, quæ parui testis instar imposita testi ipsius caput, & *σπέρμα* vocaretur. ¶ Ad
σπέρμα, Vasa testibus sanguine ac spiritum deferentium numerus, & ortus. Venæ. singulos testes singulæ pertingunt venæ, ac item arteriæ ortu differentes. Vena nam-
 que dextrum accedens testem, a venæ cauæ caudice demissius quam venarum ad renes
 exporrectarum origines pendent, principium ducit: non quidem a dextro caudicis la-
 tere: sed ex superiori anterioriue ipsius sede ad dextrum modice declinans, oblongo
 quasi & crassiusculo tubere exeritur, ac sensim oblique versus dextrum latus protensa,
 peritonæoque suffulta deorsum fertur. Sinistri testis vena non a cauæ caudice princi-
 pium mutuatur, ac elatius multo quam dextra enascens, ex venæ sinistro reni exporre-
 ctæ humiliori sede originem habet. Atque in hunc modum plerunque venarum ortus
 cernitur. Quandoque tamen, sed rarius, a sinistro cauæ caudicis latere ramulum ex-
 porrigi conspicies, qui deorsum ad sinistra repens, sinistra seminali venæ commisce-
 tur, ac cum illa coit. Galenus in libello de venæ sectione idem & dextræ seminali venæ ali-
 quando contigisse testatur, quod scilicet a dextri renis vena egrediens furculus, deor-
 sum protenderetur, & venæ commisceretur, a cauæ caudice principium ducenti. ¶ Por-
Arteriæ. ro seminales venæ ad hunc modum deorsum protensæ peritonæo fibrosis nexibus qui **C**
 in alteram earum degenerant tunicam committuntur, coniuges arterias sortitæ sunt.
 Vtræque enim arteriæ humilior quam dextrum testem petentis venæ principium con-
 sistit e directo, & sibi proximæ ex elatioris anteriorisue magnæ arteriæ sedis medio
 promuntur, ac dextra quidem cauæ venæ caudicem conscendens, deorsum oblique ad
 dextri testis venam properat. Sinistra vero sui lateris venam accedens, sæpius deesse
 videtur, sinistri testis vena solito tunc longe ampliori. Ab arteria vero sinistro reni com-
 municata illam enasci, vix vnquam occurrit: quanquam id nonnunquam accidere pos-
 sit. ¶ Dextra vena, & arteria: idem de lateris sinistri vasis subaudiendum: sese inuicem
Ad testem ductus. contingentes, peritonæo incumbunt, & ipsi, vt dictum est, fibrosis membraneisue ne-
 xibus alligatæ, decliues in dextrum protensæ, super vrinarium meatum ex dextro rene **D**
 vrinam vesicæ deferentem ducuntur peritonæo in progressu tenues, & perquam gra-
 ciles furculos diffundentes. Quamprimum vero vasa hæc ad pubis vsque ossis sedem
 peruenerint, qua septimus femur mouentium musculus supra coxendicis os deorsum
 versus minorem internumue femoris processum fertur, illa peritonæum iuxta inter-
 num eius musculi latus permeant, & ex magna peritonæi amplitudine procidentia in
 exteriorem testi peculiariū tunicam quæ hica peritonæo ducit principium, pertin-
 gunt, vna cum neruulo ad testes vsque producto, qui interdum a sexti paris neruorum
 cerebri propagine costarum radicibus exporrectæ diducitur, interdum vero a vigesi-
 mo primo spinalis medullæ neruorum pari, vt libro sexto fusius demonstrabimus. ¶ Porro
 peritonæi foramen vasi cum neruo transmittens, non ita patet, ac si quis ori pennam **E**
 inderet, sed peritonæum exactissime vasorum lateribus ipsarumque tunica, quam in
 progressu adhuc in magna ipsius cauitate vasis exporrigit, conuascitur, tuto ipsa non
 secus transmittens, quam septum & quibus id succingitur membranæ stomacho &
 venæ cauæ viam offerunt. Simulatque vero vasa illud peritonæi foramen superarunt,
 ex dextro quodammodo latere rursus oblique deorsum in sinistra ad dextri testis ela-
 tiorem sedem ducuntur, arteria non amplius venæ duntaxat, vt in reliquo processu ac-
 cumbit, fibrisque membraneis tantum connectitur, sed varia quadam peculiarique ra-
 tione vena cum arteria coit, & ambæ inuicem commiscuntur, corpusque vnum pyra-
 midis anterius posteriusque depressæ instar efformant, cuius quidem conum vasa vbi
 primum inuicem permiscuntur efficiunt, basim vero ea sede qua elatiori testis parti **F**
 committuntur. Per vniuersum hoc corpus ramorum myriades inuicem complexi ob-
 seruantur, non quidem omnes recta deorsum procedentes, sed alii partim recta, par-
 tim orbiculatim, partim transuersim, alii alio modo inuicem implicari apparent: im-
 possibileque est, vnam ductus seriem vnumue ordinem inibi animaduertere. ¶ Porro
 quum

A quum tot ramorum in membrana illa quam peritonæum vasis inibi offert, qua illi fibrosis nexibus hærent, implexus fiant, corpus id senioris rustici, aut baiuli suræ cutem varicibus turgidam referre videtur. Vt enim multifariam in illa venæ inæqualiter extuberantes errabundo ductu feruntur, ita quoque in hoc corpore venæ seminalis & arteriæ innumeræ soboles aberrant, qua sane similitudine corpus hoc veteres anatomici *κροσσίδιον* *κροσσίδιον*, quasi varicosum ad testes assistentem diceret, appellarunt. Hoc basi sua elatiori parti intimæ testis tunicæ quæ *ἐνδοδυσμίδα* vocari diximus, adnascitur, ac multos ramulos recta hanc tunicam perforantes elatiori quoque testis parti distribuit, multipliciter per testis substantiam perinde ac iecoris venæ in ipsius substantiam disseminatos, & perquam tenui tunica constantes. Hæc venæ, & arteriæ seminalium est series, quas vulgus non tantum ita, sed & vasa præparantia nominat.

Ad externum varicosi illius corporis latus, qua testi applantatur, aliud corpus album & durioris nerui modo durum, intimæ testis tunicæ adnascitur, hincque incipit. Hoc exterius qua testi non committitur gibbum, & quodammodo teres est: qua vero tunicæ illi connatum est, secundum connexum testis id cauum existit. Hoc corpus ab externo varicosi corporis latere, ad ipsius posteriorem sedem fertur, & deorsum modice versus interiora prorepens, secundum posteriorem testis sedem intimæ testis tunice validissime tantisper adnascitur, donec ad humiliorem testis descenderit sedem, a qua denuo sursum reflectitur intimæ testis tunicæ attensum, incumbensque quidem, at non amplius ipsi connatum, & non eandem formam retinens. Per totum enim ductum, quo testis tunicæ corpus id necitur, propemodum æqualiter crassum eiusdemque figuræ est, quam compacto vitis, aut cucurbitæ capreolo assimilare queas. Quamquam tamen non in orbem, sed velut in latera, huius corporis reuolutiones fiant, ad eum fere modum quo angues, & anguillas ocyus repere cernimus. Huius namque corporis anfractus & inuolutiones admodum inuicem continuæ & connatæ conspiciuntur. Adhuc itaque modum corpus id intimæ testis tunicæ connascitur, & exterius demitis reuolutionum impressionibus læue est, intus vero quum ab intima testis tunica acutiori cultello adimitur, asperum, sed nullis, quæ oculis subiiciuntur, meatibus peruium est. Neque enim aliter cauum esse visitur, non hic solum qua testis tunicæ connascitur, sed neque qua ab illa abscedens sursum fertur. Quum primum namque ad inferiorem testis partem descendit, recta sursum reflexum angustius, magisque teres sensim efficitur non amplius inuolutum, in teretem quasi neruum desinit. Atque id ipsi maxime euenit, vbi elatiorem testis partem sursum scandens superat. Quo quum pertigerit, anteriori eius corporis, quod varicosum esse diximus, parti versus interiora innititur, & ipsi tenuis membranulæ interuentu connexum, alius tantisper procedit, donec per peritonæi foramen, quod venam & arteriam seminales transeunt, in peritonæi amplitudinem pertingat. In quo transitu corpus id non amplius anteriori venæ, arteriæque parti attenditur, sed in posteriora reflexum, sub illis in peritonæum transcendit. Hinc ex dextro latere, ad posteriorem pubis ossis sedem reflectitur, & posteriori peritonæi parti connexum, super vrinarium dextrilateris meatum sub vesica deducitur. Eodem pari omnino ratione sinistro teste corpus simile perfertur, & ambo sub posteriori vesicæ sede super rectum intestinum ad vesicæ ceruicis initium protensa, sensim mutuo appropinquant, & latiora crassioraque facta, inter se tandem coeunt, vnumque corpus sub vesicæ ceruicis initio constituunt, in glandulosa, de quibus nunc dicemus, organa absumentum. Hoc corpus a teste ad hunc modum ascendens Herophilus *κροσσίδιον* *κροσσίδιον*, vulgus anatomicorum non inepte vas semen deferens appellat. Nam reuera a testis substantia semen assumens, ad penem defert. Vasis huius in penem insertio conspectum quodammodo fugit, & coitus tantum, aut excretionis seminis tempore aperitur.

Ceterum corpus glandosum, in quod deferentia semen vasa postquam coiere inferuntur, quodque Herophilus *κροσσίδιον* *κροσσίδιον* appellat, ad humilissimam vesicæ partem reponitur, medium quodammodo inter vesicæ corpus & illius ceruicem. Est autem corpus id vnicum, & subinde ipsis testibus grandius, at non ad amissim rotundum. Nam anteriùs & posteriùs depressum, a lateribus autem rotundum instar globi cernitur. Per ipsius vero medium canalisis vesicæ procedit, qui hic paulo quam in reli-

Vfus prae-
dictarum
partium.

quo progressu lator, ampliorue existit: non tamen quod manifeste conspici possit, a semen deferentibus vas foratus, sed asper duntaxat, & inæqualis ac rugosus, idque potissimum in posteriori ipsius sede, ubi interdum deferentium vasorum ingressum accurate secantes, conspicue deprehendunt. Deinde vesicæ ceruix, qua per glandosum corpus fertur, distincta ab illo corpore membrana neutiquam est. Nam solus glandosi corporis sinus communem hic urinae seminique meatum conficit, per reliquum autem processum canalisi ille priuatum est corpus, orbiculari musculo statim a glandoso corpore circumdatum, & dein duobus quæ penem constituunt corporibus, *de quibus paulo post dicemus*, adnatum. Nunc reliquum est, ut singularum iam enarratarum partium usus breuiter explicemus. Omnibus autem constat testium substantiam ingenta sibi facultate, ex materia quam venæ & arteriæ illi deferunt ac per totum testem, ut venæ per iecur sanguinem, diffundunt, semen efficere. Optimam vero sanguinis ac spirituum portionem testium venæ & arteriæ, non breui aliquo, & minime anfractuoso, verum longissimo, & innumeris reuolutionibus spirisque tortuosum & errantem perferunt, ut scilicet materiam testi præparatam, seminique efficiendo magis opportunam communicent. Neque id in vnam amplam testibus incisam cauitatem, sed in tenuissima, eademque tunica subtili admodum formata vascula, per testes substantiam frequentissima serie distributa: adeo ut testis substantia facultate sibi insita sanguini, & spiritui suis vasculis contentis perfectam seminis naturam impertiat. Atque hæc vis in masculis roboris & virilitatis, in foeminis, ut sic dicam, muliebritatis causa existit. ¶ Ceterum paratum a testibus semen, meatus innumeri, sed gracilimi in deferentis vas anfractos testi connatos exporrigunt, ut hinc rursus ex utroque teste semen in viris deducatur, qua commode in uterum proiciat, eiaculari valeat. Vas autem deferens semen tot anfractibus, spirisque super testem obuoluitur, ut citius & copiosius a testibus semen assumat, & aliquam quoque elaborationem in ipso semen obtineat. Vasis autem huius ad testem applantatio, tenuissimis & angustis foraminulis, intimæ testis tunicæ interuentu fit: quod vas id durum, validum, densum, iniuriisque ferendis pertinax fieri oportuerit, testis vero substantiam laxam mollemque, adeo ut prudens natura hic & alibi nulla essentis contraria in vnum coegerit, nisi copulam aliquam amicitiae societatisque conciliatricem interposuerit. Quanto itaque a vase semen deferente, intima testis tunica densitate duritiaque vincitur, tanto ipsa testes superat: non quidem per vniuersam circumferentiam qua testibus obducitur, sed eo tantum loco, quo vasa seminaria habet adnata. Hic enim quam per reliquum corpus mollior existit, & tenuibus, *ut dictum est*, foraminibus pertusa. Posteriori autem testis sedi non autem anteriori vas illud connascitur, ut quum iam semen confectum porrigat contineatur, testis autem solum conficiat, tutiori loco reponatur, teste propugnaculi loco vrens. Atque eadem ratione quum vas peritonæum ingreditur, sub vena & arteria merito occultatur, quod semen sanguine & spiritu, ex quibus semen paratur perfectius contineat. Dextrum vas cum sinistro coit, atque in vesicæ ceruicem ambo insinuantur, ut utriusque testis semen semel, eodemque tempore in uterum proiciatur. ¶ Glandosi quidem corporis usus is est, ut urinae seminisque in vesicæ ceruice meatum humectet, & ut meatuum quæ per ipsum a deferentibus vas digeruntur fulcrum esset. De quibus copiosius *lib. 15. de usu partium & libris de semine* Galenus scribit.

Glandosi
corporis
usus.

De virilis membri penisue structura. C A P. II.

Penis stru-
cturae ra-
tio.

Viro rerum Opifex membrum, quod Græcis *ῥαυδὸς*, Latinis *coles*, *penis*, *mentula*, *virga*, & *puendum virile* nominatur, semini in uterum fundendo aptissimum largitus est, quod concubitus tempore varios ob usum tumidum, rigidum, & erectum prorsus esse oportuit. At si perpetuo tensum & prælongum quoque seruaretur, per totam vitam præterquam congressus tempore, vsui ineptum foret, ac prompte iniuriis non secus afficeretur, ac si quis manum semper protensam circumferret. ¶ Quum itaque modo laxum, gracile & breue, modo vicissim tensum tumidumque fieri debuit, penem e duobus corporibus grandibus, & intus spongiæ modo cauis efformauit, quæ spiritu impleta erigi, produciq; & insigniter turgere & rursus eodem spiritu dissoluto

A luto arctari, concidere, flaccescere, breuioraque effici possunt. Non sunt vero neque venæ, neque arteriæ, nec nervi, quia ex ossibus oriuntur. Non tendines, quum musculorum non sint eneruationes. Non ossa, aut cartilagine, quum laxata remissaque instar ligamenti facile inuoluantur, implicenturque. Neque tamen ligamenta sunt, quod sensu participant, & forata, cauaque sunt, & velut carnea molliaque in ipsorum medio euadant, sanguineque nigro secus multo ac ligamenta impleantur. Horum quidem dextrum, a pubis ossis dextri sede, vbi id crassius, & quasi teres visitur, enascitur, paulo inferiorius quam vbi inuicem pubis ossa dehiscere incipiunt. Hoc versus sinistrum latus modice exporrectum, cum sinistro coit corpore, a pubis osse sinistro principium ducente. Hæc corpora ligamenti naturam prorsus referentia in eum modum inuicem committuntur, ac si vtrarumque manuum indices internis partibus mutuo iungeres, vnitosque fingeres. Vt enim interna indicum sedes plana, non autem gibba & teres, exterioris sedis modo est, ita etiam hæc corpora quæ inuicem connascuntur, plana sunt, externis autem lateribus & superiori sede teretia inuicem iunctorum digitorum instar, qui simul commissi latius quam profundius corpus ad penis modum efficiunt. Deinde vt inferior indicum, ita commissorum sedes modice dehiscit, planaque visitur: sic & penis corporum inferior sedes dehiscit, ac vrinarij vesicæ meatum sub se ita porrectum obinet, ac si calamus quo scribitur, inferiori indicum sedi exporrigeres, & indices tibi penis corporum loco, calamus autem vrinarij meatus vice essent. Mox enim a corporum exortu ipsis vrinarij meatus, seu vesicæ ceruix subtenditur, ac cum illis ad glandis vsque initium in eum modum porrigitur, vt corporum substantiam nusquam ingreditur.

C Corpora hæc in eum modum enata, simulque commissa seorsum singula oblongum referunt corpus ex neruea substantia contextum, instar coriaceæ fistulæ, cuius interior substantia rubra prorsus, & nigricans, & fungosa, & atro sanguine oppleta cernitur, ad eum fere modum, ac si ex innumeris arteriarum venarumque surculis quam tenuissimis simulque proxime implicatis retia quædam efformarentur, orbiculatim a neruea illa substantia tanquam in corio comprehensa. Atque hæc duo penis corpora ad glandem vsque priuatim singula nerueum retinent inuolucrum, & fungosam hanc substantiam. Quum autem ad eam vsque penis regionem perrepserit, in qua iam glandem efformatura sunt, sic autem vocant penis summitatem magis quam reliquam longitudinem crassescens in acutum feruntur, & carnosa glandis substantia ipsis obnascitur, quæ meatum vrinæ seminique communem non subnatum duntaxat, vt corpora illa habet, verum etiam in se complectitur, eumque ambit: qui hic reliquo ipsius ductu amplior efficitur, & rursus suo fine extremoue arctatur, non secus ac si natura in concubitu seminis moram, ac proinde intensiorem pruritum in glande, esse concupiuisset. Porro venæ ac arteriæ ad horum penis corporum radicem accedentes ab illis deriuantur, quæ humilioris illius diuisionis rami sunt, quam vala os sacrum prætergressa tentare *supra lib. 3. cap. 17.* diximus. Quanquam vero hæc vasa ad penis corpora pertingant, tamen vix sectione assequi potest, quo itinere in corporum illorum cavitatem inserantur, sanguinem illum nigricantem & crassum, quem fungosa corporum substantia plurimum possidet deductura. Nervus quoque huc plures ab infimis sacri ossis partibus pertingunt, secundum corporum longitudinem diffusi. Ac duo tenues in humilima penis sede exporriguntur, vnus vtrinque ad meatus vrinæ seminique communis latera. Quinetiam & alius subinde conspicuus est, superiori corporum sedi, quæ hæc inuicem connascuntur expensus. His nervis membranea vincula superiorem corporum sedem, quæ primum sursum ducuntur pubis ossium commissuræ ad eam vsque partem neccentia, quæ primum penis orbiculatim cute obtegitur. Porro inuolucrum glandis, seu cuticularis excrescentia, quæ glandem regit, *πρόσθητον* Græcis, *praeputium* Latinis nominatur. Inferior autem penis per eius longitudinem vergens, & futuræ modo protuberans linea Græcis *ῥαφή*, Latinis *sutura* nominatur. Totam hanc ex-

E porrectam extuberantemque ad anum vsque penis partem, Græci *τῷεν*, Latini *taurum* appellant. Vti & sedem inter testium inuolucrum, quod scrotum nuncupatur, & Taurorum anum conspicuam *μεταῖον*, id est, *interfeminium* dicitur. Ceterum musculi quatuor penem adeuntes *lib. 2.* descripti sunt.

Gland.

Venæ, arteriæ.

Nervi.

Vincula.

Præputiū.

Πρόσθητον.

Ραφή.

Ταυρῶν.

Μεταῖον.

Μεταῖον.

Μεταῖον.

Μεταῖον.

Nomina.
Vteri ſitus
in non præ-
gnantibus.

Vteri ſeu vulvæ, quæ Græcis μήτρα & ὤστρον dicitur, cervix, a mulieris pudendo recta ſurſum ſub pubis offibus, & ſecundum recti inteſtini ductum in peritonæi cavitatem tantisper aſcendit, donec paulo demiffius, quam e directo ſedis perſtingat, quæ a pubis offibus rectorum abdominis muſculorum principia pendent. Inibi enim cervix in fundum vteri, aut fundum ipſum in cervicem deſinit, & rariſſime altius protenditur, ac proinde humilior fundi pars hic habetur. Superioris vero ipſius partis, & laterum ſedes pro magnitudine ipſius variant. Quanto enim maior magisque diſtensus eſt vterus, tanto elatius ad umbilici regionem protenditur, atque ad ilia magis accedit. In nullis tamen omnino mulieribus vtero non gerentibus fundum ſacri offis initium inſimæ lumborum vertebræ coarticulatum ſuperat, neque in illis fundum & cervix in poſteriori parte aliud præter rectum inteſtinum tangunt, vixque ipſius etiam vincunt amplitudinem, neque elatiſſima fundi pars tam alte atque recti inteſtini ſedes, in coli anfractus ducta præreſcit. Anterior vteri pars veſicæ obtegitur, hic tamē humiliſſima omenti parte in illis interueniente, quibus ad ſurſum verſus lienem non conuolutum omnibus inteſtinis obducitur. Omenti enim moles longitudoque tanta eſt, ut inter vterum veſicamque facile implicari, atque quod Hippocrates *s. aphorif. 46.* de obefis dixit mulieribus, *vteri os ne apte concipiant, leuiter comprimere poſſit.* Anteriori autem vteri cervicis parti, veſicæ quoque fundum illic, ubi vteri cervix fundo ipſius contermina eſt, incumbit. Per reliquam enim ſedem, quaſi ad pudendum, & collum veſicæ, quod breuiſſimum eſt, ipſi duntaxat exporrigitur. Verum quia vteri cervix veſicæ collum longitudine ac latitudine plurimum ſuperat, tota cervicis vteri pars, veſica, ipſiusque collo non operta, eam peritonæi ſedem contingit, quæ internam pubis offium regionem ſuccingit. ¶ Cervicis fundique vteri latera, vaſa, quæ vterum adeunt, & membranas illum proximis partibus neceſſantes ſpectant. Atque ita vterus fere in non prægnantibus habet. In vtero autem gerentibus ſuper gracilia inteſtina ſub omēto & peritonæi anteriori parte ducitur, ilia quoque quum partui vicinior eſt, impenſiusque turget, inſigniter opplens. Vnde etiā humilior fundi pars, qua is in cervicē deſinit, iis etiam altius quam in non prægnantibus aſcendit, & vteri cervix illis mulieribus ſurſum tracta, ac in longitudinem ducta, preſſius quam ceteris arctatur. Quinetiam vterus iis non ad amuſſim, ut alias, mediam, quod ad dextrum & ſiniſtrum attinet, ſedem occupat, ſed quaſi apice elatiori in dextrum aut ſiniſtrum magis, quamuis modice, vergit. Quod etſi plerumque fortuum ſexus ratione, ut atteſtatur. *s. aphorif. 84.* Hippocrates, fit, non tamen perpetuum eſt. Locatus eſt autem in humiliſſima trunci corporis ſede, quod ad concubitum ſeminisque ſuſceptionem, & adhuc ad concepti fœtus augmentum, perfectique partum, nulla aptior excogitari poſſet. Nulla præterea offa, quo minus in miram amplitudinem diſtendi queat, inibi præpediunt, atque etiam ipſi parituro hinc ad inferiora & crura verſus facilis eſt exitus.

ſitus ratio.
Vteri forma.

Muliebris vteri forma, potiſſimum in prægnantibus veſicam ad amuſſim prope modum, refert. Quippe illis vteri fundum, ut & veſicæ, amplum admodum magnumque eſt: & cervix, ſi hanc ad fundi amplitudinē contuleris, anguſta. In non prægnantibus autem cervicis latitudinem fundi latitudo vix ſuperat: & ſi cervicem vel leuiſſimo conatu dilatare conaberis, iam eius latitudinem plurimum fundi latitudinem vincere ſpectabis, quum fundi ſubſtantia, utcumque protendenti haudquaquam ſequax ſit, ac proinde etiam iniqua vteri in iis, quæ gravidæ non ſunt, ad veſicam eſt comparatio. Deinde veſica, quod ad latitudinem attinet, exacte orbicularis eſt: vteri autē fundum non prægnantibus anteriori, poſteriorique partibus, ut latius craſſiusve euadat, comprimitur. Veſicæ etiam ſuperior pars exacti globi inſtar paulo minus rotunda eſt. Nam quæ urinaris meatus urinam e fœtu per umbilicum deducens ab ipſa pronāſcitur, velut in acutum aſſurgit. Vterus autem hic obtuſus eſt, & quartam circuli partem etiam non nihil erectam, aut nouilunii imaginem refert, non aliter, quam ſi ſuperior fundi pars utrinque obtuſum conſtitueret angulū. Ab huius partis ſuperioris lateribus, vteri fundum ſenſim, ſed modice interim arctius redditum, deorſum ad ipſius cervicis originem fertur: ita tamen ut totus vterus non multo fiat prolixior quam latior, ceruice interim

- A** interim inftar oblongi meatus longa & tereti. Vteri autem fundo forma rotundæ proxima conuenit, vt reddatur capacius, iniuriisque minus fit obnexium. ¶ Fundum vteri Vteri superfices cuiusmodi. omni ex parte præterquam in lateribus, vbi vasorum membranarumque fiunt applantationes, externa superficiei læui & æquali, & veluti madente linteo absterfa, subrubricanteque constat. Cervicis quoque exterior superfices in posteriori parte ab vteri fundo nonnihil vltra mediam ipsius longitudinem, & anteriori quoque parte fundo propinquior, læuis & humecta, magis tamen quam fundi superfices candicans cōspicitur: per reliquam vero externam sedem propter aliarum partium adnexus aspera, eorum quæ inuicem adnascuntur modo exsistit. At interna fundi superfices non prægnantibus æqualis quoque ac læuis, vt inanitarum vesicarum cavitates apparet. ¶ Porro præter vesicarum cavitatem humanus vterus, vt virorum scrotum, leuem & perquam modice extruberantem futuram, seu tenuissimæ lineæ inftar prominens tuberculum habet, secundum vniuersæ superficiei longitudinem, & antè & postè exporrectum, quasi quoddam sinistra a dextra superficiei interstitium censendum esset. Superficies hæc fundi vteri sinus est, semen genitale suscipiens, foetumque continens, quem Mundinus, & alii quidam tum Theologi scholastici, tum Iurisperiti huius somnia sequentes, non vnum enumerant, sed septenario numero eum complectentes, septem matricis cellulas recensent, tres quidem in dextra vteri sede, masculis suscipiendis aptas, tres vero in sinistra foeminis dicatas: septimam autem in vteri medio statuunt, illam ni fallor, hermaphrodytis consecrantes, *vt copiosius libro tertio, paradox. capit. 9. demonstrauimus.* Error Mā-
dini & aliorum hunc sequentiū de matricis cellulis.
- C** mus. Vnica itaque duntaxat in vteri fundo cavitates est, latior quidem & altior, quam profundior. Vnica, quod vnicum foetum complecti debeat, attamen latior quam spissior est, quod interdum & gemellos concipiat. Non enim geminus cernitur, & intestini inftar oblongus, qualis cani & sui, ac illis denique animantibus obgit, quæ plures simul foetus semper propemodum enicuntur. Hæc sane cavitates siue sinus in humilima sede iuxta fundi foramen, pro illius foraminis amplitudine angustior est, deinde secundum vteri formam sursum dilatatus, in elatiori sua sede velut in duos, cessat angulos, ad elatioris vteri partis latera conscendentes. Media enim sedes elatioris sinus partis non tam alte atque latera ipsius conscendunt, vteri substantia deorsum hic quasi septum aliquod, in suam amplitudinem spectante. Hic sinus in non prægnantibus plurimum viscido quodam & subalbo mucosus illitus, & læuis, ac extruberantiori linea interfectus. In angulis illis aut in superioribus ipsius apicibus rugosiores, ac omnino illi cavitati similis, in quam deferentia semen vasa in viris inferuntur. Hæc quidem internæ fundi superficiei sinusue vteri est descriptio. ¶ Interna autem cervicis vteri superfices magna ex parte varia est. Quum enim conuiuet, neque alias distenditur, vndeunque rugosa implicitaque est, ac in se concidit: si vero admodum distenditur, exacte læuis & lubrica secundum vniuersam ipsius longitudinem, præterquam ad eam partem, qua in pudendum terminatur. Hic namque perpetuo præter laxos amplexus, cuticulatæ illas carunculas tuberculaque, non æqualiter omnibus mulieribus propendula adipiscitur, quæ *ῥυμολη* Græci vocant. Ad hæc in anteriori cervicis *ῥυμολη*. Interna cervicis superfices cuiusmodi.
- E** sed paulo supra pudendū, vbi vesicæ collum ipsi inseritur, non ad amissim æqualis est. Nam vtrinque ad insertionis latera tenuis vteri cervicis portiuncula excrescit, in ipsius amplitudinem propendens, ac illis membranis processibus forma, perquam similis, qui vrinæ in vrinarios meatus e vesica, & bilis ex duodeno in deferentem illam meatum, regressum præpedire diximus. Haud secus quam si vteri cervix vrinam admitteret, penduli vero processus vrinam in vesicæ collum regurgitare prohiberent. ¶ Præterea vteri cervicis amplitudo toto ipsius ductu non angustatur, & eiusdem est amplitudinis qua fundo continuatur, ac qua in pudendum cessat. Verum in huius amplitudinis finem seu elatiorem sedem fundi orificium prominet, nusquam cervicis latera suo mucrone contingens, neque propter cervicis contractionem aut distensionem mobile. Porrigitur enim ex humilima fundi sede in hanc cervicis regionem vteri substantia obtusioris in pene glandis modo, cui transuersa scissura seu foramen inest, quod vteri aut fundi ipsius os vocari solitum est: quemadmodum muliebri pudendum cervicis vteri os nuncupamus. Hoc prægnantibus rugosum admodum est, & perquam angustum, vt specillum nisi validius impulsus vix admittat. Quæ nuper pe-
- Amplitudo Fundi vteri os cuiusmodi.
- Vteri os. Pudendum muliebri.

pererunt ampliorem hanc scissuram, minusque contractam rugosamue habent: non
 pręgnantes autem, medio habent modo. Ceterum os fundi non semper in coitu ape-
 ritur, sed quum virile semen appetens, id naturali motu iugendo allicit, & quando v-
 terus non concepturus, virile semen vna cum muliebri semine iterum eructat, aut in
 pollutione, vel affricu muliebri duntaxat semen excernit. Nequaquam enim disten-
 ta in coitu pro penis mole vteri ceruice, simul quoque id perpetuo recluditur. Quod
 non temere a natura factum est. Non enim decuit mulieris arbitrio os illud subici, vt
 scilicet cum vellet aperirerur occludereturque. ¶ Nam alias maxima successione spe-
 ciei noxa, mulieres subinde genituram pręter sententiam non retinerent, magna-
 que licentia nullo habito conceptionis metu parentibus maritisque imposerent si fun-
 di orificio Natura musculos arbitrarii motus opifices elargita fuisset, idque ita vt cer-
 uicis vteri fundi os semper aperire potuisset. ¶ Etsi autem toto hoc tempore quo vte-
 rum gerit mulier, ad amissum contractum conclusumque sit vteri os: tamen in par-
 tu adeo aperitur, extenditur, remittiturque, vt foetus hac procidat. Quid multa? os
 fundi semper conniuet, nisi quum naturali instinctu semen admittere, aut foetui, aut
 mensibus iter prębere debet. Ad vteri formam ipsius cornua spectant, quę Diocles in
 mulieribus oportunissime iam enascentibus bouum cornibus assimilauit. Quemadmo-
 dum enim vitulorum capita vtrinque qua pronascentur cornua extuberant: ita etiam
 superior vteri pars, vtroque veluti in duos obtusos desinit angulos, qui reuera vete-
 ribus anatomicis, hominum cadauera secantibus cornuum vice habebantur, vasorum-
 que semen muliebri deferentium insertionem excipiunt. Hęc itaque muliebris vte-
 ri sunt cornua, a caprinis, & vaccinis, & ouillis, quę arietum cornibus vndecunque si-
 milima existunt plurimum distant. Id quod de canum & suum vtero rectius dicitur,
 qui vterum statim a fundi ipsius orificio in duas partes ita diremtum gerunt, ac si in-
 dicem a medio maxime diduceres, illosque digitos vteri partes esse fingeres, quę in
 non pręgnantibus recta quodammodo ducuntur, & in apicem mucronemue sensim
 non secus desinunt, quam si recta, non autem obliquata essent cornua: in vtero autem
 gerentibus arietis cornuum modo & hęc quoque inflectuntur. Et de his quidem ani-
 mantibus ex quorundam veterum sententia recte a Galeno in libello *de vteri sectione*,
 prolaturum est, *in cornibus completi fetus*. Vteri magnitudo variatur, nam quod ad fundi
 eius molem spectat, hanc pro contenti foetus feminisue quantitate distendi contrahi-
 que constat. Paruus autem ac magis quam facile credatur in non pręgnantibus con-
 tractus videtur, vt scilicet quam minimum alia tunc comprimeret instrumenta, & si-
 num ipsius adeo angustum redderet, vt quam proxime vniuersam genituram ample-
 teretur, eam nulla ex parte a se intactam relinquens. Idem quoque de eius ceruice cen-
 sendum erit, quę modo varie complexa rugosaque conniuet, modo in coitu pro penis,
 in partu vero pro foetus mole distenditur. Et quemadmodum latitudo ceruici eadē non est,
 ita quoque longitudo. Nā si inter dissecandū vterū attollas, in mirā longitudinem ceruix
 porrigit: adeo vt non minus ridiculū sit vteri ceruicis longitudinem vel latitudinem, q̃
 penis describere. Quin etiam vteri ceruix, pro mulieris libidine turgidior, angustiorque &
 directior: pręterquam q̃ aliis sit natura strictior, efficitur. Pręterea vterus in eū modum
 a peritonæo ligatus pendet, vt ipsius fundum sursum & deorsum plus minus in coitu se-
 se ducere, & ad penis sumum tanquam animal quoddā, vt Plato dicebat, dehiscere queat.
 Quanquam vetulis, & iis quę sæpius pepererunt, aut rudius ab obstetricibus in secun-
 darum euulsione sunt tractatę, fundi os in pudendū quasi dependet, ac proinde breuissi-
 ma implexaq; in illis ceruix videtur. Quod vero puellis vteri fundum minus sit, quam
 illis, quę iam diu coierunt, aut aliquando vterum gesserunt, omnibus est in confesso
 anatomicis. Atque hactenus de vteri magnitudine, quę in non pręgnantibus frequen-
 ter tanta est, quantam Vesalius noster in figura 27. lib. 5. suę anatomies expressit. ¶ Ceterum
 vteri fundi non pręgnantium substantia neruea membranaque existit, sed crassa
 admodum, compactaque, neque nimium pura, & nō ad amissum, vt cetera neruosa, can-
 dicans, sed carneum aliquid prę se ferens. Hęc vteri substantia æqualis duritia, con-
 tinuaque passim est, nisi fortassis ad fundi foramen paulo durior collectiorque euadat.
 Ac proinde commoda ipsius functioni constat substantia, quę affatim scilicet contra-
 hi colligique quum nihil completiur possit, & rursus pro contenti augmento sensim
 in miram

Vteri cor-
dua.Magnitu-
do vteri.Vteri fundi
substantia.

- A** in miram magnitudinem & amplitudinem distendi. In exteriorem huius substantiæ superficiem venæ obscuræ, gracilesque, sed admodum frequentes integro adhuc vtero excurrunt, quæ inter internam, externamq; vteri tunicam porriguntur. Sunt enim duæ Vteri tunica.
Externa. vteri tunicæ, exterior vna, quam à peritonæo validam & crassam, ut sit propriæ ipsius tunicæ veluti inuolucrum, & tutissimum propugnaculum obtinet. Hæc oritura membranis vasa vterum accedentia continentibus, vterumque peritonæo committentibus. A peritonæo enim quæ vasa ipsi connascuntur quæ a maxima vasorum distributione supra os sacrum facta, versus crura tendunt, ipsius peritonæi partes processusque enascuntur, qui sunt instar duarum tenuium membranarum in ipsarum medio venas & arterias deducentium, & multo adipe oppletarum. Tales sane membranæ a peritonæo vtrinque procedentes, toti cervicis & fundi vteri lateribus ad eum modum committuntur, quo mesenterium intestinis tertiam obducit tunicam. Hæc itaque peritonæi membranæ vtroque vterum accedentes, in secundam ipsius tunicam degenerant, longe crassiorem ea quam mesenterium intestinis offert: quod scilicet quatuor peritonæi portiones, vtrinque nimirum duæ, eam efformant, quam intestinorum tertiam tunicam duæ tantum membranæ constituent. ¶ Interna fundi vteri tunicæ ipsi peculiaris ac propria est, neque a peritonæo pendet, & eam quam iam narrauimus vteri substantiam constituit. Hæc in non prægnanti vtero crassitie omnes reliquorum corporis organorum tunicas vincit. Ipsa tamen omni ex parte non pariter crassa visitur. Vbi enim fundi efformatos, crassissima est, & paulo quam alibi compactior. Deinde etiam in media sedē superioris fundi partis crassa quoque admodum est, & in ipsum quasi sinum extuberans. Quæ vero vterus in obtusos angulos desinit, semenque suscipientia vasa excipit, hæc tunica tenuior minusque spissa secantibus occurrat. In lateribus autem & anteriori ac posteriori sedē pariter crassa visitur, adeoque compacta, ut nihil præter ipsius substantiam citra fibrarum quibus abundat, distinctionem intueri liceat. Hæc itaque interna vteri humani tunica simplex, & minime gemina, ut quidam falso putant, existit. Quod vero vnica eademque crassa contentus fuerit peculiari tunica, neque duas cum ventriculo, carnosam videlicet vnā & nervosam alteram obtinuerit, ideo factum est, quod contineret tantum vterus complectique debeat, non autem ventriculi modo præter hæc aliud quippiam a proprio nutrimento concoquere & elaborare. Quod vero in libello, *de vteri dissectione* Galenus & alii hanc tunicam geminam & venosam esse tradunt, in dextris vnā, & in sinistris aliam, quasi vtriusque manus concava simul ex opposito iungeres, ac singulas manus singulas esse tunicas fingeres, id ipsum de vaccino vtero vere dicitur. Hæc enim non vnica, sed gemina vtriusque scilicet partis vna peculiaris, ita nimirum ac si indicem cum medio sibi iunctum conspiceres, aut duorum cornuum radices internis lateribus inuicem committeres. Porro interior vteri tunica tanto tenuior rariorque, & magis nervea visitur, quanto magis vterus ipse in magnitudinem promouit. Triplici autem fibrarum genere intertextitur, ac rectas quidem intimas habet, sed eas non ita numerosas. Extimas orbiculares transuersasque obtinet, rectorum copiam vtrunque vincentes. At medias, quæ obliquæ sunt, possidet plurimas, easdemque robustissimas. Rectas autem ideo intimas habet, quod ante omnia semen allicere debeat: easdem quoque paucas possidet, quod ocyus semen illi placens, ac fluidum aptoque membro porrectum in illum labatur. Obliquas vero plurimas, easdemque rectis ordine succedentes obtinet, quod id quod conceptum est diutissime retinendum sit. Transuersas autem extimas nanciscitur, quod illas vterus tum primum maxime requirit, quum foetum diu satis amplexum in lucem est editurus. Cervicis vteri substantia aliquid commune cum penis substantia possidet. Quemadmodum enim illa inuolucro internerum carnemque substantiam medio conformatur, fungosaque & spongiosa substantia oppletur: sic quoque & cervix vteri carnea nerveaque constituitur tunica, eiusmodi etiā substantiæ fungosæ non nihil possidente. Atque huius substantiæ beneficio vteri cervix penis modo muliere Venerē appetēte extuberat, pudēdiq; ipsius colliculi, quas alas alii nomināt, ac cuticulares illius carūculæ extra cervicis initium ne vterus frigore afficiatur prominent, cervicisq; amplitudo penē amplexura arctatur, & quod ad rectam virilis seminis eiaculationem sat est dirigitur. Præterea cervix in puellari ætate delicatior molliorque est, contra in proeuntioribus, & iis quæ frequentius

Cervicis vteri substantia.

Colliculi seu alæ vteri cervicis.

pepererūt, calloſior temporis ſucceſſu redditur, *vt etiam, quemadmodum Gal. quoq; in libro, de vteri diſſect. teſtatur*, cartilagini aſperæque arteriæ illa in vetulis ſubinde aſſimiletur. Atque inſigni prouidentia in vteri cervicis ſubſtantia efformanda natura uſa eſt. Nam vt ea dirigi diſtendique ad ſeminis ſuſceptionem facile poſſet, & ruruſ ne vteruſ refrigeraretur, locuſq; ſeu amplitudo fruſtra inaniſ ſeruaretur, colligi & cōuolutim occludi, queat, ita exſtructa eſt. ¶ Porro mulierū teſtes vteri accumbūt lateribus, paulo quidem elatius quam fundi ſuperior pars conſiſtit. Innituntur autem peritonæo ea parte, qua ilium oſſa ſacro committuntur, omnino laxi, neque aliter quam ſeminalium vaſorum beneficio peritonæo connexi. Hi virorum teſtibus minores multo ſunt, forma autem oblongiores, & ſecundum latitudinem minus rotundi, & quaſi latiores quam ſpiſſiores effici deberent, anteriuſ poſterioruſque depreſſi. ¶ Externa ſuperficiuſ inæqualiſ, ac haud ſecus quam multæ eadēque exiguæ vna colligarentur glandulæ, multis inæqualibus tuberculis oppleta videtur. Subſtantia non conſtant, vt virorum teſtes, molli, ac innato ſibi humido, læui, continua & æquali: verum duriori, meſenteriique & inferioriſ omenti membranæ glandoſo corpori non abſimili, & præter exiguoſ venarum ac arteriarum in ipſa conſiſtenteſ plexuſ, ſinuoſa cauæque. Habent enim mulierum teſteſ intuſ præter vaſa ſinuſ quorūdam tenui aqueoque humore plenuſ qui priuſ non læſo teſte, ſed vi compreſſo, ac inflatæ veſicæ modo crepante, in miram altitudinem inter diſſecandum nō ſecus quam ex ſcatūrigine quapiam exſilire ſolet. Huiuſmodi ſinibuſ nulla peculiaris eſt forma: inæqualiſ enim, vt exterior ipſorum teſtium ſubſtantia ſunt, & non vnus, ſed plureſ, neque illi ſemper iidē viſuntur. ¶ Hæc teſtium ſubſtantia membranæo inuolucro vndiquaque circumdatur, quod ipſi validiſſime adnaſcitur. Et hoc quidem durum eſt, ſed tenue & longe illi inuolucro quod virorum teſteſ proxime ambit, duritia & craſſitie cedent, neque adeo prompte a teſtium ſubſtantia inter diſſecandum ſeparabile, & ſui teſtiſ ſubſtantia magiſ participant. Præſent inuolucrum mulieribuſ eundem quem viriſ uſum præſtat. Seminariis enim vaſiſ excipiendiſ aptum eſt, teſtiumque continet ſubſtantiam. Præter hanc tunicam mulierum teſteſ nullum habent inuolucrum, niſi quod in ambitu peritonæi membranei proceſſuſ ſeminaria vaſa continenteſ, & veſperilionum aliſ longe ſimilimiſ, teſtium mediam duntaxat partem integunt, non autem vt exterior viriliſ teſtiſ tunica, proriuſ induunt. ¶ Seminaria vaſa mulieribuſ ſimiliter ac viriſ duæ ſunt arteriæ, & totidē venæ, parem omnino cum virorum vaſiſ ortum ſortitæ, ac progreſſu diſtributioniſque ſerie differenteſ. Dextra enim vena & arteria, quemadmodum & alteriſ lateriſ vaſa a primo ipſarum ortu dextrorſum peritonæo, vt in viriſ, firmata ad ſui lateriſ teſtem deſcendunt, ac quūm primū arteria venæ committitur, ambæ inuicem, vt virorum vaſa poſtquam aliquouſque e magna peritonæi amplitudine exciderunt, implicari inuoluique incipiunt: non quidem vniuerſum ipſorum corpus in implicationem abſumentēſ, verum mediam ſui partem vena & arteria in ſuperiorem ſui lateriſ fundi partem deriuant, multiplici ſobole in vteri fundum excurrentem. ¶ Quod vero ex implicationiſ initio reliquū eſt, paulatim magiſ magiſque, vt in viriſ, inuoluitur, varicoſumque illud corpus efformatur, ſua baſi elatoriſ teſtiſ parti adnatum, & ſimiliter atque in viriſ teſtiſ ramoſ in ſubſtantiam, & illum ambiens inuolucrum diſfundent. Dein vaſ ſemen deferent ſecundum teſtiſ corpus, vt in viriſ habet: quanquam magiſ teſtiſ orbiculatim, quam in poſteriori ſolum ſede aduoluitur. Ab interna enim ſede varicoſiſ corporiſ incipient, externo teſtiſ lateriſ, & deinde inferiori ipſiſ parti, & non niſi interno quoque lateriſ adnaſcitur, haudquaquam tot inuolutionibuſ, qua teſtiſ adnaſcitur, ac virile vaſ donatum. ¶ Porro a teſte non niſi ſuſum aſcendent, & teſtiſ non ampliſ adnatum, reuolutioneſ eaſ inſtar vermīſ æqualiter procedenteſ amittit, actereſ planūque inſtar nerui in vterum errabundo ductu fertur, in mediam cornu dextri ſedem inſertum. Porro hæc vaſa pinguiſ membranīſ peritonæo prænatīſ ſuffulta tuto porriguntur. Atq; hic vaſorum ſeminalium in mulieribuſ ortuſ & ductuſ, ipſaque teſtium ſubſtantia & conformatio ac ſectio muliereſ habere ſemen liquido docent, vtcunq; temere Ariſtor. refragetur. Verum id humidius & frigidius, quod teſteſ ipſiſ & minoreſ ſunt, & mediam duntaxat venæ arteriaq; ſeminalium portionem aſciſcant. ¶ Ceterum præter venāſ & arteriaſ a ſeminalibuſ nateſ vaſiſ magnāſ & conſpicuaſ frequentēſque vterum intertexenteſ, & ad internam ipſiſ ſuperficiem

Darton &
epidymi-
da intelli-
git.

Semina-
ria vaſa in
mulieri-
buſ eiuf-
modi.

Muliereſ
ſemen ha-
beat.

Vteri ve-
næ & arte-
ria.

- A** perficiem in prægnantibus, usque ad secundas dilucide procedentes: alia multo insigniores a caua & arteria magna post illarum supra sacri ossis initium diuisionem accedunt. Postquam enim ea vasa primum in duos insignes truncos diuiduntur, & hi rursus singuli in duos insignes, sed amplitudine impares ramos dissecti sunt, vnū quidem, qui maior est, ac per inguina crus accedit, alterum vero humiliorem minoremque, cuius finis per pubis ossis foramen elabitur, vteri venæ & arteriæ oriuntur, a minoribus humilioribusque; secundæ illius diuisionis pronatæ. ¶ Rami itaq; in dextro consistentes, vt qui in sinistro sunt quoque, insignem porrigunt propaginem: vena quidem venam, arteria autem arteriam, quæ simul accumbentes, dextrum vteri latus prope fundi os accedunt, vbi in multas scissæ soboles, quasdam sursum in humiliorem fundi sedem exporrigunt, quasdam per vteri ceruicem deorsum digerunt. Quæ vteri fundum accedunt, non prægnantibus quodammodo graciliores & pauciores apparent; quam quæ ceruici & potissimum iuxta fundi os implicantur. ¶ Porro ora & fines venarum & arteriarum Gal. lib. 1. de semine & 5. aphor. com. 45. teste ad vterum venientium, per quos singulis mensibus superuacuis sanguis a toto corpore in vterum deriuatur, & ex vtero in secundam pertinentium, Græcis *κετυλησφες*, Latinis *acetabula* nominantur. Sic dicta vero Galeno in lib. de vter. dis. teste, sunt, quod in prægnantibus hæc vasorum ora turgida sint, & eminentias ad acetabulorum similitudinem habeant, quales in sede hæmorrhoides, e quibus paulo post profluxurus est sanguis, obtinent. In vaccis autem, ouibus, & capris verius, quam homine, acetabulum seu sinum foliorum herbarum acetabuli exprimunt. Hinc est, quemadmodum Galen. ad finem lib. de vter. dis. scribit, quod nonnulli vterum humanum cotyledones habere negauerint. Prædictis autem venis, quas in fundum vteri & ceruicem pertinere diximus, vterus, & quando concepit mulieris, quæ fundo peculiare sunt, foetus quoque nutritur. Mulierum quoque menstruarum purgationes ex iis, quæ vterum petunt, venis vacuantur. Vna cum præsentibus vteri venis & arteriis ab ossis sacri neruorum paribus vtrinque etiam nerui deducuntur, tenuibus furculis potissimum in vteri ceruicem, & circa humiliorem fundi sedem excurrentes, vesicæque ramos prominentes. Ad elatiorem porro fundi regionem subinde neruuli perquam graciles diffunduntur a sexti neruorum cerebri paris ramis deducti, qui costarum radicibus exporriguntur. Atque vt hi neruuli prætenues albicantesque sunt, & pinguibus membranis suffulciuntur, ita quodque inter dissecandum difficulter occurrunt. ¶ Vtero autem, & potissimum ipsius ceruici, vt exactiori sensu donarentur, nerui illi frequentes inserti sunt. Nunc tandem superest, vt quas partes tangat solum, & quibus alligetur & adnascatur, exponamus. Anterior itaq; posteriorque & superior fundi vteri regiones nullis, quas contingunt, partibus adnascuntur. Tangere autem quam connasci ideo satius fuit. Si enim vteri fundum non prægnantibus incumbenti illi vesicæ, & quod ei subiacet recto intestino connasceretur, neque laxis illis, sed duris vinculis, quibus accumbit, partibus, alligaretur, non posset tunc vna cum foetu comode distendi, nec in partu deorsum repere. Latera vero connascuntur membranis vasa deducuntibus, & vterum peritonæo valide colligantibus, exterio-remque vteri tunicam producentibus, ac demum carneis illis fibris intertextis, quæ duos efformant musculos, quorum beneficio voluntario motu non nihil sursum, dum mulieres ilia trahunt, & quasi colligunt, allicitur, quique adeo oblique prorepunt, & quæ vterum accedunt, adeo crassescunt, vt cornua vteri illos musculos esse aliquis existimare posset, præsertim quod obtusi muliebris vteri anguli cornuum, vt dictum est, imagini non accedunt. Ceruix porro vteri ex lateribus membranis quoque & vasis ipsi exporrectis adnascitur, & illorum interuentu peritonæo laxè connectitur. Posteriori parte per mediam longitudinem, qua fundo propinquior est, recto intestino ita innititur, vt accumbentes inuicem intestinorum gyros mutuo allocati cernimus. Verum ad ceruicis in pudenda finem, illa podici firmissime connascitur. Rursus ceruix anteriori sede elatius quidem ad fundi os innitentem duntaxat habet vesicam, sed paulo inferius fibris quibusdam humilimæ vesicæ partem, & ipsius ceruicem adnatam possidet. Vbi autem hæc illi inseritur, velut cœ vtriusque corpus & tunica efficitur. Ceterum in fine, qua ceruix in pudendum desinit, cœ vtriusque ceruicis scilicet & cutis, vt in labris & podice, corpus constituitur. Hæc cutis præterquam quod pilosa euadat, ipsi duriuscula substernit pinguedo in vetulis vna cum mamillis flaccescens, neque ita bene pudendi colliculos alia sive vt in iunioribus sustinens. Sunt præ-

Vteri vena
& arteria

Acetabula

Nerui

Quibus
partibus
vterus ad-
nascatur,
quas solū
tangit

Vteri mus-
culi

Promi-
na in cer-
uicis ore
carunculæ.
Nuppi.

terea primi in pudendo muliebri implexus & vtrinque vna prominens cuticularis carun- A
cula, longa quidem & tenuis, & ex longa basi in mucronem desinens. Has *nuppi* Græcis
vocari diximus. Hæ carunculæ in nonnullis mulieribus ad tantam molem perueniunt,
vt deformitatem inducant, & a vestimentis attritæ ad libidinem irritent, & Veneris ar-
dorem excitent. Vt vero vteri conuoluto & inflexus, ne ille frigore afficiatur plurimum
auxilii præstat: ita quoque coniucentes pudendi colliculi, & illæ cuticulares carunculæ
cervicis opplentes initium, eidem vsui, vt dictum est, accommodatæ sunt.

De inuolucris seu tunicis factum in vtero regentibus. C A P. I V.

Prima.

Fœtum, qui ex vtriusque, foeminae nimirum, & maris, semine, vt copiose admodum in
libro de sem. 2. Galenus ostendit, generatur, tres tunicæ seu membranae inuoluunt. Quas
sane natura, quoad eius fieri potuit, vnire voluit, vt quod roboris cuique priuatim a se- B
ipsa deerat, id omnes a sese mutuo adipiscerentur. Prima autem fœtus tunica, & extima,
fœtum, non eo modo obuoluit, quo nucleum a suo putamine obduci integique
cernimus, aut quo reliquas duas fœtum ambire dicemus: sed hunc duntaxat circulo-
rum vasa contingentium modo cingit. Haud quaquam enim superiorem, vt neque etiam
inferiorem fœtus partem contingit, sed tantum ita se habet, ac si quis a mucronata
pectoris ossis cartilagine ad elatissimam vsque ilium ossium sedem fascia impense laxa
cingeretur. Tunica enim huius latitudo ex fœtus proportionem tanta duntaxat est, quan-
ta longitudo a fœtus ilium ossium elatissima sede ad mucronatam vsque cartilaginem
pertingit, tantum abest vt fœtum vesicæ alicuius, aut ipsius vteri modo amplexetur.

Latitudo.

Amplitu-
do.

Craſſities.

Substan-
tia.

¶ Porro membranae amplitudo tanta est, quanta summa interioris vteri superficiei ex- C
tensio. Hæc n. externa superficiei vtero vndique contigua est, & adnascitur quoque. Dein
exacte consistit ad fœtus mediam regionem, si modo fœtum ita iacentem subaudias,
quemadmodum conuolutus implexusque in vtero secantibus occurrit. Ceterum ipsius
crassities nequaquam membranae modo tenuis est, sed quum fœtus ab vtero paulo post
resolendus est, vteri tunicarum crassitiem longe superat, & pollicis etiam crassitiem
facile æquat. ¶ Præterea substantia non constituitur membranæ, verum peculiari, &
cui in vniuerso corpore alteram non reperiatis similem, nisi fortassis lienis substantiæ as-
similare velis. Est enim huius tunicae substantia lienis modo nigricans, friabilis, fungo-
sa & frequentissima vasorum serie implicita. Quippe omnes venæ & arteriæ ab vtero
fœtum petentes, in hanc duntaxat tunicam pertingunt, neque vndique, in fœtus ambitu D
in aliquam vniuersum fœtum inuoluentem membranam finiunt, sed in hanc quæ Græci
ἡ δεύτερη, Latini *Secundam*, barbari *Secundinam*, nonnulli etiam *loculos* appellant. Non est
itaque extima hæc tunica seu secunda nisi multarum venarum & arteriarum quidam
plexus, interualla membrana obducta obtinens. Quippe vasa vterum implicantia suis
osculis in hanc tunicam, quam lato crassoque circulo recte contuleris, pertingunt ape-
riunturque, & ex singulis vasorum oris noua procreantur vasa tot numero, quot vasorum
ora tunicam hanc contingunt. Atque a venarum quidem oris venæ procreantur, ab arte-
riarum autem arteriæ: quæ quidem per huius tunicae substantiam varie admodum im-
plicitæ, tandem inuicem colliguntur, venæ quidem in venas, arteriæ autem in arterias,
& tantisper maiores paucioresque rami ita collecti in maiores adhuc coeunt, donec E
demum vniuersæ venæ in duos colligantur venarum caudices, & arteriæ item omnes in
duos arteriarum caudices. Venæ autem & arteriæ ad hunc modum ex secunda collectæ,
reliquis duas fœtum inuoluentes tunicas, de quibus mox dicemus, penetrant ad vmbili-
cum vsque, Galeno lib. 15. de vsu par. & de vteri dissect. teste, prorepunt. ¶ Quum autem ad
vmbilicum vsque venæ prorepserint, mox in vnâ coeunt venam, imo subinde etiam vna
tantum visitur vena simulatque a secunda abscedit. Hæc vmbilicum ingressa peritonæo
adnectitur, & sursum conscendens patulæ iecoris scissuræ inseritur, qua dextrum mu-
cronatæ cartilaginis latus, in anteriori iecoris sede hominibus, quibus id priuatim con-
tingit, habetur, & foraminis cuiusdam aut meatus modo hanc vmbilici assumit venam,
eamque per iecoris substantiam versus cauam iecoris sedem deducit, non procul a portæ F
venæ caudicis exortu. Arteriæ autem vmbilico insertæ deorsum ad vesicæ fundi latera
porrectæ, ramis magnæ arteriæ post præcipuam supra os sacrum arteriæ diuisionem
continuantur. Arteriæ enim vmbilicum ingredientibus, illis magnæ arteriæ propagini-
bus vniuntur, quas per pubis ossium foramina in crus descendere sequenti libro doce-
bimus.

Vmbilici
venæ du-
ctus.

Arteriæ
ductus.

- A** bimus. Umbilici venæ beneficio foetus nutritur, arteriarum vero munere ipsius infusus vīas calor reficitur, & spiritus vitalis illi distribuitur. ¶ Ceterum quando infans nascitur, hæc vasa simul cum meatu, quo ex vesica inter intimam & secundam, *ut paulo post latius dicemus*, foetus tunicam, illius vrina effertur, ab obstetricibus iuxta ventrem præscinduntur. Bruta vero animantia dentibus abrumpunt, inuolucra foetus plerumque deglutientia. Quod horum vasorum in corpore adhuc reliquum est, temporis successu exarescit. membranamque prorsus reddituum, & multa adipe obductum, instar funis suam cavitatem perperdit. ¶ Hæc itaque extrema foetus tunica aliud nihil est, ut diximus, quam plexus quidam & textum, in quod vteri vasa pertingunt, implicanturque, ea potissimum causa, ne tot vasa foetum subirent, quod ab vtero in tunicam hanc pertingunt, vīas.
- B** sed ut huius tunicæ beneficio collecta in pauca redigerentur: quæ per foetus umbilicum ducta, tunica tantum sede eademque tutâ foetum perforant. Exterior huius tunicæ superficies vniuersa interna vteri superficiei adnascitur, proximaq; est: interior autem ipsius superficies adhuc pertinacius obnascitur secundæ foetus tunicæ, quam nunc describemus. *Secunda* itaq; foetus tunica a farciminis figura eleganter admodum *ἀνατροχίς* veteribus est appellata. Quum enim inter dissecandam extremam tunicam ab vtero diuulsa est, aterq; & nigricans subviridisq; sanguis ab illa profluxit, nullaq; alia foetus tunica effracta, foetus ab vtero eximitur, is vna cum suis tunicis farciminis alicuius non quidem oblongi, & quod ex tenuibus formatur intestinis, sed brevis, & ex crassiorib. intestinis formati, supraq; & infra confuti, non autem laqueo tantum intercepti, imaginem exprimit. ¶ *Secunda* namq; tunica intestino respōdet, foetus autem & omnia quæ hæc tunica amplectitur, intestino in parturitionem obtinent. Est n. secunda hæc tunica exacta membrana, venulis quibusdam & arteriis intertexta. Externa ipsius superficies rãta amplitudine, quãta est extrema foetus tunica, pertinacissime illi connascitur, & venulas suas arteriolasq; ab extrema foetus tunica, ut dictum est, assumit. Nullum enim vas immediate ab vtero in hæc membranam pertingit, etiamsi externa ipsius superficies reliqua, quæ extremæ non connascitur tunicæ, vterum, contingat, non tamen connascitur. Nullibi enim secunda hæc tunica vtero, nisi extremæ tunicæ interuentu nectitur, interior huius superficies ad amussim læuis est & humecta, neq; alteri parti cōnascitur, nisi puncto quodam, ut sic dicam, intimæ seu terciæ foetus tunicæ. Atq; is connexus umbilici vasorum ab extrema tunica per secundam & tertiam ad umbilicū tendentium fit interuentu. In reliqua enim amplitudine secunda hæc tunica terciæ nusquam adnascitur, & inter secundam hanc & tertiam tunicā vrina colligitur. A suprema enim foetus vesicæ fundi regione meatus quidam sursum per umbilicum in cavitatem pertinet, quæ inter secundam & tertiam consistit tunicam. Is sane meatus foetus urinam in illam amplitudinem defert, hincq; Græcis *ἰσχυρὸς* est appellatus, ut certe umbilicus non sit, nisi quatuor prædicta vasa, quæ in medio vrachum habent. ¶ Mira vero industria in hoc a natura formatus est, ut foetus urinam per vesicæ ceruicem reddens, illam corpori suo proximam tantisper, dum nasceretur, asseruaret, & eius acrimonia mordacitateq; mollis illa ac tenerula cutis erodatur vicereturque: sed ut vrina procul a foetus cute eius urinarii meatus beneficio, inter secundam & tertiam tunicam deduceretur, & ut statim de foetus quoque sudore dicemus, partus promittitudinem dum paulo ante egredientem foetum profluit, & vteri ceruicem humectando emollit ampliatq; plurimum iuuet. ¶ *Tertia* foetus tunica forma prorsus secundæ tunicæ respondet, sed minus est ampla, & longe tenuior, hinc etiam, a mollitie & teneritudine agnellorum nomine deducto, *ἀγνέλιον* Græcis dicta est. Tenuissima itaq; hæc membrana est alba, quemadmodum & secunda tunica, & venulis pariter ac arteriis implicita, foetui proxime & vndecunque obducta. Huius exterior superficies prorsus læuis & humecta est, neque vlli penitus parti adnascitur, nisi venarum arteriarumque umbilicum petentium interuentu. Hæ enim quum ab extrema tunica per secundam & tertiam umbilicum adeunt, secundam primæ committunt. Interior quoque terciæ tunicæ superficies læuis quoque & humecta est, foetui nusquam, nisi ad umbilicum, vasorum umbilici beneficio connexu. Inter hanc autem & foetus cutem sudor copiosus continetur, qui foetus est recremētum, ac ante partum non minus q̃ foetus vrina profluens ceruicem vteri rigando, foetui faciliore parat exitū. Deinde foetus cuti subflaua quædā & lutosa obducit substantia eius concoctionis, ut putamus, q̃ in singularū par-

Nam & *ἀγνέλιον* faciemem erat quod ex carne & farina subacta, incrassius intest. nū coniecta fiebat.

Ut hodie quum sanguis cum adipe in crassiora conicitur interstina.

Vrachus, Umbilicus quid.

Tertia foetus tunica, *ἀγνέλιον*.

tium enutritione fit, recrementum. Venæ & arteriæ hanc tunicam implicantes ab umbilici vasis, quum illam permeant: principium mutuuntur: quæ etsi sunt longæ, gracili-
mæ ac tenues, tamen inter dissecandum promte occurrunt, quod hæc membrana præ
ceteris corporis membranis tenuissima sit, & omnis prorsus adipis expers. Atque hæc
de foetus tunicis nos dixisse satis sit.

De mammillis. C. A. P. V.

Mammil-
larū situs.
artol.
15. 21.

Forma.

Substan-
tia.

Papillæ.
Fus.

Venarum
mammi-
larū pecu-
nium se-
ctia.

Quamquam mammillæ peritonæo nulla ex parte amplexentur, tamē quum foetus,
ubi is in lucem prodiit, alant, atque hoc nomine in instrumentorum generationi
subseruiendum numerum veniant: hoc quoque loco ipsarum historiam oportune pro-
sequemur. Mammillarum itaque, quæ Græcis *μαῖα* & *μαστὶ* dicuntur, situs nulli non con-
spicius est. Quippe super pectus ad ossis pectoris latera locantur, parti inferiori bra-
chium pectori admoventis musculi superstratæ. Vt autem hæc figura variant, sic quoque
parem non semper sedem occupant. Ampliores enim mammillæ latiori firman-
tur basi, propendulæ vero ac flaccidæ a naturali loco declinant. Quibusdam enim mulieribus
vicinius pectoris medium inuicem accedunt, quibusdam autem, quod pulcerrimum
ducitur, inuicem recedunt, thoracisque lateribus magis appropinquant. Forma illis pe-
ne propria semiglobum refert, quippe exterius rotundæ gibbæque sunt, ut scilicet iniuriis
minus sint obnoxie, papillam quæ Græcis *θήλα* nominatur, instar processus obtinentes:
intus vero seu posterius, quæ pectus spectant, leuiter admodum sinuantur, secundum
pectoris gibbum planæ, & amplæ basi, ut scilicet firma nitantur sede, commissæ. Porro
substantia earum glandulosa est, multo adipe abundans, & venis paucisque admo-
dum arteriis & nervis intertexta, ut in venis adductum sanguinem in lac familiare fœ-
tus, ut paulo post latius dicemus, alimentum conuertere queat. In glandularum autem
forma, substantia, multitudine & situ magna singulis temporibus est differentia. Viris
namque nullæ, & perquam paucissimæ, eademque aridæ sunt glandulæ, vti etiam admo-
dum puellis. Aliis vero frequentes extuberantesque adsunt duritia, & mollitie ac for-
ma variantes. Iuenculæ enim, quibus iam in mollem attolluntur mammillæ, genera-
tionique aptæ fiunt, harum glandularum habent copiam, sed inuicem compactarum &
durarum, nullog; lacteo humore oppletarum. Ceterum mulieribus ad papillæ centrum
vna magnæque & mammillæ modo effigiata habetur glans, cui aliæ frequentes, sed par-
uæ, & amygdalis a cortice liberatis similes in circuitu accumbunt, duriori adipe & ve-
narum & fibrarum ex carnea membrana in cutem pertinetium interuentu mutuo com-
missæ connatæque. Porro cutis mammillis obducta, reliquæ thoracis cuti congruit.
Mammillæ enim substantiæ, ut reliquo adipi, connascitur, pariterque inibi crassa est. At
ubi orbiculatim ad papillam nigricat, circulumque constituit, qui quæ Græcis appellatur,
pertinacius maxime in mamma glandi connascitur, velut plurimum nervorum, & te-
nuium instar fibrarum albicantium interuentu. Quinetiam cutis hic interdum tenuior
quam alibi euadit, fungolum quippiam, ut & Papilla adipiscens. Huius namque substan-
tia penis substantiæ accedit, hoc est, nerueque quodammodo cuti intus spongiosa substan-
tia oppleta, quæ dirigi ac vicissim laxari non minus quam penis apta, & pari sensu prædi-
ta est, ut nimirum tenerulo & nondum dentato foetus ori papillam lubentius mater ti-
tillandam pruriendamque inderet, & sugendam offerret. Obscure illi tenuesque nervi
ac prorsus fibræ modo albicantes in papillam pertinentes meatus venarum furculi sunt,
multiplici serie inter glandulas excurrentes. Porro venæ mammillis exporrectæ, a tri-
plici plurimum pendent radice. Axillaris enim vena thoracis amplitudinem egressa, ra-
mum insignem, in musculos pectori superstratos, & pectoris cutem ipsamque demum
mammillam, ut *libr. 3. cap. 15. dictum est*, depromit. Quæ etiam elatiorem scapulæ sedem,
& summum humerum implicant venæ, deorsum in plerisque mulieribus ante sectionem
conspicuos furculos in mammillæ cutem ipsamque mammillam deriuant. Apparent
enim crebro mammillarum cutis venæ in multis mulieribus, iis præsertim, quæ lactarunt,
insignes, subvirides, & errabundo ductu, ut in sura, tortuosæ incidentes. Venæ autem
mammillarum a tertia radice principium ducentes, non perinde in cutem atque prio-
res, sed in mammillarum substantiam penitus excurrunt, arteriis cocomitatæ perquam
gracilibus. Atque hæc præcipue sunt venæ in mammillarum constructione animadu-
tendæ, quandoquidem harum interuentu uterus cum mammillis consortii lege affici-
tur. Hæc

- A** citur. Hæ namque mamillarum venæ & arteriæ, a iugulo, vt libro tertio capi. 17. docuimus, deorsum sub pectoris ossis lateribus prorepunt, atque thorace excidentés, super anteriorem peritonæi transuersorumq; abdominis musculorum sedem rectis musculis exporriguntur, horum posteriori sedi innatæ: frequentesque soboles, donec ad medium illorum longitudinis deuenierint, huc illuc vtrobiq; emittentes. ¶ Ceterum hæ iuxta vmbilici sedem alias venas, & item arterias sub rectis musculis sursum conscendentes operiuntur, atque cum illarum ramis ita implicantur, ac si vtriusque manus digitos inuicem infereres. Neutiquam enim osculis suis ita conuiuent, ac si vtriusque manus digitorum apices e directo, non autem ex latere vna committeres. Hæc vasa sursum potentia a grandioribus cauæ & arteriæ truncis per inguina crus accessuris principium sumere, loco paulo ante citato commemorauimus. Quæ etsi ab eadem cum vterum perentibus venis radice non enascuntur, adeo tamen vtero vicina sunt, vt qui hic in vteri venis coaceruatur sanguis illis vasis excipiat, sursumque feratur, aut suis osculis sanguinem a descendentibus sub pectoris ossis vasis accipiant, & ad vteri venas & arterias diffundant. Hanc autem consortii legem quam venarum arteriarumque mutuus congressus ductusque efficiunt: Galenus copiose lib. 14. de vsu par. cap. 8. explicat, vt non sit opus hoc loco illam pluribus referre. ¶ Porro nervi semper iidem in mamillas pertingunt, ac sibi perpetuo similes sunt. Pendent autem ab illis qui subditis musculis exporriguntur, neque aliter hi in mamillarum quam reliquam thoracis cutem deriuantur, præter vnicum, qui subinde ex quinto costarum intervallo papillam adit, multosque illi surculos, vt suo dicemus loco, offert. Præcipuum vero mamillarum munus & officium in omnibus animantibus, quæ animal concipiunt, & in lucem edunt, est: vt tenero adhuc aciam nuper nato foetui alimentum suppeditent, sanguinem ex vasis prædictis elaboratum accipientes, qui subinde longo & errabundo itineris anfractu in lac conuertitur. Lactis itaque, quod est alimentum exacte elaboratum, gratia primum mamillæ creatæ sunt. Dein vt cordis sedem operiant, eiusque veluti quædam propugnacula sint. Atque hoc potissimum nomine homini in pectore collocantur. Nam hic situs lactis generationi propter cordis calorem non est ineptus, & reciprocum quandam calorem cordi retribuit. Mamillæ enim lanci penicilli, aut vestis ritu a corde caloris officina; prius excalefactæ calorem illum reprimendo reuerberant. Præterea cordis thoracisque continuus motus, cordisque calor ad lactis generationem plurimum conferunt. Non prætereundum autem hoc loco erit lac etiam nonnullis viris in mamillis generari, quod per suctum frequentiore prodit. Hinc est, quod Alexander Benedictus lib. 3. cap. 4. sue anatomies scribat, fuisse Syrum quendam, cui infans filius, mortua coniuge, supererat, qui vt vagientis filii famem depelleret, sæpius illi mamillas admouit, adeo vt frequenti suctu lacte tandem manarit papilla, quo subinde magna totius vrbs admirationis infans ille nutritus est. ¶ Papillam autem teneram & prominentem merito adeptæ sunt mamillæ, vt hanc angusto teneroque infantis osculo indutam, is contestim labiis molliuiculis constingat, & inferiorem deducens maxillam, & buccas contrahens lac attrahat. Vt autem in suctu infantis papilla turgidior proceriorq; quam alias redderetur, substantiam nata est talem, quæ & laxari concidereque, & a sua contactu intumescere, erigique posset. Atque hæc de mamillis dixisse sufficiat.

Vteri cum mamillis communio nis ratio.


Nervi mamillarum.

Mamillarum munus & officium.

Viris nonnullis lac in mamillis generatur. Papillæ constructionis ratio.

LIBER QVINTVS DE CORDIS STRUCTVRA, ET INSTRVMENTIS IPSIVS FVNCTIONI MINISTRANTIBVS.

Quomodo aer in respiratione digeratur, cordisque & ipsi administrantium partium functionis enumeratio. CAP. I.



Vv m præsens liber instrumenta aeream, quæ continuo defluit, substantiam restituentia, ac calorem innatum recreantia complectetur, non ineptè primum quo pacto aeris in respiratione ductus perficiatur explicabimus. Neq; enim aeræ substantiæ commodationem, vt lib. 1. de tuen. sanit. cap. 1. testatur Galenus, nisi respiratu & arteriarum motu tuemur. ¶ Aeris itaque per nares attracti copiosior portio in

Respira-
tio nō na-
turalis
quæ.
Exuffla-
tio.

Vitalis
spiritus
genera-
tio.

Pulsus &
respiratio
nis usus.

Situs.

Nomina.
Magnitu-
do.

Figura.

fauces ducitur, hinc in laryngem, & dein per totam asperam arteriam in frequentes ipsius per pulmonis substantiam propagatas soboles fertur. Postquam vero ab hac substantia emutatus, ac cordi quodammodo præparatus est, ab arteriæ venosæ furculis similiter pulmonis substantiæ intextis, ex asperæ arteriæ ramis elicitur, atque in sinistrum cordis ventriculum per arteriam venalem delatus, tenui feruidoque admodum, quem corinibi continet, sanguini commiscetur. Huius aeris qualitate in hoc ventriculo contenti caloris qualitas ventilatur, substantia autem caloris, quæ aere & spirituosus sanguinis exhalatione constat, illius aeris substantia enutritur. Quod vero velut fuliginosum ex hac cordis propria peculiariq; functione congeritur, rursus per arteriam venalem in pulmonem ablegatur, atq; ab asperæ arteriæ propaginibus exceptum, vna cum reliquo aere, quam ex illis propaginibus arteriæ venalis germina tanquam cordi ineptum non attraxerant, denuo per asperam arteriam, laryngem, & fauces, & nares educitur. Huiusmodi sane in naturali respiratione aeris ductus perficitur. In non naturali vero aer potissimum per os attrahitur efferturq;. ¶ Vocamus autem non naturalem respirationem, qua alterius quam temperatæ caloris innati qualitatis nomine utimur, ut cum ea qualitas aliqua ex causa in eum modum increuit, ut per nares adductus aer homini non sufficiat: aut quoties exufflationem: sic autem vocant, ut *lib. 4. de laborantibus locis cap. 7. Galenus attestatur*, quum affatim spiritus foras per guttur effertur: vocem, eiusq; generis reliqua, ad quæ secundo respiratione famulatur, tentamus. Ab aeris substantia in sinistro cordis ventriculo sanguini ibidem contento permixta, vitalis spiritus conficitur, qui ex hoc ventriculo in magnam arteriam vna cum sanguine imperu ruente ac feruido diffusus, per vniuersum corpus secundum arteriæ seriem digeritur, & calorem singulis membris priuatim innatum reficit temperatque, quod ipsius diffusum est instaurans, haud secus sane atque membrorum substantia a sanguine per venas adducto restituitur. ¶ Quemadmodum vero respiratione & sanguinis ex dextro cordis ventriculo in sinistrum assumptio, cordi ad vitalis spiritus calorisq; natui repositionem faciunt: sic materia a sinistro cordis ventriculo per arterias reliquo deducta corpori, aliarum partium spiritum & natium calorem recreat. Atque huius etiam rei gratia idem pulsus & respirationis usus censetur. Quod enim ex respiratione vni præstatur cordi, id ex pulsu calori qui in toto est animali accedit. Nam ut natius in corde calor per immisum spiritum refrigeratur, per emissum vero expurgatur: ita in dilatatione arteriæ aer attrahitur, in submissione vero seu contractione fuliginosum excrementum expellitur. Proinde quod inspiratio materiei in sinistro cordis ventriculo repositæ præstat, id reliquis partibus in pulsu arteriarum dilatatio largitur. Exspiratio autem arteriarum contractioni respondet, quemadmodum copiosissime Galenus in *libello de usu pulsuum* docet. Atqui quibus instrumentis hæc omnia perficiantur, iam ordine exponemus, a tunica costas succingente exordientes.

De tunica costas succingente. CAP. II.

Tunica siue membrana omnibus costis, præterquam duodecimæ a septi transversæ implantatione occupatæ, & toti pectoris ossi subrensæ, thoracis vero vertebrarum corporibus, & superiori septi parti thoracis amplitudinem respicienti obducta, & totius thoracis cavitati respondens, Græcis *πνεύμων*, Latinis *Succingens*, vulgo *Pleura* nominatur. ¶ Pertingit parte ipsius posteriori a prima thoracis vertebra deorsum ad vndecimam, e cuius regione septi pars arteriam magnam transmittens consistit. Anteriori autem ipsius parte a iugulo ad humilimam pectoris ossis partem, cui septum innascitur, descendit. In lateribus vero a prima costa ad superiorem septi superficiem, quæ thoracis cavitatem respicit, fertur, hanc vniuersam, ut & reliquam thoracis amplitudinem sublinens. Hæc tunica perinde atque thoracis cavitatis, figura admodum variat. Nam superiore parte, ut & thorax, angusta est, ac velut in acutum desinit. Inferiori vero parte latior, quam superiori existit. At in lateribus thoracis quoque latior, quam inferiori sedes visitur. Deinde anteriori breuior est, posteriori autem multo longior pro obliqui situm septi ratione existit. A pectoris n. ossis mucrone ad vndecimam thoracis vertebram pertingit. Rursus anteriori parte, ut & in lateribus exterius, quemadmodum & thorax ipse, gibba visitur. At posteriori secundum vniuersam longitudinem, velut ad amplitudinem ipsius internam impressionem peritonæi obtinet, atq; id ratione vertebrarum, & radicum costarum

A costarum. Vertebrarum namque corpora in thoracis prominenti cavitatem, vt & costarum radices, quæ a vertebrarum corporibus retrorsum tanisper reflectuntur, donec denuo versus anteriora deorsum præcedentes obliquantur. Interius omni ex parte læuis, & veluta quoque humore perfusa est, præterquã vbi membraneos quosdam processus exporrigit, ex quibus aut alias educit membranas, aut corpus aliquod sibi colligat. Nonnunquam etiam, sed raro admodum, non secus ac peritonæo, internæ huius tunicæ sedi adeps durior, idque præcipue, vbi vertebris propinquior est, quaque ipsius insigniores venæ porriguntur. ¶ Præterea modo in vno, modo in altero latere membraneas fibras pulmoni applantat, quibus illum sibi admodum pertinaciter adnectit. Quinetiam in hominibus priuatim qua septo obnascitur, cordis inuolucrum magna amplectitur, ne ipsa coalescit continuaturque. Externa superficie quod vndique adiacentibus partibus adnascatur, aspera, inæqualisque, inuicem connexarum membranarum modo visitur. ¶ Præterea similia cum septo foramina adipiscitur. Qua enim septo obducitur, ternis foraminibus est peruium, vno quidem cauæ venæ caudici parato, secundo autem stomacho, tertio vero magnæ arteriæ, & venæ pari carentis fini. In iugulo amplo continuoque foramine non pertunditur, verum quæ eam inibi perreptant vasa pluribus foraminibus complectitur, ipsisque adnascitur, & tunicam aliam a propria illarum ipsis offert. Transmittit vero hic venæ cauæ, & arteriæ magnæ ramos, adhæc stomachum, asperam arteriam, sexti paris neruorum cerebri neruos, & septi transuersi etiam neruos. ¶ Postremo secundum posterioris ipsius sedis longitudinem vtrinque ordinata serie perforatur, venis ac arteriis costarum interualla petentibus viam præbens. ¶ Substantia constat membranea, dura scilicet, tenui, alba, æquali, & robore non nihil peritonæum superante, verum similiter ipsi quoque peritonæo huius substantia ad dorsum durior, quam iuxta pectus sentitur. Ipsi namque origo a vertebrarum ligamentis illarum corpora connectentibus potissimum pender. ¶ Porro venis arteriis & neruis abundat. Præter hanc costas succingentem tunicam singulis costis alia peculiaris obgit, quæ non est nisi membrana omnibus propemodum ossibus communis, quam quia os ambit, Græci *περίστορον* nuncupant. ¶ Ceterum succingens membrana, quia amicū pulmonis ad costas contactum molitur, totius thoracis cavitatem velut vna superficie non asperam reddit. Deinde omnibus quæ thorax continet inuolucrum quoddam euasit. Hinc ab usu, tunica, vestit enim munit ac firmat internas thoracis partes: a substantia vero membrana vocatur. Adhæc ipsa quoque, vt & peritonæum, iis omnibus quæ complectitur organis tunicas exporrigit, eademque firmata colligat. Denique septo transuerso renui & robusto interim oportune facta, non inefficax robur adiungit, & in ipso, vt & in intercostalibus musculis membranæ musculorum ventrem ambientis vicem abunde gerit. Postremo septi neruis iter præbet, & eos velut in vagina reconditos ad septum deducit. ¶ Porro venæ, arteriæ, & nerui, quibus tunica committitur etiam si ad ipsius nutritionem & sensum vsui sunt, non tamen huius gratia præcipue, sed vicinarū partium illi adeo frequentes attenduntur. Vnde etiam ipsi & crebrior cum magna tensione, & punctili dolore Galeno libro 6. aphor. com. 33. attestante phlegmone oboritur, quæ *Pleuritis* nominatur.

Tunica succingens foramina.

Substantia.

Origo.

Singulis costis peculiaris tunica. *περίστορον*. Vnus.

Pleuritis.

De membranis cavitatem thoracis intersepientibus. CAP. III.

Membranæ quæ thoracem in duas præcipuas amplitudines interdiuidunt & distinguunt, Græcis *διασπείροντες*, Latinis *intersepientes*, vulgo *Mediaſtinum* nominantur. ¶ Habentur autem in thoracis medio vtrinque singulæ secundum ipsius longitudinem procedentes. A iugulo enim ad totam septi longitudinem pertingunt, & a tora pectoris ossis longitudine ad thoracis vsque vertebrarum corpora exporriguntur. ¶ Atque his etiam terminis membranarum amplitudo circumscribitur, quæ triangulum quoddammodo ex inæqualibus & obliquis costis lateribusue conformatum refert. Vna enim costæ, quæ & breuior est, a iugulo secundum pectoris ossis longitudinem ad eius mucronem, & septi hic connexum fertur. ¶ Secunda vero hac longior, a iugulo secundum dorsum ductum ad vndecimam vsque thoracis vertebram procedit. Tertia longitudine inter illas media, ab osse pectoris secundum septi longitudinem decliuus ad dorsum descendens, duas priores costas committit. Præsentem membranæ in murua distantia & coitu plurimum variant. ¶ Secundum dorsum enim longitudinem, qua vertebris committuntur,

Nomina. Numerus. Situs.

Forma. Magnitudo.

Quo pa-
cto inter
ſepientes
membrana
inuiç di-
ſtcat.

inuiçem contiguaſunt, & quam minimam inter ſe cavitatem fibris membraneis opple-
tam efformant. Qua vero pectoris oſſi committuntur in homine inuiçem neuiquam
contiguaſunt, imo pro oſſis pectoris latitudine mutuo diſtant. Superiori enim parte,
vbi id ampliſſimum eſt, ac clauiculas primamq; vtriuſque lateris coſtam ſuſtinet, mem-
branz etiam inuiçem admodum abſcedunt, cavitatem nihilominus vniuerſam, quam
inter ſe continent, fibroſis membraneiſque nexibus adimplentes. Vbi vero pectoris oſſi
ſecundæ coſtæ cartilago coarticulatur, quemadmodum pectoris os hic atq; ſuperius euasit, ita
quoque dextra membrana minus inibi a ſiniſtra remouetur. Hæc membranarum diſ-
iunctio, ſenſim ſecundum oſſis pectoris longitudinem descendens, vt os ipſum latius
efficitur, ſic quoque & illa capacior redditâ magis diducitur, ita ſane, vt tanta in homi-
ne hic membranarum conſurgat diſtantia, quanta vndique pectoris oſſis cernitur am-
plitudo. ¶ Ceterum qua membranz ſepto tranſuerſo committuntur, omnium maxi-
me inuiçem abſcedunt, atque hic tantam efformant amplitudinem, quanta ſepti tranſ-
uerſi membranei circuli eſt latitudo. Cautas, quam ibidem membranz efficiunt rario-
ribus membraneis fibris obſita, admodum ampla diſſecantibus occurrit, atque huius
amplitudine baſis ad amuſſim correfpondet figuræ membranei circuli ipſius ſepti,
quæ latior eſt quæ pectus, quam qua dorſum reſpicit, latiffima vero in medio exiſtit.
Hæc cautas in hominibus nihil proſus præter cordis inuolucrum ipſumque cor & ve-
nam cauam, ſeptum penetrantem complectitur. Adeo vt inter has membranas cordis
inuolucrum, ob idque & ipſum cor vna cum ſuis vaſis contineatur, deinde & venæ ca-
uæ caudex, & innumeræ membranz fibræ membranas has inuiçem colligantes. ¶ His

Quæ in-
terſepien-
tiû mem-
branz
ſubſtan-
tiam ſub-
eant.
Supra lib.
3. cap. 16.
ſunt
glandium
dicitur.
Venæ &
arteriæ.

Interſepien-
tiû membra-
nâ ſuperfi-
cies & cõ-
nexus.

Ortus in-
terſepien-
tiû mem-
branz.
Vſus ea-
rundem.

membranis in medio nulla, niſi id perquam raro, adnaſcitur pinguedo, exterius vero
qua quæque ſuam thoracis reſpicit amplitudinem, multa ſæpe, ac præcipue in homini-
bus, adipe abundant adeo vt omento quibuſdam partibus ſimiles, & pinguioreſ ſæpe vi-
deantur. Præter pinguedinem ipſis adnaſcitur glandoſum corpus, vaſorum diſtributio-
nibus in iugulo præfectum, *de quo abunde cap. 16. libr. 3. diximus.* ¶ Venis & arteriis abun-
dant, ſed tenuibus, ac illis quæ per omenti membranas digeruntur perquam ſimilibus.
Venæ quidem non a caua, vbi ſeptum permeat originem ducunt, ſed potiffimum ab il-
lis quæ deorſum a iugulo pectoris oſſi exporriguntur. Illæ enim venæ & arteriæ ſecun-
dum harum membranarum ad pectus ductum descendentes, in progreſſu ſurculos diſ-
pergunt ex anterioribus in poſteriora pertinentes. Deinde aliquot ſoboles his mem-
branis a vena coniugis experte offeruntur. At præter has plerunque alia notatu dignæ
cræſtitudinis a iugulo ſecundum vtriuſque membranz longitudinem deorſum ad ſep-
tum vſque deducitur, ſepti neruo concomitata. Septi enim tranſuerſi nerui in externa
membranarum ſede ipſis adnati deorſum protenduntur, æquali fere interuâlo a pecto-
re & dorſo in progreſſu diſtantes. Atq; ii ſolum nerui cum vaſis & adipe externæ mem-
branarum regioni, quæ pulmonem reſpicit, adnaſcuntur, & læuis quodammodo, & æ-
queo quaſi humore oblita viſitur: interdum etiam aliqua ex parte pulmonem adnatum
poſſidens. Interna vero membranarum ſedes tum propter fibras membraneas, quibus
inuiçem membranz committuntur, tum eas quibus validiſſime citra adipis interuen-
tum cordis inuolacro adnaſcuntur, vtræque æperæ ſunt. At ſi quæ iuxta ſeptum huius
cavitatis regio fibris non obſidetur, ea quoque leuiſ ſimiliter & aqueo humore madens
viſitur. ¶ Membranz hæc tunica coſtas ſuccingente tenuiores aliquanto ſunt, ab hac ex
omnibus ſedibus vbi ipſi membranz illæ committuntur ortum ducentes. Sunt autem
illæ ſedes, vt diximus, pectoris os, ſeptum tranſuerſum, & thoracis vertebræ, vnde potif-
ſimum hæc membranz enaſcuntur. ¶ In hoc autem creatæ ſunt, vt cordis inuolucrum,
ac proinde cor ipſum, ne deorſum ac retrorſum concidat, in ſua ſede continerent. De-
inde ad vaſorum ſecuriorem ductum auxiliantur, & poſtremo ex vniuerſa thoracis am-
plitudine duas efficiunt cavitates, vt ſi forte magno vulnere in alterutram eius partem
accepto reſpirationis munus eius partis perierit, altera cautas adhuc illæſa & incolu-
mis animali famuletur, & dimidium ſaltem actionis retineat, *vt copioſius libr. 6. de uſu*
par. cap. 3. Galenus oſtendit.

De æſpera arteria. CAP. III.

Nomina. ¶ Iſtula quæ a faucibus per collum ad pulmonem vſque protenditur, veteribus Græ-
cis ſimpliciter, quod aerem contineat, *ἀπνεΐα* primum appellata eſt. At tempo-
ris

Aris successu, quum & vasa vitalem spiritum sanguinemque imperu ruentem deducen-
tia, & in venarum numero non amplius habita, arteria etiam nomine donarentur, hæ
quidem *Læues arteria*, illavero *regia*, id est, *Aspera*, ab inæquali, qua constat substantia nū-
cupabatur. A nonnullis etiam *ut lib. 7. de usu par. c. 3.* Galenus est testis, *ἑσπρία* appellatur. Læues ar-
teria.
ἑσπρία.
Numerus.
Vnica non modo hominibus, verum & animantibus quæ pulmonem nanciscuntur o-
mnibus obtigit, quæ longo ductu instar caudicis cuiusdam, ex faucibus deorsum pro-
tensa frequenti sobole in pulmonis substantiam digeritur. ¶ In faucibus enim, quæ Gre- Situs.
ἑσπρία.
cis *φάρυγξ*, *ut infra latius dicemus*, nuncupantur, duobus narium foraminibus in oris am-
plitudinem pertingentibus alia duo in humiliore faucium sede correspondent, quæ
quidem non secundum latus, ut illa, mutuo contermina, sed vnum altero prius, cernun-
tur. **B** Ar horum quidem posterius stomachi gulæ & cibû & potum ex ore in ventricu-
lum deducens initium existit. Anterius vero asperæ arteriæ principium est, quæ hinc
deorsum recta nusquam in latus declinans, secundum cervicis longitudinem ad quar-
tam vsque thoracis vertebra ducitur, tota posteriori sede substratam habens gulam,
vertebrarum corporibus, primoque dorsum mouentium musculorum pari absque al-
terius organi interuentu innitentem. Vnde & aspera & arteria a vertebra tantum re-
mouetur, quæta gulæ, seu stomachi est crassities. ¶ Ceterum quum primum ad quartæ tho-
racis vertebræ corpus arteria aspera descendit, in duos pares bipartita truncos, vnum
dextris pulmonis lobis, alterum sinistris exporrigit, qui pulmonis substantia vndique
amplexi, parem cum pulmone sedem occupant. ¶ Imaginem asperæ arteriæ vix vlli re-
Cctius, quam arbori assimilaueris, cuius caudex in duos primum ramos discissus est, & hi
rursus in innumeras soboles diffusi. Huius namque arboris radicem propaginibus li-
beratæ ex terra prodiens initium laryngi respondebit: totus autem caudex reliquæ as-
peræ arteriæ parti a larynge ad quartam vsque thoracis vertebra protensæ conueniet.
Arboris vero rami eorundemque innumera soboles, arteriæ in pulmonem deductibus
conferentur. Vt enim caudicis initium radices educens, varium neque pari vndique
constans forma visitur, sic & larynx, asperæ arteriæ caput, vndique variam dissimilem-
que figuram obtinet. Superiori enim parte prout aut depressum aut erectum finxeris
laryngis operculum, acuta aut depressa obtusaque erit. ¶ Anterior autem laryngis pars,
& latera quoque, anteriorem scutiformis cartilaginis superficiem commonstrant, quæ
D secundum ipsius longitudinem in medio extruberat, illinc lateribus oblique in poste-
riora extrorsum procedens. Adhæc ut huius cartilaginis superior pars amplior longe
inferiori in hominibus, secus quam in bobus, existit: ita etiam laryngis superior sedes
hic latior inferiori cernitur. Imo humilima laryngis sedes, quæ secunda laryngis consti-
tuitur cartilagine, amplitudinem latitudinemue reliquæ asperæ arteriæ caudicis du-
ctus adæquat. Posterior laryngis regio, ac præcipua huius regionis sedes quodammodo
plana est, propter primæ cartilaginis quæ scuti imaginem refert, ad posteriora suis late-
ribus progressum. Alias enim hæc regio secundæ & tertiæ cartilaginum gratia, paulo
minus tota teres esset, uti sane est humilima posterioris regionis sedes, haud aliter quam
anterioris regionis humilior sedes, idque occasione secundæ cartilaginis humilior pri-
Ema procedentis. In posteriori sede, prout tertia cartilago in laryngis cauitatem contra-
hitur, aut extrorsum porrigitur, ita quoque elatiore ipsius apices in interiora exterioræ
magis prominent, laryngis figuram immutantes. Ceterum reliquæ asperæ arteriæ
caudex ad ramorum vsque diuarcationem sibi similis est, non tamen absolutæ. ¶ Ex- Qualis
exterior
asperæ ar-
teriæ su-
perficies.
terna asperæ arteriæ superficies præter laryngis, quæ varia est, inæqualis, sed interim or-
dinata serie procedens visitur, ac quum aere distenditur, posteriori quidem parte læuis
instar continuæ cuiusdam membranæ est: a lateribus vero & anteriore regione inæqua-
lis membrana quæ cartilagine mediat, ipsis cartilaginibus magis extuberante. Contra
vero quum laxa concidit, nam tunc cartilagine membranea substantia eminentiores
protuberant. Adhæc instar membræarum quæ aliis connascuntur partibus, externa
F quoque arteriæ superficies aspera est. ¶ Posteriori enim sede fibrosis nexibus, sed mo- Conne-
xus.
dicis stomacho gulæ committitur, verum superior laryngis regio quum communem
cû stomacho tunicam sortiatur, validissimæ illius tunicæ gratia ipsi connascitur, quem-
admodum & larynx stomacho firmissime musculorum opera connectitur, qui stoma-
chum amplectentes primæ cartilaginis lateribus implantantur. Anterior asperæ arteriæ

Interna
asperæ ar-
teriæ su-
perficies
qualis.
Substantia.

Laryngis
operculi.

Cartilagi-
num for-
ma.

Qui aspe-
ræ arteriæ
cartilagi-
nes inuicē
colligen-
tur.
neque in

Asperæ ar-
teriæ tuni-
ca exte-
rior.

Interior.

Glandes
laryngis
radici ad-
natæ.
Asperæ
arteriæ
vñs.
Situs ra-
tio.

pars attensis musculis & vasis, ac præcipue recurrentib. nervis connascitur. Quinetiam A
vbi asperæ arteriæ rami in pulmonem excurrunt, propter adnatam ipsis pulmonis sub-
stantiam minus leues existunt. ¶ Ceterum interior superficies etiam si inæqualis pro car-
tilaginum extuberantia semper est, levis tamen ac velut vñtuoso humore perfusa, neq;
vñlis fibrosis explantationibus aspera existit. Et talis quoque quod ad leuitatem spectat,
interna laryngis est superficies. Inferior laryngis operculi superficies concava, superior
autem conuexa videtur. Quæ vero sit laryngis & asperæ arteriæ substantia primo & se-
cundo libris diximus. In primo enim lib. *cap. ultimo*, præter laryngis operculum, trium
etiam eiusdem cartilaginum situm & formam descripsimus. In 2. libr. *cap. 13.* laryngis
musculos persecuti sumus, vt hoc nomine laryngis, & totius asperæ arteriæ descriptioni
hic minime immorandum sit. Satis igitur sit dixisse asperam arteriam membrana car- B
tilagineaq; formatam esse substantia, ac laryngem quidem tribus constare cartilagini-
bus: vna, quam scuto Græci assimilarunt; secunda vero, quam, quod nomine destitua-
tur, *Innommatam* vocauerunt; tertia autem, quæ gemina est, quam vasorum orificiis, qui-
bus aquam manus lauaturis affundimus, respondere arbitrati sunt. Deinde epiglottis
seu laryngis operculum ipsius quoq; conformationem ingreditur, quod ex cartilaginea
membraneaq; & pingui substantia, quemadmodum & tertiæ cartilaginis superior pars,
constituitur. Reliquum asperæ arteriæ corpus innumeris conformatur cartilaginibus,
vna serie eademque forma sese habentibus. Forma quidem circulo correspondent, cui
quarta pars sit exsecta, prope enim ad anuli perfectiue circuli figuram accedunt. Harum C
vero corpus teres nō est, sed quodammodo quadrangulare multo interim latius quam
crassius. Eandem tamen toto corpore crassitudinem non seruant, in medio enim cras-
siores sunt quam in extremis, quib. paulatim attenuantur, ac velut in membranam de-
generant. Extremis iis stomachum respiciunt, media vero parte crassiori, anteriorem
asperæ arteriæ sedem efficiunt. Cartilagines hæ continua serie ac æqualiter semper mu-
tuo distantes in arteria collocantur, & non tantum inuicem distinguuntur, quanta illa-
rum a superiori parte ad inferiorē est latitudo, nisi quum arteria aere turget, conciden-
te enim arteria, cartilagines inuicem propinquius accedunt. ¶ Cartilaginum inter se
cōnexus primum propriæ cuiusq; cartilaginis membranæ interuentu perficitur. Quē-
admodum enim in omnibus fere ossibus, & etiam laryngis cartilaginibus membrana
quædam, eo quod ossum sit inuolucrum, *περιόστεον* nuncupata obducitur, pari quo- D
que ratione circulares asperæ arteriæ cartilagines simili membrana integuntur, quæ ex
demissioribus elatioribusque sui partibus processus exporrigens, illarum interuentu
cartilagines inuicem connectit, velut membraneum vinculum inter duas cartila-
gines sese respicientes, efformans. Neque solum inter cartilagines, vbi ab inuicem
æqualiter distant, eiusmodi consurgit vinculum, verumetiam ab extremis cartilagi-
num partibus stomachum respicientibus similes membranei processus exporriguntur,
ex quibus continuum quoque instar membranæ vinculum efficitur. His cartilagini-
bus membranisque aliæ duæ accedunt membranæ ab ipso vsu tunicæ non immerito ap-
pellatæ. Atque vna quidem externam arteriæ superficiem vñdecunque amplexatur, E
membraneis illis cartilaginum vinculis pertinacissime connata. Hæc tenuis est, illi-
que tunicis par, quas peritonæum & succingens costas membrana ipsis affirmatis vasis
præbent. Præsentis tunicæ interuentu arteria conterminis partibus colligatur, ipsaque
in primis recurrentes nervos securissime defert. ¶ Altera arteriæ tunica hæc multo di-
gnior, internam yniuersæ arteriæ sedem succingit, atque ad cartilaginum inter se col-
ligationis robur plurimum auxiliatur. Interior tunica exteriori multo crassior existit,
quamuis etiam tenuis sit & valida. Adnascitur vero robustissime cartilaginum pro-
priis membranis, & interna sede pingui quodammodo humore oblita visitur, non
vñdecunque eandem seruans crassitiem. Hæc tunica per vniuersæ arteriæ caita-
tem rectis etiam fibris intertexta est. ¶ Ostendit quoque glandulas alterutra parte sin-
gulas ad laryngis radicem adnatas, quæ magnæ sunt & fungosæ admodum, carnisque
propemodum coloris, sed magis nigricantes, & venis satis conspicuis obductæ, *de qui-*
bus sequenti cap. latius dicemus. Nunc singulorum, quæ diximus, vñm breuiter perstringe-
mus. ¶ Aspera autem arteria omni prorsus sanguine vacans, primario animanti, ad aeris
in respiratione transitum ductumue confert. Deinde & vocis organum est præci-
puum

Apuum. Atque iis vñbus vniuersa ipsius substantia congruit. E faucibus enim aerem per nares, aut os attractum, recta in pulmonem ducit, hunc per vniuersum pulmonis corpus ita numerosa ipsius serie distribuens, vt pulmonis substantia illum promte alteret, atque cordis muneribus aptum reddat, vt infra latius docebimus. ¶ Vt autem aerem dum inspiramus promptissime pulmoni deferat, ac rursus omnem, qui cordi inutilis est, vna cum fuliginosis ipsius excrementis inter expirandum reddat, asperam arteriam instar membranei meatus, qui facile inanitus concidere, atque rursus oppletus distendi posset, extrui conducebat. Distenditur autem in inspiratione & aeris attractione: comprimitur autem, arctatur, & in se concidit expiratione, quando aerem in asperæ arteriæ propaginibus ac ramis exprimit, propellitque. ¶ At cartilaginibus abundauit quoque, vt non modo respirationis, verum & vocis organum fieret. Quippe ad vocem amplam, rigidam, duramque, prorsus fistularum, tibiarum, & cornuum ritu effingi debuerat. Quandoquidem vt vox fiat, symmetriam quandam esse oportet, & robur aeris ipsius & substantiæ ab ipso percussæ. Huiusmodi sane substantia est cartilago. Aspera itaque arteria commodum simul respirationis, & vocis est organum. Atque hinc est, quod larynx etiam nunc magis, nunc minus claudi possit, & spiritum ipsum ex nostro arbitratu ad magnos sæpe vsus retinere valeamus, & vocem nunc grauem, nunc leuem, prout primam illam seu lingulam, quæ vocis præcipuum est instrumentum, arctamus vellaxamus. Quod vt commode quidem fiat, laryngis musculi ad vnum omnes, præter duos posteriores, quos *libro secundo, capit. decimotertio*, ex media interiori ossis hyoidis sede enasci diximus, rimæ illi dilatandæ arctandæue subseruiunt. Larynx itaque omnium fistularum artificium longe vincit, quod ita efficta sit, vt modo minus, modo magis eam laxare possimus, ac varias voces, non vnicam duntaxat, vt artificum instrumenta, edere valeamus. ¶ Ceterum laryngis operculum, quod *ὀπίσθιος* Græcis dicitur, non alio nomine creatum est, quam vt cibi & potus inter deuorandum in laryngem casum prohibeat. Hinc est quod duo tantum posteriores communium musculorum laryngis radici huius operculi inserti sint, qui illud cibus potibusque depressam denuo eleuent: vt plurimum hallucinari necesse sit eos, qui epiglottidi viginti attribuant musculos. Præterea quum in hunc tantum vsus creatum sit hoc operculum, quod etiam *libro 7. de usu part. cap. 16*. Galenus testatur, toto cælo errant, qui id ipsum proprium præcipuumque vocis esse instrumentum tradunt. Reliquatam cartilaginum crassior pars, quaque orbem efformât, anteriori parti, & quæ iniuriis magis exponitur, prælocata est. Vbi autem a perfecti circuli figura in caudice arteriæ necessario propter inspirationem deficiunt, oportune stomachum gulamue respiciunt, quo minus illum comprimant minusque ipsius in ciborum assumptione distentionem præpediant: quum interim ibi arteria suscipiendis noxis inepta sit.

Aspera arteriam membranacea substantia operculum extrui.

Laryngis vsus.

Laryngis operculi vsus.

Cartilaginum coordinationis ratio.

Tunicarum asperæ arteriæ vsus.

Non oscitater etiam asperæ arteriæ tunicas natura extruxit. Externam quidem, vt cartilagines instar inuolucris muniat, atque ipsius interuentu arteria vicinis partibus colligata firmataque securius deorsum prorepat. Interna vero non solum cartilagines firmius connexura, verum easdem succinctura atque a grauioribus iniuriis munitura, crassior externa euasit, non tamen talis, vt sua crassitie magnam arteriæ amplitudinem oppleat, & ad defendendas tamen cartilagine sua densitate ac robore sufficiat. Sepe enim aliquid pituitæ inutilis a capite per arteriam defluit, nec non potus aliquid & cibi inter deglutendum in illam illabitur. Præterea acris quædam qualitas, vel fumi, vel cineris, vel carbonum, vel alterius cuiusdam facultatis medicamentosæ etiam inter respirandum attrahitur. Adde quod pus tussi ex pectore reiiciendum quandoque sit malignum, erodens, aut alius quispiam humor, vt pote flaua bilis, ac atra, aut pituita falsa intus putredinem experta, per asperam arteriam efferri debent. A quibus omnibus obducta cartilaginibus tunica, ne illæ radantur, & rosionem alterationemque ab his non sine graui ipsarum vitio sentiant, præcauet. Atque vt larynx eiusmodi noxiis, nimirum ori vicinior, magis subiicitur: ita quoque & tunicam hanc paulo crassiorem obtinet, quam extremi arteriæ surculi, in quibus tunica tenuior euasit, ne plus æquo pulmonis substantiæ aerem cordi temperantis vim obtunderet, & aeris in venalis arteriæ germina assumptionem, & rursus cordis fuliginosorum in asperæ ramos attractionem prohiberet.

Pinguedi-
nis vsus.

Glandium.

Ceterum pinguedo inter tunicam hanc & cartilaginem in larynge potissimum A
reposita, ipsaque etiam tunica pinguior simul cum viscido quo vndique hæc oblinitur
humore, ad facilem aeris ductum conferre, atque ne in magnis clamoribus, multisque
motibus exsiccetur, vox deficiat, plurimum commodare videtur. Hoc quoque faciunt
asperæ arteriæ ad laryngis radicem vtrinque appositæ glandes. Siquidem humore mea-
tum imbuunt, non fluido quidem, sed viscido ac pingui, quemadmodum & ipsæ crassio-
res, spissioresque ceteris humorem procreantibus glandulis sunt. Quantus vero eiusce
humoris ad vocem vsus sit, indies fistulas humectante oleo inungi videntes docemur.

De faucium glandulis. CAP. V.

φάρυγξ.
Situs.

Galenus *seçãoe 2. apheris. com. 15.* internam oris amplitudinem gulæ & gutturi seu B
laryngi præiacentem φάρυγξ, hoc est, fauces vocat. Vniuersum itaque spaciū ab
inferiori maxilla intus circumscriptum, id est, quod in profunditate ab interna menti
sede ad ceruicis, videlicet vertebra pertingit: in latitudine vero, quicquid inter dex-
tram inferioris maxillæ & sinistram habetur partem, Græci φάρυγξ Latini *Fauces* appel-
lant. Eundem certe locum Galeno *sect. 3. apher. com. 26.* Græci ἰσθμὸν ab angustia nomina-
uerunt, quod nulla in vniuerso corpore sit regio æque angusta, & tot interim organis
donata. Nam præter foramina narium quæ in os descendunt, laryngem, gulæ initium,
radicem multasque alias partes, quas breuitatis gratia lubens prætereo, glandulæ etiam
hac sede continentur. Quarum quidem triplex est genus, ac vnum quidem quod ad la-
ringis radicem asperæ arteriæ lateribus adnatum est, *de quo capite præcedenti diximus.* C

Triplex in
faucibus
glandium
genus.
Primum.

Secundum.

Secundum vero elatio laryngi apponitur, quippe in spatio quod nobis hiantibus
medium inter narium foramina & laryngem apparet, vtrinque in lateribus vna repo-
nitur glandula vtcunque insignis, & glandi forma perquam similis. Oblonga enim est,
nec glandula ac secundum longitudinem sursum ac deorsum exporrigitur, commu-
nuni oris tunica, sed ea hic quam alibi tenuiori fungosiorique vestita. ¶ Substan-
tia constat aliis glandibus simili, at impensius fungosa, in hocque propria vt saluam
procreet, ac asperam arteriam & gulam quoque cum tota oris amplitudine, *vt libro vn-*
decimo, de usu partium, capit. 10. copiosius docet Galenus, humectet. Has glandulas Græci, *τα-*
εῖσμα, quod iuxta isthmum sint sitæ, & ἀμυγδαλῆς, Latini, *Tonsillas*, recentiores autem quod
amygdalis assimilentur, *Amygdalas* nominauerunt: Tertium genus inguinum, & a-
xillarum glandibus respondet. Numerosum enim sub aurium radicibus & vniuer-
so spatio inferiori maxilla conscripto continetur, ac cauitates omnes exquisite implet,
vasorumque diductibus distributionibus præficitur, has partes quoque suæ hume-
ctandi vi imbuens. Hoc genus nullo peculiari donatum est nomine. Vulgus hoc genus
glandularum in porcis & ceteris quibus vescimur animantibus in delitiis habet. D

De gargarone. CAP. VI.

Nomina.

φάρυγξ.
Substantia.
Situs.

Forma.

Vt sit.
Vtus.

Hæc corporis pars variis donatur nominibus, Græcis γαργαρέων & κων, Latinis, *Gurgu-*
leo, gargarcon, ac columella, Barbaris *Vua & Vuula* nominatur. Gurgulio autem & gar-
gareon a vece appellatur. Columella vero, *quod instar exigua columna extensa esse videatur.* E
Quum per inflammationem aliudue malum vix instar superius angusta, inferius vero
sphæræ modo rotunda sit, φαρυλλῶ Græcis, *Vua* Latinis nuncupatur. Porro gargarconis,
qui soli fere inter cetera animantia homini contigit, substantia, situs, forma, color, &
alia omnia propemodum huc pertinentia, sialicuius hiantis os inspicere non piguerit,
conspicua euadent. Oblonga enim spectantibus occurrit particula fungosa & carnea,
a palati fine, vbi narium foramina ad os descendunt, in oris amplitudinem propendu-
la, superius vbi palato continuatur latior, inferius pyramidis instar acutior. Venulas
quasdam ex vasibus palati tunicam adeuntibus in ipsius medio assumit. Neruis autem
non admodum participat. Primarum ipsius usum ad vocis modulationem esse, illum-
que ad sermonem homini plurimum opitulari, argumento sunt qui hunc præfectum F
obtinent. Deinde quod soli homines, auiumque quædam genera hoc donari viden-
tur. Adeo sane vt velut quoddam vocis plectrum, ita ad cauum palatum pendens cen-
seatur. Secundo autem ad aeris attractionem, ne scilicet frigidior iusto in pulmonem
statim feratur, accommodatus est. Constat enim iis, quibus præfectus est gurgulio fri-
gidum

Agidum aerem impensius quam ceteris nocere, ut diximus cap. 8. lib. de diff. mor. & fusius ista prosequitur Galenus lib. 11. de usu part. cap. 11.

De pulmone. CAP. VII.

Pulmonis, quem Græci πνεύμων vocant, situm duæ thoracis cavitates indicant. In utraque enim thoracis amplitudine inter costas, & alteram intersepientium membranarum conspicua, Pulmo locatur, perinde ac cavitates ipsæ, geminus. Ipsi enim pars dextram cavitatem occupans, illi quæ in sinistra locatur; substantiæ interuentu neque continua, neque etiam contigua est. Ambæ enim intersepientium membranarum medio inuicem dirimuntur, & vasorum duntaxat interuentu, quæ ex vna radice in dextram, ac sinistram pulmonis partes digeruntur, illæ inuicem committuntur. Ac dextra quidem pulmonis pars dextram thoracis cavitatem, sinistra autem læuam ita implent, ut nihil prorsus in thoracis amplitudine pulmonis substantia non oppletum sit, præter vniuersam regionem quam intersepientes membranas in se complecti constituereque retulimus.

Porro pulmo priuatim nulla indigebat forma, sed pro accumbentium corporum effigie efformatur, prorsus suarum cavitatum formam assumens, haud secus quam si aliquis gleba his cavitatibus impressa, pulmonem construxisset. Vbiunque enim cavitatum sedes concavæ sunt, inibi pulmo gibbosus euasit: vbi autem gibbæ extuberantesque videntur, pulmo etiam cauus redditur. Quocirca dextra pulmonis pars sinistra

Ci iuncta adamussim speciem bubulæ vngulæ præbet. Atque hæc de humano pulmone dicta sunt, eoque non flaccido, sed ut secundum naturam thoracem implet distento. Alias enim quum concidit, atque in lobos seu fibras insigniter distinctus visitur, elegans hæc propriaque pulmonis forma deperditur. ¶ Distinguuntur autem utraqueque pulmonis partes in duos lobos membranis fibris in hominibus inuicem herentes. Neque sane perpetuo in duos solum lobos pulmonis partes secantur, verum aliquando in tres, interdum in nullos, aut duos, ita tamen inuicem nexos, ut sectionis potius nota quam reuera distinctio videatur. Lobus autem cauæ venæ caudicem suffulciens, qui in canibus & similibus apparet, in homine non obseruatur, quod scilicet breuiori ductu ipsi vena caua quam prædictis animalibus ducatur. Neque enim aliquod prorsus est intervallum ductus cauæ venæ inter septum & inuolucrum, quale in canibus

D maximum visitur, vnum etiam in illo intervallo vena caua hoc quinto lobo, tanquam a manu quapiam suffulciri debuit. ¶ Pulmo externa superficie læuis vndique est, & veluti humore lento madidus. Attamen in plerisque hominibus non infrequenter hæc superficies aspera earum membranarum modo conspicitur, quæ inuicem connascuntur, quandoquidem in illis iam dextra pulmonis pars, iam sinistra, iam utraque etiam pertinacissime thoracis lateribus fibroforum nexuum interuentu colligatur, adeo ut id hominibus peculiare esse videatur, & ut fuscus quidam, non autem candente rubore rubeus color, & quædam instar nubium oblineatio, ac in colore inæqualitas, in hominum pulmonibus conspiciatur, non quidem in laqueo suffocatis solum, aut aliquandiu mortuis, verum & in illis quibus adhuc viventibus cor excæcatur:

E quamuis sensim mortuis pulmones magis nigricent, concidantque. ¶ Ceterum vniuersa pulmonis substantia nihil aliud est quam caro mollis, fungosa, rara, levis, acrea, ac veluti ex spumoso sanguine spumaue sanguinea, ut Galenus libro quarto sexto, & septimo, de usu partium, copiosius docet, concreta, multisque vasorum germinibus oppleta, ut scilicet moueatur, & distendatur facile, aeremque hauriat, & reddat. ¶ Vasa autem pulmonis sunt tria, ac primum quidem est aspera arteria, quæ iuxta quartæ thoracis vertebræ corpus in duos truncos, ut capit. quarto dictum est, diducitur, quorum dexter in dextram pulmonis partem, ut sinister in sinistram exporrigitur. Et primum in duos ramos sectus, ac his rursus in plures, hisque rursus in alios diuisis, multiplici sobole pulmonem intertextit. ¶ Secundum vas venalis est arteria: tertium autem vena arterialis, de quibus infra capite nimirum decimo, latius dicemus. Hæc vasa similiter, ac aspera arteria in pulmonem ea serie digeruntur, ut arterialis venæ rami, asperæ arteriæ propaginum posteriori sedi attendantur, venalis vero arteriæ soboles anteriori. Atque hæc vasorum digestio vndecunque ad exteram vique pulmonum superfi-

Nomina.
Situs.
Numerus.

Forma.
Vide in c. 4.
li. 6. de membranis intersepientibus.

Lobi quot
pulmonis.

Pulmonis
superficies.

Connexus.

Substantia.

Vasa.
Aspera arteria.

Venalis arteria.
Vena arterialis.

ciem ad amuſſim ſeruatur, non ſitu modo ſemper ſibi ſimilis: verum & magnitudine A etiam, vt enim multo maior eſt arteriæ aſperę truncus pulmoni inſertus, venę arterialis & venalis arteriæ primis in pulmonem implantationibus, ita quoque vniuerſo per pulmonem progreſſu ramorumque ſerie, ſoboles aſperę arteriæ ampliores patentioresque venarum, & arteriarum ſurculis exiſtunt. Huic innumero vaſorum implexui, pulmonis caro intertextitur, atque omnes vaſorum amplectens ſurculos pulmonem efformat.

Tunica.

Vniuerſum vero pulmonis non aliter ac iecoris tenui quadam & molli membranaque obducitur tunica, principium ab illis vaſorum inuolucris ducens, quæ aſperę arteriæ, ac aliis duobus pulmonis vaſis ab interſepientibus thoracem membranis, ſeu ea quæ coſtas ſuccingit, offeruntur. Quamprimum enim hæc vaſa in pulmonis du- B cuntur ſubſtantiam, ea tunica a propriis vaſorum tunicis abſcedens, in pulmonis reg-
 Nervi.

Nervi.

mentum degenerat. Merito autem pulmonis tunica tenuis molliſque facta eſt, vt ſcilicet cum pulmone promte concideret, & facile dilataretur. Huic tunicę neruuli a ſexti paris neruis recurrentes neruos conſtituentibus, & poſtmodum in ventriculi ſuperius orificium diſſuſis communicantur. Nulli autem, aut perquam graciles in pulmonis ſubſtantiam ſenſu non admodum indigentem diſſeminantur. ¶ Pulmo namque in hoc potiffimum factus eſt, vt aerem cordi quo potiffimum ad naturalis caloris non ſolum qualitatem, ſed & ſubſtantiam indiget: præpararet, ac demum cor viſcuſ aliquid ſibi appoſitum haberet, ex quo aerem ſuis functionibus aptum ſemper allicere poſſet, & ne quemuis ſtatim nos ambientem aerem, eundemque aliter non immu- C tarum aſſumere cogeretur, præcipue quum natura non ſolum cordis occasione quam plurima animalia reſpirare voluerit, verum & vocis, ad commodam animalis vitam neceſſarię gratia. Quod enim a pulmone inter exſpirandum redditur, vocis optima euadit materia. *Quemadmodum libro ſexto, de uſu partium, capite ſecundo, Galenus latius docet.*

Vſus.

que in hoc potiffimum factus eſt, vt aerem cordi quo potiffimum ad naturalis caloris non ſolum qualitatem, ſed & ſubſtantiam indiget: præpararet, ac demum cor viſcuſ aliquid ſibi appoſitum haberet, ex quo aerem ſuis functionibus aptum ſemper allicere poſſet, & ne quemuis ſtatim nos ambientem aerem, eundemque aliter non immu- C tarum aſſumere cogeretur, præcipue quum natura non ſolum cordis occasione quam plurima animalia reſpirare voluerit, verum & vocis, ad commodam animalis vitam neceſſarię gratia. Quod enim a pulmone inter exſpirandum redditur, vocis optima euadit materia. *Quemadmodum libro ſexto, de uſu partium, capite ſecundo, Galenus latius docet.*

De cordis inuolucro. CAP. VIII.

Nomina.

Membrana vniuerſum cor cum ſuis articulis, ac vaſorum initiis inſtar arculę cuiuſdam aut thecę inuoluens, Græcis περιάρδιον, Latinis *Inuolucrum cordis* commodiſſime appellatur. Sunt qui *Cafulam cordis*, quod veluti domus quædam cordis ſit, nomi- D nant. Barbari adiectione vnius literę *Capſulam* vocant. ¶ Eius effigies nucis pineę formę quam ſimilima eſt. Orbicularem enim baſim, & mucronem obtuſum obtinet. Ceterum inuolucris baſis minime cõtinua eſt, ſed vt minimum quinque foraminibus per-
 Forma.

Forma.

Quibus vaſis inuolucrum cordis viam præbeat.

uia, duobus quidem quibus cauę venę iter præbet. Vno nimirum, quæ hæc ſeptum perforat. ¶ *Secundum* autem foramen illud eſt, quo eadem vena ſurſum a cordis baſi iugulum petit. ¶ *Tertium*, arteriam venalem transmittit. ¶ *Quartum* vero arteriæ magnę paratum eſt. ¶ *Quintum* arteriali venę viam præbet. His vaſis notatu digno interuallo a cordis ſuperficie abſcedentibus, præſens inuolucrum validiſſime obnaſcitur, quodammodo ab iſſis principium ducens. ¶ Reliquum inuolucris corpus nihil præſuſ transmittens continuum eſt, & ſibi vndecunque, præterquam in forma, quæ ex baſi, vt diximus, in obtuſum mucronem tendit, reſpondens. Baſis hæc ſummo apice paulo altius quintę thoracis vertebrę corpore locatur, huic non penitus, ſed dun-
 Situs.

Situs.

taxate regione incumbens. Baſis enim media eſt inter pectoris os, & quartam quintamque thoracis vertebras, æqualiter ab vtriſque, nempe pectoris oſſe & vertebris, diſtans. Item baſis quoque a dextris ſiniſtrisque coſtis pariter remota pender. In progreſſu vero deſcenſuque inuolucris ſitus variatur. In homine quidem, cui anteriorem thoracis partem rerum Opifex largitus eſt breuiorem, inuolucrum decliue, ac antrorſum ſiniſtrorſumque adeo protenditur, vt mucro magis deorſum quodammodo per-
 Subſtantia Magnitudo.

tingat, quam pectoris oſſis pars, cui ſuperior ſepti tranſuerſi pars adnaſcitur. Deinde in ſiniſtrum adeo pertinet, vt dextrum mucronis latus vix thoracis medium attingat. F In anteriora quoque adeo mucro procedit, vt ſiniſtrum pectoris oſſis latus, quæque huic coarticulantur cartilagineſ, contingat. Atque hoc inuolucrum in ſe interſepientes membranę amplexantur, ſecundum ipſius formam in latera extuberantes. ¶ Subſtantia conſtat membranea, atque in ſimilarium partium numerum cum reliquis membra-

- A** membranis reponenda. Nullis enim fibris intertexta, sed simplex est membrana, ut Magnitudo. cunque crassa, & admodum dura, cavitatemque constituens, in qua cor facile dilatari do. constringique queat. In se enim cor continet nulla prorsus portiuncula illi connatum, sed æqualiter ab illo vndique distans. ¶ Cavitās hęc levis omnino est, tenui quodam humore oblita, ac adipe omni penitus destituta. Exterior quoque inuolucris Superficies & nervus inuolucris. perficiēs omni adipe vacat. Quamquam secus arbitratus est *libr. 1. de hystoria animal. capit. 17.* Aristoteles, cordis inuolucrum pingue esse asserens, intersepientibus membranīs forte delusus, quæ huic inuolucro obnatæ præpingues, ac potissimum in hominibus videntur. Ceterum exterior hęc inuolucris superficies propter fibrosos nexūs, ut Aristoteles deceptus. membranæ inuicem connatæ, aspera cernitur. Inuolucris enim lateribus intersepientes membranæ quodammodo orbiculatim obnascuntur. Anteriori parti, cui illæ membranæ non obnascuntur, fibræ membranæ earum membranarum cavitatem implentium cordis inuolucro adnascuntur. Posterior pars vniuersa intersepientes quoque membranas habet connatas. ¶ Ceterum vniuersus mucro, & dextri lateris inuolucris egregia portio septi transversū nervo circulo ad latus sinistrum validissime, amploque admodum spatio connascitur: quod hominibus est peculiare. Similis quippe & canibus, & porcis a septo multum distat. Verum & hominum adhuc priuatim anterior mucronis pars tunicæ costas succingenti fibrosis nexibus hæret, ea parte quæ sinistri lateris sextæ, & septimæ costarum cartilagine pectoris ossi coarctantur. Sed & is inuolucris nexus inter thoracem interdiuidentes membranas perficitur, nullibi enim illarum medio inuolucrum cordis excedit, neque pulmonem vlla ex parte nisi illarum interuentu contingit. ¶ Nullas arterias in se dispersas habet, neque etiam venas, nisi perquam tenuissimas ab illis fere exortas, quæ intersepientibus membranīs tanquam in omentum deriuantur. Quum enim caua arteria transmittit, ab illa vix aliquid mutuatur: qua autem septo in hominibus connascitur, communia cum septo vasa sibi vendicat. Nervos quoque adipiscitur nimis quam obscuros, ac ab illis pronatos, a quibus recurrentes nervi iam pullularunt. Membranæ hoc cordis inuolucrum cordis, id est, quod dicitur, domus enim & arcule cuiusdam ac thecæ instar illud amplectitur, ac intersepientium membranarum beneficio sustinet. Porro cor in continuo versans motu, neque dum vivit animal vnquam quiescens, calidissimum viscus merito censetur, ideoque multa in eo aquæ quantitas est, ut scilicet ipsum madeat, & ne vehementi, Aque vasa in corde. & assiduo motu exsicceetur, sed ut libere & facilius palpitet.

De Corde. CAP. IX.

- C**OR, quod Græcis *καρδια* dicitur, & facultatis, atque adeo spiritus vitalis fons, & Nominat. natiui caloris sedes existit, pyramidalis figuræ est, & nuci pinæ non admodum absimile, ex basi nimirum latiori in mucronem paulo quam nucis pinæ acutiorē sensim desinens, estque multo longius quam crassius. Tota exterior superficies a basi ad mucronis usque extremum impenitens levis cernitur, nulli prorsus parti connata. Coronalis tamen venæ propagines a cordis basi ad mucronem usque cum coniuge suis arteriis excurrentes, sanguineque turgentes paulo magis reliqua cordis superficie extuberant, inæqualitatemque minimam efficiunt, quippe maxima sui corporis portione in cordis substantiam imprimuntur, dein etiam adeps, quo humanum cor plerumque abundat, aliquid inæqualitatis inducit. Basis propter vasorum egressus inæqualis utcunque visitur. Dextræ enim ipsius sedi dextra auricula simul cum vena caua, & arteriali vena committitur. In sinistra autem sede læuam habet auriculam, & præter arteriam venalem magnæ quoque arteriæ initium. De quibus infra copiosius dicemus.

- Ceterum hominis cor sua basi, quæ ipsius dignissima nobilissimaque pars, quum vasorum origo sit, censetur: exacte ut in reliquis animantibus, dextræ sinistræque sedis thoracis medium obtinet, atque quod ad anteriora posterioraque spectat, pariter se habet. Tantum enim a pectoris distat osse, quantum a vertebrarum corporibus abscedit. In thoracis autem longitudine quæ posteriori sede duodecim constituitur vertebris, quintæ vertebræ corpus respicit. In anteriori vero thoracis sede, quæ pectoris ossi longitudine terminatur, ad amissimam mediam sedem obtinet, tantundem a iugu-

lo remora, quantum ab ea ossis pectoris sede, cui septum inferitur. Atque hic tutissimus, & plurimum ab iis quæ foris incidere queunt, remotus, basis locus est, a quo reliquum cordis corpus sensim in anteriora, & in sinistrum latus eousque exporrigitur, ut mucronis posterior pars magis ad pectus atque antrorsum quam ipsum basis centrum vergat, & dextra quoque mucronis pars in sinistrum magis ipso basis centro protensa, medium pectoris ossis in sinistrum excedat, ipsumque mucronis centrum sextæ, & septimæ costarum sinistri lateris cartilagine respiciat, qua pectoris ossi coarctatur. Præterea cor in pulmonis, id suis lobis veluti digitis quibusdam amplexantis medio ita consistit, ut æqualem prorsus ex omnibus pulmonis partibus aeris per venosam arteriam molietur attractionem, & rursus fuliginosorum recreamentorum egestionem in pulmonem tentet, & iusta etiam portione per venalem arteriam, & venam arterialem pulmoni sanguinem porrigat. ¶ Ceterum iis terminis quibus cordis situs comprehenditur, illius quoque magnitudo innotescit, quæ sane homini, ut & cerebrum & iecur, quàm ceteris animalibus est grandior.

Magnitudo.

Substantia.

Fibræ.

Rectæ fibræ.
Transversæ.
Obliquæ.

Carnis cordis visus.

Fibrarum.

Motus cordis est naturalis.
Cordis substantiæ peculiare venæ & arteriæ.

Coronalis. Nerviulus cordis.

Tunica cordis.

Præcipua cordis substantia carne constat musculorum carne paulo minus rubra, verum duritia, spissitudine, & fibrarum quo intertextitur, Galeno libro secundo, de tempe. cap. 4. teste, genere, plurimum ab illa variante. Cordis enim caro longe durior existit, & spissior, iniuriisque ferendis pertinacior, & demum vario robustissimarum fibrarum genere donata: quum interim vnius musculorum sedis caro vnicam fere fibrarum speciem, eamque sparsim satis disseminatam duntaxat sortiatur. ¶ Fibrarum autem species, quæ cordis carne continentur, haud æque ac musculorum conspicua est. Nullus enim est musculus qui non ilico atque detectus est, fibrarum suarum differentiam exquisitè ostendat. At cordis quidem caro compactissimis fibris, & inter se plurimum differentibus oppleta visitur. Triplex tamen fibrarum genus ipsi a natura largitum esse, varius ac rarus qui in illo videtur fibrarum implexus, satis monstrat. Quin etiam sectio ipsa triplex hoc fibrarum genus inuicem commisceri, & nunc rectas, nunc transversas, & rursus rectas, & obliquas, & transversas quodammodo ostendit. ¶ Rectas autem in corde fibras appellamus, quæ in eo perquam elixato ex ipsius basi ad mucronis usque ipsius centrum deducuntur. ¶ Transversas quæ orbicularim cor ambiunt. ¶ Obliquas vero, quæ per cordis longitudinem procedunt. Atque iis sane fibris pro cordis mole, si eam scilicet ad musculum conferas, perquam numerosis, & carne has amplexante continenteque, potissima cordis substantia constituitur. ¶ Caro cordis in mucrone quam basi spissior solidiorque apparet, quod ea cordis pars tenuis sit, & quod ad eam rectarum fibrarum concursus perficitur, qui carnem mucronis compactiorem commonstrat, ad eum prorsus modum quo solidiorem carnem in musculi capite, aut tendinis principio videmus, quam in musculi ventris medio, ubi fibræ non adeo atque in illis locis compactæ ab inuicem magis dirimuntur, & si ob alia non differt. ¶ Caro cordis, ad præcipuas cordis functiones, quæ in sanguinis gratia pulmonis emutatione, & vitali spiritu conficiendo potissimum consistunt, opitulatur. Quippe sanguinem pro spiritu vitali generando attrahit cor, sanguinemque attractum subinde concoquit, & elaborat, ut pulmoni puriorem transmittat. ¶ Fibræ vero alteri functioni subseruiunt, qua cor tantisper dum vivit animal, & dilaturatur, & contrahitur, & aliquando inter contractionem dilationemque quiescit. ¶ Deinde illæ etiam motui cordis, qui naturalis est, arbitrioque nostro minime subditus, famulantur, rectæ quidem ad attractionem, orbiculares ad expulsionem, & obliquæ ad retentionem. ¶ Ceterum venæ cordis substantiam enutrientes, & arteriæ innatum suæ substantiæ calorem fountes, ac temperantes, sunt vena cordis basim coronæ instar cingens, atque ob id coronalis dicta, de quo libr. 3. cap. 16. diximus: & duæ coronales arteriæ, per cordis substantiam distributæ, de quibus suo agemus loco.

Cordis quoque basi nervulus offertura sinistro sexti paris cerebri nervo, ubi sinistri lateris recurrentem nervum constituit depromptus, ut sequenti libro fusius docebitur. Hic enim in cordis involucri basim penetrans, & sinistro venæ arterialis lateri posteriorique sedi exporrectus, in cordis basim oppido quam obscure perungit, tristantium duntaxat sensus gratia.

Tunica cordis substantiæ obnata illi membranæ prorsus responder, quæ musculorum ven-

Arum ventribus pertinaciter obnaſcitur, tenuiſſima nimirum membranula, quæ a muſculorum ſubſtantia diuelli nequit. Euiſmodi namque cordis extrema ſuperficie obducitur, cui in hominibus præcipue ad baſim durioris adipis copia adnaſcitur: aliquando & per reliquam cordis ſuperficiem ad mucronem uſque, ac id ſemper imprimis ſecundum venarum, & arteriarum per cordis corpus digreſſum. ¶ Præter adipem cor auriculas adeptum eſt. Sic autem diſſectionum auctores vocant appendices quaſdam baſi ipſius adnatas. Aurium autem nomine donatæ ſunt, non uſu, aut actione aliqua, ſed a ſimilitudine, quam illi in ſitu cum proprie dictis auribus obtinent. Ad utrumque enim cordis baſis ſeu capitis latus emicant, ſicuti & capiti animalis utrumque aures adiacent. Barbari *additamenta cordis* appellant, Rectius *appendices* dixiſſent.

B Dextra auris dextro cordis baſis lateri attenditur, toti anteriori inſertionis venæ cauæ regioni ſecundum illius longitudinē obducta, & etiam ſuo mucrone a venæ corpore abſcedens, elatius nonnihil quam cordis baſis ſorſum conſcendit. Huius auriculæ effigies pyramidem refert, exque oblonga baſi in mucronem, qui non admodum acutus protenſusque eſt, deſinit. Exterior ſuperficies auriculæ pro ipſius repletionē variat. Quum enim auricula in cordis conſtrictione turgēt, oppletaque eſt, gibba vndique & æqualis & aqueo veluti humore oblita cernitur. At inanita contidenteque auricula, ſuperficies hæc rugoſa, ac veluti plicis obſita ſpectantibus occurrat. Interim tamen auricula exterius aqueo humore, ut & cordis ſuperficies obducitur. Verum quandoque licet id rarius accidat, exterior diſtendat etiam auriculæ ſuperficies inæqualis, propter adipem illi tunc obnatum viſitur. Interior autem ſuperficies auriculæ cavitatem circumscribens, ventriculorum cordis, de quibus paulo poſt dicemus, ſuperficie omni no reſpondet. Ut enim ubi hæc vaſa inſeruntur & educuntur læuis, tota vero reliqua ſede aſpera, & foueis plena cernitur: ita quoque illa ubi venæ cauæ inſertionē adnaſcitur, læuis quidem eſt, reliqua autem amplitudine foueis, ac fibroſis implexibus adeo ſcatet, ut cordis ſuperficiem inæqualitate vincat.

Auriculæ vero ſubſtantia tripliæ fibrarum genere, & modica, eaque admodum dura, & quaſi cuticulari carne eas fibras amplectente conſtat, adeo ut auricula fibræ cordis ſubſtantiæ reſpondeat, ac carne a corde differat. ¶ Ceterum auriculæ connexus propemodum ita ſe habet, ſiniſtrum ſui baſis latus extremo cordis ſubſtantiæ, ubi anterior venæ cauæ in dextro cordis ſinu oriſicii regio conſiſtit, adnaſcitur: aut verius ab illo extremo auricula prodiit. Dextrum autem baſis latus venæ cauæ corpori ſecundum ipſius inſertionis in cor longitudinem, & in anteriori illius ſede connaiſcitur, ac velati cum venâ commune corpus efficitur. Tota reliqua parte auricula ab omni prorſus connexu libera eſt, & perinde ac cordis corpus in cordis quoque involucro continetur, nullis fibroſis nexibus illi commiſſa.

Siniſtra cordis auricula pleraque cum dextra poſſidet communia. Hæc namque in anteriori ſede exortus venalis arteriæ ſecundum ipſius longitudinem conſiſtit. Denique ex baſi in mucronem quoque ceſſat. Verum is mucro qui acutior dextræ auriculæ mucrone habetur, non adeo ſurſum, ſed in ſiniſtrum magis atque in latus exporrigitur. In ſuper ſiniſtra in prouectioribus ætate hominibus dextræ auriculæ dimidiatæ magnitudini cedit, ut & ipſum quoque venalis arteriæ oſtiolum longe minus venæ cauæ oriſicio viſitur. Quod ad externam internamque ſuperficies attingit, auriculæ utrunque reſpondent. Quanquam exterior ſiniſtræ ſuperficies rugoſior magis, multoque inæqualior ſemper occurrat. Interior autem ſuperficies ſimiliter atque in dextra auricula inæqualis, & foueis obſita cernitur. Subſtantia etiam ſimiles ſunt, verum ſiniſtra multo durior, ac minus in conſtrictione diſtentioneque ſequax viſitur. Quæ etiam ſi illam dextræ conferas, velut marcida exſiccataque ſpectatur, adipe ſemper magis quam dextra exterius abundans. In connexu prorſus conueniunt, uti enim dextra a venæ cauæ, & dextro cordis lateri ſecundum cauæ inſertionem adnaſcitur: ita quoque ſiniſtra dextro ſui baſis latere cordis ſubſtantiæ, ubi venalis prodiit arteria, connaiſcitur ſiniſtro autem latere ipſi venalis arteriæ corpori. ¶ Uſuramen parum admodum inter ſe differunt. Quum enim cor valido impetu diſtensum ſanguinem in dextrum ipſius ſinum ex cauâ allicit, & quodammodo rapiens eum abſorbet, quumque ipſa na cauâ, ut ex illa in alias corporis partes ſanguis non ita, ac ille pulmonis tenuis

Cordis a-
deps.

Cordis au-
riculæ.

Dextræ au-
riculæ ſitus.

Subſtantia.

Nervus au-
riculæ.

Siniſtræ au-
riculæ.

tianutritionis reſudaret, non adeo craſſo validoque, ac arteriæ conſtat corpore, periclitaretur proſecto vena in valida illa cordis attractione, ne rumperetur, niſi ſagax natura dextram cordis auriculam creaffet, quæ ad cordis motus ſequax, & ſanguine plena, quum cor dilatatur, ſanguinem eum quem continet, in dextrum ventriculum diſfundere poſſet, ipſaque quodammodo in ventriculum attractionis impetum ſolutura conuolueretur, cordique inſtar promtuarium eſſet. Atque huic uſui reſponderet cuticularis auriculæ conſtructio, quæ levis & iniuriis interim perferendis contumax, & ad cordis motus ſequax eſt. Caua autem viſitur, vt continere materiam poſſit, & fibris conſtituitur, vt attractioni, retentioni, & expulſioni inſeruiat. Verum quod cordis ſubſtantia ipſius auriculæ ſubſtantia adeo conuenit, oſtendere videtur, & innata ſibi facultate ad ſanguinis leuem quandam cordis ventriculo præparationem conducere. **B**

Sinistra cordis auricula venosæ arteriæ adnata, idem prorsus officium huic, & ſinistro cordis ſinui præſtat, quo venæ & dextro cordis ventriculo dextram auriculam uſui eſſe diximus. Et ſinistra auricula tanto minori cavitare donatur, quanto etiam arteriæ venalis orificium cauæ orificio anguſtius viſitur. Deinde aer etiam ipſo ſanguine ſequacior eſt, adeo vt hac quoque occasione ſinistra auricula iure minor dextra creata ſit. Nam quum aer ita promte attrahatur, non tantum periculum erat ex attractionis impetu, qui poſſimum vacui fuga aerem trahit: venosæ arteriæ corpus ita atque cauæ conuelli.

De cordis ventriculis, & vasis, ac eorundem orificiis. C A P. X.

Humanum cor intus duas inſigniter amplas obtinet cavitates, quas Græci *κοιλίας*, Latini *ventriculos*, ac *ſinus* nominant, ſecundum cordis latera ſitas, unam dextram, alteram vero ſiniſtram. Harum autem dextra ſiniſtræ amplitudinem vincit, ambæque inuicem forma plurimum variant. **S** Dextra namque magis deorſum ad cordis mucronem ipſo ſinistro deſcendens, cavitatem inſtar creſcentis lunæ paratam adipiſcitur. Si quidem dextro ipſius latere, anteriorique & poſteriori ſede inſtar interioris ſemicirculi, aut ita exſtructæ, cameræ ſedis concava eſt, exteriori in iis regionibus ſuperficiæ, quæ gibba eſt, reſpondens. In ſinistro autem latere externæ forniciæ aut ſemicirculi ritu gibba cernitur, propter cordis ventriculorum ſeptum ſemiorbis modo dextra ipſius ſuperficie in dextri ventriculi amplitudinem protuberantiæ. Atque hanc formam dexter cordis ventriculus a baſi ad mucronem uſque ſeruat, ſimul cum cordis effigie ex latiori baſi anguſtior redditus. **S** Sinister ventriculus ampla etiam baſi incipit, ſenſumque in arcum verſus cordis mucronem deſinit, cavitatem inſtar conii, quod ad totam ſuperficiem ſpectat orbicularem obtinens. Cordis namque ventriculorum ſeptum ſinistro ipſius latere, quo ſiniſtri ventriculi dextrum latuſ efformat, concavum, non vero vt dextro latere gibbum extruberanſque viſitur, & parem craſſitiem naturamque cum cordis ſubſtantia ſiniſtrum latuſ, & anteriorem poſterioremque ſiniſtri ventriculi ſedes conſtituente, habet. Ceterum vniuerſa cordis ſubſtantia, præter ventriculorum ſeptum, dextri ventriculi amplitudinem conſtituens, tenuis admodum eſt. Quæ vero ſiniſtrum ventriculum orbiculatim ambit, efformatque, ventriculi dextri ſubſtantiam multis modis craſſitie ſuperat, & vndique æque craſſa viſitur, præterquam in ipſa baſi, vbi vaſorum illinc prodeuntium dehiſcentiumque gratia, cordis carnea ſubſtantia tanta amplitudine deſicit, quanta orificiorum eſt amplitudo. **S** Vriusque ventriculi ſuperficiæ perquam inæqualis eſt, & multis quaſi foueis in carneam ſubſtantiam penitus impreſſis obſita. Neque iſtæ ad latera tantum conſiſtunt, vbi dexter ventriculus ſiniſtrum reſpicit: verum per vniuerſam proſuſ ventriculorum ſuperficiem, non ſolum in nuper occiſis animantibus, ſed perpetuo, tanſper dum cor ipſum ſeruare volueris, apparentes, neque vnquam vel in exſiccato corde conuiuentes. Deinde præter hanc inæqualitatem, quæ in ſinistro ventriculo non nihil inſignior eſt, ambo carneas quaſdam explantationes proceſſusue intus habent, qui teretes ſunt, & graciles, & in membranas fibras ceſſant, humiliori ſedi membranarum in ipſis ſinibus poſitarum continuas. Cernuntur autem carnei hi proceſſus poſſimum ad ventriculorum mucronem, humilioremue ſedem, qui ad fibrarum quas continent robur, vt infra latius dicemus, faciunt. Ventriculorum igitur ſeptum craſſiſſima cordis

Sinistra
auricula
vius.Nume-
rus.
Nomina.
Situs.
Forma
dextri.Sinistri
forma.Superfici-
es ventri-
culorum.

- A** cordis substantia efformatum, vtrinque foueis ipsi impressis scatet, hac imprimis occasione inaequali superficie, qua ventriculos respicit donatum. Ex iis foueis nullæ, quod sensu saltem comprehendi licet, ex dextro ventriculo in sinistrum penetrant, adeo sane, ut rerum Opificis industriam mirari cogamur, qua per meatus visum fugientes ex dextro ventriculo in sinistrum sanguis resudat. ¶ Porro ventriculorum cordis eiusmodi fere usus est. Dexter eo quod sanguinem præcipue continet, sanguinisque elaborationi potissimum dedicatur, Sanguineus Græcis iuxta ac Latinis Galeno *libr. 6. de usu par. cap. 7. teste* nuncupatur. Is namque pulmonis duntaxat gratia a summo rerum Opifice cordi insculptus est. Pulmo enim qui instar promptuarii cordi circumponitur, ut id ab illo aerem perpetuo allicere queat, rarus, fungosus, levis, ac ad thoracis motus sequacissimus fieri debuit. ¶ Neque profecto suis functionibus idoneo nutrimento ali potuit, nisi priuatim illi sanguis ex eo quem caua continet levis, aerius, spumosus, expurgatus, nihilque minus quam fœculentus, ab alio instrumento præpararetur, atque ita ipsi pulmoni ad opportunam nutritionem deduceretur. At nullum instrumentum corde ipso calidissimo, & pulmoni proximo viscere, ad id minus erat aptius: neque etiam aliud omnino iustius pulmoni in hac re famulari poterat: quandoquidem nimis quam ingratum cor habendum foret, si pulmoni tam amice aerem, quo nisi ilico concidere emorique velit, perpetuo indiger, ipsius nomine attrahenti, ac obsequentissimi famuli ritu præparanti, & illius potissimum gratia fabricato, nullas vices referendas putaret, ac non modo omnibus cor ut gratiam reponeret, pulmoni opportunum alimentum, quum id citra incommodum possit conficere, præparareque studeret. Pulmonis igitur occasione dexter cordis ventriculus creatus est, *ut paulo post latius dicemus.* ¶ Sinister cordis ventriculus, quod spiritum vitalem præcipue contineat, & conficiat, aeremque amplectatur, dissectionis professoribus, *Galeno loco citato teste*, spirituosus aereusque vocatus est. Hic tanto crassioribus ex cordis substantia lateribus quam dexter ventriculus constituitur, quanto materia quam ipse inclusam seruat leuior, rarior, & euaporatu promptior, velociorque illa est, quam dextrum habere diximus. Minus enim sanguinis in sinistro ventriculo asseruatur, estque is plerumque tenuior & flauior, quanquam interim quandoque e contrario crassior rigidiorque appareat, calidior vero semper. Quemadmodum vero dexteræ caua sanguinem trahit, ita quoque sinister aerem ex pulmone in arteriam venalem attractum ad se dilatato corde allicit, illoque ad caloris innati refrigerationem, & substantiæ ipsius enutritionem, spiritumque vitalem vitur, hunc aerem concoquens & præparans, ut is una cum sanguine qui ex dextro ventriculo in sinistrum per ventriculorum septum copiosius resudauit in magnam arteriam, totumque adeo corpus deligari queat. ¶ Ceterum cordis quatuor sunt vasa & totidem orificia, Vena nimirum caua, vena arterialis, arteria venalis & arteria magna. ¶ Vena caua ad dextrum cordis latus dextrumque ventriculum fertur. In dextrum enim latus basis dextri ventriculi ad humiliorem eiusdem basis sedem vena caua amplo patentique admodum orificio inseritur, ac ilico ab insertione, quæ totius venæ capacitatem amplitudine multum superat ac velut extuberans ad cordis substantiæ terminos circulus visitur, sursum ad iugulum, & deorsum versus septum contendit. Nec arteria magnæ modo in duos truncos diuiditur, sed ex dextro basis cordis latere instar recti pali citra aliam diuisionem cordis inuolucrum permeans, sursum deorsumque prorepat. ¶ Vena igitur caua primum cordis vas est, & ipsius insertio Vena caua primi orificii loco habetur. Per hoc quoties cor dilatatur ac distenditur a caua vena magnam sanguinis copiam attrahit, quem adiuantibus ad hoc ventriculi foueis excoquit, & suo calore attenuas, leuioremque, & qui aptius subinde per arterias ferri queat, reddens maxima portione per ventriculorum cordis septi poros in sinistrum ventriculum desudare sinit: reliquam autem eius sanguinis partem dum cor contrahitur arctaturque per venam arterialem, *de qua statim dicemus*, in pulmonem deriuat. Atque is certe venæ caux in cordis ventriculum orificiū vti est. ¶ Vena arterialis etiam dextro cordis ventriculo adscribitur. Vena autem dicta est ab usu, quod scilicet sanguinem ex dextro cordis sinu in pulmonem defert, venæque prorsus vicem gerit. Arterialis autem, quod arteriæ corpus nata est. Hæc multo minori quam caua orificio ex dextri ventriculi basis clarissima parte iuxta dextrum latus ventriculorum septi enascitur, &

Vfus dextri
ventriculi.
Sanguineus.

Sinistri
ventriculi vſus.
Spirituosus.

Cordis vasa
quor & que.

Vena arterialis.
Nominis
factio.

magnæ innitens arteriæ, sinistrorsumque nonnihil suo caudice inclinans, ac cordis inuolucrum permeans, tandem in duos truncos discinditur, quorum dextrum ad sinistrum latus caudicis magnæ arteriæ, posterioremque eius caudicis sedem reflexus, in dextros pulmonis lobos digeritur, sinistro vero in sinistros. Vena itaque arterialis alterum cordis vas est, & secundi orificii loco habetur. ¶ Hæc autem in hoc potissimum facta est, ut pulmoni aptum suæ substantiæ alimentum ex dextro cordis ventriculo exportaret, quod læue, æereum, spumosumque esse oportuit. Neque enim alia de causa inter reliquas corporis venas arteriæ tunica adepta est, nisi propter continuos pulmonis & cordis motus, & ne pulmo tenuis illius, quem continet, sanguinis plus quam ad nutritionem sufficere possit sibi alliceret, atque etiam ut pulmo continuo ipsius motu ac calore sanguinem in arteriali vena deductum sibi magis excoqueret, spumosioremque redderet. Accedit huc arterialem venam organum soli nutritioni oportunissime subseruiens, quodque secundum pulmonis compressionem & dilatationem quiescere, atque quam minimum moueri oportuit, magna naturæ prouidentia aliis corporis venis impensus rigidum, crassumque, & compressu dilatatuque difficilius factum esse. Hæc siquidem ratione venæ arterialis propagines, arteriæ venalis & asperæ distentionem & dilatationem haud impediunt: quum interim si illæ propagines sequaces essent, atque leui occasione distenderentur, magnam pulmonis amplitudinem illo dilatato implerent, & rursus compresso pulmone subsiderent, magnamque vim in asperæ arteriæ propaginibus ex pulmonis compressu fieri prohiberent.

Venalis arteria.
Nominis ratio.

¶ Porro venalis arteria, quæ ab usu quod ærem contineat & deducat arteria, a qua substantia autem, quod venarum corpori respondeat venosa nuncupatur, inter sinistri cordis ventriculi vasa connumeratur, ac ut venarum corpus adipiscitur, ita quoque ex molliori sinistri ventriculi sede originem ducit. Ex sinistro enim sinistri ventriculi latere ad eiusdem ventriculi dimissiorem partem venalis arteria patenti admodum orbicularique orificio enascitur, ac statim ab ortu, aut in ipso potius ortu, in duos truncos deriuatur, quorum dexter sub cordis basi productus, ac cordis inuolucrum penetrans, in dextram pulmonis sedem dispergitur, sinistro interim in sinistram pulmonis partem exporrecto. Atque hæc quidem venalis arteria tertium cordis vas est, & tertii orificii loco habetur. ¶ Ceterum si quæ fuliginosa excrementa ex aeris in sinistram ventriculum dilatato corde attracti emutatione, ipsoque innato calore producantur, ea rursus per arteriam venalem constricto corde excernuntur. Quod ut commodè faceret, corpus aliis arteriis tenuius rariusque nata est. Hæc etiam arteria, ut reliquæ totius corporis, aspera excepta, omnes, sanguine tenui ac spirituofo oppleta, pulmoni idoneum suppeditat sanguinem, quo pulmo tum propter ipsius mollietatem, tum propter continuum motum, tum propter caloris copiam, quam ex cordis vicino indefessumque cordis motum adipiscitur, plurimo præ ceteris corporis partibus indiget.

Magna arteria.

¶ *Quartum vas*, quartum cordis constituens orificium, Græcis Aristoteli præsertim *ἀσπὴν* nominatur, quod neruosam ipsius partem, vel in mortuis conspici posse diceret, instar vaginæ fortassis, quam Macedones *ἀσπὴν* vocant. Alii Græcorum eam *μυστήριον*, alii simpliciter *μυστήριον*, alii *ἀσπὴν* appellant. A Latinis *magna arteria* nominata, ex sinistro ventriculo pari ratione, qua arterialis vena ex dextro principium ducit. Ex dextro enim elatissimæ sinistri ventriculi sedis latere, & ex cordis basi veluti centro arteria magna enascitur, aliquousque recta sursum sub venæ arterialis caudice tantisper prorrepens, donec cordis inuolucrum permeans, in duos truncos discindatur, quorum vnus corporis superiora, alter inferiora petit. Atque profecto durorum crassorumque vasorum, ipsius nimirum arterialis venæ, ac magnæ arteriæ, principia adeo respondent, ut sinistram arterialis venæ latus dextro arteriæ magnæ lateri in ipsa origine adnatum sit, atque boque vasa hic ex eminentissima cordis ventriculorum septi sede commune principium radicemque possideant, quod eousque in quibusdam animantibus, ceruis potissimum, indurefcit, ut id Galenus libro sexto, de usu partium, capit. decimo octauo, & libro septimo, de ana. admi. os esse, sed tamen cartilagineum affirmer. Hoc autem vas spiritum & sanguinem tenuem in vniuersum deriuat corpus, ut sequenti capite fufius dicemus. De iis etiam omnibus plura Galenus loco citato habet.

De membranis quatuor orificiorum cordis. Cap. XI.

- A** Cordis membranæ sunt corpora, quæ cordis vasorum radicibus, ipsorumque exor-
tibus adnata, colore, substantia, crassitie prorsus membranæ existunt, materierum
regurgitationibus præfixæ. Sunt porro omnes hæ membranæ undecim numero, ac
tres quidem singulis trium vasorum orificiis, duæ autem duntaxat vno tertioque ad-
nascuntur. ¶ *Caua vena*, seu primum dextri ventriculi vasternas membranas obtinet.
Cauæ enim insertioni, quæ veluti extuberans circulus est, alius membranæus circulus
humiliori insertionis parti proxime adnascitur, qui prorsus ex cordis substantia prin-
cipium ducit: & quemadmodum vena ab insertione extrorsum e cordis ventriculo fer-
tur, ita quoque membranæus hic circulus introrsum, atque in dextri ventriculi ampli-
tudinem procedit. ¶ Præterea ut vena caua ilico a cordis substantia, cui implantatur,
abscedit, sola insertione, quæ breuissima est, cordis substantiæ adnata: sic etiam mem-
branæus circulus minima amplitudine cordis substantiæ hic adnascitur, mox ab illa
discedens, ac exacta, solida, citraque insignem crassitiem valida membrana apparens.
Hæc in ventriculi cordis amplitudinem deorsum ducta, non procul a principio in tres
veluti membranas scinditur, ex ampla basi in obtusum mucronem desinentes, ac vix a
semicirculi conuexo differentes. Mucro autem harum membranarum paulo supra
mediam ventriculi dextri longitudinem cessat, neque aliqua ex parte quam circulari
exortu membrana hæc tribus ipsius processibus cordis substantiæ adnascitur. Vetum
ex tota inferiori sede trium membranularum, seu processuum, quæ reliquo ipsarum cor-
pore non nihil crassior validiorque efficitur, fibræ quædam frequenti serie enascun-
tur, quæ deorsum per ventriculi amplitudinem ductæ, ventriculi lateribus iuxta ipsius
mucronem adnascuntur.
- Ceterum prædictæ fibræ, quæ membranulis committuntur excarnes sunt, & cor-
dis substantiæ haud adnascuntur. Vnde etiam Aristoteles illas nervos esse arbitratus,
cor nervorum principium esse iudicavit. Verum ubi fibræ ad ventriculi mucronem
implantantur, aliquousque carnosa substantia adaugentur suffulciunturque non aliter
certe apparentes, quam si carnes in cordis ventriculo virgulæ essent. Porro membra-
na hæc propter tres membranæos ab ipsa deductos processus, trium venæ cauæ orificii
membranularum loco enumeratur, atque quod processus illi quum clauduntur ac in-
uicem conniunt, spiculorum sulcis structura quam similimi sunt, Græci *τρυγλῆδες*, qua-
si *trifurcas*, aut *tricuspidēs* appellauerunt. Quum enim membranæo circulo adhuc pāren-
te, & orbiculari seruatō, tres ipsius processus inuicem e regione illius centri coeunt,
formam effingunt triangulari cuspidi non absimilem.
- Tres autem membranulas cauæ orificio natura ideo præposuit, ne irrita cordis
dum dilatatur in dextrum sinum sanguinis ex caua vena fiat attractio, eodem scilicet
rursus dum cor comprimetur per idem orificium Euripi ritu, perpulso. Hæ itaque
membranæ sanguinē dilatato corde in sinum ex caua vena fluere sinunt. At compresso
corde ne idem in cauam refluat, prohibent. Quum enim dexter cordis sinus distendi-
tur, quod fit quories breuior redditus in latitudinem insigniter proficit, tunc mem-
branæ illæ laxiores factæ, ad ventriculi dextri latera concidunt, ac sanguini recluso ca-
uæ venæ orificio, aditum præbent. At ventriculo rursus constricto, seu longiore facto,
& interim arctato, membranarum fibræ, ipsæque membranæ propter cordis mucro-
nem ab ipsius basi magis abscedentem tenduntur. Et quum ventriculi mucro in eum
modum angustior efficitur, membranularum quoque fibræ mucroni ventriculi potif-
simum adnatæ, inuicem colliguntur, ac proinde etiam e regione centri venæ cauæ ori-
ficii, sui extremis inuicem accedentes, orificium id occludunt, ac quo minus sanguis
rursus in cauam profluat, obstaculo sunt. Porro quemadmodum venalis arteria venæ
cauæ tum corpore, tum intromittendis ad cor materiis accedit, ita quoque venalis ar-
teriæ membranæ cum cauæ orificii membranis pleraque communia habent. Ad radi-
cem enim orbis venalis arteriæ membranæus circulus ex cordis substantia enascitur, qui
in sinistris chordis ventriculi amplitudinem introrsum, ut venalis arteria extrorsum,
ducitur, statimque ab exortu a cordis substantia abscedit, venæ cauæ orificii membra-
neo corpore hucusque quam similima. Verum quum aliquantisper in ventriculi am-
plitudinem descendit in duos tantum membranæos processus partitur, forma quidem

Membranæ
Numerus.

Caua venæ
membranæ.

Aristoteles
cur cor ner-
uorum prin-
cipium di-
zerit.
Membranæ
huius no-
men.

τρυγλῆ-
δες.

Venæ.

Venalis ar-
teriæ mem-
branæ.

illis qui ad venæ causæ orificium pertinent respondentes, sed mole & robore superiores. **A** Exempla enim basi in obtusum mucronē finiunt, longius in sinistri ventriculi cavitatem, quam causæ orificii membranulæ in dextri contingentes. ¶ Horum processum unus dextrum ventriculi sinistram latus, alter sinistram respicit. Anterius enim & posterius inuicem dehiscunt. Secundum vniuersam eorundem humiliorē sedem fibræ seriatiim ex illis enascuntur, quæ deorsum porrectæ, tandem cordis substantiæ ad mucronis sinistri ventriculi amplitudinem passim adnascuntur, & carnea cordis substantia adaugentur. Ceterum quia membranæ venalis arteriæ circulus in duos tantum processus dirimitur, dissectionis procures duas tantum membranulas ipsius orificio præfici afferunt, quas etsi nemo veterum, *ut lib. 6. de usu par. cap. 14. teste*, anatomicorum tentauerit assimilare alicui eorum quæ cognoscuntur, tamen mitræ episcopali non admodum ineptè contuleris, si modo partem caput amplectentem ipsi membraneo circulo, & huius processus anteriori posteriorique mitræ cacumini assimilaueris. Porro duæ venalis arteriæ orificio commissæ, ac introrsum in cordis ventriculum membranulæ deductæ, corde quidem dilatato aerem ex venali arteria in ventriculum ferri permittunt; ipsarum fibris propter cordis mucronē versus basim in dilatatione magis adductum laxatis, ipsisque membranulis ad ventriculi latera cōcidentibus. Quum autem cor constringitur, obstaculo sunt, ne aer rursus in venalē arteriam ruat, irritusque cordis labor efficiatur. ¶ Non tamen exquisitè, *ut Galenus etiam lib. 6. de usu par. testatur*, clauduntur, ne scilicet fuliginosis excrementis, quæ nativum cordis calorem extinguere possent, exitum præpediant. ¶ Venæ arterialis membranæ dictorum modo orificio- **C** rum membranis neque situ, neque forma, neque etiam robore respondent. A venæ enim arterialis exortu hæ introrsum in dextrum cordis ventriculum haud pertingunt, sed totæ in eius vasis caudice consistunt, ita ab orificio extrorsum ductæ, ut prius commemoratæ membranulæ ab orificio introrsum pertinebant. Neq; etiam iis unus communisque est circulus, verum tres distinctæ, & non admodum validæ sunt membranæ, singulæ semicirculi modo principium ducentes. ¶ Venæ enim arterialis orificium introrsum, atq; in suam ipsius amplitudinem nonnihil in origine extuberans, suæ amplitudinis superficiem in tres semicirculos extrorsum a corde latecentes distinctam obtinet, qui crassiores redditæ, in ipsam vasis amplitudinem protuberant, ac suis tuberibus veluti tres triangulos ita efformant, ut in puncto se contingentes circuli extra suam su- **D** perficiem, supra infraque contactus terminum, angulos constituent. ¶ Ab his semicircularibus tuberibus membranæ tota ipsa ipsarum amplitudine, quasi semiplenæ lunæ imaginem referentes præ nascuntur, nusquam vasi ipsi, præterquam ad hæc tubera, adnatæ. Quum itaque superior latissimaque membranarum pars latusue instar dimidiatæ parenthesis ad hunc modum (inflectatur, & ipsarum membranularum exortus, & ad vasa cōnexus semicirculū ad amussim exprimet, Græci has mēbranulas *σινυειδείς*, appellarunt, ab illorum) imagine. ¶ Ceterum venæ arterialis orificium in cordis contractionibus: patens sanguinem ex corde versus pulmonem transmittit. At quo minus idem rursus dilatato corde in dextrum eius sinum regurgitet, tres membranæ arterialis venæ orificio præfectæ cauent. Illæ etenim quia principium cum venæ arterialis origine ducunt, ac sursum tensæ in venæ cavitatem cessant, atque ad venæ latera concidunt, sanguinem in cordis contractionibus promte in venam fluere sinunt. At quum is rursus ob cordis dilatationem ad ventriculum vacui fuga retractus, aut etiam in pulmonis compressionē versus venæ arterialis caudicem protrusus ad cor impetu vergit, per venæ latera descendens, inter venæ corpus & posteriorem membranularum sedem concidit, spatium quod inter corpus venæ ac membranas est implens. Vnde etiam necessario membranas deorsum protrudens ipsis, ut ad orificii venæ arterialis centrum inuicem conniueant, orificiumque claudant, occasio est: adeo ut quanto vehementius cor sua dilatatione sanguinē retrahit, ipseque pulmo inter expirandum comprimitur, tanto exactius membranæ venæ orificium obrurantes, sanguinē in cor refluere prohibent. **E**

¶ Porro prædictis tribus venæ arterialis membranulis, tres in arteriæ magnæ ostiolo a natura creatæ respondent, in nullo prorsus ab illis, quam in magnitudine & robore differentes. Magnæ enim arteriæ membranulæ tanto grandiores validioresque venæ arteriatis membranulis visuntur, quanto venæ arterialis corpus ab arteriæ corporis duri- **F** tia am-

Venæ arterialis membranæ.

Membranulæ. Vñs.

Anteris magnæ membranæ.

Atria amplitudineq; vincitur. Hæ autem in cordis contractione spiritum vitalem vna cum sanguine in magnam arteriam fluere sinunt. At corde rursus dilatato, spirituque ac sanguine denuo ad ventriculum tracto, illius regurgitationem in ventriculum prohibent, sanguine nimirum eas versus magnæ arteriæ orificii centrum comprimente.

De arteriis generatim. C A P. XII.

QUum constet vniuersas corporis arterias a magna vocata arteria oriri, ordinis ratio exposcere videtur vt hoc loco aliquid de arteriis dicamus. Sciendum autem initio erit, arteriam esse vas membraneū, teres ac fistulæ modo cauum, quo vitalis spiritus, & tenuis, flauus, calidusq; sanguis per vniuersum corpus diffunduntur: quorū beneficio, ac dein arteriæ ipsius motu, qui dilatatione ac contractione fit, naturalis singularum

B partium calor vitalisque spiritus refocillantur. ¶ Porro Hippocrates, Plato, & alii veteres nobis arterias vocatas, venas appellabant, atque arterias a venis nonnulli ea ætate distinguebant, quum has quidem non pulsantes, illas autem pulsantes dicerent, vt alibi fusius monstrauius. Sed progressu temporis eam, quæ ex ore in pulmonem pertingit, asperam vocare cœperunt. Vasa vero pulsantia naturalemq; calorem recreantia, arterias laues nominauere. ¶ Ceterum arteriæ hæ similitè ac venæ membraneo constant corpore, comprimi ac in se collabi, & rursus distendi idoneo: at longe solidiori, duriori, & ex pluribus tunicis conformato. Arteriæ enim duas peculiare sibi vendicant tunicas, quarum exterior profecto robore ac crassitie venarum peculiari tunica responder. Interior autem plurium anatomicorum suffragio, crassitie huius fere quintupla, ac post-

C modum totum arteriæ corpus ad venam collatum sextuplum censetur. Hæc tunica quibusdam quia durior, & quauis membrana longe crassior sit, *Xoropodis*, hoc est, cartilaginea nuncupatur. Tunica arteriæ perinde atque venæ fibris conformantur. Ac interior quidem transuersis duntaxat intertextitur, exterior vero rectis, & quibusdam mediocriter obliquis, transuersis autē nullis cōstat. Interior arteriæ tunica ceu cutē quandā internæ intestinorū & vetriculi superficiei modo continet, latæ continuæq; araneorum telæ manifesto per similem, in grandioribus quidem arteriis conspicuam ac nonnullis tertiæ arteriæ tunica loco descriptam. ¶ *Quarta* vero alia peculiaris tunica nulla est, sed veluti quibusdam venarum, ita quoque arteriis alicubi membrana tenuis obhærescit & circumtenditur contegens, aut stabiliens aut connectens ipsas proximis parti-

D bus, quemadmodum de altera venarum tunica *lib. 3. cap. 14.* retulimus. ¶ Arteriæ autem hoc quo diximus modo ideo a rerum Opifice exstructæ sunt, vt vitalem spiritum & sanguinem impetu per corpus diffusum singulis partibus deducerēt, innatumq; refocilla-

rent calorem. ¶ Fibras ærem arteriæ corpore eiusdem quo venæ vsus gratia sortitur, ac plurimas quidem transuersis, vt ocys ipsi ex sinistro cordis ventriculo immisum sanguinem, & vitalem spiritum toti corpori dispenseret, neque alium in transmittendo recipiendoq; rhythmum, quam cor ipsum efficiat. Ad hoc namq; munus magnopere transuersæ conducunt, quas expulsionis a natura præfectas esse constat. Obsunt autem expulsionis insigniter obliquæ, vt quæ materias retineant ac reseruent. ¶ Vnde etiam natura paucissimas obliquas arteriis elargitur. Quæ quum tenuiorem rarioremque & velociori impetu ruentem substantiam quam venæ erant amplexuræ, ac dum viuunt animal perpetuo dilatandæ constringendæq;, merito etiam durioribus & crassioribus pluribusq; tunicis conformantur. ¶ Arteriæ autem numero binæ sunt. Vna quæ ex sinistro cordis ventriculo originem capit, atq; magna dicitur, in vniuersum corpus præter pulmonem instar caudicis ramos & propagines deriuans. Altera ex eodem cordis ventriculo pronata, in solos pulmones distribuitur, & quia venæ corpore constat cū adiectione, vt dictū est *ca. 10.* arteria venalis nominatur. Dux itē sunt arteriæ ab vmbilico secundū vesicæ latera descendentes ac fortui quodammodo propriæ, vt *lib. 4. cap. 4. fusius monstrauius.*

De magna arteria ortu, & ramis in quos ipsius pars ascendens digeritur. C A P. XIII.

COR esse arteriarum fontem & originem non solum Hippocrates, Plato, & Aristoteles, sed & Galenus, adeoq; & Philosophiæ & medicinæ principes restantur. Ex latiori autem sinistri ventriculi cordis sede, prope ipsius basis centrum magnam arteriam originem ducere *capite 10 huius libri diximus.* In quo sane ortu orbicularis est, ac hic ipsius amplissima sedes & durior & cartilaginosa consistit. Ipsa autem arteria simulatque enascitur, duos graciles promit surculos, qui coronæ prorsus modo cordis

Arteria quid.

Arteriæ veteribus venæ appellatæ.

Arteriæ corpus quale, & dux ipsius tunicæ.

Fibræ tunicarum.

Arteriæ arteria, & tunica.

Arteriæ usus.

Fibrarū.

Arteriæ numerus. Magna.

Venalis.

Arteriæ ortus sedes.

Coronales arteriæ.

Caudicis
arterie bi-
partitio.

Ascende-
tis partis
arterie se-
ries

Sinistram
axillam
perentis
portionis
series.

basim vna cum coronali vena amplectentes, cordi secundum ipsius longitudinem ra- **A**
mulos transfundunt. ¶ Coronarium autem arteriarum ortus post membranulas confi-
stit, quas resumptionem spiritus sanguinisque ex ipsa arteria in sinistrum cordis sinum
prohibere capite II. diximus. Postquam vero magna arteria coronales depromit, a
cordis basis centro sursum quodammodo sub venæ arterialis caudice conscendit, ac
cordis inuolucrum perforans bipartito scinditur, ac vnam ipsius partem, qua grandior
est deorsum ad quintam thoracis vertebra, & deinde per reliquam dorsæ sedem de-
torquet, in omnes quæ cordi subsunt regiones ramos exhibituram. ¶ At minor pars su-
pra cor positæ sedibus distribuenda sursum properat, ac statim in progressu asperæ ar-
terię innitens, ac venæ cauæ inter membranas thoracem intersepientes subtrahit, ex
sinistro ipsius latere ramum distribuit oblique, sursum ad primam sinistri lateris costam **B**
exporrectam, qui sane qua pulmone accumbit atque sinistra thoracem intersepienti
membranæ, alligatur, nullas deriuat propagines. Verum simulatque primam thoracis
attingit costam, ab humiliori ipsius sede propaginem deorsum diffundit, quæ costarum
radicibus attensa, in tria quatuor superiorum costarum sinistri lateris interualla singu-
las soboles spargit: a quibus rursus surculi in dorsalem medullam, & musculos thora-
ci vertebriisque hic intratos excurrunt. ¶ Ceterum ab elatiori sede eius ad primam co-
stam conscendentis rami, alia enascitur propago prius commemorata, multo amplior,
quæ ad septimæ cervicis vertebræ latus oblique recens, in huius lateris transuersi pro-
cessus foramen se inserit, ac deinde per transuersorum reliquarum vertebrarum pro-
cessuum foramina conscendens, perinde atque hac excurrens vena digeritur. Nam in **C**
progressu dorsali medullæ surculos deriuat ea subingredientes foramina, quæ nervis e-
mittendis rerum Opifex exsculpsit. Deinde & musculis cervicem hic occupantibus ab
illa propagine ramuli quoque sparguntur. Quod vero eius reliquum est, simul cum co-
mite vena per foramen in posteriori sede sinistri capituli occipitis ossis insculptum ca-
uariam subit, atque in sinistram duræ cerebri membranæ sinum exhauritur. ¶ Præter
hanc propaginem vertebri exporrectam, arteria quam oblique ad primam sinistri la-
teris costam contendere diximus, alia ab anteriori ipsius sede pullulat propago, obli-
quiori ductu pariter superiora anterioraque petens. Hæc enim pectoris ossis summum
accedens, ac sinistra intersepientis membranæ adhærens, decliuis perfertur secundum
pectoris ossis sinistram latus, qua ipsi costarum coarctantur cartilagines. Hæc propago **D**
in eisdem omnino ramos digeritur, in quos venam hac repentem dispensari lib. 3. c. 16.
retulimus, præterquam quod nullæ soboles a præsentī propagine cutem accedant, nisi
forsitan obscurissimæ in mammillæ corpus pertingant. Qua enim hæc arterię propa-
go pectoris ossi exporrigitur, verarum costarum cartilaginum interuallis ramos offert,
a quibus alii ramuli in musculos assurgunt cartilaginibus incumbentes. Deinde & ab
hac propagine sui lateris membranam, quæ thoracis amplitudinem intersepit, & in glā-
dium in iugulo repositum, surculi mittuntur. ¶ Quod autem ipsius est reliquum, se-
cundum sinistram mucronatæ cartilaginis latus thoracis cavitatem ingreditur, & re-
cto hic abdominis musculo subnatum, ad vmbilici quodammodo regionem procedit,
in progressu vtrinque ad partes abdominis ramulos offerens, & iuxta vmbilicum in plu- **E**
res dissectum soboles alterius arterię terminos respicit, quam hoc ab imo sursum con-
tendere docebimus. Vbi arteria oblique ad primam protensa costam, hætenus com-
memoratas edidit propagines, sinistram aditura axillam, & musculum perforatura
dorsæ motorum secundi paris sinistram, ab ipsius elatiori parte priusquam e thorace pe-
nitus labitur, notatu etiam dignæ magnitudinis ramum deriuat, qui in posteriores cer-
uicem occupantes musculos ad occipitium vsque discinditur, nullibi interim cutem
subiens. ¶ At quum primum illa arteria thoracis cavitatem, & primam costam euicit,
iamque vicinior axillæ redditur, ex posteriori ipsius sede ramum vtrunque insignem
spargit in cauam scapulæ regionem, & eius sedis musculos absumendum. Post hunc ex
superiori ipsius regione aliam, sed non adeo crassam, depromit sobolem, quæ ad hume- **F**
ri cum scapula articulum iuxta summum humerum & scapulæ gibbum in ramulos di-
geritur, quorum vnus cum humerali vena vbi adhuc in alto reconditur, aliquousque pro-
repat. Huic soboli alius succedit ramus non nihil demissius in axillam perente arteria e-
natus, ac in musculos anteriori thoracis sedi intratos numerosa propaginum sobole di-
gestus.

- A** gestus. Dehinc ramuli in glandes axillæ cavitatem opplentes ab hac arteria admodum rari sparguntur. ¶ Quin etiam priusquam tota arteria in manum absumenda feratur, propago quædam thoracis lateri exporrigitur, potissimum in musculum excurrans, cuius beneficio brachium quodammodo declivè dorso adigitur. Quod præsentis arteriæ iam superest, axillari vena concomitatum, ac in brachium procedens penitus occultitur, & primum graciles ramos internæ musculorum humerum amplexantium sedi, & membranis nervos continentibus distribuitur. ¶ Insuper deorsum sensim adhuc prorepens, & continuo interiori axillaris venæ trunco attensa, aliam emittit propaginem, quæ secundum posteriorem humeri sedem, qua ipsi cubitum extendentes musculi adnascuntur, oblique prorepat ad externum humeri tuberculū contendens. Hæc n. propago vna cum vena quam hac duci retulimus, & dein cum quarto brachium petente nervo ad externam cubiti sedem pertingit, & sub musculorum capitibus aliquousque deductus cessat, qui hic ab humeri externo tuberculo principium ducit, & partim radii, partim autem brachialis, partim vero digitorum motibus famulantur. ¶ Vbi autem sinistræ manus arteria has soboles digessit, inter duo cubitum flectentes musculos recondita ipsiisque ramulos præbens, ad mediam cubiti articuli flexus prorepat, hinc utrinque ramulum ipsi articulo exhibens, & musculi cubitum flectentis posteriori insertionis innitens, hicque subinde pulsum evidentem edens. Hinc arteria inter musculum secundos quatuor digitorum articulos flectentem, & illum qui tertios eorundem digitorum articulos flectit, mergitur, ac ubi nonnihil per cubiti internam sedem prorepsit, bipartito scissus unum ramum radio, alterum vlnæ exporrigit. ¶ Qui secundum radium fertur, cuiusque pulsum indies in ægris exploramus, non procul a brachialis radice sobolem deriuat, quæ sub tendinibus pollicem extendentibus ad summæ manus externam sedem procurrit in musculos digesta, qui inter primum pollicis os & postbrachialis os indicem sustinens collocantur. Quando ramus a radio exporrectus illam emisit sobolem, vna cum tendine b. digitos flectentibus transversum brachialis ligamentum transgreditur, & subdilatescente in summa manu tendine, similiter ac vena huc pertinens, & nervus quoque illo attensos in tres ramos discinditur, quorum vnus in duas directus propagines internam pollicis regionem accedit. ¶ Secundus vero duplici ramo internam indicis sedem implicat. Tertius autem indiuisus internum latus interioris medii digitis sedis conscendit. Ramus arteriæ qui vlnæ exporrigitur, similiter per transversum brachialis ligamentum manus volam subit, & duos ramulos minimo digito, & totidem anulari, vnum autem medio offert, sed interim nullam sobolem in externam summæ manus sedem dispensat. Quamvis interim vnam illis musculis porrigit, qui externum latus postbrachialis ossis occupant, quo minimus digitus suffulcitur. Ad hunc sane modum primus arteriæ magnæ partis superiora petentis ramus diuaticatur, qui ad primam sinistri lateris costam contendit. ¶ Maior autem ampliorque ascendens arteriæ partis portio asperæ arteriæ innitens, recta sursum ad glandium in iugulo repositum properat: id enim arteriæ huic similiter ac venæ lectuli modo substernitur, ac ipsius beneficio ramorum scissio iniuriis innoxie ferendis promittitur. Quum vero in hunc modum arteria sursum tendit, priusquam elatiorem
- E** pectoris ossis sedem superat, adhuc in thoracis amplitudine in duos impares ramos scinditur. Sinister qui gracilior est, nonnihil oblique in læuum deflexus, sursum cum interiori iugulari secundum asperæ arteriæ sinistram latus per cervicem exporrigitur, ipsaque *reperitur*, hoc est, soporalis sinistra censetur. ¶ At dexter ramus sinistro crassior, similiter sursum tendit, & simulatque primam thoracis costam contigit, ex dextro ipsius latere arteriam promittit in eandem prorsus soboles discissam, quæ a ramo, qui sinistræ manui offertur, pullulare diximus: ad superiorum videlicet costarum intervalla, ad transversos cervicis vertebrarum processus, ad pectoris os, ad posteriores in collo locatos musculos: & ut rem in pauca contraham, in eosdem omnino ramos digeritur, in quos sinistræ manus arteriam desinere commemorauimus. Quod vero maioris dextrique ramus adhuc superest, crassitie illi congruit ramo, quem secundum asperæ arteriæ sinistram latus prorepere paulo ante diximus. Atque in hac porrigitur, ita ut ille dexter, secundum asperæ arteriæ dextrum latus sursum conscendit, ac huius lateris soporalem constituit arteriam, quæ, uti sinistra, *reperitur* nuncupatur. Quum autem sinistri lateris soporalis arteria, perinde ac dextri etiam, ad fauces usque pertingit, in duos discinditur ramos,

Arteriæ
ramus cuius
pulsum ante
brachiale
exploramus.

Series mai
oris por
tionis ma
gnæ arte
riæ partis
quæ supe
riora cor
poris pe
tit.

Soporalis
sinistra.

quorum grandior idemque interior fauces subit, ac mox laryngi & linguz propagines A
deriuans, ad caluariæ basim properat: priusquam vero in caluariam mergitur, in duos
impares deducitur ramos. Maior per peculiare foramen nulla concomitatus vena, cal-
uariam inibi ingreditur, vbi glandula cerebri pituitam excipiens in ossis cuneum refe-
rentis sinu ponitur. His ramus mox in ipso ingressu vtrinque singulas emittit propagi-
nes, ac vnā per proprium foramen ad narium amplitudinem dispensat, quæ suo ex-
tremo inter nasi cartilagine, adeoq; vsque ad nasi extremum ita cum aliquot faciei ar-
teriolis deperditur, vt tactu etiam ipsius motum inibi percipiamus. ¶ Altera propago in
latus sinistrum duræ cerebri membranæ multipliciter discinditur, ipsum autem arteriæ
corpus duas illas diffundens propagines bipartitur, & caluariæ basi suffultum, itaque di-
uisum in anteriora nonnihil tantisper repit, donec denuo ipsum colligatur. Subinde B
vero huc vsque non diuisa, neque collecta rursus, sed simplex prorsus fertur. Vtunque
autem sit, siue simplex huc pertingat, siue prius in duas partes diuisa hic se rursus colligat,
inibi insignem vtrunque ramum per secundi neruorum cerebri paris foramen ad
oculū ac interiorem tēporalis muscoli sedem distribuit. ¶ Quod vero ipsius reliquum
est, duram cerebri membranam perforat, ac partim in tenuem cerebri membranam,
partim ad sinistrum cerebri ventriculum conscendit, plexum inibi faciens qui secundi-
nis seu extimo fœtus inuolucto comparatur, ac ob id *extimæ* Græcis nuncupatur. Alter
ramus arteriæ partis, vt dictum est, ad caluariam ductæ, cum coniuge vena in postero-
ra secundum caluariæ basim fertur, & ramulum musculis cervicis vertebrarum antero-
rem sedem occupantibus, iuxta primæ secundæque vertebrarum intervallum offert, C
ac dein in caluariam ingreditur, & commune foramen cum sexto cerebri neruorum
pari nactus, simul cum vena in sinistrum, seu secundum duræ cerebri membranæ sinum
exhauritur. ¶ Porro sinistræ soporalis arteriæ ad fauces diuisionis exterior graciliorque
ramus, genis seu buccis ramulum offert, penitus latitantem. Insuper in duas propagi-
nes sectus, vnā sinistro tempore, alteram secundum sinistræ auris posterioris sedem
digerit, pulsum etiam edentes sensilem. Atque in hunc sane modum pars ascendens ar-
teriæ in ramos finitur.

De amplioris descendensue magnæ arteria trunci in suos ramos serie. CAP. XIII.

T Runcus magnæ arteriæ deorsum ad thoracis vertebrae explicatus, ab infima ipsius D
sede qua vertebris incumbit, non autem lateribus vtrinque propagines in octo infe-
riora thoracis intervalla deriuat, quæ similiter ac venæ coniuge carentis rami secundum
intervalli ductum ad costarum vsq; cartilagine in veris costis prorepunt, spuriarum ve-
ro costarum intervalla excedunt, in abdominis latera magis quam ipsæ costæ pertinen-
tes. Ab his propapaginibus ramuli in dorsalem medullam per foramina neruorum gra-
tia in vertebris sculpta, ac dein ad musculos vertebris thoraciq; adnatos sparguntur, pa-
ri omnino serie qua venam coniugis expertem disseminari *libr. 3. cap. 16.* proditum est.
Ipse autem arteriæ truncus vertebrarum corporum sinistræ sedi quodammodo inni-
tens, deorsum sub septo transuerso, qua id vndecimæ thoracis vertebræ corpus respicit,
extra thoracis amplitudinem labitur, ac mox vtrobiq; septo trāsuerso vnā offert pro-
paginem, quæ in plures secta surculos, in humiliorem septi iuxta vertebrae sedem præ- E
cipue deperditur, soboles sursum ad septi elatiora adeoq; ipsum cordis inuoluctum, qua
id septo adnascitur spargens. ¶ Post commemoratas propagines magna arteria ex ela-
tiori sui corporis sede, vnum promit truncum, ramos in ventriculum, iecur, bilis vesicu-
lam, lienem, omentum, duodenum intestinum, & colon vbi ventriculo exporrigitur,
ad hunc modum offerentem. Præsens truncus simulatq; prodiit, elatiori sede inferioris
membranæ omenti suffulcitur, ac in duos magnitudine propemodum æquales ramos
diremitus, hunc qui gracilior paulo est dextrortum, illum vero qui modice amplior visi-
tur sinistrorsum mittit. ¶ Dexter ramus venæ portæ in glandoso corpore quod sub ven-
triculi posteriori sedi huic omenti membranæ intertextum cernitur, adnexus, sursum
ad iecoris cauum contendit, in medio ductu ex humiliori ipsius sede surculum inferio- F
ri omēti membranæ, ipsiq; adeo colo intestino hic deriuans. ¶ Post hūc ab elatiori par-
te sobolem ventriculo exporrigit, quæ in posteriorem ipsius sedem, qua is dorsum spe-
ctat, pauculis ramulis digeritur. Ex humiliori rursus sede, dexter arteriæ ramus ad ieco-
ris cauum tendens, duas denuo profert soboles. Vnum cum venæ portæ ramo intesti-
no dif-

Ad septū
transuer-
sum arte-
riæ.
Arteriæ
rami in ie-
cur, omē-
tum, ven-
triculum,
bilis vesi-
culam,
lienem,
duodenu,
& coli
partem.

A fundit, quod duodenum appellatur, per cuius med. u longitudinem & aliquousq; ad ieiuni intestini initium ea soboles porrigitur. Altera iam commemorata paulo amplior ad dextram fundi ventriculi sedē retorquetur, & superiori omenti membranæ innexa, ex elatiori sede in anteriora & posteriora fundi vetriculi ramulos frequenti sobole spargit, perinde ac ab inferiori sua sede alias in omenti superiorē mēbranam ducit. Atq; hæc arteriæ soboles cū portæ venæ ramo hac exporrecto ad mediū vetriculi fundi cessat. Quod verò dextræ arteriæ rami adhuc superest, postquam ab eminentiori duos insigniter exiles surculos bilis vesiculæ transmisit, in ramulos aliquot sectum ad iecoris cauū terminatur, nō admodū alte in iecoris substantiam disseminatum. ¶ *Sinister* ramus ab arteriæ caudice prodiens, qui dextro, vt cōprehensum est, modice crassior est inferiori quoq; omenti membranæ ipsiusq; glandolo corpori cōmittitur, cōiungens se venæ portæ ramo, in tot quot ille soboles digerendus. Mox n. præsens arteriæ ramus ab eminentiori sede propaginem ventriculo qua dorso innititur offert, quæ primum sobolem vnā vtrinq; in mediam ventriculi sedē eius quæ dorso incumbit regionis exporrigit. Deinde sursum ascendens, venæ portæ modo superius ventriculi orificiū coronæ intar appositissimè cingit, ramulos ventriculi corpori gracilesq; surculos stoniaci termino, quo is vetriculo continuatur, distribuens. Inter reliquos aut ramos vnus secundum ventriculi superiora dextrorsum exporrectus, ventriculi humilius adit orificiū, surculos quoq; in progressu anteriori & posteriori sedibus ventriculi depromens. ¶ *Sinister* arteriæ ramus **C** lienem potissimū accedens, ab humiliori ipsius sede propaginē in inferiorē omenti mēbranam diffundit, quæ paulo post exortū, in duos ramos inuicem valde diductus discinditur, numerosam arteriarū sobolem deorsum in nūc dictam omenti membranā, & colon intestinū propagantes. Hæc dita propagine, sinister ille arteriæ ramus sinisterum magis ducitur, & venæ ipsi arteriæ rici in duas diffunditur arterias: & hæc rursus in alias tantisper dirimuntur, donec frequenti ramorum serie lienis cauo secundū rectā in lineam implantentur. Priusquam vero omnes arteriæ in lienē cessent ab humiliori parte eius quæ demissiorē lienis sedē adit, plerūq; ramulus inferiori omenti membranæ offertur. Deinceps ab illa arteria, q̄ infimæ lienis arteriæ proxima est, priusquam hæc in lienē deperditur, propago pullulat, q̄ superiori membranæ omenti suffulta, dextrorsum ad ventriculi fundū cōtorquetur, sinistramq; ventriculi fundi sedē perreptans, geniculatim ramulos anteriori, & posteriori sedib. ac dein superiori membranæ omenti soboles spargit. I.ē ab aliis lienem adeuntib. arteriis ramuli enascūtur, qui sinistrū ventriculi latius illo protus modo adeunt, quo a venis lienem petentib. propagines eodem pertinere commemoratum est. ¶ Ceterū a magnæ arteriæ corpore, paulo inferius q̄ truncus cuiusiam seriem absoluiimus, principiū ducit, ab elatiori quoq; corporis parte alia promitur arteria, q̄ in superiorem mesenterii sedem in plurimas soboles diffusa, venæ portæ modo excurrit in ieiunum, & tenue, & coli intestini partem, q̄ a iecoris cauo ad dextrū renē vsq; pertinet. Post hæc inferius paululū ab vtroq; magnæ arteriæ latere, ampla educta arteria in sui lateris renē, quemadmodū & vena transversum prorēpēs. Hæc arteriæ in renes integræ abluuntur, vixq; venarum modo ramulos notatu dignos in pingue renum tunicam disseminant. **E** Insuper ab arteria sinistram renem accedente, ac demissius plerūq;, q̄ ea quæ sinistro reni offertur, principiū fumentē, seminalis arteria non enascitur, sed frequentissime, vt dextri testis arteria, ab arteriæ magnæ corpore originē ducit. Aliquando n. humilius q̄ dextræ seminalis venæ initiū caua exsurgit, ab anteriori arteriæ magnæ sede seminaliū arteriarū exortus pēdet, q̄ ipso ortu inuicem sunt contemina: ac dextra quidē caua venæ corpus transcendens, dextræ seminali venæ attendit, quousq; pubis os superans, ac ex magna peritonzi cavitare excidens, ipsi venæ permisceatur, atq; cū illa anfractus gyrosq; efformet, quorū basis humiliorue sedes superiori testis regioni implanta, ac testis substantiæ, & hanc proxime inuoluēti tunicæ ramos præbet. ¶ Ad hunc quoq; modū sinistra seminalis arteria sinistræ congredit venæ, & in mulierib. quoq; arteriarū series earundē venarū distributioni penitus cōgruit: vt scil. media arteriarū pars in testes adeat, seminalesq; vata cōstituāt, altera aut fundū vteri implicet. Enarratis hæten⁹ propaginib. alia succedit, inferius q̄ seminales arteriæ, ab anteriori et magnæ arteriæ sede principiū ducens, & in humiliorē mesenterii sedē distributa. Quin. **F** do quidē hac in colū intestinū, quæ aliene ad rectū vsq; intestinū prorēpit, ac dein in ipsū

Lienem
adeuntē
rami.

Præcipua
mesenterii
accedens ar-
teria.
Renum
arteriæ.

Seminalis
arteria

Ad humi-
liorē me-
senterii
sedem ar-
teria

Ad lum-
barū ver-
tebras &
carnes.

Arteria
magna
supra os
sacrum
diuisa.

quoq; rectū imprimis digeritur. ¶ A posterioriaū seu inferiori magnā anteriori sedē, A
qua hęc vertebris committitur, geniculatim ramuli vtrinq; ad singulas lomborum ver-
tebras promuntur, qui in dorsalem medullam & musculos vertebris hic adnatos excu-
runt. Atq; huiusmodi ramuli inuicem fere amplitudinis ductusq; specie conueniunt, si
modo vnicam vtrobiq; propaginem exceperis, quæ quum ceteris insignior multoque
crassior sit, ac iuxta sacri ossis summum præcipue prodeat, non solū musculos vertebris
attensos accedit, verum transuersim per peritonæum abdominisq; musculos ad latera
vsq; abdominis exporrigitur. ¶ Hactenus magna arteria in lomborū regione venæ ra-
uæ sinistro lateri succubuit. Quum vero sacri ossis principium attingit, venamq; cōscen-
dens, in duos grandes truncos instar T ad hunc modum L inuersi bipartitur. ¶ Eit vero
situs huius permutatio propter arteriæ dignitatem. Quum enim hęc dignior nobilior- B
que censeatur, non immerito ipsam magis quam venam recondi, occultari, & in alto
corporis ferri, ac demum iniuriis ferendis pertinacem effici sagax rerum Opifex voluit.
Ne vero hic ab excarni ossis sacri initio in dorsū motibus arteria promte laedatur, super-
positam prius arteriam inibi vena superiorem esse, illamq; hanc conscendere voluit, vt
vena instar substerniculi cuiusdam arteriæ subdetetur. Ceterum priusquam venæ cum
arteriis in crus dilabantur, quam iam sacrum os vasa superarunt venæ arteriis superiores
vehuntur: arteriæque quoniam digniores sunt sub venis reconduntur. Rami vero quia
magnæ arteriæ supra sacri ossis initium diuisione prodeunt, venarum ramis exactissime
correspondent. ¶ Si exiguos forte surculos secluleris, qui ab humiliori arteriæ sede, quā
hęc primum bipartito scinditur deorsum ducti, ac ossē sacro suffulti, ipsius foramina C
subeunt, hac dorsalem medullam posterioremque sacri ossis sedem petentes. Atque hęc
interdum adeo insignes occurrerunt, vt sectionum rudes has venas arbitrarentur, quæ
in recti intestini finem seu anum desinentes, feculentum sanguinem nonnunquam ex-
purgarent. ¶ Sinister itaque quemadmodum & dexter huius supra os sacrum factæ di-
uisionis truncus, non procula diuisione in duos grandes partitur ramos, quorum intē-
rior exteriori gracilior est: ac ilico duas a se diffundit propagines, quarum vnā rursus
interiorem, alteram vero exteriorem clarioris doctrinæ gratia non inepte appellabis.
Exterior simul cum vena inter sacrum & ilium os qua hęc inuicem dehiscunt, in extē-
riora transuersim exporrigitur, & frequenti vtcunq; sobole musculos ilium os amplexan- D
tes, ipsumq; adeo coxendicis articulum implicat. Anterior autem in viris vesicæ fundo,
& ceruici ipsius seu peni, & paucas admodum podici etiam soboles dispensat. ¶ In mu-
lieribus vero, quibus hęc propago grādiōr visitur, in humiliorem fundi vteri regionem
numerosa serie distribuitur. Neq; is vteri dūtaxat insitum calorem refocillat, sed & fœ-
tus quoq; quādo is vtero gestatur. Dein hęc propago præter vterum, etiam muliebrem
vesicam, & vteri ceruicem ramulis quibusdam intertexit. Quod interioris rami qui bi-
nas nunc explicatas eduxit propagines reliquum est, deorsum repit, sui lateris arteriam,
quæ in vmbilicum fertur admittens. ¶ Arteriæ enim ab vmbilico secundum fundi vesi-
cæ latera deorsum ductæ, ac in natis hominibus coriaceæ inanescq; redditæ, in sui lateris
ramum inseruntur, ipsæque continuantur, quem modo ab interiori illo ramo reliquū esse
deorsumq; ferri diximus. ¶ Is namque non minus quam vena ipsi attensa pubis ossis fo- E
ramen petit. Priusquam vero id transit, propaginem alium ab externo trunci ramo,
vbi is iam in crus est prolapsurus. Præiens itaque ramus ea propagine adauctus, per pu-
bis ossis foramen ducitur, & in musculos foramen id occupantes & illos qui a pubis ossē
principiū sumunt dispergitur, perinde ac vena pubis ossis foramen transiens. Ac quem-
admodum hęc iuxta medium longitudinis femoris extremo quodam ipsius surculo al-
teri venæ in quintum femur mouentium musculum dispensatæ commiscetur: ita sane
& præiens arteriæ ramus suo sine cum alia coit arteria, quam illi musculo a maxima crus
perente arteria distribui non ita multo post subiciemus. Exterior namque ramus sin-
istri trunci eius diuisionis quam supra os sacrum fieri dicebāmus, per inguina in lēuū
crus descendit: anteaquam vero peritonæum permeat, propaginem solum peritonæo F
exporrigit, quæ ad rectū abdominis sui lateris musculum accedēs, surculos in cōtermi-
nos sedes transuersim vtrinq; digerit, ipse autē sursum ad vmbilici vsq; regionē properās,
in ramulos discindit, qui arteriæ eodē a pectoris regionib. tendentis ramulos spectant,
ac mammillarū cū vtero communione præbent. Quū vero grādis arteria in crus descē-
dens

Arteria
pubis of-
fis fora-
men tra-
iens.

- A** dens peritonæum superauit, ramulum ad pubis ossium commissuram mittit, qui exigus est, neq; ut eo tendens vena in multas soboles dispergitur, quarum ne vna quidem cutem subit, nisi forte exilis quæpiã in penis inuolucrum diffunditur. ¶ In crure autẽ, arteria modo venæ subiecta, ipsa que vena veluti, ppugnaculo munita, ramum in anteriores femoris os amplexantes musculos digerit, qui etiã in frequentes scinditur soboles, nullã tamen cuti exporrigit. Deinde a grandi arteria aliº educitur ramº, in quintum femur mouentem musculum, & eos qui inter nã femoris sedem occupant musculos, ad genu usq; quodãmodo in ppagines sparsam, & quadam ipsiº sobole illiº arteriæ extremo cõmixtam vnitamq; quam p pubis ossis foramen in crº ptingere cõmemorauimº. ¶ Ceterum ipsa grandis arteria sensim deorsum prepens, secundum f m ris os ita cõuoluitur, ut ab anteriori inguinum sede inter duo inferiora femoris capita in poplite cõsistat, nusquam nõ vena grãdiori quæ crus accedit cõcomitata. In hoc p femoris posteriora descensu arteria ppaginem educit, quæ in musculos posteriorem femoris sedem occupantes excurrit, & aliquousq; cum illis venarum ppaginib. deducitur, quas venam efformare docuimº, quæ per genu flexum seu posteriorem ipsius partem in suræ cutem sparsa sobole pertingit, arteriæ interim nulla ppagine ad cutem emergente. ¶ At grandis arteria in ipso poplite, uti diximus, recondita, vtrinq; propaginem emittit in alto quoq; occultatam, & in genu articuli latus penitus digestam. Vbi vero arteria tibiam subire incipit, ab externo ipsius latere ramum diffundit, qui fibulæ exporrectus inter septimum & octauum pedis motº autorum musculos reconditur, atque in reliquos qui anteriorem tibiz sedem sibi vendicant, soboles ultra medium longitudinis tibiz digerit. ¶ Ipse autem arteriæ truncus inter capita duorum primorum pedem mouentium musculorum repens, inter quartum pedis motuº opificem musculum, & duos quorum beneficio vltimi digitorum flectuntur articuli, ac quintum pedem mouentiũ occultatur, neq; multum a ligamento mēbraneo fibulam tibiz ossi p totam fibulæ lōgitudinē colliganti distat, & sub medio longitudinis tibiz in duos ramos dirimitur, quorũ interior inter calcē & tibiz os pedis inferiora subit, vna cū musculorum, tendinib. humiliora pedis hac petentib. In descensu interior ille ramº surculum tali cū tibia articulo offert. ¶ In pedis vero planta inter musculum secundos quatuor digitorum articulos flectentem, & tendines qui tertios articulos flectunt repositº in duas primum partitur soboles, quarum vna duplei ramo inferiorem pollicis adit sedem: altera vero in pgressu in duos surculos digesta, vnum ad indicem deriuat, in duos tamen prius deriuatum ramulos: alterum vero surculum interno lateri inferioris medii digiti sedis indiuisum offert. ¶ Exterior ramº illiº quæ ad medium lōgitudinis tibiz fit diuisionis, inter fibulam & calcē pedis inferiora accedit, vna cū tēdinib. septimi & octaui pedem mouentium musculorũ. Atq; hic in duos minimos digitos & externum latº medii digiti disseminatur: in ipso autem ad pedis inferiora progressu, tali cum tibia articulo propaginem præbet, & aliam hac longe grandiorem digerit, sub interiori malleolo ad principium illorum musculorum qui pollicem & tres digitos ipsi proximos in externum latus abducunt. ¶ Hæc propago in superiori pedis sede motum etiam edit tactu sensibilem. Verum ut venarum pedem subeuntium serie variari suo loco relatum est, ita sane & arteriæ distributio inibi discrepat. ¶ Quippe interdum, neq; id infrequenter, obseruatur omnib. digitis surculos offerri ab illo ramo, quem pedis inferiora inter calcem & tibiam petere commemorauimus, illo qui fibulæ exporrigitur plantam non accedente. ¶ At tunc ab arteria in posteriori tibiz sede recondita, grandis ramus per membraneum ligamentum tibiz ossi fibulam, qua hæc ossa inuicem dehiscunt colligans, in anteriorem tibiz sedem pertinet: atq; inter eius sedis musculos occultatus, vna cum eorundem tendinibus per transversum ligamentum in anteriore tibiz sede conspicuum in superiorem pedis regionem deriuatur, musculis illis qui digitos in externum latus abducunt quodammodo reconditus. ¶ Atq; hic ramus interdum ligamentum id membraneum transit, mox sub genu articulo, vbi tibiz os a fibula primum dehiscere incipit, interdum vero iuxta inferiorem tibiz sedem, prout nimirum ramus quem arteria tibiam subiens, versus octauum & septimum pedem mouentes musculos digerit, aut demissius fertur, aut elatius in ramos dissectus cessat, aut etiam prorsus deest.

Arteriæ in crure series.

LIBER SEXTVS DE CEREBRI

STRUCTVRA ET INSTRVMENTIS IPSIVS FVNCTIO-
ni famulantibus.*Cerebri functionum, & eius partium brevis enumeratio. CAPVT I.*

QVum ex vniuerſa anatomicæ hiſtoria, ſenſus motuſq; voluntarii, & principis animæ partis cuius beneficio imaginamur, ratiocinamur, memoremus, ſons ac ſedes adhuc ſuperſit explicandus, præſens liber opportune illi cōſecrabitur, cerebrū ipſuſq; partes vniuerſas cum ſenſuum instrumentis pertractaturus. Quemadmodum itaq; cordis ſubſtantię vitalis animæ viſ, ac propriæ iecoris carni naturalis animæ facultas induntur, inſuper vt iecur craſſiorem ſanguinem, ac qui perquam caliginofus eſt, naturalem ſpiritum, ſi modo vllus eſt, & cor item rurfus ſanguinem impetu per corpus ruentem vna cum vitali ſpiritu cōficiunt, & perinde atque hæc viſcera per dedicatos ſibi canales omnibus corporis partibus ſuas materias deriuant: ita quoque cerebrum aptam ipſius muneri obtinens materiam in propriis ſedib, ac illius functioni appoſite ſubminiſtrantib, instrumentis, animale ſpiritum longe clariffimum tenuiffimumque parat, quod ad diuinas planè principis animæ partis functiones partim vtitur, partim autem ad ſenſuū motuſq; instrumenta per neruos, tanquā per funiculos, cōtinuo diſtribuit, ea nunquā ſpiritu, qui præcipuus eorum instrumentorum actionis auctor cenſetur, deſtituens, nō min⁹ ſane quam iecur, & cor nullas corporis partes ſuis quas illis impertit materiis, tantisper dum valet homo, indigas relinquunt, etiam ſi non ſemper tum qualitate, tum copia eafdem diſfundunt. Nerui igitur, quorū originem a cerebro pendere circa huius libri finem indicabimus, id cerebro præſtant, quod magna arteria cordi, & caua iecori, vt qui paratum a cerebro ſpiritum illis quibus hunc mandari oportuit instrumentis deducant, diligētēſque cerebri ſatellites, & nuncii cenſeantur. ¶ Ceterum animali ſpiritu materiam ſuppeditat vitalis ſpiritus, in arteriis numeroſa ſerie ambas cerebri mēbranas accedentib, abundans, & dein aer quem verſus cerebrum tum per foramina priuatim olfactus organi occaſione in octauo caluarię offe exſculpta, tū in primis per ea caluarię foramina quæ palatū ſpectant, inter ſpirandum attrahitur. Ac aer quidem, qui dum inſpiramus per anguſtiſſimos flexuoſoſq; ac tortuoſos ductus inter duram cerebri & tenuem, de quibus capite ſequenti dicemus, mēbranas, attrahitur, atq; ob difficilem tranſitum extenuatur, cerebroq; aptiſſimus redditur, vnde cūq; vbi aditum reperit, in cerebri dextrum, & ſiniſtrum, & horum medium ventriculos ſeſe inſinuans. Vitalis autem ſpiritus etſi copioſiſſimus in omnibus tenuis duræq; mēbranz vafis ductibusve habeatur, attamen in dextrum, & ſiniſtrum cerebri ventriculos plurimus a præcipuis arteriarum ramis fertur, quas obliquo longoque ductu caluariam perforare, atque ad glandis, cerebri pituitam excipientis, latera porrigi *cap. 13. prioris libri retulimus.* Ab iis nanque arteriis, quas reticularem plexum Galenus efformare docuit, non minimæ ſoboles tenuis mēbranz proceſſibus ſuffultæ, per humillimas dextri ſiniſtriſque ventriculi ſedes ingrediuntur, tandem per totum ventriculorum progreſſum in illorum amplitudinem incedentes. Verū præter has arterias e quarto duræ mēbranz ſinu vas quoddam ſub eo corpore quod teſtudinis cameræve inſtar arcus exſtructæ imaginem refert, in anteriora cerebri per communē dextri ſiniſtriſque ventriculi cavitatem, ſeu potius tertium cerebri ventriculum contendit. ¶ Hoc vas tandem in duos ramos bipartitū, vno ad dextrū, altero ad ſiniſtrum ventriculum diſfunditur, & eius loci arteriis commixtum, rete efformat, quod ab extimi foetus inuolucris imagine nomen inuenit. Ab aere itaque in cerebrum ingreſſo, ac vitali illo ſpiritu ob frequentes ſane anfractus ad cerebri vſus magis magisque adaptato, in cerebri dextro ſiniſtroſque ventriculis, & ipſorum mutua cōcavitate tertioſque ventriculo animalis ſpiritus a cerebri virtute elaboratur. ¶ Porro huius ſpiritus animalis portio tertio cerebri ventriculo per oblongum meatum inter ea corpora cerebri quæ clunibus, & teſtibus aſſimilantur porrectum, in cerebelli ventriculum fertur, quem partim cerebelli ſinus, partim dorſalis medullæ cavitās efformant. Ab hoc ventriculo in dorſalem medullam, atq; ita in neruos ab illa propagatos, animalis ſpiritus

Neruorum
officium.Animalis
ſpiritus ge-
neratio.Animalis
ſpiritus di-
ſtributio.

Aritus non mediocris portio digeritur. A reliquis autem cerebri ventriculus spiritus in nervos ab illis proxime principium ducentes, ac si in sensuum motuumque arbitrariorum instrumenta dispensatur.

De dura membrana: & cute exterius caluariam succingente. C A P. II.

VNIVERSA caluariæ cavitates cerebro excipiendo adaptata, quadam subducitur ^{Sinus.} membrana, quam propter crassitiem qua ceteris non cerebri modo, verum etiā ^{Nomina.} totius corporis præstat membranis, Græci *μακρὰς μεμβράνης* Latini *crassam*, & ab insigni duritie *duram* & Galeno li. 9. *ana. admi. auctore, cuticularem membranam* appellant. Barbaram sectantes medicinā duram matrem vocare solent. Hæc unica cōtinuāq; omnino visitur, præterquam quod quibusdam foraminib. & sinibus venarum modo exstructis, sit peruia. Præterea omni ex parte ossibus proxima necitur, aliis locis remissius, aliis vehementius. Atq; hinc etiā fit, externam durioris membranarum superficiem ppter ossium sinus, tuberaque inæqualem, & deinde fibrarum quibus hæc ossibus committitur occasione, asperam, aut non ad amissim leuem lubricamque videri. Præcipua vero ossium tubera, quæ eam orbicularem sphaeræq; modo rotundam esse prohibent, in capitis potissimum basi conspiciuntur. Hæc itaq; capitis ossium tubera quo minus dura membrana in ipsius basi instar oblongæ sphaeræ viring; ad anteriora leuiter depressa appareat, in cāssa potissimum censentur. Alia vero tubercula, quæ propria ^{Forma.} duræ membranæ vasa venarum; ac arteriarum fere materiam continentia in exteriori ipsius superficie efformant, non adeo illius orbicularem formam interturbant, seu quo minus rotunda visatur, non magnopere obstant, quum hac venarum duntaxat ritu protuberent. ¶ Porro nullus in caluariæ amplitudine sinus præter eos quos in basi capitis tubera constituunt, occurrit, quem natura non expulserit duræ membranæ vasorum gratia, vt scilicet sinus vasis cedant, ac citra compressionem ipsis locum dent, & ne duræ membranæ vasa ipsi membranæ damno sint, quo minus hæc ossi proxima apponi possit. ¶ Ceterum nulla prorsus vena aut arteria in cerebri substantiam ad eum modum intexitur & innascitur, quo pulmonibus, lieni, iecori, & plerisque etiam musculis: sed passim cerebro tantum accumbentes, ipsius membranæ, quæ venarum modo cauatur implicantur. ¶ Quippe dura cerebri membrana ubi ^{Sinus duræ membranæ} quadam ipsius portione inter dextrā, & sinistram cerebri partem cōsistit, ac dein ubi inter cerebrū, & cerebellum implicatur, penitusq; velut septum quoddā subintrat, sinus quosdam habet venarum modo oblongos, & fistulæ modo sinuatos venisq; caluariam petentibus capaciores, sed interim venarum modo neutiquam teretes existūt. (Verum horum sinuum cavitates secundum ipsorum ductus longitudinem insinuata, trianguli speciem exprimit, nō quidem cuiusvis, sed qui trib. costis longitudine paribus, & instar quartæ partis circuli incuruatis constat.) Præsentibus sinus non solum venarum vsum, sed & arteriarum quoque præstant. In hos enim sinus, & venæ, & arteriæ pariter exhauriuntur, suamque quam amplexantur, & continent materiam infundūt venæ quidem sanguinem crassiores, arteriæ vero vitalem spiritum simul cum sanguine impetu per corpus diffuso. ¶ Præter istos sinus in duræ membranæ implicationibus sinuatos, hæc alios quam plurimos obtinet, ex quibus frequentes ductus in tenuem cerebri membranā, ac cum hac quoq; in cerebri ventriculos excurrunt, qui omnes exacte teretes, venis similiter cavitates obtinent: nō tamen vniuersi parē animanti vsum præbent, quū nonnulli venarū pariter arteriarūq; munere fungantur, alii venarum duntaxat, alii arteriarū. Atq; hæc ambo, cerebri membranæ inter reliquas corporis partes peculiaria, rara, & priuata sortiuntur, eandē nimirum cavitatem ductumue arteriæ, & vena pariter mun^o obire, & interim ipsos in membranarum corporibus ductus seu sinus, neque venam neq; arteriam proprie censeri posse, verū proprias quasdam implicationes, ac tales omnino fistulas sinusue, quales quis formaret, quando stylos crassiori cuiuspiam corio per ipsius crassitudinem in longum, quasi venarum sinus exstructurus, impingeret. ¶ In vno itaq; latere, par. n. vtriusq; ratio est, sex ^{Venæ & arteriæ in primo dura membrana sinu ex-} caluariam ingrediuntur venæ, & tres arteriæ. Ac prima vena simul cum prima arteria, quæ per transversos cervicis vertebrarum ducuntur processus, deinde secunda vena internæ iugularis venæ ramus, & secunda arteria soporalis arteriæ ramus per

hanitz, i-
phusq; sin-
series.

Primi & se-
cundi sinus
congressus.
Tertius si-
nus.
Nomina.

Quartus
sinus.

Tertie cal-
uariam pe-
tentis venæ
series.

Quintæ &
sextæ venæ
series.
Tertie ar-
teris series.

grande foramen, quod sexto cerebri neruorum pari paratum est, caluariam ingrediē. **A**
res omnes simul in vni⁹ duræ membranæ sinus initium confluunt, qui ad earum quas
iam diximus, venarum & arteriarum in caluariā ingressum incipit, ad latus nimirum
maximi in occipitis osse foraminis, quo dorsali medullæ via præbetur. Deinde & ad e-
minentiore foraminis sedem, quod sexti paris neruorum cerebri gratia insculpitur.
Sinus hic occipitis ossi semp⁹ attensus, secundum cerebelli descriptionem ex priorib.
versus exteriora obliq; retrorsum sursumq; conscendit, & ilico in pgressu quartam as-
sumit venam, quæ ab externa iugulari proprio foramine caluariam ingreditur. Præ-
sensus sinus hinc rursus retrorsum modiceq; sursum instar quartæ circuli partis proten-
ditur, quousq; elatissimam cerebelli partem occipitis ossi congruam attigerit. Ibidē
enim dex⁹ lateris primusve sinus cum sinistro siue secundo coit, atque ex ambobus **B**
vna communis efficitur cavit. Hunc primi, & secundi duræ membranæ sinuum
congressum, Herophilus, *ut auctor est libr. 9. ana. admi. & vsu par. cap. 6.* Galenus, *an. id est,*
torcular vocauit. Recentiores *Lacunam, puteum, foueam, & conductum sanguinis* appel-
lant. Torcular autem dictus est, quod cōcursus ille in primum, & secundum sinus,
sanguinem tanquam vinum e torculari pmit. ¶ Iste amborum sinuum cōgressus occi-
pitis ossi, quem admodū & sinus ipsi cōtiguus est non quidem ad amussim sub elatissi-
ma parte eius futuræ quæ assimilatur, verum multo humilior, & pmodum in me-
dia regione consistit quæ inter postremā foraminis, quo dorsalis medulla ducitur se-
dem, & dictæ modo futuræ verticē habetur. Ex mutuo hoc amborum sinuum cōgres-
su, alii duro exoriuntur sinus longitudine, & cavitatis forma inuicem variantes. Quip- **C**
pe vnus longior est, & caluariæ, quemadmodum priores duo, con-iguus, secundum
capitis longitudinem antrosum procedit. Ex eminentissima enim sede congressus dex-
tri sinus, & sinistri principium ducens, sub elatissima futuræ⁴ imitantis parte, & sub
ea quæ per capitis longitudinem fertur, & deinde sub frontis ossis medio ille sinus
protenditur vsque ad osseum septum quo olfactus instrumentorum sedes interdi-
uiduntur. Quemadmodum vero dexter & sinister, seu primus, & secundus sinus,
inter cerebrum, & cerebellum quæ hæc ossi proxima sunt, in dura cerebri membra-
na feruntur: ita quoque tertius sinus in ea duræ membranæ consistit sede, quæ dex-
tram cerebri partem a sinistra dirimens, per capitis longitudinem est eminentissima
& caluariæ semper cōtermina. ¶ Alter vero sinus ex communi duorum primorum **D**
sinuum congressu pronatus, quartus ordine porrigitur ab anteriori sedē communis
primi secundique sinuum cōgressus recto tramite rursus priora cerebri, nusquam de-
orsum neq; sursum vergens. Consistit n. in dura membrana, vbi per cerebelli longitu-
dinem, id & cerebrum ad eas vsq; cerebri sedes intercedit, quæ testium & clunium i-
magini assimilant. ¶ *Quartus* itaq; sinus suo ductu cerebelli lōgitudinē, & duræ cerebri
membranæ inter cerebellum, & cerebrum implicationem haud excedit, dextræ & si-
nistre cerebri partib. & cerebello æq; attiguus. Ac proinde id sibi priuatim vendicat,
quod sit breuissimus, & nusquam caluariæ contiguus. ¶ Hætenus quatuor in dura
cerebri membrana sinus enumerauimus, in quos primæ, & secundæ, & quartæ ex-
hauriuntur venæ, & primæ secundæq; arteriæ. Varias autem propaggines sinus hi de- **E**
inceps in duram, & tenuem cerebri membranas, ac demum ad cerebri vērículos dif-
fundunt, quas si singulas nunc enarrare nihil attinet. His igitur præteritis proximum
est, vt tertie venæ, & arteriæ diuificationem subnectamus. ¶ *Tertia* igitur venæ, quæ
minor est internæ iugularis portio, simulatque ramulum per foramen nippi & neruulo
cuidam quinti paris commune ad auditus organum transmittit, caluariam ingreditur,
æ duram contingens cerebri membranā, in sinu venæ prorsus modo cauatū, & p-
repentem cessat, qui nullam arteriæ sobolem in suis ipsius cavitatem admittit, sed pas-
sim alium sinu sibi comitem afeiscit, in quem arteriæ ramum exhauriri mox dicem⁹.
¶ *Quinta* venæ per foramen secundi neruorum cerebri paris, *ut capit. 16. libr. 3. ostem-*
sum est, ingressa, & dein sexta per maius octauī ossis capitis foramen, quæ illi olfactus **F**
organa incumbunt, caluariā petens, in proximam sibi duræ membranæ sedē exhauriū-
tur. ¶ *Tertia* arteria peculiari transuersoq; foramine in caluariam ingressa, in duos gra-
ciles, & rōidem crassos dirimitur ramos. Vnus gracilium, qui exterior est, tertie
venæ mox committitur, & in duræ membranæ sinum exhauritur, illi vndique atten-
sum

- A**sum & commissum, in quem tertiam venam absumi retulimus. Alter gracilium ram⁹, qui interior humiliorque visitur, per proprium & sibi duntaxat exsculptum, vt diximus cap. 13. libri precedentis, foramen recta ductus, in narium amplitudinem procurrit, atque in plures dissectus ramulos, vnum nasi extremo offert. ¶ Verum duo grandes rami in dextro latere, quod de sinistro quoq; intelligendum est, nonnihil inuicem ducti, & adhuc caluariæ instrati antrosum prorepunt, & mox in vnam denuo coeunt, & statim a congressu in duos impares ramos diuiduntur. Minor commune cum secundo neruorum pari foramen vendicans, tandem cum visorio neruo ad oculos prorepit, atque internæ temporalium muscutorum sedi surculos communicat. Grandior autem ramus sursum conscendens, duram perforat membranam ad latus glandulæ cerebri pituitam excipientis. ¶ Quum primum vero in duræ cerebri membranæ amplitudinem contendit, in varios ramos partitur, ac horum vnus multiplici sobole in tenuem membranam hic cerebro, obductam spargitur. Alter vero in varios surculos inuicem complicatos discinditur, & in cerebri anfractus tantisper ascendit, dū in humillimā dextri ventriculi sedem pertingat. Hinc in posteriora primum sursum ad postremam vsq; eius ventriculi sedem fertur, in ascensu portiunculam propaginis, quæ a quarto duræ membranæ sinu cerebri anfractibus inibi offertur, assumens. Quum vero hic arteriæ ramus retis quasi modo implexus posteriorem dextri ventriculi cerebri sedem superauit, per eius ventriculi ductum in anteriora porrigitur, donec ipsi altera pars quarti sinus propaginis misceatur. Ab hac igitur arteria, & dextra eius propaginis parte plexus ille in dextro cerebri ventriculo constituitur, quem capit. 13. precedentis libri, ab extimi foetus inuolucris forma *plexus* nuncupari diximus. In sinistro autem cerebri ventriculo plexus ille constituitur, vt ibidem ostendimus, a sinistro soporariæ ramo. ¶ Reticularis vero plex⁹, cuius multis in locis Galenus mentionem facit, in homine nō reperitur. In boue autē, si arteriā ei⁹ indagaueris, durāq; membranā iuxta glandis pituitam cerebri excipientis latera diuiseris, aliquid Galeni reticulari plexui simile comperies. Sed de yasis duræ membranæ satis. ¶ Ceterum, vt externam huius membranæ superficiem cognitu in capitis vulnerib; perquam necessariam sermone totam perstringamus, nunc fibras ipsius, & ad caluariam connexum recensēbimus. Primum autem citra alterius corporis interuentū hac vndique ossi attigua est, D exigua omnino ipsius regione deinta, quæ super ossis cunei formis medium habetur vbi dura membrana nonnihil ab osse absedit, substratam habens glandulam cerebri pituitam excipientem, & soporalium arteriarum maximas soboles. Omnibus partibus caluariæ quibus hac membrana attigua est, in eum committitur modum, vt duo inuicē accumbētes muscoli mutuo hærere cōnectiq; solent. Verū eo cōnexionis genere in capitis basi firmitus quā in laterib; & vertice, & fronte, & occipitio affirmatur. Deinde vniuersis a euntioribus ossium processibus pertinacissime connascitur, perinde ac si ab ipsis originem duceret. Sunt vero huius generis processus, osseum illud septum olfactus organorum sedem distinguens, deinde illi qui ad latera foraminum visorios neruos transmittentium, in sinum glandi pituitam excipienti paratum cōstitunt, & qui iuxta foramen visuntur quinti paris neruorum cerebri crassiorem radicē transmittens, & vniuersim omnes processus foraminaq; capitis amplitudinem respicientia. Pari quoque ratione præsens membrana caluariæ futuris adnascitur, quamquam is connexus non æque validus sit, atque is ad quem ad osseos processus perfici dictum est. At futuris non modo dura membrana connascitur, verum tenues membraneasque fibras inter illas versus capitis exteriora transmittit, quæ caluariæ vertice inter dissecandum abstracta in dura membrana simplicis lineæ ritu extuberant, asperamque ipsius membranæ superficiem ostendunt suturarum situm, ac imaginem in ipsa etiā membrana tunc referentes. ¶ Ceterum præter fibras externam quoq; duræ membranæ superficiem minus æqualem reddunt tubercula quædam in vertice frequentes prominentia, vbi sagittalis futura coronali iungitur. Hæc si quando adsunt, inæqualiter extuberant, & pares sibi in caluaria in sculptos sin⁹ obtinent, quib; pertinacissime innascuntur. Vnde etiam hui⁹ generis tubera non obiter, neq; quod dicitur per transcennam expendenda veniunt, ne minus cauti in cauterii administratione, & capitis vulnerib; caluariam perforemus. Etenim horū tuberum nulla ratione habita-

Plexus in prioribus cerebri ventriculi constitutio.

Quis Galeni reticularis plexus.

Duræ membranæ ad caluariam nexus.

quod in iis locis, & in futuris, membrana ab osse difficulter abscedat: eam vna cum osse non sine magno malo pertunderemus. Hoc itaque modo dura membrana calvariae cavitatem succingit, & omnibus ea cavitare contentis obducitur instrumentis. Verum præter hæc dura membrana magnam sui portionem inter cerebrum, & cerebellum insinuat, quæ vniuersam cerebelli superiorem sedem integens cerebri regionem cerebello incumbentem ab illo interdiuidit. Quin etiam a media sede huius duræ membranæ portionis, vbi dextra cerebri pars sinistram respicit, & secundum totam tertiæ duræ membranæ sinus longitudinem alia quoque duræ membranæ portio processusue educitur, secundum capitis longitudinem dextram cerebri partem a sinistra dirimens. Hic processus falcis mesoriorum imagini aliqua ex parte accedit. Nam a posteriori capitis sede antrosum ductus, sensim falcis ritu arctatur. Hi processus nihil omnino a reliquo ipsius corpore, nisi vna duntaxat sede in crassitie duritieque variant. Nusquam enim crassior secantibus membrana obseruatur, quam in illa parte qua cerebellum integit. Siquidem hæc vbi natibus proxima cernitur triplo fere quam in reliqua sede crassior duriorque euadit. Neuter etiam horum processuum seu partium duplicatur, verum simplex est, quæadmodum & ipsa membrana qua cerebri lateribus aut calvariae attenditur. ¶ Præterea duræ membranæ processuum superficies specie cum reliqua interiori membranæ superficie cõgruit, qua vix inter omnes corporis superficies aliã magis splendida læuemet, & omni adipe, quæadmodum quæ in calvariae cõsistunt amplitudine omnia, destituta reperias. Quinetiam interior hæc superficies a quo huiusmodi longe magis quam exterior perfunditur, & multo candidior apparet. Et quum fibris omnibus quibus alteri parti adnascetur vacet, impensius lubrica teraq; quam exterior superficies cõspicitur. ¶ Porro quemadmodum exterior superficies os calvariae vndique respicit, ita & interior tenuem cerebri spectat membranam, cui nullius corporis interuentum, quam ductuum instar venarum ab ipso in tenuem membranam pronatorum ope, adhæret ac committitur. Si enim dura membrana pari modo tenui membranæ, ipsiq; adeo cerebro, vt calvariae connasceretur, quo minus tenuis membranæ vasa, & ipsum cerebrum distendi contrahiq; possint, illa impedimento foret. Quod præcauens natura, ampliorem duræ membranæ cavitatem ipsa cerebri mole non secus atq; cordis inuolucrum corde etiam ipso amplius visitur, produxit. Quamuis interim duram membranam a tenui non ita liberauerit, vt cordis inuolucrum a corde, quod illi ne vnius quidem fibræ interuentu connascitur, quum tamen innumeros venarum instar ductus dura membrana tenui exporrigat, mirabili industria horum adminiculo illam sibi affirmans. Vt simul ductus illi venarum arteriarumque, & postmodum vinculi vices gerant, vt cerebrum ne cõcidat cõmode subleuetur, interim vasorum tenuis membranæ, & ipsius cerebri motibus non præpeditis. ¶ Ceterum ubicunq; in calvariae amplitudine visuntur foramina, ibidem & dura quoque membrana fere peruia est, sui processus perpetuo exporrigens, illis qui a cerebro principium ducunt nervis, & ipsi etiam dorsali medullæ inuolucrum modo obductos. Proinde tot primum foraminibus dura cerebri membrana donatur, quot nervorum paria a cerebro initium ducunt. Septem iis vtrinque positis foraminibus aliud ab utroque latere accedit, quod neruulum transmittit non procul a quinti paris radice pronatum. ¶ Adhæc dura membrana vnico eodemq; inconiugato, & orbiculari veroq; foramine pertunditur, quod infundibulo cerebri piritam excipienti viam præbet. ¶ Dein iuxta huius foraminis latera aliud vtrinque spectatur foramen, maximum arteriarum cerebrum petentium ramum transmittens. Postremo multis foraminulis ad olfactus organorum sedem dura cerebri membrana abundat. Sinus præsentis membranæ, qui venas arteriasque calvariæ subintrantes exhauriunt, & ductus ex iis sinibus in tenuem membranam instar venarum propagatos in foraminum numero non habemus. ¶ Inter primarios duræ membranæ vsus non minimus censetur, vt aptis quibusdã sinib. omnes calvariæ petentes venas, omnesq; duob. tantum dentis ramis, arterias excipiat, ipsarumq; materiam in suos sinus assumat, eam ita deducens, vt hæc propaginibus venis similibus, atque ab illis sinibus depromtis, in tenuem membranam commodissime deferatur, & dura membrana ipsi tenui membranæ, & cerebro, instar lagenæ fiat, ex qua tenuis membrana, & dein cerebrum materiam ad opportunos vsus sibi alliciant.

Duræ membranæ processus.

Duræ membranæ interioris superficies qualis.

Duræ membranæ cum tenui connexio.

Foramina.

Duræ membranæ vsus.

A in venis, & arteriis versus caput transmissam. ¶ Ceterum propagines a tertio duræ membranæ sinu vtrinque innumera serie in sedem tenuis membranæ sibi proximam derivantur, cerebrum suspensum, atque ne deorsum concidat, ventriculique ipsius comprimantur, opportunissime sustinent, ut dura cerebri membrana pariter ipsius inuolucrum, & fulcrum reddatur. Ad quod rursus summopere conducunt fibræ per futuras a dura membrana prorepentes, quæ duram cerebri membranam caluariæ firmant, atque quo minus cerebri gravitate tracta, deorsum labatur causa sunt. Has fibras natura non solum per reflexos admodum, & obliquitatis nomine firmantes ductus fabricorum instar qui clauorum acies reflectunt, transmisit, verum transmissas rursus dilatavit, auxit, atque in vnum omnes adeo commiscuit, ut in membranam quandam tenuem degenerent quæ quod caluariæ obducatur, *serena*. Græcis, nuncupatur. Hæc autem non citra alterius corporis interuentum caluariæ adnascitur, sub ipsa enim alia adhuc tenuis consistit membrana, aliis quoque omnibus propemodum ossibus præcipue communis, quæ ab amplexu quo ossa succingit, *serena* appellatur. Inter reliqua vero ossa hac membrana priuata, caluariæ interna est cavitates cerebro excipiendo adaptata, cui nusquam ubi duram membranam contingit eiusmodi membranula obnascitur, adeo ut tanta etiam huius cavitatis sedes, quantæ dura membrana non connascitur, hæc quoque membranula aliis ossibus communi, obcincta sit.

Membrana caluariam succingens & vis.

De tenui membrana. C A P. III.

C TENUIS cerebri membrana quemadmodum, & dura duntaxat vnica, & sibi ipsi continua est. Eius situs ex cerebri, & cerebelli cognitione desumendus est. Nihil enim dura membrana amplexatur, cui tenuis membrana exteriùs non obuoluatur. Nulla enim exterioris superficiei cerebri, & cerebelli, & dorsales medullæ, & nervorum portiuncula conspicitur quam tenuis membrana vicinissime, & citra alterius corporis interuentum proxime non integat, si modo superiore callosi corporis superficiem exceperis, quæ sola eiusmodi membrana, quum dura vtrunque sit, non continetur. ¶ Præterea omnes cerebri, & cerebelli anfractus, in quos tenuis membrana vndicunque sui partes processusve ingerit, huius situm ostendunt, ut sane ipsius quoque figuram, & magnitudinem. Hæc membrana exteriori superficie velut aqueo humore oblinitur, secundum patrium quas ambit tubera extuberans. Ipsa namque vix alibi crassitiam variat, ac tenuissimæ semper membranæ innumeris vasorum ductibus obsita speciem commonstrat. ¶ Quippe vasorum potissimum gratia illam rerum Opifex condidit, nimirum ut instar mesenterii, & humilioris omenti membranæ, & extimi foetus inuolucris: a quo suum nomen tenuis membrana Græcis *serena* nuncupata, mutuauit: ea tuto deduceret suffulciretque. Quinetiam cerebri, & cerebelli est inuolucrum, non simplex profecto, ut dura membrana quæ propugnaculum potius, ac defensorum cerebri aduersus caluariæ occursum censetur, quam operimentum: sed quod ipsorum substantiam proxime contineat & firmet, non secus quam calcorum formæ lac paulo ante coagulatum sustinent, & fingunt pariter. Atque ad hos usus natura hanc membranam summe idoneam produxit. Tam mollis enim tenuisque & sequax est, ut aptissime omnibus anfractibus sinibusque sese ad profundissima usque ingerat, & quæcunque cerebri vasa expetebat, ea deducere possit. Quinetiam adeo leuis cernitur, ut sua gravitate neutiquam vim cerebro inferat. Et tam valida interim duraque existit, ut a dura cerebri membrana sursum tracta non diuellatur, imo illum suspensionis impetum a natura sagacissime frequenti numerosaque, & continua vasorum serie paratum sustinet, eo pollens robore, ut concinne cerebri substantiam instar formæ cuiusdam, uti iam retulimus, amplexetur, & sustineat.

Numerus Situs.

Exterior superficies.

Vfus. Nomen.

Constructio rationis ratio.

De cerebro & cerebello. C A P. IV.

CEREBRUM a dissectionum professoribus in anterioribus quod Græcis *enkephalon*, Latinis *Cerebrum*, & posterius, quod illis *metencephalon*, Latinis *cerebellum* vocatur, deinde antèrius in dextrum, & sinistrum diuidi consuevit. Non certe quod illi cerebrum omnino diuisum, & non aliqua semper ex parte continuum esse arbitrati sint, sed quod ut vna manus in digitos, ita quoque cerebrum in diuersas partes discretum videatur. Nam dextra cerebri pars & sinistra, & cum his cerebellum, & dorsalis medulla, neruique ad vnum omnes, insuper & nates testesque cerebri, deinde callosum corpus,

Numerus cerebri.

Cerebri partes.

& id quod instar testudinis effigiatum est, præterea dextri sinistrique ventriculorum A septum, & vermiformis cerebelli processus inuicem continuæ sunt partes, eademque substantia in duritia coloreque aliquantulum variante constituuntur. Quis vero præcipuus continuitatis locus sit, quæque omnes illæ iam enumeratæ partes censeantur, ordine suo seorsim docebimus. Ceterum cerebri situm, ipsius membranæ, & potissimum interna caluariæ amplitudo edocent. Quicquid enim eius amplitudinis duabus cerebri membranæ, & glande pituitam cerebri excipiente, & ramis quibusdam maximarum arteriarum cerebrum petentium non occupatur, id vniuersum cerebro, ac cerebello adimpletur. ¶ Cerebellum decuplo aut vndecuplo minus cerebro est, at-

Situs.
Magnitudo.

Cerebelli
situs, & magnitudo.

que vna cum dorsalis medullæ principio eam caluariæ amplitudinis sedem sibi vendicat, quæ posteriori parte tuberum in capitis amplitudinem cavitatemque auditus B organum caussa prominentium, & deinde duobus in occipitii ossis sinibus circumscriptur, qui vt duobus primis duræ membranæ sinibus, quos dextrum, & sinistrum nuncupauimus, os cedat, caluariæ cavitati insculpuntur. Atque hæc circumscriptio cerebelli situm opportunissime demonstrat. Haud enim hominibus perinde atque bobus in occipitium adeo porrigitur, vt non etiam postrema cerebri pars in posteriora magis quam ipsum cerebellum vergat. ¶ Quippe postrema & elatissima humani cerebelli portio ad mediam duntaxat sedem pertingit, quæ a posteriori sede foraminis dorsali medullæ viam præbentis, & A literam imitantis futuræ partem habetur. ¶ Præterea superior cerebelli pars in hominibus, quemadmodum sane in canibus, bobus, & ouibus instar globi cuiusdam, aut etiam acutius nequaquam extuberat, C sed plana & depressa minimumque in medio prominens conspicitur. Hæc itaque caluariæ sedes cerebello dicata, ipsius situm, circumscriptionem, formam, & magnitudinem, edocet. Cerebellum enim, quemadmodum & sua sedes, latius est quam longius aut profundius, & humiliori ipsius regione, idque potissimum iuxta ipsius posteriora, latioris globi imaginem exprimit, in cuius medio acuta, neque admodum lata habetur impressio, quam illi inducit tuber, instar crassissimæ lineæ in occipitii osse prominens, quod eius ossis robur insigniter auget, cuique dura membrana pertinacissime connascitur. Porro in anteriori parte, qua cerebellum ad cerebri nates exporrigitur, id quasi in acutum fertur, vndique suæ sedis formam accurate referens. ¶ Ceterum eiusmodi omnia in cerebro, quod homini maximum obtigit, nempe duobus boum, D

Cerebelli
forma.

Cerebri magnitudo & forma.

aut asinorum cerebris grandius, ostendit reliqua caluariæ cavitatis cerebello non op-
pleta, vnde etiam cerebrum per ipsius basim depressum est, neque globi modo extuberat, quamuis interim inæquale, & non vnius formæ visitur. In lateribus autem & anteriori, & posteriori, & superiori sede caluariæ cavitatis effigiem exprimit. His enim sedibus cerebrum instar oblongæ sphaeræ vtroque versus anteriora propter temporum cavitatem depressæ, rotundum & in posteriori parte multo quam in anteriori latius visitur. ¶ Caluariæ itaque cavitatis externæ cerebri superficiei imaginem com-
monstrat, ad quam & sectio cerebrum diuidens, & innumeri quadam gyri ac circum-
actus referuntur. Vniuersa namque cerebri sedes illa sectione diuisa, atque vt bisulcorum pedes in duos quasi ungues illius beneficio disiuncta, extrinsecus cerebri superficiei E magna pars existit. Attamen dictam cerebri formam parum interturbat, quum dex-
tra cerebri pars sinistræ accumbat: neque recta linea illa diuisæ cerebri partes inuicem magis dehiscant, quam quanta duræ cerebri membranæ, & tenuis duplicatæ est cras-
sitie processu, duas cerebri partes septi ritu interstinguens. Dein seorsum vtranque cerebri partem tenuis membrana ambit, & implicat. ¶ Ceterum, gyri ac reuolutiones cerebri, per vniuersam cerebri superficiem vndique eadem frequentia habentur.

Sectio dextram cerebri partem a sinistra dirimens.

Anfractus.

Duplicatio membranae circum cerebri.

Anfractus
vniuersi.

¶ Sunt vero sinus permulti penitus in cerebri substantiam penetrantes, & profecto imagine intestinorum tenuium reuolutionibus, aut nubibus, quas pictores delineare solent simillimi. Sunt autem non ob aliud, quam ad cerebri substantiæ enutritionem procreati. Cerebri namque substantia citra omnem membranosarum fibrarum plenum continua, neutiquam adeo firma fuerat, vt per illam arteriarum venarumque, vt in reliquis corporis partibus, digeri possent: & tam multa crassaque est, vt venæ & arteriæ in superficie tantum exporrectæ ipsi nutriendæ, illiusque insito calori refocillando sufficerent, quum penitiores cerebri partes si ad illum modum vasa protenderentur, illorum

- A** materia carerent. Quod prauident natura, sinuosos illos implexus passim cerebri substantiæ impressit, ut in iis tenuis membrana frequentibus vasis oppleta sese infinuaret, cerebri substantiæ alimentum appositissime ita subministratura. Atque huius etiam nutrimenti potissimum occasione cerebrum in duas partes dissectum fuit, Cerebri sectionis ratio. scilicet tenuis membrana sese in ipsius medium implicaret, ac inibi in reflexus deducta, cerebri substantiam enutrirer. Haud enim citra eiusmodi cerebri dissectionem, & profundissimas reuolutiones illa cerebri sedes qua dextra sinistram respicit, enutriripotuiſſet. ¶ Ceterum cerebelli reuolutiones neutiquam æque atque cerebri reuolutiones alte penetrant, sed paulo minus quam superficialiæ, at frequentes admodum continua serie deductæ visuntur. Superficialiæ quidem, quod exigua pars alenda sit, Cerebelli implexu ratio & species.
- B** quod facile cerebellum a profundioribus anfractibus ad ventriculum, vsque ipsius perforaretur. Frequentes autem, ut copia aliquantulum leuem illam penetrationem suppleat. ¶ Porro cerebellum tribus partibus efformatur, dextra vna, & alia sinistra, & tertia media. Ac dextra quidem sinistraque cerebelli partes, duos quodammodo globos inuicem appositos ostendunt, in quorum inani spacio, vbi scilicet globi sese non cõtingerent, tertia cerebelli pars reponitur, quæ ligni caseive recētis vermem refert, ob suas reuolutiones, quæ transuersum per cerebelli longitudinem mutuo æque distantes ducuntur. Huius partis apices versus inferiorem cerebelli sedem reflexi, vermiformes cerebri processus *ve infra cap. 10.* efformare docebimus. At hæ cerebelli partes inuicem discretæ incontinuasque nequaquam sunt, sed continuæ vnicum corpus, Cerebelli partes. Vermiformes processus.
- C** ipsum scilicet cerebellum, cõstituunt. Hoc utrinque ad dorsalis medullæ sinus latera quasi duab. circularib. applantationibus adnascitur, continuum cum dorsali medulla corpus effectum. Medio namque posterioris cerebelli sedis pars, ut neque etiã anterioris dorsali medullæ continua, cunatave est, sed tantum tenuis membranæ interuentu posterior pars dorsali medullæ committitur. ¶ At ut cerebri basis, vnde dorsalis medulla ortum ducit, ceteris omnibus cerebri partibus, & ipso quoque cerebello durior visitur: ita quoque dorsalis suo principio sensim durior euadit, neque colore neque duritiã cerebello ipsi supernato correspondens. Cerebellum enim magis flauum cinericiumve est, perquam paucis albescentibus lineis interstitum, & duntaxat in sui sinus superficie candicans. Vniuersum verò dorsalis medullæ initium cerebello ad-
- D** huc in capite subnatum albiſſimum est, ut & cerebri basis ipsi originẽ præbens, quæ omni prorsus reuolutione ac anfractu, quibus cerebellum scater, destituitur. ¶ Porro cerebro substantia quædam peculiaris & propria est, qualem in vniuerso corpore similem nullam reperiās, ad innatas cerebro actiones idonea. Præterea cerebri substantia, quam capitis medullam, alii appellant, ab ossium medulla differt, tum aliis plerisque accidentibus, tum quod liqueſcieri nequeat, neque in edicæ tempore, aut aliis occasionibus, ut reliqua corporis pinguedo absumatur minuaturve. Hæc non vniuersa candicat, verum quicquid reuolutionibus proximum subflauum, aut subcinericum est, æquali semper a reuolutionis superficie distantia. ¶ Quanta namque reuolutionis profunditas est, tanto quoque ab interna reuolutionis parte intervallo in cerebri substantia, is, quem diximus, color obseruatur: quasi rursus color ille in substantia, quod ad colorem attinet, reuolutiones duplicaret. Quicquid autem cerebri ita coloratum non est, albiſſimum & candidum prorsus visitur. ¶ Verum ut permultæ sunt cerebelli inuolutiones, ita quoque vniuersum propemodum secantibus flauum occurrit. Quacunque itaq; ex parte cerebri cerebellive substantiam tenui qua proxime continetur membrana detexeris, hanc subflauã ac velut aqueo humore oblitam, & nunquam venis implicitam inuenies, etiam si interdum rubea ac veluti sanguinea puncta in illorum cerebri substantia potissimum obseruaturus sis, qui phrenitide ante mortem laborarunt, verum illa nullã veniẽ exprimunt imaginem. Cerebrum namq; ex nullo vase alimentum assumit, quã ex iis quæ tenui membrana suffulta ipsi circumdantur.
- F** *De calloſo cerebri corpore, & cerebri ventriculorum dextri & sinistri septo.*

C A P. V.

QUÆDAM cerebri pars in externa ipsius superficie, ad elatissimam dextri & sinistri ventriculorum sedem, sese offert, tenui membrana non obuoluta. Verum intus cerebri substantiæ modo, externa superficie candicans albaque, & reliqua;

478 Operum Leonhard. Fuchsi Pars I.

Nomen.

Callosi corporis initium.

Dextri sinistrique ventriculorum septi historia.

Numerus. Dextri & sinistri historia.

Situs.

cerebri substantia ad superficiem consistente durior, unde etiam vetustissimi Græci- **A**
rum hanc partem *μακρόν*, Latini autem *callosum corpus* appellarunt. In conspectum se-
cantibus venit, leuiter dextra cerebri parte a sinistra manibus dirempta. Quicquid e-
nim ita diducto cerebro; inibi partes ipsius vnit, album candicansque conspicitur,
ipsum callosum est corpus, longum quidem, sed arctum. ¶ Præsens corpus in illa su-
perficie quæ ita diducto cerebro in conspectum venit, gibbosum cernitur. Quemad-
modum vero cerebrum diremptum superiorem callosi corporis superficiem egregie
læuem æqualemque ostendit, ita quoque indicat corpus id communem cum cerebro
partem esse, & non ex cerebri substantiæ superficie, quæ mollior & subflaua est, sed ex
intimiori substantia, quæ durior & alba visitur, enasci. Obseruantur enim vtrinque ad
callosi corporis latera secundum ipsius longitudinem singuli sinus in cerebri sub- **B**
stantia instar profundioris lineæ insculpti, ac cum superiori callosi corporis superficie
eo magis patentes, quo cerebrum vehementius, quasi id fursum in latera etiam a-
cturus, diduxeris. Interior autem inferiorve ipsius superficies dextro sinistroque ce-
rebri ventriculo ad aperto secantibus primum occurrit: quæ etsi per callosi corporis
longitudinem in rorsum, vt superior extrorsum curuatur, haud tamen simplex est.
Nam per callosi corporis longitudinem duæ instar quartæ circuli partis in sinuatæ su-
perficies ducuntur, & in medio callosi corporis tuberculum quoddam instar lienæ
per illius longitudinem exporrectum visitur, perinde ac si altero quidem puncto duas
quartas circuli partes in callosi corporis medio iunctas, reliquo autem puncto ad late-
ra fursum protensis intelligere. ¶ Præsens tubernaculum deorsum prominens, sen- **C**
simque extenuatum, tandem dextri sinistrique ventriculorum cerebri septum effici-
tur: & tota interna callosi corporis superficies tanta dextri sinistrique ventriculorum
est, portio, quanta est hæc ipsius callosi corporis superficies. Ac dextra quidem super-
ficiei portio dextrum ventriculum, sinistra autem sinistrum respicit. Porro dextri &
sinistri ventriculorum septum eadem cum cerebro constat substantia sed in medio
quod ad superiora & inferiora attinet, adeo est tenue, *Galeno lib. 9. admi. teste.* vt splendor
ipsius pelluceat, & instar specularis lapidis quodammodo diaphonum sit. In superiori
parte qua septum toti longitudini callosi corporis continuatur, & inferiori qua supe-
riori parti fornicis cameræve committitur, ipsum crassius quam in media regione ex-
istit. Quandoquidem humiliorem septi sedem corpus testudinis modo effigiatum **D**
ex superiori sua parte educit, quemadmodum superior septi pars ab inferiori callosi
corporis regione enascitur producitque. ¶ Callosum corpus vna cum septo nullis
venis neque etiam tenui membrana, vel aliqua etiam parte attextum est, sed e vicinis
partibus nutrimentum mutuatur. Non enim adeo grandis, crassaque cerebri est por-
tio, vt priuatis vasis indigeat, quamuis interim magnum vsum animanti præbeat. Hu-
ius namque interuentu, dextra cerebri pars sinistræ continuatur. Deinde dextri & si-
nistri cerebri ventriculorum septum producit, atque id etiam subleuat, ac demum e-
ius septi interuentu attollit, fulcitque testudinis instar effigiatum corpus, quo minus
id magno omnium cerebri functionum malo communem duorum ventriculorum
cavitatem compressurum delabatur. ¶ Ceterum duo sinus in cerebri substantia pro- **E**
fundioris lineæ ritu ad superiorē callosi corporis superficiem incisi, præter hos quod
ea cerebri pars calloso corpori producendo inepta sit, idque ex penitiori substantia e-
nasci debeat, ad pituitæ defluxum, e superioribus cerebri partibus facere creduntur,
quam excipientes per gibbam callosi corporis superficiem in anteriora profluere
finunt.

De cerebri ventriculis. CAP. VI.

TR E S in cerebro esse ventriculos constat. Vnus quidem in dextra cerebri parte,
alter in sinistra, tertius autem in cerebri, seu duorum primorum ventriculorum
medio collocatur. Dexter cum sinistro prorsus situ, forma, magnitudine, aliisque o-
mnibus quæ in partium constructione examinari solita sunt responder. Quare singu- **F**
la quæ de dextro trademus, de sinistro quoque dixisse nos putandum erit. Locator
autem in dextra cerebri parte per totam quasi huius partis longitudinem protensus.
Tantum enim antiqua sedes fronte, quantum postica ab occipitio distat. Remoue-
tur autem adeo illis locis ab externa cerebri superficie, quantum ipsius ventriculi
dextrum,

A dextrum, exteriusve latus a superficie cerebri distat. Internum autem ventriculi dextri latus per callosi corporis longitudinem, sinistri ventriculi interno lateri proximum est: neq; aliud interstitium ambos separat, quam tenuis quaedam, & velut quod ad subtilitatem attinet membrana cerebri portiuncula, quam septum præcedenti capite vocauimus, atq; a calloso corpore enatam, toti superiori parti per longitudinem cameræ modo exstructi corporis continuam connatamq; esse diximus. ¶ Dextri itaq; & sinistri ventriculi latera toto spatio quo septum illud porrigitur, quantave callosi corporis est longitudo, minimo interuallo ab inuicem remouetur. Verum vbi in ea cerebri parte consistunt quæ cerebello incumbit, & quæ fronti proxima est, vbi ventriculi latera mutuo maxime distant. Nā præter cerebri membranas, etiam plurima cerebri substantia ventriculos dirimit. Vnde etiam fit, vt dextrum exteriusve dextri ventriculi latus, nonnihil oblique ducatur. Anterius enim & posterius in dextrum magis, quam in medio accedit, sinistrum autem eius latus sinistrorsum magis media ipsius sede, q̃ eius extremis, ptenditur. Anterior & frontem respiciens ventriculi pars obtusa est & rotunda, nec in acutum versus olfactus instrumenta, aut visorios nervos desinens. ¶ Posterior autem ventriculi regio occipitium respiciens, obtusa quidem est & rotunda, at deorsum sensim in cerebri substantiam versus priora paulatim arctata tantisper descendit, donec ibidem desinat, vbi olfactus organorum & visiorum nervorum consistit principium, & qua maximi soporalium arteriarum rami duram cerebri membranam perforantes in cerebrum feruntur. Atque hic ductus, si longitudinem spectes, longior est quam media ipsius ventriculi longitudo, quam ab occipitio ad frontem portendi diximus. Et sub media etiam illa longitudine ductus hic in cerebri substantia tenditur, cornu modo in mucronem desinens, qui non in visiorum nervorum & olfactus organorum initia finit, & quadam continuitate nervos illos, & organa olfactus nequaquam perforat: verum in vnam cerebri reuolutionem ibidem ad cerebri basim terminatur, atque in se maximam cerebrum petentem arteriam cum tenuis membrana processu illam suffulciente admittit. ¶ Vniuersa igitur ventriculi superficie læuis a quo humore oblita, & inter dissecandum subinde eodē oppleta conspicitur. Superior ventriculi pars omnis inæqualitatis est expers, quemadmodum & utraq; latera, nisi quod levis ille ventriculi obliquus ductus quasi tubera inducere videatur. Inferiorem ventriculi partem inæqualem efficit sinus quidam, ex posterioris ventriculi sedis externo latere antrorsum oblique ad communem ventriculorum cavitatem prorepens, atque ad pituitæ leuiorem defluxum paratus. Dein ad inæqualitatem facit ea ventriculi pars, quæ deorsum versus anteriora e posteriori ventriculi sede prorepat. Ille namque ventriculi reflexus vna cum sinu illo in causa est, vt monticulus quodammodo in anteriori posteriorique inferioris sedis ventriculi regionibus extuberet, qui a dextro latere decliuus ad sinistrum latus fertur, versus communem ventriculorum amplitudinē. ¶ Non est autem aliud cōmunis ventriculorū cavitatis, quam inferiorum dextri & sinistri ventriculorum partiū sub corpore testudinis imagini comparato descensus concurfusq;, qui inferiori parte oblongam vallem duorum vicinorum montium exprimit, acutumve per ipsius longitudinem angulum efformat. Superiori vero sede ad testudinem imitantis corporis effigiem cavitatis illa per concavum orbiculatam visitur. ¶ Communis hæc amborum ventriculorum cavitatis, binos a se educit meatus, quorum vnus insigni satis amplitudine ex humiliori ipsius sede, vbi acutum angulum per totam sui longitudinē vallis cuiusdam ritu exprimit, recta deorsum in cerebri substantia insinuatus versus glandem & peluim porrigitur, cerebri pituitam excipientem. ¶ Alter autem meatus qui posterior est, tertii ventriculi non minima pars censendus venit, qui inter cerebri testes & nates ac super dorsalis medullæ initium decliuus, ad quartum ventriculum retrorsum pertinet. Meatus huius initium non ad amussim orbiculare visitur, sed quodammodo triangulare. Seruat enī in inferiori sede acutum suæ concavitatis, vnde prodit, angulum. In superiori vero meatus parte, quæ glandi vasorum tertium cerebri ventriculum petentium diuisioni præest, proxima conspicitur, transuersa linea anguli illius latera cōnectit, ipsaq; cum illis alios duos angulos constituit. Atq; huiusmodi etiā, meatus ipsius orificiū est, quo quartum ventriculum sub cerebri natib. respicit. Ex inferiori meatus angulo, qua primū inter cerebri

Communis ventriculorum dextri & sinistri concavitas, seu tertii ventriculi historia. Meatus a tertio ventriculo ducti.

testes ferri incipit, mearus alius raro educitur, qui per cerebri substantiam deorsum in priora protensus, tandem ad cyathum vsque peruenit, qui cerebri pituitam excipit. Ceterum quartus ventriculus ad quem posterior meatus tertii ventriculi porrigitur, ex dorsalis medullæ & cerebelli sinibus componitur, non secus quam si vtraque manu vnā cavitatem fingeres. Totus enim ventriculus in cerebelli corpore haud insculpitur. Dorsalis itaque medulla ex cerebro prodit, vbi tertius ventriculus meatum versus quartum ventriculum primum porrigit, testes ipsi & nates dorsalis medullæ principio continuantur, ac meatum illum tertii ventriculi cum dorsalis medullæ initio æqualiter deducunt, ita vt meatus superior pars illis, inferior autem dorsali medullæ incisa sit. Postquam vero meatus ille nates superauit, eius portio quæ dorsali incisa videtur, dilatari incipit, ac sinum efformat vsq; ad eum fere dorsalis medullæ locum, qua caluariam hæc egressura est pertinentem. Sinum hunc rectissime Herophilus concauitati assimilauit calami quo scribimus. Nam si huic sinui eam calami partem, quam atramento intingimus, comparaueris, animaduertes calami orificium vbi adhuc calamus teres est, & sectioni vicinus, tertii ventriculi meatus fini respondere, qui sub natibus prominet. ¶ Deinde cuspidem quo literas fingimus, similem obseruabis infimæ sinus parti, quæ in dorsalem medullam iam ex caluaria excisuram, veluti angustum meatum producit. ¶ Duos autem calami angulos, quos inter mucronem & elatissimæ sectionis initium fingimus, cavitatisque calami latera, sinus lateribus simillima offendes. Ad huius cavitatis latera, vbi anguli illi consistunt, vnus vtroque dorsalis medullæ processus orbicularis habetur, cui duntaxat cerebellum adnascitur, continuumque cum dorsali medulla corpus efficitur. Atque huiusmodi dorsalis medullæ cavitates est, alteram quarti ventriculi cavitatem constituens. Quæ vero in cerebello spectatur ita se habet. ¶ Inter duas orbiculares cerebelli sedes, quibus dorsali medullæ continuatur, & inter eius cerebelli partis extremam, quæ veluti tertia ipsius portio est, sinus quidam imprimitur, latior quam longior, non tamen admodum profundus, qui alteram quarti ventriculi partem constituit, in anteriori & posteriori sede patens, quod neque anterior neque posterior cerebelli pars dorsali medullæ adnascatur: quamuis interim sinus hic tenui cerebri membrana & anteriori & posteriori parte occludatur. In anteriori enim parte tenuis membrana, qua cerebellum cerebro & cerebri natibus committit, sinum obuoluit, posteriorem vero sinus sedem obstruit, eius loci tenuis membranz portio cerebellum dorsali medullæ ibidem colligans. ¶ Quartus ventriculus nihil in se præter aqueum humorem qui & aliis ventriculis communis est continet, quemadmodum neque meatus ex tertio cerebri ventriculo in quartum pertinet. ¶ Porro dexter & sinister præter huiusmodi humorem etiam plexum quandam in se continent, quem dissectionum periti extimo fœtus in uolucro comparant. Communis autem cavitates, seu tertius ventriculus venosum illud vas deducit, quod plexus illius constituendi gratia a quarto duræ membranz sinu propagatur. Dein anterior quoque horum ventriculorum pars ab illo vase venulas impense graciles interdum assumit. Ventriculi autem cerebri non sunt nisi amplitudines sinusque in quibus attractus per inspirationem aer, vitalisque spiritus a corde ipsis transmissus, priuatæ cerebri substantiæ vi in animalem spiritum mutatur. Qui postea per neruos ad sensum motusque instrumenta distribuitur, vt illa huius cerebri spiritus beneficio, & apta suis muniis constructione suo fungantur officio, quo muscoli mouent, oculi vident, olfactus organa olfaciunt, auditus instrumenta sonos percipiunt, & lingua sapores dignoscit, & demum omnis pars, cui neruus exporrigitur, tactiles qualitates diiudicat.

De fornice camere cerebri. C A P. VII.

Nomina.

Eandem

CEREBRI corpus fornicis seu testudinis modo exstructum, vel veluti domus testum quoddam in sphaeræ superficiem concauam circumactum, Græcis *νεφελος* & *ψαλιδος*, quod scilicet eius generis ædificia, qui architecturæ sunt peritiores, appellare solent *νεφελος* & *ψαλιδος*, id est, cameras, fornices seu testudines, Arabibus autem *Zac* & *zachil* dicitur. Id quidem vnicum est, & in cerebri medio repositum, ac pariter vtriusque cerebri partibus commune. Hoc eandem cum calloso corpore substantiam, & parem quoque longitudinem, ac vsum etiam quodammodo eundem adipiscitur. Verum

rum

Arum forma ortusque huius peculiaris accidit. Ex posteriori namque dextri & sinistri ^{Ortus} ventriculorum sede, quæ hæc deorsum in priora refleditur, statim in ipso reflexu corpus quoddam enascitur, similem prorsus cum cerebri ventriculorum substantia sortitum, nisi quod paulo quam ventriculorum substantia candidior, duriorque visitur. ^{Substantia}
 ¶ Huius corporis pars, quam dexter ventriculus educit, ei continua est, cuius principium ex sinistro pendet, ac simul ambæ partes latum quoddam corpus efficiunt, quod statim ab ortu a reliqua ventriculorum cerebri substantia abscedit, ac sensum in acutum definens antrorsum perfertur, ad eum usque; cerebri locum pertingens, ubi anterior communis dextri & sinistri ventriculi cavitatis, tertii ventriculi pars cessat. Ibi dem namque acuto quodam angulo corpus hoc substantiæ cerebri rursus vnitur continuumve est toto reliquo ductu a principio statim inferiori ipsius sede tribus ventriculis nusquam connatum, corporisve alicuius interuentu connexum. ¶ Obiinet itaque triangularem figuram inæqualibus lateribus conformatam. Ac primum quidem ^{Figura} lateris, quod & breuissimum est a posteriori sede dextri ventriculi ad posteriorem sinistri protenditur. ¶ *Alterum* in dextro consistit ventriculo, a posteriori ipsius sede versus interiora usque; ad priorem tertii ventriculi partem protensum. ¶ *Tertium* in sinistro positum ventriculo, secundo lateri longitudine respondet. Secundum duo hæc latera plexus illi prorepunt, qui secundarum formam expriment. ¶ Ceterum ii tres huius corporis anguli duntaxat cerebro inferiori corporis sede connati, continuique sunt. Latera enim omnia a cerebro prorsus abscedunt. Superiori vero parte corpus id vnico tantum angulo, qui acutus est, anterioraque spectat, cerebri substantiæ continuatur. Inferiori sede corpus hoc vnica donatur superficie, triangulari testudini fornicive quam simillima. Vnde etiam, & ab usu veteribus Græcis, ut dictum est, *ψαλmonds* nuncupari cœpit. Hæc superficies, tertii ventriculi elatiorem sedem constituit, ac proinde etiam sub ipsa dextri sinistrique ventriculi fit communio. ¶ Porro superior huius corporis superficies gibba, ac pro inferioris superficiiei cavitatis ratione conuexa visitur, non tamen simplex continuaque, vt illa. Ea namque per corporis longitudinem in medio in acutum quodammodo extuberat, continuaque cum dextri & sinistri ventriculi septo efficitur, adeo vt in vtroque latere vna haberi videatur superficies, quæ in ipso corporis ex posteriori ventriculorum sede exortu impense orbicularis ac oblongæ sphaeræ superficiiei similis conspicitur. Corporis itaque testudinis modo conformati omnes superficies quæ laues omnino sunt, & aqueo humore perfusæ, tres cerebri spectant ventriculos. Tota enim inferior ipsius superficies tertii ventriculi superiorem sedem, conficit: dextra pars superioris superficiiei dextrum respicit ventriculolum, sinistra sinistram. Vt vero ventriculi ipsi neutiquam tenui membrana succinguntur, ita etiam hoc corpus tenui membrana prorsus liberum est, nihil aliud ad sui constructionem præter cerebri substantiam admittens. ¶ Porro natura id creauit, vt ^{Vfus} instar testudinis, superiorum corporum impetû, quo minus illa corruant, sustinentis, tertium cerebri ventriculolum amplum seruet, ac sese ipsum haud concidere sinat. Ad quem usum, præter aptam constructionem, tres eius anguli quibus se sustinet, auxiliantur. Quinetiam septum ventricularum callosi corporis beneficio sursum tractû, hoc quoque corpus subleuat, attollitque. Quæ quæ ita sint, corpus istud magna ex parte tertii ventriculi cavitatem efformat, & sub se vas a quarto duræ membranæ sinu, citra omnem compressionem securissimè deduci finit, quod per tertium ventriculolum recta fertur, ac tandem bipartitum in dextrum sinistramque ventriculolum digeritur.

De cerebri glande. C A P. VIII.

Iuxta posteriorem testudinis modo formati corporis sedem, qua primum vas venosum ex quarto duræ membranæ sinu in tertium cerebri ventriculolum porrigi incipit, glandulam natura condidit nuci pineæ, aut turbinatæ figuræ similem, quæ idcirco veteribus anatomicis *κωνοειδης*, & *κωνοειδης* est appellata. Reponitur autem sub vasis ^{Nomina} illius initio, mucrone suo sursum spectans, basi vero cerebri substantiæ incumbit paulo posterius quam meatus initium visitur, qui ex tertio cerebri ventriculo in quartum procedit. Neque profecto aliter ipsius situm exprimere licet, nisi etiam eminentissimæ & anteriori testium cerebri parti glandem inniti dicamus. Huic namque cerebri parti in homine potius innititur in qua quod quadam substantiæ continuitate

hic cerebri substantiæ continua, aut quæpiam cerebri particula censenda esset. ¶ In A hominibus enim cerebro vix hæret. In agno autem aut prouectioris ætatis oue, cerebro non hæret modo, verum etiam cerebri substantiæ quodammodo continua cernitur. Insuper homo eam glandem minorem quam vel agnus sortitur. Vnde tum hanc ipsam, tum quæ sequenti capite describentur instrumenta visurus commodissime agnium cerebrum aggredieris. ¶ Præsens cerebri glans, quæ *cerebri substantia durior*, magisque ad glandis quam ad cerebri naturam accedit, meatum qui a tertio cerebri ventriculo in quartum porrigitur non obturat: idque hoc præcipue nomine, quod haudquamquam meatum adeo contingat, ut ipsius orificium occludere, aperireque possit. Verum ob id facta est, ut, quemadmodum aliarum corporis, sicuti etiam Galenus *lib. 8. de usu par. cap. 14.* attestatur, glandulæ permulæ, firmamentum esset vasi quod tertium cerebri B ventriculum accedit, & ab ortu statim in frequentes ramos tenui membrana contextos diuiditur, id ipsum suffulciens, ne meatus illius principio statim in ingressu incumbens eum obstrueret, animalemque spiritum ex tertio cerebri ventriculo in quartum ferri prohiberet.

De testibus & natibus cerebri. C A P. I X.

Numerus. TESTES hi natesque nihil aliud prorsus sunt, quam quædam cerebri particula in hoc fabricata, ut meatus ex tertio cerebri ventriculo quartum accedens ventriculum tuto citra aliquem a superioribus cerebri partibus compressum deduceretur. Neque etiam, etsi multitudinis nomine particula nominatur, ob id plures diuisa est. Nam vnicam cernitur, eleganter a quadam similitudine hæc sub nomina, *vi paulo post dicemus*, vè C dicans. ¶ Reponitur enim illa cerebri pars inter anteriorem cerebelli sedem, & posteriorem tertii ventriculi partem. ¶ Deinde inferiori sede spectat dorsalis medullæ initium, superiori eam cerebri partem quæ cerebello iam inniti incipit. Continuatur autem cerebro, aut, ut rectius dicam, a cerebro nascitur, tota anteriori scilicet sede sua & inferiori in lateribus, autem & superiori & posteriori partibus nulli particulæ continua est, S Substantia. sed tantum tenui membrana, ut reliqua cerebri superficies, obducitur. ¶ Substantia ipsius, quoniam tenui membrana succingitur, subflaua est, illique substantiæ cerebri respondet, quæ proxime tenui membrana passim accedit. In superiori parte iuxta anteriora, glandula incumbit ipsi, quæ paulo ante vasorum deductui præfectam ostendimus. ¶ Pars hæc effigiem quandam exprimit, duabus sibi commissis natibus, quam simillimam. Verum quoniam D superior ipsius pars testes magis, propter glandem illam quæ peni assimilatur, refert, veteres qui pueros iure hæreditario, *quemadmodum initio lib. 2. de anat. admini. testatur Galenus*, domi in confectionibus exercebant, *didymus* eam appellauere. Græcos imitati Latini, *testes* ipsam & *gemellos* nominant. ¶ Ceterum quia in posteriori inferiorique huius corporis parte, præminet orificium meatus illius qui ex tertio ventriculo quartum petit, quodque id orificium similitudinem anæ referre videatur, & in posteriori huius cerebri partis sede impressio quædam instar lineæ transversim feratur, superiora quodammodo ab inferioribus distinguens, huic posteriori inferiorique parti *γαστήρι* nomen veteres indiderunt, Latini *nates* siue *natulas*, aut *clunes* dixerunt. ¶ Ceterum temporis progressu Græci hæc nomina confudisse videntur, & partem hanc quæ meatum ex tertio ventriculo in E quartum summa Opificis solertia deducit, continetque, modo *didymus*, modo *γαστήρι* appellasse.

De vermiformibus cerebelli processibus. C A P. X.

Forma. SUPERIOR cap. nimirum & cerebelli formam explicantes cuiusmodi vermiformes cerebri processus sint diximus. Vermis namque imaginem exprimentes cerebelli processus non sunt aliud, quam prominentior cerebelli substantia, vermem referens. Siquidem vna quodammodo cerebelli pars a prioribus in posteriora, veluti in orbem ducitur, eaque talibus implexa est reuolutionibus, ut vermis in ligno nascentis effigiem appositissime ostendat. ¶ Duo huius partis apices, quorum hic anteriorem ventriculi cerebello & dorsali medullæ communis sedem respicit, ille vero posteriorem a iam dicta similitudine veteribus Græcis *σκωληκοειδής*, Latinis, *Vermiformes* nuncupantur. Nihil enim aliud sunt, quam prominentior cerebelli substantia, *σκωληκ*, id est, *vermem referens*. Vsum nullum nec motum alium habent, quam reliqua cerebelli substantia. Ceterum quas partes Galenus tendines ac veluti vincula appellauit, non sunt nisi tenuis membranæ partes cerebellum cerebri testibus colligantes.

A De infundibulo, & glandula pituitam cerebri excipienti. C A P. XI.

DV o s cerebri esse meatus *cap. 6.* quum tertium cerebri ventriculum prosequere-
mur, recensuimus. Vnum, qui ex media iam dicti ventriculi sede recta deorsum
in cerebri substantia insinuatus descendit, ita sane vt presentis meatus finis e regione
eius caluarie partis sit, quæ sinum glandulæ qua cerebri pituita excipitur, reponenda
aptum constituit. ¶ *Alter*, qui dicto longe arctior secantibus occurrit, ac ex meatu il-
lo deducitur, qui a tertio ventriculo in quartum per cerebri testes natesque pertingit.
Quamprimum enim meatus is cerebri testes subire incipit, ex anteriori inferiorive
ipsius sede, alter pituitæ expurgandæ subseruiens cerebri meatus producit, sensim
deorsum in anteriora tâtis per protensus, dum in finē primi meatus terminetur, idem-
B que ex ambobus meatibus orificium consurgat. Ad huius orificii latera, tenuis mem-
brana etiam hic cerebelli basim succingēs, orbiculatim a se educit sui portionem pro-
cessumve, substantia prorsus cum reliqua tenui membrana similem, nisi quod gracili-
bus prorsus venis, quanquam interim frequen-ibus, intertextitur. Presentis processus
initium accurate refert latissimā infundibuli regionem, quo in angustioris orificii la-
genas vinū aut alius liquor infunditur. Est enim amplum, & orbiculare. ¶ Ab exortu
vero sensim in arctum infundibuli quoq; modo cogitur, donec tandem veluti in an-
gustam oblongamq; fistulam similiter atq; infundibula finiat, quæ deorsum protensa,
per peculiare sibi in dura cerebri membrana excisum foramen descendit, suo mucro-
ne ad glandem qua cerebri pituita excipitur desinens. Adeo vt vniuersum hoc mem-
C braneum corpus infundibulo, & imagine, & vsu quam simillimum censi debeat, vn-
de etiam Græcis *scapha* nuncupatur. ¶ Quanquam etiam a scyphi forma, quam superior
huius corporis pars exprimit, *scapha* appelletur. ¶ Ceterum glans pituitam excipiens
locatur sub dura cerebri membrana in proprio ipsi in osse cuneū imitante exculpto
sinu, cuius etiam effigiem exprimit. Depressa enim est, & in humiliori parte quodam-
modo gibbosa orbicularisq; in superiori vero concaua, & sinu quodam insinuata; se-
cundum orbem non prorsus circularis conspicitur, verū paulo minus tota quadrata.
¶ Substantia constat glandulosa, sed ceterarum glandiū corporis substantia longe dū-
riori & compactiori, omni ex parte tenui obducitur membrana, quæ vt ab infundibu-
li termino glandulæ sinui innato exoritur, aut etiam a membrana caluarie os tota illa
D sede succingente, qua in hac regione dura cerebri membrana a caluarie osse abscedit,
distatq;. Huius caluarie ossi obductæ inibi membranz interuentu glandula formatur,
& etiam duab, insignioribus soporalium arteriarum propaginib; adhæret, quæ ad ipsius
latera prorrepunt. ¶ Ad huius glandis latera deorsum vtrinq; canales duo descendunt,
ac vnus quidē versus anteriora prorrepit in foramen desinens, quod secundum cerebri
neruorū par deducit. Alter vero in posteriora magis descendit, atq; per inæquale aspe-
rūmq; foramen seu rimam ducitur, quæ ad anteriorem sedem lateraque foraminis q;
soporalis arteriæ insigniorem ramum in caluarie amplitudinem transmittit, habetur.
Atque hæc omnia pituitæ cerebri vacuandæ ministrant. Quippe duo meatus, quos
in cerebri substantia incisos diximus, ex cerebri ventriculis humorem illum dedu-
E cunt, atque infundibulum desuere sinunt. Ipsi autem infundibulum superius am-
plum latumque exstruitur, non horum duntaxat meatuum, qui in vnum tandem ori-
ficium desinunt, occasione: verum etiam vt fines illos dextri sinistriq; ventriculorum
cerebri contineret, quos ex posteriori ventriculorum sede deorsum in anteriora re-
flexos inter cerebri reuolutiones hic desinere commemorauimus, quandoquidem &
hi suæ sedis pituitæ deferunt, atq; in infundibulum exporrigunt. ¶ Præterea infundi-
bulum ea constat amplitudine, vt si quid pituitæ super callosum corpus, & sinus illos
colligeretur, quos ad callosi corporis latera conspici reulimus, id ipsum in infundibu-
lum tenuis membranz beneficio procumberet. ¶ Siue enim eiusmodi humor ab an-
teriori callosi, ac instar arcus protuberantis corporis sede, siue a posteriori descendat,
F ad tenuem membranā cerebri basim inuestientē influere, & hinc paulatim in infun-
dibuli amplitudinem prolabi potest. Infundibulum vero ab omnibus his ductibus pi-
uitæ excipiens in angustū cogitur, vt tandem hæc per vnicū & priuatū sibi in dura
membrana patens foramen deducat, ac innoxie in illius glandulæ centrū promanare
sinat. ¶ Glandula autem quadā substantiæ familiaritate defluxus impetum sustinens,

Meatus ex
tertio cere-
bri ventri-
culo educi.

Galenus li.
3. cap. 3. de
vsu par.

Peluis in
quam cere-
bri pituita
confluit

Glandis pi-
uitam ex-
cipientis hi-
storia.
Figura.

Substantia.

Canales a
glande de-
ducti.

Vsus & con-
structionis
ratio.

& vt verisimile est, os ab iniuria vindicans, pituitam hanc excipit, ac sensim citra stil-
 licidium a lateribus suis eam vnde quaque defluere sinit, per omnia foramina hic in
 caluariæ basi tum venis, tum arteriis, tum nervis exsculpta. ¶ Decumbit itaque pitui-
 ta & in palatum per ea quæ illud spectant foramina, & non minima profecto portione
 per foramen secundi paris nervorum, ad oculorum sedis radicem, & hinc per amplum
 foramen cum aliis quam plurimis foraminibus in narium amplitudinem fertur. Nul-
 li vero sint meatus animante secundum naturam habente, qui pituitam ad olfactus
 organorum sinus deducant. Neque enim fieri potest, vt per tenues illos ac nervis si-
 milis, cerebri processus ab anterioribus cerebri ventriculis pituita ad nares deduca-
 tur, quum nullus omnino in ipsis meatus sit neque etiam ea constant crassitie, vt vel
 meatum quo pituita deduceretur habere possent. Nec vllus prorsus pituitæ ductus ad
 olfactus organorum sinus imaginari potest, nisi anterior callosi corporis regio, quæ
 pituitam sibi influentem, quum animal non recte se habet, in illam sinuum olfactus
 organorum amplitudinem dimittit, veluti accidit, quando cerebrum nimia pituita
 vexatur. ¶ Vnde etiam non naturalis per nares pituitæ fluxus perficitur, & pruritus,
 calor, dolor, & odorandi facultatis noxa, eiusque generis alia symptomata oboriun-
 tur, quemadmodum indies in destillationibus accidere experimur. Quod sane non
 eveniret, nisi ad sinus organorum olfactus pituita deflueret. Quæ diximus Galenus
lib. 8. de usu partium, cap. 6. luculenter admodum confirmat, ita inquit. ¶ *Sunt autem præ-*
ter hæc duo alii canales, qui per palatum in os totius cerebri excrementa eructant. Qui duo soli pur-
gando cerebro sufficiunt, quando animal omnino recte habet, alimentumque belle vincit ac perco-
quit. Quo fit ut prima utilitas ipsorum a cerebro in nares foraminum, propter quam potissimum
facta sunt, non superfluum excretio, sed ea quidem ex abundanti cerebro male affecto est substi-
dium. Ante enim superfluum excretionem est ipsa odorum dignotio, & hæc adhuc antiquior, &
ad vitam necessaria, in cerebrum inspiratio. Hactenus Galenus. ¶ Vnde omnibus perspicuū
 fit per olfactus organorum sinus foraminula aut cribri, aut spongiæ modo forata, quum
 lege naturæ animal se habet, de Galeni etiam sententia nihil pituitæ defluere. ¶ Si au-
 tem aliquando defluit, non minus præter naturam fluxum esse fatendum erit, quam
 quum foramina quæ ad glandis sculpuntur latera totam pituitam non ad amissim
 deducunt, hæcque deorsum versus foramen dorsali medullæ transmittendæ paratum
 decumbit, ac cum dorsali prolabens, in dorsum, & dein per nervorum ductum mo-
 do in brachia, modo in crura, modo in lumborum musculos, modo alio quouis pmanat.

De olfactus organo. C A P. XIII.

V A R I A est de olfactus instrumenti nostræ tempestatis tum Medicorum, tum
 Philosophorum sententia, ac dissensio, non aliunde nisi ex anatomes impetitia
 nata. Quapropter vt de eo etiam hic breuiter agamus ordinis ratio ac necessitas ipsa
 postulare videtur. Recentiores autem propemodum omnes organum olfactus esse
 tradunt duas cartunculas, id est, paruas portiones carnosas, cauas, ac spongiæ modo
 perforatas, similes mammillarum capitibus seu papillis sub cerebro intra cranium
 proxime supra nares, vel in fine narium in medio duorum oculorum in fronte loca-
 tas. Verum ridiculum admodum est, quod cartunculas vocant cerebri anfractuū
 reuolutionumque apices, ac ad frontis ossis sedem versus superciliarum medium pro-
 tuberantia eiusdem tubercula. ¶ Erroris autem occasionem illis præbuit, quod car-
 nis quasi modo iam dicta tubercula rubeant, Quia vero prominent, carnisque modo
 rubent, mammillares etiam processus nominarunt. Non esse autem hos processus ol-
 factus organa anatomes ratio satis monstrat. Quippe mammillares hi processus non
 ad narium fines sed ad ossis frontis sedem versus superciliarum medium pertingunt
 ac protuberant, ideoque quum in se vapores a rebus odoratis delatos recipere ne-
 queant vt odoratus sint instrumenta, fieri non potest. Legitima vero olfactus organa
 a sede vbi ventriculorum angusti termini, desinunt, vt *cap. 6.* diximus, nascuntur.
 Hinc enim vtrinque a cerebro alba molliisque prodit substantia, quæ in progressu et
 iam cerebro tenuis membranæ interuentu colligatur, quousque ad sinus octavi ca-
 pitis ossis pertingat, qui olfactus organi priuatim parati sunt. Ad posteriorem enim
 horum sinuum sedem albicantes nervisque non absimiles cerebri processus, a cere-
 bro abscedunt, neque amplius tenui membranæ cōnati, in suū singuli porriguntur si-
 num:

Nulli sunt
 in animan-
 te secundum
 naturam se
 habente
 meatus qui
 pituitam
 ad olfactus
 organa de-
 ducant.

Recentio-
 rum de or-
 gano audi-
 tus senten-
 tia confu-
 tatur.

Vera senten-
 tia de his or-
 ganis.

Anum: & adhuc antrosum magis protensi ad sinuum finem, seu anteriorem ipsorum sedem desinunt, sinibus suffulti, ac cerebro interim proxime accumbentes. Nam etsi cerebro in sinuum regione non amplius adnascantur, nihilominus ipsi perpetuo attenduntur, illique sunt contermini. ¶ Hi processus, *uti dictum est*, cerebri, ductu, colore, formaque nervis respondent: quamvis interim longe nervis ipsis molliores sint, pauloque latiores quam profundiores. Verum quia reliquorum nervorum ritu, neque extra calvariaz, neque extra magnam duræ membranæ amplitudinem procedunt, veteres anatomici nervi nomine non dignati sunt. Atque hæc legitima & germana de olfactus organo sententia, quam etiam sequi videtur Galenus, ut ex sequentibus clarissime patebit. Nec obstat quod is *libro 8. de usu partium, cap. 6. & lib. 3. de labo. locis cap.*

Galenus de
olfactus or-
gano sen-
tentia.

Bult. & lib. 4. Simp. cap. 20. olfactus sensorium in anterioribus ventriculis cerebri statuere videtur. Nā ea loca nō ita esse accipienda iudico, quasi Galenus simpliciter & præcise olfactus organum in anterioribus cerebri ventriculis locarit, sed quod in eorundem potius angustis extremitatibus seu terminis, ut comprehensum est, id ipsum esse voluerit. Quod euidenter monstrant ea quæ scribit *libro 7. de placitis Hippo. & Platonis in fine fere*, ubi seipsum interpretatur sic inquit: *Supere est unius olfactus instrumentum, quod non in narium meatibus sedem habet, sed in terminis anteriorum cerebri ventriculorum quo narium meatus pertingunt.* Hæc ille per *πύλον*, hoc est, terminos seu extremitates non intelligo nisi prædictos ex anterioribus cerebri ventriculis cerebri processus albicantes, nervisque similes. Atque id per *πύλον* intellexisse Galenum, ex aliis etiam eiusdem locis fit manifestissimum, quorum primus est *in lib. 8. de usu par. cap. 6.* ubi ita scriptum reliquit. *Facultatum, ait, alia odorum, alia saporum, alia sonorum, alia colorum est diiudicatrix. Odorum quidem, ab utroque cerebri ventriculo ad nares longus est processus, nihil ab ipsis ventriculis discrepans.* Hic enim diserte quæ sit sua de olfactus organo sententia exponit, nec esse illud nisi longos illos processus ad nares usque protensos. Neque enim mammillares cerebri processus, anfractuūque eius apices intelligere potuit, quod scilicet illi ad nares non pertingant. Alter locus est *lib. 11. de usu par. cap. 12.* ubi inquit. *Eius generis esse ostendimus, os olfactus instrumento præpositum, quod id prædictis nuncupatur.* Vnde iterum perspicuum fit Galenum non præcise anteriores cerebri ventriculos organo olfactus dixisse, quod illi non sint ossi *ιδρυαδὲς* præpositi, sed illorum tantum extremitates processus-

Cve ex illis natos, & animale spiritum ad narium fines deferentes ad sinus qui sunt octavo capitis ossi incisi pertingunt, organa olfactus esse dixit. ¶ Atque hinc est, quod os etiam illud multis foraminibus odorum gratia, *Galeno etiam ipso libro 8. de usu partium, cap. 6 & 7, attestante*, peruium, hocque nomine *ιδρυαδὲς* dictum sit. Hæc ad Galeni de olfactus organo sententiam enucleandam sufficere arbitramur.

De oculo visus instrumento. C A P. XIII.

OCULI Græcis ὀφθαλμοὶ dicti, in capite loco edito, & parte anteriore, quod nemi- nem latet, sit, gemini sunt, ut cætera sensuum instrumenta, & substantia molles, & ipharæ modo exacte rotundi. Ipsos autem naturā ad securitatem varie muniuit palpebris, ac ciliis, cute, & musculis, *ut lib. 2. cap. 4. 5. & 6. copiose diximus.* ¶ Ceterum constat oculus ex septem tunicis, & tribus humoribus, quod rectissime intelligemus, si exorsi ab oculi centro, ad extimam eius superficiem usque progrediemur. Quod perinde erit, ac si quis oui constructionem ab ipsius luteo ad album, & deinde ad tenuem membranulam albo obductam, & postea ad putamen egrederetur. ¶ Oculi itaque centrum est humor, qui Græcis ὕδαρ, Latinis *Glacialis* nuncupatur a similitudine nimirum, quam cum lucidissima glacie obtinet, non quidem in consistētia & duritia, verum in colore. Albus enim, clarus, lucidus, splendoris, & mediocriter durus est. Quippe ab oculo exemptus non est exacte rotundus, sed anteriori & posteriori parte leuiter compressus, ad lentis fere similitudinem, vnde etiam Græcis φαεινός dictus est. Superficie constat & læui & insigniter lubrica. ¶ Vniuersæ ipsius anteriori sedi tunica obnascitur instar tenuissimæ ceparum pelliculæ nulla parte posteriori ipsius sedem contingens, sed inibi finiēns, ubi crystallinus humor amplissimus cernitur, & ipsius capacior consisteret circulus, si illum multis æque distantibus circulis seu lineis orbiculatim obuolutum fingeremus. ¶ Hæc tunica non modo cepe tenui tunica, sed & araneæ telis similis est. Vnde a continua araneæ telarum

Nomina.
Situs.
Numerus.
Substantia.
Forma.
Partes &
constructio
oculi.

Color.

Tunica.
Arythmōdis.

imagine Græcis *αμφιδιδυς* dicta est. Respondet enim tenuitati, nequaquam autem ro-
 bore & duritia, illis araneorum telis. Sit igitur præsens tunica secunda in oculi con-
 structione nobis enarrata pars, quæ quidem anteriori tantum centri, hoc est, humoris
 crystallini, sedi obducitur, ac veluti semiglobus tantum in oculi fabrica censenda ve-
 nit. Porro posterior humoris crystallini sedes arachnoidetunicula non tecta, in alio,
 continetur humore, qui instar medii globi in posteriore oculi sede copiosus reponi-
 tur, vulgari quidem albo vitro iam refrigerato colore seu luciditate respondens.
 ¶ Consistentia humore crystallino longe mollior visitur, & ab oculo exemptus suam
 formam neutiquam seruat: quamvis interim aquæ modo non defluat, sed ita consi-
 stat, quemadmodum vitrum in fornacibus fustum, & ferreis canalibus, quibus id ab ar-
 tificibus a fornace eximitur, obuolui cernimus. Quum itaque præsens humor consi-
 stentia fuso vitro, colore autem seu luciditate refrigerato & formato iam vitro respon-
 deat, Græcis *αμφιδιδυς*, Latinis vero *vitreus* merito est appellatus. Hic præterea humor
 multis numeris copiam crystallini humoris superans, quum adhuc in oculo reponi-
 tur semiglobo similis est, cuius plana superficies oculi anteriora spectat, rotunda vero
 seu conuexa in posteriora protendit: & cuius anterioris sedis, seu plane superficiei
 medio sinus imprimitur tantus quanta posterior humoris crystallini pars est. Is enim
 humori vitreo ita innititur, ac si globum in aqua natantem cerneret, cuius media pars
 exacte in aquam mergitur, altera supra aquam conspicua. ¶ Ceterum quum primum
 nerui visorii substantia in oculum fertur, mollior reddita dilatatur, in latam quan-
 dam tunicam toti posteriori vitrei humoris sedi proxime obductam, & non ultra me-
 diam oculi sedem in anteriora pertinens, & extreme gracilibus, sed interim con-
 spicuis venulis, ac item arteriis intertexta. Hæc venulæ a tunicæ radice antrosum du-
 ctæ ipsi exporriguntur, quum primum nervus ille dilatatur. Hæc tunicæ forma
 dimidiato tantum ovo comparatur, aut minori piscatorum reti, quod vni accom-
 modatur baculo, & ex ampla basi dimidiati globi modo in obusum mucronem
 fertur. Ab huiusmodi retis imagine præsens tunica Græcis *αμφιδιδυς*, Latinis *re-
 tiformis* dicta est. Hæc a plerisque, ut Galenus libro 10. de usu partium, capite 2. auctor est,
 tunicæ nomine non dignatur, quod scilicet ceterarum tunicarum modo membra-
 nea non sit, sed mollis, & veluti mucor aliquis ex natibus procidens. Quum
 enim hæc tunica secantibus in vnum colligitur, atque a sua radice propendet, mu-
 corem, aut cerebri substantiam aqua quapiam dilutam refert. Non enim ita solida
 crassaque ac cerebri substantia videtur. Atque hæc tunc quatuor oculi partes re-
 censuimus, duos nimirum humores, crystallinum scilicet & vitreum, & totidem tu-
 nicas, arachnoiden nimirum & retiformem. Nunc itaque eam aggrediemur tuni-
 cam, quæ a tenui membrana nerui visorii substantiam concomitante producit.
 Mox enim atque hac membrana simul cum nervo oculum subit, in tunicam dege-
 nerat ad omnes oculi sedes globi modo pertinentem. Non enim ut paulo ante com-
 memorata tunica, quam nerui producebat substantia, posteriorem oculi sedem so-
 lum occupat, verum & anteriori quoque obducitur, & in tota posteriori oculi sede
 proxime tunicam inuestit a nerui substantia pronatam, & in horum contactu prorsus
 nihil mediat, neque ambo etiam inuicem aliquo nexu præterquam contactu com-
 mittuntur. Quæ autem præsens tunica anteriori oculi sedi obducitur, interna sua su-
 perficie vndiq; aqueum humorem, de quo paulo post dicemus contingit & comple-
 titur. ¶ Externa vero huius tunicæ superficies passim ea tunica proxime obducitur,
 quæ dura nominatur, neque quicquam inter eas duas interuenit. ¶ Porro vterque tunicæ
 id priuatim accidit, quod exacti globi modo prorsus non sit rotunda. Nam anteriori
 regione non nihil introsum comprimitur, aliqua sui parte planam superficiem pro-
 conuexa ac orbiculari commonstrans. Quum enim hæc ad eam usque anterioris oculi
 sedis regionem pertingit, secundum quam maior oculi educitur circulus, quem iridem
 vocamus, aut quo albus oculi a nigro distinguitur, & ea tunicæ pars consistit quam cor-
 neam appellabimus, ipsa ab hac ableedit quæ dura procreat membrana, neque amplius
 illam contingens inibi in posteriora comprimitur. Neque hac dumtaxat compressione do-
 nat, verum etiam huius compressionis medio, foramine quodam peruium est, quod minima
 in oculo apparentem efformat circulum, quod & Græcis *αμφιδιδυς*, nobis *pupilla* nominatur.
 Adco

Vitreus hu-
mor.

Tunica re-
tiformis.

Αμφιδιδυς
αμφιδιδυς

Tunica
tunica

Iris.

Pupilla.
Pupa.

- A** Adeo ut hæc tunica vix folliculo a quo pedunculum quo affirmatur extraxeris, quæ simillima sit; præsertim si vnam illic parum concidisse; & ut sit vacuari intelligas; ubi pedunculum extraxeris. Totus enim vix folliculus tunicæ huic respondebit. Ea autem concidentia illi respondebit compressioni, quam in anteriori parte hæc tunica sibi vendicat. Foramen vero quo pedunculus firmabatur, ipsi pupillæ comparatur. Atque ab hac similitudine Græci præsentem tunicam *παρωδία*, Latini autem *Vucam* *παρωδία* appellant. Dicitur vero etiam *παρωδία*, tum quod a tenui cerebri membrana, quam Græci etiam *παρωδία* nuncupant; tum quod ipsa venas arteriasque oculi sustinet, perinde atque tenuis membrana cerebri vasa suffulcit; vel quod multorum vasorum instar inuolucrum foetus quod *χελών*, id est, *secunda* vocatur, sit vinculum. Hinc est, quod nostris *secunda*
- B** appelleretur. Qua enim vucæ tunica dura obducitur, venarum arteriarumque surculi ab hac in vucam pertingunt, & vucæ ita exasperant, ut hac quoque ex parte internæ superficie folliculi vix accedat, quæ fibras illas continet, quibus vix caro & acini sustentantur.
- C** Eorum itaque vasorum surculorum interuentu, vucæ duræ cōnascitur tunica. Qua vero vucæ ab illa secundū iridis circulum abscedit, introsumque premitur, vucæ pertinaciter secundum totum circuli ductum ipsi adnascitur, & colorem euariat. Vucæ namque tota superficie qua dura tunica succingitur, perpetuo nigra est, & modice humecta. In anteriori autem suæ compressionis sede varie tingitur, eumque semper exprimit colorem, qui in oculi iride seu maiori circulo, aut oculi nigro occurrit, cuius gratia oculos nigros, aut cæcios, aut glaucos dicimus. Neutiquam enim is color humorum oculi beneficio confurgit. Ceterum interna vucæ superficies variis interstinguitur colorib; in posteriori enim oculi sede, qua hæc primum pronascitur, subalba est; mox viridis, & dein cærulea iridis in modum efficitur. In anteriori autem oculi sede vniuersa impense nigræ, & non adeo læuis hic atque in posteriori sede visitur: quod illi potissimum accidit propter progressus, quos a se in hac parte educit tunicam formaturos, quæ anteriori vitrei humoris sedi obducitur, & veluti interstitiū est vitrei & aquei humoris, quæ ciliis palpebrarumque pilis adsimilatur, & orbiculatim lineæ modo crystallino humori, ubi is amplissimus est adnascitur. Porro dura oculi tunica a dura cerebri membrana visorium neruum inuestiente pronascitur.
- D** Quum primum enim hæc membrana oculi posteriori sedi applantatur, dilatescit, & crassior ac durior ipsa cerebri dura membrana euadens, orbiculatim vndique oculo obducitur, tam in anteriora, quam in posteriora pertingens. Et si vero passim sibi similis est, tamen haud simplici donatur nomine. Quæ enim posteriorem oculi sedem constituit, & in anteriori sede ad maiorem oculi circulum seu iridem usque pertingit, crassa & dura est: Vnde *σκληρὴ* Græcis nuncupatur: & dein *dura cerebri membrana modo opaca, & minime pellucida*. Ea vero sede qua oculi nigrum seu iris consistit, hæc tunica in cornu imaginē degenerat, quod in laminas diuisum, & exacte læuigatum, vitri alicuius loco lucernæ accommodatur, pellucidumque est. Atque hinc est quod hanc Græci *μεμβράνη* Latini vero *Corneam* appellauerint. Interna huius tunicæ superficies tota ea sede qua cornu modo non pellucet, vucam tunicam absque alicuius substantiæ interuentu succingit, ipsique venarum & arteriarum gratia, ut dictum est, adnascitur, quæ admodum illi etiam pertinacissime ac orbiculatim adnectitur, secundum maiorem oculi circulum seu iridem. Ceterum hoc interuallum, & vniuersum spacium quod inter anteriorem crystallini humoris sedem & pupillam habetur, humore illo adimpletur, qui aquæ modo tenuis quodammodo secantibus & suffusionibus curantibus occurrit, & insigniter aquæ instar pellucidus cernitur: vnde etiam Græcis *ιδιωμυδία*, nobis vero aqueus nominatur. Quanquam plerique hunc oui humori comparantes, albugineum nuncupant.
- E** Hic humor vucæ tunicæ partem corneæ infano oculo non contiguam sustinet, & ut dictum est, in priori ac posteriori eius partibus continetur: atque quum in oculo consistit, termino alieno clauditur; vitrei humoris modo dimidium exprimit globum, cuius posterior pars, quæ plana constat superficie, tantum habet sinum, quanta in anteriora protuberans crystallini humoris pars est. Anterior autem aquei humoris sedes gibba, dimidiatique globi instar rotunda est.
- F** Ceterum externa duræ tunicæ superficies tota sede qua pellucida cernitur, ac reuera cornea existit, admodum læuis est, & lubrica: verum reliqua sede ita aspera inæqualisque visitur, quemadmo-

Vucæ coloris.

Tunica ciliis palpebrarumque pilis simillima. Dura oculi tunica.

σκληρὴ. Cornea tunica.

μεμβράνη.

Humor aqueus.

ιδιωμυδία.

dum inuicem connatae membranae ad mutuū contactū exasperantur. Posteriori enim durae membranae sedi praeter venas, & arterias ipsi implicatas musculus inferitur, qui musculorum oculum mouentium septimus est. Lateribus autem & superiori, ac inferiori externae huius superficiei sedibus nervosae tenuitates musculorum sex primorum oculos mouentium, inferuntur. Deinde anteriori quoque durae tunicae parti ad iridem vsque tunica obnaescitur, quae eo quod oculum contineat, & vicinis partibus committat, Graecis *ἠμικρανὶς*, Latinis *adhaerens*, Barbaris *Comiunctina* vocatur. Alba quoque, a colore, quem obtinet, nuncupata. Haec anteriori tantum oculi sedi obducta tenuis est, illi continua, qua internam palpebrarum sedem inuestit, oculique partium numero adscribitur. Atque haec de oculis dixisse satis sit. Plura de iis *lib. 10. de vsu partium*, Galenus habet.

De nervis generatim. C A P. XV.

QUVM de omnibus iam propemodum instrumentis cerebri functionibus famulantibus dixerimus, reliquum est ut hoc loco de nervis, ut qui animalem spiritum ex cerebro ad vniuersa animalis membra deducunt, aliquid etiam subiiciamus. Initio autem quid nervus sit exponemus, dein quae sit illorum differentia breuiter narrabimus. Nervus igitur est instrumentum longum, teres, nullam intus cauitatem, quae sensu dignosci queat, in sui medio obtinens e caluaria, vel dorsū vertebris elapsam ac demum animalem spiritum a cerebro ad corporis partis deferēs. ¶ Hoc instrumentum *Galeno li. 1. de motu musc. teste*, Graeci a functione sua duob. nominibus nuncupantur *νῆρῶν*, & *τῆρῶν*. Siquidem *νῆρῶν* a *νῆρῶν*, *τῆρῶν* a *τῆρῶν* appellantes, quod scilicet musculi nervorum potissimum ope & nutare, & tendere valeant. Vniuscuiusque autem nervi natura triplici constat substantia, media scilicet quae intimae arborum medullae quam simillima est. Haec haud dubie a cerebro vel dorsali medulla initium ducit, coacta & coagulata indurataque substantiae cerebri omnino respondens. Exterioribus duabus una quae intimae substantiae propinquior est, a tenui cerebri membrana orta. Altera a dura, ut enim cerebrum iis induitur, ita quoque processus a cerebro propagati, ipsi nimirum nervi, illis integuntur, & ita per corporis partes prorrepunt. ¶ Ex iam dictis vero satis constat, & hoc ipsum Hippocrates, Galenus, & alii veteres dissectionis professores vno consensu affirmant, quod cerebrum, & dorsalis medulla sit nervorum principium, ac origo, & nequaquam cor, ut *Aristoteles censuit*, quod in corporis dissectione nullus nervus ab ipso pronasci videatur. Siquidem nullus omnino nervulus cordi committitur, praeter vnum impenite gracilem, quem sinister sexti paris nervorum cerebri nervus distribuit, ut suo loco latius dicemus. ¶ Adhuc fibrae in cordis ventriculis conspicuae excarnesque, qui duntaxat membranarum processus sunt, in nervorum numero minime veniunt reponenda. Quemadmodum autem cerebri, & ex ipso pronascentis dorsalis medullae substantia, omni ex parte non eandem servat duritiem, neque formam: ita quoque nervi ab iis originem sumentes, inuicem substantia non correspondent, sed duritiae, ac mollitiae plurimum variant: id quod mirabili industria summi rerum Opificis est factum. Sensus namque organa nervo indigent molli. Nervus quidem, quia sensus est instrumentum, quodque ad suum munus obeundum multo animali spiritu indigeat. Molli autem, quoniam affici, & disponi quodammodo oporteat, & pati aliquid ab extrinsecus occurrente sensibili. Est enim ad patiendum quidem aptius molle, ad agendum vero, & ad robur durum, ut *copiosius, li. 8. de vsu par. cap. 5. Galenus monstrat*. ¶ Propterea igitur sensus organa mollibus, ceterae partes quas moveri necessum est, durioribus nervis donantur. Vnde etiam sensus instrumenta, quae motu aguntur voluntario, ut oculus & lingua, duplex nervorum genus sibi vendicant, vnum quidem sensui, alterum vero motui praefectum. Merito itaque nervorum ex cerebro, & dorsali medulla, processus non eandem exortus sedem nanciscuntur, neque iidem ductus meatusque mollibus, ac duris nervis exsculpuntur. Illi enim ex mollibus & anterioribus cerebri basis sedibus, hi vero ex posterioribus ipsaque dorsali medulla principium ducunt. Rursus illi quidem recta, hi autem tortuose longoque itinere prorrepunt. ¶ Ceterum naturae triplex fuit in nervis distribuendis scopus. *Vnus* gratia sensus in sensoriis. Alter occasione motus ad partes, quas moveri operae precium fuit. ¶ *Tertius* autem in ceteris partibus vniuersis ad instantium dignotionem. At quoniam ex necessitate tactus sensus

Adhaerens
albave oculi tunica.

Nervus
quid.
Nomina.

νῆρῶν.
τῆρῶν.

Ortus nervorum.

Nervorum
differētia.
A mollitie,
& duritia.

Naturae in
nervis dige
rendis scopus
triplex.

A
sus omni adest nervo, propterea musculos, & sensus organa virtus amplior, quam e-
gebant ad tactilium dignotionem, subsecuta est. ¶ Reliquis autem partibus tactus
sensu tantum indigentibus ex proportionem nervi offeruntur. Visceribus enim, ver-
bi gratia, pulmōni, iecori, lieni, quia in alto latitant, graciles tantum nervorum sur-
culi offeruntur. In cutem vero quod prima extrinsecus occurrantibus obuiam eat,
complures soboles passim digeruntur. ¶ Porro differunt nervi etiam originis forma.
Alioqui n. & præcipue molliores continuo, neq; quasi in plures surculos deductio cor-
pore, exoriuntur, proceduntq; Alii tanquam plures funiculi inuicem connexi ex ce-
rebro prodeunt. Alii etiam in ipso ortu surculos hos veluti funiculos inuicem distan-
tes, ac singulos propria tenuis membranz portione circumdatos habent. ¶ A serie etiā
B sumitur differentia, q; alii integri in aliquam partem absumantur. Alii in plures directi
surculos, quosdam musculis offerunt, quosdam cuti, quosdam ossib. quosdam tensus
organo. Quas singulas differentias in priuatis nervorum descriptionibus abunde
persequemur. ¶ Iam reliquum erit, vt singulorum nervorum seriem explicemus,
orsa a paribus quæ a cerebro oriuntur, deinceps ea quæ spinalis medulla educit
recensebimus. Quippe nullus nervus neque a cerebro, neq; a dorsali medulla in-
conjugatus prodit, sed perpetuo alter ad dextram, alter ad sinistram eadem prorsus
distributionis serie, situm obtinet.

Quod nervorum a cerebro ortorum sint paria. C A P. XVI.

C
NERVI omnes a cerebro pronati, quia geniculatim in caluariz amplitudine, qua
cerebrum continetur, originem ducunt, Græcis *ὀφθαλμοὶ*, Latinis *paria*, seu *coniugia*
nervorum appellantur. Sunt autem Marini, Galeni, & aliorum dissectionis profes-
sorū testimonio, septem paria. Nam paulo posterius, quam olfactus organa,
vtrinque a cerebri basi vnus exoritur nervus omnium corporis nervorum facile mol-
lissimus, & circumferentia ceteris, qui ex pluribus inuicem coeuntibus non constan-
tur nervis crassiori. Vterque nervus sub cerebri basi qua sinui innititur, cui glandula
insidet cerebri pituitam excipiens, antrorsum nonnihil oblique fertur, dextro qui-
dem nervo sinistrorsum, sinistro autem dextrorsum protenso. In progressu mox-
que ab ipso ortuambo inuicem coeunt, atque in eum permiscetur modum, vt de-
D xtram a sinistro nulla prorsus ratione queas discernere. Hi nervi a congressu e
caluaria ducendi inuicem mox dirimuntur, & per foramina ipsorum nomine in scul-
pta, in oculorum sedes extra caluariz cavitatem procidunt. ¶ In oculos vbi subierunt,
in latam degenerant expandunturve tunicam vitreo humori proximam, & mediam
oculi duntaxat sedem ambientem, ac dilatatz cerebri substantiaz admodum similē, &
mollē nihilq; minus quam mēbraneam. ¶ Hinc anatomicorum nonnulli hanc tunicam
quæ a retis forma, *Retiformis* dicta est, tunicā appellare haud quaquā, vt c. 14. diximus, di-
gnati sunt. ¶ Inter reliquos autem corporis nervos, ii soli meatu qui sensu diiudicari
possit, perforati dicuntur. ¶ Quapropter Græcis, Herophilo præferim, & Eudemo;
τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς Latinis *meatus*, aliis *nervi visorii*, nominati sunt, vt in libello de *diff. nervorum* Gale-
E nus *fusius docet*. ¶ Coniugii secundi nervi paulo posterius, quā visorii ex cerebri basis la-
terib. principium ducunt, quod hæc cerebri regio nonnihil durior illa sit, a qua viso-
riorum origo sumitur. Vt autem crassitie plurimum visoriis cedunt, ita duritia eos su-
perant; Atq; id merito accidit, siquidem musculis oculorum inferendos, duriores i-
plis visoriis esse oportuit. Prorepunt vtrinq; sub cerebri basis latere ad foramen in o-
culorum sedis radice sibi cum aliis aliquot vasis cōmune. Quamprimum autē e calua-
riz excidunt amplitudine, in ramos vterq; dissectus septem musculis oculo propriis
ramulos offert, illorum motibus præfectus. ¶ *Tertium* par duplici radice vtrinq; princi-
pium sumit. Vna quidem crassiori, cui opportune tertii paris nomen accōmodaueris,
altera autem tenuiori, & duriori, & neq; in ipso exortu, neq; etiam in pgressu crassio-
ri radici commissa. ¶ Huius enim initium non modico in posteriora intervallo,
ab illius exortu distat, adeo sane, vt verius graciliorem hanc radicem peculiare par,
quam tertii paris portionem quis esse assereret. ¶ At quum omnes dissectionis
proceres hanc tertio pari adscripserint, neque nos ordinem illum manifestioris
doctrinæ gratia turbabimus. ¶ Exoritur itaque gracilior hæc tertii paris radix a la-

A forma;

A serie.

Primum
nervorum
par.

Nervi vi-
sorii.
Secundum
par.

Tertium
par.

Tenuioris
radicis or-
tus, & se-
ries.

tere baſis cerebri, vbi dorſalis medulla ab ipſa initium ducere auſpicatur. Hinc recto ^A tramite ſub cerebri baſi antrorſum progrédiens, duram cerebri membranam perforat, & ſecundo neruorum pari attenſa cum ipſo per commune foramen in oculi ſedem procidit, ilico in quatuor diſſecta propagines. ¶ *Quarum prima* ſurſum in adipe oculorum muſculis obduſto excurrans, per peculiare foramen ad frontis cutem, & muſculoſam huius ſedis ſubſtantiam digeritur, frontis cutis, & palpebris ſuperioris motibus præſecta. ¶ *Secunda* propago deorſum ducta, mox in foramen ſibi priuatim exſculptum fertur, quouſque in anteriorem ſuperioris maxillæ ſedem prolatur, ac multiplici ſerie diſpenſetur in muſculos ſuperius labrum, & naſi alam extrorſum in ſuo latere mouentes, ac demum in ipſum labrum, & inciſorum dentiũ gingiuas. ¶ *Tertia* foramine etiam priuato vtens, poſt carunculam in interiori angulo ^B oculi conſpicuam, narium adit amplitudinem, inibi in narium degenerans tunicam, & ramulum exporrigens tenui, & membraneo muſculo introrſum naſi alam contrahenti. ¶ *Quarta* ppago iam dictis craſſitie non inferior, per foramen ſeu ſciſſuram potius, quæ inter primum maxillæ ſuperioris os, & cuneiforme in extimo latere ſedis oculi conſpicitur, ad internam ſedem temporalis muſculi contendit, tota in eũ muſculum abſumenda. ¶ Craſſior terti paris radix a latere baſis cerebri, antè tamẽ principium ſumens, recta deorſum tendit, foramen, q̃ ipſi & quarto neruorum pari, huic radici proximo, cœlatur, plabens. Hæc ſtatim ab egreſſu ppaginem diſſundit, quæ viris, aut cucurbitæ capreoli inſtar inuoluitur, duriorque paulatim efficitur, ac binos tandem quinti paris neruorum cerebri ramulos in conſortium admittens, ipſiſq; vni- ^C tus in temporalem muſculum inferitur, ac in illum qui a iugali oſſe enatus priuatim manſorius dicitur, ramulos porrigit, deinde & muſculis buccas mouentibus, ipſique demum faciei cuti in buccis etiam ſurculos offert. ¶ Poſtquã vero craſſior hæc radix ppaginem hanc capreoli modo intortã expromſit, nõnihil deorſum magis deſcẽdes, ſurculũ deriuat, qui antrorſũ duct⁹ gingiæ molarĩũ dentiũ, ipſiſque adeo denti- bus ſeriatim ſoboles diſtribuit. ¶ Dein priuſquam decliuſ ducta maior hæc radix linguam contingat, ramum poſteriori ex parte germinat vtrunq; inſignem, qui muſculo in ore deliteſcenti, & maxillam inferiorem attollenti inferitur, inferioris maxillæ foramen adit. ¶ In foramen delapſus tantisper antrorſum fertur, quouſq; ſui lateris dentiũ inferioris maxillæ radicib; ſingulas ſoboles offerat, quarum beneficio dentes inter ce- ^D tera hominis, oſſa euidentius moleſtantium occurſum ſentiunt. ¶ Neque vere ramus hic vniuerſus in dentes abſumitur, imo non minima ipſius portio per foramen in anteriori maxillæ ſede inſculptum excidit, dextri ſedi inferioris labri complures ſurculos deriuans. At maior portio craſſioris radicis, quando linguæ baſi committitur, cum alterius lateris neruo linguæ tunicam efformat, aptum ſaporibus dignoſcendis inſtrumentum. ¶ Deinde & exiguos quoq; ſurculos penitus in linguæ ſubſtantiam diſpenſat. Vt itaque primum per viſus, ita hoc tertium guſtus cenſetur inſtrumentum, guſtatoriuſq; neruus merito appellatur. ¶ *Quartum* par tertio pari nonnihil gracilius duriuſq; eſt. Exoritur enim a dorſali medullæ principio poſterior paulo quam tertium par, ſed antrorſum modice tenſum poſteriori terti paris ſe- ^E di committitur, atque vna cum illo per commune ipſis foramen ex capitis amplitudine, ſeu cerebri ſede, ad palatum elabitur: quo ſimulatque peruenit, in ſurculos quosdam partitum, in palati tunicam degenerat. Quæ quum linguæ tunica aliquanto ſit durior, iure etiam quartum par poſterior tertio pari originem ducit, ac proinde etiã palati tunica hebetiori ſenſu quam linguæ tunica donatur. ¶ *Quintum* par nonnihil quarto craſſius, ac veluti plurib; enatum ſurculis inuicem mox ab ortu connexis principium ducit, ex media propemodum dorſalis medullæ ſede. Hoc par vniuerſum per foramen fertur impenſe tortuoſum, & priuatim ipſi inciſum, quouſque in cavitatem pertingat, auditus organo præparatam: vbi varie diſcinditur, & propagines quaſdam membranæ modo dilatatas huius cavitatis ſedibus offert, auditus organi non in- ^F ſimam partem conſtituens. ¶ Præter has vero propagines duos educit neruulos, qui ſeorſum per proprium foramen elabuntur. *Vnus* quidem per tranſuerſum ducitur foramen, quod etiam admittit venulam in auditus organum excurrentem. Hic neruul⁹ non procul ab egreſſu terti paris ramo commiſcetur, inſtar vitis capreoli inuoluto.

Craſſioris origo.

Guſtato-
rius neruus
Quartum
par.Quintum
par.Auditus
inſtrumen-
tum.

- A** Alter vero per foramen repit impense arctum, & insigniter quoque tortuosum, & immissam illi setam non admittens, ob idque etiam *cacum* appellatum. Nerviulus iste transuersim supra musculum ducitur, qui a iugali osse pronatus inferiorem maxillam mouet. Vbi vero ad anterius vsque eius musculi latus antrorsum prorepit, dicto tertii paris ramo commiscetur, in genarum cutem, & musculos buccæ motuum auctores digerendus. Atq; illi demum duo sunt ramuli, quos tertii paris ramo capreoli ritu inflexo commiscere superius diximus. ¶ Porro, quemadmodum iuxta tertii paris præcipuam radicē, alia quædā radix enascitur tertio pari adscripta, simili etiā ratione iuxta quintum neruorum par interius paululum alia exoritur radix, quinti paris radici multo gracilior, sed quodā modo durior. ¶ Hæc sursum versus priora sub cerebri basi aliquandiu ptenſa, duram cerebri mēbranam perforat, ac per proprium foramen sub secundi paris foramine exculptū, e caluaria procidens in temporalem musculum, illūque digeritur qui in ore delitescens, inferioris maxillæ ad superiora motus auctor cēsetur. ¶ Hanc radicē cum sua coniuge liceret peculiaris cōiugii loco recensere. Verū ne aliorum anatomicorum numerum perturbemus, hos nervulos quinto pari adscribemus, haud secus minorem tenuioremq; tertii paris radicem tertio pari adnumerauimus. ¶ In temporalem itaq; musculum quinq; neruorum pertingunt ppagines, prima quidem a graciliori tertii paris radice, secunda a maiori radice, tertia autem, & quarta a quinti paris primario educuntur neruo. ¶ Quinta vero is demum nervus est, quem iam quinto pari connumerauimus. Neque sane frustra tot neruorum soboles temporali musculo natura exporrexerit. Sciebat enim hunc musculum pro sua mole omnium corporis musculorum validissimam functionem obiturum. Item qui haud ignoraret, quam molles illi essent nerui quos a cerebro eduxit, summa providentia illos quoad huc ex ossium cōtactu, itinerisq; longitudine voluit indurescere. ¶ Ceterum reliquorum parium, quæ in caluariæ amplitudine principium ducunt, nullum æque sparsam ramorum edit sobolem, neq; in tam multas easdemque varias inferitur partes, atque sextum, quod paulo inferius quinto pari aliquot distinctis, & a se inuicem diremtis furculis initium sumit, qui mutuo mox ab initio commissi, vnum efformant neruum, qui per foramen caluariam egrēditur, quod arteriæ soporalis minorem ramum, & grandiolem internæ iugularis venæ ramum simul admittit. ¶ Nervus hic non procul ab egressu in musculos posteriorem cervicis sedem occupantes ramum diffundit numerosa vtcunque serie soboles digestum, quarum præcipue musculo exporrigunt scapulam mouentium secundo. Ipse autem sexti paris truncus soporariæ arteriæ & septimo pari coheret, & simul cum ipsis membranæ interuentu connexus, ad laryngis vsque latera protenditur, inibi portionem a septimo pari assumens, illaque se augens. Dein quum hanc asciiuit portionem laryngis musculis ramulos transuersim exhibet. ¶ Sunt autem illi musculi duo scutiformi laryngis cartilagini duntaxat proprii, qui ex stomacho gulæve posteriori sede pronati, eius cartilaginis lateribus inseruntur. Deinde duo tertiæ cartilaginis basim occupantes, & duo ex illis qui primam cartilaginem secundæ committunt. ¶ Hinc vero sextum hoc par soporali arteria, & interna iugulari eoncomitatum, ad thoracis vsque elatiorem descendit sedem, ac mox insignem vtcunque propaginem ad primæ thoracis vertebræ latus seu potius ad anteriorem primæ thoracis costæ radicis sedem deriuat, quæ sub mēbrana costas succingēte, secundum costarum radices, prepens, a nervis in costarum interualla a dorsali medulla exporrectis furculos quosdam assumit. ¶ Quum vero hæc ppago eiusmodi adaucta furculis, septū transuersum prætergressa est, in cibi potusq; organa vt postea fusi⁹ dicem⁹, dispensatur. Præter hanc ppaginem sexti paris neru⁹ iuxta superiorē thoracis sedē ramulos musculo offert, a pectoris osse, & clauicula ad mammillarem capitis processum deducto, & a capitis motibus subseruienti. Dein & musculo qui os referens hinc a pectore accedit. ¶ Præterea & illi qui hinc ad
- F** infirmam primæ cartilaginis laryngis sedem perfertur. Huiusmodi sane vtrorumque sexti paris neruorum priusquam thoracis cavitatem subeant series est. ¶ Quum autem dexter sexti paris nervus thoracis cavitatem ingressus est, atque inter arterias & venas in iugulo repit, ab interiori ipsius latere modo tres, modo duos inuicem mox succedentes diffundit ramulos reuersuum dextri lateris neruum

Cacum foramen.

Sextum par.

Dexter nervus recurrens.

constituentes. Ramuli enim isti ad arteriam quæ in dextram alam exporrigitur, veluti ad trochleæ rotulam reuoluti, simul cœunt, nervumque vnum efformant, ad dextrum asperæ arteriæ latus sursum excurrentem. ¶ Quum primum n. ex illis ramulis, quorum loco interdum simplex visitur, vn^o cōflatur neru⁹, qui asperæ arteriæ lat⁹ petit & mēbranæ interuentu ipsi adnex⁹ ad dextrum vsq; laryngis latus properat, glandulæ incumbens, quæ aliis glandulis neque colore, neq; substantia respondens, laryngis radici vtrinq; adnascitur. ¶ Illico autem atque nervus laryngem contingit, in plures partitur soboles, in sui lateris musculos, quos paulo post explicabimus digerendas. ¶ Sinister iam in thoracis cauitatem ingressus, arteriæ in sinistram propagatæ ramulos qui sursum reflecterentur de se exporrigere nequit, quod ea oblique sursum, non autem arteriæ dextræ modo, transuersum in alam contendat. Haudquaquam enim æque tuta ad obliquum atque transuersum chordæ alicuius reflexus perficitur, imo hæc si ad obliquum baculum reuoluitur, sensim sursum conscendit, eandem reflexus sedem nunquam seruans: ac proinde sinister nervus tantisper versus cordis basim descendit, quousq; extra cordis inuolucrum arteriæ magnæ contingat truncum, qui deorsum ad spinam explicatur. ¶ Atq; hic mox tres, aut etiam pauciores a neruo educuntur furculi, qui ad arteriæ truncum, qua is ad spinam deflectitur reuoluti, inuicem vniuntur, sinistramque neruum recurrentem constituunt. ¶ Qui sursum properans, membranæ beneficio asperæ arteriæ sinistro lateri attenditur: ac quum primum laryngem contingit, non minus quam dexter nervus in ramos deriuatur, qui omnes in sui lateris musculos deorsum capita fines autem sursum habentes, cessant. ¶ Sunt autē hi, si vtriusq; lateris musculos iunxeris, quatuor secundæ cartilagini tertiam nectentes quorum benefi. io tertia cartilago retrorsum atq; in latera ducitur, & laryngis ligula adaperitur. ¶ Præterea duo tertiam cartilaginem primæ iungentes, qui laryngis rimulam claudunt. His præter alios nonnullos accedunt linguæ muscoli, ab ossis referētis medio vt linguam moueant pronati. Quum n. præsentēs muscoli inferius sua sortiuntur capita nulla ex hac sexta coniugatione descendente propago ad ipsos distribui potuit, sed fuit necessarium vt a partibus infernis nerui ipsi ab eodemque pari immitterentur, quemadmodum copiosius li. 7. de vsu par. c. 14. & lib. 16. cap. 4. Galenus qui hos neruorum inflexus omnium primus reperit præsequitur. ¶ Postquam iam sexti paris nerui, reuersiuos expromere, ac iam cordis basim spectant, ramulos duos notatu dignæ crassitudinis in pulmonum tunicam, & membraneum cordis inuolucrum dispergunt. Item a ramulis sinistram cordis inuolueri sedem implicantibus, atque a sinistro sexti paris neruo depromtis, furculus quidam cordis inuolucrum ibi permeat, vbi id sinistro lateri arteriali venæ vnitur. ¶ Atq; hic furculus oppido quam tenuis, & non nisi accuratissime sectionem administranti obui⁹, ipsi arteriali venæ adnascitur, & ad sinistram ipsius latus versus posteriora tamen magis exporrectus, in cordis basim fertur, inibi mox in soboles capillorum modo gracillimas consumtus, ac cordis basis superficiē vix proprius. ¶ Ceterum quod ex neruis sexti paris reliquum est deorsum ad stomachum defertur: ac dexter quidem dextro ipsius attenditur lateri, sinister autem sinistro. ¶ Mox vero atq; hi nerui stomacho mēbranæ interuentu laxè adnectuntur, singuli in binos partiuntur ramos, adeo obliq; secundum stomachum cōuolutos, vt dextri nerui rami sinistra ipsius sedem in progressu obtineant, sinistri autem rami dextram sedem amplexentur. ¶ Atq; ita quatuor præsentēs rami septum transuersum vna cum stomacho permeant, nullos prorsus in transgressu septo furculos offerentes. ¶ Verum sparsa admodum serie superius ventriculi os ambiunt, contextuntq; ramos in priora, & posteriora corporis ventriculi spargentes. Ab iis ramis qui dextrum huius orificii latus implicat, propago vtcunque insignis depromitur, quæ per ventriculi superiora secundum ipsi⁹ latitudinem inferius ventriculi orificium accedit, in progressu anteriori posteriorique ventriculi sedibus soboles quasdam diffundens. ¶ Quum vero illa propago inferius orificium superauit, venæ portæ instrata in iecoris cauum properat, ibidem in iecoris membranam absumenda. Dextri nerui sexti paris ramus, quem ante recurrentium neruorum principia costarum radicibus sub tunica costas succingente exporrigi, aliorumque neruorum per costarum interualla excurrentium congressu augeri diximus, simulatque septum transuersum vna cum grandi arteria prætergressus

Sinister re-
current.

Reuersiui
nerui cur-
facti.

Gal. libr. 4.
de labo. lo.
cap. 7.

A fus est, propagines diffundere incipit, ac primam quidem inferiori membranz omenti offert transuersim iecoris cauum aduentem. Propago hæc in ipso ductu inferiori omenti membranz ramum exhibet, qui deorsum tensus, atque in surculos dissectus, cum ipse membranz omenti in dextra parte implicatur, tū etiam colo intestino, vbi id huic membranz tanquam ad mesenterium committitur. Deinde alius ramus ab illa propagine duodeno intestino, & ieiuni initio deducitur adeo gracilis, vt interdum conspici nequeat. Post hunc longe crassior superiori membranz omenti depromitur, qui dextram sedem fundi vetriculi perreptans, multas soboles ventriculo, & ipsi omento communikat. Quod autem primæ illius propaginis adhuc superest, iecoris cauo, & bilis vesiculæ surculos præbet. *Secundam* vero propaginem sexti paris ramus dextri lateris costarum radicibus attensus, in dextrum renem, & pinguem membranam ipsi obductam digerit. *Terriam* iam dictis grandiore diffundit ad dextram mesenterii sedem, & in intestina mesenterio hic connata spargendam. Quod autem eius rami reliquum est, subinde in vesicam, & mulieribus in vteri fundum dextra ex parte cessat. Vesica enim & vterus quoque suos neruos a dorsali medulla in sacro osse deducta mutantur. Ad eundem fere modum sinistri sexti paris nerui ramus costarum exporrectus radicibus digeritur. Propaginem enim inferiori membranz omenti largitur transuersim in lienis cauum porrectam, quæ in progressu, anteaquam lienem cōtingit, duos diffundit surculos in humiliorem omenti membranam, & colum intestinum, quæ ventriculo hic attenditur, dispersos. Deinde aliam sobolem emittit illis surculis crassiorem, quæ sinistram fundi ventriculi sedem perreptans, ventriculo ipsique superiori membranz omenti per multa germina deriuat. Mox quoque a propaginibus lienis cauo se inferentibus, exiles ramuli sinistram ventriculi latus accedunt, illis concomitari venis & arteriis, quas a lienem petentibus vas huc reflecti diximus. *Secundam* propaginem ramus ille sinistris exporrectus costis, mesenterio & sui lateris intestinis offert, & post hanc tertiam sinistro reni exhibet, ac demum ipsius reliquo sinistram vesicæ, ac fundi vteri sedem interdum amplectitur. Neruorum cerebri septimum, & vltimum par, vt ceteris paribus durius est, sic quoque ex duriori nascitur principio. Incipit enim aliquot inuicem distantibus surculis, a dorsali medulla, vbi modo caluariam est egressura. Hinc in anteriora modice tensum, & ipsius surculis in vnum coeuntibus, per foramen procidit, sibi priuatim ex-

D sculptrum. Simulatque vero septimum id par caluariam superauit, sexto cohæret pari, & propagines aliquot dispensat musculis, qui a processibus stylum imitantib. principium ducunt. Hinc ad linguæ vsque radicem descendens, in plures deducitur soboles, quæ linguæ musculos, & ossis^v referentis, & omnes laryngis musculos superius non connumeratos, implicantur, eorumque musculorum motibus præsent. Verum præter illas soboles, vltimum par non minimam ipsius portionem sexti pari neruorum cerebri ad linguæ radicem inibi offert, sextum par illa portione adaugens.

De dorsali medulla, & neruorum ab ipso prodeuntium numero. CAP. XVII.

Dorsalis medulla neruorum modo substantiæ cerebri, a qua & nequaquam a cerebro, quod dorsali medullæ potius innititur, originem sumit, respondens, quanto magis a cerebro recedit, protenditurque, tanto etiam neruorum ritu, compactior duriorque efficitur. Variat plurimum ab aliorum ossium medulla impense humida, propemodumque fluxili. Hæc enim, & præcipue ipsius substantia mollior pinguiorque pinguedini assimilatur, in ossium sinibus nutriendi humectandique gratia, asseruata. Quinetiam hæc medulla nec cerebri, aut dorsalis medullæ membranis tegitur, neque vlla illi cum sensus instrumentis, aut musculis communio existit. Quare nulla ratione dorsali medullæ similis est, quæ non paruam, cum musculis communio-

E nem sibi vendicat. Quippe si rerum Opifex hanc non produxisset, duorum alterum subsecutum fuisset: aut enim omnes partes corporis capite inferiores, ac a nerui sexti paris neruorum cerebri propagines nullas admittentes, motu destituerentur arbitrio, tristantiumque sensu priuarentur: aut neruum in singulas partes a cerebro deriuari necessum fuisset. Verum si motu caruissent, tunc homo non amplius animal, sed lapideæ, luteæue respondisset statuz. A cerebro autem in singulas partes exiguum & grandem neruum porrigere, artificis esset neruorum securitatem nihili penden-

Dorsalis medullæ ab ossium medulla differentia.

Dorsalis medullæ procreanda necessitas. Lib. 12. de vñ par. cap. 11.

tis. Nam non solum gracilem neruum, vt qui rumpi confringique possit, longo pro-
 gressu deduci non erat tutum, verum ne aliud quoddam validorum etiam organo-
 rum, & minus adhuc venam & arteriam. Hæ enim, vt dorsalis medulla, a propria
 origine grandes amplæque enascentes instar caudicis, in progressu varie discindun-
 tur, & quum corporis partibus appropinquant, surculos singulis partibus offerunt,
 qui materiam ipsis a principio oblatam communicent. Vnde etiam satius fuit dor-
 sale medullam velut fluuium aliquem ex fonte, nimirum cerebro, effluentem, per
 eam sedem, qua transit geniculatim neruos tanquam sensus & motus arbitrarii ve-
 ctiores, germinare, vti modo rerum Opifex probe est molitus. Ceterum quando
 dorsalis medulla instar alterius cerebri omnibus propemodum partibus sub capite
 positis censetur, hanc quoque oportebat similiter ac cerebrum duro & ferendis in-
 iuriis pertinaci munimento, ac velut propugnaculo, cingi. Cuiusmodi vero id sit
 in libro primo, vbi vertebrarum structuram profecuti sumus, abunde dictum est. Præ-
 terea duræ etiam membranæ dorsalem medullam amplexantur, iis omnino specie
 respondentes, quibus cerebrum obuoluitur, etiam si distantia inuicem non congru-
 ant. Crassam enim seu duram cerebri membranam a tenui in caluaria distare, gra-
 tia distentionis contractionisque vasorum tenuis membranæ, & ipsius adeo cerebri
 diximus. In vertebrarum autem sinibus, vbi membranæ dorsalem medullam ambi-
 unt, dura tenuem contingit. Atque hoc vno inuicem membranæ pugnant, ac eo
 propterea, quod tertium quoddam inuolucrum egregie validum neruicūque dua-
 bus illis, quæ dorsali obducuntur membranis extrinsecus circumdatur. Merito au-
 tem duræ membranæ, dura nimirum & tenuis, ei circumuoluuntur, vna quidem præ-
 cipue vt colliget simul vasa, quæ in eam excurrunt, & totam substantiam eius vtrū-
 que mollem constringat: alia, vt inuolucrum efficiatur, & a circumdatis ossibus mu-
 niat, ipsaque etiam ossa & cerebrum & dorsalem medullam ambient, velut propugna-
 culum quoddam & murus, sufficiens citra noxam excipere impetum eorum, quæ aut
 secare, aut frangere, aut aliter nocere possunt. Porro quoniam cerebrum tenuisque
 membranæ vasa pulsant, crassam membranam tanto interuallo, a tenui membrana in
 caluaria priuatim distat, quantum ipsis dum dilantur, suscipiendis sat sit. Quoniam
 vero dorsalis medulla non pulsatur neque distenditur, vtræque membranæ simul coeunt
 coalescuntque, ne minimum quidem mutuo distat. Quum vero nullus, qui sensu di-
 gnosci possit motus capitis ossibus adsit, in vertebra vero motus sit varius, dorsali me-
 dullæ tertium id inuolucrum obiectum visitur. Nam nobis dorsum flectentibus, ob
 idque etiam dorsali medulla necessario flexa tensaque, hæc promte nullo eiusmodi in-
 uolucro succincta frangeretur. At dorsalem medullam vnicam, vt & cerebri sedes,
 a qua principium ducit vnica simplexque est, iuste a natura factam esse, neminem late-
 reatbitror: quum homini duo dorsa procreati fuisset plane ridiculum atque ad plu-
 rimas actiones ineptum, quodque dorsalis medulla validior per vertebra simplex,
 quam gemina prorepat. Per totam itaque cervicem, & ad thoracis vsque medium,
 aliquando & inferius nonnihil simplex ac indiuisa mollisque adhuc deorsum fertur,
 neruos duntaxat geniculatim a se diffundens. Quum vero thoracis medium perre-
 pisset, vt duris ac motui potissimum seruiantibus propagandis neruis idonea redde-
 retur, non simplex amplius, sed in innumeras soboles secta descendit, non aliter pro-
 fecto, quam si frequentes multasque tenuissimas chordulas simul recta tensas mem-
 branæ cuiuspiam illigares, ac deinde singula foramina, per quæ nerui prosiliunt, vnā
 atque alteram chordulam ex mutuo illo connexu tantisper distribuere, quousque
 vnica tantum superesset chordula, dorsalis medullæ fini respondens: Ad eum nam-
 que modum dorsalis medulla in neruos absumitur, qui per foramina in vertebra ex-
 sculpta elabuntur. Porro nerui, quos dorsalis medulla per vertebra ducta, ac paula-
 tim in progressu gracilescens distribuit, dissectionis professoribus sexaginta, & inter-
 dum quinquaginta octo enumerantur, modo triginta, modo viginti nouem com-
 plexi partibus. A dorsalis enim medullæ sede septem cervicis contenta vertebra, se-
 ptena exsiliunt paria. A medullæ autem sede per thoracis vtræque vertebra, duodena
 dependent paria. A quibusuis autem lumborum vertebra, quina. Ab osse sacro, sena.
 Quamuis interim quinque inferiora sacri ossis neruorum paria, si quando id sex ef-
 formeretur

Dorsalis
quimuni-
ta.

Ossibus
spinae.
Membra-
nis.

Membra-
narum v-
tra.

Dorsalis
vnica cur.

Quæ ner-
uorum pa-
ria a dor-
sali discin-
dantur.

Aefformetur ossibus, quodammodo gemina dici possint, quum nervi utriusque antrosum & retrorsum ducantur ab una radice vix enati. Dorsalis vero medullæ terminus ex osse sacro procidens, nervus non censetur, neque in ramulos qui nervorum nomen merentur cessat,

Septem nervorum parium e cervicis vertebra profluentium series.

C A P. XVIII.

NATURA primo cervicis pari, & secundo, & ceterorum cervicis, aut thoracis nervorum ritu, sed peculiari quodam, duarum primarum vertebrarum articulationibus impedita; viam insculpsit, ac duos utriusque paris, quemadmodum & in sacro osse, utrinque machinata est exortus, unum quidem anteriori corporis sedi, alterum vero posteriori exporrigens. ¶ Quippe ut posteriori primi paris propagini concinne via præpararetur, natura in primæ vertebræ eminentiori sede ad radicem posterioremque regionem ipsius cum capite articulationis sinum cœlauit, atque hic etiam occipitis ossi sinum insculpens foramen effecit primæ cervicis vertebræ, ipsique occipitis ossi commune. Ne si fortasse integrum foramen illi tenui vertebræ insculpsisset, ipsa quum alioquin magno indigeat robore, multis perforationibus inualida redderetur. ¶ Quinetiam quo foramen id arctius esse possit, natura posteriorem primi paris exortum gracilem effecit, eumque in quarti & quinti musculorum caput mouentium parium musculos distribuit, ac dextra quidem propago in dextri lateris deperditur musculos, sinistra autem in sinistri. ¶ Ceterum ab hoc posteriori primi paris exortu seu propagine surculus etiam deducitur in principium musculi a transverso primæ cervicis vertebræ processu, & aliquot subsequentium vertebrarum principium sumentis, ac scapulam sursum attrahentis. Altera primi paris propago non semper conspicua, nimis quam gracilis est, atque ab anteriori dorsalis medullæ regione enata, excidit inter primam cervicis vertebram & occipitis os, iuxta latus teretis ligamenti secundæ vertebræ processum, qui denti assimilatur, occipitio colligantis. Hæc propago uti gracillima est, ita etiam mox in musculos absumitur, qui anteriori vertebrarum sedi obnati, dorsum mouentium primum par recensentur. ¶ *Secundum nervorum par*, quando profus ex lateribus subsequentium parium modo pronasce nequirit, utpote ab articulatione duarum superiorum vertebrarum offendendum, aut quod si foramen inibi vertebra esset insinuatam, articulationis robur omnino infirmaretur. Natura vertebrarum noxam fugiens, secundum par ut frequentius, binis exortibus seu propaginibus exoriri operæ precium putavit. Ac posteriorem propaginem, quæ anteriori longe est crassior, per latera posterioris secundæ vertebræ processus, qui spina vocatur, eduxit, ibidem opportunissimum tutissimumque iter machinata. Præsens propago quum utrisque primi paris propaginibus crassior sit, in plures quoque dividitur ramos. Simulatque enim prodiit, in duos crassitie impares discinditur, ac crassior a prioribus quodammodo ad posteriora sursum transuersum tendit, ex spinæ nimirum secundæ vertebræ lateribus, versus spinæ medium, ubi mutuus est utriusque lateris musculorum posteriorem cervicis regionem occupantium congressus. Ramus iste tertii paris sobole huc exporrecta coactus, ac ex dictorum iam musculorum medio in exteriora prolapsus, contrario penitus ductu ex posterioribus sursum in priora ad caput cōtendit, atque inibi in uniuersam capitis cutē tā quæ circa aures, quā quæ post aures ad verticis usque summum habetur, fureulos spargit. Ceterum posterioris secundæ paris propaginis minor ramus in proximiorum musculorum principia diuicatur: Sunt autem illi tertii & sexti paris musculi, qui capitis motibus præsent. Anterior secundæ paris propago admodum gracilis, ab anteriori dorsalis medullæ sede originē mutuatur, atque inter secundam & primam elabitur vertebram ad latus radicis, eius secundæ vertebræ processus, quem dentem nominamus. ¶ Digeritur autem hæc propago mox in musculos anteriori cervicis vertebrarum sedi adnatos, qui primum par musculorum dorsi motus auctorum constituunt. ¶ *Tertium nervorum par* ex communi foramine secundæ cervicis vertebræ & tertie procidit, mox ab egressu in duos discissum ramos. Posterior retrorsum flectitur, ac inter musculos cervicē erigentes, qui dorsum mouentium septimus & octauus sunt, ac deinde inter caput mouentium secundum par ocellatus, ad secundæ vertebræ spinam contendit, atque

Primi paris series. Gallibr. 13. de usu par. cap. 4.

Galenus loc. citatus cap. 5.

Secundi paris series.

Tertii paris series.

hinc ex mutuo musculorum posteriorem cervicis sedem occupantium concursu in posteriora excidens ad cervicis properat latera, musculo suffultus, qui ex carnea constitutus membrana buccarum motus opifex est. ¶ *Anterior autem tertii paris ramus*, in quatuor spargitur propagines, ac prima musculos dorsum mouentium primum ac secundum implicat. ¶ *Secunda propago declivis* ducta quartum adit par nervorum, cui-dam ipsius furculo commiscenda, in dictos iam musculos absumto. ¶ *Tertia autem sursum* contendit, ac posterioris secundi paris propaginis rami in verticis cutem excurrenti congreditur, vna cum illo dispergenda. ¶ *Quarta autem tertii paris anterioris ramus* propago in musculos digeritur, qui transuersis vertebrarum processibus connati, cervicem in latera mouent, & cum pariter qui a transuersis vertebrarum cervicis processibus principium ducens, scapulam sursum vellit. ¶ *Quartum cervicis nervorum par* e communi tertiæ & quartæ vertebrarum foramine excidens, tertio pari similiter in duos partitur ramos. ¶ *Posterior aliorum* qui retrorsum ad spinam inter musculos occultati reflectuntur modo, versus tertiæ cervicis vertebræ spinam contendit, in progressu illis quibus intertextitur musculis, furculos diffundens. ¶ *Quando autem spinâ cōtingit*, per mutuū elabitur congressum, musculorum posteriorem cervicis regionem occupantiū, atq; hinc in latum membraneumq; digeritur musculum buccarum motus auctorē præcipuū. Anterior autem quarti paris ramus, ternas educit propagines, ac viā promit, cui tertii paris propago commiscetur, quæq; in musculos deperditur stomacho substratos, ac cervicem flectentes. ¶ *Secundam vero propaginem* in musculos distribuit vertebrarum lateribus adnatos, cuiusmodi sunt quorum beneficio cervix in latera ducitur, ac is qui a transuersis colli vertebrarum processibus principium ducens, scapulam sursum allicit. ¶ *Tertia propago* duabus iā dictis gracilior declivis fertur, cum quinti paris sobole congressura ac simul cum illa, & sexti paris propagine septi transuersi nervi constitutura. ¶ *Quinto pari*, quinta vertebra cum quarta viā præbet. Ipsum vero similiter atq; quartum in duos discinditur ramos, ac posteriorem ad spinarum apices retorquet, eodem prorsus modo digerendum, quo posteriorem quarti paris ramum digeri diximus. At prior anteriorve ramus, primum sobolem spargit musculis cervicem flectantibus. Dein grandiore depromit, qui deorsum repens ramulos utriusq; vicini paris, quarti nimirum & sexti excipit, & illis adauctus, nervum septi transuersi efformat, qui præcipua quinti paris constat propagine, & exigua sobole quarti paris, & item exigua sobole sexti. Interdum vero & septimi paris furculus septi transuersi nervo accedit. At tunc quarti paris soboles ipsi nulla offertur. Atque hæc sane regio admodum industriae septo transverso nervos elargitur. Variat enim id a ceteris musculis non figura solum, verum & functione. Orbicularis enim formæ, ut lib. 2. dictum est, visitur, & situ obliquo donatur. Mox caput ipsius a quo fibræ dependent, non ut quispiam arbitraretur, ex pectoris osse, aut costarum Cartilaginibus, aut vertebrarum corporibus educitur, sed in media totius septi regione, quæ nervosa est, id consistit. Ac proinde nervos fibrillis motum largituros, eo prærepere ab alio operæ precium fuit, ut in uniuersam ipsius sedem suam vim ex æquo diffunderent. Si vero Natura nervos septi partibus, quæ lectoris ossi, costis, & vertebris connascuntur, inseruisset, septi finis in ipsius medio haberetur: quum nervos in musculorum initia potius quam fines exporrigi Anatomes professoribus axioma sit. Atque hac ratione septum duntaxat nervos a cervicis vertebris mutuatur. ¶ Longo enim progressu eos ducere, quum possent ex proximis sedibus emitte, Opificis esset ignorantis, quid magis in fabrica conduceret. Hac igitur occasione septo sublimes transmittuntur nervi, uniuersum thoracem perreptantes. Ne vero in progressu periclitarentur, eos intersepientibus thoracem membranis adnexuit, unū nervi singulis membranis externis firmans. ¶ Neq; profecto minorem conditoris industria arguit, id quod adhuc anterioris quinti paris nervorum cervicis est reliquum, atque in musculum præcipue inferitur, cuius auxilio brachium attollimus. Hic enim quia ingens graueque membrum impese sursum attollere debebat, forti validoque indigebat nervo, quem natura ipsi securissime a commemorata quinti paris portione deduxit. Nam ab hac portione ramulos quosdam porrigens musculis scapulam attollentibus, primum ab externo huius portionis latere nervum deriuat, qui fo-

Quarti paris series.

Quinti paris series.

Septi transuersi nervorum constitutio. Gal. lib. 13. de usu part. cap. 9.

Reliquum anterioris rami quinti paris.

A ras emergens, atque in multas scissas soboles cutem implicat, qua attollens brachium musculus integitur. Dein reliqua portio in profundo recondita, simulatque scapulæ appropinquat, in duos magnitudine impares partitur ramos. ¶ Anterior qui & gracilior est, sub summi humeri cum clauicula connexu porrigitur, & musculi brachium attollentis parti soboles spargit, quæ a summo humero & clauicula inibi principium ducit. ¶ Atque hic ramus cuti nullum exporrigit surculum, nisi interdum extreme gracilem, aliquotque humeraria vena concomitatur. ¶ Posterior vero eius quinti paris portionis, quam in profundo reconditam ferri diximus, ramus, qui anteriori crassior est, postquam gracilem expromsit ramulum musculo hinc a scapula sursum ad os referens proficiscenti, insidet foramini instar semicirculi in scapulæ elatiori costa exsculpto. In hoc foramine posterior hic ramus vena quoque & tenui arteria concomitatus, mox propaginem diffundit musculo sinum occupanti, qui inter scapulæ spinam & elatiorrem ipsius costam habetur. ¶ Insuper in musculi brachium attollentis sedem digeritur, a scapulæ spina, & summo humero pronatam. Verum hic ramus in præsentem musculus non totus exhauritur, sed surculo quoque cutem brachii externæ sedi obductam adit, quem secundum exterius latus insertionis ramus ille ab alto transmittit, quam musculus is brachium attollens in humerum molitur. Eadem sane industria & a succedentibus nervorum paribus in brachium progredientibus ad musculos scapulam mouentes, nervi transmittuntur qui omnes intimis musculorum sedibus potissimum inseruntur. ¶ *Sextum par* sub quinta vertebra excidens, eadem cum ceteris paribus serie ad cervicis musculos posteriorem ramum dispensat, tum eos, qui cervicis & capitis præsumt motibus, tum illorum capita qui respiratione opifices ex ceruice thoracem accedunt. ¶ Quamquam & hi potissimum ipsorum nervos a septimo pari & octavo quoque, seu primo thoracis pari mutuuntur. ¶ Anterior autem sexti paris portio, postquam nervum expromsit, qui quinti paris portioni ad nervum septi transversum constituendum permiscetur, cum contiguis paribus, septimo nimirum & octavo coit, & varie rursus discinditur, nervos una cum proximis paribus efformatura, qui in manum contendunt. ¶ Priuatim vero præter cetera cervicis paria, sextum par portionem notatu dignam deorsum ad scapulæ cavum transmittit, & rami quoque tum ab hoc, tum etiam a ceteris coniugiis ad musculos digeruntur, qui scapulam sursum ducunt. Validis enim & magnam molem attollentibus musculis, varias quoque ac frequentes nervorum propagines inseri est consentaneum. ¶ Septimi etiam par ex comuni sextæ & septimi cervicis vertebrarum foramine prolabentis, magnus cum duabus proximis coniugationibus sextæ videlicet ac octavæ congressus perficitur, atque huius potissima portio in manum fertur. Ab hoc enim pari & quinto & sexto cervicis, & primo & secundo thoracis vertebrarum, omnes manus nervi propagantur, qui numero sex sunt, ut infra latius dicemus. ¶ Ceterum septimum hoc par, interdum ramulum septi transversum nervo offert, & perpetuo ramum in posteriora ad spinam ducit, qui præter ceteras propagines in musculos posteriori cervicis sedi intratos digestas, aliquot etiam offert lato membraneoque musculo, qui buccas movet, atque ex carneâ membrana constituitur. In hunc enim musculus a quinti paris nervorum cerebri propagine per cæcum foramen excidente, ac dein ab omnibus paribus vertebrarum cervicis, si primum excipias, soboles pertingunt, universæ secundum musculi fibrarum ductum exporrectæ, ac proinde ad venas & ligamenta multifariam reflexæ, ac cuti etiam communicatæ.

Sexti paris series. Musculi respirationis opifices quibus a vertebra nervos suos recipiunt.

Septimi paris series.

Duodecim parium nervorum dorsalis medulla thoracis complexa vertebris series.

CAP. XIX.

Primum nervorum par, inter septimam cervicis vertebrarum & thoracis primam, quinque humiliorum cervicis parium modo exiliens, opportune, superioribus dorsalis medullæ nervorum paribus comparatam octavum nuncupabitur. Hoc simulatque excidit, in duos impares diductum ramos, posteriorem, qui gracilior est, retrorsum ad spinam inter musculos vertebris hic adriatos reconditum detorquet, a quo in progressu surculos accipit radix musculi a prima thoracis costa in transversos cervicis vertebrarum processus inserti, accervicem in latus, versus anteriora tamen magis, inclinantis. ¶ Dein & qui cervicis capitisque in posteriora moti-

Primi paris series. Gal. libr. 15. de usu par. cap. 2.

498 Operum Leonhard. Fuchſii Pars I.

bus præficiuntur muscoli ab hoc ramo octauæ paris furculos adipiscuntur. Quod autem eius rami septimæ cervicis vertebræ spinam contingit, extrorsum ducitur, & rursus transuersim a spina abscedens, propagines offert humiliori sedi eius musculi qui scapulam mouentium secundus ac maior enumeratur. ¶ Insuper & musculo scapulæ basi inserto, scapulamque ac dorsum trahenti, ac demum illi qui thoracem mouentium tertius est. At anterior octauæ paris ramus, posteriori longe insignior, septimi sed magis adhuc interdum noni paris non minimam portionem cum ipso congre-
dientem suscipit, totusque varie vicinis paribus commixtus, si vni eam ipsius demer-
ris propaginem in manus fertur. Ex demissiori nanque ipsius sede, ubi iam proxi-
mis paribus se commiscuit, propaginem antrorsum emitit, quæ secundum primæ
thoracis costæ ductum ad pectoris ossis vsq; summum prolata, in pgressu furculos di-
spensat thoracis musculo a clauicula in primam inserto costam. ¶ Præterea huius pro-
paginis terminus in illos digeritur musculos, qui a pectoris ossis summo principium
ducentes, sursum exporriguntur, tum ad mamillarum capitis processum, tum ad os
imagini comparatum, & ad laryngis cartilaginem scuto non ab similem. Quamquam
interim & iis musculis a sexto pari neruorum cerebri soboles offeruntur, vt & a primo
intercostali neruo, quem mox noni paris propaginem esse dicemus. ¶ Quæ autem octa-
uæ huius paris in manum sit series, sequenti capite docebimur. Id hoc loco adiiciemus,
ab octauo pari, seu potius quarto manum petente neruo, quoniam is alia accedit ex postero-
ri ipsius regione etiam ramos pullulare, in cauam scapulæ regionem digestos. ¶ No-
num par inter primam & secundam thoracis vertebrae originem ducens, octauæ quo-
que paris ritu ramum in posteriora ablegat, simili quodammodo ratione atque po-
sterior octauæ paris ramus digerendum. Deinde non minimam sui partem octauo
porrigens, vt sequenti capite dicemus, in manum fertur. Reliquam vero ipsius por-
tionem primo costarum intervallo offert, quæ secundum primæ costæ ductum ad
pectus vique fertur in progressu, vt & reliqui costarum intervallicis exporrecti nerui,
soboles diffundens in musculos thoraci incumbentes. ¶ Porro decimum, undecimum,
duodecimum, & reliqua ad primum vsque lumborum, seu vigesimum par subsequen-
tia, eadem quodammodo serie digeruntur. Quippe omnia mox atque e verte-
brarum lateribus exiliere bipartito scinduntur, ac minor graciliorque ramus retror-
sum ad vertebrarum spinas detorquetur, inter musculos vertebris adnatos latens. D
Sunt vero illi qui dorſi & thoracis motibus præſunt, videlicet thoracis motorum
quartus, dorſum mouentium sexti paris alter, mox & alter octauæ paris, & circa ſupe-
riores thoracis vertebrae alter primi & ſecundi paris caput mouentium, & alter
tertiæ paris, & alter quoque quarti paris musculorum dorſum priuatim mouentium.
¶ In hos enim thoracis musculos neruorum posteriores rami ſparguuntur: verantamen
in illos tantum non abſumuntur. Ac quoniam ſpinarum attigere apices, extrorſum
properant, inter mutuum dextri ſiniſtriſque lateris musculorum congreſſum præci-
dentes, atque in musculos poſtmodum digeſti, qui ab illarum quas contingunt ſpina-
rum apicibus principium mutuuntur. E quorum numero, præter aliquot paulo ante cõ-
memoratos, præcipue autem alterum primi paris musculorum caput mouentiũ, ſunt E
musculus ſcapulam ad dorſum trahens, totique ſcapulæ baſi inſertus, & humilior pars
eius musculi, quem ſecundum ſcapulam mouentium enumeramus, ac monachoium
cucullis aſſimilatur, qui hac parte ſcapulam deorſum veilit, mox thoracis motus op-
ficum quintus, & iſ etiam qui brachium deorſum dorſo adducit. ¶ Et præterquam
quod a poſteriorib; horum pariarum ramis ſurculi in musculos digerantur, etiã aliquot
in cutem dorſo inſtratã contendunt, aut minus frequentes quã nerui in manũ, aut pe-
toris, aut colli cutem ptingentes. ¶ Ceterum anteriores præſentium pariarum rami ſur-
culos offerunt ſexti paris neruorum cerebri ramo ſub tunica coſtis ſuccincte coſtarũ
radicibus, exporrecto, illiſq; ſurculis adaucto. Dein præſentes rami coſtarum exporri-
guntur intervallicis, vena itemq; arteria cõcomitati, & proprio ſinu coſtarũ interiori in-
ferioriſque ſedi inſculpto veſti, ſecundum coſtarum ductum in anteriora properant:
¶ Rami enim veris exporrecti coſtis, ad pectoris vsque os ptingunt. Rami au-
tem ſecundum ſpurias delati coſtas, haud vna cum illis ceſſant, verum in abdominis
vsq; anteriora ſuper peritonæum repunt. Ab iis ramis in pgressu ſparſa ad modum
pro-

Primus in-
tercoſtalis
neruus.

Secundi
paris ſeries.

Reliquorum
pariarum e
thoracis
vertebris
proſiliẽtiũ
ſeries.

Alii inter
coſtales
nerui.

A propaginum series in musculos thoraci adstratos diffunditur, e quorum numero secundus est thoracem mouentium, & qui brachium pectori admovent, & qui scapulam pectori adducit, & qui brachium deorsum vellit, & oblique descendens abdominalis musculis. In hos enim musculos propagines ab intercostalibus nervis offeruntur, singulae tanta industria ad costas, & venas, & arterias, & ligamenta reflexae, ut ad amissum musculorum quibus porriguntur, fibrarum incessus retineant. Atque ut his musculis thoraci instratis ab intercostalibus nervis propagines exhibentur, sic a nervis spurias costas superantibus, soboles quoque abdominalis musculis communicantur, fibrarum etiam illorum quibus attenduntur musculorum incessum observantes. ¶ Porro a propaginibus musculos implicantibus, nervuli etiam thoracis tui offeruntur, non quidem certa neque nunquam aberrante serie, sed sparsim, eoque prorsus modo quo errantes vasorum rami, *ex Galeno libr. de ana. admi. teste*, Græcis nuncupanti, digeruntur. ¶ Vtunque verò varia, neque sibi constans sit eiusmodi cutem petentium nervorum series. Natura tamen veritate tenero adhuc infanti lac familiare illius alimentum, a matre exigenti papilla nonnunquam atrocius denegaretur, exactum papillis sensum impartiri voluit, quo tenerorum infantuli laborum mollisque linguae contactus, papillam voluptate afficeret, qua homines illecti, hanc promptius sugendam contectandamque offerant. Ac proinde a nervis fere qui quartum costarum perreptant intervallum, propagines diffunduntur in musculum, cuius beneficio brachium pectori adducimus: atque ab illis propaginibus surculi in papillam pertingunt, simili qua penis efformatur substantia constantem. ¶ Ceterum ut praesentes surculi duodecimo nervorum pari quodammodo peculiare censebuntur, ita sane decimo octavo & decimo nono paribus id priuatim ascribendum venit, quod surculos offerant principio sexti femur mouentium musculi.

Nervorum in universam manum series. CAP. XXI.

NERVI brachii a quinto, sexto, septimo cervicis nervorum pari, ac deinceps primo, & secundo thoracis vertebrae adituri, statim ab ortu ad vertebrarum latera permiscuntur coeuntque, & rursus inuicem dirimuntur, ac denuo congregiuntur, ac postremo separantur, ut neutiquam dicere queas, quis nam brachii nervus ab hoc illove pendeat pari. At verius quodammodo sex praecipuos nervos ab illa commixtione nervorumque congerie ac contextu reticulari principium ducere adstrues.

E ¶ *Primus brachium subiens nervus*, eius quinti paris nervorum cervicis rami soboles est, qui in musculi brachium attollentis sedem a scapulae spina pronatam digeritur. Atque haec soboles tantum in externae brachii regionis cutem paulo sub medio longitudinis brachii diffunditur, in ibique cessat. ¶ Quippe inferiorem huius regionis cutem alia exilis propago implicat, quae praedictae nuper sobolis modo ex alto emergens ab eo editur nervo, qui nervorum brachii quartus erit. Atque haec propago non solum dictae iam cuti surculos offert, sed & illi cuti soboles derivat, quae sedem externam posterioremque cubiti ad humerum articuli atplexatur. ¶ Praesentes nervi, ut & omnes quoque cutem accedentes, membrana suffulciuntur vocata carnosa, atque inter hanc & cutem illi sensum suppeditantes protepunt in homine multo adipe etiam immersi, membranamque illam cuti pertinaciter committentes ac pilorum modo interim graeciles. ¶ Porro ceteri quinque nervi per axillam brachium subeunt, atque in plures ramos quam primus sparguntur, singuli maiores crassioresque spectantur. ¶ *Secundus brachium petens nervus*, ab implexu quem nervi brachium subituri ad vertebrarum latera efformant, principium ducit. Nemo autem hunc nervum alicui pari vere adscriberet, quod non uno, sed pluribus nervorum paribus textus ille constituatur. Brachium autem sub musculo cubitum flectentium anteriori ingreditur. Vbi enim duo illius musculi capita inuicem sunt coitura, nervus ille primum in brachium fertur, quo etiam loco musculus brachium pectori adducens in insertionem secundum humeri longitudinem molitur, uti etiam musculus brachium attollens transversim inibi humero implantatur, praeter insertionem quam hac prope modum regione musculus tentat, qui ab humiliore scapulae costa pnatus brachium in posteriora allicit, ac demum eius quoque musculi cuius beneficio deorsum versus dorsi humilia brachium agitur, insertio secantibus inibi occurrit. ¶ *Secundus igitur brachium petens nervus*, priori cubitum

Primus nervus.

Secundus.

Tertii in-
gressus.Secundi cū
tertio con-
gressus.Reliqua se-
cundæ seriesTertii ner-
ui ad cubiti
vſq; flexum
progressus.

flexuentium subditur musculo, & sub interiori eius capite quod a scapulæ processu A anchoræ speciem referente originem ducit, occultatus, vtriusque eius musculi capi-
bus furculum offert, ac declivis prorepens sub posteriori nuper commemorati mu-
sculi sede reconditur. Quas vero dein propagines diffundat, vbi tertium nervum
huc sermone deduxerimus, subiiciemus. ¶ *Tertius nervus secundo humilior*, ex illo quo-
que prodit complexu retine, quod prius a nervorum radicibus brachium adeuntibus
confici diximus. Vbi vero alam perrepat, ramum promit inter musculum brachium
pectori adducentem, & illum quo brachium attollitur, cuti exporrectum, quæ illorū
musculorum obducitur lateribus, quæ illi se mutuo contingunt. Simulatq; vero ter-
tius nervus humero appropinquat, mox etiam cubitum flexuentium anteriori muscu-
lo cooperitur, atq; simul cum secundo nervo deorsum properans ramulum capiti præ-
bet musculi cubitum flexuentium posterioris quod etiam interdū & a secundo nervo
propagine quadam donatur, velut *Galenus libr. 3. ana. admi.* se observasse scribit, a tertio
ad secundum hæc propago pertinet. ¶ *Secundus autem nervus* perpetuo deorsum ad
anteriorem articuli cubiti sedem contendit, musculo cubitum flexuentium anteriori
tectus & in progressu ab externo ipsius latere ramulum spargens in caput musculi ab
humeri osse principium ducentis, & radio ad brachialis radicem inserti, radiumq; in
prorum mouentis. Quum primum vero secundus nervus ad anteriorem vsque cubi-
ti articuli sedem cubitive flexum pertingit, secundum externum latus tendinis mu-
sculi cubitum flexuentium anterioris ad carneam ducitur membranam, in cutem dis-
sipandus. Mox enim atq; alto emerſit, in duos crassitie impares secatur ramos, quorū C
vnus qui gracilior & superior est, aliquouſque cum humeralis venæ ramo secun-
dum radium ad mediam vsque cubiti longitudinem exporrecto, ac dein versus vlnæ
appendicem tendenti deducitur, vniuersam cutem radio incumbentem prætenui-
bus furculis intertexens, quorum præcipuus inferiorem radii appendicem superans,
ad secundum vsq; pollicis pertingit internodium hic, vti & toto progressu inter carneā
membranam & cutem repetens, sobolesque tenuissimas diffundens. Huic furculo
pollicis exporrecto interdum ramuli accedunt, permisceturque ab iis secundi nerui
propaginibus, quæ internæ summæ manus cutem adeunt. Humilior enim crassiorq;
ramus eius secundi nerui diuisionis, quæ iuxta cubiti flexum perficitur, statim in du-
as quoq; dirimitur propagines, sub media prorepentes vena ab humerali ad communis D
venæ constitutionem proficiscente. ¶ *Vna* harum propaginum quam *elatiorem* appel-
lare licet, postquam dictæ iam venæ succubens ad venæ communis vsq; originem ob-
liquo ductu accessit, relicta vena cuti subtenditur, & in descensu elatius ad radii sedem
non nihil obliq; conscendens, secundum internum latus musculi oblongi & radio p-
prie ad brachialis vsq; radicem perfertur. ¶ *Alter* a propago, quæ humilior nuncupari
potest, magis oblique quam medium cubiti flexus aut venæ communis origo
constitat, deorsum fertur, ac tandem venæ maioris cubiti sedis cuti potissimum ob-
latæ attensa, ad brachiale vsque prorepit, in multos exiles furculos in progressu
absumta. Nam priusquam longo ductu in cubiti regionem feratur, in duos præ-
cipuos partitur ramos, quorum vnus quodammodo radii regioni exporrigitur, E
alter vero vlnæ, ac vterque crebro brachiale superat ramulos in cutem internæ sum-
mæ manus sedi dispargens. Dein ab illis ramulis qui Veneris monticulum conscen-
dunt, interdum soboles in externam manus sedem excurrunt, neruulis commiscen-
dæ cutem primi pollicis internodii externæ regioni obductam implicantibus. Atq;
in hunc modum secundus absimitur neru⁹. ¶ *Tertius autem nervus* simulatq; secundi
nerui propagine adaugetur, frequenter ramulū in cutem dispensat, anteriori brachii
sedi hic obnatam. Hinc vbi ab initio in alto repositus, cubiti flexum accedit, æquali
propemodam intervallo in progressu a secundo distans, ac interiorem sedem sibi
vendicans. Tertius enim nervus non ad amissim per mediam cubiti flexus sedem
in cubitum delabitur, verum anteriori sedi insidet tuberculi interioris humeri, ac su- F
per internum latus quodammodo vehitur insertionis musculi cubitū flexuentium poste-
rioris. ¶ Quum vero hanc transcendit, insertionem, in multas dirimitur propagines,
feriatim recensendas, vbi quintum neruū ad cubitum vsque sermonis serie deduxeri-
mus, qui vna cum tertio in musculos sedem cubiti interiorem occupantes digeritur.

A ¶ *Quartus nervus* a reticulari illo neruorum iuxta vertebrarum latera implexu principium quoque ducens, omnium neruorum qui in brachium porriguntur longe crassissimus est, & similiter atque tertius occultatus cum ipso in brachium properat, axillari venæ & magnæ manus arteriæ attensus, moxque insignes vtriusque soboles musculis distribuens, quorum ministerio cubitum extendimus. Priusquam vero præsens nervus ad medium usque longitudinis brachii pertingat, oblique retrorsum ad humeri os contorquetur, hoc & musculos cubitum extendentes intercicens. Verum antequam penitus reflectatur, ab interno ipsius latere propaginem emittit, quæ inter musculos cubitum extendentes, & posteriorem cubitum flectentium in internam brachii sedem procidit, vniuersa in huius sedis cutem absumentia surculosque partim sursum, partim deorsum multiplici serie sparsura. ¶ Porro ipse quarti nerui truncus ad eum modum secundum humeri posteriora reflexus, sensim ad externam brachii sedem properat, ac ab externo latere propaginem edit, quæ inter exteriorem cubitum extendentium musculum & caput oblongi musculi radium in pronum ducentis ex alto emergens, in cutem dispensatur externæ brachii, & cubiti articuli sedi obducta. ¶ Quum primum autem quartus nervus in alto semper latitans, exterius humeri contingit tuberculum, posteriori ipsius sedi innititur, in qua huius nerui nomine sinus a natura priuatim exsculptus est, quo nervus musculis occultatus, atque hic in frequentem sobolem spargendus, tuto veheretur. Mox enim atque nervus ille in cubitum ducitur, ramum promittit, qui ex alto emergens, errabundo ductu sub cute ad brachiale usque proripit, frequenter surculos in progressu educens, a quibus cutis externam cubiti sedem obtegens inter exitur. Deinde hic nervus in duos discinditur truncos, in profundo, ut & ipsorum radix, reconditos, horum alter altero elatior est, ac radio exporrigitur: alter autem qui humilior consistit, secundum vnam deorsum fertur. ¶ Elatior penitus inter superius latus musculi bifido tendine brachiale expendentis, & exterius inferiusve latus musculi longi radium in pronum ducentis ad brachiale contendit, in progressu graciles ramulos vtriusque, quibus attenditur occultaturque, musculis communicans. ¶ Vbi vero elatior hic ramus brachiale accedit, per transversum properat ligamentum, in externa radii sede, bifido tendine brachiali extendenti obductum. ¶ Ceterum mox atque præsens ramus externam brachialis sedem contingit, in duas dirimitur propagines, quarum altera duplici surculo externæ pollicis regioni offertur, altera vero in duas secta soboles, vnam indici porrigit in ipsius externam sedem duplici quoque surculo absumentam. Alteram autem medio largitur digito, eam simplicem indivisamque interno lateri exterioris sedis eius digiti applicans. ¶ Demissior ramus quarti nerui iam cubitum ingredientis in duos ramos sectionis, qui vna exporrigitur ilico frequentes educit soboles, ac primam donat capiti musculi indicem, medium, & annularem extendentis, secundam capiti musculi cuius auxilio minimus extenditur digitus: tertiam autem offert musculo brachiale simplici tendine extendenti. In ipso autem secundum vnam processu præsens ramus tribus musculorum principiis ab vna originem ducentibus propagines exhibet. Aceorum quidem principiorum primus musculus est, qui radium in pronum ducentium breuior visitur: mox ille qui triplicem diffundit tendinem, ac vnum brachialis ossi primum pollicis os sustinenti innecit, secundum primo pollicis ossi, tertium secundo pollicis ossi & tertio. Dein musculus, qui tribus pollicis ossibus insertus, pollicem extendendo versus indicem ducit: Mox musculus, cuius beneficio index, ac interdum quoque medius a pollice extrorsum oblique aguntur. Horum namque musculorum principiis seriatim ab vna pronascentibus, a præsentis quarti nerui ramo soboles offeruntur, accurate fibrarum eorum musculorum ductum obseruantes, qui oblique ab vna versus radium pertinet. ¶ Quod vero huius rami est reliquum, brachiale non conscendit, multoque minus in minores absimitur digitos, sed vniuersum hic ad brachialis radicem cessat, aliquot furculis brachialis cum cubito articulum implicans. ¶ *Quintus nervus* a commemorato iam sæpius plexu inferius quam quatuor hactenus descripti principium nanciscitur, ac quarto attensus per axillam in brachium fertur, nullas omnino soboles cuiquam parti distribuens. Nam indivisus inter musculos cubitum extendentium interiorum, & cubitum flectentium posteriorem secundum internam brachii sedem occultatus

Quarti nerui in brachium ingressus

Quinti nerui in brachium ingressus & series cum tertio

tantisper porrigitur, dum internum humeri contingat tuberculum, ad cuius poste- **A**
 riorem reflectitur sedem, hic priuatim obtinens finem, quo apte in cubitum vehitur.
 ¶ Quemadmodum enim tertius nervus anteriorem humeri tuberculi sedem occu-
 pat, ita sane & quintus in posteriori sede eius tuberculi consistit, parique quodam-
 modo serie cum tertio digeritur. ¶ A duobus namque presentibus nervis propagi-
 nes omnibus offeruntur musculis internam cubiti sedem occupantibus, qui & ab inte-
 riori tuberculo humeri, & ab ipsa vlna radioque principium mutuatur. Aca tertio
 quidem nervo potissimum soboles sparguntur in musculum secundos quatuor digi-
 torum articulos flectentem, & illos qui tertios eorundem digitorum flectit articulos,
 mox illum qui tertii pollicis ossis flexus est auctor. Deinde propago quoque a tertio ner-
 uo illi porrigitur musculo, qui ab interno humeri prodienis tuberculo, ac post bra- **B**
 chialis ossi indicem sustinenti insertus, brachialis flexus opifex habetur. ¶ Verum is
 musculus etiam a quinto nervo furculum subinde asciscit, ut & omnes ab interno hu-
 meri tuberculo pronati. Ex quorum classe præter nuper commemoratum is cense-
 tur, qui tendine lato summæ manus internæ cuti subnascitur, dein qui quarto brachia-
 lis ossi insertus brachiale flectit, mox qui radium in supinum ducentium superior est.
 ¶ Porro quintus & tertius nervi etiam si sparsam hanc propaginum derivant seriem,
 penitus hic non absumuntur, verum utrorumque singuli adhuc supersunt rami, insi-
 gnes sane, & in plures furculos diffundendi. Ac tertii quidem nervi ramus inter mu-
 sculum quatuor digitorum secundos flectentem articulos, & illum qui tertium polli-
 cis os flectit, radio exporrigitur, vna cum vena & arteria hac deductis ad brachiale **C**
 properans. Et transversum permeans ligamentum in brachialis interna sede
 tendinibus obductum. Iste tertii nervi ramus furculos, sed minus quam obscuros,
 quibusdam musculis exhibere dicitur, qui in externam manu repositi, digitorum mo-
 tibus quoque præsent. Cuiusmodi est is, quo pollex ab indice maxime abducitur,
 dein quo pollex indici proxime adigitur, & duo pollicis primum flectentes interno-
 dium, & tres secundi ipsius internodii flexus opifices, mox qui indicem ac medium
 pollicis adducunt, ac duo qui indicis primum flectunt articulum, ac interior denique
 primum medii digiti os flectentium. ¶ Verum his musculis, ut & illi qui radium in
 supinum ducentium inferior est, nervi potius attenduntur, quam inseruntur, aut et-
 iam superficie tenus adnascuntur. Ipse tamen tertii nervi ramus in vlna tres notatu di- **D**
 gnas & insignes quoque emittit propagines, quarum prima pollicis internam accedit
 sedem, in duos prius dissecta furculos, secunda etiam binis furculis internæ indicis sedi
 implicatur, tertia vero simplex interno tantum lateri interioris medii digiti sedis ex-
 porrigitur. ¶ Porro quinti nervi ramus vlnæ attensus inter musculum secundos qua-
 tuor digitorum articulos flectentem, & illum qui eorundem digitorum tertios arti-
 culos flectit, ad brachiale ducitur, vna etiam & arteria concomitatus, quæ vlnæ ex-
 porriguntur, atque ad vlnam per transversum brachialis ligamentum tendunt. ¶ His
 ramus simul atque ligamentum id superavit, vnam propaginem in duos diuisam furculos
 minimi digiti internæ sedi communicat, ac vnam similiter in duos furculos diremptam
 internæ, sedi annularis digiti offert, mox vnam quoque medio digito communicat, **E**
 quæ indiuisa externo applantatur lateri, internæ medii digiti sedis. Nisi forte ut non
 infrequenter accidit, a tertio nervo duæ soboles indicis offerantur. ¶ Præter has quin-
 ti nervi propagines nullas in extremæ manus musculos sparsi animadvertitur, in illos
 nimirum qui annularem & minimam ad pollicem ducunt, qui primum os minimi &
 annularis flectunt, cum externo musculo primum medii digiti os flectentium, & illo qui
 minimum a ceteris digitis in latus remouet. Nam ut prius monuimus, his musculis
 nervi potius attenduntur, quam adnascuntur. ¶ Porro quinti nervi præsens ramus ad
 hunc modum non totus absumitur, verum non perfunctorie expendendam promit pro-
 paginem, paulo inferius quam medium vlnæ longitudinis consistit. ¶ Quam enim
 ramus hic vlnæ medium emensus est, ab externo ipsius latere propaginem illam de- **F**
 ducit inter musculum brachiale flectentium inferiorem, & inferiorem brachiale ex-
 tendentium. Propago hinc ex profundo elabens secundum vlnam in externam sedem
 cubiti porrigitur, & quæ externam brachialis sedem contingit, in externam regionem
 illorum digitorum ramulos spargit, in quam quartus nervus nullas soboles promittit.

A ¶ Diuiditur itaque ea quinti nerui propago in tres ramos, quorum primus duplici furculo externam minimam digiti sedem adit. Secundus duplici quoque furculo externae annularis sedi exporrigitur. Tertius autem indiuisus externo implicatur lateri exterioris medii digiti regionis. ¶ Ex iis quae diximus perspicuum fit, cur nonnunquam motum integro adhuc sensu perire, & sensum quoque motu adhuc integro aboleri contingat. Nam ut ceteros taceamus neruos, de vulnere, aut alio affectu quartum neruum, quae secundum humeri posteriora reflectitur, aut etiam quae a reticulari plexu ad vertebrarum latera consistenti exorditur, praescindi, aut alias ex humoris affluxu eiusque generis malo quopiam ita vitari, ut animalis spiritus cum ipso non deducatur, & quintus neruus interim illaesus, ac integer sit, nonne minimi digiti & annularis extensio perdetur, illorum sensu integro. Nam quintus neruus sensum suppedians illaesus est, at propter quarti vitium musculorum digitos extendentium manus intercidit. ¶ Quod si casu quintus neruus, integro interim quarto, contusus, aut alioqui oblaesus fuerit: nonne paruus digitus & annularis stupefcent, ipsorum interim motu haud corrupto. Atque ut haec de quarto & quinto neruis exempli gratia proposuimus, ita sane illi quem neruorum series & musculorum natura non fugerit, expendere confingereque promptissimum est, qui sensus illaeso motu aliquando aboleatur: aliquando autem seruat sensu motus pereat. Neque necesse est eo desecti, quod maior vis animalis ad motum, quam ad sensum requiratur. ¶ Sed quum haec alibi copiosius explicauerimus, sexti nerui seriem quoque perstringemus.

Cur motu integro adhuc, sensus pereat, & contra.

C ¶ Sexti porro nerui principium ab infirma retis iam saepius dicti sede enascitur, & inconiugatus per axillam in brachium properat, nullibi in alto reconditus, sed cuti interni brachii sedi substratus, ad internum humeri accedit tuberculum, in progressu conterminus eius quam perrepat cutis partibus frequentem depromens sobolem. Ad interius vero humeri tuberculum, in plures partiur ramos venae axillaris propaginibus partim incumbentes, partim quoque substratos. ¶ Hi deorsum humerosa propaginum serie secundum vnam digeruntur, inter cutem & carneam membranam deducti, & priusquam brachiale contingant cessantes, perpetuoque secundum inferiorem cubiti regionem seu vnam exporrecti. Atque praesens neruus crassius secundo respondet, ubi is cubitum accedit. ¶ Quintus autem neruus tertio congruit, ut etiam secundus, qui priusquam sui portionem tertio offert crassus visitur. Et hi sexto fere quintuplo crassiores sunt, omnium autem plenissimus est, quem quartum enumerauimus, quemadmodum summe gracilis occurrit, qui primus ordine fuit.

Sexti nerui ingressus & series.

Neruorum crassities.

Quinque parium neruorum & lumborum vertebris prodeuntium series. C A P. XXI.

S P I N A L I S medullae, lumborum vertebris complexa, nerui, in hoc thoracis vertebrarum neruis magna ex parte conueniunt, quod a singulis rami retrorsum ducatur in musculos vertebris adnatos sparsi. ¶ Committitur autem hic vertebris musculus thoracis motorum quartus, dein dorsum mouentium vndecimus, ac demum huic qui substat decimustertius. Atque his musculis propagines a posterioribus ramis offeruntur, quum illi adhuc reconditi ad vertebrarum spinas ducuntur. ¶ Quando autem rami ex mutuo vtriusque lateris musculorum connexu, atque ab ipsis spinarum apicibus procedunt, ad latera denuo excurrunt, cuti & musculo praecipue intexti cuius ope brachium versus dorsum humiliora agimus. Anteriores autem horum parium rami in abdominis musculos, ac illum qui brachium versus dorsum humiliora detrahit, ipsamque adeo cutem disseminantur, ut & in musculum dorsum motus auctorem nonnum, & eum qui femur mouentium sextus est. Dein a vigesimo primo pari, seu secundo lumborum, vna cum seminaria sui lateris arteria perquam exiguus furculus ad testem ducitur, si modo a sexti paris neruorum cerebri ramis costarum radicibus exporrectis, atque in intestina propagatis nullae soboles ad testes pertingant. Nam & ab illis ramis interdum furculi testibus exporrigi animaduertuntur. ¶ Quinetiam ab anterioribus ramis trium primorum parium ex lumborum vertebris profluentium, furculi etiam diffunduntur, qui paulo ante dictos sexti paris ramos costarum radicibus exporrectos accedunt, illosque adaugent. A tribus vero humilioribus & lumborum vertebris elabentur paribus, non minimi crus accedunt. Qua autem serie in illo digerantur ultimo huius libri capite exequemur.

Nervorum a sacro osse profiliantium series. C A P. XXII.

HOMINIS nervorum e sacro osse profiliantium series, a canum & caudatarum simiarum serie plurimum discrepat. Ac primum quidem par tam in hominibus, quam quadrupedibus inter os sacri ossis primum & infimam lumborum vertebrae ea prorsus ratione qua nervorum paria e lumborum vertebrae egredientia procidit, ac mox ab egressu ramum in posteriora non secus atque superiora paria diffundit: qui etiam similiter atque posteriores illorum parium rami, digeritur. ¶ Priuatim vero a posteriori regione primi paris sacri ossis propago utcumque insignis in musculos spargitur, ab ilium osse principium ducentes, potissimum autem in primum femur mouentium. Dein eius propaginis soboles non poenitendae in cutem clunibus obductam deriuantur. *Anterioris* vero praesentis paris portio, nervis in crus deducendis permiscetur. Non enim tota in crus absorbitur, quum ab illa ramus secundum internam ilium ossis sedem exporrigatur, surculos offerens abdominis musculis, & illi pariter musculo, qui ab interna ilium ossis sede pronatus femur mouentium septimus censeretur. ¶ Ceterum quinque humiliora paria peculiari procidunt ratione. Nam priusquam ex ipso osse elabantur, gemina ab utroque latere sunt, & vnus nervus utrobique a singulis paribus in anteriora procidit, & vnus item utrobique retrorsum. Atque haec series in hominibus visitur. In simiis vero & canibus ut tria tantum in illis sacri ossis nervorum sunt paria, ita etiam duo solum inferiora anterior & posterius excidunt. ¶ Dein reliqua paria, quae in canibus & caudatis simiis cernuntur numerosa, ab ossis coccygis lateribus in eum modum prodeunt, quo ex thoracis & lumborum vertebrae nervi egrediuntur, quum interim ab hominis osse coccyge, ne vnus quidem exiliat nervus. ¶ Quod adiciendum esse duximus propter Galenum, qui in libro de ossibus capite vndecimo & duodecimo secus quam nos hoc loco de horum nervorum paribus loquitur. ¶ Quinque igitur sacri ossis inferiora paria nervos in posteriora excidentes ad musculos potissimum digerunt, qui ilium ossis & sacri ossis posteriorem occupant sedem, ex quorum classe in dextro latere musculus dorsum mouentium vndecimus, ac dein decimustertius, praeter membraneum initium in musculi brachium ad dorsum humiliora agentis, & quartum humani thoracis motorum. ¶ Item quatuor primi femur mouentium, ac cutis denique clunibus obducta, quae ipsa quoque propaginibus aliquot ab illis nervis donatur. ¶ *Anterioris* vero nervi varie magis digeruntur. Siquidem tres superiores, primi paris modo in crus, uti in capite quod sequitur dicemus, properant. Duo autem humiliores nervi, qui sexti septimique parium propagines sunt, in ani musculos digeruntur. ¶ Ad haec in vteri cervicem frequenti sobole, uti etiam in virorum vesicae cervicem penemve, pertinent. ¶ Nam vesicae ac vteri item fundum plerumque nervulos ab illis mutuantur ramis, quia sexto pari nervorum, cerebri costarum radicibus sub tunica costas succingente exporriguntur. ¶ Terminus vero spinalis medullae ex sexto sacri ossis procidens osse, nervi ritu haud quaquam digeri videtur, quanquam a nonnullis hic nervus coniuge carens vocatur. In homine tamen cuius sacrum os quinque tantum efformatur ossibus, interdum medullae spinalis terminus ab osse procidens vnum, & utrinque diffundit surculum hac ratione sexti paris sacri ossis vices supplens.

Nervorum femur, tibiae, & pedem advenantium distributionis ratio. C A P. XXIII.

Quatuor
nerui cruris
petunt.

Primi nervi
series.

CRURI iuxta femoris initium a spinae medullae lumborum vertebrae & osse sacro complexae nervorum paribus, quatuor nervi offeruntur, a reticulari quodammodo plexu perinde procidentes, atque praecipuos brachium petentes nervos iam antea relatum est: quanquam magis varius in cervice, quam hic ad lumbos sacrumque os implexus visitur. His nervis non eadem obtigit crassities multoque minus per series & ductus. Qui enim primus ac tertius recensentur, graciles sunt: secundus autem duobus illis crassior subinde reperitur, licet interea tenuis quoque sit. ¶ Quartus vero illorum trium vna complexorum crassitiem vincit, Primus a suprema parte implexus nervorum in crus peruenientium originem ducit, ubi tertii lumborum paris, quod ordine vigesimum secundum est, anterior ramus vigesimo tertio pari commiscetur. ¶ Nervus hic lumborum incumbens carnibus, ac peritonaeo substratus, in femur procidit secundum exterius latus tendinis sexti femur mouentium musculi, qui

vna

A una cum septimo femoris motuum auctore musculo supra coxendicis os ad minorem femoris processum contendit. Simulatque vero nervus ille femur contingit, ramum depromit cuti paulo minus quam ad genu usque exprorectum, quæ anteriori femoris sedi versus externum ipsius latus obducitur. ¶ Porro maior præsentis nervi portio in alto latitans, aliquot propagines deriuat primo tibiam mouenti musculo, dein & septimo tibiam mouenti musculo, mox quoque in nonum tibiam motuum auctorem, atque cum illis duobus musculis primi huius nervi grandior portio declivis ducta, e latius quam genu consistat articulus terminatur. ¶ *Secundus nervus* suum principium inferius quam primus adipiscitur, e regione videlicet vigesimi secundi paris nervorum spinalis medullæ, seu e regione articulationis tertiæ lumborum vertebræ cum

Secundi
nervi se-
ries.

B quarta. ¶ Hic nervus peritonæi posteriori regioni etiam subtenus, simul cum vena, & arteria per inguinæ femur petentibus in crus porrigitur, ac mox ab interno ipsius lateris ramum deriuat venæ ad pedes usque pollicem attensum, quam ab inguine per internam femoris sedem, ac per genu articulum internamque tibiam regionem sub cute ad lumen usque pedem protendi dictum est. ¶ Atque ut illa vena varias soboles in progressu ad cutem illi conterminam diffundit, ita sane & hic secundus crus petentis nervi ramus anteriori venæ illius sedi toto ductu contiguus, soboles passim in cutem spargit: inter quas illa est præcipua, quam anteriori genu regioni offert, in eius sedis cutem frequenti ramorum serie disseminatam. ¶ Neque hic omissum obaudiendum est, præsentem ramum anteriori venæ parti exporrigi, ut scilicet in eius venæ sectione,

C quæ mox sub genu, aut iuxta interiorem malleolum molimur, scalpellum retrorsum atque in posteriora impingamus, ne is casu antrorsum actus nervum præsecet. ¶ Ceterum grandior secundus nervi portio simul cum vena, & arteria reconditur, & in musculos anteriorem femoris sedem occupantes quoque digeritur, præcipue autem in quintum mouentium femur, & in octavum tibiam mouentium, cum quo etiam secundum latus internum noni tibiam mouentium musculi deorsum fertur supra genu articulum, non minus quam primus nervus cessans, & in progressu membranulis vasa colligantibus exiguas porrigens soboles. ¶ *Tertius nervus* secundo succedit, illic enatus ubi quarta lum-

Tertii ner-
vi series.

D repens. ¶ Verum priusquam foramen id superat, nono & decimo femur mouentibus, musculis ramulos porrigit: mox vero & illis musculis qui a pubis osse pronati prius peculiare censentur. ¶ At ubi paulo demissius prorepserit, duorum nervorum quos iam descripsimus ritu ramum emittit cuti oblatum, quæ internam femoris sedem iuxta inguinæ occupat. ¶ Dein eius nervi reliquum ramum offert secundo tibiam mouenti musculo, ac dein quinti femur mouentis musculi portioni a pubis osse pronatæ ramum deriuat, supraque medium longitudinis femoris terminatur. ¶ *Quartus cruris nervus* ter-

Quarti ner-
vi series.

E tio quidem ortu subsequitur, at sextuplo etiam crassior est, atque ex vigesimi quinti ac trium succedentium parium anterioribus ramis potissimum constituitur: non solum omnium nervorum crassissimus, verum etiam quum hinc a spinali medullæ termino

principium obtineat, durissimus, pariterque validissimus. ¶ Hic nervus peritonæo quoque subditus inter sacri ossis latus, & ilium os, quæ hæc ossa inuicem dehiscent, tanquam per sinum ipsi peculiariter paratum ducitur, & mox ramum ex posteriori ipsius sede deriuat, qui aliquousque sub primo femoris motorum latitans, tandem ad cutem procidit, soboles distributurus cuti inferiori clunium sedi obtensæ, & illi pariter cuti quæ posteriorem femoris ultra medium longitudinis femoris integitur. Cutis enim supra genu in posteriori femoris sede reposita, ab alia quarti nervi propagine ramulos obtinere mox docebitur. ¶ Postquam vero quartus hic nervus hunc ad cutem depromsit ramum, alias utcumque grandes distribuit soboles in musculorum capita dige-

F tendas, quæ a coxendicis ossis appendice principium ducunt, quorum tria tibiam motibus famulantur, ac tertium, quartum & quintum tibiam mouentes constituunt musculos: Quartum vero caput femoris motibus inseruit, quintumque femur mouentem musculum efformat. ¶ Quartus nervus hinc inter musculos posteriorem femoris sedem sibi vendicantes receditus, deorsum fertur, ac paulo sub medio longitudinis femoris ramum educit in quarti tibiam mouentis musculi partem a femoris osse, ac si peculia-

ris esset musculus, enatam. ¶ Ab hoc ramo propagines in cutem excurrunt humiliori A
sedi posterioris femoris regionis iuxta genu obductam. Simulatque quartus nervus
inferiorem femoris capitum radicem spectat, vtrinque vnam edit propaginem, in ca-
pita musculorum disseminandam, qui ab inferioribus femoris capitibus enati, tres
primi pedis motores enumerantur. ¶ Quando autem quartus nervus in sinu cōsistit,
quem duo inferiora femoris capita mutuo diremta efficiunt, in duos crassitudine in-
æquales truncos partitur, a quibus vniuersæ propemodum tibiæ, & item pedi nervi
offeruntur. Nullus enim in tibiā nervus procidit a quarto non diductus, præter ra-
mum secundi crus petentis nervi interiori femoris, & tibiæ & pedis quoq; sedi expor-
rectum. ¶ Exterior, qui & gracilior est, ad fibulæ cum tibiæ ossi iuxta genu articulum
prorepat inibi musculis offerendus. ¶ Priusquam autem penitus inter musculos trun- B
cus ille reconditur, propaginem diffundit externæ cuti tibiæ propriam, ac per exte-
riorem malleolum pedis externum latus adeuntem, atq; in progressu frequentes so-
boles spargentem. ¶ Ipse autem exterior truncus postquam nuper commemoratam
edidit propaginem, inter septimum & octauum pedem mouentes musculos primum
occultatur, etiā sexto pedem mouentium musculo attentus. ¶ Atq; inibi rursus mox
in progressu ramum educit, qui errabundo ductu in cutem dispensatur anteriori tibiæ
regioni obtensam. ¶ Quod vero exterioris huius trunci reliquum est, ad hūc modum
inter musculos anteriorem tibiæ sedem sibi vendicantes prorepens, illisq; musculis ra-
mulos offerens, ligamento incumbit, fibulam tibiæ ossi secundum totam tibiæ longi-
tudinem colliganti, ac vna tandem cum tendinibus digitos extendentibus sub trans- C
uerso huius regionis ligamento in pedis superiora ducitur, & penitus sub tendinibus
latitans, digitorum superiori sedi ramos exporrigit. Antequam tamen transuersum id
ligamentum subit, ramulum deriuat cuti intextum, qua ipsum ligamentum tegitur.
¶ At præter eum ramulum magnam sui portionem, sub medio longitudinis tibiæ per
membraneum transmittit ligamentum fibulam tibiæ colligans. Atq; hæc portio inte-
riori trunco quarti nervi permiscetur, quem pedis inferiora accedere mox dicemus.
¶ Interior vero quarti nervi truncus qui exteriori multo grandior est, inter capita pri-
mi, & secundi pedem mouentium musculorum in tibiā subiens, mox ramum dif-
fundit multiplici sobole in cutem digestum, quæ posteriori tibiæ sedi ad calcem vsq;
obducitur. ¶ Quanquam interea ramus ille non vniuersus in cutem absorberetur, ve- D
rum ipsius etiam portio inter quartum pedem mouentium musculum, & primum
quoque, & secundum tantisper fertur, quousq; tres illi muscoli vniantur. Nam & hic
quoque portio illa cutem adit. ¶ Ipse vero interior truncus in posteriorem tibiæ sedem
penitus prorepens, fertur inter quartum pedem mouentium musculum, & quintum
pedem mouentium, duosq; qui a tibia procedentes digitorum flexui præsunt. Hac
itaq; deorsum tendens, exterioris trunci propaginē assumit, huc per membraneū liga-
mentum transmissam. ¶ Quum vero hoc interioris trunci reliquum ad tibiæ vsq; hu-
miliora contendit, vna cum huius sedis tendinibus per transuersum ligamentum in-
ter calcem, & interiorem malleolum pedis inferiora petit, musculis inibi repositis dis-
tribuendum, ac singulorum digitorum inferiori sedi duos surculos oblatum. ¶ Ve- E
rum nervi musculis iis pedis potius attenduntur, quam innascuntur aut inseruntur.
¶ Porro præter hanc quarti nervi seriem, etiam subinde inuenies exteriorem trun-
cum priusquam pedem contingat cessare, multoque minus per membraneum liga-
mentum fibulam tibiæ ossi colligans, sui portionem interiori offerre. ¶ Imo ab inte-
riori trunco, quum posteriori sedi eius ligamenti exporrigitur, ramum educi ani-
maduerter, qui ligamentū id perforans deorsum fertur, inter musculos in anteriori se-
de conspicuum prorepens, superiori digitorum sedi ramulos communicat. ¶ Hacten-
us de Vesalii nostri sententia, ex quo ad verbum fere omnia hæc descripsimus, vt qui
ceteris omnibus Anatomicis non solum neruorum, sed & venarum, & arteriarum hi-
storiam rectius tradiderit, neruorum ortus, & insertiones commemorauimus, vt iam
nihil restet, quam vt huic nostro de humani corporis fabrica Epitomæ fi-

nem imponamus, rogantes simul omnes veritatis amantes,

vt laborem hunc nostrum & qui boni-

que faciant.

F I N I S.

D. N.

LEON. FVCHSII,
MEDICI ILLVMINATI,
SCHOLÆ TVBINGENSIS
PROFESSORIS PVBLICI, NEC
NON PRINCIPVM WIRTEN-
bergenſium Protophyſici,

Operum Didacticorum Pars II,

CONTINENS MEDICAMENTORVM OMNIVM
præparandi, componendi, miſcendique rationem ac modum legi-
timum, vſitatum, & e natiuis fontibus petitum,

*Ab Auctore ipſo paulo ante mortem, reſectis mendis & erroribus pernicioſis, reco-
gnita, aucta & locupletata, luculentiffimis que annotationi-
bus illustrata,*

CVM MEDICIS TVM PHARMACOPOEIS LONGE
vtiliffima, & ſumme neceſſaria,

Indice Rerum & Verborum ſatis locuplete donata.



PRODIT E COLLEGIO
Paltheniano, Quod eſt in nobili Francofurto.

M. DC. IV.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

500 EAST 57TH STREET

CHICAGO, ILL. 60637

TEL. 733-4331

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

OPERV M LEONHARDI FVCHSII Pars Secunda

DE VSITATA HVIVS TEMPO- RIS COMPONENDORVM MISCENDORVMQVE

Medicamentorum ratione, Liber Primus.

PRAEFATIO.



EXSTANT aliquot recentium medicorum de hodie vsita-
ta componendorum miscendorumq; medicamento-
rum ratione scripta, sed talia fere omnia, unde nullus plane,
aut saltem exiguus ad lectorem fructus venire potest. Nam
vel prodigiosa & distorta oratione ac barbarie prorsus sunt
defectiva & contaminata, vel nullo ordine contexta, vel im-
perfecta & manca, ita sane, ut horrido ac monstroso sermonis
genere offensus lector, ab eorum lectione resiliat, & quod rem-
nec orasne, nec perfecte tradant, prorsus abiiciat, & indigna
esse, in quibus multum opera ponat, iudicet. Quod quum ipse
mecum reputarem, opera pretium me facturum existimaui, si

Recentium
medicorū
de miscen-
dorum me-
dicamen-
torum ra-
tione scri-
pta quā-
liā.

scriptum aliquod, in quo ad eam rem cognitu necessaria omnia, tolerabili oratione, breuiter, & per-
spicue traderentur, pararem. Quod ut facerem, me non parum etiam hortabatur, quod intelligerem
eos, qui antea medicinam non exercuerunt, sed eam iam facere incipiunt, hac maxime parte pluri-
mum laborare, illisq; miscendorum ac componendorum medicamentorum rationē plurimum diffi-
cultatis parere, adeoq; indigere, qui eos quasi manu ducat. Quē certe si illis nō contingat, non raro in
miscendis medicamentis impingant necesse est. Proinde ut haberent quod ipsis quasi viam quandam
ad recte miscenda & componenda medicamenta strueret, hoc quaecumq; scriptum parare volui. Ne-
quaquam autem hac medicinā pars, quae recte componere medicamenta docet, negligenda erit, idque
duabus potissimum de causis. Primo quidem, quod hanc plerique morbi requirant, adeoquo
necessaria sit. Si enim contra singulos morbos simplicia haberemus medicamenta, in quibus nihil
omnino desiderarem, compositis medicamentis nō indigeremus. Nunc quia morbi & circumstā-
tiam multis modis componuntur fere fit, ut multo nobis opus sit apparatu. Hinc ars est inuenta, qua di-
uerse medicamentorum substantiae miscentur. Fit etiam, ut medicamenta non tantum ad morborū
profligationem, sed etiam ad sui conseruationem, aliorum opem requirant. Atq; hac altera est com-
positionis medicamentorum causa. Ut duplex sanē compositionis medicamentorum finis sit: Vnus,
quod morbi talem misturam desiderent: alter, quod alioqui medicamenta conseruari
nequeant. Ceterum vniuersum hoc opus in quatuor digessimus libros, ut non esset quod desiderare
vel medici, vel pharmacopaei possent. In horum quidem primo, simplicium medicamentorum, eorum
praecipue, quorum hodie in Seplassiis & medicorum officinis frequens est vsus, nomenclaturas, & ubi
opus fuit eorundem genera etiam & notas, ordine, ut speramus, optimo perstrinximus. Nisi enim
simplicium medicamentorum exquisitam quis habeat notitiam, ut composita recte construat fieri
haud potest. Ut enim domum struere nemo potest, nisi materias, e quibus hac constat, perspectas habe-
at: ita sane nullus componere medicamenta potest, qui non prius simplicium, veluti horum materi-
am, notitiam sibi parauerit. Ceterum formas & vniuersam simplicium historiam, ut hic attinge-
remus, neque necesse fuit, neq; conueniebat. Nam hac ratione liber ille immensam in molem abis-
set. Et quae ad hoc institutum pertinent, in tribus tomis, quos de stirpium historia inscripsimus,
plenissime docuimus: ad quos, eos, qui pleniorē tractationem requirunt, ablegamus. Deteximus ta-
men hic non paucos tum Medicorum, tum Seplassiariorum errores, quos in vsurpandis simplicibus
adulterinis haecenus commiserunt, & adhuc hodie (tanta est quorūdam impudentia & proteruitas)
committunt. Nōmina vero eorundem produximus ea duntaxat, quae optimis tum Graecis, tum Lati-
nis auctoribus recepta sunt: idque non alia sane de causa, quam ut hac ratione efficeremus, ut abie-
ctis tandem ac repudiatis barbaris & ineptis medicamentorum nomenclaturis, quibus hodie passim
(Medici & Seplassarii vtuntur, pro illis, Latinis, receptis, & perspicuis uti assuescerent. Neque enim
perpetuo illis cum balbis & indoctis pharmacopaeis balbutiendum & ineptiendum erit. Verum quum

Operis
usū.

Quā
primo li-
bro tracta-
tur.

Simplicium
cognitio
necessaria.

haud ignorarem, Latinas & proprias nondum omnibus esse cognitās: non piguit etiam barbaras, hodieque vsitatas, ubi necessitas ita postulare videbatur, adicere nomenclaturas. Non enim iis tantū, qui singula simplicia suis & Latinis nōminibus appellare nouerunt, vtrumetiam iis, qui per ignorantiam Græcæ & Latinæ linguae consuetis ac barbaris vti coguntur, inferuire volumus. Quippe studiorum nostrorum ratio sic comparata est, ut ea ad omnium commoditatem conferamus. Ut igitur imperitia pharmacopæorum prorsus consuleremus, Indicem quoque parari curauimus, in quo Latina & barbara voces ex aduerso posita essent, ut ad hunc in singulis compositionibus, in quibus Latinis vsus sumus nomenclaturis, confugerent, & quod illis simplex usurpandum esset, cognoscerent. Non solum autem simplicium medicamentorum nomenclaturas sed eorundem etiam collectionem, asservationem, præparationem, delectum & temperamenta in hoc primo libro obiter exposuimus: & præterea quæ ex iis singulares corporis partes iuuant medicamenta, nominatim indicauimus. Adiecimus quoque secundarum medicamentorum simplicium qualitatum commemorationem, Postremo breuem etiam purgantium medicamentorum hodie vsitatorum descriptionem subiiecimus, ac singulorum pondera & illorum vehementiam infrenantia medicamenta monstrauimus. Ut hinc pateat, hunc librum non solum medicis ipsis, sed & pharmacopæis, mire esse utilem. In Altero huius operis libro ponderum, quibus hoc tempore tum medici, tum pharmacopæi utuntur, & eorum medicamentorum omnium, quæ hodie in officinis medicorum prostant, conficiendorum ratio exponitur. Qui utiq; rectissime Medicamentarius liber inscribetur. Ita enim verius & Latinius, quam, ut vulgo solet, Dispensatorium nominabitur. Nam & veteres Græci eos libros, in quibus medicamentorum compositiones traduntur, *pharmakutikōs* appellarant. Atque is sane liber itidem ad utrosque, medicos nimirum & pharmacopæos pertinet. In Tertio compositorum medicamentorum, quæ intro in corpus sumuntur, construendi modus ac formula, eorundemq; miscendi hodie vsitata ratio docetur. In Quarto, eorum quæ extrinsecus corpori admouentur medicamentorum conficiendorum ratio monstratur. Hic ut etiam is qui eum præcedit tertius, ad medicos fere tantum spectat. Nihil igitur earum rerum, quas saltem ad rite miscenda & componenda medicamenta cognoscere tum medicos tum pharmacopæos oportet, omisimus, aut negligenter præteriuimus. Quinetiam passim, ubi necessitas postulauit, singulis medicamentis Annotationes adiecimus, ne imperitus lector in plerisq; hæverere posset. Proinde qui expeditè & vtiliter composita medicamenta construere, aut ea, quæ ab aliis composita sunt, dextere vsurpare velit, cum sane quatuor hos libros, quos de Compositione medicamentorum huius temporis vsitata inscripsimus, diligenter euoluere, & assidue in manibus versare oportet, præsertim pharmacopæos, ut tandem veteres suos errores non solum cognoscant ac discant, verumetiam dediscant, abijciantq; & ad meliorem frugem redeant.

Quid medicamentum, & quo a nutrimento distet, ac quotuplex sit medicamentorum natura. C A P. I.

Cum vniversa huius operis tractatio futura sit de medicamentis, ordinis utique ac methodi ratio postulat, ut primum quid sit medicamentum, & deinceps quotuplex eius natura, exponamus. Medicamentum itaq; Galeno lib. 1. Simp. cap. 1. & lib. 3. de Temperamentis teste, est omne id, quod naturam substantiamue nostri corporis alterare & immutare potest. Vel breuius, quod alteranda natura vim habet. Quocirca nutrimento plane aduersatur, atq; ut dici solet, illi ex diametro repugnat. Nutrimentum enim est, quicquid corporis nostri substantiam augere potest. Vel, quod augenda natura vim obtinet. Non augebit autem, nisi prius ab ea alteretur, illiq; assimiletur: iam dictis igitur definitionibus sua vtriusq; illorū naturæ proprietas rectissime explicatur, declaraturue. Ceterum natura medicamentorum quadruplex est. Siquidem vel nulla substantiæ suæ mutata parte, sed tota integraq; seruata vincunt, corpusq; ipsum afficiunt ac mutant, ad eum sane modum, quo id cibos. Atq; hæc prorsus grauiæ, & naturæ animalis corruptricia sunt, ideoq; Græcis *δυναμικὰ* hoc est, venenata, lethalia, seu mortifera dicuntur. Eiusmodi certe sunt, quæ frigiditate sua interiunt: veluti cicuta, mandragora, papauer, hyoscyamus, & id genus alia. Hæc autem non toto genere, hoc est, naturæ suæ contrarietate, adeoq; semper, humanæ naturæ aduersantur, ac lethalia sunt, sed sola quantitate. Nam horum quodque si exigua quantitate sumatur, nullam euidentem hominibus noxam infert, tantum abest ut mortem afferre queat: haud secus quam si copiosæ flammæ paucillum aquæ instilles, aut lignum illi iniicias humidum ac viride. Et si vero hæc ipsa toto genere, adeoq; quocunque modo sumpta non occidunt, sunt tamen nihilominus ex genere deleteriorum seu lethalium, quia magna quantitate sumpta interiunt. Neque utiq; eo minus genere le-

thalia

Quia in
saro.

Medica-
mentarius
liber.

Quia in
tertio.

Quia in
quarto.

Medica-
mentum
quid.

Nutrimi-
ntum
quid.

Medica-
mentorum
natura
quadruplex.
Præterea.

Sola quæ
interiunt
lethalia.

Athalia sunt dicenda, quod quum minima quantitate exhibentur, nullam sensibilem noxā inferūt. Sic nāq; neq; ignis ipse calidus sit, neq; nix frigida, oportet. Nam horum quoq; si quid prorsus exiguum est, nullum euidēs in corporibus nostris excitat pathos. Quippe centesima vnus scintillæ pars est quidem omnino genere ignis, ceterum adeo nos non vrit, calefacitue, vt corpori incidens, ne sensum quidem vllum sui exciret. Ad eundem modum frigida guttæ centesima portio non inodo nihil offendit, aut refrigerat, sed nec sensum sui vllum præbet. Nequaquā igitur sic iudicanda deseteria sunt, sed totius naturæ suæ contrarietate, vt *fusus Galenus lib. 3. de Temp. cap. 4. & libro 3. de Simplicium med. facul. cap. 17. 18. & 19. ostendit.* Secunda medicamento: um species seu natura eorum est, quæ vbi mutationis initium ab animalis corpore consecuta fuerint, subinde putrescunt, ac corrumpuntur, vnaq; corpus ipsum corrumpunt ac putrefaciunt. Eiusmodi sunt quæ erodendo putrefaciendoq; interimunt medicamenta: vt sunt, *auripigmentum, aconitum, cantharides, chrysocolia, & iis similia.* Sunt autem toto quidem genere lethalia, hoc est, naturæ suæ contrarietate interimentia, adeoque in genere eorū quæ secundum naturam sunt, numerari non possunt, quandoquidem minima etiam quantitate sumta erodunt, putrefaciunt, & corrumpunt: nisi vna cum excrementis, priusquam iniuria afficiant corpus, excernantur: aut eibus, aut aliis quæ vim eorundem obcundunt, mixta fuerint, quemadmodum copiosius *lib. 3. de Simplic. medic. facultatib. cap. 20. 21. & 23. Galenus monstrat.* Tertia medicamentorum species eorum est, quæ corpus quidem calefaciunt, mali tamen nihil adferunt. Talia quidem sunt, *absinthium, organum, abrotanum, & id genus alia,* quæ sunt potestate calida. Quarta species eorum est medicamentorum, quæ agunt & patiuntur aliquid, sed spatio temporis plane vincuntur. His porro accidit, vt tam medicamenti quam nutrimenti rationem habeant. Quatenus autem medicamenta sunt, eatenus corpus nostrum afficiunt & alterant: quatenus vero nutrimenta sunt, eatenus in corpus nihil plane agunt, sed ab illo alterata ac prorsus ad similitudinem calorem naturalem augent. Eiusmodi sane est lactuca, vt *lib. 3. de Temp. cap. 5. Galenus fufius ostendit.*

Quid sit Medicamentum simplex, & eiusdem diuisio. CAP. II.

Quam in primo huius operis libro simplicium medicamentorum ratio aliqua ex parte nobis explicanda veniat, principio quid sit medicamentum simplex, & quos sint eiusdem genera, nobis exponendum erit. Medicamentum igitur simplex, collatione ad compositum nuncupatum est. Neq; enim simplex est, nisi id quod immixtum, & syncerum est. Aut quod tale est, quale ipsum natura produxit. Proinde simplex medicamentum, *Galenus lib. 1. de Simplic. medicam. facultatib. cap. 1. refert, est, quod natura sua syncerum, & a mixtura alterius medicamenti alienum est.* Natura vero hic nihil aliud, nisi substantiam seu essentiam significat: ita vt verborum Galeni is sit sensus: *Medicamentum simplex est id, cuius substantia syncera est, & cum alterius medicamenti substantia non commixta.* In hanc sententiam idem Galenus *cap. 4. iam citati libri,* exquisitè ac sincere aquam vocat eam, quæ alterius substantiæ mistione vacat. Quod ideo esse adiiciendum duximus, ne imperiti variarum vocis naturæ acceptionum, adeoq; parum æqui iudices, sibi pugnantia docere Galenum existimarent, dum is *libro 3. de Simplic. medic. facul. cap. 13. scribit, omnia propemodum medicamenta, licet sensu simplicia appareant, natura tamen esse composita.* Eo namq; in loco natura non significat substantiam seu essentiam, vt in priore, sed potius facultatē. Quapropter is est verborum Galeni sensus: *Tametsi medicamenta propemodum omnia sensu simplicia esse apparent, adeoq; cum aliis substantiis minime commixta, tamen facultate naturæ composita sunt.* Verum, ne quis tergiversari possit, ac dicere, naturam hoc loco non idem quod facultatem denotare, Galeni testimonium producemus, qui eodem in loco seipsum interpretatur, ac perspicue naturam non nisi facultatem significare monstrat, inquires: *Quin & subinde compositas, easq; diuersissimas in se facultates continent.* Simplicia vero medicamenta fere omnia, compositas ac diuersas plane in se habere facultates, in eo quod ibidem mox sequitur capite, brassicæ, lenticulæ, conchularum, & multorum aliorum medicamentorum exemplis ostendit. Neque hoc solum in loco Galenus naturam pro facultate usurpat, sed multis etiam aliis, præsertim *lib. 2. de Sympt. causis, cap. 1. vbi hanc pro facultate sumi manifestis testatur verbis.* Ceterum alii succinctius medicamentum simplex ita definiunt. *Est quod a natura eiusmodi productum est, & cui nulla alia aliunde, aut*

Obiectio diluitur.

Secunda.

Toto genere lethalia.

Tertia

Quarta

Simplicia

Natura

Galenus a pugnantia vindicator. Natura

Medicamentum

menti sua *nostra opera, substantia accessit, & admista est.* Hæc aut cum priore in idem plane recidit. **A**
 plicis alia Nonnunquam vero medici improprie simplicia medicamenta vocare consueverunt,
 definitio. quæ reuera composita sunt: idq; non alia sanè de causa, quam quod paucioribus con-
 Simplicia medica stant medicamentis simplicibus, quam alia eiusdem generis composita. In hanc senten-
 menta improprie di tiam diatrion pipercon, quod reuera compositum est, simplex Galeno *lib. 4. de tuenda sa-*
 eta. *nitate, dicitur.* Sic Actuário, Nicolao, & aliis, Oxymeli simplex & compositum, & alia per-
 multa vocantur simplicia. Igitur simplicia medicamenta proprie loquendo illa dunta-
 xat nominantur, quibus nulla aliunde, vel a nobis mistio accessit, non obstante, quod ex
 qualitatibus & facultatibus diuersis consent. Quæ vero minus composita sunt ceteris
 eiusdem generis, *καλὰ ἁπλῆς* etiam simplicia interdum appellantur.

Quæ ad recte componenda medicamenta necessaria sint. CAP. III.

QUum iam nobis clare expositum sit, quid compositi medicamenti nomine intelli- **B**
 gendum veniat, restat vi nunc, *quæ ad recte & legitime componenda medicamenta præcipue*
necessaria sint, explicemus. Quamquam autem hæc res late pateat, nec breuib; sat dici
 queat, tamen quum hodie munus componendi medicamenta totum sit in manib; ho-

minum quorundam, magna ex parte rudium & imperitorum, quos *pharmacopolas* no- **C**
 minant, ea saltem perstringemus, quæ in illis maxime requiruntur, & septenario nume-
 ro complectuntur. Principio namq; quæ medicamentorum componendorum sibi lu-
 1. Vniūsq; munt provinciam, ii minimū vtriusq; linguæ Latinæ nimirum & Græcæ, cognitionē
 linguæ pe- habeant, si non exquisitam, quam profecto in eis non requirimus, sed tantam saltē, quæ
 tiū sint. illis ad intelligēdos in Latinam linguam cōuersos materiæ medicæ scriptores, Diosco-
 ridem, Galenum, Serapionem, Mesuen, & Auicennam sufficiat, & quæ ad cognoscen-
 das Græcās voces, quæ in eorūdem officinis adhuc remanserunt, & hodie v̄sitate sunt,
 illis satis sit. In summa, Grammatices saltem præcepta probe teneant, si vltra progredi
 nequeunt. Quantum enim ea in parte omnes hætenus laborarunt, notius est quam ve-
 pluribus a me dici debeat. Quirigitur etate iam prouecti sunt, ac ita consenserūt, vt di-
 scere linguas nec velint, nec possint, id saltem agant, modo Christiani dici & haberi, &
 de omnibus bene audire velint, vt ministros non tantum sedulos, verum etiam doctos
 habeant. Et si hac in parte non præstent quod ab illis postulatur, magistratus officium
 erit, vt seueriter constituat eorundem ministros examinari, nec vllum admittat, nisi in
 quem antea diligenter a medicis est inquisitum. *Secundo loco,* vt exquisitam simplicium **D**
 medicamentorum notitiam habeant, eorum potissimum, quibus in componēdis me-
 dicamentis hodie v̄sitate, quotidianus v̄sus, esse solet, necesse est. Quæ quidem in re
 plurimum illis adiuuenti conferēt, Theophrastus & Dioscorides, nostriq; quos *de stir-*
pium historia conscripsimus commentarios, in quibus initio eorundem nomina, & cur
 ita denominata sint, dein genera, formam, locum, tempus, temperamenta, ac faculta-
 tes ipsorum diligenter & copiose explicauimus, adiectis singulorum iconib; artificio-
 sissime expressis atq; depictis, ita vt nihil quod ad illorum plenam cognitionem requi-
 ritur, desiderari ab ipsis possit. Non vero satis erit pharmacopœis, vt simplicium legiti-
 mam habeant cognitionem, sed vt ea, quæ cognouerunt, rite colligant, tertio loco ab i-
 3. Rite col- p̄s requiritur. Siquidem nisi id accurata diligentia præstent, ad v̄sum medicum parum **E**
 ligant sim- idonea & efficacia medicamenta simplicia reponent. *Quarto loco,* vt ea quæ rite ab ipsis
 plicia. collecta sunt, ita asseruent, ne situ & squalore, aut alia de causa putrescant, viresq; suas
 4. Probe amittant, & omnino pereant, oportet. *Quinto loco,* vt ex iis quæ collegerunt, non nisi
 collecta as- quæ optima sunt, ad v̄sum medicum deligant, necessum est. Eum quoq; delectum eos
 seruent. in v̄sum. in coemendis peregrinis adhibere oportet, vt scilicet in ipsorum officinis nihil venale
 5. Delectū pliciu ad- proster, quod non sit optimum, aut saltem minime adulterinum & suppositiuum. Non
 abeant. est igitur vt pharmacopolæ, qui officinam instruunt, in hanc tantum curam incūbant,
 vt vascula auro & argento incrustata, variēq; picta habeant, vt quæ plus ad ostentationē
 quam ad necessitatem faciunt, quod vulgus officinas has tantum admiretur, verum id
 studeant vt superfluas & inutiles has impensas, ad comparanda optima medicamenta
 infumant. Hac namq; ratione tum sibi, tum ægrotis melius consulent. *Sexto loco,* vt iis **F**
 medicamentis quæ id postulant, præparationes suas, quo suauiora palatoq; gratiora fi-
 ant, vel melius conseruari, aut compositionibus misceri queant, adhibeant. *Septimo &*
ultimo loco, vt iis omnibus factis, ea ita ordine disponāt, vt omnia ad manum sint, & ex iis
 recta

3. Simplicium cognitionem habeant.

3. Rite colligant simplicia.

4. Probe collecta asseruent.

5. Delectum in vsum pliciu adabeant.

6. Præparatione quibus oportet adhibeant.

A recta ad scopum, quem sibi Medicina præfixum habet, collimetur, nimirum ut ægro profint ad sanitatem, ne quid pro quo utendo patiens in extremum vitæ periculum incidat. Singula itaque norit, quo in loco tutius & incolumius seruari possint. Nō enim omnia vno in loco salua simul esse possunt: sed hoc loco calidæ, alio frigidæ, alio humidæ, iterum alio siccæ, pro varietate conclauū, aeris, ventorum, fumorum, qui omnino abesse debent, seruari medicinz simplices postulant.

B Porro simplicium differentiz colliguntur a rebus, vnde illa proueniūt. Quædam enim a stirpibus & arboribus sumuntur, ut sunt *arborum & herbarum folia, flores, semina, fructus, radices, succi pradenſi concretive, liquores gummi, cortices, ligna*. De quibus omnibus, præter Dioscoridem, Galenus etiam priuatim & copiose a lib. 6. *Simpl. med. usque ad nonum pertractat*. Quædam ab animantibus petuntur, ut sunt *pinguedines, ossa, medulla, carnes, pili, partes, excrementa, sanguis, & lac*. De quibus omnibus lib. 10. *de simplicium medicamentorum facultatibus* Galenus abunde scribit. Nonnulla e venis & latebris terræ sumuntur: ut sunt *metalla, lapides, gemmae & terra diuersæ species*. De quib. lib. 9. iam citati operis Galenus copiose pertractauit. Aliqua vero a mari & aquis, quæ tamen animalium e genere non sunt, proficiſcuntur. De quibus lib. 11. *simpl. medic.* Gal. differuit, idque in eiusdem fine. Hanc simplicium medicamentorum diuisionem, qua lib. 1. *de compos. med.* generalium Galenus quoque vluseſt, ut studiosi rectius intuerentur, in breue hoc digessimus schema, quod subiecimur.

C	Stirpibus & arboribus, quarū hæ sunt partes,	Folia.	Flores.
		Gemma.	Fructus.
D	Animalibus totis, vt sunt,	Rami.	Surculi.
		Radices.	Succi.
E	Simplicium medicamentorum materiæ sumuntur, vcl a	Liquores.	Gummi.
		Resina.	Cortices.
F	Parribus animalium, vt	Stipites.	Ligna.
		Vulpes.	Cancr. Mumia.
	Excrementis animalium,	Hirundo.	Ostrea.
		Lumbrici.	Cantharis.
	Terræ latebris,	Buccina.	Purpura.
		Limaces.	Galerita.
	Mari & aquis.	Pinguedo.	Adeps.
		Medulla.	Sanguis.
		Coagulum.	Oua.
		Lac.	
		Senecta serpentis.	
		Cerebrum leporis.	
		Cornu ceruinum.	
		Vnicornis	
		Vngues caprarum, asinorum.	
		Glutinum tauri.	
		Tunica interna ventriculi.	
		Stercus canum, luporum, puerorum, caprinum, columbinum, asinum.	
		Fel.	Vrina.
		Sudor.	Salua.
		Pili.	Lana succida.
		Metalla	
		Lapides.	
		Gemma.	
		Terra.	
		Sales.	Spuma salis. Succinum.
		Bitumen.	Adarce. Pissasphaltos.
		Spongia.	Garum.
		Muria.	Alcyonium.

6 Operum Leonhardi Fuchſii Pars II.

Collectio-
nis ſtirpū
tempus.
Stirpes.

Flores.
Fructus.
Semina.
Lac.
Radices.

Stirpes fere cum floribus colliguntur. Collecta ſiccantur in vmbra potius, q̃ ſole, ne huius calore vires earū extoluant: niſi caule ſint craſſiore, aut folio humidiorē, adeoq; vt putrefcant idoneæ. Vbi probe ſunt exſiccata; loco nō fumato, non humido, non puluerulento, ſed ſublīmi, puro, & arido reponuntur. Et quū diu ſeruari herbæ vix queant, conſiliū eſt, vt quotannis mutantur. *Flores* tamē priuatim antea q̃ ſponte ſua decidunt, decerpenti ſunt: fructus, vbi maturuerunt: ſemina, vbi ſiccari cœperint, & priuſquā defluant. Herbarum ſuccus & foliorum elici debet, germinantib. tum primū cauliculis. Lac & lachrymæ excipiuntur, incifo per ſumum adoleſcentiæ vigorem caule. *Radices* & cortices eximere cōuenit, quum herbæ ſuis foliis exſuuntur. Siccātur prius expurgatæ, & a luto & puluere elūtæ. Reconduntur autē flores, & omnia quæ iucundum odorem efflant, articulis ſiliaceis, nullo ſitu obductis. Nonnunquam carta aut foliis ſemina, vt perennent, apte inuoluuntur. Liquidis medicamentis denſior materia argētea, vitrea, plumbea, aut cornea conuenit. Fiſtilis etiā, ſeu reſtacea, modo non ſit rata, in hūc vſum probatur. Ligneæ, quæ ex buxo parantur vaſa quoq; conueniunt. *Aenea* vaſa oculariis medicamētis, & liquidis, omnibuſq; iis quæ aceto, picē liquida, aut cedria componuntur. Adipem autem & medullas, vaſis e plumbo albo confectis reponere conuenit.

De ſtirpibus & arboribus. C A P. IV.

Pharmacopolarū
er-
ratum.

A *Brotonū* geminum eſt, mas & fœmina. Mas vulgaris eſt, ac cognita omnibus, ideoq; omnibus in officiis proſtat. Fœmina paucis agnolcitur, & quæ ſub eius nomine a pharmacopœis hodie venditur, adulterina eſt, & abſinthii Pontici genus, vt in 1. *tomo noſtrorum de ſtirpium hiſtoria luculentis argumentis oſtendimus*. Ibidem ſtudioſi vniuerſam quoque Abrotoni fœminæ tum hiſtoriam, tum imaginem affabre expreſſam inueniēt. Vtriuſque coma & floribus vtimur.

Nota.

Abſinthii multa ſunt genera, vt loco iam citato monſtrauimus, vbi autē apud veteres abſinthii mentio incidit, non vulgare & quod omnibus notum eſt, vſurpandum erit, ſed Ponticum: quod non eſt niſi id, quo haſtenus Seplaſiarii pro abrotono fœmina, vt diximus, ad ſua medicamenta vſi ſunt. Comam tantum cum floribus ad medicamentorum confectionem adhibemus. Santonici tamē ſemine ad enecandos vermes vtimur, quod ob id pharmacopœi *ſemen lumbricorum* appellant.

Error phar-
macopœo-
rum.

Acanthus vel *Acantha*, officiis Germanicis nō agnoſcitur. Quam n. illæ Brancæ vſi-
nam appellant, veterum *Acanthus* nō eſt, ſed Sphondylium potius ſylueſtre: q̃ nos alibi
euidentiſ. argumentis monſtrauimus. Vera igitur in vſum medicum reuocāda erit,
poſthabita & abiecta adulterina. Hiſtoriam vero & imaginem pictam in 1. *noſtrorum de*
ſtirpium hiſtoria comm. tomo pharmacopœi inuenient. Vtimur tum foliis, tum radice.

Acetabulum geminum eſt. Vnum, q̃ Vmbilicus Veneris, & Cymbalaris, a foliis in ace-
tabuli modū orbiculatis, & in euidenter cauis dicit̃. Hoc noſtris officiis adhuc ignotum
eſt. Alterū, vulgo & Seplaſiis *Craſſula maior* vocatur. eſtq; q̃ paſſim ſcil. naſcitur, omnib.
cognitum. Vtimur foliis, ſemine & radice. Vtriuſq; pictura eſt in noſtris commentariis.

Error Sepla-
ſiarii.

Adianti duo genera officiis medicorum hodie innotescere cœperunt, ſed ſub no-
mine Capilli Veneris, candidum nimirum, & nigrum. Errant autē pharmacopœi plu-
rimum, qui pro *Adianto*, vel vt ipſi appellant, *Capillo Veneris*, herba vtūtur quæ *Ruta mura-*
ria nominatur, vt alibi fuſius diximus.

Agnus, quod Latinis non eſt niſi caſta: ſic enim Græcis vocatur hæc herba, q̃
ad caſtitaſem plurimum conferat. *Vitex* Latinis dicitur. Vulgo medicorum & Seplaſiis
Græca & Latina iunctis vocibus, nō ſine riſu eruditorū, *Agnus caſtus* appellat̃. Foliorum,
florum, & ſeminis vſus eſt. Noſtræ tamē officinæ ſemen tantum venale exhibent.

Seplaſiario-
rum erratū.

Adinga, ſive *Abiga*, & *Ibiga*, quæ veteribus dicta eſt herba, & poſtea abiectis duab. literis
b & g, *Iba*, hodie mutatione b in v, *Iua* Seplaſiis & Medicis nuncupatur. Alio nomine
Chamepitiſ vocatur, quaſi *pumila & humi naſcens pinus*. Multi in Germania pharmacopo-
læ pro *Iua*, non ſine maximo errore vſurpant herbam, quæ *Sideritiſ* eſt ſpecies. Coma
cum floribus & ſemine vtimur.

AEra Græcis, *Loliū* Latinis nominatur. Germanicis officiis nec cognitū, nec vſita-
tum. Præſtaret autē, pp veterum auctoritatem, qui illo creberrime vſi ſunt, eſſe vſitatiſſi-
mum. Quare operam dabunt, vt in vſum reuocent loliū Seplaſiæ: q̃ facile poterunt,
ſi hiſtoriam & imaginem eius pictam in noſtris Commentariis traditam intuebuntur.

Alſine, vulgo & officiis *Morſus gallinæ* dicit̃: eius multa ſunt genera, q̃ alibi demōſtra-
uimus.

Althea,

A *Althea*, alio nomine *Ebiscus* & *Ibiscus* appellatur. *Seplasis Bismalua*, & *Maluaniscus*. Foliorum, seminis & radicis vsus esse debet.

Amarantus multorum est generum, sed ex illis vnum duntaxat, nempe luteū, *Seplasis* cognoscitur, & *Strichas citrina* nominatur. Coma & florū luteis corymbis vtimur.

Anagallis trium est generum. Duo autē nempe puniceum & cærulæum, passim proueniunt. Nullus vero est prorsus in nostris officinis *Anagallidum* vsus: quod reprehensione non vacat. Nam quum mira earūdem sit facultas & vtilitas, expedit, vt in vsū quotidianum reuocentur.

Anethum nulli non cognoscitur. Vtendum coma, floribus, foliis & semine.

B *Anonis*, siue *Ononis*, vulgo *Resta bouis* nominatur. Trium est generum, purpureum, luteum, & candidum. Debet etiam huius stirpis aliquis esse in *Seplasis* vsus. Nam illam hæcenus, vt alias multas vulgares, supra modum tamen viles, neglexerunt, peregrinas interim & incognitas vsurpantes.

Anthemis etiam multorum est generum, tamen vnicum tantum, nempe quod *leucanthemon*, *chamæmelum* Latinis, vulgo *Chamomilla* dicitur, *Seplasis* cognitum & vsitatum est. Eius coma & flores vsurpant medici.

Apium satiuū est id, quod vulgo *petroselinum* nominatur. Vtimur foliis & semine. Quod igitur *Seplasię* hodie pro *Apio* vtūtur, nō est nisi *Elæoselinon*: quod alibi abunde ostendimus.

C *Artemisę* plura sunt fastigia: *ramosa* & *vnicaulis*. *Ramosa* iterum in geminas partitur species, *fruticolam*, & non *fruticolam*. *Fruticosa* est, quæ in hodiernum vsque diem in officinis *Artemisę* nomen retinet. Non *fruticosa*, quod eximie morbis vteri conferat.

Matricaria, Medicis & Pharmacopœis nominatur. Aliorum generum nostratibus officinis nullus est vsus. Vtimur coma cum floribus.

Asplenon *Seplasis* *Ceterach* dicitur. Vfus est eius foliorum duntaxat.

Atriplicis duo primaria sunt genera, *latua* & *syluestris*. Foliorum & seminis vsus est.

Balsamita officinarum non est nisi *Sisymbrium* Græcis simpliciter appellatum. Vfus est foliorum & florum.

D *Betonica* coronaria gemina existit, *altilis* & *syluestris*. Officinæ detritis duabus prioribus literis, & mutatione o in v, *Tunicā* vocant. Vtuntur autē *altili* duntaxat, eius flores & radices ad medicamentorū compositiones vsurpant. Est & *betonica* altera nō coronaria dicta ad prioris differentiā, quæ priuatim Græcis *Cestros* vocatur. Duū generum existit, *purpurea* & *alba*. Prior tantū *Seplasis* vsitata. Vtuntur autē coma cum floribus.

Beta duum est generum, *alba* & *nigra*. *Alba* in purgandis per nares cerebri humoribus valentior. Foliorum succi, & radicis vsus est. Confundūt nostræ ætatis Medici *Betam*, non sine maximo errore, cum *Blito*. nam *Bletam* vocant adiecta literal, quæ *Beta* illis dicenda erat. *Blitum* autem a *Beta* diuersum esse, sciunt omnes, qui vel leuem simplicium medicamentorum notitiam habent.

Branca vrsina. vide *Acanthus*.

E *Brassica* hortensis & esculenta multarum est specierum, vt alibi ostendimus. *Seplasis* caulis appellatur.

Brassica marina est, quæ hodie officinis medicorum, *Soldanella* nominatur. Folia eius in puluerem redacta, & ex succo ac liquore aliquo conueniente hausta, miram in aqua inter cutem sananda efficaciam præbent.

Buglossum veterum est herba, quæ *Seplasis* & vulgo *Borrago* nuncupatur. Hodie Medici & Pharmacopœi floribus duntaxat huius herbæ vtuntur, quum, *Nicolai Myrepsi* exemplo, foliis etiam & radicibus vtendum esset.

Buglossę officinarum. vide *Enchion*.

F *Buphthalmum* *Seplasis* *Cotula* non fœtida vocatur. Pauci vero sunt qui hanc hodie recte agnoscunt, quum propemodū omnes *Chamæmelum* *Chrysanthemum* pro ea vsurpent. Effigies veri *Buphthalmi* in nostris Commentariis de stirpium historia existat.

Bursapastoria, vel *Pastoris bursa* hodie vulgo dicta veteribus, quod sciam, non fuit cognita. Ob insignes tamen suas, quas in constringendo habet vires, in frequēti medicorum vsu esse meretur. Foliis autem cum semine vtendum.

Caalmintha Latinis nominata, *Seplasis* *Calamentum* appellatur. Eius plura sunt ge-

8 Operum Leonhardi Fuchſii Pars II.

Capnos
Plinii.
Aristolochia
rotunda officina-
rum.

nera: altera tamen duntaxat nostrates officinæ vtuntur. Coma cum floribus vtendum. A

Chamamelum. vide Anthemis.

Capnos & *Capnios*, Latinis *Fumaria*, Sepalsiis autem *Fumus terra* nuncupatur. Atque hæc est, quæ Dioscoridi pingitur. Altera est, quæ a Plinio describitur, & tum Medicis quibusdam, tum officinis *Aristolochia rotunda* nuncupatur, manifeste repugnantibus foliis, quæ minime sunt hederacea, vt alibi copiose admodum demonstrauimus. Vſus foliorum & seminis duntaxat prioris, alterius vero etiam radicis.

Carduus benedictus. vide Cnicus.

Cassutha recentiorum Græcorum, Sepalsiis *Cuscuta* nominatur.

Centaurium est geminum, maius & minus. Maius officinis *Raponticum* hodie nominatur, vt infra fusius docebimus. Minus suam retinet appellationem, & *Centaurea minor*, in aliud genus deflecta voce appellatur. Maioris radice duntaxat vtuntur officinæ. Minoris coma cum floribus.

Chamadrys multarum est specierum. Præstat vti ea, quæ passim haberi potest, modo adulterinam pro vera non vsurpemus. Vtimur coma cum floribus.

Chamalea Sepalsiis *Mezereon* nominatur. Paucis autem hodie vera *Chamælæa* cognoscitur. Seminata quidem nobis est aliquoties, verum nunquam prodiit. Quæ stirpe hodie nostrates officinæ pro *Mezereon* vtantur, paulo post exponemus.

Chamæpitys. vide Aiuga.

Cichorium, officinis *Cicorea*, Latinis *Intybum sylvestre* dicitur.

Cicuta venenata & lethalis est herba. Vtimur eius semine, sed extrinsecus ad moto.

Cnici duo sunt genera, latius & sylvestris. Satiua Sepalsiis *Cartamus*, vulgo *Crocus sylvestris* nominatur. Sylvestris duas partitur in species. Vna est leuis & mitior, quæ officinis non cognoscitur. Altera hirsuta, quæ Sepalsiis *Carduus benedictus* appellatur.

Chelidonium duū est generū, maius & minus. Maius passim nascit, & nulli non cognitum est. Minus iudico hodie esse omnib. ignotū. Herba enim quæ vulgus medicorum *Scrophulariā* minorē vocant, *Chelidonium* minus nō est, q̄ nullam pene acrimoniam, & rā exilē vt sensui fere nō occurrat: sed est potius altera *Malacocissi* species, vt alibi a nobis ostēsum est.

Cynoglossa
officinarū.

Cynoglossum officinarum non est id, quod Dioscorides & alii veteres pingunt, sed potius ea herba, quam illi *Lycopsis* nomināt. Reuocandum igitur in vſum Medicum veterum *Cynoglossum*, cuius quidem foliis, non radice vtendum erit. Eius effigies est in nostris de *Stirpium* historia commentariis.

Daphnoides Sepalsiis *Laureola* nuncupatur. Eius foliis pro *Mezereon* nostrates vtuntur officinæ, quum tamen, vt paulo supra est monstratum, sit Græcorum *Chamalea*. Semine vero eiusdem pro *Coccognidio*, vt infra latius dicemus.

Delphinium duplex est, satiuū & sylvestre. Satiuum in Germania non nisi satum prouenit. Sylvestre passim in agris & segetib. gignitur, vocaturq; Sepalsiis *Consolida regalis*.

Dictamnus officinis *Diptamus*. Vere aut dictam nō multis annis nostrates officinæ non sunt vſæ, sed radice *Pseudodictamni*, quū *Cretenſis* potius foliis illis vtendū fuisset. Iam vero innotescere satis coepit, neciā est facile officina, in qua non venalis habeatur.

Buglossa
officinarū.

Ebiscus, vide Althæa.

Echion multorū est generū. Eius generis herba est, quæ hodie Sepalsiis *Buglossa* vocatur. Vtendum illius coma, floribus & radice.

Elelisphacos, Latinis & officinis *Salvia* nominatur. foliorum duntaxat vſus est.

Equisetum Sepalsiis *Cauda equina* dicitur. Coma eius vtimur.

Ebulus nomen suum in officinis retinet. Foliis potissimum hodie vtimur.

Apium offi-
cinarum.
Error offi-
cinarum in
Senecione.

Eleoselinum Latinis sonat *Apium palustre*. Sepalsiis simpliciter, nō tamen sine errore, *Apium* appellatur, quum ita nominatum, proprie non sit, nisi quod vulgo medicorum *Petroselinum* nuncupatur. Vſus foliorum, florum, & seminis.

Erigeron, Latinis *Senecio* dicitur. Errant officinæ medicorum, quæ pro *Senecione* vtuntur aquatico nasturtio, quod tamen alterum *Sisymbrii* genus est. Ita nullā prorsus cognitionem herbarum præ se ferunt, qui hodie componendis medicamentis præsumunt. Coma cum floribus vsurpatur.

Eruca hortenſis vera paucis est cognita. Imaginem eius in primo nostrorum de *Stirpium* historia Commentariorum tomo pictam dedimus. Sylvestris est, quæ vulgo deprauato & decurtato nomine *Rucula* nominatur. Foliis & semine vtimur.

- A** *Eupatorium* triplex existit. Vnum Dioscoridis, Galeni, & aliorum Græcorum medicorum, quod ab officinis *Agrimonia* vocatur. Vfus foliorum eius & radicis. Alterum Auicennæ, quod sub nomine *Eupatory* simpliciter, omnibus propemodum in officinis prostat. Alio nomine *Kunegundis* herbam, & *Origanum aquaticum* nominant. Hæc tamen quum omni adstrictione vacet, pro vero & Græcorum Eupatorio vsurpari non debet. Tercium est Mesue, quod Græcis *Ageratum* dicitur, paucis pharmacopœis cognitum. Effigies eius est in nostris Commentariis expressa. Eo vtendum, quum ex præscripto Mesues Seplassarii componunt medicamēta: sicuti altero, vbi Avicennæ medicamenta construunt. Errant toto cœlo pharmacopœi, qui pro Eupatorio vtuntur *Scarlea sylvestri*, vel vt nonnulli vocant *Salvia agresti*. Siquidem nullus vnaquam neq; Græcorum, nec Arabum ea herba pro Eupatorio vsus est.
- Eustragia* veteribus, sub hoc præsertim nomine incomperta herba. Apparet hanc vetustioribus herbariis *Euphrosinon* fuisse dictam, propter causam alibi abude expositam. Ab aliis non inepte *Ophthalmica* est nuncupata. Foliis cum floribus vtimur.
- Feniculum* omnibus est notum, & retinet nomen suum hodie in officinis medicorum. Vfus comæ eius, seminis, & radicis.
- Fumaria*. Vide *Capnos*.
- Gingidium* non est herba, quæ officinis *Ceresolium* dicitur, sed potius *Lappula agrorum*, vt alibi evidentibus argumentis ostendimus. Coma eius vtendum. A nostratibus pharmacopœis non agnoscitur, ideoq; in illorum officinis nullum obtinet vsum. Eius iconem dedimus primo nostrorum de *Stirpium historia* commentariorum tomo.
- Halicacabus* geminus est, peregrinus, & vulgaris. Posterior officinis duntaxat cognitus est, & deprauata voce *Alchechengi* nominatur, vtimur succo foliorum, & fructu.
- Hedypnois* duum est generum, maior & minor. Maior Seplassii nota, *Taraxicon* dicitur. Coma cum floribus vtimur.
- Helxine*, vulgo & officinis medicorum *Parietaria* nominatur. Foliis vtimur.
- Hysocyamus* ab officinis barbarâ & deprauata voce *Iusquiamus* vocatur. Vfus comæ & seminis.
- Hyssopum* nomen suum in Seplassii retinet. Foliis eius cum spica florum vtimur.
- Intybum* duplex est, satium & sylvestre. Satium iterum in duo partitur genera: latifolium, quod vulgo Medicorum & Seplassii *Endiua* nominatur Angustifolium, quod eisdem *Scariola* nuncupatur. Plurimum errant pharmacopœi qui pro Endiua vtuntur herba quadam, quæ est sylvestris lactuca. Alii is non minus hallucinantur, qui alteram Sonchi speciem loco Endiuæ vsurpant. Sylvestre Intybum *Cichorium* dicitur. Officinæ deprauata nonnihil voce *Cicoream* vocant. Vfus est foliorum seminis & radicis.
- Iuncus odoratus* Græce *ζίζυ*. Huius flore, qui Actuarius & aliis recentioribus Græcis *ζίζυ* appellatur, maxime vtendum esset. Hodie tamē ad nos flos minime defertur, sed culmi duntaxat eiusdem, superiore nimirum parte a camelis, qui ea vescuntur, Galeno attestante, & maxime delectantur, erosa. Eam enim in Arabiæ semitis copiosissime prouenientem cameli depascuntur. Hinc Germanis *Camelshew* id est *sanum camellorum*, nominatur. Quod autem falso Galenus sit a Matthiolo notatus, in appendice aduersus illum scripta docuimus. Seplassiæ et si culmos tantum venales proponant, tamen nihilominus deprauata voce *Squinantum*, quum dicendum esset illis *Schenanthion*, vocat.
- Floris culmorum, & radicis vsus esse in officinis medicorum deberet. Sunt tamen, vt Monachi illi, qui in Mesues filium commentarios ediderunt, quod prætereundum nobis minime erit, qui culmos illos legitimos esse negent, quod scilicet linguam non mordicent, nec rosæ odorem spirent. Sed vicissim non desunt, qui Schoenanthum recens linguam valide mordicare, & rosæ odorem referre attestantur. Nec mirum vetus & odorem & saporem amittere, præsertim quum ab eo, vt Galen, auctor est, omnis vis vetustate euanescat. Sed nec illud, quod passim in officinis pstat, odore prorsus vacat.
- F** *Laurus* nomen suum retinet, vtimur eius foliis & fructu.
- Laurus Alexandrina*, Seplassii *Vuularia* nuncupatur. vsus foliorum duntaxat est.
- Lactuca* multarum est specierum. vtimur foliis, & semine.
- Lapathum*, quod officinis corrupta nonnihil voce *Lapatium* dicitur, multorum est generum, quorum duo duntaxat Seplassii vsitata sunt, nempe *Oxylapathum*, quod illis

Eupatoriū
Græcorū.
Agrimon-
ia.
Auicennæ
Herba Ku-
negundis.
Mesue.

Pharma-
copœorū
immemus
error.
Eustragia.

Ophthalmi-
ca.
Feniculū.

Fumaria.
Gingidiū.

Halicacab-
us.
Alchechengi.
Hedypno-
is.

Taraxacū.
Helxine.
Parietaria
Hysocyam-
us.

Hyssopū.
Intybum.
Endiuiā.

Scariolā.
Error
pharmacopœ-
orum.
Cichoriū.
Iuncus o-
doratus.

Squinantū.

Laurū.
Vuulariā.
Lactuca.
Lapathū.

- Laparium acutum.** *Laparium acutum* vocatur ex *Oxalis*, quæ iisdem *Acetosa* nominatur. Vñs foliorum, seminis, & radicis. A
- Laureola Hepatica.** *Laureola* vide *Daphnoides*.
Lichen, officinis medicorum *Hepatica* nuncupatur. Vtuntur foliis.
- Lolium.** *Lolium*, quod officinæ hodie nec cognoscunt, nec vsurpant, veteribus vsitatissimum fuit. Quare in quotidianum vsus reuocandum. Quale vero sit, discant nostris de *Stirpium historia Commentariis*. Ibidem enim duo illius genera recensuimus, adiectis eorundem picturis.
- Lotus sylvestris.** *Lotus sylvestris* est herba illa, qua nostrates officinæ hætenus propemodum omnes per melilotum, non sine errore, vsæ sunt. Quæ enim vera *Melilotus* sit, paulo post indicabimus. Lotum illam vulgus medicorum, & Germani etiam nostri *Saxifragam luteam* appellant. Vtuntur eius coma cum floribus. B
- Lupulus Malus.** *Lupulus salictarius*, officinis medicorum *Lupulus* dicitur. Coma cum floribus vtuntur.
Malua multarum est specierum. Officinæ *pumila* maxime vtuntur. Vñs vero est foliorum eius, & seminis.
- Malabathrum.** *Malabathrum* Dioscoride teste, folium est sui generis, quod Indicæ paludes gignunt, lentis palustris modo innatis aquis, sine radice. Hoc namq; ita a Dioscoride pingitur.
- Folium indum.** *Folium indum* Græci appellant. A quo vnguentum *Malabathrinum*, dictum est. Alium *Malabathrum* folium est arboris cuiusdam in Syria nascentis, ideoq; *Malabathrum syriacum* nominatum, & Plinio *lib. 12. cap. 26.* celebratum. Vnde Galeno *lib. 7. de compos. medicament.*
- Vnguentum Malabathrinum.** vnguentum Syriacum appellatum est. Vtrumq; folium hodie ad nos deferri desuit. Est præterea aliud cuiusdam plantæ folium perpetuo viride, amplum, folio Nucis iuglâdis simile, in quadam Indiæ regione, quæ *Malabar* dicitur, natum, quod incolæ decurtata nonnihil voce *Batrum* nominant. Hoc cerebrum & stomachum roborat, ac cor exhilarat, Veneremq; incitat, & halitum oris comendat: itidem Indiæ incolis priuatim *Folium* appellatur. Ab hoc vnguentum foliatum diuitibus Romanis mulieribus nuncupatum est, Vñam dicta tria sint distincta genera. Hinc Galen. *lib. 7. de compos. medicam. general. cap. 12.* in vñius medicamenti compositionem tria hæc vnguenta *μαλαβάθριον, καὶ κυλάον, καὶ καλέμενον, καὶ πικρόν* adhibet. Differunt etiam hæc, eodem teste a *μαλαβάθριον*, secus ac Plinius putant. Non temere autem hoc ad vsus erit admittendum, quod eius facultas nos lateat, sed vbi *Malabathro* seu *Folio* opus sit, casia odorata, vel Indicæ nardus, Galeno auctore, D
- Folium Arabicum.** supponenda erit. In horum locum Arabes quartum inuenerunt folium oblongum, Laurino proximum, sed maius, & nervis tribus illud intercurfantibus distinctum, odore & sapore Cinnamomi iucundo. Quapropter quidem e sapore colligunt Cinnamomi esse folia. Hoc vñum hodie cognoscitur, illudq; officinæ, vt Mauritanii, quos illæ maxime imitantur, simpliciter *Folium* nominant.
- Marrubium.** *Marrubium* officinis hodie Græca appellatione *Prassium* nuncupatur. Coma cum semine vsus est.
- Maiorana.** *Maiorana*, Sampsychus alio nomine dicitur. Vtuntur foliis cum floribus, & semine.
- Melilotum.** *Melilotum* quo *Seplasia* hodie vtuntur propemodum omnes, non est verum & legitimum, sed potius lotus, vt paulo ante dictum est, sylvestris. Verum autem *Melilotum* in nostris de *Stirpium historia Commentariis* pinximus. Ex iis itaq; discant *Seplasiarii*, quo illis deinceps *Melilotus* sit vtendum, nec in veteri errore, toties moniti, persistant, nec præfracte adulterinum subinde ad medicamentorum compositiones vsurpent.
- Officina cum error.**
- Melissa.** *Melissophyllum* officinis *Melissa* dicitur. Sunt autem vulgaris *Melissæ* duo genera. Vna cum luteis floribus, qua communiter omnes propemodum officinæ vtuntur. Altera cum purpureis floribus, quæ Turcica, discriminis gratia, nominari potest. Vtraq; grauiter odorata est, & cimices verius quam citrum redolet. Tertium *Melissæ* genus, quod copiose in Boiaria iuxta Ingolstadtium prouenit, odore suo plane Citrum refert, præsertim quum arida exsistit, ideoq; vera est, & *Citrage* rectissime nuncupatur. Hac etiam *Seplasia* Ingolstadianæ pro *Melissa* vtuntur.
- Citrage.**
- Mentha.** *Mentha* multorum est generum, quæ singula alibi nominatim expressimus. Vñs coma cum floribus.
- Mentastrium.** *Mentastrium* nomen suum in officinis in hodiernum vsq; diem retinet. Vtendum foliis cum floribus.

- A** *Mercurialis* duplex, mas & foemina. Vfus foliorum & seminis. *Mercurialis.*
Morus arbor est, cuius foliis, fructu, & radice vtendum esse veteres tradunt. *Morus.*
Muscus, *Seplasis* *Vsnea* vocatur. *Muscus.*
Myrrhis non est nisi herba, quæ vulgo & officinis *Ceresolium* dicitur. Foliis & semine vtitur. *Myrrhis.*
- Nasturtium* nomen etiam suum hodie in officinis retinet. Vfus foliorum & seminis. *Nasturtium.*
Nepeta. Vide *Calamintha*. *Nepeta.*
Ocimum multorum est generum, officinæ *Basilicon* vocant. Vfus comæ cum floribus & semine. *Ocimum.*
Ononis. Vide *Anonis*. *Ononis.*
- B** *Origanum* est multarum specierum. *Seplasis* nostrates hactenus omnes syluestri, vt pote vulgari & passim proueniēte, duntaxat vsæ sunt. Iam afferunt etiam *Creticum*, *Heracleoticum*, & alia quædam genera. Vfus est comarum & florum. Effigies omnium in nostris Commentariis de *Stirpium historia* habentur. *Origanum.*
Osyris *Seplasis* *Linaria* dicitur. Vtuntur foliis cum floribus. *Osyris.*
Oxalis. Vide *Lapathum*. *Oxalis.*
Parietaria. Vide *Helxine*. *Parietaria.*
Parthenium Officinis, & vulgo *Cotula foetida* dicitur. Errant autem, qui hanc herbam *Matricariam* esse arbitrantur. Vfus comæ cum floribus. *Parthenium.*
Perichlymenon vulgo & *Seplasis* *Mater sylvarum*, caprifolium, & *Lilium inter spinas* vocatur. Vfus foliorum & seminis. *Perichlymenon.*
- C** *Perfoliata* officinis, dicta, veteribus incognita fuit. Vtuntur foliis & semine. *Perfoliata.*
Personata officinis & vulgo *Lappa maior*, & *Bardana* nominatur. Vfus foliorum & radices. *Personata.*
Phyllitis *Seplasis* *Scolopendria* vocatur. Coma eius frequenter vtuntur medici. Floribus namq; & semine vacat. *Phyllitis.*
Plantago maior, minor & media. Vtuntur foliis, semine, & radice. *Plantago.*
Polium duplex est. Inter ea montanum optimum est. Errant nonnulli pharmaco-
pœi qui pro *Polio* vtuntur *Chamæpityos* specie. Vfus est comæ. *Polium.*
- D** *Polygonon* officinis *Corrigiola* dicitur. Vtuntur coma cum floribus. *Polygonon.*
Populus duplex, alba & nigra. Vfus foliorum, florum, corticis, & seminis. *Populus.*
Portulaca itidem duplex, satiuæ & syluestris. Vtuntur foliis & semine. *Portulaca.*
Prasium. Vide *Marrubium*. *Prasium.*
Psyllium nomen suum vetus retinet in medicorum officinis. Coma cum semine vtuntur. *Psyllium.*
Pulegium duorum est generum, mas & foemina. Vfus foliorum cum semine. *Pulegium.*
Rosa gemina, satiuæ & syluestris. Vtuntur coma & floribus. *Rosa.*
Rosmarinus coronaria utilis folio & flore, quem vulgus medicorum simpliciter ad
hoc genere pro specie vtens, appellat. *Rosmarinus.*
Rumex. Vide *Lapathum*. *Rumex.*
Ruta duum est generum, hortensis, quæ omnibus cognita est: & syluestris, quæ rur-
sus gemina est, vna scilicet montana, & altera quam Syri *Harmala*, nostræ ætatis medici
E *Harmel* nominant. Errant capitaliter *Seplasiarii* & Medici, qui pro *Harmala*, vel vt ipsi
loquuntur *Harmel*, Cicuta semine vtuntur. *Rutarum* omnium historias & picturas alibi
studiosis dedimus.
- Sabina*, officinis *Sauina* vocatur. Comæ vsus est. *Sabina.*
Salix, nomen retinuit suum in hodiernum diem. Vtuntur foliis duntaxat. *Salix.*
Salvia duplex, maior & minor. Vfus comæ cum floribus. *Salvia.*
Sambucus antiquum hodie nomen obtinet in officinis medicorum. Vtendum fo-
liis eius, & radice. *Sambucus.*
- Sampfychum*. Vide *Maiorana*. *Sampfychum.*
Sanguinalis. Vide *Polygonum*. *Sanguinalis.*
- F** *Sanicula* duum est generum, & vtraq; vulneraria est. *Seplasis* primi generis tantum
Sanicola vtuntur. Comæ vero eius vsus est. *Sanicula.*
Satureia verum & antiquum nomen suum retinuit. Foliis vtuntur officinæ. *Satureia.*
Scabiosa multarum est specierum, quas omnes alibi monstrauius. Vfus foliorum
cum floribus. *Scabiosa.*

Scarlea.

Scarlea, aut potius *Orminum sylvestre*, duobus potissimum hodie cognitis distinguitur & generibus: est enim maior & minor. Maiorem *Seplasia* priuatim corrupta voce *Gallitricum* vocant. *Callitrichum* namque illis dicendum erat, quæ tamen appellatio *Adianto*, quod illæ *Capillum Veneris* nominant, conuenit. Minor est, quam vulgus medicorum *Saluiam sylvestrem* appellant: & nonnullæ officinæ, non nisi maximo errore, ut diximus supra, pro *Eupatorio* vtuntur. Vtus foliorum cum floribus & semine.

Officina-
rum qua-
runda er-
ror.*Scolopendrium*. Vide *Asplenon*.Scolope-
dium.*Scolopendria*. Vide *Phyllitis*.Scolope-
dria. Scor-
dium.

Scordium verum, magna *Seplasiarum* pars hætenus ignorauit, & pro eo, magno errore, alii sylvestris radice vsæ sunt. Iam hunc errorem omnes fere abiecerunt. Foliorum cum floribus vsus est.

Error Se-
plasiarum.

Semperuium plurima habet genera. *Seplasia* maiorem, & minorem foeminā maxime vsurpant. Folis autem cum floribus vtuntur.

Semper-
uium.*Senecio*. Vide *Erigeron*.

Senecio.

Serpyllum nomen vetus retinet. Coma cum floribus utilis est.

Serpyllū.

Seris.

Seris. Vide *Inrybum*.Sisymbri-
um.

Sisymbrium simpliciter, officinis *Balsamita* nominatur, ut supra quoque monuimus. Vt mur foliis cum floribus. *Sisymbrium* autem *cardamine* est, quod vulgo & *Seplasis* *Nasturtium aquaticum* dicitur. Vtus eius vt prioris.

Nasturtiū
aquaticū.

Sonchus duplex est, aspera & non aspera. Posteriore officinæ quædam pro *Endiuia* vtuntur: quod ferendum erat, nisi idem quoque medici nonnulli facerent: quorū tantum est pertinacia & stupiditas, vt moniti etiam, imo de errore conuicti, illum tamen deferere nolint. Sciunt autem nunc fere omnes, *Endiuia* appellationem deprauatam ex *Inrybo* promanasse, vt indigni sint quos amplius moneas: imo qui errorem nunc quidem agnoscere volunt, hos perpetuo cæcos esse conuenit. Foliorum & florum vsus esse debet.

Sonchus.

M-dicorū

pertina-

cia.

Solanum.

Solanum *Seplasis* corrupte *Solazrum* nominatur. Hoc quum multarum sit specierum, duabus tantum, nempe *hortensi*, & *aliera*, quæ *Halicacabus* dicitur, vtuntur. *Hortensis* folia duntaxat vsurpant. *Halicacabi* semen.

Spicanar-
di.

Spicanardi, & *Spica* simpliciter non est nisi radix, quæ sub eo nomine passim in officinis medicorum venditur, vt alibi fufius monstrauimus. Sic vero est appellata, non quæ reuera spica sit, & in caulium cacumine proueniat, sed quod *Spicæ* formam radix hæc repræsentet.

Spica cel-
tica.

Spica celtica, alias *Romana* dicitur. Eius effigies est in altero nostrorum *Commentariorum* tomo.

Spina-
chia.*Spanachia*, vulgo *Spinachia* dicitur. Coma cum semine vtitur,Spina
alba.

Spina alba *Seplasis* & *Serapioni* *Bedeguard*, nominatur. Hodie pharmacopœis fere omnibus incognita: ideoque fit vt alius aliam pro ea vsurpet herbam. Singuli enim peculiarem propemodum habent *Bedeguard*, ita vt nonnulli etiam eo insanix veniant, vt spogiolas quas sylvestris *Rosa* proferit, pro illa vtantur, silentibus interea medicis, æque, vt ipsi, imperitis. Germanicis *Seplasis* cōsultissimum erit, vt pro *spina alba* vtatur ea quæ passim apud nos prouenit, & in altera nostrorum de *Stirpium historia* *Commentariorum* editione picta est, quod illa sit vera *Spina alba*, & *Dioscoridis* descriptioni optime quadret. Vtendum foliis, semine, & radice.

Spina A-
rabica.

Spina Arabica, vel *Aegyptia* *Serapionis* & officinarum est *Sucaba*, vt conferenti vtinque descriptiones & facultates sole clarius patet. Est autem *spina Arabica* hodie incognita, ideo eius succedaneo vtendum: quod quale sit, suo infra indicabimus loco.

Succaba.

Stæchas vel *Stichas* duplex est: vna cæruleis; altera purpureis floribus, ut alibi mon-Stichas
peregrina.

strauimus. Priore *Seplasia* pro *Stichade Arabica* vtuntur, quum tamen neutra esse Arabica videatur. Arabica namque, modo *Auicennæ* credendum sit, semine destruitur. Singula autem iam dictæ suis in spicis semen producant. Sunt tamen legitimæ Græcorum *Stichades*, & quidem nobis peregrinæ. Præter enim has duæ aliæ officinis medicorum vsitæ sunt, quarum altera *Spicanardi* appellatur, altera vero *Lauandula*. Plurimā in mendo efficaciam habent, ideoque in vsu medico minimè contemnendæ.

Arabica.

Spica nar-
di.Lauandu-
la.Stichas ci-
trina.*Stichas citrina* officinis dicta, est *Amaranti* lutei species, ut alibi ostendimus.

Stratiotes

A *Stratiotes millefolia*, *Seplasis simpliciter Millefolium* vocatur. Vfus est foliorum cum floribus. Millefolia

Tamarix officinis *Tamariscus* appellatur. Vtimur foliis, cortice tum ligni, tum radice. Tamariscus.

Thymelæa hodie a paucis agnoscitur. Eius semen est granum siue *coccum Gnidium*, pro quo tamen officinæ nostræ hodie fructu seu semine *Daphnoidis* vtuntur, vt *supra* quoque monuimus. Eius effigiem alibi dedimus. Tamarix.
Thymelæa.

Tithymalus est multorum generum, quæ propemodum omnia alibi picta legentium oculis subieciimus. *Seplasis* aliquot eius genera *Esulas* nominant. Nicolaus tamen Myrepsus sic duntaxat *Tithymalum Cyparissiam*, non *Pityusam*, vt *Matthioli* falso censet, appellat, & interdum etiam eadem nominat *Chamæpityn*, nulla alia haud dubie de causa, quam quod magnam similitudinem cum *Chamæpity*, quod ad foliorum formam attinet, habeat. Hodie *Esula minor* vocatur. Tithymali.
Esula.

Trichomanes *Dioscoridis* officinis *Polytrichum* nuncupatur. Magni vsus & non contemnendi herba. Coma eius vtimur, quod floribus & semine vacet. Polytrichum.

Thymum nomenclaturam suam in *Seplasis* retinuit. Coma cum floribus vtendum. Putant plerique, atqui falso, *Thymum* vulgare esse *Serpyllum sativum*. Thymum.

Tussilago officinis *ungula Caballina* nominatur. Foliis eius tantum vtuntur hodie Medici. Flos enim eius fugax est, nec non nisi verno tempore compareret. Quum vero hoc tempore quo floret, foliis adhuc suis destituatur, fit vt a paucis tum cognoscatur. Ungula caballina.

C *Verbascum* multarum est specierum, quas omnes alibi ostendimus. *Seplasis* *Tapsus* *barbatus* dicitur. Foliis & floribus vtimur. *Verbasculorum* duo sunt genera, odoratum & non odoratum. Officinis herba *paralyfis* vocatur, & coma, odorati maxime, ac floribus vtuntur. Verbascum.
Tapsus
barbatus.
Verbascula.
Herba paralyfis.

Verbenaca est duplex, supina & recta. Supina officinæ tantum vtuntur, & *Verbenam* nominant. Vfus est foliorum cum floribus. Recta multa habet genera, quæ alibi monstrauimus. Errant qui inter genera eiusdem recensent herbam, quæ est *Erysimum oleraceum*, quod diffuse & ex professo in nostris de *Stirpium historia Commentarijs* monstrauimus. Verbenaca.
Verbena.
Error quorundam detectus.

Vetonica, *Seplasis* *Betonica non coronaria* nuncupatur. Duum est generum, purpurea & alba. Purpurea officinæ tantum vtuntur. Foliorum cum floribus maxime vsus est. Betonica.
Viola.

D *Viola* purpurea seu nigra, siue *Martia*. Eius tum foliis, tum floribus in officinis vtuntur.

Vitex. Vide *Agnus*.

Atque hæc sunt stirpes quibus nostrates officinæ maxime vtuntur.

De floribus. CAP. V.

V Sus autem priuatim in nostratibus officinis sequentium florum est.

Anethi. Vide in stirpibus.

Anthos vulgus medicorum, & pharmacopœorum posteriorum, Græcorum exëplo, *Anethi*, *Anthos*. Anethi.
Anthos.

Rosmarini florem appellat, Vide *Rosmarinus*. Balaustium.
Cytinus.

E *Balaustium* syluestris *Punicæ* flos est, vt *Cytinus* satiuæ, *Theophrasto*, *Galeno*, & *Dioscoridis* testibus. Intelligunt autem prædicti auctores per florem non solum foliola, sed & calycem, qui pomum producit. Cuius quidem rei testis est *lib. 23. cap. 6*. *Plinius*, qui *Cytinū* primum huius pomi partem florere incipientis nominat. Et *Galenus lib. 6. de Comp. medic. local. cap. 1*. *Cytinum* interpretatur *primogenitum punicum*. Quare minus recte *Cornarius* in suis super iam citatum locum *commentarijs* *Galenum* negligentiam infumat, quin potius diligentiam tribuendum erat, quod hoc loco quid per *cytinum* intelligat, tam diserte explicare, & lectorem a confusione asserere voluerit. Per florem igitur *Punicæ*, & futuri pomi formam, & foliola, quæ super calycem sunt, prædicti auctores accipiunt. *Plinius* vero florem ipsum tam satiuæ, quam syluestris nondum apertum, & qui foliola rubra nondum ostentat, *Cytinum* nominare videtur. *Balaustium* autem foliola rubetia, quæ iam ex calyce eruperunt. *Plinius* sequuntur recentiores & nostræ ætatis medici in vniuersum omnes, qui per *balaustium* cuiusvis mali *Punicæ* florem intelligunt, contra quam Græci, qui syluestris duntaxat *Punicæ* florem ita nominant. Retinuit itaque flos ille in officinis Medicorum veterem nomenclaturam. Galenus a Cornarii calumnia defensus.

F *Betonica coronaria*. De qua capite præcedenti diximus, Vfus est quoque florum aliter *Betonice*, quam *Cestron* Græci vocant. Betonice coronarie.
Cestron.

- Buglossi.** *Buglossi.* Borriginem Seplasia appellant, vt antea monstrauimus.
- Cichorii.** *Cichori.* Vide *Intybum*.
- Chamaemeli.** *Chamaemeli.* Chamomillam officinae Medicorum nuncupant. Vide *Anthemis*.
- Croci.** *Croci.* Optimus autem ad medicamenta Coryceus, recens, oblongus, integer, plenus, non fragilis, flauissimus, & odoratissimus. Hodie primas tenet Vienenfis.
- Cyani.** *Cyani.* Fruimenti florem officinae appellant. Eius duo sunt genera, satiuia scilicet & syluestris, vt alibi docuimus.
- Buglossi.** *Echij.* Buglossam Seplasia nominant, vt praecedenti capite dictum est.
- Ephemeris non lethalis.** *Ephemeris non lethalis,* quod vulgus medicorum & officinae illorum *Lilium conuallium,* & Germani nostri *Maij florem* nuncupant. Quidam sciola, quem indignum, vt a nobis nominetur, censemus, nuper aliam Polygonati specie. n pro Ephemero, non lethali multorum risu, produxit. Matthiolus putat inter Ephemeris genera numerandum haud esse, quae de re alibi multa diximus, & ipsius opinionem confutauimus.
- Lilium conuallium.** *Epithymum* Graecorum & Arabum vnum & idem est. Hallucinantur itaque plurimique, qui Dioscoridis aliorumque Graecorum Epithymum, ab eo quod Arabes pingunt, & hodie in officinis vsurpatur, diuersum esse putant. Quippe vtrumque capillamentum Thymi est. Esse autem vnum & idem vtrorumque Epithymum, principio facultates, quas illi tam Graeci, quam Arabes tribuunt, liquido monstrant. Ex æquo enim huic pituitam atramque bilem per inferna ducendi vim inesse tradunt. Praeterea descriptio Epithymi, quae est apud Dioscoridem, satis testatur, non esse ipsum ab Arabum Epithymo diuersum. Is namque Epithymum suum a Romanis inuolucrum vocari scribit: quod quidem nomen ei, quo in officinis vtimur, & ab Arabibus, praesertim Serapione, & Mesues filio, pingitur, optime quadrat. Nam rubrum est capillamentum, quod Thymi flores, inuolucrum instar, ambit, quale etiam in aliis herbis, Thymbra nimirum, quod ob id Graecis *ambrosia* dicitur, & in lino, quod posteriores Graeci priuatim *Cassutham*, nostri *Cascutam* vocant, inuenitur. Denique Dioscorides Epithymum habere inquit capitula tenuia, leuia, caudas capillorum modo obtinentia: quae certe singula indicia communis vsus & Arabum Epithymo pulcre conueniunt, Quare vt diuersum ab eo sit, fieri nequit. Sed iis, quae diximus, quispiam forte reclamabit, & Dioscoridis auctoritatem opponet, qui diserte ait, *Epithymum Thymi esse florem*. Quod si verum est, vt nemo inficias ire poterit, ab eo, quod Arabes describunt, diuersum sit, necesse est, qui non esse Thymi florem, sed eius potius inuolucrum memoriae prodiderunt. Cui ita respondemus, recte quidem Dioscoridem statuere, Epithymum esse Thymi florem, si quidem florem ille appellet, non id quod proprie Thymiflos dicitur, sed id quod criniū vel cincinnorum modo capitula Thymi ambit, ac florum quadam imagine comat capillamentum. Hincq, adeo factum est, quod non contentus fuerit simpliciter florem nominare, sed adiecit, atq, perspicue explicat, quale id sit quod Thymi capitula cingit, aut quod flores Thymi inuoluit & ambit: nempe capillamentum aliquod *Cassutham* referens. Vnde omnibus palam fit, Epithymum non solum capillamentum esse, quod Thymi flores cingit, sed etiam ipsos flores, tam Thymi, quam capillamenti, qui vna quum capillamentum illud tollitur, decerpuntur. Cuius rei testis est Auicenna, qui lib. 2. cap. 229. Epithymiū hisce verbis describit: *Est, inquit, semen, & flos, & stipites parui confracti*. E quibus sane verbis manifestum omnibus fit, Epithymum esse capillamentum seu inuolucrum, quod simul flores, semē & summitates stipitis seu coliculos Thymi in se complectitur. Id quod confirmat maxime, quod nunc pharmacopoei etiam Epithymum eiusmodi, afferant, quod Thymi folia, flores, & semen sibi admixtum habet. Vt rectissime Dioscorides capillamenta illa flores Thymi ambientia & cingentia, atq, florum quadam imagine comantia, *Thymi flores* dixerit, capillamenta scilicet ipsa floribus conectens, vt qui a capillis illis separari nequeant, & vna vt cum eis decerpantur, necesse sit. Quapropter rectissime fecit Galenus, quod Epithymo facultates Thymi assignat, quanquam efficaciores. Nec obstat nostrae sententiae, quod Plinius lib. 20. cap. 8. duo Epithymi genera esse statuat. Nam is, vt post eum multi quoque alii, Dioscoridis locum non recte intellexit, quem admodum copiosissime in primo nostrorum de Stirpium historia commentariorum diximus. Sed haec de Epithymo in praesentia dixisse satis sit.
- Genista.** *Genista* nostratis, quam corrupta nonnihil voce Seplasia *Genistam* vocat, flores pharmaco-

A macopceos habere oporteret. Sed tanta est multorum negligentia, ut illos plane negligat, nec inter reliquos flores locum obtinere patiatur. Vultur enim eius duntaxat semine. *Iunci odorati*, Squinantum barbari nominant. flores in Sepalsis nostratib. haud prostant. Eius enim duntaxat culmes venales exponunt.

Lauandula. Vide *Stachas*.

Leucoiorum luteorum. Cheiri nuncupant officinae. Vide *supra*.

Liliorum alborum quidem flores usurpant Sepalsis, aliorum nequaquam.

Malvae sylvestris floribus vtuntur maxime.

B *Meliloti*, cuius multa esse genera constat, ut alibi diximus. Officinae propemodum omnes, flores Loti sylvestris pro Meliloti floribus venales exponunt, quum potius earum herbarum floribus illis ad conficienda medicamenta vtendum esset, quas in altero nostrorum de *Stirpium historia* commentariorum tomo primam, & quartam speciem fecimus. His enim levis quaedam adstrictio inest, quam in Meliloto veteres requirunt, quum contra Lotus sylvestris nullam prorsus habeat, acrisq; magis sit. Graecorum succedanea, quorum nonnulli falso auctorem esse Galenum sibi persuadent, quod multa in iis non satis commodè pro aliis substituta sint: inter succedanea Meliloti referunt *Lotum sylvestrem*: quod non alia de causa fecerunt, quam quod concoquendi & discutiendi facultatem, perinde atq; Melilotum, habeat. Quasi vero solas has facultates Melilotum, & non etiam illis coniunctam adstrictionem, qua Lotus sylvestris prorsus destituitur, obtineat. Atq; ea haud dubie causa est, cur haecenus etiam officinae ea pro Meliloto vsae sint. Quum autem habeamus aliam herbam, quae praeter iam dictas tertiam etiam habeat, nempe adstrictoriam facultatem, necesse est vt illa vtantur. Praestaret tamen eas prima specie vti, si eius copia haberi posset.

Melissophylli, officinis *Melissa*. Vide *supra*.

C *Nymphaea*, Sepalsis *Nenupharis*. Facultatis tamen florum eius Dioscorides & Galenus priuatim non meminerunt, quod eandem quam semen & radix facultatem habent. De illorum itaq; sententia, semine potius, & radice Medicis vtendum erit, quae vt iidem testantur, refrigerandi & exsiccandi potestatem obtinent. Arabes contra floribus esse vtendum praecipunt, illisq; refrigerandi in tertio, in secundo autem humectandi vim tribuunt. Atq; hos quidem flores quarta species Nenupharis producit, quando quidem illi praeter binas, quas Graeci commemorant, duas alias recensent. Vt hinc constet, eam Nymphaeam, cuius flores humectare Arabes memoriae prodiderunt, non esse Nymphaeae speciem, sed herbam ab iis diuersam, & hodie omnibus incognitam. Quapropter toto caelo errat nostri temporis Medici, quod suis Nymphæis, quae sunt Graecorum, humectandi etiam facultatem assignant. Ita Arabum scripta saepe numero errandi occasionem Medicis praebent. Et mirum plane est, Serapionem etiam inter Nenuphares suas, quae frigidae & humidae sunt, numerare, quam calidam esse, & tenuium partium scribit. Adeo nihil est in vniuersa Arabum doctrina certum ac solidum. Decebat autem Serapionem huic tertiae Nenuphari, vt peculiare nomen imponeret, aut ita designatione aliqua perspicua illam declararet, vt a ceteris dignosci posset. Quod quum non fecerit, non temere hoc Serapionis institutum admiratus sum. Quanquam magis mirer, Matthiolum tam nullius momenti rationibus Arabib. patrocinari ausum fuisse.

Origani. vide *supra*.

D *Perficorum* floribus subducendi aluum vim inesse, experientia compertum est. Excipiuntur Saccharo, vt aliarum quarundam herbarum flores.

Prunella, cuius multa esse genera constat, vt alibi diximus, flores veteribus innominati, aut saltem neglecti fuerunt.

Rosarium. vide *supra*.

Rosmarini, anthos officinis, recentiorum Graecorum exemplo nominatur.

Sambuci, omnibus noti.

Scabiosa vocata multa sunt genera. Herba in vsu medico minime contemnenda:

E *Sparti*, quod a Genista distat, id quod omnes sciunt, quibus vtraq; stirps visa est, imo vtriusque pictura, quam alibi exhibuimus, planissime vtriusq; esse diuersas demonstrat: Spartum foliis fere destituitur, Genista vero multifolia existit:

Stichadis. *Supra*.

Pharm.
copceoru
negligentia
Iunci odorati.

Lauandula.
Cheiri.
Liliorum
alborum.
Maluae.

Meliloti.

Galenus
non estans
flor Graecorum
succedaneorum.

Melissophylli.
Nymphaeae
Nenupharis.

Medicorum
nostri temporis
error.

In Arabum
doctrina
nihil certum
ac solidum.

Perficorum.

Prunella.

Anthos.

Sambuci.
Scabiosa.
Spartum
a Genista
distat.

Stichadis.

16 Operum Leonhardi Fuchſii Pars II.

Verbaſci.
Herba pa-
ralyſis.

Verbaſci. vide ſupra.

Verbaſculi odorati, Seplaſiis herba paralyſis, vt ſupra eſt oſtenſum.

Violarum. vide ſupra.

Agni caſti
flores.

Viridis, officinis Agni caſti. Vide ſupra.

De ſemine. CAP. VI.

Semen.
Fructus.

Semen a fructu differt, perinde atq; contentum a continente, ſeu potius veluti pars a ſuo toto. Quod exemplo clarius euadet. *Pomum & pyrum, item perſica mala, arborum fructus ſunt: nuclei autem in medio fructuum reperi, ſemina.* Pari ratione *cucumer, cucurbita, pe- po, & id genus alij fructus ſunt, quibus plurima, lata & conſpicua inſunt ſemina.* Semen autem Græcis proprie *σπέρμα* dicitur. Crebro tamen Dioſcorides & Galenus *καρπὸν* etiam vo- cant. Quare diligenter conſiderandum, quando fructum, & quando ſemen ſignificet. **B** In Seplaſiis autem noſtratibus magna ex parte ſequentium vſus eſt ſeminum.

Altheæ.
Ammi.

Althea.

Ammeos, cuius iam multa cognoscuntur genera. Quod autem inter illa legitimum ſit, ex noſtris de *ſtirpium hiſtoria* Commentariis diſcendum erit, nempe id, quod par- uum nominatur, & odore ſuo Origanum refert.

Amomū.

Amomi ſemen in omnibus officinis deſideratur. Quod enim ſub Amomi nomine proſtat, eius herbæ ſemen eſt, quam nos *Petroſelini Macedonici*, non quidem eius, quam officinæ ita vocant, vt mihi falſo Bernardus Deſſennius Cronenburgius affingit, quum ne per ſomnium quidem mihi in mētem venerit, ſed eius potius, cuius iconem in com- mentariis meis de *ſtirpium hiſtoria* ſubieci pro vero Petroſelino. Eſi non omnes offici- nas vno & eodem ſemine pro Amomo vti ſcio. Non autem ſemine Amomi priuatim vſi ſunt veteres, vt ex Dioſcoride ſatis conſtat, ſed toto frutice, ligno ſcilicet vel ſurculis eius cum ſemine ſeu fructu vuis ſimili. Interdum etiam ſolis racemis, vt liquet ex lib. 9. Galeni *κατὰ τόπον cap. 3. & lib. 7. κατὰ γένος cap. 9.* Quum itaq; vero Amomo deſtituamur, ſuccidaneo eius in componendis medicamentis vtendum erit: quod, quale ſit, ſuo monſtrabimus loco. Non eſſe autem Roſam Hierichontis, hinc maxime liquet, quod illi vt Amo- mo non inſit origani odor, nec acris ſapor. Quare Acoro vero, pro Amomo vtendum erit.

Anethi.

Aniſi.

Apium ſa-
rium.
Error Se-
plaſiarum.

Apij ſatini, quod eſt Petroſelinum vulgare, vt alibi multis argumentis oſtendimus. Errant igitur Pharmacopœi, quod pro Apij veri ſemine, alterius cuiuſdam, nempe *Ela- ſelini*, ſemen vſurpant.

Aquilegiæ.

Aſparagi.
Atriplicis.

Aſparagi, officinæ abiectione primæ literæ Sparagi ſatis inepte nominant.

Atriplicis, cuius multas eſſe ſpecies conſtat, quas omnes alibi indicauiſus. Vtuntur horteniſis maxime ſemine.

Caulis.
Carui.

Bractea, Caulem officinæ vocant. Cuius itidem multa eſſe genera alibi diximus.

Cari, carei, & caroi, Seplaſiæ Carui ſemen appellant.

Cannabis.
Cardamo-
mum du-
plex.

Cannabis.

Cardamomi. Duplex eſt autem Cardamomum, vnum quidem Græcorum, id nimi- rum, quod Dioſcorides & alij Græci deſcribunt. Id autem Serapioni & alijs Arabibus

Græcorū.

Cardumenum vel *Cordumenum* dicitur, id quod ex vtrorumq; collatione ſit maniſteſtiſſi- mū. Hochodie deſideratur, & Seplaſiis incognitum & inuſitatum eſt. Alterum, quod

Arabum.

Sacolla.

Cardamo-
mum.

Arabum
geminū.

Maius.

Minus.

Cardamo-
mum offi-
cinarum.

Maius.

Græcorū

paradiſi.

Melegreta

Serapioni *Sacolla* nominatur. Cardamomum autem Auiſcennæ & Sacollam Serapionis eſſe eandem rem, vtriuſq; deſcriptiones inter ſe collatæ monſtrant. Digerunt vero A- rabes ſuum Cardamomum in duo ſtagia, maius ſcilicet ac minus. Maius appellant, cuius ſemen Ciceris amplitudine grandæſcit, & quod fractum intus granula alba, angu- loſa, & odorata, guſtu ſuo mordaci linguā vellicantia, habet. Minus, inuolucris ſuis ſe- mina lētis magnitudine obtinet, minore odoris fragrantia. Seplaſiæ Arabū imitatione itidem duo Cardamomi genera faciunt. Vnum maius, quod in ſiliquis concipit ſemi- na triangula, colore ſuſca, guſtus acerrimi, ſine vlla adſtrictione. *Granum paradiſi* vocant: Nicolaus Myreſus *Menegetam*. Ad quam ſane appellationem alludentes Hiſpani *Ma- lagretam*, Itali *Melligetam* vel *Melegretam*, quod ſcilicet a regno Melli aduchantur, nun- cupant.

A cupant. Minus itidem in filiquis flauis semen continet angulosum, colore ex terreo flauum, quod illæ simpliciter *Cardamomum* nominant. Vnde perspicuum euadit, officinarum *Cardamomum* non esse Dioscoridis. neq; enim densa sunt & ad frangendum contumacia, nec in gustu vllam amaritudinem relinquunt. Vtrunq; autem ad *Cardamomum* maius Arabum magis, etsi per omnia non respondens, referendum esse videtur. Nam filiqua, in qua concipiuntur, *Ciceris nigri* magnitudine grandescit, granaque intus angulosa, mordacitate sua gustum vellicantia continet. Minore autem prorsus carent, quod non est nisi id, quod *Actuario* & aliis recentioribus Græcis *Capsicon* vulgo *piper Indianum* appellatur, quod alibi abunde satis ostendimus. Eo igitur recte pro *Cardamomo* minore deinceps vtentur *Seplasia*.

Minus

Capsicon
Piper In-
dianum.

B *Cepa*. Sunt autem eius aliquot genera, quæ alibi indicauimus.

Ciceris rubri & nigri.

Cepa.
Ciccris.
Ricinus.
Cherua.
Cataputia
maior.
Officina-
rū error in
Cicuta.

Cici, quod Latinis alio nomine *Ricinus* dicitur. Arabes *Cherua*, barbari & officinæ *Cataputia* maiorem vocant. Quapropter in compositionibus Arabum & recentiorum Pharmacopœi pro *Cherua* & *Cataputia* maiore *Ricini* semine vti debent.

Cicuta, quo certe non sine capitali errore in plerisq; compositionibus pro *Rutæ* semine vtuntur officinæ, vt supra quoque in *Ruta* diximus. Errant vero etiam in eo, quod pro *Cicutæ* semine, *Cicutariæ* alterius vsurpant semen, vt supra quoq; diximus.

Citrei mali, *Citri Seplasia* nuncupant.

Citras.
Carramus

Cnici. *Cartami*. Vide supra.

C *Coriandri*, quod omnibus notum est.

Cotoneorum, *cidoniorum*ue.

Cotoned-
rum.
Granum
tinctori.

Coccus baphica, vel *coccum baphicum*, id est, granum tinctorium, insectariumue, Arabes *Karmes* vel *Chermes* & *Alkarmes* nominant. Nihil autem est granum tinctorium, nisi baccula, lenticulæ, æmula, ramis adnata *Illicis cocciferæ*. Ceterum granum tinctorium communis vsus, & quod hodie in officinis prostat, non est id, quod a Dioscoride pingitur. Nam hoc nullam lentis faciem, vt *Dioscorides* asserit, refert. Videtur itaq; esse granum quod ad radices quarundam herbarum, maxime *Pimpinella* reperitur, ex cuius medulla tenues, formicæ instar, vermiculi exoriuntur: argumento quod hoc inane intus deprehenditur. Hoc rustici in pluribus Italici locis colligunt. Huius meminisse apparet *Plinium lib. 24. cap. 4.* iis verbis. *Est autem genus Cocci in Attica fere & Asia nascens, celerrime in vermiculam se mutans, quod ideo Scolecion, quasi vermiculosum, vocant improbanq;.* Ceterum granum hoc paruum obscure rubrum siue puniceum, nō solum ex Italia, sed & aliis regionibus, nempe Thuringia, Polonia, & Occidentalibus plagis ad nos affertur. Officinis *granum tinctorum* appellatur. Huius grani duæ sunt partes: altera interior seu medullaris, melior ac præstantior, quam nonnulli *Grani tinctorij pulverem* nominant: altera exterior corticosa, quæ longe priori est inferior. Eximie confert hoc granum mulieribus abortientibus, cum pari *Thuris* pondere in potu sumtum.

Coccon gnidium, seu *granum Cnidium*, *Seplasiis Coccongnidium* composita dictione vocatur, semen est *Thymelææ*. Hallucinantur plurimum pharmacopœi, qui pro eo vtuntur *Daphnoidis* semine, vt supra quoq; in dictione *Thymelææ* monuimus.

Granum
cnidium.
Error Se-
plasiario-
rum.

E tur *Daphnoidis* semine, vt supra quoq; in dictione *Thymelææ* monuimus.

Cucurbitæ, cuius tamen apud veteres nulla fit mentio.

Cucurbi-
ta.
Cucumer-
es.

Cucumerum omnis generis, quæ singula fere alibi ostendimus. Inter ea *Citrulus* etiam appellatus *Cucumer* continetur.

Cumini satui. Nam syluestris nullus est in officinis vsus.

Dauci veri. Quod non temere adiciamus, quia magna pharmacopœorum pars *Staphylini erratici* semine, quanquam nullo errore, pro *Dauco* vtatur.

Daucus.

Eruca veræ. Nam raro etiam officinæ legitimæ *Erucae* semen vsurpant, imo pro ea *Sinapis* quodam genere vtuntur, quod in nostris de *Stirpium historia* Commentariis latius monstrauiamus.

Eruca.

F *Eruæ*, *Orobum* Græca quidem nomenclatura *Seplasiæ* nuncupât. Estq; duplex, candidum & rufum. Neutrum hodie cognoscitur nostratibus pharmacopœis: Nō enim est hoc semē, quod pro eo aliquot annos vti cœperunt: *Ochri* enim & *Lathyri* semina esse constat, vt alibi monstrauiamus. Errant tamen omnium maxime, qui pro *Eruo* seu *Orobo* syluestri vicia, & *Aphace* vtuntur. Afferunt iam aliud semen pro *Orobo* Siculo, q; ipse

Orobos.
Eryum.

Cicerculam esse potius arbitror. Proinde pro vero *Eruo* tantisper, dum in notitiam Pharmacopœorum venerit, eius succedaneo utendum erit. Quod quale sit, infra in catalogo succedaneorum quærendum erit.

Fœniculi.

Fœnigræci.

Fæbarum.

Genistæ.

Hippocelimum.
Macedonismum.

Hippocelini, quod falso *Seplasiarii* pro *Petroselino* Macedonico usurpant. *Nicolaus Myreplus Macedonismum* appellat: unde haud dubie Macedonici *Petroselini* nomenclatura, qua hodie utuntur promanavit.

Alchechengi.
Hyoſeyami.
Endiuia & Scariola.
Cataputia minor.
Laurcolæ.

Halicacabi, officinis *Alchachengi* vocatur, ut supra quoque diximus.

Hordæi.

Hyoſeyami albi & flauī. *Seplasiis* barbara & inepta voce *Iusquiami* semen nominatur.

Intybi satini utriusque, *Endiuia* & *Scariolæ* officinis semen appellatur. Vide *Intibus*.

Lactucæ. Supra.

Labyrinthi, quod *Seplasiis* *Cataputia* minor dicitur.

Laureola, non sine magno errore rerumque confusione, officinis *Coccognidiū* vocatur.

Eens, notum omnibus semen.

Libyſticū.
Leuſticū.

Ligusticum vel *Libyſticum* verum nostratibus officinis adhuc incognitum est. Nam *Leuſticum* illis nuncupatum non esse veterum *Ligusticum*, omnes deprehendent, qui illud cum *Ligustici* descriptione conferre volunt. Neque est, ut plerique censent, *Smyrniū*, propterea quod *Brassicæ* semen simile haud habeat: sed est *Dauci* genus, ut alibi abunde ostendimus.

Lingua auis.

Lingua auis, fraxini est semine, ut in nostris de *Stirpium historia* Comētariis indicauimus.

Lini. Vide supra.

Lithospermon geminum est, satium & sylvestre. Satium iterum est duorum generum, maius & minus. Maius *Lacrymæ Iodoci* nominant. Minus, *Milium solis* *Seplasiis* & *Medicis* nuncupatur. Hoc solum hodie vsitatum est, & a sylvestri, quod nigrius est, variat.

Lachryma Iodoci.
Milium solis.

Lupini.

} Retinent suas appellationes.

Maluæ.

Maiorana. Vide *Sampsyichum*.

Melonū.
Myrtilli.

Melouum inter *Cucumeris* genera recensetur.

Myrti. *Seplasiæ* myrtillorum semen appellant.

Nasturtij, omnibus notum.

Nigella.

Nigella tria sunt genera, ut alibi diximus. Utuntur duorum seminibus officinæ. *Lutea* enim *nigella* illis incognita est. *Gith* Barbari *Nigellam* nominant. Haftenus maximo errore *Pharmacopœi* semine cuiusdam stirpis, quæ in segetibus nascitur, & a nonnullis *Pseudomelanthiū*, a nobis autem *Lolium* putatū, & adulterinum nominatur, vsi sunt.

Pharmacopœi error.
Basilicum.
Acetosa.

Ocymi, *Seplasiis* *Basilici* nuncupatur.

Oxalidis, officinis *Acetosa* dicitur.

Riza.

Oryza, *Seplasiis* detrita vna litera *Rizæ* nominatur.

Orobi. Vide *Eruum*.

Pæonia.

Pæonia. Gemina est maris & feminae discriminē. Officinis nostratibus feminae duntaxat semen usurpatur.

Papaueris albi & nigri.

Daſtylorū ossa.

Palmularum nuclei, officinis *Daſtylorum ossa* dicuntur.

Apium.
Bardana.

Petroselini, *Seplasiis* *Apj* semen vocatur. Vide *Apium*.

Pastinacæ
sylvestris.

Perſonacia, officinis *Bardana* semen appellatur.

Plantaginis.

Pastinacæ sylvestris, *Seplasiæ* pro *Danci* utuntur semine.

Plantaginis utriusque.

Rapi.

Raphani.

Capatutia maior.
Anthera.

Ricini, officinis *Cataputia* maioris dicitur semen. Vide *Cici*.

Rosarum, officinæ id genus seminis *Antheram* nominant, atqui falso. *Antheræ* namque medi-

A medicamentum est compositum ad oris morbos accommodum. Decipiuntur itaque Medici & Pharmacopœi, qui putant, semen rosarum esse id croceum, quod capillamentis insidet, quum semen in capite sit: Caput autem est globulus ille ab inferiore florum parte, quem si aperias, re quadam quasi lana plenum videbis. Huius capitis exterior cortex vbi maturuit, rubescit, & semen ipsum ambit.

Rhois. Sepalsia *Sumach* appellant.

Rusci, officinæ vnius literæ adiectione veterem appellationem deprauantes, *Brusci* semen nuncupant.

Ruta sylvestris, officinis & Arabibus *Harmel* dicitur. Vide *Ruta*.

Santonici, Sepalsia *lumbicorum semen* vocant.

B *Saxifraga* albæ, quam veteribus incognitam putamus, semine iuxta radices proveniente, non eo quod in cacumine caulium producit, officinæ vtuntur.

Scilla, officinis *Squilla*, qua quidem voce Varro quoq; in libris suis de re rustica vsus est, ne quis barbaram esse vocem suspicetur. Scilla autem inter semina mentionē facimus, quod Dioscorides eius seminis in Medicina aliquem esse vsum memoriæ prodiderit.

Seseli, Sepalsii *Siler montanum* nominant. Semen vero illud, quod sub *Sileris montani* nomine in officinis Medicorum prostat, non est *Seseli Massiliensis* semen: quod acrimonia omni destitutum sit. Dent igitur operam vt verum habeant Pharmacopœi, aut loco eius *Ammi verum* vsurpent. Ceterum *Seseli* trium generum est: Massiliense, Aethiopicum, & Peloponnesiacum. De quibus alibi copiose diximus.

C *Sesami*. Officinæ vnius syllabæ adiectione veterem nomenclaturam deprauantes, *Sesaminum* appellant.

Sinapi. Sepalsarii *Sinapi* & *Erucæ* semina inter se confundunt. Vide quæ supra de *Eruca* annotauimus.

Staphidis agria siue *vua sylvestris*, officinis *Staphisagria semen* decurtata appellatione vocatur.

Thlaspi, quod duum est generum, nostrates officinæ ignorant. Historia eorundem & pictura est in altero nostrorum de *Stirpium historia* Commentariorum tomo.

Tritici, omnibus notum.

D *Vrtica*. Sepalsia propemodum omnes semine eius vrticæ, quæ apud nos passim in sepius provenit, vtuntur, quum ad medicamentorum compositiones eius porius, quæ vera est, & Romana hodie nominatur, semen, quod Linum prorsus, nisi minus esset, refert, vsurpare debent, quod alibi quoq; fusius monuimus.

Vitidis. Vide *Agni*.

Xyli, Barbaris & officinis *Bombacis*, *Bombacy*, & *Bombasi*, item *Coti semen* dicitur. Historiam vniuersam in altero nostrorum de *Stirpium historia* Commentariorum tomo reperient studiosi.

Zea, Sepalsii *Spelta*.

E Ex iis, quæ ordine iam commemorauimus, seminibus, nonnulla vulgus Medicorum, & officinæ peculiaribus donarunt appellationibus. Nam aliqua calida maiora, alia minora: nonnulla item frigida maiora, alia minora nominant: & singula quaternario sunt complexæ numero, in hunc modum.



Error
Medicorū
& Pharmacopœo-
rum.
Caput ro-
sarum.
Sumach.
Brusci.

Harmel.

Lumbri-
corum se-
men.

Scilla.

Siler mō-
tanum.

Sesaminū.

Officinæ
Sinapi &
Erucæ se-
men con-
fundunt.
Staphisag-
ria.
Thlaspi.

Tritici.
Vrticæ.
Sepalsiarū
error.

Agni.
Bambacū
Coti.

Spelta.

Fructus
quid.

Fructus est ea stirpis pars, quæ carne constat & semine. Sæpe quoq; pro semine ipso sumitur, *ut dictum est in eo, quod præcedit capite*. In officinis autem sequentium maxime vsus est.

Amygdala dulcia & amara. Probantur flauissima, plena, integra, non contracta, nec erosa, tamen leuia, intus albissima.

Anacardi-
um.

Anacardium. Actuatio, & recentioribus Græcis appellatum: Veteres enim eius non meminerunt: fructus est arboris cuiusdam Indiæ, cordi auiculæ non dissimilis: vnde nomen putatur illi esse inditum. Nomen in officinis nonnihil immutatum *Anacardi* retinuit. Germanis quod pediculi effigiem exhibet, *Elephantenlaß* nominatur. Sit plenius, habilius, fuscum, resina in cortice multa, acri, nigra, nucleo intus albo, quo in

Mel ana-
cardium.

melle costeo fit, mel anacardium, ad hunc quidem modum. Anacardia seorsum trita in aceta iustæ quantitatis diebus septem perfunduntur, octauo die lecto igne ad medietatem coquuntur, & per linteolum colantur. Fax remanens sicatur. In succo autem mel iustæ quantitatis ad spissitudinem coquitur.

Auellana. Laudantur graues, nucleo intus sonante.

Grana lu-
niperi.

Bacca luniperi, Sepalsiis *Grana luniperi* appellantur.

Bacca lauri, nomen vetus retinent.

Glans vn-
guentaria.
Ben.

Balanus myreplice, hoc est, glans vnguentaria, Plinio *lib. 12. cap. 21*. Myrobalanum Arabibus *Ben* dicitur. Fructus est arboris Myricæ similis, magnitudine Melues, filio teste, Auellanae nucis, vel Pistacia referens, albo cortice, triquetro, fractu facili, nucleo intus conferto, & admodum pingui, e quo a putamine repurgato, hodierno etiam tempore, quemadmodum ex amaris Amygdalis, exprimitur liquor, quo in pretiosa vnguenta olei vice vtuntur. *Oleum Balaninum* Dioscoridi vocatur. Glans autem vnguentaria sit ampla, vetus, cortice leui, tenui, pleno medulla, læui, pingui.

Carica.

Carica ficus sunt passæ siue aridæ. Habentur præstantissimæ, quæ in calathis spartaceo digitis aut pugnis vtrinque pressæ, sic illis mollitia sua cedunt, vt mutuos partium dictarum motus sibi prope occurrentes sentias. Odore præterea sunt iucundo, non calorem putredinosum referente.

Cappares.

Cappares, ab officinis inepte admodum *Cappari* vocantur.

Cupula
glandi.

Caliculi glandium, Sepalsiis & barbaram sectantibus medicinam *Cupula* glandium, D Græcis *quaxidis* nominantur.

Carpesiu.
Cubeba
duplex.

Carpesium, Actuatio & Nicolao Myrepso *Combeba* vel *Compeba* nuncupatur, Mauritanis *Cubeba*. Nam Actuarius diserte scribit, *Combebas alio nomine dici Carpesia*. Nec temere diximus Mauritanis. Nam quas officinæ hodie *Cubebas* vocant, ab iis sunt diuersæ, *ut a libi diffuse docuimus*. Ceterum officinarum *Cubebæ* sint corpulente, plenæ, graues, acres, minus tamen quam piper, subamaræ, admodum aromaticæ, subdulces.

Carpobal-
samum.

Carpobalsamum, id est, fructus Balsami. Sit flauum, plenum, grande, graue, odoratum, mordax gustu, & feruens in ore. Vnde suspicio est, id quod in officinis prostat, sub hoc nomine *Carpobalsamum* non esse legitimum. Nam subnigrum est, leue, euandidum, nec gustui mordax, denique parum aut nihil odoratum.

Caryo-
phyllum.

Caryophyllum, Sepalsiis *Garyophyllum* dicitur, fructus est grano Piperis grandior, fragiliorque, ex atro rufescens, in clauum modum capitatus, exsertis in aduersum quatuor denticulis sese stellatim decussantibus.

Cassa fistu-
laris.

Cassa fistularis siue *fistulacea*, quæ nigra etiam Actuatio dicitur, & officinis *Cassa fistula*, veteribus indicta, recentioribus tantum Græcis & Arabibus Medicis cognita fuit. Probatur foris & intus nigra, ampla, collucens, grauis, plenior, & quæ concussa clausis intus granis non strepat, pulpa intus pingui, splendente, succulenta. De qua infra plura dicemus.

Citrium.
Aurantia.
Limonæ.

Citrium, seu *citreum* siue *medicum*, & *aureum malum*, officinis *Citrum* appellatur. Inter Citrea mala numerantur etiam, quæ ab auri colore *Aurantia*, vel vt vnus literæ detritio- ne Sepalsiæ vocant *Arantia*, & *Limonæ* nominantur. Sint autem hæc omnia mala odo- re valido & iucundo, cortice tenui, raro, colore Limonæ pallido, Citria flauo, Arantia rubescente, quamuis viridia etiam per maturitatem inueniantur: carne intus multa, firma, & succo odorato, acido, interdum dulci, quandoque ex vtrisque misto.

Cucumer.

Cucumeres hortenses varii sunt. Cucumeris agrestis, seu, vt vulgus Medicorum vocat, *asinini*

- A** asinini fructus præfertur absolutus & maturus, & virore deposito flauus, amarus. Ex quo succus, quem *Elaterium* vocant, extrahitur, ad modum a Dioscoride præscriptum.
- Cydonia*, vel *cotonea*, Sepalsiis *Citonia* sunt bene habita, flauescencia, & odorata. *Colocynthis*, officinis *Coloquintidis* corrupta voce nominatur. Vtuntur eius medulla cortice ablato. Hæc autem quanto leuior, tanto melior.
- Galla*, quædam immatura, Græcis *iquantia* dicta. Quædam matura.
- Glans* vnguentaria, vel *Granum Ben.* vide *Balanus* myrepsice.
- Glandes.*
- Gossipium*, barbaris *bombax* & *Cotum* appellatur. vide *Xylum*.
- Malum punicum* siue *granatum*, cortice seu corio integro, rufo, duro, & denso, graue,
- B** maturum, granis intus rubris, succo vinolo plenissimum.
- Myrobalani quinque generibus distincti, veteribus extra Dioscoridem, qui horum *lib. 1. cap.* de palma meminit, & Arabicos Myrobalanos vocat, incogniti, recentioribus autem Græcis & Arabibus noti. Flauiluteiue, Sepalsiis *carini* dicti, multum in viride inclinant, densi, graues, ampli, cortice crasso, denso, os paruum complectente. *Cepuli*, officinis *Chebuli* vocati, ampli sunt: & quo maiores, eo meliores. subnigri, in rubrum inclinant, aut ex fusco nigrescentes, & carnosi. *Cerulei* siue *nigri*, Sepalsiis *Indi* appellantur, solidi, magni, graues, sine ossibus, oliuæ figura. *Empelici*, vel *Empelici*, officinis *Emblici*, graues, lapillorum pene figura, cute ossibus hærente, colore in cinereum languente. *Belezici* Sepalsiis *Bellirici* dicti, magni, graues, instar pyri rotundi. De his omnibus
- C** infra copiosius dicemus.
- Myrtibacca*, officinis *Myrilli*. Laudantur recentes, plene, odorata, & bene nutrita.
- Myxa*, & *Myxa*, ac *Myxaria* Actuatio, Græcisq; aliis recentioribus dicuntur. Sepalsiis *Sebesten*. A mucoso autem lentore, quo abundant, Græcis appellatas esse *Myxas* constat. Acuminatae sunt, parum rugosæ, graues, nigrae, carne multa ex rubeo nigricante, firmiore, glutinosa, dulci & subacida, esse prunorum inæquali, nucleo intus exiguo, dulci.
- Morum*. Notus est fructus arboris, quam *Morum* Celsi Barbari vocant.
- Nux cupressi*, Latinis & Græcis *pilula cupressi* nominatur. Probatum perfectum, recens, ac mollis, seminis plena, etiam in ipsis hiatibus.
- D** *Nux Indica* fructus est prægrandis, circumscriptæ rotunditatis, inuolucris tectus, cortice primum callolo herbarioq; intus villosus, tenui exterius tunica vestiente: qua extrita, solutus in capillamentum fatiscit, capaci subtus orbe, duro, lignoso, triplici foramine, concauo anfractu, grandi, nullis loculamentis interstincto, dulci intus quum recens est liquore: nucleo molli, candido, carnoso, quum inueterauit cartilaginoso.
- Nux moschata*, vel *myrepsica*, hoc est, vnguentaria, officinis muscata vocatur. Sit grauis, oleosa, odorata. Hinc est quod Symeoni Sethi *odorata nux* appelletur. Eius historia est in altero nostrorum *de stirp. historia* commentariorum tomo.
- Nux vomitoria*, Sepalsiis *Vomica*. Sic dicta quod vomitum citet. Non est, autem eadem cum Serapionis nuce vomica, quod Auellana multo maior sit, nec nodosa, sed plane compressa, & hirsuta. Quum igitur Serapionis delineationi nux vomica officinarum non respondeat. Quum itaq; non eadem sit, nec quid sit, satis adhuc constet nux vomica officinis dicta, adeoque eius usus vix periculo vacet, non temere illam deinceps ad conficienda medicamenta adhibere Medici & pharmacopœi debent. Accerte nulla iactura, huius usu carere possunt. Prudenter itaq; fecerint, si ea abiecta, deinceps radicibus tertiae Aphaces speciei, quas Erbnus Germani vocant, pro ea usu fuerint, præsertim ubi vomitum mouere student.
- Nux pinea*, officinis simpliciter *Pinea* nuncupatur. Sit plena, recens, & alba. Viteretur *Pinea* flaua, aut etiam pallida, oleosa, rancida.
- Nux pontica*, *pranestina*. vide *Auellana*.
- E** *Oliua* melior magna, oualis figura, pallida aut rufa, plena, solida, carne multa, densa, subamara & subdulci, osse intus paruo, longo, nucleum delicatissimum complexo.
- Oxyacantha* vel *Oxyacanthi baccula*, Mauritanis & barbaris Medicis *Berberis* nominatur. Est autem a Berberi officinarum diuersa, ut quibus vera *Oxyacantha* ignota est.

Elateriū.

Cydonia.
Colocynthis.

Galla.

Gossipiū.
Malum punicum.

Myrobalani.

Flani.
Cepuli.

Carulei.

Empelici.

Belezici.

Myrilli.

Myxa.
Sebesten.Morum.
Nux cupressi.

Nux Indica.

Nux moschata.

Nux vomica.

Auellana.

Oliua.

Berberis.

Quæ autem sit vera Oxyacantha, alibi monstrauius. Ac debent deinceps pharmaco-
pœi veræ illius Oxyacanthæ baccis uti, & non, ut hætenus fecerunt, suæ Berberis, quæ
est veterum *Vua vrsa*, ut in nostris de *stirpium commentarijs* copiose docuimus. In penu-
ria tamen Oxyacanthæ, baccarum berberis fructu uti licebit.

Oxyphænix & Oxyphænicon Aëtuario & aliis recentioribus Græcis dictus ab acido suo
sapore, palmæ sylvestris fructus est. *Thamar Indus* officinis vocatur. Sit subniger seu sub-
fuscus, mollis, recens, pinguis, ex dulci acidus, & vinolo sapore.

Dactyli. *Palmula*, officinis *Dactyli*, a digiti figura dicti, fructus palmæ sunt. Probantur magnæ,
flauæ, parum rugosæ, molles, plenæ tamen & carne intus multa, subdura, ad nucleum
candicante, ad corticem rubescente, non pertusæ, non vermiculosæ, & quæ concussu
nihil, aut minimum sonent, sapore vinoso.

Piper. *Piper* trium est generum, longum, album, & nigrum, non in vna, sed diuersis stirpib.
secus ac Theophrastus, Galenus, Plinius, & Dioscorides memoriæ prodiderunt, natū.
Siquidem piper rotundum in frutice gignitur. Hoc ubi Labruscæ vix modo pubescit,
album nominatur. Vbi vero Octobri mense per maturitatem decerptum, & sub fer-
uenti sole palmeis tegetibus expansum torretur quousq; nigrescat, & rugosum euadat,
quod tridui plerumq; spatio fit, nigrum appellatur. Proinde piper rotundum album-
ue, & nigrum eiusdem fruticis sunt fructus, nec alia in re distant, quam quod hoc magis,

Longum. illud vero minus est maturum. *Longum* autem aliz arbores ferunt, quæ utiq; piperis sa-
pore, oblongum aliquid producunt, compactilibus callis racematim cohærentibus, ve-
luti Ponticæ nucis iulum, quod Incolæ illic piper longum vocant, ut fusius tomo altero
nostrorū de stirpiū historia cōmentariorū docuimus. Ceterum longū piper, sit corpu-
lentū, integrum, recens, linguam tarde, sed diu cōmordens. *Candidum* acrius est longo,
& nigro, plenissimum, graue, non rugosum. *Nigrum*, quod iam a sole superassatum & ex-
siccatum est, maius, cortice tenuiore & minus rugoso, graue admodum existit.

Fisticum. *Pistacium*, Sepalsiæ barbara, & prorsus inepta voce *Fisticum* appellant. Sit recens, nu-
cleo intus herbaceo, sapore iucundo.

Pruna. *Pruna* satiuæ multorum sunt generum. Inter ea, Galeno etiam attestante, *Damascena*
Damascena. ceteris præstant ad subducendam aluum. Probantur ampla, & plana, carne intus mul-
ta, succulenta, osse exiguu.

Prunus *Prunus sylvestris* arbor est, quemadmodum alibi fusius monstrauius, qui fructum profert
sylvestris. quem vulgari more *Prunulum* & *Pruneolum* nominat. Germani nostri *Schlehen* sua lin-
gua vocant. Idem affirmant, & nobiscum plane sentiunt, Ruellius, Iacobus Syluius, Eu-
ricius Cordus, Conradus Gesnerus, Musa Brasauolus, & quotquot nostra ætate de stir-
pibus aliquid memoriæ prodiderunt, vno demto Cornario: cuius certe aduersus me
furor eo usq; progressus est, ut catenas nunc & compedes requirat: quas sane illi iam du-
dum pro suis Nitris & Brabyliis misissem, nisi me pigeret ac puderet cum eo conuiciis
certare. Nam id genus certaminis mulierculas potius, quam viros doctrina ex cultos
deceret. Omisissis igitur contumeliis, erroncam eius opinionem de Poterio & Brabyliis,
ea qualicet modestia deregemus, detestamq; subinde confutabimus. Is namq; non
fine maxima temeritate, apertam, & omnium Medicorum consensu comprobaram
veritatem impugnans, spinam illam, quæ fructum *Schlehen* Germanis appellatum pro-
ducit, *Poterium* esse contendit: ac rationibus nullius momenti frusus, hanc opinionem
constanter tueri conatur, quarum hæc prima est. Dioscorides inquit, de Poterio inter
reliqua spinarum genera tractat, igitur Germanis *Schlehendorn* dicta existit. Bella me-
hercle ratio, quasi verò necesse sit *Poterion* ideo esse *Schlehendorn*, quod aculeatum sit,
& inter spinarum genera recensatur. Si enim hæc ratio procedit, qui sit, ut non *Rham-
num*, aut *Paliurum* dicamus esse *Schlehendorn*? vtrumq; enim spinosum esse cōstat. Sed
ita colligit *Δαλεχνορόν*, si diis placet, Cornarius. Non esse autē spinam *Schlehendorn*
nominatam *Poterium*, non aliunde certius, quam ex eiusdē historia, quæ est apud Diosco-
ridem, probari potest. Is in primis, præter alia, in Poterio requirit spissam lanuginē, folia
exigua, rotunda, florem paruum, fructum gustu odoratum & acrem, nullius vsus, quo-
rum sane indiciorum nullum in spina, quam nos cum multis aliis doctis viris, & ex pro-
fesso medicis, *Prunum sylvestrem* appellamus, neq; etiam eius fructu, reperitur. Siquidem
in ea nulla apparet lanugo, nisi ea quam non raro prætereuntes oues inuitę rapientibus
pinis

Cornarii
de Poterio
pudendus
error dete-
gitur, ac
cōfutatur.

Poterii de
lineatio.

- A** pinis & aculeis concedere coguntur. Folia præterea eius non sunt parua, & rotunda: sed propemodum eiusdem cum pruni satiuæ foliis magnitudine, & oblonga. Neq; flos eius exiguus est, sed Cerasi floribus, qui satis magni sunt, æqualis. Et quod omnium maximum est, fructus eius neq; odoratus neq; acris, multiq; in medicina vsus, ita vt omnes huius spinæ notæ reclamant Poterii historiam. Quapropter furere, & mente destitutum esse oportet, qui Poterium esse Schlehendorn affirmare, omnibus reclamantibus notis, audet. Atqui Cornarius eā p̄batione, qua docemus neq; facultatem, neq; notas Poterii conuenire spinæ & fructui, quem Schlehendorn nominant, mirum in modum, tāquam prorsus absurdam, ridet & cōtemnit, quum tamen omnium testimonio nulla possit esse efficacior. Nam qua alia ratione ostendemus, hanc stirpem hoc vel illo nomine esse insigniendam, quam quod omnes tum notæ, tum facultates, quas illi veteres tribuerūt, ei conueniant? Quum itaq; Poterion eas notas, quæ veterum testimonio in spina producente fructum Schlehen apparēt, minime habeat, ab ea sit diuersum est necesse. Denique quum fructus Schlehen dicti sint acerbis, & odore destituti: Brabylā vero Poterii fructus, odorata & acria, vt hoc nomine diuersa esse fateamur, necesse est. Sed vide miram Cornarii, dicam ne impudentiam, an improbitatem. Is enim vt errorem suum aliqua saltem ratione tegeret, aut imperitioribus fucum faceret, Dioscoridem ^{de quod} pro ^{acrem} hoc est ^{acrem} pro ^{acervo} dixisse nugatur. Verum quis vnquam credet, Dioscoridē hos duos sapores inter se diuersissimos, & multo interuallo distantes, sic confudisse, vt alterum pro altero vsurparit? Verum qui apertam veritatem oppugnare studet, huic vt eiusmodi confingat nugas, necesse est. Pudeat igitur Cornarium, qui leonis sibi passim, non sine multorum risu, nomen vendicat, istius commenti, quod certe in puero ferulis plectendum esset. Non ignoramus quidem, Dioscoridem alicubi improprie vsum esse quorundam saporum nominibus: quod Galenus *lib. 1. de Simplic. medic. facul. ca. 34. & lib. 11. capisē de Pinguetudine*, testatum etiam reliquit: sed non est, cur hinc colligamus id ipsum etiam in Poterii historia fecisse. Fatemur itaq; Dioscoridem adstringētium appellatione interdum abusum fuisse: sed quod idem in acribus fecerit, id constanter negamus. Aut producat vnum saltem locum, quo huic rei fidem faciat, & victos nos esse confestim fatebimur. Atqui, sat scio, id ipsum nunquam facturum est, quod Dioscorides perpetuo acrium voce recte sit vsus. Aut proferat nobis vnicum saltem fructum, quem ille acrem esse affirmarit, qui gustantibus talis non fuerit? Nulli præterea radici ab eodem attributa est acrimonia, quam nō simul etiam hodie gustu exferat, adeo vt Cornarii commentum omnium sit vanissimum. Et rectissime fecerit, si deinceps non leonis, sed apri potius sibi nomen vēdiceret. Vt enim aper agros, prata, vineas, quas ingressus est deuastat: ita Cornarius legitimas & omnium consensu approbatas optimorum auctorum lectiones p̄turbat, & magna temeritate vastat & immutat. Atq; hætenus Brabyla non esse fructus, quos Schlehen appellant, liquido nos monstrasse confidimus. Vt mirari subeat Bernardi Desennii stuporem, qui audet me falso traducere, quasi Brabyla esse fructus prunorum syluestrium dixerim, quum id ne per somnium vnquam mihi in mentem venerit. Sed ii lapsus frequentes admodum sunt in iis, qui ex aliorum scriptis, parum recte intellectis, omnia corradūt, vt & ipsi in scriptorum numero esse possint. Eiusmodi certe est hic Desennius, qui nihil aliud suis annotationibus consecutus est, nisi compilatoris nomen: quandoquidem nullo iudicio omnia in vnum fascem ex aliis corraferit, & lectori miras tenebras offuderit. Nunc reliquum est, vt eos fructus esse pruna syluestria doceamus. Prunos autem syluestres principio esse spinarum genera, præter omnium propemodum hodie viuientium Medicorum consensum, Columella diserte admodum testatur. Prunum præterea syluestrem Virgil. *lib. 4. Geor.* vocauit *spinum*, vbi ita cecinit:

Spinos iam pruna ferentes.

- F** Atq; hinc factum est, vt Germani hanc spinā sua lingua Schlehendorn nominarint. Neq; sane temere: plurimus namq; huius in sepibus construendis vsus est, quo ingressū alienorum, ac bestiarum suis spinis & aculeis prohibeat. Ex historia quidem eius, quod a veteribus notis suis delineata nō sit, nullum testimonium proferre possumus. Quod si tamen hanc spinam diligēter spectes, cum satiuæ pruni radicib. caudice, folio oblongo, & minutim per oras serrato, flore candido, & foliato, atq; fructu plane conuenire deprehendes, vt necesse sit, speciem eius syluestrem esse. Facultates deniq; quas veteres

Cornarius
aper recti-
us quam
leo dicere-
tur.
Schlehen
sunt pruna
syluestria.
Desennii
stupidus.

Cornarii
argumēta
improba-
ta.

prunis sylvestribus adscribunt omnes, fructibus quos Schlehen vocant, inesse constar. **A**
 Adstringunt enim, aluumq; sistunt. Id quod succus ille, quem ex hoc fructu hodie con-
 faciunt pharmacopœi, & pro vera *Acacia*, nullo tamen, aut saltem ferendo errore, in suis
 officinis vtuntur, satis confirmat. Atqui cognoscere lectorem oportet, quid adversus
 hæc Cornarius producat: *Fructus*, inquit, *Schlehen* nominati non solum palam adstringunt,
 sed sua acerbitate omnes a gustu suo auertunt: nec edi possunt priusquam vieti ac flaccidi ex repositio-
 ne fiant. Quod palam adstringere fructus iam dictos asserit Cornarius, inficias ire haud
 possumus: siquidem experientia id ipsum confirmat. Quid autem ad oppugnandam
 nostram sententiam hæc ratio momenti habeat, non video. Neq; enim iis verbis aliud
 euincit, quam quod sylvestria pruna immatura maturis magis, quandoquidem acerba
 admodum sint, adstringant, quod libenter illi concedimus. Nam Galeno quoq; *lib. 7.* **B**
The. metho. cap. 7. attestante, nullum eorum quæ *εσφυα* Græcis, *acerba* latinis dicuntur;
 modice adstringēs est. Hinc est, quod pyra sylvestria, quæ *lib. 1. Simp. cap. 37.* inter acerba
 recenset, idem Galenio *lib. 6. eiusdem operis* magis quam reliqua pyra adstringere & de-
 ficcare, fluxusq; repellere scribat. Proinde plurimum errat Cornarius, quod fructum
Schlehen nullum vsum in sistenda aluo præstare posse ait. Quāto enim fructus illi acer-
 biores fuerint, tanto ad sistendam aluum aptiores erunt. Cornario tamen non conce-
 dimus, fructus *Schlehen* vocatos edi non posse, nisi ubi vieti & flaccidi iam facti fuerint.
 Quippe in confesso est; prætereuntes hanc spinam tum viros, tum mulieres, pueros ac
 senes, eius fructu priusquam flaccidi fiant vesci, tantum abest vt acerbitate sua omnes a
 gustu suo auertat. Et memini me, quum puer essem, creberrime hoc fructu nondum **C**
 flaccido, magna auiditate, vsum esse. Ceterum nullius probati auctoris testimonio, nul-
 la etiam ratione Cornarius pruna sylvestria ante maturitatem nō esse admodum acer-
 ba, vt sunt fructus *Schlehen* dicti, docere potest: imo contrarium plane e verbis Dio-
 scoridis iam ostendimus. Quippe dum is inquit *columellam, gingiuas, ac consillas fluxione in-*
festatas, pruna sylvestria ubi maturuerunt & siccata fuerunt, reprimere posse, manifeste innuit
 maturis etiam iam prunis sylvestribus tantam inesse adstrictionem, vt intumescences
 paulo ante nominatas partes iuuare, & fluxionem auertere queant. Nam reprimendi
 facultas non nisi adstringentibus, vt omnibus in confesso est, inesse solet. Quod si igi-
 tur matura iam pruna sylvestria adstrictionem aliquam obtinent, & eam quidem tan-
 tam vt reprimere possint, multo maiorem habeant, dum adhuc immatura sunt, necesse **D**
 est. Acerba enim, adeoque adhuc immatura, immodice esse adstringentia, paulo ante
 ex Galeno monstrauius. Quapropter Cornarii ratio frigida plane, & nullius mo-
 menti sit oportet. Pergit deinceps Cornarius, more suo, ineptire, & negat, *fructus*
Schlehen appellatos cum *Sapa* coctos, stomacho commodiores fieri, & magis aluum sistere: quem ta-
 men vsum præstare posse pruna sylvestria quum Dioscorides testatum reliquerit, vt hoc nomine, in-
 quit ille, *sint diuersi fructus est necesse*. Verum vt temere id ipsum affirmatur, ita rectissime
 negari potest. Nam *Schlehen* adiecta sapa stomacho fieri vtiliores, aluumq; magis si-
 stere, sole meridiano clarius est. Si quidem *Sapa*, vt *lib. 7. de Comp. med. local. cap. 1.* testis est
 Galenus, *εμπλαστικὴ ἐστὶν, ἀδινωλάτη*: hoc est, *vehementem obturandi facultatem obtinet, &*
minime mordax est. Quocirca emplastica illa sua & citra morsum exsiccante facilitate ef- **E**
 ficat, vt pruna sylvestria, & *Schlehen* fructus appellati, stomacho magis sint vtiles. A-
 speritatem enim eorum, quam quia acerbi sunt efficere solent, lenit: & vt magis aluum
 sistat, eo quod meatus obturet & exsiccat, plane præstat. Vt hanc quoq; Cornarii ratio-
 nem concidere sit necesse. Possunt autem fructus *Schlehen* per se cocti exhiberi, & suc-
 cus etiam eorundem quacunq; ratione extractus, per se datus, aluum sistere. Id quod
 Acacia officinarum, quæ non est nisi succus ex fructibus illis *Schlehen* dictis, coctis ex-
 pressius, tessellatimq; confectus, & insolatus, abunde docet. Nam hæc, haud secus atq;
 vera & veterum *Acacia*, refrigerat, exsiccat, & adstringit, vt quotidiana experientia cō-
 firmat, & gustus quoque testimonio comprobatur: vt pluribus rationibus non sit opus.
 Postremo spinam ferentem *Schlehen* non esse prunum sylvestrem, hoc argumento **F**
 probare conatur Cornarius, quod *humilis sit hæc spina, & non iusta arbor, vt prunus sylvestris*.
 Verum quam nullius momenti hoc sit argumentum, omnib. constare arbitror, quum
 nemo sit qui ignoret spinam ferentem fructus *Schlehen* dictos, ad iustæ arboris proce-
 ritatem assurgere. Et puto paucos esse, qui oculis suis non conspexerint multas eiusmodi
 spinas,

Acacia of-
ficinarum.

Spina fe-
rens

Schlehen
ad iustæ ar-
boris proce-
ritatem
ascendit.

A di spinas, quæ geminâ viri altitudinem excefferint. Quod aut magna ex parte humilis sit hæc spina, nulla alia de causa accidit, quam quod succrescere, illam agricolæ non patiantur, sed cerebro ad parandas sepes, atq; in alios vsus necessarios, nempe ad munientdas vineas, & agros, succidant. Porro Latinos auctores hos fructus *Prunula* & *Pruneola* nominasse nusquam dixi, *ut mihi imponit Cornarius*, sed sic vulgo appellari, in *Commentarijs meis de Stirpium historia* scripsi, id quod verissimum est, & eius rei testes habeo doctissimos viros, Ruellium, Cordum, Syluium, & alios multos supra nominatim citatos. Quare ad confutandam erroneam Cornarii de Brabyliis opinionem pluribus argumentis non est opus: ad ea igitur, quæ restant, dicenda progrediemur.

B *Ribes* non est nisi alterum genus *Vua* crispæ, veteribus incognitum. Nam Arabum *Ribes*, diuersum est ab eo, quod officinæ vsurpant, *ut alibi fufius monstrauiamus*. Laudatur fructus eius plenior, acinis paucis, bene nutritis potius quam densis, paruis, & strigosis.

C *Rhus* Seplasis *Sumach* dicitur. Duo eius in vniuersum Galeno etiam teste, sunt genera. Vnum, quod Græcis *μαγειρων*, id est, *culinarium*, quod eo pro sale aspergeret obsoniis, nominatur. Alterum Græcis *βυροδενδρον*, hoc est, *coriarium* vocatur, quod ad densandos pilos eo vterentur. Quod certe non est ita accipiendum, ac si diuersæ essent stirpes: ex vna enim & eadem stirpe vtrunq; genus sumitur. Siquidem culinarium semeri eius & succus maxime appellatur. Coriarium autem folia, & fruticis ramusculi, quod iis præcipue coriarii vterentur. Quanquam interdum vtrunq; genus ad medicamenta vsurpatur, ut semen etiam a coriariis. Ceterum Galenus *lib. 6. de Compos. medic. localium*, Nicolaus Myrepsus, & pleriq; alii, Syriaci quoque Rhœis mentionem faciunt, qui non est nisi succus ex Rhœ in Syria proueniēte collectus, quod e Galeni verbis fit manifestissimum: ait enim, *ῥυδὸς ὅς ἀπὸ τῆς οὐσίας κομίζεται*. Quapropter Matthiolus falso mihi tribuit, quod Syriacum Rhœm peculiarem quendam succum; & separatam genus fecerim. Nam hic disertis verbis dico, *esse succum Rhœis*, nec ab aliis nisi loci ratione differre. Calumniose igitur præsentem locum, & contra animi mei sententiam Matthiolus est interpretatus. Ut non temere a quibusdam *μαμτορ* appellatus esse videatur.

D *Rubi mora*, quæ *βάννα* Græcis, Latinis *Vacinia* dicuntur, ut alibi fufius monstrauiamus. Sunt etiam mora arboris omnibus nota.

E Senæ folliculi, quorum præcipuus esse deberet vsus, sint subnigri, semine intus amplo & compresso. Deteriores subalbi, nondum iustæ magnitudinis & maturitatis. Decerpendi autem sunt: caduci enim inefficaces existunt. Folia secundum locum tenent si viridia sint, & plena, non subalba. Surculi inutiles purgationi, ob id abiiciendi. De ea plura infra.

F *Scrobyli* officinis *nucis pinæ* nominantur. Probantur pleni, recentes, albi. Improbantur contra, pallidi, oleosi, rancidi.

Vua passæ, officinis *Passule* dicuntur. Laudantur pingues, carnosæ, cortice tenui.

Vua vrsi, officinis *Berberis* nominatur, ut alibi monstrauiamus.

E *Xylocerata*, vel simpliciter *Cérata* & *Ceratia* Latinis *siliqua*, Seplasis *Xylocaracta*, barbara prorsus & deprauata voce, nuncupantur.

Ziziphia Græcis recentioribus, & Aëtuario *Zinziphia*, officinis *Iuube* appellantur. Probantur recentes, ample, oblonge, carne intus multa, succulenta, laxa, dulci, vinosâ: graues, sapore dulci, nucleo paruo, foris rufæ, intus pallidæ, aut albescentes.

De Radicibus. CAP. VIII.

Officinis nostratibus radices, quæ nominatim nobis iam ordine perstringentur, vsitatz sunt.

Aconiti Lycopodi, Seplasis *Lupariam* hodie appellare solent.

F *Acori veri* radix complicata in obliquum, geniculis intercepta, candida, acri gustu, & modice amaro, odore nõ ingrata, geniculis intercepta. Quare ea videtur esse radix, quæ a quibusdam Galanga maior vocatur, quod omnes iam dictas in se notas habeat. Non quod certo asseram, radicem hanc e stirpe, quæ *Acorus* reuera est, natam esse. Quæ enim hæc esset temeritas id cõstater affirmare, quod oculis meis non viderim vnquã? At fac non esse Acorum, tamen præstat hæc in Acori veri inopia vri, reiecta vulgaris Acori, quem vulgus herbariorum *Gladiolum luteum* vocat, radice, quod a veri Acori radi-

Error Medicorū & officinarū radice Gladioli lutei vocati pro Acoro vero vtrū. **Adulteri- ni Acori vsus.** **Agaricū.** **Althea.** **Angelica.** **Apium.** **Officina- rum error.** **Ari radice pro Serpē- taria vtun- tur offici- na.** **Aristolochia.** **Rotunda destitutæ sunt Se- plasiæ.** **Asarum.** **Hirundi- naria.** **Vinceto- ricum.** **Asparagus Asphode- lus.** **Seplasia- rum erra- rum.** **Behen.** **Ben albū officinarū est Pole- monii ra- dix.** **Hermo- dactylus albus & purpureus posteriorū Græcorū.** **Bistorta.** **Medicorū & Pharma- copæorū error non ferēdus & plerēdus.**

ce tota sua natura diuersissima sit. Vt maiorem in modum hallucinari tum Medicos; tum Pharmacopœos sit necesse, qui adulterino hoc Acoro pro vero vtuntur, magno ægrotantium malo ac detrimento. Non est enim adulterinus Acorus vsurpandus, nisi vbi Medico vt refrigeret & exsiccat cōsiliū est. Magnam quoq; in profluuiū sangui- nis omnis generis sistendo efficaciam habet, quod alibi fufius ostendimus.

Agaricum, quod Galenum secutus, inter radices recensere volui, quum fungus ve- rius sit, leuis, rarius, mollius, albius, breuius, friabilius sit, sapore initio dulci, mox ama- ro, tandem etiam subacri. De quo *infra* plura. Cur autem Galenus *Agaricum* inter ra- dices numerarit, temo primo nostrorum commentariorum diximus.

Althea, siue *Ebisci*, lenta, intus alba:

Angelica, satius præsertim.

Apysatius, *Seplasis petroselinæ* vocatur. Nam herba, cuius radice pro Apio vtuntur nostrates officinæ, est *Elæoselinum*, id est, *palustre Apium*, quod sua sponte in palustri- bus locis nascitur:

Ari, qua vtiq; radice pro *Serpentaria*, quæ Latinis *Dracuntium* dicitur, officinæ vti debent, si vera *Serpentaria* destituuntur, & nequaquam illa, quæ alio nomine *Bistorta* dicitur, vt paulo post fufius demonstrabitur.

Aristolochia, officinæ inepte *Aristologiam* nominant, & pronuntiant. Quum autem gemina sit *Aristolochia*, rotunda & longa, altera, nempe rotunda, omnes propemodū *Seplasiæ* nostrates destituuntur. Quæ enim sub hoc nomine passim prostat, non est le- gitima, sed eius herbæ radix, quæ Aetio *Capnos* appellatur, vt *supra* quoq; monuimus. Af- fertur tamen nunc a quibusdam Pharmacopœis vera, qua omnibus plane vtendum es- set. Quanquam si haberi vera nequeat, *Capni* Aetii radice, vtpote vehemēter quoq; a- mara, pro ea sine errore vti licebit. Longa non catent officinæ, vt plerique censent, qui eam, qua illæ vtuntur, *Clematitin* esse arbitrantur. Nam folia *Hedere* liquido docent, esse *Aristolochiam* longam, & non *clematitin*, vt alibi copiosius monstrauimus. Non prohibeo tamen, ne ea vtantur, quæ aliunde affertur, & nostrate longe maior existit.

Asari radix numerosa, geniculata, tenuis, obliqua, Gramini similis, odorata.

Asclepiadis, *Seplasis Hirundinaria* & *Vincetoxicū* appellatæ, numerosa, tenuis, odorata.

Asparagi, adempta vna litera *Sparagi* radix nostratibus officinis dicitur.

Asphodeli veri radice omnes Germaniæ nostræ officinæ carent. Nam ea quam sub hoc nomine ad conficienda sua medicamenta vsurpant, *Lilii* genus existit, & longe a- liasquam vera *Asphodelus* facultates obtinet. Facillime autem veri *Asphodeli* copiam illis suppedirabit diligens inquisitio, quod in plerisque locis huius prouentus sit vbetri- mus. Etiam multi Pharmacopœi veram in suis officinis repositam habent.

Behen Serapioni duplex, alba & rubea. Radices illæ ex Armenia ad nos hodie non af- feruntur. Quare *Behen* alba & rubea nostratium officinarū non sunt legitimæ, sed eas, de quibus Serapio, & alii Mauritani scripserunt, ementiuntur. Nam *Behen* radices Ar- menicæ ac veræ magnitudine sunt radicis *Pastinacæ* minoris, contortæ, & suauis odore. Officinarum vero crassæ sunt, & odoris, rubra saltem, expertes. Præterea *Behen* veræ radices tenacitatem quandam mansæ obtinent, qua *Seplasiarum* prorsus carent. Deni-

que in Italia non in Armenia effodiuntur. Quo fit vt nulla sese offerat nobis ratio, qua probare possimus *Behen* communis vsus esse Arabum legitimum. *Ben album*, quo magna ex parte vtuntur officinæ, videtur esse *Polemonii* radix, quod alibi fu- sius docuimus. Quid vero sit *Ben rubrum*, certo statuere nondum possum. Actuarii certe, vt ex compositione *Antidoti Diamoschi* sole meridiano clarius conspicitur, & *Nicolaus Myrepsus* multis in locis *Behemum album* & purpureum, nominant *Hermo- dactylum candidum* & purpureum, forsitan quod digitorum quandam imaginem radix illa exhibeat. Vnde iterū liquet officinarum *Behen*, rubrum maxime, quum digiti cras- situdinem excedat, non esse legitimas, sed supposititias, quemadmodum fufius in eius historia diximus tomo nostrorum de *stirpium histor.* commentariis altero.

Bistorta, quam *Seplasiæ* falso *Serpentariam* nominant, quod *Serpentaria* vera non sit nisi *Dioscoridis*, & aliorum veterum *Dracunculus* & *Dracuntium*. Hinc capitaliter errant magna Medicorum pars, qui *Seplasiariorum* imperitia decepti, vt cæci cæcos habeant duces, non sine maximo ægrotantium detrimento, radice *Bistortæ*, cui vehe-

A mens & immensa adstringendi facultas inest, in vnguentorum thoraci & pectori illinendorum compositionibus, & ad thoracis ac pulmonis exsereationes faciles reddendas, vtuntur: quum Dracunculi potius radice, quæ *Dioscoride & Galeno testibus*, iam dictam facultatem obtinet, illis vtendum esset. Et mirum est, eos hodie etiam num sapius monitos, huic errori esse implicatos, quum tamen, modo diligenter inquirere vellent; veri Dracunculi copiam habere possent. Vtuntur autem saltem in veri Dracunculi penuria horum Ari radice, quæ passim prouenit, & easdem, Dioscoride & aliis attestantibus, facultates habet. Atqui scio, quorundam Medicorum adhuc tantam esse dicam inscitiam an temeritatem nescio, vt ne nunc quidem toties moniti errorem deferere velint. Quorum certe pertinaciam magistratum vindicare decet, atq; seuera huius animaduersione, talium carnificum petulantia, quum verbis emendari non possit, coercenda: ac ne latius progrediatur, cohibenda.

Bryonia radix foris cinericea, intus albicans, ampla, consummata.

Bryonia.
Borrage.

Buglossi, borraginis officinis dicitur. Nam recentiores Græci non tantum floribus, sed & radicibus Buglossi vtuntur: & recte quidem. Nam quum radices illæ sint succosæ admodum, fieri non potest quin sint efficaces.

Calamus aromaticus seu *odoratus* verus in officinis nostris non habetur. Nam qui hoc nomine venditur, calamus non est, sed radix. Neq; habet eas notas, quæ illi a Dioscoride tribuuntur. Siquidem arundini similis non est, nec odore fragrantissimo præditus: fistulis deniq; intus plenus nequaquam est, nec ex India affertur. Qui igitur in officinis sub nomine calami aromatici prostat, radix est, *mea sententia*, non quidem veri odorati calami; siquidem vili pretio venditur, & sæpe admodum recens cernitur, sed eius qui in *Mæotide* nascitur, quod alibi copiosius monstraui. Porro quum hæc radix in commanducando glutinosa sit, linguam adstringens, amara, & subacris; eiq; propemodum omnes veri calami Indici notæ quadrent, profecto tuto & citra vilius reprehensionem pro calamo aromatico in veri penuria *Seplasiæ* vti possunt.

Calamo aromatico
vero caremus.
Quid sit
calamus
odoratus
officina-
rum.

Capparis lignosa, grandis, & numerosa est radix.

Capparis.
Cardapa-
tium.

Chamaeleonis albi, *Cardapatium* *Seplasiis* dicitur, in lætis collibus crassa, in mōtosis gracilior, in profundo alba, aliquatenus aromatica, graui odore, dulcis.

Rhapon-
ticum of-
ficinatum
est *Ceteri*
magni
radix.

Centaury magni, quæ huius ætatis Medicis & Pharmacopœis *Rhaponiticum* vocatur, crassa, grauis, solida, tripedalis, si integra est, succo vbi recens est prægnans.

Cichory. Vide *Intybum*.

Cichoriæ
Costus
Matthio-
li calum-
nia depul-
sa.

D *Costi*, qui Græcis triplex est, *Arabicus*, *Indicus*, & *Syriacus*. Arabes costum dulcem & amarum faciunt, quemadmodum posteriores etiam Græci, potissimum *Actuarius*, & *Nicolaus*. Non potuit autem sibi temperare *Matthiolus*, quin libro 5. *suarum epistolarum medicinalium* mihi genuinum infingeret, errorisq; insimularet, quod Arabas secutus dulcem etiam esse aliquem Costum dixerim, ita nunquam non me ex insidiis obsequat, & ea etiam, quæ recte a me dicta sunt, in calumniam rapit. Dulcem enim dixi Costum, vt in *commentarijs meis de stirpium historia* latius monstraui, non simpliciter, quod talis nullus, legitimus saltem, existat, sed collatione ad alterum, qui plus eo amaritudinis habet.

E Quare mirari satis non possum, cur de aliorum dictis temere iudicandi auctoritatem sibi arroget *Matthiolus*, quum hinc aliam quam multorum odium mercedem sibi sperandum esse sciat. Exstant quidem in officinis Medicorum sub *Costi* appellationibus dulcis & amari radices duæ, sed a veri costi notis plurimum distantes. Nam nec candidæ, nec leues, nec gustu feruentes, nec odoratæ sunt. Suspicio est *Mentæ Sarracenicæ*, quam vulgus herbariorum *Costum hortensem* nominat, esse, alteram saltem, radicem. Nos, vt speramus, veras *Costos*, dulcem & amaram, in altera nostrorum de *Stirpium historia Commentariorum* editione pictas dedimus. Ad quos nunc lectorem ablegamus.

Costus of-
ficinatum
qualis.
Vera *Co-*
stus.

Cucumeris sylvestris, asinini *Seplasiis* appellatur, magna, & candida radix.

Cucumer
asininus
Cyclami-
nus.

F *Cyclamini*, nigra, & aliquantum lata. Officinæ Medicorum perperam ad tertiam Latinorum inflexionem huius radices appellationem detorquent, *Cyclaminis* nomenclantes radicem.

Cyperus radix rotunda, nigro colore, suauis odore, gustu amara. Est vero aliud Cy-

Cyperus.

Curcuma officinarū. **Serapionus.** perigenus in India natum Zingiberis specie, quod manducatum Croci vim & colorem reddit. Hoc interdum inter Zingiberis radices inuenitur, & *Curcuma* Seplasiis nominatur. Porro Serapionis Curcuma, ut ex vtriusque historię collatione patet, non est nisi Chelidonium maius. Quapropter de Serapionis sententia Chelidonii potius radice, quam Cyperi Indici Pharmacopœis vtendum esset. Nihil autem refert, utro vtantur, quod Cyperus quoq; Indica præsentem, *Dioscoride attestante*, pilothri vim illita exhibeat. Germanis *Cucurma*, *Geel genffer* dicitur.

Cynoglossum. *Cynoglossi* radix, qua nostrates officinæ vtuntur, non est veri Cynoglossi radix. Nam ea, Dioscoride recte, nullius est in Medicina vsus: sed eius herbæ, quæ Græcis *Lycopsis* vocatur, ut alibi fusius docuimus.

Dictamnus. *Dictamni* radix, quam *Diptami*, deprauata nonnihil voce, vulgus Medicorū, & Pharmacopœi appellant, & in officinis prostat, non est veri Dictamni radix: ea enim, ut auctor est Dioscorides, inutilis est: sed potius albi vocati Dictamni, ut alibi abunde monstrauimus. Non est autem abiicienda hæc radix, quod suum habet in Medicina vsum, nec eum sane cōtemnendum. Veri Dictamni foliis canna lanugine intectis vtimur, ut supra est ostensum.

Doronicum orientale. *Doronicum* vocabulum multis accommodatur herbis. Est enim quoddam *Doronicum*, quod orientale & *Mauritanorum* dicitur, quod hodie ignotum est & inusitatum. Aliud est, quod *Romanum* appellatur, paucis recte cognitum, officinis nostris ignotum. Tertium est, quo hodie officinæ vtuntur omnes. Quartum *Dulcichinum* nominatur, itidem officinis inusitatum. Quintum, *vulgatum* vocatur. De quibus omnibus copiosissime *tomo primo nostrorum de stirpi. histor. commentariorum tomo diximus*. Ad quem nunc Lectorem ablegamus.

Dracunculus. *Dracunculi* radix nusquam fere in officinis Medicorum prostat. Nam omnes prope modum Pharmacopœi pro ea Bistortæ radice, maximo sane errore, vtuntur, ut supra quoq; monuimus: quum potius in veri Dracunculi penuria Ari radix illis vsurpanda esset, cui etiam forma non absimilis est.

Ebulus. *Ebuli* longa, digitali crassitudine radix.

Enula campana. *Elenj*, enulæ campanæ vocatit officinæ, subalba, aut subrufa, odorata, subacris, vegeta, magna.

Iringus. *Eryngj* radix oblonga, lata, foris nigra, interne candida, pollicis crassitudine, odorata. Officinæ corrupta voce *Iringum* appellant. Trium est generum apud Dioscoridem, ut alibi demonstrauimus, vbi eorundem quoq; picturas exhibuimus. Istius radice, tanquam legitimi, officinæ vti debent.

Elleborus. Ellebori vtriusq; tum albi, tum nigri. Albus radicibus nititur multis, tenuibus, ab oblongo capite exeuntibus, ceparumq; modo fibratis. Niger hodie Germanis non cognoscitur. Nam qui hoc nomine venditur *Enneaphyllon* satiuum est. Circumfertur quoque ab Agyrtis radix sub Ellebori nigri appellatione, quæ legitima non est, ut alibi diximus.

Esula. *Esula* radicis cortex probatur tenuis, leuis, fractu facilis, casia fistulæ modo rubescens.

Filix. *Filicis* radix nigra, oblonga, gustu subadstringente.

Fœniculi. *Fœniculi*, nota est.

Galanga. *Galanga* minor appellata radix, est subrubra, geniculata, intorta, grauis, sapore acerrimo, linguam vellicante, odore, & figura quadam Cyperi. Vnde nonnullis *Cyperus Baby-*

Cyperus Babylonius. *lonicus* vocatur.

Benedicta. *Garyophyllata* seu *Benedicta* intus rufescens, capillamentis multis fibrata, odore Caryo-

Gentiana. *phylli*.

Liquiritia. *Gentiana* radix, colore foris buxco, intus crocante, amarissima, frangi contumax.

Hermodactylus. *Glycyrrhiza*, officinis deprauata prorsus voce *Liquiritia* dicitur, radix longa, coloris buxci, fractu contumax, sapore subacerbo, & dulci.

Enula campana. *Hermodactyli* radix rotunda, ampla, foris & intus alba, mediocriter dura. De qua in-

Iris Illyrica. fra copiosius differemus.

Iris Illyrica. *Inula*, *Enula campana* Seplasiis nominatur, radix. Vide *Elenium*.

Raphanitis & Rhizotomos. *Iridis Illyrica*, quæ duū est generum, Plinio lib. 21. c. 7. teste, Raphanitis & Rhizotomos.

Rapha-

A *Raphanitis* est, quæ a similitudine Raphani sic est dicta. Hanc Galenus, Paulus, & Aëtius *Astragaliten*, quod radix eius cum Astragali radice similitudinem habeat, vocant. V-
triusque pictam imaginem in altera nostrorum de *Stirpium historia* Commentationum e-
ditione dedimus. Probatum parua, densa, frangi contumax, subrufa, amara, odorata.
Florentina tantum officinæ nostræ hodie videntur. Germanica illi non dissimilis, sapo-
re acri & mordaci.

Florenti-
na.Lapatis.
Magist. a-
tia.

Lapathi, *lapaty* officinis dicitur, radix oblonga, crocei intus colore.

Laserpitij, officinis *Magistrantia*, *Ostrutij*, vel *Astrutij* radix nominatur. Nam herba i-
ta vulgo appellata, nobis *Laserpitium Germanicum* dicitur, cuius etiam radice eiusque succo
in penuria veri *Laserpitij* uti licebit.

B *Lilij* tum albi, tum punicea radice in officinis usus est. Sed puniceum non sine maxi-
mo errore, *Affodillum* depravata voce nominant, ac pro *Asphodeli* radice videntur: quod
paulo supra quoque indicavimus.

Lilium.
Officina-
rum error.Affodillus
officinarius
est Lilij
speciesCynoglof-
Mandra-
gora.

Mcon.

Lycopsios, *Cynoglossa* & *Seplasis* vocata, radix rubra, & adstringens.

Mandragora vera radicibus nititur bene magnis, binis, ternisve inter se conuolutis,
nigris foris, intus albis, crasso cortice vestitis. Eius effigies est in nostris de *Stirpium histo-
ria* Commentariis, quæ satis docet Agyratum Mandragoram esse fictitiam, ut ibidem
etiam fusius docuimus.

Mei radix officinarum, non est nisi eius herba, quam Germani nostri *Beerwur* no-
minant, radix. Ac possunt quidem officinæ nostræ radice illa pro vero *Meo* sine omni
errore tantisper uti, donec verum ad nos aduehatur: siquidem Germanicum hoc
Meum: ita enim appellare placet: easdem quas *Meum* facultates habeat. Sunt qui *Meum*
Sistrum, *Spiculum*, & *Anethum* sylvestre nuncupent.

Nardus Indica etiam radix est, ut Galenus etiam lib. i. de *Antidotis* testatur, tamen Nar-
di etiam spica, a formæ similitudine quam cum spica habet, appellatur. Radix dodran-
talis, digiti parui crassitudine, multis fibris donata, levis, nigra ad rubedinem vergens,
adstringens, subacris, leniter amara, & odorata.

Nardus sy-
ca.

Nymphaea radicibus, perinde atque semine, Dioscoride & Galeno testibus, non tantum
floribus Pharmacopœis utendum esset. Cur autem flores, tanquam humectans medi-
camentum, quum potius desiccant, in usum venerint, Arabibus acceptum ferendum
erit, ut supra, & alibi plenius docuimus.

Nymphaea

D *Oenanthes*, *Filipendula* Nicolao & *Seplasis* radix nominatur. In multa rotunda capi-
ta extuberat.

Filipendula

Pæonia utriusque maris & foeminæ radix digitali crassitudine, & palmi longitudine, gu-
stus adstringens alba. Foeminæ radicibus seu glandes circiter septem, aut octo inhaerent.

Pæonia

Pentaphylli, officinis *Quinq. folij* dicitur, radix oblonga, & subrufa.

Quinq. folium.

Petroselinij veri radix in officinis non habetur. Nam quam sub hoc nomine usurpant,

Petroselinij
radice
officinæ
carent.

Apj sativi radix est, ut supra quoque indicavimus.

Peucedanum.
Polypodium.

Peucedani radix a plerisque Pharmacopœis non cognoscitur. Nigra est, crassa, succosa,
gravi odore. Pictura extat in nostris Commentariis.

E *Polypodij* radix dulcis, austera, digiti parui magnitudine, cirris & nodis plena, ex ru-
bro nigrescens, colore intus herbaceo, Pistacii instar.

Sigillum
Salomonis.

Polygonati, *Seplasis* *Sigilli Salomonis* dicta radix alba, mollis, longa, crebro geniculata,
digiti crassitudine. Duum est generum stirps, Alteram duntaxat officinæ agnoscunt.

Pimpinella

Pimpinella maioris & minoris radix, eius quam sic in Germania vocant herba ab offi-
cinis usurpanda. Nam quam hoc nomine insigniunt Itali herba, *Sanguisorba* nobis ap-
pellatur. Utriusque generis herbarum picturas & facultates in nostris Commentariis de
Stirpium historia reperient studiosi.

Pyrethri.

Pyrethri, est longa, pollicari crassitudine, gustu feruidissimo, & igneo.

Phu, *Valerianæ* officinis nominatur. Duum est generum, vera & Germanica. Vera, *Valerianæ*.

F hoc est, quæ Dioscoridis delineationi per omnia responder, radicem habet superius di-
giti minoris crassitudine, ex obliquo villosam, in nigri Ellebori modum, capillamentis
inuicem contextis, flavescentibus, odoratis, cum quadam odoris gravitate Nardum æ-
mulantibus donatam. Nos tertiam in nostris de *Stirpium historia* commentariis adie-
cimus.

Raphanus
Rha ponticum.

Raphani, magna, Rapi ſpecie, ſubacris.

Rhaponticum veterum in officinis deſideratur. Qua enim ſub hoc nomine vruntur, Centaurii magni radix eſt, *ut ſupra quoq; oſtendimus*. Rha ponticum enim veterum adeoq; verum, radix eſt nigra, Coſto nigro foris, Centaurio magno intus ſimilis, ſed minor, ruſſior, fungoſa, & laxa, aliquantum levis, ſine odore, quæ manſa colorem reddit pallidū ad Crocum inclinantem, teredinibus non exefa. Ea igitur ſit oportet, quæ a D. Gerardo Imperatoris Caroli Oratore e Ponto allata, & tandem mihi ante annos paucos a doctiſſimo viro, & amico omnium cariſſimo, D. Andrea Veſalio tranſmiſſa pro vero Rha pontico radix eſt, vt quæ omnes in ſe Rha pontici veterum notas habet, adeo vt nihil dubitem legitimam eſſe. Nam magna ex parte digitalis eſt tum longitudinis, tum craſſitudinis, fungoſa, levis, colore exterius nigro, intus luteo, eodem nimirum quo vulgare Rheum barbarum modo cōmanſa colorem reddit pallidum, inodora, guſtu aſtringens, adeoq; purgandi vi deſtituta, *ut infra latius dicemus*. Eius effigies eſt in noſtris de Stirpium hitoria commentariis.

Andreas
Veſalius.

Rha barbarum.

Rha Indicum, & ipſi proximum *Rha barbarum*, quod *Raued ſceni* Mauritanis dicitur, quod in officiniſ Medicorum vſitatum eſt, laudatur ſubnigrum, in rubrum inclinans, graue pro raritate ſua, confractum, ex ruſo & glauco alternans, & Croci modo tñgens. Seruatur annis tribus, aut quatuor in milio, vel cera ſola oblitum. *De eo infra plura, & loco paulo ante citato*.

Rubia tinctorum.
Brufcus.

Rubia ſatiuæ radix tenuis, longa, rubra. Officiniſ *Rubia tinctorum* nuncupatur.

Ruſci, quam Seplaſiæ vnus adiectione literæ, *Brufci* nominant, radix Gramini ſimilis, acerba, & ſubamara.

Satyrium.

Satyryj, officinæ inepta voce *Satyriionis* appellant, radix in officiniſ deſideratur. Nam qua ſub huius nomine ad *Diaſatyry* compoſitionem vruntur Pharmacopœi, aut *Orchios*, aut *Satyryj baſilici* radix eſt, quæ impetum nullum ad venerem excitat. Quum itaq; hodie vix verum Satyrium agnoſcitur, licebit pro eo vti herba, quam nos in altera editione *Satyrium trifolium odoratum germanicum* nominauimus. Picturam illic quoq; reperient ſtudioſi. Aut *Orchios*, quæ etiam *Cynoforchis* nominatur, radice pro Satyrio vtendū.

Saxifraga alba.

Saxifragi albi radix multis fibris capillata, eiq; multa Coriandri ſeminis quantitatem referentia grana adhærent, quibus Seplaſiæ, non ſine errore, pro ſemine vruntur, quum ſemen ſuum excuſſis floribus in caulium cacumine proferat.

Scilla.

Scilla, Varro *Squilla*, radix probatur bonæ magnitudinis, bene habita & nutrita, alba.

Scordii.
Officina-
rū error.

Scordij herba, non radice, *ut hætenus maximo errore Seplaſia fecerunt*, vtendum erit, *ut ex Dioſcoride abunde liquet*. Radix autem, quam huc vſque vſurparunt, non fuit Scordii, ſed Allii ſylueſtris. Nunc pleriq; reiecto veteri errore, vero Scordio, quod facile haberi poteſt, vt incipiunt. Quod vrinam aliis quoq; nonnullis in medicamentis facerent: ita enim promte veteres dediſcerent errores.

Scrophularia.
Maior.
Minor.
Conſolida
maior.

Scrophularias Seplaſiæ duas habent, vnā maiorem, alterā minorem. Maior non eſt niſi *Galeopſis* Dioſcoridis. Minor vero eſt altera *Malacociſſi* ſpecies, *ut alibi fuſius monſtramus*.

Symphyti maioris, officiniſ *Conſolidæ maioris* radix vocatur, foris nigra, intus alba, viſcoſa.

Tamarifcus.
Thapſia.

Tamaricis ſive *Myrice*, *Tamarifci* Seplaſiis dicitur.

Thapſia radix, non eſt niſi *Turbii* eius, quod a Meſue deſcribitur radix, quemadmodum in tertio noſtrorum de *Stirpium hitoria Commentariorum* tomo oſtendimus.

Turbis.

Turbis Arabibus laudatur, cuius cortex eſt albus, gummoſus lactis craſſitie, vacuus, arundinaceus, fractu facilis, recens, foris cinericus. Cuius autem fruticis radix ſit, alibi, nempe loco iam citato, oſtendimus.

Eſula.

Tithymali *Cypariſſii*, Meſuæ & Auicennæ *Eſulæ* minoris eſt radix. Quod non temere adiicitur, quia Nicolaus Myrepius interdum *Chamapityn Eſulam* hanc vocat, *ut ſupra quoq; eſt dictum*.

Tormentilla.
Turpetū.

Tormentilla radix in nigro rubea, modice intorta, fibris capillata.

Turpetum, officiniſ *Turbis* dicitur. De quo paulo ante diximus, & infra copioſius diſceremus.

A *Vitis alba*, *Seplafis Bryonia* dicitur. De qua supra satis.
Zadura, *Zaduar*, *Zudar*, *Zudera*, & *Zaduar* posterioribus Græcis appellatur, officinis
Zedoaria, Serapioni præsertim rotunda, *Zurumbet*. Sapore ac colore fere *Zingiberis*.
Zingiber Galeno, aliis *Gingiber*, *Seplafis Zinziber* nominatur. Eius radix sit intus can-
dida, odorata, Piperis sapore, ponderosa, fracta, solida, non teredinibus exesa. Condi-
enda est recens, non vetus, impostorum quorundam more, qui ut teredinum foramina
obstruant, rubricam aqua subactam superlinunt.

Vitis alba.
Zedoaria.

Zingiber.

B Radices quinque communes:

Asp.
Asparagi.
Fœniculi, alii *Graminis*.
Petroselin.
Rusc.

De Succis. CAP. IX.

Succus proprie loquendo est id, quod ex tota stirpe, parteve eius aliqua concisa, aut
stusa, torculari, vel manibus, vel aliter exprimitur. Græcis *χυλός* dicitur. Nam illi *χυλός*
interpretantur *ὑγρὸν ἐκ πίστεως*. Nos more officinarum, succorum nomine, eos tantum
hic in audiri volumus, qui ab expressione liquidi permanent. Cæterum succus, qui ex
glutinosiis seminibus, verbi gratia *lini*, *psylli*, *sænugraci*, *cydoniorum*, aut radicibus, ut *althææ*,
extractus, quum lentorem habeat, *Viscago* seu *Muccago* dici potest. Officina *mucilagi-*
C *nem* nuncupant. Hinc emblastum *δαχυλῶν*, id est, *elentis & glutinosiis succis*, appellatum
est. Porro succi aut per se servantur, veluti *acetum*, *vinum*: aut misto sale, ut *omphacinum*
oleum: aut superfuso phialæ oleo, ut *rosarum succus*, *granatorum*, *limonum*, *cotoneorum*, *sam-*
buci, & *similium*. Succi pauci admodum in officinis Medicorum prostant, quod nimi-
rum citra corruptionem & putrefactionem multo tempore cōservari facile nequeant.
Sunt enim ii propemodum omnes.

Succus
quid.
χυλός

Mucilago:

Muccagō.

Succi quo
modo ser-
uandi.

Acetum album tenuius, ob id valentius nigro & medio, præsertim si æque sit acre &
Vetustum.

Acetum.

Acidus citrei mali succus, officinis *acetositas Citri* nominatur.

Acetositas
Citri.

Cotoneorum, *cydoniorum*.

Brassicæ.

E *Elatarium* succus est, qui ex Cucumeris sylvestris fructu exprimitur. Optimum læue,
non ponderosum, cum candore leniter humectum, gustu amarissimum, quod lucer-
narum luminibus obiectum facile flagrat.

Elatariū.

Iridis.

Limonum.

Malorum granatorum puniceorum.

Mel optimum purum, adeo ut totum pelluceat, odorem, flavum, acerrimum, dulcis-
simumque gustanti & iucundissimum: consistentia nec crassa, nec liquida, sed tam sibi
cohærens, ut continuitatem suam quasi linea longissima non intercisum seruet, si digi-
to attollitur. Idem coquendo paucam spumam emittit.

Mel

E *Oleum omphacinum* ex immaturis oliuis expressum ad viride inclinat, odoratum,
morsus expers, sapore acerbum. Ex maturis oliuis expressum colore rufum, purum, pel-
lucidum, tenue, odore exiguo, sed grato, sapore dulci, subacri.

Oleum

Omphacinum succus ex vva immatura expressus, officinis *Agrestis* nominatur.

Omphaci-
cium.

Oxyacantha fructus succus *Seplafis Berberorum* appellatur. Vide supra.

Agrestis.
Berberor-
um succus.

Rosaceus.

Violaceus.

Vinum, deligitur varium pro scopis Medicorum diuersis.

F Ceterarum quum herbarum ac stirpium succi ætate tantum & vere e viridibus her-
bis, vsu poscente, exprimantur, & hyberno tempore, quo omnes herbæ frigore emori-
untur, haberi non possint, in horum locum recentiores tum Græci, tum alii Medici Se-
rapia, de quibus suo dicemus loco, & stillatitios liquores, seu ut hodie loquuntur, aquas
distillatas, excogitarunt. Sic autem nominant, liquorem vi caloris e stirpe extractum.
In quorum tamen vsu modum aliquem esse oportet, præsertim vbi non diligenter, &

Stillatiti-
liquores.

Modus e-
liciendi
stillatitios
liquores
optimus.

in duplici vase sunt elicit. Siquidem is modus ceteris est præstantior, ut qui succo stirpis tum odorem, tum saporem conciliet. Modum hunc eliciendi stillatitios succos Ioannes Manardus *lib. 15. Epist. 5.* ostendit. Et cauendum vnice in succo stillatio eliciendo, ne plumbeis vel æreis instrumentis utamur. quod is a metallicis illis organis malam eorum qualitatem sibi vendicet, & si gustetur nunquam non, vel frequentissime fumidum virus, nidoremque resipiat. Quæ res non modo ægris ingentem molestiam afferunt, & nauseam plerumque mouent, sed & plurimum noxæ ventriculo, iocinori, aliisque visceribus interunt. Ceterum stillatitii liquores, qui duplici vase vitreis instrumentis, calentis aquæ balneo ab herbis & floribus eliciuntur, non solum proprias stirpium qualitates referunt, sed etiam ne tantillum quidem tum fumi, tum rei adustæ resipiunt, modo caueatur, ne eius vasculi, in quo stirpes continentur fundum, aquam in cacabo bullientem attingat, sed solo vapore ab eo eleuato incalescat. Nam a lento ac miti illo calore: quippe lentus ignis calor est in feruente aqua, quod eius acrimonia ab humiditate obtundatur: e totius stirpis substantia vapores exhalant, qui in succum vertuntur omnium fere partium vices seruantem, quæ ex odore, & sapore, quem succus ille retinet, cognoscuntur. Euenit autem hoc, quod aqua feruens sua ipsius humiditate partes tenuiores illas retinet, conseruat ac cohibet. Iam dictam eliciendi stillatitios liquores rationem Matthiolus quoque, tanquam ceteris præstantiorem laudat. Tamen ut esset sibi a nobis dissentienti occasio, aut ut nostrum saltem sententiam arrodere posset, alteram quoque eliciendi liquores hac minus exquisitam rationem probare voluit, nec omnino esse reiiciendam putauit. Ut hinc palam fiat, Matthiolum nunquam non alios reprehendendi occasionem querere, etsi quod reprehensione dignum sit, haud inueniat. Ceterum in confesso est Galenum in diplomate seu duplici vase omnia propemodum coxisse, quod is modus extrahendi facultatem esset optimus. Nam quæ ita exprimuntur nullam præ se ferunt adustionem, quæ magna ex parte stillatitiis liquoribus multa inest, quæ non tantum ingrata est, sed etiam non mediocriter ad morborum curationem obest. Hinc est, quod liquores illos stillatitios patulis vasibus exponere soli coguntur, quo calor alienus exhalet. At is pariter tenuissimas, & sæpe nobilissimas rerum partes secum educit. Nec melior est eorum, quæ calore fimi putrescunt conditio. Nam hic alienam putredinis qualitatem, quæ salutem vehementer obest, adiunctam habet. Præstat igitur is modus, qui in duplici vase. Sed quum tenuiores maxime partes ignis actione eliciantur, præstat tum maxime liquoribus stillatitiis vti, ubi celerem actionem requirimus, ut in syncope, apoplexia, & id genus aliis morbis celerem opem desiderantibus. Vbi vero tantæ celeritate opus non est, consultius est, ut herbarum ac stirpium earundem decoctis utamur, præsertim quum integras earundem vires requirimus. Nam quum omnes propemodum stirpes, Galeno etiam *libro tertio de Simpl. medic. facul. cap. 14.* attestante, licet sensu simplices apparent, natura tamen sint compositæ, adeoque maxime contrarias in se habeant facultates, nempe excernendi & sistendi, adstringendiue, rarefaciendi & condensandi, reserandi & contrahendi, aperiendi & occludendi, ceterasque vniuersas oppositiones: fieri vix potest ut in stillatitiis liquoribus omnes hæc facultates stirpium insint. Quippe ut iam dictum est, tenuiores maxime partes ignis feruore eliciuntur, crassiores autem in stirpibus fere vniuersæ remanent. Quapropter vires, quæ antea fuerunt coniunctæ, & per totam substantiam æqualiter diffusæ, iam separantur. Ceterum stillatitiorum liquorum nomenclaturas nihil attinet referre, quod nulla propemodum sit herba, ex qua hodie succus non eliciatur.

De Liquoribus. CAP. X.

Liquor
quid.

Liquor, qui Græcis *ῥαῖς* dicitur, est qui ex stirpe, aut parte eius aliqua, vulnerata, terebrata, scarificata, castrata sponte defluit, non curando gustu suauis, aut ingratus sit. Hic paulo post diu insolatus, aut lento igne siccatus concrefcit, quapropter omnes eius fere generis liquores officinæ concretos vocant. Sunt vero Seplais repositi & vsitati liquores, qui sequuntur.

Acacia ve-
ra.
Acacia of-
ficinarū.

Acacia succus ex fructu seu semine exprimitur Aegyptiæ spinæ, & in umbra siccatur. Interdum etiam ex foliis, ut *Dioscorides auctor est*. Vera rarissime, aut nunquam habetur in nostris officinis. Huius autem loco vtuntur succo ex baccis syluestriū prunorum expresso,

A expresso, tessellatim confectio, & insolato, non admodum magno errore; quod & is succus haud secus atq; veterū Acacia adstringat, siccet, & refrigeret, etsi minori efficacia.

Aloe optima sit pinguis, glutinosa, friabilis, facile liquefcens, ex rubro rufa, iccoris modo coacta, & intus foueis plena, proinde minus grauis, bono odore, eximie amaritudinis, syncera, nitida, arenularum & calculorum expers. De qua suo loco fufius dicemus.

Cera fauis occlula exprimitur. Probatur flauissima, odorata, pinguis, coacta, leuis, pura, & aliena omni materia carens. Expetitur etiam alba, vel natura, vel ablutione. Fit viridis mista æruginē. Rubea minio tingitur. *Cera virginea* officinis dicta, non est nisi veterum *Propolis*, quæ in alucariorum foribus inuenitur.

B *Cyrenaiicus liquor* est *Laseric* seu *Laserpitij*, siue *Silphij herba*; qui caule ipsius, aut radice scarificata, defluit. Est acer, mordax, modice rufus, translucens, odoratus, & qui dilutus cito albefcat. Officinis Medicorum *Asa dulcis*, & *Belzoe*, vel *Belzoin*, & *Belzuinum* nominatur. Sed qui sub hoc nomine in officinis prostat, nō est legitimus, aut saltem quarundam rerum accessione deprauatus, quod neque acer, neq; mordax sit. Non esse autem *Silphij* liquorem hinc etiam sciri potest, quod Strabo libro ultimo *Geographiæ* scribat, *Silphium suo propemodum tempore defecisse*. Plinius quoq; lib. 19. cap. 3. multis iam annis non inueniri memorie prodidit. Quum igitur Strabonis & Plinii testimonio constet, *Silphium* Cirenæ eorum ætate pene defecisse; neque inibi facile inuentum esse, nihil mirum videri debet, si nostra quoque tempestate defecerit, atque nullum iam ad nos vehatur; quod legitimum sit. Præstaret itaque succo *Laserpitij Germanici*, quod *Magistrantiæ* nominant nostri, ad compositionem medicamentorum vrī. Ad vsum autem suffumigiorum nihil obstat, cur non *Benzoe* adhibeamus. *Laserpitij* vero liquor Syriacus; Medicus, Parthicus, & Persicus vocatus, virus & putrilaginē, *Dioscoride* teste, olet, ideoq; *Seplais Asa fetida*, & Germanis *Diabolisfercus* appellatur, ob virosū, quem reddit odorem. *Asa* vero vox deprauata est & corrupta, a *Lassere* herba haud dubie detorta. Vt enim veteribus *Lasere* duplex est, odoratum, & virosū, ita quoq; officinis gemina est; *Asa dulcis* & *fetida*.

Dacrydion, officinis corrupta voce *Diagridion* dicitur. *Scammoniaz* succus correctus est, ut infra latius dicitur.

D *Euphorbium* liquor ex Libyca emanans arbore existit, lacteus, vrens, tenuium partium, vel *Orobi* seu *Erui* magnitudine, *Sarcocollæ* modo emicans: vel in ouillis aut hœdinis ventriculis exceptum & concretum, vitreum, translucens, acre, recens, albissimū. Ob eius certe acrimoniam violentissimam nunquam nisi inuitis pharmacopolis tunditur. Quippe etsi nares, & os omni prorsus diligentia sibi muniant, tamen tanta est eius acrimonie vis, ut omnibus vna cum aere penetratis munimentis, in eorundem tandem nares perueniat, vbi molestissimum excitat ardorem, qui non facile tollitur. Quapropter accurata diligentia in tundendo *Euphorbio* opus est. Recens albius est & calidius; ac leui gustatu os accensum diutius sic tenet. Color autem hic caducus est, & cito euanesceat, fitq; vetustate pallidius, aut flauius. Bimum aut trimum adhuc mediocriter viribus est; & interdum quadrimum: quinto autem vel sexto anno exsoluitur, precedente quoque tempore totum elanguescit: ne quis vulgi errorem secutus, annis decem posse integrum seruari, etiam cum Milio, lentibus, fabis, existimet. Recenti tamen, quia viribus est violentis, non vtendum temere erit. Annotino igitur, nam recentius igneum & venenosum est, vtendum.

Galbanum liquor est nascentis in Syria ferulæ. Laudatur odore graui, sapore abominabili, pingue, in Ammoniæ & thuris modum cartilagosum, minime lignosum. Metuendum, ne id, quo passim officinæ vtuntur, ab impostoribus sit vitiatum, lignorum ferularumq; ramentis, lapidibus & alijs compluribus recrementis adiecta. Quia itaq; optimo destituuntur, id saltem quod impurum est admodum a *Dioscoride* præscriptum purgent.

F *Glycyrrhiza* liquor, aut verius succus, ex radice eius nominis stirpis exprimitur. *Seplais* deprauato nomine, *liquiritiam* nominant. Nos quod concretus sit succus ille, inter liquores etiam hunc commemorare voluimus. Probatur dulcissimus, mollis, recens, purus, tenax, & qui confractus splendescat, nigerrimus, & qui linguae subditus totus e-

Aloe.

Cera.
Alba.
Viridis.
Rubra.
Cera vir-
ginea.
Propolis.
Cyrenai-
cus liquor.
Asa dul-
cis.
Belzoe.Asa feti-
da.Diagridi-
um.Euphor-
bium.

Galbanum.

Glycyrrhi-
za succus.
Liquiritia.

Glaucii. *Glaucium* liquor aut succus est herbæ ad Hierapolim Syriæ nascentis. Græcis in mul- A
Memithe. to vsu fuit. Arabibus *memithe* dicitur: Gustu amarum, & intus colore croceum, forinse-
 cus autem rufescit.

Hammo- *Hammoniacum* siue *Hammoniacum thymiana*, liquor est stillans ex ferula quadam Cy-
niacum. renaica in Aphrica, prope Iouis Hammonis, vnde illi nomen, oraculum. Sunt qui
Hammonicam guttam appellant. Sepalsiæ vnus literæ adiectione *Armoniacum* vocant.
 Probatum purum ligno, arenis, terra, sordibus, bene coloratum, odore castorii, sapore a-
 maro, prædensum, & thuris masculi similitudine minutis glebis cartilagosum. Vnde
 palam fit hodie syncerissimi parum ad nos conuehi. Siquidem rarissimum *Ammonia-*
cum visitur, quod suis minutis glebis thus referat. Nam omne fere, quo officinæ vtun-
 tur, piceæ resinæ modo in massam compactum conspicitur, impurum, ac quam pluri- B
 mis impostorum adulteriis vitiatum.

Hypoci- *Hypocisthis* veluti fungus ad pedem *Cisthi*, forma *cytini*, nascitur. Non temere autem
sthus. a nobis dictum est, *veluti fungus*. Siquidem fungus reuera nõ existit, sed potius germen, q-
 e *Cisthi* radicib. Punicorum costinis, *Dioscoride teste*, simile pullulat. Quare nõ erat, cur
 Matthiol^o hic me, more suo, flagellaret, & simpliciter fungum *Hypocisthim* me dixisse scri-
 beret. At ab eius morfu nemo est qui tutus esse queat. Liquor expressus etiam *Hypoci-*
sthis simpliciter, aut cum adiectione liquor *Hypocisthidis* vocatur. Officinæ ineptissima
 voce *Hypoquistidis* succum appellant. In offas conformata est nigra, lenta, sapore ad-
 stringente, odore non ingrata. Timendum, ne *Hypocisthis*, qua officinæ passim vtun-
 tur, non sit legitima, sed ex *Hirci* barbæ herbæ radicibus ab imposterioribus confecta, C
 qui succum inde exprimunt, ac vt concrelcat, insolant. Errandi occasionem iis, qui of-
 ficinis parant *Hypocisthidem* Arabes dederunt, qui *Cisthum hirci barbulam* appellant. Si-
 quidem illi sibi persuadentes *hirci barbam*, quam Græci *τετρακτύρα* nominant, illam ef-
 se stirpem, de qua Arabes scribunt, non modo se ipsos decipiunt, sed etiam alios, qui
 nunc adulterina *Hypocisthide* vtuntur. Quum autem sine legitima *Hypocisthide* non
 possit optima confici theriacâ, præstat succedaneo eius vri, quod, *Galeno teste*, est acacia,
 aut *Dioscoride auctore*, sylvestris floris Punicæ succus. Ceterum ante præparationem
 quædam *Hypocisthis* flaua, alia virens, alia candida:

Ladanum. *Ladanum* ex altero *Cisthi* genere fit, quod nonnullis *Ledon* & *Ladon* nominatur. D
 Officinæ vnus literæ adiectione deprauantes appellationem legitimam, *Laudanum* vo-
 cant. Laudatur odoratum, subuiride, facile, mollescens, pingue, resinofum, quod are-
 nas non collegit, nec squalore obsitum est. Impostorum malitia fabulo, & aliis adulte-
 riis vitiatum.

Lycium. *Lycium*, a Lycia regione dictum, liquor est Pyxiacanthæ. Optimum est, quod vri po-
 test, & restinctum rubentem spumam ostendit, glebis extrinsecus nigris, intus quum
 fregeris rufis, odore minime viroso, cum amaritudine adstringens, crocino colore.
 Quas sane notas id, quod in officinis prostat, non habet. Neque enim igni admotum
 accenditur, nec intus rubescit, neque in gustu amaricat, vt adulterinum sit necesse est
 fateamur. Dabunt igitur operam Pharmacopœi, vt legitimum sibi comparent.

Melaeriu. *Melaerium*, *Galeno* appellatum, non est nisi *Manna* Arabibus nomine ab Hebræis E
Manna. mutuato, dicta. Mel vero aerium appellatum est, quod sub lucanis temporibus ex aere ve-
 niens arborum ramis, & frondibus, herbis, lapidibus, & solo interdum hæreat. Itaque co-
 ria super terram extendentes, & arbores ac stirpes excutientes, quod ab eis mellis in-
 star defluit, excipiunt, & fœtilia eo implent. Relictum breui temporis curriculo coa-
 lesceus grumofum, gummi modo, efficitur. Duum igitur in vniuersum est generum,
 altera liquida, quæ in fœtilibus asseruatur, & Arabico nomine *Tereniabin*, Hippo-
 crati *mel cedrinum*, *Galeno*, vt diximus, aerium, & *ros Libani* appellatur. Hæc quia
 nunc nullo in pretio habetur, seruari desit. Altera arida, quæ hodie in arculis li-
 gneis aut vitreis assetuatur. Huius tria potissimum sunt genera, quorum alterum F
 ab orientali plaga, alterum a Calabris defertur. Eius, quod ab oriente asportatur, duæ
 sunt species: Altera præstantissima, exiguo grano *Mastyche* assimilis est. Hincque
 adeo *Granata* & *Mastichina* vulgo nominatur. Altera vilis, quæ grano constat gran-
 diori, floccorum lanæ, & bombycis effigie, hincque adeo *Bombycina* vocatur. Tertia
 compacto est grano, pingui, dulci, flauoque prædita, vulgo *Brianfona*. Porro quæ a Cala-
 bris af-

Calabrienſi agro. Omnes tamen ſiccior loco gaudent. Mala cineritia. Peſſima fulca, cornuſa, antiqua. Hæc tempore molleſcit, dolumq; prodit. De ea infra plurâ.

Etorum succo confectum est, & Meconium vocatur, opio longe inferius. Erid quidem Glaucii, vel Meconii.

Dlac coagulāt, in aqua aut lacte celerrime liquatur, & colore lactescit. Hodie in nostris officinis non habetur.

Opopanax liquor e *Panacis Heracii* radice incisa emanans, candidus dum recens est: *Opopa-*
dum aruit colore foris croceo, aut subflavo, intus candido, odore graui, sapore amari- *sax*

Propolis, officinis Cera virginea dicitur. Vide Cera.

E *Scammonia* vel *Scammonium*, laudatissimum quod est nitidum, rarum fistulis tenuib', fungosum, leue, taurino glutini, vel Gummi colore simillimum, linguam parum vehen-

menter vrens, linguæ saluolæ tactu, vel humoris alicuius albescens in fragmentis, & lactescens, tenerum fractu, ac pulueratu facillimum. Si verò linguam vehementer exirrat, Tithymali succo vitiatum indicatur, quale est quod a mercatoribus ad nos defertur Syriacum & Iudaicum, compactum, densum, graue, & Erui fortasse farina, & lacte Tithymali aliisq; impostura vitiatum. Nam quod probatissimum est, rarum inuentu est. Id quod Pharmacopœis partim acceptum referendum erit. Hi namque illud præstantissimum Scammonium esse existimant, quod *lingua salina madentis contactu, facile, confestimq; albescit*. In quo Dioscoridis doctrinam hi negligere manifeste videntur, vt qui admoneat, non solum illi experimento fidendum esse, sed etiam aliis ac certioribus: id namq; adulterato quoque lactis Tithymali admistione euenit. Ceterum Scammonium illud, quo omnes fere officinæ vtuntur, Tithymali succo vitiatum esse hinc liquido patet, quod decem, vel quindecim eius grana aluum pluries deliciant, quum synceri drachma, *Dioscoride teste*, id vix præstare possit.

A necesse est. Non tamen inficias eo, ut roris aliqua saltē pars in auram euaneſcat, maior tamen eius pars ſemper in grumos coaleſcit. Quā de re minime mirandum eſt, quandoquidem idem fere quotidie in luto euenire conſpiciamus. Nā eiſdem partes liquidas, priuſquam dureſcat, in auram euaneſcere nemo nō videt. Præterea cur ſaccharum veterum primi generis ſuper arundines concretum fuiſſe haud adſtrueremus, idq; veterum auctoritate frēti, quum noſtrum & id quo nunc paſſim vtimur, etiam in loco humido liquefactum, a ſole concreſcere & indureſcere omnibus conſtet. Mirum igitur eſt, cur Matthiolus non ſecum reputarit, mendacem oportere eſſe memorē. Ita enim ſibi non tam impudenter contradixiſſet, ſed cur nunc ſecus atq; olim ſentiat potius indicaret. Verum eius tanta eſt in conſtantia, & in alios inuehendi libido, ut præ iis quid

B dicat parum curet, modo aliorum ſententias perſtringat, & eaſdem pro erroribus traducat. Hanc vero eius in conſtantiam Franciſ. Alex. fol. 12. iis verbis notare voluit: *Matthiolus, inquit, ſe aliter olim ſenſiſſe conſeſſus non eſt, nec mutata opinionis veniam poſcit, ac ſi eius ſapientia ratio, eiſq; doctrina ea ſibi dignitatis inſignia adoptauerit, ut more Gnatonis Terentiani, nutet ac fluctuet, & rem ſe dignam facere polliceatur.* Hæc ille. Sed de primo genere Sacchari veterum ſatis. Alterum Sacchar veterum, ſeu vetuſtiſſimis ſcriptōrib. cognitū, ex arundinibus quibuſdam, vel ex earundem radicibus exprimebatur, eoq; tum veluti liquido melle tum in cibo, tum in potu utebantur. Hinc eſt, qd a nonnullis Mauritanis Mel canne ſit nominatū. Ex Ægypto, & India maxime afferebatur. Id genus aut Sacchari veterib. fuiſſe cognitū, in primis Narbon. Varro. verſiculi ſole clariuſ docent, qd ſunt huiuſmodi.

Alterum
Saccharum
veterum.
Mel canne

C *Indica non magnanimis arbore creſcit arundo,
Illius & lentis premitur radicibus humor,
Dulcia cui nequeunt ſucco contendere mella.*

Lucanus inſuper, quem C. Cæſare, & L. Cæſiano conſulibus natum eſſe conſtat, tertio Pharſaliæ eiſ Sacchari meminit, ita canens:

Quique bibunt tenera dulces ab arundine ſuccos.

Statius præterea Papinianus, qui Neruæ Imperatoris temporibus clariſ, de eodem lib. 1. ſuarum ſylvarum, ſic ſcriptum reliquit:

Et quas percoquit Hypaſita cannas.

D Strabo quoq; quem ſub Octauiano celebrem fuiſſe conſtat, lib. 15. non ſolū arundines illas exprimi, ſed & decoqui ſolitas fuiſſe memoriæ prodidit, in eū ſcribēs modum:

Eratoſthenes arborum radices, præſertim magnarum arundinum, & natura, & decoctione dulces eſſe tradit. Et ruruſ ibidem, vbi de eodem Eratoſthene ita ſcribit: *Dixit etiam arundinem mel ſine apibus gignere.* Solinus deniq; qui Plinii contemporaneus fuit, c. 65. de India ſcribens, inter alia ita ait: *Quæ paluſtria ſunt, arundinem creant ita craſſam, ut ſiſſis internodiis, lembi vice veltet nauigantes. Ex radicibus eiſ exprimitur humor dulcis ad melleam ſuauiſſimam.* Quinetiam

Gal. qui ſub Antonino Cæſare, iis iuniore, vixit, arundinum illarum in Ægypto naſcētium dulcium, vnde melleus ille humor exprimebatur, lib. 4. de ſimpl. med. ſacul. c. 14. meminit, inquiens: *καὶ τῶν καλάμων αἱ μαλαγαὶ ῥίζα.* Quo quidem in loco interpres Gaudanus, maximo errore, *maluarum*, pro *arundinum* conuertit. Nō eſt enim veriſimile, Galenum

Saccharum
noſtrum a
Saccharo
veterum al-
terius gene-
ris, ſaltem
genere non
diſſert.

E taſium rerum diligentem & ſolertem indagatorem, Saccharū ſiue melleum liquorem Iulii Cæſaris, Varronis, Neruæ Imperatoris, & aliorum ætate notiſſimum ignoraffe. Quum itaq; Sacchar veterū alterius generis, ante Galeni quoq; tempora notiſſimum, ut oſtendimus, fuerit, dubium non eſt, quin ille eiſ loco prædicto mentionem fecerit. Maniſteſtum inſuper eſt, quod ab eodem, Saccharum, cuius hodie in Sepaſiorum officiis, & paſſim vſus eſt, & more Mauritanorum Zuccarum appellatur, genere non diſſerat. Ut enim veterum Saccharum: alterius generis fuit arundinum ſuccus, ita quoque noſtrum, earundem ſuccus exiſtit. Differunt tamen inter ſe aliqua ratione, quod veteres Saccharum ſuum magna ex parte ex arundinibus expreſſerint, licet interdum etiam decoquendo, ut ex Strabone & Statio monſtratū eſt, extraxerint. Noſtrum vero decoctione tantum efficitur. Siquidem Sacchari arundines minutim conciſæ ignis calore tantisper decoquuntur, donec vniuerſus liquor, diu efferueſcens, igneq; conſumtus, in Saccharum, ſalis modo, in vaſis fundo concreuerit, indureturque ac dealbetur. Non

F eſt autem, cur quiſpiam exiſtimet, priſcos hanc decoquēdi rationem ignoraffe, quod illa etiam vſos eſſe paulo ante oſtenderimus: ſed de induſtria, qd ille ſuccus expreſſus iis ſuauiſſimum potū præberet, eo uti noluerunt. Maluerunt igitur eo liquore, ob melleam

Priſci deco-
quendi Sac-
chari ratio-
nem non i-
gnorant:

eius ſuauitatem, pro portione vti, quam ignis calore, vt hodie fieri ſolet, ad ſalis conſiſtentiam ac duritiem decoquendo deducare. Poſtquā vero ſpes lucri quotannis arundines incidere, adeoque artem modumq; quo liquor ille iis iſpis prius minutim concifis, ac deinde decoctis, ad ſalis cōſiſtentiam redigere Indos docuit, verifimile eſt, quod ſpe lucri alleſti, ſucco expreſſo pro potu vti deſierint. Aut certe quum ſuccum illum incorruptum in alias, & maxime diſtantioreſ, regiones transferre haud potuerūt, in eam, qua hodie affertur, formam redigere voluerunt. Proinde quum Saccharum veterum alterum, & noſtrate ex eadem arundine, *vt monſtratum eſt*, colligantur, vt inter ſe differant genere, fieri nequit. Differunt autē hac ſolum ratione, *vt dictum eſt*, quod noſtrum ſolum arte & igne præparetur, adeoque artificiale ſit, veterum vero interdum expreſſum, aliquando vero decoctione elicitum & extractum, adeoque naturale & artificiale fuerit. Sed hic Matthiolus noſtram, vt capere vitem, arrodit ſententiam: neque enim ob immenſam ſuam reprehendendi libidinem alios perpetuo pungere non poteſt: atque veterum & noſtrum Saccharum idem nequaquam eſſe, ſed inter ſe differre, hoc argumenti genere probare conatur. *Saccharum veterum*, inquit, *Galeno & Paulo teſtibus*, id eſt, *non ſiticoſum eſt: noſtrum vero Saccharum contra ſitim affert, vt experientia docet, quare vt inter ſe eadem ſint, fieri non poteſt*. Sed non videt homo ille, totus ad calumniadum comparatus, prædictos auctores Saccharum ſuum non ſimpliciter dixiſſe, ſed collatum potius cum melle. Quod dicimus, eorundem verba diligentius expenſa, ſatis confirmant, & omnium maxime Auicenna, qui *lib. ſui Canonis 2. cap. 757.* illorum ſententiam diſerte explicans, ita ſcribit: *Saccharum antiquorum, minorē quam mel ſitim efficit*. Quapropter iam citati auctores Saccharum non ſimpliciter, quali omnino non excitet ſitim, ſed quod perinde atque mel, ſitim nō efficiat vehementem ſignificarunt. Et quid opus eſt verbis multis? mel vehementiorem Saccharo excitare ſitim, experientia quotidiana docet. Ceterum quum Saccharum, quod hodie decoctione paratur, non ſolum in medicum uſum, verum etiam in culinariū expetatur, vt fere cibus nullus in deliciis ſit, niſi Saccharo conditus fuerit, præſtat vt de iſpius delectu aliquid dicamus. Quum enim illud, quo plus coquitur, eo magis purum, & elaboratius fiat, cādeſcat & dureſcat: coctio namque depurat, defecat, & cogit: ideo ex multiplici coctura, diuerſos quoq; bonitatis gradus recipit. Quum enim *primum* coquitur, adhuc quidem lenrum & fœculentū eſt. *Deinde* vero, ſemper magis atq; magis defecatum, durius, ac ſolidius ſit, donec ad bonitatis faſtigium peruenerit, ac perfectionis finem cōſecutum fuerit. Hinc eſt, quod illud hodie *ſinum* appellant, puriſſimū & præſtantiſſimū, nomine a ſine mutuato, quia candore, duritie, ac ſuauitate ad finem bonitatis peruenerit. Infimum vero, & ab hoc prorsus euarians lentum, humidum, nigrirans, inſuaue, fœculentum, & primæ decoctionis nominatur. Inter hæc duo extrema, duo quoq; ſunt media, alterū quidē infimo proximū, *ſecundæ decoctionis*: alterum vero ſummo, *tertiæ decoctionis* dictum. Quid multa? quanto diutius excoquitur, tanto cādidius, ac durius ſit Saccharum. Saccharum itaq; noſtrum præſtantiſſimum eſt, q̃ durum, ſolidum, & mutuo metarum allifu ſonorum, ligni ſicci & ſolidi inſtar, exiſtit: tamē ob ſiccitatem & imperceptam raritatē leue, dulciſſimum, candidiſſimum, & niuis in morem ſcintillans, cohærens: quale Valētinum in metas pyramidum æmulas coactum, paruas, ponderis libræ vnus & dimidię, cariſſimum, & confectionibus ſiccis aptiſſimum. Illi dotibus, & pretio eſt proximū, q̃ *Madere* vel *Medere* appellant: ſed in metas ponderis librarum 6. 7. 8. 9. & decem formatur confectionibus expeditum. Affertur ex Canariis in ripa fluminis Nigui nunc dictis *inſulis*, olim *Fortunatis*, etiā intus albicans, bonitate prædictis inferius, metis conſtans maximis pondere librarum 10. 12. Ignobiſſimum foris albidum, intus ſubrubicum, tanq̃ alio fartum, & foris dolo tectum, metis æqualibus, omnium glutinoſiſſimum: condituris ſiccis ineptum, liquidis ſeruit, Serapiis ſcil. conſeruis vocatis, & ſimilibus. Saccharum, q̃ purius & candidius eſt, officinæ *Finum*: quod vero minus eſt expurgatum, *rubrum* nominant. *Sanguis draconis* recentioribus Græcis vocatus, legitimus, non eſt, vt quibuſdam videtur, niſi liquor cuiuſdā arboris in Africa naſcentis, colore ſanguinis, pellucidus, leuis & fractu minime cōtumax, vi eadem, qualapis *Hematites*, præditus. Siquidē arbor hæc ſcarificata liquorē emittit ſanguineum, quē inſtar gummi denſatū e cortice abradunt incolæ. Quod abunde confirmant ea, q̃ Aloſius Cadanuſtus Venetus *c. 4. ſua nauigationis* ſcribit inquiring:

Matthioli
calumniā
depulſa.

Sacchari
noſtratiſ
delectus.

Finum Sac-
charum.

Optimum
Saccharū.

Valentini.

Madere.

Finum.
Rubrum.
Sanguis
draconis.

- A** inquit: In insula Sancti portus dicta, sanguis draconis reperitur, qui liquor est cuiusdam arboris. Nam statim anni tempore incolae arbores ferro sauciant, corticesque earundem incidunt, qui sequenti anno liquorem gummesum emittunt, colore purissimi & summe naturalis sanguinis, quem colligentes ab ignis igni, resina modo decoquunt, ac defecant, sanguinemque draconis nominant. Lignum quoque eiusdem arboris in frusta confectum incolae decoquunt, liquoremque inde collectum igne aut sole densant. Porro liquorem hunc Africanum iidem non nisi Dioscoridis Cinnabarin esse dicunt, quod illa olim ex Africa, perinde atque is liquor Africanus, allata sit, & quod pictorum in usum veniat, in ducendis purpureis, & rubris ymbris pauca quantitate, & quod Hæmatiti facultate similis sit. Verum etsi non admodum reluctet, quin illis concedam, sanguinem Draconis officinarum, esse liquorem Africanum, tamen mihi nondum
- B** persuadere possum, eundem esse Dioscoridis Cinnabarin, quod is hanc inter metallica recenseat, adeoque fossile potius aliquid, quàm liquor arboris esse videatur. Accedit, quod is sanguis draconis nō magni constet, sed vili satis pretio vèdatur, & haud exigua quantitate afferatur. Quare mihi animus in eam magis inclinat sententiam, ut credam officinarum sanguinem draconis, aut esse liquorem illum Africanum, aut eum, qui ex herba illa, quæ hodie vulgo dicitur sanguis draconis, exprimitur. Ceterum in nonnullis Serapio Mauritanus maximo errore sanguinem hūc Draconis, Syderitidis Achilleæ herba succum esse memorie prodidit. Quæ de re copiose tomo nostrorum de Stirpium historia cōmentariorum primo, in historia Achilleæ disseruimus. Plinius quoque non minori errore hanc saniem siue sanguinem ex draconis pugna cum elephāte elisum & cōmixtum putauit, vulgi secutus opinionem: quod liquorem illum, qui intento nec diluto sanguinis instar colore præditus est, sanguinem animantium falso esse credidit. Atque hinc est, quod veterem appellationem a vulgi opinione natam recētiore subinde Græci retinuerint, & Seplasiæ in hodiernum vsque diem, quod in picturis proprie sanguinem reddat, sanguinem draconis vocent. Officinis medicorum tertium sanguinis draconis genus etiam præstat, factitium & adulterinū, quod ex hircino sanguine, bolo Armeno, & luco forborum diutius insolatis constat: & globi, compressi tamen & nō assurgentis, forma paratur. Hoc præstat abstinere, & prioribus duobus, utpote natiuis & legitimis, uti.
- Thapsia liquor, herbæ ferulaceæ.*

Serapionis error.

Plinii erratum.

Sanguis draconis factitius.

Thapsia.

De lacrymis. CAP. XI.

- L**acryma, quæ a Græcis δακρυον dicitur, humor est ex stirpe sua sponte defluens, ac Gummi modo concrevens. In officinis autem medicorum, sequentium maxime lacrymarum quid. vsus est, quarum exactam notitiam habere pharmacopolas oportet, quod non desint mangones & impostores, qui eas adulterent, ac vitient.
- Bdellium* lacryma arboris est Saracenicæ. Optimum est carens cortice, ligno, for-
dibus, translucens & clarum, gustu amaro, intus pingue, & si tactu subigitur mollescit. Scythicum, Galeno teste, resinofus, atrius, emolliens magis. Arabicum, resinofum, lucidum, liue-
scens. Indicum, sordidum, nigrum, grandioribus glebis in offas conuolutum. Adulteratur gummi, & id quidem minus est amarum, & minus suffitu odoratum. Quapropter quum
- Bdellium** officinarum amarum non sit, & accensum gummi odorem referat, dubium non est, quin adulteratum sit.
- Cancamum* lacryma est Arabicæ arboris, Myrrhæ quodammodo similis. Lacha A.
ætuario, Arabibus & Seplasiis Laccadicitur, id quod ex collatione Serapionis & Dioscoridis liquido patet. Ceterum Lacha, quæ passim in Medicorum officinis prostat, neque est Dioscoridis, aliorumque Græcorum Cancamus, neque Serapionis latca, quod scilicet odore prorsus careat, neq; cum Myrrha ullam affinitatem habeat. Ut maiorem in modum hallucinetur Matthiolus, qui nos Dioscoridis Cancamo non omnino destitutos esse putat. Errat etiam, quod Cancamum, & Laccam Arabum inter se non differre somniat. Si enim Cancamum, ut paulo post dicemus, grato odore spirat, quomodo rogo Arabum Laccam, quæ sapore, ut Matthiolus fatetur, ingrato est, esse poterit? Tres autem res Lachæ appellatione veniunt. Vna, quæ est veterum Græcorum Cancamum, Arabici ligni lacryma, myrrhæ quodammodo similis, ut diximus, boni odoris: sic enim in Dioscoride conuertendum erit, ut in quo falso Bequaer, id est, virofi odoris, pro euo des, legitur, quod hanc lectionem non solum Paulus, qui habet euo des, verum etiam Serapio, qui conuertit, habens odorem bonum, hodie ignorata.

Lacha triplex. i.

Altera factitia, quæ Venetiis, & aliis locis e cocci seu grani tinctorum, & Bersilii feces, quæ maxime pro conficiendo colore rubro obscuro videntur pictores, paratur. Tertia, ex qua ruber fit color, qui vulgo Carmesinus appellatur. Hac tinctoribus est expetita, ideoque a Nicolao Myrepsio in antidoto e lacco, insectorum lacca, Arabibus rubra lacca nominatur. Roris modo supra arborum surculos infidet, præsertim mespili, & coalescit in gummi. Quod confirmat Ludouicus ille Romanus lib. 6. suæ navigationis c. 21. vbi sic scribit. *Mittit etiam ea regio Laccam, unde conficiunt rutilum colorem. Gignitur hac in arbore Inghlandibus nostris haud ab simili. Insectores floccorum purpuream eam macerant, ut colorem ebibant lanæ, & quod remanet lacca dicitur. Hoc autem modo solet elui. Ramuli & frutices, qui illo scatent gummi, feruente aqua, in qua aristolochia & iuncus odoratus inferbuerint, resperguntur: & pistillo subiguntur: dein aqua, quum siccant, emittitur.* Quæ certe omnia ex Isaac cuiusdam sententia Serapion recēset, adeoque inter se Cancamum, quæ lacryma est, & tertiam laccæ speciem, quæ gummi est, vulgoq; Arabes sectanti Charmes & Chermesim appellatur, ex quo floridus ruber fit color, qui Charmesinus nuncupatur, miscuit & confudit. Vt Arabum doctrina nihil sit confusius & incertius. Est tamē præter hoc Serapionis Charmes tertium & nouum Chermesinum Arabib. ignotum, quo hodie puniceo & purpureo colore serica stamina inficiuntur, bacca exigua herbarum, maxime Pimpenellæ radicibus adnascens, de quo supra, vbi de tinctorio grano egimus, multa a nobis dicta sunt. Hoc loco me immerito pungi Matthiolus, quasi parum recte Chermesinum esse laccæ colorem, quo panni rubri inficiuntur putauerim. Siquidem ea in re Serapionem auctore secutus sum, qui huiusce laccæ insecturam Chermes vocat. Sed verba Matthioli subiiciam. *Verum, inquit, Fuchsius se auctoritate Serapionis tueri non potest, quod proprio capite de Chermes, per Chermes nihil sane aliud intelligat, quam Coccum insectarium Dioscoridis. Quo fit ut existimauerim in eo capite de lacca omnino subesse mendam, vel auctoris, vel interpretis.* Hæc ille. Si subesse mendam putauit Matthiolus, cur non in Serapionem, aut eius interpretem, cuius ego verba retuli, potius quam in me errorem illum transtulit: præsertim quum metipse hæc ex Serapione verba referat, inquiens: *Coquitur hæc & inficiuntur inde panni rubeo colore, quam insecturam Chermes vocant.* Atque placuit sibi ut Fuchsiū præ reliquis omnibus tanquam creberrime hallucinantem traduceret. Sed quo candore id fecerit, omnibus notum esse arbitror, qui in lectione Arabum paulo diligentius versati sunt, utpote quibus satis constat, illis duplex esse Chermes. Vnum quidem, quod simpliciter Chermes, vel granum quo panni tinguntur, dicitur. Id profecto non est nisi Dioscoridis κόκκον βαφικόν, id est, granum tinctorium. Alterum est, rubra lacca, ut diximus, insectura. De utroque, diuersis tamen in locis Serapio agit. Quum igitur vtrunque Serapioni Chermes nominetur, parum candide fecisse Matthiolum constat, quod me reprehenderit propterea, quod colorem eius laccæ rubræ, quæ tenuibus lignorum surculis inhæret, Serapionem secutus Chermes appellauerim. Cur enim mihi non licuisset Arabum verba bona fide referre? Amatus Lusitanus tertiam hanc Laccam non in arboribus coalescere scribit, sed apud Indos, quum terra vel pluuia, vel arte plus iusto irrigatur, formicas alatas ligna quædam gracilia ab incolis sic disposita in altum conscendere, & in iis laccam generare, & hac de causa in lacca ligna inueniri. Quæ si vera sunt, lacca non est, nisi, si Diis placet, formicarum alatarum stercus, & Arabum doctrina nihil vanius erit. Sed nihil dubitamus hoc esse Lusitani figmentum: est enim homo ille in effingendis eiusmodi fabulis exercitatissimus. Cuius rei fidem faciant eius Centuriæ, quæ fabulis sunt refertissimæ, & Luciani dialogis similes.

Hederæ lacryma. Gummi. Hederæ officinarum non est legitimum.

Hederæ lacryma in caudice aut trunco interdum concreuit. Hæc Dioscoride & Galeo testibus, Psilothrum est, & illitu pediculos necat. Quapropter quod in officinis sub hoc nomine venditur, minime legitimum est, sed plane spurium & adulterinum: quod gustu neque mordax sit, neque calorem præ se ferat, tantum abest, ut Psilothrum esse possit. Hic vero error facile ex officinis explodetur, si modo Pharmacopœi ex ipsa potius Hederæ lacrymam decerpere, quam a dolosis mercatoribus hanc comparare velint.

Myrrha.

Myrrha arboris Arabicæ est lacryma. Probatum recēset aequalore & situ obducta, leuis, tota concolor, & quæ confractas vnguiū modo, & leuas venas ostendit, glebis minutis, amara, acris, odorata. Omnibus antefertur Troglodytica, subflaua, perlucida, mordax, odoris gratissimi, nullo vituata liquore. Post hanc secunda est tenuis, Bdellii modo facile sub digito mollescens, odore grauiuscula. Mala, nigra, grauis, retorrída, præter modum exsoluta,

A exsoleta, quæ *Caucalis* dicitur. Vera inuentu rara est. Nam in optima Myrrha, Galeno *lib. 1. de Antidotis* teste, *Opopalson*, quod lethale est, de industria a nonnullis eorum, qui eam præparant, admixtura inuenitur, ab optima myrrha diuersum. Propter quod, & alia, Myrrhæ vsus parum tutus est. Officinarum Myrrha videtur esse omnium pessima, ea nimirum, quæ *Caucalis* vocatur.

Myrrha
vsus parum
tutus.

B Myrrha *stacte*, id est, stillatitia, non est, nisi expressa recentis Myrrhæ pinguetudo. Siquidem ex Myrrha recente pingui, & solo lætiore nata largior exsudat ac stillat: deinde cum aqua pauca tunditur, ac tandem machina exprimitur, colore pallido, amaritudine præcipua, odoratissima, pretiosissima, minima portione efficacissima. Arabibus & recentioribus *Stryax*, vel, ut ipsi loquuntur, *Storax*, liquidus appellatur: id quod ex historia verorumque auctorum tum Græcorum, tum Arabum, facile patet. Qui in officinis profertur sub *Stryacis liquidus* nomine, quum teterrimo propemodum sit odore, legitimus aut sincerus esse nequit. Quid vero sit, infra indicabimus. Ex Arabum namque & recentiorum traditione tres sunt *Stryaces*. Vnus liquidus, qui non est nisi, quod iam diximus, Myrrha *stacte*. Alter rubeus, qui nihil aliud est quam exterior cortex fuscus & aridus, qui post lacrymam subactam & expressam remanet, quod Serapio ipse confirmat. Tertius est lacryma, quæ ex *Stryace arboris* exsudat, de qua infra differemus.

Myrrha
officina-
rum.
Myrrha
stacte.

Stryax li-
quidus.
Stryax li-
quidus of-
ficinarum.

Tres Stry-
aces.
Liquidus.
Stryax ru-
bens.

Stryax la-
cryma.
Gummi
Elemi.

Gummi
Elemi of-
ficinarum
adulteri-
num.

C Olea *Aethiopica* siue *sylvestris lacryma* officinis, ut *Hederæ*, inter gummi recensetur, & corrupta voce iisdem *Gummi Elemi* nominatur. Nam oleæ vox primum in *eleæ*, postea in *elemi* ab imperito aliquo Græcæ linguæ est detorta. Laudatur quæ *Scammonio* est similis, fulua, stillis exilibus constans, mordax. Quare videntur officinæ vera oleæ, vel ut ipsæ nominant, *Elemi*, lacryma carere: quod cum *Scammonio* nullam habeat similitudinem, nec rufa sit, nec gustu mordax. Non recte etiam in gummi genere, sed verius refinatum numero censetur, quum igni imposita colliquescat & diffundatur, quemadmodum aliæ resinæ. Ceterum *gummi Elemi* vocati vires apud Chirurgicos, & vulnerarios medicos in sanandis caluarie fracturis præstantes sunt.

D *Resina lentiscina*, id est, *Mastiche* officinis *Mastix* nominatur: laudatissima, fulgore quodam ignis splendida, candore ceræ Tyrrhenicæ, ampla, retorrída, friabilis, stridens, friando odorata, minimum acris: *Chia*, hoc est, ex *Chio* insula. Deterior est viridis & nigra, *Aegyptia* aut *pontica* dicta, Bitumini nigredine similis.

Mastiche.

Chia.

Aegyptia.

D *Terebinthina resina*, ex terebintho arbore defluens, optima est alba, vel cærulea, vel colore vitri, pellucida, odorata, & *Terebinthum* referens, subamara, asperæ arteriæ & ori mordax, liquida. Quapropter quæ pro *Terebinthina*, vel ut ipsi loquuntur, *Terpentina*, a *Seplasiariis* venditur, quod iam dictas notas non habeat, vera non est. Huic proxima est *Laricea*, ex larice arbore, cuius in *Silesia* magna est copia, manans. Quæ certe in *Terebinthinæ* penuria vtendum esset pharmacopœis. Hodie autem *Abietina*, pro *Terebinthina*, a nonnullis officinis supponitur, nullo quidem errore, quum non sit *Terebinthina* multo inferior. Magna tamen ex parte *Laricea* pro *Terebinthina* vtuntur hodie in suis officinis pharmacopolæ.

Terebin-
thina.

Officina
Terebin-
thina de-
statur.

Laricea.

Abietina.

E *Colophonia*, *Dioscoride lib. 1. cap. 78.* auctore, liquida e pinu & picea resina est sponte manans. Hæc quia olim non ex omni loco, sed a *Colophone* maxime, Asiæ ciuitate, petebatur, *Colophonæ* nomen sibi vendicauit. Ceterum liquida pinea resina veteribus duplex fuit. Vna quidem pura, & alienorum commixtione carens: quæ vtribus asserua-

Colopho-
nia.

Liquida
pineae resi-
na duplex.

batur ac portabatur, ut *lib. 9. de Stirpium historia cap. 2. testis est Theophrastus*. Altera impura quæ scilicet ligna & lapidosa corpora in se habuit. Hanc *Galenus lib. 3. de compositione medic. generalium*, *αργιλική*, quod in figulinis, fistilibus amphoris seu doliis impura adueheretur, vocat. Hinc est, quod eandem multis in locis suorum monumentorum *Resinam*

αργιλική.
Resina ex
fistilibus.

αργιλική, id est, ex fistilibus appeller. Nam *αργιλική* Græcis *fistile* significat. Cruda vero & liquida resina, *Plinio lib. 24. cap. 6. teste*, raro vsi sunt Medici, quod coctam & vltam magis vsurparent. Fit enim per coctionem ac vltionem resina arida & friabilis, quod manifeste *Dioscorides lib. 1. cap. 78. & Aetius lib. 1. testantur*, vbi uterque coquendi & vrendi resinam modum docet. Hac autem ratione coctam & vltam resinam, Græci *σπυρτὴν*, hoc est, *fri-
xam & tostam*, vocauerunt. Nec ei, quod iam diximus obstat, quod *Galenus lib. 3. de comp. medic. generalium, c. 2. & 4. σπυρτὴν* appellat eam, quæ eliquata percolatur & purificatur. Nam priusquam resina torretur, ut eliquata percoletur, necesse est, *Dioscoride etiam teste*: ut scilicet.

Resina fri-
xa & tosta.
Obiectio
diluitur.

quod in ea sordidum ac lignosum est, secernatur ab eo, quod purum est. Quapropter A
tosta cocta que esse nequit resina, nisi antea depureretur, ut rectissime Galenus puram &
tostam eandem esse putauerit, quemadmodum impuram & minime tostam itidem inter
se haud differre putauit. Quod euidentissimum fit ex iis, quæ lib. 2. iam citati operis scri-
bit, inquit: *ἡ τῆς δ' ἡ τῶν καρυίων ἀξίαται & πρὸς ἄφρυντον*. Proinde nihil refert, ut com-
prehensum est, utrum impuram minimeque percolatam, aut non tostam frixamue di-

Resina tosta
falso Colo-
phonia no-
minata.
Græca pix.
Resina pro-
prie quid.
Pix proprie.

xeris resinam: quod iis omnibus nominibus res vna duntaxat significetur, nec frixa fiat
resina, nisi prius repurgetur. Hoc vero modo tostam frixamque resinam, ut etiam Gal. lib.
iam citato memoria prodidit, nonnulli, etsi falso, Colophoniam appellauerunt. Qui profecto
error ad hæc vsque secula nostra dimanauit. Nam in hodiernum vsque diem frixam

Zopissa.
Pix sicca.

Colopho-
nia.

& tostam resinam officinæ medicorum Colophoniam, & Gracampicem nominant, picis B
nomine abutentes. Siquidem veteres, quod ex viucentibus & nondum præsectis arborib,
destillat, resinam dixerunt. Quod autem ex incensis pinguiissimis harum arborum li-
gnis in furno effluit, picem liquidam vocauerunt. Seplassiæ hodie naualem picem nuncu-
pant, quod ea ad obturandas naues vtantur. Distat autem a Zopissa Dioscoridis, ut quæ
sit resina cum cera nauibus derafa. Ceterum liquida pix decocta in siccam coit, quam
Dioscorides *καλὴ πικρὰ*, hoc est, bis picē, nominat. Vera aut Colophonia, peculiaris fuit
resina, Mastichæ similis. Quod euidentissime testatur Gal. lib. 7. de Compos. med. gen. in huc
scribens modum: *ἐπὶ δὲ τῶν περικίντων & φρυκτῶν ῥητίνων εἰσὶν αἱ καλοφονίαι ὀνομαζόμεναι. εἴτιν, ἐπὶ δὲ ἄλλῃ τῇ
δὲ καλοφονίᾳ πρὸς πλῆθος τῇ χιὰ μασίχῃ, μαλακκὴν δὲ χροῖαν*: Consueuerunt pineam, & frixam resinam,
etiam Colophoniam nominare. Sciendum vero, quod & alia quædam est Colophonia, Ma-

Colopho-
nia triplex
veteribus.

stichæ Chizæ similis, emolliendi aliquam habens facultatem. Quam quidē Galeni sen- C
tentiam Plinius quoque lib. 14. c. 20. confirmat, ita scribens: Colophonia resina præter ceteras
est fulua, si teratur, alba fit, grauior odore, & ob id ea non vtuntur unguentariis. Ex quibus palam
fit, veteribus triplicem fuisse Colophoniam. Vnam pineam & picem, ex Colophone allatam.
Alteram resinam eandem, sed tostam ac frixam, qualis est etiam hodie, quæ hoc nomine in officinis
Medicorum prostat. Tertia vero & peculiaris, quæ Mastichen referebat, quæ hodie est incognita.

Sarcocolla.

Sarcocolla arboris Persicæ lacryma, pollini thuris similis, rufa, emplastica, subamara,
sine morfu siccans. Valentior est flaua, quam alba: & quo amarior, eo melior. Quapro-
pter quæ amara non est, haud dubie adulterium sensit. Sarcocollam autem Græci hanc
lacrymam dixerunt, quod *sicuti glutinum lignum, ita hæc sauciatam, exulceratamque corporis* D
carnem agglutinat.

Styrax cala-
mitæ.

Styrax lacryma arboris Syriacæ. Probatum flauus, pinguis, resinofus, albicantibus
grumis, acer admodum & amarus, odoris bonitatē diu seruans, & qui subactus melleū li-
quorem reddit. A Gal. lib. 1. de Antidotis, Calamitis, quæ olim in calamis & arundinibus ex
Pamphilia adueheretur, dictus est, & reliquis præstantior fuit. Atque hinc est, quod in
hodiernum vsque diem vsitatum sit medicis, ut Styraci semper Calamita nomē adiungant,
præstantiorem significare volētibus. Hic reuera liquidus fuit, & dicebatur, quanquam
diuersus ab eo, qui ita Arabibus nominatur. Hodie adferri desit. Hallucinatur igitur
plurimum Dessennius, qui impudenter scribere ausus est, *quoties simpliciter effertur Styrax,* E
Calamiten siue aridum intelligendum. Optarem hunc hominem paulo tardius scribendi p-
uinciam, donec maturuisset iudicium, suscepisse. In errore quoque versatur Matthiolus,
qui illum liquidum fuisse negat, quemadmodum copiose in 3. nostrorum de stirpium historia
Comm. tomo demonstraui. Hic in candicantes & rufescentes grumos seu micæ con-

Dessennii
error.

Styrax sic-
cus Galeni.

Styrax li-
quidus offi-
cinarum.

Styrax sic-
cus Arabū,
& officina-
rum.

Styrax ru-
beus.

Thymia-
ma.

Thur.

Masculum.

Manna
uris.

crefcit, & Galeno siccus dicitur. Huic Calamitzæ Styraci interdum liquida resina & oleum
additur, ut liquidior factus magis redoleat, & viliori pretio vendatur: qualis est, qui in
officinis Medicorum sub Styracis liquidi nomine hodie prostat. Porro exterior cortex,
qui post lacrymam expressam remanet, Arabibus, ut ex Serapione constat, Styrax fucus di-
citur. Et hoc etiā nomine Seplassiis hodie appellatur. Iisdem quoque rubens Styrax, & Thy-
miamina nominatur, quæ scilicet Papiasticæ religioni addicti, eo in suis templis ad suffumigandas
aras diuorum vtantur. Thus lacryma est arboris Arabicæ, officinis non sine risu erudito- F
rum, Græco articulo adiecto, *Olibanus* vocatur. Laudatur pingue, albius. Quod *femininum*
appellat, resinofus magis est, ac molle, cito ardens. Quod masculum, primum albicat,
tandem etiam rubescit & flauescit. Mannam vero thuris ex magnis fasciculis glebisue
exiguas thuris micæ, cōcussu, motuque elisas, a thure læuigato diuersas, cum fragmentis
quibus-

A quibusdam exiguis corticis thuris, nominant. Nam, *ut Galenus lib. 4. de compos. medic. generalium, ca. 4. testatur*, fragmenta quædam exigua corticis thuris ipsi mannæ in hærent; a quibus exiguum quiddam adstrictionis assumit; qua quidem ratione a thure differt, utpote quo magis adstringat, id quod *libro 3. Thera. methodi* confirmat Galenus, ubi mannam *συμπυκνότερον ἔχει φάρμακον ἢ λιβάδιον*, disertè scribit.

Tragacanthos, tragacantha, vel tragacanthum, lacryma est, *Dioscoride teste*, quæ radicibus vulneratis emanans, concrevit. Officinis, corrupta nonnihil voce, *Dragagantum* appellatur, & perperam ab iisdem inter gummi genera numeratur. Laudatur *Tragacantha alba, pellucens, gracilis, levis, sincera, subdulcis*. Quæ vero est antiquata, magis primum pallescit, dein rufescit, tandem etiam flavescit: fitque hæc annis amara, ob idque calidior.

De Gummi. CAP. XII.

Gummi est lacryma, in truncis arborum concreta. Visitata hæc quæ sequuntur, in officinis Medicorum sunt.

Arabicum gummi vulgo dictum, quod ab Arabia regione Aegypto contermina olim importaretur, ex Acacia Aegypti spina manat, in vermiculorum speciem contractum, vitri modo perlucidum. Veteribus *gummi* absolute, Galeno *Thebaicum*, aliis *Babylonicum*, a Babylone Aegypti Arabiam attingentis dictum. Quod in officinis prostat, non videtur esse legitimum. Nam sunt illi commixta varia aliarum arborum gummi, nec contractis vermiculis simile existit.

Amygdale amara.

C *Cerasi*, quod tussi medetur vetustæ, visum exacuit, & calculosis auxilio est.

Iuniperi gummi veteribus non memoratur. Plinius tamen *lib. 13. cap. 11.* eius meminit, sed ad nihil utile esse tradit. Contra recentiores Græci, Actuarius præsertim, & Nicolaus, crebro ipsius mentionem faciunt, & ad plurima esse utile scribunt. De quo non est, cur quispiam miretur: fieri enim potuit, ut Plinii temporibus ignotus fuerit eius gummi usus: ob idque contemptum, tanquam inutile iacuerit. Atqui tandem posterioribus Græcis coeptum est uti hoc gummi: ideoque eius facultates iisdem quoque innotuerunt, quæ priores latuerunt. Probat *recens, perlucidum, pallidum*, dum veteravit, flavescit, & fit friabile, Mastiches modo, quam toto habitu multum mentitur. In usu frequentior tamen est scriptoribus & pictoribus, quam medicis, *ut mox fusius dicemus*.

D vulgo *Vernix* nominatur. Sed ne ambiguitas hoc loco alicui imponat, animaduertendum duplicem esse Vernicem: unam *sponse natam*, alteram *factitiam*. Sponse nata, est iuniperi gummi, quæ *solida & scriptorum Vernix* a nonnullis appellatur. *Solida* quidem, ad alterius differentiam, quæ liquida est. *Scriptorum* vero, quia ex hoc gummi pulvis fit ad delinendas chartas aptus, ne bibulæ sint, & elegantiores appareant literæ. Eius enim farina superiecta, literis nitorem conciliat. Vernix autem hæc alio nomine Arabibus, maxime Serapioni, *Sandarax*, & *Rasi Sandaros*, recentioribus *Sandaraca* dicitur. Factitia vernix est liquida, & Germanis, allusione quadam ad Latinam vocem, *Vernis* nominatur. Hæc gemina existit. Una enim est, quæ constat ex gummi iuniperi, & oleo, quod pressum lini semen remisit, quanquam aliqui oleum e nucibus expressum, adiecta

E aloë usurpant. Altera, quæ ex succini reliquiis ad tornasilia opera inutilibus conficitur. Quæ res nonnullis imposuit, ac erroris occasionem præbuit, ut vernicem eandem cum succino esse crediderint. Vtraque liquida pictores, & fabri lignarii utuntur. Ea namque colores imbuti sic tinguntur, ut pertinacius hæreant, quam deleri facile possint: Hac etiam illustrantur picturæ, & ferro nitor conciliatur. Vtilis quoque ad ambustia, & efficax ad dolores & tumores hæmorrhoidum. Diversa vero est vernix a vernigine, quæ Aristoteli *lib. 5. de animal. historia cap. 22.* & Varroni *lib. 3. de re rustica, cap. 16. iedān* appellatur. Non est autem nisi apum opificium, *ut idem M. Varro testatur*, quo fauos extremos inter se conglutinant. Quod Plinius quoque *lib. 11. cap. 7.* confirmat, qui apum, dum operantur, cibum plenum humoris esse, & in favorem inani-

F ratibus sepositum inueniri, atque non tantum *Erithacen*, sed & *Sandaracam* vocari, scribit. Vernigo autem dicta est, quasi *vernus ros*, ex verno enim rore, Plinio loco iam citato teste, fit. Ut hinc palam fiat, plurimum errare eos, qui verniginem eandem cum vernice esse existimant. Hallucinantur iisdem, quod vernicem, quasi *vernum rorem*, vocatum esse putant, quod ex verno rore fiat. Id enim de vernigine, non vernice recte affir-

Tragacantha.

Gummi Arabicum.

Thebaicum Babylonitum.

Cerasi. Iuniperi.

Plinii locus con-
cleatus.

Vernix. Duplex vernix. Sponse nata. Solida. Scriptorum.

Sandarax. Factitia seu liquida.

Vernix a vernigine distat. iedān.

Sandaraca. Vernigo unde dicta.

matur: vt quæ non verno, vt *vernigo*, sed æstiuo potius tempore, recentiorum Græcorum testimonio; e iunipero arbore sudat.

Pruni.

Pruni gummi, potum in vino, calculos frangere dicitur: & ex aceto illitum, infantium impetigines sanat.

De Corticibus. CAP. XIII.

Corticis vsitati autem hodie in Medicorum officinis sunt maxime, qui sequuntur.

Arancio-
rum cor-
tex.
Casia.

Aranciorum, aut rectius *auranciorum* *malorum*. De quibus *cap. 7.* diximus.

Casia quo *Cinamomo* est similior, ac odore, ac gustu, ppior, eo est præstâtior. Tanta enim est *Casie* cum *Cinamomo* similitudo ac confinitas, vt, auctore etiam in libro de *Antidotis Galeno*, *Casie* ramuli in *Cinamomum* vertantur, & contra. Quod cognoscentes, qui arbores illas excorticant, nullo discrimine vtrumq; corticem in fasciculos redigentes, ad externos mittunt. Est autem inter *Casie* genera, quæ, vt ex *Dioscoride* liquet, complura sunt, optima, rufa, flauescensq; rosam exspirâs, & vinû olens, boni coloris, perquâ angusta, longa, crassa, & fistulosa: nec linguam ita impense vt *Cinamomum* erodit, sed cum acrimonia quadam potius adstringit, & aromatum modo odora. Hinc omnibus perspicuum euadit, quod cortex, quo sub *Casie* nomine hætenus vsi sunt pharmacopœi, non sit vera *Casia*, quod nec gustu *cinamomum* referat, nec acris sit, nec odoratus. Sunt qui sarmëta quædam & virgularum frustula *Casiam ligneam* esse fallo putarunt. Alii *Genistæ* radices corticem esse censuerunt. Nec *Casia*, quæ nunc affertur, est nisi pessima ipsius species. Vera autem *Casia* quibusdam non videtur esse, nisi id, quod Nicolaus Myrepsius & alii *Canelam* & *Canellam* nominant, quod canales & tubos imitetur. Sed fieri forte potest, vt in capsis *canella* refertis & *casie* & *cinamomi* genera reperiantur: quare delectu opus erit, qui illa distinguere velit. Distinguet autem, notis vtriusque diligenter expensis. Ceterum habet *casia* alias quoq; apud Græcos appellationes. Nam *Galeno* sæpe *ῥάνα σιέρις*, & *Actuario* ac *Nicolao* *σιέρις τῆς ῥάνας*, id est, *Casia fistulosa*, aut *Casia fistula* & *ῥυνοργία*, hoc est, *lignea fistula*, qua quidem nomenclatura adhuc officinæ vtuntur, nuncupatur. Diuersa tamen res est a *Casia* purgatrice & *Aegyptia*, quæ eidem fistulæ vel fistularis nominatur, vt *cap. 7.* diximus.

Casia offi-
cinarum.

Canella.

Casia fistu-
la.
Casiali-
gnea.
Cinamo-
mum.

Cinamomum, quod nobis *Zeilam* insula mittit, cortex est arboris quatuor fere cubi-

torum altæ, crassitudinis brachialis, sex vel septem e trunco mittentis ramulos, qui singulis annis amputantur, atq; iterû pullulant, quorû cortex, qui *Cinamomum* est, sit tenuis, odoratissimus, gustatu acris, & valde mordax, non tamen adeo vt moleste rodatur, mansum rutam oleat, colore intus cinericio, extra subrufo, nodis frequentibus, leuis, fractu facile. Hanc meam de *Cinamomo*, quod cortex sit, sententiam *Matthiolus* in altera suorum in *Dioscoridem* *commentariorum* editione prorsus improbat, & sibi admodum dolere ait, quod maiorem fidem præstiterim *Lusitani* ineptiis & mendaciis, quam virum peritum decuerat. Quasi vero hoc a *Lusitano*, cuius fides mihi semper suspecta fuit, didicerim, & non huius meæ sententiæ auctores ac testes habuerim viros grauissimos, ac fide dignissimos. Inter quos sane vnum *Ludouicum Vartomannum*, Romanum patricium commemorasse in præsentia satis sit. Is enim *lib. 6. sue nauigationis cap. 4.* de *Cinamomo* ita scriptum reliquit: *Cinami arbor Lauro haud absimilis nascitur, præferim si folia spectes.* Et mox subiicit: *Cinamum nihil aliud esse, quam librum corticemue, eumque ita legi. Singulis ternis annis, inquit, incidunt ramos delibrantque, demtumque eo modo corticem, Cinamomum appellant.* Quibus vtiq; verbis *Matthioli* opinionem plane refellit. In peruersam autem hanc opinionem nulla alia de causa peruenit *Matthiolus*, quam quod veteres vnanimes scribant, *Cinamomum esse ramos, virgulta & surculos*, id quod nos quoque fatemur. Quod enim illi ramulorum, virgultorum, & surculorum tantum in historia *Cinamomi* mentionem faciunt, id nullo alio nomine factum est, quam quod cortex, qui *Cinamomum* est, ex iis ipsis duntaxat, & nequaquam e caudice colligatur. Quod itidem confirmat *Ludouicus ille Romanus*, qui loco paulo ante citato sic scribit: *Non caudicem incidunt, sed tantum ramos.* Quapropter quum non ex caudice, sed ex ramulis virgultisue tantum cortex, qui *Cinamomum* appellatur, delibretur, nihil mirum, cur in eius historia horum tantum meminerint, vt de victoria *Matthiolo* non sit admodum triumphandum. Accedit huc, quod Germani nostri in hodiernum diem *Cinamomum* sua lingua, *Zimmet rinden*, hoc est, *corticem Cinami*, nominant. Ocularis etiam inspectio docet, *Casiam* esse

Matthio lo respon-
detur, &
eius opi-
nio repro-
batur.

A esse corticem, cui cinamomum est simile, quapropter ut & illud cortex sit, necesse est. Sed hanc & alias Marthioli calumnias etiam Franciscus Alexander Vercellensis infertatur. Raro aut nunquam hodie verum Cinamomum affertur. Quo enim sub hoc nomine videntur Seplasia, magna ex parte Casia est, ut paulo ante diximus. Nam si affertur, de quo tamen non parum addubito, non est nisi id, quod tenue admodum est. Quod enim crassum hodie affertur, non est nisi Casia genus. Ceterum arboris huius folia nucis juglandis aut Lauri latifolia foliis similia sunt, quæ in officinis falso pro Malabathro venditur, ut supra quoque ostensum est.

Citrei mali cortex, Citri officinis nominatur.

B *Punicorum malorum, Granatorum* Seplasiis vocatur. Galeno & Dioscoridi, *Sidion*, Barbaris adiectione vnius literæ deprauata voce *Psidion*, Plinio, *Malicorium* dicitur.

Macer cortex est flauescens, crassus, gustu perquam adstringens, *Dioscoride teste*, ex Barbaria aduehitur, Galenus ex India conuehi tradit, gustu multum acerbo, cum leuicula quadam acrimonia odorata, iucundum & suauiter redolens. In calore & frigore temperatus, in tertio autem desiccatur. Non differt a Mace, quemadmodum lib. 2. de stirpium historia copiosissime monstrauimus.

Macis autem Arabum extrema est membrana, tenuis, fusca, aut flaua, odorata, sapore subacri, alteri duro & ligneo nucis moschatae inuolucro coherens. Calida & sicca, *Auicenna teste*, in secundo ordine.

C *Fraxini cortex.*

Mandragora cortex crassus.

Nucis juglandis viridis.

Raphani.

Sambuci.

Tamaricis.

Thuris arboris cortex sit crassus, pinguis, odoratus, recens, læuis, non scaber, sine membranis. Adulteratur misto cortice pini aut nucis eius cortice, sed hi sine odore fumant, non incenduntur: *thuris* vero cortex ardet, & cum odoris fragrantia vaporem iniaculatur. Fere in glebis *thuris*, ut dictum est, inuenitur.

D De Lignis. CAP. XIV.

A *Gallochon* est lignum, quod ex India & Arabia, *Dioscoride auctore*, deferretur. Thina ligno simile, solidum, compactum: *ἡ γὰρ ὁμοῖον* enim, id est, constrictum, compactum, & solidum, ut habet *Aldinus codex*: non *ἡ γὰρ ὁμοῖον*, hoc est, maculatum, ut in aliis *Dioscoridis* codicibus scribitur, legendum. Quod necessario monendum esse duxi, ne more quorundam lignum aloes verum esse non putaremus, nisi quod esset maculatum, seu punctis interstinctum. Satis enim est, si gustu sit adstringens, odoratum, subamarum, & compactum. Accedit pro confirmanda *Aldini* codicis lectione, quod neque *Serapio*, neque *Auicenna* macularum & punctorum meminerint, sed uterque durum & ponderosum.

E seu graue, quale certe est id, quod compactum & solidum existit, esse scribit. *Dioscorides* quidem corticem eius corii similitudinem habere, & versicolore esse, non lignum ipsum tradit. Quapropter interpretum *Dioscoridis* sententia, qui *ἡ γὰρ ὁμοῖον* legerunt, & *maculatum* interpretati sunt, prorsus repudianda erit, & *ἡ γὰρ ὁμοῖον* cum melioribus & emendationibus codicibus: aut cum *Oribasio* *ἡ γὰρ ὁμοῖον* est igitur odoratum legendum.

Xylaloe Aetio, *Simeoni Sethi*, *Nicolao*, & *Actuario* recentioribus Græcis, *Seplasiis* lignum aloes dicitur: Optimi hanc esse probationem scribunt. Si coniectum in carbones *Thuris* modo liquecat, lacrymamue fundat, & odorem spiret bonum, diuque antequam ab igne absumatur, perduret. Item si aqua iniectum mox subsidat, & bullas edat. Crudum *Nicolaus* & *Me-*

F suæ ubique fere requirunt. *Simeon* autem *Sethi* non consequi illud bonum odorem, nisi putrescat, memoriam prodidit. Putrescit autem, si conditum sub terra, & multo puluere obrutum, post certum temporis spatium ab incolis educatur. Crudum itaque est, quod in sepulchrum fuit, nec computruit. Non autem temere crudi *Agallochi* mentionem prædicti auctores fecerunt. Nam ad geminum usum medici *Agallochum* accommodant, nepe ad suffimēta odorisque conciliandi gratia: & ad roborandas internas corporis

Cinamomi folia.

Citri.

Sidion.

Psidion.

Malicorium.

Macer.

Macis.

Mandragora.

Agallochon.

Dioscoridis locus.

emendatus.

tus.

Xylaloe.

Lignum aloes.

Optimi probatio.

Crudum.

partes. Si igitur boni odoris conciliandi ergo ad medicamentorum compositiones ad- **A**
hibetur, usurpandum erit id, quod sepultum fuit. Si quidem, *ut Simeon Serbi attestatur*,
quamdiu non putruit, nihil odoris suauitate a reliquis arborum lignis distat. Sin ad ro-
borandas internas corporis partes, verbi gratia, cor & ventriculum, medicamentis in-
ditur, crudo vtendum erit, vtpote quod adstrictoriam suam facultatem illa befactatam
adhuc retinet, adeoque ad robur partibus conciliandum aptissimum est. Quare crudum
etiam, vbi dysenteriam curantibus medicamentis inditur, præstantissimum erit. Quum
itaque crudum Agallochum id sit, quod non putruit, & insepultum fuit, adeoque quod
statim ab arbore excisum ad vsum rapitur, parum recte Matthiolus me reprehendit, &
id potius esse Agallochum crudum contendit, quod non fuerit antea elixum. Nam
non id solum, quod antea non fuit elixum & coctum, sed etiam id, quod terra vel pul- **B**
uere sepultum non fuit, *crudum* dicitur. Vtrunque enim statim ab ipsa arbore excisum,
ad vsum rapitur. Coctum vero, & quod sepultum fuit, nequaquam. Coctum vero in i-
gne diu durat inconsumtum, propterea quod inter coquendum, quemadmodum et-
iam sepeliendum, glutinosam humiditatem amiserit. Mos est autem Arabibus deco-
quere *Agallochum*, *ut Cassius Felix auctor est*, odoris excipiendi gratia, aquamq; in qua de-
coctum est & eius succum excepit, in multos vsus seruare. Proinde dum me Matthiolus
erroris infimulat, ipse in binos, eosque maximos errores incidit, quorum is primus est,
quod per crudum Agallochum Nicolaum intelligere tradit, quod imperu fluminum,
longoque eorum ductu per regiones defertur, sed non videt id, quod a sole elixatum **C**
est, *crudum* dici non posse. Vtrunq; enim, nempe tam id, quod ab igne, quam id, quod a
sole elixatur, coctum sit necesse est. Alter error est, quod censet, Nicolaum nullum al-
liud expetere Agallochum, quam quod sepultum præstantissimum euaserit. Quomo-
do enim præstantissimum esse poterit id, quod facultatem adstrictoriam, quæ in crudo
maxime requiritur, iam ex sepultura fere totam amisit. Atqui ita euenire solet, vt quum
aliorum errores, meos potissimum auidius insectatur Matthiolus, ipse interea suos pro-
deat. A Matthioli calumnia & iniuria me asseruit Franciscus Alexander Vercellensis ita
in folio primo sui Antidotarii scribens: *Hic noua laudis studio Matthiolus, Fuchsi sententiam
refellit, quoniam per crudum aloes lignum intelligit, quod non putruit, quod terra non obruitur, sed
statim ab arbore excisum, ad vsum rapitur.* Qua quidem in serie, quod non vitii genus insit,
docti viri diiudicent. Merum enim creditur odium in eundem profusum, *ut fusi apud* **D**
eundem legere licebit. Vt hinc etiam conspicuum fiat, Matthiolum virus suum & tam va-
rias calumnias in me nulla, nisi ambitionis & odii gratia euomuisse.

Aspala-
thus.

Aspalathus optimus est grauis, detracto cortice rubens, aut purpurascens, densus,
odoratus, gustu amarus. Est & alterum genus candidum, lignosum, sine odore, quod de-
terius habetur. Suspicio est Aspalathum legitimum in officinis nostris non proflare.
Quapropter suppleat eius vicem Viticis, siue agni semen, *ut suo indicabimus loco.*

Bersilium.

Bersilium vel *Bresilium*, vel *Verzinium*, a Verzinia vrbe Indiæ, vnde aduehitur, dictum.
Hoc quidem in Medicorum vsum nondum venit, sed velleribus imbuendis, & scripto-
ribus expetitur. Qui namque librorum mangonio dant operam, segmenta ligni ace-
to tantisper macerant, dum omnem coloris vim ad se rapiat, cui non nihil gummi & a- **E**
luminis, ne chartas penetret, adiiciunt.

Gaiacum.

Gaiacum, siue *Guaiacum lignum*, vt officinæ nominant, probatur, quod caudice cete-
ris exiliore constat, cortice ipsi ligno firmiter hærente, densum, graue, bene habitum,
sapore magis amaro, acri, & odoratius, quod Sanctum dicitur, quale est, quod omni ex
parte albicat. Hoc enim quum minus adoleuerit, ac consenuerit, plus in se succi conti-
net, atq; ceteris viribus præstat. Nam quod hoc tam intus, quam extra candicet, illud
vero interiore sui parte nigricet, non aliunde prouenit, quam quod hoc magis, illud
vero minus adoleuerit. Quippe eo nigrius cernitur lignum Guaiacum, quo ad matu-
riorem ætatem peruenerit arbor, a qua decisum fuerit. Ceteris igitur minus præ-
stat, viribusque infirmius habetur, quod nigrius, crassius, & annosius reperitur. Ce- **F**
terum cortices, qui etiam in vsum medicum veniunt, probatissimi habentur, qui a præ-
stantiori caudice detracti fuerint.

Santalum

Santalum Actuarius, Nicolao, aliisque posterioribus Græcis triplex est, candidum,
rubrum, & flauum, seu, vt Seplassæ nominant, citrinum. Præfertur in iis generibus fla-
uum,

Auum, utpote odoratissimum. Secundas tenet rubrum, tertiam sibi sedem arrogat album. Sunt tamen, qui postremum locum rubro, quod nullo ut priora duo commendatur odore, assignent. Non est tamen, quod Matthiolum secuti, dicamus album santalum, quod suauiter spiret, calidum esse. Deceptus enim est verbis Galeni ab eo parum recte intellectis, qui *libro 4. simpl. cap. 20.* odorata omnia esse calida scribit. Quasi vero rosæ, quæ suauiter spirent, & Mandragoræ poma, hoc nomine calida esse per excessum necesse sit, quum tamen Galenus id tantum innuere prædictis verbis voluerit, *odorata omnia aliquid caloris obtinere*, non per excessum esse calida, *ut in nostris super hunc locum Cōmentariis plenius docuimus.* Santala tertiam frigidorum, & secundam siccorum classem sibi assumunt. Ut hinc omnibus perspicuum euadat, Santalum flauum quarundam officinarum, seu, ut ipsæ appellant, citrinum, quum acri sapore linguam interdum mordeat, ac pungat, non esse legitimum, ideoque eo non utendum. Calidum enim admodum est, adeoque Cedri, vel alterius arboris odoratæ & calidæ lignum esse apparet. Officinæ vnius literæ immutatione Sandalum vocant.

Santalum
citrinum
officina-
rum est
spurium.

Tamarix, tamariscus officinis. Vide supra.

Viscum quernum, vel, ut Seplasiæ nominant, *quercinum.*

Tamari-
sci.
Viscum
quercinū.

Xylobalsamum probatur recens, sarmento tenui, fuluum, odoratum, quadamtenus opobalsamum spirans. Quare quod officinæ usurpant, Xylobalsamum non est, sed alterius cuiusdam arboris virgultum, quum a iam dictis notis plurimum absit, nec præter graciliatem quicquam cum ligno Balsami commune habeat.

De animantibus & eorundem partibus. CAP. XV.

Antalium & Dentalium more Latinorum prolatum, vel, ut Nicolaus Mirepsius *sect. 1. ver- tia, unguento 42. appellat*, ἀνταλὶ καὶ δένταλι, & officinæ *Antale & Dentale*, varii varic interpretati sunt, ita tamen ut nihil attineat singulorum prolixè referre sententias, quandoquidem in vniuersum omnes a veritate aberrauerint. Reuera autem e testarum genere & *Antalium*, & *Dentalium* existit, sed quarum a nullo adhuc satis explicatum esse puto. Mihi quidem, ut *diserte quid de iis vocibus sentiam in presentia exponam*, vtraque esse corrupta, quales certe multæ aliæ in Nicolao reperiuntur, videtur. Nam ἀνταλὶ dictio ex Græca ἀντέλλω haud dubie deprauata est, qua Athenæum vsum esse constat. Sic enim ille nominauit Conchæ speciem, quam alii Græci τελλίην, & in plurali τελλίνας, a crescendi nimirum celeritate, ἐπὶ τήνδε γίνονται τελλίαι: quod celerrime perfectionem attingant, vocant. Idem nomen Latini retinuerunt. Atque etiamnum hodie Romani has Conchas Tellinas appellant. Duo autem Tellinarum Athenæus genera facit, nempe marinas & fluuiatiles, vel in fluuiorum hostiis repertas. Atque harum aliquæ maiores, aliquæ minores sunt. Duplici testa minor constat, vtraque simili, læui, valida, & satis spissa, in ambitu serrata, qua de causa ad vnguem coniunctæ sunt. Maioriam dictæ similis, nisi quod testa sit maiore, tenuiore minusque spissa, & ex rubro flauescente, parte qua testæ colligantur in acutiorem angulum desinente. Per Antalos autem Nicolaum non nisi *Antellas vel Tellinas* dictas intellexisse, hinc quoque perspicuum euadit, quod ille

Antalium
& Dentalium.

Antali
quid:
ἀντέλλω.
τελλίνα.

Dentalis in vnguenti e citriis compositione, quod ad extergendas lentigines faciei, impetigines delendas, aliaque cutis vitia sananda confert, perinde atque id genus aliis abstergendi facultate præditis medicamentis, vltus sit. Id enim satis ostendit, Antalos ei non nisi Antellas siue Tellinas significare, quibus certe abstergendi quoque inesse facultatem Galenus *libr. 4. de compos. medicam. localium capite ult.* abunde docet, dum earundem testis leuigatis ad pilos palpebrarum euulsos, ne amplius pronascentur, utendum esse docet. Siquidem constat ea omnia, quæ pilorum ortum prohibent, esse attenuatoria, & abstergentia. Idem etiam Galenus, *libr. 11. simplicium*, omnium testarum cinerem extergendi facultatem obtinere memoriæ prodidit. Præterea, Dioscorides *μύαγες*, quas Athenæus *μύτλος*, Plinius adiectione vnius literæ *mytilos* nominat, Tellinarum species palpebrarum crassitudines, oculorum albugines, caliginesque extergere scribit. Plinius denique Mytilos ad lepras, lentigines, & maculas exterendas vim habere literis mandauit. Quum itaque Antellarum & nomen & facultas cum Antalis pulcre quadret, dubium non est, Nicolaum has ipsas, deprauata & corrupta voce Antalorum, significare voluisse. Ceterum hodie pharmacopœi no-

Tellinæ.
lib. 3.

Minor.
Maior.

Qua testa officinae hodie pro Antellis vtantur. Antali nō sunt lapides. stri pro Antali seu Antella, in prædicti vnguenti confectioe, vermiculorum quorundam testis vtuntur, tubuli imaginem referentibus. Nascuntur autem tubuli illi seu siphunculi testacei in saxis marinis, & super Concharum vetustarum testas, rotundi, asperi, candidi, & nigri, intrus læuissimi. Horum autem alii recti sunt, alii contorti & replicati. Proinde quum tubuli illi nascantur in saxis, factum est, vt barbaram sectantes medicinam lapides hos ipsos esse crediderint. Ceterum in iis tubulis procreantur & viuunt vermes, qui foras se exserunt hauriendæ aque gratia. Hi vtique colore, substantia, Scolopendræ rubræ similes sunt, figura & magnitudine non nihil differunt: longissimi enim digiti magnitudinem non excedunt. Pars posterior folii Myrtei modo in acutum desinit. Priore parte vtrinque pedes habent, veluti *Scolopendra*, vnde fistula prominet in extremo obtusa tubæ modo, & perforata. De Antalis hæctenus. Porro *πνταλι* vox forte

Dentali quid. *δενταλοι*.

Rondeletius lib.

1. cap. 40.

& 41. & sequent. Et

lib. de insectis atque

Zoophytis cap. 5.

Qua testa officinae hodie pro

Dentali vtantur.

Antalium vt a Dentali distet.

Antalium

licetbit vsurpare iam dictos in saxis natos tubulos, quod testæ Concharum in vniuersum

omnē extergendi facultate donatæ sint. Ceterum, ne id silētio inuoluamus, Entaliū, vt

nonnullis vocatur, ab Entali iā dicto diuersum est, ac lapidis genus, q̃ Platearius in exposi-

tionē Antidotarii Nicolai, *Amentum dulce* nominat, quod nomen Gesnerus Sabaudien-

ses adhuc vsurpare scribit. Sic autem appellant, nomine haud dubie corrupto ab Ami-

antho lapide, cui quidem, quod eboris instar candidus, splēdidus & friabilis sit, similis

est. Etsi autem lapis hic dulcis sit, atque hoc nomine ab Amiantho, qui falso sapore ac

pungenti qualitate est præditus, differt, vt Platearius etiam fatetur: tamen nihilominus

factum est, vt in vnguento Citrio Nicolai Latini scriptum sit *Amenti dulcis*, pro *Amian-*

zi, quod in Græco codice diserte sit *ἀμιάρις*, veluti in nostris in illud annotationibus copiosius

diximus. Quum enim vnguentum hoc desideret medicamenta maxime abstergentia,

quæ dulcia sunt, in eius compositione locum habere non possunt.

Cancrorum fluuiialium vltorum cinis ad morsum canis rabidi laudatur. Sciendum

vero, nos Cancro fluuiali in Germania nostra carere. Quamobrem non sine errore ho-

die Astaci fluuiatiles ab omnibus fere pro Cancris habentur, & in eorum vicem vsur-

pantur. Carne enim sunt molli, fluida, & dissipatu facili minimeque nutriente.

Cantharides probantur in frumentis inuentæ, *Dioscoride teste*, & quæ luteas in alis

transuersas lineas obtinent, corpore longo, crasso, blattarum modo præpingues. Capi-

untur verè, & necantur, vt præcipit *Dioscorides*. In harum verò vsu diligenter consideran-

dum medicis erit, quando integris vtendum sit, & quando caput & pedes auferre con-

ueniat. Quum extrinsecus corpori ad tollendas impetigines, scabiem, lepram, & sca-

bro vngues admoventur, nihil prohibet corpore solo cantharidum, abiectis pedibus,

capitibus, & alis, vt, quod nimirum hac ratione magis erodant, vtpote iis, quæ erosio-

nem impedire possunt, abiectis. Alas autem & pedes cantharidum maleficio aduersa-

ri in primis testatur *Dioscorides lib. 2. cap. 53.* qui ait, *pennas seu alas pedesque ipsarum iis, qui*

eas in potu hauserunt esse ἀντιόδομακον & remedium. Actius præterea *lib. 13. cap. 49.* idem docet

iis verbis: *Cantharidibus haustis contraria affectionis ratione, quantum nihil aliud, auxiliantur*

Cantharidum ala & pedes cum passo pota. Item inter Latinos Plinius, qui *lib. 19. cap. 4.* de Can-

thari-

des.

Canthari-

dum legi-

timus v-

sus.

Canthari-

dum legi-

timus v-

sus.

Canthari-

dum legi-

timus v-

sus.

Canthari-

dum legi-

timus v-

sus.

Canthari-

dum legi-

timus v-

sus.

A tharidibus ita scriptum reliquit: *Conuenit inter omnes, pennas earum auxiliari, in quacunque parte sit venenum.* Idem quoque *libr. 11. cap. 35.* ait: *Venenum hoc remedia secum habet.* *Ale-* Ala.
dentur, quibus demtis lethale est. Hinc est quod Galenus *libr. 11. de simpl. medic. facul.* pruden-
 ter admodum, totas cantharides tam in exteriori, quam interiori vsu, vsurpandas esse
 hortetur ac doceat. Siquidem præstat in externo etiam vsu, vt Cantharidum corpora
 mitius erodant, & visillarum non nihil frangatur, quam vt integram suam facultatem,
 magno cum ægrotantis periculo, imo non raro præsentis eiusdem interitu, exferant.
 Quapropter plurimum errant, qui alas & pedes in interiori vsu abiiciunt, quum totis Medicorū error.
 potius vtendum esset. Si enim integra exhibentur, non indigent tum iis, quæ vim ipsa-
 rum frangunt & imminuunt, quum secum habeant alas & pennas, veneno earundem
 aduersantes. Quæ circa si imperitia Medicorum accidat, vt quæ corporum Canthari-
B dum noxam emendent ac corrigant, temere negligentur, tamen si integræ suman-
 tur, alæ & pedes hoc pisum, quod a Medicis neglectum est, sarciant. Præstat igitur pet-
 petuo totis vti Cantharidibus, nisi vbi vehementer erodendi & vrendi nobis consi-
 lium est.

Castorium, siue testes Castoris animantis ancipitis capite, oculis murem refert, ro- Castoris.
 stro canem barbatus, cauda præterea est piscosa, pilo superne canino, pedibus poste-
 rioribus anseris, anterioribus simiæ aut canis, dente validiss. nō. Siquidem arbores iux-
 ta flumina, vt ferro cædit: hominis parte comprehensa, non antequam fracta concre-
 puerint ossa morsu resoluit. Ceterum, quod in officinis venditur, *Castorium*, non esse
C testes Castoris magnitudo ipsa conuincit. Illi enim parui, substrixi que sunt, & gallo-
 rum gallinaceorum testiculos magnitudine non excedunt. Castorium vero nostrum
 multo maius est, nihilque aliud plane, quam tumores in inguibus gemini, vtrinq; enim
 vnicum membrana sua conclusum, oui anserini magnitudine Castor habet, in quorum
 medio singuli sunt meatus, e quib. exsudat liquor pinguis & cerosus. Sunt autem eo lo-
 co, quo in quadrupedibus pendent testes, ex vtraque parte penis, vt non sit mirum, si
 hodie pro testibus venales proponantur. Probatur castorium, cui intus est liquor cerosus,
 friabilis, odore graui, & virus olente, gustu acri & mordaci. Porro tumorum liquo-
 rem liquidiorum & tenuiorum partium esse, quam testium, saporis odorisque maior a-
 crimonia declarat, ac proinde in remediis, quæ extrinsecus adhibentur, efficacior erit:
D iis vero, quæ assumuntur vis pro affectus ratione minuenda. Et verisimile hinc est, ve-
 teres quoque ipsos, tumorum potius, quam testium liquorem, medicamentis ad-
 miscuisse.

Cerebella passerum vere & autumnis captorum reponuntur, & prolificis remediis
 miscentur. Cerebella passerum.

Cerebrum leporis pueris dentientibus comestum vtile.

Coagulum leporis omnium præstantissimum ad comitiales morbum, si cum aceto
 bibatur. Cerebrū leporis
Coagulū leporis
Cochleæ

Cochlea, Sepiasis *Limaces* duplices sunt, terrestres & marinæ seu aquatiles.

Cornu ceruinum.

Cornu caprinum.

E *Ebur*, elephantorum sunt dentes, quod vt alias summopere expetitur, ita nostra
 quoque ætate preciosissimum. Eo factum est, vt nullibi pene verum Ebur reperiatur.
 Quod enim vulgo huius vice in officinis prostat, marinorum piscium dentes esse vi-
 dentur. Ebur legiti-
mum in
officinis
non pro-
stat.
Genitale
ceruinū.

Genitale cerui a vipera demorsis auxiliatur: ad retentam præterea urinam, & ad coli
 dolores valet. Siccatum & tritum in puluerem, in dysenteria efficacissimum esse reme-
 dium, experientia comprobatum est.

Iecur canis rabidi.

Iecur caprinum.

Iecur lupinum.

Intestinum lupinum.

Lumbrici seu *intestina terra*. Officinis vermes nominantur.

Mumia Rhazis & officinarum seu factitia, liquamen est hominum in sepulchris condi-
 torum: in summa, compositio, quam mortuorum corpora condiuntur: vel vt breuius ac rectius di-
Intestina
terra.
Mumia
artificia-
lia.

cam, medicatum funus. Hac autem condiendi funera ratione Syriaci, Aegyptii & Iudæi A maxime vfi sunt. In diuitum autem corporibus condiendis vfi sunt *baljamo, myrrha, aloe, cedria, cinamomo, & id genus aliis*. Hoc medicatum funus hodie non affertur, quod locis bene munitis ac clausis repositum custodiatur, vt mercatoribus integrum non sit, comparare, *quemadmodum alibi fufius monstrauimus*. In pauperum & infimæ plebis funeribus condiendis, bitumine Iudaico præsertim & Babylonico vfi sunt. Quod Strabo in 16. abunde testatur, qui diserte Aegyptios ad mortuorum condituras bitumine, cui nonnulli picem, salern, & nitrum adiiciunt, vfos esse scribit. Atque hæc est, quæ hodie ad nos affertur, & distat a Mumia Auicennæ & Serapionis, quæ non est artificialis, sed natiua, adeoque non alia, nisi Græcorum *Pissasphaltus*, de qua infra latius dicemus. Habet autem prior Mumia eandem cum Pissasphalto facultatem, modo recte illa vtatur. Quod fiet, si abiectis terra, ossium fragmentis, & carnibus exsiccatis, liquore tantum concreto, qui est in cauis partibus humani corporis collectus, vtatur. Siquidem quum ex Aegypto integra ad nos hac ratione condita corpora aduehantur, necesse est eandem Pissasphalto, quod non sonat, nisi picem & bitumen, facultatem habere hæc Mumia. Præstaret autem naturali vti, quam artificiali Mumia. Nam Mauritanii haud dubie, quia Pissasphalto destituebantur, artificiali in alterius inopia vti cœperunt.

Natiua.

Os cordis ceruini.

Os e corde Cerui exemptum humanum cor totius substantiæ similitudine robore inter posteriores Græcos Actuarius & Nicolaus, cum vniuersa Arabum familia, tradunt. Veteres Græci eo non sunt vfi. Num vero os sit, aut potius offea cartilago, C alibi diximus. Suspicio autem est ea, quæ a Pharmacopœis hodie proferuntur, sub hoc nomine, esse piscium, aut grandiora agni ossis hyoidis aut bouilli capitis officula.

Ossa humana vsta, discutiendi & desiccandi facultate prædita.

Pinguedo Adeps.

Pinguedo proprie loquendo est, quæ Græcis *πικελῶ* adeps autem seu seuum, quod iisdem *σῆας* dicitur. Quapropter inter se differunt, Galeno etiam libr. 11. de simpl. medicam. facultat. autore, quod vnum altero sit crassius, nempe adeps pinguedine. Hinc est, quod in animantibus vniuersam naturam magis terream habentibus seuum adepsue proueniat, in humidioribus autem pinguedo. Quapropter pinguedo in ignem posita celeriter liquefcit, nec facile, vbi liquata fuerit, rursus concrefcit ac cogitur. At seuum adepsue nec facile funditur aut liquefcit, & fufus celerrime coit, ac concrefcit, multoq; D pinguedine durior apparet. Officinæ omnem oleosam & pinguem in animantibus substantiam pinguedinem, & axungiam, vocant. His autem vfitatæ sunt, quæ sequuntur.

Anatina.

Anserina.

Ardea.

Capi, caponis officinis nominatur.

Canis.

Cervina.

Caprina.

Felis siue cati.

Gallinacea.

Hircina.

Humana.

Leonina.

Suilla, Porcina.

Tauri.

Taxi.

Vitulina.

Vrsina.

Vulpina.

Vulturis.

Medulla ossium, quod oleosa pinguisq; substantia sit, merito iam dictis subiicitur. Autumno & ad hyemis initia e florenti animali, vt etiam pinguedo, colligi, & loco sicco, edito, & ad Septentrionem spectante, cum foliis Lauri siccis, ne putrescat, aut situm

A tum ducat, reponenda. Recens etiam tenerorum animalium usurpatur. Vilitate officii Scinci nis sunt:

Canina.

Ceruina.

Hircina.

Tauri.

Vaccina.

Vitulina.

Pulmo Vulpinus, resiccatus asthmaticis plurimum auxiliatur.

Renēs Scincorum. Scinci autem, quos officina commutatione vnius literæ, & non

sine risu eruditorum, *Stinos* nominant, animalia sunt Crocodilo similia; quadrupeda, squamis parvis & frequentibus subluteis tecta, capite longo, dorso quadantenus elato, ventre lacerta non maiore, corio squamis subluteis numerosis transuersim intercur-

B rentibus referto a capite ad caudam æquis distantibus spatiis, veluti lineam facientibus latam, squamis acris, cauda lacertæ instar tereti, breuiore tamen. Maris rubri, aut Aegypti, siquidem Nilus fecundissimus Nili fluius, hos quum egreditur, producit, aut Indiæ alumni sunt *Scinci*. Hodie etiam ex Alexandria Aegypti allati, Venetiis excuterati & saliti venduntur: licet autem Crocodilorum speciem referant, magnitudine tamen prægrandes lacertas non excedunt. Squamis sunt, ut diximus, albis in luteum vergentibus, cum cæcia a capite ad caudam lineæ.

Ex quibus omnibus perspicuum fit, eos quos officina subiiciunt, veros non esse. Nam hæ bestiolarum Salamandræ sunt aquatiles, venenatæ, lacertos corporis specie referentes, quamuis capite sint paulo latiore, oris ritu ranis simili, tumido ventre, & maculis vario. Hinc Germanice *Wassereder* oder

C *Wassermolch* nominatur. Flagris itaque digni sunt pharmacopœi, qui virus lethale pro antidoto medicamentis miscent, lacertis minores sunt, nec ex Aegypto, sed ex fontibus & stagnis dulcibus, quorum incolæ sunt, & ex Vicentino agro afferuntur. Ceterum ne & id silentio transeamus, ii qui Scincorum renes in medicamentis præscribunt, non renes, sed carnes, quæ circa renes sunt & latera, intelligunt.

Senectus anguim, seu *Vernatio*, cuticula est, qua sese angues primo vere e terra prodeuntes exsuunt, saxis aut stirpibus affricato, & restricto corpore.

Sanguis hirci quadrimi, bene habitus, Augusto mense iugulari, medius effluens eligatur. Primus enim tenuior, postremus crassior putatur. Vase vitreo receptus, linteo veto tectus, sole sicceatur.

D *Testa sepia*, os *Sepia* officina nuncupant. Exterior dura, levis, interior tenera, fungosa. Ad dentificia aptissima est.

Testa Concharum, officinis mater margaritarum seu perlarum: Nos enim perlas vocamus, quas Græci *μαργαρίται*, Latini *uniones* appellant.

Vipera deligatur magna, bene nutrita, corpore toto & ventre crassiore, subflaua, collo valde prominenti, capite latiore, oculis rutilis ac subrubentibus, truncibus, & ferino aspectu, meatu magis ad extrema caudæ vergente, cauda non inuoluta, sed potius conuersa.

Vnguis odoratus, qui Græcis *ὄνυξ* dicitur, Conchylii tegumentum operimentumue est, ei simile, quo purpura integitur, *Dioscoride auctore*, in Indiæ nardiferis lacubus inuen-

E tum, grauitè odoratum, quod Conchyliia inibi Nardi pabulo velcantur. Vnguis autem appellatur, quod vnguis speciem referat. Odoratus, quia grauem, ut diximus, odorem spiret. Hinc est, quod mirificam ei in conficiendo thymiamate præstantiam facere literæ tribuant. Vnde omnibus palam fit, vnguem illum, licet secus sentiat Matthiolus, & perperam me hoc nomine reprehendat: diuersum esse ab eo, quod A. Guario & Nicolao *ελάτιον* & *βλάτιον βύζαντον*, vulgo & officinis *Blatta Byssantia* nominatur. Nam quod illis *Blattion Byssantis* siue *Byssantium* appellatur, non est nisi *Purpura*, & nequaquam Conchylii, operculum. Differre autem *Blattion Byssantis* recentioribus Græcis dictum, ab *Vngue odorato*, e Nicolao Myrepsō fit manifestissimum, qui illud esse *ὄνυξ τῆς πύδος τῆς πορφύρας*, id est, os narium *Purpuræ* scribit. Etsi autem *Purpura*, neque nasum, neque na-

F res, neque intus ossa habet, tamen constat Nicolaum per os naris intellexisse, nisi operculum *purpuræ* foraminis in capite, quod naris instar est. Aut si parum arridet comoda hæc verborum Nicolai interpretatio dicamus Nicolai locum deprauatum esse, & pro eo quod scribitur, *ὄνυξ τῆς πύδος τῆς πορφύρας*, legendum esse, *ὄστρον, ἢ πύδων τῆς πορφύρας*, id est, *testam*, vel *scutum seu operculum Purpuræ*. Quippe *πύδος* præterquam quod *pellem* signi-

ficat, etiam pro *scuto* Phauorino teste, sumitur. Operculum vero veluti scutum Purpu- **A**
 rz capiti imponi satis patet. Vt iam perspicuum sit, *Blattas Byzantias* vocatas, recen-
 tioribus Græcis non esse, nisi Purpuræ opercula. Id quod ipsa etiam satis testatur
 nomenclatura. Neque enim alia de causa Blattium dictum est, quam quod de pur-
 pura Indica, quæ recentioribus Græcis *βλάτιον* nuncupatur, sumtum sit. Et constat
 Latinis etiam Blattium colorem, pro purpureo dictum esse a Flauio Vopisco in Au-
 reliano, & Eutropio in Nerone, qui inquit: *Retibus aureis piscabatur, quæ blatteis funi-*
bus extrahebantur, quos Suetonius & Orosius purpureos interpretantur. Byzantia autem, haud
 dubie a Byzante, vel Byzantio Aphricæ cognominata est. Nam etiam illic tingeba-
 tur purpura: Ceterum *Blatta Byzantia* Arabum, nihil aliud est, quam *Conchylii opercu-*
lum, siue unguis odoratus, quod vtriusque historiæ collatio sole clarius ostendit. Est au- **B**
 tem Conchylii operculum oblongum auium carniuarum vnguibus simile, vt hic
 etiam palam fiat, *Pharmacopolas hodie in officinis suis habere Conchyliorum, quæ sunt longa,*
& Buccinorum, quæ sunt rotunda, permixta opercula, quæ Blattæ Byzantias vocant, quum hoc
nomine, vt ostensum est, Purpurarum tantum opercula appellanda erant. Sunt autem qui Blat-
 tas Byzantias longas, negent esse Onychas, siue opercula Conchyliorum, quod illæ
 non sint odoratæ suauisue odoris, sed foetidæ. Verum horum opinio facile refellitur
 ex eo, quod Dioscorides non semper *ἐρώδης* vocet id, quod grato solum & iucundo o-
 dore placet, sed etiam aliquando id, quod vehementi & graui est odore. Sic pix ab eo *ἐρώδης*
 dicitur, quam tamen suauis odoris esse nemo dixerit. Pari ratione unguis vel Conchy-
 lii operculum ab eodem *ἐρώδης* appellatur, non certe, quod iucundi admodum sit odo- **C**
 ris, sed quod graui ac vehementi sit odore. Hinc Dioscorides qualitatem odoris ex-
 primere volens, dixit: *ἀμφοτέρη δὲ ἐρώδης θυμωμέναι, καὶ ἐξ ὀστέων ποσὶς τῇ δομῇ: Ambo, de marino*
& Babylonico loquitur, grauis odoris, incensi Castorium quodammodo redolent. Quod autem
 Castorium odore graui & virus redolente esse debeat, Dioscorides tradidit. Huc ac-
 cedit, quod non nisi a foetidis rebus suffitu facto, strangulatu vteri oppressæ, quibus de
 consilio Dioscoridis conchylii operculum adhibetur, excitantur. Quapropter si
 Blattæ Byzantiæ, quæ hodie a Pharmacopœis venduntur grati & iucundi odoris non
 est, cur id ob Conchyliorum opercula, vel vngues esse inficias eamus. Porro, vt hoc
 etiam adiiciamus, quum opercula Conchyliorum & purpuræ ac Buccini, viribus si-
 milia sint, nihil refert, quo illorum ad vultu strangulatus vtamur. Ex iis quoque, quæ a **D**
 nobis iam dicta sunt, palam fit Blattam Byzantiam recentiorum, ab vngue odorato dif-
 ferre, Arabum vero nequaquam. Nec est, quod Nicolaum erroris accuset Matthio-
 lus, eumque narium ossa excogitasse putet, & vt ipse ait, purpuræ in vniuersum præter
 testam, quæ conteguntur ossibus careant: siquidem is per os naris operculum forami-
 nis in capite purpuræ, quod naris instar est, vt dictum est, intellexerit. Denique meam
 sententiam haud labefactat, quod Matthiolus de Conchularum Indicarum facultati-
 bus affert argumentum. Nam quæ Mauritani Conchulæ Indicæ tribuunt, eadem et-
 iam purpuram & buccinum præstare Dioscoridis testimonio comprobatur. Quod si
 igitur crematæ Conchulæ idem præstant, quod purpura & buccina vsta, igitur idem
 etiam non vstæ, quod non vstu præstent, necesse est. Quod vero Purpuræ perinde at- **E**
 que Conchulæ Indicæ operculum, iecori & lieni conducatur, vterique strangulatus iu-
 uet, Galenus lib. II. de simpl. medic. facultat. disertis verbis docet, inquiens: *Opercula tegu-*
menta que purpurarum ex aceto pota, quidam memoria prodiderunt, lienes tumentes sanare, &
suffita eas quæ vteri suffocatione periclitantur iuuare, præterea retentas eiicere secundas. Proinde
 quum purpuræ eisdem, quas Conchulæ, facultatibus donatæ sint, parum refert vtras
 per Blattium Byzantium intelligamus. Præstat tamen in Nicolai compositionibus pur-
 puratum, in Mauritanorum autem Conchularum testas vsurpare.

Vnguis caprarum.

Vnguis asinorum.

Vnicornis

Vnicornis, Græcis *μόνονας* dicitur. Animal est reliquo corpore equo simile, capite
 ceruo, collo non oblongo, cornu vnico in fronte prominente, longitudine duum aut **F**
 trium cubitorum. Duum cubitorum fere vidi in aula Marchionum Brandenburgensium
 dum illicagerem. Cornu huius vsus frequens est aduersus venena, & pestilentes
 affectus, puerorumque nobilium lumbricos. Differt vnicornis a Rhinocerote animali,
 quod Elephanto simile est, & cornu in nare, aut supra nares habet.

Rhinoceros ab vni
 corni di-
 stat.

Vulpes

A *Vulpes tota.*

Vniones, non quod in vnica tantum Concha, sed quod nulli duo indiscreti reperi-
antur dicti, seu margaritæ, quodam Cōcharum genere leues, nō quatuor, aut summum
quinque, *Plinio lib. 9. cap. 35. auctore*, sed plures, centum, numero excedentes auelluntur,
Perlas Barbari & officinæ vocant. Harum aliquæ perforatæ sunt, aliæ integræ, quæ qui-
dem reliquis sunt meliores. Cordis, & oculorum affectibus medentur.

*Vniones.
Margaritæ.*

Ventriculi interior tunica siue membrana gallinarum inutilis a Galeno censetur:
Quare non magnificienda erit Medico.

De excrementis animantium. CAP. XVI.

B *Vttrum.
Cascus.*

Fel, Tauri, Hirci, Accipitris, Leporis.

Moschus, Simeone Sethi, ac recentioribus aliis testibus, *Gazella* dicti animalis, Dor-
cadi seu Capræ Indicæ similis, sanguis est in vmbilico concretus. Id animal eodem Si-
meone Sethi, qui illud ceteris copiosius pingit, teste, *μωσχος*, id est, *unico* armatum est
cornu. (Quum vero id nemo aliorum, ne oculati quidē auctores, scribar, errorem in Si-
meonis codice subesse suspicio est, inde forte natus, quod dentes huic animali retro re-
flexos cornua duo esse putarit.) *Quum ruit in Venerem quasi astro agitatam, stimulatamque,*
ei vmbilicus intumescit, in quem crassior sanguis confluit, quo tempore & pabulo & potu abstinet,
humique volutatur. *Qua quidem volutatione vmbilicum saculento sanguine, qui ibi coierat, tur-*

Moschus.

gentem exprimit: emissaque sanies, & post aliquod tempus concreta, sibi magnam odoris suauitatem
adsciscit. Hæc Sethi. M. Paulus Venetus *lib. 1. de regionib. orientilib. cap. 62.* esse quoque a-
nimal Catti librarii forte, aut interpretis errore: legendum enim esse censeo *capreoli: ma-*
gnitudine scribit, quod *crassos* habet pilos, *pedes ungulatos*, *dentes quatuor*, *duos supra, & totidem*
infra exsertos, *palmi vel trium digitorum longitudine*, *iuxta vero vmbilicum inter cutem & car-*
nem vesicam sanguine plenam, qui sanguis est moschus. Iam dictis auctoribus inter Arabes Se-
rapio quoque subscribit, & animal esse capræ simile tradit. Amatus Lusitanus hæc omnia
ficta esse, sed parum recte, *ut paulo post ostendemus*, cōtendit, & in India esse animal quod-
dam leporis magnitudine inquit, quod viuum adhuc virgis cæsum, necatur. Eo occiso,

D pelleque detracta, & interaneis exemptis, vniuersa caro plagis ac verberib. quoad liue-
scat contunditur, pinsiturque. Hæc vbi optime est pista, manu tractatur, ut si quæ duri-
uscula in illa ossa fuerint, reiiciantur. Carnem hæc ratione optime pistam & contusam,
manu in globos redigunt, & parte pellis eiusdem animalis excoriatæ obuoluunt ac
muniunt, ut in pilæ formam euadat, & moschus folliculo inclusus dicitur. Hic calidus
in secundo, siccus autem in tertio ordine habetur. Cerebrum roborat frigidum, & par-
tes imbecillas firmat, eosque quos animus defecit, reuocat. Vtra iam sententia verior sit,
diiudicent, qui Moschum colligi conspexerunt. Mihi certe tum Arabum, tum recen-
tiorum de hoc animali sententia, quod plurimum in eius descriptione varient, suspecta
est. Neque audiendos esse puto, quod Moschum tuberculi, vel vmbilici eius animantis

E inflammati laniem esse tradunt, id enim haud dubie falsum est. Sed sunt Moscho ani-
mali tumores, quales in Castore esse supra diximus, & quales in omnib. leporibus sunt:
propter quos vulgus testes esse existimans, lepores omnes simul mares & foeminas esse
credit: a quibus odoratum illud pus emanare arbitror. Atque tumores esse rotundos ac
testiculis similes, membrana seu pelle circumdatos, noruat, qui adulterant. Nam in te-
sticuli formam effingunt, & pelle animantis obuoluunt, ac testiculum *Moschi* appellant.
Hic itaque est Moschus Lusitani, non legitimus, sed admodum ab ipso descripto adul-
teratus, ab eo, quem Arabes & recentiores aliquot Græci pingunt diuersus. Ut parum
recte ab eo mendacii insimulentur. Ceterum melior est, *eodem Sethi auctore*, subflauus
quam nigricans: & qui pelui humectatæ immixtus leuior euadit, quam qui grauior. Ex

F Catay tamen niger præstantissimus hodie affertur. Ferrugineus fere noster est. Serua-
tur melius in pyxide plumbea, cera obturata per se. Si autem odoris gratiam perdidit,
reponendus erit in vase vitreo aperto: & si Plateario credendum, in cloaca suspenden-
dus, & odorem recuperabit: Sed & alii latrinis & foetoribus odoris amissi vim recupe-
randam esse literis mandarunt. Officinæ non sine confusione *Muscum* appellant. Et sit &
fictitius Moschus, qui ut pareretur, Gesnerus in suis *Commentariis de Animalium hist.* docuit.

Oesypus.

Hyssopus
humida.

Sanguis.

Sanguis
draconis.

Lac.

Serum la-
ctis.Sericum.
Bomby-
cc.Serum
Sericum
crudum.Album
gracum.

Zibethū.

Metallū.

Oesypus est succidarum lanarum pinguitudo. Succidæ autem Lanæ, quod sudoris for-
dib. & succo imbutæ sint, dicuntur. Recentiores Græci, Nicolaus præsertim, *ὑσσωπός*
ὑγρὸν, id est, *Hyssopum humidum* vocant. Quem sequentes qui hodie medicinam faciunt,
& *Seplasiæ*, iidem *Hyssopum humidam*, ab *Hyssopo* herba hac adiectione illam sepa-
rare volentes, nōminant. Ea appellationis deprauatæ ratio ex græcæ dictionis corru-
ptione orta est. Nam *Dioscoridi* & *Galeno* *ὑσσωπός* dicitur: quam dictionem imperitus
subinde librarius in *ὑσσωπός* commutauit. Et hodie quoque in plerisque locis apud *Gale-
num* & *Paulum* *ὑσσωπός*, pro *ὑσσωπός* scribitur, ut alibi fusius docuimus.

Sanguinis plus est potissimum hircini, ut diximus, columbini, leporis, suilli, & ves-
pertilionis.

Sanguis draconis, *Plinio lib. 33. ca. 7. teste*, sanies est Draconis elisi Elephantorum mo-
rientium pondere, permixto vtriusque animalis sanguine, qui subinde terra mixtus col-
ligitur, ac in pastillos ac rotundos orbes conformatur. Hodie, modo *Plinius*, quod ta-
men suspicamur factum esse, falsus non sit, eo uti desierunt Medici, altero in huius vi-
cem substituto: qui qualis sit, supra exposuimus.

Lac vacca, capra, asina iuuenis, aliquandiu post partum exercitæ, & bene pastæ præ-
sertim idoneis sibi pascuis, vernū largius, sed humidius, aut autumnale parcius siccus,
& buryro diu seruando aptius. Sit autem quatenus lacti datum est, dulcissimum, albissi-
mum, consistentia mediocri, si vaccinum est: tenuiori, si asininum, vel caprinum.

Lactis serum caprae iuuenis nigrae, salubribus pabulis nutritæ. Secundas tenet serum
lactis ouini.

Sericum vellus est, quod vermiculi Seres & Bombyces nominati pedib. explican-
tes nent, & congesto glomeri se condentes emoriuntur. Fila enim ab illis araneorum
modo nentur, quæ in vestes texuntur. Semestris illis vermibus vita est apud nos, prorsus-
que ante completum annum, quum suum nendi obierūt munus, efflant animam, prius
tamen ascitis sibi alis in volucres papiliones degenerantes, & relictis ouise quibus sua
rediuiua proles sequenti anno renascitur, ut copiosius in altero nostrorum de stirp. hist. com-
ment. tomo, ubi *Mori historiam* narramus, cuius foliis vermiculi illi pascuntur, diximus. Horum
certelanicio recentiores Græci in quibusdam medic. compositionib. vtuntur. Folli-
culos recentes, qui cortinas aut colorem nondum experti sunt, *Aetius*, *Actuarius*, &
Nicolaus, posteriores Græci, *μεράκας* & *μεράκας ἀπὸν*, Latini *sericum crudum*, *Seplasiæ* *Seram*
crudam appellant. Dicendum autem illis erat *Sera*, a *Seris* vermiculis. Et haud dubie in-
itio ita vocata est, sed deinde rerum ignoratione factum est ut *r* in *t* mutatum sit. Exca-
lescit autem *Sericum*, mirifice exhilarat, resiccatque primo ordine, attenuat, cor re-
creat, lætumque efficit.

Stercus bubulum, Caninum, quod officinis medicorum *Album gracum* vocatur, *Co-
lumbinum, Caprinum, Gallinaceum, Murium, Ouillum*.

Salina.

Sudor.

Urina.

Sordes.

Zibethum recentiorib. Græcis dicitur, quod e genitalib. locis cuiusdam feræ ani-
mantis, feli, qui veterib. edificiorum ruinis oberrat, non absimilis est, sed maior, dentib.
armata & fera, colore lupi, maculis passim nigris per summum dorsum obscure fuluo
mixtis, odoramentum, foeminæ intra genitale & aluum, mari intra genitale membrum
& testes, argenteo cochleari, aut oriculario instrumento cruitur & excipitur. Est autem
excrementitius quidam lentor, primo butyri colore, qui mox liuidius redditur. Nulla
fere res nostra ætate in maiori pretio fuit, quod vncia vna octonis aureis permutetur.
Huius odoramenti vluam tam amantem esse prædicant, ut ad id vndecunque admo-
tum, irrepit. In huius itaque strangulatione ex eo pessos conficere præstat. Nomen su-
um in officinis retinet.

De Metallicis. C A P. XVII.

Metallum est corpus fossile, quod natura vel sua sponte natum est, & e terris quæstum cruitur,
aut liquidum, ut argentum viuum, aut durum, sed quod igne liquecat, ut aurum, argentum,
as, & plumbum, vel mollescat, ut ferrum, idque Græcis *ἀντοκτὸς* nominatur: vel quod arte conficitur,
eag. de causa factitium appellatur, ut alibi fusius docuimus. Sic autem Græcis *ἀντὶ τῆς μεταλλῆς*, id est,

A ab inquirendo & perscrutando dictum est. Vt metallum omne id sit, quod in venis terræ generatum latet, & in usus nostros eruitur. Plinius tamen *lib. 33. c. 6.* ob id *μέταλλα* nominata esse putat, quod *μετ'* *ἄλλων* cum aliis, vel *μετὰ τὰ ἄλλα*, post alia inueniantur. Metallica itaque *Metallica*.
medicamenta sunt, quæ vel ipsa metalla existunt, aut iuxta metalla reperiuntur, vel dum in fornacibus illa excoquuntur, fiunt, vel aliquo alio modo ex iisdem conficiuntur. Visitata officinis sunt quæ sequuntur. *Aurum* metallorum omnium pretiosissimum, præstantissimumq; quod indice lapide exploratur, colore scil. fuluo in lapide relicto. In foliola & bracteolas multis ictibus latescit, quibus medicamenta inaurantur. Quod statim suum & natium est, Græci vocant *ἄπυρον*, id est, *ignem non expertum*: contra quod vsq; eo coquitur, dum argentum omne ab eo fuerit separatum, *ἀπεσθον*. Idem *obryzum* nominatur. Bibitur maxime ad cordis affectus, & animi mœrores.

Argentum similiter in bracteolas latescit, & foliatum redditur.

Arrenicum vetustis Græcis & Articis, posterioribus, cōmutatione, in *σ*, *Arsenicum*, Latinis scriptoribus *Auripigmentum* dicitur. Officinæ Græcæ appellationem retinuerunt, & ab Auripigmento distinxerunt. Arsenici autem duo sunt genera, natium, & factitium. Natiui rursus tres sunt species, colore & figura differētes. Vnum, quod auri imitatur colorem, & ex multis tenuibus crustis, tanquam squamis, constat, vt altera alteri imposita videri possit, & findi, vt lapis specularis, de quo *infra dicemus*. Id si purū fuerit, præstantissimum est. Alterum, magis auri colorem imitatur, nec est nisi pulvis seu arena, cuius Theophrastus in *libello de Lapidib.* meminit. Tertium in glebas cōcretum est, & lapidosum, ac Sandarachæ quodammodo colorem exprimit. Factitii duo sunt genera, quorum vtrumque splendet: sed alterum album est, quod venis in albo subluteis, aut subrubris distinguitur. Alterum luteum, quod variatur nigris, subrubris, plus minusve luteis venis. Conficiendi modum alibi tradidimus. Seplasiæ quatuor Auripigmenti genera venalia proponunt, nempe album, citrinum, quæ duo sola Arsenici nomen in officinis retinent, rubrum, & auripigmentum. Album factitium est, perinde atq; citrinum, rubrum *Sandaracha* veterum existit, de quo suo loco. Auripigmentum autem illis primum dictū, tertium est natium Arsenici veterum genus. *Ærugo aris*, quæ non est nisi florida æris rubigo, itidem duplex est, natia seu fossilis, & factitia. Fossilis, in metallicis Cyprii ærariis, *Dioscoride teste*, duobus modis gignitur. Aut enim ex lapidib. quibusdam ærariis exigua, sed bona efflorescit. Aut ex specu quodam per Caniculæ æstus manat & destillat, copiosa quidem, & grati coloris, sed vitiosa, quod cum multis calculis sit permixta. Prior abraditur, ideoque Græcis *ἰδὲ ἔρως*, Latinis *ærugo vasilis* vocatur. Posterior sicca colligitur. Est præter has tertia fossilis, quæ a similitudine vermiū, Græcis *ἰδὲ οὐδὲν* nominatur. Factitiæ similiter tria sunt genera. Aut enim abraditur ab ære. Aut in vermes formatur. Aut in mortario æreo efficitur veteri ex vrina, quæ *Santeria*, & ab effectu hodie *Chrysocola* nuncupatur. Natia seu fossilis in usum medicum haud dum recepta est. Rasilis vero factitia hodie visitata est, & officinis viride æris appellatur.

Aes vstum seu crematum vocant laminas Cupri, æs enim latini recentiores *cuprum* appellare consueverunt, vstas. Cremandi modum tradit Dioscorides. Probatur, *eodem teste*, rubrum, & quod tritum colore Cinnabarim imitatur. Nigrum vero plusquam decet exustum est. Quapropter improbatum duci poterit *æs vstum officinarum*, quod nigrore nimiam vstionem repræsentet.

Æs flos ære fuso, & aqua effusa exsilit milii effigie. Quando enim candenti æris massa aqua frigidissima affunditur, de repente ceu minutissima & rubentia grana, exsilit ac erumpit flos ille. Optimus est brevis, grauis, splendens, cum teritur rufus, friabilis. Hodie in officinis desideratur.

Aëris squama est, quæ malleorū ictibus de panib. æris excutitur, & gemina existit, crassa, & farinæ modo tenuis. Crassa Germanice *Rupferschlag* dicitur. Tenuior vero *Rupferbraun* vel *Resselbraun*. Hanc Plinius *lib. 34. cap. 11.* *Stomoma* vocat. Differt autem a squama stomomatis, quod hæc ex chalybe, ferro purissimo & optimo, decussa sit (squama, quod Græcis *σέλα* nominatur. Ceterum est etiam squama clauaris dicta, quod e clauis, per quos panes ærei ferruminantur, decussa sit.

Alumen, quod Plinius *lib. 36. c. 15. teste*, non est nisi salsugo terræ, aut liquidū est, aut concretum. Liquidū duum est generū. Alterū purum, lactei coloris, pellucēs, æquale, *Kochæ*.

φειμον.
παρφορην.
Concretū.
Sciſſile.

Capillare
alumen dif-
fert a plu-
moſo.
Amiantus
lapis.

Rotundū.

Talare.
Latercula-
rium.
Crustaceū.

Zucchari-
num.
Catina.
Scaiola.

Cadmia.
Natiua du-
plex.
Fossilis ſim-
pliciter.
Orichalcū.
Calamina.
xis lapis.

Cadmia fos-
ſilis metal-
lica.

Lapis æro-
ſus.
Factitia.
Fornacaria.

Cadmia
fornacaria
quatuor
genera.
Crustosa.

Cingulum.
Onychitis.

& omni ſui parte ſuccolum, non lapideſum, & ignem olens. Id quia propter puritatem A
in primis vtile eſt, Græcis φειμον vocatur. Alterum, eſt impurum, pallidum, & ſcabrum,
officinis vtraq; ignota. Hoc quia ſordibus inquinatum eſt & peruerſum, παρφορην, quaſi
fraudentum ſive deprauatum appellatur. Concretum itidem duum eſt generum.
Quoddam enim ſciſſum ſive ſciſſile, & Serapioni Iamenum vocatur, eſtq; quatuor ge-
nerum. Vnum quod eſt cuiuſq; gleboſi, & natiui veluti flos, quod optimum, & guſtu
maxime adſtringens exſiſtit. Hoc autem ſingularim effloruit ſimile canis capillis, hinc-
que adeo Græcis τειχίτης, latinis *capillare* dicitur. Non eſt autem id, quod Seplaſiis hodie
alumen plumoſum nominatur, *ut alibi efficaciffimis argumentis probauimus*. Hoc enim non
eſt niſi Amiāthus dictus lapis, qui ſciſſilis eſt & friabilis: eamq; obtinet naturam, vt ab i-
gne nunquam abſumatur, etiam ſi aliquot diebus vritur, vt ſuo loco latius dicemus. Hic B
certe lapis præter alia nomina, quæ alibi indicauimus, a Quadrigario, propter ſimilitu-
dinem, quam cum alumine ſciſſo habet, alumen etiam dictus, vt nihil mirū ſit, hoc no-
men adhuc hodie in Seplaſiis retinere. Sciſſilis aluminis quatuor ſunt genera, quemad-
modum *lib. 9. de Simp. medic. ſacul. cap. 30.* diximus. Alterum, eſt rotundum, & plurium ge-
nerum. Aut enim manu conſictum, aut ſuapte natura tale. Aut bullarum modo intru-
mit, vel foraminum fiſtulis quandam ſpongiæ ſpeciem gerit, vel eſt ſolidum. Aut tali
formam præ ſe fert, & Græcis ἀσχηλάντης, id eſt, *talare* dicitur. Aut lateri colore ſimile eſt,
ac πλανήτης, hoc eſt, *latercularium* nuncupatur. Aut ex cruſtis maſſiſue in tabellæ formam
congeſtis conſtat, & πλακίτης, id eſt, *crustaceum* vel *tabulatum* rectius appellatur. Nullum
vero ex iis omnibus Aluminis generibus hodie in officinis Medicorum proſtat venale. C
Quapropter pro iis vtendum nobis erit gleboſo factitio, cuius hodie in officinis magna
eſt copia. Pro illis autem hodie vſitata ſunt alia ſex Aluminis genera, nempe *Rocha*,
quod *rupeum* alio nomine vocant, *plumeum*, de quo diximus, fecis vini, *catinum*, *ſcaliole*, &
zuccharinum, de quibus alibi fuſius diſſeruimus. Ceterum ex glebis natiuis, qualeſcunq;
fuerint, hodie in metæ maſſæue turbinatæ formam & figuram effingunt id, quod offici-
næ *Zuccharinum* vocant. Sed quod *Catina* & *Scaiola* appellant, ex aliis conſiciuntur rebus
hoc quidem e lapide Squamoſo, qui in ignem coniectus ſimilis ſit Gypſo, illud ex herba
Cali Mauritanis dicta, combuſta. Nam huius cinis *Alkali* Mauritanis vocatur. Ex
lixiuio autem eius cineris *Sal alkali* iſdem dictus reſultat. Cinis autem ille induratus, i-
pſis *Alumen Catinum* appellatur.

Cadmia, quam Barbari & Seplaſiæ *Climiam* vocant, duplex eſt, ſcilicet natiua & facti-
tia. Natiua ſeu fossilis, ruruſus in duas digeritur ſpecies. Vna metalli expers, quæ certi-
oris diſcriminis gratia ſimpliciter *fossilis* appellari poteſt. Ea æs tingitur ex rubido in
aureum colorem, nominaturq; Græcis *Orichalcum*. Cadmiam enim hanc fossililem con-
bibens æs, ſit *Orichalcum*, quod Germanice *Meſſing* dicitur. Lapis vero eſt ſublutei co-
loris, interdum non multum durus, ſcaberq;. Hinc Feſtus Pompeius terram nominat.
Crematus luteum emittit fumum, & Seplaſiis *Calaminaris* vocatur. Quo tamen nomi-
ne primum fragmenta Cadmiæ, quæ ferreis fornacum haſtis adhærent, quoniam caua
ſunt, & calamo ſimilia, *ut paulo poſt fuſius dicetur*, nuncupata fuerunt. Hodie autem ſola
fossilis nomen hoc a calamo ſumtum obtinet. Germanice *Calmey*, vel magis corrupte
Galmey appellatur. Altera, cum adiectione Cadmia fossilis metallica, quod metalli
fertilis ſit, Germanis *Cobaſt* nominatur. Hanc Galenus olim in montibus & riuis Cy-
pri iuxta metallum ſe inueniſſe ſcribit. Color ei niger, aut fuſcus ferreuſue aut cinereus.
Hanc Plinius lapidem æroſum vocat. Errant itaq; qui eundem cum Calaminari eſſe
putant. Factitia Cadmia eſt, quæ in fornacibus, vbi æs eliquatur & coaleſcit, efficitur.
Quapropter merito Cadmia fornacum vel fornacaria dicitur. Quanquam autem Cad-
mia hæc in fornacibus, in quibus etiam venæ auri, argenti, & plumbi nigri excoquuntur,
ſit, tamen optima in ærariis, & quidem ex pyrite, & Cadmia fossilis metallica, efficitur.
Huius autem Cadmiæ quatuor ſunt ſpecies. Prima ſit, vbi craſſa materiæ pars egeri-
tur, & poſt Diphryges parietibus fornacum inſidet, quod propter grauitatem ad ſum-
mitatem peruenire non potuit, atque in corpus cruſtæ ſimile concreſcit. Græcis non-
nullis πλακίτης, Dioſcoridi πλακώδης, Latinis *crustosa* & *crustacea* nuncupatur. Aliis quibus
maculas lineis, vel zonis ſimiles habere viſa eſt, ζώνιτης, id eſt, *linearis* vel *cingularis* voca-
tur. Quibus autem venas Onychis lapidis referre videtur, *ονυχίτης* appellatur. Altera
ſpecies,

- A** species in iisdem fornacem locis humilioribus, & itidem ex crassa fit materia: quæ quia terrena & dura, & quasi testacea facie superficieue est *τεργαῖνς*, id est, testacea nominatur. Tertia, tenuis materiæ pars est egesta, quæ propter leuitatem magis in sublime fertur, & in altioribus fornacum locis insidet, ibique pariter in corpus concrescit, cuius superficies vuarum speciem gerit. Hinc Græcis *βερρυῖνς*, id est, *racemosa* dicitur. Cadmiam efficit quæ curua & caua, calamoq; similis est, ideoq; veteribus *Calaminaris* vocata est. Officinæ hodie & vulgus medicorum perperam Thutiam Alexandrinam vocant: & pro vera Thutia, quæ Græcorum est *Pompholix*, vendunt. Quarta, tenuissima materiæ pars egesta est. Quapropter quum propter leuitatem altius cum fumo feratur, Græcis *καυῖνς*, id est, *fumaria* dicitur.
- B** *Chalcanthum* vel *Chalcanthus* Græcis, atramentum sutorium latinis dicitur. Priorem appellationem, quod ex ære quodammodo efflorescat, alteram vero ab atro, quem reddit colore, & quod olim eo coria sua tingeant sutores, natum est. *Seplasiæ Vitriolum*, quod vitri aut crysalli modo translucidum sit, Germani *Rupfferwasser* nominant. Hoc, Plinio auctore, geminum est fossile natiumve, & factitium. Fossile ex humore constat, qui gelu concreuit, aut in venis vel fibris, vel commissuris saxorum, aut dum ex iis guttatim destillat, nondum tamen in canales decidit, quo sane modo de eorum cameris stiriarum instar dependet: aut postquā destillauit, quomodo reperitur in earum solo. Verum siue dependeat de cameris, siue humi iaceat, *σταλακτιδόν*, id est, *stillatitium* nominatur. Cum capillis vel plumis similitudinem habet, adeoque molle & tenue est: aut
- C** stiriarum modo concreuit, aut glebæ formam obtinet. Coppam rosam Itali, Germani *Goselgut* nominant. Factitiū duplex est. Vnum Græcis *πυρίδον*, hoc est, *concretitium* vocatur. Id ubi e speluncis cuniculisue vel effertur, atque in piscinas quadratas excauatolue scrobes effunditur: vel inde corriuatur frigore, aut solis calore concrescit. Hoc viride est, & *Seplasiis* hodie *Vitriolum Romanum* appellatur. Alterum Græcis *ἰσίδον*, id est, *cothile*, vocatur. Decoquitur enim aqua atramentosa in ahenis quadratis. Ceterum sutorium atramentum variis præditum est coloribus. Nam aut candidum, aut pallidum, aut viride, aut ceruleum est. Differt a metallico atramento, quod priuatim Græcis *μυλαινία* dicitur, quod scilicet colore cinereum & nigrum sit. Latinis *atramentum* eadem de causa nominatur. In cuniculorum faucibus & cauernis reperitur. Officinis incognitum. Est & præter hæc tertium atramentum scriptorium librariumue vocatum, Græcis *μύλαν* nuncupatur.
- D** *Chalcitis* est semper natia, quæ sponte sua nascit, & in fodinis concreta inuenitur, æris ruborem & colorem habet, vnde & nomen accepit, ac *Rubra* dicta est. Germanis *rot Rupfferwasser* oder *rot Atrament* vocatur. Optima, *Dioscoride* teste, æri similis est, friabilis, nec lapidosa, recens intercurfantibus oblongis & splendentibus venis fibrisque. Ex Chalcantho veteri fit, *Galeno attestante*, qui Chalcæthum paulatim in Chalcitim transire scribit. Neutra officinis hodie vsitata. Quum autem Misy & Sory eiusdē cum Chalcite sint tū naturæ, tū facultatis, præstat, neglecto alphabeti ordine, hoc loco de iis disserere.
- Misy* gleba est substantia, sapore, & viribus Chalcantho similis, & dum friatur arenosæ naturæ, colore aureo seu luteo, & stellarum instar scintillans. Errant igitur, qui vulgo *vitriolum Romanum* appellari putant. Nam illud viridi potius, ut dictum est, aut cæruleo, non aureo, colore constat. Misy præterea fossile est, & quod sponte in terræ visceribus nascitur. Vitriolum autem Romanum factitium est Chalcanthi genus viride, quod concretitium vocatur. In officinis desideratur, in fodinis tamen Goselariæ æariis reperitur, & *geel Atrament* dicitur.
- E** *Sory* itidem fossile, & natium est, ac Melanteriæ metallicæ cognatum. Lapidis præterea duritia, ob vehementem concretionem, ideoque crassarum partium existit. Colore, ut metallicum atramentum, cinereum & nigrum, non nihil tamen ad rufum declinans. Hinc est, q̃ Germanice *graw Atrament* nominetur. Porro ut Sory est crassissimarum partium, ita Misy tenuissimarum. Chalcitis autem medium quiddam tenet. Probatur Sory, quod dum frangitur & nigrius apparet, ac splendet, in foramina multa dehiscens, quod est subpingue, quod valide fulminis olet virus, quod olfactum stomachum subuertit. Officinis non cognoscitur.
- Calx* duplex est, viua & exstincta. Viua seu nō exstincta, Græcis *ζοήου* dicitur. Bifida. *Calx Viua*.

riam fit, nempe ex albo lapide e propriis fodinis eruto & marmore viliori, vel calculis A
litoralibus coloris cæsi vel candidi. Fit etiā ex testis Ostrearum & Buccinorū, ad eum
modū, qui est a Dioscoride ostensus. Ex quo certe calcis genere publica & priuata ædi-
ficia in tota maritima Germania fiunt. Calx quædam est aqua sæpius extincta.

Extincta.

Cerussa.

Cerussa, Græcis *λευκός* dicta, non est nisi plumbum nigrum acerrimi aceti halitu in-
crassamentum, post intrusatili mola tritum, denūque cribratum in candidum pulue-
rem pollinemue resolutum. Cerussæ conficiendæ modum alibi ostendimus. Porro si

Sandyx.

Minium se-
cundarium.

Cerussa vratur donec rufum contrahat colorem, Sandyx nominatur. Vitruuius *lib. 7. cap. 12.* Sandaracam, quod nimirum veræ Sandarachæ colore similis fit, appellauit. La-
tini colorem hunc *Minium secundarium*, officinæ simpliciter *Minium*, Germani *Mennig* vocant.

Chryfocol-
la.

Natiua.

Chryfocola duplex est, metallica seu fossilis, natiuaue & factitia. Natiua, in fibris &
venis gignitur, aut per se plerunq; arenæ similis reperitur, aut materiæ metallicæ adhæ-
ret, atque hinc abrafa cuiusdam arenæ similitudinem gerit: aut quum aquæ iam dictas
species lambunt, pulueri similis subsidit. Germanis *Berckgrün* / *Schiffergrün* dicitur.
Laudatur quæ in ærariis fodinis, secundum locum obtinet quæ in argentariis, & tertiu-
m quæ in aurariis inuenitur. Quæ ex plumbi cauernis exudat, deterior. Officinis igno-
ta est. Factitia duplex est: altera ex dura natiua fit, tingiturque lutea herba, ob id herba-
cea dicta. Atq; ea laudatissima est, natiuaq; preciosior. Conficiendi eius modum tradit

Factitia.

Santeria.

Tincar.

Borax.

Baurach.

Plinius *lib. 33. cap. 5.* Altera, qua aurifices ad glutinandum aurum vtuntur. Hanc Diosco-
rides inter æruginēs enumerat, & Plinio *Santeria* dicitur. Fit ex Cyprio ære, pueri impu- C
bis vrina, & nitro. Quia vero propter Cyprii æris penuriam hodie confici non potest,
altera & recentiorum Chryfocola in eius locum successit, quæ fit ex nitro fossili, *ut suo*
loco fusius dicemus, ac Serapioni alijsq; Mauritanis *Tincar*, officinis *Borax*, quod nomen ipsi
cum reliquis Nitris est commune, dicitur. *Baurach* namq; aut potius *Borax*, Arabibus o-
mne nitrum appellatur.

Cinnaba-
ris.

Theophra-
sti.

Minii na-
tium, seu
Cinnabaris
fossilis.

Cinnabaris duum est generum, veterum scilicet ac recentiorum. Veterum iterum in
duo partitur genera. Vna quidem est Galeni & Theophrasti, quæ in libello de *Lapidibus*
illi *κινάβαρις* nominatur. Hæc non est nisi Minium natiuum, quod aliis Græcis *ἀπύρον*, id est,
arenula, & *ἀδρεγ* vocatur. Verum esse, quod dicimus, ostendit abunde Plinius *lib. 33. cap. 7.*

vbi ex professo Minii historiam perscribit, Theophrastumque citat, & ad minium o- D
mnia, quæ ille ad Cinnabarim retulit, perspicue accommodat. Minium autem nati-
uium, seu Cinnabaris fossilis, lapis est rubens, non extrema duritie, hinc est, quod aliis
gleba & arenula potius dicatur, atqui ponderosissimus, & non raro argento viuo ita fat-
ctus, vt sponte exstillet, haud aliter quam arte, & vi ignis elicitur. Germanis *Bergzinob*
vocatur. Hoc plane venenatum & exitiosum existit, atque in metallis strangulantem
halitum eructat. Eo pictores olim ad sumptuosa parietum ornamenta vsi sunt. Quod
autem Galeni Cinnabaris non sit alia, quam Theophrasti, paulo post, vbi prius, quæ sit

Dioscoridis
Cinnaba-
ris.

Plinii et-
ror.

Sanguis
Draconis.

Galenii Cin-
nabaris.

Dioscoridis indicauerimus, monstrabimus. Altera est Cinnabaris Dioscoridis, quæ
nonnullis non est, nisi liquor ex Aphrica allatus, vi eadem, qua lapis *Hæmatites*, non
foris tantum adhibitus, sed etiam intra corpus sumtus pollens. Quorum tamen senten- E
tiam probare, ob causas capite re. expositas, haud possum. Hanc Cinnabarim Plinius,
vulgi secutus opinionem saniem Draconis illisi, Elephantorum morientium pondere,
permixto vtriusque animalis sanguine esse scriptum reliquit, qui intento nec diluto
sanguinis modo colore præditus est, sanguinem animantis esse falso credens. Veterem
autem hanc appellationem a vulgi opinione natam, recentiores subinde Græci reti-
nuerunt, & hodie etiamnum *Seplasiæ* succum cuiusdam vel arboris, vel herhæ *sanguini-*
nem Draconis nominant, vel quod sanguinem in picturis reddat, vel quod hoc nomine,
in iis, vnde affertur locis vocetur. De hoc tamen & Dioscoridis Cinnabaris supra cap.
nimirum 10. abunde diximus. Porro Galeni Cinnabarim non esse a Theophrasti Cin-
nabari diuersam, multis argumentis constat. Nam illam *lib. 9. de simpl. med. facultat.* inter
metalla, periade atque Theophrastus recenset. Præterea ibidem acrem illi inesse fa-
cultatem, & in capite de cæruleo detrahendi ac minuendi carnem facultatem habere
memoriæ prædixit. Denique *lib. 1. de compos. medicam. localium. cap. 28.* Cinnabarim inter
calefacientia, mordentia, & discutientia numerat medicamenta, & eandem cum suil-
lo felle

Alo felle confert. Vt hinc omnibus perspicuum euadat, Galeni Cinnabarim etiam venenis annumerari, adeoque a Theophrasti Cinnabari nihil differre. Nam quum ea, quæ carnem detrahunt ac imminuunt, eiusdem sint generis cum *onixis*, id est, *putrefacientibus*, quemadmodum Galen. *lib. 5. de simp. medicamen. facul. cap. 15.* ostendit, vt eadem quoque venenata sint oportet. Recentiorum, & qua hodie officinæ vtuntur Cinnabaris, factitia est. Siquidem ex argento viuo & sulphure a Chimistis conficitur. Germanis *Zinnober* dicitur. Est & hæc, perinde atque Theophrasti & Galeni, venenata & exitiosa, idcoque intro corpus haud sumenda. Sola autem Dioscoridis Cinnabaris innoxia est, intro etiam in corpus assumta.

Cinnabaris recentiorum.

B *Diphryges* et si officinis incognitum & inusitatum est, tamen quum creber eius apud veteres vsus fuerit, præstat etiam quid sit, breuiter hic commemorare, quo aliquando in vsum reuocari possit. Eius tria sunt genera. Primum metallicum & natium, quod in Cypro gignitur, hincque adeo *Cyprium* dictum est. Fit eluto, quod especu quodam Cypri extrahitur, & extractum sole siccatur, mox circumpositis sarmentis vritur. Hinc *Diphryges*, quasi bis, a sole scilicet & a sarmentis, tostum crematumue, appellatum est. Alterum genus factitium est. Fit enim in fornacibus, & excocti atq; perfecti æris veluti sedimentum quoddam, & fex subsidens existit. Id enim postquam æs effluxit in catinum, remanet in fornace, in eius fundo tanquam vstorum in foco lignorum cinis residens, vt alibi fufius monstrauius. *Tertium*, ex Pyrite ærolo fit lapide, quando is, vt calx in camino donec rubescat, vt rubrica concremat. Hoc etiam, vt tradit Dioscorides, fit

Diphryges.

Natium.

Fex æris.

Pyrites cōcremat.

C ex sola materia, quæ æris lapidem, quando assatur, gignit.

Ferrum duplex est, natium & conflatum, seu excoctum. Natium est purum, & reperitur in fodinis. Germanis *gedigen Eisen* dicitur. Alterum conflatū seu excoctum, quod in ferreis officinis excoquit, quas *Hammer-schmitten* Germani nominant. Fit duplici modo, nempe vno ex lapidibus ferreis. In eadem vena nō raro reperitur *Magnes* tanta illi cum ferro est familiaritas, & amicitia. Altero ex terra rubra, ferrugine quasi leuiss. Plura de ferro Plin. *lib. 34. c. 14.* Rubigo autem ferri, *Dioscoride attestante*, egregiā in restringendo, siccandoq; facultatem habet. Recrementum ferri, quod Germanis *Eisenschlack* & *Zunderstein* oder *Sunderstein* vocatur, eandem quam rubigo vim obtinet.

Ferrum.

Rubigo ferri.

D *Gypsum* cognata Calci res est, non tamen ita calidū. Differt primum colore: candidum enim plerisque in locis reperitur, in aliis in candido cinereum, cinereum item nigris maculis interstinctum, cinereum tantum, subrufum, & viride. Dein niore: aliud enim stellarum instar micat, aliud marmoris modo nitet, aliud translucet. Postremum figura: Quippe aut est glebosum, aut ex crustis constat, aut quemadmodum *Salammoniacus* filium videtur. De quo plura alibi diximus.

Gypsum.

E *Hydrargyrum* Galeno ac aliis Græcis, quasi aqueū argentum dicas, Aristoteli *ἀργυρεός*, hoc est, *fusile argentum*, quod scilicet solidum non sit, sed fusum ac liquidum, Latine a motu, quia stare loco nescit, & suo pondere hac illac fertur, *Argentum viuum* nominatur. Chimistæ & hos imitantes officinæ medicorum *Mercurium* vocant. Est autem argentum viuum duplex, natium scilicet, & factitium. Natium & purū in lacunis reperitur. quum aquæ, quibus venæ stillant, Minium madefecerint. Eo enim modo coit, & in argentum viuum vertitur. Factitium ex Minio conficitur ad eum modum quem Dioscorides, & Plin. *lib. 33. cap. 8.* tradunt. Ceterū idem Plin. *ca. 6. iam citati libri*, natium, argentum viuum nuncupat, factitium autem *Hydrargyron*: quo nomine merito a Leonicensio est reprehensus. Diuersis enim verbis diuersas res significari putauit, quum tamen constet vtrumq; argētum viuum vtriusq; vocibus denotari. Quæ ad temperamentum eius ac vires attinet, copiose admodum *lib. 9. de simpl. med. facul. sect. 3. c. 32.* docuimus. Porro vbi in sui generis vasa Chimistis impositum fuerit argentum viuum, calore ignis in sublime fertur, atque ex eo efficitur corpus albū, quod *Mercurium sublimatum* nominant. Conficiendi modus is est. Argentum viuum in vas vitreum cōicitur, adiecto sale

Hydrargyrum.

Argentum viuum.

Mercurius.

Natium.

Factitium.

Plinii error.

F quod *ammoniacum* vocant. Vtraque simul mixta, ac in fornacem posita, ignis vi & calore in sublime feruntur, ex eisque corpus album salis aut Sacchari colore præditū, efficitur, quod *Mercurium sublimatum* appellant. Efficitur etiam argentum viuum, rubrum, quod Chimistæ *Mercurium præcipitatum* appellant, hoc quidem modo. *Aluminis, & atramenti sutorii æquales partes sumuntur, quibus salis dimidio plus altero eorum additur. Destillatur*

Mercurius sublimatus.

Mercurius præcipitatus.

hoc totum cum vitreis vitis. Stillatitii huius pondo unum, argenti viui tria in vas vitreum ponuntur, inde destillantur, & auctis ignibus perseveratur tantisper, donec fumus & vas rubescant, nec liquoris quicquam super sit: demum fracto vase colligitur argentum viuum, quod coire iam videtur instar lapidis, hoc tenuissime teritur in Porphyritide tabula, & denuo excoquitur ac destillatur, donec sicceat in vase vitreo. Rursus fracto vase materia, quae super est colligitur, ac denuo teritur in eadem tabula subtilissime, postea ipsum in aneo vase reperitur: suppositoque igne valido, cum aneo pistillo miscetur, & agitur per duarum horarum spatium, quoad splendorem ferme ac rubedinem minus acquirat, tuncque exceptum servatur vitreis vasis. Citra dolorem carnes erodit, & putrescentia vicera liceat.

Lithargyros.
Spuma argenti.

Dioscoridis & Plinii lapsus.
Spuma argenti sex conficitur modis.
Fulua Aurea.
Candida.

Lithargyros Græcis, Plinio & aliis scriptoribus. *Spuma argenti*, quod vena conflata igne, ut in omni coctura fit, eam veluti spumam reddat, dicitur. Qui igitur lithargyron, id est, lapidem argenti, nominant, hi ortæ rei duritiam: qui vero spumam, hi nascentis naturam considerant. Rectius autem *spuma*, vel *lapis plumbi* diceretur, quod scilicet hæc spuma ex plumbo nigro conficiatur, & vicissim ex ea plumbum. At nec ex argento spuma fit, nec ex spuma argentum. Nam si quando ex mistura plumbi & argenti, quum argentum separatur a plumbo, fit spuma, eam non ex argento, sed ex plumbo fieri hinc cognoscitur, quod de argento nihil depereat: plumbum vero totum mutetur partim in hanc spumam, partim in plumbaginein. Quod quum Dioscorides, Plinius & alii quidam non animadverterunt, factum est, ut ex argento etiam hanc spumam fieri putauerint. Germanice *Glett* vel *Bleyschaum* rectius, quam vulgo consuevit, *Silberschaum* appellaretur. Conficitur sex modis, ex arena plumbaria, e lapide plumbario, ex plumbeis laminis, e mistura plumbi, ex argenti mistura, ex auri mistura, ut alibi fusius docuimus. Spuma hæc colore differt: si quidem aut fulua est, aut candida. Fulua, non quod ex auro fiat, ut nonnulli arbitrantur, sed propter coloris similitudinem, quam cum auro habet, Græcis *χρυσῆς*, officinis *Lithargyrum auri*, Germanis *Goldglett* nominatur. Candida propterea, quod argenteum refert candorem, Græcis *ἀργυρῆς*, Seplassis *Lythargyreum auri*, Germanis *Silberglett*, non quod ex argento fiat, dicitur. Fuluum vero colorem *Chrysitis* contrahit, quod maiorem vim ignis passa sit. Argyritis, quod minorem vim ignis sensit, candidum contraxit colorem.

Minium.
Nativum.

Factitium

Minium duplex est, nativum & factitium. Nativum, quod a Vitruvio lib. 7. *sua architectura cap. 8. & 9.* describitur, non est nisi Theophrasti & Galeni Cinnabaris, de qua supra abunde diximus. Eo pictores utuntur. Factitium, alio nomine *secundarium minium*, & *Sandyx*, Germanis *Mennig* ut suo loco ostendimus, appellatur.

Nitrum.
Nativum.

Primum.

Nitrum vel *Litrum*, quod Arabibus *Baurach* dicitur, Sali cognatum est, quod similiter ac sal aut nascatur, aut conficiatur. Habet vero triplicem differentiam trib. distinctam nominibus. Est enim *nitrum* simpliciter dictum, est *spuma nitri*, & *aphronitrum*. Nitrum simpliciter dictum geminum est, nativum & factitium. Nativum est, quod sine artificio, & suapte natura condensatur. Primum eius genus est, quod ex terra nitrosa imbre perfusa, & a sole densata efficitur. Hoc non aliorum fossilium modo caditur, aut ligone e montibus effoditur, aut ex subterraneo specu excauatur, sed ex solitudine & campis concretum legitur. Nihil tamē verat, quod minus ligone auferatur: sed nullo modo rectum terra reperitur. Quod vero ita solis calore densatur, & suapte natura sese coagulat, in acervos condunt, ut duret: alias n. ab imbre liquatur. Quapropter ut densari coeptum est, rapit, aut relictum in acervos, ut comprehensum est, conditur. In hoc genere Nitrum præfertur leue roseo colore, aut candido, in foramina dehiscens, perinde quasi spogiosum quiddam durum ac spissum, & lapidi similis, quale est Aegyptium, quod lapidis instar induruit in acervis, qui eo quod collium habeant speciem, *βυρρι* Græcis dicuntur, ut alibi fusius docuimus. Nitrum hoc, quod beneficio terræ, & æstuantis solis vi perficitur, atque in conuallibus & cæpis sua sponte ex terra efflorescit, *ἀλμυγλιν* Græci peculiariter vocant, nomine ducto partim ex sapore, quæ habet subsalsum, partim ex eo, quod e terra erupit, ab *άλμη* & *ἰγρυν*. Præter hoc quod diximus, alterum est idem nativum, quod ex fluminibus lacubus, vel fontibus, quorum summitas in Nitrum densatur, colligi solet. Quum enim aqua Nili, aut fontis, aut lacus diu in conualle steterit, saluginosa & nitrosa tandem evadit, quædam ad se substantiam ex profundo, & salis materiam euocans, quæ postea salis instar, calore solis concrevit, duriorque ipso sale redditur. Porro nitrosus quidam est lacus in

- A** Macedonia, qui circa Canis ortum gignit Nitrum, quod veteres scriptores *Chalastrum* nuncupant. Ceterum factitii Nitri plura sunt genera. Vnum, fit in Aegypto, maxime ex Nili aquis, quæ nitrosæ sunt, in nitrarias infusis. Hoc eodem modo ut nativum, priusquam densari coeptum est, rapitur, ne in nitrariis resolvaatur. Hoc, *Plinio* *Chalcidre*, fuscum & lapidosum est. Factitium præterea Nitrum est, quod Græco nomine nostris *Chrysocola*, Arabico *Tincar*, Barbaro *Borax* dicitur, ut supra quoque diximus. Porro quod Nitro ipsi insidet, ac sub dio tum in conuallibus, tum in nitrariis ex sese efflorescit, ut in salinis, tenuissimum & levissimum; spuma siue flos, Galeno præsertim *lib. 4. de Simpl. medicament. facultatibus cap. 20.* frequentius tamen *spuma*, nominatur. Hanc autem Græci duabus separatis vocibus *ἀφρονίτρου* appellant, ut distinguant ab eo, quod iisdem composita voce *ἀφρονίτρου* nominatur. Quid vero Aphronitrum sit, vnus duntaxat Plinius ostendit, qui id esse scribit, *quod in speluncis & antris mollibus destillans colligitur*. Id quia spumæ concretæ simile est, coniunctis duabus vocibus *ἀφρονίτρου* nominauerunt, ut illud a spuma nitri, quæ non ita compacta & concreta est, sed aspectu triticeæ farinæ similis, quamque hoc nomine separatis nominibus *ἀφρονίτρου*, ut comprehensum est, vocant, discerneret. Duplex autem Aphronitrum existit. Vnum, quod ex speluncarum cameris stitrium instar concretum pendet. Id quia nullam in se terream vel grauitatem, vel crassitiam habet, optimum est, & Galeno *album* appellatur. Alterum est, quod liquidum adhuc excidens, in terram defertur. Id ob admixtam sibi terram, graue est, terreamque crassitiam habet: ob id nigrius & deterius existit. Præter iam dicta est etiam, quod *Halinitrum*, vel ut hodie loquuntur, *Sal nitri*, Germanice *Salpeter*, quasi dicas *sal petrosus*, vocatur. Fit duobus modis. Primo, ex molli & tenuissima materia, quam exsulant veteres muri, rupes, saxa; montium. Hoc cum Asiæ petra flore magnam similitudinem & cognationem habet. Atque inde illi Germanicam nomenclaturam *Salpeter* inditam esse omnibus perspicuum est. Secundo, ex terra putri & saluginosa, e stabulis, & similibus locis, in quibus animalia diu inxerunt petita, conficitur. Hanc enim ita præparant & madefaciunt, ut falsedinem omnem exuat: Halinitrum autem candidum est, translucentum, salsum, subacre, rarum, lenè. Ignem ocysime concipit, & in flammam totum mutatur. Quapropter utile est ad compositionem pulueris tormentarii vocati, qui accensus missiles globos tormentorum bombardarumue extorquet. Etsi autem Halinitrum multum differat a legitimo Nitro, tamen quum etiam sit tenuium partium, & absterget in veri Nitri penuria, eo in compositione medicamentorum uti licebit. Ex iis, quæ hætenus diximus, omnibus perspicuum euadit, Galenum non temere multis in locis suorum monumentorum separatim nitri, spumæ nitri, & aphronitri facere mentionem. Nam inter se tria hæc, *Nitrum, spuma nitri, & aphronitrum*, uti ostensum est, differunt. Quæ autem inter spumam Nitri & Aphronitrum sit differentia, diserte Galen. *lib. 9. de Simpl. medicament. facul.* docet, qui spumam nitri inquit aspectu triticeæ farinæ similem esse, hoc est, *laxam, dissolutam, & candidam*. Aphronitrum autem farinæ speciem non habere, neque, ut illam, dissolutum laxumue, sed concretum, coactum, & compactum esse. Ut hinc pateat, spumam nitri consistentia, quam aphronitrum, tenuiorem esse.
- E** Hanc inter aphronitrum & spumam nitri differentiam veteres probe tenuerunt, & disertis verbis explicarunt. Quippe Galen. libro paulo ante citato, ita de iis scriptum reliquit: *ἀφρονίτρου ἀφρονίτρου διαφέρει* *Aphronitrum a spuma nitri differt*. Quanquam eo in loco Græcus Aldinus codex mendosus sit & deprauatus, legatque: *ἀφρονίτρου ἀφρονίτρου διαφέρει*. Hæc autem lectionem esse falsam, in primis testatur Paulus Aegineta, qui *libro septimo de aphronitro, & spuma nitri*, tanquam diuersis rebus & inter se differentibus agit, eamque differentiam ibidem explicat. Dein Aetius *lib. 2. cap. 50.* ubi ad verbum Galeni locum describens, ita inquit: *ἀφρονίτρου καὶ νίτρου ἀφρονίτρου διαφέρει* *Quinetiam locum Galeni ita, ut diximus, esse legendum, ea quæ mox in contextu Galeni sequuntur verba euidentissime conuincunt*. Nam statim ibidem subiicit: *νίτρου μὲν γὰρ ἀφρονίτρου, &c. ἀφρονίτρου δὲ νίτρου, &c.*
- F** Serapio quoque euidenter hanc differentiam innuit, dum inter se Baurach *Aphricum* seu *spumofum* (sic enim eius interpres Aphronitrum appellat) & *spumam nitri* differre scribit. Præterea Auicenna, etsi Baurach voce confuse ac promiscue iam pro nitro, iam vero pro aphronitro vitur, si quis eiusdem verba diligenter expendat, hanc, quam diximus differentiam inter aphronitrum & spumam nitri innuere videtur, quum Baurach arm-

Factitium nitrum.

Chrysocola.

Spuma seu flos Nitri.

Aphronitrum quid.

Album. Nigrum.

Halinitrum. Asiæ petra flos.

Nitri spuma & aphronitrum differunt.

Græcus Galeni codex emendatus.

num, *nitrum*: baurach aphricanum *aphronitrum*: & spumam baurach, *nitri spumam* appellat. Accedit quod inter recentiores Græcos etiam Nicolaus Myrepsus hanc differentiam obseruauerit. Is enim illitione 24. *νίτρον ἀφρόν*, illitione autem 43. & multis aliis locis, *ἀφρόνιτρον* mentionem facit. Deniq; Plinius *lib. 31. cap. 10.* separatim spumæ nitri, aphronitri, & nitri meminit, adeoque inter hæc tria differentiam agnouisse videtur. Vt iam sole meridiano clarius sit, a spuma nitri diuersum esse, & composito nomine aphronitrum dici. Nihil autem refert, siue *ἀφρόνιτρον*, siue *ἀφρόλιτρον*, siue ad eam litera *φ* *ἀφρόνιτρον* aut *ἀφρόλιτρον* nomines. Vt enim inter se non differunt *νίτρον* καὶ *λίτρον* sic etiam *ἀφρόνιτρον* καὶ *ἀφρόλιτρον*. Verum *ἀφρόνιτρον* & *ἀφρόλιτρον* verbum est, exoletum, quemadmodum Phauorinus in suo Lexico testatur, inquit: *τὸ ἀφρόνιτρον τελέως ἐξήτηλον καὶ ἀδόκιμον*. Atq; hinc est, quod hæc vox aliquoties in Galeni & Pauli libris remanserit, & in manuscripto Nicolai Myrepsi codice passim *ἀφρόνιτρον* pro *ἀφρόνιτρον* scribitur. Quum itaq; constet aphrolitron ab aphronitro non distare, euidentissimum est in eodem cap. Gal. in codice Aldino deprauare legi: *ἐρρεθὴν γὰρ ὁλίγον ἐμπερθεὶν ἐν τῷ μεταξύ κατὰ τὴν δύναμιν εἶναι τὸ ἀφρόλιτρον ἀφρόνιτρον τε καὶ ἄλῶν*. His enim verbis significaretur aphrolitrum in medio consistentem habere facultatem aphronitri & salis, adeoque ab aphronitro diuersum esse: quod tamen a veritate plurimum abest. Legendum igitur erit pro *εἶναι τὸ ἀφρόλιτρον εἶναι τὸ λίτρον ἀφρόνιτρον τε καὶ ἄλῶν*: vt sit verborum Gal. sensus: *Nitrum in medio consistentem habere facultatem aphronitri & salis*. Sic vero locum hunc esse emendandum, ex capite de salibus, quod ibidem citatur a Galeno, fit manifestissimum, in cuius fine ita scriptum reliquit: *ἐν τῷ μέσῳ δὲ ἀμφοῖν ἐστὶν ὁ τῷ λίτρῳ: in medio autem viri- usq; scilicet aphronitri & salis* (de iis enim duobus locutus est) *sapor nitri existit*. Sic enim conuertendus ille locus erit, & non quemadmodum interpretes fecit, *spuma nitri*. Nam articulus: ad vocem *χυμὸν*, cuius paulo ante ibidem a Galeno est facta mentio, & non ad *ἀφρόν*, cuius nusquam eo in capite meminit, referendus erit. Quod alius Galeni locus euidentissime conuincit, qui est in eodem libro, capite de nitro, vbi in eum scribit modum: *νίτρον ἔρρει καὶ κατὰ πρὸς δὲ ἐν τῷ μεταξύ τῷ ἀφρόνιτρον τε καὶ ἄλῶν δυνάμει εἶναι: Nitrum dictum est antea* (*capitib. nimirum de salibus, & aphrolitro*) *in medio esse aphronitri & salis*. Et item alius locus, qui est *lib. 11. de Simplicium medicamentorum facultatibus in fine propemodum*, vbi de nitro ita scribit: *Ostensum est & hoc medicamentum in medio salis & aphronitri vires habere*. Præterea Galeni locum prædictum ita, vt diximus, esse legendum & emendandum, Aetius manifestissime docet, qui *lib. 2. cap. 81. de nitro* hæc verba Galeni ad verbum transcripsit, inquit: *νίτρον μεταξύ τῆς ἀφρόνιτρον τε καὶ ἄλῶν δυνάμει ἐστὶ*. Serapio deniq; Galeni ex hoc capite verba referens, ait: *Natura baurach media est inter naturam baurach aphrici, & naturam salis*. E quibus sane omnibus meridiano sole clarius sit, plurimum hallucinari Ioannem Cornarium Marpurgensem Medicum, qui in suis super primum Galeni *de Comp. medic. localium librum Commentarijs* non veretur apertissimæ veritati reclamare, & falsissimis ac nullius momenti rationibus, ostendere aphrolitrum ab aphronitro esse diuersum, conatur. Nam iis, qui vel Græcas literas a limine tantum salutarunt, notissimum est, hæc duo vocabula eandem rem denotare: nec alia inter se ratione differre, quam quod alterum sit Atticum, alterum communi linguæ familiare. Attico namq; sermoni id peculiare est, vt, literæ loco *α* usurpet. Insuper errat etiam non leuiter, quod soluta compositione *ἀφρόν νίτρον* dicitur, nihil differre censet, quum esse diuersas res etiam dictis abunde constet. Nec rarum est apud Græcos, compositas voces longè aliud, quam dissolutas significare. Siquidem *χάλας* diuersum est ab eo, quod illis separatis vocibus *χαλκὸς ὕδωρ* dicitur. Differre quoq; *λευκὰν δυνάμιν*, ab *ἀσθενὲς λευκὰ* nemo ignorat. Et mirum certe est in hac opinione Cornarium perdurare, quum tamē doctissimus vir Augustinus Riccus Medicus, in quadam præfatione Galeni operibus præmissa, illam tanquam erroneam & a veterum sententia alienam, non tantum improbauerit, sed & firmissimis argumentis confutauerit, penitusq; euerterit. Quam falsis autem & confictis rationibus Cornarius pro tuenda sua opinione usus sit, & quam peruerterit ac deprauarit Galeni sententiam legitimum, tum cognoscent studiosi, si obiter hoc loco prodigiosas nugas, quas nuper in libello se digno, cui titulum fecit, *Nitra ac brabyla*, protulit, excusserimus, ac rationibus optimis exploserimus. Principio falsum est, quod se haud ignorasse scribit, quod Græci grammatici *λίτρον* pro *νίτρον* Atticos dicere annotarint. Nam statim altero versu met ipso mendacii se conuincit, quum inquit: *Et satis constabat ex Hippocrate & Galeno, λίτρον uelisse*

Aphronitrum ab aphrolitro non est diuersum. ἀφρόνιτρον vox exoleta.

Cornarii falsa opinio refellitur.

Confutatio libelli Nitra ac Brabyla.

- A** omnino nitrum, vel saltem aliquam eius speciem. Nam quum ait, *vel aliquam saltem eius speciem*, palam fatetur se adhuc dubitare, num litrum & nitrum prorsus idem sit. Quod autem ignorauerit Græcos Grammaticos *ἄρην* pro *νίτρον* dixisse, omnium luculentissime ostendit locus, qui est in eius Commentariis, ubi inter alia sic scriptum reliquit: *Quod vero ita legendum sit, etiam postea cap. de litro edocemur, quanquam & tum corrupte ἄρην pro νίτρον legatur.* Quid per Deum immortalem opuserat Galeni de *Nitro* inscribere potius, quam de *Litro*, quum Græce legeretur *νίτρον* & ita legendum esse literarum ordo exposceret, si non diuersum a Nitro Litrum putauit Cornarius? Sin eadem esse censeret, cur lectionem legitimam esse corruptam existimat? Vtunque igitur quæ sitis hinc inde coloribus fucum facere veritati Cornarius conetur, tamen tantus est veritatis splendor, vt verborum lenociniis obfuscarī haud possit. Fateatur igitur oportet, se nitrum & litrum inter se esse diuersa existimasse; aut manifeste mendax suis: inscriptis fuisse deprehenditur. Atqui tanta est illius pertinacia & impudentia, vt conuictus etiam veritati aduersari illum nihil pudeat. Pergit enim in suo illo egregio, si Diis placet, libello, & dicit, se in Ricciitūrum sententiam, modo id illi persuasum esset, quomodo spuma nitri & aphronitrum fiat diuersa, & non eadem res veluti Dioscoridi & Plinio videretur. Quibus sane verbis palam ostendit, se neq; mentem habere, neque eorum meminisse, quæ ea de re Dioscorides, Galenus, Paulus, & Aetius literis mandarūt, & quæ paulo ante a nobis sunt producta. Et mirum profecto est, Cornarium hoc loco ad Dioscoridis auctoritatem confugere, quum contentio inter nos non sit orra de Dioscoridis, sed potius Galeni, cuius ipse locum peruertit & deprauauit, sententia de spuma nitri & aphronitri genuina erunda. Dicendum igitur Cornario erat, quid de illis Galenus statueret, & non quid Dioscorides sentiret. Quem tamen si recte inspexisset, vidisset illum spumam nitri, perinde atq; Galenum, vnica appellatione *ἀρὴν νίτρον* appellasse. Siquidem is geminam *ἀρὴν νίτρον*, id est, *nitri spumam* fecit, ac bonitate alterā ab altera discreuit. Primas enim tribuit ei, quæ ex Philadelphis Lydiæ defertur, quæ non est nisi spuma optimi natiui Nitri. Secundas Aegyptiæ, quæ est spuma nitri eius; quod in nitrariis Aegypti sub dio concreuit, vt alibi fufius diximus. Vt hinc etiam ab omnibus cognoscatur, Cornarium sui erroris patrociniū temerē apud Dioscoridem quæ siuiffe, quum ille quoq; perinde atq; Galenus & alii Græci, spumam nitri separatim nominibus *ἀρὴν νίτρον* appellauerit. Atqui ferendū propemodum erat, quod inter prædicta duo nullam esse differentiam, putauit, modo non eo dementiæ venisset, vt aphrolitrum ab aphronitro diuersum esse affirmare, nulla nec ratione, nec veterum testimonio fulcitus, auderet. Quapropter vt fucum aliquem imperito lectori, & suæ opinioni fidem aliquam faceret, Galeno falsissimam affingere lectionem coactus est, hanc nimirum: *ἀφρολίτρον ἀφρονίτρον διαφέρει*. Non esse enim locum hunc legitimum, abunde in superioribus a nobis ostensum est. Hinc vt obstinate semel conceptam erroneam opinionem perpetuo tueretur, nihil illum puduit Aetii quoq; locum sua conuersione deformare, & ex vero falsissimum reddere. Is enim de aphronitro & spuma nitri l. 2. ita habet: *ἀφρονίτρον ἔστι νίτρον ἀρὴν διαφέρειν ἀλλήλων*. Quæ quidem verba Cornarius ita est interpretatus: *Aphronitrum; hoc est, spuma nitri, & litri spuma in se differunt*. Quod si alicui suspectus hoc loco fuero, illum rogo conuersionem eius, vt adire dignetur. Si non ita conueruisse Aetii verba deprehenderit, mendacii & impudentiæ me liberrime accuset. Quis autem magis detortam & prodigiosam interpretationem vidit aut legit vnquam? Sed non contentus fuit Cornarius hunc quem ostendimus locū deprauasse, nisi alium quoq; in eodem capite eadem temeritate peruerteret. Nam Serapionis, vt ipse fingit, auctoritate fretus, falsissimam Galeno assuit lectionem, hanc nimirum: *τὸ δ' ἀφρολίτρον ἀφρόπτερον δύναμιν ἔσθ'· πλὴν ἡ τυπικὴ ὀλίγη· πολλὴ δὲ πλεονὴν ἔχει*. Quod vt liquido declaremus, initio Serapionis excutiamus verba, quibus ille nititur, oportet, quæ sic habent: *In Baurach autem sunt duæ virtutes simul; nisi quia virtus styptica est in eo pauca; virtus vero abstersiua multa.* Quæ certe verba etiam si legitima essent, & mendo vacarent, vt minime vacant, tamen Cornario non ad Aphrolitrum, sed ad litrum potius, quod Serapioni, vt comprehensum est, Baurach dicitur, transferenda erant, locusq; Galeni illi ita legendus erat: *τὸ δὲ λίτρον ἀφρόπτερον δύναμιν ἔσθ'.* Quam sane lectionem cōfirmat etiam Auicenna, qui *Canone 2. de Baurach* inter cetera sic scribit: *Et in Baurach quidem est stypticitas pauca cum abstersione bona; propter sui falsedinem.* Atqui Cornario fucus

Cornari
perrina-
cia.Dioscori-
dis de spu-
ma nitri
& aphro-
nitro sen-
tentia ex-
posita.Cornarius
Galeni a-
liquor lo-
ca deprā-
uat.Serapio-
nis locus
expositus.

A *Plumbago*, quæ Græcis *μολυβδαίνα* dicitur, Plinio *lib. 34. cap. 16. & 18.* Galeno nominatur. Plumbago. Hanc Græci in tres digesserunt species. Primam Dioscorides *μολυβδαίνα λίθον*, nos lapideus. Galena. dem qui plumbi imaginem obtinet, vel simpliciter *plumbarium* appellamus. Germanice *Glantz*, quia nimirum modice splendet, nuncupatur. Alteram Græci *μολυβδαίνα αμυρον*, Eius generis. id est, *arenam plumbariam* vocant. Tertiam generali nomine *μολυβδαίνα*, hoc est *plumbaginem*. Est autem plumbago duplex. Natiua seu fossilis metallicaue vna, quæ non est nisi plumbiferax vena. Germanis *Bleyerz & Bleyeschweiß* oder *Bleyeschweif* dicitur. Factitia, in fornacibus procreatur, in quibus aurum & argentum eliquantur, *ut alibi fusius diximus*. Germanis *Thest* oder *Herdbley* nuncupatur.

B Plumbum trium est generum: Vnum candidum, quod Græcis, *ut Plinius lib. 34. cap. 17.* testis est, *αργύρεον* appellatur. Idem *cap. 18. eiusdem libri* argentarium, quod argento simillimum sit, & album nominat. Germanis *Zin* nominatur. Diuersum est a Stanno, utpote composito. Nam vbi tertia plumbi nigri portio, duabus argenti portionibus inest, Latinis *Stannum*, Germanis *Wercz* vocatur. Ex stanno fiunt laudatissima specula. Alterum cinereum dicitur, quod tum Græci, tum Latini veteres scriptores ignorasse videntur. Atque hinc est, quod Plinius duo tantum plumbi genera commemoret. Nostri *Bisemuntum*, Germani *Bisemunt* oder *Wisemunt* oder *Contersein* appellant. Tertium Græcis *μολυβδος*, Latinis *nigrum plumbum*, Germanis *Bley* dicitur.

Pompholyx post Cadmiam supra fornaces parieti adhæret. Fauilla est æris tantum, aut Cadmiæ fornacum tantum, aut vtriusq;. Fit quum ex Pyritis lapidis panibus torrefactis excoquitur æs: aut quum ab argento separatum, in sui generis fornace perficitur.

C Tum enim fauilla tenuissima & leuissima sursum fertur, & euolat in superiorem domicilii ærarii partem, adhærens ad eius parietes, & ad laquearium tecti. Quæ primum in bullas, *ut aqua tumet*, atq; ex eo nomen inuenit. Neque enim *πύρεολιξ* Græcis est, nisi bulla: Mox maiore accedente incremento, lanarum assimilatur peniculis. Et hunc in modum sua sponte in fornacibus gignitur *Pompholyx*, quæ Germanis *Hüttenrauch* propriissime nominatur. Cura & industria *Pompholygem* artifices triplici ratione conficiunt. Primo, æri quum perficitur, friatam detritamue Cadmiam fornacum inspergunt. Secundo, ære & Cadmia fossili alternis, *ut ex ipsis fiat Orichalcum*, in ollas positis, fauilla ex ære resoluta sursum in operculi cavitatem fertur, eamque implet, quæ pura *Pompholyx* est. Tercio, Cadmiam fornacum separatim in fornace ardenti folliis ventilare solent. His tribus rationibus *Pompholyx* primæ bonitatis, id est, *candidissima & leuissima* efficitur, quæ *Seplasis Nil album*, quod candidissimæ lanæ similis sit, Germanis *Weiß nichts* nominatur. Hinc Germanis vsitatum est dicere, *Nil prodesse oculis*. Duos ex iis modos, nempe primum & tertium, Dioscorides monstrauit. Secundo hodie vruntur. *Pompholyx* autem Serapioni *Thutia* vocatur. Quæ illi duplex est: Vna fornacum, de qua iam dictum est. Altera subterranea & fossilis, quæ Germanice *Erđ* vel *Zechenrauch* appellatur. Græcis ignota. *Thutia* officinarum hodie non est, nisi Cadmia racemosa, *ut suo diximus loco*. Ceterum *Spodos* siue *Spodion*, quam *Cin*culam aliqui interpretantur, a *Pompholyge* non certe genere, quod similiter, *ut hęc fauilla* ex eadem orta materia sit, sed specie differt. *Pompholyx* enim candida est, & leuis, *ut monstrauimus*: *Spodos* autē cinerea & grauior partim ad exteriora fornacum latera adhærens, partim in pauimentum decidens, adeoque impurius. Ab raditur autem de lateribus, in terra vero conuertritur. Nil griseum hodie nominatur: Germanis *Graunichts* oder *Grauerhüttenrauch*. Fit & lutea *spodos* supra secundas fornaces, in quibus argentum a plumbo separatur, *ut alibi fusius diximus*. Germanis *Gelerhüttenrauch* appellatur. Atque hætenus de *spodio* fornacum. Alterum *spodium* subterraneum seu fossile dicitur, inque quatuor species, cinereum videlicet, *nigrum, viride, & luteum* digeritur, solis Arabibus notum; Græcis vero ignotum: *Ut mirum sit Matthiolum apud Serapionem in capite de Thutia*: sic enim *Pompholygem* ille nominat, non legisse; quod quædam sit, quæ in mineris: ita enim interpretæ eius loquitur, inueniatur. Præter iam dictum fossile. Arabes aliud quoque *spodium* habent, nempe *cannarum seu arundinum radicem exustarum cinerem*. Hinc hodie *spodium de canna* nuncupatur. Hoc cum eo, quod Græci *ἀνθαράδος* nuncupant, non nihil conuenit: Nam id ipsum ex myrti foliis, o-

D quæ pura *Pompholyx* est. Tercio, Cadmiam fornacum separatim in fornace ardenti folliis ventilare solent. His tribus rationibus *Pompholyx* primæ bonitatis, id est, *candidissima & leuissima* efficitur, quæ *Seplasis Nil album*, quod candidissimæ lanæ similis sit, Germanis *Weiß nichts* nominatur. Hinc Germanis vsitatum est dicere, *Nil prodesse oculis*. Duos ex iis modos, nempe primum & tertium, Dioscorides monstrauit. Secundo hodie vruntur. *Pompholyx* autem Serapioni *Thutia* vocatur. Quæ illi duplex est: Vna fornacum, de qua iam dictum est. Altera subterranea & fossilis, quæ Germanice *Erđ* vel *Zechenrauch* appellatur. Græcis ignota. *Thutia* officinarum hodie non est, nisi Cadmia racemosa, *ut suo diximus loco*. Ceterum *Spodos* siue *Spodion*, quam *Cin*culam aliqui interpretantur, a *Pompholyge* non certe genere, quod similiter, *ut hęc fauilla* ex eadem orta materia sit, sed specie differt. *Pompholyx* enim candida est, & leuis, *ut monstrauimus*: *Spodos* autē cinerea & grauior partim ad exteriora fornacum latera adhærens, partim in pauimentum decidens, adeoque impurius. Ab raditur autem de lateribus, in terra vero conuertritur. Nil griseum hodie nominatur: Germanis *Graunichts* oder *Grauerhüttenrauch*. Fit & lutea *spodos* supra secundas fornaces, in quibus argentum a plumbo separatur, *ut alibi fusius diximus*. Germanis *Gelerhüttenrauch* appellatur. Atque hætenus de *spodio* fornacum. Alterum *spodium* subterraneum seu fossile dicitur, inque quatuor species, cinereum videlicet, *nigrum, viride, & luteum* digeritur, solis Arabibus notum; Græcis vero ignotum: *Ut mirum sit Matthiolum apud Serapionem in capite de Thutia*: sic enim *Pompholygem* ille nominat, non legisse; quod quædam sit, quæ in mineris: ita enim interpretæ eius loquitur, inueniatur. Præter iam dictum fossile. Arabes aliud quoque *spodium* habent, nempe *cannarum seu arundinum radicem exustarum cinerem*. Hinc hodie *spodium de canna* nuncupatur. Hoc cum eo, quod Græci *ἀνθαράδος* nuncupant, non nihil conuenit: Nam id ipsum ex myrti foliis, o-

E uilla ex eadem orta materia sit, sed specie differt. *Pompholyx* enim candida est, & leuis, *ut monstrauimus*: *Spodos* autē cinerea & grauior partim ad exteriora fornacum latera adhærens, partim in pauimentum decidens, adeoque impurius. Ab raditur autem de lateribus, in terra vero conuertritur. Nil griseum hodie nominatur: Germanis *Graunichts* oder *Grauerhüttenrauch*. Fit & lutea *spodos* supra secundas fornaces, in quibus argentum a plumbo separatur, *ut alibi fusius diximus*. Germanis *Gelerhüttenrauch* appellatur. Atque hætenus de *spodio* fornacum. Alterum *spodium* subterraneum seu fossile dicitur, inque quatuor species, cinereum videlicet, *nigrum, viride, & luteum* digeritur, solis Arabibus notum; Græcis vero ignotum: *Ut mirum sit Matthiolum apud Serapionem in capite de Thutia*: sic enim *Pompholygem* ille nominat, non legisse; quod quædam sit, quæ in mineris: ita enim interpretæ eius loquitur, inueniatur. Præter iam dictum fossile. Arabes aliud quoque *spodium* habent, nempe *cannarum seu arundinum radicem exustarum cinerem*. Hinc hodie *spodium de canna* nuncupatur. Hoc cum eo, quod Græci *ἀνθαράδος* nuncupant, non nihil conuenit: Nam id ipsum ex myrti foliis, o-

F quod quædam sit, quæ in mineris: ita enim interpretæ eius loquitur, inueniatur. Præter iam dictum fossile. Arabes aliud quoque *spodium* habent, nempe *cannarum seu arundinum radicem exustarum cinerem*. Hinc hodie *spodium de canna* nuncupatur. Hoc cum eo, quod Græci *ἀνθαράδος* nuncupant, non nihil conuenit: Nam id ipsum ex myrti foliis, o-

quod quædam sit, quæ in mineris: ita enim interpretæ eius loquitur, inueniatur. Præter iam dictum fossile. Arabes aliud quoque *spodium* habent, nempe *cannarum seu arundinum radicem exustarum cinerem*. Hinc hodie *spodium de canna* nuncupatur. Hoc cum eo, quod Græci *ἀνθαράδος* nuncupant, non nihil conuenit: Nam id ipsum ex myrti foliis, o-

66 Operum Leonhardi Fuchsi Pars II.

Spodium
officina-
rum.

Arabum
Spodium
cannæ in-
tra corpus
non assu-
mendum.

Sal.
Salinae.
Natrius.
Fossilis.

Sal Ham-
monia-
cus.

leæ, lentisci, & aliis nonnullis in fictili crudo, donec illud percoquatur, vstis conficiunt. A
Ita vero ipsis dictum est, *quod deficiente spodio, eo illius vice vsti sint.* Porro iam dictis omni-
bus spodiis diuersum est id, quo nunc passim Seplassæ vrantur. Siquidem hæ Platea-
rii securæ opinionem, *ossa Elephantis combusta, siue Ebur vstum* pro spodio vendunt.
Quod aliquo modo ferendum esset, quum Ebur vstum adstringendi polleat facultate,
si non ex bouis, & canum maxime ossibus suum interdum conficerent Spodium. Nam
si illud diligenter excutias, non raro ex cadaueribus collectorum ossium fragmenta in
iis reperies. Hanc quam diximus Spodiorum differentiam tum Medici, tum Phar-
macopœi diligenter expendant, vt sciant, quo illis in medicamentis conficiendis v-
tendum sit Spodio: & quod neque Spodium, neque Antispodium Græcorum intra
corpus assumere liceat. Quum enim ipsorum spodium, quod in pauimentum reci- B
dit, e tenuissima metallorum substantia vehementissima ignis combustionem conficia-
tur, dubium non est quin inde magnam consequatur acrimoniam, ob quam tuto intra
corpus exhiberi nequit. Atque hinc est, quod Græci ne extrinsecus quidem omnibus
promiscue vlceribus, nisi interdum lotum ad mouere illud voluerint. Accedit, quod hos
intra corpus exhibuisse, nusquam legatur. Sunt quoque plurimi nostræ ætatis Medici e-
ruditi, qui extrinsecus tantum hoc Spodium esse admouendum diserte tradant. Sed
neque Arabum Spodium cannæ, per os ingerendum erit, vtcumque Auicenna & alii Ara-
bes eius vsum in roborandis corde & iecore, plurimum commendent. Nam *vt Galenus*
testatur lib. Simp. 7. radix arundinum per se non leuem abstergendi facultatem obtinet.
Vita vero, & calidior & magis tenuium partium, adeoque acris efficitur. Hinc est quod C
lib. 1. de Compo. medic. local. cap. 2. inter medicamenta quæ alopecias sanare possunt, quem-
admodum etiam Dioscorides illam recenseat. Non solum vero hæ ipsa discutere, sed
etiam ex alto humores trahere possunt, quam etiam ob acrem qualitatem suam radix
arundinis vsta maxime obtineat necesse est, vt hoc nomine intra corpus tuto exhiberi
non possit. Quum vero non solum Auicenna, sed & Serapio suum Spodium multis in
morbis intra corpus exhibeant, & frigidum in secundo ordine, siccumque in tertio esse
scribant, fieri non potest, vt ex cannæ radicibus vstis confectum fuerit. Quare sunt, qui
illud ex radicibus nostrarum arundinum non constare, sed ex aliqua peculiari in Aui-
cennæ patria nata. Verum non considerant illi, eandem habere vim omnium canarum ex-
ustas radices. Alii vt Bellunenſis, *ex radicibus procere cuiusdam arboris internodia harundinum* D
modo habentis. Sed eadem facilitate qua afferuntur, etiam negantur. Ego quidem erro-
rem in Auicennæ cõdices irrepsisse suspicor, & falso *canna*, pro *alcanna* scriptum fuisse.
Alcannam vero ille vocat *herbam, quam Græci Cyprum, Latini Ligustrum* appellant. Nam
Galenus *Cyprum mista facultatis esse, quod habeat quiddam discutiens cum aquea substantia mo-*
dice calida: & quiddam adstringitorium, ex terrena substantia frigida refert. Item eius *decocto*
ambusta foveri. Vt etiam eo, aduersus igneas phlegmonas, & carbunculos: quod absque
molestia & modice siccet, vt rectius Serapio illud in 2. ordine siccum statuatur. Quineriã
cõmansum conducere oris vlceribus tradit. Quos omnes effectus suo spodio Auicenna
& Serapio adscribunt. Siquidem Auicenna spodio suo parum tum resolutionis, tum ad-
strictionis, veluti etiam Serapio tribuit. Vterque etiam illud phlegmonibus calidis, & o-
ris vlceribus conferre scribit. Quia vero, *vt iidem tradunt, & Galenus confirmat,* plurimum
frigiditatis habet, ideo ventriculū calidum roborat, & bilis ad ipsum defluxū repellit.
Vt dubium fere nullum sit, spodium Mauritanorum eandem quam Ligustrum habere
facultatem. Quod si vero quispiam pertinaciter contendat, spodium eorundem esse
radicis cannæ exustas radices, certe eas quas ei Arabes assignant facultates haud habe-
bit, nec intra corpus assumendum erit.

Sal diuum est generum, *Natrius & Factitius.* Natrius vel in terra, vel extra terram re-
peritur. In terra inuentus, seu fossilis, aut excuditur montibus, aut e campis effoditur,
aut ex iisdem eximitur arenis, quibus tegitur prius remotis. Salis certe montes, natriui
multi & illustres sunt in orbe terrarum, quos nihil attinet recensere. Effoditur e campis F
in ea Sarmatiæ parte, quam hodie Poloniam vocamus. Sub arenis autem, *Plinio teste,*
inuenitur iuxta Pelusium in Aegypto, qui quum omnis rectissime *Hæmoniacus* dici pos-
set, tamē id nomen sibi *Cyrenaicus* tantū vendicauit. Dicitur autē is *Hammoniacus*, vel quia
sub arena, quæ Græcis dicitur *ἀμμο*, inuenitur: vel ab Hammonis ibidem oraculo, iuxta
quod

quod effoditur. Siquidem illic sub arena defossa glebæ salis oblongæ, extra nigricantes, intus albæ, & Alumini scissili similes inueniuntur. Officinæ more suo vnus literæ adiectione vocem deprauantes *Armoniæcum*, vel *Armeniacum* salem nominant. Extra terram natiuus sal reperitur, aut in fonte, aut in fluuio, aut in lacu, aut ad mare. Fons quidē vel salem fert, vel eius riuuli solis calore siccati in salem conuertuntur. Fluuius aut salis ramenta defert, aut summa eius in salem densantur, reliquis aquis veluti sub glacie fluentibus Lacus in salem mutatur, vel sale æstuat, *ut alibi fusius docuimus*. Ad mare tenuis sal gignitur. Quum enim æstu feruet, & intumescit spumas agit, easq; ad littora & scopulos appellit. Hæ autem abscissæ, & in illis depositæ, atq; exsiccata, nonnullis in locis in salem conuertuntur, quem Dioscorides *ἁλὸς ἀχυνῖ*, Plinius *spumam maris* simpliciter interpretatur: Latini *siccum maris* *spumam* dicere possent, aut rectius *salem e marina spuma genitum*. Nam sub dio in scopulorum cavitatibus hærens, remanensq;, salibus, & rore ætliuis caloribus, in salem album concreuit, Iuniores Medici *salis spumam*, ambiguitate nominis decepti, vocant. Siquidem *ἁλὸς* & *sal* & *mare* Latinis est. Factitius fit multifariâ. Nā vel ex aqua fit marina in fossas ad hunc vsum paratas, quas *Salinas* appellant, tracta, quæ dein ardentissimo sole exsiccata concreuit. Hic *marinus* dicitur. Vel ex falsis fontibus excoquitur, vt Halæ Sueuorum, & multis aliis locis. Vel putealib. excoquitur. Vel ex sui generis lixiuio, *ut alibi copiosius monstrauius*. Perro sal a sale differt colore, & nitore. Nā quum omnis alius sal nō pelluceat, tamen Dacicus adeo interdum pellucet, vt cū quouis Crytallo de nitore, & translucida facilitate certare possit. Hinc talis recte *gemma*, vel vt officinæ hodie loquuntur, *sal gemma*; quod scilicet *gemma* in star niteat, nominatur. Alias differentias alibi ostendimus. Ceterum *ἁλὸς ἀχυνῖ*, id est, *flos salis*, vt ex Plinoliquet, vox ambigua est. Nam & fauillam, hoc est *siccum, tenuissimum & candidissimum salis in salinis collecti partem, & aliam quandam rem humidioris nature, ac crocei aut rufi coloris, & ingrati odoris, qua summo mari & fluminibus ac lacubus, qui maris etiam appellatione veniunt, innatat*, significat. Præstaret autem ad euidendam confusionem Latinos priorem *salis florem*, alteram autem *maris florem* appellare, quod scilicet reuera maris flos sit: & *ἁλὸς* vox quum sine articulo a Græcis efferatur, pro *mari* vsurpari possit. Maris autem flos ille, qui Dioscoridi *ἁλὸς ἀχυνῖ* dicitur, non est nisi efflorescentia, quæ summo mari, fluminibus, ac lacubus, qui maris etiam appellatione veniunt, innatat liquida. Balenarum semen, in officinis Medicorum, non tamen sine errore, & *Sperma ceti* vocant. Nam proprie loquendo Balenarum aut ceti semen est succinum, vt cap. 20. fusius dicitur, quod pisces iam dicti deuorant, & quod Auicennæ, aliisque Mauritanis, *Ambra* simpliciter, aliis rectius *ambarum subalbidum* nominatur. Ceterum Flos maris Germanis *Wolram* oder *Walraih*, oder *Baldrath* forsitan, quod cito auxilium afferat, nominatur. Et testantur nautæ ac mercatores illud hodie reperiri in paludibus ad mare, & in stagnantibus maris partibus. Nec obstat, quod hodie in officinis prostant non sit crocei coloris. Nam inuenta est ratio lauandi, qua fit vt ita albescat, & acrimoniam fere omnem deponat, vt mirari satis nequeam Matthiolum, qui locum hunc conuiuentibus, aut forte lippientibus præterit oculis. Sed est ei solenne, vt perpetuo ab aliorum sententiis, optimis etiam, dissentiat, etsi non nisi leuib. & nullius momenti rationibus vtatur. Præterea nomenclaturæ ipsum monere debuisset, *ἁλὸς ἀχυνῖ* non tantum a Nilo flumine defluere, sed etiam stagnantibus maris partibus innatare. Atque hinc est, quod rufi quasi grumi in eo interdum inueniantur. Res autem est pinguedine virus olens, & ingrati odoris, vt hinc a maris flore non esse diuersam constet, quæ non aqua, sed oleo potius diluitur.

Sandaracha vel *Sandaraca* trium est generum; Vnā fossilis & natiua, quæ ad satietatem rufa est, fragilis, pura, & Cinnabaris imitatur colorem, aut minus vsta, & partim subluta, Germanis *Bergrot* / *Reißgeel* oder *Rosgeel* dicitur. Serapioni & Seplasi *Auripigmentum* vel *Arsenicum rubrum* nominatur: idq; non temere, quod Arsenico non solū natalib. sed etiam tota natura affinis sit. Altera est *Sandaracha factitia*, quæ fit ex Arsenico, hoc quidem modo. Arsenici mediocres particule in ollam cōiectæ, cuius os obturatur, quinque horis coquuntur in fornace, contrahuntq; sandaracæ colorem. Tertia itidem est factitia, cuius *libr. 7. cap. 12.* meminit Vitruuius, & *Sandyx* appellatur. Aetius *Syricum* nominat, Græci alii *σύνιον*, quod scilicet *fuci*, quo suum mentiuatur colorem mulieres, speciem ac si.

Extra terram inuentus.

ἁλὸς ἀχυνῖ
Spuma maris.Factitius sal.
Marinus.
Salina.

Salis differentia.

Sal gemma.

ἁλὸς ἀχυνῖ
Salis flos.

Maris flos.

Sperma ceti.

Ambar Auicennæ.
Ambar subalbidum.

Matthiolum reprehensio refuta.

Sandaracha triplex.
I.
Auripigmentum rubrum.
II.
Sandyx.
III.

68 Operum Leonhardi Fuchſii Pars II.

militudinem gerat. Vitruuius, *ut supra diximus*, Sandaracham diſerte vocauit, inſiciens: *A* Ceruſſa quum in fornace coquitur, *mutato colore ad ignis incendium, efficitur Sandaracha.* Quare Matthiolus hoc loco me per calumniam, *ut ſolet fere ſemper, flagellat, quod Sandycem dixerim appellari etiam Sandaracham, quod inſtar eius ruſa ſit,* hanc tamen diſerte a Sandaracha Dioſcoridis & aliorum Græcorum diſtinguens, quæ res foſſilis eſt. Ita perpetuo ex aliorum falſa ſuggillatione ſibi laudem comparare ſtudet Matthiolus, *ut mirum non ſit, illum hac ſua mordacitate multorum bonorum ſibi contraxiſſe odium.* Ceterum Sandyx alio nomine Latinis *Minium ſecundarium* appellatur. Conſiſcendi eius modum *lib. 9. Simp. Galen.* indicauimus.

Scoria. Scoria Græcis, *Recrementum* Latinis, *Schlacken* Germanis, non eſt niſi purgamentum venæ metallicæ in fornace excoctæ, quod ubi metallum in catinum defluxit, ab eo de- *B* trahitur.

Stribium. Stribium aut Stimni, Seplaiſis Antimonium, Germanis *Spießglas* appellatur. Plinio *ſpuma candida & nitentis lapidis* nuncupatur. Optimum ſplendidiſſimum, & nitidum, con- *fractu cruſtoſum, terræ & calculorum expers.* Noſtra tamen ætate foſſile non vendi- *tur, ſed excoctum.*

Sulphur duplex. Sulphur duplex eſt, foſſile ſeu natium, & factitium. Foſſile effoditur, & Græcis *ἀπύρον*, id eſt, *ignem non expertum*, Latinis *vinum*, nō alia de cauſa nominatur, quam quod *Natium.* ex vena ſua ſine aliqua coctura accipitur: vel quod nondum liquefactum, & in fruſtula

Factitiū. fuſum ſit. Factitium, quod Græcis *πυρρὸν*, id eſt, *ignem expertum* vocatur. Fit autem *C* variis modis. Nam aut ex aquis excoquitur, ſulphuris in plumbeis cortinis tam diu co- ctis, donec omnis aqua excoquatur, & quod reliquum eſt in ſulphur denſetur: aut ex gleba effoſſa, & in vaſis cocta perficitur igni. Quem quidem modum faciendi ſulphur *in lib. 9. de Simpl. medicam. facultat.* indicauimus. Aut eo Pyrites ſtillat, item in ollis co- ctus. Modus in eodem loco a nobis eſt traditus. Factitii ſpecies eſt, quod ex ſulphure, quod excocta aqua denſatur, & ſquama ferri ſit, concoctis, & in vrceo transfuſis. Id *Caballinū* propterea, quod eo ſcabiem equorum ſanant, *Caballinum* nominant. Quod, *ut etiam* *ſulphur.* *Pannonicum,* luteo obducitur. Luteum vero a nonnullis virgineum, quod purum ſit: vel *Virgineū.* quod virgines, perinde atq; mulieres, eo faciem pingant, appellatur. Tale interdum natium, interdum factitium eſt. Officinæ citrinum vocant.

De Lapidibus & Gemmis. CAP. XIX.

Adamas. *A* *Damas* lapis ita dictus eſt, quod non poſſit nec ferro, nec igni domari. Dictus eſt & *Anachites,* quod pauitantium animos a vano metu liberet, Germanis *Demuth* / *oder Demanth.* Attamen ſingularis eximiaq; lapidis illius duritia, calido hirci leoniſue cruore ita molleſcit, *ut rumpi poſſit.* Adamas autem venena deprehendit, & irrita facit. Quocirca regibus vnice expetitus, maximi ſemper pretii fuit. Lymphationes quoque, ſi credimus, abigit.

Aetites. *Aetites,* officinis lapis aquilæ, Germanis *Adlerſtein* vocatur. Sic vero dictus eſt, vel a colore aquilæ candicante cauda, *ut ſentiit Plinius,* vel quod in aquilæ nidis reperiatur. Eſt illi globola & rotunda facies, aliumq; in ſe, veluti prægnans, lapidem continet: qui *E* ubi quatitur, ſonum edit. Aetites omnis exſiccatur, & qui lapillum in vtero continet: is, *ut Græci perhibent,* alligatus ſiniſtro grauidæ mulieris brachio, foetum, ne vuluæ lubri- cæ excidat, continet, accuſtodit. Sinistro vero parturientis femori alligatus, ita adiu- uat eam, *ut ſine doloribus pariat.*

Alabaſtri. *Alabaſtrites* vocatus eſt lapis, quod ad Alabaſtrum oppidum inueniatur. Germanis *Alabaſter* dicitur. Ex eo a vetuſtis temporibus artiſices pyxides ſeu vaſa vnguentaria, *Alabaſtra.* quæ Attici *alabaſta,* & alii Græci *alabaſtra* nominant, *ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ λαβέν,* addito per Pleona- ſimum *p.* quod videlicet *propter leuiorem comprehendendi non poſſint.* Facultates eius Dioſcorides & alii tradunt.

Amethy- ſus. *Amethyſtus* purpurea eſt gemma, ſic dicta quod *uſq; ad vini colorem accedens,* Plinio teſte, *F* priuſquam eum deguſtet, in violam deſinat. Quanquam magorum vanitas, reſiſtere ebrie- rati *Amethyſtum* promittit: & inde appellatam eſſe aſſerit. Reſiſtere item veneficiis, & auertere grandinem.

Amiatus. *Amiantus* lapis dictus eſt, quod ignis adeo non inquinat ipſius ſplendorem, *ut etiam* *in eum*

A in eum coniciatur sordibus, nihil deperdens nitidus & splendescens extrahatur. Idem *Asbestos*, quod in lucernis (sunt enim ex eo thryallides) semel accensus non extinguitur, dum aliquid olei supererit, siquidem ignibus non absumitur. Idem quia plexis mulierum crinibus similis est (*ea enim figura formatus plerumque, venditur*) a Zoroastre nominatur *Bostrychites*. Ab aliis quia caniciei hominis non dissimilis, *Polia*, vocatur. Quia vero ad alumen scissum similitudinem obtinet, a Quadrigario alumen nominatur. Quia denique manibus netur, & textitur, a quibusdam *Linum* appellatur. Germanice *Sederweiß* oder *Erdschlach* nuncupatur. Nec est aliud, nisi id, quod in officinis Medicorum *Alumen plumosum* dicitur. Asbestos.
Bostrychites.
Linum.
Alumen plumosum.
Aphroselenus.
Selenites.

B *Aphroselenus* dictus est hic lapis, quod multis persuasum esset, lunę spumę esse. Dioscorides *Seleniten*, quod noctu ad incrementum lunę soleat inueniri. Vel quod imaginem lunę contineat, quam quia pellucet, noctu concipit, & in dies singulos crescentis minuētisq; numero. Aetio, q; transluceat, *Diaphanis*, & vocabulo latino *εικλαειον* nominat. Nam in hodiernum diem *Specularis*, quod perspicui possit, & rei, quę ab eius tergo est, imaginem reddat, appellatur, adeoque ab ipso speculo nomen ei impositum. Germani glacię & vitri nomen illi imponunt, & noster *Graben Eiß* vnde *Erzglas* vocant. Specularis lapis.
Armenius.

Armenius lapis, vel, ut Galenus appellat, *Armeniacus* ita dictus est, quod ex Armenia afferatur. Laudatur levis, colore cęruleus, per quam æquabilis, calculo carens, & friabilis. A cęruleo, de quo infra dicemus, differt modico candore, qui in Armenio teneuiorem efficit colorem. Plinius, *Armenium optimum esse* scribit, *qui summe virēt, communicato colore cum cęruleo*. Qui nunc in officinis pro Armenio habetur, cęruleo & Chrysocolia partim aspersus, non est Armenius, quod nimirum Dioscoridis notę illi haud conueniant, & color cęruleus in eo tam exiguus sit, ut nullum, aut modicum saltem vsum præbere possit. Accedit, quod nullum habeat leuiorem, ac planus siue æquabilis non sit. Reperitur tamen nunc in compluribus Germanię nostrę locis, lapis congener illi, quem Armenia mittit. Siquidem, ut ille, viridis est colore, ad cęruleum inclinante. Viribus etiam ab eo non discrepat, quod atra bile vexatis, iis vomitum, & aluum ciens, maxime conferat. Hoc igitur vice veri Armenii uti licebit.

Affius lapis ab Affo oppido Troadis dictus est. Alio nomine *Sarcophagus*, quod scilicet corpora defunctorum in eo cõdita, intra quadragesimum diem absumantur, excoctis dentibus appellatur. Affius lapis instar Pumicis rarus est, illiq; Tophi candidus color, venę in profundo luteę, levis, fungosus, & friabilis. In eius superficie insidet quidam simile tenuissimę farinę, quę parietibus molarum inhæret, quod Affię petreę florem nominant, qui supra, & magnam cum sale petreę hodie appellato cognationem & similitudinem habet, ut alibi latius diximus. Affius.
Sarcophagus.
Affię petreę flos.

Carbunculus gemma preciosissima, ab igne nomen accepit. Quidio hoc nomine *Pyropus* dicitur. Multorum est generum. Optimus est egregie rubens, & *Amethystizon*, id est, citius extremus igniculus in Amethysti exit violam. Vulgo & *Seplasis Rubinus*, Germanis *Rubin* nominatur. Alterius generis nigrior aspectu est, quem veteres *Carchedonium*, atq; iuniores, quod florem mali granati colore, referat, *Granatū* Germani *Granatlin* appellant. Lætificat cor, & pellit mœtorem. Alia eius genera alibi recensuimus. Carbunculus.
Pyropus.
Rubinus.
Granatus.

Ceruleus aut *Cyanus*, Arabibus & officinis Medicorum *lapis lazuli*, *Meluc lapis stellatus*, quod in eius fracturis velut stellę quędam aureę, radiantes, & splendentes scintillant, Germanis *Lasurstein* appellatur. Duplex existit, natiuus & factitiuus. Natiuus seu fossilis, in venis fibrisq; ortus, vel per se reperitur, vel a materia metallica abraditur. Germanis *Berglasur* oder *Bergblau* dicitur, & in se chrysocollam continet. Factitiuus, Germanice *Gemein lasur* oder *Ultramarin* dicitur. Pictores tam natiuo, quam factitio vtuntur. Medici enim veteres natiuo tantum, eliguntq; eum, qui est saturi colore. Proinde male faciunt hodie Medici & Pharmacopœi, qui factitio ad medicamentorum compositionem vtuntur. Ceruleus Lapis lazuli.
Stellatus.
Natiuus.
Factitiuus.

F *Corallium* frutex est marinus, qui ex alto maris extractus induratur. Vbi enim emergit, obfuso aere mox concreuit. Hinc nonnullis *λιδοδενδρον*, id est, *arbor lapidosa*, nominatur. Dioscoridi duum est generum, rubrum & nigrum, quod tamen ratum est. Reperitur tertium quoque album, citra etiam vstionem existens. Vires Dioscorides recenset. Corallium.
Genera corallium tria.

- Chrystallina.** *Crystallus* ex similitudine, quam cum glacie obtinet, idem quod ea nomen apud Græcos inuenit. Nec tamen, ut quidam volunt, est glacies, id est, *aqua gelu vehementiore concreta: sed magis succus frigore densatus*. Si enim glacies esset, solis calore liqueceret. Ex marmorum saxorumque canalibus effoditur, ac veru & aratro excitatur, & torrentibus defertur. Intenuissimum puluerem trita, & in vino austero pota, dysentericis, quod multum exsiccet, auxiliatur, & sitim, sub lingua posita, restinguit.
- Hematites.** *Hematites*, sic quod sanguinei sit coloris, dictus est, vel quod sanguinis profluvia sistat, vel quod aquarum coribus attritus, succum reddat sanguineum. Germanis *Blutstein* vocatur. Optimus cui concreti sanguinis color inest, friabilis, durus, & qualis, purus, & qui nullas sordes admixtas habet, nec lineis zonisue variatur. Aquarum autem cotes, ut *id obiter etiam dicamus*, sunt, quæ aqua madefiunt: sicut olearum, quibus oleum, quo fer-
- Aquarum cotes. Olearum.** rum aciem trahat, illinitur.
- Hyacinthus.** *Hyacinthus* gemma est, *Plinio teste*, in qua fulgor violaceus dilutus est. Duplex reperitur *Hyacinthus*, nigrior, quam *marem* appellant: candidior, quam *fœminam*. Iuniores gemmarum scriptores, ex tribus gemmis faciunt unam *hyacinthum*, eamque in tres secant species. Quarum primam appellant *Granatos*, fulgore rubro splendentes, qui sunt *Chrysolithi*, Germanice *Jacint* dicti. Altera citrinos, sic a Citri colore vocatos, qui etiam sunt *Chrysolithi*. Tertiā venetos, qui sunt *Cyani*. Ferunt *Hyacinthum* gestantes a fulmine tutos reddi, eosque a pestis periculo liberari, etiam si in aere pestilenti habitant. Somnum quoque conciliat.
- Iaspis. Subiudis. Thyites. Viridis. Turcica Iaspis.** *Iaspis*, Paulo, & Aetio duplex est. Vna subviridis, quæ Dioscoridi, & post eum Gale-
- C** no, *Thyites*, ut alibi diffuse monstrauimus, dicitur. Plinio *lib. 37. ca. 10. Meroiles* vocatur. Merum sentit Georgius Agricola *lib. 6. & 7. de natura fossilium*. Altera viridis, quæ sic dicta est, quia magis viret. Eius 12. vel 13. sunt genera, quæ alibi a nobis sunt ordine explicata. Tertium autem genus est *Turcica* iunioribus vocata *Iaspis*, quæ quod aeri similis est, aut cælo matutino, id est, *cærulea, lacte suffusa*, Græcis *ἀέριος*, id est, *aerea, adeps, boria, caspia, & persica*, nostris *Turces* nominatur.
- Iudæicus. Syriacus. Teco-** *Iudæicus* a regione, in qua nascitur, nempe *Iudæa*, appellatur. Quia vero *Iudæa* ipsa *Palæstina* Syriæ regio est, Aetio *Syriacus* vocatur. Græcis a facultatibus *πυλνθός*, quasi *lapidem lique faciens ac comminuens*, Germanis *Judenstein* nuncupatur. Habet & alias appellationes, quas alibi indicauimus. Glandis formam obtinet. Nam ab obtusiore eius
- D** parte ad acutiorem procedunt eminentes lineæ, ita inter se æquales, ut toro factæ videri possint.
- Lyncurium.** *Lyncurium*, officinis *lapis Lyncis* dicitur, quod illum ex vrina Lyncis in terra condensata concretum esse putauerint. Fabulosum autem esse quod illi affirmant, & Plinius *lib. 37. cap. 3. & Dioscorides lib. 2. cap. 73. testantur*. Nec enim vnquam vllum tale fuit
- Lyncurium veterum.** *Lyncurium*, quod ex Lyncis vrina concreuit. Veteres certe Græci scriptores hoc modo concretum *Lyncurium* non lapidem, sed *Succinum*, de quo infra dicemus, appellarunt. Quod manifestum fiet legenti Theophrastum, Aetium, & alios paulo ante citatos auctores. Ut ridiculum plane sit, quod Amatus Lusitanus scribit, *lapidem lyncis officinis hodie nominatum electri esse speciem quandam*, quum cæcus etiam statim tactu sentiat lapidem. Non est autem, ut recte sentit, vrina lyncis concreta, sed reuera lapis. Porro *Lyncis lapis* dictus non est, nisi Phrygius Dioscoridi nominatus, quod illi omnes *Lyncurii* notæ conueniant, quemadmodum alibi fusius a nobis monstratum est. Hallucinantur itaque plurimum nostræ ætatis Medici, quod Phrygium lapidem, *Lyncis* appellant: & quod illum ad eliciendam vrinam, & ad lapides in renibus, aut vesica comminuendos, vtilem esse opinantur. Ad sordida quidem vlcera, & oculorum medicamenta, Galeno teste, valet.
- Magnes. Herac-** *Magnes* ab inuentore, Magnete pastore, a quo repertus est, dicitur. Ab aliis *Magnetis*, eadem de causa. *Heraclius*, vel ab Heracليا ciuitate, vel ab Hercule. Vt enim is terras, & immanes belluas subegit: ita lapis ille ferrum ad se trahit. Qua quidem de causa *Sideris* etiam est appellatus. Eius varietates sunt differentie, quas alibi indicauimus.
- F** **Pyropus.** *Pyropus*, quia valde ardet ab ignis aspectu, ita est vocatus. Hinc ab igneo colore officinis *Rubinus* est dictus. Vide *Carbunculus*.
- Pumex.** *Pumex* lapis Græcis *πυμής* nominatur. Quod sane nomen a verme frumenta erodere, qui iisdem vis, Latinis *gurgulio* dicitur, inuenit. Vt enim is frumenta perforat, ita natura pumicem.

A cem. Quoniam vero haud secus ac spongia fistularum plenus est, *Spongia* quoque appellatur. Non est autem, nisi terra levis exusta, vel lapis excoctus. Germanis *Pims* oder *Kramstein* vocatur.

Pyrites lapis sic dictus, quod ex eo ferri, aut alterius duri lapidis conflictu ignis excutitur, aut quod ipsi persæpe igneus insit color. Serapioni & reliquæ Mauritanorum familiæ, ac officinis, *Marchasita*, Germanis *Kiſſ*/ *Rupfferstein*/ *Rupffererz* nominatur. Aristoteli *πνευματικός*, quod igni repugnet, dicitur. In ardentibus enim fornaces projectus fluit: at ubi in catinum defluxit, rursus concrevit ac durevit. Eius præcipua genera duo sunt. Alter *argentæus* siue *argentarius* appellatus, quod sit coloris argentei. Ex eo *zs* & argentum excoquitur, & officinis vsitatus est. Germanis *wasser* oder *weisser Kiſſ* nuncupatur.

B Alter aureo est colore præditus, & Germanice *Goldkiſſ*/ *Gelberkiſſ*/ *Rupfferkiſſ* vocatur. Vterque veterum literis est celebratus. Præter hæc duo genera, sunt etiam alia quædam alibi a nobis ostensa.

Sapphirus & *Cyanus* eiusdem sunt generis. Vterque enim est cærulei coloris, sed *Sapphirus* insuper aureis punctis collucet. Viraque gemma similis est cælo sereno, verum *Sapphirus* propter aurea puncta, stellis ornato. Duplex autem est *Cyanus*, alter nigrior, alter candidior: ille mas, Germanice *blauer Saphier*; hic foemina, Germanice *weisser Saphier* appellatur. Vtus eius est in roborando corde. Sunt qui hominem reddere castum tradant, ideoque Monachis, ut illorum inextinguibilem compescat libidinem, magno studio gestandus.

C *Smaragdus* a splendendo nomen suum accepit. Siquidem *σμαραγδός*, splendo significat. Sua viriditate oculis iucundus est, & tanquam speculum imagines rerum reddit. de quo copiosissime *Plinius lib. 37. cap. 5. differit*. Smaragdo motus obscenæ voluptatis valde est perniciosus. Siue enim mas, siue foemina, dum commiscet corpora, secum gestet, vel in anulo, ut contingat cutem, disrumpitur. At cum comitiali morbo, tanquam cum hoste pugnat, ut vel ipse vincat vim morbi minorem, vel a maiori vincatur. Illo modo manet integer & solidus, hoc in aliquot frangitur partes. Venenis etiam maxime epota gemma hæc resistit.

Specularis lapis. Vide *Aphroselenus*.

Spongia vel *spongites* lapis, sic est appellatus, quod in spongiis inueniatur. Is Cochleæ instar perforatur, & quidem vtrinque testaceus existit. Germanis *Schwammstein* vocatur. Renum calculos in vino potus comminuit.

De Terris. CAP. XIX.

Bolus siue *gleba armenia* Ochra in modum palleſcit, promptissime in summum leuorem calcis modo soluitur pistillo, aut quouis liquore, arenaque substantia caret. Commanducata butyri instar liqueſcere videtur, & in gustu manifestam adstrictionem exhibet. Talem ab amico mihi quodam transmissam & donatam habeo. Quæ passim in officinis proſtat, quum impense rubeat, legitima esse non potest.

E *Cimolia* terra a Cimolo insula dicta, vulgo *Saponaria*, Germanis *Wascherdt*/ oder *Wasseller*/ oder *Seisserdt*. Eius duo sunt genera, candida, & ad purpureum inclinans.

Cretica terra siue *Creta*, ab insula Creta, in qua potissimum inuenitur, est appellata. Hæc quia argentarii opera sua abstergunt, ut splendant, *Argentaria* etiam nominatur. Germanis *Kreid* dicitur. Est quoque Creta viridis, & nigra, ut alibi ostendimus.

Lemnia terra, a Lemno insula unde olim exportabatur, dicta est. *Lemnium* quoque *sigillum* nominatur, ob impressum illi *sigillum Dianæ sacrum*, quod capra erat. Officinæ eadem de causa *terram sigillatam* vocant. Hodie Turcicæ literæ eidem imprimuntur. Metuendum tamen est, ne quæ etiam num hodie iis literis insignita affertur, vera terra Lemnia & impermixta sit, quum vera rubeat, aut fuluo colore prædita sit: quæ vero hodie asportatur, dilutius rubet, quod cum alia terra mixturem arguit.

F Proinde non desunt, qui Bolum armenium *orientalem* dictum, infucatam, & veram terram Lemniam esse putent. Non enim ex Armenia, ubi verus & syncerus bolus reperitur, ea affertur, sed ex Lemno insula. Id vero Lemnensium mercatorum dolo accidit, qui, ut res diuersas montiantur, ex vna & eadem terra Lemnia, duas res efficiunt: quum pura est, *armenium bolum*, hac vero mixta & adulterata, *terram Lemniam*. Præstat tamen terram *Le-*

mniam, mistam etiam & adulteratam, in usum Medicum adhibere, quam eam, qua ha-
ctenus vsæ sunt Sepalsæ, quæ non est nisi terra figulina, omni adstrictione vacans. Qua-
re hanc abicere debent Pharmacopœi.

Rubrica.
Sinopica.

Fabrilis.
Natiua.

Factitia.

Rubrica, Græcis *κίλινθος* dicta, duplex est: vna, quæ *Sinopica* appellatur, quod in quibusdā
Cappadociæ speluncis, *Dioscoride attestante*, effossa purgataque, Sinopen, Ponti urbem,
fertur, ac ibidem venditur. Altera Græcis *τελινθία*, Latinis *fabrilis*, quod scilicet ea fabri
potissimum vtantur, nominatur. Atq; hæc rursus in duo scinditur genera. Siquidem
vna est natiua, quæ Germanis *Bergrottel*, quasi dicas *montana rubrica*, quod scilicet in
metallis aurariis, argētariis, ærariis, ferrariis, non raro quoq; in propriis venis reperia-
tur, appellata est. Est & rubrica fabrilis factitia, Germanice simpliciter *Röttel* vocata.

Sunt plures aliz terræ species, quibus veteres vsi sunt Medici, hodie ignotæ Pharma-
copœis & inusitatæ, ob id a nobis præteritæ. Harum tamen historias *libro nono Simplicium*
tractauimus.

Deijs quæ mari & aquis sumuntur. CAP. XX.

Bitumen.

Genera bi-
tuminis.
Durum.

Liquidū.

Naphtha.
Petroleū.

Succinū.

ἡλεκτρον.

πτερυγόβιον.

καράβιον.

Carabe.

καρυόβιον.

Gagates.

Succinum

Africanū

& Asiati-

cum.

Ambra.

Auicennæ
error.

A *Sphaltes* Græcis *Bitumen* Latinis, *Bergwachs* Germanis nuncupatur. Succus est pin-
guis seu terra adeps, qui naturali cognatione cum sulphure iunctus est, ideoq; facillime ignem
concepit & flagrat. Optimum in lacu quodam Iudææ nascitur, qui ob id *Asphaltites* est vo-
catus. Duum generum existit, durum & liquidum. Durū est, quod intra, vel extra terrā
denatur, ac in aliquam lapidis consistentiā & duritiam mutatur. Fossile autem terrenū
multis nominib; appellat. Siquidē terra *pharmacitis*, *ampelites*, *carbo fossilis* seu *bituminosus*,
Samothracia gemma, *thracius* & *obsidianus lapis*, atq; *gagates*, vt alibi copiosissime monstrauimus, di-
citur. Liquidum bitumē est, quod plerumq; a concreto bitumine per saxa emanat, ex-
sudat, & destillat, oleiq; propter pinguetudinem simile est. Hinc est, quod nonnulli scri-
ptores, vt *Vitruuius*, aliquando *oleum* simpliciter, alii cū adiectione *Medea oleum*, quo illa
vsa est in cremēda pellice: Medici *Naphtham* vocabulo Babylonico, appellarint. Nostra
ætate *Petroleum*, siue *oleum petrae aut saxi*, quod scilicet e saxi, vt dictū est, destillet, & Ger-
manis *Steinöl* / *stießend Bergwachs* vocatur, Monachi & sacrificuli Papistici, quorū est
inexplebilis auaritia, vt simplices argento emūgant, hoc oleum e corporibus defuncto-
rum diuorū stillare mentiuntur. Huius triplex est differentia. Est enim alba, aut verius
ex cinereo colore candida *Naphtha*, nigra, & rufa. Porro liquidi bituminis genus est, q
succinum Romanis vocatur. Ita namq; illis dictum est, quod ex succo, nempe liquido bi-
tumine, e saxi in Germanicum mare profuente, atq; inibi durefcente, non autem ex
lacryma Populi arboris, vt quidam existimant, fiat, quemadmodum *libro nono Simpl.*
firmis rationibus monstrauimus, vbi totam eius historiam copiose commemorauim-
us. Græcis *ἡλεκτρον*, quod scilicet attritu calefactum ad se paleas, aliasq; res minutas
ac tenues trahat. Quæ quidem de causa iisdem etiam *πτερυγόβιον*, id est, pennas floccosue
ad se alliciens, & *καράβιον* vocatur. Mauri & officinæ Persica voce, quæ idem significat, *Ca-
raben* appellant. Græcis quoque *καρυόβιον*, vt supra est monstratum, dictum esse constat.
Germani veteres *Glessum*, quæ vox illis vitrum denotabat, nuncuparunt. Hodie
duobus nominibus vocatur: vno, quod illi commune est cum nigro, q; priuatim *Gagates*
dicitur, *Agstein* vel *Adstein*: altero, quod ex eo q; incensum ardeat, intuenit, *Bornstein*.
Saxonum namq; & aliarum septentrionalium gētium lingua, *bornen*, idem quod *ardere*
significat. Sed de succino, quod in Europa gignitur, ideoq; Europæum est nominatum,
in præsentia hæc dixisse satis sit. Præter id vero aliud est, quod in Africa, & item aliud, q
in Asia gignitur, ob id hoc *Asiaticum*, illud vero *Africanum* appellatur: vtrumq; Arabes
Ambram vocant. Recentioribus quoq; Græcis *ἀμπρά* & *ἀμβρά* nominatur. Quos Latini
imitati *Ambarum* nuncupant. Hoc colligitur ex balenis, & piscib; cetaceis, qui fontes
Ambaris degustarunt. Hi namq; huius Ambaris vtpote pinguis, aerei, & subdulcis, ni-
miū auidi, eius esu sibi mortem consciscunt, præsertim vbi copiosius vorant. Mortui i-
gitur fluitant, & vndis maris emergunt, quod animaduertentes insulani, cōiectis vncis
& funibus illos extrahunt, ambarumq; cæso ventre eximunt. Hoc nonnulli *semen*, vel
Græca vtētes voce *sperma ceti*: alii, vt Auicēna, *stercus* eiusdem esse magno errore putāt,
quum non sit nisi succinum quod balenæ siue cete deuorarunt. Vnde liquet, Auicen-
nam ma-

- A** nam maximo in errore versari, qui sub Ambræ voce vnica, duas inter se diuersissimas res, nempe *sphumam* siue *florem salis*, & succinū hoc Africanum & Asiaticum, describit ac confundit. Et ex eodem etiam posteriores Medici, & horum officinæ, errandi occasionem sumserunt. Nam illi res has discernere nequeunt, *florem maris*, *sperma ceti* vocant, quum potius succinum, quod e cetaceis piscibus eximitur, vulgi & imperitorum more, ita nominandum illis fuisset. Porro succinum hoc, perinde atq; Europæū in Arabia maxime felice ad Sychrim, vt scribunt, oppidulū maritimum ex liquido bitumine coloris e cinereo candidi in mare e fontibus suis effluit, illicq; concrefcit, quod sæuietibus procellis agitatū pelagus, cū prouolutis impetuose saxi exspuit in littus. Homines aut, qui præsentitū maris insultus, ad vada se conferunt, & quod eructarint Ambarū congerunt.
- B** Interdum etiam in cetaceis piscibus interfectis, vt *comprehensum est*, inuenitur. Quod ad alterius differentiam, *sperma ceti* nominari posset, quamuis parum proprie. Ambarū fuluum, vel, vt hodie loquuntur, *Ambræ citrina*, discriminis gratia appellari posset. Ad nos hoc tempore non affertur, sed in eius locum substituitur *Ambarum factitium*, quod hodie in officinis sub Ambræ nomine prostat, & magnis impensis a pharmacopœis comparatur, atq; a colore cineritio, vt illā a citrinā, quæ succinum est, vt diximus, discernant, *gryseam* appellant. Modum autem conficiendi alibi ostendimus. Vt iam perspicuum sit omnibus recentioribus Medicis triplicem esse Ambram. Vnam subalbidam, quæ est flos maris, Dioscoridi, & officinis inepte *sperma ceti* dicitur. Alterā fulvā & pinguem, quā *citrinam* nominant, quæ certe rectius quam prior *sperma ceti*, quum nonnunquam ex illis iam interfectis eximatur, diceretur. Non est autem nisi succinum, quod cetacei pisces deuorant. Tertia *grysea*, quæ natiua non est, sed factitia, & hodie in officinis sub Ambræ nomine prostat. Quæ singula in nostris in nonum Galeni de simpl. medica. facult. librum commentariis copiosius ostendimus. Quod si igitur Matthiolo hæc non satisfaciunt, nec vt mea sententiæ subscribat efficere possunt, ad eos, quos iam citamus commentarios, recurram, & inueniet forte, quæ ipsius animo satisfacient.

Auicennæ error.

Iuniorum & officinarū error.

Ambarū factitium. Ambræ officinarum. Ambræ grysea. Ambræ recentioris triplex.

- Ceterum vt succinum est liquidi Bituminis genus, ita etiā id medicamentū, quod recentiores Græci *Caphuram*, Mauri Indico, vt videtur, vocabulo, *Camphoram* appellant: quod multis argumentis alibi demonstraui. Sic autem a verbo *Caphar* dicta esse videtur, quod ob lentorem suum ac tenacitatem, in compingendis, glutinandis, & oblinendis nauium tabulis, aut tignis, lateribusq; ædificiorum magnus eius olim vltus fuerit. Post Dioscoridis, Galeni, & Pauli seculum in vsum medicum venit, & gemina existit. Vna natiua, vel, vt aliis vocatur, rudis, quæ scilicet nullam vim ignis experta est. Talis in maris fontibus oritur, & aquæ marinæ supernatat. Hæc, vt Serapio auctor est, copiosa gignitur, cum terra crebris motibus conuulsata, magnam tam Sulphuris, quam bituminis vim profundit. Hæc non colore, sed partium duntaxat tenuitate, a candida Babylo-niorum *Naphtha* differt. Odor autem & color candidi Bituminis esse sobolem testatur. Non esse autem gummi, hinc abunde liquet, quod nullum Gummi ardet, nec oleo dissoluitur, sed aqua: atqui *Caphura* nequit dissolui, nisi aliquid oleosum adieceris. Hinc experientia edocti Seplasiarii, vbi contundenda venit in pilis, aliquid e nucis, aut amygdali nucleo, aut quid simile adiiciūt. Quod autem bitumen sit, Auerrhoes satis testatur, qui hanc Ambræ congenerem facit. Item quod ardet in aquis, quod Bitumini peculiare est. Amicissima præterea est ignibus, quem semel conceptum, difficile dimittit. Neq; dissident ipsius facultates ab iis, quas Bitumini inesse videmus. Cui rei mercatores quoq; fidē faciunt, qui constanter affirmant, se vidisse Indiæ locum *Caphuram* exsudatē. Hæc officinæ caret. Factitia altera est, quæ ignis ardorem sensit, a quo album, quem semper obtinet, colorem contraxit, & in laminas pellucens digesta est. Hinc est, quod Simeoni Sethi *ἱερὰ ζοῖον*, id est, ignis calore elaborata, Serapioni autem *sublimata* dicatur. Hæc certe est, quæ in pastillis magnis ad nos affertur, & in officinis passim sub nomine *Camphora* venalis habetur. Quæ autem ad conficiendi eius modum, item diuersas de eā Arabum opiniones, & temperamentum attineat, prolixè admodum libr. 9. de simpl. medic. facult. in nostris Commentariis indicaui.

Caphura. Camphora.

Natiua.

Factitia.

Bituminis liquidi, at crassioris, limiq; speciem referētis neq; tamē duri genus quod est id, quod Græci composito ex pice & Bitumine nomine *μικτόν πικτόν* vocant, non certe, q̄ naturaliter ex vtroq; constet, vt Plinio visum est, sed quod mistam Bitumine picē

Pissasphe-tus Plin. lib. 12. ptus.

Dioscoride attestante, redoleat: aut forte quod pici simile sit. Tanta enim ei cum pice similitudo est, ut nonnulli illud propter hanc similitudinē *Picem* appellent. Hoc Aristotele & Dioscoride auctoribus, in Apolloniatarū agro inuenit, atq; ex Cerauniis montibus deuolutum fluminis impetu rapitur, illicq; in glebas coactū, ad littus eiicit. Quum igitur in fluminis littora eiectū mox reperitur, pingue quidem & adhuc molle existit. Vbi vero diutius extra aquas fuerit, durius multo efficitur, resolutisq; tenuiorib. ac humidis eius partibus ita siccum redditur, ut resinæ tostæ, quā *Seplasiæ* picem *Colophoniam* & *Græcam* vocant, consistentiā acquirat. Atq; illud hoc tempore apud Pharmacopœos deprauato & decurtato nomine *Asphaltis* venit, quum potius illis *Pissasphaltos* nominandum erat. Bitumen hoc accensum, picis modo, igne liquefcit, & de se guttas fundit, mistamq; Bitumini picē omnino redolet. Graui etiā halitu non accensum consistat. Pingue præterea est, & manib. tractatum mollescit, aut igni ad motum liquefcit. Vt dubium non sit, quin id, q̄ nuper sub *Asphaltis* nomine a nostris Pharmacopœis afferri cœpit, sit vera Græcorum ac Dioscoridis *Pissasphaltos*, & Mauritanorum *Auicennæ* & *Serapionis* *Mumia*. Ceterū, ne id silentio transeamus, olim in ea fui sententia, ut crederem id, q̄ non procul, nepe trib. tere lapidibus, ab *Oenoponte* oppido, ab *Oeno* flumine sic dicto, ad montes *Seefeldenses* post immodicos imbres colligit, & ab incolis eius loci *Dursenblut* id est, *gigantum sanguis* dicitur, esse *Pissasphalton*. Atq; in eam quidē sententiam me pertraxit doctissimus vir *Georgius Collimitius*, qui fragmentum eius mihi pro *Pissasphalto* transmiserat, quod in hodiernum vsq; diem retineo. Verum accepta tandem vera *Pissasphalto*, utrunq; deceptum fuisse deprehendo. Nam id ipsum igni ad motū, picis instar, nō liquefcit, nec guttas de se fundit, sed ligni, aut tedæ modo conflatur. Durum præterea est ac solidū, ita ut tufum in puluerē redigi possit. Et quum omnino lapidea duricie præditum sit, nihil dubito *Gagatē* esse lapidē. Nam nigro colore est, crustosum, aliqua ex parte læue, accentumq; bitumen redolet, & omnes *Gagatis* a *Dioscoride* cōmemoratas notas habet. Quapropter si alibi diuersum a me scriptum aut dictum est, id, ut parū veritati cōsentaneum, iam damnatum esse volo. Porro ut ad *Pissasphaltum* redeamus, si illa diutissime extra aquā posita terra multa obruatur ac tegatur, retorrida magisq; sicca euadit, tandemq; effossa & exempta, a nonnullis *Pissasphaltos* fossilis nuncupatur. Nō ab re aut paulo ante a nobis dictum est, *Pissasphaltū* esse *Serapionis* & *Auicennæ* *Mumiā*. Mauritani namq; duplicē *Mumiam* describunt, nempe natiuam & factitiā. Natiua, nō est nisi *πρωτόσφαλτο* Dioscoridis, quam iam descripsimus. Altera factitia, quæ itidem gemina est. Vna, qua principum & diuitum corpora condiuntur. Ea constat ex myrrha, aloë, balsamo, & sanie, quæ ex humani cadaueris carne resudat. Hæc hodie non affertur. Altera est, qua pauperum corpora demortua condiri solent. Ea, ut *Strabo in 16. testatur*, ex bitumine, quo ad mortuorū condituras *Ægyptii* vtiuntur, cui nonnulli picem adiiciunt, constat. Siquidem natiuum bitumen, & liquefactum in hominis cadauer infundunt, omnesq; eius partes cauas, cranium nimirum, thoracem, ventrem, & ossa peruia, eo cōplent. Atq; ea est, quæ ad nos affertur, & in officinis fere omnib. pro *Mumia* prostat. Quæ utiq; in *Pissasphaltis* penuria vti licet, q̄ eandem fere facultatē habeat, modo ossa prorsus abiiciant, & bitumē tantum, quo cadauera illa completa sunt, ad vsum medicū adhibeatur. Verum quū iam *Pissasphaltus* satis magna copia a quibusdam *Seplasiariis* afferatur, ut dictum est, præstat ea neglecta *Mumia* veteri vti.

Spongia. *Spongia seu fungus marinus*, corpus laxum, rarū, ac cauernosum, q̄ ad se liquores allicit, & eos, quos attraxit, nisi vi exprimat, asseruat. Præstat vti noua spōgia, ut q̄ non tantum est materia irrigandos humores excipies, sed etiā manifeste desiccet. Nā in ipsa etiamnum ea, q̄ a mari accepit, facultas exsiccandi seruat. Progressu tēporis etiam si vsui nō accommodat, tamē nihilominus odorē & facultatē maris amittit, adeoq; nō eque desiccet.

Pila marina. *Sphæra seu pila marina*, sic a figura dicta, hodie corrupta voce *Balla marina* vulgo nominatur. Meminit eius *Gal. lib. 1. de comp. med. loc. c. 18.* *Cornarius* tamen ignorans, quid esset apud *Galen.* eo loco *pila marina*, *Galen* locum suo more deprauauit, & pro *sphæra*, *spongiā* falso substituit, adeoque res, forma & aspectu diuersas, confudit. Eius autem vniuersam historiam in altero nostrorum de *Scirpium* historia *Commentariorum* tomo studiosi reperient, ut non sit opus hic fusius de ea verba facere.

- A** Hactenus breuiter, quæ in vniuersum sit materia medica, hodie in officinis vñtata, adeoque pharmacopœis & Medicis etiã cognitu necessaria: membratim perstrinximus. Nunc itaque qua ratione illa situm colligenda, tum asseruanda, eadem breuitate docebimus. Habet namq; quælibet stirpis pars, vt ab iis exordiamur, suam maturitatem, statumq; colligendi tempus, quod anni aut dierum numero, sed magis ex ipsius rei natura æstimatur. Ea enim, quæ maturitatē consecuta sunt, & perfecta, ea colligēda maxime ad medicamentorum vñum veniunt. Herbarum igitur vbi florent, aut semine prægnantes sunt, & serena cœli constitutione, non nubibus, nec imbribus apparentibus, ac post meridiem statim sunt colligendæ. Collectæ, terra ab iis expurgata, atq; aliis aduentitiis excrementis diligenter amotis, in vmbra potius quam sole, ne huius calore vires earundem exsoluatur, exsiccandæ sunt: nisi caule sint crassiore, aut folio humidiorē, adeoq; vt putrescant idoneæ. Exsiccandæ autem sunt in loco ædium aliquo superiore perflatili, asserib. dolabra læuigatis, & arctissime inter se iunctis atq; compactis, ne semina q̄ ex herbis, excidunt per rimas decendant, sed potius colligi possint. Impendente autem tempestate aliqua, fenestræ maturæ claudendæ sunt, ne herbarum a vñtis dispersæ inuicem implicentur, & inter se confundantur. Cauendum etiam vnice, ne canibus aut felibus accessus illuc pateat, quod ab illis commingantur, ac stercorebus contaminentur. Valerianam autem & Neperam vocatam herbas suspendere ex pariete, quam in pavimento stratas exsiccare: quod feles illarum amantes in iis assidue versari delectentur. Et si accidat, vt herbarum decerptæ humidæ admodum sint, ac cœlum itidem humidum ac pluuiosum sit, nec siccioris auræ spes vlla fuerit, in hypocausto calefacto sæpe versando, ne scil. putrescant, siccari debent, non tamen eo, vñq; siccare conuenit, vt aliquid virib. earum decedat. Singulis annis renouandæ sunt. Flores, non secus atq; reliquæ stirpium partes tum legendæ, quum maxime vigent, & nequaquam quum iam flaccescentes decidui euanescent: demtis tamen Rosis, quæ expandi cœptæ, auelluntur, quum reliqui vbi iam dehiscētes aperti sunt, sed haud ita pridem, & ex quibus vis nondum exhalauit. Legantur autē tempore pomeridiano, rore nocturno aut matutino solis calore absumto: alioqui enim ob alienam humiditatem facile corrumpuntur. Verum quia maiori ex parte omnes fere flores sint herbis fragiliores, molliores, ac tenuiores, ideo tantum abest, vt in sole exsiccandi sint, maxime vbi odorati sunt, vt ne quidem in vmbra, si calida, & eminentia loca fuerint. Siccandi igitur sunt in locis temperatis, quo vtique tempore sæpius, ne situm contrahant, reuoluendi sunt, adhibita etiam cura, ne sicci natium colorem amittant. Certum enim est flores, qui inter siccandum a proprio colore degenerant, nullius esse in medicina vñus. Durant annum duraxat, ideo singulis annis renouari debent, veluti herbarum. Semina legenda quum maturitatem sentiunt, priusquam decidunt, paleisq; festucis, pediculis, lapillis, & aliis extraneis repurganda, atq; leuiter exsiccanda. Deligēda vero pleniora, nec rugosa, nec cariosa, & quæ odorē & saporem suos seruant. Repurgandi autē modus est, vt quicquid leue & puluerulentum est, inouendo hinc inde & inflando in aerē dissipetur, vel angustiore cribro excernatur. Præterea semina manib. primum fricanda sunt, vt q̄ leuiter hæreat & alienum est tollatur. Maiora & rotunda semina in tabulam inclinatam, & leuiter manu pulsam in vas ei subiectum relictis arenis & lapillis deuoluenda sunt. Quæ iam dictis rationibus separari nequeunt, virgula, cuius vertici cera agglutinata est, sigillarim contacta remoueantur. Præstat etiam singulis annis mutare ac renouare semina. Licet. n. quædam ex illis seruari possint, tamē pauca admodum sunt, quæ inueterata rancorem non redolant: quo fit, vt calorē nanciscantur extraneum, & sibi haud congenitum. Siccatur, vbi præsertim humida collecta fuerint, fasculis vitreatis, aut sacculis reponuntur loco sicciore, & humiditatis experte. Fructus vbi maturi sunt decerpant, demtis Sorbis, q̄ immatura decerpere conuenit: id q̄ etiam in reliquis fructib. adstringentib. obseruandum erit. Hi namq; paululum immaturi decerpēdi sunt. Oleosi fructus, vt sunt *Iuglandes, amygdala, pistacia, nuclei pinei, & anellana*, non prius ex arboribus decutiant, q̄ plane vltimum maturitatis gradum attingant. Id autem recte cognoscit, quum extima inuolucra sponte sua dehiscunt, & arbore concussa vna cum fructib. decidunt, alioquin in solatu contrahuntur & sidentur. Decerpti fructus exsiccantur, vel in aere, expositi soli ac ventis septentrionalibus, aut orientalibus: vel in clybano, si in aere fieri nequeat, q̄ tamen expeditius est. Porro qui in aere exsiccantur,

Herbarum quæ
do colligendæ.

Flores quæ
do decerpēdi.

Semina
quo tempore
legenda.

Fructus
quando decerpēdi.

Radices
quo tēpore
auellendæ.

ne a muſcis contaminentur, aut telis araneorum obducantur, curandum eſt. Qui vero in clybano exſiccantur, ne comburantur cauendum erit: id quod fiet, ſi poſt extractum panem imponuntur. Reponuntur armariis, pixidibus, & locis, quo neque humor vllus, neq; fumus, neq; puluis perſtingere poteſt. Mutantur quorānis. Radices præcipue euellendæ ſunt, cœlo ſereno, & a pluuiis vacuo, quum medicamentoſæ ſunt, id q̃ vere & autumnō fit. Vere namq; priuſquam in caulem, folia, florem, fructum & ſemen viſ ſtirpis erumpat, velluntur. Autumno autē incipiēte, iam foliorū deſluuiō, ſuccus omnis p̃ caulem in radices remeat, quapropter tum ſunt maxime efficaſes. Vere etiā ideo quædam radices eruendæ veniunt, q̃ hoc tempore tātum inueniri poſſint, pereuntib. mox tum foliis, tum caulibus: cuiuſmodi ſane ſunt fere omnes bulbōſæ radices. Omnes autē radices integræ, ſi fieri poteſt, & abunde nutritæ, vbi ſcil. nec nimis molles humideq̃ue, nec nimis duræ ſunt, & putredine omni vacantes, euellēdæ. Euulſæ aqua clara tātisper dum omni vndiq; terra, quæ illis tenaciter hæret, & argilloſa eſt, vel limo penitus omnibuſq; fordib. abſtergantur, lauandæ ac purgandæ ſunt: & ſi quid computruir, cultello abſcindendum & amputandū. Deradi quoq; debent, vt tum a fibris, tum capillamētis omnib. repurgentur. Purgatæ, ſi magnæ & craſſæ fuerint, in taleolas ſecandæ ſunt, vt ſcil. citius exſiccari, & facilius deinde, vbi vſus poſtulat, conteri poſſint. Quædā autē vmbra, & vento ſiccādæ, vt eſt apii, fœniculi, iridis, & ſi quæ aliæ ſunt vel minores, vel ſicciores, vel rariores, vtpote quarum vires ſol, vel ignis promte diſſipabit. Quæ vero grandiores ſunt, veluti *bryonia*, *gentiana*, *helenii*, *mandragora*, & id genus alię, ſi aer ſit nubilus & hyems, ne in vmbra ſitu tabeſcant, ac proinde marceſcāt, in ſole & vento, vel igni ſiccant. Aut tranſuerſim in orbiculos, & taleolos ſectæ, & filo traictæ, paruiſq; interuallis, ne ſe contingant ſuſpenſæ exſiccantur. Quæ autē in pauimētum proiectæ ſiccantur, ſæpe verſandæ ſunt, ne mucidæ aut putridæ fiāt. Quod ſi vero ſiccatis celeriter opus eſt, patellæ ignitæ, & admodum calefactæ impoſitas, ſæpe verſando ſiccabis. Quædā etiam lignoſa matricē (ſic enim cor ſtirpium Gaza ex Theophrasto nominat) exempta ſiccantur, vt fœniculi, & apii. Ceterum mutandæ radices vbi rancorem naſcæ fuerint, aut vires ſuas amiſerint. Succī, vtpote in medicina admodum neceſſarii, omni prorſus diligentia ſunt eliciendi, vt ſcil. totiuſanni curriculo nullam putredinem ſentiant. Hi autē non ſolum ab herbis, & eorundem foliis, verum etiam a radicib. & fructib. eliciuntur. Qui e radicib. extrahuntur, vt *Chycyrrhica*, vere quidē parandi ſunt, quum primum folia prodeunt, tum enim ſuccoſæ admodum ſunt radices. E foliis vero dum primum cauliculi germinant, & antequam ſtirpes flores edant, & earum caules lignoſæ fiant, herbis priuſ conciſis & contuſis, eliciuntur. Ex fructib. aut quum quidam vltimam ſenſerint maturitatem, cuiuſmodi eſſe debet *malorum punicatorum*, *citriorū*, & *limonum*. Quidam vero priuſquā ad plenum maturuerint, vt *ex iuglandibus*, *moris*, *liguſtri baccis*, & *fructu ſylueſtrium prunorū*. Quidam ex immaturis, vt *omphacium*. Liquores, quum fere omnes aliunde afferantur, ac peregrini ſint, qua ratione, quoue tempore colligendi ſint, hi ſciunt apud quos ſtirpes illæ, vnde hi deſluunt, naſcuntur. Non raro etiam Dioſcorides colligendi eorundem modum recēlet. Excipiuntur autem incifo per ſummum adoleſcentiæ vigorem caule. Lacrymarum eadem eſt, quæ liquorum in colligendo ratio. Gummi quoq; colligendi modus diuerſus non eſt. Cortices partim e truncis & ramis, partim e radicibus, partim etiam a fructib. arborum & herbarum ſumuntur, atq; earundē nominibus appellantur. Arborum autē craſſiores cortices aut manu auellunt, quum leuiter adhærent: aut vbi tenacius hærent, ferro abſcinduntur, vel abraduntur, quum tenues ſcil. ac membranofi ſunt. Radicum cortices hoc pacto colliguntur. Radices virides per medium ſinduntur, vel piſtillo a ſummo uſq; ad imum tunduntur, & medulla exempta abiicitur. Fructuum cortices carne abiecta retinentur. Nō ſecus autem quam radices ſunt exſiccandi diligenter. Quæ reliqua eſt materia medica vel animantium, vel eorundem partium, itemq; metallorum, & e mari ſumpta, nullam in colligendo, ſed tantum in reponendo & aſſeruando induſtriā & diligentiam Pharmacopœi requirunt. Magna namq; ex parte exotica & peregrina ſunt, aliundeq; afferunt. Quapropter, quomodo hæc & alia materia medica aſſeruāda ſit, iā exponem.

Derite aſſeruanda materia medica. C A P. XXII.

Herbæ vt
reponēdæ.

Herbæ vbi pbe fuerint exſiccata, loco nō fumato, non humido, nō puluerulento, ſed ſublimi, puro, & arido in ſacculis ex corio cōfectis, vel in ligneis capſulis reponendæ

A nendæ sunt, ac diligenter claudendæ, ne earum vires euanescent. Qua quidem in re nonnulli Pharmacopœi plurimum errant. Nam herbas iam sic atas in fasciculos digestas ad officinarum laquearia suspendunt, vbi breui non solum viribus aeris ambientis exustione, ac ventorum perflatu destituuntur, sed etiam in mille sordium sentinam deficiunt, quandoquidem & puluere, & araneorum telis obsiduntur, ac muscarum stercore defœdantur. Neque reprehensione omnî vacant ii, qui in linteis sacculis, ipsisque textura admodum raris herbas asseruant, & appendunt. Siquidem æstius aer in ipsos penetrans, quicquid boni inest, absumit & abolet. Quin etiam puluere obsitæ corrumpuntur ac contabescunt. Quum autem diu integris viribus herbæ seruari vix queant, consilium est, vt quotannis mutantur. Flores, vt herbæ, in ligneis arculis asseruantur ac Flores.
B reconduntur, & singulis quoque annis permutantur. Semina vbi exsiccata fuerint, itidem ligneis arculis inclusa reponuntur in locis aridis, non calidis: facile enim locorum humiditatem contrahunt, ac putrent. Præstat ea etiâ quotannis mutare, non obstante quod pleraque illorum seruari possunt. Fructus exsiccati in sportam vel capsulam ligneam recondendi sunt, & in loco temperatiore seruandi: ita enim extraneos humores non concipiunt, nec situm facile contrahunt, nec corrumpuntur, nec etiam nimium siccantur. Qui per annum recentes reponuntur, aut maiori anni parte perdurant, in locis siccis minime asperginē redolentibus appenduntur, vt sunt *vua, pyra, mala cydonia, & punica*: aur sup paleas expaduntur, vt sunt *immatura sorba, & mespila*: vel milio sepeliuntur, quemadmodum medica seu citria, & arantia mala. Fructus denique oleosi, vt *Iuglandes, amygdala*, pineæ melius sparsim, quam acruatim asseruantur: nam in acruos congesti facile incalescunt, & raucidi fiunt, maxime in loco & tempore calidiore. Seruandi igitur sunt loco frigidiore. Radices exquisite siccata reponuntur loco non insolato, non fumato, Radices.
non humido, non squalente, non puluerulento, sed sublimi, sicco, puro. Sit igitur locus qui ad septentrionem vergat, vel etiam ad meridionalem plagā, quādo scilicet radices ipsæ non prorsus exsiccata reconduntur, adhibita tamē cura, ne eo tēpore austri humidissimi flatus admittantur. Seruandæ autē quam diu vegetæ adhuc sunt. Quare quæ crassæ & densæ sunt, trib. annis seruari possunt, vt *radix bryonia, cētauri maioris, peucedani, & similia*. Quæ vero tenues & ratæ sunt, vt *asari, apii, tragii, asparagi, & similia*, quotannis sunt mutantæ vterque elleborus, *Gal. lib. i. de Compos. medic. local. teste*, triennio seruari potest. Succi.
C i alii seruantur paululum primum liquidi ad ignem feruēfacti, moxque diligenter defecati, vt est *succus rosarum, oxalidis, buglossi, & similia*. Alii ignem non experiri tantum sublidere permittunt, ac deinde vasis tandiu transferuntur, donec defecati pelluceant, vt est *succus malorum punicorum, citriorum, limonum, cydoniorum, & mororum*. Sicci reponendi sunt, vbi aut sole, aut igne probe siccantur: tum demum vasculis vitratis, aut pixidibus reconduntur. Cortices, fructuum maxime diligenter prius exsiccati, ne situm contrahant, aut putrescant, in arculis ligneis recondi debent. Gummi facile seruantur & diu durant, si in loco nec humido, nec putrido collocentur. Animalia sicciora integra, vt *cantharides*, non difficulter, vbi semel probe exsiccata fuerint, asseruantur. Cortices.
Gummi.
Animalia
& eorundē
partes.
Humidiora & pinguiora prompte corrumpuntur, & putrescunt, vermibusque opplentur, nisi absinthium vulgare, & id genus alia amara, & putredinem arcenia illis adiciantur. Reponuntur autem in loco sicciore ac frigidiore. Partes eorundem siccæ, ante repositionem nullam singularem præparationem requirunt, nisi vt membranulæ, carnes, & quicquid corruptioni obnoxium est, diligenter abradatur, & auferatur, ne scilicet putrescant, & subiectæ parti graueolentiam concilient. Humidæ autem partes accuratiore præparatione egent, quæ qualis sit, suo dicemus loco.

De delectu & in vniuersum præparatione materia medica. CAP. XXIII.

Quod ad delectum materiæ medicæ attinet, non est cur hoc loco aliquid dicamus. Delectus.
Nam quod ad stirpes ipsas spectat, is delectu in iis optimo vteretur, qui veras & legitimas ad vsum medicum adhibebit. Aliorum delectus passim supra est in commemoratione singulorum indicatus, vt opus non sit hic denuo de eodem verba facere. Quapropter ad præparationem potius accedemus. Varie autem medicamenta simplicia Præparatio.
præparantur tribus de causis, nempe, vt vel palato gratiora, & magis suauia sint: vel vt diutius conseruari, vel vt melius & expeditius aliis misceri possint. Varii autem sunt me-

Preparatio-
nis modi
quot.
I.
Comminu-
tio. dicamentorum simplicium præparationis modi, nempe decem, quos ordinè prosequemur. Primus est *Comminutio*, qua vtiq; vtendum erit, vbi simplicia integra vsurpari non possunt. Imminuuntur vero primo, dum in multas secantur partes, vt scilicet hac ratione corrupta, aliena & inutilia ab vtilibus, propriis, & integris separentur. *Secundo*, quando duriores partes finduntur scindunturue, vt expeditius tundantur: molliores aut, vt facilius siccentur, aut condiantur. *Tertio*, vbi quæ dura & tenuia sunt, vt *arborum surculi, & herbarum aridarum stipites*, franguntur. *Quarto*, quæ findi aut frangi nequeunt, lima attruntur, vt vomica nux officinis hodie appellata, aut torno in ramenta diffecantur, vt *lignum Guaiacum*. *Quinto* comminuuntur simplicia medicamenta, quando eorundè cortices duriores vel membranosi cultello, vel vnguibus abraduntur, propterea quod illorum tantum in medicina vsus sit, vel quod noxi, vel nullius pretii sint. *Sexto*, quæ dura & crassa sunt, atq; ob id commisceri aliis nequeunt, teruntur ac pistillo tunduntur. Terere autem seu tundere est crebro percussu non solum humida, mollia, & virentia, sed etiam sicca comminuere, sic vt in puluerem redigantur. Plinio trita in farinā, tusa, & cribrata dicuntur: quanquam posterius etiam de humidis, quæ trita per cribrum vi cochlearis, aut rudicula, aut manus cernunt, intelligi potest. Sicca vero cribri succussione descēdunt: Vtrunque autem, humidum scilicet & siccum, Græci λεαινειν, id est, laugare, seu laue reddere, & in puluerem tenuem comminuere, aut in pollinem redigere, & cum vino, vel alio liquore multum subigere dicunt. Vulgus pistare vocat, & ad herbas, fructus, semina, radices, ligna, & alia tum mollia, tum dura transfert. Succi tamen & liquores lenti gummi instar, vt *Galbanū, Hammoniācum*, sub pistillo dilatantur potius, quam laugantur: Ceterum Græci etiam κόπτειν in pila tundere herbas & radices, & semina appellant. τελεειν quoque, id est, terere, non tantum in puluerem comminuere, sed etiam de *Vuis passis, Bdellio, Vino, Myrrha*, & aliis simul tussis effertur. Porro ducuntur pistillo per mortarium, aut super marmor leui compressu *Thus, Mastiche*, & similia quæ tundendo lateſcunt. Sic *Rhabarbarum* per se, sic *Lithargyrum* cum oleo, vel *Oxelæo*, vel *Hydreleo* nutritum, & alia permulta non humida modo, sed etiam arida, quæ trituram illam verberatu multo faciendam non tolerant. Quinetiam metalla vel aliud quidpiam elaboramus, valenter & pluribus diebus, præsertim in sole cum aceto, vel alio simili diu conterimus. Teruntur autem medicamenta potissimum arida, interdum etiam liquida, trib. de causis. *Vna* quidē, vt promptius quod potentia sunt, id actu fiant. Sic medicamēta, quæ potestate calida sunt, quo tenuius sunt irrita, eo citius & facilius a calore nostro actu calida euadunt, & nos quoque calefaciunt, quum integra adhuc nullam aut minimam calefaciendi efficaciam habeant. *Piper. n.* si integrum corpori adhibetur, aut ore continetur, aut deglutitur, nihil, aut parum id calefacere, deprehenditur etiam longo post tempore, quum eius puluis tenuissimus mox, vbi linguæ impositus est, eam vehementer incendat & moleſter. Eodem modo calida alia potestate omnia, sic stirpium calidorum folia tusa calefaciunt nos, & magis & citius, quam si integra vel sumantur vel admoueantur. Simile accidere lignis videmus, quæ quo crassiora sunt ægrius, quo vero tenuiora expeditius incenduntur. *Alterā* vt exquisitius promptiusque aliis medicamentis misceri possint. Quæ enim trita sunt tenuissime, & cribro tenuissimo creta, vbi medicamentis compositis miscentur, quod partibus suis minimis mutuo se contingant, promptius & valentius se inuicem afficiunt, & tandem compositi vnā facultatem rectius conflant. *Tertia* propter quam medicamenta teruntur, magis vel minus, causa est, vt facultatem acquirant a priore diuersam. Quæ enim tenuissime sunt tusa, & cribro tenui creta, in totū corporis habitum promptissime distribuuntur: e diuerso quæ crassiora sunt, in ventre hærent, quia angusta venarum ora subire nequeunt.

Hinc est, quod *Gal. lib. 4. de tuend. sanit.* Diospoliticum crassius faciendum esse doceat, vbi aluum per id ducere cōsiliū est: tenuissimum vero & pollinis instat minutissimum, quando vrinas mouere volumus. Pari modo *Rhabarbarum officinarum, asarū, cuminum*, & id genus alia permulta negligenter trita aluum subducunt: tenuius vero comminuta in corpus expedite subeunt, & venas perreptāt celeriter, vrinasq; mouent. Sic erugo, chalcitis, misy, sory, chalcanthū, æris squama, & alia similiter fortia & valida diu ex aceto trita morsum & rosionē deponunt & admittunt, virib. reliq; auctis. Quum enim natura partium sint crassiorum, vim suā in alcum vsq; corporis curandi nō demittunt,

- A** tunt, quapropter ut tenuiora fiant, diu ex aceto terenda sunt ac comminuenda, ut scilicet hoc modo curiose attenuata ad penitiora usque penetrent, & corporis meatus pertranseant, nusquam inter eundem retēta, & si calidioris naturae fuerint, sine morfu munere suo fungentur. Porro aromata, quae Actuarius, Nicolaus Myrepsius, & Paulus etiam *Asa*, id est, *species*, saepe appellat, negligenter teruntur, quum vires earum diu integras sunt seruandae, quod earundem spiritus facile exhalent ac dissoluantur: tenuissime autem teruntur, quum viribus illarum in praesens opus est. Ceterum terendorum non est una natura. Quaedam enim substantia sunt tenuia, si sint arida, promte in minimas comminuuntur partes: uti humida mox per se sparguntur, & alte corpus imbuunt. Crassa vero contra: quapropter illa minus diu, haec longiori tempore in eundem scopum terenda sunt. Species.
Terendorum non una est natura.
- B** roinde metallica & terrea cetera quod crassa sint, etiam post vitionem diu admodum, praecipue quae collyriis oculorum vel liquidis vel aridis permiscuntur, terenda sunt. Rara quoque mediocriter & friabilia non diu admodum terenda veniunt, ut *Rhabarbarum*, & *Scammonium*: accuratius vero, densa & mediocriter lenta, ut *est aloe*. Nec temere dictum est, rara mediocriter, quod ea, quae immodice sunt rara, ut *agaricus*, *colocynthis*, per se in puluerem tenuem redigi nequeunt: sed vel cum aliis sunt in puluerem redigenda, aut prius in pastillos digerenda siccandaque. Tunc enim nullo negotio tenuissime teruntur, quod maxime tentandum erit, ne scilicet in ventriculi & intestinorum tunicis mole sua haereant, humoreque redundanti imbuta ex oppressionem & pertinaci adhaesu magnam & diuinam molestiam afferant. Lenta quoque mediocriter diximus, quod quaedam ex iis ob ariditatem etiam iam mediocriter dura, nondum tamen per se in puluerem comminui possunt, sed sub pistillo lateſcunt. Quapropter aut vetustiora eligenda sunt, aut sole vel ligni siccanda, aut cum aliis siccioribus & friabilibus ac tenuioribus terenda, vel aliquo liquore idoneo sunt dissolueda. Sic *tragacantha*, *gummi arabicum*, *thus*, *myrrha*, *masliche*, *sarcocolla*, *styrax*, *bdellium*, *euphorbium*, *ladanum*, *succus glycyrrhizae*, & alia *gummi*, *resina*, *liquores*, *succi*, dum vetustate, aut aliter sunt siccata in puluerem terendo, aut pastillo diu multumque per mortarium ducendo comminui possunt, vel per se, vel cum siccioribus: quum vero sunt recentia, melius aliquo liquore dissoluentur. Eodem pertinent semina quaedam, ut *Cnici*, *lini*, *cannabis*, *cydoniorum*, *citrui*, *bombacis seu gossopii*, *melonum*, *cucumerum*, *cucurbita*, *citreoli*. Amygdalae praeterea utraque, & fructus quidam, ut *dactyli*, *bacca*, *halicacabi*, ob lentorem & pinguitudinem non teruntur, sed vel scalpro, vel cultelli acie itentidem verberata minutim inciduntur. Ligna priusquam in mortarium imponuntur, lima atteruntur, vel quod minus laboriosum est in tenuissimas assulas finduntur. In herbis & radicibus ac seminibus, quod lignosum, fibrosum, & neruosum est, abiicitur, nisi pretiosum sit; & reliquis viribus non multum inferius. Radices inciduntur in taleolos transversim, ita enim facilius in puluerem rediguntur, & pulvis ille filis seu fibris carebit. Tunduntur quandoque simplicia crassissime, ad decoctum nimirum: quandoque crasse, interdum in tenuissimum puluerem, ut in roborantibus compositis. Denique ut coctione longa non modo vires imbecillae resoluuntur, sed etiam *emaculata*, id est, *incensio*, siue *ignitio*, coctis rebus imprimitur: sic longo attritu corporum durorum pistilli, mortarii, & terendorum etiam cum humore calorem, in medicamentis praesertim diu terendis, vel gignit, vel auget, qui eorundem facultatem mutat, & si haec imbecilla fuerit, dissipat, adiutus diffilatione per agitationem illam exsiccata. Quam caloris ex attritu durorum generationem plane indicat farina, quae ex breuissimo contactu molarum, calida tamen in subiectam arcam decedit. Ob id *Thymus* & *Hyssopus* ut coctionem, sic etiam triturationem mediocrem, non diuturnam & vehementem sultinent. Quaedam denique frigido pistillo, & in frigido loco contundi postulant, ut *aloe*. Quaedam contra calidis gaudent, quaedam utrisque. Quaedam ligneo pistillo, quaedam lapideo teruntur. Quaedam in pila plumbea, alia aerea, alia, ut margaritae, in marmorea teruntur. Alter praeparationis modus est auctio, qua medicamentum, quum aliis miscetur, aliquid acquirit, id quod fit nutritione, conditura, & coloratione. Nutrimus autem, quando *rhabarbarum*, *agari-* Auctio.
cum, *sena*, *lithargyrum*, *molybdana*, & id genus alia, aliquam diu super calidos cineres, idoneo liquore temperamus. Turpetum vero, ut id obiter indicemus, lacte, myrobalani oleo, aqua & aliis ex praescripto filii Mesuae nutritur. Nutritio.

Conditura.

Conferua.

Coloratio

A

B

C

D

E

F

vel capræ nutrita, aliquam diu post siccata, idque aliquoties ad vsus reponitur. Fit autem hæc medicamentorum simplicium nutritio, & velut refectio atq; auctio interdum etiam citra ignem, nempe in aere calido. Cuminum insperso aceto nutritur, & iterum reficcatur. Nutritio vero ideo est excogitata, vt medicamenta e liquore, quem imbibunt, temperentur, ac mitiora fiant, suamque vehemenciam nonnihil remittant. Conditura fit saccharo, aut melle, aut vtroque, aut sale, aut muria, aut aceto, idq; vel vt gratiora palato fiant medicamenta, vel vt diutius conseruari citra putrefactionem possint. Condiuntur autem *herba, flores, fructus, cortices, & radices*, vel virides, vel arefactæ, vel crudæ, vel prius coctæ. Herba prius coctæ, magna ex parte, vt fit in Serapiorum compositionibus, hodie condiuntur. Olim muria etiam condiebantur. Sunt tamen qui nunc quoq; herbas virides minutissime, instar florum, concisas, saccharo condiunt. Florestamen non modo, *vt iam dictum est*, minutissime concisi, sed & tusi saccharo condiuntur. Vocantur autem eiusmodi conditurae hodie *conseruae*. In iis autem parandis plerunque triplum sacchari ad simplum herbarum aut florum concisorum vel tusorum sumitur. Qui quæstui student Pharmacopœi, vel gulæ gratificari student, plus sacchari accipiunt. Sic autem maxime parantur. *Herbis aut floribus exactissime concisis, aut tuis saccharum adiicitur, & simul in pilam probe purgatam coniciuntur, miscentur, & contunduntur, postea aliquot diebus soli exponuntur.* Cauendum tamen vnice erit, ne fermentando extra vasa effluant, quod fiet, si vasa ipsa non ad summum vsque impleantur. Quum conseruarum durationis tempus inæquale sit, quod aliæ satis diu durent, veluti *rosacea*, aliæ vero cito corrumpantur, accescant, vel arescant, danda opera erit, vt singulis annis nouæ conficiantur. Afferuantur commodissime in vasis vitriis, lapideis, fictilibus & densis. Fructus molles & aquosi priusquam ad perfectam maturitatem peruenerunt auulsi & decerpti saccharo, vel melle, ad iustam spissitudinem cocto atque clarificato condiuntur. Duri, non nisi maturi condiuntur. Aridi, vt *Myrobolani genera omnia*, prius macerantur & coquantur, dum mollescant, deinde vt alienam humiditatem deponant in cribro aut læuigato affere aeri exponuntur, vel in panno lineo resiccantur, donec in superficie contrahi incipiant, postea saccharum aut mel coctum affunditur. Pari modo a nonnullis *Iuglandes* nondum plene maturæ nouem diebus vel circiter in aqua pura quotidie mutata macerantur, deinde coctæ ferramento tenui transuersim secundum tres dimensiones perforantur, & dein leuiter resiccantur, foraminibusq; cinamomo, caryophyllis, & zingibere in festucas longas concisis, expletis affuso saccharo vel melle cocto condiuntur, & afferuantur. Ceterum cauendum ne saccharum aut mel, dum affunditur, nimis calidum sit, alioqui enim contrahentur & corii modo lenti & teneres fructus euadunt. Quod si vero aquosiora post aliquot dies euadant, & metus sit ne fructus corrumpantur, rursus effundantur, & ad iustam crassitudinem, coquantur, ac denuo affundantur. Sunt qui crudo melle, aut sacchari puluere fructus maxime molliores, vt sunt *cerasa, persicca, mora, zectos* condiunt. Quidam muria condiuntur, vt *limones & oliua*. Quidam sale, vt *cappares*. Radices recentes & virides, vt *helenii, Pimpinella, Paonia, eryngii*, primum coquantur dum mediocriter mollescant, coctæ leuiter resiccantur in aere a se inuicem seiunctæ, ac tandem saccharo aut melle cocto conduntur. Aridæ, vt *zingiber, & calami vstrati radix*, acerrimo lixiui probe macerantur, vt mollescant, quo facto perfunduntur aqua pura frigida subinde mutata, donec omnis acrimonia & lentor lixiui auferatur. Dein leuiter in aere siccantur, vt dictum est condiuntur. Colorationis vt in aliis multis rebus, ita quoque in medicamentis vsus est. Quædam autem citra alterius rei adiectionem colorantur, vt penidia diu tractando fiunt candidiora & elegantiora. Loch sanum & expertum diu multumq; agitando fit candidius. Quædam contra adiectione alterius, vt *theriaca chalcitide adiecta nigrescit: saccharũ santalo rubeo addito, vel alio colore tingitur, unguentũ potabile, anchusa radice*. Quanquam temere coloris conciliandi gratia medicamentis nihil adiici debet. Coloribus autem variis inficiuntur magis spectandi, quam necessitatis gratia. Ad flauum enim colorem conciliandum vtuntur *croci aut rhabarbari succo*. Ad rubrum, *santalo, prasilii ligno, lacha, grano tinctorio, floribus, Amarati purpurei*. Ad viridem, *Anethi, succo, solani, & ruta*. Ad cæruleum, *florib. Cyanei*. Ad indicum, *baccis sambuci*. Ad nigrum, *gallis, succo corticum viridium Iuglandis*. Hi succi aceto, aut vino sublimato diluuntur, & confectionibus vocatis iam absolutis, sensim in ahenis calentibus asperguntur. Quum autem confectionum

- A** num nobis iam facta sit mentio, forte ab instituto alienum non erit, si modum struendi confectio-
 num hic breuiter perstringamus. Confectiones autem Pharmacopœi, vt id obiter indicemus, vocant, quando simplicia medicamenta arido saccharo obducuntur
 siue incrustantur. Hoc autem modo conficiuntur semina, fructus, radices, & aroma-
 ta integra, vel in partes frustra que dissecta, vt gulæ gratiora sint, minoreque molestia as-
 sumi possint, quandoquidem alia eorum nimis amara, vel acria, vel alium medicamen-
 tosum parumque iucundum saporem habeant. Semina itaque priusquam conficiun-
 tur a sordibus, pulueribus, festucis, lapillis, & pediculis suis cribrando, ventilando, &
 seligendo purgantur. Fructus aquæ feruenti iniiciuntur, vt putaminibus suis exsuantur.
 Aromata in frustra longiuscula ac tenuia finduntur atque conciduntur. Saccharum ad
 conuenientem consistentiam coquitur. Medicamentum autem conficiendum in vas
 æneum duabus ansis pensile inditur, & super carbones hinc inde antrorsum retrorsum,
 dextrorsum sinistrorsum agitur, nunc in orbem voluitur, nunc instar auenæ in van-
 nis mouetur, donec calefiat, calefacto autem parum sacchari terreo cochleari infun-
 ditur, non procul ab extremitate vno foramine perforato, & continuo agitur, quo ad
 saccharum siccatur: deinde aliud affunditur, vt prius, idq; tantisper fit, dum iustam ac-
 quirat magnitudinem. Superficies autem in plerisque leuis est, nisi singulari artificio
 asperior, seu crispa, saccharo ex alto fundendo, fiat. Si vero materia conglobatur, vel
 saccharo confertim infuso, vel negligenter moto, manu affricta nodi dissoluuntur. In
 fine confectio-
 nis exacte siccantur, deinde in calidum & siccum locum cribro imposita
 reponuntur. Atque is optimus conficiendi modus existit. Tertius præparationis mo-
 dus est separatio, per quam a simplicibus medicamentis vel aliena, vt sordes, vel par-
 tes, vel contenta separantur. Hæc vero multis perficitur modis, nempe *pulsatione*, *fric-
 tione*, *maceratione*, *lotione*, *expressione*, *coctione*, *despumatione*, *colatura*, *clarificatione*, & *de-
 stillatione*. Pulsantur autem materiæ malleo, vel pistillo, vt partes a se mutuo auellan-
 tur, ita semina a stirpibus, cortices a nucleis, medullæ radicum a reliqua substantia pul-
 sando separantur. Fricantur materiæ vel crudæ manibus, vel coctæ, vt a se mutuo sepa-
 rentur. Porro quam nos macerationem dicimus, vulgus medicorum infusionem no-
 minat. Medicamenta vero quæ macerantur, parum trita in liquorem aliquem calen-
 tem a sole, vel igne interdum per semihoram, aut etiam plures, octo nimirum, noctem
 totam & diem, per triduum ite vel quatrimum pro medicamento natura, & vario Me-
 dici scopo, ac necessitate, coniicitur, vt interim vis eorum tota in liquorem illum traha-
 tur ac transeat. Hac quidem hodie Medici nō solū in decoctionib. & serapiis, verum et-
 iam in potionibus purgantibus, vt scilicet gratiores fiant, quam sit solidorum medica-
 mentorum substantia. Citius præterea distribuuntur aut subeunt liquida quam crassa,
 vt potu quam cibo, et facilius & iucundius est impleri. Nō solum autem medicamento-
 rum facultas in liquorem transit, sed eius etiam substantiæ portio tenuior: interdum
 quoque crassioris aliquid, præsertim quum id, quod maceratum est, valentius colando
 exprimitur, aut per colum rarius transmittitur. Nisi enim valide id, quod maceratum
 est, exprimatur, tenuior tantum eius substantiæ pars in liquorem transit, & crassior in
 medicamento remanet. Colandum igitur, & exprimendum magis aut minus erit, pro
 ægri & affectus, medicamentoque natura. Maceratio veteribus non ita frequens atque
 recentioribus fuit, maxime in purgantibus medicamentis. Noluerunt enim facultates,
 quas natura coniunxit, non sine maxima sua industria, & ægrorum utilitate, separare.
 Verbi gratia, in Rhebarbaro purgatoriam facultatem ab adstrictoria separare nolue-
 runt, vt scilicet sua adstrictoria facultate ventriculum roboraret. Ante ramen deco-
 ctionem sæpe, etsi non ad purgationem, medicamenta macerarunt, vt scilicet quod a
 maceratione remansit, percoctionem eliceretur. Galenus *lib. 4. de tuen. sanit.* Semen ab-
 ietis tritum, & flores populi nigræ tritos, oleo dulci & tenui macerat dies 40. Interdum
 menses duos, tres, quatuor, & plures in domo calida, & sub sole mouet meridiano, post-
 ea linteo colatum, vt expressum oleum reponit, reliqua abiicit. Nostri vice maceratio-
 nis nonnunquam in seculo aliquo medicamēta nodulo ligata incoquunt. Ceterum ma-
 cerantur liquore aliquo medicamenta quatuor de causis. Primo vt portionem substā-
 tiæ medicamentorum tenuiorem a crassiore ac terrea adstringente separetur, vt vel
 hac, vel illa seorsim vsurpet. Qua utiq; de causa Rhabarbarū Indicū, aliq; medicamēta
 dissimilariū partium macerantur. Quando enim Rhabarbarum iis, qui tantum purga-

Confectio-
 num stru-
 endarum
 modus.

3. Separa-
 tio.

Pulsatio.
 Fricatio.
 Macera-
 tio.

Cur medi-
 camenta
 maceren-
 tur.

tione & absterfione indigēt exhibere confilium est, diluto eius vtimur, vtpote cui tenuior duntaxat eius substantiæ pars inest. Non est igitur Rheibarbari dilutum dysentericis exhibendum, quod ii adstringente eius facultate magis egeant. Sic agaricum maceratur, ne intestina debilia sua substantia leui & rara illis facile adhærere, lædantur. Secundo, vt medicamenti facultas vehemens corrigatur, frangaturque. Sic Turpetum lacte caprino recens multo maceratum, & postea siccatum, mitius & clementius fit, nec ita ventrem perturbat. Pari modo Myrobalani, qui vel oleum, vel butyrum imbibuerunt adstrictionis noxam remittunt, minusque obstructionibus obsunt. Thymelæa quoque & Tithymali, quum in aceto macerantur, mitescunt, & acrimoniam effrenem deponunt. Nucum pinearum amarorem, & lupinorum aqua, in qua macerantur, mitigat. Palmulæ in aceto maceratæ dulcedinem nauseam proritantem deponunt. Coriandro in super vis illa caput tentans, si in acetum, in quo samfuchus maceratus est, coniiciatur. Nam is caput admodum confirmat, adeoque Coriandri noxam frangit. *Tertio*, vt facultas medicamenti validior fiat. Sic Turpetum in succo Cucumeris agrestis maceratum, materias noxias a remotis partibus maiori efficacia trahit, & expellit. Hermodactylus in Scyllæ aut Raphani succo, vel aceto scyllitico maceratus, potentius ab articulis euocat. Agaricus etiam in oxymelite maceratus, vehemētius purgat. *Quarto*, vt medicamentum fiat lubricum. Ob id medulla Colocynthidis, succo tragacanthæ macerata, promte per totum ventrem lubricat, vt neque ventriculo, neque intestinis, neque vesicæ adhæsu suo sit molesta. Scammonium quoque oleo violato vel simili maceratum promte subit deorsum, nulla aut minima partium, quas permeat, noxa. Quapropter liquor ipse medicamenti vires, aut in se trahit, aut mutat, ac frangit, vel auget, vt de auctione quoque dictum est, pro varia cuiusque liquoris natura. Danda igitur opera est, vt singulis affectibus conueniens liquor pro macerationis materia accommodetur. Ita profecto Sena adustorum humorum purgatrix in dulcium pomorum succo maceratur, cui flores quoque violæ, buglossi siue borraginis, cinamomum, sericum grano baphico tinctum adiunguntur. Rhabarbarum Cichorii, & Seridis stillatitiis liquoribus delectatur. Serum præterea multis purgantibus medicamentis macerandis accommodatum admodum est, quod scilicet non tantum abstergere, sed etiam purgare possit. *Idem* etiam efficit stillatitius lupi salictarii, fumaris, absinthiique liquor. *Quinto*, macerantur, vt mollescant, & concoctioni aptiora reddantur, veluti lignum Guaiacum. *Sexto*, vt dissoluatur, vt gummi, chrysocolle, & alia metallica. De maceratione hætenus. Porro lauantur medicamenta quatuor ob causas. *Primo*, vt partes eorum impuræ & alienæ ab ipsis remoueantur, & tollantur. Qua quidem ratione herbæ si impuræ sint, item radices, semina, & metallica, aqua pura & fontana lauantur, vt terrenæ partes, lapilli nimirum, arena, & lutum in fundo subsidentes: aut leues, veluti festucæ & ligna in superficie natantes auferantur. *Secundo*, vt facultas velut in profundomersa, parumque efficax fiat euidentior. Sic in Cadmia non vsta, & aliis quibusdam, tergendivi occultram lotio detegit. Ita quoque aloelota ventrem magis roborat. *Tertio*, vt virtus medicamenti malefica, vel nobis in affectum præsentem incommoda tollatur, & quæ expetitur maneat. Sic vsta omnia vbi lauantur, moderatiora fiunt, acrimoniamque vstione acquisitam deponunt, ac minus mordacia redduntur, sed ignea illa natura in aquam deposita ipsam efficiunt, tenuem & calefacientem: quod vero terreum remanet, morsus expers vlcerebus humidis fit epuloticum, illisque cicatricem inducit. Ob id æ vstum acre & subadstringēs lauari petit, vt cicatricem inducat in carne molli: in dura enim est epuloticum seu cicatricem inducens citra lotionem. Chalcantium vstum & lotum fit moderatius. Chalcitis præterea, lithargyros, ærugo, os Sepiæ, cera, resina, pix, oleum, & id genus alia sunt abluenda, præsertim quum vlceri, aut oculo, vel parti alii insigniter sentienti acrimonia mordax est noxia. Testa ostreorum, buccinorum, purpurarum, vsta & lota vlcera caua & fistulosa, & ob fluxionem diuturna carne implet. Cornu ceruinum vstum, lotumque dysentericis salubre. Lauantur eadem ratione plurima citra vstionem acria. Sic enim lauat Acaciam Galen. vt acrimonia per lotionem deposita, siccet sine morsu. Oleum quoque picem, resinam, ceram, & alia multa lauat, vt morsus & acrimonis expertia sint. Aloelota ventrem minus subducit, & vacuat, magis autem roborat. Lacha lota minus soluit, magis obstructiones leuat. Cyaneus & Armenius lapides lotionepurgandi

- A** gandi molestiam deponunt, ac mitiores redduntur. *Quarto* abluuntur medicamenta, vt eliquore facultatem aliquam nouam acquirant, veluti si Tithymali succo, aut decocto medicamentum aliquod lauetur, eius vires in se transfert. Si caloe lora decocto aromatum, stomachicorū ventrem potentius roborat. Turperum decocto Agarici lotum, aut in eo maceratum valentius est pituitæ purgatorum. Decoctum Scammonii Tithymalorū & aliorum id genus, in se lotis vim suam largitur. Aqua vero vel vino albissimo lauantur metallica ad emplastra alba, & ad collyria. Aqua lauantur, si affluens in vlcus humor est acris & mordax. Vino austero, si humor affluit largior: aceto vel aqua marina: si vlcera sunt tumida, & cū oris crassis ac callosis attenuationem multam requirentib. Aqua autem dulci præcipue lauamus, quando medicamento facultatem adimere studemus.
- B** *Qua* vtq; ratione omnia metallica lauantur, vbi illis mordicādi vel vrēdi vim adimere conātur. Interdum etiam, vt aliquam adiciamus, vt quum ceratum diutius aqua frigida lauamus, quo potentius subinde refrigeret. Vino lauamus, vt calor, vel odor, vel roborandi vis inde medicamēto contrahatur. Calor, vt si fructus æstiuos frigidos pepones, verbi gratia, vel melones, vino, quo minus vētriculo noceāt, lauamus. Odor, vt si ad cōciliandū odorē, & vt ad sumendū suauiora reddamus, medicamēta lauamus vino. Vis roborandi accersitur, e vino adstringēte. Aceto qñ vim medicamenti excitare, & eius substantiam attenuare, & vt efficacius penetret efficere volumus. Aqua marina, vel salsa, vt medicamēta exquisitissime purgentur, & candidiora reddantur: vel vi falso medicamento concilietur, vt si resinam laticeam aqua salsa lauamus, vt ad extergendā & exsiccadam scabiem efficacior fiat. Ita sane & in reliquis liquor pro affectus & partis natura mutādus est: verbi gratia, calido succo refrigerante, vt cucurbitæ, lora frigiditatē, deposita, aut saltē imminuta caliditate, induunt. Cōtra vero frigida, succo calefaciente lota. Lauandi autē modus, Galen. lib. 2. de simp. med. facul. c. 15. auctore is est, vt quæ calefacta liquantur, nec possunt aquæ misceri, qualia sunt *oleū, cera, pix, resina & alia quadam modice calefiant*; ac mox indant in vas magnū lati oris, semiplenū aqua purissima, omnis qualitatibus experte, quando scil. medicamēto nullā vim nouā addere volumus, sed id tm̄ purgare, aut facultatē eius merfam detegere aut noxiā tollere, sed quæ ex sole vel igne repeat. Tū id corpus lauandū in aqua ipsa terit, tūditur, frangitur, subigitur manib. vt vnaquæq; medicamenti abluendi portio aquam tãgere possit, & in ea suam acrimoniam exfluere.
- D** Denique aqua hac effusa, in synceram aliam vasi infusam recalefacta ipsa medicamenta immittantur: rursus ad modum diu contunduntur, mox idem tertio, quarto, ac sæpe deinceps faciendum, donec omnē suam qualitatem in aquam deponat medicamentum, seu aqua nullam ex loto medicamento qualitatem amplius recipiat: quam quidem rem gustu colore, & odore cognosces. Oleum autem ablutione non modo mordacitatem & fæluginem exuit, sed etiam fit candidius, aquea ac rufa eius substantia separata & deterfa. Ipsum tamen lauando minus verberabis, quam ceram, picem, resinam, ne adeo aquæ misceatur, vt ægre postea separari possit. Id vero quod falsum non est, & omphacinum lotionem non admodum indiget. Quæ vero lapidosa & dura sunt, vt Cadmia, æris squama, æs vltum, ea tenuissime trita ex aqua fontana & purissima multum diuque teruntur, ea aqua subinde effusa, & pura in eius locum affusa, quoad nihil sordium medicamenti aquæ innatet, maneatque aqua medicamenti qualitatibus omnino expers. Quamdiu enim aliquid eius aquæ ipsi innatabit, aut qualitatibus eius quippiam sensui apparebit, tamdiu terendum & effundendum. Sic *lithargyrum, diphryges, cerussa, misy, sory, stimmi, omnes lapides, prater ea calx ipsa* lauanda erunt, non tamen semper aqua, sed etiam vino, vel aceto, vel aqua marina, vel alio liquore, cui metallica & terrea obinnotam grauitatem facile subident. Sunt autem hæc toto die cum liquore illo medicamento contrita, per noctem in eo relinquenda, postero die mane ille abiiciendus, & alius mox superfundendus: postea rursus similiter terenda, & sequenti aurora liquor iterum effundendus, idque fiendum, donec morsus sint expertia hæc metallica,
- F** vt sordes nullas in aqua relinquant, sintque pura & perspicua. Quod si hæc æstate sub sole feruente laueris, medicamentum potentius siccabit, tenuius erit, & candidius. Aliqui numerum lauandi definiunt, sed temere, quum pluribus aut paucioribus vicibus, seu diutius aut parcius pro ipsorum facultate medicamentorum, aut partium, quibus applicantur, natura, medici indicationibus, lauandi fiat. Porro, vt id etiam adicia-

mus, hodie pleriq; metallica, lapides, terre species hoc modo lauant. Medicamentum
 tusum, in aquam immittūt, illudq; rudicula hinc inde agitant, dein stare permittunt, ita
 enim quicquid leue est, aquæ innatat, quod postea cochleari multis foraminib. pertuso
 aufertur. Dein rursus aquam agitando turbāt, quamq; turbidam in aliud vas effundunt,
 vt quæ grauia sunt subsideant, quod tantisper faciunt, donec quicquid alienum & graue
 est, in vase priore linquatur. Reliquum autem stare permittunt, quoad pura & clara fiat
 aqua, quam postea leuiter inclinato vase effundunt, ne quid vtilis materiæ simul effluat,
 quod remanet siccant, & in pastillos digerunt. Oleum lauant, affusa aqua, in vase vitreo
 amplo ventre, vtrinq; mediocriter oblōgo, in fine angusto, atqui aperto, vt obstrui pos-
 sit. Quo facto hinc inde agitat, & deinde liquorib. quiescentibus; ex altera parte aquam
 emittunt, postea iterum atq; iterum lauant, quoad aqua insipida reddatur. Quod si o-
 leum ita faciendo aquæ permiscetur, vt separari ab eo statim nequeat, expectant do-
 nec quiescendo vtrunq; in suum redeant locū: aut calefaciunt vitrum super vapore cali-
 do, & hac ratione separant. Terebinthinam in vase aliquo aperto aqua lauāt pistillo vel
 rudicula agitata. Sed de lotionē satis. Expressione separātur partes, quādo liquor aliquis
 e medicamentis cōtusis exprimitur. Exprimūtur et macerata & decocta, vt efficaciora
 euadant, idq; manu, torculari, vel alio instrumento. Quæ manu exprimūtur, tenuiora &
 elegantiora fiunt. Quæ torculari, crassiora atq; validiora. Leuiter igitur aut violēter ex-
 primuntur medicamēta, prout tenues, vel crassas medicamentorū partes desideramus.
 Atq; hinc est, quod huic rei varia destinata sint instrumenta. Stirpes virides nō nisi pro-
 be contusæ prælo subiiciuntur, vel manib. premūtur. Quarum vero succus valde tenuis
 est & aquosus, non mox vt decerpuntur etiam exprimūtur, sed aliquamdiu expectatur,
 donec incipiant flaccescere, ita enim efficacior succus erit, & facilius inspissari potest.
 Quarūdam stirpium succus crassior & viscidior est, quā vt per se exprimi possit: quapro-
 pter herbæ rursus aliquamdiu stare permittūtur, donec, quod aquosius est, a reliquis sepa-
 retur: vel affuso alio humore virib. cognato, simul ambo exprimuntur. Quædam n. nisi
 prius humectentur, succum nullum, vel difficile saltē reddent. Si vero succus tantū mu-
 cilago est, vt seminis psyllii, lini, fœnugræci, cydoniorū, maceratur semen affuso aliquo
 liquore diebus aliquot, deinde in sacculo inclusum suspenditur, postea ligneo cultello,
 vel cochleari a sacculi superficie abraditur, vel manib. deorsum premēdo, & veluti mul-
 gendo, vel duob. baculis comprimitur, cæditur, & elicitur. Quum deniq; calida facilius
 fluant, ideo nonnunquam pinguib. aqua feruens affunditur. Coctio, quæ non est nisi e-
 lixatio, medicamenti excrementosum humorem coquit, resoluit, flatus in eodem cras-
 sos, mordaces, ad nauseam ventriculum euertentes dissipat, deniq; eius acrimoniam,
 vim valide lacerantem, excoriantem frangit. Hincq; adeo est, quod radix Ari, dracon-
 tii, cepæ, allii, porri, aliaq; medicamēta acria, elixando euadant mitiora, ac gratiora. At-
 tractio quoq; medicamenti vehementior & malignior coctione obtunditur, vt quum
 medicamentum maleficum intra alterius benigni cavitatem coquitur, quo illius facul-
 tas in hoc fracta maneat. Verbi gratia, si radicem Raphani radicib. Ellebori transfixam
 sub cinerib. coquimus, eamq; edendā damus. Habet n. virtutem Ellebori purgatricem,
 sed multum repressam. Ita Scammonium malo cydonio circūdatur, in eoq; coquitur,
 vt ipsum malum clementius purget, quam per se Scammonium. Præterea medicamen-
 ta in liquorem, cui illa incoquantur, vim suam transmittunt, & liquoris illius virium ali-
 quid adipiscuntur. Danda igitur opera est, vt vas, in quo coquantur sit, arētissime clau-
 sum, præsertim quum tenues medicamentorum partes conseruari cupimus, quæ alio-
 qui statim dissipabuntur. Coquantur igitur medicamenta permulta, vt eorum vires
 imbecillæ augeantur, aliorum validæ nimis minuantur, aut alienæ in totum abigantur,
 & vt ex omnib. etiam facultate diuersis & sæpe contrariis, facultas vna concreascit coa-
 lescatque. Quædam quoque coquantur, vt mollescant, atq; ad aliorum medicamentorū
 vsum aptiora fiant, vt gummi galbanum, & hammoniacum, vel vt condiantur, vt
 radices gladiolæ lutei palustris, & Pimpinellæ. Quædā vt vna facultate amissa, alteram
 tantum retineant, vt lentes. Quædam in duplici vase coquantur, maxime olea pretiosa,
 & alia quædam ne vstionem aliquam sentiant. Vas autem duplex est, quando vas in
 quo medicamentum coquēdum continetur, in aliud vas, aqua plenū, cui ignis subiectus
 est, imponitur. Vasa autē in quibus coquūtur medicamenta figulina & vitrata, & plum-
 bo al-

Expressio.

Coctio-
vis.Vas du-
plex.

- A** bo albo incrustata, potius quam ænea & cupria. Vitrea vero præstantissima sunt. Ceterum non sunt omnia æqualiter coquenda. Nam quæ ad custodiæ diuturnitatem parantur, coctionem longam requirunt, ut omne aqueum & corruptioni aptum, longa coctione absumatur. Quædam etiam diu coquuntur, ob destinatam medicamenti formam, ita sane Serapium diutius coquimus, quam decoctum, aut Iulebum, emplastrum item diutius, quam ceratum, aut cataplasma. Quæ item medicamenta mel liberalius accipiunt, coqui largius postulant. Ea quoque quæ paucum mel accipiunt, si iis parantur, qui mel & dulcia cetera auersantur. Nam hoc pacto mel, si diutius coquatur, minus dulce erit, minusque stomachum eorum, qui a melle abhorrent, subuertet. Longo tempore etiam coquuntur aristolochia, polypodium, hermodactylus, & reliquæ radices.
- B** Duræ enim firmæ, crassæ, & densæ sunt, ideoque non solum diutius, sed & diuissæ, & concissæ coquuntur. Semina etiam prope omnia, quod pleraque eorum densa sunt: ligna item, nisi aromata fuerint, aut facultate imbecilla & superficialia diutius coquuntur. Quo enim quid facilius aut difficilius resoluitur, eo breuius aut longius coquitur. Primo igitur radices, dein ligna, cortices, semina: postea herbæ, præsertim aridæ, tandem fructus, & flores inter coquendum adiciuntur, exceptis tamen violis, quæ diu coquuntur, ubi virtus earundem purgatrix in centro earum posita quaeritur: item rhabarbaricum, myrobalani omnes, quando adstringendum, acerbæ quoque & austera, omniaque metallica. Quemadmodum enim violarum vis purgatrix in profundo hæret, ita Rhabarbarici quoque, myrobalanorum, & similium vis adstringens. Parcius vero coquuntur, quorum virtus imbecilla, aut superficialis est, aut facile ob tenuitatem resoluitur, aut substantia est parum firmiter contexta, hoc est, rara, ut flos violæ nigræ, si vis leniens emolliensue quaeritur: rosæ & ceteri fere flores, excepto chamæmelo, epithymum, adiantum album, agaricus, semen cucumeris, cucurbitæ, melonis, citruli, rhabarbarum, myrobalani omnes, quando per hæc duo, ut rosas recentes purgandum, aperiendum, tergendum. Habent enim hæc omnia facultatem abstergentem & purgantem in superficie positam. Manna quoque, & Casia, & Tamar Intus, ceteraque dulcedine, vel aciditate lubrica, & humiditate multa purgantia. Nam vim lubricandi in iis imbecillam coctio multa perdit. In summa coquuntur omnis generis simplicia, exceptis metallis & lapidibus. Perdit Aromata etiam, ut nardus, casia, cinamomum iuncus odoratus, calamus aromaticus, iris, ladanum, styrax, bdellium, & id genus alia non coquuntur, sed ad finem coctionis, quum vas ab igne deponendum est, aut mox, postquam depositum est, iniiciuntur. Pari modo Ambarum, moschus gemmæ, ubi medicamentum iam perfecte coctum est, iniiciuntur. Quid multa? quando diuersa vna coquenda sunt, diligenter obseruandum, ut quod facilius resoluitur, reliquis serius ac tardius adiciatur. Quum vero hic de concoctione agatur, forte non ab re erit, si rationem coquendi saccharum breuiter exponamus. Saccharum primum in partes secatur, & affusa aqua aliquam diu feruefit, dein per laneum pannum colatur, postea ad perfectionem coquitur. Si clarius & purius esse debet, albumine oui vno & altero pro sacchari portione sumto, paucaque affusa aqua virgulis in modum scoparum colligatis, agitur, donec in spumam abeat, quæ cum feruenti aqua saccharo iniicitur, & ubi aliquam diu cocta fuerint, colantur, colataque denuo coquuntur, donec gutta in marmor aut stanneum orbem, aut laminam ferri leuem fusa consistat, nec mota diffuat, aut donec omnis fere humiditas absumatur. Cuius rei signum est, quod paululum spathulæ adhærens violenter in aerem proiectum in floccos abeat, & quo flocci maiores ac latiores, eo saccharum exactius coctum, & minus humiditatis reliquum est. Absoluta iam coctione de despumatione nobis dicendum erit. Est autem despumatio non nisi spumæ cochleari ferreo pettuso, necum spumâ etiam humor, in quo coctio fit, abiciatur, detractio & remotio. Quum enim hæc superiorem locum petat, sine negotio cochleari foraminibus pettuso tolli potest. In coquendis autem medicamentis Pharmacopœus non, ut coquus, omnem spumam detractam abiciere, sed inutilem solum, vtilem autem, qualis est sacchari & mellis, in vas quoddam colligere, & dein ad Serapii consistentiam ac spissitudinem iterum coquere, & in suos usus seruare debet. E sacchari spuma Theriaca pro iumentis, e mellis autem spuma recocta nonnulli glandes parant. Colatura liquoris dissimilares partes, perinde atque de spumatione, secernuntur. Ut enim despumatione tenues aëres & pingues partes, ita

Non omnia æqualiter coquenda.

Ratio coquendi sacchari.

Despumatio.

Colatura

Clarifica-
tio.Destilla-
tio.In duplici
vase.Balneum
Mariæ.4. Calfa-
ctio.

colatura craſſa, terrenæ ac fœculentæ partes ſeparantur. Craſſa autem & terrenæ par-
tes primo per pannum rarioris, dein denſioris texturæ, liquore tranſmiſſo colliguntur.
Semper autem calida, frigidis melius colantur. Interdum ſua ſponte ad fundum vaſis,
aut coli ſcendant. Quod ſi per colum libere nō tranſmittitur liquor, terrenis & craſ-
ſis partibus obſtructum ipſum mutamus, vel abluimus, & a ſordibus purgamus. Si te-
naciſ liquidas ſucci partibus adhæreant terrenæ, acetum, citriorum ſuccum modi-
cum addimus, aut aliud quippiam, quod habeat diuidendi ſeparandiq; facultatem. Si-
militer albumen oui batuatum, ſive bacillo quaſſatum, vt magis per totum corpus di-
ſtribuatur, ducimus per liquorem, quo dum concreſcit, incluſam, vel adhæreſcentem
ſibi ſimilem materiam educat, quæ ſic facile poſſit auferri. Porro quum turbida ventri-
culo ſint ingrata, & aſpectu etiam parum iucunda, clarificatione etiam interdum opus
erit. Clarificantur autem, hoc eſt, purificantur, ſucci quidam per ſe. Reſidendo enim
quod in iis eſt terreum ac fœculentum ſubſidet, adeoque limpidioreſ ſunt. Quidam
coctione & colatura, vt dictum eſt. Quidam vt alia decocta, quæ vix ſine albuminibus
ouorum in ſpumam agitatiſ, purgantur. Hac enim ratione quicquid craſſum & fœcu-
lentum eſt, vna cum ſpuma albuminum in ſuperficiem fertur, quod deinde cochleari
foraminibus pertuſo affertur, & id quod reliquum eſt, ob ſordes grauioreſ fundum pe-
tentem, per pannum colatur. Singulis autem decoctiſ libris, ſingula albumina adhiben-
tur, quamuis tria etiam ſex libris & pluribus ſufficere poſſunt. Adhibentur vero immiſ-
ſo vel paulo ante, vel modico poſt ſaccharo aut melle, alioqui & albumina vrunt, & pur-
gatio parum melle procedit. Serapia aut decocta, quæ magiſtralia nominant, agaricum
in ſine ponendum accipientia, albuminibus non egent. Albuminum autem loco, ace-
tum, ſuccus limonum & arantiorum adhibetur. In quibus enim eſt acetum, deſpuman-
tur coquendo, & coquuntur deſpumando, donec ſpumare deſinant: tunc enim clara
ſunt, quatenus eis conſeſſum eſt. Albumina ouorum vel in aquam frigidam iniecta ſco-
pulis agitantur & concutiuntur, donec in ſpumam abeant, quæ particularim ſaccharo
cum aqua feruefacto, vel decocto alicui iniicitur, quum ſcilicet prior nigreſcit aliam ſub-
ſtituendo, donec clareſcat, vel eadem iniecta primum ſaccharo cum aqua coquendo,
vel decocto alicui, vel ſimul miſtis ambobus, quod frequentius fit, ſcopulis ſimiliter fre-
quenti agitati in ſpumam abeunt, ſimulque coquuntur, donec ſpuma ſubſidat. Quod ſi
decoctum futurum eſt liquidiffimum, per pannum album laneum ſemel, & ſi non ſatis
clarum, bis & ter colatur. Itidem decocta mucilagineſ recipientia, ſerapia, & ſaccha-
rum cum aqua coctum incruſtandis ſeminibus, vel aliis bellariis aptum, calida omnino
per pannum colanda ſunt, quod calida ſemper frigidis melius per colum traiciantur.
Reſtat, vt de deſtillatione, per quā tenue a craſſo per ſe ſine adminiculo alterius liquo-
ris, vel adiecto aliquo liquore vi caloris elicitur ac ſeparatur. Inuētum eſt nouum Chy-
miſtarum, veteribuſque incognitum. Quum vero de ea non nihil ca. 9. huius libri dixe-
rimus, hic breuioreſ erimus, præſertim quum ſint hodie quam plurimi, qui integros de
deſtillatione libros ediderint. Deſtillandi modi varii quidem ſunt, duobus tamen ſum-
matim generibuſ complexi. Vnus enim per deſcenſum, alter vero per aſcenſum fit.
Nos hic tantum vnuiſ modi qui aſcendendo fit, cuius nimirum, qui optimuſ eſt, & in vaſe
duplici fit, hunc quidem in modum. Vaſ vitreum, vel ex plumbo albo factum medica-
mentum continenſ in alterum vaſ ſigulinum cacabumue aqua feruente plenum impo-
nitur, adeoque calentis aquæ balneo liquor elicitur. Vaſculi autem in quo ſtirpeſ con-
tinentur fundum, aquam feruentem alterius vaſculi non attingat, ſed ſolo ab eo eleua-
to vapore incaleſcat. Primum vaſ operculo roſtrato exquiſite tegitur, vt e medicamen-
ti ſubſtantia exhalati vaporeſ in operculum illud impingenteſ in liquorem verſi, per
roſtratum canalem deſtillet. Hæc deſtillandi ratio optima exiſtit, & Balneum Mariæ
nominatur. Ceterum in omnibuſ deſtillationum modis ignem moderari oportet, vt
materia nec aduratur, nec nimium ferueat. Præſtat igitur ex prunis, quam ligniſ parari
ignem, ille enim æqualior quam hic eſt. Similiter ſicca ligna humidis præferuntur. Li-
quoreſ ſtillatitii per aliquot dieſ Soli exponi debent in vaſiſ linteo aut membrana per-
forata obturatiſ, vt quicquid excrementoſum eſt reſoluatur, ſimulque empyreuma ex-
halet. Quartuſ præparationiſ moduſ eſt calefactio, quæ fit vel igne, vel ſole, vel in ſimo,
vel putrentib. corticibuſ, areniſ, cineribuſ, ſcobibuſ renuib. calore animalis, lapide aut
ferro candente, vel calce aqua coſperſiſ. Plurima vero ſolum caleſcunt, vt dum calefacto
piſtillo

- A** pistillo mastiche siccae alutæ intenditur, dumque calefacto mortario & pistillo gummi Arabicum vocatum, & tragacantha siccata promptius in puluerem tenuissimum ducendo læuigantur, præsertim aere humido. Nam sicco existente, qualis æstare & hyeme, frigida est, præsidium illud non requirunt, nisi sint admodum recentia. Oleum præterea, cera, pix, resina, & similia, prius calefacta abluuntur. Calefacta promptius & perfectius miscentur. Atqui in calefaciendo sunt certi fines, quos ultra citraque medicamentorum vis non consistit. Ob id aromata miscemus aliis ab igne remotis, ne ab ignis calore vis eorum dissoluatur. Semina saccharo incrustanda antea calefaciendo modice siccamus, ut promptius in iis saccharum siccitate concreascit, & albescat. *Refrigeratio* quintus ^{Refrigeratio} præparationis modus, fit aere frigido, aqua frigida, niue circumposita, colloca-
B tionem in cellam vinariam, aut alium subterraneum locum. Hos autem refrigerandi modos fere omnes Galenus *lib. 2. de simp. med. facul. cap. 7. & lib. 8. ihera. metho. cap.* docet. Humectatio sextus præparandi modus fit immersione, aut insersione liquoris alicuius, item maceratione, de qua dictum est, liquatione, & dissolutione. Merguntur in liquore vel eo asperguntur, quæ sicca admodum sunt. Liqueantur autem, & humida redduntur calore ignis, quæ frigido concreuerunt, ut *butyrum, oleum hybernium, adipes, medulla, cera, resina*. Siquidem cuncta hæc dum calefunt, magis liquida, fluxibiliaque fiunt. Liquida vero facta, melius cum aliis miscentur. Resinæ quidem oleo liquatæ eidem probe miscetur, non aquæ. Chalcitis inter metallica celerime liquatur, & alumen omne, sed scissile mollescit tantum. Liquatur & sandaracha, & auripigmentum. Lythargyrus per se tardissime liquatur, cum æruginæ, vel duplo oxelæi cocta citius liquescit, quam cum hydrelæo duplo, vel paulo plus duplo. In medio horum sunt ærugo, & misy. Sori autem, quia terreum magis est ac saxum, quæ chalcitis & misy, etiam tardius liquatur. Dissolui aliquo liquore solent multa medicamenta, quæ teri nequeunt. Differt liquatio a dissolutione, quod hæc etiam sine calore per se, vel addito aliquo liquore: hæc vero tantum calore fiat. Sic gummi aqua aut vino, vel aceto dissoluitur. Crocū, thus, myrrham læuigata vino dissolui oportet, & medicamento propemodum cocto misceri: Hæc etiam ubi modice dissoluta erūt, ab igne remouenda ac deponenda. Galbanum, opopanax, sagapenum, hammoniacum ex vino vel aceto, vel alio liquore cocta dissoluantur. Cum siccis vero trita abeunt in puluerem. Gummi vero dissoluantur liquore aliquo, aut pistillo calido, item & pingues succi, nisi ob siccitatem teri possint, ut frequenter gummi arabicum, tragacantha, iuniperi grana, thus masculum, mastiche, & fere reliqua vetustate, vel igne siccata. Recentia vero & adhuc viridia, etiam calentibus digitis liquefunt aut saltem mollescunt. Eadem tundendo latefunt, multo magis si pistillo calido in mortario calido tunduntur. Gummi quia aquea est natura, promptius cum aqueis miscetur, quam cum oleaginis. Resina contra, quia est oleagina. Multa idem composita, ut conferuæ vocatæ, pastilli, antidoti, aliis miscenda, antea liquore aliquo dissoluantur. Septimus præparationis modus est exsiccatio, quæ simplex quidem fit vel ab aere sicco, ut omnibus constat, vel a fritione, vel tostione, vel assatione, vel vstione. Frictio proprie est, ubi aliquid in sartagine aut testea coquitur, ut excrementitiæ eius partes exsiccantur, & subinde rudicula ferrea, aut lignea, aut manibus vertitur, circumagitur, & voluitur. Tostio fit proprie, quando aliquid craticulæ impositum, exsiccatur. Torrentur vero, ut diutius in usum medicum conseruari possint. Sic profecto animalia quædam torrentur potius, quam sale macerantur, ut ranæ, & cicadæ, quod iis ad eliciendam yrinam: illis vero ad sanguinis fluxum comprimendum utamur. Saliri enim ad hos usus non debent, quod manifestum est omnibus. Vtrique autem sub assatione comprehendi potest, qua utique utendum erit, ubi excrementitiæ medicamentorum partes exsiccandæ veniunt. Assatio autem fit vel in sartagine, vel craticula, vel clybano, vel vitro, aut alio vase fictili, aut patella, vel in veru prunis subiectis, vel cineribus calidis. Ceterum assantur quædam, ut excrementitia humiditate absumpta diutius durare queant. Quædam, ut sicciora facilius ad læuorem terantur, ut *gummi, tragacantha, amygdala, auellana, herba, radices, flores, crocus in antidoto ex ovo*, ubi celer usus pulueris requiritur. Crocus etiam papyro impositus igni, vel sole siccatur. Sericum etiam ex præscripto Arabum torretur, ut puluis fiat. Quædam vero assantur, ut vis eorundem per ignem augeatur, ut scilla tosta, & in sartagine frixa maiorem acrimoniam assumit, humiditate largius absumpta, & ob id purgantior euadit.

Quædam, ut viscerum minuat, & inutilis ac excrementitia, ut flatulenta humiditas absumatur. Sic cepa, allium, ari & draconitii radices sub cineribus assa, minus acria, & mitiora redduntur: sic etiam assi fructus, ut poma, castaneæ, & semina nonnulla assa, ut Lini & Irionis flatus deponunt. Eadem ratione opium & meconium ob eius stupefaciendi malignitatem veteres aliquot torruerunt. Sed quia torrendo omnis eius in stupefaciendi sensum efficacia aboletur, non tostum Galenus mauult Castorii calore obtundi. Sic Psyllium assando siccatur minus aluum subducere somniant, quum nullam prorsus subducendi aluum facultatem habeat, *ut alibi copiosius diximus*. Nonnulla facultate gemina, & interdum contraria prædita, assando facultatem vnâ vel perdunt vel minuunt, alteram intendunt, ut myrobalani, & rhabarbarum assando purgatricem facultatem amittunt, adstrictoriam augent. Et balanos myrepisica assando vomitoriam facultatem in humiditate nitrosa largiore positam deponit, deiectionaria remanet. Ceterum ut rara aut imbecillam facultatem vel superficiali sortita, decoctionem longam non sustinent: sic quoque neque longam assationem ferre possunt. Vstio itidē a calore sicco fit, maioris tantū ratione ab assatione differens. Chymici calcinationem vocant. Vrendorum autem medicamentorum causæ sunt variz. Quædam enim vruntur quo sicciora reddita & solutiora leuigari & tenuissime comminui possint, ut pili lana succida, testa ostreorum, buccinorum, purpurarū, vngues, & cornua multorum animalium, & ossa, coria, & alia, quæ vel ob terream duramque corporis consistentiam ac concretionem condensatam sunt sortita, & partes impendio crassas, quia ab eo vim quandam cogendi, vel ob lentorem immodicum, aut humiditatem aliquam vsui esse non possunt. Sic enim recte vngues caprarū vsti ex aceto alopecis illinuntur, & vngues asini, & cranium hominis vstum ad epilepsiam bibuntur. Et ossium aliorum cinis ad arthritidem, & cornua cerui, atq; capri vsta veniunt in dentefricia, & teste ostreorum in emplastra, Pompholyx & hæmatitis in collyria. Nitrū quoq; si lapidosum est vritur. Alia vruntur ut essentiz crassitiem deponant, & tenuitatem, aliasq; facultates igneū calorem sequentes, ut sunt absterfio & erosio, induant. Metalliea vrendo tenuiora quidē euadūt, sed etiam ignis commercio mordacia & rodētia. Elota vero, ut supra diximus, latius ro- sionem omnem deponunt, & lenia prorsus redduntur. Arsenicum vstum, & non vstum est causticum & adurēs, sed vstum tenuioris est substantiz. Gypsum vstum tenuioris essentiz fit & siccantius, quā non vstum, & minus emplasticum atque obturans. Pumex vstione tenuitatem, & aliquid acrimoniæ acquirit, quam lotionem deponit. Cornu cerui & capræ vstum tergere potest. Cinis corii veterum calciamētorum siccatur vlcerum. Pili & lana succida vrūtur, ut acria, calida, sicca, & tenuium partium fiant. Testa ostrearum, & cetera terrea vrūtur, non modo ut in puluerem redigi possint, sed etiam ut tenuioris sint essentiz, & cogendi quandam facultatem deponant, & contrariam discutientem accipiant. Cinis radicis Aspodeli magis calefacit, siccatur, tenuatur, discutit. Abrotonum vstū, anethi radix, & ipsum anethū, colocyntha vsta siccandi vim magnam acquirunt, abrotonum etiam mordendi. Hinc non temere Galenus *lib. 9. de simpl. medica facul.* scripsit, quædam vstione calidiora reddi, & magis acria. Cōtra quædam vstione minus euadunt calida. Quæ enim acria sunt, ea vsta multum caloris amittunt, & mitescunt, quod scilicet partes igneæ non sint admodum reliquis admistæ. At quæ acria non sunt, calorem assumunt. Alia vrūtur, ut vis quædam nostro scopo aliena in superficiem trahatur, postea lotionem separetur, quo sine hæmatitem & Pompholygem sæpe vrunt & lauant ocularii Medici. Alia vruntur, ut colorem nouum induant ægro gratiorem. Sic ærugine vsta, Galenus emplastra faciebat lutea, quod viridis color multos terreret. Sic cerussa trita vsta, rudicula ferrea mora transit in Sandycæ, & fit rubra. Et ossa multum vsta, albissima fiunt. Et cornua cerui potius, quam capræ vsta dentes dealbant sua substantia, non sola vi deterforia sine morfu, quam vtrunque vstum obtinet. Alia vruntur, ut in aliam transcant speciem. Sic ex viperis vstis sal fit theriacus. Ex cinere Brassicæ, aut Berzæ, & aliorum sapore nitroso præditorum, fit a quibusdam nitrū artificiale. Ex calce vsta, & fæce vini vsta cauterium. Ex Stibio vsto, sulphure vsto, cerussa vsta, chalciti vsta, oleum. Porro vrendi modus non est omnibus vnus. Quædam enim humore pingui prædita per se vruntur, ut lana, cornua, vngues, ossa, coria, hirundines, & aues quædam alia, viperæ item aliaq; pedestria. Atq; hæc in olla noua operculo foraminulēto testæ sūt vrēda, præsertim

- A** ubi in cinerem redacta dispergi possunt. Quæ vero etiam vsta manent integra, vt vngues, ossa, cornua, hæc etiam viuis carbonibus tradi possunt, nisi quædam sint addenda, quæ vim eorum mutant. Tunc enim etiam in olla noua vruntur. Sic viperam cum subitratis quibusdam medicamentis, Galenus ad salem theriacum vrendam esse tradit. Alia materiam aliquam inflammabilem requirunt substerni, vel aliter misceri adipes, resinas, olea, ceras, mel, sulphur, & id genus alia. Stibiū pinfita farina circumlitū, carbonibusq; obrutum torretur, donec ipsa crusta adusta sit: Si paulo magis teratur, fit plumbum. Ceterum qualis debeat esse vrendi modus ac ratio, exemplo Phrygii lapidis *lib. 4. de compo. medic. localium*, Galenus docet: qui quum sit paulo prolixior, præstat hunc apud Galenum legere. In hoc tamen exemplo id obseruandum erit, quod operculum, quod
- B** ollæ imponitur sit foraminulentum, & in vertice, vel etiam aliis partibus pluribus perforatum, vt fumosi & fuliginosi effluxus eorum, quæ vruntur, per ea foramina efferantur. Dein vt operculum cum vase extrinsecus lutetur, seu cum luto circumlinatur. Tertio, vt carbonies sint perusti, vt scilicet nihil fumidum habeant. Octauus præparationis modus est extinctio. Hæc autem fit, quædo aliquam materiam igne candentē, in quopiam liquore sæpius mergimus. Id vero tribus de causis fit. Primo, vt vapor duntaxat ab eo, quod exstinguitur, recipiat, vt si Pyritem lapidem candentē in aceto mergimus, vt vapor hinc exhalans duritiem alicuius partis emolliat, & discutiat. *Secundo*, vt liquor vim externam acquirat, adeoq; ipsum ad certum vsum conseruemus. Sic candens ferrum in aqua sæpius restingimus, vt subinde eam potandam præbeamus iis, qui ventriculi, vel
- C** lienis, vel intestinorum corroboracione indigent. Tertio, vt euaporatis & exhalatis tenuioribus partibus, crassiores remaneant. Sic lapillos ignitos in lacte tantisper exstinguimus, donec pars tota serosa exhalarit, & dissipata fuerit. Tum enim optimum ad dysenteriam remedium erit. Sic chalybem candentem, & aurum ignitum in liquore exstinguimus, vt is minus humidus, & magis adstringēs reddatur. Ceterum medicamentis extinctis, liquore prorsus abiecto, vrimur, vbi exsiccantia citra morsum requirimus. Stibium in lacte muliebri extinctum, mitius exsiccat. Nonus præparationis modus est purgatio. Neque enim purgatio aliud est, quam quicquid medicamenti inest abicere. Purgantur autem seu, vt vulgo loquuntur, mundantur medicamenta quædam intus, quædam foris, quædam intus & foris, quædam nusquam. Intus purgantur a seminibus
- D** seu granulis nucleisue vuc passæ, si Medico ita videat: myrobalani omnes, exceptis Indis enucleatis, & magna ex parte empeleticis: vua rhois, nisi in decoctum veniat: quando nec pruna passa, nec myxa, nec zizipha a nucleis purgētur, nisi quod expressa pruna, nucleos in colo relinquunt: myxa, zizipha non exprimuntur. Foris quæ excorticantur, vt semen cucurbitæ, cucumeris, citruli, melonum, cnici, ricini dente, vngue, cultello, forfice purgantur. Semen quoque *citri, limonum, arantiorum, paoniae utriusque, staphydis agria, pinea, pistaciorum, gossipii, cerasi, persici, anacardorum, nucis Indicae cultello, vnguibus malleo, Bacca lauri, amygdala utraq; aqua calida macerata facile digitis purgantur*. Si vero in oleo exprimuntur: integra prius tunduntur: si indeocta veniunt, integra iniiciuntur, si vero foris admouenda sunt, cū cute terūtur. Omnia prædicta foris nō purgantur. Hordeum, *Foris*
- E** triticum aqua calida parū diu maceratum pistillo ligneo, in mortario æreo promte deglubitur. Zea, oriza, molis. Zea iterū vt hordeum purgatur. Radices quædā solū recentes abluuntur, & circumcisis radiculis seruantur vel vsurpantur, vt *Cichorii, rustici, asparagi, buglossi, echii*. Aliæ vtendi tempore cultello raduntur, vt *radix glycyrrhizæ, gentiana, rubia, paonia, tormentilla, doronici, betonica altilis*. Quarundam superficies tota circumciditur, & quod int⁹ inutile apparet, excidit, vt *rhabarbari agarici, iridis*. Int⁹ & foris simul, *mala cydonia, dactyli etiam edendi, colocynthidis fructus cortice & semine purgantur, vt sola maneat medulla seu caro*. Radices, quæ intus habēt substantiam lignosam, vt *raphani, apii, petroselinii, feniculi, saxifragia, oxalidis, peucedani, ellebori utriusq; pseudodictamini vulgaris sine Tragii, turpeti, esula, scilla, capparis, tamaricis*. Scilla et nucleis & agnatis purganda. Cyperus, inula, costus, *Foris*
- F** acorus integra teruntur aut coquuntur. Ellebori radicum fibræ aqua paulum macerantur, postea cortices extracti in vmbra siccantur ad vsus, vt *Zingiber, calamus aromaticus, cassia, cinamomum, galanga*. Et bacca myrti, iuniperi, interdū etiam oxyacantha, asparagi. Piper omne, cubebe, cardamomum. Semina feniculi, apii, cari, ameos, dauci, cumini, seseleos, carduibenecti, lini, *fenugraci, anisi, anethi, papaueris, portulacæ, lactucæ, cichorii, psyllii, milii utriusque, & cetera semi-*

na perua, nec intus, nec foris purgantur a Pharmacopœo, sed vel trita, vel integra vsur- **A**
pantur. Ex magnis Cicer item, faba, lupinus, eruum, vicia, semen agni manibus confricandum,
ut deposita canicie, nigrescat. Hippofelini, cydoniorum. Gummi quædam & lucci solidi, & li-
 quores, & resinæ tetra, foliis, scobe, ligno, cortice suæ parentis adulterati purgantur li-
 quore idoneo fusi, vel dissoluti, postea colati. Quorûdam seminû sola medulla in com-
 positiones inferitur, vt *cartami, melonum, cucumeris, cucurbitæ, citruli, & aliorum magnorum.*
 Tamen solus cortex rhois est vsui, & multarum radicû apii, elcoselini, sceniculi, rapha-
 ni, corde lignoso exsecto. Semina illa sole siccata teruntur leuiter in mortario, fricâtur
 manibus, cernuntur cribro, medullam solam transmittente: si non succedit torcipibus,
 vnguibus, dentibus, cultello excorticâtur. Ceterum hic obiter etiam de cribratione di-
 cemus, sciendûq; erit farinas cribrari, vt a fursuribus, & a cortib. quod purû ac tenuius **B**
 secernatur. Cribrantur etiam medicamenta quæ teruntur, vt puluis æqualis sit partesq;
 crassiores in cribro retineantur. Pulpa quoque Casiæ purgatricis cribro transmittitur,
 vt solus flos seu Pulpa a corticis fragmentis & seminibus repurgetur. Semen tamen La-
 thyrus, daphnoidis, & id genus alia quidem non pauca vno die insolata, aut ignita paxel-
 la parum affata, rupto cortice, promte exsiliunt. Amygdalæ, pineæ, pistacia, nuges, aqua
 frigida per noctem, vel calida parum diu macerantur, aut ignita patella tosta excorian-
 tur. *Decimus* præparationis modus est mucaginis, aut mucilaginiseductio. Hæc fit, quâ-
 do e reb. viscidis liquore quopiam sub sole, vel igne calefacto mucus educitur. Sic vtiq;
 e semine psyllii, e quo fortem ac validam facere expressionem aduersus falsam Arabum
 opinione Pharmacopœi ne dubitent, mucilago educitur. Eius quoq; generis est semen **C**
 cydoniorum, item maluæ, althææ, lini, scœnugræci, & vrticæ: si quidem ex illis etiam lerus
 succus extrahitur. Cum quo autem liquore succi illi sint educendi, Medico consultore
 opus est. Nam in dysenteria cû stillatio rosarum & plâtaginis hæc mucilago educitur,
 & per clysteres iniicitur. In pleuritide cû stillatio tussilaginis liquore, vel adianti, hyf-
 sopi, aut scabiolæ extracta illinitur. Sic perpetuo in aliis affectibus cum liquore conue-
 nienti, & Medici variis scopis mucago educenda erit. Ex gummi item Arabico, & tra-
 gacantha infusis seu maceratis, materia lenta educitur, vt etiam e reliquorum gummi
 dissolutione. Iniiciuntur autem prædictorû libræ vni aquæ calentis libræ tres, si crassio-
 rem visuccum: aut quatuor, vel quinque, si aquosiorē, & nocte vna, vel horis aliquot ma-
 cerantur recalefacta, & sacculo linteo imposta, exprimuntur. Baculo etiam interdum **D**
 verberantur, donec totus humor lentus effluat. Nam aqua calida & agitata promptius
 mucaginem educit. Ceterum semperuiû vtrûq; portulacæ, symphytum, cotyledon,
 aloë, telephium, & id genus alia multa lentore prædita, vix succum reddent trita, nisi
 inter tundendum liquorem aliquem affundas tenuem & aquosum, non crassum & len-
 tum. Quod si tamen liquorem affundas, is herbæ huius vires non vitiet, sed vel augeat,
 vel foueat, & seruet. Sic Polygono mari ex loco arido, maioranæ, thymo, saluie, rosmari-
 no, foliis lauri, hæderæ itidē ex aridiorib. liquor aliquis affundendus iis facultate conue-
 niens, si succum aliquem ex huiusmodi sicciotibus educere libet. Porro ne id silentio
 inuoluamus, de mollitione ac duratione hæc breuiter adiiciemus. De mollitione qui-
 dem, quod quædam tractando manibus mollescant, vt cera, aloë: quædam adiecto li-
 quore, vt saccharum, sciendum est. De duratione, quod sicut materiæ molliores fiunt,
 idoneo humore adiecto: ita humore absorto duriores fiunt. Consumitur autem hu-
 miditas calore interno aut externo.

De præparatione aliquot priuatim medicamentorum. C' A P. XXIV.

LOTIO ALOES SIMPLEX.

Accipe Aloes purissima trita, & creta libras duas. Aqua pluuia libras sex. Hæc primum in
 patinam lancemue vitream infunditur calefacta, deinde aloë in eandem coniici-
 tur, & subsidere permittuntur sordes, ac calculi: atq; aqua pura pinguisq; cui se pura &
 syncera commiscuit aloë, sensim percolatur, ac sordes seu recrementa in fundo lancis
 collecta, abiiciuntur. Quod colatum est, linteo rectum soli expositum, exsiccatur. **E**

Lotio aloes exquisitior.

Aloë optima trita, creta, ex aqua fontana purissima dupla, aut circiter, agitur ali-
 quam diu rudicula ferrea, aut lignea, in vase lato ex plumbo albo cōfecto, vel terreo
 vel alio, tecta sinitur horæ quarta parte, aut paulo diutius, subsidere. Tunc, quod clarius
 super-

A supernatat, inclinato vase, in aliud simile, sed minus, per colum saraceum transuafatur. Aut si puriorē, sed parciorem vis aloem loram, * licio, aut filtro, vulgo vocato, excolatur, diutiusque residere permittitur in vase præsertim vitreo, interuallis paruis foramina habente, spinā aut cera obturatis, per quē, quantum clarum videtur, effluere finitur, ne scilicet inclinato vase turbetur. Aqua noua affunditur, subigitur, * elutriatur, id fit quater, aut quinquies, donec arenosa & terrea tantū sæx supersit. Prima omnium præstantissima siccat in sole, aliæ omnes simul. Si autem hyems est, aut elora aloē in rem præsentem desideratur, igne lento siccare potest. Vbi siccata iam aloē est, ex vase ipso eximitur, calefacto parum vase, vt promptius ab eo separet. Imo eius pars, in quam, quod crassius est, subsedit, cultello deraditur.

Lotio aloes cum aromatis.

Habet aloes purissimæ tritæ & cretæ libram unam. Cassia lignea vocata, spica nardi, asari, iunci odorati floris, * Caryophyllorum, macis, cinamomi, ligni aloes, croci, mastiches, lacha, an. draahmastres. Tula coquuntur in duplici vase in aquæ libris sex ad dimidias: colantur & exprimuntur. Colato in vitreā, aut vitreatam patinam excepto, in eo aloerudicula assidue agitur: & dein soli donec exsicceretur, exponitur. Sit autē patina linteolo recta, ne aliquid incidat. Hoc quater fiat, donec arenosa & terrea omnia subsideant, vt dictum est.

A N N O T A T I O.

C Caryophyllorum, macis.] Seruitor, vnde hanc lauandi rationem recentiores desumserunt, pro iis habet carpobalsamum, & xylobalsamum. Verum quia illa raro, aut nunquam in officinis legitima habentur, ideo ex Ioanne Damasceno, qui istis aromatis celeritatem purgandi aloē conciliare posse putat, hæc ipsa substituimus.

Lotio Lacha.

Accipe aristolochia longæ floris iunci odorati, an. uncias duas. Coquantur in aquæ libris quatuor, quoad remaneant libræ tres. Colato inspergantur Lachæ integræ libræ vna & vnciæ quatuor. Coquatur lacha lento igne, donec sanguineum aqua contrahat colorem: & quicquid in lacha boni fuerit, dissoluatur. Coletur per laneū pannum, aut filtrum: & sordes quæ remanent, abiiciantur. Excolata sanguinei coloris aqua lentis prunis in duplici vase ad mellis consistentiam coquatur, & massa adhuc tepida in pastillos cogatur.

Lotio plumbi.

In plumbeum mortarium infunditur aqua cœlestis, & pistillo plumbeo aliquot horis agitatur, donec liuidum acquirat colorem, & in limi modum crassescat: dein per lineum pannum ter quater colatur, & subsidere permittitur. Quod subsedit, exsiccatum reponitur.

*Lotio * recrementi ferri.*

Recrementum ferri, aut chalybis, aut squama eius purgata ab omni spurcitia, in aquam conicitur clarissimam, & manibus fricatur, dein aqua sordida tota effunditur. Post, recrementum in patinā vitream imponitur, & modicum aceti, vt ab eo duntaxat humectetur, nec emineat, affunditur, vt in eo diebus triginta maceretur. Postremo teritur & reponitur.

*Lotio * pompholygis.*

Pompholyx arida, aut aqua respersa, puro linteolo modiceque raro ligata, in vase pluvia vel fontana aqua pleno, huc atque illuc ducitur, vt pars eius utilis & tenuior in aquam effluat, & omne excrementum in linteolo remaneat: Postea residere finitur, & aqua cum cinere per colum traicitur, noua deinde aqua affusa, agitur & effunditur, per colum traiecta, & mutata tantisper aqua, donec in linteolo nihil vtile maneat. Demum aquam excolato, cinerem autem exsiccatum recondito.

Eboris preparatio.

FEboris in partes secti libræ vna coniiciatur in nouum & nō crematum fictile, crudoque tegitur operculo, & figulino luto oblinitur: deinde in figuli furnū imponitur, illicque, donec fictilia percocta sunt, cremari permittitur. Postea exemptū ebur in tenuissimum puluerem teritur, & cribratur, inque patinam vitream iniicitur: & affunduntur ei stillatitii rosati liquoris libræ duæ, & exsiccare permittitur. Deinde secundo teritur, &

denuo stillatitii rosarum liquoris affunduntur libræ duæ, atq; similiter exsiccat. Dein ^A teritur in tabula marmorea durissima, & finduntur pastilli, qui in denso vase, ne exspirent, reponuntur. Quod si ebore destitutus fueris, vice eius sume cornu ceruinum, & similiter præpara.

Scammonii præparatio.

Scammonii optimi vnciæ quatuor teruntur in puluerem subtilissimū, quibus aspergitur modicum olei violacei, vt massæ formam induant. Dein aliquot cydonia magna cauantur, & in eorundem cavitatem scammonie massa imponitur: & malorum foraminib. obturatis assantur cum pane in furno, donec cydonia perfecte assentur. Postea eximitur scammonium, & accipiuntur carniū myrobalanorum flauorum vncia vna, ^B Succī cydoniorum, vnciæ quatuor. Teruntur myrobalani & permiscuntur cum cydoniorum succo calefacto, & macerantur horis viginti quatuor: dein leuiter colantur: colatum affunditur Scammonio cocto, simulque mixta calido in loco exsiccantur. Hi rursus tenuissime teruntur, & cum mastiche in oleo rosacco dissoluta, in pastillos rediguntur.

Eiusdem alia præparatio.

Scammonii optimi vnciæ quatuor, succi cydoniorum vnciæ duæ probe miscentur, & in calidum locum reponuntur, & quotidie mouentur & agitantur, quoad modocriter duræ massæ formam accipiant, & tandem in pastillos rediguntur, & exsiccantur.

Colocynthis præparatio.

Colocynthis pulpæ accipe libram vnam. Bdellii, tragacanthæ, an. vncias duodecim. Colocynthis minutissime inciditur: Bdellium vero & tragacantha in stillatio rosarum liquore dissoluta colocynthidi permiscuntur, & finduntur pastilli, qui in loco sicco exsiccantur. Hi rursus tenuissime teruntur, & cum mastiche in oleo rosacco dissoluta, in pastillos rediguntur. ^C

Mezeri præparatio.

Iolia Mezerei macerantur in aceto horis viginti quatuor acerrimo, postea exsiccantur. Vfus tempore conteruntur, & in contundendo abiiciuntur venæ, & nerui eorundem.

Esulæ præparatio.

Radices Esulæ detracto cortice macerantur horis viginti quatuor, in acerrimo aceto, postea exsiccantur. Sunt qui triduo macerare solent. ^D

Scillæ præparatio.

Scillæ magnæ recentis, nec putridæ, nec gelu flaccidæ, exteriores abiiciuntur aridæ tunicæ, dein massæ pistorum, vnde panis fit, includitur & inuoluitur: coquitur assaturque postea in furno cum panibus, donec illi percocti fuerint. Dein e furno eximitur, & sigillatim omnes eius detrahuntur tunicæ, & funiculo traiectæ in calido loco, vt se non contingant, exsiccantur. Solenni quodam hodie more medium eius, vnde germen enascitur, abiiciunt: nec ferreo cultro, sed ligneo Scillam secant & incidunt.

* Saccharū tractum penidium vocant.

** Penidiorum præparandorum modus.*

Sacchari boni, si lubet, puluerisati, libras duas aqua dulci, aut hordei mersas, cū mel- ^E lis vnciis duabus: nisi saccharum sit dulcissimum: & ne id candefiat, coque prunis in vase æreo, plumbo albo obducto, potius quam terreo vitreato, quoad fila inter digitos ducat, & manus non inquinet: affundendo paulatim oleum amygdalarum dulcium, vel commune, subige in marmore, quod eodem oleo illeueris. Deinde in clauo parieti affixo, longo, curuo, tanquam funem aliquem nunc trahe, nunc rumpe, nunc duplica, quoad omnino albescat. Calido loco serua, vt sit diutius tractabilis. Forficibus diuide in offas exiles oblongas, vel in quam voles figuram, cum puluere amyli finde. Quidam sine melle saccharum album bonum coquunt leniore igne ad extremam spissitudinem, quæ cognoscitur, quādo portio aliqua extremis digitis duobus distracta, in tenuissima quasi fila, abit, quæ digito percussa instar vitri diffiliunt. Dein super marmor butyro vel ^F oleo amygdalino illitum effundunt, & manibus vel illitis, vel amyli polline aspersis, ne adhæreat comprehensum ex alto paulatim comprimendo & fricando, hinc inde aliquoties dimittunt: tandem vbi paululum refriguit, ferramento vnco parieti infixio obvolunt, & assidue vtraque manu, vel alternis alterutra retrahunt, retractum iterum atque

Atque iterum clauo obuoluunt, idq; rantisper dum bene lentum & candidum efficiatur. Quo autem diutius trahitur, eo candidius redditur. Attractum tandem ministris exhibent, qui distrahendo torquendoque modo consueto formant, formatumque calido loco reponunt.

Pulmonis vulpis preparatio.

Pulmo vulpis, e quo aspera extracta est arteria, a sanguine, vino odore calefacto, vel stillatitio liquore hyssopi aut scabiosæ lauatur: mox ollæ impositus in furno siccat: ita tamen ne insternuti indurescat, aut admodum aduratur. Exsiccatus in arido loco reponitur, absinthii, marrubii, vel scabiosæ foliis, ne putrescat, inuolutus.

Iecoris lupi preparatio.

Iecur lupi vino albo optimo lauatur: vel liquore stillatitio absinthii, aut eupatorii Græcorum: dein conspergitur puluere tenuissimo Santali flau: siccat absinthio, vel eupatorio iam dicto inuolutum, reponitur in arido loco.

Sanguinis hircini preparatio.

Hirci mediocris ætatis, & quadrimi, domi vino albo & herbis calculum frangentib. fœniculo, nimirum apio, pimpinella, & ænanthe nutriti. Iulio aut Augusto mense iugulari, medius effluens, ex arteriis maxime sanguis excipitur: nam primus tenuior, postremus crassior putatur: vaseq; vitreo exceptus concrefcere finitur: atque aqueum, quod in eo est, effunditur, reliquum linteo raro tectum in sole exsiccatur.

Tunica interioris ventriculi gallinarum preparatio.

Tunica interior ventriculi gallinarum lixiuo calido hora vna maceratur, & ter lauitur: iterum lixiuo, post vino, & siccaturno, ex quo panis extractus est.

Oſispi preparandi modus.

Succidarum lanarum pinguitudo, quam œsopum Latini, vulgus medicorum & Pharm. Hyssopus humida. macopæorum hyssopum humidâ nominant, ita paratur. Lanæ illæ succidæ, hoc est, nondum purgatæ, e collo, feminibus & femoribus ouium detonsæ, quantitate satis magna calida aqua diligenter lauantur, quoad omnem suam pinguitudinem in aquam deposuerint. Dein lana expressa seposita, aqua illa pinguis & fordida vasculo aliquo diutissime ex alto funditur, & refunditur, donec spumosa fiat: tunc spuma subsidere permittitur, & aquæ innatans pinguedo colligitur, iterumque aqua affusa agitatur, atque donec spumer, refunditur, & subsidens pinguedo aufertur, & rursus refunditur, donec non amplius spumer, & nulla aquæ pinguedo innatet. Tum collecta pinguedo manib. emollitur, & aqua lauitur: & si qua infedit spurcicia demit, quoad pura fiat, & aqua clara defluat, albescatque, nec linguam admodum mordeat. Quo factò in fictili denso reponitur loco frigido.

A N N O T A T I O.

Præscriptum œsipi parandi modum sequi debent Pharmacopœi, quod is, qui in officinis existat, parum aptus est.

Intestini lupi preparatio.

Intestinum lupi per longum scinditur, & per transuersum in portiones mediæ digiti longitudinem æquantem secatur, vinoque lauatur, aut stillatitio fœniculi vel rutæ liquore, dein in furno exsiccatur.

Terebinthina coquenda modus.

Resinæ terebinthinæ, aut laricinæ libræ vni affunditur aquæ libræ viginti quatuor, & coquantur in magno vase, donec odorem amittant, & inspissentur, ita vt refrigerata digitis friari queant.

Adipum preparatio.

Adeps cuiusque animalis lauatur in aqua aliquoties, donec pura defluat aqua, & non amplius saniosa, aut cruenta appareat. Dein minutim concisa in duplici vase liquatur, & eliquatus in frigido sine sale reponitur loco. Alii ita præparant. Pinguedo ex emtis venulis, & fibris, membranulisque nudata, lota, & minutissime incisa in duplici vase liquatur lento igne, postea per pannum colatur densiorem, & in vas fictile fusa, frigido in loco reconditur.

Medulle preparatio.

Medulla ex ossib. autumnæ initio exempta lauitur, & duplici in vase liquatur, eodem quo adipem modo. Ceterum, vt id obiter moneamus, medicamentorum præpa-

94 Operum Leonhard. Fuchsi Pars. II.

Pharmaco- rationes ad Dioscoridis, harum optimo magistro & doctore, Pharmacopœi efficiant, A
pœi Dioseo quem utique hoc nomine perpetuo in suis officinis repositum habere, & assidue etiam
ridē in suis legere debent.
officinis re-
positum ha-
beant.
Succedanea
quæ.

DE SVCCEDANEIS. CAP. XXV.

Succedanea dicuntur medicamenta, quæ in aliorum penuria, quæ similes habere putantur vires, supponi & substitui possunt, Græcis ἀντὶβαλλόμενα καὶ ἀντεμβαλλόμενα, vulgo quid pro quo appellantur. Non negligenda vero erit hæc substituendorū medicamentorum ratio, quod sæpe accidat, vt Medicus in curandis corporis vitiis necessariis, & maxime commodis medicamentis prorsus destituatur: aut si eadem in promptu habeat, tamen veritate confecta viribus euanidis sint, aut alia quadam de causa vitiata & corrupta esse appareant, vt hoc nomine necesse sit in eorundem locum aliud substituat, quod ei, quod desideratur, maxime respondeat. Quod quidem factu facillimum erit, si modo exquisitam simplicium medicamentorum cognitionem habeat. Cōsiderandum igitur erit, quibus ordinibus singula medicamenta simplicia contineantur, & quæ eorundem sint facultates, & quam inter se similitudo sint. Quapropter si succedanea sint eiusdem, vel in calefaciendo, vel refrigerando, humectando item vel siccando ordinis, sicq; eiusdem sint facultatis, inque plurimis cum eo, pro quo substituantur, cōueniunt, dubium nullum erit, quin legitima sint succedanea. Quanquā quum nihil sit tā simile, quin multis rebus sit diuersum, præstat, quoad fieri potest, a succedaneis abstinere. Tamē vt in legitimis substituendis succedaneis, quam rationem sequi debeant imperitiores, tum Medici, tum Pharmacopœi sciant, non pigebit hæc ordine recensere.

A.

Pro *Abrotono* auctor libelli eius, qui de succedaneis inscribitur recte *Origanum* substituit, quod illud perinde atque *Abrotonum*, in tertio ordine calidum & siccum existat, ac incidendi & extenuandi facultatem obtineat. Errant autē, qui pro eo *Absinthium*, & vicissim pro *Absinthio* substituant *Abrotonum*: quod hoc stomacho impendio inimicum, illud vero gratum sit.

Bianca vrsina officinarum.

Acantho, spina alba. Vtraque enim herba calefaciendi & exsiccandi discutiendi- que citra morsum vim habet. Errant qui nostratibus officinis dictam *Branca vrsinam*, quæ non est, nisi *Spondylion* pro *Acantho* substituant, quod ea herba acrem & cum mor-
su exsiccantem facultatem, adeoque *Acantho* dissimilem, habeat. *Acantha Arabica* si-
ue *Aegyptia*, quæ Serapioni & aliis Māuritanis *Sucaba* dicitur, itidem *Spina alba* nostras: quod in facultatibus conueniant, & iisdem calefaciendi & exsiccandi ordinibus con-
tineantur.

Acacia, succus syluestrium prunorum, & eorundem caro: vel si haberi potest, legitima *Hypocistis*, quod ordinibus, & adstringendi facultatibus *Acaciæ* similes sint: vel *Leniscis succus*.

Acore, radix *Asari*, quod, *Galeno disertis verbis testante*, *Acori* radici similis existat.

Agallacho, quod officinæ lignum *Aloes* nominant, *Centaurium maius*, vel *Lycium*, libelli de succedaneis auctore: quod facultate similia admodum sint.

Ammi, *Anisum*, quod vtrunque in tertio ordine calefaciat & exsiccat, tenuium- que partium sit.

Ammoniaco thymiamate, non *Propolis* apte substituitur, vt est in Græcorum succedaneis, quia hæc ipsa extergentem & valenter attrahentem facultatem obtinet, illud vero emolliendi & discutiendi. Aptius igitur pro eo *Galbanū* substituitur. *Amomo*, *Acorum*, quod *Galeno attestante*, ei similem obtinet vim: vel *Ammeos semen*, quod itidem facultate ipsi simile existit.

Anchusa, *Hyacinthus*: Quippe vtraque herba refrigerat, desiccatur, extergit, & adstringit, maximaque inter eas est similitudo.

Aristolochia quauis, vna ex trib. *Aristolochiis*, quæ ad manum est. Siquidem iisdem viribus præditæ sunt.

Armenio, *Indicum*, præsertim factitium, quod illud haberi possit. Vulgo *Ferber Indich* dicitur. Vtrunque medicamentum purgat, & carnem excrecentem coercet ac reprimat.

Arsenico,

- A** *Arsenico, Sandaracha.* Ambo vrentis sunt facultatis.
Asio lapide, Salpetra, vel hammoniacus. Vterque abstergerendi, expurgandi, dissipandi, reprimendi, & eliquandi carnem vires obtinet.
Aspalatho, viticis semen. Vtrique enim acrimonia, & adstrictio inest, earumque ratione calefaciunt & desiccant.
Asphodeli radice, Beta succus. Vtrunque medicamentum extergit, siccant, & discutit.
- B.**
Balsamo succedanea Græcorum Leucoi seu viola alba radicem substituunt, & recte quidem. Vt enim Balsamum est tenuium partium, menses mouet, vterumque recludit: sic quoque Leucoii radix, imo totus frutex tenuium est partium, extergit, siccant, menses cit, vterumque aperit.
Bdellio, muscus arborum, qui perinde atque Bdellium emolliendi & discutiendi facultatem obtinet.
Behen, Orminum. Vt enim Behen Arabum semen genitale adauget, ita quoque Horminum venerem stimulat. Nec temere diximus Arabum, siquidem Mauritanorum Behen hanc facultatem non obtinet. Alba enim, quia admodum amara, discutiendi: rubra vero quia vehementer adstringit, contrahendi constipandique vim habet.
Bolo armeno, lemnium sigillum, siue terram lemniam, iisdem namque facultatibus prædita sunt.
- C.**
Chamalea, Polypodium, præsertim ubi ad sordida, & crustas habentia vlcera accommodatur. Sin purgando corpori adhibetur, *Daphnoides.*
Carpobalsamo, viola alba, vt in Balsamo dictum est.
Cardamomo veterum & Arabum, id quod officinæ ita nominant, vel *Capficum* substituitur.
Calamo aromatico, radix ea que in officinis sub hoc nomine prestat, quanquam non est calami odorati radix, sed alterius qui Mæotide palude nascitur, subiicitur, quod iisdem viribus donata sit.
Cassia, cinamomum, vel *Sabina,* quæ Cassiæ facultati similis est, vt patet conferenti vtriusque facultates.
- D** *Capparis radice, Tamaricis cortex,* quia facultatibus similes sunt. Nam vtrique extergendi, discutiendi, incidendi, & paululum adstringendi vires insunt.
Cedri fructu, succedanea Græcorum ladanum substituunt.
Cinnabari Dioscoridis, Sanguis draconis: pro Galeni Cinnabari, *Minium,* quod eandem facultatem obtineant.
Cinamomo, Cassia dupla, vel *Ruta sylvestris,* vt quæ instar Cinamomi crassos humores dissecat, oculorumque caligini conferat, discutiat, & vrinam moueat.
Costo, Helenum substituunt Græci, & recte, quod facultatibus non parum conueniant, vt liquet conferentibus vtriusque facultatibus: atque succedaneo illo maxime pro Costo qui passim in officinis prestat vtendum erit, quia spurius est.
- E** *Cumino æthiopico, Melanthium siue Nigella,* quia iisdem facultatibus sunt prædita, vt merito alterum alterius vices subire possit.
Cypero, Iuniperus, quod vtrunque medicamentum vrinam, mensesque euocet.
- D.**
Damasonio, Galenus Calamintham substituit, quod scilicet eius radici detergendi vim inesse expertus sit, quam etiam Calamintha obtinet. Alii vice illius subiiciunt *Eryngium,* quod iisdem viribus donatum est.
Dauco Staphylinus, quod eandem quam *Daucus,* sed imbecillio rem facultatem habeat. Alii *Sii* semen, quod similibus est viribus, substituunt.
Dictamno, Pulegium, quod ei Galeno attestante, simile est.
- F** *Diphryge, Phrygius lapis,* quem *Lyncis* officinæ nominant. Vtrunque enim medicamentum ad vlcera sordida conueniens, quandoquidem ambo mediocriter adstringant, & valide exsiccent.
Doronico, dimidium Caryophyllorum & uicenna substituit.
Dorycino, Papauer, aut Mandragora, quia illis parem refrigerandi facultatem obtinet.

Dracontio siue Serpentaria maiore. Arum.

E.

Elateris, Pori succum, vt qui ventrem stimulet, & aluum moueat.

Ebeno, lignum Guaiacum, quod iisdem quibus Ebenum viribus donatum est.

Elleboro nigro, Struthii radicem Græci substituunt. Verum quia id paucis est cognitum ideo præstat pro eo vsurpare *Enneaphylli radicem*, vt quæ similibus est in mouenda aluo viribus; atqui imbecillioribus. Ad purgationes autem adhibendum esse *Enneaphyllon* Græcorum abunde testantur succedanea, quæ pro illo *Colocynthis semen* substituunt.

Eruo, Ciceris nigri semen, quod instar Erui discutit, incidit, extergit, obstructionesq; expedit.

Eryfino, Nasturtii semen, aut Eruca, quorum vtrunque tam forma, quam facultate **B** *Eryfino simile existit.*

F.

Folio, vide Malobathrum.

Felle hyena, fel perdicis, quod viribus æquale est.

G.

Gummi seu verius lachryma olea athiopica, Elemi officinæ nominant, Græci *Acatia* duas partes substituunt, verum parum recte. Nam Acatia viribus, & temperamento oleæ æthiopice lacrymæ similis non est. Quapropter *Gummi Cerasi*, pro ea potius substituenda erit, vt quod visum exacuit, vrinas & menses, calculosq; instar huius lacrymæ, elicit.

Grano seu Cocco gnidio, Lathyridis semen, aut Daphnoidis. Siquidem vtrunque purgandi facultate præditum est. **C**

H.

Harmali, Ruta sativa semen, quod eandem facultatem obtinet.

Heliotropio Græca succedanea Rapi semen substituunt: id quod faciendum, si venerem stimulare Medici consilium est. Nam rapi semen venerem excitare potest. Quod si vero de siccatione & absterfione opus erit, pro *Heliotropio Dauci semen* rependum erit, quod non solum ad Venerem stimulat, verum etiam desiccatur, extenuatur, mensesque ducit. Quas sane facultates omnes Dioscorides *Heliotropio* inesse scribit.

Hammoniaco, vide Ammoniaco.

Hyssopo montana, hortensis, qui idem potest.

I.

Intybo satiuo vtroque, hoc est, *Endiuia & Scariola* vocatis, *Cichorium* substituendum, quod similibus temperaturis & facultatibus constat.

Iride Illyrica, Græca succedanea *Helenium odoratum* subiiciunt, quod iisdem fere facultatibus donatum est. Officinæ nostrates non inepte *Iridem florentinam* dictam substituunt.

Succedaneorum libellus non est Galeni.

Iunco odorato, succedanea Græca, quæ falso Galeno adscribuntur, *Cardamomum* substituunt, atqui, meo iudicio parum recte, quod *Cardamomum* viribus *Iunco odorato* non sit prorsus simile. Pro eo igitur potius substituendus erit *Calamus odoratus*, vt qui perinde atque ille mediocriter tum calefacit, tum adstringit, atque in facultatibus plurimum conuenit. **E**

L.

Lanaria, Ellebori nigri radix, quod illa quoque sternutationem moueat.

Liquore Cyrenaico, Magistrantie vulgo vocatæ liquor, qui proxime ad Cyrenaicili quoris facultates accedit.

Lybistici semine, Staphylini semen, vt Græca succedanea docent. Præstat autem pro eo substituere *semen cumini, carei, anisi, aut petroselinæ*, quod hæc ipsa eandem, quam *Lybisticum*, Galeno teste, facultatem obtineant.

Lycio, Rhois succo, aut semine, quod vt illud exsiccandi vires habeat.

Loti semine, Beta semen, quod exsiccandi & abstergendi facultatem habet perinde **F** ac *Loti semen*.

M.

Malabathro, Spica nardi, quæ cum *Malabathri folio* similitam facultatem obtinet, quemadmodum Galenus scriptum reliquit.

A *Mannathuris, Thuris cortex*, qui eandem vim, nempe exsiccantem, & adstringentem, atqui validiorem, habet.

Meliloto, herba vulgaris inque pratis passim nata, quam nos tomo altero nostrorum commentariorum postremam meliloti speciem facimus. Officinæ a Græcis succedaneis seductæ, pro Meliloto perperam loto sylvestri, *ut fusiis supra, capite nimirum s. dictum est*, utuntur.

Melyssophyllo, Marrubium, quod ei facultate, *ut testatur Galenus*, simile admodum est.

Meo, herba, quæ Germanis *Beerwurh* nominatur, aut *Petroselinum* macedonicum.

B Nam utraque herba calefaciendi & desiccandi vim, instar Mei veri, habet.

Molybdæna, vide *Plumbago*.

Myrrha, Bdellium arabicum, quod gustu admodum amarum, & siccum, perinde atq; Myrrha existit.

N.

Nardo Indica, Nardus Celtica, quæ iisdem donata est facultatibus, etsi imbecillioribus, præterquam ad eliciendam urinam, *ut testis est Galenus*.

Napi semine, Rapi semen. Nam utrunque potum, *ut auctor est Dioscorides*, venenis aduersatur.

O.

C *Oesipo, medullam ceruinam*, quæ instar Oesipi emollit. Vbi igitur emolliendi necessitas est, hic medulla ceruina commodissime pro Oesipo substitui potest. Eadem etiam vlcera explet, igitur optimum Oesipi succedaneum existit.

Omphacio succus Rhœis, id est, *sumachii* vulgo dicti: aut *Ribes nostratis* substituendus. Nam succi illi iisdem facultatibus donati sunt. Vlceram namque oris sanant, dysentericisque, & sanguinis excreationibus profunt.

Opopanace Galbanum, quia utrunque emolliendi & discutiendi vim habet.

Opobalsamo, succum radice violæ albe, siue leucoy ob causam antea dictam.

Ormino, Lini semen. Quippe illud perinde atque Orminum venerem stimulat, & discutit.

D *Oleoricino, Raphaninum*, quod Galeno attestante, huic est in omnibus aliis simile, atqui calidius.

Oleo sesamino, Amygdalarum dulcium, quod emollit, modice calefacit, dolores coli, & vterilenit, ut Sesaminum.

Orobo, vide *Erno*.

P.

Panacis radice uncie una, Opopanacis drachma una, est enim eiusdem cum radice facultatis, atqui validior.

Petroselino macedonico, Hipposelinum, quod facultate ei simile est, verum imbecillius. Aut *Pimpinellæ nostratis semine*, vel radice, quæ etiam temperamento ac viribus æqualis est.

E *Pipere albo, Piper nigrum* substituitur, quia utrunq; valenter excalefacit & desiccatur. *Polio montano, Polium campestre*, quod eiusdem est facultatis, etsi imbecillius. Quamquam quum montani copia haberi potest, nulla substitutione opus erit.

Potamogitone Græca succedanea *Serpyllum* substituant, maximo errore. Nam quum *Potamogiton*, Galeno auctore, refrigeret & adstringat: *Serpyllum* autem calidum admodum sit & acre, fieri nequit, ut alterum pro altero substituat. Quapropter hinc meridiana luce clarius est, succedaneorum libellam, qui sub Galeni nomine circumfertur, esse spurium. Siquidem Galenus pro *Potamogitone* non *Serpyllum*, sed *Polygonum* substituit, quod easdem illi vires obtinet.

F *Phu, Valeriana vulgaris*, vel alia eiusdem species, quod omnes eiusdem temperamenti, & earundem sint virium.

Plumbagine, Lithargyros, quæ Galeno attestante, similem plumbagini facultatem habet.

Pyrethro succedanea Græca *Zingiber* substituant, sed parum recte. Nam, *ut Galenus testatur*, *Zingiber* cum *Pipere* magis, quam cum *Pyrethro* in facultatibus & temperamento

conuenit. Vt hinc quoque manifestum fiat, libellum succedaneorum græcum non esse A
Galenī, sed alterius cuiuspiam, cui facultas medicamentorum non satis perspecta fuit.

R.

Rheo, veterum, centaurium maius, quod officinis in hodiernum vsque diem *Rheum-
ponticum* nominatur, nulla alia de causa, quam quod viribus & temperamento Rheo
simile sit, & quod eius olim etiam succedaneum fuerit.

Resina terebinthina, laricea, quæ easdem aut certe similes vires obtinet, qualis fere est
ea, quæ hodie in officinis nostratibus habetur.

S.

Sandaracha Arsenicum, quod Galeno auctore, eiusdem nempe vrentis, est facultatis.

Santonico absinthio, abrotanum, quod vtrunque Galeno teste, stomacho admodum in- B
festum sit.

Satyrio, ea herba quam nos tertio nostrorum *de stirpium historia* temo pro Satyrii
specie subiecimus: vel Orcheos genus aliquod.

Schænantho, iunci odorati stipites vel culmi, quia similem facultatem, et si minus cali-
dam, possidet.

Stichade arabica, Lavendula potius quam *Chamadrys*, vt græca succedanea substitu-
unt, vsurpanda erit, quod iisdem plane facultatibus donata sit, quemadmodum tertio
nostrorum *de stirpium historia commentariorum temo* fusius docuimus.

Spodio, non ebur, aut cornu ceruinum vstum, sed potius cinis fornacum substituendus e-
rit. Nihilominus tamen officinarum Spodio suus vsus erit. C

Symphyto petraeo, Symphytum magnum, quod ei, Galeno auctore, similem vim habet.

Sory, non melantheria, aut *Diphryges*, vt succedanea græca docent, sed chalcitis substi-
tuenda erit.

Struthio, elleborus albus, quod ille sternutationem moueat.

Sulphure viuo, flauum, quod viribus proxime accedit.

T.

Tapſia, nasturtii aut cruce semen. Nasturtii autem semen Tapſiæ facultatibus simile
est.

Terra cimolia, creta, quod eiusdem sint facultatis.

Terebinthina, laricea.

Terra lemnia, Bolum armenum, quia temperamento & viribus similes sunt. D

V.

Vinorhodio, austerum aliquod vinum nostrate.

X.

Xylabalsamo, viola alba, aut Leucoii radix.

Z.

Zingibere, piper album, vt in Pyrethro dictum est.

Hactenus paucorum admodum, & eorum quæ hodie non facile haberi possunt,
succedanea recensuimus. Præstat enim perpetuo iis vti, quæ ab auctoribus composito-
rum medicamentorum nominatim percensentur, quam pro ipsis alia substituere, quod E
raro accidat, vt vnum alteri facultate per omnia respondeat. Et profecto non videmur
hodie succedaneis admodum egere, modo in comparandis simplicibus, quorum fere
omnium copia haberi potest, Pharmacopœi diligentiam eam, quæ illos decet, adhi-
beant. Studium enim in illis tantum desideratur, quum in promptu sint medicamenta
omnia, quibus eos in parandis compositionibus vti oportet.

*De limitatione ac finitione ordinis cuiusque calefacientium, refrigerantium, hu-
meſcantium, & desiccantium.* C A P. XXVI.

NON generatim solum simplicium medicamentorum facultates Medico noscendæ
sunt, num scilicet calefaciant, refrigerent, humectent, & desiccant, sed & distincte
membratimq; quantum habeat, quodq; eorum, definiendum erit. Quippe multa sunt
quæ calefaciunt medicamenta, idq; sibi cōmune obtinent: attamen maioris minorisq;
rationem non exiguam in calore sortita sunt. Pari ratione sunt quæ refrigerant, hume-
ctant, vel exsiccāt, attamen rationem maioris minorisq; in iis omnib. obtinent. Proin-
de veteres, præsertim Galenus non temere per vnum quemq; excessum ab eo quod tē-
peratum

Aperatum & mediocre est, quatuor ordines, quos Græci *τάξεις*, Latini *gradus* appellant, Quatuor ordines calefacientiū, refrigerantiū, humectantiū, & exsiccantiū.
 statuerunt, a modice calidis, frigidis, humidis, siccis, ea, quæ euidenti eiusmodi qualitate præcellunt, tum quæ magna vehemente, & summa. Porro temperatum est, quod ob temperamenti similitudinē eius, cui admouetur, neq; calefacit, neque refrigerat, neq; humectat, neq; desiccatur. Quod vero illo aut calidius, aut frigidius, aut humidius, aut siccus est, a vincente seu excedente facultate qualitateue cognominatur. Excessus autem is ab eo, quod mediocre seu temperatum est, Galeno aliisque Græcis medicis, ut diximus, *τάξις* & *ἀπόστασις*, Latinis *ordo gradusue, recessus, digressio, & distantia* nominatur. Calidum itaque in primo ordine, recessu, distantiaue vocant, quod nos calefacit, non tamen eui denter, sed ita modice, ut *in super demonstratione rationali opus sit*. Sic frigidum, humidum, **B** siccum primo ordine statuunt esse, quod demonstrationem etiam requirit, nondum actionem valentem & manifestam adeptū est. Quæ vero manifeste aut calefacere, aut refrigerare, aut humectare, aut desiccare possunt, ea secundi esse ordinis, aut recessus dicunt. At quæ iam admodum & vehementer quidem id præstant, non tamen summe, **C** tertiū. Quæ aut adeo calefacere possunt, ut crustam moliantur & vrant, quarti. Sic quoq; quæ ita refrigerant, ut calorem natium extinguant, adeoque stupefaciant ac mortem inferant, & ipsa quarti ordinis sunt. Humectantium in quarto ordine fere nullū reperitur, quod inter omnes qualitates omnium sit maxime imbecilla. Nullum deniq; inuenire est, quod quarto ordine desiccet, quod non etiam vrant. Nam quod summe desiccatur, omnino id etiam deurit. Nunc nominatim singulorum ordinum simplicia perstringemus.

Quæ calefaciendo & refrigerando temperata sunt. CAP. XXVII.

Adiantum, asparagus, cadmia, cera, citri cortex, faba, glycyrrhizæ succus, lens, lycium, lithargyrum, myxa, muscus, vsneam Barbari vocant, oleum dulce, lotus sylvestris, saxifragam luteam ap- pellant, nuclei nucis pineæ, terra Samia, Zizipha. Vinca.

Quæ primo ordine calefaciunt. CAP. XXVIII.

Calorem innatum augent, quem sequuntur concoctiones, ac reliquæ naturales actiones. Talia sunt, absinthium, agaricum, atoe, althæa, amygdala dulcia, anethum viride, betabradica, buglossum, chamamelum, castanea, cassutha, eupatorium græcorum, ladanum, lini semen, lithospermum, malabathrum, nuces virides, oryza, populi nigra flores, saccharum, serum lactis, sesamum, vinum nouum seu mustum, vna matura.

Quæ secundo ordine calefaciunt. CAP. XXIX.

Ignei cuiusdam caloris participes sunt, ideoque attenuandi & rarefaciendi obstru- ctionesque ac meatus aperiendi vim habent, ambarū, amygdala amara, anethum aridum, apium, artemisia, balsamum, calamus odoratus, capparis, caphura, chamapitys, crocus, chamaeleontis albi radix, eruum, fœnum græcum, ficus, galbanum, mastiche, marrubium, mel, melissophyllum, myrrhis, nuces aride, nux moschata, ocimum, peucedanum, pistacium, pix arida, polium, propolis, rapa, scylla, scolymi radix, succus cucumeris sylvestris, sal, thus, vinum non admodum vetus, zadura, seu **E** zadoaria.

Quæ tertio ordine calefaciunt, CAP. XXX.

Incidunt, attrahunt, inflammant, sitimque excitant, ut sunt abrotanum, & magis vstum, acori radix, amaraeum, ammi, agnus, anethum vstum, anisum, asarum, arum, amomum, anacardium, dictamnus, carcum, chamaedrys, casia, cartamus, calamintha, cinamomū, conyza, cuminum, carpesium, carnabadium recentiorum Græcorū, elleborus vterque, epithymum, fœniculum, galanga, garyophyllum, iris, iuniperus, helenium, hyssopum, mentha, mentastrum, moschus, nigella, opopanax, organum omnis generis, petroselinum, piper, ptarmice, pulegium, raphanus, ruta hortensis, sampsychnus, sabina, sisymbrium, trifolium, vinum vetus.

Quæ quarto ordine calefaciunt. CAP. XXVII.

Pustulas excitant, adurunt, & erodunt, ut sunt, allium, adarce, cepa, costus, euphorbium, lepidium, nasturtium, porrum, pyrethrum, ruta sylvestris, sinapi, struthium, tithymali, chelidonium vtrumque.

Quæ primo ordine refrigerans. CAP. XXXI.

Calorem innatum refrigerant imminuuntque, adeoque coctiones aliquo modo impediunt, qualia sunt, *atriplex, acini vuae, caro citrei, cotonea, gramen, hordeum, malua, milium, myrtus, pyra, pruna, rosa, viola.*

Quae secundo ordine refrigerant. CAP. XXXII.

Increassant, caloremque naturalem euidenter obtundunt, ut sunt, *acacia, blitum, cucurbita, cucumis, damascena pruna, galla, inrybium, hyacinthus, lens palustris, mala granata, oxyphænicum, pepones, persica, plantago, polygonum, psyllium, rhus obsoniorum, solanum hortense.*

Quae tertio ordine refrigerant. CAP. XXXIII.

Internos corporis meatus occludunt, sensus omnes stupefaciunt, ut sunt, *hyoscyamus, mandragora, nymphaea, portulaca, potamogiton, santala omnis generis, semperuium.*

Quae quarto refrigerant ordine. CAP. XXXI.

Congelant, calorem natium exstinguunt, & interficiunt, qualia sunt, *cicuta, opium, papauer.*

Quae primo ordine humectant. CAP. XXXII.

Leniunt & lubricant, ut sunt *buglossum, citrii caro, helxine, malua, rapa, saccharum, satyrium, sesamum.*

Quae secundo ordine humectant. CAP. XXXIII.

Relaxant, naturaliumque partium robur imbecillius reddunt, ut sunt, *atriplex, blitum, cucurbita, lactuca, lenticula palustris, melones, oxyphænicum, pepones, persica, portulaca, pruna damascena, viola, vua matura.*

Quae primo ordine desiccant. CAP. XXXIV.

Corpus validius, sensusque vegetiores reddunt. Talia sunt, *brassica, beta, castanea, chamemelum, crocus, feniculum, faba, faenum graecum, hordeum, hyacinthus, malobazrum, myrtus, thus.*

Quae secundo ordine desiccant. CAP. XXXV.

Manifeste adstringunt, humorumque transitum intercipiunt, ut sunt, *anethum, artemisia, balauftium, balsamum, bursa pastoria, caphura quorundam sententia, capparis, cassutha, calamus odoratus, cotonea, eruum, galbanum, gingidium, lentes, mel, mastiche, mentha, mentastrum, milium, myrrha, nux moschata, opopanax, oriza, pix arida, pistacium, plantago, pyra, raphanus, rosmarinus, santala, spica nardi.*

Quae tertio ordine desiccant. CAP. XXXVI.

Aprotanum vstum, *acacia, absinthium, acetum, acorus, aloe, ammi, anisum, anethum, apium, asarum, careum, chamedrys, chamapitys, calamintha, caphura, ut aliqui censent, cinamomum, coriandrum, cuminum, elleborus, epithymum, galla, caryophyllum, hyssopum, iuniperus, macer, marubium, milium, moschus, nymphaea, origanum, petroselinum, pentaphyllum, peucedanum, piper, polium, ptarmice, rhus obsoniorum, sampsychem, sanguis draconis, sabina, sal, sisymbrium, trifolium.*

Quae quarto desiccant ordine. CAP. XXXVII.

Allium, nasturtium, ruta sylvestris, sinapi, chelidonium.

De medicamentis simplicibus peculiare corporis partes iuuantibus.

CAP. XXXVIII.

Non defuturos hoc loco indoctos, & ad calumniandum duntaxat natos homines, quosdam scio, qui nos ridebunt, quod esse medicamenta, quae priuatim hanc vel aliam corporis partem, verbi gratia, caput, thoracem, iecur, iuuent, asserere audeamus. Qui enim fieri posset, ut haec aetas, quae etiam optima quaeque calumniis deprimere solet, illa tanquam a veritate aliena non exhibilaret? quum Galeni etiam aetate, quae nostra tamen, quod credimus, paulo melior fuit, reperti sint, qui hoc dogma prorsus explodere voluerint in haec prorumpentes verba: *Num praeses quidam eis imperat, quemadmodum Tra-*

Σὺ μὲν βιάζε τὰς ἐμὲς ἰσάχους ποῖς,

Σὺ δ' αὖτις ἀέλας σείχης τὰς ἡδυνίας, id est,

Tu visse latas prope re ripas Inachi,

Tu perge Thebas modo quas Cadmus condidit:

A ut medicamentum hoc ad iecoris portas, illud ad vesicam, vel renes proficisci necesse sit? An non quod in ventriculum ingestum est, iecur quidem excipit, inde vero per vniuersas corporis partes defertur? Atqui sycophantis illis, qui hoc pacto nobis obgannunt, ita cum Galeno respondemus: *Hoc scilicet eos tam esse medicamentorum facultatis imperitos arguit, ut a marino lepore pulmonem exulcerari, solum ex omnibus particulis corporis penitus ignorent: vesicam solam a cantharidibus, ab aliis renum lapides conteri, ab aliis rursus pulmonis atque thoracis promtas fieri excreationes, quemadmodum ab aliis alia in vna quadam particula singulariter perfici. Ut igitur sunt medicamenta quædam, quæ priuatim partes quasdam corporis vitiant: sic etiam nonnulla reperiuntur, quæ quibusdam corporis partibus eximie iuuandis sunt idonea. Vtrumque experientia confirmat, & id ipsum veterum testimonia comprobant. Siquidem Galenus in libro de Theriaca ad Pilonem ita scriptum reliquit: Nonnulla partes quasdam corporis priuatim vitiant. Nam lepus marinus pulmonem exulcerat. Cantharides vesicam peculiariter offendunt. E contrario pleraque medicamenta quasdam corporis partes præcipue iuuare solent. Laboranti enim iecoris sæpe Eupatorium herba per strenue auxiliata est, Glans unguentaria lienem iuuat. Saxifraga & betonica renes probe afficiunt: & similiter alia aliorum, ut experientia obseruauimus, propria sunt medicamenta. Idem etiam libr. 13. Ther. methodi tradit, inquit: Quale medicamentum iocinori est absinthium, tale est lieni capparitis cortex. Quale rursus iocinori Eupatorium, tale est lieni Scolopendrium. Galeni sententiæ subscribunt etiam tota Arabum familia, & reliqui nostræ ætatis medici, neque ab re, quod illorum sententiam quotidiana experientia, ut diximus, cui nemo temere refragari debet, confirmet. Quod autem alia medicamenta alias corporis partes, quasi delectu quodam iuuant, aut lædant, id fit totius substantiæ proprietate, non quæ ad vniuersum corpus, sed quæ ad vnamquampiam particulam comparatur. Nihil enim est in vlla naturæ parte, quod non peculiari & occulta proprietate vigeat. Etiam si multa inter se conferamus, necesse est omnino has illorum proprietates aut similitudine quadam & affinitate consentire, aut dissimilitudine atque dissidio aduersari. Hinc *συμπάσια* & *ἀντιπάσια*, id est, consensiones & dissensiones profecta sunt, omnibus rebus diuinitus inserta, arcana quidem ille & abdita, quas natura siue Deus ipse, nos mirari potius, quam scire voluit. Hæ causæ habentur omnium occultorum effectuum, qui nullis euidentibus rationibus probabiles existunt. Quod igitur alia medicamenta alias corporis partes aut iuuant, aut lædant, in causa est sympathia vel antipathia. Quapropter quod a marino lepore, ut dictum est, pulmo vnus ex omnibus corporis particulis, e cantharidibus vesica sola exulceratur, & Eupatorium iecur iuuat, non manifesta aliqua qualitas, sed totius substantiæ similitudo & amicitia, aut dissidium & repugnantia efficit. Ceterum, ne hoc silentio transeamus, facultates a partibus nominatæ sunt, non quod omnibus partibus, quam nomine indicant, affectibus conueniunt, ne quod ita vni parti conducant, ut nihil aliis partibus profint: sed quia frequentissime, & magno cum fructu, ac potissimum eam partem a qua nomen sunt mutuatur, iuuat. Quapropter quum in parte vna aliqua humorem concoquere, aut ab ea vacuare volumus, tum medicamento facultas aliqua a parte illa nominata miscenda erit, Vt, exēpli causa, oxymeli coquit, incidit, tenuat, vacuat ex æquo in omnibus corporis partibus, vbi vero pæonia, aut betonica illi incoquitur, id ipsum valētius in capite præstat, cappareas autem in liene. Ut itaq; studiosi medicinæ in promptu habeant medicamenta, quæ præcipuas corporis partes iuuant, adeoque ipsis tota sua substantia familiaria sunt, nō pigebit ordine eorundem catalogū texere, ab iis, quæ caput iuuant exorfi.*

Quæ caput iuuant. CAP. XXXIX.

Calefacientia: acorus, agallochum, ambarum, anisum, asarum, betonica, calamintha, chama-
melum, castorium, carpesum, eufasia, feniculum, galanga, ladanum, lauandula, lauri folia, &
bacca, macer, melilotum, maiorana, mentha, moschus, mirabolana beletzica, nigella, nux moschata,
peonia, pulegium, ruta, satureia, salvia, scifeli, serpyllum, sesamum, sisymbrium, stechas, thus, xylobal-
samum. Refrigerantia: acetum, lachumanum, lactuca, myrti folia & bacca, nymphae folia & flo-
res, papauer erraticum, rosa, salicis folia, salanum satium.

Quæ thoracem roborant. CAP. XL.

Calefacientia: acorus, adiantum, ammoniacum, thymiana, amygdale amara, agaricus, cari-
ca, cinamomum, costus, calamintha, dracunculus, ficus, glycyrrhiza, gummii arabicum, iuncus
rotundus odoratus, helenium, hyssopum, iuniperus, iris, lini semē, marrubium, myrrha, nausturtium,

Refrigeran-
tia.

*origanum, pinea nux, palmula, penidia, piper, pulmo vulpis, sagapenum, scabiosa, scilla, scordium, sti-
chas, triticum, terebinthina, thymus, urtica, uua passa.* Refrigerantia: *Hordeum, myxa, papauer
satiuum, mora, tragacantha, viola, zizipha, tussilago.*

Calefacien-
tia.

Quæ cor iuuant. CAP. XLI.

Refrigeran-
tia.

Calefacientia: *Ambarum, amomum, buglossum, beben, carnabadium, cinamomum, carda-
momum, caryophyllum, citrei cortex & succus, crocus, daronicum, galanga, melissophyllum ve-
rum, macer, moschus, mentha, ocymum, polium, rosmarinus, rosa, (spodium Arabum, ut falso pu-
tant,) spica nardi, succinum, styrax, unguis odoratus, xyloaloe, zadura vel zedoaria.* Refrigeran-
tia: *Acetum, corallium, ebur, hyacinthus gemma, lemnia terra, nymphaea, rosa, santala, smaragdus,
viola, vniones, os cordis ceruini, sericum crudum.*

Calefacien-
tia.

Quæ stomachum & ventriculum roborant. CAP. XLII.

Refrigeran-
tia.

Calefacientia: *Absinthium, agallochum, aloe, amygdala dulces, anisum, artemisia, aster atti-
cus, cardamomum, calamus odoratus, careum, cassutha, cinamomum, caryophyllum, cuminum,
cupressus, cortex citrii, fœniculum, galanga, gentiana, helenium, iuniperus, iuglandes, iuncus odo-
ratus, ligusticum, macer, mentha, mastiche, malobathrum, melilotus, nux moschata, nuclei pini, pi-
per, serpyllum, smyrnium, xyloaloe, zingiber.* Refrigerantia: *Cucurbita, cucumis, coronea, inti-
bum, lactuca, mala punica, melones, mespilū, nymphaea, oxalis, portulaca, plantago, pyra, rosa, viola.*

Calefacien-
tia.Refrigeran-
tia.

Quæ iecur firman. CAP. XLIII.

Calefacientia: *Absinthium, acorus, adiantum, agallochum, agaricus, amomum, anisum, ana-
gallis, asarum, apium, ammi, betonica, cassutha, calamus odoratus, chamamelum, chamapitys,
cinamomum, costus, chamadrys, cicera, eupatoriū, fumaria, gentiana, glycyrrhiza, iuncus odoratus,
fœniculum, radices quinque cōmunes, scylla, semina quatuor calida, serpillum, spica nardi, rha pon-
ticum, (spodium Arabum, si Diis placet.)* Refrigerantia: *Acetum, cucurbita, cucumer, intybum,
lactuca, lichen, nymphaea, oxyacantha, portulaca, santala, solanum, semina quatuor frigida, rosa,
viola.*

Calefacien-
tia.Refrigeran-
tia.

Quæ lienem iuuant. CAP. XLIIII.

Calefacientia: *Absinthium, acorus, adiantum, agaricus, anisum, aristolochia rotunda, amy-
gdala amara, asparagus, asplenon, asarum, ammoniacū, betonica, brassica satina, bdellium, bu-
glossum, capparis, calamintha, cassutha, chamedrys, chamepitys, careum, cyclaminus, daucus, dicta-
mnus, epithymum, filix, fraxini cortex, iris, lictum, linū, leucoion, lupinus, lupus salictarius, nastur-
tium, phyllitis, polium, peucedanum, sagapenum, smyrnium, scordium, semina quatuor calida, radi-
ces quinque communes, rubia, vitex.* Refrigerantia: *Acetum, corallia, coronea, intybum, lactuca,
nymphaea, santala, semina quatuor frigida.*

Calefacien-
tia.Refrigeran-
tia.

Quæ renes roborant. CAP. XLV.

Calefacientia: *Abrotanum, agaricus, anagallis, amygdala amara, asparagus, apii radix,
betonica, daucus, cicera, cubebe, calamus odoratus, cinamomum, eruca, eryngium, fœniculum,
iuncus odoratus, iuniperus, lithospermum, milium solis, nuclei pini, petroselinum, pimpinella, radi-
ces quinque communes, ruta, rha ponticum, ruscus, saxifraga, smyrnium, spica nardi, seseli, uua pas-
sa, urtica.* Refrigerantia: *Intybum, lactuca, malua, hordeum, plantago, portulaca, nymphaea, parie-
taria, semina quatuor frigida maiora, tragacantha.*

Calefacien-
tia.Refrigeran-
tia.

Quæ uterum iuuant. CAP. XLVI.

Calefacientia: *Abrotanum, agaricus, ammi, artemisia, aristolochia, ambra, balsamum, bdel-
lium, betonica, calamus odoratus, ebulus, fœnumgræcum, iuniperus, iris, iuglans, linum, lilium,
laurus, laserpitium, mentastrum, mentha, melissophyllum, myrrha, moschus, nux moschata, opopa-
nax, peucedanum, piper, pulegium, rubia, ruta, sabina, sagapenum, salua, spicanardi.* Refrigeran-
tia: *Acacia, balaustrum, galla, geranium, polygonum.*

Calefacien-
tia.Refrigeran-
tia.

Quæ artus iuuant. CAP. XLVII.

Calefacientia: *Acorus, asarum, ammoniacum, bdellium, castorium, chamamelum, chamapitys,
costum, chamadris, euphorbium, hypericum, hermodactylus Pauli, galbanū, myrrha, melilo-
nasturtium, opopanax, origanum, polium, pulegium, ruta, rosmarinus, salua, staete, sagapenum, scil-
la, synapi, sapa, styrax, stercus caprinum, verbasculum, zingiber.* Refrigerantia: *Acetum, bo-
lus armenia, intybum, lactuca, myrtibacca, psyllium, salicis folia, solanum, semperuiuum, vitis folia.*

Secundæ
facultates
quæ.

Facultates medicamentorum simplicium, quæ ex primis oriuntur, aut eas simplices,
vel cōiugatas nullius interuentu sequuntur, secundæ appellantur, ut adstringendi fa-
cul-

A cultas refrigerationem primo comitatur, quemadmodum etiam repellendi, densandi, & claudendi. Discutiendi vero, abstergerendi, tenuandi, rarefaciendi, attrahendi, & putrefaciendi, calefactionem. Tertiæ autem facultates sunt, quæ ulterius procedendo prope particulatim appellantur, ut mensendi aut sistendi facultas, seminis generatrix, aut extinctrix, urinam mouens, sudorem eliciens, & similes. Hæ magna ex parte primas & secundas sequuntur. Non pigebit vero nos ordine singulorum generum medicamentorum, quæ secundis & tertiis prædita sunt facultatibus, catalogos texere, ut imperitiores ex iis minore negotio formulas compositionum struere possint, a reprimentibus oriri. Subiiciemus autem singulis mox contrariorum catalogum.

Quæ reprimunt. C A P. XLIX.

R eprimentia vocamus, quæ Græcis *ἀνταρροπῆς*, aliis *repellentia*, vulgo *repercutientia* dicuntur. Ea sunt, quæ humores occurrentes, & in aliquam corporis partem irruentes retro, & in altum pellunt, qualia sunt omnia acerbæ & adstringentia, quæ consistentia sua, Galeno libro 4. de simpl. medic. facul. cap. 6. attestante, terrena ac crassa sunt, qualitate vero frigida. Ceterum adstringendi facultas non solum frigidis, sed & calidis quibusdam inest medicamentis, ut liquet ex horum catalogo, qui est eiusmodi: Aloe, alumen, amomum, a-cacia, absinthium, agnus, acetum, ærugo, agaricum, arsenicum, balaustium, bolus armenia, bursa pastoris, adeps taurinus, vitulinus, & caprinus, brassica bis cocta, chalcanthum, crocus, castanea, cyperus, corallium, chrysocola, cadmia, carpesium, crystallus, cornus, cotonea, cypressus, cortex thuris, equisetum, ebulus, stlos aris, glans, galla, granum tinctorum, gentiana, gramen, hypocisthus, hederæ, heixine, hieracium, maius, hamatites, inrybum, lauri folia, lycium, lysimachium, luteum oui assum, leporis coagulum, lens, lythargyrum, ladanum, melilotum, myrrha, myrtus, menta, morus, mespilus, milium, myrica fructus, malum punicum malicorum, nuclei, acinorum, nux moschata, oxalis, oxyacantha, omphacium, oriza, polygonum, palmula, pentaphyllum, pilus leporis, pissasphaltum, plantago, psyllium, portulaca, pyra, persica, plumbumustum, quercus folia, rosa, rutha, rhus obsoniorum, rhaponticum veterum, rubi folia & germina, salyx, semperuium, santala, sal, sanguis draconis, succinum, spodium, sponsia, terra lemnia, thus, tragacantha, verbasum, vitex, vitis capreoli, sterces asininum, & xyloaloe.

Quæ ex alto trahunt. C A P. L.

A ttrahentia medicamenta Græcis *ἐλκυστῆς*, dicta sunt, Galeno lib. de simp. medic. facul. 5. c. 16. teste, quæ ex alto vehementius trahunt, essentia quidem calida, & tenuium partium. Ceterum attrahentium medicamentorum materia, alia sponte nata est, ut angallidis utriusque, aristolochia, cyclamini, dictamni, galbani, geniste, oxyacanthæ radices, propolis, picus piperis, porri, sagapeni, scoriz argenti, sandaracha, sulphuris, liquoris cyrenæici & Medici, terebinthina, ac thapsia. Alia ex putrefactione, seu coaccescente putredine generationem sortita est, qualis est fermenti, & psorici. Fimi præterea, si eius generatio ex putrefactione constet, materia omnis attrahendi facultate pollet. De iis lib. 5. simpl. Galenus.

Quæ discutiunt. C A P. LI.

D iscutientia, quæ Græcis *σφραγιστικῆς* dicuntur, attestante libr. 3. Ther. method. Galen. sunt, quæ per insensibiles meatus educunt. Ex quorum numero sunt quæ sequuntur: Abrotanum, alibæa, adiantum, anethum, aristolochia, atriplex, asphodeli radix, brassicæ folia, bdellium, butyrum, bryonia radix, cappares, chamamelum, erui farina, fursur, scænum graecum, dauci semen, galbanum, hordei farina, tritici lupinorum, lini semen, lacha, ladanum, lilii folia, malua, mentha, mercurialis, melilotum, nigella, nitrum, origanum, pix sicca, piper, resina omnis, ruta, stichas, sesamum, sampsychem, styrax, sulphur, sagapenum, sterces omnes, terebinthina.

Quæ ora vasorum aperiunt. C A P. LII.

V enarum & arteriarum ora aperiuntia medicamenta Græcis *ἀνασφραγιστικῆς* vocata, calida sunt, acria, mordacia, crassarum partium, & terrena, ut lib. 5. de simp. medic. fac. c. 13. testis est Galenus. Eiusmodi sunt, allium, anemona omnes, cepa, fel taurinum, cyclaminus.

Quæ Vasorum ora obstruunt. C A P. LIII.

O bstruentia medicamenta, Græcis proprie *σφραγιστικῆς*, Galeno loco iam citato auctore, dicta sunt, quæ ora vasorum constringunt & contrahunt, aut quæ sensibiles excretiones cohibent. Hinc est, quod alio nomine *συνάροντα*, *κλείοντα*, *καὶ σφραγιζόντα*, hoc est, *contrahentia*, *occludentia*, & *constringentia* dicantur. Hæc frigida natura sunt, crassarum partium, & adstringentia, ut bolus armenia, balaustium, & alia complura supra c. 49. commemorata.

Quæ rarefaciunt. CAP. LIV.

Rarefacientia Græcis ἀραιωτική appellata sunt, quæ moderato suo calore, quem inferunt, cutis meatus reserant ac dilatant. Horum natura modice calida, minimum desiccans, & tenuium partium, ut *chamamelum althea*, & quod ex ipsis præparatur oleum, nec minus, quod ex cucumere agresti, *oui album, thus, oleum vetus, & cicinum*.

Quæ densant. CAP. LV.

Densantia, Græcis πυκνωτική dicta, prioribus plane contraria sunt, propterea, quod meatus corporis contrahant. Horum utique natura frigida, nec terrea, nec aerea, sed aquea, sic ut tenuem substantiam non exprimant, sed eam totam compingant, ut est *aqua frigida, semperuium, portulaca, tribulus viridis, lens palustris, psyllium*, & ut semel dicam, quæcunque refrigerant, sed non adstringunt.

Quæ obturant. CAP. LVI.

Obturantia nominamus medicamenta, quæ Græcis ἐμπλαστικά appellantur, ea nimirum, *Galeno lib. 5. de simpl. medic. facul. cap. 10. teste*, quæ illita corporis meatibus tenaciter inhaerent. Alio nomine Græcis ἐμφορητικά, latinis *insarcientia, obstructionem facientia* nuncupantur. Hæc consistentiam nacta sunt siccam, citra tamen mordicationem terrenam, ac glutinosam: cuiusmodi sunt, *amylum, cerussa, calx lota, cadmia, cimolia, alica, pompholyx elota, terra Samia*.

Quæ meatus repurgant, & obstructionem tollunt. CAP. LVII.

Meatu repurgantia medicamenta emplasticis contraria sunt, Græcisque ἐνρρεγνικά vocantur. Hæc mordacitatis expertia non sunt, sed nitrosa & subtilia. Alio nomine Græcis ἐμφορητικά, latinis *obstructiones tollentia, & insarctum liberantia* latinis appellantur, ut *erui farina, & lupinorum, amygdala amara, nitrum, aphronitrum, spuma nitri, abrotonum, seriphium, urtica semen, scilla, iris, aristolochia, asparagus, absinthium, chamapitys, cassutha, capparis cortex, lichen, serum lactis*, & quæcunque in se vincentem amaram qualitatem obtinent. His quoque medicamentis inest, ut crassios lentosque humores extenuent. In extenuantiam autem numero est *artemisia, cinamomum, hyssopus, iris, illyrica, iuniperi bacca, pulegium, stichas, & calamintha*.

Quæ exstergunt. CAP. LVIII.

Exstergentia, Græcis πυντική dicta sunt, quæ in superficie sordem a cute, & ulceribus, *Galeno ubi supra attestante*, auferunt ac tergent. Differunt ab iis, quæ meatus repurgant, & obstructiones tollunt, quod illis sunt imbecilliora, & viribus inferiora, dulcia, & salsa, cuiusmodi est *mel, amygdala dulces, mulsæ, saccharum, hordeum, cicer, radix iridis, faba, sal, terestibinthina, lupinorum & erui farina*.

Quæ emolliunt. CAP. LIX.

Emollientia, Græcis μαλακτικά vocata sunt, quæ id, quod concretum est, fundunt, *Galeno lib. 5. de simpl. medic. facul. cap. 6. auctore*, & sensim per halitum discutiunt, nec admodum calida, nec valde etiam sicca existunt. Eius generis sunt *ammoniacum, adipēs omnes, atriplex, bdellium, butyrum altheæ radix, adeps caprinus & taurinus, cera, colophonia, fœnum græcum, crocus, galbanum, ladanum, linum, lilium, lithargyrum, malua, nigella, opoponax, æsopus, pix, resina omnes, medulla ceruina, & vitulina, styrax, viscum*.

Quæ indurant. CAP. LX.

Indurantia medicamenta, Græcis σκληρυντικά nominata, *Galeno lib. 5. de simplic. medic. facul. cap. 9. teste*, viribus sunt frigida & humida, veluti, *portulaca, psyllium, lenticula palustris, semperuium, & solanum*. Siquidem concretione, non vacuatione, propriè loquendo, durum aliquid efficitur.

Quæ suppurant. CAP. LXI.

Suppurantia siue pus mouentia medicamenta Græcis ἐκπυόνια dicta, sunt quæ humorem tumores præter naturam excitantem, & carnem contusam, in pus vertunt. Hæc cognatæ ac simillimum corpori, cui admouentur, & ipsa immutanti, calorem obtinent. Sunt etiam mediocriter humida, ita nimirum, ut nec augeant, nec minuant naturalem eius partis, cui admota sunt, humiditatem, ut *lib. 5. de simpl. medic. facul. cap. 5. testatur Galenus*, quod saltem manifestum sit, & sentiri queat, sed aliquid excrementi in vacuis spatiis contenti discutiant. Talia sunt, *althea, aqua temperata, adeps porcinus, vitulinus, butyrum, crocus, cera, fœnum-*

A *ſænumgracum, farina lolii, bryonia radix, capita liliorum alborum, hordei farina, tritici farina, ladanum, lini ſemen, maſtiche, æſopus, pix, thus, reſina, ficus, ſtyrax, ſtichas, & ſmyrnum.*

Quæ cruſtas efficiunt, & adurunt. C A P. L X I I.

Medicamenta, quæ admota corpori cruſtas efficiunt, Græcis *καυστικά* nuncupantur, & *καυσικά*, id eſt, *adurentia*. Hæc in quarto ordine ſunt calida, & conſiſtentia craſſa, ignisque inſtar, & cauterii ritu corpus colliquant, cruſtasque excitant. Qualia ſunt, *allium, æſuſtum, auripigmentum, cantharis, cinis, præſertim ſiculna, calx viua, chalcanthum, chryſocolla, pyrethrum, ſinapi.*

Quæ putrefaciunt. C A P. L X I I I.

Putrefacientia medicamenta Græcis *συνίμια* vocata, ſunt, quæ carnem, mollem maxime ac teneram, tum liquare, tum colliquare poſſunt, idq; abſq; dolore, vt ſunt *arſenicum, chryſocolla, dryopteris, pityocampe, aconitum, & ſandaracha*. Ex iis ſunt proprie putrefacientia nominantur, quæ ſcilicet cum fœtore corrumpunt. Inter putrefacientia recenſentur, quæ Græcis *καταρρεντικά*, latinis *detraçtoria*, aut *carnem imminuentia*, quod nimirum extimam ſuperficiem detrahant, & carniū excrescentiam imminuant & abſumant, vocantur. Imbecilliora enim ſunt, quam quod in altum ſubire valeant. Cuiuſmodi ſunt *aſia petra ſlos, æris ſquama, æſuſtum non lotum.*

Quæ cicatricem inducunt, & glutinant, carnemque generant. C A P. L X I V.

Cicatricem inducentia, Græcis *ἐπιλωπικά* nominata; Galeno lib. 5. de ſimp. medic. fac. cap. 15. auctore, ſunt proprie loquendo, quæ cutem contrahunt, conſtringunt, conſtipant, denſant, præterea ſiccant, & calli inſtar indurant. Differunt ab iis, quæ Græcis *κολλήματα*, Latinis *glutinantia* dicuntur, quod hæc minus quam illa ſiccant. Nam in glutinandis vlceribus ſiccandū ſolum, quod præter naturam confluit, quo nimirum laborans particula ſuperuacuis vacet. In cicatrice autem ducenda, non modo, quod confluit, verum etiam humor qui in ipſa carne continetur, eſt cōſumendus, vt ſcilicet caro in cutis ſimilitudinem mutetur, quæ carne multo aridior exiſtit. Carnem vero generantia, quæ Græcis *σαρκοπικά* dicuntur, iis omnibus minus in primo quidem ordine ſiccant, & modice ſineque morſa detergunt, quemadmodum copioſius lib. 3. Ther. meth. c. 4. & 5. Gal. docet. Leuiora ſunt *thus, aloë, colophonia, hordei farina*. Vehementiora, *ariſtolochia, cadmia, erui farina, iris*. Sarcotica vero nominantur, non quod carnem reſtituant, ſed quod naturam, quæ carnis generandæ opifex eſt, in procreanda carne iuuent. Ceterū glutinant, & cicatricem inducunt, quæ ſequuntur, *aloe, alumen, amyllum, ariſtolochia, althea, anagallis, bolus armenius, balauſtium, centaurium, chamædrys, chamæpitys, cadmia, corallium, dracontium, equiſetum, eupatorium, ebulus, æſuſtum, gummi acatie, gentiana, glans, gypſum, iris illyrica, iſatis, lolium, lyciū, myrtus, myrrha lithargyriū, palmula, plantago, pentaphyllum, pumex, plumbū elotum, perfoliata, papyrus uſta, ſymphytū maius, ſanguis draconis, ſarcocolla, ſpongia, terra lemnia, thus, tormētilla, teſta oui, verbenaca.*

Quæ vrinas mouent. C A P. L X V.

Vrinam mouētia, Græcis *διουρητικά* vocata, ex acrium ſunt genere, vt lib. 5. de ſimp. medic. facul. cap. 12. teſtis eſt Galenus, ac proinde calida & ſicca: præterea quod in ſanguine aqueum tenueque ac ſeroſum eſt, ſegregant. Cuius ſane generis ſunt, *apii ſemen, ammi, aſarum, acorum, dauci ſemen, ſæniculi, betonica, radix aſparagi, polium, meum, ſeſeli, phu, ſmyrnum, & omnia fere, quæ menſes cient.*

Quæ menſes cient. C A P. L X V I.

Menſes cientia medicamenta ab iis, quæ vrinam mouent, differunt, quod minus ſiccant. Ea ſunt eiufmodi. *Aſarum, amomū, ariſtolochia, abrotanū, acorū, adiantū, abſinthiū, artemiſia, aniſum, aſphodeli radix, ammi, braſſica ſatiua, bryonia radix, betonica, cypari radix, caſſia, cinamomum, coſtum, cicer, calamus odoratus, caſtorium, capparis, centaurium maius & minus, chamamelū, calamintha, chamædrys, caſſutha, cyclaminus, dictamnus, dancus, gingidiū, ſæniculū, eryngiū, elleborus uterq; galbanū, heleniū, hypericū, heliochryſus, iūcus odoratus, iris, lili radix, leucoion, laſerpitiū, maiorana, marrubiū, myrrha, meliſſophyllum, naſturtiū, nigella, opopanax, organū, ocimū, pulegiū, piper, poliū, petroſelinum, peonia, ruſcus, ruta, radix rubia, roſmarinus, ſmyrniū, ſaluia, ſabina, ſagapenū, ſeſeli, ſerpillū, ſcordiū, ſtyrax, thlaſpi, trifoliū, ſtaphyliū, urtica, vitex, phu, thymū.*

Quæ menſes ſiſtunt. C A P. L X V I I.

Siſtūt mēſes omnia, quib. adſtriçtoria ineſt facultas, præſertim *acacia, anthedz, balauſtiū, ſurſapaſtoria, coagulū leporis, fragaria, hypocithis, cornu ceruinū, hyoſcyamus, licium, lapis hæma.*

zites, limonium, lysimachia, myrtus, nymphaea lutea, paonia semen, calyces glandium, rubus, oxyacantha, semperuium, symphytum, solanum, thus, vna passa cum nucleis. A

Lac generantia.

Qua lac & semen generant. C A P. LXVIII.

Lac generant, quæ mediocriter calefaciunt, Galeno libr. 5. de simp. medic. facul. cap. 20. teste, & exsiccant. Quæ vero plus quam expediat calefaciunt, quæque immodice desiccant aut refrigerant, partim qualitatem sanguinis vitiantia, partim ipsum minorem ac pauciorum reddentia, lac provenire prohibent. Lac autem gignunt, partim alimenta, partim medicamenta. Alimenta quæ boni sunt succi, & mediocriter calida & humida. Medicamenta, quæ pituitosos succos excalefacientia in sanguinem conuertunt. In lactis itaque procreatione sanguis contemplandus venit. Si enim is paucus est, vniuersam victus rationem excalefacientem & humectantem esse oportet. Sin deterior, siquidem biliosus fuerit, primum purgationem desiderat, mox victum iam dictum. Si vero pituitosior, medicamenta requirit excalefacientia aut primo, aut secundo ordine, non tamen desiccantia. Inter ea potiora sunt, quæ non tantum sunt medicamenta, sed & nutrimenta, veluti eruca, fœniculum, & anethum, virentia adhuc. Huius generis est smyrnium, apium, sium, & polium. Ceterum semen generant cibi, qui bene nutriunt, & flatuosi sunt, totisque substantiis familiares: medicamenta vero flatuosa, & calida, vt bulbi, cicer, faba, polypodes, conus, scincus, satyrion, lini semen, & eruca. Exstinguunt contra, desiccantia, refrigerantia, & quæ totis substantiis sunt contraria, vt ruta, agnus, nymphaea. B

Semen generantia.

Exstinguuntia.

Qua leniunt dolorem. C A P. LXIX.

Dolorem mitigantia.

Dolorem lenientia & mitigantia, Græcis ἀνώδυνα, καὶ παρηγεῖν καὶ παύειν appellata sunt, quæ primo ordine calefaciunt, ac tenuium partium existunt, vt anethinum oleum, chamamelinum, chamamelum, fœnumgracum, linum, panis calidus, adeps asferinus, gallinaceus, suillus, vitellus oui. De quibus plura lib. 3. cap. 4. dicemus, vt non sit opus de illis hoc loco copiosius tractare. C

Qua stupesciunt. C A P. LXX.

Somnifera. Stupescientia.

Medicamenta Græcis ὑπνωτικά, id est, soporifera, & ἁρεστική, hoc est, stupefacientia, dicta sunt, quæ corpus nostrum refrigerant, & sensum eousque obstupefaciunt, vt si paulo liberalius ebibantur, mortem afferant, vt opium, cicutia, mandragora, papauer, solanum, hyoscyamus, & id genus alia, de quibus loco paulo ante indicato fusius agemus.

Qua venenis resistunt. C A P. LXXI.

ἀλεξιμελεια. ἀλεξιφάρμακα.

Quæ venenis aduersantur & resistunt, Græcis ἀλεξιμελεια καὶ ἀλεξιφάρμακα nuncupantur. Sunt tamen, qui priuatim ea, quæ venenatarum bestiarum ictus aut venena sanant, ἀλεξιμελεια nominant: ea vero quæ deleteriis medentur, ἀλεξιφάρμακα. Horum quidem medicamentorum duplex est natura, vt lib. 5. Simp. med. cap. 17. Galen. testatur. Siquidem quædam alterant, quædam vero vacuant ex laborante corpore, seu venenum corrumpens, seu deleterium medicamentum. Alterant autem vel vna qualitate, aut duarum coniugatione, aut denique tota substantia. Vacuant vero totius substantiæ similitudine, & caliditate subtilium partium, vt latius loco iam monstrato Galenus docet. Venenis autem resistunt, quæ sequuntur: Abrotanum, anisum, aristolochia longa, absinthium, allium, adiantum, ammi, apium, bdellium, butyrum, brassica succus, bolus armenius, bryonia radix, cepa, cyperis radix, betonica, castorium, cardamomum, citrii mali semen, chamadrys, cyclaminus, casia, costus, calamintha, erysimum, fœniculum, gentiana, galbanum, iuniperus, libysticum, marrubium, iuglans, origanum, pulegium, polium, laserpitium, piper, ruta, rapisatiui semen, terra lemnia. E

Qua ambustis medentur. C A P. LXXII.

Adeps suillus, althæa, acacia, asphodelus, atramentum sutorium, adiantum, alumen, scissile, beta, corium vstum, bulbi hyacinthi, & liliorum alborum, cynoglossum, cimolia terra, ebulus, gallium, gummi arabicum, hederia, hypericum, helxine, lactuca sylvestris, malua, morus, ouum, plantago, semperuium, sesamum, stercus ouillum, columbinum sambuci folia, thus verbasum. De quibus plura apud Paulum lib. 4. cap. 11.

Qua strumas discutiunt. C A P. LXXIII.

Adiantum, aparine, althæa, capparis radix, coriandrum, cortex fabarum, iris, hordei farina, lens, lupinum, lolium, lapatum, melissophyllum, laserpitium, lithospermon, galiopsis, nasturtium, plantaginis radix, pix liquida, piper, pentaphyllum, scordium. De quibus copiosius in lib. 5. medendi rationis nostra cap. 10. diximus.

Qua

Qua purgant. CAP. LXXIV.

- A** Medicamenta quæ Græcis καθαρτικά, Latinis purgatoria vocantur, bifariam accipiuntur. Vno enim modo communiter ac generatim sic appellantur medicamenta, quæ quouis modo corporis excrementa expurgant. Qua quidem ratione omnia medicamenta, quæ a quibuscunque corporis partibus vacuant, purgantia dicuntur nempe ἴσχυρα, βλεφαρῶν, ἀπορροήματα ποιοῦν, ἰσχυρὰ, Græcis dicta, id est, quæ per nares vacuant, tussis mouent, a capite vacuant pituitam & urinam elicientia. Altero modo per excellentiam, pro iis solum, quæ vel vomitu, vel alia deiectione expurgant. Atque horum tres notantur ordines. Vnus est malignorum, in quibus vis & substantia inest venenata, ut est *chamælea*, *colocynthis*, & *scammonium*. Alter est mediocrium, qui a priorum malignitate nonnihil declinant, ut est, *agaricus*, *rhabarbarum*, *aloe*, *sena*, & eiusmodi. Tertius benignorum, quæ scilicet minimum ab alimentum natura deficiunt, cuiusmodi sunt *casia*, *manna*, *pruna*, *myrobalani*. Quæcunque vero hac lege purgant, ea trahendi vim obtinent, alia vnum quempiam humorem, alia duos, aut etiam plures. Trahunt autem humores, non communi & promiscua quadam vi, sed Galeno lib. 3. de simp. medic. facul. cap. 24. aliisque locis multis teste, totius substantiæ essentiaue similitudine, amicitiaue seu qualitatum quæ in substantiis sunt adeoque insita familiaritate. Nihil enim refert, utro loquendi modo utaris, quemadmodum metipse Galen. lib. 5. iam citati operis cap. 16. testatur, ubi ita scriptum reliquit: *Qualitatis familiaritas attrahere nihil aliud est, quam totius essentia similitudine trahere*. Nam qualitatum familiaritatem, amicitiam, consensumue non vocat Galenus, nisi proprietatem illam, quæ in natura seu vniuersa substantia consistit. Non est autem substantia illa rei materia, a qua vnumquodque aut tenuis, aut crassæ substantiæ dicere solemus, neque huius substantiæ similitudo attrahendi causa existit. Nam neque agaricus, neque colocynthis tenuis substantiæ quum sit, crassiorem pituitam: neque rheum barbarum quod adstringentis & solidæ crassæque substantiæ sit, tenuem bilem educeret, sed præstantior est tota illa substantia, a qua tanquam ab intimo principio defluit & manat, quæ totius substantiæ proprietas appellatur. Hæc igitur quum neque materia sit, neque temperamentum necesse est rei forma, ut Philosophi loquuntur, sit, præcipua ac tota rei compositæ, ut Galenus vocat, substantia existit. Hæc utique proprietas, quia obscuritate naturæ ita inuoluta est, ut neque euidenter percipi, neque verbis dici possit, occulta & cæca rerum proprietas, quod scilicet neque colore, neque sapore, neque odore, neque ullis sensuum qualitatibus, sed solis operibus percipi possint: & Græcis non raro ἰδιότης ἀπὸ τοῦ, id est, proprietas quæ efferri non potest, nominatur. Harum itaque occultarum qualitatuum causa, quum nec in primis, nec in secundis qualitatibus monstrari possit, rectissime in totâ rei essentiam substantiamue transfertur, & ob id similitudo totius substantiæ dicitur. Hanc totius substantiæ proprietatem siue similitudinem, non solum Medici, sed & Philosophi statuere coguntur, dū eo veniunt ut effectus rei cuiuspiam ratio nequeat vel acutissimi hominis ingenio explicari lucemque recipere, neque quoquo modo primorum elementorum naturis attribui. Per Philosophos autem non omnes, qui hoc nomine superbire voluerunt, intelligimus, sed veteres illos tantum Philosophiarum procures, qui non omnium quæ fiunt, sed quorundam duntaxat rationes ab elementis petierunt, neque causas eas attigerunt, quas generali nomine occultas rerum proprietates appellant. Hinc est quod Aristoteles quoque naturalem Philosophiam instituens, quæ ex primis rerum naturis atque ex rebus sensu perceptis demonstrationes affert, dū forte in abstrusas & inexplicabiles huiusmodi quæstiones incidit, earum solutione certaque definitione se abstinens, inquit, omnes esse supra captum humanæ mentis. Ut valde ineptos esse, & Philosophi nomine indignos oporteat, qui omnium rerum naturales rationes ac causas afferri posse existimant. Ut præclare dixerit Theophrastus, eos qui de omnibus rationem quarunt, simulcum ratione scientiam tollere: imo verius eos rationem petere eorum, quorum neque est, neque fuit. Merito igitur illis euenit, ut dum omnium actionum causas producere conantur, non leuibus se ambiguitatibus implicent, & alter ab altero, quo sapientior & acutior videatur dissentiat. Quapropter rectissime Galenus Philosophiam naturalem quæ se intra suos limites non continet, contemnit, & ab huius studio Medicos debortatur, quod scilicet innumerabiles tum ambiguitates, tum errores, eos qui illam sectantur, coniciat. Quum itaque actionis purgantium medicamentorum causa ab elementis, ac primis secundisque qualitatibus peti non possit, optima ratione hanc a tota substantia, seu occulta eorundem proprietate qualitateue

Purgatoria medicamenta duplicia. Generatim.

Per excellentiam.

Purgantia medicamenta trahunt humores sibi familiares totius substantiæ similitudine.

Qualitatum familiaritas.

Occulta proprietates.

Similitudo totius essentia. Philosophi etiam ad totius substantiæ proprietatem siue similitudinem confugere coguntur.

Lib. 1. Metaph. cap. 5

Lib. 2. simplic. cap. 5. Quam Philosophiam contemnit Galenus.

Aduer-
siorum
Galenī cō-
futatō.

Puteani
libellus ad-
uersus Ga-
leni de-
purganti-
bus medi-
camentis
senten-
tiam.

Superbia
commu-
ne Philo-
sophorū
vitiū.

Philoso-
phorum
inter se
diffidiū.

proficisci statuit. Verum hic non desunt qui hoc Galeni placitum miris modis exagitar, A
& tanquam a veritate abhorrens explodunt. Nam habet hoc seculum homines quo-
rum hoc vnicum est studium, vt quæ a veteribus etiam optime dicta sunt, conuellant,
sugillant, & misere lacerent, adeoque non secus vitent quæ quis antea dixit, quam Aspi-
des vel Basiliscos. Ea plane res transuersos agit quam plurimos hodie scriptores, assertq;
in disciplinas memorabiles errores, & perniciosos, dum mauult quisque auctor esse suæ
sententiæ, quam assertor aut enarrator alienæ. Cæci non vident quanta sit laus, & paru-
isse bene monenti, & recte docenti assensisse: aut certe longe malunt, se scientes pru-
dentesque falsum pro vero affirmare, quam alienæ opinioni acquiescere. Hoc itaque
nouitatis pruritum laborans Gulielmus Puteanus, nuper libellum edidit, in quo magno
studio Galeni sententiam, *medicamenta purgantia a substantiarum similitudine succos trahere*, B
asserentis explodere nititur. Nam hanc tuam occultam proprietatem Philosophis &
Medicis, si Diis placet, inauditam esse ait: quod tamen falsum esse, ex iis, quæ paulo ante
diximus, abunde constat. Proinde medicamenta purgantia non a totius substantiæ pro-
prietate siue similitudine succos trahere, sed a forma sua substantiali efficiente, vt a pri-
mo trahente & præcipuo, atque a temperamento natiuo, tanquam secundo, siue instru-
mentario mouente contendit. Quod dum facit, non aliud conatur, vt fuit hoc homi-
num genus perpetuo superbum, quam vt medicos cogat philosophico more, a quo ta-
men frequenter, & nequaquam temere, abhorrent, loqui. Quasi vero si etiam ad for-
mam medicamentorum actiones referamus, res sit intellectu faciliior, quam si similitu-
dini totius substantiæ illam feramus acceptam: quum palam sit longe esse hanc recen- C
tium Philosophorum loquendi rationem quam Medicorum obscuriorem: siquidem
inter hos magna hodie est contritio, quid forma sit substantialis. Etsi enim in eo consen-
tiant, quod forma sit quæ toti essentiam largiatur, tamen quid tandem ea sit, inter illos
non satis conuenit: aliis hanc cœlitus dimitti & diuinam esse, aliis de potentia materiæ
educi, aliis quatuor elementorum mixturam & temperaturam, nonnullis ignem, qui-
busdam spiritū feruidum esse dicentibus, & tñ interim nihil nō ad formam referre stu-
dent. Quod forte ferendum esset, si in ceteris omnibus etiam illi inter se conuenirent,
& non circa singula inter se pugnarent, atque dissentirent, perpetuamque hanc per se-
cula litem alerent, & quod Firmianus ait, vnaquæque secta, quas sane multas habent, om-
nes alias euerteret, & se suæque confirmaret, nec vlla alteri sapere concederet, ne de- D
siperet se fateatur. Quid multa? Philosophorum ratio nihil constans persuadere potest,
sed semper in lubricis opinionib. vacillat, nec intellectus ad omnia incertus habet, & te-
neat. Quumque de singulis Philosophi disputant & opinantur, de nullis certi sunt. Hinc
tot, & quidem inter se ex diametro pugnantes de principiis rerum naturalium, mundi
pluralitate & duratione aliisque rebus compluribus opiniones ac dissensiones, quas Di-
uus Augustinus *lib. 18. de Ciuitate Dei c. 41.* percenset, natæ sunt. Quæ non ideo a me com-
memoratur, vt in vniuersum Philosophorum doctrinam damnam: sed vt moneam, ne
hanc ita cum medicina misceamus, vt ad illorum præscriptum nobis perpetuo loquen-
dum esse putemus: quum constet, inter illos suorum dogmatum nullum esse cōsensum:
& vt studiosi intelligant furore quodam nouitatis correptos esse hodie plerosque, qui E
dogmata Medicorum omnium, tum Græcorum, tum Arabum, consensu recepta, fu-
catis Philosophorum rationibus suspecta reddere conantur. Hi sane sunt, qui nulli sub-
scribere in animum induxerunt, ignominiam existimantes, si non aliis doctiores ab om-
nibus reputentur. Alios qui veterū scripta interpretari student, furti accusant: nec vl-
lum laudē aliquam mereri putant, qui non alicuius noui dogmatis auctor esse velit. Ho-
mines mehercule quauis venenata tera nocentiores, q. non solum plurimos seducant,
sed & vt multi indubitationē rapiantur, efficiant. Quo nomine fit, vt ad veritatis cogni-
tionem peruenire nunquā possint. Et nisi Deus optimus maximus excitauerit viros ali-
quot pios, & veritatis doctrinæ amātes, qui se horum conatib. opponant, & illorū nugæ
explodant, propediem medicinæ eueniet, q. superiorib. annis Theologiæ accidisse cō- F
pertum habemus. Hanc n. ita Philosophorum deliramentis obscuratam fuisse constat,
vt ne vestigiū veteris & veræ Theologiæ relictū fuerit. Vt scitissime a nostratiū quopiam
dictum sit, referente Diuo Hieronymo, Philosophos esse patriarchas hæreticorum, vt
appellant, id est, impiarum sectarum, mendaciorum, dissidiq; auctores. Quod verum
esse

- A** esse omnium temporum historiarum testantur. Quapropter & illud Pauli mihi vsurpare libet: βλέπετε μή τις ὑμᾶς εἰς αἰὲς οὐλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης. Ita enim eos diuus Paulus appellat, quod per inane nomen sapientiarum, simplices seducebant. Ex horum quidem numero, ut diximus, est Puteanus, qui, ut noui dogmatis auctor esset, & cornicum, quod dicitur, oculos cōfigeret, ad formam substantialem potius, quam substantiæ similitudinem purgantium medicamentorum actionem referre voluit. Et tamen interim fateretur substantialem formam merito nos substantiam totam vocare posse, quia sine ea materia prima constare & coherere nō possit. Quare, inquit, si per totam substantiam, formam substantialem intelligat Galenus, cum eo sane fatemur attractionem humorum a tota substantia fieri. Si ignoras Putide Pureane, dicere volui, quid per totam substantiam Galenus intelligat, cur illius dogma, quod tibi non satis cognitum fuit, tanto fastu sugillare ausus es? An non ille multis in locis ingenue fateretur, se ignorare, quæ sit formæ essentia? Quomodo enim ille se cognoscere eam impudenter iactaret, quam Philosophis nondum satis perspectam esse intelligebat? Quum itaq; Galenus, & alii, qui hunc securi sunt, formarum naturam & essentiam ignorarent, adeoque quid illæ aut agere aut pati valerent, non satis intelligerent, maluerunt hoc genus actionum in occulta proprietate, vel tota rei agentis substantia, quam forma substantiali, & merito quidem, ponere. Nam quum hæc actio, nec temperamentorum duntaxat, nec materialium sit, sed horum certe omnium, rectissime toti substantiæ hanc tribuerunt, quam Philosophi formam substantialem, alii proprietatem, virtutem seu qualitatem occultam, quæ rationem formæ sequitur, appellare maluerunt. Nominet vero vnusquisque ut velit, Galenus certe similitudinem substantiæ, vel qualitatis familiaritatem, & nonnunquam simpliciter qualitatem vocat. Siquidem solenne est Galeno & Hippocrati quoque, ut quas formas rerum Philosophi, ipsi qualitates, quæ secundum rei naturam insunt, & naturas appellent. Quapropter non magnopere resistendum esset Puteano, quod purgantium medicamentorum actionis causam, formæ substantiali acceptam ferret. Quod vero subiicit in eodem libello, causam hanc a qualitatibus elementariis primis, vel secundis dependere, hoc est, ut metipso interpretatur, ab immodico calore, & acrimonia iunctis cū nidore quodam naturæ ingrato, id ferendum nullo modo erit, maxime quum eam etiam fuisse Galeni sententiam dicat, & quasi ille quoque purgantia omnia esse calida, & acria, suoque calore & acrimonia trahere scribat. Nam quam falsa & a Galeni mente adeoque veritate ipsa abhorrens hæc sit Puteani sententia, paucis iam ostendemus. Si calor & acrimonia tractionis humorum a purgantibus medicamentis causa erit, certe ut omnia calida & acria intra corpus sumpta idem efficere posse fateamur necesse est. Sed falsum id ipsum esse, experientia quotidiana conuincit. Siquidem plurima sunt vehementer calida & acria medicamenta, quæ tamen trahendo ad se humores non purgant: ut est, *piper, nasturtium, sinapi, zingiber, pyrethrum*, & id genus alia. Præterea si caloris ratione medicamenta purgantia traherent, concedendum esset, ea nullos certos, sed quosuis sibi obuios trahere humores. Nā calor quicquid sibi occurrit, & ut trahat magis idoneum est, ad se allicit. Purgans autem medicamentum, quum in corpus assumptum fuerit, ut *lib. I. de humana natura testatur Hippocrates*, primum eum humorem, ὃ αὐτῷ κατὰ φύσιν μάλιστα ἔστι, id est, qui maxime sibi secundum naturam & cognatus est, deinde reliquos quoque trahit & purgat. Sic certe medicamentum pituitam purgans: Primum pituitam trahit longius etiam distantem, dimissa ac præterita interim flaua bile. Denique si calor tractionis medicamentorum causa esset, concedendum foret id magis ceteris trahere & purgare, quod calidius esset: id quod tamen manifestissime falsum esse constat. Quippe Colocythis & Elaterium validissime trahunt & purgant, quum tamen minus quam Sinapi aut Nasturtium sint calida. Non etiam vrget Puteani argumentum, quo colligere nititur, calorem causam esse tractionis medicamentorum, propterea, quod omnia medicamenta purgantia sint calida. Est enim hic fallacia cōsequentis, ut *Dialectici* appellant. Perinde enim est, ac si ita quis colligeret: *Omnes homines sensu tactus sunt præditi, Asini sensu tactus donati sunt, igitur asini sunt homines*. Quum itaq; hoc modo Puteanus colligit, omnia trahentia sunt calida, medicamenta purgantia omnia sunt calida, igitur medicamenta purgantia trahunt: cōsequentiam negamus, propterea, quod hac ratione in secunda figura ex puris, ut loquuntur *Dialectici*, affirmatiuis nihil sequatur. Ceterum non negamus

Purgantium medicamentorum actio non a primis vel secundis qualitatibus dependet.

Aphor. 31.

Calor tra-
ctionem
medica-
mentorū
iuuat.

Forma
virtus
quid.

Purgan-
tiū actio
vt perfici-
tur.

Medica-
mēta pur-
gantia be-
nigna.

Vehemen-
tiora.

Forma.

Delectus.
Tempera-
mentum.
Facultas.

Pondus.

tamē calorem ad attractionem aliquid conferre, non tñ vt primum efficiens, sed vt ad-
iuuans tm̄, & validiorem tractionē reddens. Atq; huc videtur respexisse Galenus, dum
lib. 3. de simp. medic. facul. cap. 25. scribit: *Cnicum calore suo quam pituitam valentiorē esse, vt tra-
here quam trahi magis par sit.* Siquidem caloris perpetuo proprium est vt attrahat, sed non
hoc magis quam illud: totius autem substantiæ, seu occultæ proprietatis, aut virtutis for-
mæ, vt attrahat hoc magis quam illud. Proinde vniuersalis, vt ita dicam, tractio a calore,
particularis huius vel illius humoris, a tota substantia, vel a formæ virtute perficitur. For-
mæ autem virtutem nō appellamus, nisi illam occultam seu indicibilem proprietatem,
quæ totam essentiam, vel, vt Philosophi loquuntur, formæ essentiam sequitur. Nam &
Themistius insitam rei proprietatē esse definit quippiam, quod rei substantia ex se pro-
fert, & tanquam de suo sinu promit, atq; ab illa dimanat. Occultæ igitur dicuntur, nō q̄
omnino a nobis percipi & comprehendere nequeant, vt nonnulli cēsent, quando quidem
eas experientia deprehendi constet, sed quod gustu, aut ratione monstrari & cognosci
haud possint. Quapropter vt tandem dicendi finem faciamus, medicamenta purgan-
tia medio quasi ordine inter alimenta & deleteria dicta confederunt, q̄ neq; vt alimen-
ta in nostram substantiam conuertantur, neq; hanc prorsus corrumpant. Extremorum
igitur naturam participant, quod partim nobis similia, partim dissimilia sint. Atq; dum
nec vinci omnino, neque vincere possint, inimica dissimilitudine velut per seditionem
exiguntur & exterminantur, secum interim similitudinis necessitudine eum humorem
abducunt, cām quo illis maior est affinitas, amicitia, seu familiaritas. Quæcūq; autem
ab iis in alimētorum extremū latius propius accesserunt, qualia sunt, quæ benigna vo-
cantur, ea si suo purgandi fine quauis occasione frustrent, in humore, ad quē educēdum
apta erant, conuertuntur, ceduntque nonnunquam in alimentum corpori. Quæ vero a
medio in latus deleteriorum magis declinant, quod genus sunt vehemētiora, si quando
purgandi finem nō assequuntur, corpori grauiter incommodant, quemadmodum fu-
sius *lib. 3. de simpl. med. facul. cap. 24. & 26.* Galenus docet. Ceterum quum in medicamen-
torum simplicium numero, quæ per excellentiam purgantia nominantur, quædā, vt iam
diximus, benigna sint, ac blande, quiesce, suauiter, ac sine molestia humores noxios, non
quidē totius corporis, sed quarundam duntaxat partium vacuent, aluumq; subducāt, atq;
ob id barbaris ac recentiorib. benedicta vocentur: quædā vero vehementia, & non ci-
tra molestiam & laboriose humores totius corporis noxios purgantia, ideoq; maligna
nominantur, de omnibus particulatim differemus; a leuioribus ac benignis orsi.

De casia nigra. C A P. LXXV.

Casia nigra recentioribus Græcis, Arabibus *fistularis fistulae* appellata, magna & pro-
cera est arbor in India, & Ægypto nascēs, folio Iuglandis, ordine, vt in *Fraxino*, dis-
posito, fructu siliquaue oblonga, tereti, vtrinque fastigiata, intus fistulosa, concretum
intus humorem continens nigrum, gustu prædulci, sed plane medicato non vna coa-
lescentem serie continuitateue, sed ex interuallis, ligneis tenuibusq; membranis inter-
uenientibus septum, seminalibus ossibus specie & figura non dissimilibus iis, quæ sili-
qua priuatim dicta profert. Hæc veteribus Græcis plane incognita, recentiorib. autem,
Actuatio præsertim, notissima fuit. Deligenda ponderosa, collucens, perplena, quam si
conculseris, inclusa intus grana seminaue non obstrepuunt. Refrigerare Græci recen-
tiores eam calores iecoris intemperatos, calidamq; & humectam primo ordine, perhi-
bent. Flauam bilem, sed magis retorridam, & quæ iam fere in atram degenerat bilem,
suauiter & citra molestiam, quod eius vis ventriculum non pertranseat, hæc ipsa expur-
gat. Quin etiam pituitam mediocriter educit. Datur iis audenter ac intrepide, qui ob
teneram ætatem, aut aliam quamuis causam deiicientia aluum medicamēta respuunt.
Præbetur pueris & foeminis vterum ferentibus commoditate & necessitate quadam
urgente, quibus validius aliud medicamentum sumere denegatum est. Item iis, quibus
exsuperans febris reliquorum medicamentorum vsus aspernatur. Casia quidem tribus
aut quatuor drachmis sumpta vix mouet aluum. Datur itaque a semiuncia ad vnciam v-
nam, si per os sumatur. In clysteribus ab vncia vna ad duas vsque exhiberi potest.

De Manna. C A P. LXXVI.

Manna Mauritanis, Arabibus, & Græcis recentioribus dicta, proxima est natura,
Marqui imbecillior, quare merito secūdum sibi a Casia locum arrogat. Hanc Gale-
nus

- A** nus *Melaerium* & *roscidum* vocat. Siquidem tanquam ros e cœlo cadit, vbi halitus e terra & aquis prodeuntes, solis calore sublatis, ac deinde exacte extenuati ac cocti, a frigore noctis in vnum coguntur & densantur, atque in mellitos grumos coit, Manna herbarum & arborum foliis inhærens. Sunt quibus *ros Syriacus*, & *Lybani* appelletur. Vergiliarum autem exortu, vel Syrio splendente, sublucanis temporibus venit, siue sit cœli sudor, siue purgantis se aeris succus, siue aquæ, siue naturæ liquor. Optima censetur, quæ recens est, splendens, candicans, & in purissimos grumos concreta, gustu melleam præ se ferens dulcedinem, nullis surculis aut foliolis implicata. Ceterum huic recentiores Græci eandem, quam *Cassia nigra*, tum temperaturam, tum vim tribuunt. Nam aluum deuorata, vel hausta ciet, tamen imbecilliter. Ideoque tum fœminis vtero gerentibus, tum pueris ipsis tuto semper exhiberi potest. Aliis medicamentis addita, vires eorum auget. Ceterum bilem quoq; flauam simplici ratione pellit. Datur iisdem quibus *Cassia nigra*. Maiori pōdere, quam *Cassia* sumitur. Datur enim ab vncia vna ad vncias tres. Mæ suæ tamen intra sescunciam consistit. Leuem certe, aut fere nullam, nisi magna quantitate sumatur, soluendi aluumq; subducendi vim habet. Quod iis compertū est, qui iuxta Libanum fuerunt. Nam referunt indigenas eius montis, quum abunde eo satientur, nihil tamen lædi, nec aluum sibi quoquo pacto subdūci sentire, sed eo tanquam obsonio nutriri. Quod partim consuetudini acceptum referendum erit, quæ facit vt ea, quæ medicamentū rationem habeant, fiant naturalia, quemadmodum anus Atheniensis exemplum, quod a Galeno *lib. 3. simp. cap. 18.* refertur, abunde docet. Quapropter quum mellis quodam modo similem facultatem habere constet, facile ea carere, maxime, dum infirmæ fortis hominibus, nec admodum abundantibus, medemur, liceret, modo peregrinorum admiratione, non ita duceremur, neq; stulti, contemptis nostratibus, e longinquis regionibus allatis vti potius, quā iis, quæ nostris in hortis proueniunt malle. Sed stultitiæ nostræ, temere sumtus immodicos facientes condignas damus pœnas. Ad principū aut & diuitum curationem adhibere Mannam nemo prohibet, modo sit optima, & nō exsolera. Quæ autem a me de manna dicta sunt, non ita intelligi volo, quasi prorsus eam a Medicorum vsu, veluti Matthiolus sinistre interpretatur, exclusam velim. Fieri enim potest, vt indigenis Libani montis, ob frequentem vsu, aluum non deiiciat, sed fere in alimenti naturam abeat, perinde atq; Cicutæ anui Atheniensis, cuius Galen. *lib. 3. de med. fac. cap. 18.* meminit, quæ ex consuetudine paulatim inducta, nihil nocuit, eiq; naturalis facta est. Verum quum Manna, non nisi magna quantitate sumta, nempe, vt ipse faretur Matthiolus, duarum & semis vnciarum, aluum moueat, & sumtuosum sit medicamentum, hac loquendi ratione Medicos admonere volui, ne illa tam frequenter, præsertim in tenuioris fortunæ hominibus, quum *Cassia nigra* copiam haberent, cui Græci recentiores eandem vim assignant. Quæ mihi hoc loco dicenda fuerunt, vt Matthioli cauillationes retunderē, & ne quis peregrinorū medicamentorū vsu penitus damnare putaret.

De *Oxyphænice*. C A P. LXXVII.

- O** *Zuqal* Actuario, Nicolao, & aliis recentioribus Græcis (nam e veteribus nemo quicquam de eo memoriæ prodidit) ab acido sapore dictus, syluestris palmæ fructus est. Hæc autem arbor est fronde saligna virens, pomo pruni figura, osse duro, nucleo intus exili, carne foris copiosa, colore e nigro in luteum languescente. Officinæ Medicorum a barbaris edoctæ Thamar Indum, id est, palmulam Indicā nominat. Plurimus n. apud Indos nascitur, qui palmulam sua lingua Thamar vocare consueuerunt. Ex iis, quæ ad nos importantur, nulli vel pauci admodum integri reperiuntur. Nam plerunq; contriti, & in massam quandam compacti deferuntur, quam si disseceris, flauos nucleos inuenies, varias formas referentes. Hincq; adeo fit, vt hodie nō per numeros, vt alii fructus, sed potius per pondera medicamentis indantur. Probatur recēs, pinguis, acido sapore, subniger, lucidus, tener, non exsuctus vetustate. Argentis naturæ est, & vt Actuar. scriptum reliquit, in 2. ordine refrigerat & humectat. Contra flauam bilem pollet. Nihil enim huius impetus æque domat, præter Rheon Indicū. Arquatis auxiliatur, sitim restinguit, doloribus capitis remedio est, noxios humores, qui in ventriculo coierunt, deiicit, appetentiam inuitat, cibi fastidium abigit, nauseas & vomitus sedat. Insaniam ac furorē mulcet. Tertianis febribus correptos cum Rheo & *Cassia nigra*, prorsus liberat. Ardentibus quoq; medetur. Noxas omnes a calore natas mitigat, destillationesq; quas bi-

Pondus. lis feruor excitauit, inhihet. Dandi pondus Actuario & aliis posteriorib. Græcis est vna. A
cia vna. Mesue eo, quod leuiter purgat, ab vnciis duab. ad quinq; propinari posse censet.

De Myrobalanis. C A P. LXXVIII.

Forma. **Genera.** **Flau.** **Nigri, siue Indici.** **Cepuli.** **Empelici.** **Beletzici.** **Temperamentum.** **Facultas.** **Flauorū.** **Nigrorū.** **Cepulorū.** **Empeliticorum.** **Belezicorum.** **Myrobalani obstru-
tiones
pariunt.** **Pondus.** **Puteani
opinio eo
futara.**

Myrobalani, veterib. Græcis & Latinis indicti, Actuar. teste, fructus sunt nobiles, me-
diocriter & citra noxam aluum cientes, qui ex Ægypto Syriaq; deportantur, cal-
lo corporis compactili, osse intus lignoso. Hos sane in quinque genera discernunt, quæ
non modo effectū differre obseruauerunt, sed & alia aliis gigni arboribus. Quidam enim
flauī seu lutei, eo quod herbaceo colore flauescant, vocantur, oblongi, spissi, ponderosi,
exili nucleo, cute crassa. Sepalsiæ hodie *Citrinos* appellant. Alii sunt, quos a colore cœru-
leo & in nigrum vergente nigros nominant, solidi, ponderosi, sine nucleis, oliuæ for-
ma. Officinæ *Indos* siue *Indicos* vocant. Nonnulli *Cepuli* vocantur, subnigri siue ex fusco
rubescētes, quo maiores, eo meliores, carnosī, ob id etiam graues, ut aqua mergantur,
pingues, ampli, & semidigitales, *Chebulo* Sepalsiæ nominant. Quarti generis *Myrobalani*
Empelici, vel, ut alii nominant, *Empelici* dicuntur, lapillorum pene figura, cute ossibus
hærente paruis, colore in cinereum languente. Hi tamen non integri, sed in fragmen-
ta dissoluti ac fracti ad nos perferuntur. Officinæ *Emblīchos* nuncupant. Quinti generis
Beletzici vel *Bellerici* appellantur, eadem quasi forma, qua Empelici, maiores tamen, &
instar pyramidis rotundi. Sepalsiæ *Belliricos* nominant. Temperamento sunt in primo
recessu frigidi, in altero vero sicci, ex Arabum, Mesues præsertim, traditione. Genera-
tim cor, stomachum, ventriculum, iecur, & intestina sua adstrictione roborant & fir-
mant, sed vlti multo magis, & eloti. Qua de causa ignem & aquam experti, magnam
purgantis facultatis iacturam faciunt, quod tenuioribus & siccioribus consistant parti-
culis. Horum etiam vsus ætatem conseruat integram, adeoque senectutem remoratur,
cutis colorem commendant, halitus præstant suauitatem, mentem exhilarant: & tri-
stitiam abigunt. Purgant ventriculum quisque pro sua, quæ illi insita est, proprietate. In
quibus itaque decumbens fluxio partem aliquam male habet, aut intestina exulcerat,
hos vltos & elatos adhibemus, & mediocriter aluum subducunt. Priuatim vero tria
prima eorundem genera capitis superuacuum humorem educunt, sed flauī, bilem fla-
uam, nigri atram, cepuli pituitam detrahunt. Flauī præterea corporis æstus refrigerant,
accensamq; bilem deiciunt. Nigri tristitiam discutiunt, quartanas & tremulos sanant,
lepras purgant, & corporis bonum restitunt colorem. Cepuli aciem oculorum illu-
strant, thoracem repurgant, coctiones iuuant, aquæ inter cutem, & longis febrib. auxi-
liantur. Empelici pituitam trahunt, præsent neruis & lethargicis, mentis aciem exa-
cuunt, ventriculum purgāt, cardiacis succurrunt affectibus, sitim sedant, fastidia discuti-
unt, comprimunt vomitus. Beletzici eiusdē quasi naturæ sunt, cuius Empelici. Me-
dentur autem peculiariter purulētis excreationibus, venis sedis, hæmorrhoidas vocāt,
sanguinem profundentib. capillorum defluuio, quos etiam denigrare tradūt, ex amygdalino oleo & melle triti. Ceterum non prætereundum nobis hoc loco erit, quod recte
Arabes monuerūt, Myrobalanos in vniuersum omnes promte obstructions excitare,
idq; ob adstrictoriam, quam obtinēt facultatem. Quare laborantib. obstructione per se
temere exhibendi non sunt, sed adiicienda illis medicamenta, quæ obstructions solu-
ere, adeoque adstrictoriæ eorundem facultati resistere possunt. *Flauorum* pondus est,
si in substantia propinentur, a drachmis duabus ad quatuor. Maceratorum a drachmis
tribus ad decem. *Nigrorum* in substantia a drachmis duabus ad semiunciam. Infusorum
a semiuncia ad vnciam vnā & dimidiam, si per se sumantur. Idem est pondus *Cepulo-
rum*, *Empeliticorum*, & *Belezicorum*. Atqui hic etiam, ut Puteani dogma explodamus ne-
cessē est, qui Arabes Myrobalanis pro purgantibus medicamentis non recte vsos esse,
ac falso singulis horum generibus succos sibi proprios attrahendi facultatem eosdem
tribuisse contendit. Nam, ait, *quum omnes frigidi, sicci, & adstringentes sint, adeoque vasa ob-
struant, fieri non potest, quaque facultate iam dicta, ut humores a iecore, vel membri ventriculo vi-
cinis meatibus, comprimendo obstructis, atque occlusis, myrobalani ad ventriculum trahant, attra-
ctosque deiciant*. Non videt autem principio Puteanus, non solum Arabes, sed & recen-
tiores Græcos, & inter hos magnæ auctoritatis & doctrinæ virum Actuarium, idem de
Myrobalanis, quod Arabes, & quidē ante illos, tradidisse. Dein quod illi vnanimi con-
sensu literis mandarūt, posteriorū quoq; Medicorū experientia comprobatū est. Præ-
terea

- A** terea prae studio ferendi noui dogmatis, parum quid dicat Puteanus animaduertit. Nam ratio illius procederet, si Myrobalani praeter eas, quas recēset, nullam aliam, quam ipse illis impudenter & non citra mendacium adimit, haberent facultatem. Habent autem purgandi facultatem, quod tum Graeci recentiores, tum Arabes testantur, & quotidiana eorum, qui medicinam faciunt, experientia confirmat. Hanc quum pro suo somnio, quod supra abunde confutauimus, ad calorem, qui in Myrobalanis nullus est, referre non possit, ut illis a tota substantia, inuitus etiam fateatur, insit necesse est. Quod itaque purgant Myrobalani, Graeci recentiores & Arabes non manifestis qualitatibus, sed occultae potius ipsorum proprietati, quae a tota eorundem substantia dimanat, acceptum ferunt. Et quum semper facultates illae, quae a tota substantia rebus insunt, iis,
- B** quae a qualitatibus prodeant manifestis, sint superiores, & primo suas exserant actiones, nihil mirum purgandi facultatem Myrobalanorum reliquas, quae illis etiam insunt, anteuertere. Et quidem Puteanus fatetur adstrictionem Rhabarbari ab amaritudine, tanquam maiori ac vehementiori, superari. Ut autem amaritudo veluti vehementior in Rhabarbaro vincit adstrictionem, ita utraque purgandi eius facultas superet necesse est. Hinc est, quod Rhabarbarum postquam purgandi facultatem, tanquam ceteris superiorem exseruit, tandem etiam & postremo adstrictoriam suam facultatem ostendat, ventriculum & intestina roborando. Idem etiam in Myrobalanis accidit. Quare recte Mesuae filius horum decoctum promptius & valentius obstruere scribit, quam macerationem. Nam decoctum elicit etiam porcionem substantiae earundem terream & adstringentem, quae purgatricem frangit: maceratio autem, tantum purgatricem. Quapropter Baptista Montanus perperam hoc loci Mesuae erroris infimulat, & decoctum Myrobalanorum magis, quam infusionem purgare contendit, quod scilicet, si Diis placeat, purgandi suam vim in crassioribus & terreis partibus, quandoquidem comprimendo purgent, habeant. Si enim ideo purgant Myrobalani, quod adstringendo & comprimendo soluant, cydonia certe inter purgantia numerabuntur: quae itidem a cibo sumta aluum subducere, Galeno etiam teste, possunt. Verum quum hoc ex accidenti efficiant, & non per se, inter purgantia numerari non debent, quod omnia haec per se, & sua purgandi facultate aluum deiciunt. Quare Puteanus merito recentiores erroris notat, quod ea, quae comprimendo tantum aluum soluant, in purgantium numerum
- D** adsciuerit. Errat autem & ipse, quod Myrobalanos hac etiam ratione aluum deicere putat, quum non sua compressoria seu adstrictoria, sed potius purgatrice, quae illi a tota substantia inest, facultate id praestet. Sed ut Montani errorem plenius detegamus, & Myrobalanorum vim purgatricem non inesse crassioribus ac terreis eorundem partibus ostendamus, sciendum erit, Montanum sibi ipsi ex diametro pugnare, quum in cap. de torrefactione scribit, ad fluores alui Myrobalanos torrefactos esse adhibendos. Quippe si tenues partes ex torrefactione exhalant, ut ipse etiam fatetur, crassiores vero ac terree remanent, inque iisdem, ut idem contendit, purgandi facultas Myrobalanorum inest, igitur torrefactos Myrobalanos magis purgare, quam non tostos fateatur necesse est. Si autem magis purgant, igitur ad compescendum alui fluorem inutiles sunt. Hinc itaque
- E** perspicuum euadit, purgandi facultatem Myrobalanorum non adstrictioni, sed potius toti eorundem substantiae tribuendam esse. Falsum igitur est dogma eorum, qui hos comprimendo purgare asserunt. Repudiandum quoque furiosum Puteani consilium, qui omnia Myrobalanorum genera a Medicorum praxi, ac Pharmacopolarum officinis prorsus esse eiicienda suadet, non solum, quia magnas obstructions toti corpori humano asserunt, ut ipsi quoque Arabes consentiunt: verum etiam, quia, ut quodam in loco scribit Fulginius Medicus, nulla eorum species non cariola, prorsusque corrupta ad nos defertur. Quod enim obstructions pariunt, id post expletam purgationem faciunt, ideoque in obstructionibus, quod paulo ante diximus, non exhibendi Myrobalani, aut illis permiscenda, quae obstructions soluant. Optandum denique esset, ut recentes haberemus:
- F** verum quum loca, unde asseruntur, longius a nobis distent, aridioribus utamur oportet, eorundem pondera augentes.

De sena. CAP. LXXIX.

Sena siue seno posterioribus tantum Graecis nota fuit. Abunde autem nobis in *tertio de stirp. histor.* descripta est, ut non sit opus hic eius integram texere historiam. V-

sus foliorum, & filiquarum eiusdem, quos folliculos vocant, existit. Efficaciores autem
 sunt, Mesue auctore, filiquæ, quæ scil. ante maturitatem demetiuntur. Sunt enim Senæ
 folliculi duum generum. *Alterum* per se caducum, & in stirpe arefactum, a quo semen
 eximitur nigrum, & prorsus fere euanidum. *Alterum* vero, quod ante maturitatem de-
 metitur, crassum, ponderosum, succo prægnans, & tegetibus expansum siccatur. Pri-
 mum genus, quo officinæ scatent, non modo minorem foliis vim deiectionariam habet,
 sed propemodum nullam. Alteri non minor, quam foliis aluum deieciendi vis inest. Ci-
 tra noxam, *ut Actuarius auctor est*, purgant trahuntue pituitam & bilem. Reliquos hu-
 mores modestissime purgat, retorridam atramq; bilem, earumque suffusiones ex galli-
 naceo iure depellunt. Vetusto capitis dolori, scabiei, comitialibus, imperigini succur-
 runt. Verum decoctum eorum potius quam farinam propinat. Mesue scribit tergere,
 discutere, citra molestiam melancholiam & bilem torridam purgare, a cerebro, senso-
 riis, pulmone, corde, iecore, & liene, corpus efficere floridum, obstructionsque visce-
 rum soluere, aliaque posse, quæ apud illum legere quivis potest. Ceterum pulveris pon-
 dus drachma vna. Decocti semiuncia, aut drachmæ quinque. Quidã ad vnciam vnam
 usque progrediuntur. In Guaiaci decoctione nonnulli adiiciunt semiunciam de ea, &
 interdum vnciam cum dimidia. Multis tormina concitat, aliis est clemens, pro varia su-
 mentium natura. Infrenatur eius malitia adiectione mastiches, vel caryophyllorum.

De Polypodio. C A P. LXXX.

Polypodii historia itidem alibi a nobis est conscripta. Radicis eius tantum usus est.
 Laudatur solidum, nodis plenum, & foris nigrescens, intus pistaciorum virorem re-
 ferens. Actuarius & alii posteriores Græci melancholici humoris purgandi vim ei tri-
 buunt, ideoque melancholicis affectibus mirabiliter confert. Dioscorides bilem & pi-
 tuitam trahere literis mandavit. Dantur purgatæ radices drachmæ duæ, affusa aqua
 mulsa. Mesue de ea exhibendum censet a drachmis duabus usque ad sex. Nostri eius ma-
 litiam infrenandam esse tradunt odoratis, semine nimirum anisi, zingibere, caryophyl-
 lis, & cinamomo, idque Mesues auctoritate, moti, nullo veterum exemplo.

De Epithymo. C A P. LXXXI.

Vid sit tum Græcis, tum Arabibus, Epithymum, supra, quum de floribus ageremus,
 est expositum. Vis Epithymi est, ut atram euocet bilem. Viriis statu turgentibus &
 hypochondriorum noxis opitulatur, & quibus iecur aggrauatur, & qui spirandi diffi-
 cultate laborant. Obstructionem lienis, & morbos inde ortos sanat, item quartanam,
 lepram, & vlcera ab atra bile pronata. Datur, *Actuario auctore*, adultis tusum & cribro
 excusum scrupulorum quinque pondere, cum decocto vuarum passerarum purgatarum,
 vel aceto mulso, & salis pauxillo. Dioscorides pondere quatuor drachmarum in sero la-
 ctis, aut mulsa ad melancholicum purgandum humorem exhibendum esse docet. Ægine-
 ta ad quinque progressus est drachmas. Mesue nimis audaculus, a tribus drachmis ad se-
 ptem usque transit. Sed præstat intra consistere, & raro ultra quinque drachmas propinare.

De Aloe. C A P. LXXXII.

Aloes historiam alibi narrauimus. In præsentia ea tantum, quæ ad institutum no-
 strum pertinere videntur, attingemus, e quorum numero delectus est. Aloe itaque
 optima censetur pinguis, nitida, splendida, sincera, calculorum expers, & sine arenis,
 subfului aut rufi coloris, friabilis, iecoris modo coacta, facile liquefcens siue humescens,
 odorata, & eximie amaritudinis. Non est autem, nisi succus herbæ semper virentis. Et
 sunt eius duo genera. Primum est id, cuius iam notas ordine percensuimus. Hanc a-
 loen Medici & Pharmacopœi hodie *succotrinam* decurrata voce, quum illis *succocitrinam*
 dicendum esset, appellant. Alterum eius genus arenosum est, purissimæ quasi sedimen-
 tum, veterinariis tantum dicatum, ac solis mulo Medicis vsurpatum, & propterea *Ca-*
ballinum officinis dictum. Hæc nigra, obscura, sæci simillima, odore tetro, & arenosa,
 ideoque omnium vilissima. Porro aloë non totum corpus vacuat, sed insidentem sto-
 macho ventriculo, & intestinis bilem, cum inhærentibus inibi excrementis, citra no-
 xam exigit. Danda est iis potissimum, qui capitis afficiuntur molestia, propter frequen-
 tes ex ventriculo sursum latas exhalationes. Præbenda quoque iis, qui ob eandem causam
 oculorum suffusionibus laborant, nec non iis quibus lingua & os facile resiccantur. Ve-
 rum hic nobis obgannit Puteanus, & aloë non recte a nobis aliisq; Medicis inter ea medi-
 camen-

A camenta, quæ a totius substantiæ proprietate humores sibi familiares trahunt & purgant, connumerari inquit. Nam quum aloes vis purgatoria, *Gal. lib. 8. de Comp. med. local. ca. 1. resle*, iecoris regionem non transcendat, adeoque a toto corpore haud trahat, fieri non potest, ut inter purgantia medicamenta numeretur. Quasi vero a specie ad genus negative ductum argumentum valeat. Ut enim non recte ita colligitur, *asinus non est homo*, igitur *asinus non est animal*: ita quoque haud sequitur, *aloe non est totius corporis purgatoria*, igitur *aloe non est purgatoria*. Nam fateamur quidem cum Galeno, aloem non purgare totum corpus, atqui nihilominus tamen purgatoriam esse affirmamus, quod nimirum peculiare sibi trahendo humores, eosdem per alium deiciat. Sic enim per excellentiam purgatoria medicamenta Galenus describit. Quo nomine factum est, ut Aëturius Aloem, casiam nigram, mirobalanos, & oxyphentica inter verè purgantia, hoc est, ea, quæ proprium & determinatum, ut ita dicam, humorem trahunt, numerarit, non obstante, quod totum corpus non purgent. Purgant autem hæc omnia a tota substantia. Neque enim Aloem abstergendo, neque Casia lubricando, neque Mirobalani comprimendo, *ut iuniores putant, & nos paulo ante ostendimus*, purgant, alias omnia abstergentia, lubricantia, & comprimantia purgarent, quod absurditate haud vacaret maxima: sed inest illis vis certum, quendam humorem attrahendi, propter quam merito purgantia nominantur. Quum autem duplicia sint purgantia, leuia nimirum & vehementia, quæ hætenus numerauimus, non totum corpus, sed aliquas duntaxat partes purgant. Aloem autem esse purgatoriam, & trahere familiaritatem substantiæ, in peculiari apologia nostra aduersus Puteanum hunc scripta abunde ostendimus, ut non sit necesse, id ipsum hoc in loco longius tractare. Nobiscum quoque sentit Ioannes Baptista Montanus, vir apprime doctus, & cuius umbram Puteanus non assequetur vnquam, omnes denique quotquot olim, & hodie inter celebres habiti sunt Medici. Sed quam parum suæ causæ fidat Puteanus, vel hinc conspicitur, quod nomen meum in egregio illo suo libello exprimere metuerit, *insigne ætatis nostræ Medicum* me appellans, qui tamen magno studio forū omnium malo publice profitear. Ego vero Puteane putide id flagitium, cuius me mendaciter insimulas, in te potius torquendum esse existimo, ut qui nouas & prodigiosas seras opiniones, & vel ambitione, vel malitia corrumpas & deprauas, quæ a veteribus recte tradita sunt, & plurimos tuis scriptis, falsaque doctrina seducas, vel saltem in dubitationem rapias. Ego contra nullas fingo nouas & monstrosas opiniones, sed veterum ac probatissimorum virorum consensum amplector, eorumque scripta quam possum fidelissime enarro, neminemque sciens seduco. Lubens prætereo alia, quæ quasi ridens profert Puteanus, quod scurrilia sint, & indigna quibus respondeam. Porro quum omnia reliqua, quæ ventrē deiciunt medicamenta, ventriculo negotium facessant, sola vero aloem ipsum iuuans potius confirmat, ideo medicamenti quæ malitiam eius, quam nullam obtinet, refrenent, emendant, & frangant, non indiget. Hinc est, quod Dioscorides etiam testetur, hanc aliis purgantibus medicamentis admistam præstare, ut minus stomachum infestent. Impugnat autem & hoc Puteanus, sed nullius momenti argumentis, quæ plus satis in Apologia nostra aduersus ipsum conscripta confutauimus: Quibus in præsentia quod addam nihil habeo, nisi quod dicam aloem non solum propter manifestam aliquam qualitatem, nempe adstrictionem, stomacho esse gratam, sed & proprietate quadam latente. Nam nisi id fateamur, nulla subest causa, cur addita ceteris purgatoriis, ut minus infestetur stomachum, efficere possit. Neque etiam, ut id affirmemus, absurdum erit, quum in confesso sit absinthium iecori, capparim lienem eadem ratione grata esse. Simili ratione Eupatorium iecur, & Scolopendrium lienem iuuat. Neque enim Puteanus hic ad suam rationem confugere potest, qua ostendere conatur, aloem ebilitare magis stomachum quam roborare, quod plus in ea sit amaræ detergentis, & expurgantis, quæ ventriculum debilitat, quam adstringentis, quæ eundem roborat. Nam in Eupatorio etiam incidendi & detergenti facultas, adstrictoriam vincit. In Cappare quoque superior est qualitas amara, & acris, inferior autem acerba, & tamen nihilo minus utrumque medicamentum roborandi facultatem obtinet, hoc lienis, illud iecoris. Quapropter non solum manifestæ qualitati id acceptum ferendum, sed & latenti proprietati, quæ a tota horum substantia manat. Ceterum datur aloem pondere drachmarum duarum, Aëtuario attestante, ex aqua mulla. Cuius sententiæ Aëtius, & inter Arabes Mesue subscribit.

Puteani opinio exploranda.

Io. Baptista Montanus.

Purgantia medicamentorum sola aloem ventriculum confirmant.

Pondus.

Delectus.
Facultas.
Pondus.

Qui *Cnicus* & *Cnecos* Græcis vocatur, Latinis *Cartamus* dicitur. Eius historiam *tomo altero nostrorum de Stirp. historia Commentariorum* exarauimus. Semen eius, quod candidum est, planum seu læue, & plenum, pituitam per ventrem vacuat. Actuarius seminis triti drachmas tres in gallinacci decocti ius, vel ptisanæ cremorem indendum, colatumque bibendum esse præcipit. Sunt qui, eodem teste, seminis pulpam, drachmæ pondere cum amygdalis, aniso, & melle cocto misceât, & in catapotia cogant, & arquat commodè præbeant: id quod mitius habetur. De Mesues sententia semē hoc datur a drachmis quatuor ad aureos quinque, seu ab vncia dimidia ad drachmas sex. Flos eius a drachma vna ad aureos duos exhibitur, idem potest.

Rha seu Rheum duplex.
Veteris.

Posterioribus Græcis, *Actuario præsertim & Nicolao Myrepsso*, duplex est Rha seu Rheum. Vnum, quod veteribus, Dioscoridi, Galeno, & Plinio cognitum fuit, radix est foris nigra, sed crocum aliquo pacto, dum manditur, referēs, Centaurio similis, sed paulo minor, & rufior, sine odore, laxa & leuis, gustu leniter adstringens. Affertur ex iis, quæ supra dictum sunt, regionibus, vbi Bosphorus & Rha fluuius, qui huic radici nomen dedit: Dioscoridi *ῥα, καὶ ῥέον*, vt etiam Galeno, dicitur. Idem interdum cum adiectione *ῥέον ποταμὸν*, id est, *Rheum ponticum* appellatur. Vfus est iisdem nomenclaturis Paulus. Interdum etiam, perinde atque Actuarius, *ῥίζην ποταμὸν*, hoc est, *radicem ponticam* vocat. Plinius *Rhacoma*. Celsus *radicem ponticam* nominat. Hoc Rha veterum purgandi facultate destitutum fuit: quod hinc primum fit manifestum, quia nemo veterum Græcorum,

Rha veterum purgandi facultate caruit.

aut Latinorum illi vnquam purgandi vim inesse literis mandauit. Imo inter Arabes Serapio & Auicenna Rheubarbari historiam tractantes, nullius prorsus purgandi facultatis, quæ illi inesset, meminerunt. Præterea si purgandi facultas medicamenti a tota substantia inest, vt, vno demto Puteano, omnes tum veteres, tum recētiore Medici fatentur, & nos supra demonstrauimus, vt reliquis omnibus, quæ a manifestis prodeunt qualitatibus, superior ac validior sit necesse est. Si vero est validior, omnesque alias superat, ac talis in Rha veterum fuit, fieri certe non potuit, quin illam veteres, qui crebro Rhapontico hoc vsu sunt, aliquoties deprehēderint. Non aut deprehēdisse, hinc omnibus perspicuum euadit, quod illius nullo vnquam in loco mentionē fecerunt. Quomodo enim hanc in solo Rhapontico silentio transirent, quam in ceteris omnibus, magna diligentia posteris memoriæ prodiderunt. Nullam vero fuisse purgandi facultatem in Rhapontico, Dioscorides omniū maxime ostendit, qui disertis verbis in Rhapontico, *ἀνωτάτην δύναμιν εἶναι συνιέναι*, hoc est, *supremam & maximam esse adstrictoriam facultatem*, asserit. Si itaq; ceteris omnibus superior est adstrictoria, igitur nullam in eo fuisse purgatoriam fateamur oportet. Nam si in ea fuisset, reliquas omnes, adeoq; etiam adstrictionē, tanquam ea, quæ a tota substantia diminat, superasset, ac primū omnium se exseruisset. Porro nullam prorsus habuisse Rha veterum purgatoriam facultatem, ex eius quoq; succedaneo omnibus conspicuum euadit. Siquidē pro eo Centaurio magno vsu sunt veteres.

Quod in suo libello *περὶ ἀντιβαλλόμενων* inscripto Galenus testatur, ita scribens, *ἀντὶ ῥέου, καὶ ταύριου*, id est, *pro Rheo Centaurium usurpandum*. Nemo autem veterum vnquam fuit, qui Centaurio purgatoriam inesse facultatem scripsisset. Atq; hinc palam fit omnibus, cur Centaurii magni radix, Rheipontici appellationē hodie in officinis Medicorum retineat. Nulla profecto alia de causa, quam quod tum, postquam in veri Rheipontici penuria Medici eius succedaneo Centaurii magni radice vti cœpissent: quæ Rheopontico, Dioscoride auctore, forma & facultate similis est: sensim e Medicorum cognitione verū rheum ponticum abierit, donec eo tādē ventum sit, vt quum prorsus iam ex illorū notitia ipsū excidisset, eius succedaneum, verum esse Rheumponticum crederent, adeoq; eius nomen in Centaurii magni radicem transferrent, q̄ etiam hodie retinet. Deniq; non habere veterum Rheum purgatoriam facultatem, ex Nicolao etiā Myrepsso satis liquet, qui pro eo nō solum Centaurio maiore, sed & symphyti radice vtendum esse docet. In

Rheipontici succedaneum.

Cur Centaurii magni radix Rheipontici nomen hodie in officinis retineat.

nominum enim quorundam, quib. ille in suis compositionibus vtitur explicatione, ita scriptum reliquit: *ἐὰν μὴ ῥέον, καὶ ταύριον τὸ μέγα, ἢ συμφύτον ῥίζα: si destituaris Rheo, Centaurio magno, aut Symphyti radice vtendum*: His omnibus accedit, quod Rhaponticum illud q̄ D. Gerard. Caroli V. Imp. apud Solymannum Turcarum Imp. orator, propriis manibus in

- A** Ponti regionibus eradicatum, in nostras regiones inuexit, itidē purgandi facultate destitutum est. Nam experientia compertum est, duarum drachmarū pondus datum aluum haud mouere, sed potius adstringere. Alterum *Rheum est recentiorum*, q̄ sic appellare placuit, quia veteribus Græcis, Dioscoridi, Galeno, & Theophrasto, atq; inter Arabes Serapioni & Auicēnæ etiam incognitum fuit: recentiorib. aut Græcis, Paulo nimirum, Aëtuario, & Nicolao, quib. simpliciter *ῥέον* appellatur, celebratum. Eius autē duo faciunt fastigia. Vnum *ῥέον βαρβαρικόν*, hoc est, *Rheum barbaricum*, quod ex Barbaria vocata deportetur, illis dicitur. Alterum *ῥέον ἰνδικόν*, hoc est, *Rheum Indicū*, propterea quod ex India, aut locis Indiæ proximis, nempe Scenitis populis, *ut auctor est Stephanus de Urbibus*, Persidis, affertur, vnde *Sceniticum* etiam a quibusdam nominatur. Vtriusq; Nicolaus in
- B** Drolato 70. meminit, & quidem separatim, vt hinc diuersa esse inter se liqueat. Mesuetria facit Rhei genera. Vnum *Indicum*, quod *Raued Sceni* appellat, omnium præstantissimum. Alterum *barbarum*, generis nomine vocat. Nam omnes regiones, vnde hodie affertur, maxime vero Troglodytica, barbariæ nomen olim acceperunt. Id, quo hodie passim ad subducendā nobilium & delicatiorū aluum Medici vtūtur, ex meridionalib. regionibus, præsertim ex eius parte, quæ Barbaria hodie nominat, ad nos deferret, ideoq; recte *barbaricum* appellatur. Hinc superioribus annis quum *Tunisam*, vel vt nunc vocant *Tunesū*, Carolus Imp. expugnasset, milites eius magnam copiam secum in Germaniam attulerunt. Tercium *Turcicum*, omnium ignauissimum, ita q̄ ad Turcas vicinos deferatur appellatum. A Ponto, n. vnde affertur, non longe distant. Et verisimile est illud non fuisse nisi veterum rha: q̄ quum ad purgandum inefficax esse animaduertent Mauritanii, ignauissimum esse dixerunt. Perperam aut illud inter genera sui Rhei cōnumerauerunt, cuius Paul. Aëtarius, & Nicolaus duo tantum esse fastigia memoriæ prodiderint, ab iis veterū Rheon excludentes. Regio aut ipsa vnde asportat satis indicat ipsum a veterū Rheo esse diuersum, vtpote q̄ ab aquilonarib. regionib. delatum fuit. Accedit q̄ nigrum non sit, sed potius flauū. Vehementer quoq; odoratū est, ac graue: & quo grauius est, eo melius. Plurimū deniq; purgat, adeoq; notas priori contrarias obtinet. Nam
- C** *ut testis est Aëtarius*, flauē bilis impetus, potissimum Indicum, potenter domat, ideoq; vere cholagogō existit. Quare Mesues sententiam falsam esse oportet, qui Rheon hoc plane innoxium esse, ac tuto tum pueris, tum prægnantib. dari posse literis mandauit.
- D** Nam vt quotidiana multorum experientia cōprobatum est, & id ipsum tum Græci posteriores, tum alii Medici testant, humores in venis biliosos attrahit & educit, id q̄ sine grauiore agitatione fieri non potest. Quam utiq; agitationē grauidis periculosam semper, viris aut interdum molestam esse abunde constat. Non igitur recte faciunt nostri temporis Medici, quod imbecillioribus & grauidis id ipsum exhibēt. Nam & ipse noui Medicum, cui nō satis feliciter cessit Rhei in muliere quadā teneriore exhibitio. Quod a me dictum non ita intelligēdum erit, quasi omnino prohibeā grauidis propinandum esse Rhabarbarum. Nā si Hippoc. permittit 4. *Secl. Aph. 1.* fortiorib. multo medicamentis purgare grauidas, cur ego contra tanti viri auctoritatem, & multorum experientiam vsum Rhabarbari in illis prorsus damnarem? Mea igitur sententia est, vt Rhabarbarum
- E** primo & secundo, septimo, octauo & nono mensibus vtero gerentib. haud secus quam alia purgantia tuto exhiberi nō possit, contra Mesues assertionem, qui censet, Rhabarbarum adeo esse innoxium, vt illud etiam iis tēporibus, quibus alia purgatoria medicamenta dari ab Hippocrate prohibentur, tuto propinari possit. Nisi enim id sensisset Mesues filius, nihil opus erat dicere, illud tuto dari posse grauidis, quando constet & Hippocratem ipsum suis temporibus concedere vsum purgantiū in grauidis sine omni noxa. Quod vero pueris interdum sine detrimento exhibetur, nihil mirum, non enim nisi exigua quantitate illis præpinatur. Nemo autem ignorat, quod etiam venena citra noxam exigua quantitate sumi possint. Nota enim est historia apud Galenum libro tertio de *Simplacium medicamentorum facultatibus capite decimo octauo*, de anu Atheniensi, quæ ab exigua Cicutæ portione auspicata nullo detrimento ad permagnam progressa est copiam. Vt igitur reliqua purgantia medicamenta pueris exigua quantitate citra noxam exhiberi possunt, ita quoque Rhabarbarum. Nihilominus tamen id ipsum eandem, quam reliqua purgantia proprie dicta medicamenta, facultatem humores trahendi, & corpus agitandi obtinet. Atque tum magis purgando lædere solet,

Recentiorū
Rha.Genera eius
duo.

Barbaricū.

Indicum.

Sceniticū.

Vires.

Mesues
opinio im-
probata.

Rheum ma-
ceratū vali-
dius pur-
gat.

Cur recen-
tiores Rheo
barbaro in
dysenteria
vitiatur.

Exhibendi
Rhebarba-
ri purgato-
rii modus.
Pondus.
Mefue te-
meritas.

Nomen.
Quid Aga-
ricum.

Genera
Mas.
Fœmina.

Vis.

Medicamē-
tum fami-
liar.

Pondus.

quum maceratum exhibetur. Nam quum macerando eius substantia calida & purga-
trix, quod Mesue etiam fatetur, in liquorem, in quo maceratum est, transferatur, terrea
vero & adstringens, adeoque roborans, & purgandi vires non nihil frangens, in Rheo re-
maneat, necesse est, ut tum validius purget, quam si integrum exhiberetur. Præstaret
itaque imbecillioribus & delicatioribus integrum exhibere Rheum, quam eius dilutum.
Nam hoc modo illi adesset, quod vehementiam eius frāgeret, adstrictio nimirum ipsa.
Hinc est, quod Auerroes Rheum barbarum aliis purgantibus medicamentis præfert, ut
quod infrenans eius vehementiam secum habeat, ceteris fere omnibus eo destitutis.
Prægnantibus tamen & pueris præstat Cassiam & mannā propinare, quæ maiori faci-
litate, citraque omnem agitationem & noxam aluum subducere possunt, quam Rha-
barbarum. Si enim omni caret vitio ac noxa, ut Mesue & iuniores Medici affirmāt, cur
in eius sumptione infrenantia, aut, ut ipsi loquuntur, corrigentia, illi esse adiicienda docēt?
nempe spicam, mastichen, cinnamomum, & iuncum odoratum? quum cōstat illa & id
genus alia non alio nomine adiici, nisi ut purgantium malitiam infrenēt & obtundant.
Ceterum quum purgandi facultate præditum sit Rheum recentiorum, reprehensione
non vacat, quod illud hodie plerique dysenteria laborantibus exhibent, ut lib. 2. Paradox.
c. 13. copiosius monstrauimus. Erroris autē occasio nulla alia fuit, nisi *παροχησία*, id est, *peruersa*
imitatio. Quum enim viderent veteres tum Græcos, tum etiā Arabes in dysenteria cre-
bra fuisse vios Rheo pontico, voluerunt & ipsi Rheo barbaro, quod idem esse putaue-
runt, in eodem malo uti. Quod si vero eius, quod nunc vocāt, *rheum ponticum* radice pro
veterum rheo vti fuissent, omnem reprehensionem effugere potuissent, quod eius, ut
ostēdimus, legitimum sit succedaneum. Nam ut veteres suum Rheum in dysenteria, &
vulneribus sanandis esse efficax experti sunt, ita quoque Centaurii radix, quam officinæ
Rhæpoticum nominant, miram in iis malis vim obtinet. Porro rheum hoc recentio-
rum datur ex lactis sero, vel decocto intybi satiuolatifolii. Maceratur quoque in iisdem
liquoribus, aut in stillatitio intybi iam dicti liquore, idque ætate potissimum: aut vino
albo & odorato, & id quidem hyeme. Propinatur per se tritum pōdere drachmæ vnus
cum dimidia. Mesue ausus est ad drachmas quatuor progredi, quæ satis multa est quan-
titas, quum non solum sapore, verum etiam odore sit molestum. Accedit quod etiam
purgandi facultatem non leuem admodum habeat. Dilutum seu pondere vnus, dua-
rum, vel ad summum trium drachmarum sumitur.

De Agarico. CAP. LXXXV.

Agaricum nomen suum sibi adsciuit ab Agaro vrbe, & amne Sarmatiæ, vel simpliciter
ab Agaria Sarmatiæ regione, vbi optimum prouenit. Non est aut, ut omnibus illud
intuentibus constat, nisi fungus in truncis quarundam arborum Larice potissimum, natus.
Ex Sarmatia per Illyriam Venetias, & ex Galatia & Cilicia Alexandria, & ab Alexandria
Venetias olim allatum est. Hodie ex vicinioribus locis, in quibus sunt sylvæ Laricibus. re-
fertur, Venetias importatur. Duo eius, Dioscoride etiam asstipulante, sunt genera, mas & fœ-
mina. Mas rotundus est, & vndique compactus, ideoque grauis, & densus, gustusque ama-
rior. Fœmina, mari omnium consensu præfertur, rectis intus venarum discursibus con-
stat, albus, levis, friabilis, fungosus, & rarus valde. In Agarico quoque diuersæ partes sunt,
quarum aliæ aliis sunt meliores, superiores scilicet inferioribus, & exteriores interioribus.
Pituitam & bilem, ut Actuarius auctor est, purgat, sed non celeriter pellit. Aduersatur ven-
triculo, quod sua leuitate emergens enatet. Internis omnibus vitiis conuenit, in omni
ætate, ob quæ medicamentum familiaris veteribus, Democrito maxime, est appellatum.
Ad cerebri aut & neruotū affectus, item asthmatis, & spirandi difficultati, cetero, hydro-
pe, & comitiali morbo plurimum confert. Nostri adiiciendum illi esse aliquid Zingibe-
ris, aut salis fossilis, quem *Gemma* vulgo vocant, docent, non ut eius malitiam, quam nul-
lam præcipuam habet, corrigant & infrenent, sed potius ut tardam eius actionem iu-
uent, ac quasi stimulent, quo celerius erumpat, & pellat. Confert etiam adiicere semen
anisi, carei, & id genus alia, quæ os ventriculi roborant, & nauseam ab Agarico excitatam
tollunt. Dantur eius triti, Actuarius teste, binæ drachmæ, ex aqua multa, vel aceto mulso.
Quum enim leuitate sua ori ventriculi graue & molestum sit, præstat ut illud exhibea-
tur cum aliquo quod deorsum trahat, qualia sunt ab Actuario commemorata. Gal. cen-
set de

- A. fer de agarico dandum esse pondus vnius drachmæ, vel a scrupulis duob. ad drachmam vnam. Mesue itidem triti drachmam vnam, aut summum drachmas duas exhibet. Decocti pondus est drachmæ duæ, vsque ad quatuor, vel quinque.

De Scammonio. CAP. LXXXVI.

- S**cammonium, vel Scammonia liquor est ex vulnerata radice crassa herbæ cuiusdam in Myisia Asiatica natæ emanans. Probatum leue, nigrum, rarum, taurino glutino colore similitum, fungosum, tenuibus fistulis, linguam non vehementer exurens. Flauam trahit bilem, & pituitam, sed cordis seu oris ventriculi dolorem mouet. Est enim graui præditum odore, gustu iniucundum, & siticulosum. Siquidem quum omnia, quæ aluum deiciunt in medicamenta, aloë, vt diximus, sola excepta, ventriculo infesta sint, Scammonium certe illi præ ceteris plus aduersatur. Proinde summopere iis cauendum erit, qui stomachi sentiunt imbecillitatem, & iis qui febre laborant. Quippe suapte natura leuissimum, in corpus facile rapit, residemq; spurcitiam colluuiemq; in eo omnem commouet. Datur itaq; minori noxi iis, qui febre vacant, & stomacho valent. His denique quib. ægre vomitus eliciuntur, nec facile animo linquuntur. Huic vt si cui alteri, infrenantibus opus est. Actuarius illi permiscendum esse tradit thymum, pulegium, & salem: aut quippiam ex iis, quæ gratum spirant odorem, & stomachum roborant, verbi gratia, *anisum, mastichem*, & id genus alia. Quum noxius sit Scammonii vsus, ob causas iam dictas, & quia subuertit ventriculum, nõ temere per se exhiberi debet, sed adiectis iis, quæ eius vehementiam ac malitiam obtundunt & emendant. Nec hodie est necesse, vt illo per se vtamur, quod multæ sint cõpositiones purgantes, quibus illud inseritur. Illis igitur potius, quam Scammonio per se vtendum erit. Datur per se tamen interdum ex melle, vel pituita cremore. Scammonia pondus, *Actuario auctore*, scrupuli duo, paulo plus, aut minus, pro virium ratione. Mesue a quinque granis vsque ad duodecim, intra quæ certo consistendum erit, progreditur. Dioscorides integram drachmam propinari posse scribit, tamen præstat, vt quatuor obolorum, quod idem quoque ille pondus præscribit, quantitatem non excedamus. Scammonii liquorem, quod silentio transeundum non erit, recentiores Græci *δακρυδίων*, id est, *lacrymulam* nominant. Hanc vocem nostræ ætatis Medici & pharmacopœi deprauarunt, & in diagridium commutarunt, non simpliciter omnem *Scammonii lacrymam* per eam innuentes, sed illam tantum, quæ in Cydonio malo cocta est, ad eum quem Dioscorides præscribit modum. Hoc maiori quantitate vsurpari potest, quod scilicet vis eius imminuta sit coctura in malo Cydonio facta.

De Colocynthide. CAP. LXXXVII.

- C**olocynthidis historia in altero nostrorum de Stirpium historia Commentariorum tomo est exposita, quare hic breuiter de ea agemus. Est ei vehemens in purgando facultas, ita vt solo interdum contactu, ac etiam odore abunde, & non sine magna perturbatione aluum quibusdam deiciat, vt quotidie experiuntur, qui eam tractant. Quum itaque vehementissimum & maxime perturbans sit medicamentum, ideo circulatores & circumforanei illi impostores in ducenda rusticorum & plebeiorem aluo illo crebro vtuntur. Purgat autem pituitam, bilemque & mucosum humorem. Pellit aquas tam bibita, quam per sedem infusa. Datur commode in omnibus quæ caput obsident malis, orthopnoicis, hoc est, non nisi recta ceruice spirantibus, & similibus. Item coxendicum cruciatibus, morbis articularibus, frigidis, lōgis, renum, & vesicæ vitiis. Insuper iis, qui renitentes & præduros conceperunt affectus, sic vt non nisi ægre excutiantur. Diligenda est candida eius, & recens medulla. Aridior enim & nigricans, vt vitiosa, damnatur. Porro quum ob suam vehementiam cordi, ventriculo, iecori, & reliquis visceribus plurimum incommodet, imò vniuersum perturbet corpus, fastidium, & tormina excitas, permiscenda illi sunt perpetuo, quæ eius vehementiam emendant & infrenant, vt est *mastiche, galla, tragacantha*, & similia. Datur ex ea, *Actuario auctore*, scrupulus vnus cum aqua multa. Dioscorides quatuor obolorum, id est, *scrupulorum duorum, pondere dandum esse* censet. Cui Aetius subscribit: *imbecillibus tamen scrupulum sufficere*, inquit. Paulus drachmam integram, seu decem & octo siliquas dare non veretur. Mesue a siliquis sex, hoc est, scrupulo vno, ad decem siliquas progreditur, adeoque duorum scrupulorum quantitatem non excedit. Atque Actuarii pondus tutissimum existit, nec illud temere transcendendum.

Nomina.
Scateoniz
auctorum
de Turbit
variaz.
Serapionis.

Mesues.

Aetuarii.
Aetuaris
quando vi-
xit.

Officinari.

Vis.

Infrenan-
tia.

Error hu-
ius ætatis
medicorū
communis.

Modus dā
di.
Pondus.

Turbit, Turpet, & Turpeton, recentioribus maxime Græcis vocatur. Diuerſi vero au-
ctores aliud atque aliud Turbit pingunt. Siquidem Serapio vnus e familia Arabum
de ſuo Turbit, ea quæ Dioſcorides de Tripolio tradit. Vt hinc perſpicuum euadat omni-
bus, Serapionis Turbit non eſſe, niſi Dioſcoridis Tripolium, quod vtriuſque hiftoriæ
collatio liquido demonſtrat. Ex eadem familia Meſue Turbit eſſe ſcribit radicem her-
bæ cuiuſdam, quæ folia habet ferulæ, & lacte turget. Sed quū nulla alia ſtirps, quæ foliis
ferulæ ſit, & lacteſcat, præter Thapſiam reperiatur, euidentiffimum ſit omnibus, Me-
ſues Turbit non eſſe, niſi Dioſcoridis Thapſiam, quemadmodum fuſius in tertio noſtrorum
de Stirpium hiftoria Commentariorum tomo demonſtrauiſmus. Inter recentiores Græcos A-
etuaris, vir magnæ auctoritatis, & qui Nicolao Myreſo ſect. 40. cap. 8. teſte, ſub Conſtan-
tino vixit, adeoque Serapione, Auicenna, & Meſue vetuſtior fuit, duplex Turpetum fa-
cit. Vnum non eſt, niſi Pituiſæ radix, quam Dioſcorides etiam Turbet barbaris vocari
ſcribit. Album alterum, quod Alypum eſt Dioſcoridis. Ceterum Turbit, quod in offici-
nis medicorum proſtat, & hodie in frequenti eſt medicinam facientium vſu, nō eſt niſi
radix Tithymali Cretenſis, qui foliis eſt Portulacæ, ut tomo tertio noſtrorum de Stirpium hifto-
ria Commentariorum diximus, vbi eius hiftoriam inuenient ſtudioſi. Pituitam autem craſ-
ſam & lentam, putremque a ventriculo, thorace, neruis, & articulis vacuat. Meſue qui-
dem tarde & imbecilliter ſuum Turbit purgare tradit, vt neceſſe ſit a Turbit officina-
rum eſſe diuerſum, vtpote q̃ vehementer, & cum quadam turbatione purget. Quapro-
pter infrenantibus, ſi exhibetur, indiget, qualia ſunt roborantia ventriculum, & odora-
ta, maſtiche, aniſi ſemen, careum, nux moſchata, & id genus alia. Noſtræ ætatis Medici
Zingiber illi hoc nomine permiſcent, atqui non ſine maximo errore. Nam Zingiber
eius actionem ac vehementiam non frangit, ſed magis intendit, quod diſertis verbis
Meſue affirmat, & ratio ipſa confirmat, quæ acribus purgantium vim intendi docet.
Nec eſt, quod hunc errorem Meſues exemplo tueri queant. Siquidem huius Turbit,
niſi falſum adſtruxerit, tarde pituitam educit, ideo zingiberis adiectione actionis eius
vehementiam intendere volens, recte illud permiſcuit. Datur ex melle roſaceo, vel paſ-
ſularum decocto, pondere vnius drachmæ. Nec temere vltra hanc quantitatem pro-
grediendum. Meſue ad duas vſque drachmas de ſuo trito exhibet. De macerato, a
drachmis duabus ad quatuor vſque propinadum eſſe cenſet. Sed quum noſtrum Tur-
bit ſit eo, quod Meſues pingit, vehementius, in exhibendo Turbit pōdus a Meſue præ-
ſcriptum vſurpari non debet.

De lathyri. CAP. LXXXIX.

Cataputia
minor.
Pondus.

Cataputia
maior.

Lathyris hiftoriam in altero de Stirpium hiftoria Commentariorum tomo indicauimus,
ad quem locum lectorem nunc aſſegamus. Selapſiis Cataputia minor vocatur. Vehe-
menter purgat pituitam. Dantur grana eius maiora, vt teſtis eſt Aetuar. 15. minora vero
20. Idem iis qui efficacius purgari cupiunt, ea mandenda præcipit: iis vero qui deie-
ctionem non deſiderant copioſam, vt integra deuorēt, præſertim vbi iis, qui ſumit, ma-
lo & imbecillo fuerit ventriculo. Dioſcorides ad purgandum ſeptem, aut octo grana
ſufficere tradit, intra quod pondus conſiſtere tutius eſt. Alterius cataputiaz, quam ma-
iorem vocant Seplaſiaz, Græci Cici, Latini Ricinum, non eſt cur priuatim hoc loco men-
tionem faciamus, quod eius hiftoria a nobis in primo noſtrorum de Stirpium hiftoria Com-
mentariorum tomo pleniffime ſit tradita.

De elleboro. CAP. XC.

Genera.
Niger.

Forma.

Ellebori eſſe duo genera, omnibus eſt notiſſimum: album nimirum, & nigrum. Niger
in Germania noſtra incognitus eſt, quod in ea non proueniat. Nam ſtirps, qua hæ-
tenus pro Elleboro nigro vſæ ſunt Selapſiaz, Enneaphylli alterum genus, vt loco paulo
ante citato docuimus, exiſtit. In aliis tamen regionibus nuſquam fere non in aſperis col-
libus, & ſtumentibus locis naſcitur. Foliis platani, ſed minoribus, & nigrioribus, incifuris
pluribus diuiſis. Caule candido, elleboro ſimili, hoc eſt, palmi aut cubiti altitudine, ſe-
culaceo, bulborum tunicis, conuoluto. Flos ei ex purpureo candicans, & vix modo ra-
remoruſ, ſemenque in eo, vt Cnici, in purgationes adhibetur. Radices nigra prætenues
ab vno

- A** ab vno fastigio seu capitulo capæ simili dependentes, & confibratæ; quarum vsus est in Medicina. Flavam atramq; bilem e toto corpore deortum trahit, idq; citra villam difficultatem: ideo febribus circuitu repetentibus, & longis obicitur. Datur quoq; infanientibus, altera in parte capitis existentibus doloribus diuturnis commodissime: r. fertim visceribus, vtero, & vesica purgatorium medicamentum postulantibus. Maxima vero vis est, peculiariter educere, quicquid sanguini commixtum eum corrumpit: ideo veterascentibus arquat morbis utilis, & quibus in superficie summam asperitates emerferunt, hoc est, lepris, imperiginibus, & id genus aliis. Elephantia quoq; laborantibus confert. Ceterum suauitatis gratia, & vt vehementia eius frangatur nonnihil, quædam ex odoratis seminibus ei permiscenda erunt. Datur ex passio, aut aceto mulso, Facultas
- B** scrupulorum ternum; seu drachmæ vnius pondere, aut paulo plus, vel minus, pro corporis habitu. Candidi historiam loco iam indicato plenissime tractauimus, vt non sit Pondus. necesse de eo hic priuatim verba facere. Raro hodie, ob eius immensam vehemenciam, Medici ipso vtuntur. Albus.

De Euphorbio. CAP. XCI.

- E**uphorbium liquorem esse arboris cuiusdam, supra diximus. Pituitam crassam & lentam, Aetio, Paulo, & Actuário testibus purgat, quantumuis impactam etiam neruis, & articulis. Aquam quoq; deicit. Est vero celerrimum, & maxime ignea vi flagrans: vnde colicis, & aluum frigidiorē habentibus datur. Ceteros vehementer conturbat, & sitim maxime ciet. Per se minime sumendum, sed semper illi nonnihil ex odoratis Vis.
- C** seminibus aniso, mastiche, & spica nardi permiscendum. Datur ex aqua mulsa. Præstat autem cum melle cocto in catapotia digerere. Infrenaria Exhibendi modus. Pondus, Actuário teste, triobolare est. Mesue a siliqua vna ad tres progreditur, adeoque vltra scrupulum dimidium, aut duodecim grana ad summum non transcendit, idq; si vetustius fuerit. Ante annum, propter immensam vehemenciam, quam tum habet, haud temere vsurpandum erit. Quare vbi recens fuerit, vix quantitatem ab Actuário præscriptam transcendemus, sed infratia, aut summum quatuor grana subsistamus. Pondus.

De Armenio lapide. CAP. XCII.

- A**rmenius, siue Armeniacus, vel, vt vulgo appellatur Armenius lapis, quo pictores vtuntur: Actio attestante, ex Armenia deferitur, vnde nomen assum sit. Præfertur qui friabilis, æquabilis est, & expers calculorum, quiq; non nigrescit adustione. Atram bilem, & omnem lentum crassumq; humorem sanguini commixtum educit. Quare, vt auctor est Actuarius, melancholicis, elephanticeis, & similibus dari solet. Item in renū vitiis, & spirandi difficultate. Citra vero molestiam alui deiectionem mouet, neq; vllus strangulationis timor subest, neque deliquium animi sequitur: quæ duo fere in vehementioribus purgationibus accidere consueuerunt. Hinc est, quod Aetius hunc infantibus, thoracis vitio vexatis, ad vomitum excitandum dari præcipiat. Pondus eius, Vis.
- E**actuário teste, est sextula, hoc est, scrupuli quatuor, aut plus minusue pro sumentis viribus. Mesue non loti pondus esse drachmam semis, aut sesquidrachmam: loti autem drachmam vnā, vel drachmas duas scribit. Alexander Trallianus scrupulos tres vel quatuor, loti vero quinq; vel sex exhibet, adeoque a Mesue non dissentit. Lauatur autem iis liquoribus, qui refrigerandi vim habent, vt est cichorii liquor stillatitius. Pondus.

De Cyaneo. CAP. XCIII.

- C**yaneus, vel, vt Latini nominant, cæruleus lapis est, quem Arabum familia Lazuli, & stellarum, q; maculas quasdam aureas stellarū modo radiantes habeat, vocat. Optimus est, qui percussus celerrime scintillat, difficile frangitur, aureas guttulas ostendit, & est exactissimo cæruleo colore, Armenio violentior est, ideoq; vt laetur liquoribus refrigerandi vim habentibus opus est. Commode quoq; cum aromaticis ac corroborantibus medicamentis, cinamomo, & mastiche propinatur. Vim purgantem melancholicam supra & infra obtinet. Quocirca aduersus omnes melancholicos affectus, Maniā, melancholiam, cancos, alphas nigros, quartanas, & hæmorrhoidas valet. Dum vritur, Nomina Stellarum.
- F**cæruleus magis euadit, si legitimus est: adulterinus autem vstione nigricat. Pondus eius, quod Armenio vehementior sit, minus esse debet. Mesue drachma vna vsque ad drachmas duas & dimidiam, in Cyaneo exhibendo, progrediaudet. Facultas. Probatio. Pondus.

De Hermodactylo. CAP. XCIV.

Hermoda-
ctyli duo
genera 1.

Hermoda-
ctylus
Pauli.

Francisci
Alexandri
reprehensio
repulsa.

Infrenan-
tia.

Pondus.

Colchico.

Hermodactyli Mesue duo facit genera. Vnum radice digitali longitudine, quod non est nisi *Behen*, & minime ephemerum, non lethale, ut nonnulli existimant, quemadmodum in nostris super Nicolaum Myrepsum annotationibus demonstrauimus. Alterum radice rotunda: quod itidem in duo partitur genera. Vnus enim habet radicem albam, crassam, ac modice duram, atque is esse videtur, qui in hodiernum diem nomen Hermodactyli in officinis Medicorum retinet. A Paulo quoque, qui *Hermodactylus* appellatur, albus est. Hicalui deiectionem molitur, pituitamque crassam, ab articulis præsertim extrahit. Ob id priuatim in podagra, & articulorum doloribus, quum humores defluunt, datur per se, vel decocto aliquo conuenienti. Admouetur etiam articulis dolore affectis cum farina hordei, virelis ouorum, & mica panis. Nec solus Mesue album *Hermodactylum* conferre podagræ, adeoque Pauli esse Hermodactylum innuit, verum etiam Serapio. Ut falso me reprehendat Franciscus Alexander, quod *Hermodactylum* Mesues, eundem cum Pauli *Hermodactylo* esse statuerim. Quum enim vterque, Mesue nimirum & Serapio, rubrum occidere scribat, ut ab albo diuersus sit, necesse est. Sed bono viro imposuit, quod Pauli *Hermodactylum* cognitum non habuerit. Ceterum is, Paulo auctore, stomacho nimis quam aduersatur. Proinde aliqua, quæ eius malitiam corrigant, ac vehementiam coerceant, illi miscenda erunt: ut sunt *cinnamomum*, *mastiche*, *zingiber*, aut *piper longum*. Datur cum oxymelite scyllitico, aut melle rosaceo, pondere drachmæ vnius, aut plus aut minus, pro summentis viribus. Alterum genus Hermodactyli rotundi, foris nigram aut rubentem radicem obinet. Atque is est, qui Croci flore per autumnum se passim in pratis ostentat, & vulgo *Hermodactylus* nuncupatur. Græcis vetustioribus *Colchicon* dicitur, ut *tomo nostrorum de Stirpium historia Commentariorum secundo copiose admodum ostendimus*. Is intra corpus, utpote venenatus, tuto haud sumitur. Sed Hermodactyli historiam multo exquisitius altero nostrorum *de Stirpium historia Commentariorum tomo* tractauimus, ad quem nunc lectorem ablegamus. Atque inde quam pueriliter Rondelenius, alioqui vir doctissimus, in sua *Pharmacopolarum officina in pilulis fetidis*, de Hermodactylo disseruerit, omnibus patebit. Ut enim reliqua taceam, quis vnquam Græcorum *Pentaphylli radices*, *Hermodactylos* appellauit? Certe non credidissem, virum hunc herbarum tam exiguum habere cognitionem, nisi id ipsum ex eiusdem annotationibus certe cognouissem.

De Tithymalo. CAP. XCV.

Esula.

Vis.
Pondus.

Etithymalorum genere est herba, quæ vulgo & officinis *Esula* vocatur. Quapropter pituitam & bilem elicit, quemadmodum alii Tithymali. Virentes illorum ramuli, *Actuario teste*, fictili paulatim torrendi sunt, tritique cum polenta scrupulorum ternum pondere, miscendi in aqua, & in potu præbendi: quippe quod exsiccati furculi impotentiores habeantur. Admiscenda tamen iis erunt odorata aliqua medicamenta, & quæ eorum vehementiam frangere possunt. Sunt hodie, qui plus de Tithymalis in puluerem redactis, quam drachmam vnā exhibent. Tutius tamen est, ut intra pondus ab Actuario, optimo auctore, nobis præscriptum consistamus. Historiam & picturas omnium Tithymalorum, qui septem numero sunt, in *tertio nostrorum de Stirpium historia Commentariorum tomo* reperient studiosi: ut non sit necesse hic de iis fufius tractare.

De Elaterio. CAP. XCVI.

Elaterium
quid.
Vis.
Pondus.

Elaterium, ut supra quoque monstrauimus, est succus e fructu syluestris Cucumeris expressus. Modum autem exprimendi Dioscorides docet. Bilem & pituitam vacuat. Eius maximum pondus, auctore Dioscoride, obolus est: minimum, semiobolus. Pueris tamen minus adhuc est dandum: chalcis nimirum duo, id est, grana quatuor. Actuarius ternos obolos, hoc est, scrupulum vnum & semis, cum lacte recens emulso exhibet.

De Thymelæa. CAP. XCVII.

Thymelæa.

Thymelæa officinis *Melæreon* dicitur. Pituitam & aquam purgat, si viginti granorum interna bibantur, aut summum triginta, quemadmodum Actuario placet. Verum quoniam adurentis sunt facultatis, ea præstat in catapotia cum melle cocto formare, aut vuzacino, farinæ similie quoque inuoluere, ac simul hordei cremorem superbibere. Præstat etiam post hausta grana gnidia rosaceum aut melinum sorbere, ne fauces inflammantur. Nemo tamen iis, ut etiam catapotis ex ipsis confectis facile, nisi in robu-

Astis, ac fortioribus corporibus uti debet. Hic finem libro primo imponemus: quod si quid adhuc desideretur, id in altero libro explicare studebimus.


DE VSITATA HVIVS TEMPORIS

COMPONENDORVM MISCENDORVMQVE MEDICAMENTO-

rum ratione, Liber Secundus, Medicamentarius dictus, Leonhardo Fuchio

Medico auctore.

P R O O E M I V M.



Vperiore libro summa, qua potuimus breuitate, & quantum instituto nostro sufficere arbitrati sumus, simplicium, quibus in componendis medicamentis nostra atatis Pharmacopœi utuntur, catalogum premisimus, & quid de singulis statuendum esset, indicauimus: nulla alia sane de causa, quam ut recte cognitis simplicibus, adulterina abicerent, nec illa compositionibus suis permiscerent. Quum autem simplicibus omnia curari nequeant, necessaria fuit compositorum inuen-

Necessaria est medicamentorum compositio.

tio. Sæpe enim multifariam compositi sunt affectus, ut in ijs curandis non diuersa tantum, sed & contraria medicamentorum genera requirantur, ut sicubi repellendum simul est, & discutiendum. Præterea, ut affectus simplici medicamento curari possit, cogimur tamen interdum multa miscere, quod nullum in manibus sit simplex, quod conueniat. Denique, quorundam est ea natura, ut nisi cum olijs misceas, vel inutilia, vel noxia futura sint. In altero igitur huius operis libro, compositorum

medicamentorum omnium, qua hodie in officinis Medicorum prostant, conficiendorum ratio exponitur. Quare optima ratione Medicamentarius liber inscribitur: ita enim rectius, quam, ut vulgus Medicorum solet, Dispensatorium appellabitur. Composita vero medicamenta vocamus, qua vel Medicus, qui natura minister ac imitator est: vel Pharmacopœus, qui Medici minister est, ex varijs simplicibus commiscet ac componit. Siquidem veteres Medici in componendis medicamentis multum opera, artis, & studij posuisse constat. Et ridendi sint prorsus, qui Pharmacopœam a Medica distinctam esse artem existimant. Necessario autem, ut hic liber ordine secundus esset, curauimus.

Medicamentarius liber. Dispensatorium. Composita medicamenta.

Fieri enim non potest, ut quispiam ea, qua in tertio & quarto tradentur libris, assequatur, nisi prius qua in hoc commemorantur composita medicamenta, omnia perspecta habeat. Quomodo enim simplicia & composita inter se recte quis miscbit medicamenta, qui non utrorumque prius rationem probe cognitam habet?

Quapropter ordinis ratio, qua in recte docendo plurimum momenti obtinet, postulauit, ut hunc sibi locum liber ille Medicamentarius dictus, vendicaret. Quod si vero quispiam causam etiam cur librum hunc exarauerim, ac prioribus tribus adiecerim, scire vult, non pigebit me illam quoque, atqui breuiter, referre. Non fuit autem alia, nisi summa necessitas. Quum enim animaduertentem, singulos Pharmacopœas singulis fere in locis suos ac proprios, eosque magna ex parte manuscriptos, ac inter se plurimum, pro cuiusque, qui eos conscripsit, arbitrio, variantes libros, ex quorum præscripto sua componunt medicamenta, habere, hocque nomine fieri, ut raro admodum simili modo in officinis nostris parata medicamenta prostant: committere non potui quin hunc laborem subirem, ac curarem, ut tandem haberent Pharmacopœi Medicamentarium librum, vel ut ipsi nominant Dispensatorium, optima & exquisita ratione a nobis exaratum, unde subinde omnes sua conficerent medicamenta. Nam plurimum refert, reique publica interest, ut uniformiter in officinis composita sint medicamenta: quod alias Medicis non raro errandi præbeatur occasio, agrotantibusque ex eorundem erratis non leue imminet periculum. Quod quum omnibus in confesso sit, non est cur multa demonstratione egeat. Ut vero Pharmacopœorum, plurimum imperitorum, hesitationi consulereimus, singulis compositionibus, qua id ipsum requirebant, Annotationes, adieciimus: in quibus non solum voces obscuriores, sed & res ipsas difficiliore explicauimus, hac quidem ratione non solum Pharmacopœis, verum etiam Medicis consulere volentes, ut nihil plane esset, in quo harere possent. Hinc est quod interdum ea, qua Pharmacopœorum caput exsuperant, attigerimus. Ut autem ordine optimo singulorum medicamentorum compositiones traderemus, librum hunc Medicamentarium in Sectiones digessimus, ut singula sui generis medicamenta continerent, & ab inuestigantibus illi facile & expedite inuenirentur. In summa, nihil negleximus, quod operi lucem offerre posse iudicauimus. Hortamur itaque Pharmacopœos, ut in componendis medicamentis tum veterum, tum recentiorum diligenter caveant, ne quid adiciant, vel omittant, sed omnia ad præscriptum eorum, qui medicamenta composita struxerunt, conficiant. Absit hinc studium gratificandi alijs, qui suauioribus delectantur medicamentis, nisi id fieri possit citra virium labefactionem.

Causa huius libri ceteris adiecta.

Annotationum ratio

De ponderum, quorum in componendis medicamentis usus est, ratione.

Sectio I.

Ponderū
cognitio
necessaria
Medico.

Vum citra ponderum, quorum in conficiendis medicamentis usus est, cognitionem, ratio componendorum medicamentorum intelligi haud possit, principio de iis nobis esse differendum putavi. Non solum autem hoc nomine ponderum ratio Medico cognoscenda venit: sed & ideo, ne eorundem inscitia accidat, ut ægris exitium afferratur. Nam quum constituta & certa sint quorundam medicamentorum potidera, adeo sane, ut si quis eā temere nō obseruet, aut tran-

scendar, certam & indubitatam corpori noxam, & nonnunquam etiam perniciem accersat: nihil profecto æque curandum Medico erit, quam ut eorundem plenam & exquisitam notitiam habeat. Ponderum itaq; tum nomina, tum rationem breuiter hic, & quātum instituto nostro cōuenit, perstringemus, ut paratiores ad cōpositorum medicamentorū tractationē veniamus. Principio autem de iis, quibus Græci & Romani Medici vsi sunt, agemus: qualia quidem sunt *libra, quadrās, uncia, denarius, hexagium, drachma, scrupulus, siliqua, & obolus*. Libra Medica, quæ Græcis *λίτρα* dicitur, est vnciarum duodecim. Hinc *duodenaria* & *Romana*, quod illa Romani vsi fuerint, vocatur. Hæc alio nomine pondo nominatur: idq; vbi per se, siue absq; alio pondere scribitur & effertur. Vbi vero cum alio ponderis vocabulo adiungitur, idem significat, quod Græcis *σαβμὸς* & *ἰάλιον*, hoc est, *pondus*: ut *pondo libra, pondo uncia*. Libra igitur Medica, quatuor quadrantes cōtinet. Quum igitur Medica libra non nisi duodecim contineat vncias, quod multis

Pharmaco-
pœorum
error.

exemplis declarare possemus, plurimum hallucinentur nostræ ætatis indocti Pharmacopœi necesse est, qui libram sedecim vnciarū, quod sane mercatoria & negotiatoria habet, ad conficienda medicamenta vsurpant. Quod vero eiusmodi libra vtantur, e libris partibus, quadrante maxime, quam quartam illi nominant, facile demonstratur. Si quidem huic quatuor vncias attribuunt: quapropter ut eorundem libra sedecim contineat vncias, fateantur oportet. Si enim quatuor vncias quater sumseris, sedecim prodibunt vnciæ, quæ libram constituent mercatoriam. Quadrans itaq; *sic enim Latini*

Quadrās.
Triens.
Sextans.

quartam libræ partem appellant, trium & non quatuor vnciarū pondus existit. Triens autē quatuor vncias cōtinet. Sextās, sextam libræ partē, hoc est, vncias duas habet. Quocirca in manifesto errore omnes, p̄p̄modum Germanicę nostræ Seplasiarii ac Pharmacopœi versantur, eo q; triente p̄ quadratē vtantur. Monacenses tamen Pharmacopolæ (q̄ olim, dum illic medicinam facere, deprehēdi) legitima quadratē utebant. Vncia, Græcis *ὑνχία* dicta, quæ, ut comprehensum est, duodecima libræ Medicę pars existit, drachmis

Vncia.

Denarius.
Nicolai
Salernitæ
& Seruitoris
error.

octo, seu denariis Romanis septem constat. Denarius itaq; pendet drachmam ynam, & septimam eius partem. Vnde se prodit Nicolai Salernitæ error, qui nulla veterū auctoritate fultus, vnciæ drachmas nouem tribuit. Cui etiam *Seruator*, scriptor triobolaris, subscribit. Atq; hos egregios duces magna Pharmacopœorum turba, nullo habito delectu, sequitur: nullaq; mehercle alia ratione, quam quod a iam dictis auctoribus sic est scriptum, sese tuentium: quum potius illis iudicio meliorum tum Græcorum tum

Interpretū
Galenī cr-
ratum.

Latinorum auctorum standum esset. Panditur & hinc quorundam Galeni interpretum error, qui perpetuo denarium cum drachma confundunt, alterum pro altero pondere vertentes: quum tamen constet, denarium, ut iam ostensum est, drachma paulo, scilicet vna septima, esse grauiorem. Exagium, vel ut Græci appellant *ἑξάγιον*, pondus est quatuor scrupulorum. Nouum est nomen, quo recentiores Græci vsi sunt, maxime Aëturius in *Antidoto aurea Alexandrina*. Lanni *Sextulam* id pondus nominant.

Sextula.
ἑξάγιον.
Drachma.
Scrpu-
lus.

Græci alio nomine *ἑξάγιον* appellant. Quanquam Nicolaus Myrepsus, si locus non est mendosus, ita Saracenos siliquam vocare ait. Drachma, quæ Græcis *δραχμή* & *ἰάλιον* vocatur, octaua est vnciæ pars, habetq; in se scrupulos tres. Scrupulus autem, siue *scriptulus*

Obolus.
Siliqua.
ὑπὸ βύβλῳ.
Granum.
ἁράριον.

qui Græcis *ὑβήμα*, quasi primum ponderis elementum, nominatur, obolos duos pendet. Obolus itaq; dimidium est scrupuli, seu sexta drachmæ pars, pendetq; siliquas tres. Siliqua, quæ Græcis *κισσόνιον*, Aëtuario more vulgi *κισσούβλῳ* dicitur, grana quatuor frumētī pendet. Frumenti vero granum Græcis *ἁράριον* nuncupatur: ἁράριον enim illis frumentum significat. Sed quum frumenti genera, Græcis nota, sint plura, *triticeum, hordeum, &c.*

A *avena, oryza, milium, panicum*, & Græci ipsi non explicarint, cuius frumenti quatuor grana pendat siliquæ semē, hoc alius in aliam accepit partem. Pleriq; tamen id de hordei aut tritici granis scriptum esse interpretantur. Atq; referendum id quidem non ad omnia grana, sed mediocria, non enormia: neq; ad habitiora, neq; strigosa & emaciata. Quod si igitur siliqua quatuor frumenti grana, ut demonstratum est, pēdet: & scrupulus sex siliquas, ut grana frumenti quatuor & viginti complectatur, scrupulus necesse est. Plurimum itaq; errant Pharmacopœi, qui a Græcis & Mauris dissidentes, statuūt scrupulum viginti granorum esse. Eum autem errorem ex Nicolao Salernita suxerunt. Ceterum si ad legumina respiciamus, vnum granum seu semen siliquæ, sex lentis seminib⁹, quod nos experientia comprobauimus, pondere suo responderet. Hæc si sexies sumseris (siliquæ namq; sex, *ut dictum est*, pendent scrupulum) in vniuersum sex & triginta lentis semina prodibunt, quæ pondus scrupuli habent. Hinc patet, Rhemni Fannii Pālæmonis in libello de *Ponderibus & mensuris* inscripto locum mirifice esse deprauatum, vbi inter cetera de scrupulo cap. 1. sic scriptum reliquit:

Pharmacopolarū error.

Rhemni Fannii loci emendatus.

Semina sex alij siliquis latitantia curuis

Atribuunt scrupulo, lentes veraciter octo.

Nam si quis octo lentis semina cum scrupulo ponderare haud grauatus fuerit, is manifeste comperiet, non octo lentis semina, ut præscripta innuunt carmina: sed quatuor & quater octo; id est, triginta sex, *ut paulo ante quoq; diximus*, scrupulum pendere. Multo enim leuiora sunt octo lentis semina, quam ut scrupulum æquare possint. Proinde Fannii locus ita legendus erit:

Semina sex alij siliquis latitantia curuis,

Atribuunt scrupulo lentes quatuor, quater octo,

Aut totidem speltas numerant, tristesue lupinos

B *ic duo*.—Lupini autem quatuor semina pendere scrupulum, cū Fannio Græcus Nican-dri interpres tradit. Et si Mauri tria tantum constituere scrupulum literis prodiderunt. Atq; sic quidem se habent pondera, quibus olim veteres tum Græci, tum Romani vsi sunt, & hodie quoq; vtuntur Medici. Nunc ad ea veniemus, quibus peculiari ter, præter iam dicta, Arabes vsi sunt: inter quæ primo nobis occurrit *aureus*, qui ipsis Arabibus *denarium* significat, hoc est, *pondus drachmæ vnius cum septima eiusdem parte*: & nequaquam,

Arabes pondera. Aureus. Danich.

D ut plerique putant, *drachma vnius & dimidia*. Dein *Danich*, quod perperam Recentiores efferunt *Danic*, pondus est Arabibus, quod a Græcis *σέπτε*, a Latinis *lupinus* dicitur. Hoc Cleopatram imitati Arabes, aiunt pendere duas oboli tertias partes. Quum enim obolus pendat grana duodecim, seu dimidium scrupulum, *Danich* pendat grana octo necesse est. Siquidem quatuor grana ter sumpta, constituunt duodecim. Verum esse quod dicimus, Serapio confirmat, dum inquit: *Obolus est Danich vnum & dimidium*, id est, *grana duodecim*. Terti generis pondus, quo Arabes vtuntur, est *Kirat*. Sic autem filiquam Græco vocabulo, quod est *κεράτιον*, deprauato nominant. Et nō est nisi dimidia pars Lupini. Quod ex Auicenna liquet, qui ait: *Et omnis Kirat, est grana quatuor hordei*: quippe *Lupinus octo grana hordei pendit*.

Kirat.

E *hordei pendit*: Granum autem hordei apud Arabes minimum pondus est. Habent quidem & alia pondera Arabes, sed illa duntaxat referre volui, quod iis maxime Mesue filius, ex cuius præscripto multa hodie conficiuntur medicamenta, vtatur. Quod si vero quispiam pleniorē & exquisitiorem ponderum iam dictorum, & aliorum omnium cognoscere cupit, is libros Georgii Agricolæ, viri perpetua memoria digni plane aureos ea de re scriptos legat. Ceterum Medici quasdam res simplices, ex quib. medicamenta conficiunt, interdum non metiuntur, nec ponderant: sed numero, vel manus complexu sumunt. Altero modo quum ceteris miscentur *Pruna, Ficus, Zizipha, Myxa*, & id genus alia: altero, quum herbae aut flores aliis permiscuntur, tum enim fasciculum, *ut est apud Scribonium Largum*: siue manipulum, *ut apud Cornelium Celsum*, horum esse sumendum præcipiunt. Græci potissimum Recentiores, non solum *σείδιον*, id est, *fasciculum*, sed etiam *σείδιον χειρῶν*, id est, *fasciculum qui manu comprehendi potest*, nominant. Siquidem fasciculus, siue manipulus non est, nisi quod summa manu cōplicata apprehendi & complecti potest. Atq; manipuli voce rei rusticæ scriptores crebro vtuntur. Recentiores Medici *pugillo*, quod diminutivum a pugno existit, pro pondere

Areolæ Granum hordei.

Fasciculum Manipulus. σείδιον.

Pugillus.

vtuntur. Significat vero illis pondus herbarum & florum, quod pugno, seu compressis A
in extremo digitis capi potest, adeoq; alteram fere manipuli partem. Quod quidem
genus ponderis recentioribus Græcis, Actio potissimum, & nuncupatur. Nunc reli-
quum est, vt notas ponderum, quibus hodie in conficiendis medicamentis tum Medi-
ci, tum Pharmacopœi vtuntur, subiiciamus, quæ sunt eiusmodi:

Pondera
notæ.

<i>Libra</i>	} <i>Hæc nota</i>	<i>lb.</i>	} <i>est.</i>	<i>Scrupuli</i>	} <i>Hæc nota</i>	<i>℥.</i>	} <i>est.</i>
<i>Semis</i>		<i>β.</i>		<i>Grani</i>		<i>g.</i>	
<i>Quadrantis</i>		<i>qr.</i>		<i>Manipuli</i>		<i>M.</i>	
<i>Vncia</i>		<i>ʒ.</i>		<i>Pugilli</i>		<i>P.</i>	
<i>Drachma</i>		<i>ʒ.</i>					

Et si autem præstaret, abiectis ac posthabitis prorsus iam dictis notis, pondera ipsa B
primis suis saltem literis, si non integra, scribere potissimum vnciam & drachmam, ne
scilicet notarum β & γ affinitate vel Medici, vel Pharmacopœi ipsi magno mortalium
incommodo peccarent, & aberrarent: tamen quum vsus longi temporis id obtinuerit,
vt pondera notis potius quibusdam, quam literis designentur, in eam maxime curam
incumbere decet Medicos, vt accurate ductus notarum delineent, quo ab omnibus a-
gnosci, & aliæ ab aliis discerni queant, ne scilicet scribendi negligentia Pharmacopœis
errandi occasionem præbeant. Nos quidem neglecto, quo hodie Medici vtuntur, mo-
re, pōdera & mensuras medicamentorum integris dictionibus, quo minus tum Typo-
graphus in iis excudendis, tum Pharmacopœi in construendis compositionibus aber-
rarent, exarauimus. Sed de ponderibus satis, ad medicamentorum igitur composi- C
nes iam transire tempestiuum est.

DE ANTIDOTIS, SEV CONFECTIONIBVS

magnis vocatis, & opiatis, Sectio II.

Aurea Alexandrina. Nicolai Myrepsi.

AD Capitis fluxiones, a frigore natas, efficax est: dolorem enim eius confestim mi-
tigat. Oculorum lacrymas sistit, dentium dolores sanat, non modo epota, sed &
imposita. Comitialibus subito factis, prorsus auxiliatur. Furiosorum incompositos
motus compescit, & in vniuersum omnem capitis dolorem mulcet. Tussientibus, ta-
bidis, humores ægre a thorace reicientibus, cardiacis, sanguinemq; excreantibus mi-
rifice opitulatur. Confert etiam resolutis, viscerum & laterum malis. Lapidēs conte-
rit, stillicidium & difficultatem vrinæ soluit, & omnia vteri vitia discutit. Quotidia-
nis, tertianis, & quartanis febribus ante inuasionis horam sumta succurrit. Quicquis de-
nique semper hac vti antidoto consueuerit, is neq; apoplexiæ, neque colico malo vn-
quam obnoxius erit. Conficitur autem in hunc modum. *Asari*, ¹ *seminis hyoscyami*,
² *carpobalsami*, ana drachmas duas & dimidiam. *Caryophylli*, ³ *opij*, ⁴ *myrrha*, *cyper*, ana drachmas
duas. ⁵ *Balsami*, *cinamomi*, ⁶ *folij*, *zedoaria*, *zingiberis*, ⁷ *costi*, *coralli*, ⁸ *casia*, *euphorbij*, *tragacantha*,
thuris, ⁹ *styracis calamita*, ¹⁰ *saluia*, ¹¹ *mei*, *seselios*, ¹² *sinapi*, ¹³ *saxifraga*, *anethi*, *anisi*, ana drachmā
vnā. *Ligni aloes*, ¹⁴ *rhei pontici*, *alipha moschata*, *castorij*, *spica*, *galanga*, *opopanax*, *anacardi*, *ma-*
stiches, *sulphuris ignem non experti crudius*, *radicis peonia*, *eringij*, *carnis palmularum*, ¹⁵ *behen albi*
& *rubri*, *rosarum*, *thymi*, *acori*, *pulegij*, *aristolochia longa*, *gentiana*, *corticis radicis mandragora*,
chamadryos, ¹⁶ *phu*, *ammeos*, *baccarum lauri*, *piperis longi*, *piperis albi*, *xylobalsami*, ¹⁷ *carnabadij*, ¹⁸
amomi, ¹⁹ *seminis macedonis*, ²⁰ *libystici*, *ruta*, ²¹ *sinonis*, ana drachmam dimidiā. *Auri puri*, *argēti*
puri, ²² *margaritarum non perforatarum*, ²³ *ossis anterioris narium purpura*, *ossis cordis ceruini*, ana
grana frumentacea quatuordecim. *Lapidis saphyri*, *smaragdi*, *iaspidis*, ana drachmam vnā. *Nucis*
auellana drachmas duas. *Pyrethri*, *ramēti eboris*, *calami odorati*, ana grana frumentacea viginti no-
nem. ²⁴ *Mellis*, aut *sacchari*, quod satis est.

ANNOTATIONES.

Hæc integra & legitima est, & ad verbum e Græco Nicolao transcripta Aureæ Alexandrinæ com-
positio; quam si cum aliorum codicum descriptionibus cōferre volueris, reperies in iis quædam de-
siderari. Non est autem, quod quispiam speret a nobis, vt componendi rationem præsentis, & aliorum F
etiam sequentium antidotorum exponamus: id namque infiniti fere laboris esset, sed quod polliciti in
huius libri procemio sumus, si quæ vel vocum, vel rerum obscuritas & difficultas in medicamentorum
compositionibus occurrat, hanc breuib; semper annotationibus illustrabimus. Nec etiam de singulis
annotationes struemus, sed de iis solum, quorum nulla in libro primo facta est mentio. Aurea vero di-
cta est, ab auro, quod eius compositionem ingreditur. Alexandrina autem cognominatur ab insigni vr-
be Ale-

A be Alexandria, vbi constructa est. Nam illic studia bonarum artium maxime floruerunt, vt mirum non sit, optimos quoque Medicos ibidem commoratos fuisse.

1 *Seminis hyoscyami.*) Quotiescunque Hyoscyami seminis simpliciter & sine adiectione fit mentio, Hyoscyamus simpliciter elatus.

Id quod semel monuisse Pharmacopoeos satis sit.

2 *Carpobalsami.*) Quum suspicio non levis, imo indubitatum sit, neque Carpobalsamum, neque Opobalsamum, neque Xylobalsamum Sepalsiarum esse legitimum & verum: non temere illis ad conficienda medicamenta vtendum erit, sed potius ex officinis Medicorum cicienda, & succedaneo illorum vtendum, quod auctore libelli πειρ ἀνθραλλομένων teste, est radix violæ albæ: ait enim, ἐν τῷ βαλσάμῳ λευκῆς ἰσίδας.

Violam autem albam, non Theophrasti, sed Dioscoridis, quæ Sepalsiis & Arabibus Cheiri dicitur, hoc loco inaudire oportet. Hæc enim commodissime pro Balsamo vsurpari potest. id quod facultates vtriusque abunde docent. Vt enim Balsamum est tenuium partium, menses mouet, vterumque aperit: sic quoque radix, flores, semen, & totus Leucii siue violæ albæ frutex. Immo radix eius, vt gustus liquido docet, mordax & acris reperitur, & aliqua ex parte odorata. Vt odio digna sit Matthioli tum impudentia, tum pertinacia, qui affirmare audet, eam radicem nec morsu mordacem, nec feruentem ore, nec vlla ex parte odoratam, contra manifestum tum narium, tum linguae iudicium. Parum igitur circumspecte aliorum sententias suggillat & arrodit Matthiolus. Quod vero ad libellum succedaneorum Galeno adscriptum attinet, facile cōcessero, hunc non esse Galeni, sed spurium, quod multa substituatur absurdissima, quod nos supra in nostris succedaneis etiam aliquoties ostendimus. Tamen non est improbandum, quod balsamo substituit violæ albæ radicem, propter causam quam produximus. Quum itaque habeamus a natura productum, quo pro omnibus iam dictis vtamur: non est cur ad aliquod arte paratum, nempe oleum Charyophyllorum, vt Valerius Cordus censuit, confugiamus.

C 3 *Myrrha.*) Actuarius Latinus, a Ruellio conuersus, pro Myrrha habet baccarum Myrti. Sed locum illum esse deprauatum, e Nicolao abunde liquet, qui hic habet μυρρῆν. Latini etiam codices omnes, qui Nicolao Præposito hætenus attributi sunt, Myrrhæ legunt. Vt dubium non sit, pro μυρρῆν apud Actuarium falso scriptum esse μυρρίνης: & facilis quidem ab altera in alteram vocem fuit lapsus. Porro optima & vera Myrrha inuentu rara est: vt hoc nomine metuendum sit, officinarum Myrrham non esse legitimam. Suspicionem hanc auget, quod notæ, quæ sunt apud Dioscoridem, & libro primo commemoratae, illi non omnes conueniant. Quin ipsi Bdellii indicia magis respondere videntur, quam Myrrhæ, vt ea de causa Bdellii potius quam Myrrhæ species quibusdam esse putetur. Quicquid autem sit, constat non esse optimam, nec inter Myrrhas deterrimam. Apparet autem, eam esse Myrrhæ speciem, quæ Caulalis Dioscoridi nominatur. Quippe hæc ἰνδὸς, hoc est, ultra tempestiuitatem producta, bonitatem suam amisit, & exoletarum more arefcit, nigra ac retorrída existit.

D 4 *Balsami.*) Valerius Cordus in suo medicamentario libro, pro Balsamo habet Opobalsamum, quod admiratione dignum est: quandoquidem in Græco Nicolai codice βαλσάμῳ, & in Latinis quoque codicibus scriptum sit Balsami. Sed quum neutrum habeatur, parum refert vtro modo legas. Vtendum enim erit succedaneo, quod qualis sit, paulo ante exposuimus. Ridet me hoc in loco Franciscus Alexander, quod notarim Cordum propterea, quod pro Balsamo subiecerit Opobalsamum, quod per balsamum sit intelligendum Opobalsamum, ignorans Myrsium distincte iis vocibus Xylobalsamū, Opobalsamū, Carpobalsamum, & Balsamum vti, atque per tres priores lignum, succum, & fructum semenue, per quartam vero herbam ipsam intelligens. Quapropter non tantum ridendus, sed cachinno excipiendus nobis hoc nomine Franciscus erit.

5 *Folii.*) Folio vero, quod Græcis vetustioribus Malabathrum dicitur, Sepalsias destitui, libro primo indicauimus. Succedaneo igitur eius vt Pharmacopoei vtantur, est necesse, quod Galeno auctore est.

πείρα σφακίτης, ἢ τανδράχης, ἢ ἀτρακτύλις: id est, casia rotunda, aut spica nardi, aut atractylis. Quum vero hæc antidotus alioquin capiat casiam, & spicam nardi, præstat folii loco atractylim vsurpare. Quæ qualis sit, in primo de Stirpium historia commentariorum tomo monstrauius. Atractylim autem folii esse succedaneum, hinc omnibus palam sit, quod hæc idem temperamentum, eandemque facultatem cum Spica nardi obtinet. Siquidem in primo ordine calefacit, & secundo exsiccit, obstructionsque iecoris, ac aliorum interiorum viscerum, perinde atque Spica nardi, tollit: vrinam cit, & fluxiones desiccit, vt hinc omnibus perspicuum euadat, Galeni locum: hunc in libello πειρ ἀνθραλλομένων esse mendosum. Nam illic falso ἢ τανδράχης, pro ἢ ἀτρακτύλις scribitur. Nullibi enim neque apud Galenum, neque Dioscoridem stirpis, quæ Tractylis dicitur, mentio fit. Verum hoc loco, more suo, Matthiolus mihi insultat, & perperam me in altera sua editione Dioscoridis Malabathri seu Folii loco Atractylem substituisse scribit, nulla alia motus ratione, quam quod nusquam se apud Galenum legisse dicat, quod Atractylis Folii vicem suppleat, sed Casia potius odorata, & Nardi spica. Quasi vero id non doceat Galenus in eo libello, qui inscribitur πειρ ἀνθραλλομένων, opéraque Ioannis Caii Britanni editus est. Cui accedit ratio paulo ante a me producta. Non quod inficias eam pro folio Casiam odoratam & Nardi spicam substitui posse, sed quum vtrique alias compositionem hanc ingrediatur, consultius esse arbitratus sum, nunc pro folio vtendum esse, ob causas iam dictas, Atractyli. Vt hinc liquido appareat, Matthiolum nusquam non alios, me maxime, reprehendendi captare occasionem. Quid enim a sycophantæ morsu, etiam admodum circumspecte dictum, tutum esse posset? Porro quum Atractylis non nisi fata in Germania proueniat, li-

ecbit in eius penuria spina vpi, quam vulgus & officinæ Carduum benedictum appellant, non propterea
ut malitiose mihi impingit Matthiölus, quod in Germania Atractylis non reperiatur, nisi in hortis sata,
quam eadem de causa Carduus etiam benedictus, quandoquidem nullibi reperiatur, nisi in hortis sa-
tus, substitui nequeat, sed quod Carduus ille frequens in hortis colatur, & easdem cum Atractylide vires
habeat. Quæ igitur Matthiöle furia te exagitarunt, ut in hanc prorumperes in tuis epistolis medicinali-
bus vocem? prohi Diu immortales, quanta est hic Fuchsii ineptia. An non mihi nunc licet potius in
hunc modum exclamare: Prohi Deum immortalem, quanta est Matthiöli improbitas & peruersitas, qui
malitiose rapit in calumniam, quod verissime est a me dictum. Cur enim non suaderem in penuria A-
tractylidis herbæ in Germania paucis cognita, ac rarissima, aliam hac multo frequentiore & in om-
nium hortis plantatam substituere? Sed satis sit in præsentia Matthiöli mordacitatem utcumque ad-
umbrasse.

Casia. 6. *Casia.*) Intelligit eam, quam Sepalsia ligneam vocant. Non est autem, quod hactenus vtitam ac-
cipiant Pharmacopœi Casiam, quod illa radice potius quam arboris cortex sit, ut omni odore ac sapo-
re, ita etiam facultate destituta. Exigenda igitur prorsus ex omnibus officinis erit, nec vlli deinceps
compositioni permiscenda. Quæ autem vera sit Casia, libro primo diximus, nempe ea, quam inter spe-
cies Canellæ quidam numerant. Ea enim haud dubie Casia species est, tametsi forte non optima.

Canella. Quare recte fecerint Pharmacopœi, si semper eius duplum acceperint. Id quod etiam in Cinamomo
faciendum erit. Quippe Cinamomum nostrum huiusmodi quæquam optimum aut certe Casia genus est,
ideoque duplicato eius quoque pondere utendum erit. Id quod in succedaneis suis Galenus quoque sua-
det, inquit: ἀπὸ κινάμου, καὶ τῆς οὐγγὸς διπλάσιον, ἢ βεζύου διπλῶν: Pro Cinamomo Casia fistula

**Cinamo-
mum no-
strum quale.** (ita enim vocat quam hodie ligneam appellant) aut Saurinæ duplam portionem. Ut succedaneum Ca-
sia sit, Saurinæ pondus duplicatum. Quinetiam Dioscorides in Cinamomi legitimi penuria duplica-
tam Casia portionem sumendam esse hortatur. Quapropter perpetuo Pharmacopœi pro vero Cina-
momo vulgaris & nostri Cinamomi, præsertim ubi non admodum acere fuerit, duplum: & pro Casia iti-
dem, eius Casia quæ vulgare Cinamomum refert, duplam portionem in componendis medicamentis
vsurpent. Videtur autem Cinamomum nostrum esse imbecillum Cinamomum, quod Galeño priua-
tim Cinamomis, aliis vero pseudocinamomum appellatur.

Costus. 7. *Costi.*) Quoties Costi mentionem facit simpliciter, & citra adiectionem Nicolaus, semper ama-
rum appellatum intelligit, ut qui gustu feruidus sit. Nos vtriusque Costi historiam, & picturam in al-
tero nostrorum de Stirpium historia Commentariorum tomo dedimus. Quum vero paucis adhuc ve-
ra Costus nota sit, operæ precium erit eius succedaneum cognoscamus: ut in penuria Costi, saltem
succedaneum habeamus. Tale autem est Helenium, vel ut hodie nominant, Enula campana, quod in
suis ἀντικαρδιόενος confirmat Galenus, inquit: ἀπὸ κόστυ, ἐλένιον. Subscribit quoque ratio, quæ docet
idem vtriusque temperamentum esse, nec viribus inter se discrepare, ut ex ambarum stirpium historiarum
collatione omnibus sit manifestissimum.

**Styrax ca-
lamita.** 8. *Syracis calamita.*) De ea abunde libro primo dictum est, quapropter de hac ipsa in præsentia,
quemadmodum etiam aliis, quæ loco iam citato explicata sunt, nihil annotabimus. Quod semel hic
monuisse lectorem satis sit.

Salvia. 9. *Salvia.*) Latini Nicolai codices habent Saliuncæ, at minus recte. Nam in Græco Nicolai codice
est ἐλενοράκη, id est, saluiæ, ut nos conuertimus. Nam hæc sanguinem cohibet, menses & vrinam cit, i-
deoque rectissime huic antidoto permiscetur. Errore autem imperiti librarii accidit, ut propter litera-
rum affinitatem, Saliuncæ pro Saluiæ sit scriptum. Saliuncæ autem a Salvia diuersam esse stirpem fa-
tis constat. Ceterum Saliunca, ut id obiter dicamus, non est Nardus siue spica Celtica, quam officinæ

Saliunca. Medicorum Spicam Romanam nuncupant, ut nonnulli putant. Quæ autem herba sit Saliunca, tertio
nostrorum de Stirpium historia commentariorum tomo diximus.

Meum. 10. *Mei.*) Meo vero quod Athamanticum dicitur, destituitur: quapropter eius succedaneo uten-
dum, quod est eius herbæ radix, quæ Germanis *Bernstirn* dicitur. Nam easdem, quas Meum facultates
obtinet, ut in altero nostrorum de Stirpium historia Commentariorum tomo abunde ostendimus, Mat-
thiölus falso herbam Imperatricem, siue Angelicam dictam pro Meo substituit.

Sinapi. * *Sinapi.*) Hoc in loco Bernardus Deslentinus Cronenburgus pudendo errore Napum substituit,
quum in Græco codice diserte scribatur σάπιον. Sic passim bonus ille vir impingit turpiter, interim ta-
men nihilominus aliorum se censorem, si Diis placet, constituit.

**Saxifra-
ga.** 11. *Saxifraga.*) Quum multæ hodie sint stirpes Saxifragæ nomine insignitæ, diligenter dispicien-
dum erit, quam hoc loco, & alibi quoque Nicolaus, alique Græci intellexerint. Nullam vero nisi eam
quæm Dioscorides Empetron: non quidem hoc, quod idem Phacoides nominant, sed quod post Tri-
bulum libro quarto pingit, & Romanis Saxifraga dicitur. Eius historia & pictura est in tertio nostros
de Stirpium historia commentariorum tomo capite 64. Officinis hodie ignota. Pro ea tamen uti

**Empetron
alterum.** licebit herba, quæ Plinio Saxifraga, alterum Trichomanis scilicet gentis, & hodie vulgo Ruta muraria
appellatur, qua hactenus Sepalsia perperam pro Adianto, siue ut illarum voce utar, Capillo vene-
ris vsæ sunt. Huic namque herbæ Saxifragæ nomenclatura fere præ omnibus aliis quadrat. Si quidem
in saxis ac petris nascitur, & calculos vesicæ frangit, & vrinas cit. Dum itaque nascitur, saxa frangit &
perrumpit: dum etiam assumitur, calculos conterit, ut hoc nomine merito illi Saxifragæ appellatio con-
ueniat.

A 12. *Rhei Pontici.*) Falso in Cordi medicamentario libro, & omnibus Latinis Nicolai codicibus, quorum fidem ille secutus est, Rheu barbari legitur. In Græco namq; Nicolao est *ῥέον ποταμῶν*. Est autem Rheum ponticum diuersum a Rheu barbaro: vt libro primo huius Operis, & alibi copiosissime demonstraui. Quum vero Rheum ponticum Galeni, aliorumq; veterum, de quo hoc loco, Nicolaus loquitur, sit officinis nostris incognitum adhuc, aut saltem in vsum hodie Medicorum non veniat, pro eo succedaneo aliquo vtendum erit: quod quale sit, metipse Nicolaus ostendit. Nam suo quoque tempore rarum esse coepit Rheum ponticum verum, ideoq; eius succedaneum indicare coactus est. Sic enim in interpretatione quarundam vocum ille scriptum reliquit: *ἐάν μὴ ῥέον, κενταύριον τὸ μέγα, ἢ κυρτόριζα*. id est, Si desit Rheum, Centaurio magno aut Symphyti radice vtendum. Et Nicolai sententiam confirmat Galenus, qui in libello suo *περὶ ἀντιβαλλομένων, ἀντὶ ῥέον, κενταύριον*: hoc est, pro Rheo, Centaurium, substituendum esse docet. Quum itaq; fere omnes Centaurii magni radicem pro vero Rheo pontico vsurparent, factum est, vt nomen Rhei pontici in Centaurii radicem translatum sit: quod etiam hodie in officinis retinet. Rheo pontico igitur Seplasiarum, aut Symphyto, id est, Consolida maioris vulgo vocata radice, pro veterum Rheo vtendum erit Pharmacopœis. Hoc autem in loco maxime vsurpandum erit, vt sanguinem excreantes hæc antidotus iuuare etiam possit. Quum vero neutra harum radicum purgandi facultatem habeat, dubium non est, nostrum Rheu barbarum, cui eiusmodi facultas inest, a veterum & Nicolai Rheo esse diuersum, quod libro primo quoq; fusius monstraui.

Cordus
hallucina-
tus.
Rheum
Ponticum

Succeda-
neū Rhei
Pontici.

B 13. *Behen albi & rubri.*) Græce est *ἑρμωδακτύλος ἑρυθρῆς καὶ λευκῆς*, id est, hermodactyli rubri & albi. Studio autem has voces omisimus, ne imperitis Seplasiariis errandi daremus occasionem, qui Hermodactylos nominant stirpes, ab iis, quas ita Nicolaus appellat, diuersissimas. Quippe Nicolaus, perinde atq; Aetuaris, Hermodactylos rubros & albos vocat eas radices, quas Arabes, & officinæ Medicorum, hos quasi semper imitantes, Behen albam & rubram nominant. Hæ olim afferebantur ex Armenia: quarum quædam contortæ erant, aliæ in rectum exierunt, suauis odore, & glutinoso humore. Eas Serapio calidas & humidas, ex Mesuæ cuiusdam sententia, esse statuit. Auicenna calidas & siccas in secundo ordine. Ita nihil est in Arabum scriptis solidum, ac sibi consonans. Hodie ex Italia ad nos deferuntur, vt suspicio sit, non esse legitimas, præsertim quum Arabum notæ illis non respondeant. Alba quidem Behen, quam officinæ ostendunt, mirifice tortuosa est: ac glutinosum aliquid præ se fert, sed minime odore suauis donata, vehementer tamen amara. Rubra certe nihil habet, quod legitimum esse doceat. Quid autem sit Behen illa rubra tomo primo nostrorum de Stirpium historia commentario monstraui. Præstat igitur in ista hæsitazione harum radicum succedaneo vti, quod Auicenna auctore est Tuder. Ita vero Horminum appellat nominatam herbam: quæ qualis sit, altero nostrorum de Stirpium historia commentariorum tomo monstraui. Horminum autem pro Behen substitui posse facultates eius abunde docent. Nam Venerem stimulat Horminum, Dioscoride auctore. Behen iudem, Auicenna attestante, semen genitale adauget. Hic discutiendi gratia maxime indi potest. Quod si tamen sanguinem excreantibus hanc antidotum dederimus, præstat Behen rubeum officinarum, vtpote adstringens medicamentum, iniicere.

Hermoda-
ctyli Nico-
lai.
Behen al-
ba & ru-
bra.

Succeda-
neum Be-
hen.
Hormi-
num.

D 14. *Phu.*) Valerianam intelligit: & quidem, si haberi potest, optimam, quæ, qualis sit, alibi ostendimus. In melioris autem penuria, vulgari vti licebit.

E 15. *Carnabadii.*) Græce est *καρναβάδιον*. Studio igitur Græcam vocem retinuimus, vt quid per hanc vocem Nicolaus intelligeret, Pharmacopœi cognoscerent. Ita vero appellat, nempe *καρναβάδιον* & *καρναβάδιον*, cuminum Æthiopicum, vt satis liquet ex antidoto 406. in qua metipse Carnabadium interpretatur cuminum Æthiopicum. Simeon autem Sethi, & alii recentiores Græci, Carnabadium nominant, Careum Dioscoridi & aliis dictum. Hinc est, quod Latini codices Nicolai, quos Cordus secutus est, hoc loco pro Carnabadio habent Carei. Nihil autem refert, Cumini an Cari, seu Carei semen vsurpemus, quum eandem facultatem omnia obtineant, & vtrunque vrinam moueat, statusque discutiatur.

Phu.

Carnaba-
dium.

E 16. *Amomi.*) Amomum legitimum hodie desiderari, libro primo ostendimus. Neque enim est rosa Hierichuntis, aut S. Mariæ, vt Cordus censet. Siquidem Bryoniæ folia haud obtinet, nullum Ori-gani odorem refert, acrimonia nâres non percellit, imo potius nullius est odoris. Tantisper igitur dum carebimus vero Amomo, eius vice, Galeno auctore, Acoro vtetur: aut in huius penuria, Galanga maiore vocata, aut ammeos semine.

Amomi.
Cordus
errat.
Succeda-
neum A-
momi.
Macedo-
nium.

F 17. *Macedonisii.*) Per Macedonisium inaudiendum semen, quod Græcis Hippofelinum, & Romanis Olus atrum nominatur. Hinc est, quod idem semen in hodiernum vsq; diem Seplasis petroselinum Macedonicum, quod in huius locum in veri Petroselini Macedonici locum successerit, vocetur: quum Macedonisium potius, Nicolai exemplo, illis appellandum esset. Sed hic more suo nobis obgannit Matthiolus, negatq; Macedonisium vocatum esse Hippofelini, sed potius Smyrni semine. Parum cogitans, Smyrni semine esse Brassicæ semini simile, cum quo Macedonisium nullam prorsus similitudinem habet, rotundum enim non est. Quapropter si etiam euicerit Matthiolus, hoc semen quod officinis nostratibus Petroselinum Macedonicum vocatur, nō esse Hippofelinum, tamen id nunquam a nobis im-
petrabit, vt illi concedamus, idem semen esse Smyrni, ideo in manifesto errore versari Matthiolum constat.

18. *Libystici.*) Et illud hodie semine in officinis Medicorum desideratur. Neq; enim id est, quod Leustica Libystica

Succeda- illæ appellant: id enim Dauci potius genus est, ut alibi demonstrauimus. Quapropter eius succedaneo
neum Li- vtendum, quod, Galeni testimonio, est Staphilinus. Vt enim Libystici semen menses cit, vrinas prouo-
bystici. cat, statufque discutit: ita etiam Staphilinus, vt ex vtriusq; historia patet. Aut loco eius vtantur semine
eius herbæ, quam nos pro Libystico in altero nostrorum de Stirpium historia commentariorum tomo
subiecimus.

19 *Sinonis.*) Sinonis historiam in tertio de Stirpium historia tomo texuimus. Non habetur in of-
ficinis Medicorū. Pro eo tamen vsurpare licebit semen id, quo hactenus Seplassæ pro Amomo vsz sunt.

20 *Margaritarum non perforatarum.*) Hæ enim perforatis, vt primo diximus libro, præstantiores

Margaritæ sunt.
21 *Offis anterioris narium.*) Intelligit id, quod Actuarius & aliis recentioribus Græcis Blattium By-
zantium, & Bysantis appellatur. Officinis Blacca Bysantia. Sic autem nominant purpuræ operculum,
quod foramini capitis eius, quod naris instar est, veluti scutum imponitur. De quo plura libro primo
annotauimus.

22 *Mellis quod satis est.*) Triplum vero mellis sumitur, quod semel monuisse sufficiat. Si quis de
ceteris, quorum nulla in iis annotationibus mentio facta est, dubitauerit, is ad indicem, aut primum re-
currat librum. Ceterum in Nicolai Latinis codicibus, octo hæc in ista Antidoto desiderantur medica-
menta: Saluia, palmulæ, Behen album & rubrum, zaphyrus, smaragdus, iaspis, & nux auellana.

Theriaca Andromachi. II.

Quæ in
Latinis
Nicolai
codicibus
medica-
menta de-
sunt.

Theriaca, seu Theriace dicta est, quod ferarum & viperarum moribus medeatur,
omnium antidotorum præstantissimum: exitiæ venenis, & ferarum virus
ciaculantium ictibus aduersatur. Inueteratis capitis doloribus, vertiginibus, aurium
grauitati, comitialibus, attonitis, apoplecticis, resolutis, oculorum hebetudinibus,
voci amissæ, asthmaticis, recenti & vetustæ tussi, sanguinem reicientibus, ægre excre-
antibus, & non nisi recta ceruice spirantibus, ventriculi imbecillitatibus ac inflationi-
bus, colicis cruciatibus, ileosis, cholericis, celiacis, regio morbo correptis opitulatur.
Induratum lienem liquefacit, calculos in renibus comminuit, vrinæ difficultati, & ve-
sicæ exulcerationibus medetur. Februm horroribus & rigoribus, hydropicis, ele-
phantia laborantibus sæpe præsentis est auxilio. Menstrua cit, foetum mortuum excu-
tit: articulorum doloribus adiumento est. Non autem corpus modo, sed & animi mor-
bos persanat. Melancholicis itaque, lymphaticis, aquæ pauoribus, & id genus aliis ma-
lis iugiter data succurrit. Ceterum in pestifera lue, vix aliud præsentius magisque ido-
neum præsidium, hac ipsa inueniri potest. Habet ¹ *pastillorum* ² *theriacorum*, drachm. vi-
ginti quatuor. *Pastillorum* ³ *scilliticorum*, drachm. quadraginta octo. *Piperis longi*, ⁴ *liquoris pa-*
paueris, ⁵ *magmatis hedychoi*, ana drachm. viginti quatuor. *Rosarum aridarum*, ⁶ *iridis Illyricæ*,
⁷ *glycyrrhizæ*, ⁸ *seminis napi sylvestris*, ⁹ *scordij*, *opobalsami*, *cinamomi*, *agarici*, ana drachm. duo-
decim. *Myrrha*, *costi*, *cruci*, *casia*, *nardi Indiciæ*, ¹⁰ *florum iunci odorati*, *thuris*, *piperis albi & ni-*
gri, ¹¹ *dictamni*, ¹² *marrubij*, ¹³ *rhei*, ¹⁴ *stæchadis*, ¹⁵ *petroselini Macedonici*, *calaminthæ tere-*
binthina, *zingiberis*, *quinquefolij radices* ana drachm. sex. ¹⁶ *poly*, *chamepityos*, *styracis*, *amo-*
mi, ¹⁷ *botryos*, *mei*, *nardi Celticæ*, ¹⁸ *sigilli Lemnii*, *phu Pontici*, *chamadrios Creticæ*, ¹⁹ *foliorum*
malabathri, ²⁰ *chalcididis tosta*, *gentianæ*, *anisi*, *succi hypocistidis*, *carpobalsami*, ²¹ *gummi*, *semi-*
nis faeniculi, ²² *cardamomi*, *seselios*, ²³ *acaciæ*, ²⁴ *thlaspios*, *hyperici*, ²⁵ *sagapæni*, *ammeos*, ana
drachm. quatuor. *Castorej*, ²⁶ *aristolochia tenuis*, *seminis dauici*, *bituminis Iudaici*, *opopanacis*,
centaurij minoris, *galbani*, ana drachm. duas. *Mellis*, *libras decem*. *Vini phaleri*, ²⁷ *quod sa-*
tis est. Coniice in mortarium opium, hypocistidem, sagapenum, glycyrrhizæ succum, acaciæ,
styracem, opopanacem: & affunde exiguum mellis, & vnum quodque contusum dissolue, &
adiice vinum, vt illa superet, finitoq; vt per triduum madescat. Dein arida omnia, radi-
ces scilicet, semina, herbas, tusa & cribrata coniice in mortarium, & affuso vino terito,
ac ²⁸ vt collyria læuigato. Postea iis e mortario exemptis, admisce omnia arida, & valide
subigito. Tandem iniice mel terebinthinam, galbanum, & opobalsamum, ac calefacta
in cacabo confunde. In mortario autem hæc vniendo diebus quinque valide subigito,
ac in vitreo vase recondito. Atq; hoc modo Andromachi theriacam Nicolaus Myre-
psus conficiendam esse docet. Aetius aliam habet, huic propemodum similem, hanc
scilicet. *Casiam & Cinamomum per se tundito, & cribrato*. Dein *crocum*, primum in mortarium
coniectum, cum vino probe terito. Vbi quam tenuissimus factus fuerit, ei cribratam ligneam
Casiam addito, & rursus affuso vino terito. Postquam *Casia* sufficienter fuerit trita; *sigillum*
Lemnium, cum vino modico, in alio paruo mortario per se terito, & bitumen similiter dissolu-
tum ad *Crocum & Casiam* injecto, ac rursus aliquandiu terito. Reliqua vero omnia herbacei
generis

Theriaca
conficiendi
ratio phar-
macopæis
obseruan-
da.

A generis cum tribus pastillis & castorio tundito, perq; tenuissimum cribrum cernito. Succulenta vero omnia, acaciam nimirum, myrrham, opium, thus, hypocistidis succum, glycyrrhizam, opopanax, sagapenum, galbanum, & gummi confusa, in competenti vini mensura una die ante macerato. Styracem vero in mortarium magnum ac amplum coniectum, cum opobalsamo terito, & priuatim vnito. Deinde & præmacerata succulenta in mortarium iniicito, ac probe terito: atque, si opus fuerit, vinum sensim affundito. Postquam autem & hæc sufficienter fuerint trita, styracem antea tritum, & casiam, & crocum, & quæ cum eis sunt adiucito, ac diligenter vnito. Chalcitidis deinde bonæ vncias sex in ollâ exigua, Chalcitis
vt tollens
da. nouâ, amplioris, iniicito, & supra carbones ignitos imponito, & chalcitidē assidue cum pura rudicula agitato. Quū vero liquefieri cœperit, & lutosam subsidetiā acquisierit, **B** ita, im ab igni auferto: potitaq; in terrâ ollula, quo vniatur, diligenter agitato, coagmentatāq; paulisper finito. Deinde ablato & abiecto eo, q; in superficie siccus & rufum apparet, ex medio quod viridius est, & molle apparet, accipito: ac quatuor drachmas ponderato, easque in medium mortarium iniicito, in quo reliqua prius trita habes: cumque modico vino in aliquo mortarii loco dissolutas, cum reliquis committito, ac exiguo addito melle despumato, vnito. Postquam vero chalcitis ad reliqua trita fuerit admixta, omniaq; nigrum acceperint colorem, tunc addito etiam terebinthinam, cum modico melle prius dissolutam. Quæ deinde admixta, arida etiam tusa & cribrata adiucito, & reliquum item mellis paulatim admisceto. Postea cum magno pistillo omnibus quam diligentissime vnitis, antidotum ipsam in mortarium transfundito, & **C** pistillis ligneis ex grauiissimo ligno & politissimo fabrefactis, eam ad solem in mortario tundito. Denique probe contextam finito, & rursus post triduum aut quatrimum ad horas tres tundito, atque id donec quadraginta dies abierint facito. Dein vasis vitreis, modico melle despumato prius imbutis, excipito. Neque vero vasa valde expleto, sed locum quendam, quo transpirare, ac efferuescens se attollere medicamentum, ne effluat possit, relinquito, probeque contextum ac obligatum adseruato. Hæc est priore magis exquisita theriacam conficiendi ratio, quam Sepalsarii obseruare debent. Reponendum autem hoc medicamentum, donec feruescat in tepido & sicco loco: postquam vero subsederit, in frigido & sicco loco adseruandum erit. Per mensem medicamentum ipsum visitare oportet, & rudicula munda agitare, ne id quod in superficie est, **D** & quod vasi contiguum adhæret, exarescat. Ceterum tempore ad concoctionem non ex quo indiget, quo maturā vsui antidotus fiat, & iuste concoquatur.

ANNOTATIONES.

Hæc theriaca Andromachi senioris, Neronis archiatri est, adeoq; omnium optima. Quapropter ceteris omnibus contemptis, hac una Medici vt debent, nec aliam Pharmacopœos parare oportet. Nec Andromachus.
Bernardus
Dessennius
non ad
diendus. audiant horror Bernardum Dessennium Cronenburgium, qui hanc officinis negligendam putat nulla alia de causa, quam quod sit mendosissima & peruerissima. Nam nos, mendas eas omnes sustulimus, & simplicibus omnibus suas appellationes restituiimus. Quod quum ipse præstare haud posset, factum est vt abiiciendam putarit. Sed neque hoc loco Francisci Alexandri morsus effugere potui, quin me illis connumeraret, atqui falso, qui suas compositiones e mendoso Nicolai codice petunt omnes. Quum autem aliis in locis hanc calumniam abunde diluerim, & hoc loco Theriaces compositionem ex Andromacho recenseam, prolixiore confutatione opus haud erit.

1 *Pastillorum.*) Pastillos Latina voce appellauimus, quos Græci *τροχίσκος* officinæ non nihil deprauata appellatione, trochiscos nominant.

2 *Theriacorum.*) Pastilli theriaci sunt, qui a vipera, vel, vt hodie vocant, de thiro conficiuntur, qui infra inter pastillos describentur.

3 *Scilliticorum.*) Eodem in loco horum etiam compositionem reperies.

4 *Liquoris papaneris.*) Opium hodie vocatum intelligit, quod non est, nisi liquor siue lacryma papaneris, sua sponte emanans. De quo abunde lib. I. diximus.

5 *Magmatis hedychroi.*) Pastilli genus est, quod ab Auicenna corrupte Alindaracaron nuncupatur. Eius descriptionem infra inter pastillos referemus.

6 *Iridis Illyricæ.*) Hæc hodie nostris Sepalsii ignoratur. Annitendum vero illis, vt hanc aliquando habeant ex Illyria, quæ non longe a Germania abest. Duum est generum, vt libro primo huius Operis diximus. Interim tamen dum Illyrica iride destituuntur, pro ea vt Florentina nominata vtantur licet: aut de Galeni potius in suis succedaneis sententia, Helenio odorato, seu vt hodie appellant, Enula campana aromatica. Inquit enim, *ἀντὶ τοῦ ἰλλυρίου, ἐλένιον ἐρωματικόν.*

7 *Glycyrrhizæ.*) Non radicem eius, sed succum potius Andromachus hoc loco accipiendum esse Glycyrrhi-

innuit, id quod sequetur, ia satis testantur, & id ipsum confirmat libro primo de Antidotis Galenus, qui hanc vocem diserte expians ait, γλυκύλης χυλῆς, id est, dulcis radices succum. A

Napus sylvestris.

8 *Seminis Napi sylvestris.* Napum, quem Græci Buniada nominant, duplicem esse, a'ibi ostendimus, nempe sativum & sylvestrem. Satiivum, parvum, oblongum, densumque rapum est, quod Germanis Druckenstreckrüblin et Weyrtschüblin nuncupatur. Sylvestris, iisdem Druckenstreckrüblin appellatur. Geminus autem est, Creticus, & Germanicus, ut tomo primo nostrorum de Stirpium historia commentariorum diximus. Matthæolus libro quinto suarum epistolarum medicinalium Galeni sententiam, qui sylvestris Napi ex Creta a'ati semen Theriacæ imponendum esse præcipit, impugnat, & sativi potius Napi semen usurpandum esse contendit, quod Andromachus nec agrestis, nec sativi aperte meminit, sed dulcistantum Napi feminis. Quum vero in agresti nulla percipiatur dulcedo, sed potius acuta quædam amaritudo, ideo illum de domestici Napi semine locutum esse verisimile est. His, inquit, Dioscoridis accedit auctoritas, qui libro secundo Napi sativi semen potum venenorum vires hebetare, antidotisq; admisceri scribit, quas tamen vires sylvestri, de quo 4. libro egit, nusquam tribuit, sed tantum ad urinas secundasque ducendas commendavit. Quanquam autem non anxie cum Matthæolo contendere velim, nū sativi, an sylvestris Napi Buniadis, quod uterq; dulcis sit, semen Theriacis compositioni adhibendum sit, quum easdem vires habeant, tamen nihil dubito, quin Cretici sylvestris Napi, utpote maius & præstantius, ut ex pictura, quam in primo nostrorum commentariorum de Stirpium historia tomo subieciimus, satis liquet, Galenus ceteris recte prætulit. Hincque adeo est, ut dum Galenum immerito flagellat Matthæolus, ipse in maximum incidat errorem, nempe Bunion cum Buniade confundens. Licet enim tum Bunias, tum Bunion Lapi genus sit, ut ex libro vigesimo Plinii capite quarto, liquet, tamen Andromachus nequaquam de eo Napi, quem Bunium, sed de eo, quem Buniada vocant, loquitur: inquit enim καὶ γλυκύλης σπέρματ' ἐστὶν ἐν Βυνιάδῃ. Quum vero Napus Bunias etiam geminus sit, quod ignorat Matthæolus, nempe sativus & sylvestris, & rursus ille quoque duplex est, ut loco paulo antecitato ostendimus, Galenus ex sylvestris genere Creticum reliquis antetulit. Ceterum quod ad Dioscoridis locum attinet, nemo est, qui non videat Matthæolum illius testimonio non recte uti. Siquidem Dioscorides non nisi de Napo Buniade, & eo quidem utroq; sativo scilicet ac sylvestri, libro secundo tractat, quare non erat, cur per sylvestrem Napum Buniada, ipse Bunium dictū intelligeret. Merito igitur Matthæolus suos prodit errores, dum in aliorum scripta nimium inquirens, quæ vera sunt, pro falsis refutare studet. B

Scordium.

9 *Scordii Cretici.* Creticum Scordium ad conficiendam Theriacam Galenus libro primo de Antidotis, utpote quod optimum, existit, usurpandum esse iubet. Nos tamen interea nostrate satis efficaci utemur. Hoc quale sit, alibi abunde monstravimus: errareq; ibidem, qui pro eo allio sylvestri utuntur, docuimus. C

Iuncus odoratus. Squinantus.

10 *Iunci odorati florum.* Quem Latini iuncum odoratum, hunc Græci ῥοίνον vocant. Eius florem iisdem ῥοίνον ἀνθῶς, vel ῥοίνωνθον: Sepalsæ, suo more depravantes vocem, Squinantum nominant. Quum vero hodie flores illi ad nos deferri desierint, culmis iunci uti cogimur. Sunt autem horum tenerissimæ partes in cacumine decerpæ usurpandæ. Aut iunci huius succedaneo utendum, quod Galeno πικρὸν ἐπὶ καρδὰ καλομένην teste, est Cardamomum, libro primo docuimus. D

Distans.

11 *Distami.* Creticum intelligit, qui folia habet alba, lanugine obducta, gustu acra. Hunc Sepalsæ paucis ante annis, prius ignotum, agnoscere cœperunt. De quo alibi multa diximus.

Marrabium. Prasium. Rheum.

12 *Marrubii.* Ita vocant Latini stirpem, quam hodie Sepalsæ Græca nomenclatura Prasium appellant. E

13 *Rhei.* Rheum hoc loco non significat Rhabarbarum, officinis nominatum, ut nonnulli arbitrantur, & vulgares Nicolai Præpositi nominati codices Latini falso interpretantur: sed veteribus descriptum, quod interdum cum adiectione Ponticum vocarunt. Id quod satis testantur Galenus, Paulus, & Aetius, in quibus scriptum est, ῥήν, ῥὴν πορνικῶν, & ῥήν πορνικῶν. Huc accedit, quod Rhabarbarum officinarum Andromacho, quemadmodum etiam Galeno fuerit plane ignotum. Nequaquam igitur Pharmacopœis in Theriacis huius compositione Rhabarbarum est usurpandum, sed Rha veterum Ponticum dictum. Quia vero id ipsum hodie nondum ab omnibus cognoscitur, eius succedaneo pro illo utendum, quod quale sit, in Aurea Alexandrina exposuimus. Sed huic meæ sententiæ, quasi ex composito, reclamationem Matthæolus, qui lib. 5. suarum epistolarum medicinalium, Rhabarbarum potius illi substituendum esse docet, quam magni Cetaurii radicem, idq; nulla alia de causa, quam quod Rhabarbarum, præter id, quod polleat odoris fragrantia, mirum in modum contra venena, & venenatorum morsus valeat. Quasi vero nihil in Theriacis compositionem miscetur, quod non odoris fragrantia præstet. Cur igitur Scordium, Sagapenam, & Castorium non etiam abiicit Matthæolus, quum nullum illorum non gravissimum exhalat odorem. Accedit huc, quod non omnia, quæ ad compositionem theriacis adhibentur, venenis resistent, multa enim hoc tantum nomine admiscuntur, ut cæliacis, dysentericis, sanguinemque reicientibus opem ferant, quæ utique de causa Rha ponticum, aut loco eius Centaurii magni radix, eius compositionem intrat. Valde autem ridiculum est, quod Auicennæ testimonium pro inepta & falsissima sua opinione confirmanda adducit. Nam constat omnibus Auicennam per Rhabarbarum non nisi Rha ponticum intellexisse, & nequaquam id, quod hoc nomine hodie in Medicorum officinis appellatur, quod qui historiam eius cum Galeni verbis de Rha pontico conferre voluerit, manifeste comperiet. Ut mirum sit, quod Matthæolum tam absurdas opiniones proferre non F

A non pudeat, nisi forte se in regio solio collocatum esse existimet, unde omnibus ius dicere possit, & illius dicta pro Apollinis oraculo nobis habenda esse sibi persuaserit. Constitueram quidem, Matthiolum nullo in loco acerbe excipere, verum quum reprehendendi me, & magna ex parte immerito, nullum faciat modum, necesse est ipsum ita referiam, ut alii etiam intelligat; Matthiolum inanibus & nullius momenti rationibus in aliorum sententiis confutandis vti. Quod ad Nicolaum Myrepsium attinet, dubium non est, illum fuisse Pharmacopolam, non admodum rerum peritum, sed diligentem in colligendis tum veterum, tum recentiorum Medicorum in vnum librum medicamentis, ut mirum nihil sit, ipsum Rhaponticum a Rhabarbaro secernere haud potuisse. Quare Matthioli consilium Pharmacopoei, tanquam minus veritati congruens, reiiciant.

14 Stœchadis.) Procerior meliorque Stœchas, Galeno libro de Antidotis teste, est, quæ ex Creta affertur. Quot vero genera sint Stœchadis, primo libro, & tomò de Stirpium historia tertio monstrauimus.

B **15 Petroselini Macedonici.)** Non intelligendum de eo semine, quod ita hodie officinis nominatur: id enim est Hipposelinum, & nequaquam Petroselinum e Macedonia petatum: hoc namq; hodie haud cognoscitur. Licebit tamen pro eo uti semine Hipposelini, quod scilicet, Galeno teste, eius sit succedaneum. Hinc est, quod nomen Petroselini Macedonici, in hoc semen non sit temere translatum. Nam quum in veri Petroselini penuria Medici succedaneo eius uti coeperint, factum est, ut progressu temporis nomen Petroselini ei sit inditum, quod etiamnum hodie retinet in officinis. Habet autem Hipposelinum easdem cum Petroselino facultates, quare merito eius succedaneum existit.

16 Polii.) Montanum intelligit, quod ceteris præstat. Historia & pictura eius est in tertio tomò.

17 Botrys.) Græce & in libro Galeni de Theriaca ad Pisonem, unde hanc compositionem ad verbum descripsimus, est ἀμύμη, βότρυς separatis dictionibus. Hanc lectionem secutus est etiam Nicolaus Myrepsius, qui in Theriaca Andromachi descriptione, itidem habet ἀμύμη, βότρυς καλκή, id est, amomi, Botrys Gallica. Botryn autem merito Gallicam vocat, quod in Gallia copiose proueniat, præsertim iuxta Lutetiam. Nam ut Ruellius, vir excellenti doctrina præditus, memorie prodidit, hæc herba Parisiensibus matronis, melius quam Sepalsis nota est, quæ illam odoris sui, quem de se edit, gratia, vestimentis, pannis, linteis, ac stragulis curiose interponunt, ut scilicet hinc odoris suauitatem contrahant. Andernacus in libris Galeni de antidotis primo, & de Theriaca ad Pisonem βότρυς vocem parum recte, vuz conuertit. Andromachus autem in suis carminibus, quæ a Galeno iam citatis locis referuntur, non βότρυς, sed βοτρυέλων, id est, racemosi, tanquam præstantissimi meminit Amomi, quod ita dictum est, Dioscoride teste, quod οἰνὴ βότρυς ἐκ ξύλου ἀντιπεπλεγμένως ἐαυτῇ, id est, ex ligno instar racemi seu vuz se conuoluat. Hinc est, quod Plinius Amomi vuz non raro, potissimum lib. 12. cap. 13. mentionem faciat. Quare si Andernacus, vuz vocem ab Amomi interiecto cômate, non distinxisset, reprehensione omni eius interpretatio vacaret. Ex iis igitur, quæ iam commemorauimus, manifestum fit, præsentem locum trifariam legi, quod in quibusdam codicibus, ut monstratum est, βότρυς separatim ab Amomo, ut in libro de Theriaca ad Pisonem, & apud Nicolaum Myrepsium: in quibusdam vero, ut libro primo de antidotis Galeni, in carmine Damocratis, βότρυς τ' ἀμύμη, pro βοτρυέλων, aut βοτρυδών, id est, vuz amomi haud dubie carminis ratione dixit; in Andromachi autem carminibus βοτρυέλων ἀμύμη, hoc est, racemosi Amomi scribatur. Omnes vero iam dictæ lectiones commode se habent, & legitime sunt. Nam Andromachus sua lectione innuere voluit, in Theriaces compositionem, eam maxime Amomi partem esse adhibendam, quæ vuz siue racemi speciem obtinet. Idem etiam significauit Damocrates, dum vuz Amomi Theriace permiscendam inquit. Qui βότρυς separatim legunt, hi præter Amomum iniiciendam esse aliam etiam herbam docent, quæ priuatim Botrys dicitur. Quorum certe sententia minime damnanda erit. Nam quum inter facultates Theriace ea etiam ab omnibus iam dictis auctoribus referatur, quod iis, qui non nisi recta ceruice spirant, plurimum conferat, rectissime profecto Botrys eius compositioni permisceri potest. Siquidem, ut Dioscorides auctor est, hæc summa

E orthopnoeas mulceat. Quum itaq; hæc sic se habeant, parum candide facit Matthiolum, quod tum in altera Dioscoridis editione, tum in suis epistolis medicinalibus me immerito flagellat. Nam quum in libro meo de Medicâ compositione Andromachi Theriaces compositionem retulisset, contendebar de sententia Nicolai Myrepsii non solum Amomum, verum etiam Botrym iniiciendam esse. Nec dubito, si hodie etiam viueret Andromachus, Botrys permissionem non esset improbaturus. Quum vero eius nullam fecerit mentionem, non alia de causa accidit, quam quod sibi, quemadmodum forte etiam Galeno, Botrys incognita fuerit. Quod si vero eius esse mirificam ad asthmatis & orthopnoeæ sanationem vim Andromachus cognouisset, haud dubie illam, perinde ac posteriores, Theriace admiscuisset. Nihil igitur opus erat Matthiolo, ut tot testimoniis ostenderet, Andromachum in sua Theriaca Amomi tantum meminisse, quum id ipsum nunquam negauerim. Quod vero inquit fieri potuisse, ut Nicolaus Græci sermonis non admodum peritus, Andromachum non intellexerit, facile Matthiolo concederem, si vocem καλκή dictioni βότρυς non adiecisset. Donemus autem Matthiolo, Nicolaum per errorem Botrys herbe mentionem fecisse, quid tandem piaculi erit, Botrym Theriace commiscuisse, quum illam non deteriore, sed meliorem, magisque asthmaticis conferentem reddat? Perperam igitur mordacitatis suæ frenos laxauit Matthiolum, quum nihil neq; in me, neq; in Nicolao esset quod merito sugillaret. Ceterum ridiculum est, quod Nicolai lapsum Ruellii auctoritate fuicire me voluisse inquit, quum nulla alia de causa eius testimonium produxerim, quam ut ostenderem, Botrym recte a

Nicolao dici Gallicam, quod copiose in Gallia proueniat, adeoque illic mulieribus notior, quam Pharmacopolis sit. Sed magis mehercle ridiculum est, quod me Germanicam Botrym descripsisse ait, quum hæc ipsa nusquam sua sponte in Germania nascatur, sed hortorum cultum illic perpetuo requirat, ita ut hoc nomine Botrys dici Germanica non possit. Ita quum alios ridere studet Matthiolus, non raro aliis se ipsum ridendum propinat. Amomum denique nunquam esse racemosum negavi, ut qui illud iam pridem ex Dioscoride, & aliis cognouerim, ut frustra tot congerendis ad eam rem comprobendam testimoniis laborarit Matthiolus. Potuisset itaque hoc etiam loco sibi temperare Matthiolus, nec mihi temere faceſſere negotium; illumque referendi præbere occasionem. Verum permittamus ipsi, quæ vult, dicat, ut interim quoque, quæ non vult, a nobis audiat. Porro inueniet etiam hic Franciscus Alexander, quæ forte illi pro risa lacrymas mouebunt, ut qui, Matthioli reprehensione apprehensa, me etiam, more suo, pungere voluit.

Sigillum
Lemnii.

18 *Sigilli Lemnii.*) Officinæ Medicorum Terram sigillatam nominare consueuerunt. Non est tamen, quod figulinam illam, quæ hæcenus vsæ sunt, terram pro Lemnio sigillo vsurpent, hæc enim nullius est momenti, & inefficax, idcoque abiicienda: sed eam potius, quæ Turcicis characteribus signata est, & quæ colore pallido est, aut dilutius rubet, & sapore cinastringentem obtinet. Ea enim etsi pura non est, tamen multo præstantior vsitata existit. Legitimum autem sigillum Lemnium est, quod hodie Boli armeni nomine insignitur, ut libro primo diximus. Impostores mercatores, sordidi quæstus gratia, figulino etiam luto colorem adulterinum inducunt, & Turcicas ei imprimentes, quæ possunt ratione, literas, verum Lemnium sigillum exprimere ac imitari student. Sed impostura hæc nos, quo minus illud abiciamus, nihil impedire debet.

Foliorum
Malabathri.
Chalcitidis.

19 *Foliorum Malabathri.*) Intelligenda sunt, quæ hodie simpliciter Folia Sepalsii dicuntur. De quibus quid statuendum sit, in Aurea Alexandrina est indicatum.

20 *Chalcitidis tosta.*) De Chalcitide libro primo est dictum. Melior est vsa, quod tenuiorum sit partium. Vrendi autem, siue torrendi eius ratio in Theriaces confectione est exposita. Admisit hanc Theriaces compositioni Andromachus, partim coloris nigri conciliandi gratia, qui ab omnibus in theriaca requiritur, partim etiam, ut hinc desiccandi consequatur facultatem.

Gummi.

21 *Gummi.*) Inaudiendum, quod cum adiectione hodie Arabicum Sepalsii nominatur. Tale vero est, quod ex Acacia Egypti spina manat. Græcis absoluto sermone Gummi dicitur. Id quia in grumos vermium modo concretum est, ideo a nonnullis Vermiculatum appellatur. Hanc formam quum non habeat id, quod in officinis fere omnibus venale exponitur, ideo adulterinum sit oportet. Non est tamen cur Arabicum vocatum gummi Mauritanis, ob id, ut Matthiolus somniat, non sit id quod ex Egyptia spina manat.

Cardamomum.

22 *Cardamomi.*) Quod Græcis Cardamomum, id Arabibus Cardumenum, & Cordumenum dicitur: hodieque desideratur, ac ignotum est, ut libro primo copiose monstrauimus. Quia vero id, quod sub hoc nomine in officinis proſtat, & Serapioni Sacolla vocatur, insignibus aromaticis viribus est præditum, gustusque non secus ac Græcorum acre & amarum existit, eius loco rectissime vsurpari potest.

Acacia.

23 *Acacia.*) Acacia vera est succus eius fructus, qui decerpitur de spina, unde Arabicum gummi manat. Hæc hodie raro habetur. Eius vice vtendum succo syluestrium prunellorum diligenter spissato, ut libro primo ostendimus. Is ita conficitur. Pruna syluestria aqua macerata, lento igni ad dissolutionem coquuntur. Colatum ex iis siccatur igni, vel sole complanatur, inque tessellas rubentes & adstringentes secatur. Qui succo foliorum Rhois aut Lentisci, vel Hypocistim pro ea substituere volunt, cum iis digladiandum non erit.

Thlaspi.
Sagapenum.

24 *Thlaspi.*) Eius herbarum hist. vniuersa ex altero tomo nostrorum de Stirp. hist. Coment. petenda erit.

25 *Sagapeni.*) Officinis Medicorum hodie corrupta voce Serapinum nominatur, ut libro primo est indicatum.

Aristolochia tenuis.

26 *Aristolochia tenuis.*) Quæ sit Aristolochia tenuis, puto hodie ab omnibus fere ignorari. Neque enim Cordo, & aliis assentior, qui hanc esse nostram hodie longam vocatam Aristolochiam existimant, quippe hæc folia magna, lata & oblonga, hederaceaque habet. Tenuis vero, quæ Clematidis Dioscoridi nominatur, folia subrotunda, minori Sedo siue semperuiuo similia obtinet. Norunt vero omnes, foliorum nostræ Aristolochiæ longæ cum Semperuiui foliis, quæ minime lata, ut illa, sed rotunda, & figuræ oualis, ut vermiculos putes, sunt, nullam esse similitudinem: ut alibi fusius monstrauimus. Non est igitur tenuis Aristolochia, nostra longa. Vtque verò Clematidis dicta Aristolochia non sit longa nostra, tamen quum omnes Aristolochiæ eandem facultatem habeant, & nostra, longæ sit species, licebit ea uti sine errore pro Clematide. Quæ autem vera sit Clematidis Aristolochia in primo nostrorum de Stirp. historia Commentariorum tomo ostendimus.

27 *Quod satis est.*) Liquoribus & gummi dissoluendis scilicet.

28 *Ut collyria lanigato.*) Id est, in tenuissimum puluerem instar collyriorum, quæ Sic offinis dicuntur, redigito.

Stannum non est plumbum album.

29 *Vasis vitreis.*) Aut aliis e densa materia: verbi gratia, plumbo albo, quod falso hodie stannum vocant, factis.

30 *Tempore ad concoctionem.*) Nam, Galeno lib. de Theriaca ad Pisonem teste, concoquitur plurimum duodecim annorum spatio. Qui autem vigentiore validioreque ipsa uti volunt, etiam quinto anno, & septimo exhibuerunt. Paulus itidem post annum suæ ætatis septimum ea vtendum esse iudicat.

A Aetius, ut plurimum, Theriacen per duodecim mensium spatium concoqui scribit. Qui vero ipsa magis urgente & validiore uti volunt, inquit idem, etiam post unum mensem ea utuntur. Nicolaus post menses sex, aut decem, hac utendum esse præcipit. Perfecte autem post decem exactos annos concoqui, idem scribit. Verum quum Aetius ad verbum hunc locum, temporis mutatione excepta, ex Galeno transcripserit, suspicio est, non recte mensium, pro annorum, & in Aetio, & in Nicolao legi. Est autem validum medicamentum ad triginta usque annos.

Theriaca Dia¹ Tessaron. Ioannis Mesue Damasceni. III.

Antidotus hæc ad frigidos corporis affectus, siue in cerebro, siue in ventriculo, aut iecore consistant, nempe epilepsiam, resolutionem, convulsionem Cynicam, quam *oris torturam* vocant, inflationes ventriculi, tardam eius concoctionem, aquam inter cutem, malum corporis habitum, obstructionem, morsum scorpionis, & venenum haustum confert. Recipit *gentiana, baccarum lauri, myrrha, aristolochia rotunda, ana unc. duas*. Trita curiose omnia mellis optimi despumati ³ lib. duas excipiuntur. Datur ab aureo dimidio, ad aureum unum.

ANNOTATIONES.

¹ *Vetus & vtilis hæc est Antidotus, quæ *ἡ τερρεῖα* dicta est, quod e quatuor simplicibus medicamentis sit composita. Et nomen eius satis testatur, Græcorum esse inuentum. Ab illis enim describens hanc ipsam Ioannes, filius Mesue Damasceni veterem inscriptionem mutuari voluit. Ea certe est, quæ hodie etiam a circumforaneis & impostoribus illis, qui epoto, si diis placet, veneno mirifice inflantur, passim pro magna theriaca venditur. Et sciendum hoc loco crit, nos non temere hanc Antidotum inscripserit Ioanni Damasceno Mesue filii. Nam opus illud de Re medica, in quo hæc Antidotus habetur, non est Mesue, ut plerique putant, tribuendum. nam Mesue pater fuit Ioannis, qui & ipse filius fuit Hamech, filii Hely, filii Abdolæ regis Damasci. Ioannes igitur Mesue filius Damascenus, præfati operis auctor fuit. Quod hic monuisse nos semel, satis sit.*

² *Aristolochia rotunda.* Quæ in officinis Medicorum sub hac appellatione prostat, non est Aristolochia, sed potius Capnos, seu Fumaria Aetii, ut altero de Stirp. hist. Comment. tomo demonstrauimus. Vera iam facile ex Heluetia, & Italia haberi potest. Hæc intus solidam obtinet radicem, colore buxi flauo, odore & sapore nostrati Aristolochiæ lögæ similis. In huius tamē penuria, Fumaria Plinii uti licebit radice, quæ illa amara & subacris sit, perinde atq; legitimæ Aristolochiæ rotundæ radix. Aut certe nostrate longa.

³ *Libris duabus.* ut scilicet triplum mellis pondus sit, ad species collati. Alii quadruplum esse iumentum putant, quod mihi non probatur. Si quidem metuendum, ne nimia mellis copia, specierum facultas frangatur & obtundatur. Ceterum hæ duæ Theriaces compositiones Seplassis sufficere debent. Præstat enim pauca easq; accurata diligentia, & probe paratas, quam multas inutiles, & negligenter confectas, habere. Priorem, Andromachi nimirum, pro ditioribus; alteram Dia tessaron dictam, pro iis qui non admodum abundant; aut saltem, Absyrto & Vegetio mulomedicis testib. pro iumentis cōseruandis. Quare recte Communem nominabimus, quod scilicet tum hominibus, tum iumentis exhibeatur vtiliter.

Mithridatis Antidotus. Nicolai Myrepsici. IV.

Antidotus Mithridatis sic ab ipso Mithridate, Póti & Bithyniæ rege, qui eā inuenit, nominata, Gal. l. 2. de Antidot. teste, ad eadē, q̄ Theriace valet, & ad pleraq; pernicioſa medic. & venena est efficacior: in viperæ aut morsus curatione, theriaca inferior. Priuatim vero facit ad diuturnas vetriculi, & thoracis fluxiones, & ad omnes inueteratas in profundo corporis exulcerationes & abscessus. Tabidis, ventrisq; inflationib. medet, appetitiā emēdat & restituit, ac bonū corpori colorem cōciliat, Calculos cōterit, ac vrinę difficultatē sanat. A cuit visum eorū, qui illa crebri⁹ vtunt. Mortuū foetū eiicit, & ad muliebria omnis generis mala frigida, atq; iis, q̄ nō cōcipiūt, conducit. Itē melāch. nō sinit cōsistere. Omne deniq; capitis malum, ex frigiditate ortū, dolores auriū, sacrymātes oculos, dentiū cruciat⁹, oris, palati, auriūq; omnia vitia, emplastri forma imposita, sanat. Accipit¹ styracis, drach. unam, & scrup. duos. Caryophyllorū, spica, xylobalſami, ² erui, ³ lacha, tragacantha, mastiches, galbani, ⁴ gūmi cedri, bituminis castorij, ⁵ gūmi hederæ, bdellij, sigilli Lemnij, ⁶ meliloti, opopanaxis, ladani, ⁷ ammoniaci, opij, sulphuris ignē non experiri, glycyrrhizæ, nitri, succi hypocistidis, acacia, rosarum, chamadryos, hyperici, abrotani, pæoniæ, hyssopi, origani, helenij, ligni iuniperi, foliorū lauri, aristolochiæ longæ, epithymi, peucedani, centaurij, rosmarini, eryngij, balaustiorū, foliorū myrti, absinthij, raphani, scilla, carpobalsami, anisi, nigelle, hyoscyami, cumini, fœniculi, cardamomi, seselios, senapi, ameos, sinonis, libystici, ruta, papaueris, apij, dauici, rapī seminū, piperis longi, seminis ocimi, amomi, ana drach. unā & dimidiā. Acori, ⁸ personatiæ, cyclamini, seminis agni, ⁹ cornu ceruini vsti, a. scrup. duos. Balsami, cinamomi, croci, costi, floris iunci odorati, Zingiberis, folij, terebinthina, myrrha, thuris, casia lignea, agarici, nardi Celuicæ, rhei Pontici, iridis, asari, dictamni, marrubij, colocynthidos, stichadis, artemisiæ, calamint hæ, scordij sylvestris, symphwi, chamapityos, piperis albi, piperis nigri, petroselinij, rhœi culinarij, malabathri, ¹⁰ nasturtij, quinquefolij, a. scr. unū.

*Baccarium lauri. scrup. unum. Vini veteris boni, unciam unam. Mellis^{II} Attici, aut sacchari, quod A
satis est. Datur auellanæ nucis quantitate ex vino tepido, cui Salvia sit incocta.*

ANNOTATIONES.

Cordus. Hæc Mithridatis antidoti componendæ ratio a Pharmacopœis hodie obseruanda erit, & hætenus quidem ex Nicolai Præpositi præscripto parata est: quanquam non recte, propter obscuras aliquot in ea voces, quæ ab ipsis intelligi haud potuerunt. Atq; ea res Valerium Cordum quoq; mouit, vt hac descriptione præterita, alias poti⁹ ex Damocrate, Cleopatra, Antipatro, & Andromacho proferre voluerit. Bernardus quoq; Dessennius Cronenburgius, eadem haud dubie de causa, legitima hac neglecta, aliam inusitatam hætenus protulit. Sed hic me pungit Franciscus Alexander, quod derelictis primis & clarissimis fontib. Myrepsum in antidotis pro miraculo habeam. Quasi vero non hoc meum sit institutum, vt Pharmacopœos derelicto Nicolao Præposito, abbreviatore & deprauatore Myrepsi, ad fontes reuocem. Negare enim nemo, ne ipse tantum Franciscus, poterit, quin Myrepsi antidota, quandoquidem illa e Græcis, & Mauritanis descripsit, atq; maxima diligentia collegerit, reliquorum compositiones plurimum superare. Quod ipse, si occasio ferret, & locus daretur, per singula vagatus simplicia, demonstrare possem. Neminem vero prohibeo, quin etiam Græcorum compositionibus vtatur. Verum quum illæ hætenus nostris vltatæ non fuerunt, multis modis præstat, Myrepsi, quam Præpositi illius deprauatoris maximi, vt compositionibus. Id quod etiam hic semel monuisse satis sit, ne toties Francisci cauillationibus, & nullius momenti reprehensionibus mihi respondendum sit. Hanc igitur vt plene Pharmacopœi intelligant, annotationibus nostris illustrabimus.

Styrax. 1 *Syracis.* Quoties in Græcorum libris Styracis fit mentio, semper calamites inaudiendus erit. De quo abunde libro primo huius Operis diximus: ad quem profecto Pharmacopœi perpetuo in difficultatibus, & in iis, quibus nihil annotamus, confugere debent.

Eruum. 2 *Eruui.* Officinæ Græcam potius vsurpantes vocem, Orobum nōinant. Hodie eruum vix agnoscitur, vt diximus libro primo, quare querendum illius succedaneum erit. Non est autem semen vitæ syluestris, vt hætenus Pharmacopolæ putarunt: etsi enim id ipsum deficcat, tamen amaritatis expers est, vt hoc nomine pro Eruo vsurpari nequeat. Quare substituendum pro eo potius erit semen, q̃ perinde atq; ipsum, incidēdi, extergēdi, & obstructions expediendi vim habet: quale est Cicer nigrū, aut Lupini semē.

Lacha. 3 *Lacha.* Quam Actuarius, aliiq; recentiores Medici Lacham nominant, hanc officinæ Laccam vocare cōsueuerūt, Dioscorides Cancamū. Nō esse autem Cancamum diuersum a Lacca Arabum medicamentum, sole clarius conspiciet, qui Dioscoridis de Cancamo historiam cum Serapionis Lacca cōferre voluerit. Lacca tamen, qua Sepalsarii ac pictōres nostra ætate vtuntur, non est posteriorum Græcorum Lacha, siue veterum Cancamum: quod nulla sit apud Dioscoridem nota, quæ illi quadret. Siquidem tres sunt res, quæ Lachæ appellatione veniūt, vt libro primo ostendimus. Tertia est officinarum Lacca, quam Arabes iecoris tollere obstructions, & ictero, ac a quæ inter cutem conducere tradūt. Auicēna tamen 2. Canone, Laccam bis in diuersis capitib. tāquam rem diuersam, maximo cum errore, sibi tamen familiari describit. Primo sub nomine *Reiden* vel *Reifen*, quæ haud dubie vox ex Cancamo deprauata est. In hoc vero capite ipsum pingere Cancamum, omnes euidentissime deprehendent, qui modo illud cum historia Cancami conferre voluerint. Deinde non longe post, illam sub Lacca appellatione describit. Vt hinc quoq; perspicuum euadat, in doctrina Arabum nihil esse solidum, & confusionis expers.

Gummi cedri. 4 *Gummi Cedri.* Hoc Gummi hodie in officinis nostratibus non prostat. Venetiis tamen comparari posset. In huius autem penuria eius succedaneo vtendum, quod Galeno auctore, Ladanum, vel vt Barbari efferunt, Laudanum existit. Verum quum Ladanum alias hanc cōpositionem ingrediatur, licebit p̃ eo uti gūmi abietis, q̃ eiusdē cū Cedri gūmi sit facultatis, præsertim in curādis vulnerib. & eliciendis calculis, ad quæ vitia Mithridatis antidotus maxime cōmendatur. Quare opus minime erat, vt hoc loco genuinum mihi infigeret Matthiolus, nisi quod forte mordacitatis nomine celebris esse voluerit.

Gummi. 5 *Gummi.* Ita interiecto puncto legēdum erit, ac intelligēdum, Arabicum hodie appellatū, vt supra est monstratū. Nā Gummi in Mithridatis cōfectione Damocrates, Andromachus, & Aetius meminerūt.

Melilotū. 6 *Meliloti.* Melilotum legitimum a Pharmacopœis vsurpandum. Nam id quo hætenus vsi sunt fere omnes, syluestris est lotus, vt alibi ostendimus, & libro primo monuimus.

Ammoni- 7 *Ammoniaci.* Sepalsiæ adiectione vnus literæ deprauantes vocem, Armoniacum nominant. De quo libro primo diximus.

Personat- 8 *Personatæ.* Bardanam & Lappam maiorem Pharmacopœi, ac vulgus herbariorum appellant.

Cornu cer- 9 *Cornu ceruini vsti.* Hoc loco maxima in Nicolai codice manuscripto, quo nos vnico, quum illum Latio donarem, vsi sumus, menda subest. Nam illic falso legitur *μολιβδον κεκαυμένον*, id est, plūbi vsti: quū omnib. constet, plumbum iis, quæ intra corpus sumuntur, medicamentis, ab auctorib. nequaquam permisceri. Legendum vero erit *ἐλάφου κέρας & κεκαυμένον*, id est, cornu ceruini vsti: vt nos nūc conuertimus. Lectionem autem hanc esse legitimam & veram, omnes Latini Nicolai cōdices testantur, qui cornu ceruini habent, vbi Græcus manuscriptus codex plumbi legit. Accedit quoq; ratio, lectionem hanc cōfirmans. Siquidem Cornu ceruinum vstum, dysentericis, vesicæ dolorib. & fœminis fluxione laborantib. confert: ad quæ sane omnia vitia Mithridatis Antidotus accommodatur. Deniq; facilis admodum ab ἐλάφου dictionem in *μολιβδον*, imperito librario lapsus fuit. Hæc pluribus annotauimus, quod in nostra prima conuersione locus non sit a nobis emendatus.

Alter Ni- 10 *Nisurtis.* Et hic locus in manuscripto Nicolai codice est corruptus. Siquidem is *καρδιώμην* legit, pro *καρδίου*. Non esse autem scribendum *καρδιώμην*, hinc omnib. liquet, quod paulo ante in hac cōfōsione

A tione Cardamomi sit facta mentio. Inutilis igitur esset repetitio, si iam iterum Cardamomi mentio fieret. Proinde legendum erit, ut diximus, *καρδάμω*, id est, Nasturtii: quod hanc lectionem Latinus Nicolai codex confirmet, qui statim post Malabathrum subiicit Cardamum. Hunc quoque locum in nostra conuersione, religione quadam Græci codicis moti, in emendatum reliquimus.

11. *Mellis Attici*.) Quum Atticum non habeamus, pro eo optimum mel odoratum, & despumatum accipiendum. Triplum autem mellis ad species, ut ante quoque monuimus, inferendum. Mel Atticum,

Mithridatis Antidotus Andromachi. V.

Mithridatium antidotum Andromachi ad lethalia peculiariter efficax, internosque affectus omnes. Accipit *Glycyrrhizæ, drachmas septem semis; & quaternos obolos. Opy, drach. quatuor, obolos duos. Castorei, drach. sex. Poly drach. quing., obolos duos. Costi, drach. quing., obolos duos. Spica nardi, drach. sex, obolos duos. Cassia, drach. quing., obolos duos. Thuris, drach. sex. Seseleos, drachmas quing., obolos duos. Hypocistidis succi, drachmas sex. Acori, drachmas duas. Scordij, drachmas sex, obolos duos. Foly, drachmas quatuor. Gallij, drach. quing., obolos tres. Alij drachmas sex.*¹ *Cipheos, drachmas sex, obolos duos. Myrrhæ, drachmas sex. Croci, drachmas septem, obolos duos. Cinnamomi, drachmas septem, obolos duos. Syracis, drachmas quing., obolos quatuor. Dauci seminis, drach. sex, obolos tres. Zingiberis, drachmas septem, obolos duos. Phu pontici, drach. duas. Petroselinij, drach. quatuor, obolos tres. Nardi gallicæ, drach. quatuor. Fœnuli seminis, drach. quatuor. Nardi indicæ, drach. quatuor. Hyperici, drach. duas. Gentianæ, drach. quatuor. Alii drach. duas. Anisi, drach. tres. Thlaspi, drach. sex, obolos quatuor. Menihamantici, drach. quatuor. Alii drach. duas. Rosarum aridarum, drach. quatuor. Gummi, drach. duas. Cardamomi, drach. quatuor. Alii drach. duas. Iunci odorati rotundi, drach. sex, obolos duos. Opopanacis, drach. sex, obolos duos. Opobalsami, drach. sex, obolos quatuor. Galbani, drach. septem. Scinci, drach. duas, obolos duos. Resina terebinthina, drach. sex, obolos duos. Vini Chij, quod satis est. Mellis attici cocti quantum sufficit.*

ANNOTATIONES.

Matthiolus libro quinto epistolarum medicinalium, nescio qua temeritate ausus est Mithridatis antidotum Damocratis, ei quod ab Andromacho descriptum est præferre, idque nulla alia de causa, quam quod Damocratis compositio agaricum, stœchadem, longum & album piper, balsami baccas, bdellium, Creticum dictamnium, & asarum capiat, quibus omnibus altera destituitur, quæ venenis mirifice resistent. Quasi vero necesse sit, Mithridatis antidotum omnia ea, quæ Theriaca recipit, habere medicamenta. Accedit quod Galenus, grauissimus scriptor, Andromachi compositiones aliis omnibus præferre soleat, ob componendi rationem, quam ille in illis obseruauit paulo exquisitiorem. Sic enim hoc antidotum construxit, ut non solum ad lethalia sit efficax, venenisque plurimum resistat, verumetiam ut ad internos alios corporis affectus sanie multos, vilitatem non contemnendam afferat. Denique ex eiusmodi medicamentis antidotus hoc constat, quorum hodie fere omnium, excepto Opobalsamo, passim copia haberi potest, ut hoc etiam nomine merito Damocratis & aliorum descriptionibus sit anteferenda. Sed placuit Matthiolo hic & alibi se aliorum sententiarum opponere, ut ipse solus, stertentibus reliquis omnibus, & a veritate deuiantibus, vigilasse & sapere videatur.

Matthioli opinio improbara.

1. *Cypheos*.) Et in huius compositione Matthiolus mirifice inepit. Nam Damocrati, Cypheos compositionem acceptam refert, quæ haud dubie est Mithridatis, ut videre licet apud Aetium libr. 13. cap. 99. ubi Cyphium iis verbis ex Andromachi sententia describit:

Matthioli error insignis. Cypheos compositio.

Sumito ¹ *Vuapassæ tenuis pinguisque detractis pellicula & vinaceis, hoc est, ipsius carnis, drachmas viginti quatuor. Terebinthina vstæ, drachmas viginti quatuor. Myrrhæ, drachmas duodecim. Alij drachmas sedecim. Cinnamomi, drachmas quatuor. Floris iunci odorati, drachmas quatuordecim.*² *Croci, drachmam unam. Bdellij, drachmas sex.*³ *Vnguis drachmam unam. Aspalathi, drachmas duas, & dimidiam. Spica nardi, drachmas tres. Cassia, drachmas tres. Cyperi, drachmas tres, & dimidiam. Baccarum Iuniperi magnarum, drachmas tres, & dimidiam. Calami odorati, drachmas nouem. Mellis quantum satis est. Vini odorati parum. Myrrham, bdellium, & terebinthinam vstam contere cum vino, ut mellis liquidi crassitudinem habeat, dein vuam passam per se probe tritam in yce, simulque tritis mellis quantum satis est infunde, ac reliqua insperge formatoque pastillos, & utere. Vritur autem terebinthina hoc modo. Terebinthinam conyge in ollam, & triplum, aut etiam plus aqua infunde, & ad ignem adhibe, nihilque mouendo coque. Vbi vero aqua consumpta fuerit, & terebinthina friabilis, ut digitis confringi possit, eam tolle, & ad antidoti confectionem utere. Si vero infusum aqua adhuc mollior appareat terebinthina, aliam aquam superfunde, rursusque ad ignem adhibe, donec friabilis reddatur. Datur autem Cyphi per se com-*

ANNOTATIONES.

1. *Vuapassæ tenuis*.) Matthiolus manifesto errore accipiendas esse maiores, & nequaquam minores pastillas contendit, quum tamen Andromachus discrete dicat, *καρὶς καὶ λευκὴ*. Nec alio argumento suam

Matthioli lapsus.

sententiam confirmat Matthiolus, quam quod laboriosum esse dicat, ab vna passa tenui cutem & vinaceos detrahente, nihilq; fere vbi hæc fierent, pulpæ, reliquum fore. Sit sane laboriosum, tamen quum id requirat Andromachus, non est, cur illi non obtemperemus.

2. *Crocus*.) Crocum Matthiolus omisit, cuius tamen uterque, Andromachus scilicet & Damocrates, mentionem faciunt: ita ut eius, quam ipse refert, compositio neutrius sit.

Matthio-
lus hallu-
cinatur.

3. *Vnguis*.) Hoc in loco turpissime Matthiolus hallucinatur. Initio enim vnguium Bdellii mentionem facit nullius veteris Medici scriptoris fectus testimonio. Nemo enim illorum vnquam Bdellii vnguium meminit, ut ille somniat, Plinio de mto, qui libro 12. capite 9. sic scriptum reliquit. In Bastriano nidor siccus, multiq; candidi vngues. Dubium vero non est, quin Plinius hunc locum ex poeta quopiam, ut recte censuit Cornarius, vel ex deprauatis Damocratis carminibus describeret, qui Bdellium, ut li- quet & malagmate eiusdem, quod in fine libri octavi de compositione medicamentorum localium Gale- nus refert, nunc *diavys*, id est, pellucidum, hunc vero *ονυχας*, id est, Dioscoride interpretis, *ονυχας*, hoc est, vngui, non profecto humano, ut Marcellus Plinium haud dubie secutus, interpretatur, sed odorato simile: id quod e verbis Dioscoridis fit evidentissimum, inquit enim, *ονυχας εν τῷ θυμῷ*, id est, *ονυχας*, id est, odoratum in suffitu Onychis instar seu similitudine. Quibus sane verbis diserte significare voluit, optimum Bdellium esse, quod incensum ac suffitum Onychis Indici Cōchyli suauem referat odorem. Quum itaque Bdellium colore humanum vnguem non referat, sed odore cum Onyche similitudinem

Damocra-
tis locus
emenda-
tus.

habeat, adeoq; hoc nomine *ονυχας* dictum sit, sole meridiano clarius est, Damocratis versum, in quo legi- tur *βδελλινος ονυχας τις ισος συνηείας*, id est, Bdellii vngues & pares aluminis partes, esse deprauatum. In Bdellio namq; etiam si legitimum fuerit, nulla vnguis humani conspicitur, similitudo, ideo nulli plane sunt vngues Bdellii. Legendum igitur erit in Damocratis carmine: *βδελλινος ονυχας τις ισος συνηείας*. Sic vero esse legendum, satis liquet ex Charmidis antidoto, quod itidem ex Damocrate citatur, & refertur a Galeno libro secundo de antidotis, vbi ita legitur: *βδελλινος ονυχας τις διαγῶν ες δραχμῶν*. Id est, Bdellii Onychis, seu Onychis instar odorati, & dilucidi drachmam. Idem quoq; fit manifestum ex libro deci- mo de compositione medicamentorum cap. 2. vbi Galenus fabullæ malagma describit, in quo sic legi- tur: *βδελλινος ονυχας λιβ. β.* Hoc est, Bdellii Onychis libro duas. Ex iis igitur perspicuum fit, Plinium e- tiam deceptum fuisse, dum loco supra citato, in Bdellio multos candidos vngues conspici scribit; contra ocularem inspectionem, quæ nihil eiusmodi in Bdellio animaduertit. Dubium itaq; non est, quin Pli- nius mendosum inciderit codicem, in quo scriptum fuit, *βδελλινος ονυχας διαγῶν*, id est, Bdellii candidos vngues, siquidem pellucidos, ipse candidos vocauit. Plinii errorem hoc in loco secutus est quoque Mat- thiolus, dum vngues Bdellii immisceri Cypheos compositioni scribit, optimumq; esse Bdellium, quod vnguibus humanis simile sit, ait. Et ferendum hoc forte erat in Matthiolo, ut qui huius suæ sententiæ Plinium auctorem haberet. Quod autem Cornarii conuersionem apud Aetium tanquam erroneam no- tat, id iniquissime facit: cogit enim me indignitas rei Cornario, etsi nihil tale de me meritis sit, patrocina- ri. Nam quum in Actio vnguis odoratus, & Bdellium diuersis ponderibus distincta, & ab inuicem se- parata sint, fieri non potest, ut vnā rem denotent. Bdellium enim drachmarum sex, vnguis autem o- doratus, vnius drachmæ pondere ingreditur. Sed ad conuincendam pertinaciam, & immodicam alios reprehendere, licentiam Matthioli, præstat Aetii verba commemorasse, quæ sic habent: *βδελλινος ζ. ονυχας ζ.* Quis igitur hinc non conspiciat Cornarii manibus insignem a Matthiolo factam esse iniuriam, ut qui optima fide huic Aetii locum reddiderit, tantum abesse debuisset, ut a Matthiolo cauillaretur i- psius interpretatio. Non solum vero Aetius ex Andromacho in Cypheos compositione Bdellium ab vngue separauit, verum etiam Paulus & Nicolaus Myrepsus idem fecerunt: Nam Paulus lib. 7. 22. de suffimentis & Cyphi sex numero separatim mentionem facit Bdellii & vnguis. Primum in suffimento rosaceo, vbi ait *βδελλινος, ονυχας ἀν. Γ. ο. ζ.*, id est, Bdellii, Vnguium. Nec est quod pro confirmando suo errore Matthiolus dicat, male per interiectum punctum has voces esse separatas, sed illas potius esse coniungendas, atq; ita legendum *βδελλινος ονυχας*, id est, vnguium Bdellii. Quippe in Cyphi magno, quod so- lare dicitur, separatim vtriusque meminit, inquit, *βδελλινος Γ. ο. ζ. ονυχας μύρων β.* Id est, Bdellii vncias sex. Vnguium magnorum duas. Nicolaus vero Myrepsus sectione 21. suffimento primo Esdræ prophete, quod Cyphi dicitur, itidem has duas voces separat, quum ait, Bdellii vncias tres. Et deinde interie- ctis compluribus aliis medicamentis, Vnguium odoratorum magnorum & minorum singulorum vnciam vnā & dimidiam subiicit. Dein in suffimento sexto, quod Cyphion sacratum nominat, habet Bdellii vnciam vnā & dimidiam, & multis aliis interpositis medicamentis, vnguium odoratorum mi- norum vnciam vnā. Idem in sequenti mox septimo facit, vbi ita habet. Bdellii, vnciam vnā & di- midiam. Vnguium odoratorum, vnciam vnā. Nec secus illum fecisse deprehendimus in suffimen- to, vbi inquit: Vnguium odoratorum, costi, spicz nardi, bdellii, singulorum, vnciam vnā. Et rur- sus in decimo quinto, vbi ait: Vnguium odoratorum, vnciam vnā & dimidiam. Bdellii, vnciam, di- midiam. Quæ singula ideo prolixius commemoravi, ut Cornarium ab iniuria Matthioli assererem, quem in Cyphi Actii compositione vnguium Bdellii loco, vngues odoratos perperam vertisse dicit, quod scilicet Bdellium ignorauerit suos etiam habere vngues, quum potius ipse falso tribuerit Bdellio vngues, qui in illo nusquam conspiciuntur. Quum igitur contra Græcicodis fidem, & aduersus Dio- scoridis manifestissimum testimonium Cornario iniquissime errorem affingat Matthiolus, officii mei esse putavi, ut hominem Germanum, ipse etiam Germanus, aduersus Itali iniuriam, præsertim iam mor- tuum, & qui a se calumniam amplius propulsare non possit, tuerer, & pro virili defenderem. Moneo au- tem, ut

Plinii la-
psum.

Cornari-
us calum-
nia Mat-
thioli af-
fectus.

reprehendere: licentiam Matthioli, præstat Aetii verba commemorasse, quæ sic habent: *βδελλινος ζ. ονυχας ζ.* Quis igitur hinc non conspiciat Cornarii manibus insignem a Matthiolo factam esse iniuriam, ut qui optima fide huic Aetii locum reddiderit, tantum abesse debuisset, ut a Matthiolo cauillaretur i- psius interpretatio. Non solum vero Aetius ex Andromacho in Cypheos compositione Bdellium ab vngue separauit, verum etiam Paulus & Nicolaus Myrepsus idem fecerunt: Nam Paulus lib. 7. 22. de suffimentis & Cyphi sex numero separatim mentionem facit Bdellii & vnguis. Primum in suffimento rosaceo, vbi ait *βδελλινος, ονυχας ἀν. Γ. ο. ζ.*, id est, Bdellii, Vnguium. Nec est quod pro confirmando suo errore Matthiolus dicat, male per interiectum punctum has voces esse separatas, sed illas potius esse coniungendas, atq; ita legendum *βδελλινος ονυχας*, id est, vnguium Bdellii. Quippe in Cyphi magno, quod so- lare dicitur, separatim vtriusque meminit, inquit, *βδελλινος Γ. ο. ζ. ονυχας μύρων β.* Id est, Bdellii vncias sex. Vnguium magnorum duas. Nicolaus vero Myrepsus sectione 21. suffimento primo Esdræ prophete, quod Cyphi dicitur, itidem has duas voces separat, quum ait, Bdellii vncias tres. Et deinde interie- ctis compluribus aliis medicamentis, Vnguium odoratorum magnorum & minorum singulorum vnciam vnā & dimidiam subiicit. Dein in suffimento sexto, quod Cyphion sacratum nominat, habet Bdellii vnciam vnā & dimidiam, & multis aliis interpositis medicamentis, vnguium odoratorum mi- norum vnciam vnā. Idem in sequenti mox septimo facit, vbi ita habet. Bdellii, vnciam vnā & di- midiam. Vnguium odoratorum, vnciam vnā. Nec secus illum fecisse deprehendimus in suffimen- to, vbi inquit: Vnguium odoratorum, costi, spicz nardi, bdellii, singulorum, vnciam vnā. Et rur- sus in decimo quinto, vbi ait: Vnguium odoratorum, vnciam vnā & dimidiam. Bdellii, vnciam, di- midiam. Quæ singula ideo prolixius commemoravi, ut Cornarium ab iniuria Matthioli assererem, quem in Cyphi Actii compositione vnguium Bdellii loco, vngues odoratos perperam vertisse dicit, quod scilicet Bdellium ignorauerit suos etiam habere vngues, quum potius ipse falso tribuerit Bdellio vngues, qui in illo nusquam conspiciuntur. Quum igitur contra Græcicodis fidem, & aduersus Dio- scoridis manifestissimum testimonium Cornario iniquissime errorem affingat Matthiolus, officii mei esse putavi, ut hominem Germanum, ipse etiam Germanus, aduersus Itali iniuriam, præsertim iam mor- tuum, & qui a se calumniam amplius propulsare non possit, tuerer, & pro virili defenderem. Moneo au- tem, ut

Atem, immo maiorem in modum oro Matthiolum, ut iam senex & capularis sibi non nihil temperet, nec ita temere aliorum sententias bonas, & cum veritate congruentes, pro erroribus falso traducat. Quod si fecerit, inueniet qui illum pro dignitate tractabunt.

Hamagogos Antidotus. Nicolai Myrepsii numero 26. VI.

Vtilis est ad varia muliebria vitia. Siquidem eas, quæ solito tempore purgari haud consueverunt, mirifice iuuat. Menfes enim elicit, foetum in utero mortuum excutit. Eas quæ a partu non sunt purgatæ, expurgat, & sanitati restituit. Calculum vesicæ atterit, & per urinam expellit. Stillicidium urinæ, obstructionem iecoris, lienisq; duritiem sanat. Omnibus internis vitiis, cruditati ventriculi, colori doloribus, & nephriticis auxiliatur. Hæmorrhoidas aperit, secundas educit. Vesicam expurgat, veniriculū calefacit, flatus discutit, vomitum compescit, & mulierum vitiis omnino salutaris est. Caueant sibi ab usu huius antidoti, qui hæmorrhoidibus, ventris profluuiū, & dysenteria laborant. Habet¹ *Intybi seminis, acori, amoniaci, atriplicis seminis, fœniculi seminis, singulorum² scrup. unum, grana sex. Anisi, scrup. duos. Aristolochia longa, artemisia, casia, singulorum scrup. duos, grana quatuordecim. Centaurij minoris, scrup. unum, grana septem. Centaurij magni, scrup. duos. Dauci cretici, scrup. duos. Ellebori nigri, scrup. unum. Foliorum lauri, scrup. unum & dimidium, grana tria. Glycyrrhizæ, drach. unam. scrup. unum. Lupinorum, drach. duas. Nigelle, scrup. duos. Myrrha, scrup. duos, grana quatuordecim. Erui, scrup. unum. Aluminis, scrup. duos. Petroselinii seminis, scrup. unam. Pyrethri, scrup. duos, grana quatuordecim. Piperis nigri, drach. unam, scrupulos duos, grana septem. Pulegij, scrupulos duos, grana quatuordecim, Præniæ, scrupul. unum, grana decem & octo. Cyperi, scrupulos duos. Ruta seminis, scrup. duos, grana quatuordecim. Stachij, scrup. duos, grana quatuordecim. Sinonis, scrup. duos. Floris iunci odorati, scrup. duos, grana quatuordecim. Saluæ, apij seminis, utriusq; scr. unum, grana quatuordecim. Caryophylli, scr. duos. Capparis radices, cumini, utriusq; drach. un. Mellis astici, aut sacchari q; satis est.*

ANNOTATIONES.

¹ Hamagogos dicta est hæc antidotus, quasi sanguinem educens, quod menses mulieribus eliciat, & hæmorrhoidas occlusas, aperiat.

² *Intybi seminis.* Sic habet Græcus manuscriptus Nicolai Myrepsii codex. Latinus autem legit Asari. Vtraque autem lectio vera est. Nam ut Asari radix, Dioscoride teste, urinam cit & menses euocat, ita etiam Intybi semen & ipsum Intybum, Plinio libro 20. cap. 8. teste, decoctum in aqua mulierum purgationibus adeo prodest, ut emortuos partus educat. Quare nihil refert, Asarum an Intybum compositionibus adhiberi, quod ambo ad sanguinis menstrui educationem conferant. Quum vero *aripuat* vox in Nicolao sit, quæ Asaro accommodari non potest, rectius Intybi, quam Asari legi videntur. Ut in errore

Distinctioni huic indas, quod ambo ad sanguinis menstrui educationem conferant. Quum vero *aripuat* vox in Nicolao sit, quæ Asaro accommodari non potest, rectius Intybi, quam Asari legi videntur. Ut in errore versari Matthiolum sit necesse, qui melius esse ut Asarum, quam Intybum huic compositioni addatur, in suis epistolis medicinalibus scribit. Matthiolum sequitur etiam Franciscus Alexander, sed nos Græci codicis lectionem merito antefereamus.

³ *Scrupulum unum.* Sic etiam legitur in codice Nicolai Alexandrini. In Nicolai autem Præpositi vocati exemplari, drachmam unam scriptam videmus.

⁴ *Centaurij minoris.* In manuscripto codice Græco Nicolai, Centaurij minoris nulla fit mentio. Ex Latinis igitur codicibus, qui in vniuersum omnes huius meminerunt, hanc adieciimus. Atq; hæc ipsa recte huic compositioni adhibetur, quod menses & foetum, Dioscoride & Galeno testibus euocat. Hoc loco silentio transire non possum Bernharti Dessennii Croneburgii oscitantiam, qui in suo Antidotario vocato, mihi mendaciter hanc affingit opinionem, quod officinarum Rhaponticum alterum esse Lapathi Dioscoridis genus dixerim, quod mihi ne per somnium quidem vnquam in mentem venit. Hoc sane me fateor docuisse, Rheubarbarū Monachorum appellatum, Lapathi esse speciem, id quod etiamnum sentio. Esse autem Rhaponticum officinarum Lapathi genus, nullibi me dixisse aut scripsisse certo scio. Quare oscitanter mea scripta legisse Dessennium hinc apparet, qui Matthiolum, quem vnice admiratur & colit, secutus, passim me per calumniam reprehendere voluit. Quod, ut ingenue fatear, me plurimum commouet, qui cogor adhuc viuus istorum Sycophatarum experiri morsus. Præstitisset igitur Dessennium prius simplicia cognouisse, quam alios se peritiores falso erroris insimulasse. Sed quid facerent illi Matthioli adulator, nisi ut Fuchsum arrodam, & mendaciter tanquam errantem traducant. Multo igitur satius erat Dessennium, perpetuo sibi silentium indixisse, ita enim Alumen plumosum officinis dictum, nunquam Alumen esse scissile affirmare potuisset.

⁵ *Ellebori nigri.* Sic etiam legit codex Nicolai Præpositi Latinus. Manuscriptus autem Græcus Nicolai Myrepsii liber habet, *ἑλενί μίλαν*, id est, Heleni nigri, atqui falsi, non quod nulla prorsus ratione adiectiuum *μίλαν*, ut Matthiolum putat, cum Helenio conuenire posse exillimem, quum reuera Helenium alterum a radice subalbida, album; alterum vero a radice cortice nigro obducta nigrum dici possit: sed quod codex Latinus, ut dictum est, Ellebori nigri etiam habeat, & quod in antidoto Nicolai Myrepsii 26. quæ illam mox antecedit, & quæ ventrem subducit, eundem *ἑλενί μίλαν*, pro *ἑλενί* scriptum sit, ita ut solenne fuerit ei librario, ut pro *ἑλενί* scriberet *ἑλενί*. Recte autem in Nicolao Myrepsio legi *ἑλενί μίλαν*, hinc fit manifestum. Nā, ut Dioscorides auctor est, Elleborus niger *ἑλενί μίλαν*

Hamagogos cur dicta.
Nicolai Myrepsii locus expensus.

Matthioli error.

Bernharti Dessennii oscitantia notata.

Dessennii ingens error.
Nicolai Myrepsii locus emendatus.

Matthioli
calumnia
expulsa.

ἀγλῆ, καὶ ἐμβετα ἔλεν, id est: Appositus aut vtero admotus menses ducit, & foetus enecat. Si itaq; vtero in-
ditus & appositus Eleborus niger menses elicit, quanto magis id præstabit, si intra corpus sumatur.
Atque hic me iterum Matthiolus perstringit, errorisq; insinuat, dum lib. 5. Epistolarum medicinalium
ad Petrum Spezzaloncium Pharmacopœum ita scribit. Adhæc cauēas velim, ne in admiscendo Ellebo-
ro, Fuchsi opinionem sequaris. Ille enim alioqui vir clarissimus, quod in antiquo Græco Myresfici i-
psius codice legerit ἐλεν μέλαν, credidit non ἐλεν legi debere, sed ἐλεβορον. Nam cum adiectiuum
μέλαν, nulla prorsus ratione cum Helenio cōuenire posse cerneret, nō absque manifesta ratione men-
dam subesse putauit. Atqui longe alia sum ego opinio, quippe qui Helenium, non Elleborum ad-
miscendum censeam: ea omnino ductus ratione, quod præter id, quod sciuerim Græcum Nicolai co-
dicem numerosis admodum vbique scaterere mendis, non videam quid emolumenti in hac paranda An-
tidoto Elleborum nigrum laboriosum medicamentum, aluumq; non sine incommodo deiciens præ-
stare possit, præsertim quod ventriculo sit insensissimus, nec menses ciere valeat, nisi pro glande supposi-
tus. Contra vero Helenium, quandoquidem id Dioscoridis testimonio menses & vrinas ciere, status exp-
pellit, & stomacho vtile est, quæ omnia Antidotus hæmagogos nobis pollicetur. Quo fit, vt credam, im-
mo omnino mihi persuasum habeam, dictionem ἐλεν neq; amouendam esse, neq; immutandam, sed
dictionem μέλαν potius corrigendam. Etenim, vt mea fert opinio, non μέλαν, sed μελανθίον legendum
est. Hactenus Matthiolus, qui mihi perpetuo altera manu panem, altera lapidem ostendit. Sperat enim
me suis blanditiis & magnificis titulis posse demulceri, ne crebris suis obtrectionibus, ac cauillationi-
bus durius respondeam. Quasi vero mihi famæ mez conseruatio non sit multo, quam istæ suæ Italicæ
blanditiæ antiquior & carior. Cur autem Nicolai lectionem immutauerim, iam abunde mihi dictum
est. Mirum autem est quod Matthiolus scribat, se sciuisse Nicolai codicem multis mendis scaterere, &
nihilominus eius lectionem audet alteri Latinorum codicum præferre. Si numerosis mendis scaterere
sciuit, debuisset profecto eius lectionem tanquam suspectam, damnare potius, quam quæsitis vtcunque
rationibus illam alteri anteferre. Ceterum Helenii radicem menses & vrinas ciere nemo inficias ire
poterit, atqui constat, idem etiam præstare Elleborum nigrum, & præterea crassos ac pituitosos humo-
res, qui non raro menses, quo minus promanent, remorantur, per aluum educere, quod Helenium effice-
re nequit. Quum itaq; Elleborus niger vtrunque, nempe menses ciere, & pituitosos humores per aluum
subducere, Helenium autem alterum tantum efficere possit, præstat profecto Elleborum nigrum huic
antidoto, quam Helenium admiscere. Nec obstat, quod Matthiolus dicat, Elleborum laboriosum esse
medicamentum, aluumque non sine incommodo deiciens, & ventriculo infestissimum: ita enim, ei
potius dicendum erat, quam insensissimum. Nam id verum est, vbi per se, & in magna copia sumitur.
Hic vero non admiscetur, nisi scrupuli pondere, habetq; sibi additum Anisum, & alia quæ eius maliciam
frenant & obtundunt. Quare merito ἐλεν dictio e contextu per me amota est; & codicis Græci lectio
immutata in ἐλεβορον, μέλαν autem vox retenta. Ridenda igitur merito hoc loco nobis venit Mat-
thioli correctio, qui dictionem μέλαν potius esse corrigendam opinatur, & pro ea substituendam esse
μελανθίον, non animaduertens, Nicolaum paulo post in hac antidoto ipsius ius quidem verbis facere men-
tionem, μελανθίον σκῦπολα β. Si itaque ridicula Matthioli opinio procederet, bis vnius & eiusdem me-
dicamenti in vna compositione Nicolaus, quod absurdum esset, meminisset. Non minus vero, ne id
silentio transeam, ridiculum est, quod Matthiolus vocem περὶ τοῦ σκῦποιος apud Dioscoridem, pro glande sup-
positus, interpretatus est, quum illi potius reddendum erat, pro pessa suppositus. Nam ea quæ menses
euocant, non ario, sed vtero supponuntur indunturæ. Sic nunquam non stultitiam suam in aliorum
bene dictis suggillandis prodit Matthiolus. At quum Franciscus Alexander falsam Matthioli opinio-
nem sequatur, non est cur ei priuatum respondeamus. Videat autem ne hoc loco Dauus potius quam
Oedipus sit. Ego id vere de me dicere possum, me nihil nisi rationibus adiectis temere affirmare, quod
tamen subinde Franciscus facit.

Macedo-
nicum. 6 Petroselin.) Latini codices habent Macedonici, vt hinc palam fiat, Macedonicum, vel, vt Myre-
psus vocat, Macedonifium, posterioribus Græcis & recentioribus Medicis non esse nisi Petroselinum
Macedonicum.

7 Grana decem.) Latini codices habent scrupulum vnum.

8 Ruta.) In Latino codice desideratur.

9 Stachys.) Ita legendum, non Spicz, vt Latini habent codices. Græce enim σάχους legitur. Stachys
enim, Galeno attestante, non solum menses ducit, sed & abortum efficiens medicamentum est, & secun-
das elicit.

Matthioli
ignorantia
Siso & Si-
sonidem. 10 Sinonis.) Græcus Nicolai codex legit σῖνονθις σκῦπολα β. atqui falso. Nam paulo ante iisdem ver-
bis Myrrhæ meminit. Quare hic Latini potius codices sequendi sunt, qui habent Sinonis. Sic enim
vtrq; in codice tum Nicolai Præpositi vocati, tum Alexandrini legitur, vt mirari subeat Matthiolum,
qui dicit nūquam rei Medicæ scriptores Sinonis meminisse, haud dubie Sinonem diuersam esse a Si-
sonē stirpem credens. Satis autem iis verbis indicat, se Aetium non legisse, qui libro primo ita scriptum
reliquit. Σῖνον θερμὸς καὶ ὑπόπιρρος ἐστὶ τῷ γούτῳ. ἴδεν δὲ οὐρητικὸς πρὸς τὴν καὶ πεπτικὸν. Quæ omnia Gal. & post
eum Paulus quoque Sisoni tribuit libro octauo de simplicibus medicamentorum facultatibus ita
scriptum reliquit. Sison calidus & subamarus gustu est: quare vrinam elicit, & concoquit. Quinetiam
Hermolaus in suo Corollario testatur, Sisonem Hippocratem appellare Sinonem & Senonem. Vt hoc
in loco

A in loco suam ignorantiam aperte prodiderit Matthiolus, quod nusquam Sinonem mentionem fecisse rei Medicæ scriptores dicere non erubuerit. Mihi deniq; iniuriam facit Matthiolus, quod scribit me Sinonem facere sylvestris Petroselinii semen. Nam id mihi ne per somnium in mentem venit. Fateor me quidem in annotationibus in Auream Alexandrinam scripsisse, Sinonem alios petroselinum agreste nominasse, atqui illorum sententiam non approbaui, sed tantum quo nomine hodie a quibusdam vocaretur indicare volui. Ita nunquam non calumniatoris potius, quam castigatoris officio fungitur Matthiolus. Hoc loco notandus erat nominatim Matthiolo Desfennius, quod, pudendo admodum errore, Sinonem eandem esse cum Sio herbam dixerit, quum tamen constet, eas esse genere diuerfas, & in diuersis capitibus a Dioscoride descriptas. Verum nomine eius suppresso, tantum dicere voluit se cogi ut ab aliis qui Sinonem interpretantur Sium, dissentiat. Bone Deus si ego aliquid tale designassem, hic itatim Matthiolus in hæc prorupisset verba: Fuchsius hallucinatur, turpiter errat, ineptit, cœcutit. Sed quid ita? quia illius dicta nō, ut Desfennius, adoro, & oraculi loco habeo. Valeat igitur cum suis adulatoribus Matthiolus, & me ad satietatem vsq; proscindat, ut vicissim ipse calumnias suas refellere, & ipsius errores sane immensos & multos detegere suis adulatoribus queam.

B *11 Saluia.*) Græcè *ἐλενισσαία*. Latini codices, facili lapsu, propter literarum affinitatem, habent Sabina, nullo sane discrimine, quod vtraq; stirps menses moueat, & foetum eiiciat, licet in iis prestandis Sabina efficacior sit. Desfennius hic iterum, more suo ineptit, & Gari legit. Quanquam ubi se satis torfit, tandem Cari esse scribendum, propter literarum affinitatem, ait. Sed quæ rogo est Cari affinitas vel cum Sabina, vel Saluia voce? ita se passim ridendum cum suis insulsis annotationibus propinat Desfennius.

Athanasia Magna Nicolai Myrepsici, numero 13. VII.

C **A** Ntidotus¹ Athanasia magna, dysenteria laborantibus, & coeliacis confert, atq; ad fluxum muliebrem utilis est. Facit ad profluuium sanguinis narium, & eos, qui cibum non retinent in ventriculo. Sanguinis præterea a quacunq; causa natis reiectionibus auxiliatur. Habet cinamomi,² casia fistularis, ana drach. tres, grana septem. Croci floris iunci odorati, styracis calamita, phn, se selios, seminum hyoscyami, apij, dauci, anisi, opij, ana drach. vna, & dimidia, grana tria.³ Betonica, drach. duas, & scrup. duos. Spica, folij, castorij, myrrha, lapidis hamatidis, sanguinis draconis, corallij rubei,⁴ momia, boli armenij, symphyti,⁵ helenij, acori, asari, corticis, radices mandragora, poly, folior. lauri, mei, piperis albi & longi, seminis petroselinii, a. drach. dimidiam.⁶ Seminis quinqueneruia & myrti, rosarum, ana scrup. tres, grana quatuor. Succu hypocistidos, acacia, seminis oxyacantha, & succi eius, ana uncias duas. Succu quinqueneruia, vnc. tres. Mellis Attici quod satis est. Datur pondere drachmarum trium.

ANNOTATIONES.

1 Athanasia.) Etsi multæ sunt apud Nicolaum Athanasia descriptiones, tamen hæc, quæ ordine apud hunc inter Antidotus decimatertia est, in nonnullis officinis prostat, & Magna ipsis nominatur. Vtrunque autem nomen, & Magna scilicet, & Athanasia, accepit ab immensa eius, quam habet in reprimendis omnis generis fluxionibus, efficacia. Quapropter recte facerent Pharmacopœi, si hanc in suis officinis paratam haberent.

2 Casia fistularis.) Nicolaus Græcus habet, κασία φυσούλα. Per eam autem intelligit, quam Actuarius & alii recentiores ξύλον σίαν, id est, Casiam ligneam vocant: nempe corticem, qui a Galeno quoq; lib. I. de Antidotis in theriacis compositione, & Actuario quoq; ipso αἰετὲς τῆς κασίας, id est, casia fistula nuncupatur. Inferitur autem Athanasia propterea, quod Galeno & Dioscoride testibus, leuiter adstringat. Huc accedit, quod libro secundo de Antidotis apud Galenum, in Athanasia descriptione Casia fiat mentio: quæ certe non potest esse Ægyptia, nigra, seu cathartica, hoc est, purgatrix, quod illa Galeno ignota fuerit. Quapropter plurimum errat Platearius, qui in sua super Nicolaum expositione, Casiam pro purgatrice interpretatur: utpote cuius in hac compositione, quæ ventris profluuii aduersatur, illudq; cohibet, nullus esse vsus potest.

3 Betonica.) Huius in Nicolao nulla fit mentio. Quia vero in Latinis codicibus habetur, & in Athanasia prima, quæ inter Antidotus est vndecima, hic quoq; illam inferere placuit, quod rupta sanet, & omnibus bestiarum morsibus succurrat.

4 Momia.) Sic appellat Nicolaus, quam hodie vnus literæ immutatione Medicorum officinæ Mumiam nominant. Per Momiam autem minime accipiendâ hoc loco erit Serapionis Mumia, quæ non est nisi Dioscoridis, & aliorum Græcorum Pissaphaltos, ut libro primo monstrauimus: sed Rasis & aliorum Græcorum Arabum, & ea quæ hodie in officinis sub Mumia nomine prostat, & vsitata est, quæ non est nisi tabida sanies, aut liquamen hominum, aloe, myrrha, & bitumine conditorum, ut libro primo dictum est. Id quod e verbis Nicolai fit manifestissimum, quæ sunt eiusmodi: αἷματ' ἀνθρώπου τεθνήκοντος ἐπὶ τοῦ μαζομένου καὶ ἐν ταῖς μάμμιαις, id est, sanguinis humani, qui ab Italis Momion appellatur. Sanguinem, inquit, non ossa. Ut plurimum errent hodie, qui ossibus etiam pro Mumia vtuntur. Atqui de Mumia abunde libro primo differuimus, ad quem perpetuo in explicatione simplicium ignotorum Pharmacopœi confugere debent.

Helenii. *5 Helenii.*) Vel vnicus hic locus euidentissime docet, qua fide & diligentia hactenus composita medicamenta passim constructa sint. Neq; enim dissimulandus nobis vlla ratione erit capitalis tum Medicorum (vtpote quorum erat officium hunc ipsum corrigere) tum Pharmacopœorum error, qui hucusq; pro Helenio, pro dolor, auripigmentum, præsentissimum venenum, Athanasia antidoto indiderunt. Quod si negare velint, multorum codicum fide & testimonio conuincuntur. Nam vbi Græcus Nicolai codex habet *ἡλένιον*, ibi omnes legunt Auripigmenti. Sic enim Arnoldus de Villa noua, cuius apud imperitos magna est auctoritas, habet in suo Antidotario. Nec aliter legit codex Nicolai Latinus, Ioannis Agricola opera Ingolstadii excusus. Errandi autem occasionem omnibus iis dedit Platearius ille, qui in expositione sua, quam Nicolai Antidotario adiecit valde ineptam. Lemnias dictionem Auripigmentum est interpretatus. O iascitiam flagris, & cruce dignam! An non oportuit Platearium, vtpote ex professo Medicum, scire, Auripigmento in hac Antidoto nullum esse relictum locum, vt quod venenum esset nocentissimum, ac erodendi vrendiq; facultate præditum, adeoq; reliquis medicamentis Athanasiam constituentibus maxime contrarium? Atqui & huic erroneæ interpretationi occasionem præbuit

Auicenna error per niciofus. *Lib. 5. Inst. Medicarum.* Auicenna, qui Auripigmentum datum tussientibus in ouo forbili, multum valere scripsit. Nam hæc verba in sua expositione Platearius de Auicennæ sententia retulit. De quo sane errore quum alibi copiose disseruerimus, non est cur illum hic prolixius confutemus. Franciscus Alexander errori communi consulere volens, pro Lemnias dictione restituit terræ Lemniæ, pro qua certe barbari, si ea dictio tale aliquid significasset, terræ sigillatæ reposuissent. Nec habet vllum suæ huius coniecturæ probati auctoris testimonium Alexander. Nō ignoro autem terram Lemniam, perinde atq; bolum armeniam, nullo incommodo huic compositioni indi posse, tamen quia Helenii Græcus Codex mentionem facit, & eius radix exsiccata, Dioscoride attestante, cruentas excreationes sanat, ideo dubium non est, quin pro Lemnias voce deprauata, recte Helenii legatur. Hoc tamen adiciendum erit, Auicennam Auripigmento tribuisse, quod sulphuri ex Dioscoridis aliorumq; Græcorum sententiatribuendum erat: qui illud tussientibus, asthmaticis in ouo sumtum, prodesse memoriæ prodiderunt. Ceterum si Platearius animum paulo magis intendisset, facile cognoscere potuisset, Lemnias vocem per imperitum librarium ex Helenio deflexam ac corruptam esse. Sed hi sunt nostri temporis Medicorum cœcorum duces cœci: vt nihil mirum sit, si in foueam ambo impingentes incidunt. Eiusmodi profecto etiam est Bernardus Dessennius, qui & ipse in suo Dispensatorio Auripigmento in Athanasia locum esse voluit. Quare vt ab eius medicamentario libro sibi caueant, tum Medicos, tum Pharmacopolas hortor, quod is sine omni iudicio medicamentorum compositiones corraserit.

* *Foliorum lauri.*) In Græco est *φύλλον δάφνης*, foliorum lauri. Nos antea Latinorum codicum fidem secuti, baccarum lauri legimus.

Quinque acruia. *6 Seminis quinqueneruia.*) Sic appellari Plantagioem minorem, alibi ostendimus. Et monendus nobis hoc loco lector erit, quod omnia, quæ vsq; ad compositionis calcem sequuntur, in Latinis Nicolai codicibus desiderantur. Vt vel hinc appareat manifestissime, quantum præstet ex præscripto nostrarum compositionum ac descriptionum, quam aliarum, medicamenta conficere, vt qui singulas ex ipsis fontibus, sane purissimis, hauserimus.

Tryphera Magna Nicolai Myresfici, numero 210. IIX.

Tryphera magna confert ad omnia muliebria vitia, a frigiditate nata. Datur cum aqua, cui incocta sunt anisum & sceniculum: vel ex vino tepido. Ad stomachi vero mala, ex decocto mastiches, & vino, præbetur ieiunis. Ad muliebria vitia, accipe ex hac antidoto, & adice illi artemisiā bene tritam, cum oleo¹ moschato, & impone vtero vt linamentum. His qui non concipiunt, potandam præbe cum vino, in balnei in scensu, confestimq; concipiet. Recipit opij, drachmas duas. Cinamomi, caryophylli, galanga, spica, zedoaria, zingiberis, costi, styracis calamitæ, calamii odorati, cyperi, iridis, peucedani, acori, mandragora,² nardi celticæ, rosarum, piperis, anisi, apij, petroselini, feniculi,³ sinonis, dauci, hyssopi, hyoscyami, ocimi, ana drachmam vnā. Mellis Attici despumati quod satis est.

ANNOTATIONES.

Tryphera, quasi delicata dicta est, non quod iucunda & suauis sit, sed quod totius corporis colorem, & oris odorem commendet, & delicatam quandam commendabilis speciei ostentationem præ se ferat. Putredinem enim humorum emendat, & formæ corrumpi cœptæ vitium corrigit.

Oleū moscharum. *1 Oleo moschato.* Alii, moschelinum: nonnulli, vt qui barbaram sectantur Medicinam, muscellinum nominant. Eius descriptionem in sectione de Oleis studiosi reperient.

Spica fen nardus celtica. *2 Nardi celticæ.*) Siue Spicæ celticæ. Officinis Spica Romana vocatur. De qua in historia Stirpium plurimā diximus.

3 Sinonis.) Huius in Latinis Nicolai codicibus nulla fit mentio. Græcus autem codex eius diserte meminit. De illo supra quoq; annotauimus quādam.

4 Hyssopi.) In prima editione hæc vox manifeste omissa est, typographi negligentia, quum in Græco Nicolai codice sit *ὑσώπτον*. Igitur nec studio, nec data opera, vt mihi falso affingit Franciscus Alexander, præterita hæc nobis dictio est. Quum vero opij duas tantum drachmas habeo, id de præscripto codicis Græci feci, qui habet solum L. β.

Tryphera Saracenica. Nicolai Myrepsici. IX.

Tryphera Saracenica efficax maxime ad melancholicos omneque capitis, stomachi, & hypochondriorum, quod ex melancholia, aut flaua bile exulta oritur, vitiū. Accipit myrobalani citrini, casia fistula, oxyphoenici, ana unciam unam, & dimidiam. Myrobalanorum cepulorum, manna, ana drach. sex. scrup. duos grana quinq. Rhei indici, violarum, ana unc. dimidia. Anisi, feniculi, ana drach. duas, grana quindecim. Spica, maceris, ana drach. unam, grana septem cum dimidio. Myrobalani bellirici, emblici, ana drach. dimidiam, grana quatuor. Ceterum in duabus libris aqua uncias tres recentium violarum coquito, quoad aqua purpureum contrahat colorem: dein seruescito oxyphoenicum, & cassiam, probeq; subacta colato, & injecto sacchari libram unam, & uncias octo, decoquito usq; ad mellis crassitudinem, ac deinde supra scriptas species benetritas injecto, & rudicula subigito. Postquam confeceris antidotum, dato de ea castaneæ quantitate.

ANNOTATIONES.

- 1 Tryphera hæc rectius quam prior est appellata, quod sit incunda, & delicata. Præcedens, quia amara, per antiphrasin magis id nominis sibi arrogauit. Trypheram Saracenicam Mesues quoq; descripsit, sed hæc Nicolai visitatio est.
- 2 (Casia fistula.) Hic per Cassiam fistulam intelligenda venit medulla Cassiæ nigre, id quod Latinus Nicolai codex liquido testatur, qui diserte medullæ Cassiæ mentionem facit. Accedit, quod Cassia cum Oxyphoenico, alio nimirum purgante medicamento, hic coniungatur, & ab aliis speciebus, quæ antidotum hanc constituunt, separetur: quod Nicolao faciendum non erat, si per Cassiam hoc loco ligneam accipi voluisset: sed ut redactam in puluerem, instar aliarum specierum inieciisset, plane necesse fuisset.
- 3 Oxyphoenici.) Fructum intelligit, qui hodie officinis barbara & Indica vocē Thamar Indus, quasi primula Indica, nominatur: ut libro primo est expositum.
- 4 Cepulorum.) Sic vocant recentiores Græci fructus, qui hodie Sepalsius myrobalani Chebuli appellantur, ut fufius libro I. est ostensum.
- 5 Rhei Indici.) Rheum indicum Actuarius, & alii Græcis posterioribus, esse Rhabbarbari vſitati hodie genus, libro primo diximus. Eo igitur hoc loco vitendum erit. Vulgares Latini Nicolai codices, ex quorum præscripto Pharmacopœi hætenus sua confecerunt medicamenta, legunt hoc loco simpliciter Indi. Quapropter ad Myrobalanum, Arnoldi de Villa noua exemplo, non tamen sine maximo errore, retulerunt, quum Nicolaus Rheum Indicum intelligat: quod diserte dicat. *ῥέον Ἰνδικόν*. Et Indicum nominat, ut hæc nomenclatura distinguat ab eo, quod a Ponto affertur, & ob id Ponticum dicitur, quod Indico imbecillius existit.
- 6 Maceris.) Etſi Macera Maci distat, ut lib. I. ostendimus: tamen Nicolaus, quemadmodum etiam Actuarius, per Macerem non nisi id, quod Arabes Macem vocant, intelligit. Debet itaq; Pharmacopœi hoc loco pro macere, quod hodie etiam desideratur, macem vsurpare.

Tryphera Persica. Ioannis Damasceni. X.

Tryphera Persica, sic quod apud Persas experta sit, dicta: aduersus acutas febres, calidam ventriculi & iccoris intemperiem efficax. Morbis omnib; ex humorum vſtione natis confert, sitim restinguit, icterum calidū ex obstructione sanat. Suffusione a vaporib; biliosis visu incommodantem discutit. Recipit succorum solani, intybi, apij, lupisalicary, depuratorum, ana libras duas. Quibus immitte violarum siccarum, aut viridum, & rosarum, ana drachm. tres. Folliculorum sene, uncias duas. Agarici, unciam unam. Prunorum Damascenorum numero quinquaginta. Cassiæ, unciam dimidiam. Myrobalanorum, cepulorum, flauorum, Indorum, vinctorum in oleo violato, aut amygdalarum dulcium, ana uncias duas. Spica nardi, drach. tres. Coque igni prunarum lento, donec libra dua supersint: quibus inijce epistymi, drach. quadraginta. Myrobalani autem oleo amygdalarum dulcium mersi semel seruescant, tollantur ab igne, colentur. In parte colati dissolue Thamar Indorum recentium, uncias tres. Manna, unciam unam & dimidiam. Pulpa cassiæ, unc. quatuor. Sacchari violati, unc. duodecim. Percolentur, ut munda sint a seminibus, & alyis: in reliqua parte, & aceti, libra una, coque lento igni. Sacchari albiſſimi, libras tres. Adde quod prius in succis est dissolutum, misce, & ad mellis crassitudinem pcoquas. Postremo adde paulatim Rhabbarbari optimi, unc. duas.

Myrobalanorum citrinorum, unciam unam, & dimidiam. Myrobalanorum cepulorum, Indorum, ana unciam unam. Belliricorum, emblicorum, ana drach. quatuor. Seminis sumariae, trochiscorum diarhodon, macis, mastiches, cubearum, spody, santali rubei, ana drachmas duas. Seminum quatuor, drachmas duas, & dimidiam. Anisi, drachmas quatuor. Spica nardi, drachmas duas. Inuoluantur oleo violato, & reponantur vase vitreo. Datur pondere vnciæ vnius cum aqua frigida, vel succo intybi, vel solani.

1 Et si hæc Tryphera Persica ob causam antea expositam dicta, usitata non sit, quod scilicet eius componendi ratio satis longa & negotii plena existat: tamen posset pro diuitibus & delicatis parari, ut eius usus esset in febribus biliosis, & eius generis calidis vitiiis.

Solanum. 2 *Solani.*) Hodie corrupta voce Solatrum dicitur.

Intybus. 3 *Intybi.*) Intelligit herbam, quæ hodie *Seplasiis Endiuiæ* nominatur, sed legitima, cuius effigiem in historia Stirpium offendunt studiosi.

Lupus salicarius. 4 *Lupisalicarii.*) Lupulum officinæ vocant, ut loco iam citato ostendimus.

Cassutha. 5 *Cassuthæ.*) Cuscutam, ut primo diximus libro, *Seplasiæ* appellant.

Spodii. 6 *Spodii.*) Quale vero usurpandum sit spodium, in sequenti mox Micletæ compositione dicemus.

Micleta Nicolai Myrepsi, numero 200. XI.

Micleta utilis est dysentericæ, intestinorum leuitate laborantibus, inflationibus intestinorum, & ad omnes cœliacos affectus. Habet *myrobalani citrini, cepuli, bellirici, emblici, magni vstorum, ana drachmas duas, & dimidiam. Nasturtij seminis, drachmam unam, & dimidiam. Cumini, anisi, fœniculi, ameos, carnabadij, ana drachmam unam, & dimidiam. Spodij, balauſtiorum, sumachij, gummi Arabici, mastiches, ana drachmam unam, grana quindecim.* Conficitur autem hoc modo: *Semina macerentur die ac nocte in aceto, deinde soſta, & exquisitè leuigata cum oleo rosaceo fricentur multoties, ut rursus siccantur, & oleum combibant. Fricentur autem manibus. Postea omnia misceantur, & adijciatur Zalapium myrtinum. Irrigata & diligenter subacta exiguo tenuiq; igne decoquantur: dein ab igne remota, tepida in vase recondantur. Dantur drachmæ tres, aut exagia tria, cum decocto plantaginis vesperi dormituris, aut media nocte.*

ANNOTATIONES.

Rectius inter Antidota roborantia quam magna recensetur Micleta. Nos communem ordinem secuti sumus.

Myrobalanus magnus. 1 *Magni.*) Per magnum myrobalanum accipiendus is, qui hodie a nigro colore Indus nominatur. Quum enim, ut e Latinis etiam Nicolai codicibus liquet, quinque Myrobalanorum genera Micletæ compositionem ingrediantur, atque ex iis quatuor, usitatis hodie nominibus appellentur: ut per Magnum quintum genus, nempe Indum intelligamus, oportet. Quod confusionis vitandæ gratia monendum esse duxi, quum non desint, qui per Magnos, Cepulos accipiant, & recte quidem: sunt enim ceteris maiores, ut suspicio sit, pro *μαγνὸν* legendum esse *ιδὸν*.

Nasturtium. 2 *Nasturtii.*) Codex Nicolai manuscriptus habet *ναστουρίον*: atqui falso. Nam scribendum erat *ναστύριον*, id est, nasturtii: hoc ipsum omnibus Latinis Nicolai codicibus aperte testantibus. Atque is sane error a librario non solum hoc in loco, sed & multis aliis est commissus, quemadmodum supra in Michridatis antidoto ostendimus. Quare non erat cur Franciscus Alexander mihi denuo affingeret, quod ipse hoc loco immutaueram paulo post.

Carnabadium. 3 *Carnabadii.*) Hic locus manifeste declarat, Carnabadium varic a Nicolao usurpari. Nam supra in aurea Alexandrina, pro Cumino Æthiopico usus est: ut ibidem diximus. Hic vero pro Careo, seu, ut hodie appellant officinæ, Carui usurpatur: quod e Latinis omnibus Nicolai codicibus patet, qui pro Carnabadii voce, Carui habent. Non solum vero Nicolaus, sed & Simeon Sethi, vnus ex recentioribus Græcis, Carnabadium vocat, quod Dioscorides & alij vetustiores Græci Careum nominant. Ceterum hic non posse pro Cumino Æthiopico accipi Carnabadium, hinc perspicuum euadit, quod antea cumini in hac antidoto facta sit mentio: adeoque bis eius compositionem ingrederetur, nisi pro Careo a Nicolao usurparetur. Neque mirum est, variis modis Carnabadii vocem a Nicolao esse usurpatam, ut qui e variis quoque auctoribus suas descripsit compositiones.

Spodium. 4 *Spodium.*) Quum varie apud auctores Spodium usurpetur, quemadmodum copiose libro primo huius Operis ostendimus: diligenter cogitandum erit Pharmacopœis, de quo hoc loco Nicolaus sit locutus. Non est autem neque de spodio Græcorum veterum, neque Arabum, quod illi spodium cannarum vocant, locutus: quod neutrum in ea medicamenta, quæ per os ingeruntur, usurpetur, ut loco iam citato monstrauimus. Accipiendum igitur per spodium hic erit, id, quod officinæ hodie ita, de sententia Placentarii, appellant: quod non est nisi Ebur vsum, & adstringendi facultate pollens. Eius autem conficiendi modum infra docebimus. Non solum vero Nicolaus, sed & Actuarius, alijque recentiores Græci, per Spodium intelligunt id, quod hodie usitatum est. Nicolaum autem hoc loco id ipsum innuere, satis testantur Balauſtia, & sumachium illi coniuncta: quæ itidem adstringendi facultatem obtinent.

Sumachii. 5 *Sumachii.*) Nobis ita Latina ratione appellare placuit, id quod hodie Sumac officinæ, Græci atque vetustiores Rhœn nominant. Debet autem eius pulpa sine ossibus usurpari.

Mastiche. 6 *Mastiches.*) Hæc vox in Græco manuscripto codice desideratur. Verum quum eius in omnibus, quos viderim, Latinis codicibus mentio fiat, non putavi omittendam esse. Ceterum hæc quoque compositio a Bernardo Dessennio Crönenburgio perperam recitatur, ut mirari satis non possim, quum melioribus codicibus parum instructus fuerit, ausum tamen fuisse de compositionibus medic. hoc præsertim tempore, aliquid literis mandare. Nihil igitur mirum, si pro speratâ gloria ignominiam referat.

Esdra. Nicolai Myrepsici. XII.

- A** Esdra capitis dolorem sedat. Phreniticis fronti & naribus illita confert, somnumq; accersit. Oculorum fluxiones sistit. Auribus dolentibus, & exulceratis instillatur. Dentium dolorem illita sanat. Columellæ defluxione tentatæ, longæ tussi, & spirandi difficultati, cruenta excreantibus, interno abscessu laborantibus, tabidis, intestinorum cruciatibus, singultui, & cœliacis auxiliatur. Item regio morbo correptis, & iocinerosis succurrit. Fœminis difficulter parientibus ea inus venter illinitur, & confestim fortum edunt. Sterilibus in internum vteri sinum imponitur, & postquam cum viro coierint, concipiunt. Est & dysentericis, & cœliacis efficacissima. Accipit ¹ *mamira* drach. dimid. *Amomi* drachmas sex. *Floris iunci odorati*, drachmas quatuor, scrupulum unum, grana octo.
- B** *Pyrethri*, scrupulum unum, grana octo. *Croci*, scrupulum unum, grana quatuor. *Myrrhe troglodytica*, scrupulos duos. *Syracis calamitæ*, scrupulos duos, & dimidium, grana quatuor. *Petroselinî*, scrupulum unum. *Tragacanthæ*, scrupulum dimidium, grana quatuor. *Succi hypocistidis*, scrupul. unum, grana octo. *Iridis illyrica*, drachmam dimidiam, grana quatuor. *Seminis fœniculi*, drachmam dimidiam. *Dauci Creici*, scrupulum dimidium, grana quatuor. *Seminis papaveris*, drachmam dimidiam. *Spicæ*, drach. dimidiam, grana quatuor. *Foliorum ruta*, scrup. dimidium, grana quatuor. *Cassie*, scrup. unum, grana quatuor. *Ammeos*, scrupulum dimidium, grana quatuor. *Costi*, scrup. dimidium, grana octo. *Cardamomi*, scrup. unum, grana octo. *Opy*, scrupulum unum, grana quatuor. *Euphorbii*, scrupulum unum, grana octo. *Piperis communis*, scrup. unum, grana quatuor. *Rosarum aridarum*, unciam unam & dimidiam, drach. unam, scrup. unum. *Opopanacis*, drach. sex. *Mei*, scrup. unum, grana octo. *Lachæ*, scrup. duos & dimidium, grana quatuor. *Lycii Indici*, drach. dimidiam, grana quatuor. *Caryophylli*, scrup. duos & dimidium, grana quatuor. *Anisi*, drachmam dimidiam, grana quatuor. *Foliorum citri*, scrup. unum, grana octo. *Ammoniaci thymiamatis*, drach. dimidiam, grana quatuor. *Seminis nigellæ*, scrup. unum, grana octo. *Sulphuris vivi*, castorij, ² gentiane, ana scrup. unum, grana octo. ³ *Cimolia terræ*, drach. dimidia, grana quatuor. *Sinonis*, ⁴ *ventriculi mergi*, ana scrup. unum, *Artemisii*, drach. dimidiam, grana quatuor. *Hedychroi magmaticis*, drach. dimid. grana quatuor. *Seminis ocimi*, lapidis ⁵ *iaspidis*, ⁶ *florum nery*, *cinnamomi*, *anethi*, ana scr. dimid. gr. quatuor. *Bdellij*, scr. duos. ⁷ *Rhois syriaci*, *Rhois culinarij*, ana drach. unam, & dimidiam. *Asari*, drach. unam. *Lapidis hematitius*, drach. dimidiam. *Thuris*, grana sex. ⁸ *Seridis herba*, scrup. unum. *Teste sepie*, scrup. unum, grana octo. *Corallij*, grana septem. *Iuniperi baccarum magnarum*, grana septem. *Iuniperi baccarum parvarum*, scrup. unum, grana octo. *Sanguinis draconis*, drach. dimidiam. ¹⁰ *Cinnabaris*, hoc est, *Simphiti*, drach. dimidiam, grana quatuor. *Peucedani*, *seminis apij*, ana grana septem. *Piperis albi*, scrup. duos. *Maceris*, drachm. dimid. grana quatuor. ¹¹ *Hermodactyli*, *crystolobie*, *libyistici*, ana drach. dimidiam. *Nardi celticæ*, drachm. dimidia, grana quatuor. *Calami odorati*, scrup. dimidium, grana quatuor. *Balsami*, drach. unam. ¹² *Mellis attici despumati*, quod satis est. Liquores vino odorato bono macerentur, & paratæ utentibus detur. Datur tabz magnitudine.

ANNOTATIONES.

E Etsi hæc Esdræ Antidotus e numerosis constructa est simplicibus medicamentis, adeoq; nō sine molestia confici potest, tamen, quia cum Actuarii & Aetii maxime descriptione convenit, & tantum ponderibus distat, quorum tamen exquisitior in Nicolao, quam Aetio aut Actuario ratio est, ideo Pharmacopœi ex Nicolai præscripto Esdræ parare debent. Bernardus Dessennius Cronenburgus, quum quæ est ^{Bernhardus Dessennius Cronenburgus} apud Nicolaum Præpositum appellatam Esdræ, propter deprauatas in ea passim voces explanare non posset, eam quæ in Paulo est, ab hac tamen multifariam diffidentem, proferre voluit. Inde omnibus perspicuum euadit, quam nihil omnino hic vir in hoc argumenti genere præstiterit. Potuisset igitur hanc prouinciam, nisi scribendi ^{exaggeratio} illum exagitasset, aliis sese peritiōibus, & magis exercitatis relinquere.

¹ *Mamira.*) In Nicolai codice Græco manuscripto est *μαμια*. Quid autem sit Mamiras, Paulus lib. ^{Mamira} septimo diserte explicat, quum inquit: Mamiras radícula est herbæ, frequentibus tuberculis nodosis cincta, quæ cicatrices & albugines extenuare creditur, detergendi nimirum facultate prædita: hæc ille. Non videtur itaque hac delineatione representare nisi radiculam, quæ Mauritanis Doronicum nominatur, quemadmodum fufius tomō primo nostrorum Commentariorum de Stirpium historia ostendimus. Mamiræ igitur loco, Doronicum Mauritanorum vsurpandum erit. Quum vero neq; hoc hodie satis cognitum sit, præstat pro eo vri Ormino, quod Dioscoride teste itidem albugines oculorum extergere potest. Mirum autem est, Aetium Mamiræ in Esdræ prophetæ, aut doctoris antidoto non meminisse: quum tamen aliorum omnium simplicium, quanquam ordine non nihil immutato, meminerit. Utrobique autem pondera ipsa exigua admodum sunt, idq; propter immensam simpli-

cium copiam: quorum pondera tandem si in unum cocant, in magnam molem ac iustam quantitatem exsurgunt.

Gentiana.
Amara
herba.

2 *Gentiana.*) Nicolaus habet *πικρία πόντι*, id est, herba amara. Per amaram vero herbam intelligere illum Gentianam, ex Actio primum liquet, qui eius post castorium meminit. Dein ex Paulo, qui nec ipse Gentianam in Esdra descriptione præterit. Huc accedit, quod omnibus constet, vix reperiri radicem aliam, quæ Gentianæ radice sit amarior: ita ut quum rem aliquam vehementer amaram esse inducere velimus, Gentiana esse amariorem dicamus.

Cimolia
terra.
Succeda-
scum
Cimoliz.

3 *Cimolia terra.*) De Cimolia terra libro primo diximus. Sic dicta verò est, a Cimolo insula: quæ una est, Strabone in decimo auctore, Cycladum. Græcis alio nomine *σμηκτίς*, a mirifica abstergendi facultate est appellata. In eius penuria Cretica terra, seu Creta uti licebit, quod & illa extergendi, Galeno libro nono de Simpl. facultatib. cap. 5. teste, vim habeat. Verum hic me erroris insinuat Franciscus Alexander, & me non recte cretam pro cimolia substituisse dicit, quod potius in eius inopia terra lemnia vel armenius bolus, vel hæmatites substitui debuissent. Non nego autem, quin, maxime si adstrictiōnem quis spectet, huic compositioni unum e tribus iam commemoratis inseri possit: tamen quum hic sulfur, & gentiana, absterforia facultate prædita, cimoliam præcedant, dubium non est; Cimoliam propter eandem vim, mox illis subiectam esse. Quum itaque Cimolia extersionis gratia Esdræ indatur, & creta eandem, ut dictum est, facultatem habeat, quæ est Francisci impudentia, ut reprehendere audeat, ubi nullus plane inest error? An non seipsum errare indicat evidentissime, dum fullones in vestium maculis abluendis, Cimolia uti scribit? Non enim has abluit, nisi extergendi sua facultate, ob quam etiam, ut commemoratum est, *σμηκτίς*; quasi abstergens dicta est. Sed reprehendendi alios immensa libido ita Francisci animum stupefacit, & oculos præstringit, ut quid agat nec intelligat, nec videat. Qui itaque ab hac immunes sunt labe, facile cognoscent me recte pro Cimolia, si huius inopia laboretur, cretam substituisse, meque ab errore vacuum esse.

Mergi v-
ticulus.

4 *Ventriculus mergi.*) Manuscriptus Nicolai codex hic falso *ἐρίαι γαστρός*, pro *αἰθίας γαστρός* legit: quod ex Actio satis liquet, qui ita habet, *κόπρα τῆς ἐντοσίουμένης ἐν τῇ κοιλίᾳ τῆς αἰθίας* hoc est, stercoris reperti in ventre mergi. Paulus tamen perinde atque Nicolaus, ventrem potius quam stercora mergi usurpandum esse docet, ait enim *ῥυδὸς αἰθίας*: id est, ventris mergi. Galenus libr. II. Simplicium, eius usum non magnificat: ut etiam si prorsus omittatur, quum exigua eius sit quantitas, nihilo deterius sit futura compositio. Mergum Germani cin *Quaether* nominant. Facile haberi potest.

Iaspis.

5 *Iaspidis.*) Opuntia erit usurpanda, quæ Dioscoridi Thytes, Galeno Iaspis subuiridis, Iunioribus Turcica dicitur, ut libro primo est ostensum.

Nerium.

6 *Florum Nerii.*) Et si Nicolai codex manuscriptus habet *ῥοδαίων ῥοδαίων*, id est, foliorum Nerii: tamen quia Actius legit *ῥοδῶν ῥοδαίων*, hoc est, rosarum Nerii: & Paulus *ῥοδῶν ῥοδῶν*, hoc est, florum Nerii, ideo nos quoque hanc lectionem, tanquam veriorē, secuti sumus. Quamquam, si Dioscoridi credimus, nihil refert, folia an flores Nerii usurpemus, quod utraq; aduersus venenatorum morsus præsidio sint. Quid autem sit Nerium, aibi copiose docuimus: nempe in altero de Stirpium historia tomo. Oleandrum vulgus herbariorum vocat. Ceterum quum rarum sit Germaniz Nerium, nec Pharmacopœis adhuc satis cognitum, licebit vice eius uti Asclepiade, quæ vulgo herbariorum Hirundinaria, & Seplafus Vincetoxicum appellatur. Quippe utraq; herba ictibus serpentum medetur.

Rhois.
Obsonio
rum.
Coriari-
um.
Syracus.

7 *Rhois Syriaci.*) Rhois duo sunt genera. Alterum, quod obsoniis inspergitur: ob id obsoniorum, rubrum, & culinarium dicitur. Alterum, a coriorum tinctoribus expeditum: ideoque Coriarium nominatum. Semen eius, quod Sumach officinæ vocant, in Medicum maxime usum venit. Est vero etiam qui Galeno, & hic Nicolao, Syriacus dicitur, quod in Syria præstantior fere proueniat. Quum vero Syriaci hodie forte nullus sit usus, præstat Sumachii vsitati pondus duplicare, ac in Esdra conficienda eius drachmas tres usurpare. Haud melatet quod hoc loco Matthiolus mihi falsam affingat sententiam, quasi nimirum ipse Syriacum Rhoem peculiare quoddam, ac separatum genus faciam. Nam ab ea sententia me esse alienum ex hoc loco omnibus sit manifestum, & ex his, qui in tertio meorum de Stirpium historia commentariorum tomo in capite de Rhoë scripsi: Ut mirum sit Matthiolum, qui se veritatis amatorem esse, passim iactat, hisce calumniosis interpretationibus haud abstinuisse, præsertim quum has in Lusitano ægerime ferat.

Seris.

8 *Seridis.*) Intelligit herbam Latinis Intybum officinis corrupte Endiuiam appellatam. Pro Endiua verò non lactuca sylvestris, ut hætenus est factitatum, sed vera usurpanda erit: cuius effigiem in tertio Stirpium historia tomo dedimus.

Iuniperi
Baccæ
mag-
na.
Cinnaba-
ris.

9 *Iuniperi baccarum magnarum.*) Si magnæ haberi nequeunt, geminetur paruarum pondus.
10 *Cinnabaris.*) Per Cinnabarim hoc loco non accipienda venit recentiorum Medicorum factitia, quæ ex argento viuo & sulphure simul vltis conficitur, & sub nomine Cinnabarii in officinis proflata, sed nec ea quæ Dioscoride describitur, quæ non est nisi liquor ex Aphrica allatus, adeoque a sanguine Draconis recentioribus vocato, haud diuersa, ut libro I. supra fufius monstraui. Quare quum inter se Cinnabaris Dioscoridis, & Sanguis draconis posteriorum Græcorum haud differant, ut per Cinnabarim aliud intellexerit Nicolaus necesse est. Non est autem per Cinnabarim inaudiendum, nisi Symphytum Græcis dictum. Id quod metipse Nicolaus testatur, qui sect. 41. pastillo 135. disertis verbis, Cinnabarim interpretatur Symphytum. Hanc vero herbam, quæ hodie consolida, aut rectius Solidago maior appellatur, Esdræ compositioni recte indi, hinc liquet, quod instar Sanguinis draconis

A hæc ipsa dysentericis ac celiacis plurimum conferat. Nonnunquam vero Cinnabaris vox apud Nicolaum nostrum Rubiam herbam alio nomine vocatam denotat, ut in compositione Antidoti 62. ad vrinæ difficultatem destinatur. Rubiam autem alio nomine dici Cinnabarin, Dioscorides memorie prodidit, ut in historia Rubiæ alibi fusius docuimus. Quare posset & hoc loco commodissime Rubia tinctorum dicta loco Cinnabaris inferi, quod scilicet regio morbo laborantibus auxilietur, quibus etiam Eisdram Antidotum succurrere Nicolaus affirmat. Quapropter quandocumque vox Cinnabaris in Nicolai compositionibus occurrit, semper per eam Pharmacopœis Symphytum, vel ut ipsi nominant, Consolidā maior, vel Rubia tinctorum appellata, intelligi debet. Id quod in prima editione non animaduertimus.

11 Hermodactyli.) Hic iterum per hermodactylum accipiendum, quod Arabibus & officinis Behen dicitur, ut supra in aurea Alexandrina annotauimus.

B *12 Mellis attici quod satis est.*) Ut scilicet singulis vnciis specierum, ternas vncias mellis adiciamus. Mellis ad-
Quod si itaque supputaueris species, sumendæ erunt, ni fallor, mellis optimi odorati lib. vna, & dimidia, liciendi
cum vnc. tribus. Aetius Eisdram hunc conficiendi modum præscribit. Arida omnia cum croco, castio- quantitas.
rio, ac hedychroo tundito, & per angustissimum cribrum excutito: Opium vero, myrrham, hypocisti- Confici-
dem, bdellium, lycium, ammoniacum in vino macerato. Tragacantham vero per se macerato. Sequenti di modus
die rosas Nerii & Serin terito & vnito, ac tragacanthæ similiter probe tritæ: reliqua trita adiecito, & cum Actii.
succo Artemisiæ vnito: mel quoque, despumatum ac tepesactum sepe instillato, ne tragacantha exarescat. Postea arida tusa inspergito, sufficienterque vnita probe contegito. Sequentibus vero diebus septem aut nouem in sole terito, & vasis vitreis excipito.

Diacodion. Nicolai Myrepsici. XIII,

D *I*acodion' confert ad omnem celiacum affectum, item dysentericis, febricitantibusque, ex aqua pluuiali data: in qua spodium, rhu culinarium, myrtus, & stillatitius rosarum liquor infertur. Item prodest iis quibus tenui defluxione a capite deuoluta tussis excitatur, & quibus venter acris, & biliosa excernit. Præterea calidæ interperici, & cholera laborantibus, nec non per uigilio vexatis. Habet capitulum papauerum candidorum, neque, viridium neque, aridorum, integrorum cum exteriori corice, tredecim. Rosarum rubearum, drach. duas, & dimidiam. Croci, acacia, glycyrrhizæ, ana drach. vnam. Boli armenij, vnc. dimid. Cinamomi, symphyti, hypocistidis, balaustiorum, ana drach. vnam. Baccarum myrti, vnc. vnam. Coralli albi & rubri, rhois culinarij sanguinis draconis, rhois syriaci, ana scrup. duos. Seminij portulacæ, drach. dimidiam. Capita prædictorum papauerum in aqua pluuiali, donec dimidium eius absumatur, coquito: prius tamen in aqua illa, in qua coquentur, capitibus per biduum maceratis. Dein per saccum colato, & adiecito mellis myrtini lib. vnam, & dimidiam, ac probe subacta iterum coquito, ad mellis consistentiam. Postea deposita ab igne vase, species tenuissimè tritas inijceto, & bene subacta in vase recondito. Datur pondere drachimarum quatuor aut sex.

ANNOTATIONES.

1 Hoc Diacodion medicamento, potius quam Ioannis Mesue Damasceni vtendum est, quod cum eo quod Actuarius describit, plane conueniat: & ad vitia illa, ad quæ adhibendum esse diximus, efficacissimum sit. Ita vero a capitibus papauerum, quæ Græcis *καρδια* dicuntur, nominatum est. Diacodion vnde dictum.

2 *Per biduum.*) In Græco Nicolai codice manuscripto, tempus macerandi capita papauerum non est expressum: ita ut suspicio sit, codicem hoc loco esse mutilum; præsertim quum in Actuario diserte sit id ipsum significatum, qui biduum constituit: & in Latinis quoque Nicolai codicibus, qui triduum designant.

3 *Per saccum colato.*) Græce est *σικκάλισον*. Sciendum igitur, *σικκάλισον* & *σικκίον* frequens esse non solum apud Nicolaum, sed & Galenum, verbum: hoc est, per saccum colare. Hac colandi ratione frequenter in decoctis, quæ per cocturam aut ad tertias, aut ad dimidias reddita sunt crassiora, quæ liquidiora euadant, vtimur. Eandem ob causam vina etiam olim per saccum trans mittebant. Et hodie, a-
romatis in saccum inditis vinum hoc modo paratur, quod vulgo Claretum & Hippocras vocatur. Per saccū col. re. *σικκάλισον*.
Claretum.

4 *Mellis myrtini.*) Mel vero myrtinum ita conficitur: Duabus libris mellis optimi despumati, admisce succi baccarum myrti, Myrtillos nominant Sepias, lib. vnam, & ad succi consumptionem coquito. Quia vero ad nos bæccæ illæ virides & recentes non afferuntur, vtendum eorundem decocto erit ad Myrtini mellis confectionem. Hippo-
cras.
Mel myrtinum.

Dia Libanu. Nicolai Myrepsici. XIV:

D *I*al' Libanu, id est, Antidorus ethiops: facit ad eos, qui angina correpti sunt; asthmaticos item, nephriticos, & guttatum mingentes. Dettillationes sanat, & ilci dolorem ex vino albo data mitigat. Accipit castorej, opij, hyoscyami, ana drach. quatuor. Casta lignea, peonia, styracis, piperis longi, folij, croci, thuris masculi, ana drach. duas. Rhei pontici, amomi, ana drach. vnam. scrup. duos. Myrrha, drach. vnam, & dimidiam. Spice Indicæ, pyrethri, eusorbi, piperis albi, ana drach. duas, & dimidiam. Mellis attici despumati, quod satis est. Datur pondere drachmæ vnus aut drachmarum duarum cum vino albo calido, cui thus, aut saluia incocta sit.

ANNOTATIONES.

Dialibanu. 1 *Dialibanu.*) Sic enim proferendum, non ut vulgus consuevit, *Dia* olibanum. Neque enim *di* *li* aliud sonat, quam antidotus et thure: ut interpretati sumus. *li* *can* enim thus est Græcis. Et conuenit hæc descriptio cum ea, quæ est apud Aethurium.

Thus masculum. 2 *Thuris masculu.*) Thus masculum, Dioscoride auctore, album est: quum frangitur intus pingue, in suffitu statim ardens, suapte natura rotundum, seu in rotundos globulos singulos, aut geminos testiculorum forma conerctum. Hinc masculi cognomen accepit.

3 *Spice Indica, & pyrethri.*) In Græco Nicolai manuscripto codice hæc duo medicamenta desiderantur. Sed ex Actuário & aliis Latinis Nicolai codicibus adiecta sunt. Non est vero dubium, quin Græcus Nicolai codex hoc loco mutilus sit.

Requies. Nicolai Myrepsici. num. 205. XV.

Requies¹ ad febres continuas & ardentes, omnemque febrilem affectum, ad febres B denique acutas confert. Est autem utilis, temporibus & pulsibus manuum inuncta, ac cordis dolorem mitigat, somnumque conciliat. Recipit *rosarum, violarum, ana² drach. tres. Opij, hyoscyami, feminis³ papaueris, mandragore, intybi, lactuca, portulacæ, & pyllij seminũ, nucis moschata, cinamomi, zingiberis ana drachmam unam, & dimidiam. Santali albi & rubei * spodij, tragacathæ, ana scrup. duos, grana quinq., Sacchari candi, drachmam unam. Sacchari & stillatij rosarum liquoris, quantum satis videbitur. Datur castanea quantitate, ex Serapio violato.*

ANNOTATIONES.

Requies cur dicta. 1 *Requies.*) Sic appellata est ab effectu, quod dolorem obtundat ac mitiget, caloremque febrium mitiorem reddat: & iis qui hanc sumunt, requiem afferat.

2 *Drachmastres.*) Hoc pondus in Græco Nicolai codice desideratur, ex Latinis autem est a nobis C adiectum.

Papauer. 3 *Papaueris.*) Quoties Papaueris simplicis & citra adiectionem mentio fit, semper album inaudiendum erit. Hoc itaque loco semen papaueris albi sumendum.

Intybum. 4 *Intybi.*) Latini Nicolai codices Scariolæ habent. Quum vero Intybum simpliciter prolatum non sit, nisi ea herba quæ corrupta voce officinis Endiuia dicitur, huius potius quam Scariolæ semen hic usurpandum erit. Quanquam quum vtrisque eadem sit facultas, parum refert utrius semen accipias.

5 *Zingiberis.*) Eius in Latinis Nicolai codicibus nulla fit mentio. Tamen quum eius diserte Græci exemplar manuscriptum mentionem faciat, & ad frangendam frigidorum ac stupefacientium, quæ præcedunt, vehemenciam conferat, omittendum non esse iudico. Vocat autem Myrepsus *κινναμωμιν*.

* *Spodij.*) Non est cur hoc loco per Spodium Græcorum intelligamus, sed id potius quod Eburustum appellatur. Nam hoc Myrepsus tempore, ut hodie adhuc Spodium nominabant Medici. Scio hoc loco me a Francisco Alexandro notari, quod relictis veteribus ex Myrepsio antidota erigam: sic enim loquitur: pertinaciter nimis magisque quam debeat. Non est igitur ut hanc contumeliam atque calumniam tacitus præterire possim aut debeam. Siquidem quod veterum Græcorum compositiones relinquo, non fit quod illos contemniam, quandoquidem primus fere fuerim, qui ad eos, tanquam ad fontes, Medicos reuocare studuerim: sed quum eas, duntaxat compositiones quæ in nostris officinis sunt vsitate, referre & quidem e fontibus instituerim, factum est, ut paucas admodum veterum attigerim. Utinam vero aliquæ etiam eorundem in usum reuocentur. Quare optarem Alexandrum in suis reprehensionibus non raro fuisse circumspiciorem.

Sacchari candi. 6 *Sacchari candi.*) In Latinis codicibus desideratur. Non est autem omittendum, quod in Græco sit *αγνιν*. Saccharum autem candi solenne est Nicolao, ut *αγνιν* appellet, ut alibi fusius ostendimus.

7 *Sacchari.*) Alii codices habent, Mellis quod satis est. Sed quum in Græco Nicolai codice sit *αγνιν*, & hæc antidotus maxime febribus continuis & ardentibus conferat, cum saccharo, & stillatio rosarum liquore hanc potius, quam cum melle, cui calefaciendi facultas inest, ut conficiam præstat. Ceterum neque hæc antidotus, neque ea quæ sequitur philonis in Dessennio integra est, ideo hortor Pharmacopolas omnes, ne in parandis compositionibus eius præscriptum sequantur. Quod semel hic monuisse satis sit.

Philonium Galeni. XVI.

Philonis antidotus pollet contra colicos cruciatus, iecoris, & lienis. Calculo renum, & difficultate lotii laborantibus auxiliatur. Phlegmonem costarum, pleuritimus, & omnem intestinorum dolorem leuat. Datur *stomachicis nausea vexatis, vomituriensibus & vellicato mordicis vetriculo singultientibus, dissolutis in quotidiana febre sanguinem exscreantibus, tabidis, tussientibus, destillationeque laborantibus. Somnũ accersit. In summa, medicamentũ est, quod mirifice dolorem sopit. Habet croci, drach. quinq., Pyrethri, euphorbij, spica nardi, ana drach. unam. Piperis, ibi, hyoscyam, ana drach. viginti. Opij, drach. decem. Mellis despumati optimi, quod satis est. Datur Pontica nucis quantitate.*

ANNOTATIONES.

1 *Galeni.*) Sic appellamus, non quod a Galeno compositum sit, sed quod id ipsum ex Philonis Philosophi & Medici Tharsensis sententia Galenus, libro nono de compositione medicamentorum localium produ-

A prodiderit. Recenset & hanc Nicolaus Myrepsus Sect. one prima, Antidoto 243. A Quatuor ite in ac Paulus, sed ponderibus variatis. Quare hoc quod nunc descripsimus, legitimum est philonium; etsi alia duo quæ sequuntur, hæcenus fuerint visitata. Et Galenus loco iam citato, hoc ipsum tanquam probe compositum a Philone, laudat eiusq; compositionis rationem exponit, quam quivis ex illo cognoscere poterit.

Philonium¹ Maius,² siue Romanum. Nicolai Myrepsici, num. 303. XVII.

Philonium Romanum, idem quod præcedens potest. Accipit piperis albi, hyoscyami, ana drach. quinq. Opj, drachm. duas, & dimidiam³ Casia lignea, drach. unam, & dimidiam. Seminis apj, drach. unam. Petroselin. fœniculi, dauci Cretici, ana scrup. duos, grana quinq. Croci, scrup. dimidium. Spica nardi, pyrethri, zedoaria, ana grana quindecim. Cinamomi, drach. unam, & dimid. Euphorbji, myrrha, castory, ana drach. unam. Mellis optimi, quod satis est. Datur nucis auellana quantitate.

ANNOTATIONES.

1 *Maius.*) Sic vocarunt, quod ex pluribus quam præcedens, ab ipso Philone compositum; constat Maius medicamentis. Nam præter ea quæ Philo prodidit, pleraq; alia adiecta sunt; ut ex vtriusq; collatione liquido patet.

2 *Romanum.*) Dictum esse nonnulli putant ab Auicenna, Canone quinto, summa i. tract. i. quod Romanum sit a Philone conditum hoc medicamentum. Mihi alia ratione sic esse vocatum videtur. Nam etsi Philo, qui Tarsensis, ac diui Pauli compatriota, adeoq; cuius Romanus fuit, Romæ fortassis Medicinam fecit, illicq; hoc confecit medicamentum; tamen non ideo Romanum dici potuit, quod plurimum sit immutatum, nec tale existit quale ipse composuit. Quapropter Romanum potius est nominatum, quod post Philonem Medici Romani aliqua simplicia adiecerint, & deinde pro Philonis Antidoto, hoc ipso Romæ vii coeperunt, indeq; Romanum dixerunt.

3 *Casia lignea.*) Casia lignea, semen Petroselin, opj, fœniculi, dauci Cretici, zedoaria, cinamomum, myrrha, & castorium; in Philonis compositione non fuerunt, sed a posteris adiecta sunt omnia.

4 *Myrrha castori.*) Hæc duo medicamenta in Latinis Nicolai codicibus desiderantur, pro iis Costum substituentibus. Nos autem illa ex Græco Nicolao adiecimus, idq; ut faceremus, Galenus nos monuit: qui loco paulo ante indicato disertè scribit, alios myrrham & castorium admiscuisse. Quapropter hæc descriptio Philonii Romani, quam nos afferimus, integra est, ut quæ omnia a Philone prodita medicamenta habeat, tum etiam ea quæ ab aliis esse adiecta, Galenus memoriæ prodidit. Quæ in Græco Nicolao manuscripto est, mutilam esse constat, ut quæ opium, quod maxime requiritur, non habeat. Est & ea quæ in Latinis habetur codicibus, manca, ut quæ myrrham & castorium omiserit. Nos itaq; collatione vtrorūq; codicum hæc perfecimus, quæ deinceps Pharmacopœi pro Romano, ceteris abiectis, uti debet.

Philonium Persicum. Ioannis Damasceni. XIIX.

Philonium Persicum ad sanguinem vndecunq; manantem confert. Quapropter menses immodice etumpentes, hæmorrhoidas, & cruentas excretiones per inferna: itemq; sanguinis sputum compescit, ac foetum in utero retinet. Recipit¹ piperis albi, hyoscyami, ana drach. viginti. Opj, terra sigillata ana drach. decem. Lapidis hamatidis, croci, ana drach. quinq. Castory, spica, euphorbji, pyrethri, margaritarum non perforatarum, succini, zedoaria, daronici, pastillorum ramich, ana drach. unam. Succisemperiini, scrup. unum. Mellis rosacei optimi, quod satis est.

ANNOTATIONES.

1 *Persicum.*) Sic dictum putatur, quod a Persis inuentum sit.

2 *Piperis.*) Cordi medicamentarius liber, & omnia Mesues, quæ vidi, exemplaria, legunt Papaueris, sed mendosissime. Scribendum enim erit, ut nos emendauimus, Piperis. Quod in primis ex Auicenna liquet qui Philonium illud itidem describit, atq; hic disertè Piperis albi mentionem facit. Accedit huc, quod in nulla alia Philonii descriptione Papaueris mentio fiat: & quod piper inter ea quæ opj vehementiam refrenent, numeretur. Nec est cur quispiam hic Matthioli sequatur sententiam, qui libr. 5: suarum epistolarum rædicalium me non rectè Cordum reprehendisse scribit, quod non piper, sed papauer, album imponendum sit, ita enim habere Mesues codicem, qui ad manus est. Id quod non sine ratione factum videtur, quod ubi sanguis abrupto vase fluat, nullo pipere opus sit, sed eorum quæ sua frigida vi, sanguinem crassorem reddant, & fluxionem sistant. Rectè itaq; faciunt, ut mea fert opinio, qui piper negligentes, papaueris semen addunt. Nami quum ad coescendam opj malitiam, & croci & castorii satis excipiat antidotus; non video cur opus sit addere piper, ut magis incalascet, ubi opus sit potius refrigeratione. Hæc est Matthioli, bellæ mehercle, quæ meam impugnat sententiam, ratio, quam facile in ipsum retorquebo. Nam quod dicit ita habere Mesues codicem, qui ei ad manus est, probe etiam tacente Matthiolo, noueram, ut qui dixerim disertis verbis, omnia Mesues exemplaria sic habere. Quod vero subiicit, id non factum esse citra rationem; quod scilicet ubi rupto vase emanat sanguis, nullo pipere opus sit; sed medicamentis frigidis sanguinem incrassantibus & fluxionem sistentibus, ridiculum utiq; est. Cur enim Matthiolus eadem ratione ex philonii istius compositione non etiam

Persicum
Cordus
erat.

Matthio
sententia
improba-
ta.

Euphorbium & pyrethrum, quorum vtrumq; pipere calidius est, abiiciendum esse censet? Accedit, quod Philo Tarsensis suum quoq; Philonium laudat, & vtile esse sanguinem exscreantibus tradit, quum tamē illius compositionem non solum pipet, sed & pyrethrum atq; Euphorbium ingredientur. Quum itaq; persicum Philonium ad exemplum Tarsensis sit compositum, & in eo hyoscyami & opii tantum mentio fiat, quia igitur de causa huic Matthiolus, motus quidem exemplaris deprauati auctoritate, papaueris albi semen admiscendum esse contendit? quum tamen Auicenna, ex quo Mesuz suum hoc philonium, ut alia fere omnia; mutuatus est, & ad verbum descripsit, ut illa inter se collata euidentissime monstrant, piper album, non papauer, miscuerit. Recte igitur faciunt, qui Matthioli friuolis & nullius momenti rationibus contentis, papauer album negligentes, piper album adiiciunt, quum falsissimum sit quod ipse dicit, ad opii malitiam corrigendam coercendamue croci & castorii sufficere misturam. Quum enim hyoscyami albi semen pondere drachmarum viginti, opii autem drachmarum decem huic compositioni indantur, & croci atq; castorii vna duntaxat drachma addatur, fieri nequit ut tantilla portio tantam opii & hyoscyami quantitatem refrenare queat, piper quoque adiectum est. Ut sole clarius sit, Matthioli sententiam esse falsam, & in hoc tantum productam, ut me de errore accusandi rationem haberet, & superior alijs videretur. Sed iam satis nota omnib; Matthioli arrogancia est, ut opus non sit.

Succinum
Pastilli Ra-
mich.
Succus
semperui-
ui.

3 Succini.) Officinæ Charaben, ut libro primo indicatum est, nominant.

4 Pastillorum Ramich.) Descriptionem illorum pete ex sectione de Pastillis.

5 Succisemperuiui.) Mesuz Caphuram, vel (ut ipse loquitur) Camphoram habet. Quia vero Caphura, quæ bituminis species est, refrigerare nequit, sed potius calefacit, ut in Commentariis nostris super nonum Galeni de Simplicibus medicamentorum facultatum librum demonstrauimus: ideo e contextu hanc ipsam ciccimus, & pro ea Semperuiui succum substituimus. Id quod in multis etiam alijs compositionibus fecimus.

PERORATIO.

Hactenus confectiones magnas, & Opiatas vulgo vocatas, descripsimus sedecim. Quas vtiq; sufficere arbitramur, ne scilicet nimia harum copia fiat, ut vel negligenter a Pharmacopœis parentur, aut neglectæ iaceant, raroq; in vsum Medicum veniant. Nam quod sæpe diximus, præstat habere paucas, & eas quidem diligenter constructas, quam plures nulla nec arte, nec diligentia compositas.

DE ANTIDOTIS ROBVR CORPORI ADIICIEN-

tibus, liquidis, siue Electuariis, Sectio III.

Dia Castorii. Nicolai Myrepsici, numero 27. I.

Antidotus e castorio succurrit verriginosis, comitialibus, apoplecticis, resolutione correptis, tremulis, omnibusq; frigidis morbis. Habet castorij, myrobalani, ana drach. tres. Aloes flauæ, drach. unam, & dimidiam. Scordij, myrrha, euphorbij, ana drach. unam, grana septem. Folij artimonij, id est, pyrethri, tragacanthæ, calami odorati, nitri, galbani, senæ, floris iunci odorati, spicæ, opopanax, rhei Pontici, sagapeni, styracis calamitæ, zingiberis, cinamomi, ana drach. unam, grana duo. Staphydis sylvestris, seminis dauci, feniculi, petroselinij, cumini lati, nigellæ, sinonis, petrolei, styracis rubræ, sanguinis draconis, thuris, salis ammoniaci, cedoaria, anisi, ana drach. tres, & dimidiam, scrupulum unum. Thymbra, hyssopi, chamædryos, pulegij, origani, balsami, balsamitæ, seminis ocimi, branca ursina, dictamni, aristolochie rotunda, brassica sylvestris, asari, saluæ, rosarum, bdellij, ana scrup. dimidium. Ambaris, grana decem. Ossis cordis ceruini, drach. tres. Ossis naris purpure, drach. unam. Epithymi, polypodij, opobalsami, ana scrup. dimidium, granum unum. Betonica, grana undecim. Anacardij, sabina, gentiana, foliorum mandragora, ana grana decem. Serici vsti, scrup. dimidium. Peucedani, absinthij, ana grana septem. Iridis, scrupulum dimidium, granum unum. Mellis despumati optimi, quod satis est: hoc est, triplum. Datur Pontice nucis quantitate.

ANNOTATIONES.

Antidotus
e castorio
hactenus
recte para-
ta non est.
Cordus.
Myroba-
lani.

Dia castorii Antidotus hactenus nullis in officinis recte parata est, quod scilicet eius descriptio in Latinis Nicolai codicibus, quibus Pharmacopœi vsi sunt, legitima non fuerit. Neque etiam quam Valerius Cordus in medicamentario suo libro refert, a vulgari quiequam distat. Quapropter iuxta hanc nostram, quæ e Græco Nicolai codice ad verbum transcripta est, descriptionem, deinceps Dia castorii Antidotum conficiant Pharmacopœi: Quod ut rectius possint, annotationibus illam illustrabimus.

1 Myrobalani.) In Græco Nicolai codice non exprimitur genus Myrobalani, quum enim easdem fere facultates habeant, parum refert vtrum accipiamus. Verum quia Latini omnes codices flauorum, quos Citrinos hodie nominant, mentionem faciunt, & statim etiam aloë subiicitur, illi præ ceteris ad huius Antidoti compositionem sunt adhibendi.

Scordium.

2 Scordij.) Græcus Nicolai codex habet *σκόρδα*: & statim dictionem hanc explicans subiicit, quod Italis Asa foetida dicitur. Per asam autem foetidam Nicolaus non id quod hodie ita nominant

officijs

officinæ, intelligit: sed stirpem, quæ aliis Græcis Scordion vocatur, ut in Annotationibus nostris super Nicolaum copiose monstrauimus. Proinde ne Pharmacopœi in hac voce hærent, Scordium conuertimus. Vt hinc perspicuum fiat, errare plurimum Pharmacopœos, qui mendosos secuti codices, Afam foetidam, rem foetidissimam, & ob id Diaboli sterces Germanis appellatam, in huius medicamenti compositionem usurpant.

3 *Artimonii.*) Hanc dictionem studio in contextu reliquimus, ut hac ratione aliorum codicum erratum detegeremus, qui in vniuersum omnes Antimonii legunt, adeo ut Cordi etiam liber medicamentarius hoc errore haud vacet. Artimonium vero esse pyrethrum, metipse Nicolaus, qui sic vocem hanc interpretatur, docet.

4 *Sena.*) Eius in Latinis codicibus nulla fit mentio.

5 *Staphydii syluestris.*) Officinis Staphys agria nominatur.

6 *Cumini lati.*) Græce est *πλευκωνία*. Latini codices habent, Sileris montani. Vt suspicio sit, Nicolaum per latum Cuminum intellexisse semen, quod Sepalsis Siler montanum appellatur. Nihil vero refert hoc an illo utamur, quod eiusdem sint facultatis. Et hoc loco Franciscus Alexander, communem aliorum errorem secutus, Seseleos semen inserit. Quum latum hoc semen, quod Siler montanum officinæ nominant, Ligustici potius sit, ut tomo altero nostrorum de Stirpium historia monstrauimus.

7 *Nigella.*) Et hæc in Latinis codicibus desideratur. Vt hinc pateat, Græcum Nicolai codicem Latinis plurimum prætere.

8 *Petrolei.*) Per petroleum intelligit oleum naturale, quod e petris & saxis emanat: quod non est nisi bitumen liquidum, vel colamen bituminis. Babylonis olim Naphtha dictum, ut fufius libro primo ostensum est. Nicolaus superstitione quadam ductus, vnguentum seu oleum S. Barbaræ vocat, quæ quidem ad nostra vsque secula durauit, hanc pulcre confirmantibus cucullatis illis fratribus qui S. Catharinæ, & S. Walburgis oleum vocarunt: sanctimoniz specie ab imperitis & simplicibus, ut fuerunt, & adhuc hodie sunt, ad fucum faciendum instructissimi, pecuniam emungentes.

9 *Styracis rubæ.*) Quid sit Styrax rubea, libro primo expositum est.

10 *Anisi drachmas tres, scrupulum dimidium, grana octo.*) Nescit hoc loco Franciscus Alexander, quæ fide adductus ita legam. Respondeo me, ut candide verum fatear, Latini codicis lectione deceptum esse, qui habet drach. tres semis, scrup. octo, quum tamen Græce sit *πταρχαί, γλ.* id est, grana viginti, quæ coniuncta scrupulum vnum constituunt. Quare non octo, sed vnus scrupulus accipiendus erit.

11 *Thymbra.*) Thymbra non est nisi syluestris Satureia. In cuius penuria, satiuæ uti licet.

12 *Branca ursine.*) Acanthum Græci & Latini nuncupant. Non est autem pro Branca ursina, vsurpanda quæ sic hodie appellatur herba, hæc enim est Dioscoridis, & aliorum Græcorum Sphondylium: sed spina alba vulgaris, in primo de Stirpium historia tomo nobis descripta.

13 *Brassica syluestris.*) Græce est *κεράμβυξ ἀγρία*. Hæc Dioscoridi pingitur. In eius penuria, satiuæ, quæ easdem obtinet vires, uti licet.

14 *Ambaris.*) Tria hæc, nempe ambar, os cordis ceruini, & os naris purpuræ, in Latinis codicibus desiderantur: ut hinc quoque innotescat, quanto Græcus Latinis codicibus præstet.

15 *Offis naris purpure.*) Intelligit Blatium bizantium, aliis junioribus Græcis dictum. Sepalsiz Blaccam bizantium appellant. Per os autem naris purpuræ, non inaudiendum esse nisi purpuræ operculum, libro primo huius operis abunde monstrauimus.

16 *Serici vsti.*) Et hoc in Latinis desideratur codicibus. Sic passim manca Latina Nicolai exemplaria esse constat.

Dia Satyrium. Nicolai Myrepsici. Sect. I. cap. 65. II.

A Ntidotus e Satyrio valet ad liberorum procreationem, ad venercorū frequentiore vsum utilis est. Venerem namque stimulat, eamque certa de causa cessantem haud segnitè restituit. Renum & vesicæ imbecillitati succurrit. Præterea iis qui coire nequeunt, auxilio est. Voluptatem quoque excitat. Accipit¹ satyry viridis, dauci satyri, radicem nucis Indice pistatorum, eryngy radicis, nucum pinearum, ana drach. 12. & Zingiberis, anisi, sinapi albi, lingue auis seminis, ana drach. quinq. Cinamomi, scincorum cauda, seminis bulbi, ana drachm. duas. Moschi grana 7. Mellis despumati optimi, quod satis est, Satyry, dauci, & eryngy radices singule priuatim & seorsim bene trita melli imponuntur, ac subiguntur, paululumque molliusculo ignis feruescunt, dein pistacia & nucis pineæ repurgatæ ac tusa adijciuntur. Vbi cum melle aliquantulum bullierunt, sublato ab igne lebetæ, tusa & cribrata species adduntur. Postremo moschus cum exiguo stillatio liquore inferitur. Rursus hac probe subacta in vasculum ad vsum reconde. Datur cum veteri vino vesperti dormituro drachma vna.

ANNOTATIONES.

1 *Satyrii.*) Officinæ non sine errore radicem Satyrii basilici, quod illis Manus Christi dicitur, ad Antidotum e Satyrio confectionem usurpant. Siquidem nullum ad libidinem impetum excitat, nec vllas ad stimulandum coitum vires obtinet. Debent igitur in veri Satyrii, quod hodie a nullis cognoscitur, penuria, uti radice Orchios, seu Cynosorchios, quæ ad stimulandum coitum, Dioscoride & Galeno testibus, vim obtinet. Non autem utendum nisi radice eius solida, quod flaccida venerea magis inhibeat.

- Daucus.** 2 *Danci.*) Cretici radix etiam ad vsus Medicos adhibetur: in aliis generibus feminis vsus duntaxat A inualuit. Matthiolus locum hunc a typographo corruptum suggillauit, parum quidem candide. Nam quum hunc ex Dioscoride esse productum intelligeret, facile illi erat coniectare, pro etiam a typographo tantum dictione, perperam suppositam fuisse. Ceterum quum Creticus Daucus hodie non afferatur pro eius radice vtendum erit Staphylini radice, quæ Dioscoride attestante, Venerem stimulat. Eius tamen historia & pictura est in tomo primo nostrorum de Stirpium historia commentariorum.
- Succedaneū Dauci Cretici.** 3 *Eryngi.*) In Latinis eodicebus desideratur. Præstat autem pro Eryngii radicibus, Sifari satiui vti radicibus, quæ idem quod Secacul efficiunt. Græce quidem est *ερυγγιον*. Actuarius tamen, qui eodem fere modo hanc compositionem describit, Eryngii nullam facit mentionem.
- Sinapi album.** 4 *Sinapi albi.*) Per Sinapi album Erucam intelligit, id quod ex Actuario fit manifestum, qui Erucam, quemadmodum etiam omnia exemplaria Nicolai Latina, hoc loco habet.
- Lingua auis.** 5 *Zingiberis.*) Actuarius post zingiber subiicit Gryophyllorum iudem drach. quinq;. 6 *Lingua auis.*) Ita vocat, cum officinis nostris, Nicolaus semen Fraxini, vt secundo Stirpium historie tomo fufius diximus. Actuarius eius non meminit.
- Scinci.** 6 *Scincorum caude.*) Horum in Græco manuscripto Nicolai codice nulla fit mentio. Actuarius autem cinamomo statim subiungit scincos. In Latinis quoq; omnibus codicibus Nicolai, Scinci non omittuntur. Vt haud dubie hoc in loco mancus sit Nicolai Græcus manuscriptus codex. Quod confirmat, quæ statim in Nicolao e satyrio Antidotus sequitur, in qua diserte Scinci fit mentio. Accedit iis omnibus, quod Scincorum vsum Venerem mirifice excitare constet. Non igitur sunt omittendi. Sunt autem veri ad vsum Medicum adhibendi, vt primo diximus libro.
- Bulbus. Succedaneū bulbi.** 7 *Seminis bulbi.*) Quum omnes bulbi Venerem stimulandi vim habeant, syluestris saltem bulbi, cuius magna est in Germania nostra copia, semen ad præsentem Antidotum Pharmacopœi vsurpare debent. Quod si tamen nec illud haberi potest, eius loco semine vrticæ, quod eandem obtinet facultatem, vtendum erit.
- Species.** 8 *Species.*) Græcus Nicolai manuscriptus codex habet *μυρίαν*. Sic enim vocat species odoratas, quæ aromata nominantur.

Antidotus e baccis Lauri. Rhazis. III.

Electuarium e baccis lauri ad coli, & tenuis intestini cruciatus a flatibus procreatos maxime confert. Recipit foliorum ruta aridorum drach. decem. Ammios, cumini, nigelle, libystici, origani, carui, amygdalarum amararum, piperis nigri, piperis longi, mentastri, dauci, radicis acori, baccarum lauri, castorij, ana drachmas duas. Sagapeni, unciam dimidiam. Opopanaci, drach. tres. Mellis despumati quod satis est. Datur auellana quantitate.

ANNOTATIO.

Quum hæc Antidotus in dissoluendis flatibus sit longe præstantissima, & nulla melior sit in vniuersis Rasis empirici libris, ideo in omnibus officinis paratam hanc proflare oportet. Sunt vero omnia illam constituentia medicamenta antea explicata, vt pluribus annotationibus non sit opus.

Anacardina. Ioannis Damasceni. IV.

Antidotus anacardina ad totius inferioris ventris, & cerebri affectus frigidos conducit, sanguinem puriorem reddit, & inde spiritu animali facto purgatior & renuiore sensus omnes, apprehensionem, (hinc est quod Auicenna Electuarium sapientum nominari) in intellectum, & memoriam iuuat, coloremq; viuidum corpori tribuit. Habet piperis nigri, piperis longi, Myrobalarum (Auicenna, nigrorum) Cepulorum, Emblicorū, indorum, belliricorum, castorij, ana drach. duas. Costi, anacardij, sacchari albi, melissophylli, baccarum lauri, ana drach. sex. Cyperi, unciam dimidiam. Anacardina per se teruntur, & alijs tritis permiscuntur: deinde omnia excipiuntur butyro vaccinosalis experte, & melle despumato aequalis portionis, nempe uncis quinq; & dimidia. Datur post sex menses pondere, drach. duarū. Ea sumta, vitetur labor, ira, coitus, ebrietas.

ANNOTATIONES.

Hæc Antidotus quia calidissima est, solis iis qui admodum frigidi sunt, tuto sumitur. Nam alias spiritibus accensis, febres excitat diarias, a quibus sæpe transitur in putridas, vel heclicas. Quare non temere quibusdam suspecta est.

Burungi. 1 *Melissophylli.*) In Mesue est Burungi, quam sane dictionem varie interpretantur. Sunt enim qui cubebas, alii melissam, quidam erysimon, nonnulli ocimum significare dicant, adeo vt nemo se facile ex hac sententiarum varietate explicare possit. Sed vtrunque Arabum interpretes inter se plurimum dissentiant, quod minime mirum, quandoquidem Arabicæ linguæ imperiti fuerint: tamen ex hac difficultate nos expedite extricabit Serapio; & ipse Arabs, qui diserte burungi interpretatur melissam. Quanquam illic falso legatur turungi, pro burungi aut berungi. Nam Bedarungi est ocimum, Auicenna secundo Canone teste. Burungi autem, vel, vt legitur apud Auicennam Canone quinto, Berungi, est melissa. Siquidem ibidem Auicenna hanc quoq; Antidotum describit, & in nullo prorsus a Mesua variat, quam quod pondus duplicet. Proinde ad Auicennam magis hæc Antidotus, quam ad Mesuen referenda erit. Quippe illam ad verbum ex Auicenna, qui ætate ipsum præcessit, transcripsit. Et no furtum

Serapionis locus emendatus. Bedarungi.

A furum agnosceretur, dimidia duntaxat parte ponderum vsus est. Errare igitur constat eos, qui Burungi, nigellam interpretantur. Nec Cordus & hunc secutus Berahardus Dessennius, recte hic erucæ semen pro Burungi in suo medicamentario libro substituit: quum Melyssophyllum, ut ostensum est, vox ^{Cordici} ^{cor.} hæc significet. Nam quum hæc Antidotus sensus ornes, & intellectum acuat, & Melyssophyllum, vel ut officinæ nominant, Melissa, membranarum cerebri ramos expurget instar Marrubii, cui æquas obtinet facultates, rectissime præ omnibus aliis antea dictis huic Antidoto inferitur. Sed hic mihi miris modis iniurius est Matthiolus. Nam initio me errare dicit, quod Melissam pro Burungi, seu Berungi substituerim. Dein quod scriptis mandauerim Auicennam quinto Canone in huiusce Antidoti descriptione, Burungi etiam præter cetera meminisse, quum tamen id falsum sit. Miratur insuper quod Monachorum sectator sim acerrimus, & quod iis tantam fidem adhibuerim, ut eorum potius crediderim testimoniis, quam quod vellem tantum subire laboris, ut hoc loco Auicennam inspicerem. Quod **B** autem nec Auicennam inspexerim, nec legerim, id manifestum præbere iudicium ait, quod scripserim Anacardiaz descriptionem apud Auicennam in nullo prorsus variare ab hac, quam describit Damascenus, ob idque magis hanc Auicennæ, quam Damasceno Medico acceptam referre debere, quod tamen falsum deprehenditur. Hæc ille. Quam inique autem Matthiolus hic me mendacii insimulet, ipse mendacissimus, & uter nostrum Auicennam rectius inspexerit, & legerit, iam sole clarius docebo. Verum quidem est, Auicennam quinto Canone tractatu primo tres ordine confectiones Anacardinas recensere, quarum nulla eum ea quam Damascenus habet eadem est. Quod si tamen Matthiolus Auicennam intimius perspexisset ac legisset, tertiumque iam dicti Canonis tractatum excussisset, inuenisset certe vera fuisse omnia quæ ipse impudenter pro falsis traducere ausus est. Ibidem enim ita scriptum reliquit Auicenna: Electarium Anacardinum conferens dolori stomachi vetusto, & eiusdem frigiditati. Oblinioni medetur, colorē corporis bonū reddit. Sensus & intellectū iuuat, & intellectuarius sapiētum nominat, & Salomonis esse dicitur. Accipit piperis nigri, piperis lōgi, myrobalanorum nigrorum, belliricorū, & emblicorum, castorii, singulorum drachmas quatuor. Cōstū, anacardii, berungi, sacchari albissimi, baccharum lauri, singulorum drachmas duodecim. Cipri, drachmas octo. Anacardia per se teruntur, &c. Ex iis manifestissimum est Damascenum, quod dixi, antidotum hanc ad verbum ex Auicenna transcripsisse, pondere tantum dimidia. Quæ igitur est Matthioli temeritas & iniquitas, ut dicere ausit me Auicennam nec inspexisse, nec legisse: An non ipse manifesto in mendacio deprehensus meam mihi famam & existimationem restituere tenetur? Hactenus quidem tuli patienter Matthioli iniurias, nunc vero quum calumniandi me nullum facit in Epistolis suis maxime medicinalibus modum, faciam ut totus mundus intelligat Matthiolum pacta non seruasse, mihiq; licuisse illius ineptias paulo acriore oratione retundere, & me a suis mendaciis & cauillationibus asserere. Quod ad Burungi, ut Damascenus, vel Berungi, ut Auicenna nominat, vocem attinet Arabicam, non libenter quidem de ea, quod Arabicæ linguæ imperitus sim, quod candide nunc fateor, & antea etiam semper falsus sum, cum aliis contendo: tamen hoc nemo sanæ mētis negare poterit, si Bedarungi, Mauritanis, ut Auicenna interpretatur, est Ocimum, fieri nequit ut apud Serapionem in capite de Melissophyllo recte scribatur Bedarungi, quod hoc nomine Arabibus non Melissophyllum, sed Ocimum appelletur. Quare illic Burungi, vel Berungi scribendum esse vox turungi abunde docet, quæ immutatione vnius literæ deprauata fuit a librario imperito, cui facilis a Bin Tlapius fuit, adeo ut pro Burungi seu Berungi in huius Antidoti compositionem nō sit substituendum nisi Melissophyllum, idq; ob causas paulo ante expositas. Ut Matthioli cauillationes merito risu & cachinno explodi mereantur. Sed videamus nunc quæ sit de Burungi Matthioli sententia. Putat pro Burungi, legendum esse Durangi, quæ vox Mauritanis Doronicum denotat. Sed qua ratione id probabit Matthiolus? quum constet Damascenum in aliis suis compositionibus, verbi gratia, Diambareos & Diamposci, nunquam Durangi, sed Doronici voce usum esse, ita ut hoc quoq; in loco Durangi vocem non usurpasse Damascenum sit manifestissimum. Quapropter per Berungi dictionem aliam a Doronico stirpem, nempe Melissophyllum, intellexisse illum omnibus constat. Et qua fronte Matthiolus audeat substituere Doronicum Auicennæ, quum illud hodie sit incognitum, ut primo nostrorum de Stirpium historia commentariorum tomo monstrauiimus. Quod enim in officinis prostat, non est legitimum, sed dulcichini genus, adeoque eos effectus, quos Doronicum Mauritanorum, præstare non potest. Vides igitur optime Lector, quam se nunc ridendum omnibus propinet Matthiolus, & quod merito dum aliorum bene & recte dicta cauillatur, suos, & eos quidem minime leues, errores prodat.

2 Post sex menses.) Vbi scilicet vis Anacardiorum feruendo nonnihil exspirauit & fracta est.

Lithontribon. 1 Nicolai. V.

Antidotus lapidem atterens ideo dicta est, quod lapidem tum renum, tum vesicae, magna ^{Aldov re} ^{Cur.} efficacia constringit. Stranguriæ & difficultati vrinæ sine mora succurrit. Accipit ^{Dessenni} ^{us non si} ^{ne riu e} ^{ruditorū} ^{Lithon} ^{Tribon. 1} ^{nomina} piperis longi, zingiberis, xilobalsami, acori, cinamomi, radicis peucedani, mei, piperis nigri, * piperis albi, piperis longi, saxifragi, ana drach. duas, & dimidiam. Opobalsami, caryophyllorum, costi, rhei pontici, glycyrrhizæ, cyperi, tragacanthæ, chamædrys, seminis apij, ammeos, asparagi, ocimi, uretice, citrei mæli, hypofselini, ana drachmam unam, grana quindecim. Folij, crocei, florum iuncti odorati, casie lignæ, bdellij, mastiches, mily folij, petroselinij seminum, seselios, sinonis, cardamomi, anethi, euphorbij, lapidis lycis, olei nardini, olei moschati, ana scrupulum unum, grana quatuor. Mellis quod satis est. Datur pondere nucis Ponticæ.

ANNOTATIONES.

1 *Nicolai.*) Hæc Antidotus in Græco manuscripto codice Nicolai, quod sciam, non habetur: sed ex Latinis codicibus est descripta, ita ut certo non sciatur, num ad Nicolaum auctorem sit referenda nec ne. Mihi videtur a quodam ex multis Nicolai Antidotis, nempe 187. 188. & 190. esse composita & emendicata, & ob id ad atterendos calculos non est inutilis. Non est autem quod longiores annotationes desideret, quod omnia fere ex quibus constat, simplicia in superioribus sint explicata.

* *Piperis albi.*) Hic falso me accusat Franciscus Alexander, quod piper album omiserim, quum tamen expressis verbis eius meminerim. Sed est is homo plus æquo ad aliorum dicta caluminanda pronus, quod tamen subinde in Matthiolo reprehendit.

2 *Lapis lyncis.*) Vide quæ libro primo huius Operis de eo notauimus, & in sequenti mox Antidoto.

3 *Oleimofchati.*) Vide Sectionem de oleis.

4 *Scrupulum unum, grana quatuor.*) Reprehendit me & hoc loco Alexander Franciscus quod grana quatuor adicio, nullo profecto candore, quod ita ut scripsi, in Nicolai codice disertis verbis legatur. Optarem itaq; bonum hunc virum in reprehendendis aliis cautiorem fuisse.

Nephrocatharticum. Nicolai Myrepsici. VI.

Antidotus purgatoria renum, & calculosorum. Eadem potest, quæ prior. Recipit *lapidis lyncis*, drachmas duas, grana quindecim. *Croci*, *cnicus*, ana drachmam unam, grana quindecim. *Zingiberis*, *euphorbij*, *myrrhæ*, *thuris*, *lapidis in vesica suis sylvestris* reperti, cumini, *hyoscyami*, *carei Alexandrini*, *seminis citrei*, ana drach. unam, grana sex. *Spica nardi*, *floris iunci odorati*, *costi*, *pyrethri*, *casie lignæ*, *rhei pontici*, *marrubij*, *helenij*, *sampsuchi*, *pulegij*, *rosmarini*, *gentiana*, *saxifragi*, *gummi hedera*, *cyparissi*, *baccarum lauri*, *piperis albi & nigri*, *seminis ruta*, *granorum iuniperi*, ana drachmam dimidiam, grana quatuor. *Balsami*, *styracis calamita*, *sanguinis hircini*, *nasituri* *seminis*, *asari*, *acori*, *phu*, *mei*, *aristolochie longæ & rotundæ*, *betonica*, *filipendula*, *petroselinij*, *sinapi albi*, *seminis urtica*, ana scrupulos duos, & dimidium, grana duo, & dimidium, *Succi asparagi & rustici*, ana grana quindecim. *Mellus optimi*, quod satis est. *Parata cum decocto maly solis*, aut *saxifragi*, aut *artemisia*: datur pondere drachma unius, vsq; ad drachmas tres.

ANNOTATIONES.

Et si hæc Antidotus Nicolao *ὑδαγνὸν νεφρῶν* & *λιθιῶν*, aliis vero vnica dictione *νεφροκαθαρτικὸν* dicta; hæcenus in nullis, aut paucis saltem visitata fuerit officinis: tamen quia in omnibus Latinis Nicolai codicibus deprauata est; & in pellendis ac atterendis calculis miram efficaciam ostendit, & ob id digna est ut in Medicum usum reuocetur, hanc omittendam nobis esse non putavi. Atq; ut rectius illa a Pharmacopœis construi possit, eam quoq; annotationibus illustrabimus.

Lapis lyncis.
Succeda-
neū lapi-
dis lyncis
Belemnites.

1 *Lapis lyncis.*) Quum lapis lyncis officinarum non sit, nisi Phrygius Dioscoridi nominatus lapis, non debet ad præsentis Antidoti constructionem adhiberi, quod nullam in atterendis calculis vim habeat. Pro eo autem utendum erit Lyncurio Dioscoridis & aliorum Græcorum, quod non est nisi succinum: vel, ut hodie vocant officinæ, Charabe. Nam illud mirificam in atterendo calculo vim obtinet, ut veteres testantur, & experientia recentiorum confirmat. Aut loco lapidis lyncis Belemnites vsurpandus erit, quem Saxones Alpschos nominant. Siquidem & is non aliter ac Iudaicus lapis, quo etiam vice lapidis lyncis uti licebit, lapidem frangit. Tantum cauendum, ne vulgarem, & visitatum officinis lapidem lyncis in eum usum accomodemus.

Cnicus.
Lapis vesicæ apri.
Succeda-
neum.

2 *Cnicus.*) Cnicus in omnibus Latinis codicibus desideratur. Latinis cartamus dicitur.

Latini Nicolai codices deprauati.
Careum Alexandrinum.

3 *Lapis in vesica suis sylvestris.*) Periphrasis est apri. Nam lapis vesicæ apri, si haberi potest, ad confectionem huius Antidoti adhiberi debet, quod illi latens quædam & innata insit conterendi calculum proprietas. Quod si consequi illum non liceat, pro eo accipiat lapis, qui ab ægris hominibus per lotium eiectus est. Nam habet is quoque, Actio libro vndecimo capite decimo auctore, similem quam lapis vesicæ apri facultatem, proprietatemque. Aut loco eius Iudaicus vsurpetur lapis, & pro lyncis lapide succinum. Sunt autem hoc in loco Latini Nicolai codices mirifice deprauati. Legunt enim, *Vesicæ apri*, lapidis in hepate vel vesica porci inuenti: quum neque vesicæ, neq; hepatis, in Græco Nicolai codice mentio fiat.

Gummi hedera.

4 *Carei Alexandrini.*) Græce *καρίον ἀλεξανδρινόν*. Quapropter falso in omnibus Latinis exemplaribus legitur, Macedonici seminis. Careum autem, vel Carum omne vrinas ciendi facultatem obtinere, Dioscorides, Galenus & alii Græci testatum reliquerunt. Delegit autem Alexandrinum tanquam patrium, & quod facile haberi potuit, Nicolaus.

Sanguis hircinus.

5 *Gummi hedera.*) Græce est *κίονον χυλόν* id est, succi hedera. Sic vocat, quam alii potius *δάκρυον*, id est, lacrymam appellant.

6 *Sanguinis hirci.*) Nicolaus Græcus habet, *ἀμαλὸν ἀγρίου ὄβρι*: sanguinis sylvestris suis, id est apri. Verum quum omnia Latina exemplaria hircinum potius sanguinem memorent, & is sanguis ad nephriticos & calculosos, Actio libro paulo ante citato capite 12. & Nicolao ipso Antidoto 54. testibus, præsentissimum remedium sit, hunc potius quam apri sanguinem huic Antidoto inferendum esse putamus.

A 7 *Nasturtii seminis.*) Hic manuscriptus Nicolai Græcus codex, quem semper sub Græci nomine Nasturtii inaudiendum esse volumus, mendos. legit, *καρδαμῶνος σπέρμα*, id est, cardamomi seminis: pro *καρδαμῶν*, hoc est, nasturtii. Nam legendum esse nasturtii, e Latino codice omnibus fit manifestissimum: in quo adhuc remansit vox decurtata Sturtii, quam deinde librarii imperiti in Struthii mutarunt, non ammaduercentes na syllabam deesse, qua adiecta, Nasturtii vox nascitur. Deinde si *καρδαμῶν* scribendum fuisset, Nicolaus *σπέρμα* vocem non adiecisset: quandoquidem illi, ut ceteris etiam, solenne & familiare sit, *καρδαμῶν* simpliciter, & citra adiectionem efferre. Quibus & hoc accedit, quod librario manuscripti codicis Græci Nicolai is error consuetus fuerit, ut *καρδαμῶν* pro *καρδαμῶν* scriberet.

Nasturtii
Nicolai
codex
macula-
tus.

8 *Filipendula.*) Latini codices habent Fisiadias, dictionem plane corruptam, & a nullo hactenus intellectam. Quare hæc haud dubie occasionem multis dedit, ut hanc Antidotum construere, & in officinis venalem habere neglexerint. Est autem diserte in Nicolai codice *φιλίπενδύλα*, id est, filipendula; Quam etiam herbam constat in frangendo calculo, & vrinæ stillicidio sanando efficacem esse.

Filipendula

9 *Rusci.*) Officina, literæ vnius adiectione; Brusci appellant.

Rusci.

Quum itaque iam nostra opera legitimam Nephrocatactices medicamenti compositionem habeant Pharmacopœi, debent in hanc incumbere curam, ut illam in suis officinis paratam deinceps inueniant Medici.

Electuarium Analepticon. Nicolai Myrepsici. VII.

Antidotus recreans & restituens vires, valet ad cardiacos, animi defectionem, syncopen, & exsolutionem e diarrhœa, aut sanguinis excretionem, aut alia vacatione nativum calorem dissipante natam. Item ad liquationem carnis, tussientes, suppuratos, & faucium e destillatione ortam asperitatem. Capit cinamomi seminis ocymi, foliorum sampsychi, maceris, caryophylli, carnis maiorum citriorum, melissophylli, silymbrii, ana drach. duas. Sefeliis, drachmam unam, & dimidiam.

C Hermodactyli albi & rubri, folij, ana drach. quatuor. Floris rosmarini, drach. tres. Ossa cordis cervini, numero quatuor. Berberis, drachmas duas. Mastiches, rosarum, violarum, & borraginis florum, ana drach. unam, & dimidiam. Succus chamæleuces, vnc. tres. Libystici scrup. unum. Gallia moschata, drach. un. Glycyrrhizæ, drach. tres. Cubebarum, drach. duas. Pastillorum de rosis, & violis, a. drach. un. & dimid. Ligni aloes crudi, nucis moschata, zingiberis, a. drach. un. & dimid. Moschi, grana sex. Cinamomi boni, drach. duas, & dimid. Nucis Indica magnæ carnis, vnc. dimidia. Spica, drach. unam, & dimidiam. Saphiri lapidis, gagatis, iaspidis, & smaragdi, ana scrupul. dimidium. Croci scrup. unum. Margaritarum perforatarum, & non perforatarum, ana grana quatuor. Xylbalsami, drach. tres. Blatii byzantiis, grana octo. Ramenti eboris, serici vsti, ana drach. unam. Syracis calamita, drach. duas, & dimidiam, grana duo. Seminis portulacæ, drachm. unam, & dimidiam.

D Seminum cucumerum, vnc. unam, & dimidiam. Corallij rubri, iridis, ana drach. tres, scrup. unum. Auri puri ramentum, drach. duas. Noces ponticas, numero decem. Amyli, drach. tres. Amygdalarum amararum & dulcium, ana numero viginti. Carnis palmularum, vnc. unam, & dimid. Marrubij, drach. duas. Fabarum farina pura, vnc. unam, & dimidiam. Carnis seminis gossipy, vnc. dimid. Seminis malvæ & florum, ana vnc. dimid. Seminis urtica, vnc. dimid. Pinearum recentium, vnc. duas. Hyssopi cretici, drach. tres. Penidiorum bonorum, lb. dimid. Sacchari candidi, vnc. tres. Contusis omnibus simul, adijce gummi Arabici, drach. duas, scrup. duos. Tragacantha, vnc. dimid. Commixta omnia simul, & trita, decoquantur cum stillatio rosarum liquore, quod satis est ad electuarij consistentiam: & reconde in vase.

ANNOTATIONES.

E Hoc Electuarij merito *αναληπτικόν* Græce nominatur. Nam fractas & lapsas iam vires mirifice recreat ac restituit. Hinc est, quod ipsum Nicolaus veluti expertum laudet. Valerius Cordus in suo medicamentario libro, Electuarij cuiusdā, quod ille Resumptivum Nicolai appellat, descriptionē affert: quod integrum non est, sed ex præsentī Antidoto decerptum. Præstat itaq; hoc nostro vti, maxime in his qui abundant, quod omnia in se contineat medicamenta, quæ ad instaurandas vires adhiberi possunt. Ut aut illi qui mediocris fortunæ sunt, huius quoque antidoti viribus frui possint, prudenter fecerint Pharmacopœi, si bifariam hanc confecerint. Vnam cum auro, & alteram sine auro. Aut potest prorsus in eius confectioe omitti aurum, quod nihilo fere deterius sit futura compositio.

Αναληπτικόν
Cordus.

1 *Chamæleuces.*) Per Chamæleucen hic intelligit herbam, quæ Græcis *βίχχορ*, Latinis Tusilago, vulgo & officinis Vngula caballina dicitur. Nam hæc tussis adiuvat: adeoq; huic Antidoto, quæ tussienti- bus succurrit, convenientissima est.

Chamæ-
leuce.

2 *Pastillorum de rosis & violis.*) Quorum descriptiones ex Sectione de pastillis petendæ.

Vngula ca-
ballina.

3 *Ligni aloes crudi.*) Sic vocat, quod non est sub terra conditum, & nondum computruit, sed quod statim ab arbore excisum, in usum venit, ut lib. i. huius Operis ostensum est.

Pastilli de
rosis &
violis.

4 *Gagatis.*) non est nisi succinum, vel ut Seplastia loquuntur, charabe nigrum, ut loco iam citato diximus.

Lignū ale-
es erudū.

5 *Auri.*) Hoc certe ut ab omnibus comparari possit, & ne nimis sumtuosa sit Antidotus, omittere licebit Pharmacopœis, quod neq; vulgati Resumptivæ vocato inscribitur aurum.

Gagates.

Aurum.

- Fabrum farina.** 6 *Fabrum farina.*) In manuscripto Nicolai codice legitur, *φασάρον ἀλέγειν φάρμακον*: ut vix sciri queat quid *φασάρον* voce intelligat Nicolaus. Ego vero *φασάρον* legendum esse censeo, ut sit Latina vox Fabarum. Nam quum Faba, Galeno attestante, excreationibus ex thorace & pulmone idonea maxime sit, huic Antidoto quadret necesse est.
- Gossipii Bombax.** 7 *Gossipii.*) Gossipium Nicolaus Bombacium vocat, quod nomen hodie etiam durat, sed nonnihil immutatum. Nam Bombasum & Bombacem officinae nominant. Sed de ea re satis libro primo, & alibi dictum est.

Dia *Acorn.* Nicolai Myrepsici. IIX.

Climax. **A**ntidotus ex acoro conferens *nephriticis, iocinorosis, obstructionibus, nervorum imbecillitatibus, & distentioni, ac rassis humoribus nata.* Habet ¹ acori, drachm. quinq. Pyrethri, vnciam dimidiam. Zingiberis, caryophylli, galangæ, ana drachmas tres. Piperis longi, drachmas duas. Croci, maceris, ana drachmam vnam. *Απὸ σπέρματος, ana drachm. dimidiam.* *Μελλίς ὀπίμης* despumati, quod sufficere videtur. Datur vncia dimidia.

ANNOTATIONES.

Diacorus. Hec ex Acoro antidotus, quæ Diacorus more balbutientium officinarum vocari potest, hæcenus vsitata non fuit: sed nunc in vsum reuocari debet, quum optime sit à Nicolao ad Climacum rationem constructa, & ex facile parabilibus omnibusq; notis simplicibus medicamentis concinnata. Et conformis plane est Mesue diacoro, quam mox subiiciemus, præsertim si adiciantur nuces pineæ pondere vnciarum duarum, quod in altera ex acoro Antidoto faciendum esse suadet Nicolaus; idq; post sufficientem decoctionem. Erit magis efficax Antidotus, si ad prædicta omnia adiciantur radices costi, & præoniæ, ana drachmæ duæ. Atq; erit hæc Acori compositio præferenda ei, quam Mesues habet.

Acorus. 1 *Acori.*) Sumendus est autem, ut iterum moneamus, Acorus Indicus iam notus, qui Galanga maior dicitur, non nostras palustris. Is enim ad eum vsum damandus est, atq; abiiciendus, quod omnino inutilis sit ad nervorum & cerebri frigidis morbos. Non debent igitur eius vsu perdere ægros Medici, & in sumtus non necessarios conuicere, antea satis miseros.

Diacoru. ¹ Ioannis Damasceni. IX.

Diacorus, mirum in modum ad omnia nervorum vitia frigida confert, uti præcedens. Recipit ² *secacul. pinearum repurgatarum, radices acori, ana lib. vnam, & dimidiam.* *Secacul & acoris repurgata, & minutim concisa coquantur in aqua pura vsq; ad aqua consumptionem, postea tundantur, & terantur, donec pulvis consistentiam consequantur.* Deinde affunde illis mellis optimi despumati libr. decem, & leni igne coquito, quoad iustam consistentiam acquirant. Quo peracto ab igne deponantur, & adiciantur pineæ minutim concisæ, cum sequenti puluere; qui capit: Piperis vnciam vnam. Piperis longi, caryophyllorum, ³ zingiberis, macis, ana vnciam dimidiam. Nucis moschatæ, galangæ, cardamomi, ana drachm. tres. Omnia simul comixta & vnita diligenter subigantur, & in Electuarii formam redigantur. Datur ut præcedens.

ANNOTATIONES.

1 *Ioannis &c.*) Non quidem in suo de Antidotis seu medicamentario libro, nam illic eius compositionis nulla fit mentio: sed in sua, ut vocant, praxi, capite de Morbis nervorum. Ibi namq; hanc Antidotum, quam Diacorum appellant, describit.

Secacul. 2 *Secacul.*) Hanc vocem, quæ Arabes crebro vsi sunt, recentiores varie interpretantur. Sunt enim qui Eryngium esse existimant, alii sigillum Salomonis, quidam sigillum sanctæ Mariæ, siue Fraxinellam. Sed in vniuersum omnes errant. Quippe Secacul Mauritanis Indica est radix, quæ hodie ad nos non amplius affertur, adcoq; incognita. Quapropter ut quod sit illius succedaneum, cognoscamus oportet. Non est autem aliud, quam Sisari, siue Siferis, satui præsertim, quæ Germanis Geirui, officinis Mesuen sequentibus Baucia nominatur, radix. Quod in primis confirmat Mesues, qui in Sectione de conditis, radicem Bauciae, eandem cum Secacul esse scribit. Accedit, quod Sisari radix cocta stomacho utilis sit, vrinam & Venerem cit, cordique conualescentiam conducit, omniaq; ea quæ Secacul potest. Quapropter reprehensione dignus est Bernardus Dessennius, qui liberum permittit Pharmacopœis, ut deligant vtram radicem, Eryngii scilicet aut Polygonati velint pro Secacul, quum neutra sit radix, ut alibi fusius ostendimus.

Cordi cor. 3 *Zingiberis.*) Post Zingiber Cordus subiicit rosas, sed minus recte. Siquidem earum neq; Mesues, neq; Nicolaus Antidoto ex acoro mentionem faciunt. Præterea illarum in hac compositione nullus esse vsus potest: quod minime, ut reliqua, calefaciant, sed refrigerent potius.

DE ANTIDOTIS ROBVR CORPORI ADIICENTIBUS, solidis. Sectio IV.

Dia Rhodon Abbatis. Nicolai Myrepsici. I.

Antidotus erosus ¹ Abbatis, id est, *præsidis collegij*: valet aduersus ventriculi calorem, potissimum vero icteris, lienis, pulmonisq; & in vniuersum contra omnem corporis noxam, & calorem

A calore ortam. Efficacissima præterea ad febres acutas, ardentessq. Cardiacis & celiacis plurimum auxiliatur: item defectionibus animæ cordenatis. Accipit santali albi & rubei, ana drach. duas, & dimidiam. Tragacantha, gummi arabici, & spodij, ana scrup. duos. Asari, mastiches, spica Indica, cardamomi, croci, ligni aloes, caryophylli, gallia moschata, anisi, fœniculi, cinamomi, succi glycyrrhizæ, rhei barbari, seminis ocimi, berberis, seminis intybi & portulacæ, seminum peponis, cucumeris, cucurbitæ, citruli, ana scrup. unum. Margaritarum, ossis cordis, ceruini, ana scrup. dimid. Rosarum, sacchari candi, ana unciam unam, drach. tres. Corallij, crystalli seminis lactucæ, papaue- ris albi, mandragoræ, ana scrup. unum. Nymphææ, vel Semperuini florum, scrup. duos. Moschi, granatriæ & dimidium. Sacchari dissoluti in stillatitio rosarum liquore, quantum satis est.

ANNOTATIONES.

B 1 *Abbatis, id est, præsedis collegij.* Ex hac Nicolai interpretatione, ut ne id quidem silentio transca-
mus, palam apparet, Monasteria olim non fuisse nisi monastica Collegia, siue Scholas, in quibus reiecta
seculi cura, doctrinæ, moribus, pietati, pudicitiz, & continentiz vacabant: adeoq; veluti seminaria ordi-
nis Ecclesiastici fuerunt. Siquidem in monasteriis educati, illinc ad Episcopale munus vocati sunt. Atq;
vilitatum fuit, ut ecclesiæ Christi clericos ac ministros cœnobiaz suppeditarent. Nostratia contra, non
sunt nisi cœtus otiosorum & ignauorum, imo sceleratorum hominum. Nam illic non aliter ac porci in
hæris saginantur, nec ullus hominum ordo magis omni vitiorum turpitudine inquinatus est, omnique
obscenitate scatet. Quid multa? edunt, bibunt, ludunt, scortantur, adulteria & idolomanias exercent,
nec ulli profunt: ut mirum sit, Christianos principes hæc lupanaria æquo animo, & bona conscientia fer-
re posse. Illinc enim non nisi Satanz ministros prodire, atq; ali pro dolor constat. Porro ne id silentio
inuoluam, notat me hoc loco Franciscus Alexander, quasi veterum oblitus, nouissima quæq; tantum a-
mem, & admirer. Quam falso autem me hoc nomine accuset, norunt omnes, ut qui perpetuo ad fontes
reuocare Medicos studeam. Atq; in hac compositione ad Nicolaum, tanquam ad eius auctorem, om-
nes reuoco, Mesues compositione neglecta, & nostratibus officinis inusitata.

Monas-
teria quæ o-
lim.

Nostratia
qualia.

C 2 *Spodij.* Per spodium autem non intelligendum nisi officinarum, hoc est, ebur vsum. Id enim
adstringit, adeoq; huic Antidoto conueniens est.

3 *Rhei barbari.* Per rheum barbarum hic non intelligendum erit id, quod hodie ita vocant offici-
na, sed potius rheum Ponticum. Nam Nicolaus hoc in loco, ut multis aliis, vulgi errorem, qui e Mesue
placitis emanauit, secutus, Rheum barbarum cum Pontico confudit. Quapropter Pharmacopœi in
construenda hac Antidoto, Rheo pontico, aut in eius penuria, Centaurii magni radice, quam ipsi etiam
Rheum ponticum vocant, uti debent. Nam id hepaticos mirifice iuuat: & ad febrium circuitus, omnes-
que phlegmones, Dioscoride teste, vtile est. Quare non, ut aliqui putant, expungendum, quod id quod
soluendi alium vim habet, huic compositioni inferendum non sit.

Rheum bar-
barum.

D * *Berberis.* Nicolaus hanc dictionem βέρβερος, suo haud dubie tempore vsitatam, retinuit. Hac ve-
ro voce Arabes eam stirpem, quam Græci βέρβερων nominant intellexerunt, non fruticem illum qui
hodie Berberis vocatur. Oxyacantham vero altero nostrorum de Sturpium commentariorum tomo de-
scripsimus. Quum autem utraq; Berberis eadem facultate prædita sit, in alterius inopia, altera uti licet.

3 *Corallij.* Quatuor hic in Latinis codicibus desiderantur simplicia, nempe Corallium, crystallus,
semen lactucæ, & mandragoræ: quæ, quum ad calorem frangendum ac minuendum sint efficacia, potis-
simum lactucæ semen & mandragoræ radix, non sunt vlla ratione omittenda. Refrigerat autem & Co-
rallium mediocriter. Quapropter nihil mirum fuit nonnullis qui compositionis rationem non satis
tenuerunt, parum fuisse hanc compositionem probatam, præsertim ad calidos affectus. Perturbauit e-
nim dubio procul eosdem, quod hic calida, ut sunt crocus, lignum aloes, caryophylli, ocimum, & id ge-
nus alia, frigidis commixta sunt. Verum illi non animaduertunt hæc esse ideo admixta, ut iis qui cordis
syncope laborant hæc Antidotus quoq; conferat. Desseñnius itaq; non sine errore, hæc in suo medica-
mentario libro omisit. Quapropter iis febribus, quibus syncope maxime coniuncta est, competit.

Omissa in
hac Anti-
doto.

Nymphææ florum. Nicolaus habet, Caphuræ grana septem. Secutus est vero & hic Nicolaus com-
munem multis, præsertim Mauritanis, errorem, qui Caphuram, vel ut ipsi loquuntur Camphoram, refrige-
randi vim habere putant, quum potius calefaciendi facultate prædita sit: ut alibi copiosissime demonstra-
uimus, ita ut hic repetere non sit necesse. Quum itaq; Caphura, quæ bituminis genus est, calefaciat, non
debet huic Antidoto misceri. Non enim quod nonnulli putant, ut sua tenuitate medicamenta frigida
penetrare faciat: sed quod refrigerare credita sit, a Nicolao indita est. Pro ea igitur Nymphææ, vel ut offi-
cinæ nominant, Nenupharis flores, qui non segniter refrigerant, substituiimus. Poterit autem pro ea e-
tiam Semperuini succus subiici, quem itidem refrigerare, & modice desiccare constat.

Nym-
phæa.
Libr. 9.
Simpl.

Desseñni-
us nota-
tus.

Dia Trion Santalon. Nicolai Myrepsij. sect. i. cap. 213. II.

F Antidotus et tribus santalis, ad ventriculi & iccoris calorem vtilis est. Præterea mi-
rum in modum tabidis, & regio morbo correptis auxiliatur. Recipit trium santalo-
rum, rosarum, ana drach. duas, scrup. duos. Rhei barbari, & spodij, succi glycyrrhizæ, seminis poru-
lacæ, ana drach. duas. Amyli, gummi Arabici, tragacanthæ, seminum peponis, cucumeris, cucurbitæ,
citruli, & intybi, ana drach. unam, scrup. unum. Nymphææ florum, scrup. duos. Violarum, unc.
dimidiam. Rosarum, quantum omnium aliarum specierum. Sacchari albissimi, quod satis est.

ANNOTATIONES.

Rheum barbarū. *Rhei barbari.*) Et hoc loco accipiendum a Pharmacopœis, propter causam in præcedenti Antidoto expositam, rheum Ponticum vocatum.

β Spodiu.) Et hic per Spodium, ut in omnibus aliis fere compositionibus, ebur vltimum intelligendum est. Quod hic semel monuisse satis sit.

2 Nymphaea florum.) Habet & hic Nicolaus, Caphuræ scrup. vnum. Nos autem substituimus, Nenupharem, propter rationem loco iam ostenso prolatam. Licebit autem pro ea succum Sedi maioris substituere. Hoc ut toties moneam, me quorundam sycophantarum cogit improbitas, qui nisi passim consilii mei rationem indicem, singula in pessimam interpretantur partem, & caluminose traducunt. Qui vero ob tenuitatem substituisse me dicunt flores Nymphaeæ, non ob refrigerationem, iniuriam raihi faciunt, quod id non somniarim vaquam.

3 Violarum.) In Latinis codicibus desiderantur.

4 Rosarum, quantum omnium aliarum specierum.) Græce ῥόδων, ἕως τῆς ἑξήκοντα. Omiserant in prior editione hæc verba, quod antea facta esset rosarum mentio. Verum quum disertis verbis, harum in Græco Nicolai codice mentio fiat, & hæc rosarum quantitas Antidoti vires augeat, melius est ut omisso rosarum duabus drachmis, postremo vserpemus.

Dia Tragacantes¹ Frigida. Nicolai Myrepsici. sect. 1. cap. 98. III.

Antidotus e tragacantha frigida, utilis ad thoracis gravitatem, tussientes, pleuriticos, peripneumonicos, lienosos, & ad sitim immodicam a plurimo pulmonis calore ortam, in ore fetentem, ac sensim dissoluta. Admodum etiam laudatur ad raucitatem vocis. Prodest tabidis, macieq; confectis. Caput tragacantha alba uncias duas. Gummi arabici, unc. unam, drach. duas. Amyli, unc. dimid. am. Glycyrrhizæ, drach. duas. Penidiorum, unc. tres. Seminis peponis, cucumeris, cucurbitæ, & citruli, ana drachm. duas.² Seminis urticae, papaveris albi, ana drach. tres.³ Florum nymphaeæ, scrupulum vnum. Sacchari, quantum satis videbitur.

ANNOTATIONES.

Frigida. *1 Frigida.*) Ad sequentis differentiam, quæ calida dicitur: adeoq; ad contrarios frigidæ affectus, perinde ut præsens ad calidos, adhibetur.

2 Seminis urticae) Semina urticae & papaveris albi in Latinis codicibus desiderantur. Nequaquam autem omittendum urticae semen, utpote quod educationi humorum ex thorace, adeoq; pleuritidi, & peripneumoniæ, plurimum conducit. Teuantis enim sine calore facultatis est, quo nomine lentos & crassos humores e pulmone educit.

3 Florum nymphaeæ.) Nicolaus habet, Caphuræ scrup. dimidium. Nos duplicato pondere, ut in præcedentibus quoq; fecimus, Nenupharis flores pro Caphuræ substituimus. Possunt etiam flores violarum, pro Caphura substitui succus Sempervivi.

Dia Tragacanthæ calida. Nicolai Myrepsici. sect. 1. cap. 99. IV.

Antidotus e tragacantha frigidis affectibus thoracis, asthmaticis, & difficulter excreantibus confert. Habet tragacantha, * libram dimid. Hyssopi, unc. dimid. Foeniculi, drach. dimid. Amygdalarum ambarum, nucum pinearum repurgatarum, ana unc. dimid. Cinamomi, unc. una.¹ Seminis lini, Zingiberis, glycyrrhizæ, & succi eiusdem, cubebæ, ana unc. dimidiam. Sacchari, quod satis est.

ANNOTATIONES.

Cordus. Hæc descriptio a vulgari, & ea quæ in Cordi medicamentario libro habetur, non nisi ponderum ratione differt. Nos Græci codicis fidem secuti sumus, quam plaris fecimus quam Latinorum codicum consensum.

* *Libram dimidiam.*) Græce Scio Franciscum Alexandrum reprehendere, quod non recte libras quinque, pro dimidia legatur, quum tamen ego converterim libram dimid. & nequaquam libras quinque. Sibi igitur is error potius imputandus erit, ut q. notamus. quæ dimid. denotat, pro quinque legit & interpretatus est. Quare non temere factum est, ut notis iis cietis, pondera integris dictionibus scribere voluerim.

Linifemine. *1 Seminis lini.*) Græcus codex habet ἀμύλου, amyli. Mihi igitur, ita monentibus Latinis codicibus, videtur ἀμύλου legendum esse. Siquidem lini semen virtus thoracis medeatur tussimq; , Dioscoride teste, leniat. Et fuit facilis ab una in aliam dictionem lapsus. Accedit quod amylo contra fluctiones utile sit, & sanguinis reiectiones, adeoq; sputa cohibeat, in frigidis thoracis affectibus, & asthmaticis non conveniat. Quare non est cur miretur Franciscus Alexander, quod lini semine, contra Græci codicis, qui legit ἀμύλου, fidem, pro amylo substituerim.

Dia Penidion. Nicolai Myrepsici. sect. 1. cap. 97. V.

Valeat tussibus.¹ pleuriticis, peripneumonicis, asperitati faucium, raucitati, voci amissa, & raucæ. Accipit nucum pinearum, amygdalarum, seminis papaveris albi, singulorum drach. duas. scrup. vnum. Cinamomi, caryophyllorum, succi glycyrrhizæ, tragacanthæ, Zingiberis, gummi arabici, amyli, seminis peponis, cucumeris, cucurbitæ, & citruli, singulorum drach. unam.² Caphura, scrup. vnum. Serapy violati quod satis est. Dein affunde aquæ libram unam, violarum drach. tres, atq; hæc ad ter-

A tias decoque, perq, saccum colato. Decoctum hoc accipe, & in id conycito sacchari libram unam, aut quantum satis erit. Posthac species omnes prædictas probe tritas impone, & cum ipsis penidiorum drach. sex, & dimid. atq; bene subactas coniice in mortarium, & probe contunde donec solidescant, deinde a mortario auferens impone vasculo, & cum stillatio liquore exhibe.

ANNOTATIONES.

¹ Pleuriticis & peripneumonicis.) Non quidem in principio, sed postquam phlegmone rupta est.

² Caphura.) Quam Nicolaus, ut iam aliquoties monui, communem aliorum Medicorum errorem sequutus, caphuram frigidam esse opinatus sit, & hoc loco e contextu remouenda erit, & pro ea substitutiendi flores nymphae.

B ³ Donec solidescant.) Vnde satis patet, Nicolaum in formam ecligmatis hanc compositionem redigisse, contra morem nostri temporis Medicorum, qui ex ea tabulas coniiciunt. Possunt Pharmacopœi hanc utroq; modo componere, & reconditam in suis officinis habere. Sunt enim ex eruditis qui hanc antidotum ei quæ mox sequitur, tanquam ex fonte petitam anteferunt.

Dia Penidion. Nicolai Præpositi. VI.

A ntidotus e penidiis valet ad omne vitium pulmonis, rufficulosis asperitati faucium, rancitati, ex siccitate orta, voci amissa, tabidis deniq, & purulentis. Accipit¹ penidiorum, ² unc. duas. Nucum pinearum, amygdalarum, repurgatarum, seminis papaveris albi, ana³ drach. tres, scr. unum. Cinamomi, caryophyllorum, succi glycyrrhizæ, tragacanthæ, zingiberis gummi Arabici, amyli, seminum⁴ peponis, cucumeris, cucurbitæ, citruli, ana⁵ drachm. unam, & dimidiam. Florum nymphae, ⁶ scrupulum unum. Sacchari albissimi, quod satis est.

ANNOTATIONES.

Hæc Antidotus ei qui est in Græco Nicolao non prorsus respondet, quod scilicet ad ponderum rationem, & conficiendi modum attinet. In ponderibus enim Latinos codices, & Actuarius magis secuti sumus: in conficiendi modo, usitatam rationem, quæ in aliis solidis observatur. Notat tamen me hoc loco iterum Franciscus Alexander, quod pondera & simplicia toties augendo & minuendo immutem, nec animaduertit, quod eius mutationis semper causas adiiciam. Parum præterea memor, quod & ipse hanc Actuarii compositionem aliquot simplicibus ex Myrepso augeat. Quare perperam in me reprehendit, quod metipse aliquoties facit. O detestabilem reprehendendi temere alios libidinem!

D ¹ Penidiorum.) Modum autem parandorum penidiorum infra in sectione decima octaua indicabimus.

² Uncias duas.) Sic haud dubie legendum erit, ut liquet ex Actuario qui habet drachmas sedecim, quæ libras duas constituunt.

³ Drachmæ tres &c.) Scribunt alii drachmas duas & scrupulum.

⁴ Peponis.) Ita passim habet Nicolaus Græcus, ubi Latini codices legunt Melonis. Nihil autem refert, utrum ex iis seminibus ad conficienda medicamenta usurpes, quum eiusdem plane sint facultatis. ⁵ Semen peponis. Quod semel hic monuisse sufficiat.

⁵ Drachma una, & dimidia.) Legendum ex Myrepso drachma una, ut ex eiusdem descriptione, quam mox subiiciemus patebit.

⁶ Scrupulum unum.) Recte ita legitur, quum in præposito perperam tantum grana septem, vel tertii scrupuli pars habeatur.

E

Manus Christi. Recentiorum inuentum. VII.

A ntidotus manus Christi dicta, deiectis viribus medetur, ardentibus febribus, & id genus alijs affectibus. Caput sacchari claresacti, libram unam. Aqua rosacea, libram dimidiam. Concoquantur, dum rosacea aqua igni euanescat, & saccharum iustam crassitiem consequatur: tandem agitentur & adiciatur margaritarum minutissime tritarum, ² uncia dimidia, & mariori aqua rosacea consperso infundatur: fiantq, orbiculi, seu, ut hodie vocant, rotula.

ANNOTATIO.

F ¹ Manus Christi hæc Antidotus, perinde atq; ea quæ est apud Nicolaum ordine 467, *χρῆμα χριστι*: id est, Manus Christi nus accedat, data ægrotantibus succurrat. Conficitur autem bifariam, cum vnionibus, seu margaritis: & curdita sine illis. Prior conficiendi modus, hic est expressus: Alter nihil distat a priore, nisi quod non adiiciuntur margaritæ. Hinc est, quod officinæ priorem confectionem manum Christi perlatam nominent. ² Manus Christi perlatæ. Siquidem vniones ipsæ Perlas appellare consueverunt.

160 Operum Leonhardi Fuchsi Pars II.

² *Vncia dimidia.*) Sunt qui vnciam integram adiiciunt. Atq; ita quidem magis efficax, & sumtuosius redditur medicamentum. Sunt etiam qui vnciae vni sacchari, drachmam vnam vnionum addant.

Rosata nouella. Nicolai Myrepsici. numero 204. IIX.

Rosata nouella, efficax ad calorem stomachi, & ad iecoris, pulmonisq; siccitatem. Sitim restinguit, vomitum compescit, stomachi & cordis imbecillitati succurrit. Sudores dissoluentes discutientesue reprimis. Cardiacis, pulmonarijs, & ijs qui diutino morbo sunt extenuati, & in virium defectum inciunt, plurimum auxiliatur. Recipit rosarum viridium, glycyrrhizae, ana vnciam vnam, scrupulos duos, & dimidium. Cinamomi, drachmas duas, scrupulos duos, grana duo. Caryophylli, spica galanga, zingiberis, nucis moschatae, Zedoariae, styracis, cardamomi, seminis apij, ana scr. vnum, grana octo. Sacchari albiissimi, vel mellis attici, quod satis est.

ANNOTATIO.

Quum multa calida huius antidoti compositionem constituent, merito ob id in magnis stomachi ardoribus suspecta fuerit. Praestat itaq; hanc non per se in calidis vitiiis, sed cum Serapio violarum aut rosarum, aut decocto hordei, vel prunorum propinare.

¹ *Grana duo.*) Notat me hoc loco Franciscus Alexander quasi ipse praeter Myrepsi sententiam hoc pondus adiecerim, quum in eo diserte legatur *αυτῶν ὀξυς β.* Sed hoc est solemne Francisco, vt Matthiolum calumniando sequatur, & mihi affingat errores, vbi nulli sunt.

Aromatica rosata Gabrielis, ex Ioanne Damasceno. IX.

Antidotus aromatica rosata Gabrielis, cerebrum, cor, ventriculum, & omnia nutritioni famulancia membra roborat, appetentiam excitat, concoctionem iuuat, viscerum excrementosam humiditatem absumit, imbecillitatem firmat, ac ex morbo conualescentibus auxiliatur. Accipit rosarum rubrarum, drach. quindecim. Glycyrrhizae, drach. septem. Ligni aloes, santali flauo, drach. tres. Cinamomi, drach. quinque. Macis, caryophyllorum, ana drach. duas, & dimidiam, gummi Arabici, tragacanthae, ana drach. duas, scrupulos duos, Nucis moschatae, cardamomi, galanga, ana drach. vnam. Spica nardi, drach. duas. Ambrae cinerinae, scrup. duos. Moschi, scrup. vnum. Sacchari quantum satis erit, dissoluti in stillatitio rosarum liquore.

ANNOTATIO.

Non me latet esse, qui hoc loco Electuarium de aromatibus siue aromatum Galeni proferant. Verum quum falso Galeno adscriptum sit, utpote quod e multis simplicibus illi ignotis constructum, & nostratibus officinis inusitatum sit, studio id omisimus.

Aromatica caryophyllata, Ioannis Damasceni. X.

Aromatica caryophyllata, cor, ventriculum, & reliqua nutritionis membra roborat, nausea & vomitum reprimis, flatus dissipat, putredinem humorum in ventriculo arcet. Recipit caryophyllorum, drachm. septem. Macis, Zedoariae, galanga, santali citrini, pastillorum de rosis, cinamomi, ligni aloes, spica nardi, piperis longi, cardamomi, ana drach. vnam. Rosarum, vnciam dimidiam. Glycyrrhizae, galliae moschatae, ana drachmas duas. Folijs, cubebe, ana scrup. duos. Ambrae, drach. vnam. Moschi, scrup. dimidium, Sacchari candidissimi, quod satis est.

Diambareos. Ioannis Damasceni. XI.

Antidotus Diambra vocata, cerebrum, cor, ventriculum, ac ventrem reliquum inferiorem calefacit & roborat, exhilarat, concoctionem iuuat, affectibus vterinis, & omnibus alijs frigidis prodest. Senibus ob id ac mulieribus salubre. Caput cinamomi, daronici, caryophyllorum, macis, nucis moschatae, folijs, galanga, ana drach. tres. Spica nardi, cardamomi maioris & minoris, ana drach. vnam. Zingiberis, drach. vnam, & dimidiam. Santali citrini, ligni aloes, piperis longi, ana drachmas duas. Ambrae, drach. vnam. Moschi, drach. dimidiam. Sacchari albiissimi, quantum sufficere potest.

ANNOTATIO.

¹ *Drachmam vnam.*) Hic me, non sine maxima iniuria, reprehendit Franciscus Alexander, quod vna cum Cordo legam drachmam vnam, quum constet omnia Ioannis Damasceni exemplaria habere aureum vnum, pro quo ipse etiam Franciscus drachmam subiecit. Nam nisi id fateatur, necesse est, vt Moschi non drachmam dimidiam, sed aureum dimidium adiiciat. Non esse autem nisi drachmam vnam, Ambrae huic compositioni inferendam, omnes Mesues codices testantur. Accedit, quod maiorem eius quantitatem neque Myrepsus probet, vt qui eius tantum scrupulos duos iniiciat. Sic perpetuo huic vitio obnoxius est Franciscus, quod ipse passim in Matthiolo damnat. Quod etiam scribit mihi fatale esse, vt vel addam, vel succidam, fatcor verum esse, modo omnes intelligant me id non facere temere: sed ita monentibus codicibus eorum auctorum, vnde compositiones illae desumuntur sunt: aut vt id faciam rationibus non levis momenti, quas semper adicio, me cogentibus. Quare potuisset hac reprehensione abstinere Franciscus, nisi reprehendendi alios temere libidine laboraret.

Diamoschu dulcis. Ioannis Damasceni. XII.

Diamoschu dulcis, ad frigidos cerebri affectus sine febre, melancholiam, & illi conuulsam tristi-

A tristitiam sine causa manifesta, vertiginem, epilepsiam, resolutionem, oris torturam, cordis palpitationem, pulmonis affectus, & spirandi difficultatem, conducit. Accipit croci, doronici, zedoaria, ligni aloes, macis, ana drachmas duas. Margaritarum¹ albarum, serici crudi vsti, charabe, corallj rubei, ana² drachmas duas, & dimidiam. Gallie moschata, ocimi citrati, ana³ drachmam unam, & dimidiam. Ben albi & rubei, folij, spica nardi, caryophyllorum, ana drachmam unam. Zingiberis, cubebe, piperis longi, ana drachmam unam, & dimidiam. Moschi, scrupulos duos. Sacchari candidissimi, quod satis est.

ANNOTATIONES.

B ¹ Albarum.) Ita potius quam Ambarum esse scribendum censeo: vt intelligat integras & non perforatas. Id quod ex Auicenna maxime patet, qui disertè habet Margaritarum non perforatarum. Integras autem præstantiores esse, iam antea dictum est. Sunt quoq; albæ meliores: quanto enim lucidiores, rotundiores, crassiores, & candidiores sunt, tanto certe efficaciores margaritæ.

² Ana drachmas duas, & dimidiam.) Secus vulgares filii Mesuz, codices legunt. Nos vero emendatiores secuti, hic & multis aliis in locis pondera variavimus: quod semel monuisse satis sit. Atque ita hoc loco scribendum esse, hinc maxime patet: quod nisi sic legamus, inutilis esset eiusdem ponderis repetitio.

³ Ana drachmam unam, & dimidiam.) Non ignoro & hoc ia loco in nonnullis codicibus Mesues secus legi. Quia vero in melioribus ac castigatioribus libris ita vt nos monuimus legitur, & quod alias nulla necessitate idem pondus repeteretur, ideo hanc lectionem tanquam veriore alteri prætulimus. Vt minime opus fuerit Francisci Alexandri monitione quasi ignorarem in quibusdam exemplaribus aliter legi.

Diamoschu amara. Ioannis Damasceni. XIII.

C Diamoschus amara, ad prædicta efficacior, & præterea ventriculi humores putres potentius absorbit. Habet prædicta omnia, quibus adiunguntur absinthij, rosarum, ana drachma tres. Aloes lotæ, uncia dimidia. Castorei, ligustici, ana drachmam unam. Cinamomi, drachma dua, & dimidia. Sacchari albissimi quantum sufficit.

Diagalanga. Ioannis Damasceni. XIV.

D iagalanga ventriculi & iccoris intemperiem frigidam sanat, ob id concoctionē inuat, ruētus acidus compefcit, & flatus crassos potenter dissipat, atq; ab eis natas inflationes. Oris halitum commendat, ac eiusdem fetorem gigni prohibet. Recipit galanga, ligni aloes, ana² drachm. sex. Caryophyllorum, macis, ligustici, ana drach. duas. Zingiberis, piperis longi, piperis albi, cinamomi, ana drachmam unam, & dimidiam. Calaminthæ³ sicca, menthæ sicca, cardamomi, spica nardi, seminis apij, feniculi, carui, anisi, ana drachmam unam. Calami aromatici, drach. unam, & dimidiam. Sacchari albissimi, quod satis est.

ANNOTATIONES.

¹ Ioannis 36.) Describitur etiam a Nicolao, cap. 222. Sectionis primæ ad verbum, nullo plane præterito medicamento simplici, excepto vno cardamomo.

² Drach. sex.) Cordus in suo medicamentario libro, contra omnium codicum fidem habet drach. Cordus septem. Quinetiam in Nicolao disertè est L. id est, drachmas sex.

³ Sicca.) Ita in omnibus Latinis codicibus legitur. Quapropter in Nicolai manuscripto codice mendose $\chi\lambda\alpha\upsilon$ pro $\xi\eta\gamma$: id est succi, pro sicca, scribitur. Huc accedit, quod in solida Antidoto, qualis hæc est, locum succus non habeat. Nicolai locus restitutus.

E ⁴ Spica nardi.) In quibusdam codicibus desideratur, sed parum recte. Siquidem Nicolaus eius quoque mentionem facit, & $\sigma\alpha\chi\upsilon$ minime in sua descriptione omittit.

⁵ Carni.) Nicolaus habet, $\kappa\alpha\rho\alpha\tau\alpha\sigma\tau\upsilon$. Vt hinc pateat, Carnabadium recentioribus Græcis non esse nisi Carcum, quod supra etiam diximus. Carnabadium.

⁶ Calami odorati.) Nicolaus quoq; postremo illum collocat loco. Sed parum refert quo loco statuat, modo ubiq; ponderis sit eadem ratio.

Dianthon. Nicolai Myrepsici. numero 46. XV.

A ntidotus e¹ floribus, succurrit præter rationem tristibus: animi enim latitiam auget. Item Cardiacis, elephantia correptis, animi defectionibus, & cordis syncopi. Prodest etiam destillatione affectis & in uniuersum omni corporis ac cordis imbecillitati. Capit florum rosmarini, unciam unam. Rosarum, violarum, glycyrrhizæ, ana drachmas sex. Caryophyllorum, spica nardi, nucis moschata, galsangæ, cinnamomi, zingiberis, zedoaria, maceris, ligni aloes, anisi, cardamomi, anethi, ana³ scrupulos quatuor, Sacchari albissimi, quod satis erit.

ANNOTATIONES.

¹ E floribus.) Græce est $\delta\iota\ \alpha\upsilon\theta\alpha\upsilon$. Nam etsi vetustioribus Græcis $\alpha\upsilon\theta$ flores simpliciter omnem significet, tamen posteriores Græci, Actuarius præsertim, & Nicolaus, propter eius excellentiam sic tantum Rosmarini coronarii florem nominarunt, posset itaq; commodius appellari Antidotus e floribus Rosmarini. $\alpha\upsilon\theta$.

Zedoaria. ² *Zedoaria.*) Non est in Græco Nicolao. Verum, quum eius in omnibus Latinis codicibus, & apud A
Actuarium mentio fiat, corpusq; imbecillum reficiat, omittendum esse minime putauimus.

³ *Scrupulos quatuor.*) Nicolai manuscriptus Græcus codex habet scrupulum vnum. Sed quia id pondus satis exiguum est, & Latini codices omnes quatuor scrupulorum, vt Actuarius quatuor drachmarum mentionem faciunt, præstat quatuor quam vnum scrupulum ad huius Antidoti confectionem vsurpare. Vt hoc etiam loco mirari subeat Alexandram Vercellensem, quod me teste quasi inconstantia insimulet, quod alter in Nicolai codice, alter vero in libro 2. de compositione medicamentorum legam quum tamen disertis verbis eius rei causam in annotationibus meis exposuerim.

Diamargariton. ¹ *Nicolai Myrepsici. num. 37. XVI.*

Antidotus e margaritis, ad *uniuersi corporis refrigerationem confert. Cardiacos, animo deficientes, mulieres uterum ferentes, praefocationes uteri, cordisque syncopen iuuat. Omnem virium imbecillitatem firmat. His quos animus desecat, supraq; modum tristibus mirifice auxiliatur. Omnem vitalium partium noxam discutit. Insuper asthmaticis, tussientibus, tabidisq; succurrit. Ventriculi fastidia tollit, eiusq; concoctionem iuuat. Longo morbo deiectos & imbecillitate lanquentes recreat, & ad pristinum robur reducit. Accipit caryophyllorum, cinamomi, spica, galanga, ligni aloes, glycyrrhizæ, pastillorum e rosas, & pastillorum e violis, ana drachmam vnam, & dimidiam. Nucis moschata, maceris, galliæ moschata, *Zedoaria*, ² *rhei pontici*, styracis calamitæ, ana drachmam vnam. Margaritarum perforatarum, & non perforatarum zingiberis, ossis cordis ceruini, ramentorum eboris, ³ *blattij bisantis*, ana drachmam dimidiam. Moschi ambaris, cardamomi, libistici, seminis ocimi, ana scrupulum vnum, minus duobus granis. ⁴ *Florum nymphaeæ*, scrupulum dimidium. ⁵ *Serici crudi vsti*, drachmam vnam. Lapidis saphiri, lapidis iaspidis, lapidis ⁶ *prassij*, ana drachmam dimidiam. Nucis Indicæ, drachmas duas. Tragacanthæ, corallij rubei, ana drachmam vnam & dimidiam. Anacardij, iuniperi baccarum, ana scrupulum dimidium, grana sex. Auri puri, drachmam vnam, scrupulum vnum. Sacchari candidissimi, quantum satis erit.*

ANNOTATIONES.

¹ *Nicolai.*) Hæc est legitima, & integra Diamargariton antidoti Nicolai Myrepsi descriptio, quæ etiam in Latinis exstat codicibus: quamuis manca & mutila, vt post fusius ostendemus. Et hanc deinceps Pharmacopœi paratam habere in suis officinis debent, sub nomine Diamargariton Nicolai: propter alias, quas mox subiiciemus. Hanc nonnulli Calidam appellant.

Rheum pontici.

² *Rhei pontici.*) Nicolaus Græcus manuscriptus habet, *ῥῆς καπύρῃς*. Nam, vt antea quoq; aliquoties monuimus, is inter se rheum Ponticum & barbarum confundit. Quum autem hæc Antidotus inter roborantes ac confortantes numeretur, & uterum ferentibus exhibeatur, non est cur illi purgantia permisceamus. Quapropter rheum Ponticum a Pharmacopœis accipiendum erit, non rheum barbarum. Id quod Actuarius etiam confirmat, qui habet Rhei simpliciter. Constat autem, tam veteres quam recentiores Græcos per Rheum, citra adiectionem positum, semper Ponticum, quod iidem sæpe etiam Rha nominant, intelligere. Huc accedit, quod Rheum Ponticum ad ventriculi & iecoris imbecillitatem, & item uteri vitia præstantissimum sit.

Blattium bisantiu.

³ *Blattij bisantis.*) Nicolai codex Græcus habet, *ὄσσης ἐκ νάρηος πορπύρας*: quod idem est. Nam blattia bisantia, non sunt nisi opercula purpuræ, vt antea quoq; diximus, quæ Nicolaus ossa narium purpuræ propter causam in libro primo expositam nominat.

⁴ *Florum Nymphaeæ.*) Nicolaus habet, *καφύρα* grana sex. Nos, quod Caphura admodum calida sit, vt supra quoq; fecimus, substituimus flores Nymphaeæ, seu Nenupharis.

Quæ in aliis codicibus desideratur.

⁵ *Serici crudi.* &c.) Hæc omnia vsq; ad finem compositionis in Latinis codicibus desiderantur, & a librario imperito, & qui pleraq; legere haud potuit præterita. Omitti autem nulla ratione possunt, aut debent. Quum enim partim sint confortantia, partim calefacientia, præteriri nequeunt: quod, vt diximus, roborans sit hæc Antidotus, & ad frigida corporis vitia utilis, vt hoc nomine anacardia, & iuniperi baccas accedere necesse sit. Odio itaq; dignus est Bernardus Dessennius, qui impudenter, contraque Græci codicis fidem, nulla adiecta etiam ratione, hæc simpliciter omittenda decernit. Quis vero non indignaretur Francisco Alexandro, qui me inepte hæc adieciisse ait, quum tamen omnia in Græco Myrepsi codice habeantur. Accedit, quod nemo non me quasi interpretem infidelem accusaret, si præter rationem omitterem quæ Myrepsus studio adiecit: Non igitur erat quod in me transferret, quod perpetuo, multorum sane risu, facit quæ Myrepsus magis attribuenda erant. Rogo autem nobis dicat Franciscus cur inepte adiecta sint, quæ omnia facultates huius Antidoti a Myrepsio commemoratas mirum in modum auget. Sic nunquam non vitium incidit Franciscus, quod in Matthiolo nulla non in pagina acriter admodum notat.

Prasium. Succedaneum Prasii.

⁶ *Prasii.*) Prasium lapis a succo Porri, cui assimilis est, nomen inuenit. Reperitur in Germaniæ metallis ærariis, & argentariis: & Germanice Pras vocatur. Officinis inusitatus, quapropter loco eius vtendum erit Smaragdo, qui eandem obtinet facultatem.

⁷ *Auri puri.*) Posset, ne nimis sumtuosa esset Antidotus, omitti Aurum.

A Diamargariton¹ Auicenna. XVII.

Valeat ut præcedens. Priuatim vero imbecillitati stomachi, & cruditati eiusdem corporis ac cordis exolutioni succurrit. Habet margaritarum non perforatarum, pyrethri, ana drach. unam. Zingiberis, mastiches, ana unc. dimidiam. Zedoaria, petroselinum, casia lignea, cardamomi, nucis moschata, maceris, ana drach. duas. Cinamomi, drach. quinque. Ben alba & rubra, piperis nigri & longi, ana drach. tres. Ligni aloes, caryophylli, spica, glycyrrhiza, galanga, ana drach. unam, & dimidiam. Ramenti auri puri, drach. unam, scrup. unum. Ambaris, scrup. dimidium, grana quatuor. Gallia moschata, drach. unam. Styracis calamita, thei Pontici, ana drach. unam. Ossis coræ cervini, drach. dimidiam. Berberis, drach. dimidiam, grana tria. Serici crudi vsti, scrup. unum. Margaritarum perforatarum, drach. unam, & dimidiam. Blatti bizantii, scrup. unum, grana octo. Libylici, seselios, ocimi seminum, ana scrup. dimidium, grana sex. Lapidis iassidis, saphiri, prasii, ana scrup. dimidium, grana sex, Sacchari candidissimi.

ANNOTATIONES.

¹ Auicenna) Nicolaus falso ad Galenum auctorem refert, quod in hac Antidoto multa recenscantur medicamenta, quæ Galeno ignota fuisse constat: ut est Behen, nux moschata, ambar, blattium bizantii, & id genus alia, quæ hic commemorantur.

² Mastiches) Græcus Nicolai codex habet *μύσχο*, id est, Moschi, sed haud dubie mendose. Neque enim verisimile est Moschum, rem preciosam ac sumptuosam, pondere quatuor drachinarum ab aliquo usurpatum esse. Quapropter Latinos & Auicennæ codices secuti, pro moscho substituiimus mastichen, ut quæ stomacho accommodatissima sit.

Masticha

C ³ Petroselinum, &c.) Cordus in suo medicamentario libro, post Zedoariam subiicit Doronicum, cuius nulla fit in Nicolao (qui, ut diximus, hanc Antidotum non mancā & mutilā, ut alii faciunt, sed integram habet) mentio. Dein semen apii subiungit, cuius etiam Nicolaus non meminit, sed pro eo Petroselinum recenset. Verum ex eo nihil periculi ægrotantibus accedit, quod Doronicum corroboret, & apii semen idem quod petroselinum possit. Id vero errore non caret, & quidem maximo, quod Cordus Thapsiæ radicem mox iam dictis subiicit, cui omnes exulcerandi facultatem inesse sciunt: ideoque intra corpus exhiberi facile non debet, præsertim quum mitiora & meliora præsto sint. Nam & Franciscus Alexander, qui me tamen hoc in loco satis grauiter pungit, Thapsiæ vsum parum intra corpus exhibitum parum tutum esse scribit. Vercellis enim elibratam & turpeti loco diuenditam Thapsiæ radicem, tormina, & scroti tumorem in purgatione excitasse refert. Quid multis opus est verbis? dicat per Deum oro Franciscus ipse, in quem vsum reliquis medicamentis hanc compositionem constituentibus Thapsia coniungi debeat? Non certe purgandi, quum Antidotum non sit purgatorium, sed roborans stomachum & cordis imbecillitatem. Non etiam cruditatem curandi, quum id nullo modo possit Thapsia, & erodendi facultate donata sit. Quare pro ea Nicolaus Casiam ligneam potius recenset: & recte quidem quod calefaciendi, adeoque cruditatem & frigiditatem ortam sanandi, itemque sua leniter adstringendi facultate roborandi vim habeat. Ut hoc nomine & contextu euicenda, aut atro inducenda colore vox Thapsiæ, & Francisco medius digitus ostendendus sit.

Cordus

Cordi et-
ror maxi-
mus

D ⁴ Ben alba, &c.) Quæ nunc in hac compositione sequuntur simplicia, omnia in latinis codicibus & Cordo desiderantur: at minus recte. Nisi enim omnia hæc addantur, eandem cum priore facultatem non habebit. Nec recte Antidotus & margaritis appellaretur, nisi utraque, id est, perforatas, & non perforatas margaritas, contineret. Ut hinc liquido appareat, nullos medicamentarios libros hactenus legitimos fuisse.

Cordus

Diamargariton frigidum, ¹ incerti auctoris. XVIII.

Omnem virium imbecillitatem firmat, syncopen iuuat, ac asthmaticos, tabidos tuſſentes, longo morbo extenuatos, & imbecillitate languentes recreat, & ad pristinum recuperandum robur conducit. Recipit seminum cucumeris, cucurbitæ citruli, melonum, portulacæ, papaueris albi, santalorum albi & citrini, ligni aloes, Zingiberis, rosarum rubearum, florum nymphææ, borraginis, myrti baccarum, ana drach. unam. Coralli albi & rubei, ana drach. dimidiam. Margaritarum perforatarum, & non perforatarum, ana drach. unam, & dimidiam. Sacchari albiſſimi.

ANNOTATIO.

F ¹ Incerti auctoris) Quia neque apud Nicolaum, neque Meſuen, neque alium quempiam auctorem, qui compositiones medicamentorum literis mandauit, reperitur. Cordus id ipsum ex Platearii commentariis in Nicolaum, descripsit. Alii Diamargariton frigidum vocatum aliter describunt, in eum scilicet, qui sequitur modum. Et priori præferendum erit, adeoque in vsum a medicis reuocandum.

Diamargariton frigidum aliud, ¹ incerti auctoris. XIX.

Valeat ut præcedens. Capit santalorum omnium, florum rosarum, & violarum, seminum melonum, passillorum & rosæ, ana drach. duas. Ossis cordis cervini. Spodii, doronici Romani, behen albi & rubei, spica nardi, ana scrup. duos. Margaritarum perforatarum & non perforatarum, ana scrup. dimidium. Smaragdi, ramentorum eboris, hyacinthi & saphiri gemmarum, ana drach. dimidium. Serici crudi vsti, drach. duas. Seminis intybi & oxalidis, auri puri, ana drach. dimidium. Ambaris, ligni aloes, ana scrup. dimidium. Florum nymphææ, scrup. unum. Moschi, gr. duo. Sacchari, q. satis est.

ANNOTATIONES.

¹ *Incerti auctoris*) Vtunque incerti auctoris & hanc esse Antidotum constat, tamen priori est præstantior, & ad robur cordis conferuandum ac recuperandum efficacior: id quod omnibus simplicium medicamentorum peritis palam est.

Oxalis ² *Oxalidis*) Oxalis Græcis & Latinis herba est, quæ barbaris & Seplassi Acetosa nominatur.

Antidotus e Gemmis Ioannis Damasceni, XX.

AD frigida cordis, cerebri, ventriculi, iecoris, & uteri vitia efficacissima. Nam melancholicos, sine causa manifesta tristes, timidos, solitarios iuuat, ex hilarat, ad mores probos inuitat. Emendat cordis tremorem, ac syncopen. Ventriculum a frigida intemperie imbecillum roborat: & concoctione tum eius, tum iecoris meliore reddita, corpus bene coloratum reddit. Habet margaritarum albarum, ¹ drach. tres. ² Saphiri, hyacinthi, ³ sardæ, grauatorum smaragdi, ana drach. unam, & dimidiam. Zedoaria, doronici, corticum citrei mali, macis, seminis ocimi caryophyllati, ana drach. duas. Coralli rubri, charabæ, ramentorum eboris, an. scrup. duos. Behen albi & rubei, caryophyllorum, zingiberis, piperis longi, spicæ nardi, folii, croci, cardamomi, an. drach. unam. Pastillorum de rosæ, ligni aloes, an. drach. quinque. Cinamomi, galangæ, ⁴ Zurumbet, an. drach. unam, & dimidiam. Foliorum auri & argenti, ana scrup. duos. Moschi, drach. dimidiam. Ambre, drach. duas. ⁵ Sacchari albißimi.

ANNOTATIONES.

Hæc Antidotus, si gemmæ ex quibus constat legitime sunt, satis sumptuosa est, ita ut Regibus & magnatibus hoc nomine magis conueniat, quam mediocri fortunæ hominibus. Quod hodie viliori precio venditur, non alia de causa accidit, quam quod a pharmacopœis legitimæ gemmæ ad huius structuram non vsurpantur.

¹ *Drach. tres*) Alii codices habent drach. duas. Nos emendatiores secuti, drach. tres adscripsimus.

Saphirus. ² *Saphiri*) Metuendum, ne Saphirus & Smaragdus officinarum adulterini sint. Quapropter præstat loco earundem, Hyacintho & Granato vti. Quod hic semel monuisse sufficiat.

Smaragdus. ³ *Sardæ*) Sardæ, quæ & Sardius & Sardo vocatur, a Sardibus vbi primum reperta, sic dicta gemma: est, quæ gemmariis nunc Carneolus appellatur, quod colore similis sit carni. Eius vsus semper fuit frequens, tum quia facile scalpi posset, tum quia ad signandum esset valde utilis, ut cuius signum partem ceræ secum non auferret. In puluerem trita, & cum vino austero pota, sistit menses, & sanguinis per ora venarum profusionem. Quoniam vero interdum rubro Sardæ corpori candidum Onychis substernitur, ex utraque gemma sui generis tertia etiam oritur, & nomen Sardonyches inuenit.

Sardonyches. ⁴ *Zurumbet*) Quod Mauritanis, Serapioni præsertim Zurumbet nominatur, id geminum est. Vnum quod Auicennæ Zarnabò, & recentioribus Græcis Zarnabum & Zarnabadium, Paulo autem Arnabò dicitur. Hoc describitur a Serapione cap. 261. vbi Zurumbet arborem esse proceram in Oriente prouenientem tradit: foliis longis, colore viridi, in luteum læuescente, Salicis modo, sicuti & ramorum cortex. Infrugifera est, citreum spirans odorem. Eo hodie caremus, ideoque succedaneò eius vtendum erit, quod Paulo & Serapione testibus Cássia lignea, vel Carpesium existit, propterea quod similis naturæ sit. Possidonijs eo non præserte. Cinnamomo vsus est. Alterum Zurumbet, cap. 172. Serapioni est radix rotunda, & globosa, Aristolochiæ rotundæ radici similis. Hæc hodie inter Zedoarias longas ex India & Oriente affertur. Hinc est, quod plerique Zurumbet interpretentur Zedoariam simpliciter, sed minus recte. Nam adiiciendum erat Rotundam, ut discrimen a vera & longa Zedoaria hac adiectione innueretur. Quapropter pro Zurumbet, rotunda illa nobis vocata Zedoaria accipienda erit. Hinc omnibus palam sit, Matthiolum me, & Cordum falso erroris insimulare, quod Zurumbet zedoariam interpretati fuimus, quum ipse potius in errore versetur sane maximo, eo quod vnicum esse Serapionis Zurumbet existimet. Ita merito accidit, ut quum Matthiolum omnium errores traducere studet, suos magis prodatur.

⁵ *Sacchari*) Qui in electuarii formam redigunt, ii pro Saccharo mel Emblichorum vsurpant.

Pleres Archonticon Nicolai Myrepsici. XXI.

Antidotus pleres archonticæ, prodest cardiacis, tristibus, melancholicis, imbecillo ventriculo, & animi deliquio a corde nato. Præterea eos qui ex diutino morbo penitus extenuati sunt, plurimamque inde imbecillitatem contraxerunt, admodum corroborat. Memoriam amissam recuperat, sensus acuit, comitialibus, asthmaticis prodest, omnemque cerebri debilitatem aufert. Capit cinamomi, caryophyllorum, ligni aloes, galangæ, spicæ nardi, nucis moschata, zingiberis, & spodiæ, floris iunci odorati, cyperi, rosarum, violarum, ana drach. unam, grana quindecim. Folii, glycyrrhizæ, styracis, mastiches, sampsychi, ² balsami, ocimi, cardamomi, piperis longi, baccarum myrti, ³ foliorum citrii mali, ana scrup. duos, grana quinque. ⁴ Behen albæ & rubæ, coralli, serici vsti, ana scrup. unum, grana duo, & dimidium, Moschi, grana septem, & dimidium. ⁵ Florum nymphææ, scrup. dimidium. Sacchari albißimi.

ANNOTATIONES.

1. *Pleres archontice*) Nicolaus præfens antidotus *πληρης ἀρχοντικῆς* id est, implens principalis, siue eximia, dicitur: quod scilicet mirificam quandam in recuperandis & instaurandis amissis viribus facultatem habeat. Quippe quum quasi impieat, saturusque robustos reddat, eos qui imbecilles atque deiectis viribus fuerunt: merito Græcis *πληρης*, quasi *ἑμπλής*, hoc est, implens: & *ἀρχοντικῆς* id est, principale seu eximium, dictum est, Barbaris medicis, & officinis non recte Plinifarcoticon nominatur.

Pleres archontice cur dicta.

2. *Spodii*) Et hoc loco neque Græcorum, neque Arabum, siue cannae spodium vocatum vsurpandum erit, sed ebur vsutum, ut iam aliquoties monuimus.

3. *Balsami*) Latini Nicolai codices habent Balsamitæ, sed falso. Nam in græco Nicolai est, *βαλαάμου*. Et in recolligendis viribus, Balsamum rectius quam Balsamita adhibetur. Sed quum Balsamo careamus, eius succedaneum vtendum erit.

4. *Foliorum citri mali*) Latini Nicolai exemplaria legunt, Corticum citri mali, quum græce sit *κίτρινος φῶλος*. Corticem enim potius quam folia huic Antidoto inserere voluerunt: quod hæc in nostris regionibus haberi nequeant, illas vero facillime consequi liceat.

Error latinorum Nicolai codicum.

5. *Behen, &c.*) Ante Behen in latinis codicibus scribitur, margaritarum, in aliis Gemmarum. In Græco nulla fit earundem mentio. Adiectæ haud dubie sunt ex sequenti hanc Antidoto, in qua Nicolaus Margaritarum meminit. Verum quum in corroborando corde Margaritæ vim magnam habeant nihil prohibeo; quin illas huic Antidoto misceat pharmacopœi pondere, scrup. vnius, & grana duorum, & dimidii. Non erat autem cur annotaret hoc loco Franciscus Alexander hanc compositionem constare simplicibus diminutis, quum antea ego id in meis annotationibus expressis verbis indicauerim. Et mirum est, Alexandrum pluris hac in re facere Præpositum, quem tamen nouit esse Myrepsi compilatorem atque abbreviatorem, & de quo non admodum præclare sentit. Quare semper Myrepsi, tanquam senioris, ac græci exemplaris omnibus esse ratio & auctoritas debet, quam imperiti illius Præpositi.

6. *Florum Nymphae*) Nicolaus habet, Caphure granum dimidium. Cur autem pro ea utamur foliis Nymphae, supra aliquoties dictum est, ut non sit opus hic repetere. Si tibi ita videbitur, pro Caphura succum Sedi siue Semperuini maioris substituere poteris, ut antea quoque monuimus. Quum autem solida sit Antidotus, folia aut flores Sedi etiam loco Caphuræ vsurpare licebit.

Dia Thamaron Nicolai Myrepsici, XXII.

Prodest tabidis, tussientibus, stomachicis, difficulter spirantibus, asthmaticis, & ad omnem corporis imbecillitatem. Renum præterea impotentia, & debilitati succurrit. Veneremur mortuam efficaciter excitat. Accipit caryophylli magni, qui Italica lingua¹ Antophyllus cognominatur, zingiberis ana drach. quinque, scrup. unum, grana sedecim. Cinamomi, caryophylli parui, carnis palmularum, ana vnc. dimidiam, scrup. unum, grana sedecim. Galange, spica, Zedaria, costi, pyretri, coralli rubei, tragacanthæ, rhei Pontici, spica celtica, anacardii, ossium palmularum, carpobalsami, anisi, baccarum iuniperi, ana drach. vnam, scrup. duos, grana octo. Margaritarum integrarum & perforatarum, ana scrup. duos, Moschi, grana tria. Blatti bizantii, scrup. duos. Trium piperum, ana drach. vnam, scrup. duos, grana octo. Ramentorum auri puri, argenti puri, ossis cordis ceruini, ana scrup. duos, & dimidium. Ramenti eboris, ambaris, ana scrup. unum, grana septem. Saccharo candidissimi, quod satis est.

ANNOTATIONES.

1. *Dia Thamaron*) Ita inscribenda est hæc Antidotus, propter palmulæ tum carnes, tum nucleos, eius compositionem ingredientibus. Nam palmula Arabibus Thamar: ut officinis, a digiti forma, quam refert, Dactylus dicitur. In manuscripto Nicolai codice mendose legitur, *δια θάμαρον*, pro *δια θάμαρον*. Facilis enim ab *θ* in *z* lapsus fuit, præsertim in barbara voce: quæ vel ipsi Nicolaus, utpote Græco, vel librario ignota fuit. Hinc est, quod in Actuarius, qui hanc Antidotum etiam describit, mendosior sit lectio. Siquidem illic scriptum est, *δια θάμαρον*. Quapropter imperiti interpretes sic dictam esse hanc Antidotum putarunt, quod hominem e morte ad vitam ducat. Eius itaque falsæ inscriptionis causa nulla alia fuit, quam quod ex Arabum libris hæc Antidotus sit a recentioribus Græcis descripta.

Dia thamar. Thamar. Nicolai locus restitutus.

2. *Antophyllus*) Et hæc vox satis declarat, ex Arabum libris hanc Antidotum esse transcriptam, quum barbaram esse omnibus constet. Significat autem, Nicolao metipso interprete, grandem caryophyllum, qui scilicet iam ad maturitatem peruenit, nucleo intus duro, bifidoque.

Antophyllus.

3. *Coralli rubei*) Cordus in suo medicamentario libro, præter Græci & Latini codicis fidem, Album Cordus quoque corallium adiecit.

4. *Rhei pontici*) Non Rhabarbarum, ut Cordus est interpretatus: sed veterum rha Ponticum, vel quod hodie officinis ita vocatur, accipiendum erit, idque propter causas ante sæpe expositas.

Cordi interpretatio impro-
bata.

5. *Spica celtica*) Latini codices habent, Saliunca: nulla plane alia de causa, quam quod Saliuncam non nisi spicam celticam, vel, ut hodie nominant, Romanam, atqui falso, ut supra quoque diximus, esse putauerint. Est enim Saliunca a Spica celtica diuersa planta, quemadmodum in nostris de stirpium historia commentariis plenius monstraui.

6. *Drach. vnam, scrup. duos, grana octo*) Sic etiam habet Latinus Nicolai codex. Quare præter omnium codicum hæc Cordus hic pondus variatur.

Cordi tēmeritas.

7 *Margaritarum, &c.* Harum in latinis codicibus nulla fit mentio. Nos Græci exemplaris fidem secuti, illas præterire haud potuimus: præsertim quum ad roboris consecutionem plurimum momenti habere margaritas, omnibus in confesso sit. Variant & hic ad finem vsque Latini codices, a Græcis: vt iterum pateat, hæcenus nullas in officinis compositiones fuisse integras, ac legitimas.

Ramenta auti. 8 *Ramentorum auri*) Hodie potius foliis auri vtuntur, quod ramenta ob grauitatem suam prompte fundum petant, nec æqualiter hoc nomine compositionibus commisceantur. Quod semel hoc loco monuisse satis sit.

Dia Cinamomu Ioan. Damasceni XXIII.

Antidotus e cinamomo concoctionem iuuat, pituita putredinem prohibet, ac alimenti in corpore distributionem promouet. Recipit¹ cinamomi tenuis & selecti, drach. quindecim.² Cinamomi vilioris, enule, ana vnc. dimidiam. Galanga, drach. septem. Caryophyllorum, piperis longi,³ cardamomi, zingiberis,⁴ granorum paradisi, macis, nucis moschata, ligni aloes, an. drach. tres. Croci, drach. unam.⁵ Sacchari purissimi, drach. quinque.⁶ Sacchari albißimi, quantum satis est.

ANNOTATIONES.

Cinamomū tenue. 1 *(Cinamomi tenuis)* Intelligit optimum, quod, Dioscoride teste, tenuibus est ramulis, iucundi odoris, acre, ac mordens.

Cinamomū vilioris. 2 *Cinamomi vilioris*) Mesuz filius habet Darfeni cinnami, quod idem est. Nam Darfeni Mauritanis est Cinamomum. Sed Cinamum vilioris Dinemomi species est. Serapione teste, inualidi odoris, solutarumque virium. Dioscorides Pseudocinamomum appellat, quod quandam Cinamomi faciem præbeat. Quare hoc loco deprauati sunt fere omnes Mesuz filii codices, qui habent Darfeni cumini: quum scribendum sit Darfeni cinami. Mesuz namque filius vtrumque Darfenum seu cinamomum, selectum & videlicet, huic compositioni permiscet; postremumque cum Serapione & aliis Mauritanis Cinamum nominat. Non igitur recte Cordus Cuminum huic Antidoto in suo medicamentario lib. inserit, quum eius nullam Mesuz filius fecerit mentionem. Secutus itaque exemplaria mendosa, pro Cinami legit Cumini. Et quum hæc compositio sit e Mauritano Mesuz desumpta, vt in eius dictionis explicatione, quicquid Franciscus Alexander dicat, Mauritanorum sequamur iudicium oportet. Quamquam tandem in nostrâ concedat sententiam, & vbi Cinamomi ac Darfeni legitur, pro altero primariæ causæ æquale pondus: pro altero autem duplum eiusdem substituendum, fateatur.

Cardamomi. 3 *Cardamomi*) Intelligit id, quod ita hodie officinis medicorum vocatur.

Heil. 4 *Granorum paradisi*) Mesuz filius habet Heil. Ceterum Heil, non est, nisi ea Cardamomi species, quæ Cordilapfus. Seplasiis Granum paradisi nuncupatur. Cordus hic reprehensione dignus est, quod Heil silentio

transiit. 5 *Sacchari purissimi*) Mesuz filius habet Zucchari tabarzeth, quod idem est. Hoc autem speciebus permiscetur, vt eo expeditius ad vsum quotidianum conferuentur.

Zucchari tabarzeth. 6 *Sacchari albißimi*) Hoc adiicitur, quando species in orbiculos, vel, vt hodie nominant, rotulas digerantur.

Dia Xylaloes Ioannis Damasceni XXIV.

Antidotus e ligno aloes prodest vitio cordis, ventriculi, & iccoris frigidis, easque partes roborat. Ob id cordis palpitationem, & animi defectionem sanat, exhilarat, concoctionem iuuat, orisque halitum commendat. Caput ligni aloes crudi, rosarum rubearum, ana vnc. unam. Caryophyllorum, spica nardi, macis, nucis moschata, gallie moschata, cubebe, cardamomi, granorum paradisi, mastiches, cinamomi, cyperi, iunci odorati floris, zedoaria, beben alba & rubea, folii, serici crudi, margaritarum, coralli rubei, charaba, foliorum & corticum citrii mali, ocimi caryophyllati, sisymbrii, mentha sicca, piperis longi, zingiberis, an. vnciam dimidiam. Moschi, scrup. unum. Ambaris, drachmam unum, & dimidiam, Sacchari albißimi.

Latificans Galeni¹ Nicolai. XXV.

Lætitiâ, colorisque bonitatem efficit. Concoctionem iuuat, & caniciem arceat. Habet florum ocimi caryophyllati, croci, zedoaria, xylobalsami, caryophyllorum, corticum citrii mali, galanga, macis, nucis moschata, syrachi calamitæ, ana drachmas duas, & dimidiam. Ambaris, moschi, florum nymphaeæ, ana drach. dimidiam. Anisi, ramentorum eboris, thymi, epithymi, ana drach. unam. Margaritarum, scrup. duos. Osu cordis ceruini, drach. dimidiam. Auri foliati purissimi, argenti foliati puri, ana scrupulum dimidiam.⁵ Sacchari albißimi, quod satis est.

ANNOTATIONES.

1 *Galeni*) Falso ad Galenum refertur hæc Antidotus: quod inde fit manifestum, quia moschus, ambar, margarita, & caphura eius structuram ingrediuntur: quæ Galeno incognita fuisse constat.

2 *Nicolai*) In Græco manuscripto codice, quem nos in Latinum conuertimus sermonem, Antidotus hæc, quod sciam, non habetur. In Latino autem exemplari, seu paruo Nicolai Præpositi vocati Antidotario, ad eum quem exposuimus modum refertur.

3 *Florum Nymphaeæ*) Nicolai codex habet, Caphuræ: pro qua nos Flores nymphaeæ, aut violarum, propter causam antea sæpius dictam, substituimus.

A 4 *Scrupulos duos.*) Nicolai exemplar habet drachmam vnam. Verum quia hoc pondus antea precessit, suspicio est locum esse deprauatum, quod alias margaritas a precedentibus non separasset, sed plane coniunxisset, & ana dictionem subiunxisset. Parum autem refert, drachmam vnam aut scrupulos duos recipias, quod margaritæ roborandi cor facultatem habeant eximiam.

5 *Sacchari candidissimi.*) Si in solidam digesseris formam. Quod si vero liquidam facere volueris Antidotum, tunc adiuicere oportet, succi cotoneorum, pomorum odoratorum dulcium, boraginis, & vini veteris partes æquales: ea scilicet quantitate & mensura, quæ despumando & decoquendo saccharo sufficiat.

Letificans¹ Rasis. XXVI.

A D affectus cordis, ventriculi, iecoris, quas partes etiam roborat, admodum confert: palpitacionem cordis emendat, valenter exhilarat, & concoctionem iuuat, coloremq; viuendum efficit.

B Capit melisse, corticis citrij mali, caryophyllorum, gallia moschata, mastiches, croci orientalis, zinzibromi, nucis moschata, cardamomi, seminis Paonia, behen alba & rubra, zedoarie, doronic, seminis ocimi maioris, s. minoris caryophyllati, ana unciam dimidiam. Moschi, scrup. unum. Sacchari albi, quod satis est, formentur orbiculi, seu, ut vocant, tabula. Si vero in liquidam digerere formam Antidotum volueris, tunc prædictas species cum sequenti Serapio misce, ut electuarij accipiat consistentiam: quod recipit, myrobalanorum chebulorum numero³ viginti. Emblicorum numero triginta. Trii myrobalani coquantur in tribus aqua libris, donec ad unam redeant, dein colentur, & colatura adijciatur mellis despumati libra una. Dein bulliant, quoad aqua consumpta sit, & ad instam consistentiam veniat: & postquam seruo remiserit, inspergantur species.

ANNOTATIONES.

C 1 *Rasis.*) In libro nono ad Almanforem, capite decimo tertio, de Melancholia.

2 *Seminis Paonia.*) Razes habet Ncheremisch: quam sane dictionem etsi varie interpretantur, nihil enim certum aut solidum est in Arabum doctrina, tamen maior pars auctorum eo inclinat, ut semen Pzoniz esse statuant. Quorum nos etiam sententiam secuti sumus, propterea quod constat Pzoniam ventriculum, & iecur roborare: id quod huic etiam Antidoto tribuitur.

Nehere-
misch:
Nihil cer-
tum aut
solidum
in Arabi
doctrina.

3 *Numero viginti.*) Cordus habet quadraginta. Nam duplicato in sequentibus omnibus vsus est pondere, ita ut emblichos sexaginta, aquæ libras sex, & mellis despumati libras duas sumendas esse voluerit. Nos Rasis codicum fidem secuti, simplici mensura ac pondere potius vtendum esse duximus. Nihil autem refert, vtram amplectaris conficiendi rationem.

Dianisu Ioannis Damasceni. XXVII.

A Ntidotus ex Aniso in temperiem ventriculi frigidam, & a pituita cruda natam sanat. Cras-
D sis quoque flatibus illic procreatis succurrit. Crudam deniq; pituitam in ventriculo procrea-
tam absorbit, tussisq; diuturna prodest. Recipit anisi, drachmas viginti. Glycyrrhiza, mastiches, ana unciam unam. Carei, macis, galanga, zingiberis, cinamomi, feniculi, ana drachmas quinq;. Trium piperum, calaminthes, pyrethri, casia lignea ana drach. duas.* Granorum paradisi, caryo-
phyllorum, cubebarum, spica nardi, croci, ana drachmam unam, & dimidiam. Sacchari can-
didissimi.

* Hall

Dia Cyminu. Nicolai Myrepsici, num. 100. XXVIII.

A Ntidotus ex cymino, confert frigiditati thoracis, stomachi, inflatis, colicis, febre quartana
E laborantibus, & ventriculi concoctionem iuuat. Accipit cumini die nocteque in aceto
macerati, & dein in umbra exsiccati, drachmas octo, scrupulum unum. Cinamomi, caryophyl-
lorum, ana¹ drachmas tres, scrupulos duos. Galanga, thymbra, calamintha, zingiberis, piperis ni-
gri, ana drachmam unam, scrupulos duos. Ammios, libystici, ana drachmam unam, scrupulum
unum, grana sex. Piperis longi, spica,⁴ nucis moschata, ana scrupulos duos, & dimidium Sacchari
albi.

ANNOTATIONES.

Cordus

1 *Drachmas tres, scrupulos duos.*) Cordus secutus Latinorum codicum lectionem, habet drach-
mas duas, & dimidiam. Nos vero fidem potius Græci manuscripti exemplaris sequi voluimus,
quod legit L β *supr. e.* Scrupuli enim quinque efficiunt drachmam vnam, & scrupulos duos. Hallu-
cinatus est quoque Dessennius, qui legit drachmas duas, scrupulum dimidium. Mirum autem est
F quod Franciscus Alexander hoc loco laudet, quod integritati suæ hanc compositionem restitue-
rim, quum alias non raro reprehendat, quod pondera & simplicia mutauerim, ita tamen codice
Græco monente.

Dessenn
error.

2 *Galanga.*) Immutatum hic & ordinem simplicium, aliamque quam in Latinis codicibus ponde-
rum efferationem, vides. Ita namq; scriptum erat in Græco Nicolai codice, qui plus auctoritatis quam
Latinus habere merito debet.

3 *Thymbra.*) Pro ea Pharmacopœi Satureiam vsurpent.
 4 *Nucis moschatae.*) Latini codices ante nucem moschatam Cardamomi mentionem, quod tamen Ioannes Agricola in Græco desideratur codice, faciunt. Nec eius meminit exemplar, quod opera Ioannis Agricola nostri Ingolstadii est excusum. Est autem haud dubie ex altera Dia cuminu Antidoto, quæ præsentem apud Nicolaum sequitur, in contextum insertura. Nos quia in Græco non erat, omisimus, ut sincera & legitima esset huius Antidoti structura.

Dia Calaminthes. ¹ Galeni. XXIX.

Antidotus e calamintha Galeni, crassa & lenta attenuat, & discutit, urinas mouet, ac muliebres menses. Habet calamintha, pulegi, petroselini, seselios, ana ² unciam unam. Seminis apij, cacuminum siue cornarum thymi, ana uncias duas. Lybistici, unc. octo. Piperis, unc. viginti-quatuor. Sacchari albiissimi.

ANNOTATIONES.

1 *Galeni.*) Libro quarto de Tuenda valetudine, capite sexto. Vbi, qualia esse debeant simplicia, quæ huius Antidoti compositionem ingrediuntur, docet. Verum quum ex iis regionibus, quas ipse memorat, hodie medicamenta illa non afferantur: satis erit, si nostratibus, optimis tamen, & rite collectis, utamur.

2 *Unciam unam.*) Galenus passim duplum accipit pondus. Verum quia magna est hæc quantitas, præstat simplex pondus, quod nos fecimus, vsurpare.

Dia Calaminthes. ¹ Nicolai Myrepsici. XXX.

Vtilis ad refrigerationem thoracis, & tussientes. Item ad refrigerationem stomachi, abolitam appetentiam, ad eos qui difficulter concoquunt, & eos quibus stomachus celeriter inflatur. Caput calaminthes, pulegi, seselios, piperis nigri, petroselini, ana drach. tres, scrup. duos. Lybistici, drachmas duas, scrup. unum. Seminis apij, scrup. unum. Ameos, ² thymi, anisi, cinamomi, zingiberis, ana scrupulos duos. Sacchari candi, dissimi.

ANNOTATIONES.

1 *Nicolai.*) Nam Mesue filii vsitata non est, nec a Galeni nisi ponderum ratione distat. Præstat itaq; hac Nicolai, quæ plura quam Galeni simplicia recipit, & legitima, adeoq; e Græco transcripta est, uti. Desseñius eam mutilam, & deprauatam refert.

2 *Thymi.*) Comæ autem, siue summitates thymi intelliguntur, ut in ea quæ præcedit.

Dialacha maior. Mesue filij. XXXI.

Antidotus elacha magna facit aduersus ventriculi frigus, ventriculum & iecur roborat, obstructions atq; inflationes viscerum, iecoris potissimum & lienis aperit, eorumq; duritiem dissoluit. Aquam intercutem, & malum corporis habitum sanat & emendat, menses ciet, urinas mouet, lapidem renum & vesica frangit. Accipit lacha ¹ lota, ² rhabarbari, ana drach. tres. Spicæ nardi, mastiches, ³ coliculorum iunci odorati, absinthij, succi ⁴ eupatorii, sabine, asari, amygdalarum amararum, costi, myrrha, rubia tinctorum, seminum apij, anisi, feniculi, ammeos, ⁵ aristolochia gentiana, croci, cinamomi, hyssopi, cassia lignea, ⁶ cacuminum iunci odorati, bdellij, ana drachmam unam, & dimidiam. Piperis, zingiberis, ana drachmam unam. Sacchari albiissimi.

ANNOTATIONES.

1 *Lacha lota.*) Quomodo Lacha sit abluenda, suo docebimus loco, ut non sit necesse hic explicare. In calce enim huius libri, abluendi ac præparandi medicamentorum rationem seorsim trademus. Lauatur autem, iunci odorati florum & aristolochiæ decocto: ut essentia tenuitate assumpta, valentius obstructions aperiat.

2 *Rhabarbari.*) Quum Antidotus hæc in hoc sit parata, ut obstructions soluat, non autem ut alui subducat: præstat hic etiam rha Ponticum officinis nominatum vsurpare, quam rhabarbarum iisdem dictum. Eius autem Mesue filius fecit mentionem, quod veterum Rha ignorauit.

3 *Coliculorum iunci odorati.*) Quum hanc compositionem Iuncus odoratus, qui Squinantus barbaris appellatur, bis ingrediatur, hoc loco culmi, siue coliculi eius sunt accipiendi. Desseñius hanc compositionem, ut omnes fere alias, deprauauit.

4 *Succi Eupatorii.*) Hic Græcorum Eupatorium, quod vulgus Agrimoniam nominat, vsurpari non debet: sed id quod a Mesue describitur, & Græcis Ageratum. Eius historia est in primo nostrorum de Stirpium historia commentariorum tomo.

5 *Aristolochia.*) Et si eandem facultatem omnes habeant Aristolochiæ, tamen quum rotunda sit tenuissima, & ad omnia Galeni etiam testimonio, efficacior: vbi cunq; Aristolochia, ut hoc loco, simpliciter effertur, rotunda vsurpari debet.

6 *Cacuminum iunci odorati.*) Per cacumina seu summitates Iunci odorati, non intelliguntur, nisi eius flores, qui in cacumine huius herbæ sunt constituti. Verum quia flores ad nos hodie non deferuntur, necesse est tenerrimas eius partes e cacumine decerptas arripiamus, aut geminum pondus Schœnanthos indamus.

A Dia Lachan¹ Nicolai Myrepsici, numero 123. XXXII.

Antidotus e Lacha confert iocinerosis, lienosis, malo corporis habitu laborantibus, nephriticis, stomachi inflationibus, & viscerum. Item iocineris, & lienis obstructionibus, Recipit lacha² infectorum, vnc. unam & dimidiam, drach. tres. Spica, costi, carpobalsami, xylobalsami, casia lignea, cinamomi, acori, croci, asari, floris iunci odorati, sena rheibarbari, mastiches, aristolochia longa & rotunda, ana drach. nouem Gentiana seminis apii, feniculi, anisi, polii, caryophylli, cumini, eupatorii, absinthii phu, nucis moschatae, cardamomi, gallia moschata, cubearum, ana drach. tres. Sacchari quantum satis erit.

ANNOTATIONES.

B ¹ Nicolai Hæc etsi visitata non est, tamen quum ad soluendas obstructions sit efficacissima, in vsum reuocari potest: propterea quod ad eam quam Mesues describit, proxime accedat, & pluribus etiam simplicibus constet.

² Infectorum Græce est βακτηρ. Quæ vero sit Lacha infectorum, primo abunde dictum est libro. A- Lacha infectorum.

³ Sena rheibarbari Si rheum barbarum, quod hodie ita vocatur, ad huius Antidoti structuram accipiat: dubium haud erit, quin aluum sit subductura, præsertim quum Sena illi coniugatur, & pondus sit vnc. vna, drach. vna. Quia vero obstructionum soluendarum gratia hæc Antidotus magis vsurpatur, præstat hoc rha barbaro accipere rheum Ponticum vocatum: quod ita minus sumptuosa sit futura Antidotus. Actuarius quidem Rheum Indicum indendum esse docet, sed quinque drach. duntaxat pondere.

Dia Curcuma¹ Mesue filii. XXXIII.

C Antidotus e² curcuma magna, ventriculi iecoris, lienis morbos frigidos & diuturnos sanat. Itæ obstructions, hydropem, malum corporis habitum, inflationes, vultuosum corporis colorem, renum & vesicæ vitia frigida, urinamque euocat. Habet croci, asari, petroselin, dauci, anisi, seminis apii, ana vnc. dimidiam. Rhei barbari sp. ca. ³ mei, an. drach. sex. Costi, myrrha, casia lignea, floris iunci odorati, radicis rubiæ, carpobalsami, ⁴ succi absinthii, succi eupatorii, ⁵ olei balsami, an. drach. duas. Calami odorati, cinamomi, drachmam unam & dimidiam. Scordii⁶ scolopendrii, succi glycyrrhizæ, an. drach. duas, & dimidiam. Tragacantha, drach. unam. Sacchari albißimi.

ANNOTATIONES.

D ¹ Mesue Hæc Mesue filii Antidotus ex centesima decimanona, & centesima vigesima secunda Nicolai Myrepsi est collecta: quod ex collatione vtriusq; auctoris omnibus sit manifestissimum.

² E curcuma Mirum admodum est, cur hæc Antidotus e curcuma sit inscripta, quum curcuma eius structuram non ingrediatur. Curcumam autem visitatam hodie officinis intelligimus, quæ non est nisi Ciperi Indici radix, vt libro primo diximus. Nec Serapionis & aliorum Arabum, quæ non est nisi Chelidonium, inaudienda erit. Quapropter suspicio est, Curcumam apud Mesue filium hoc loco idem quod crocum significare. Aut certe Antidoti inscriptio per imperitum librarium deprauata est, qui pro dia xep-
za, legit dia xepxua, vt etiam apud Nicolaum legitur. Recte autem hæc Antidotus e croco inscribitur, quum primum medicamentum hunc constituens sit Crocus.

Dia curcuma vnde dicta.
Curcuma.

³ Mei Monachi, qui in Mesue filium Commentarios scripserunt, ante Meum inferendum Phu esse contendunt: nullo alio argumento moti, quam quod Auicenna in sua Diacurcuma eius etiam meminerit. Quasi vero necesse sit, in Mesue filii descriptione omnia commemorari, quæ in Auicennæ memorantur. Curigitur in hac Antidoto desideratur Cappar Romanæ? cur succus lilii? Debebant itaque monachi eadem ratione, qua phu, hæc etiam duo inter ea, quæ Antidotum hanc constituunt, recensere medicamenta. Quapropter quum neque in Nicolai, neque in aliis quos ipse viderim Mesue codicibus phu, mentio fiat, merito a nobis omissum est.

Monachi commentatores filii Mesue.

⁴ Succi absinthii & Eupatorii Hic iterum Ageratum pro Eupatorio sumendum erit. Atque sciendum, quod succi illi, vt glycyrrhizæ, densandi sunt. Liquidi enim solidis Antidotis non conueniunt.

Eupatorii Mesue.

⁵ Olei balsami Opobalsamum intelligit, cuius vice succedaneo eius vtendum erit.

Oleum balsami.

⁶ Scolopendrii Herbam, quæ Ceterach hodie dicitur, inaudire oportet per Scolopendrium, non lingua ceruina vulgo dicta, hæc tollendi obstructions facultatem haud obtineat, vt in Phyllitidis historia copiose monstrauimus.

Scolopendrium.

F Dia Prasiu Nicolai Myrepsici. XXXIV.

Antidotus e marrubio confert tabidum, suffocantibus, in qui fluxionibus distillationibusque capite obnoxii sunt. Item hebetudini oculorum, & palati vitiosis purpurationibus: & in vniuersum omnibus vitiosis suffocantibus. Calculos attērit, & iis qui difficulter mingunt, prodest. Caput marrubii viridis drach. quinque & dimidiam. Tragacantha, pinearum repurgatarum, amygdalarum pistaciorum, carni palmarum, caricarum, uuarum passarum, an. drach. tres, & dimidiam. Cinamomi, caryophyllorum, nucis moschatae, macis, ligni albes, galanga, spica, zingiberis, Zedoaria, glycyrrhizæ, rhei Pontici, anacardii, syraci, mastiches, myrrha, galbani, terebinthina, iridis, aristolochia rotunda, radicis cappar, gentiana, piperis nigri, anisi, feniculi, anethi, seminis apii, si nonu, saxifraga, an. drach. duas, Hermodactyli, castanea, origani, peucedani floris iunci odorati, car-

damomi, piperis albi, carnabadii, libysfici, vincetoxici, an. drach. unā & dimidiam, gra. unum & dimidium Pulegii, balsami, abrotoni, costi, pyrethri, thymbræ, ocymi, pænia, amomi, erui, an. drach. unā, scrup. unū, gr. duo. Xylobalsami, casia lignea, corallii, ramentis eboris, carpobalsami, dauci cretici, an. drach. dimid. Moschi, ambaris, ossis cordis cervini, an. gran. duodecim. Mellis despumati, aut Sacchari albißimi, quod satis. Nonnulli qui liquidam facere antidotam volunt, pro saccharo accipiunt mellis lib. quatuor. Dein capiunt marrubium siccum corallium, Resinam pineam, vini veteris, unc. tres, & decoquunt cum caricis, cumq; visus passus eximitis acinis, donec vinum absumatur, postea utraq; contundunt, & reliquis admiscunt, adiciuntq; therebintinā cū melle, atq; ita probe ebulliunt. Vbi vero ab igne amouere volunt, imponūt species, & quum probe subactæ fuerint, reponunt in vase.

ANNOTATIONES.

* *Galbani, Terebintina*) Hæc si in solidam formam redigitur medicamentum hoc, omittenda erunt. Sin liquidum futurum est, indenda veniunt. Quum itaque multa simplicia, si solidum futurum sit hoc medicamentum, omittenda sint, præstat illud liquida forma constructum, Nicolai exemplo in officinis proflare, quam solida.

Castanea.

1 *Castanea*) Græce est *καστανόν*. In latinis codicibus omnibus desideratur, Tamen a Nicolao haud dubie reliquis hanc Antidotum constituentibus est permista, ut destillationes inhibeat ac sistat: perinde atque caro palmularum, quæ itidem astringit & desiccatur, adeoque destillationi sistendæ apta est.

*Carnabadi-
dium.*

2 *Carnabadi*) Hoc loco, ut apud Simeonem Sethi, pro Careo accipitur. Quod etiam testantur latini codices, qui in vniuersum omnes pro Carnabadio habent Carui.

*Vinceto-
xicum.*

3 *Vincetoxici*) Varie interpretantur Vincetoxicum recentiores. Nonnulli enim Iberin esse putant. Alii Thlapin. Quidam Anemone sylvestrem. Quæ sane herbæ omnes quum eiusdem sint facultatis, ideo nihil refert, utram exiis accipias. Officinæ nostræ hodie pro Vincetoxico usurpant Aclepiada herbam, quam illi hirundinariam vocant.

*Balsamum
Cordus
erat.*

4 *Balsami*) Græcus Nicolai codex habet *βαλσαμόν*. Cordus balsamita legit, Latini codicis fidem secutus. Non video, quod tamen ille affirmat, quomodo in vetere aliquo & probato auctore vox balsami significet Mentham. Et nisi quis eius rei testimonium aliquod proferat, mihi haud persuadebit. Præferamus igitur huic coniecturæ Græci exemplaris fidem, in quo disertè, ut diximus, Balsami fit mentio. Quum autem Balsamo destituamur, eius succedaneo vtendum erit. Quod quale sit, suo monstrauimus loco.

5 *Abrotoni*) In omnibus latinis codicibus legitur pro Abrotoni, Dictamni. In græco tamen Nicolai exemplari est disertè *ἀβροτόν*. Nihil autem refert, Abrotonum aut Dictamnium usurpes, quum eiusdem sint facultatis, & utrunque eos præster effectus, quos antidoti inscriptio pollicetur.

Dia Ireos simplex, XXXVI.

Prestat fere idem quod sequens. Accipit iridis, unc. dimid. Sacchari candi seu candefacti. Specierum diatrachanthæ frigida, an. drach. duas. Sacchari albißimi.

Dia Ireos² Solomonis Nicolai Myresfici, XXXVII.

Antidotum ex iride, prodest ad columellam, quæ veluti acus intus pertusa videtur: ad vocē etiam amissam, similiter asthmaticos, & difficulter spirantes. Recipit iridis, unc. unā. pulegii, hyssopi, glycyrrhizæ, an. drach. sex. Tragacanthæ, amyli, cinamomi, zingiberis, piperis, amygdalarum nucis pinearum, an. drach. tres. Caricarum sine acinis, carnis palmularum, quarum pinguium exemptis acinis, an. drach. tres, & dimidiam. Styraçis rubri drach. duas, scrup. unum. Sacchari albißimi.

ANNOTATIONES.

1 *Solomonis*) Nicolao simpliciter *δι' ireos* inscribitur. Recentiores autem Solomonis dictionem adiecerunt, ut hac ipsa adiectione eam a simplici, quæ præcedit, discernere.

Amylum.

2 *Amyli*) In latinis codicibus omnibus desideratur, quum tamen in Græco manuscripto codice disertè sit *ἀμύλον*. Non est autem omittendum Amylum, propterea quod ad columellam defluctione laborantē, & exulceratā plurimū conferat. Quod testatur Dioscorides, qui Amylum contra fluxiones, caua vlcera, exasperatū guttur efficax esse scribit. Ita paucæ, aut fere nullæ cōpositiones integræ hæctenus in officinis fuerunt. Et hic me notat Franc. Alexander, quod aduersus Actuarii sententiam, Amylum addiderim, quum tamen eius rei rationē et subiecerim, quod ille silentio transit. Non a. nescius fui hanc vocē in Actuarii cōpositione desiderari, sed id tantū præstare volui, ut lector intelligeret, cur hoc loco pro semina lini, cuius in Nicolai codice mentio fit, Amylum substituerim. Mirum autem, cur Franciscus haud cogitet, se crebro Matthiolo obtrudere crimen, a quo profecto ipse alienus nequaquam est.

3 *Styrax rubens*) Quid sit Styrax ruber recentiorib. Græcis & Arabib. lib. i. diximus. Præstaret quidem styracē optimū ac liquidū, quā Calamiten vocant, usurpare: verū quum succus siue cortex magis ad hanc cōpositionem, quæ arida est, quadret, ideo illum Nicolaus potius usurpare voluit, quam liquidum.

Dia Hyssopi, Nicolai. XXXVII.

Antidotum ex hyssopo, confert ad vitia capitis frigida, columellæ exsiccata, arteriā asperā purgat, & cōpescit vitia frigida thoracis & stomachi vitia emendat, & concoctionem iuuat. Habet hyssopi, iridis, thymi, piperis nigri, an. dra. 30. Pulegii, thymbræ, ruta, cumini, an. dr. 20. Carnis palmularum, tragacanthæ, passularum exemptis acinis, feniculi, an. dra. 10. Zingiberis, anisi, carei libysfici, an. dra. 5. Sacchari albißimi.

Climax.

A

ANNOTATIONES.

¹ Nicolai) In latinis duntaxat codicibus habetur, in græcis desideratur. Rarissime in usum venit: quapropter omitti potuisset.

² Fœniculi) Miratur hoc in loco Franciscus Alexander cur glyzyrrhizam præterierim, quum mihi magis mirandum sit, cur ipse omiserit fœniculum, cuius expresse in Nicolai codicibus mentio fit: & glycyrrhizam ac ficum addiderit, quum tamen neutrius ibidem mentionem faciat Nicolaus. Ita passim in aliorum dictis reprehendendis oculatus est Alexander, in suis vero erratis animaduertendis plane cœcus.

Dia trion pipereon, ¹ Nicolai. XXXVIIII.

Antidotus e tribus piperum generibus ventriculi refrigerationibus, acido ructui, quartanis, resolutis, iocinerosis, & inflationibus auxiliatur. Capit trium piperum, an. vnc. vnā. Zingiberis, thymi, seminis anisi, ² apii, an. vnc. dimidiam. Sacchari quod satis est.

B

ANNOTATIONES.

¹ Nicolai) Hæc proxime accedit ad Dia trion pipereon simplex Galeni: quæ ita dicta est, quod minime sit mendicamentosa, nec ex variis, vt sequens, medicamentis composita, adeoque citra negocium ab iis, qui hanc sumpserunt, concoquitur. Danda itaque iis qui parum concôxerunt, & qui recens frigus in ventriculo contraxerunt, & pituitosum succum: item iis, quibus cruditas est multa in primis venis. Galenus de vnoquoque genere piperum accipit drachmas quinquaginta. De reliquis tribus, drachmas octo.

² Apii) Galenus in sua compositione Apium non habet. Qui igitur magis simplex esse cupit medicamentum hoc, ab eo apium detrahât.

Dia trion
pipereon
simplex.

C

Dia trion pipereon, ¹ Mesue filii, XXXIX.

Hæc Antidotus magis fluxionibus, quæ a capite ad thoracem descendunt, conuenit. Accipit trium piperum, ana aur. quinq. Zingiberis, thymi, anisi, aur. duos. Spica nardi, ² ammeos, an. aur. vnum. Casia lignea, asari, helenii sicci, seminis ³ apii, seseleos, an. aur. dimidium. Sacchari albißimi.

ANNOTATIONES.

¹ Mesue) Hæc plane est quam Galenus lib. 4. de Tuenda sanitate damnat, veluti nimis medicamentosam. Omnia namq; quæ structuram huius Antidoti constituunt, medicamenta, illic nominatim perstringit.

² Ammeos) In latinis codicibus est Amomi: sed quum Galenus loco iam citato diserte Ammeos mentionem faciat, & Amomum hodie vix, & a paucis tantum cognoscatur. Ammi autem verum iam afferatur, & omnibus fere cognitum sit, præstat Ammeos semen quam Amomi, ad structuram huius Antidoti vsurpare. Nec erat cur te te me pungeret Franciscus Alexander, quasi temere Amomum omiserim.

³ Apii) Ex hac Antidoto Apii semen, est in præcedentem simplicem translatum.

Dia Zingiber, ¹ Incerti auctoris. XL.

Recipit zingiberis, galanga, caryophyllorum, cinamomi, nucis moschata, granorum paradisi, piperis longi, macis, cardamomi, spica nardi, rhei Pontici, rosarum rubearum, an. scrup. dimidium, grana tria. Pinearum repurgatarum, vnc. dimidiam. Pistaciorum, drach. duas. Anisi, fœniculi, glyzyrrhizæ, croci, an. drach. dimidiam. Sacchari albißimi.

ANNOTATIO.

E ¹ Incerti auctoris) Cordus, & alii Nicolao ascribunt, quum tamen neque in Latinis, neque in Græco, quod sciam, Nicolai codice hæc Antidotus habeatur. Quapropter incerti auctoris compositionem esse iudico, ad ventriculum roborandum, & firmandum excogitatum.

Electuarium Ducis ¹ Nicolai. XLI.

Valeat ad cruditatem, & inflationem stomachi & intestinorum, ileon, & calculum. Recipit anisi, drach. duas. grana sedecim. Glycyrrhizæ, mastiches, ana scrup. duos, grana quinque. Chamedryos, cinamomi, zingiberis, galanga, fœniculi, carei, an. scrup. vnu. grana quindecim. Casia lignea, calamintha, dauci, pyrethri, piperis albi, piperis longi, cyperi, floris iunci odorati, iridis, amomi, folii, asari, an. scrup. vnum. Spica nardi, croci, gummi Arabici, tragacantha seminis anethi, calami aromatici, cubebæ, caryophyllorum, carpobalsami, cardamomi, libystici, seminis ² hippofelini, baccarum iuniperi, seseleos, quinque folii. Seminis aspargi, seminis citri, radicis acori, ammeos, rhei Pontici, nucis moschata, ligni aloes, ocimi, ³ lithospermi, seminis saxifragæ, citruli, cucurbitæ, cucumeris, melonis, scariolæ, petroselinii, beben albæ, beben rubæ, styracis calamitæ, an. scrup. dimidium, ⁴ grana quinque. Penidiorum, vnc. dimidiam, scrup. duos, & dimidium. Sacchari albißimi.

F

ANNOTATIONES.

¹ Nicolai) In Græco non exstat codice: quapropter, nisi a nonnullis in usum quotidianum vocata esset, omitti potuisset.

² Hippofelini) Petroselinum Macedonicum ab officinis vocatur, vt lib. i. diximus.

³ Lithospermi) Milium solis hodie nominatur: quod etiam lib. i. monuimus.

⁴ Grana quinque) Sic legendum, non tria, veluti Typographi negligentia factum est, qui pro quin-

Hippofe-
linum.
Lithosper-
mum.

que tria legit. Nam in Nicolai codice sunt grana quindecim, quæ constituunt scrupulum dimidium, & A grana quinque.

Electuarium Iustini Nicolai. XLII.

Valeat aduersus dolorem renum, calculos atterit, & difficultati urina succurrit. Habet cinamo-
mi, folii, costi, spica nardi, casia lignea, aristolochia rotunda, helenii, hyssopi pulegii, arthemisia,
quinque folii, piperis albi, ²erui, petroselini, ³libystici, hippiscini, seminis urtica, lithospermi, saxi-
fragæ, baccarum iuniperi seminis asparagi, scifeleos, apii, anethi, ruta, citrii mali, fœniculi & anisi se-
minum, baccarum lauri, an. drach. unam, & dimidiam. Sacchari albiissimi.

ANNOTATIONES.

¹ Nicolai) Neque hæc in græco Nicolao, quod sciam, habetur: sed tantum in latinis codicibus repe-
ritur.

² Erui) Orobum græco nomine appellant officinæ. Quum vero Eruum legitimum hodie nondum a
nostratibus pharmacopœis agnoscat, succedaneo eius vtendum, quod est Ciceris nigri semen, vt supra
quoque dictum est.

³ Libystici) Neque Libysticum verum hodie habetur in nostratibus officinis, igitur eius succedaneo
interim dum agnosceretur vtendum: quod Staphylii semen erit, aut certe id, quod ipsis Leuisticum voca-
tur. Eandem namque facultatem obtinet. Aut id, cuius nos iconem in altero tomo de histo. stirpium de-
dimus.

Antidotus e nucibus, incerti auctoris. XLIII.

Antidotum e nucibus mirifice aduersus pestifera luis contagia confert. Accipit inglandium, nu-
mero viginti. Ficuum pinguium, numero quindecim, Ruta, manipulos duos. Absinthii, ¹par-
thenii, ²abiosa, an. manipulum unum. Radicis aristolochia longa, unc. dimidiam. Radicis aristolo-
chia rotunda, unc. unam, & dimidiam. Radicum tormentilla, ²petafitis pimpinella, dictamni albi
nominati, an. unc. duas Baccarum lauri, drach. tres. ³Foliorum dictamni Cretenfis, manipulam v-
num. Cornu ceruini vsti, drach. duas, & dimidiam. Macis, myrrha, boli armeni, terra Lemnia,
ana drach. tres. Salis marini, drach. unam, & dimidiam. Florum borraginis, manipulum unum.
Corticum citrii mali, unc. dimidiam. Contusa & trita omnia, & per cribrum t. nussimum traiecia,
excipiantur quantitate sufficienti mellis dissipati, vt formam electuarii accipiat.

ANNOTATIONES.

Et si mihi non satis constat, quis huius compositionis auctor sit, tamen ad propulsanda pestis contagia D
latis conducere videtur. Immutauimus tamen in plerisque non solum pondera, sed & medicamenta sim-
plicia. Sublatis enim nonnullis, vt nuce vomica, quæ quid sit in hodiernum vsque diem ignoratur, pro ea
alia substituiimus meliora. Neque enim Serapionis nux vomica est, vt secundo nostrorum de stirp. histo-
ria commentariorum tomo capite de malo Stramonia ostendimus. Præstat igitur hanc, tanquam igno-
tam, prorsus abiicere, & pro ea vt alio, quod ad præsens institutum conferre potest. Nos in eius locum
Cortices citrii mali aut semen eius, substituiimus.

Nux vo-
mica quid
sit igno-
ratur.
Parthenii.

¹ Parthenii) Cotulam fœtidam vulgus herbariorum appellant, quemadmodum alibi multis rationi-
bus ostendimus.

² Petafitis) Hanc nos, propter admirandam quam habet aduersus pestilentiam facultatem, adicimus,
Nec vlla ratione hæc ipsa pharmacopœis negligenda & omittenda erit.

³ Foliorum Dictamni Cretenfis) Et hæc a nobis addita sunt.

Antidotus ex ouo, incerti auctoris. XLIV.

Antidotus ex ouo magnam efficaciam aduersus pestilentia contagia habet. Constat ex oui vi-
tello, cum quo tantum Croci primo, reiecto albumine, permiscetur, vt oui putamen denuo com-
pleri possit. Deinde tandiu ¹assatur, quoad nigrescat. Tum pistillo conteritur, & ei admiscetur, Se-
minis ²eruca, radicis tormentilla, ³dictamni nostratis, albine, angelica, ⁴laserpis germanici, an. unc.
dimidia, Terra ⁵lemnia, drach. dua. Ligni aloes, coralli rubri, ana drach. vna, ⁶Radice petasitis, scrup.
duo. Cornu bestie unicornis, scrup. dimid. Theriaca Andromachi tantum, quantum vniuersa pen-
dent. Commixtis omnibus, formetur electuarium solidum.

ANNOTATIONES.

Antidoto hac olim Maximilianus, optimus & prudentissimus Imperator, vsus est, vt hinc etiam ap-
pareat illam non esse contemnendam, propter ea, quod a tanto principe non temere vsurpata, & in precio
fuerit.

¹ Assatur) Non desunt, qui hanc Antidotum propterea minus probent, quod Croci vis assando fran-
gatur, atque ita neque Crocus, neque vitellus ægrotis prodesse possit, sed medicamentarius siue pharma-
copœus ex is lucrum faciat. Pieri quidem nequit, quin Croci vim ex assatione non nihil frangi fateamur,
tamen non est, cur ob id vniuersum suam facultatem amittere antidotum existimemus. Neque etiam te-
mere ipsam assari, vna cum vitello credamus. Quum enim ad leuiorem teri, quod maxime in huius anti-
doti constructione requiritur, crocus & vitellus nequeant, necesse est, vt per assationem sicciora, adeoq;
ad terendum aptiora, reddantur. Qua de re in præparatione medicamentorum plura,

Maximi-
lianus im-
perator.

Crocus &
vitellos
cur assan-
tur.

- A** ² *Eruca*) Duabus de causis Erucae semen huic antidoto permiscetur, vna vt in longum tempus illud conferuet: altera, vt per vrinam educat noxia, quod in pestilentia optimum existit.
- ³ *Nostratis*) Quia Cretenis Dictamni folia tantum vsitata sunt.
- ⁴ *Lasertii Germanici*) Magistrantiam vulgus & officina medicorum vocant.
- ⁵ *Lemnia*) Terram sigillatam nominant.
- ⁶ *Radici petasitis*) Alii pro ea nucem vomica inuiciunt. Verum vt paulo ante dictum est, quum non satis constet, quid sit nux vomica officinarum, & Serapionis nux vomica vomitum admodum moueat, atque ægri antea abunde satis ad vomitum in hoc morbi genere irritentur, præstat has plane abicere, & pro eis radice petasitis, omnium præstantissimo remedio, & facile parabili vti.

Lasertii
Germani-
cum.

Electuarium Regium Mesue filii. XLV.

- B** *Electuarium regium, cerebrum, cor, thoracem, ventriculum roborat. Habet pinearum excorticatarum, uncias octo, Amygdalarum purgatarum, uncias sex. Sacchari albi, libras quatuor. Stillacii rosarum liquoris, lib. vnam, & dimidiam. Olei amygdalarum dulcium recentis, rosacei, ana unc. tres. Cinamomi selectissimi, drach. octo, & semis. Caryophyllorum, ana drach. tres. Santali flauui, ana drachmas tres. Ligni aloes, drach. quatuor. Ambre, drach. vnam. Moschi, scrupulum dimidium.*

Aliud XLVI.

- E** *Electuarium regium alterum, idem potest. Accipit pinearum excorticatarum, unc. sex. Amygdalarum dulcium etiam delibratarum, unc. quatuor. Stillacii rosarum liquoris, libram vnam, & dimidiam. Santalorum flauorum, drach. tres. Sacchari albi, lib. quatuor. Ambaris, drach. vnam, Moschi, scrup. dimidium.*

ANNOTATIONES.

- ¹ *Regium*) Ita vero dictum est, quod eo vsi sint reges, & principes, alique qui deliciis studebant. Hodie eiusmodi electuaria, latinis dulciarii panes, vulgo corrupta ex massa panis voce, Marze panes, vel Marcii panes vocantur, vbi scilicet cum saccharo in formam liborum, ac panis coguntur. Horum hic facere mentionem volui, vt pharmacopœi hinc conficiendorum horum panum exemplum caperent.
- ² *Uncias sex*) Meliores codices legunt uncias quinque, quod etiam facit Nicolaus Myrepsicus.
- ³ *Olei amygdalarum, &c.*) Olca hæc ex hac compositione prorsus sunt amouenda, quod vomitum, si simul aliis misceamus, moueant. Hinc est, quod Nicolaus Myrepsicus in sua compositione, quam mox subiiciemus, ea omiserit.
- ⁴ *Drachmas octo*) Castigationibus in codicibus legitur, drach. quatuor, & dimidiam. Nam præstat Cinamomi, & aliorum etiam aromatum imminutam esse quantitatem.
- D** ⁵ *Santali flauui*) Et hi omitti possunt, quod gustui multorum ingratifint.
- ⁶ *Ambaris*) Et hæc nimia est quantitas, quod non solum sumptuosam, sed & nimio odore ingratam compositionem efficiat.

Dulciarii
panes.
Marze pa-
nes.

Dulciarium Nicolai Myrepsici. XLVII.

A *ntidotus ad tussientes, de fluxione capitis laborantes, & ad imbecillitatem corporis admodum bona. Capit nucum pinearum, unc. octo. Amygdalarum, drach. quinque. Cinamomi, unciam vnam. Caryophylli, maceris, ana drach. septem. Ligni aloes, drach. sex. Santali flauui, drach. quinq. Ambaris crudi, drach. vnam. Sesami repurgati, unc. vnam. Vrticæ seminis, unc. dimidiam. Gossipii seminis, unc. dimidiam. Moschi puri, siliquas tres. Sacchari & stillacii rosarum liquoris, quod satis est.*

ANNOTATIONES.

- E** ¹ *Dulciarium*) Hoc subiicere placuit, vt Mesue filii Electuariis regis aliquid lucis accederet. Nam vel Nicolaus ex Mesue filio, vel vterque ex vno eodemque auctore ipsis vetustiore, has compositiones descripserunt. Id quod e medicamentis ipsis, quæ compositiones illas constituunt, fit manifestum. Sunt enim, paucis exceptis, vtrobique eadem.
- ² *Quinque*) Apud Mesue filium sunt drachmæ sex, quum tamen hanc lectionem errore non vacare satis constet, quod Nicolaus, & meliores etiam filii Mesue codices quinque tantum drachmas habeant.
- ³ *Unciam vnam*) Et hic Mesue filii codices variant, minusque recte dimidiam unciam adiiciunt.
- ⁴ *Septem*) Apud Mesue filium defunt drachmæ quatuor.
- ⁵ *Sex*) Ibidem duæ desiderantur drachmæ.
- ⁶ *Sesami*) Additur exemplo veterum, qui πέρυρα, & τραγύρα, hoc est, placentas, & bellaria ex Sesamo, & melle parabant.
- F** ⁷ *Vrticæ*) Non temere Vrticæ semen adiicitur, nam illi singularis facultas inest educendi ex thorace quæ crassa, & lenta sunt.
- ⁸ *Gossipii*) Siquidem semen hoc tussi & thoracis vitiis mirum in modum confert. Vt igitur Dulciarium suum Nicolaus ad tussim & thoracis vitia totum accommodauit, ita medicis pro varietate affectuum, quibus laborant & grotantes, iam hæc quæ dicta sunt, iam alia quædam nucibus pineis, & amygdalis addi possunt. Sic vtiq; in calidis affectibus in aromatum locum substitui possunt semina lactucæ, portulacæ,

Vrticæ se-
men.
Gossipii
semen.

intybi, melonum, cucurbitæ, & cucumeris. Quod adiciendum esse duxi, vt subinde ad Marcios vocatos A panes conficiendos pharmacopolæ instructiores essent. |

Diaspermaton, Nicolai Myrepsici. XLVIII.

Antidotus e seminibus confert ad ea, ad quæ Antidotus ex aniso, & cumino. Capit cumini, carei, ammeos, anisi, dauci, apii, petroselinii, amomi seminum, an. ² drach. duas. Cinamomi, libystici, an. drach. vnam. Zingiberis, galanga, cardamomi, caryophylli, spica folii, an. drach. dimidiam. Se- seleos, scrup. vnum. Piperis longi, ³ scrup. dimidium. Sacchari albißimi.

AN NOTATIONES.

¹ Nicolai Est & alia e seminibus Mesuæ filii, huic persimilis, demptis ponderibus, quæ in Mesuæ filio sunt maiora: & quod hic petroselini etiam mentio fit, quæ in Mesuæ descriptione desideratur. Vtraque concoctionem ventriculi iuuat, obstructions aperit, licentiam sanat, & dolores viscerum a flatibus excitatos placat. Est digna, quæ in vsum reuocetur, tum propter veteres, qui crebro ea vti sunt, tum propter miram suam facultatem.

² Drachmas duas Nicolai habet L. id est, drachmam vnam, sed minus recte. Est enim climax, ideoque vt primum eius pondus sit drachmæ duæ oportet.

³ Scrupulum dimidium Nicolai habet, grana quindecim, id est, scrup. dimidium, & grana tria. Nos ne Climacis rationem turbaremus, scrup. dimidium tantum de pipere adicere volumus.

Antidotus Cordialis, Incerti auctoris. XLIX.

Core pestis contagione maxime conseruat & tuetur. Accipit radicem dictamni albi, siue pseudo- dictamni Zedoaria, herba tunica vocata, seu betonica altilis, tormentilla, an. vnc. dimidiam. Radicis pimpinellæ, drach. tres. Dictamni cretensis, scordii, trifolii odorati, ligni aloes, an. drach. duas. Sigilli Lemnii, boli armenii, corticum citrii mali, croci, santalorum rubeorum & alborum, ramentorum eboris, ana drach. vnam. Coralli albi & rubei, charabæ candida, unicornu, phu, granatorum, margaritarum, hyacinthorum, an. scrup. duos. Serici crudi vsti, anthera, mastiches, an. drach. dimidiam. Ossis cordis ceruini, scrup. vnum. Moschi, ambre, an. scrup. dimid. Sacchari albißimi, quod satis est.

DE MEDICAMENTIS, TVM LENIENTIBVS alium, tum purgantibus, liquidis & solidis, Sectio V.

Flores casie nigrae. I.

Siliquæ casie ponderosæ, & quæ concussæ non resonant, aperiuntur, ac contenta in Sillis medulla cum laminis & seminibus suis eximitur. Exempta super angustum, fetisque equinis contextum inuersum cribrum proiciuntur. Post cribro supra feruentis D aquæ vaporem imposito, medulla casie auerso cochlearis conuexo hinc inde traduci- tur, vt per cribrum paulatim traiciatur. Quicquid vero medullæ hac ratione per cri- brum traiectum est, confestim subinde aufertur, ne scilicet plus quam conueniat vapo- ris aquæ imbibat. Idque tantisper faciendum, donec² quantum voles collegeris.

AN NOTATIONES.

Flos casie.
Facultates
florum ca-
sie.

¹ Flores Casie Differunt a Casia extracta, de qua sequenti capite dicemus. Nam flos Casie est eius me- dulla, siue pulpa sincera, quæ citra vllum decoctum ex siliquis exempta est. Proinde idem, quod Casia po- test: nempe bilem & pituitam innoxie a ventriculo leniendo alium deducit, ac sanguinis biliosi, ipsiusq; bilis acrimoniam frangit, sanguinemq; puriorem reddit. Thoracis, pulmonis, & asperæ arteriæ phlegmo- nas resoluit, easque partes lenit ipse morfus omnis expers, præsertim cum succo vel serapio glycyrrhizæ sumptus. Denique intemperiem renum calidam mitigat, cum iis quæ vrinam mouent sumptus, & in iis E calculum gigni prohibet.

Vt Casie
flos validi-
us alium
ducat.

² Quantum voles colligere Nam multa eius copia vna vice eximenda non erit, quod repositus facile ac- cesscat. Qui, vt vehementius moueat alium, Casie florem efficere cupiunt, ii in feruentem ac bullientem aquam folia Perfici, aut eiusdem flores proiciunt. Horum siquidem vapor ex aqua sublatus, & flori Casie permixtus, efficit vt alium magis ducat.

Casia extracta sine foliis sena. II.

Recipit prunorum numero 12. Violarum, manipulum vnum. Hordei repurgati, anisi, polypodii, seminis cartami, an. drach. quinq; ² Adianti, thymi, epithymi, an. manipulum dimid. Passularum vnc. dimid. Seminis feniculi, drach. duas. Seminis portulacæ, & maluæ, an. drach. tres. Glycyrrhizæ, vnc. dimid. Coquantur in aqua iuste quantitatis, colentur, & in colatura diluantur medulla casia, libra dua, Tamarindorum, vnc. vna. Cinamomi drach. tres, Sacchari optimi, libra vna. Coquan- tur ad perfectam consistentiam. P

AN NOTATIONES.

Casia ex-
tracta.

¹ Casia extracta est, quæ operam dicti decocti e siliquis extrahitur, medulla. Siliquas quoque hoc decocto interiore parte nonnulli colluunt, ac subinde aliis hic commemoratis adiectis, ad consistentiam coquunt, ac Casiam extractam nominant. Sunt qui pro Casie medulla extrahenda, sequenti decocto vt

A malint, quod habet, Florum violarum, manipulum vnum, & dimidium. Florum borraginis, buglossi, intybi, cichorii, ana Manipulum vnum. Prunorum damascenorum, numero quindecim. Passularum, vnc. vnam. Glycyrrhizæ, vnc. dimidiam. Oxyphœnicon, vnc. vnam. Ficum, numero sex. Corticum myrobalanorum flauorum, chebulorum, ana vnciam dimidiam. Thymi, epithymi, ana drach. tres. Cinnamonomi, drachmas duas, & dimidiam. Santali rubci, drach. dimidiam. Seminis fœniculi, drach. vnam, & dimidiam. Contusa macerentur in tribus libris aquæ horis 24. dein bulliant, & decoquantur ad tertias: postea valide exprimantur, & adiciatur Sacchari libra dimidia. In hoc decocto medulla casia & siliquis extractæ diluantur libras tres, & decoquantur ad consistentiam.

² *Adiant.*) Officinæ noua appellatione Capillum Veneris nominant.

Decoctum aliud, quo extrahitur Casia medulla.

Casia extracta cum folijs Senæ. III.

Adiantum.

B *Expedite aluum subducit, intestinorum asperitatem lenit, & morbis biliosis ac melancholicis auxiliatur. Accipit casia sine folijs Senæ extracta, libras duas. Pulueris foliorum Senæ, vnc. duas. Commisceantur, & ad legitimam consistentiam redigantur.*

Casia extracta pro clysteribus. IV.

C *Apit violarum florum, violarum foliorum, malua, mercurialis, beta, parietaria, ana manipulum vnum. Coquantur in aqua iusta quantitatis, & horum decocto medulla casia extrahatur, eiusque siliqua eluantur. Dein accipiat medulla casia hoc modo exempta, & ad consistentiam cocta, libra vna. Sacchari, libra vna, & dimidia, & coquantur ad perfectam consistentiam.*

ANNOTATIO.

Hæc Casia iniecta per clysterem, aluum leniter, & citra omnem molestiam subducit: estque pro delicatissimis ac mollioribus aptissima.

¹ *Dia cassia cum manna. Incerti auctoris. V.*

C *onfert ijs, qui dura sunt aluo, hanc enim leniter & citra molestiam subducit, ac flauam educit bilem, febresque inde natas mitigat. Habet prunorum damascenorum, vnc. duas. Florum violarum, Manipulum vnum, & dimidium. Aqua fonante, vnc. decem & octo. Bulliant usque ad medietatis consumptionem, colentur, & in colatura diluantur medulla casia, vnc. sex. ² Pulpa tamarindorum, vnc. vna. Manna optima, vnc. duæ. Serapij violacei, vnc. quatuor. Sacchari candidi, sacchari penidij, ana vnc. vna. Sacchari violacei, vnc. quatuor. Commisceantur, & ad iustam redigantur consistentiam.*

ANNOTATIONES.

¹ *Diacassia.*) Non est in frequenti medentium vsu: tamen quum plerique varietate delectentur, eaque compositione vtantur, silentio transire illam nolimus.

D ² *Pulpa tamarindorum.*) Hæc quidem instar florum Casia fit, Tamarindis per cribrum e pilis equinis contextum, angustumque traiectis.

Pulpa tamarindorum.

Dia manna, Nicolai. VI.

P *rodest ad purgandum sanguinem, flauam & atram bilem reprimendam, ad iecur calefactum, & vniuersi corporis purgationem. Caput adianti, ² scolopendrij, ³ lichenis, ana vnc. tres. Seminum cucurbitæ, citruli, cucumeris, melonis repurgatorum, violarum, ana vnc. vnam. Prunorum damascenorum, numero viginti. Coquantur in sufficienti aqua ad dimidias, dein colentur & exprimantur: inque colatura diluantur manna optima, sacchari violacei, medulla casia recens extracta, ana vnc. quatuor. Tamarindorum, sacchari rosacei, ana vncia vna. Coquantur ad mellis consistentiam, & deinde sequentes injiciantur species, quæ habent seminum quatuor frigidorum decorticatum, florum violarum, & nymphae seminum lactuca, ⁴ intybi angustifolij, portulacæ, ana vnc. vnam. Rhei barbari, foliorum senæ, ana vnciam vnam, & drach. vnam. His accurate permistis & subactis, fiat electuarium.*

ANNOTATIONES.

¹ *Nicolai.*) Non exstat, quod sciam, in Græco manuscripto Nicolai codice. Ex Latinis igitur desumpta est, & in plerisque officinis vsitata.

² *Scolopendrij.*) Hoc nomine intelligenda stirps erit, quæ Seplasiis barbara voce Ceterach dicitur, vbi alibi fufius docuimus.

Scolopendrium.

³ *Lichenis.*) Lichen herba est, quæ officinis Hepatica nominatur.

Lichen.

⁴ *Intybi angustifolij.*) Vulgus Medicorum Scariolam vocat.

Intybum angustifolium.

Electuarium lenitiuum, Incerti auctoris. VII.

F *VAlet in febribus ex humorum putredine natis, & pleuritide. Emollit enim aluum, & vtramque bilem sine molestia & innoxie educit. Accipit passularum, exemptis acinis, vnc. duas. ¹ Adianti nigri, violarum, hordei repurgati, ana Manipul. vnum. ² Ziziphorum, ³ myxorum, ana num. viginti. Glycyrrhizæ, vnciam dimidiam. Prunorum exemptis nucleis, tamarindorum, ana drach. sex. Senæ polipodij, ana vnc. duas. Mercurialis, manipulum vnum, & dimidium. Decoquantur ex præscri-*

pro artis in aqua iusta quantitatis, dein per colum traiciantur: & colatura addantur medulla A
casia, pulpa⁴ oxyphænicon, pulpa prunorum, sacchari optimi, sacchari violacei, ana vnc. sex. Pul-
ueris senæ, vncias tres, drach. tres, & dimidia. Coquantur ad consistentiam perfectam, & fiat ele-
ctuarium.

ANNOTATIONES.

Adiantum 1 *Adiantum nigri.*) Adiantum nigrum, est altera Capilli Veneris species: quam in primo nostrorum
nigrum. de Stirpium historia commentariorum tomo descripsimus, & pinximus. Nisi quis Trichomanes hoc
nomine accipere velit.

Z-zipha. 2 *Z-zipha.*) Fructus sunt officinis Iuiubæ dicti.

Myra. 3 *Myxorum.*) Myxa fructus sunt, qui Seplassis hodie Sebesten nominantur.

Oxyphæ- 4 *Oxyphænicon.*) Oxyphænica sunt fructus, quos Tamarindos appellant, quod libro i: quoq; dixi-
mica. mus, ad quem perpetuo in ignotis dictionibus Pharmacopœi confugere debent.

Medulla seu pulpa prunorum. II X.

Calorem, ac sitim in febribus mitigat & exstinguit. Recipiuntur pruna grandia, acida & vino-
sa, quantitate qua lubet: & exemptis nucleis in fictili vitreato coquuntur, deinde per cribrum
setaceum traiciuntur. Traiecta medulla iterum lento igne ad iustam consistentiam coquitur, & sine
saccharo reponitur.

Antidotus e¹ Damascenis prunis. Nicolai Myrepsici. IX.

Facit ad acutas, & dentes, omnesq; alias febres, nempe tertianas continuas, heclicas, marasmodos,
lipurias, & in summa ad omnem febrilem affectum. Capit pruna Damascena centum. Hac in aqua
2 iusta quantitatis decoquuntur, 3 quoad tertia pars aqua absunta fuerit, dein ab igne remouentur,
& ubi modice refrigerunt, subiguntur, & probe manibus confricantur, tantisper dum caro eorum o-
mnis dissoluitur in aqua: & ossa duntaxat, & cortices remaneant. Postea cribro raro transmittun-
tur, relicto hoc iure, 4 aliaq; accepta aqua, illi imponuntur violarum vnc. dimidia. Sacchari libra
dua, & lento igne ad mellis; aut 5 Serapij crassitudinem decoquuntur. Dein ab igne remouentur, &
per saccum transfunduntur. Hoc peracto, accipitur de aqua prunorum Damascenorum, qua prius
per cribrum transfusa, & in succum redacta fuit, libra una, & commiscetur cum 6 Serapio viola-
rum, simulq; iterum bulliant, donec virag; ad mellis consistentiam veniat. Dein ab igne deponuntur,
& sinuntur, accipiturq; 7 Oxyphænicorum, medulla casia extracta, ana vncia una, & 7 cum aqua
altera calida probe subiguntur, ac subacta per saccum transfunduntur: atq; hec eadem aqua rursus
conijcitur in lebetem, in quo est succus prunorum & serapium. Vbi probe 8 simul subacta fuerunt,
iterum 9 calido cineri imponuntur, & posteaquam una ebullitione in altum sublata fuerunt, ab igne
remouentur, & rudicula aut cochleario probe agitantur. Dein inijciuntur santali albi & rubei,
10 spodij, 11 rhei barbari, ana drach. tres. Rosarum, violarum, seminis portulacæ, 12 intybi, * oxya-
canthæ, succi glycyrrhizæ, tragacanthæ, ana drach. dua. Seminum melonum, cucumeris, cucurbitæ,
citruli repurgatorum, ana 13 drachmas duas. Omnia hæc simul trita, & per cribrum probe traiecta
lebeti, ut dictum est, inijciuntur, & calefacta simulq; subacta in vase reconduntur. Quod si, ut hæc
Antidotus alium subducit ac purget, efficere volueris, ubi ab igne illam remoueris, admisce dacry-
dij, 14 drach. quatuor, in singulas libras.

ANNOTATIONES.

Diaprunis 1 *E Damascenis prunis.*) Nicolaus hanc Antidotum ita vocat, nempe ἀντίδοτον τῆς ἐξ ἀμαρηνῶν.
simplex. Diaprunum alii, officinæ Diaprunis nominant: & eam quidem quæ citra Dacrydii adiectionem con-
Solutina. stat, simplicem: eam vero quæ dacrydium recipit, Solutinam appellant.

2 *Iusta quantitatis.*) Tanta nimirum, quæ pruna tegere queat.

3 *Quoad tertia pars.*) Sic habet Nicolai codex manuscriptus Græcus, quem in hac describenda An-
tidoto secutus sum. Latini codices Pruna percoquenda esse vsq; ad dissolutionem præcipiunt: quod in
idem recidit cum eo quod paulo post Nicolaus ait, tantisper manibus esse confricanda, donec caro eo-
rum omnis dissoluatur.

4 *Aliaq; accepta aqua.*) Hic plurimum variant Latini codices, ac aquam in qua pruna bullierunt,
accipiendam esse præcipiunt, & in ea dimidiam vnciam violarum cum sacchari duabus libris coquen-
dam esse docent.

Serapium. 5 *Serapii.*) Serapium vocamus id, quod vulgus Pharmacopœorū & Medicorum Syrupum nominat.

6 *Serapio violarum.*) Quod scilicet ex alia aqua, violis, & saccharo confectum est.

7 *Et cum aqua altera calida.*) Et hic iterum variant Latini codices: & Oxyphænica, seu Tamarin-
dos, & casiam extractam cum aqua prunorum, ad crassitudinem decocta permiscendam, & subigendam
esse iubent.

8 *Simul subacta.*) Quod sane hic & in omnibus medicamentis purgantibus obseruandum erit. Sic
enim in illis omnia ligneo pistillo & rudicula miscenda sunt, ut omnia vnum & idem tum consistentia,
tum

A tum colore esse videantur. Si enim negligentē commiscētur, sēpe vfu venīre solet vt species in vna parte quasi conglobentur, in alia vero vix sensu percipi queant. Vnde profecto agris non parum periculi est. Medicis vero & Pharmacopœis ignominiz ac calumniz occasionem affert.

9 *Calido cineri.*) Aut lento igni, vt Latini habent codices, admouentur.

10 *Spodii.*) Hoc etiam in loco Spodium intelligit Myrepsus id, quod alio nomine Ebur vñū dicitur. Habet enim id, perinde atq; Santalā, adstringendi ac roborandi facultatem, vt iam sēpe numero monuimus. Ne scilicet per hoc quispiam imperitus Spodium Græcorum, aut cannā dictum inaudiat.

B 11 Notat me hoc quoq; in loco Franciscus Alexander, quod post rhei barbari mentionem cinnamomum omiserim. quasi vero mihi inferendum huic compositioni fuerat, q̄ in Græco codice desiderabāt. Scio quidem eius fieri mentionem in Nicolai Præpositi codice, mirari autem satis non possum, cur hoc loco eius lēctionem sequi voluerit, quem tamen in Hiera legadii disertis verbis scribit, neq; literas scire, neq; natare, & omnia perueritisse, deprauasse, ac corrupisse, atq; a Myrepsi mente abalienasse. Et quare adiceremus, tanta præsertim copia, cinnamomum, quum hoc antidotum ad exstinguendum febrilem calorem potissimum sit paratum? Sed voluit Matthiolum, quem tamen hoc nomine reprehendit nunquam non, imitari Franciscus, non sine multorum risu.

12 *Intybi.*) Simpliciter in Græco manuscripto Nicolai codice *ιν τιβι*. Latini habet Scariolā, & ad an- Intybū m. gustifolium Intybum detorquent. Verum nihil refert, vt sēpe iam diximus, Scariolę aut Endiuiz vocatę herbę semen accipiant Pharmacopœi, quum eiusdem esse vtrāq; facultatis constet. Legitimo autem de Intybo mihi sermo est, non de adulterino, quod est Lactuca sylvestris, vt lib. I. quoq; monuimus.

13 *Drachmam vnā.*) Negare non possum, me in Myrepsō cōuertisse drach. duas, quia ille habeat *Λβ*. Quia vero quum codicem Græcum inspicerem, video me in margine alterā etiam annotasse lēctionem, quod nimirum aliqui pro *β*, legerent *α*. Sed ne alii Præpositi illius deprauatoris me temere motum auctoritate dicerent, mutata hac lēctione, Myrepsi vt præferrem placuit. Habet igitur nunc eius varietatis rationem Franciscus. Quod non vsquequaq; meam lēctionem sequitur, id & ego facio.

C 14 *Drachmas quatuor.*) Nicolaus Græcus non exprimit pondus. Latini autem codices habent, Septem drachmarum pondus. Sunt autem ex Pharmacopœis qui plus, & qui minus dacydii adiiciūt. Alii enim ad singulas libras vnciam vnā dacydii, alii vnciam dimidiam, sicq; Medicis ignorātibz mirifice imponunt. Nam tum accidere solet vt medicamentum exhibitum vel vehementius, vel minus quam ex istimentis sperarint, purget. Præstat autem in medio consistere, & ad singulas libras addere dacydii vnciam dimidiam. Ceterum codex Nicolai Cinamomum non habet, ideo nos quoq; illud omisimus. Cucumeris autem diserte meminit, quare omitti non debet. Quæ adicere propter Cordum voluimus, Cordus qui diuersum in suo medicamentario libro annotauit.

Electuarium¹ e myxis. Montagnana. X.

D *Confert febribus biliosis intermittētibz, ac continuis exquisitis, febriumq; vehementiū sedat, sitim exstinguit, vigilias ardet, & acres humores per urinam educit. Habet myxorū recentium sine ossibus, vnc. quinq;.² Macerantur in libra vna aqua stillatitia violarum, deinde bulliant & colentur. Decocto percolato admisceantur aquarum iridis,³ anguria, ana vnc. sex. Prunorum siccorum contusorum, oxyphænicon, ana vnc. quinq;. Seminum cucurbitæ, cucumeris, melonum, citruli, ana vncia vna, & dimidia. Succus mercurialis, vnc. quatuor. Coquantur ad dimittias, dein valide exprimantur, ac colo traiciantur, adijcianturq; penidiorum vnc. octo. Antidoti e prunis simplicis, libra vna, & dimidia.⁴ Dacydij, drach. tres. Misceantur, & formetur electuarium. Propinatur pondere vncia vnius.*

ANNOTATIONES.

E 1 *E myxis.*) Myxa recentioribus Græcis, vt iam aliquoties diximus, & Myxaria per diminutionem Myxa dicta, officinis Sebesten vocantur. Quapropter præsens Electuarium Seplasiarius, & Medicis hodie Electuarium de Sebesten appellatur.

2 *Macerantur.*) Non latet, alios alia ratione hoc medicamentum parare: tamen hæc visa est mihi Electuaris
um de Se-
besten. melior.

3 *Anguria.*) Anguria non est nisi Cucumis omnis generis: & nequaquam, vt Cordus annotauit, Melon magnus. Nam quod veteres Græci *ἀνγούριον*, Aetius, Simeon Sethi, Nicolaus, & alii recētiore Græci *ἀγγούριον* nominant. Per aquam igitur Anguriz, Mōtagnana intelligit succum Cucumeris: & per aquam iridis, succum iridis. Et hoc loco me pungit Franciscus Alexander, falsoq; perstringit, quod flores violarum & citrulos omiserim, quum bona fide Montagnanę compositionem ad verbum ex eius libro describerem, in quo florum violarum nulla fit mentio. Quid enim attineret illos adicere, quum libra integra aquę stillatitię earundem ingrediatur. Citrulorum vero vnciam & dimidiam inserui. Vt meræ sint Anguria.
Cordus
errat.
Aqua an-
guriz.
Aqua iri-
dis. Francisci calumniæ.

F 4 *Dacydij.*) Dacydium est, id quod corrupta voce officinis, & vulgo Medicorum Diagridium dicitur, vt iam aliquoties monuimus.

¹ *Hiera⁴ veterum simplex. XI.*

Hiera veterum simplex hodie appellata, præstantissimum medicamentum est ad visiosos succos, Hiera sim Hiera sim qui in ventriculi tunicis hærent. Vtiliter quoq; exhibetur ijs qui suffusorum imagines & alia plex.

Symptomata ex stomachi vitio patiuntur: & prater ea ijs qui aluo adstricta sunt, & mulieribus quæ non probe purgantur. Accipit cinamomi, xylobalsami, asari, spica nardi, croci, chie mastiches, ana drach. sex. ¹ Aloes, drach. ² centum. Mellis despumati, quod satis est.

ANNOTATIONES.

Hiera vnde dicta. Picra. ¹ *Hiera.*) Ita nominarunt Græci, quasi sacram, ab operibus & facultatibus suis diuinis & mirabilibus: aut certe quasi magnam. Solemne enim est Græcis *hieros* appellare magnum. Magna itaq; est, propter excellentes suas facultates. Iisdem quoq; picra, vt hodie etiam, vocabatur: id est, amara, ob aloen, quæ mirifice amara est, & magna copia eius compositionem ingreditur.

² *Veterum.*) Quod adiecimus, ad detegendum errorem eorum, qui hieram hanc Galeni esse putant. Neq; enim a Galeno inuenta, sed multis ante ipsum annis celebrata fuit a Themisone, Asclepiade, & aliis quibusdam vsurpata. Sicq; Romæ Galeni temporibus parabatur.

Hiera nō a Galeno inuenta. Aloes. ³ *Aloes.*) Simpliciter effertur, quod hanc dupliciter confectam habuerunt: vnam ex elota aloes, alteram ex non lota. Prior aluum minus subducit, & ventriculum magis roborat. Siquidem lota aloes multum medicamentose facultatis deposuit. Altera magis aluum subducit, & minus roborat. Posset itaq; vtroq; modo a Pharmacopœis parari, & prior appellari Hiera simplex cum aloes lota; altera vero cum aloes illota.

Error Pharmacopœorū. ⁴ *Centum.*) Hinc patet error officinarum nostrarum, quæ ad omnia simplicia simul sumpta duplam, id est, septuaginta duarum drachmarum tantum aloen, idq; ex Mesuæ filii auctoritate, admiscunt, quum veteres triplam eiusdem portionem reliquis miscuerint. Nam pro aliorum cuiusq; drachmis sex, quæ in vniuersum sunt triginta sex, adiiciunt aloes centum drachmas. Hinc est quod hieræ picræ veterum sicæ drachma vna probe purgat, quum vulgaris officinarum hieræ sicæ drachma vna, & dimidia, parum sit efficax. Adeo vt interdum ad duas, & plures etiam progrediendum sit. Debent itaq; deinceps Pharmacopœi Hieram ad modum a veteribus, aut Galeno præscriptum parare.

Hiera Galeni. XII.

Idem quod prior potest. Recipit cinamomi, xylobalsami, asari, spica nardi, mastiches chie, ana drach. sex. ² Croci, drach. quinq;. Aloes, drach. nonaginta. Mellis despumati quantum sufficit.

ANNOTATIONES.

¹ Hæc Hiera merito Galeni dicitur, quod ea, vt metipse libro secundo de Compos. medic. localium, cap. 9. testatur, vsus sit, nec temere. Nam ad eum constructa modum præstantior est. Siquidem nimiam aloes copiam centum drachmas esse idem docet, ad proportionem reliquorum quibus hæ adduntur: quapropter per nonaginta duntaxat drachmas Hieram composuit.

² *Croci, drach. quinq;.*) Crocum parcius misceri voluit Galenus: quod sint, quorum capita Crocus odore suo ferit.

Hiera cum agarico. XIII.

Habet specierum hieræ simplicis sine aloes, agarici trochiscati, ana vnc. dimid. Aloes illota, vnc. vnam. Mellis despumati, vnc. sex.

Hiera composita. Nicolai Myrepsici. XIV.

Facit ad vitium stomachi, & cruditatem, ileum, subuersiones, capitis dolores, hemi-
cranium, lienosos, iecinerosos, stomachicos, & vomentes cibum. Similiter anginosos, epilepticos, destillatione laborantes iuuat. Caput cinamomi, spicæ nardi, croci florum iunci odorati, asari, casia lignæ, xylobalsami, carpobalsami, violarum, absinthij, epithymi, agarici, rosarum, turpeti, mastiches, pulpæ colocynthidis, ana ¹ drach. dimid. Aloes flauæ, ² quatum omnium aliarum specierum. Mellis optimi despumati, quod satis est. Datur pondere vnciæ dimidiæ.

ANNOTATIONES.

Ad enematum vsus valde vtilis.

Cordus. ¹ *Drachmam dimidiam.*) Cordus habet scrupulos duos. Sed nos fidem Græci codicis secuti sumus qui habet drachmam dimidiam.

² *Quantum omnium aliarum specierum.*) Id est, drachmas octo.

Hiera Logadij. Nicolai Myrepsici. XV.

Mala diuturna ex melancholia facta transmutat, & propulsat. Appetentiam excitat, & robur corpori inducit, egrotantemq; hilarem reddit. Comitiali morbo laborantibus, veriginosis, subito concidentibus, spumantibus, & linguam mordentibus, conuulsis, ita vt putentur ab aliquibus, a demone obsessi esse, confert. Biliosis, & elephantia correptis inter initia conuenit. Prodest ijs qui feris impetiginibus laborant, lethargicis, & ijs qui inuoluntarie alui excrementa emittunt, potissimum vero ¹ ijs qui lethalia venena hauserunt. Dolorem quoq; sedat, & iecinerosus vtilis est. Datur etiam pleuritidis, & ijs quibus pericardium laborat. Educit enim vitiosos humores, & mouet mulierum menstrua. Ischiadicis, & lumborum dolore infestatis admodum competere creditur, & omnibus diuturnis vitij ter singulis mensibus summa. Accipit pulpæ colocynthidis, polypodij, ana ² drach. duas. Euphorbij, poly,
cocco-

Agnidy, ana drach. unam, & dimidiam, grana sex. Absinthij, myrrha, ana drach. unam, grana duodecim. Centaurij minoris, agarici, ammoniaci thymiamatis, folij, scille, spica, dactydy, ana drach. unam. Aloes flaua, corymborum thymi, casia lignea, chamedryos, bdelly, marrubij, ana scrup. vnum, grana quatuordecim. Cinamomi, opopanacis, castorij, aristolochia longa, trium piperum, croci, sagapeni, seminis petroselin, ana drach. dimidiam. Ellebori nigri & albi, grana sex. Mellis despumati, quod satis est. Datur pondere trium drachmarum.

ANNOTATIONES.

- 1 **Hiera Logadii.**) Sic recte inscribitur, Aetio & Nicolao testibus hanc compositio. Cordus secutus Latina & mendosa exemplaria, Hiera Logodion inscripsit, Latini autem codices Nicolai Praepositi nominati, Hiera Logodium memphitum appellant, quum tamen Hiera Logadii Memphitz apud Græcum Nicolaum ab ea sit diuersa. Ridiculum autem est, quod in huius vocis interpretatione affert Platearius. Siquidem ille ait, Dicta est hiera, id est, sacra: & logos, sermo: & memphitum, impeditum. curat enim impediam locutionem. Adm dicitur piunischuch. Quid hac interpretatione ineptius confingi potuisset? quum satis constet, Logadium proprium esse nomen eius, qui huius Hieræ auctor fuit. Is Memphites cibus est ab oppido Memphi, unde oriundus fuit. Sed mittamus has ineptias.
- 2 **Drach. duas.**) Nicolaus Græcus manuscriptus habet diserte Drachmas duas. Quapropter non est legendum vncias duas, vt in nonnullis mendosis exemplaribus scriptum reperitur.
- 3 **Polij.**) Simpliciter legitur tam in Græco, quam in Latino codice. Montanum igitur intelligitur.
- 4 **Scille.**) Simpliciter est in omnibus Latinis & Græcis Nicolai codicibus. Cordus autem assatz, ex Aetio adiecit.
- 5 **Drach. vna.**) In Græco Nicolai codice est Vncia vna. Sed videtur hoc pondus esse nimis, adeoque locus mendosus: quod etiam testantur Latini codices, in quibus omnibus legitur Drachma vna.
- 6 **Corymberum thymi.**) Corymbos alij comas nominant, quod in idem recidit. Intelligit enim summitates, siue cacumina Thymi.
- 7 **Scrupul. vnum.**) Ita Græcus manuscriptus Nicolai codex habet. Quare Cordus non recte immutauit hoc in loco pondus, & pro scrupulo vno substituit scrupulos duos, quum constet, Latinum quoque codicem duntaxat scrupulum vnum habere.
- 8 **Grana sex.**) Manuscriptus Nicolai codex legit Drachmas sex, sed repugnantibus omnibus Latinis exemplaribus. Accedit, quod plusquam dimidia huius Antidoti pars ex purgantibus medicamentis consistet, etiam si grana sex tantum de Elleboris accipiantur. Quapropter censco sufficere grana sex.

Hiera Pacchij scribonij Largi. XVI.

DSanat morbo comitiali correptos, furiosos, vertigine laborantes, diutino capitis dolore infestatos. Item ad lateris dolores facit, asthmaticos, vocem amissam, subitas praefocationes, incubum, conuulsionem caninam vocatam: ad eos qui ex alto lapsi sunt, neruorum tensiones, resolutionesque. Prodest articulari morbo, ad spina ac lumborum dolores. Item podagra mirifice auxiliatur. Duritias in mulierum mammis cum dolore consistentes leuat, & interdum ex integro sanat. Stomachicis mirum in modum confert. Remedio est is, quibus cibus in ventriculo acescit, & nausea assidue infestantur, & salua abundant. Melancholicis autem precipue benefacit. Recipit stichadi, marrubij, chamedryos, agarici, colocynthidis, ana drach. decem. Opopanacis, sagapeni, seminis petroselin, aristolochia rotunda, piperis albi, ana drach. quinq. Cinamomi, spica nardi, myrrha, poly, croci, ana drachm. quatuor. Opopanax & sagapenum in mortario teruntur, adiecto melle tenui: id est, quam liquidissimo. Cetera arida trita & cribrata melle despumato, ad comprehendendum ac continendum sufficienti excipiuntur.

ANNOTATIONES.

- 1 **Scribonij Largi.**) Qui libri sui de Compositione medicamentorum cap. 97. & sequentibus aliquot, hanc Hieram ad Pacchium Antiochum auditorem Philenidis Catinenfis auctorem refert, & miris laudibus in cælum vsq; effert. Siquidem illum, ex ea magnum, ob crebros successus, questum fecisse in difficillimis vitis idem testatur. Nec se viuo vlli compositionem hanc dedisse, sed post eius mortem in manus suas venisse scribit. Ex quum alij etiam qui hac Hiera vsi sunt, eius efficaciam aliquoties experti sint, præstat in nostris etiam officinis hanc constructam habere: atq; vt paratam omnes habeant, hortor. Nicolaus hanc itidem describit Sectione 23. atque appellat Hieram e Marrubio.
- 2 **Chamedryos.**) In Nicolao est χαμαδρυς: aut mendose pro χαμαδρις, vt in Scribonio legitur, scriptum: aut vox noua, idem quod χαμαδρις significans.
- 3 **Drachmas decem.**) In Scribonio, vt Romano, veluti nonnullis videtur, scriptore, est pondus Romanum, nempe denarius, drachma paulo grauius: propterea quod septem denarii constituent vnciam, quum non nisi octo drachmæ vnciam faciant. Nos Nicolaum, & solennem iam consuetudinem sequentes, vsitatum officinis pondus vsurpare malimus.
- 4 **Aristolochia rotunda.**) In Scribonio est. Mali terræ. Non est autem malum terræ, nisi Aristolochia rotunda: quod radicem habeat instar mali rotundam, in terra hærentem.

¹ Polii.) Scribonius habet Folii. Sed quum in Nicolao sit Polii, & folium hodie verum non agnoscat, præstat Polium sumere quam folium. A

Hiera¹ ex colocynthide Nicolai Myrepsici. XVII.

Confert ad capitis dolorem, vertiginem, morbum comitiale, cholericos, melancholicos, pituitosos, quartanos, hydropicos, pleuriticos, nephriticos, resolutos, stomachicos, morbo regio correptos, lienosos, iocinerosos, lethargicos. Arteria raucitatem sanat, & vniuerso corpori sanitatem affert. Habet aloes flauæ seminis petroselini, absinthij, piperis nigri, ana drach. duas, scrupulos duos. Colocynthidis, scilla assata, agarici, ellebori nigri, ammoniaci, sulphuris, hyperici, ana drachmas duas. Epithymi, polypodii, bdellij, succi chamaedryos, brassica tenuis, castia, ana vnciam dimidiā. Myrrha, sagapeni, aristolochia longa, piperis albi, longi, cinamomi, opopanax, castorei, ana vnc. vnam. Mellis optimi despumati, quod satis est.

ANNOTATIONES.

Hiera magna Galeni. ¹ Ex Colocynthide.) Nicolaus Magnam Galeni nominat, nec immerito: quia ea est quam Galenus crebro vsurpauit, præsertim lib. 1. de Compositione medicam. local. cap. 2. & Hieram ex colocynthide vocat: vt alibi fusius monstrauiamus. Et est bona admodum compositio Hieræ, & digna quæ in vsum reuocetur, & in omnibus officiniis parata habeatur.

Brassica tenuis. ² Brassicatenuis.) Nicolaus habet, Brassicæ exiguz. Exiguam autem vocat, quæ tenuis, & minora quam alia genera, folia obtinet: quam nos hic, & alibi Tenuem appellauimus.

Antidotus e Psyllio. ¹ Nicolai Myrepsici. XIX.

Flauamæuocat bilem, ob id febribus ardentibus, acutis, & curatu difficilibus auxiliatur. Item dolori capitis, & vertigini, a biliosorum humorum euaporationibus procreatis. Morbo regio, & iecori supra modum calefacto, & immodica siti. Capitis succi² buglossi, boraginis, apij, iniybi, ana libras duas. Postquam coquendo despumati ac probe repurgati fuerint, illis inijciantur cassuthæ, anisi, sena, ana vnc. dimidia. Capilli veneris, Manip. vnus. Fumaria, vnc. tres. Asperi, drach. quatuor. Spica nardi, drach. duæ. Iniecta & commixta cum succis ferueant, bulliantue ad dimidias. Dein ab igne remoueantur, & quoad refrigerentur dimittantur, ac manibus probe⁷ subigantur, donec omnia simul in succum redigantur. Postea adijce violarum vnc. tres. Epithymi, vncias duas. rursusq. parum decoque. Deinde ab igne amoueto, & inijce psyllij. vnc. tres, & iterum⁸ modice admodum decoque agitatoq. & subigito, & colato. De octi colo transfusi accipe lib. quatuor. Sacchari⁹ lib. tres. Dacrydij, vncias tres, & subacta lento igne decoquisto. Postea adijce pastillorum e rosis, & espodio, & rheibarbati, ana vnc. vnam. Pastillorum ex oxyacantha, vnc. dimidiā. Tritos & subactos cum omnibus prædictis commisce, & in vase recondito. D

ANNOTATIONES.

¹ Nicolai.) Et si enim Mesuz filius hanc quoq. Antidotum describit, tamen Nicolai descriptionem illius, utpote meliorem, exquisitiorem, ac magis emendatam, præferendam esse putauimus. Antiquioribus hoc Antidotum fuit celeberrimum, quod bilis feruor em retundat, & sanguinem mirifice repurget. Debetq. hodie hoc nomine esse vsitatissimum.

Buglossum. ² Buglossi.) Per Buglossum non inaudiendum est, id quod hætenus ita nominarunt officinæ, & vulgus Medicorum. Siquidem id ipsum est Echii species, vt alibi demonstrauiamus. Neq. Buglossum Italicum, vt Cordus putat, quod & ipsum Echii genus sit. Sed illud potius, quod nos in primo de Stirpium historia tomo Buglossum sylvestre, & Germanice Bruchkraut appellauimus: quod verno tempore floribus suis duntaxat redimitum inuenitur. Atq. hoc quod dicimus, confirmat Mesuz filius, qui Buglossi domestici & sylvestris meminit. Per domesticum, Borriginem: per sylvestre, id quod iam indicauimus, intelligens. E

Iniybum. ³ Iniybi.) Sic simpliciter in Nicolao est scriptum. Mesuz codices Endiuiz habent. Parum autem refert, Endiuiz aut Scariolam vsurpes, vt sæpe iam diximus, quod eiusdem sint facultatis.

⁴ Anisi.) Non est in Nicolao, sed ex Mesuz adiectum. Nihil autem refert, si etiam omittatur.

⁵ Fumaria.) Mesuz habet Succum fumariz. Mihi magis arridet, vt cum Nicolao ad stirpem referamus. Nam si de succo intelligendum esset, potuisset antea inter succos recenseri.

Cordus et rat. ⁶ Drachma quatuor.) Ita est in Nicolai codice Græco nempe (δ. Quapropter in nonnullis Mesuz codicibus falso legitur, vnciz quatuor. Cordus non recte legit hic drachmæ duæ.

⁷ Subigantur.) Dicitur pro eo quod alii, Exprimantur, efferunt.

⁸ Modice admodum decoque.) Mesuz iubet macrari vigintiquatuor horis. Mihi magis probatur Nicolai sententia, qui modice semen psyllii bullire suadet. Hac enim ratione plus facultatis e psyllio exit, quam si maceretur. Quod etiam si ad aluum subducendam nihil conducit, quod tamen Arabes, præsertim Mesuz filius constanter affirmant: tamen prodest ad exstinguendum febrilem calorem, plurimam Psyllii esse facultatem.

⁹ Lib. tres.) Exemplaria Mesuz filii habent minus, nempe lib. duas, & dimidiā. Sed nos maluimus Græci Nicolai codicis fidem sequi, qui habet, sh. γ.

¹⁰ Dacrydij.) Mesuz habet, Dacrydij in cotoneo malo assati, Verū quū Nicolaus iubeat Dacrydij, esse co-

A esse coquendum lento igne, non est opus ut prius in cotoneo malo assetur: propterea quod si antea coctum, iterum coquendum miscetur, leniet tantum Antidotus, non etiam purgabit, aut soluet. Quare Nicolai ratio, qui crudum Dacrydium miscendum esse putat, melior est ea quæ a Mesuæ præscribitur.

¹¹ *Vncias tres.*) Mesuæ filius habet vnc. tres, & dimid. Sed Nicolai diferte habet 8ss. ¹² Atq; hunc potius quam Mesuæ filium sequendum esse iudicauimus. Quod nimirum, trium vnciarum dacrydii pondus, sit satis magnam, ut non sit necesse accedere dimidiam.

Antidotus e¹ succo rosarum. Nicolai. XIX.

Flauam bilem citra molestiam educit. Salubre prorsus medicamentum ad morbos articulorum, & biliosos & calidis humoribus natos, febresq; tertianas. Accipit sacchari, succi rosarum, ana libram unam, vnc. quatuor. Trium santalorum, ana drach. sex. Dacrydij, vnc. unam, & dimid. & Spodij, drach. tres. ² Succi semperuiui, scrup. unum. Succus rosarum cum saccharo ad iustam consistentiam coquatur, dein adijciantur species, & formetur Electuarium. Digeritur etiam cum saccharo albissimo, quod satis est, in solidam formam.

ANNOTATIONES.

¹ *E succo rosarum.*) Ita hodie componitur ex Latinis Nicolai codicibus, in quibus non est integra. Nam in Græco Nicolao, iis ex quibus hæc compositio constat, adiunguntur rheum barbarum, & turpetum: ut patebit ex sequenti mox Antidoto, quod Nicolaus & Zulapio rosaceo inscribit.

² *Spodij.*) Et hic pro Spodio accipiendum erit Ebur vstum, quod id tria santala antecedant.

³ *Succi semperuiui.*) In Nicolai codice est, Caphuræ. Nos Caphura, ut refrigerante medicamento, utendum esse haud putamus, quare pro illa succum semperuiui, qui refrigerat, & quouis tempore haberi potest, restitimus. Caphura enim tenuiorem est partium, & calefacit potius, quam refrigerat, ut suo loco fusius monstrauius. Quare ad bilem nihil confert.

C *Antidotus e¹ rosaceo Zulapio. Nicolai Myrepsici. XX.*

Confert iis quibus flaua bilis redundat, defluxionibus, vitij a calore ortis. Alium citra molestiam ac dolorem mouet. Vilis etiam febrib. acutis & ardentibus. Recipit succi rosarum, libram unam, vnc. quatuor. Trium santalorum, ana drach. sex. Spodij, drach. tres. Dacrydij, vnc. unam, & dimid. Succu semperuiui, scrup. unum, ² Rhei barbari, drach. tres. Turpeti, vnc. unam. Cum Zulapio rosaceo, & saccharo sufficienti commisceantur. Datur pondere³ trium aut quatuor drachmarum.

ANNOTATIONES.

¹ *E rosaceo Zulapio.*) Ita a Nicolao inscribitur, propterea quod cum Zulapio, vel, ut hodie loquuntur, cum Iuleb rosaceo conficiatur Antidotus. Nos quoq; hac inscriptione insignitam, paratam in officinis habere oportet: ut sciamus hanc priore distare, & ea esse validioribus ad purgandum viribus.

D ² *Rhei barbari.*) Rheum barbarum & Turpetum in priore non habentur. Quapropter ut purgandi vim augeant, adeoq; hanc ipsam priori esse validiorem, est necesse.

³ *Trium aut quatuor.*) Pro virium diuersitate. Sufficiens enim pro mediocri purgatione drachmæ tres. Proinde aptum erit medicamentum pro iis, qui modica purgantia medicamenti quantitate delectantur. Nam in solidam etiam formam, ut prior Antidotus, redigi potest.

Electuarium rosatum. Mesuæ filij. XXI.

Flauam bilem sine molestia ducit, ob id conducit biliosis affectibus, arthritidi & calore nata, vertigini, capitis & oculorum doloribus ex eadem causa ortis, & ictero. Habet succi rosarum, & beaurum perfectarum, libras quatuor. Sacchari, libram unam, & dimidiam. Manne puræ & recentis, vnc. sex. Scammonij Antiocheni, vnc. unam, & dimidiam. Coquantur lento igne ad mellis consistentiam, dein injiciantur pastillorum & spodio, vnc. una. Pastillorum ex oxyacantha, vnc. dimidia. **E** Gallia moschata, croci, ana drach. duæ. Reponantur in vase vitreo.

ANNOTATIO.

Et si hoc Electuarium raro vsurpatur, tamen quum in formandis catapotijs Aggregatiuis vocatis, item minoribus ex Hermodactylis, eo utendum sit, nequaquam autem in Antidoto Nicolai & succo rosarum, quod scilicet hæc catapotia a Mesuæ filio inuenta sunt, minime nobis prætereundum fuit.

Electuarium Indum maius. Mesuæ filij. XXII.

Excrementa humorum, maxime pituitosorum ac putridorum, a ventriculo, & alijs nutritorijs instrumentis educit. Crassos etiam in ijs flatibus discutit, vitiaq; hinc nata: nempe inflationem ventriculi, coli, rectorum, & aliorum viscerum sanat. Capit cinamomi, caryophyllorum, spica nardi, rosarum, ² casie, macis, cypri, ana vnciam dimidiam. Santalorum citrinorum, drachmas duas, & dimidiam. Ligni aloes, nucis moschatae, ana drachmas duas. Turpeti optimi, drachmas quinquaginta. Sacchari, penidiorij, ana³ drach. viginti. Galange, cardamomi vtriusq;, asari, mastiches, ana drach. unam, & dimid. Scammonij boni & in malo cydonio cocti, vnc. una, drach. quatuor. Omnia terantur, & cum oleo amygdalino dulci fricentur. Postea accipe succi cydoniorum & granatorum, apij & feniculi, ana lib. dimid. Coquantur succi cum melle ad iustam crassitudinem, & admisce species.

ANNOTATIONES.

Indum.
Maius.
Casia.
Sylui opi-
nio impro-
bata.

1 *Indum maius.*) Indum forte, quod ab Indis inuentum sit, aut apud eos in frequenti vfu fuerit, dictū est. Maius, ad minoris, quod statim subiiciemus, differentiam.

2 *Casia.*) Per Casiam hoc in loco non audienda fistularis dicta, quod Syluius, & alii quidam putant: sed lignea potius. Quid enim tam exigua mōles conferret vniuersæ Antidoto, suaq; leniendi facultate purgatricem eiusdem vim iuaret? Nihil plane. Lignea igitur accipienda, quæ itidem vt cinamomū, caryophyllum, & alia, sua calefaciendi, concoquendi, & attenuandi facultate, frigidos ac crassos, adeoq; pituitosos humores plurimum iuuat.

3 *Drachmas viginti.*) In nonnullis Mesues codicibus mendose legitur vñcias viginti. Nam vt sæpe accidit, a librario imperito vñcia pro drachma scriptum est. Proinde præstaret integris vocibus pondera exprimere, quam notis vocum.

Electuarium Indum¹ Minus. Mesue filij. XXIII.

Idem quod præcedens efficit. Accipit turbit, sacchari, ana drach. centum. Macis piperis, zingiberis, caryophyllorum, cinnamomi, cardamomi maioris, nucis moschata, ana drach. septem. Scammonij, drach. duodecim. Mellis optimi despumati, quod satis est.

ANNOTATIO.

Minus cur-
dictum.

1 *Minus.*) Dicitur, quod ex paucioribus constat medicamentis simplicibus, decem nimirum: quum præcedens ex decem & octo componatur, idēq; Maius dicatur. Rectius itaq; simplex, vt præcedens cōpositum, nominaretur. Valentius autem purgat, quod duplo ponderē turpetum recipiat. Proinde sunt qui, si Electuarium Indum absolute scribatur, hoc minus quia efficacius purgat, intelligendum esse censent. Alii contra maius, ob maiorem simplicium, ex quibus constructum est, numerum, potius accipiendum esse contendunt. Optimum igitur in ista sententiarum diuersitate est, vt quiuis quod vsurpandum esse putet, diserte exprimat.

Benedicta¹ Laxatiua. Nicolai. XXIV.

Humores pituitosos, ad articulos potissimum decumbentes, elicit. Arenibus quoq; & vesica purgat. Recipit turpeti electi, sacchari, esula, ana drach. decem. Daurydij, hermodactyli, rosatum, ana drach. quinq;. Caryophyllorum, spica nardi, zingiberis, croci, saxifragæ, piperis longi, amomi, cardamomi, seminis apij, petroselinij, salis gemma, galangæ, macis carui, fœniculi, seminis asparagi, rusci, granorum solis, ana drachmam vnam. Mellis optimi despumati, quod satis est.

ANNOTATIONES.

1 *Benedicta laxatiua.*) Hæc est vsitata officinarum nostrarum Benedicta laxatiua, ex Latino Nicolai Præpositi illis vocati libro ad verbum descripta: quæ tamen nulli descriptioni Nicolai Græci Myrepsi appellati per omnia respondet. Apparet igitur, eius auctorem hanc compositionem ex omnibus Nicolai Benedictis laxatiuis, quæ quatuor sunt numero, corrasisse. Nam Turpetum in omnibus est. Esulam ex 509. Antidoto desumpsit. Rosas ex 507. Hermodactylos, caryophyllos, spicam, Zingiber, crocum, saxifragam, piper longum, amomum, cardamomum, semen apij, galagam, partim ex 447. partim ex 508. & 509. transtulit. Macerem, carui, fœniculum, asparagum, ruscum, grana solis, partim ex 447. partim ex 507. mutuatus est, vt has inter se conferenti patebit.

Cordus
errat.

2 *Esula.*) Cordus de ea drachmas tantum quinq; accipit, quum tamen in Latino codice sint decem & in Græco vñcie duæ & dimidia. Quapropter præstat decem quam quinque Esulæ accipere drachmas.

3 *Apij.*) In Latino Nicolai codice est Lini. Verum quum in Græco exemplari nusquam Lini seminis mentio fiat, sed semper apij semen vsurpetur, nos quoq; pro Lini semine apij semen substituiimus. Et huic quidem errori vñcum vicinitas occasionem dedit, facilis enim a *αλιν* in *λιν* semota prima syllaba lapsus fuit.

Grana so-
lis.

4 *Granorum solis.*) Milium solis hodie nominatum intelligit.

Benedicta¹ laxatiua vera. Nicolai Myrepsici. numero 108. XXV.

Idem quod præcedens efficit. Habet turpeti, sacchari, ana drachmas decem. Polypodij folij, ana drachmas sex. Cardamomi, spica, pulegij, calamintha, saxifragi, caryophylli, apij seminis, ana drach. quatuor. Piperis albi, & longi, ana drachmam vnam. Rhei barbari, drach. duas, scrup. duos. Anomi, cinamomi, Hermodactyli, ana vñciam vnam. Epithymi, agarici, sena, ana vñciam vnam. Mellis optimi despumati, quod satis est.

ANNOTATIONES.

Benedicta
laxatiua
yera.

1 *Benedicta laxatiua vera.*) Sic nominamus, vt eam a præcedenti discernamus: quæ non e Græco, vt hæc ipsa, codice, sed e Latino potius Nicolai Præpositi appellati exemplari, vt diximus, transcripta est: & mea quidem sententia priore melior. Nam quum hanc ingrediantur multo mitiora medicamenta purgantia, nempe polypodium pro esula, rheubarbarum & agaricum pro dacrydio: sit vt etiam minori noxa & molestia fumatur. Præerea inferitur eidem pulegium, calamintha, & cinamomum: quæ crassos & pituitosos humores attenuare, & concoquere possunt. Franciscus Alexander Benedictam ex Myrepsio receisset ordine 447. ab vsitatis longe diuersam, quæ qui vti volent e Myrepsio ipso petant.

- A** 2 *Polypodium*.) Hic statim a priore variat, quæ pro Polypodio habet Esulam.
 3 *Pulegii, calamintha*.) Hæc duo in præcedente desiderantur. Rectissime autem & propter causas iam dictas, induntur.
 4 *Apis seminis*.) In Myrepsi codice haud dubie falso *iosidus* pro *saliv* legitur.
 5 *Amomi*.) Quum verum Amomum hodie non habeatur, eius succedaneum utendum: aut pro eo Amomum fermen anmeos, cuius etiam in prima sua Benedicta Nicolaus mentionem facit, sumendum.
 6 *Epithymi, agarici, senæ, ana vnc. vnam*.) Sic legitur in manuscripto codice Græco. Et frequens est apud Galenum & alios auctores, ut pondera quæ vno comprehenduntur numero, ipso identidem repetito iterentur. Tamen si plane quis hoc loco varietatem in ponderibus desiderat, de Epithymo vnc. vna, de agarico & senæ, ana vnciam dimidiam accipiat: quod Nicolaus item in quarta Benedicta, quæ est numero 509, fecit. Quod si eius usum in calculo quoque efficacem esse quispiam desiderabit, is granorum seu milii solis drachmas duas, ut facit Nicolaus in altera Benedicta, quæ est numero 507, adiiciat: & habebit optimum medicamentum.

Diasenæ vulgaris. Nicolai. XXVI.

Antidotus esenæ succurrit melancholicis, in unia vexatis, quartana laborantibus, tristitia affectis, lienosis, elephantiasis, & omnibus vitij ex atra bile procreatis. Capit senæ, vnc. tres. Auellanarum tostiarum, numero quinquaginta. Serici tostii, drachmas duas. Lapidis armenij, drach. vnam. Lapidis lazuli, drach. tres. Sacchari, vnc. sex. Cinamomi, vnc. vnam. Caryophyllorum, galange, piperis spica nardi, ocimi, foliorum caryophyllorum, cardamomi, croci, zingiberis, zedoaria, florum rosmarini, piperis longi, ana drach. duas. Mellis despumati, quod sufficit.

ANNOTATIONES.

- C** 1 *Vulgaris*.) Seu hodie usitata. Quod adiecimus propter aliam hac longe præstantiorem, quæ est in Nicolao Græco. Præfens enim ex Latinis est descripta codicibus, & prorsus decurtata, ut ex mox sequentibus liquido apparebit. Variat tamen etiam pondera, quæ in hac quam sequenti sunt alia, & diuersa.
 2 *Galange*.) Sola galanga in sequenti desideratur, quæ hic ab aliquo adiecta est.
 3 *Foliorum caryophyllorum*.) Si haberi possunt. Sunt autem similia foliis lauri, & odorem atque saporem caryophyllorum habent.

Folia caryophyllorum.

Diasenæ vera. Nicolai Myrepsi. num. 465. XXVII.

Idem quod præcedens efficit. Accipit senæ, nucis auellanarum, ana vnciam vnam. Rasuræ eboris, drach. tres. Serici crudi tostii, drach. vnam. & dimid. Boli armenij, pastilli scillitici, pastilli theriacis, hedychroi magmatici, lapidis armenij, lapidis lazuli, asari, ana drach. vnam. Lapidis smaragdi, iaspidis, saphiri, ana drach. vnam. Rasuræ ferri, chalibis, drach. quatuor. Stiracis boni, pastillorum rosæ & violis, galliæ moschatæ, ana drach. duas. Thuris, cinamomi, cultræ, ana vnc. dimidiam. Trinum santalorum, drach. quatuor. Corallij rubei, drach. quatuor, & dimidiam. Margaritarum, blattiarum bifantis, ana drachmas duas. Caryophylli, maceris, spica, ocimi, seminis portulacæ, zingiberis, anisi, ammeos feniculi, ana drachm. vnam, & dimid. Calamintha montana, auri puri, ana drach. tres. Folij, cardamomi, zedoaria, croci, floris rosmarini & borraginis, piperis albi, ligni aloes crudi, ana drach. tres. Offa cordis ceruini, numero quatuor. Berberis gentiana, ana drach. vnam. Moschi, grana duodecim. Mellis optimi despumati, quod satis est.

ANNOTATIONES.

- E** 1 *Vera*.) Hæc est vera & legitima Nicolai Myrepsi Diasenæ, exceptis deob. Apelazio & Asimio nimirum: ita enim in manuscripto codice inuenitur, haud dubie corruptis medicamentis. Quæ quum sit operosa & sumtuosa, factum est ut a quibusdam sit decurtata: ita tamen ut pleraque omiserint, quæ omittenda minime erant. Est autem compositio optima, ut quæ accurata diligentia sit constructa, adeoque promissis plane respondeat. Habet n. in se medicamenta melancholicum purgantia humorem, senam nimirum, lapides armenium & lazuli. Item quæ crassitiem eius humoris incidant, extenuent, & angustas vias aperiant pastillos scilliticos, theriaces, hedychroum, zingiber, anisum, ammi, feniculum, calamintham, & id genus alia. Præterea corroborantia, adeoque tristitiam, quam melancholicus humor inducit, abigentia, & corruptionem sanguinis arcentia: ebur, sericum, bolus armenium, iaspidem, saphyrum, margaritas, spicam, ocimum, crocum, Zedoariam, caryophyllos, macerem, ossa cordis ceruini, & moschum. His accedit Smaragdus, qui quasi insita quadam proprietate elephantiam sanat. Corallium lieni absumendo aptum esse remedium, ex Dioscoride constat. Ad hunc denique extenuandum, blattia bifantis, & berberis conducunt. Emolliendi gratia styrax, & thus indita sunt. Ut errasse plurimum constet, qui maiorem horum partem omiserunt. Cōsulo igitur, ut Pharmacopœi deinceps ad eum quem hic ostendimus modum, parent Diasenam, veteri, prorsus neglecta.
 2 *Hedychroi magmatici*.) Sic appellat Gal. in libris suis, quos de Theriaca inscripsit, & multis aliis locis. Magma est autem magna non tantum vnguenti, sed & pastilli massula. Ideo a nonnullis inter vnguenta, a quibusdam autem inter pastillos Hedychroum, numeratur. Nos suo loco illud inter pastillos numerabimus.

Antidotus Catholica. Nicolai Prepositi. XXVIII.

Iecoris & lienis affectibus potissimum conuenit, acutis quoque, & peracutis febribus, lenis enim, concoquit, & roborat. Habet casia fistule purgata, senæ mundata, tamar Indorum, singulorum

uncias octo. Rhei barbari, violarum, Polypodij, anisi, singulorum uncias quatuor. Glycyrrhizæ, rase penidiorum, sacchari candi, singulorum drachmas quatuor. Seminum quatuor frigidorum maiorum purgatorum, singulorum unciam unam. Polypodij querni, libram unam. Tritum diu in aqua coquitur, colatumq; in serapium percoquitur cum libris octo sacchari. Casia & tamar Indii in colati parte dissoluntur, & Serapio iam percocto adduntur, postremo species adijciuntur.

ANNOTATIO.

1. *Nicolai Præpositi.*) Hac inscriptione ab ea, quæ mox sequitur, discernitur, quæ est Nicolai Myrepsi, & hac ipsa propter Turpeti & Dacrydii accessionem paulo auctior. Etsi autem præfens catholica vniuersos corporis humores blande admodum vacuat: Senæ enim & polypodij ope melancholiam & serosos humores, ob casiam & tamar Indos flauam bilem, propter Rheum barbarum bilem & pituitam educit: ita ut etiam in febribus tuto dari possit, tamen quum in eam, quæ a Nicolao Myrepsio traditur Catholica, omnia minori pondere indantur purgantia medicamenta, dubium non est quin benignis etiam medicamentis annumerari queat. Non prohibeo igitur quin vtriusq; compositionem paratam in officinis suis habeant Pharmacopœi, inscriptionibus tamen suis distinctas, hanc Nicolai Myrepsi, illam Nicolai catholicam appellantes, ut Medici pro suo arbitrio hac vel illa uti possint. Quia vero Rhei barbarici uncias octo accipit, satis sumtuosa erit, nisi quod crebro faciunt, Pharmacopœi antiquatum & deteriora eius frustula iniecerint. Commodius itaq; erit minori pondere, nempe drachmarum quatuor, more nonnullorum, inseratur. Præstat autem Myrepsi descriptionem sequi.

Antidotus Catholica. Nicolai Myrepsici, numero 503. XXIX.

Omnēs corporis humores purgat. Confert acutis, & peracutis morbis. Emollit enim, alterat, raburg, addit. Iocinerosis, lienosis, podagricis, arthriticis, tertianis, quartanis, & quotidianis doloribus capitis succurrit. Recipit² Senæ, casia fistula, tamar Indorum, ana unc. unam. Polypodij repurgati, vnc. unam, & dimidiam. Rhei barbari, drachmas duas. Glycyrrhizæ repurgata, vnc. dimidiam. Seminum⁴ cucumerum, ana unc. dimidiam. Penidiorum, vnc. dimidiam. Sacchari candi, drach. tres. scrup. unum, Radicis capparis, drachmas duas. Anisi violarum, ana unc. unam. Turpeti, vnc. dimidiam. Dacrydij, drach. duas, scrup. duos. Ex ijs quæ terenda sunt, probe trita per cribrum traiciuntur: dein rursus accipiuntur polypodij repurgati, & tempestiui, vnc. due. Senæ bonæ, violarum, anisi, fœniculi seminum, radicis capparis, ana unc. una. Pruna⁹ refrigerata, numero viginti. Cerasa, numero triginta. Hæc bene macerata & liquata coniunguntur in lebetem cum aqua libras quatuor, & bene cocta colantur. Postea accipitur decoctum colatum, & inijciuntur in lebetem, & cum ipso sacchari puri, libra una & dimidia, atq; ad Serapij consistentiam coquuntur. In quo¹⁰ prædicta omnia irrigantur, madefiuntq; conquassantur, & probe subiguntur, emolliuntur, & ad electuarij formam redacta in vase reconduntur.

ANNOTATIONES.

Catholica. 1. *Catholica.*) Græce est καθολική. Sic autem dicta est Nicolao, quasi vniuersalis: quod scilicet omnes corporis humores expurget. Vulgus certe Medicorum & Officinæ incepte admodum Diacatholicon, id est, de vniuersalibus appellant.

Senæ. 2. *Senæ.*) Vbi Senæ simpliciter, ut hoc loco, in compositionibus reperitur, semper folia & folliculos simul intelligere oportet. Quod si Senæ purgatæ mentio fiat, ab ea auferendæ sunt festucæ, & foliorum folliculorumq; pediculi. Id quod semel nos monuisse hic satis sit.

Casia fistula. 3. *Casia fistula.*) Intelligit nigram dictam, & purgatricem: præsertim eius medullam & pulpam, quæ hodie flos Casiæ nominatur.

Semina cucumerum. 4. *Seminum cucumerum.*) Per semina cucumerum inaudienda sunt non solum cucumeris, sed & cucurbitæ, citruli, & melonium: in summa, quatuor frigida maiora vocata semina, quod ex Latinis manifestum sit codicibus, & ex ipso Nicolao, qui ana dictionem subiecit, quod nunquam fecisset, si de vno tantum semine locutus fuisset.

5. *Radicis capparis.*) Hæc in Latinis codicibus, ut etiam anisi semen, omissa est. Ut hinc satis appareat, eam, quæ hactenus vsitata fuit Catholica, non fuisse integram, sed macam, & multis modis mutilam.

Turpeti. 6. *Turpeti.*) Turpetum Nicolaus nominat medicamentum, quod vulgus Medicorum & Pharmacopœorum, Arabum doctrinam sectantium, Turbit nuncupat. Rectissime autem Turpetum huic Antidoto inseritur. Nisi enim illud iniicias, vix Catholica appellabitur: quod scilicet non omnes purget humores. Siquidem omisso Turpeto, nullum in ea erit medicamentum quod pituitam purget, demto Rheo barbaro, quod leuiter tantum pituitam ducit. Ut hinc quoque perspicuum euadat, vsitatum Catholicam esse decurtatam. Ad præsentis igitur Antidoti modum deinceps Pharmacopœi Catholicam etiam componant, vna cum veteri, aut ut rectius dicam, hactenus vsitata. Hic si silentio inuoluere non possum quin Bernardi Dessennii calumniis respondeam. Nam ipse compositio-
ni Diacatholicon Præpositi inscrip-
tor, ait, Leonhardum Fuchsum Myrepsi interpretem, posterius Catholicon velut consuetudine Offici-

Bernardi
Dessennii
calumniæ
depulsa.

nis fa-

A nis familiare commendasse. Nam ut dosin, quæ nihil habet cum Nicolao Alexandrino, aut Præposito commune, præteream, res quoque ipsæ plane variant: siquidem radices Capparorum: ita enim loquitur, pruna, cerasia, turpetum, diacrydium, purgatoria fortissima, adiungit, atque longe aliam quam præpositus cocturam instituit. Et cæcus sit funditus oportet, qui ista non videat. Proinde manifestum est, quam nihil operæ in conferendis auctorum compositionibus reposuerit Fuchsius, quod nunc semel monendum esse duxi, quum frequentissime alias obseruarem, ne Apothecariorum vulgus alioqui ad quiduis suscipiendum sine iudicio proclive, huiusmodi descriptionibus seducatur, ac magis auctoritati ipsius, quam rei veritati credat. Nec potest nec debet ipse, quando vir bonus ac doctus sit, hanc monitionem meam non candide interpretari. Hactenus Dessennius. Quis vero initio non detestetur ac diris omnibus exsecratur immensam hominis ingratitudinem, ut qui mihi malam admodum gratiam pro Myrepso, auctore multis seculis desiderato, in Latium cōuerso, referat. Quod vero posteriorem Myrepfi Catholicam usitatam dixerim, non alio nomine factum est, quam quod voluerim significare, eam esse compositionem, unde Præpositus ille abbreviator, deprauator dicere volui, Nicolai, suam, sed multis modis decurtatam, descripsit. Ea enim quæ præcedit, nihil cum officinis usitata fere commune habet. Non sum autem Dessenni tam stupido ingenio, ut non viderim hanc in multis ab usitata variare, sed non statim sequitur ob id, eam non esse hactenus usitatam, imo id potius, quod Præpositus eam, ut alias multas, omnino sua abbreviatione deprauarit. Volui itaque marginali mea adiectione Pharmacopolas tacite admonere, quod ea, quæ hactenus vsi essent Catholica, non vera, nec integra, sed mutila, & deprauata esset, atque ut deinceps hanc ipsam, tanquam legitimam, vsurparent. Qui sit igitur Dessenni ut hic non potius in Præpositum, quemadmodum in Dia margariton calido fecisti, tua conuitia, quam in me expuere & regerere voluisti? An non tum multas compositiones officinarum hunc decurtasse ac vitiasse, innumerisque mendis conspurcasse dixisti? Imo in hæc tandem verba prorupisti. Ecquis Præpositum huic diutius sibi imitandum in Pharmacopoliis proponet? ac non potius maximi Apollinis graui censura plectendum iuste decernat? hoc est, ut ex optimis officinis profligatus & proscriptus apud pessimos percat. Cur non hic eandem cantas cauitulenam? cur rogo eorum, quæ tum magno stomacho dixisti hic oblitus es? Dicam, voluisti ex Fuchsii reprehensione aliquam tibi doctrinæ & existimationis opinionem parare. Atqui metuo, ne pro sperata gloria, sis non leuem consecutus ignominiam, & certo declaraueris, te omni desitutum i iudicio. Id quod hinc etiam satis innotescit, quod me nihil operæ in conferendis auctorum compositionibus posuisse inquis. Quali vero hoc tum meum consilium fuerit, ac non potius id, ut Nicolaum quoad fieri posset, optime in Latinum sermonem conuersum darem studiosis. Quanquam in medicamentariis etiam libris scribendis non id conandum est, ut auctorum compositiones conferas, sed id potius, ut eas, quæ in officinis sunt usitata, quam emendatas ac plane legitimas habeamus. Denique non est, quod vulgus tantum Pharmacopœorum ad quoduis suscipiendum sine iudicio proclive existimes, sed te illis plane coniungas oportet, ut qui omnia ex quibusuis auctoribus, nullo adhibito, vel delectu, vel iudicio, in tuas annotationes corradas, & lectori crassissimas offundas tenebras. Atque hactenus puto tuis calumniis abunde per me responsum esse. Nosti vetus hoc: Qui quæ vult dicit, quæ non vult audit.

D 7. *Dacrydii.*) Et illud in usitata Catholica desideratur, ut necesse sit, eam fuisse minus in purgandis omnibus humoribus efficacem.

8. *Tempestiui.*) Tempestiuum vocat haud dubie, id quod legitimo tempore collectum est.

9. *Risigerata.*) Ita nominat, quæ in aqua frigida sunt macerata, & emollita, aut liquata: ut ex mox sequentibus planum sit.

10. *Prædicta omnia.*) Intelligit casiam, senam, tamarindos, & alia omnia, quæ Serapii compositionem præcedunt. Et hæc est legitima Nicolai Catholica structura, quæ in officinis deinceps etiam parari debet.

Polypodium
um tepes-
tium.
Pruna re-
frigerata.

E *Antidotus¹ diaphœnicon. Mesua filij. XXX.*
A *ntidotus e palmulis, febribus cōpositis & diuturnis auxiliatur, bilem namq. flauā, & pituitam sine molestia educit. Colicis cruciatibus mirifice conducit, item doloribus ventriculi, & id genus alijs vitij ex crudis humoribus ortis. Habet² palmularum fuluarum in aceto per triduum maceratarum, drach. centum. Penidiorum³ hordeatorum, drach. quinquaginta. Amygdalarum purgatarum, drach. triginta. Turpeti, drach. trigintaquing. Scammonij, drach. duodecim. Zingiberis, piperis longi, foliorum rute siccorum, cinamomi, macis, ligni aloes, anisi, fœniculi, dauci, galangæ, ana drach. duas, & dimidiam. Mellis optimi despumati, quantum sufficere videtur.*

ANNOTATIONES.

1. *Dia Phœnicon.*) Hoc est, e palmulis, vel, ut hodie vocant officinæ, e dactylis. Nam φῶνιξ Græcis, Palmula, palmulam sonat. Recte autem sic inscribitur, quod hæc mole sua reliqua omnia hanc compositionem

F ingredientia medicamenta superet.

2. *Fuluarum.*) Codices Mesuæ fere omnes legunt Cheiron. Est autem Cheiron haud dubie vox deprauata Græca, contextui inserta, pro χείρων; id est, fuluarum. Sunt autem χείρωνες ὑπόφοι, id est, palmulæ fuluæ, probe maturæ. Nam sufficit in præsentia adstrictio, quæ in maturis palmulis remanet. Cheiron autem dictionem significare, quod dicimus, satis capite 69. testatur Serapio, inquit: Cheiron est species dactylorum, & color eorum est citrinus, & rubeus. Heiron vero illic deprauatius quam in Mesuæ filio legitur.

Cheiron,
Palmus?
fulv

Hordeata 3 *Hordeatorum.*) Hordeata vero penidia vocant, quæ ex saccharo albo & optimo, in aqua decoctione
Penidia. nis hordei sex horas infuso, & cocto ad iustam consistentiam, conficiuntur. A

4 *Scammonii, drach. duodecim.*) Sic meliores Mesuæ filii codices, quos nos secuti sumus, habent. Alii drach. viginti duas, quorum lectio minus probatur, quod antea drachmæ triginta quinque; Turpeti, huius Antidoti compositionem ingredientur.

Dia phœnicon solidum. Inceri auctoris. XXXI.

Idem quod præcedens potest. Capit palmularum fulvarum per triduum in aceto maceratarum, numero sex. Seminis libystici, drach. duas. Nucum pinearum, amygdalarum dulcium, ana drachm. quindecim. Turpeti, drach. duodecim. Dacrydij, drach. undecim. Sacchari candi, uncias duas. Zingiberis, piperis longi, foliorum rutæ siccorum, cinamomi, macis, fœniculi, dauci, galangæ, ligni aloes, ana drachmam unam. Sacchari libram unam; fingatur orbiculorum rotularumue figura. B

ANNOTATIO.

Sunt qui ad iam dictum modum Diaphœnicon solidum conficiunt, quod a priore non nisi ponderum diuersitate distat: & quod semen libystici, quod in priore non est, accedit, & pro penidiis, nuces pineæ usurpantur. Alii nihil addunt, nec adimunt: sed plane, de iusta forma, eodem quo primum Diaphœnicon parant. Quod in ceteris quoque Antidotis, quæ in liquida aut solida forma consruuntur, obseruant, ut noua compositione non sit opus. Nos tamen hic quorundam libidini inseruiendum esse putauimus, qui hac, quam alia ratione; medicamentum hoc struere malunt. Ponderus eius drachmæ quinque magna ex parte, aut sex.

Antidotus¹ Episcopi. Mesuæ filij. XXXII.

Flammam bilem ac pituitam elicit. Flatibus & excrementa e toto corpore educit: ob id doloribus articularum & hypochondriorum prodest. Item colicis cruciatibus mirifice auxiliatur. Humores adrenes & vesicæ decumbentes expurgat. Accipit scammonij Antiocheni, turpeti albi & optimi, ana drachmas sex. Caryophyllorum, cinamomi, zingiberis, myrobalanorum emblicorum, nucis moschate, polypodij, drachmas duas, & dimidiam. Sacchari albi, ² uncias sex. Mellis optimi despumati, quod satis est. C

ANNOTATIONES.

Episcopi. 1 *Episcopi.*) Sic appellanda venit hæc Antidotus, non Episcopus: ah dicere volui Episcoph, ut barbari hæcenus Medici nominarunt. Nam ita etiam vocat Auicennæ interpret: ut mirum sit, iuniores Medicos Auicennam; quem tamen veluti numen quoddam coluerunt, & in oculis tulerunt, non esse hoc loco imitatos: & itidem ut ille fecit, Episcopi electuarium hæc nuncupasse. Describitur autem ab eodem Can. 5. eodem quo hic modo: nisi quod Cardamomum & piper adiicit, quæ in præsentia non habentur. D

Cordus. 2 *Uncias sex.*) Sic omnia Mesuæ filii exemplaria habent. Vnus Cordus, nisi typographi culpa factum sit drach. sex habet, quum tamen Auicenna integram libram sacchari contriti inspergere iubeat. Ceterum sunt qui hanc Antidotum etiam in solidam redigunt formam, singulis drachmis specierum, sacchari optimi unciam addentes.

Antidotus¹ Hamech. Mesuæ filij. XXXIII.

Purgat utramque bilem, & pituitam viscam: ob id morbis inde natis, impetigini, scabiei, elephantia, & cancro exedenti, & similibus mire confert. In summa, omni scordati cutis, a biliosis & adustis humoribus procreata, conuenit. Recipit myrobalanorum flauorum, unc. quatuor. Cepulorum, & Indorum, & hei barbari, ana unc. duas. Agarici, colocynthidis, polypodij, ana drach. decem & octo. Absinthij, thymi, senæ, ana² drach. sex. Violarum, drach. ³ quindecim. Epithymi, unc. duas. Anisi, rosarum, fœniculi, ana drach. sex. Succifumaria, libram unam. Prunorum, numero sexaginta. Vuarum passarum purgatarum, unc. sex. Maceretur omnia in sero lactis sufficiente dies quinque, in vase vitreato oris angusti, & probe obturati. Postea ad ignem feruescant una & item altera ebullitione: ac manibus deinceps fricentur & colentur. Colato adde cassia fistula purgata, unc. quatuor. Tamarindorum, unc. quinque. Manna, unc. duas. Fricato manibus, iterum cola, colato adijcito sacchari libram unam & dimid. ⁴ Scammonij, unc. unam, & dimid. Coque ad mellis crassitiem. Deinpuluerem sequentem insperge, qui habet Mirobalanorum flauorum, cepulorum, indorum, ana unc. dimid. Bellericorum, emblicorum, & hei barbari, seminis fumaria, ana drach. tres. Anisi, spica nardi, ana drach. duas. Formetur electuarium. E

ANNOTATIONES.

Hamech. 1 *Hamech.*) Ab auctore, qui hanc Antidotum struxit, ita est nominata. Idem vero vox hæc sonat, ut quidam interpretantur, quod Mahemet. Hæc autem appellatione Razes Pœnus Medicus intelligendus venit, qui varie a Mesuæ filio nominatur. Nam interdum, ut hoc loco, simpliciter Hamech siue Mahemet dicitur. Aliquando cum adiectione Hamech Razes. Nonnunquam Hamech filius Zachariæ. Interdum Hamech filius Zachariæ Razes. Aliquando Hamech filius Zesar. Non est autem ille Hamech, qui Mesuæ pater fuit, auus nimirum ipsius Ioannis filii Mesuæ. Siquidem is fuit filius Heli, qui filius fuit Abdelæ, regis Damasci. F

A ² Drachmas sex) Non latet, codices quosdam habere vnciam vnam. Sed meliores legunt Drachmas sex.

³ Drachmas quindecim) Alii codices legunt vnciam vnam, & dimidiam, ita vt demant Drachmas tres.

⁴ Scammonii) Scammonium hic crudum, non coctum, quod dacrydion, & corrupte diagridion vocant, inaudiendum erit. Nam coquendo corrigitur. Non igitur coctum vsurpandum ad huius antidoti structuram erit; id enim vterum coquatur non indiget. Et si coqueretur, vim suam purgatoriam non nihil amitteret, concoctione fractari & imminuitur. In quibus igitur compositionibus Scammonium coquendum præcipitur, crudum in aliis coctum accipiat. Quod semel hic monuisse satis sit.

Scammonium crudum.

Antidotus hamech altera, seu minor, Mesue filii. XXXIV.

B **H**amech altera purgat melancholiam, & vltos humores alios: ob id confert manias, melancholia, vertigini, obliuioni, & vitii cutis, qualia sunt, scabies, lepra, alphas, cancer, elephantia, impetigo. Habet microbalanorum nigrorum, id est, indorum, cepulorum, epithymi, an. drach. quinquaginta. Fumaria, absinthii, an. drach. viginti. Thymi, calaminthe, polypodii, agarici, glycyrrhizæ, buglossi, an. drach. decem. Stichadis, chamedrysos, chamæpitios, spina alba, anisi, an. drach. quinque. Pruna, ² Zizypha, ³ myxa, an. numero septuaginta. Vuarum passarum repurgatarum, lib. vnam. Cæquuntur in aqua sufficienti ad tertias. Dein colantur. Colato adduntur. ⁴ Sapa, lib. duæ. Mellis despumati, lib. vna. Scammonii, vnc. duæ. Igni lento ad mellis crassiciem percoquantur.

ANNOTATIONES.

C ¹ Minor) Ita nominauimus, ad differentiam prioris: quæ simpliciter Hamech, aut cum adiectione Hamech maior appellari potest. Et si hodie non est officinis nostris vsitata, tamen posset, quod sit prima, in vsum reuocari, & loco superioris vsurpari in lue Hispanica. Cur enim non ita appellaremus, quum hac ipsa gens illa creberrime laboret?

Lue Hispanica.

² Zizypha) Ita recentiores Græci nominant Iuiubas hodie dictas.

³ Myxa) Sebesten vulgo vocantur, vt libro primo diximus: adeo vt nihil opus erat hic denuo re-

Zizypha.
Myxa.
Sapa.
Rob.

ferre. ⁴ Sapa) Sapa mustum est, ad tertiam partem decoctum. Græcis *σάπων* & *σάπων* Arabū familiæ, & habentam sectantibus medicinam simpliciter Rob, & coctum dicitur.

Dia Turpetu, cum Rheobarbaro Montagnana. XXXV.

E Lauam bilem & pituitam educit, atque aqua intercutem laborantibus mirifice confert. Caput turpeti optimi, hermodactylorum, an. vnciam vnam. Rheibarbari selecti, a drachmas decem. Dacrydii, drachmas quatuor. Santalorum alborum & rubeorum, violarum, zingiberis, an. drach. vna & dimidiam. Mastiches, anisi, cinamomi, croci, an. drach. dimid. ² Sacchari albissimi, quod satis est,

ANNOTATIONES.

¹ Dia turpeti cum Rheobarbaro) Hac inscriptione insignitur hæc Antidotus, vt discernatur ab altera quam Dia turpeti: vel, vt hodie loquuntur, Dia turbit maiorem, quam mox subiiciemus, appellent.

² Drachmas decem) Hic mihi falso affingit Franciscus Alexander, quod legam vncias decem, quum nusquam in omnibus compositionibus dia turpeti ita scriptum sit. Nec minore candore vitium hoc in Typographum transfert.

E ² Sacchari) Ita hodie frequenter paratur. Potest autem cum melle despumato, si ita visum fuerit, in liquidam consistentiam redigi. Sunt qui malint hac compositione vti, quæ accipit Turpeti optimi, vnciam vnam & dimidiam. Rheibarbari selecti, drachmas sex. Zingiberis, drach. tres, Spicæ, mastiches, ania drachmam vnam. Anisi, drach. dimidiam. Dacrydii, drach. sex. Sacchari albissimi, vncias sedecim, fiat co-
³fectio in rotulis. Ad vermes lumbricosq; excutiendos efficacissimum est medicamentum. Nam Rheum lumbricos necat, turpetum autem pituitam lumbricorum fomitem educit.

Aliud dia,
turpetum
cum rheo-
barbaro.

Dia Turpetu maior, incerti auctoris. XXXVI.

Pituitam maxime purgat, & eandem extenuat, ac concoquit. Accipit turpeti optimi, vnciam vnam. Dacrydii, zingiberis, an. drach. quatuor. Cinamomi, caryophyllorum, an. drach. duas. Galangæ, piperis longi, macis, an. drach. vnam. Sacchari albissimi.

Dia Turpetu minor Zezaris. XXXVII.

Leuit ² pituitam, præsertim eam quæ in ventriculo hæret, elicit. Recipit turpeti optimi, drachmas decem. Zingiberis, drachmas quinque. Mastiches, drachmas tres. Sacchari albissimi quod sufficit.

ANNOTATIO.

¹ Zezaris) Zezar autem pater fuit Hamech, qui, vt diximus, Razes alio appellatur nomine. Rarum est Zezar, admodum Diaphenicæ electuario eius vicarias operas subeunte.

² Leuit) Quod vt præcedens, dacrydium non accipiat.

Dia Turpetu Mesuafilii. XXXVIII.

Plurimam & flauam bilem educit, & idem fere quod Montagnana potest. Habet Zingiberis, galange, an. drach. dimidiam, Piperis longi, cinamomi, an. drach. duas. Spica Indica, mastiches, an. drach. dimidiam. Croci, scrupulos duos. Turpeti albi gummosi, Rhei barbari selecti, an. vnc. vnam & dimidiam. hermodactylorum vnc. dimid., Dacrydii, drach. vnam. Sacchari, vnc. sedecim, aut circiter, fiat confectio in tabulis.

Dia Turpetu incerti auctoris. XXXIX.

Idem quod præcedens potest. Capit Rheibarbari, unciam dimidiam. Caryophyllorum, galange, an. drach. duas. Macerantur tria hæc in stillatitii rosarum liquoris, unciam trium, horis viginti quatuor. Dein eximuntur, & exsiccantur: exsiccataque subinde in puluerem rediguntur, cum iis quæ sequuntur: nempe turpeti albi, drach. decem. Hermodactyli, Zingiberis, an. drach. quinque. Scammonii in pomo cocti, drach. sex. Sena, drach. duas. Spica, anisi, mastiches, an. scrup. vñ. Sacchari, vnc. viginti quatuor, fiat confectio in orbiculis.

A N N O T A T I O.

Studio plures Dia turpeti compositiones attulimus, vt delectu habito, quiuis ex illis eam, quæ optima sibi videretur, in sua officina parari curaret.

Dia Cnicu, Arnaldi Villanouani. XL.

Antidotus e cartamo, flauæ bili & pituita educenda mirifice conducit. Habet specierum dia tragacanthi frigidi, vnc. dimidiam. Pulpa carnisue cydoniorum, vnc. vnam. Medulla seminis cartami, hermodactylorum, an. drach. quatuor. Zingiberis albi, drach. duas. Dacrydii, drachmas tres. Turbit albi, *drachmas sex. Mannæ granatæ, drach. duas. Mellis rosacei colati, unciam vnā. Sacchari, vnc. octo. Cum saccharo albißimo sufficienti fiat electuarium.

A N N O T A T I O N E S.

Diacartami.

1 *Diacnicu*) Hodie Diacartami nominant, quod idem valet. Pauci sunt, qui hac vtuntur Antidoto. Tamen quum nonnulli sint, qui eam in compositis, nempe ex biliosis & pituitosis humoribus natis, affectibus, libenter vsurpant, vt pharmacopœi illorum postulatis morem gerere queant, eius quoque compositionem hic recensere curauimus. Paratur magna ex parte in forma solida.

* *Drachmæ sex*) Alii legunt drachmas duas, quæ sane lectio, ne vehementius fiat medicamentum, quum Dacrydium, & Hermodactyli eius quoque compositionem ingredientur, melior esse videtur. Legendum igitur ita potius esse iudico, Turpeti, drachmas duas. Mannæ granatæ, drachmas sex.

2 *Vncias octo*) Alii legunt drachmas octo. Parum autem refert, vtram lectionem arripiant pharmacopœi: modo ad solidi Antidoti consistentiam redigatur medicamentum. Sin ad electuarii formam reducere medicamentum voles, pro saccharo mel adiciendum erit. Franciscus Alexander hoc in loco vehementer in Cordum, e quo, vt verum fatear, hanc compositionem descripsi, neque enim Arnaldi lectione vnquam sum delectatus, inuehitur: atqui parum recte: quandoquidē si omnia simplicia, quæ hanc compositionem ingredientur, ac pondera ipsa expendas, multo ea quæ Franciscus affert, meliorem esse deprehendes. Quis enim non abhorreat a Turpeti vncis duabus & dacrydii drachmis quinque? Sed sic placet nonnullis Germanorum deprimeret labores, quum ipsi meliora non afferant.

Catharticum imperiale, Nicolai. XLI.

Bilem vtramque, & pituitam sine molestia purgat. Obesis autem & crassis, quique magnæ ex parte aluo constrikti & dura sunt, ileosis: & iis quorum ventriculus atque intestina flatibus distenduntur, conuenit. Capit dacrydii, sacchari, an. drach. octo. Cinamomi, spica nardi, saxifraga, polypodii, an. drach. quatuor. Caryophyllorum, Zingiberis, spica celtica, piperis nigri, piperis longi, cardamomi, amomi, an. drach. tres. Mellis optimi despumati.

A N N O T A T I O.

Nicolaus Præpositus.

Hæc descriptio exstat in codice Nicolai, qui opera Ioannis Agricolæ Ingolstadii excusus est. Alia est, & quæ e pluribus constat simplicibus, quæ habetur in Nicolao vocato Præposito: qui alius ab eo qui Myrepsus nominatur, fuisse videtur: nempe compilator aliquis, qui ex aliis auctoribus collegit medicamentorum compositiones. Quibus vt gratiam aliquam apud lectores conciliaret, ea quæ compilauit sub Nicolai Myrepsi, quod dein imperitia quorundam in Præpositi mutatum est, nomine edere voluit. Plures autem illum referre quæ in Nicolao Myrepsio græco non habentur, ex superioribus abunde patuit. Ceterum Nicolaus Præpositus Catharticum Imperiale ita describit. Recipit Dacrydi, sacchari, ana drach. quatuor. Cinamomi, spica nardi, saxifragæ, polypodii, ana drachmas duas. Myrobalani citrini, hermodactyli, ana drach. quatuor. Caryophyllorum, zingiberis, spica celtica, piperis nigri, piperis longi, cardamomi, amomi, ana drach. vnam, & dimidiam. Mellis quod sufficit. Non distat a priore, nisi adiectione Myrobalanorum & hermodactylorum, & quod pondera, quæ in præcedente sunt duplicata, hic simplicia existunt. Posset postremum hoc appellari a maiori simplicium copia, Catharticum imperiale maius.

Cartharici imperialis alia descriptio.

est, & quæ e pluribus constat simplicibus, quæ habetur in Nicolao vocato Præposito: qui alius ab eo qui Myrepsus nominatur, fuisse videtur: nempe compilator aliquis, qui ex aliis auctoribus collegit medicamentorum compositiones. Quibus vt gratiam aliquam apud lectores conciliaret, ea quæ compilauit sub Nicolai Myrepsi, quod dein imperitia quorundam in Præpositi mutatum est, nomine edere voluit. Plures autem illum referre quæ in Nicolao Myrepsio græco non habentur, ex superioribus abunde patuit. Ceterum Nicolaus Præpositus Catharticum Imperiale ita describit. Recipit Dacrydi, sacchari, ana drach. quatuor. Cinamomi, spica nardi, saxifragæ, polypodii, ana drachmas duas. Myrobalani citrini, hermodactyli, ana drach. quatuor. Caryophyllorum, zingiberis, spica celtica, piperis nigri, piperis longi, cardamomi, amomi, ana drach. vnam, & dimidiam. Mellis quod sufficit. Non distat a priore, nisi adiectione Myrobalanorum & hermodactylorum, & quod pondera, quæ in præcedente sunt duplicata, hic simplicia existunt. Posset postremum hoc appellari a maiori simplicium copia, Catharticum imperiale maius.

Antidotus e¹ brassica marina, incerti auctoris. XLII.

Antidotus e brassica marina magna efficacia aqua inter cutem laborantium educit aquam. Accipit brassica marina, unc. unam. Turpeti, drach. tres. Folliculorum senia, Tartari radice iridis, polypodii, an. drachmas duas, & dimidiam. Rhei barbari, drachmas tres. Seminis iuniperi, dr. duas. Dacrydii, drach. unam, Ligni aloes, Zingiberis, cinamomi, an. drach. unam, & dimidia. Nardii, drach. dimidiam. Sacchari albiissimi in stillaticis liquoribus. Cichorii & hyssopi, quod satis est dissoluti, fiat Antidotus solida.

ANNO TATIO.

¹ E brassica) Brassica vero marina est, quam Recentiores Soldanellam vocant.

DE CATAPOTIIS, SEV PILVLIS,

Sectio VI.

Catapotia¹ aurea, Nicolai Myrepsi, numero 97. I.

Caput expurgant sensus omnes, precipue aciem oculorum exacuunt, flatum ventriculi & intestinorum dissolunt, ac citra molestiam aluum deticiunt. Ad stomachicos, colicos, nephriticos, & inflatos valde probata. Habent aloes flavae, dacrydii, an. drach. quinque. Rosarum, apii, an. drach. duas, & dimidiam. Anisi, fœniculi, mastiches, an. drach. unam, & dimidiam. Croci, colocynthidis, hieræ puræ, an. drach. unam. Succu tragacanthæ, quod satis est, formetur massa.

ANNO TATIONES.

C¹ Aurea) In manuscripto Nicolai Myrepsi codice sic vocari ab Italici scribitur, haud dubie ob eorum excellentiam: quod scilicet, quamvis in vacuando satis sint potentia, tamen minus omnibus aliis læsunt, nec tormina afferunt. Nam etsi magnam vim dacrydii & colocynthidis capiunt, tamen reliquis rebus ita temperantur, ut iustam actionem obeant. Scribitur autem mendose in Nicolai codice, *adepsa* pro *adepsa*. Siquidem latinam dictionem græcis literis parum recte scripsisse Nicolaum, minime mirum est, utpote, qui linguae latinæ ignarus fuerit. Sunt autem alia a presentibus & fortiora catapotia.

² Mastiches) In Græco Nicolai Myrepsi codice non habetur, sed ex latino adiectum est: neque tamē sine causa. Nam cum stomachicis maxime conferant hæc Catapotia, nihil mirum, quosdam mastichen tanquam ventriculo valde gratum, & conueniens medicamentum adieciisse.

³ Succu tragacanthæ) Sic more aliorum Græcorum vocant lentorem, aut veluti mucorem tragacanthæ, quem hodie mucilaginem barbari alii magis latine Mucaginem nominant.

D⁴ Formetur massa) Id quod fit, quando speciebus in pila accurate permistis, postea liquor, qui tanquam glutino massa cohereat, affunditur. Omnibus hoc modo mistis, massa e pila exempta manibus oleo vel butyro inunctis figura tereti formatur, & priusquam reconditur, leuiter exsiccat, inque sicciore loco, ne situm contrahat, seruiatur.

Catapotia¹ ex eupatorio, Mesue filii, II.

Mirifice prosunt febribus circuitu repetentibus, biliosis: obstructionem quoque iecoris, & icterum inde natum sanant. Accipiunt myrobalanorum citrinorum, succu eupatorii, succu absinthii, an. drach. tres. Rhei barbari, drach. tres, & dimidiam. Mastiches, drach. unam. Croci, drach. dimid. Aloes bonæ, drach. quing. Succu endiuia, aut feri lactis, quod satis est, singatur massa.

ANNO TATIONES.

E¹ Ex eupatorio) Maiores nimirum dictæ. Siquidem minorum nullus hodie est usus.

² Eupatorii) Non quidem Græcorum, sed eius quod a Mesue pingitur. Id quale sit, in primo nostrorum de Stirpium historia commentariorum tomō indicauimus.

Catapotia e Rhabbaro, Mesue filii, III.

Humores educunt crassos, lentos, multum putres, & inde ortas febres diuturnas, & ex aliis quoque humoribus natas: iecoris item dolorem, ac hydropem incipientem sanant. Recipiunt Rhabbari, drach. tres. Succu glycyrrhizæ, absinthii, mastiches, an. drach. unam. Myrobalanorum flauorum, drach. tres, & dimidiam. Seminis apii, fœniculi, an. drach. dimidiam. Pastillorum e rosis, drach. tres, & dimidiam. Hieræ picæ, drach. decem. Liquoris stillatitii fœniculi, quod sufficit: singatur massa.

ANNO TATIO.

F Hæc Catapotia, ut diutius in officinis durent, cum melle conficienda sunt, in quo coquendo succus fœniculi consumtus sit.

Catapotia¹ pestilentialia, incerti auctoris. IV.

Aduersus pestiferæ luis contagiones populatim grassantes mirifice prosunt. Humores etiam ventriculo infusos & immersos educunt. Habent aloes selectæ, unc. duas. Myrrha, croci, an. unc. unam. Confice cum vino claro, odorifero.

ANNO TATIONES.

¹ Pestilentialia) Alio nomine communia vocantur: & e tribus, scilicet medicamentis, constantia, & sine custodia.

² Incerti Rodia.

Rufi com-
positio.

2 *Incerti auctoris*) Neque enim ad Rufum auctorem, ut hodie faciunt propemodum omnes Medici referenda sunt. Nam Rufi compositio crocum non habet, sed pro illo guttam aut thymiamma ammoniacum accipit. Præterea forma quoque a præsentī differt, quod scilicet potio sit, adeoque in catapotia non digeratur. Quod ut rectius cognoscant studiosi, compositionem Rufi, quam lib. 2. cap. 35. Paulus describit, ad verbum recensebimus: Recipit aloes partes duas, ammoniaci thymiammatis partes duas, myrrhæ partem unam. Hæc simul confusa, ex vino odorato dimidii cyathi mensura potui quotidie danda. Atque ita hanc compositionem Rufus in peste laudat, ut nullum fuisse affirmet, qui ea usus non euaserit. Quæ qui uti voluerit, hanc quam retulimus componendi rationem sequatur.

Aloe in
pestilenti
constitu-
tione non
lauanda.

3 *Aloes selectæ*) Sunt qui putant, in pestilenti constitutione aloem esse lauandam. Quorum mihi sententia minime probatur. Nam quum aloë non exhibeatur tum roborandi tantum ventriculi gratia, sed & putredinem ut arceat, & corruptos ac vitiosos inde humores educat, minime lauandam esse, sed plane illotam esse exhibendam censeo. Ita enim ratione amaritudinis putredinem prohibebit, & quum purgandi facultate minime sit destituta, quicquid vitiosorum in ventriculo erit humorum, eliciet. Ideo in pestiferæ luis contagione præcauenda quotidie vacuo ventriculo ex catapotium vnum scrupuli pondere sumendum erit.

Catapotia Pestilentialia nostra. V.

Magis quam præcedentes aduersus pestifera luis contagia valent. Capiunt aloes flauæ, drach. sex. Myrrhæ optima, drach. tres. Rhei barbari, drach. unam & dimidiam. Agarici in pastillos redacti, drach. dimidiam. Croci, drach. unam. Boli armenii, terra Lemniæ, an. drach. dimid. Mastiches, scrup. duos. Theriaces Andromachi, drach. duas. Cum liquore stillaticio rosarum, fingatur massa.

Catapotia¹ Coccia² Rhazis. VI.

Caput magna efficacia expurgant, & ex eo ac nervis crassos vacuant humores, Accipiunt specierum hieræ picræ, drach. decem. Colocynthidis, drach. tres. scrup. vnum. Scammonii, drach. duas, & dimidiam. Turpeti, stichadis, an. drach. quinque. Cum serapio & stichade, formetur massa.

A N N O T A T I O N E S.

Coccia.

1 *Coccia*) Sic nonnulli putant a Græcis deducto nomine, & a forma esse nominata, quod nimirum olim figuram granulorum ciceris vel erui, qua conficiebantur, referrent; Si quidem κόκκιοι, Græcis granulū denotat. Alii vocem hanc barbaram esse censent, ac sic esse dicta, quasi capitalia, quod caput maxime expurgant, volunt. Nostri hodie Cocchia nominant, quod frequenter illis in capitis affectibus vtantur.

2 *Rhazis*) Libro primo ad Almanforem capite primo de Cephalæa. Sunt admodum valentia, & prorsus incorrecta, torminaq; excitant, nec iis nisi præmissis aliis quibusdam, & in crassis admodum & frigidis humoribus educendis vtendum. Quare a Medicis vsurpanda non erunt, sed pro iis Nicolai Myrepsi mox sequentibus magis vtendum.

Catapotia¹ Coccera, Nicolai Myrepsi, numero 122. VI.

Valent ad eos, qui destillatione capitis laborant, caput dolent, hemicranicos, lippitudine, & nervorum incontinentia affectos. Recipiunt hieræ picræ Galeni, drach. quinque. Dacrydii, dr. unam, & dimidiam. Pulpæ colocynthidis, drachmam dimidiam. Turpeti, stichadis Arabicæ, an. dr. duas, & dimidiam. Sagapeni, opopanax, bdellii, ammoniaci, agarici specie, an. drach. dimidiam. Rhei barbari, aloes flauæ, an. drach. unam, scrup. vnum. Cum succo, aut stillaticio fœniculi liquore fingatur massa.

A N N O T A T I O N E S.

E

1 *Coccera*) Aut Cocceri Nicolao vocantur: qua de causa, scire non possum. Mihi certe magis quam Rhazis probantur, quod minus sint valida, pluraq; habeant simplicia, quæ vim fortium medicamentorum frangant, contundant ac mitigent. Nam ut alia medicamenta purgantia omnia propemodum a Rhaze composita eiusmodi sunt, ut vix tutiorum mentis exhiberi possint: ita quoque hæc Catapotia, quæ ille Coccia vocauit, ob suam vehementiam expedite admodum tormina excitant, & alia grauius symptomata. Censeo igitur præsentibus magis vtendum esse, utpote minus fortibus, & rectius compositis: quod quicquid compositionem ipsam expendens, statim cognoscet.

2 *Sagapeni*) Quod adiectum est præcipue propter oculorum lippitudinem, & alia eorundem vitia, suffusiones nimirum & hebetudines, quibus idipsum maxime auxiliatur.

Catapotia ex Agarico, Mesua filii. VII.

Thoracem purgant pituita, crassa & putri, ob idq; antiqua tussi & asthmati conferunt, aliisque thoracis vitis, a crassis & pituitosis humoribus ortis. Habent agarici, drach. tres. Radicis iridis, marrubii, an. drach. unam. Turbit, drach. quinque. Hieræ picræ, drach. quatuor. Colocynthidis, sativæ, an. drach. duas. Myrrhæ, drach. unam. Excipietur cum sapa, & formato massam.

A N N O T A T I O N E S.

1 *Drachmas quatuor*) Fallo me hoc loco notat Franciscus Alexander, quod diminute legam drachmas tres. Ita parum attendit, num recte alios reprehendat.

2 *Cum sapa*) Quæ pilulas illas a putredine, aut transpiratione vindicat.

Catapotia ex agarico, Nicolai Myrepsici. VIII.

A Conferunt iis, qui non nisi recta ceruice, & difficulter spirant, & destillatione laborant. Capiunt agarici, drach. unam, & dimidiam. Iridis, marrubii, an. drach. unam. Turpeti. hiera picra Galeni, an. drach. duas Colocynthis, sarcocolla, an. drach. unam. Cum sapa quantum sufficit formetur massa.

A N N O T A T I O.

Harum pilularum descriptionem ex præscripto Nicolai subicere volui, vt si quis illis magis quam Mesuz vti vellet, haberet in promptu compositionem. In omnibus cum præcedentibus conueniunt, exceptis ponderibus, quæ sunt in quibusdam minora: & quod Myrrhæ desideretur, perinde atq; apud Auicennam cap. 3. Fen. 10. tract. 1. cap. de Curatione asthmatis 40.

Catapotia e hiera simplici, Galeni. IX.

B Vltius ventriculi ex humoribus biliosis & pituitosis natus prodest. Recipiunt aloes flauæ, drach. quinquaginta. Cinamomi, xylobalsami, asari, spice nardi, croci, mastiches Chia, an. drach. tres. Melle rosaceo excipiuntur, & fingitur massa.

Catapotia e hiera composita, Nicolai Myrepsici. X.

A D vitia capitis, neruorumque, stomachi item cruditatem conferunt. Habent cinamomi, spice nardi, croci, floris iunci odorati, asari, casia lignea, xylobalsami, carpobalsami, violarum, absinthii, epithymi, agarici, rosarum, turpeti, mastiches, colocynthidis pulpa, an. drach. dimidiam. Aloes flauæ, quantum omnium aliarum specierum. Cum stillatitio intybi liquore formetur massa.

Catapotia hiera cum agarico. XI.

C Vccurrunt stomachicis, asthmaticis, aliisque stomachi, & thoracis vitiis, a crassis & pituitosis humoribus natis. Capiunt specierum hieræ simplici Galeni, agarici recens in pastillorum formam redacti, an. unc. dimidiam. Aloes flauæ, an. unc. vnâ, Cum rosaceo melle excipiuntur, & fingitur massa.

Catapotia optica maiora, Mesuz filii. XII.

V isum roborant & conseruant, excrementa vacuant a cerebro & oculis pituitosa. Accipiunt rosarum, violarum, absinthii, colocynthidis, turpeti, canbebe, calami odorati, nucis moschatae, spice, epithymi, carpobalsami, xylobalsami seselios, seminis, rutæ, floris iunci odorati, asari, mastiches, caryophyllorum, cinamomi, an. si, fœniculi, apii, casia lignea, croci, macis, an. drach. duas. Myrobalanorum flauorum, cepulorum, indorum, bellericorum, emblichorum, rhei barbari, an. drach. quatuor. Agarici, senæ, an. drach. quinque. Euphrasie, drach. septem. Aloes flauæ pondus omnium. Excipe succo aut stillatitio liquore fœniculi, & formato massam.

A N N O T A T I O N E S.

1 Optica) ὀπτική, id est, visoria; quod visorium spiritum roborent, purioremque reddant ac visionem mirabiliter iuuent, dicta sunt. Vulgus medicorum & pharmacopœorum Lucis nominant. Sunt a quibus ocularia vocentur.

2 Maiora.) Quod pluribus constat simplicibus, appellata sunt: ad differentiam minorum, quorum cumpositionem iam subiicemus.

Optica.
Catapotia
lucis.
Ocularia.
Maiora
eius dicta.

Catapotia optica minora, Mesuz filii. XIII.

Idem quod maiora possunt, viribus tamen valentiora sunt, magisque melancholicum humorem quam pituita purgant. Recipiunt xylobalsami, carpobalsami, ana drach. unam. Chelidonii, drach. quinque. Rosarum, violarum, absinthii, euphrasie, ana drach. tres. Senæ, epithymi, robalanorum flauorum, cepulorum, indorum, bellericorum, emblichorum, agarici, colocynthidis, floris iunci odorati, lycii, lapidis cyanei, an. drach. duas, & dimidiam. Aloes pondus omnium. Cum succo fœniculi aut chelidonii fingatur massa.

A N N O T A T I O N E S.

1 Minora.) Vocata sunt, quod paucioribus simplicibus constant. Nam quum operosa sit præcedentium compositio, factum est, vt nonnulli hanc in pauciora contraxerint simplicia.

2 Cyanei.) Lapidem lazuli appellant, quemadmodum lib. 1. diximus. Maiores, quod lapidem lazuli non accipiant, tutiores sunt.

Minora
quare vo-
cata
Cyaneus.

Catapotia arthritica Nicolai. XIV.

Valent ad podagram, aliosque articularum dolores a frigidis crassis & pituitosis humoribus natos. Habent hermodactylorum, turpeti, agarici, an. unc. dimidiam. Casia lignea, spice nardi, caryophyllorum, xylobalsami, carpobalsami, Zingiberis, mastiches, fœniculi, anisi saxifragæ, seminis asparagi, rusci, rosarum, granorum solis, salis gemmei, an. drach. dimidiam. Aloes flauæ pondus omnium. Succo fœniculi quod satis est, fiat massa.

A N N O -

ANNOTATIONES.

¹ *Nicolai*) Non Myrepsyllius, cuius nōs opus de Compositione medicamentorum in latinum conuertimus sermonem: sed eius, qui vulgo Præpositus dicitur. Nam ille truncatam ex *αυτογένη* Nicolai Myrepsi descripsit: vt ex eiusdem compositione, quam paulo post subiiciemus, liquido apparebit.

² *Drachmam dimidiam*) Latinus codex Nicolai Præpositi habet drach. duas, & statim subiicit, Scammionii, vnc. vnam, vt hinc quoque perspicuum fiat, neque eam descriptionem, quæ hætenus in officinis vsitata fuit, & quam iam recensuimus, per omnia respondere ei, quam Nicolaus Præpositus decurtauit: quia minus pondus habet, & Scammionium omisit. Ita, quod sæpe antea monuimus, nulla fere integra & legitima est hætenus vsitata & vsurpata officinis compositio.

Catapotia arthritica vera Nicolai Myrepsi. XV.

A *D podagricis & arthriticis valde probata. Capiunt hermodactyli, turpeti, an. vnc. vnam & B dimidiam. Myrobalani indici, cepuli & citrini, agarici. Colocynthidis, anisi, Caryophyllorum, spica, zingiberis, saxifragi, piperis longi, seminis apii, dauci, rosarū, amomi, salis gemmei, mastiches, granorum solis, seminum asparagi, fœniculi, singulorum drach. dimidiam. Aloes flauæ, drach. dimid. Dacrydii, vnc. vnam. Succī absinthii quantum sufficit, fingatur massa.*

ANNOTATIONES.

Hæc est legitima, & ad verbum e Nicolao græco transcripta compositio: nisi quod ad pondera attinet, dimidiam tantum eorundem partem vsurpauimus, nempe vnc. vnam, & dimidiam, quum ipse habeat vnc. tres, & ita deinceps.

¹ *Myrobalani indici*) Omnes Nicolaus Præpositus compiler omisit Myrobalanos.

² *Colocynthidis*) Et hanc silentio transiit.

³ *Caryophyllorum*) Post Caryophylla inseruit suæ compositioni xylobalsamū & carpobalsamū Nicolaus Præpositus, superstitione magis quam iudicio ductus, quum horum nulla sit facta in *αυτογένη* mentio, nec legitima haberi possint, in nostris maxime regionibus. Fuit autem haud dubie in ea opinione cum multis aliis, vt nullum medicamentum sine Balsami accessione efficax esse crederet.

⁴ *Piperis longi*) Et illud a decurtatore eius compositionis est præteritum.

⁵ *Dacrydii, vnc. vnam*) Eius eodem pondere in Nicolao Præposito vocato, vt diximus, mentio fit. Sed in hætenus vsitata compositione horum catapotiorum omissum.

Catapotia ex hermodactylo, Mesuæ filii maiora. XVI.

A *Duersus podagram, & dolores frigidis articularum prosunt. Accipiunt hermodactylorum, D myrobalanorum flauorum, aloes, turpeti, colocynthidis, bdellii, sagapeni, an. drach. sex. Castorei, sarcocollæ, euphorbii, opopanax, ruta syluestris, & apii seminum, an. drach. tres. Croci, drach. vnam, & dimidiam. Cum succo brassicæ formetur massa.*

ANNOTATIONES.

¹ *Maiora*) Quod pluribus simplicibus consent, sintque magis composita.

² *Dolores frigidis*) Crassos enim & lentos frigidosque humores educunt, atque longinquiribus partibus trahunt.

³ *Hermodactylorum*) Quid de vniuerso hermodactylorum genere sentiendum sit, tomo nostrorum de stirpium historia commentariis perspicue, & luculenter explicauimus. Vt mirum sit Rondeletium, virum E doctissimum, per hermodactylos vulgares, non tamen sine magno errore, vulgares, præcipue in compositionibus Arabum intelligere.

Catapotia fœtida maiora, Mesuæ filii. XVII.

V *Acuant humores crassos, & pituitosos, ob id conueniunt affectibus indematibus, articularum, pedum & nervorum doloribus. Colicis item cruciatibus, vteri, & spina succurrunt: nec non vetriculi, alphis, elephantia, aliisque cutis vitiiis opitulantur. Recipiunt sagapeni, hammoniæ, opopanax, bdellii, colocynthidis, seminis ruta syluestris, aloes, epithymi, an. drach. quinque. Hermodactylorum, esule, an. drach. duas. Scammionii, drach. tres. Cinamomi, spica croci, castorei, an. drach. vnam, Turbit, drach. quatuor. Zingiberis, drach. vnam & dimidiam. Euphorbii, scrup. duos. Cū succo porri prius dissolutis lachrymis, finge massam.*

ANNOTATIONES.

¹ *Fœtida*) Ita vocantur propter grauem odorem, quem illis Sagapenum, hammoniacum, castorium, & alia graueolentia conciliant. Sunt etiam valentia admodum, quod minime repressa sit purgantium vis, ideoque parum tuta.

² *Maiora*) Ad differentiam minorum, quæ itidem a Mesuæ describuntur, sic cognominata sunt.

³ *Ruta syluestris*) Si haberi non potest, pro ea vsurpetur Ruta hortensis: quod semel hic nos monuisse satis sit. Semen namque Cicutæ, quod imperiti pharmacopœi facere solent, plane hoc in loco abiciendum.

A *Catapotia ex euphorbio, Mesua filii. XVIII.*

Pluitam frigidam ac crassam ad nervos decumbentem vacuant. Quapropter opem ferunt resolutioni, lumborum doloribus, & podagra a pituita concitata. Sunt valida: ideoque illis, nisi magna urgeat necessitas, utendum non est. Habent euphorbii, colocynthidis, agarici, bdellii, sagapeni, an. drach. duas. Aloes, drach. quinque. Succiporri quod satis est: fingatur massa.

ANNOTATIO.

1 *Fingatur massa*) Ad hunc quidem modum Euphorbium prudenter tritum, cribratus agaricus, laevigata concisa colocynthis, cum gummis vino dissolutis, pistillo calido & mortario tantisper subiguntur, dum in massam coeant. Catapotia sunt valentissima non nisi in maximis & contumacibus morbis vsurpanda.

B *Catapotia ex sarcocolla, Mesua filii. XIX.*

Pluitam vacuant, ob id pituitosis affectibus commodant. Capiunt sarcocolla, drach. tres. Turpeti, drach. quatuor. Colocynthidos, Zingiberis, an. drach. unam, & dimidiam. Salis gemmei, drach. unam. Cum aqua stillatitia rosarum formetur massa.

Catapotia Inda, Hali. XX.

Ad vitia ex melancholico humore procreata cancrum nimirum, elephantiam, albos nigros curata difficles, melancholiam, & inde ortum timorem ac mærorem, quartanam, icterum nigrum, ex vitio lienis procreatum, eiusdemque dolorem prosunt. Accipiunt myrobalanorum nigrorum, ellebori nigri, polypodii, an. drach. quinque. Epithymi, stichadis, an. drach. sex. Agarici, lapidis cyanei loti, colocynthidis, salis Indi, an. drach. quatuor. Succieupatorii, spica, an. drach. duas. Caryophyllorum, drach. unam. Hierapicra, drach. duodecim. Fiat massa cum succo apii.

ANNOTATIONES.

1 *Inda*) Cur ita dictæ sint, facile animum attendentibus constat. Non enim alia de causa, quam quod myrobalanos nigros, quos alio nomine Indos appellant, vel salem Indum recipiunt. Plerique hic mire ineptiunt, ita esse nominata putantes, quod eorum usus apud Indos potissimum sit, & in India celebrentur.

2 *Hali*) Ad hunc sane auctorem horum & præcedentium catapotiorum compositionem Mesua filius Hali refert. Quis autem is Hali fuerit, non satis constat.

3 *Salis Indi*) Per salem Indum minime inaudiendus erit ille, quem Paulus & Avicenna ita nominant: Sal Indus, qui certe non est, nisi mellis concreti genus, in India in arundinibus inuentum, salis modo coactum, detibus, ut sal, friabile, ut libro primo huius Operis fusiùs diximus. Verum sal Indus hoc loco non est, nisi is qui inter omnes alias salis species maxime falsus est: qualis certe in India reperitur. Is quia hodie non affertur, pro eo vsurpandus erit sal fossilis, quem Gemmeum hodie vocant. Caueant igitur pharmacopœi, ne pro sale Indo, ut multi hæcenus fecerunt, saccharum candum appellatum, in horum catapotiorum constructione vsurpent.

*Catapotia * e Lapide Cyaneo, Mesua filii. XXI.*

Ad vitia ex melancholico humore nata conferunt, cancrum nimirum, elephantiam, & quartanam. Recipiunt lapidis cyanei loti, drach. sex. Epithymi, polypodii, an. drach. octo. Scammonii, ellebori nigri, salis Indi an. drach. duas, & dimidiam. Agarici, drach. octo. Caryophyllorum, anisi, an. drach. quatuor. Hierapicra, drach. quindecim. Cum succo Intybi latifolii, formetur massa.

ANNOTATIO.

1 *Loti*) Scilicet duodecies, ut vult Trallianus, in liquore stillatitio violarum, vel borraginis. Sic enim aliquo modo acrimoniam suam deponit, hocque nomine catapotia illa minus noxia & ventriculo infesta fiunt. Quum itaque olim illorum usum damnauerim, de iis, quæ illorum lapidem cyaneum accipiunt loquutus sum. In mollibus tamen & imbecillioribus corporibus neutro utendum erit.

Catapotia e lapide Armeno, Mesua filii. XXII.

Melancholicum humorem, & bilem vstam sine molestia vacuant: ideoque vitia inde natis conducunt. Habent lapidis Armeni loti ac preparati, hierapicra, an. drach. quinque. Epithymi polypodii, an. drach. octo. Scammonii in cydonio cocti, drach. tres. Caryophyllorum, drach. duas. Salis Indi, drach. unam, & dimidiam. Cum succo intybi latifolii fingatur massa.

ANNOTATIONES.

1 *Loti*) Ex liquore stillatitio lupuli, vel intybi, aut decocto polypodii.

2 *Polypodii*) Actuarius, qui iridem horum Catapotiorum compositionem tradit, pro Polypodio, agarici drachmas quatuor habet. Alexander Trallianus etiam Agarici meminit, & eius scrupulos quatuor inferendos esse docet. Ita ut euidentissimum sit, Græcos omnes Agaricum, omisso Polypodio, recensuisse,

Catapotia e lapide Armeno, Alexandri Tralliani. XXIII.

Praeterquam quod stomachum roborant, simul etiam varios humores praesertim terreum & melancholicum humorem citra molestiam purgant. Capiunt hierapicra, unc. dimidiam. Epithymi, unc. dimidiam. Agarici, scrup. quatuor. Armeniaci lapidis, scrup. quatuor. Scammonia, unc. unam.

Caryophyllorum, grana viginti. Contusa excipiuntur melle rosaceo, aut succo citrii, & formetur massula.

ANNOTATIONES.

Hanc Alexandri Tralliani compositionem referre placuit, quod illam miris efferat laudibus, nec ante eius usum opus esse dicat, ægrōs vt medicamentis præparemus, quod ab eiusdem assumptione, nec suffocationis, nec syncopes imminet periculum. Quibus omnibus verbis innuit, hanc mitissime, & citra omnem molestiam purgare. Quapropter præstat hæc deinceps pro ea, quam Mesues afferit vt, vt pote meliore: & quæ cum ea, quæ ab Actuario refertur, demptis duntaxat ponderibus, plane conueniat.

1 Vnciam vnam) Ita enim græcus Alexandri codex habet Γο δ: Sed vt ex veteri interprete liquet, qui legit lapidis Armeni loti drachmas quatuor. Scammoniz scrupulos quatuor. videntur pondera esse transposita, adeoque ita potius scribendum esse Scammoniaz π δ: id est, scrupulos quatuor, & lapidis Armenii α δ, hoc est, drach. quatuor.

Catapotia azaiareth, Auicenna. XXIV.

F Lauam bilem & pituitam sine molestia, e ventriculo potissimum, vacuant. Quapropter iis qui caput e ventriculo dolent, conueniunt. Accipiunt hierapicra, vnc. vnam. Mastiches, myrobalanorum flauorum, an. vnc. dimidiam. Aloes optima, vnc. duas. Cū serapio e stichade formetur massa.

ANNOTATIONES.

1 Qui caput e ventriculo) Non igitur simpliciter capitis doloribus & affectibus conueniunt, sed iis tantum, qui a ventriculo impuro orti sunt.

2 Myrobalanorum) Qui biliosos & calidos vapores sursum a ventriculo in caput elatos arcent.

Catapotia aromatica, Ioannis Damasceni. XXV.

V Entricum, cerebrum, & sensoria omnia, a crassis ac pituitosis humoribus purgant, indeque natum dolorem dissipant. Ventriculum roborant concoctionem eius iuuant, & appetentiam excitant. Recipiunt cinamomi, cubebæ, ligni albes, calami odorati, macis, nucis moschatæ, cardamomi, caryophyllorum, asari, mastiches, flores iunci odorati, spica, carpobalsami, an. vnc. vnam. Absinthii sicci rosarum, an. drach. quinque. Trita crassiuscule coquuntur in aqua libris duodecim, ad duarum partium consumptionem: fricantur manibus, coluntur, & exprimantur. Incolati libris duabus maceratur, aloes in vase lapideo vitreato, cum aqua pluuia lota, & iterum siccata, libra vna. Dein ipsi affunduntur decocti prædicti: circiter libra dua, & teruntur in sole: ipsique aloes miscentur myrrha, mastiches, an. drach. quinque. Croci drach. tres. Teruntur curiose, & postea prædicti decocti reliqui ipsis affunditur, terunturque donec siccantur: formantur catapotia ciceris magnitudine.

ANNOTATIONES.

1 Aromatica) Aut ex aromatibus dicta sunt, propterea quod e multis consent aromatibus, hoc est, rebus odoratis. Hodie imitatione Mauritanorum Alephangina nominantur, quod illis, vt nonnulli interpretantur, Alephangin, odoramenta siue species, pulueres siue odoratos significet. Nos tamen de lingua nobis incognita nihil temere affirmamus. In confesso autem est, hæc catapotia roborare potius ventriculum, quam aluum ducere, propter aloen lotam, quæ vim purgatoriam lotionem deponit & exsist.

2 Vnciam vnam) Nicolaus Myrepsus, qui itidem catapotia hæc describit, habet vnciam dimidiam.

3 Absinthii, &c.) Nicolaus pro Absinthio & Rosis, habet Croci, grana quindecim. Paulus quoque aliter conficienda esse hæc catapotia docet, vt cap. 10. Sect. 32. videre licet.

4 Crassiuscule) Quum enim coquenda sint odoramenta, non est cur in exquisitum puluerem teri debeant: sed satis est, si crasso modo terantur, ita enim concoctionem facilius sustinebunt.

5 Iterum siccata) Id quod quatuor aut quinque potissimum sub Caniculæ æstu, dierum spacio fieri solet.

6 Drachma quinque) Hic Franciscus Alexander me & Cordum, atqui falso, nec sine magna calumnia, notat, ac perperam drachmas, pro vncias quinque legere nugatur. Nam omnia Mesues exemplaria habent tantum drach. quinque, & recte quidem: quod maiore copia, respectu præcedentium, minime opus sit. Sed semper Franciscus voluntas, nationis loco esse solet.

Catapotia stomachica, Mesue filii. XXVI.

B iliosos ac pituitosos humores, eos præsertim qui caput, iecur, & ventriculum obsident, vacuant. Præterea ventriculum roborant, concoctionem iuuant, appetentiam excitant. Habent hierapicra, drach. septem. Trium myrobalanorum, an. drach. tres. Agarici, drach. duas. Turpeti boni, dr. decem. Epithymi cretensis, anisi, an. drach. duas, & dimidiam. Salis Indi, drach. duas. Absinthii, scammonii, an. drach. tres. Cum penidiorum, drach. tres, & succo scariolarum, formetur massa.

ANNOTATIO.

Quum hæc catapotia, vt etiam sequentia satis magnam Turpeti copiam, quod stomachum mirum in modum offendit, accipiant, diligenter Medicis cauendum erit, ac temere iis catapotis vtantur, quod

A quod non solum turpetum: verum etiam agaricum, ventriculum admodum subuerentem recipiant sed tum solum, quum flauam bilem & pituitam valenter ex ventriculo educere volent. Ceterum quum variz, sex nimirum, sint Catapotiorum stomachicorum apud Mesue filium compositiones, adeoque pharmacopœi nunc hanc, nunc illam constructam, sub vnica tamen inscriptione, habeant: præstat illas aliqua ratione discernere, hac scilicet, vt præsentem compositionem simpliciter Cataporia stomachica: alteram quæ mox sequitur cum adiectione maiora, quod pluribus: & tertiam minora, quia paucioribus constet simplicibus, nominemus. Hac enim distinctione efficiemus, vt Medici cognoscant: qua illis compositione sit vtendum. Franciscus Alexander, vt ab aliis dissentire videatur, simplicium ordinem mutat, ponderibus retentis.

Cataporia stomachica maiora, Ioannis Damasceni. XXVII.

B *Idem quod priora possunt. Capiunt hiera picra, drach. decem. Trium Myrobalanorum, absinthii, an. drach. duas. Mastiches, anisi, bellirici, emblici, agarici, an. drach. tres. & dimidiam. Zingiberis, drach. duas. Caryophyllorum, salis gemmei, floris iunci odorati, an. drach. vnâ. Turbit, drach. duodecim. Cum succo absinthii fingatur massa.*

Cataporia stomachica minora, Ioannis Damasceni. XXVIII.

A *ccipiunt myrobalanorum flauorum, aloes, turpeti, an. drach. decem. Rosarum, spica, mastiches, an. drach. duas, & dimidiam. Anisi, drach. vnâ, & dimidiam. Salis Indici, croci, an. drach. vnâ. Cum succo absinthii formetur massa.*

Cataporia¹ polychresta, Ioannis Damasceni. XXIX.

C *Ad varios capitis, ventriculi, iecorisque affectus sunt efficacia. Purgant enim ex iis & sensoris pituitam, & bilem viramque. Quapropter ad disuturnas febres & complicatas, vitia capitis, ventriculi, & iecoris plurimum valent. Recipiunt myrobalanorum flauorum, rhei barbari, an. drach. quatuor. Succu eupatorii, succu absinthii, an. drach. tres. Dacrydi, drach. sex. Cepulorum, Indorum, agarici, colocynthidis, polypodii, drach. duas. Turpeti, aloes, an. drach. septem. Mastiches, rosarum, salis gemmei, epithymi, anisi, Zingiberis, an. drach. vnâ.² Electuarii rosati, quantum sufficit ad excipiendum.*

ANNOTATIONES.

¹ Polychresta) Ob id sic sunt appellata, quod ad multos affectus corporis præter naturam sint vtilia, & omnes humores purgent. Vulgus Medicorum & Pharmacopœorum Aggregatiua vocant. Et sunt optima, & digna quæ in frequenti sunt medicorum vsu, quod absque difficultate educunt, & maxime sunt efficacia.

D ² Electuarii rosati) A Mesue, non Nicolao, descripti. Inuenies eius compositionem inter Antidota purgantia.

Cataporia e fumaria¹ Auicenna. XXX.

H *umores biliosos, acres & salsos e corpore educunt: ideoque pruritus & scabiei, atq; id genus aliis cutis vitiiis conferunt. Habent myrobalanorum flauorum, cepulorum, nigrorum, scammonii, an. drach. quinque. Aloes, drach. septem. Omnia² ter imbuantur succo fumarie depurato, & toties siccantur: postremo fingatur massa.*

ANNOTATIONES.

E ¹ Auicenna) Fen. 7. Canonis quarti. de Curatione scabiei atque pruritus, cap. septimo. Affinia sunt catapotii Indis supra descripti, sed imbecillius purgant.

² Ter imbuantur) Nam vbi primo fuerit siccata massa, plus succi est adiiciendum, & rursus exsiccandas: idque tertio faciendum erit.

Cataporia sine quibus esse nolo, Nicolai Præpositi. XXXI.

M *irifice pituitam, bilem, & melancholicum humorem a capite ducunt, & ad oculorum claritatem conducunt, visumque conseruant. Suffusionibus auxiliantur, aurium doloribus, atq; tinnitui. Ileosis quoq; non sine magna utilitate dantur. Capiunt aloes optima lota, drach. quatuordecim. Myrobalanorum flauorum, cepulorum, bellericorum, emblicorum, indorum, rhei barbari, mastiches, absinthii, rosarum, violarum, senæ, agarici, cassiæ, an. drach. vnâ. Scammonii bene triti, drach. sex, & dimidiam, dissoluantur in succo feniculi, & per pannum tantum de eo traiciatur, quantum ad Catapotiorum confectionem satis erit: * formeturq; massa.*

Cataporia e Benedicte, Nicolai Myresici. XXXII.

H *umores maxime pituitosos, & ad articulos decumbentes, eliciunt. Obstructiones, quæ sunt in instrumentis nutritionis, tollunt. Auxiliantur etiam iis, qui lapide renum & vesica molestantur. Accipiunt specierum benedicte laxatiua, drach. sex. Mellis rosati, quod satis est, formetur massa.*

Cataporia massichina, Conciliatoris. XXXIII.

V *entriculum ab omni morbo præseruant, leuiter purgant: cerebrum, & reliqua viscera, item oculos, & uterum a putridis humoribus liberant. & tuentur. Recipiunt mastiches, drach. qua-*

Aggregatiua.

Polychresta.

*Manibus olco violato, vel communi inunctis.

tuor. *Agarici optimi, drach. tres. Aloes selectæ, drach. decem. Cum succo artemisia, aut serapio este. i. A chade, fingatur massa.*

Catapotia ex aloë & mastiche, Nicolai Præpositi. XXXIV.

Sine molestia ventriculū purgant, & ex eo bilem ac pituitam eliciunt. Habent aloes, vnc. vnam. Mastiches, vnc. dimidiam. Caryophyllorum, rosarum rubearum, an. drach. vnam. Croci, dacrydii, an. scrup. duos. Cum succo fœniculi aut absinthii formetur massa.

Catapotiā ex aloë lota, incerti auctoris. XXV.

Cerebrum, ventriculū, uterū, & alia viscera a putridis humoribus purgant. Capiunt aloes cum succo rosarum rubearum lota, vnc. vnam. Agarici in pastillos redacti, drach. tres. Mastiches, drach. duas. Specierum diamoschi dulcis, drachmam dimidiam. Cum vino Chio, quod vulgo Maluaticum nominatur, fingatur massa.

Catapotia Arabica, Nicolai Præpositi. XXXVI.

Omnes humores mirifice purgant, lætitiā generant, tristitiāq; depellunt, mentis vigorem conseruant: visum acunt, auditum amissum reparant, memoriā roborant, vertigini, hemi-
crania, ac dolori capitis succurrunt. Accipiunt aloes selectæ, vnc. quatuor. Radicis bryonia, myroba-
lanorum flauorum, cepulorum, indorum, bellericorum, emblicorum, mastiches, dacrydii, asari, rosarū,
an. vnc. vnam. Castorii, drach. tres. Croci, drach. vñā. Succu fœniculi quod satis est, formetur massa.

ANNO TATIO.

Saluberrima sunt, ac tutissima, omnibusque expurgandis humoribus idonea. Aloe namque dacrydiū, myrobalani flauī, bilem: emblici, bellirici, cepuli pituitam. Bryonia, Dioscoride teste, pituitam & aquo-
sos humores euocat. Cetera robur firman, & medicamentorum violentiam retundunt.

¹ Vncias quatuor) Et hoc loco falso me perstringit Franciscus Alexander, quasi drach. tres, mutilus, vt verbo eius vtar, legam: quum disertē dixerim vncias quatuor aloes sumendas esse. O immensum reprehē-
dendi alios temere prurium!

Catapotiæ Cynoglossi Nicolai Præpositi. XXXVII.

Alii nominant, Catapotia ad omnes de stillationum morbos. Magnam enim vim obtinent in te-
nibus sistendis de stillationibus, & sedandis ac mitigandis omnis generis doloribus. Recipiunt
¹ Cynoglossi, opii, seminis hyoscyami, an. drach. quatuor. Myrrha troglodytica, drach. sex. Thuris ma-
sculi, drach. quinque. Caryophyllorum, drach. duas. Cinamomi, ² styracis calamitis, an. drach. duas. Cū
stillatio rosarum liquore, fingatur massa.

ANNO TATIONES.

¹ Cynoglossi) Ridiculum plane est, quod Rondeletius, vir eruditione clarus, Cynoglossum nostrum nō
esse verum, scribit, sed potius glastum agreste: non enim edit caulem, neque florem: quod si verum est,
glastum hoc esse non poterit, quod vtrunque ferat. Cynoglossum autem nostrum esse verum, & a glastro
syluestri diuersum in nostris de Stirpium historia luculentissime monstrauimus.

² Styracis calamitis) Ita conuertendum erit, quod in quibusdam codicibus Cozumbri scribatur, & a
Simone Ianuense, Arabicarum vocum fido interprete, pro Styrace exponatur. Conducit vero, vt Dio-
scorides testatur, de stillationibus.

Catapotiæ Cynoglossi, Nicolai Myrepsii, numero 22. XXXVIII.

Ad omnem defluxionem capitis, thoracis, & pulmonis mirabiles, & dolorem dentium sanant. E
Habent myrrha, drach. sex. Thuris masculi, drach. quinque. Opii, hyoscyami, radicis cynoglossi a-
ridi, an. drach. quatuor. Stillatitii rosarum liquoris, quod satis est: finge pilulas, & dato dormituri.

ANNO TATIO.

Hæc est legitima catapotiorum de Cynoglossi descriptio: quæ a priori, quod ad pondera attinet, nihil
distat, nisi quod Climacis rationem habet. Accesserunt autem præcedenti tria simplicia, quæ ab alio Ni-
colao Præposito vocato adiecta sunt, haud dubie vt opii & hyoscyami vires nō nihil frangant. Franciscus
à. Alexander pondera, præter Myrepsi sententiā, mutat, atq; Opii & Hyoscyami tantū drachinā mediam
inferit. Myrepsi vero ratione cōposita, sæpenumero felici successu dedi catapotia. Nō tamen vñdecim, i. e.
aut 15. vt in Myrepsi codice scribitur, sed ex drachma vna sex pilulis confectis, vñā ante cubitū deuorandā
exhibui. Atq; sic vtendō, pondera Myrepsi mutanda non sunt, quod alias dolorem haud mitigent.

Catapotiæ quinque myrobalanis Nicolai Myrepsii. XXXIX.

Conferunt stomachicis, melancholicis, l'enosis, & inflatis, sanguinemq; purificant. Capiunt quinque
myrobalanorum generum, agarici, dacrydii, colocynthisidis, senæ, an. drach. duas, scrup. vnum, &
dimidium. Epihymi, turpeti apisi, mastiches, lapidis lazuli, an. drach. vnam, grana sedecim. Rhei
barbari, dr. vnam, scrup. vnum. Aloes flauæ, vnc. dimidiam. Cum succo fœniculi formetur massa.

ANNO TATIONES.

¹ Drach. duas, scrup. vnum, & dimidium) Variant in aliis codicib. pondera. Nam Nicolai Præpositi co-
dex habet vñciam dimidiam. Cordi medicamentarius liber drachmā dimid. Nicolai autē Myrepsi, vñde
compositionem hanc ad verbum transcripsimus, manuscriptum exemplar legit, drach. duas, & dimidiā.

Atque

A Atque hoc sane pondus legitimum est, quod medium sit inter utraque iam dicta: quorum alterum, nimirum: alterum vero minus existit.

² *Mastiches*) In aliis codicibus ante mastichen, feniculum insertum est: quod tamen in Græco desideratur. Neque utique temere, quod catapotia hæc subinde feniculi succo excipiantur.

³ *Drachmam unam, grana sedecim*) Et hic variant pondera. Nam & Nicolai Præpositi exemplar habet drachmas duas, & dimidiam, & grana quinque. Quod secutus est etiam Cordus. Sed pondus, quo os Cordus expressissimum, est legitimum. Siquidem quum Cyaneus lapis erodendi etiam facultatem obtineat, satis erit, si de eo drachma una, & grana sedecim accipiamus.

B ⁴ *Rhei barbari*) In aliis omnibus codicibus omissum est Rheum barbarum. Quapropter præfens descriptio ceteris melior est, atque a Pharmacopœis usurpanda, quod moderatius & longe tutius vacuet, quàm ea, quæ a Præposito est proposita, ob Turpeti, & lapidis Lazurii parciorem copiam. Purgant autem catapotia illa utramque bilem & pituitam: Cerebrum expurgant etiam, & visionem acunt.

⁵ *Vnciam dimidiam*) Alii codices integram vnciam habent. Sed quia accessit Rheum barbarum, quod illi omiserunt, sufficit vnciam dimidiam accepisse.

Catapotia ¹ *Bechica* Ioannis Damasceni. XL.

A Duerfus tussim veterem & fissam, gutturisque & faucium spumam pollet. Accipiunt succi glycyrrhizæ sacchari, an. drach. decem. Amyli tragacanthæ, an. gdalarum dulcium, an. drach. quinque. Cum lentio seminis psylli, aut cydoniorum succo fingatur massa. Quod si rubea vocata catapotia facere volueris, adde Boli armeni præparati, drach. sex.

Bechica
rubra;

ANNO TATIO.

C ¹ *Bechica*) Græce βήχικα, quod aduersus tussim plurimum valeant, dicta sunt. Siquidem græce βήχισι tussim sonat: Barbari inepte admodum Bichichia nominant.

Bechica.
Câç.

Sub lin-
gua Bar-
baris no-
minatur.

Catapotia lingua subdita, Nicolai Myrepsici. XLI.

A D asthmaticos, tussientes, & stomachi imbecillitatem admodum probata. Conferunt cardiaci, & non nisi recta ceruice spirantibus. Recipiunt seminum cucumeris, cucurbitæ, & rili, melonum, an. drach. dimidiam. Radici glycyrrhizæ, scrup. duos. Succu glycyrrhizæ, drach. unam. Galangæ, tragacanthæ, gummi Arabici, an. scrup. unum. Zingiberis, iridis, ambaris, styracis calamitæ, margaritarum, ligni aloës, an. scrup. unum. Cinamomi, caryophylli, nucis moschæ, papaueris albi, boraginis, ocymi, an. scrup. unum. Penidiorum, drachmam unam. Moschi, grana sex. Nucum pinearum scrup. unum. Stillarum rosarum liquoris, quod satis est, cui tragacanthæ sit intrita. Formentur catapotia, quæ sub lingua contineantur.

D Catapotia Sebellia Ioannis Damasceni, XLII.

O Bstructiones ventriculi iecoris, lienisque sanant, & hydropem, materiamque biliosam, pituitosam, & melancholicam e iam dictis partibus obstructis vacuant. Habent spica Indæ, drach. quinque. Spica Romana, drach. duas. Rhabarbari, azarici, epithymi, an. drach. quatuor. Costi, mastiches, chamædryos, amomi, an. drach. tres. Croci, drach. duas. Myrrhæ, cinamomi, caryophyllorum, iunci odorati, an. drach. unam. Aloës, drach. decem. Cum veteri vino fingatur massa.

Catapotia ex colocynthide Ioannis Damasceni. XLIII.

E **A** D affectus pituitosos & melancholicos, ut albos curat, & difficiles, & artuum dolores. Capium colocynthidis, drach. sex. Myrobalanorum nigrorum, & flauorum, sagapeni, bdellii, sarcocollæ, an. drach. quinque. Aloës, drach. septem. Melanthi, cumini ¹ Carmani, origani ² Persici, ³ nasturtii albi, salis gemmei, absinthii Romani, an. drach. unam. Cum succo porri formetur massa.

ANNO TATIONES.

¹ *Carmani*) Ex Carmania, Indiæ regione.

² *Persici*) Ex Perside allatum. Cretense bonitate illi respondet.

³ *Nasturtii albi*) Satiuum intelligit: quod album vocat, ab albis floribus, canescentibus foliis, & radice alba.

Carmanu.
Persicum.
Nasturtiu
album.
E Mezereon.

Catapotia ex ¹ *Thymelea* Ioannis Damasceni. XLIV.

F **S**erosum excrementum valenter purgant, seu aquas: ob id hydropem, ascitem & anasarcam iuuat. Accipiunt foliorum thymelæ, aceto per noctem maceratorum & siccatorum, drach. quinque. ² Myrobalanorum flauorum, drach. quatuor. Cepulorum, drach. tres. Cum manna, vel tamar Indis aqua intybi dissolutis, fingatur massa.

ANNO TATIONES.

¹ *Thymelea*) Mezereon Arabes nominant. Quæquam sub Mezereon appellatione Thymelæa & Chamelæam, ut alibi diximus confundunt.

² *Myrobalanorum*) Ad reprimendam vim acrem, & supra modum purgatricem thymelæ.

Thyme-
læa.
Mezereon

Catapotia e sarcocolla Ioannis Damasceni. XLV.

Pituitam vacuant, ob id pituitosis affectibus commodant. Recipiunt sarcocollæ, drach. tres. Turpeti,

drach. quatuor. Pulpa colocynthidis, zingiberis, an. drach. unam, & dimidiam. Salis gemmei, drach. unam. Cum stillatio rosarum liquore formetur massa.

Catapotiae¹ sagapeno, Ioannis Damasceni. XLVI.

Valent ad ischiadem, podagram, & reliquorum articulorum dolorem, atque uteri, Menses eliciunt. Habent sagapeni, kammoniaki, popanacis, bdellii, an. drach. duas, & dimidiam. Seminis apii, ammeos, ruta sylvestris, anisi, an. drach. unam. Acori,² lepidii Indi, calaminthes, folii, cetaurii, polii, costi, salis gemmei an. drach. dimidiam. Aloes, drach. sex. Colocynthidis, drach. quinque. Cogantur cum succo artemisia, aut porri, in massam.

ANNOTATIONES.

Sagapenu.

¹ Sagapeno) Serapinum deprauata voce hodie appellant Medici, quod veteres Græci Sagapenum nominant.

Setaragi.
Cordus
errat.

² Lepidii Indi) Mesuæ filius, Ioannes Damascenus, habet Seitaragi: quam vocem Cordus, & alii falso pro Casia lignea interpretantur. Nam non est, nisi Lepidium: quod deprehender manifeste, qui volet eam quæ Serapio de Seitaragi scribit, conferre cum iis, quæ Dioscorides, & Galenus de Lepidio tradunt. Per Lepidium autem intelligunt herbam, quæ alio nomine iberis dicitur, ischiadicis conuenientissima.

Catapotia ex opopanace, Ioannis Damasceni. XLVII.

Ad resolutionem, conuulsionem caninam, genu, pedum & aliorum articulorum dolores, morbosq. nervosarum partium frigidos. Capiunt opopanacis, hermodactyli, sagapeni, bdellii, kammoniaki, colocynthidis, an. drach. quinque. Croci, castorii, myrrha, zingiberis, piperis nigri, piperis longi, cassia, myrobalanorum flauorum, belliricorum, emblicorum, an. drach. unam. Scammonii, drach. duas. Turpeti, dr. quatuor. Aloes, dr. 12. Cum succo brassicæ maceratis in eo prius lachrymis, fingatur massa.

Catapotia e bdellio maiora, Ioannis Damasceni. XLVIII.

Ad fluxum hæmorrhoidum, & ulcerum in eis, & ad menses immodicos. Accipiunt bdellii, dr. duodecim. Ammeos, drach. tres.¹ Cepulorum, indorum, belliricorum, emblicorum,² concharum venerearum, vstarum, succini, an. drach. duas, & dimidiam. Maceretur bdellium in succo porri, & formetur massa.

ANNOTATIONES.

¹ (Cepulorum, indorum) Quorum ope humor melancholicus & vltus per aluum vacuatur, & materia hæmorrhoidibus detrahitur.

Veneres
seu Veneri.
Cordus
errat.

² (Concharum venerearum, vstarum) Codices alii Ioannis Damasceni habent, atqui parum recte, concharum ostarum genus pro specie. Venerearum autem, seu Veneris dictionem varie interpretantur. Alii enim pro radice acori, alii pro auellanis vltus, vt Cordus. Neutri tamen recte. Non significat enim hoc loco, nisi conchas venereas vltus. Venereæ autem dictæ sunt, quemadmodum Rondeletius censet, quod hæc apud Gnidiōrū Venerem colebantur. Nonnullis vero ita nominatæ esse videntur, quod hæc Conchæ non modo Veneri gratæ, sed etiam cognatæ sint, ob communem e mari originem, & quod celebris sit eius deæ effigies concham pede premens. Quibusdam vero a pulchritudine & splendore, lauoreque, quæ dotes veneri formosique corporis præcipue sunt. Conchæ istæ oui figura sunt. Purpura maiores & latiores, testa læui, in cuius extremo utroque foramen est, alterum cibi capessendi gratia non asperum, non rotundum, sed parum prominens, non tamen in angulōs procurrens: alterum ad excrementa reicienda, concha simplice atque vna vtrique sese colligente, vt fusius lib. 2. de testaceis cap. 34. Rondeletius memorie prodidit. Concharum autem mentionem hic recte fieri, venerearum vstarum primum ex alia compositione, tertia nimirum catapotiorum de Bdellio, satis liquet, in qua diserte conchularum venerearum vstarum fit mentio. Dein satis constat, Conchas venereas ad alui fluxus constringendos, & intestinorum atque uteri vlcera, quemadmodum etiam testas concharum, quæ peculiariter Ostrea nominantur, vltas, vt testis est lib. 1. Galenus, implendis, cicatriceque claudendis vlceribus humidis esse vtilis, siquidem insignem resiccandi vim citra calorem, habent, vt hoc nomine ad præsentem compositionem apta sit concha venerca. Ceterum vulgus pharmacopœorum pro Concha venerca Pectines, atqui parum recte, vsurpat, quod Pectines specie a Conchis differant, & detergendi quoque facultatem habeant, adeoque ad fluxus constringendos nequaquam conducant.

Catapotia imperialia, Incerti auctoris. XLIX.

Parū admodū purgant, & plurimū roborant ventriculū, & oīa viscera refrigerata. Conseruant facultates naturales, sanguinē & spiritus purificāt. Recipiunt cinamomi, amomi, anisi, mastiches, cardamomi, zingiberis, Zedoaria, maceris, nucis moschata, caryophyllorum, croci, cubeba, ligni aloes, turpeti, manna, agarici folliculorū senæ, spicæ nardī, myrobalanorū flauorū, cepulorū, indorum, belliricorū, emblicorū an. scrup. unū. Rhei barbari, unc. unā. Aloes, unc. duas. Cū serapio rosaceo aut violaceo, fingatur massa.

Catapotia ex octo rebus Nicolai Praprosii L.

Purgant humores crassos a capite, visum acuiunt, & suffusionē arcent. Habent aloes, dacrydii, ana drach. duas. Pulpa colocynthidis, epithymi, agarici, mastiches, dauci cretici, myrobalanorum cepulorum, absinthii, an. dr. unam. Cum succo solani formetur massa.

ANNO-

A

ANNOTATIO.

1 Ex ostioribus.) Græce *ostioribus* dicuntur. Nam aloë in formandis catapotiiis numerum tenere non videtur, ut neq; mel, neq; saccharum in Electuariis, alias ex nouem constarent rebus.

Catapotia ex aloë. Galeni. LI.

Biliosos & acres humores, pituitamq; salis a capite purgant, eiusq; destillationes sistunt, tussibus profunt, & asperitates faucium leniunt, suntq; omnium præstantissima, & ob id in vsum quotidianum reuocanda. Accipiunt aloë, scammonia, ana vnciam dimidiam. Colocynthidis, agarici, ana drachmas duas. Bdelyj, gummi arabici, ana drachmam vnam. Cum succo absinthij, fingatur massa. Alijs ita componitur. Pulpa colocynthidis, drachmam vnam. Aloës, scammonie, ana drach. duas. Mastiches, drach. dimidiam. Cum succo absinthij formetur massa.

B

Catapotia genitale semen auentia. Incerti auctoris. LII.

Habent seminis eruce, testiculorum vulpis, seminis druce, satureie, caudarum scinci, pudendi tauri, ana vnciam dimidiam. Cum cerebello passerum fingantur catapotia.

DE SACCHARIS ET CONDITIS. SECTIO VII.

2 Iosacchar. I.

Saccharum violaceum seu violatum bilis feruorem mitigat, sitim exstinguit, aluum lenit: tharacis vitij calidis faucium & gutturis asperitati ac seccitati auxiliatur: fit hoc modo. Florum violarum nigrarum recentium, cauda pediculoue & viridi, ceu calculo, purgatarum, in mortario lapideo tritarum, duplo saccharo miscentur, & vase vitreo aut vitrato reponuntur. Mesue filius triplum sacchari miscet.

C

ANNOTATIONES.

1 Saccharis.) Ita cum recentioribus Græcis, & iunioribus Medicis appellare placuit. Quamquam ii Sacchara. Conferuas etiam vocent, flores saccharo conditos.

2 Iosacchar.) Saccharum violaceum sonat. Rectius viola saccharata.

Iosacchar.

3 Triplum.) Quæ ratio condiendi non probatur, quod minima Sacchari mole violarum facultas obruatur. Hodie flores minutim inciduntur, & singulis libris florum, sacchari libræ duæ permiscuntur: nisi flores ficiore fuerint. tum enim singulis libris florum, Sacchari albissimi libræ duæ, & dimidia addiuntur.

Saccharum rosaceum rosatumue. II.

Ventriculum & cor, reliquaq; viscera refrigerat, firmat, repentesq; in arcem cerebri vapores reprimat. Tabidis, & sanguinem reijcientibus vetus plurimum confert. Fit vero sic. Foliorum rosarum rubrarum nondum perfectarum, recentium, exunguatorum, tritorum in mortario lapideo, libra vna duplo saccharo permiscetur: & in vase vitreo, aut vitrato, non tamen omnino repleto, ut feruenti sit locus, nec foras exsiliat, reconduntur. Hodie, ut diximus, minutim tantum inciduntur rosarum folia, & in umbra prius, ut eorundem excrementosa humiditas resoluiatur, a nonnullis exsiccantur.

Saccharum buglossatum. III.

Cor ipsum roborat, eiusq; tremorem, & syncopen sanat, manicos & melancholicos iuuat. Fit, ut violaceum, nempe floribus pediculo purgatis, in pila tritis, addito saccharo duplo.

ANNOTATIO.

1 Saccharum buglossatum non est, nisi Borraginis saccharum. Siquidem veterum Buglossum notum est, nisi Borrago recentioribus vocata herba, ut alibi fusius monstrauiamus.

Saccharum Nymphae. IV.

Vehementioribus febribus subuenit, & doloribus quos bilis creat. Capitis ardores feruoresq; sopit, ac somnum accersit. Fit, ut violaceum.

ANNOTATIO.

1 Nymphae.) Nenufaris, hodie facientes Medicinam & Pharmacopœi nominant.

Valeat aduersus iecoris calorem, & viscerum obstructions. Fit, ut prædicta.

Saccharum Oxalidis. VI.

1 Acetosa.

Contra ventriculi & iecoris calorem auxilio est. Fit, ut præcedentia.

Saccharum Prunelle. VII.

Irepentes in cerebrum vapores calidos reprimat, & ad omnia oris gutturisq; vitia utile est. Fit, ut priora.

Saccharum Echj. IIX.

Commorsis a serpente auxiliatur, & præsumentes percuti non patitur. Lumborum dolores sedat. Fit, ut prædicta.

ANNOTATIO.

2 Echii.) Buglossum recentiores vocant, quemadmodum alibi ostendimus.

Saccharum Rosmarini. IX.

Anthos.

Anthos, hodie facientes Medicinam vocant. Cerebrum refrigeratum ac humectum firmat, itemque omnes corporis partes nervosas. Flatus denique dissipat. Fit alijs similiter.

Saccharum Lauendulae. X.

Aduersus morbum comitiales, apoplexiam, & id genus alia frigida cerebri & nervorum vitia valet. Fit, ut ea qua praecedunt.

Verum firmat, & alia qua saccharum praecedens potest. Fit ut priora.

Saccharum betonicae. XII.

Frigidis capitis malis confert, ventriculum & uterum purgat, calculosis renibus auxilio est, conceptionemque iuuat. Fit instar aliorum.

Comitiali morbo aduersatur, & ea qua praecedens efficere potest. Fit, ut alia.

Saccharum Maioranae. XIV.

Scorpionum ictibus aduersatur. Menses euocat. Urinae difficultati, & hydropicis succurrit. Fit aliorum modo.

; Melissa.

Saccharum Melissophylli. XV.

Eadem, quod praecedens efficit. Praeterea articulorum dolores mitigat. Fit, ut priora. Hac saccharata medicamenta commemorasse satis sit. Nam magna ex parte omnibus in Officiis parata habentur. Sunt tamen, qui pluribus alijs utuntur, ut est:

16 Scabiosa

17 Sambucus

18 Mentha

19 Fumaria

20 Enfrasia

* Primulae

veris.

* Lili cō-

nallui.

22 Tilia florum

23* Ephemeris non letalis

24 Cardus benedicti

25 Persica floribus, bilem & aquam educit

26 Genista floribus, ad renum & lienis obstructions

Conficiuntur autem omnia, instar eorum, qua antea dicta sunt, easque habent, quas herbae, quae saccharo condiuntur, facultates. Ad condita igitur transeundum erit.

DE CONDITIS.

Condiuntur hodie magna ex parte radices, cortices, & fructus quarundam stirpium & arborum. Condiendi vero vocabulum recentioribus Medicis in angustum sic est coactum, ut Conditum appellatione ea solum veniant, quae melle aut saccharo, ut vocant, clarificato excepta conseruantur, ac condiuntur. Sunt vero usitata hodie condita quae sequuntur.

Zingiber Conditum. I.

Intemperiem ventriculi frigidam & humidam sanat, & ab ea tardam ac depravatam concoctionem, qua cibos in acidam cruditatem corrumpit. Viscerum lubricitatem corrigit. Flatus dissipat, alimenti in iecur & uniuersum corpus distributionem accelerat. Senibus, aut natura, aut ex morbo frigidis, & hyeme vtile. Fit hoc modo. Zingiberis recentis, si haberi potest, aut saltem arte humectati, pars una, cum Sacchari partibus tribus coquitur. Sunt qui zingiber humectatum cum melle partibus tribus, & sacchari parte una coquunt: alij vero cum saccharo clarificato triplo condunt. Humectandum autem zingiber album, purum, recens, aqua frigida affusa, qua biduo maceratur.

ANNOTATIO.

1 Aqua frigida affusa.) Hac ratione non solum radices, sed & fructus sicciore recentibus similes redduntur. Biduo enim sine etiam coctione, in aqua frigida macerata haec omnia intumescunt. Atque hic se prodit error eorum, qui aridas radices Zingiberis longo tempore, nunc cum acerrimo lixiuio, calce, quernoue cinere: nunc muria macerant humectantque donec mollescant. Siquidem hac ratione magnam acrimoniam, & calorem illis conciliant, ut parum tutus sit illarum subinde usus, nisi in iis, qui frigidus admodum

A modum ventriculo sunt præditi. Sunt qui zingiberis & aliarum radicum libram vnam coquunt in aqua; donec tenerescant, dein tritas per cribrum setaceum traiciunt, & denuo cum sacchari libris tribus ad mellis consistentiam coquunt. Porro Zingiber viride hodie dicitur, quod recens conditum saccharo, ex alieno orbe ad nos affertur.

Acorus conditus. II.

Cerebrum & nervos roborat, malisq; eorum frigidis auxilio est. Conditur autem, radicibus Acorus. prius in frusta dissectis: ut zingiber humectatus, cumq; Saccharo triplo coctus.

ANNO TATIO.

B *Acorus.* Indicus, Galanga maior dictus, sumendus: non nostras palustris. Hic enim ad nervorum & cerebri frigidos affectus plane inutilis est. Quocirca vsus eius in iam dictis malis damnandus est; atq; abiiciendus, neq; post hac eius vsu ægri perdendi, ac in sumtus non necessarios coniiciendi, ut libro quoq; primo monuimus: vñ non sit necesse, ea de re hoc in loco verbosiores esse. Calamus aromaticus officinarum, eodem quo Acorus modo condiri debet.

Pimpinella condita. III.

Calculosis renibus auxiliatur, mulieres a partu purgat, regio morbo laborantibus succurrit, & a pestilentia contagione incolumis atq; immunes seruat. Fit, ut zingiber conditum. Condiuntur & alia quadam radices, quas nominatim tantum recensuisse satis erit.

5 Calamus Maoticus conditus.

6 Galanga maior condita.

7 Helenium conditum. Helenij autem conditum nonnulli ita parant. Radix probe purgata, & in frusta vel taleolas dissecta, in aqua donec mollescat coquitur. Cocta subinde tunditur, & per colum trahitur, vniq; parti radices, mellis despumati, aut sacchari clarificati, partes duæ miscentur. Stomacho confert, obstructa reserat, pestilentia resistit.

8 Sisarium sariuum, loco Secacul, quod hodie incognitum est conditur, quod eius radices stomacho utiles sint, urinam & Venerem ciet, status ventriculi dissipent, conualescentibus conducant, eademq; qua Secacul præstant. Radices eius a cortice cineritio & nervo interno purgate, in frusta secantur pollicem aquantia, intus, unde nervus extractus vno caryophyllo humectato, & particula zingiberis itidem humectati facta. Deinde coquuntur ut tenerescant, & cum saccharo & melle, aut triplo saccharo solo, ut cetera, condiuntur.

Quæ sane omnia condita eam facultatem obtinent, quæ radicibus illis a probatis auctoribus tribuuntur.

Citria condita. IV.

D Cor & ventriculum firmant, concoctionem iuvant, orisq; halitum commendant. Condiuntur hoc modo. Podma citria frustatim secta, saccharo clarificato condiuntur. Ioannes Damascenus aliam habet condiendi rationem, quam sane, qui ea uti volent, in Sectione de conditis apud eundem inuenient. Condiuntur etiam cortices Citri ad eum modum. Hi carne purgati lixiuio clare merguntur diebus novem, mutato ad diem quintum: post merguntur aqua clara, donec amaritudine deposita dulcescant. Tunc aqua fontis plurima in vase mundo coquuntur donec tenerescant. Aquosa dein substantia ab his expressa, in vase lapideo merguntur horis 24. Iulebo sufficienti ex saccharo albo & aqua tripla constante, post coquuntur igne lento ad penidiorum consistentiam. Extracti ex hoc Iulebo cortices, vase vitreo reponuntur, superfuso singulis vicissim Iulebo rosato ad medicrem ceu sacchari candefacti crassitiem cocto.

Myrobalani cepuli conditi. V.

Ventriculum firmant, appetentiam inuuant, concoctionem promouent, rationalem animam partem vegetam reddunt, & sensibilem. Quapropter visum quoq; acuiunt, & vsu crebro iuuentutem & vniuersi corporis vires tuentur. Condiuntur integri, industria idonea prius humectati.

Myrobalani empelatici conditi. VI.

Ventriculum roborant, nimiamq; eius humiditatem corrigunt, mentis aciem exacuunt, sitimq; restinguunt. Condiuntur, ut priores.

Cydonia condita. VII.

Fluorem vomitumq; sistunt, ventriculum roborant: ob id concoctionem iuvant, appetentiam inuuant: iecur & cor, corpusq; vniuersum refrigerant. Hac intus a seminibus & foris a cortice purgata, quadripartito diuisa, saccharo clarificato condiuntur. Aliqui ita diuisa ex aqua coquunt, donec tenerascunt, dein saccharo condunt.

Hactenus magis vsitata recensuimus condita fructuum. Sunt autem complures alij fructus qui iam recentes quam sicci condiri consueverunt: ut sunt qui sequuntur.

8 *Aurantia*, seu, ut vulgus nominat, *arantia integra*, & horum cortices. A

9 *Limonēs*

10 *Nuces moschatae*

11 *Iuglandes*

12 *Bellerica*

Myrobalani.

13 *Cepula*

14 *Emblica*.

Purgant minus nutritioni autem inservientes partes magis roborant, concoctionem promouent, cerebri actiones omnes vegetant, visumq; clariorem reddere creduntur, obstructionsq; tollunt. Datur una singulis diebus. Cerebrum, nervos, cor, hepar, ventriculum, & partes laxas constringendo roborant, & intemperiem humidam corrigunt. Tremori cordis conferunt, appetentiam inuitant, vomitum sistunt. B

15 *Mespila*

16 *Pira*

17 *Poma*

18 *Pruna sylvestria*

19 *Cerasa*

20 *Baccaribes*.

Condiuntur autem ij fructus aut saccharo, aut melle, aut ambobus. Conditij autem melle, magis calent, & tergent, minusq; ventriculo iucundi sunt: cum Saccharo contra. Condiuntur vero interdum integri & cum seminibus interdum seminibus, purgati. Fructus sicci recentib; similes redduntur, velut pruna, & vine passae si modice compuncta in aqua frigida macerentur. Sic enim statim timent, & pleniores redduntur. C

Dia cydonium simplex. XX.

Ventriculum, & cetera viscera roborat, appetentiam excitat, concoctionem iuuat, vomitum & hienteriam sedat, ac alui fluxum cohibet. Ad vomitum autem compescendum potest, ad fluxum vero alui supprimendum ante cibum datur. Recipit carniū cydoniorum, vapore aquae calidae dulcis coctorum ad spissitudinem usq;: Sacchari albissimi despumati, & ad iustam consistentiam cocti, ana libras octo. Coquantur una ad solidam consistentiam, & massa adhuc feruens super tabulam extenditur, & refrigerata in partes dissecatur. Quidam octo libris carniū cydoniorum, libras sex clarificati sacchari adijciunt. Nonnulli in eum modum parant. Accipiunt cydoniorum decoricatorum, & a nucleis repurgatorum, libras octo. Sacchari clarificati, libras quatuor. Coquuntur cydonia per vaporem aquae dulcis, dein una cum saccharo ad iustam consistentiam coquuntur. D

Dia cydonium compositum. Nicolai Praepositi. XXI.

Ad frigidam ventriculi intemperiem facit, appetentiam languentem excitat, ventriculum & secur roborat, concoctionem & retentionem iuuat: status dissolvit, fetorem corporis remouet, & bonum odorem, pristinumq; eiusdem colorem restituit. Habet carniū cydoniorum in aqua coctum, libr. tres. Mellis despumati, libras quatuor, & dimidiam. Coquantur simul igne lento, ad iustam consistentiam: & postquam ab igne deponuntur, priusquam refrigerentur, inspergantur subsequentes species in puluerem tenuissimum triti: nempe cinamomi, vnc. una, & dimidia. Zingiberis, vnc. una. Galanga, piperis, ana vnc. dimidia. Caryophyllorum, nucis moschatae, ana drach. tres. Spica, ligni aloes, macis, cardamomi, ana drach. dua. Zedoariae, drach. una. Extendatur tota massa in tabula marmorea, prius stillatio rosarum liquore, in quo aliquid moschi solutum est, illita. Refrigerata cultello frustatim secetur. Quod si purgatorium efficere volueris, priusquam in marmorea tabula extendatur, in singulas libras inycito scammonia probe trita, vnc. dimid. Subacta, in vasculum recondantur. E

Dia cydonium compositum. Nicolai Myrepsici. XXII.

Omnia potest, quae praecedens. Capis carnis cydoniorum emundatorum, lib. tres, & dimidiam. Zingiberis mastiches, ana drach. duas. Cardamomi magni & parui, cinamomi, croci, ana vnc. dimidiam. Caryophylli, drach. tres. Moschi, drach. dimidiam. Ligni aloes crudi, galliae moschatae, ana drach. unam. Maceris, drachm. unam, & dimidiam. Spica, nucis moschatae, ana drach. dimid. Mellis optimi, lib. sex. Aut sacchari, quantum sufficit. F

Dia cydonium, e succo cydoniorum. Incerti auctoris. XXIII.

Idem potest, quod praecedens. Accipit succi cydoniorum despumati, lib. duodecim. Mellis optimi despumati. Sacchari albissimi clarificati, ana lib. duas. Coquantur simul ad iustam consistentiam. G

A tiam, dein ab igne remotis, & adhuc tepentibus inspergantur subsequentiū specierum pulueres minutissime triti, & per cribrum excussi: nempe cinamomi, nucis moschatae, ana vncias quatuor. Caryophyllorum, Zingiberis, galange, ana vnc. duae. Radicularum nardi celticae, piperis nigri, ligni aloes, macis, Zedoaria, cubebarum, cardamomi, ana vnc. una. Subacta omnia, simulq; mixta in vas recondantur.

Dia cydonium, e succo cydoniorum. Galeni. XXIV.

A d excitandam appetentiam, ijs quibus ea languet, tum ad concoctionem ciborum utile est, ventriculoque robur conciliat. Recipit succi malorum cydoniorum¹ struthiorum², sextarios Romanos duos. Mellis optimi tantundem: aceti sextarium unum, & semissem. Coctus super prunas modice, & spuma detracta, immittuntur zingiberis, vnc. tres. Piperis albi, vncia duae. Dein rursus B simili igni recoquantur, donec mellis crassitudinem consequantur.

ANNOTATIONES.

¹ *Struthiorum.*) Struthia cydonia sunt ea, quae dulciora & maiora sunt, minusq; acerba.

² *Sextarios Romanos duos.*) Hoc est, vncias quadraginta mensurales. Nam sextarius Romanus capit libram vnam & dimidiam, & sextam eius partem: id est, vncias mensurales viginti. Est etiam Atticus, qui vncias decem & octo habet, ut alibi fufius diximus.

Struthia.
Sextarius.
Romanus.
Atticus.

DE ECLEGMATIS, SECTIO IIX.

Eclegma sanum & expertum. Ioannis Damasceni. I.

T ussi, vocisq; asperitati, & raucedini, a frigidityte natae auxilio est: crassos in thorace & pulmonibus humores extenuat, & incidit. Habet cinamomi, hyssopi aridi, glycyrrhizae, ana vnciam dimidiam. Zizyphorum, myxorum, ana numero triginta. Vuarum passarum a nucleis purgatarum, ficuum aridarum, palmularum pinguium, ana vnc. duas. Foenigraci, drach. quing. Adiantii, manipulum unum. Seminum anisi, faeniculi, lini iridis, calaminthae, ana drachmas quatuor. Coquantur omnia in aqua purissima lib. quatuor, ad duarum lib. consumptionem. Colatum cum penidiorum lib. duabus, coquatur ad mellis crassitudinem. Postea adiciantur, minutissime incisorum & triorum pinearum nucum repurgatarum, drach. quing. Amygdalarum dulcium mundatarum, glycyrrhizae, tragacanthae, gummi Arabici, amyli, ana drach. tres. Iridis, drach. duae. Misceantur subiganturq; omnia simul celerrime, donec albescat medicamentum.

ANNOTATIO.

D ¹ *Eclegmatis.*) Eclegmata Latinis sunt linctus, medicamenta quae linguntur ac lambuntur verius, Eclegmata quam deuorantur. Arabibus Loch & Lohoch nominantur, ut libro tertio fufius dicemus. Veteres arte-Loch. riacas compositiones vocarunt. Coctura quidem quam Electuario solido vel liquido parciore, ut consistentia ipsa dilutior sit: praecipue si pus crassum, aut pituita lenta e pulmone educenda est.

Eclegma e scilla. Ioannis Damasceni. II.

C rassos & lentos humores, quos in thorace difficulter concoquuntur, incidit & extenuat: ideoq; asthmaticis & difficile spirantibus auxiliatur, thoracisq; dolorem leuat. Caput succi scillae, mellis despumati, ana lib. vnam. Coquantur ad eclegmatis consistentiam.

ANNOTATIO.

E ¹ *Succi scilla.*) Is vero succus a nonnullis ita colligitur. Scillas crudas tres aut quatuor in partes eburneo cultello secant, dein in pila marmorea vel lapidea terunt, cum pistillo e ligno Guaiaco constructo: & deinde succum, linteo raro eas immittentes, exprimunt.

Scilla sua.
cus.

Eclegma e pineis. Ioannis Damasceni. III.

D iuturna tussi, difficultati spiritus, & asthmatis succurrit. Humores in thorace crassos incidit & extenuat. Accipit nucum pinearum, drach. triginta. Amygdalarum dulcium, auellandarum assatarum, tragacanthae, gummi Arabici, glycyrrhizae & succi eius, amyli capilli Veneris, iridis, ana drach. quatuor. Carnis palmularum fuluarum, drach. triginta quing. Amygdalarum amararum, drach. tres. * Mellis passularum, sacchari albi, butyri recentis, ana vncias quatuor. Mellis optimi sincerissimi & odoratissimi, quod satis est.

ANNOTATIONES.

F ¹ *Drachmas tres.*) Ita omnes quos vidimus codices legunt. Quare typographi errore factum esse iudico, ut in Cordi medicamentario libro scriptum sit, vncias tres. Facilis enim a 3 in 3 lapsus est.

Cordus.

* *Mel passularum.*) Est in quo passulae donec liquentur bulliunt. Sunt qui passulas enucleatas viginti quatuor horis maceratas probe concoquunt atque exprimunt, ac dein colant, colatasque ad mellis lentorem percoquunt.

Mel passula.
larum.

² *Vncias quatuor.*) Ioannis Damasceni fere omnes codices habent, drachmas quatuor. Nam exigua satis quantitas esset aliorum respectu, drach. tres. Quapropter pro drach. substituere vnciam placuit.

Franciscus Alexander metuit ne butyrum rancorem induat, atqui temere, quum alia multa ei admista haud ferant, vt corrumpatur. Senibus maxime familiare est hoc eclegma. Peripneumoniam & pleuritidem iuuat, inclinante iam febre.

Eclegma e pulmone vulpis. Ioannis Damasceni. IV.

Eiusdem cum precedentibus facultatis, tabidis vero potissimum confert. Recipit pulmonis vulpis siccati & preparati, succi glycyrrhizæ, adianti, seminis fœniculi, anisi, ana vnciam vnā, Sacchari clarificati, vnc. quindecim. Trita omnia tenuissime, cum saccharo excipiuntur.

ANNOTATIO.

¹ *Preparati.*) Preparatur autem hoc modo. Recens ex vulpe iuvene venatu capta sanguine, venis & arteriis purgatur, vino albo odorato tepido sæpe abluitur, clibano siccatur, exsiccatus pulucre absinthii reponitur.

¹ *Eclegma e papauere. Ioannis Damasceni. V.*

Iuuat tussim, & gutturis asperitatem, a destillatione calida ac tenui ortas. Hanc enim sistit, & crassorem reddit. Confert etiam febribus ardentibus, dolenti thoraci, & pleuritidi. Habet papaueris albi, drachm. viginti quinq. Amygdalarum dulcium repurgatarum, nucleorum pineorum, gummi Arabici, tragacanthæ, succi glycyrrhizæ, ana drachm. decem. Amyli, seminum portulacæ, lactucæ, & cydoniorum, ana drachmas quatuor. Croci, drachm. vnā. Penidiorum alborum, vnc. quatuor. ² Serapy e papauere, præsertim albi & nigri, cum semine lactucæ & violis facti, quod satis est.

ANNOTATIONES.

¹ *Eclegma e papauere.*) Sunt qui Dia papaueris appellant. Sed est eius alia apud Nicolaum descriptio. ² *Serapi e papauere.*) Eius compositio sic habet. Recipe Caput papauerum alborum & nigrorum, vna cum semine ipsorum, ana vncias sex. Seminis lactucæ, florum violarum, ana vnc. vnā. Bulliant in aqua iustæ quantitatis, quoad capita papauerum percocta fuerint. dein exprimantur: & cum sacchari & penidiorum, ana lib. vnā fiat Serapium.

Eclegma ad asthma. Ioannis Damasceni. VI.

Ad asthma & diurnam tussim valet: humorem enim crassum extenuat. Capit scillæ assatæ drach. tres. Radicis iridis, drachmas duas. Hyssopi, marrubij, ana drachmam vnā. Myrrhæ croci, ana drach. dimid. Melle sufficiens excipiuntur.

ANNOTATIONES.

Validissimum quidem ad incidendos ac dissecandos crassos humores hoc est Eclegma: sed ob multa amara, quæ eius constituunt compositionem, medicamenta, vehementer ingratum.

¹ *Drachmas tres.*) Desseñnius, secutus exemplaria inendosa, legit drachmas quatuor. Nam quum fit Climax, non potest lectio illa non esse falsa. Proinde vt climacis ratio constet, tres tantum drachmæ substituendæ erunt, vt nos legimus.

Eclegma ad vocem amissam. Nicolai Myrepsici. VII.

Accipit seminis lini tosti, drachm. duas. Vuarum passarum pinguium exemptis acinis, nucleorum pinearum nucum tostorum, ana drach. sex. Glycyrrhizæ, drach. tres. Palmularum pinguium, vnc. vnā, & dimidiam. Tragacanthæ, drach. vnā. Seminis vrticæ, drach. dimidiam, grana septem. Styracis calamitæ, drach. dimidiam. Penidiorum & sacchari, ana vnc. vnā. Cum succo ruffilaginis formetur Eclegma.

DE ZVLAPIIS, ET SVCCIS MEDICATIS, SECTIO IX.

¹ *Zulapium violaceum. I.*

Febribus acutis, iecoris & cordis caloribus, asperitati gutturis, tussi arida, affectibus thoracis calidis & siccis succurrit. Sitim restinguit, aluumq. emollit. Recipit stillarum violarum recentium liquoris, lib. tres. Sacchari clarificati, libras duas. Coquuntur ex præscripto artis, lenso igne.

ANNOTATIONES.

Zulapiū.
Iulebum.

¹ *Zulapium.*) Ita cum recentioribus Græcis vocamus, quod hodie facientibus Medicinam Iulebum: aut magis barbare, Iuleb nominatur.

² *Stillarum violarum, &c.*) Is parandi modus hodie est vsitatissimus, magisq. laudatus, quam is qui fit ex violis siccis aqua maceratis: cui saccharum incoquitur, ad hunc modum. Capit violarum siccatū, vncias tres. Macerantur in sextariis tribus, hoc est, libris quinque aquæ, 24. horis. Colatū cum sacchari tribus li-

Abus libris coquitur. Id Iulebū priori minus efficax est, & tamen hodie sub Serapii violati nomine frequentissime ita paratur. Præstantissimum autem, quod ex violarum succo cōficitur, & Actuarius *ibexap*, id est violarum succus saccharatus appellatur: utpote quod violarum in se substantiam recipit. Parum aut nihil differt a Serapio violato simplici. Paratur ex præscripto Ioānis Damasceni ad hunc modum. Recipit Succus violarum, lib. tres. Sacchari clarificati, lib. duas. Coquantur, ut dictum est. Et debent etiam hæc tria genera Zulapiorum a Medicis, certis appellationibus discerni. Primum enim Zulapium, ex stillatione violarum liquore; alterum Serapium violatum, ex infusione violarum; tertium Zulapium e succo violarum appellandum erit. Vtrunq; viribus præstantissimum est Iulebum, quod ex violarum succo fit, minus tamen iucundum quam alia duo. Iucundius enim est quod ex florum violarum fit maceratione: atqui minus, ut comprehensum est, efficax, nisi multiplex fiat maceratio, & flores sint recentes. Iucundissimum, sed maxime imbecillum, quod ex aqua destillata, ut hodie loquuntur, paratur. Quum igitur hodie tum

B Medici, tum Pharmacopœi id vnum maxime studeant, ut iucunda sint ægrotantibus medicamenta: id quod est iucundissimum Iulebum, & maxime imbecillum, potius quam id quod est parum iucundum, efficacissimum tamen, conficiunt.

Zulapium rosaceum. II.

Febriantium acute sitim in expletam restinguit. Ventriculi, cordis, & iecoris æstum mitigat: putredini febrium aduersatur, propterea in pestilentibus febribus, quod veneno aerisq; corruptele scititate subamara, & aromatica quæ sitate resistat, præstantissimum est. Habet stillatij rosarum liquoris, lib. tres. Sacchari repurgati, lib. duas. Coquantur igni lento.

ANNOTATIO.

C Stillatij.) Paratur autem Iulebum rosaceum aliis quoq; duabus, perinde atq; violaceum, rationibus: nempe ex aqua in qua rosæ sunt macerate, & e succo rosarum. Priore ita. Recipit aqua in qua rosæ macerate sunt lib. quinque, cum sacchari repurgati, lib. quatuor, igni lento coquantur, idq; Serapium rosatum simplex, ut infra latius dicitur, appellatur. Altero in hunc modum. Recipit succi rosarum, lib. tres. Coquantur cum sacchari clarificati, lib. duabus. Potentius est hoc postremum, quod certioris discriminis gratia, Zulapium e succo rosaceo vocari debet.

Zulapium * zizyphorum. III.

Asperitatem gutturis inuat: sputum tenue quia incrassat, facilius ut educatur efficit. Raucitati & pleuritidi confert. Contra ardentes febres valet. Tussi & destillationi quam calor mouit, auxilio est, ac sanguinem purgat. Fit hoc modo: Zizypha magna & pinguis centum in lib. aquæ pluvialis quatuor ad dimidias coquantur. Libra duæ relicta, cum sacchari lib. una percoquantur in Iulebi consistentiam.

DE SVCCIS MEDICATIS.

Succus Medicatus¹ ribes, Simplex. I.

DVentriculum firmat, vomitum biliosum reprimat, sitim restinguit, & biliosas alui excreções sistit. Accipit succi ribes lib. decem. Coquantur lento igne ad tertiæ partis consumptionem colantur: subsidere permittuntur, donec clarescant. Clarum dein lento igni percoquitur, ad mellis crassitudinem: aut ipsolatur, & reconditur.

ANNOTATIONES.

¹ Succus medicatus.) Sic nominamus eos qui purgati ac defecati, solis aut ignis calore densantur. Arabes, & huius temporis Medici, Rob & Robus vocant. Quum vinum ad tertias coquitur, Sapa nuncupatur.

² Ribes.) Nostratis, non Arabum, quod in Germaniam haud deportetur. Nascitur enim Syriæ montanis, ut tomo tertio historiz stirpium latius diximus.

Succus medicatus ribes, Compositus. II.

E Idem quod simplex potest. Habet succi ribes, lib. tres. Sacchari optimi, lib. duas. Coquantur lento igne ad iustam crassitudinem.

Succus medicatus * ex vna urfi. Simplex. III.

Idem quod præcedens efficit. Capie succi vna urfi, lib. decem. Coquantur ad tertias, colantur, & subsidere permittuntur, donec clarescant. Clarum subinde ad iustam crassitudinem percoquitur.

Compositus. IV.

Recipit succi vna urfi, lib. 3. Sacchari optimi & purgati, lib. 2. Coquantur ad mellis crassitudinem.

Diacaryon, Simplex. V.

FDestillationi tenuium & acrium humorum a capite, & phlegmonem excitantium confert. Habet succi corricum viridum in iuglandium diebus canicularibus extracti, lib. quatuor. Mellis optimi, lib. duas. Coquantur ad iustam crassitudinem.

ANNOTATIO.

¹ Diacaryon.) Latinis non sonat, nisi compositionem e nucibus. Veteribus autem gemina fuit, simplex & composita. Simplex hodie Medicinam facientibus, & Pharmacopœis vocatur Rob nucum viridum. Compositum describitur a Paulo lib. 7. cap. 14. Simplici n. miscet per initia quidem, & in vigore phlegmo-

Alter Iulebi parandi modus. Tertius.

Zulapium ex stillatione liquore violarum. Serapium violatum. Zulapium e succo violarum.

Alii modi Iulebi rosacei parandi. Serapium rosarum simplex. Zulapium e succo rosaceo. *Iuubini hodie Serapium simplex.

Succus medicatus. Rob. Sapa.

*Berberia.

Diacaryon. Simplex. Rob nucum viridum.

Compositum.

num, Croci & aluminis ana drachmam vnam. Myrrhæ, drach. duas. In inclinatione vero ad discutiendū, nitri, sulphuris, ana drach. vnam. Ioannes Damascenus ex Galeni lib. 6. de Compos. medic. local. cap. 2. in phlegmonis initio adstringentium aliquid miscendum esse tradit, ut est rosa, balaustium: in vigore, crocum & myrrham: in declinatione, nitrum, salem ammoniacum, & similia.

Dia caryon. Nicolai Myrepsici. VI.

Confectio e nucibus est omnibus stomaticis medicamentis efficacior: non tamen, ut alia, stomacho grata. Capit exterioris corticis nucum inglandium, quo etiam tinctores utuntur, adhuc viridis, in mortario contusi, & per linteum expressi succi, lib. quinq. Mellis optimi, lib. vnam. Glycyrrhizæ, uncias viginti. Coquitur succus cum glycyrrhizæ ad mellis crassitudinem, & per colum traicitur: adiecto melle, iterum coquitur.

ANNOTATIO.

Hanc Nicolai compositionem referre placuit, quod propter adiectam Glycyrrhizam mirifice ad faucium ac gutturis asperitatem conferre videatur. Et si igitur vsitata non est, tamen in vsum reuocari posset. Refert autem hanc ad Galenum auctorem, quod is primus, quemadmodum metipse loco paulo antecitato, ex historia cuiusdam hortulani testatur, illam inuenerit. Adiecit autem e suo Glycyrrhizam Nicolaus, ut videre licet Galenum legenti.

Diamoron Simplex. Pauli. VII.

Contra depascētia oris ulcera, ad dentium affectus, & gingivarum noxas, atq; ad omnia oris vitia efficax est. Accipit succi mororum domesticorum, lib. quinq. Coquuntur ad terrias, adiecto mellis optimi lib. vna, rursus percoquuntur ad mellis consistentiam.

Diamoron compositum. IIX.

Recipit succi mororum, lib. quinq. Coquuntur ad mellis crassitudinem. Adijcitur croci, myrrhæ, ²omphacii, ana drach. vna. Mellis, lib. vna. Percoquuntur ad iustam crassitudinem.

ANNOTATIONES.

Hæ duæ Diamoron compositiones existant etiam apud Nicolaum Myrepsium. Atq; ex eiusdem sententia est confecta, compositi Diamoron, quod nunc retulimus, compositio. Nam Paulus ab eo non nihil variat, ut qui habet, Croci, drach. vnam. Myrrhæ, drach. duas. Omphacii, obolum vnum, aluminis scissi, obolos tres. Paulum Ioannes Damascenus sequitur. Miscet Galenus eadem lib. 6. de Compos. medic. loc. cap. 1. & iis etiam plura: nempe balaustium, rosas, malicorium, & id genus alia, ut illic videre licet.

Omphacium.

² Omphacii. Græce est, *ὀμφακίς*. Omphacium vero nō est, nisi vuz acerbæ & immaturæ succus, quem officinæ Agrestam vocant. Perperam igitur in Paulo legitur, *ὀμφακίς*, pro *ὀμφακίς*. Succum enim vuz acerbæ, non vnam ipsam Galenus admiscet. Ceterum hic me Franciscus Alexander perstringit, ut cui videor perfunctor Galenum legisse, quod Omphacii tantum drachmam vnam adiciam, quum tamen de Galeni sententia, si citra vinum Diamoron paretur, plus de Omphacio adiciere conueniat. Quasi vero ipse Galeni hoc loco compositionem, & non Myrepsi referam, qui non nisi drachmam vnam, ut bona fide conuerti, habet. An non Paulus in sua compositione, eius non nisi obolum vnum adiecit? Accedit, quod succus Omphacii non eo nomine ut iusta concoctio fiat, addatur: quum ad eam succi mororum, & mellis quantitas, sufficiat: sed tantum ut totius compositionis vires augeantur. Deniq; hoc Franciscus solemne est, quod tamen calumnia non caret, ut mihi adscribat, quæ ego de Myrepsi, quem in Latinum sermonem conuerti, sententia refero. Quare consideret diligenter num hac in parte quod crebro in Matthiolo reprehendit, ipse quoq; faciat.

Diamoron vsitatum. Nicolai Præpositi. IX.

Valeat, ut priora. Præcipue autem ad faucium ardores, serpentia oris ulcera, gula, columella, & tonsillarum phlegmones, Habet succi mororum domesticorum, lib. dimidiam. Succi mororum ²batinorum, lib. vnam. Mellis, lib. dimid. Sape, unc. 3. Coquuntur lento igne, ad mellis spissitudinem.

ANNOTATIONES.

¹ Domesticorum. Mora sunt, quæ ex arbore decerpuntur. Celsi mora hodie vocant.

Mora batina.

² Batinorum. Non sunt nisi mora rubi, humi nascentis, Batina, ut alibi diffuse admodum monstrauimus. Præter iam dictos succos medicatos, sunt & alii quidam officinis Medicorum vsitati, quos nominatim etiam perensebimus.

Succus acidus citrij. X.

Idem quod succus Ribes potest. Fit, ut præcedentes simplices. Officina succum acetositarum Citri nominant.

Succus vna immatura. XI.

Agresta.

EArundem est virium, & palpitacionē cordis cohibet. Fit eodem modo. Officinis Agresta vocatur, ²Græcis omphacium. Ad hunc modum complures alij succi parari possunt: nempe sine melle & saccharo, igne vel sole incrassati: & appellatur hodie Rob. Quum vero succus prunorum syluestrium valde sit frequens, & Acacia loco hodie vsurpetur, illum etiam iam dictis adijcere conuenit.

Rob.

Succus prunorum Syluestrium. XII.

Eadem

A *E*adem, quas priores, facultates habet. Sic paratur. Baccæ pruni sylvestris aqua in vase pauca aliquot dieb. macerata, coquuntur, colantur, recoquuntur, donec crassescas. Seruatur, qua libet figura.

¹ Hydromelum simplex. Pauli. XII.

A *D*uersus alui profluvia biliosa valet. Ventericulum firmat & vomitum cohibet. Habet succi cydoniorum, exemtis nucleis contusorum, lib. tres. uncias quatuor. Mellis, lib. quinq. Aquæ, lib. decem. Coquuntur despumando ad tertias.

ANNOTATIO.

¹ Hydromelum.) Græcis, Paulo præsertim lib. 7. cap. 15. ὑδρομήλον vocatur, quod Mauritanis Miua cydoniorum. Nam ipsis Miua non significat nisi factum fructuum, adeo coctum, ut in consistentiam sapæ, aut crassitudinem mellis abierit: Hydromalum itaq; quod iam recensuimus, veterum fuit Miua cydoniorum: biliosis ventriculi affectibus magis, quam ea quæ hodie vsitata est, & vinum accipit, ut paulo post dicemus, conuenit. Quanto enim Miua simpliciter fuerit, tanto calidis vitis magis confert. Quod si igitur pro melle saccharum vsurpabimus, minus quopq; tum calefaciet, iucundiorq; erit. Præstat itaque veterum, quam hodie vsitam Miua vsurpare.

Miua cydoniorum simplex¹ vsitata. XIV.

E *A*dem potest, quod prior: nisi quod vini ratione magis calefaciat. Capiti succi cydoniorum acidum, lib. ² duodecim. Coquuntur lento igni, semper despumando ad dimidia partis consumptionem. Colatum horis circiter tribus residendo clarescit. Claro adduntur vini antiqui ³ lib. quinq. ⁴ Sacchari, ⁵ lib. tres. Iterum coquuntur despumando, ad iustam consistentiam.

ANNOTATIONES.

C ¹ *Vsitata.*) Est autem Ioannis Damasceni, ut Cordus quoq; in suo medicamentario libro indicauit. Quanquam ponderum rationem non obseruauit, ut iam ostendemus.

² *Lib. duodecim.*) Mesuæ filius habet, libras centum: immensam prorsus mensuram. Quare cum Cordo lib. duodecim sufficere putamus, Et si arbitrio Pharmacopœorum plus aut minus, seruata tamen legitima proportione, accipi possit.

³ *Lib. quinq.*) Cordus habet, lib. octo, non obseruata proportione. Siquidem Ioannes Damascenus accipit libras quadraginta. Quam autem proportionem obtinent quadraginta ad centum, eandem quinq; ad duodecim habent. Ut hoc nomine vini quinq; non octo, Cordi exemplo, libras sumendæ sint.

⁴ *Sacchari.*) Mesuæ filius liberum permittit, ut vel mel, vel saccharum vsurpemus.

⁵ *Lib. tres.*) Cordus hic quoq; legitimam excedens proportionem, habet lib. duodecim. Nam Ioannes Damascenus accipit de melle vel saccharo lib. sex. Quam igitur proportionem sex habent ad decem eandem tres habeant ad quinq; oportet. Tres igitur non duodecim libras sacchari sunt accipiendæ.

Miua cydoniorum composita, seu Aromatica. Ioannis Damasceni. XV.

D *V*entriculum, iecur, & cetera viscera frigefacta roborat, appetentiam excitat, cœcoctionē iuuat, vomitum, & lieteriam ex humore frigido & pituitoso ortam reprimat. Accipit succi cydoniorum aridorum, lib. 20. Vini antiqui boni, lib. 10. Coquuntur igni lento, semper despumando, ad 3. Colatum residendo clarescat. Claro adduntur mellis boni & despumati, lib. 6. Iterum coquitur despumando, & in eo suspēduntur nodulo ligata hac aromata: nēpe cinam. electi, cardam. ana drach. 3. Caryophyllorū, 3. 2. Zingiberis, macis, ligni aloes, mastiches, ana drach. 1. & dimid. Croci, 3. 2. Moschi, scr. 1. Gallie moschata, 3. 2. Omnia, præter crocum, parum terantur, & suspendantur in linteum colligata pānum.

DE SERAPIIS, SECTIO X.

Prius quam ad Serapiorum compositionem veniamus, notandum erit, horū alia esse simplicia, quæ scilicet ex vnius simplicis decocto, vel succo fiunt, ut violaceū, rosaceū, e limonib. e succo acido citrij mali. Alia composita, quæ ex varijs pluribusq; cōficiuntur, ut Serapiū e quinq; radicib. & alia quadam. **E** *V*arie autē paratur. Sūt n. q. decocta a simplicib. medic. effundūt, & colāt, adiectoq; saccharo vel melle quātū satis est coquūt. Alij decoctū manib. vel plo exprimūt, expressumq; donec clarū efficiatur purificant, postea ad pfectionē coquūt. Alij materias in liquore pscripto macerant & calidū supfundūt non nimis multum, sed quātū tegēdis materijs sufficit. Deintāquam recentes plo subiciūt, & succū exprimunt, atq; ut decet percoquunt, ne recoquēdo, & diutius ebulliendo ex his multū exhalet, & q. in illis tenuius est pereat. Ceterum quæ ex succis cōstruuntur Serapia, alia merum accipiūt succū, alij aqua mistum, ut Serapiū ex infusione violar. rosar. & c. Quadā materia cū melle coquuntur q. rariū fit. Quibusdā Serapis materia exactissime trita, & panniculū linteū rara textura, vel sericum inclusa dum ad huc feruent, imponitur, itidēq; quoad totius absumatur relinquitur, ut sit in Serapis ex stachadē ex cichorio, cum rheobarbaro. Rectius autē faceret si materias illas vel dissolutas, vel laxius inclusas medio decoctionis tepore inijcerent, atq; aliquātisper simul feruere sinerēt, ita n. altarum vis melius in Serapiū transiret. Porro Serapia quō diutius durent, eo ad crassiorē cōsistentiā coquendi sunt. Sic astate quoq; quam hyeme spissiores sint necesse est. Non satis cocti vel acescunt, vel sitim cōtrahunt, vel aliqui corrumpuntur atq; putrescunt. Nimum vero cocti, in fundo sacchari candi vocati modo concrescunt.

¹ Serapium violatum. ² Simplex. I.

Bilis acrimoniam frangit, ac thoracis vitis calidis confert. Recipis succi¹ violarum recentium, in mortario maximo tritarum, lib. tres. Sacchari clarificati, lib. duas. Coquantur⁴ despumando ad crassitudinem iustam.

ANNOTATIONES.

Serapium.
Syrupus.

Serapia
cur inuen-
ta.

Drosarū.
Zulapiū.
Iulebum.

¹ Serapium.) Cum Actuario *σικερίον* vocamus id, quod hodie Syrupum nominant, medicamentum forma liquidum, ex succis, vel alijs stirpium partibus cum liquore aliquo percoctis & mellitis, vel saccharatis ad saporis gratiam, & custodiæ diuturnitatem. Serapia enim Arabibus nulla alia de causa inuenta sunt, quam ut vis stirpium alioqui euanida & lubrica, efficax diu seruetur: utq; huiusmodi remedia e succis constructa ad manum sint, quoties vtendi necessitas inciderit, sintq; vtentibus iucundiora. Nicolaus Myrepsus nouo, & alijs inusitato vocabulo, *σρῶμα* nominauit.

² Simplex.) Hoc recentiores quidam Græci *ἰόσαχαρ*, & *ιοζαυλάριον*, & *ἰὼν χυλίωμα*: Mauritanii Lulapium, Iulepum, vel Iulebum appellant, ut supra etiam monstratum est: Fit autem ex infusione seu maceratione duplici violarum recentium, ad Rosati exemplum. Quo in febribus biliosis & acutis morbis, viscerum phlegmonibus, & immodica siti vtimur. Gutturis asperitates lenit, bilisque acrimoniam retūdīt. Alterum ex violarum aqua stillaticia paratur, vsu quidem crebrius, quia gratius, sed viribus inferius.

³ Violarum recentium.) Quia ex aridis, aut parum recentibus succus exprimi non potest. Suntq; ad eam sem tantum purpurea florum foliola, abiectis viridibus cauliculis & calycibus, pediculisq; herbaceis vsurpanda.

Spuma
e-raufo-
renda.

⁴ Despumando.) Sunt qui spumam non auferunt, ne scilicet color pereat. Sed coloris hic ratio nulla haberi debet: quia repositum cum spuma Serapium hoc, cito corrumpitur.

Serapium violatum compositum. Ioannis Damasceni. II.

Pleuritidi, tussi a calore nata prodest: easdēq; quas zulapium violatum, facultates obrinet. Nam excreationi promouenda idoneum est, materia tenuitatem densando, & leuiter incrassando. Tussim siccam sedat humectando, & faucium asperitatem leniendo. Recipis violarum, vnc. duas. Seminis cydonij, & matua, ana drach. septem: alias unciam vnā: Zizyphorum, myxorum, ana numero viginti. Cum succi cucurbitæ, lib. sex, coquantur ad tertiam partis consumptionem, & adijcitur sacchari, lib. vna, & dimidia. fitq; Serapium.

ANNOTATIO.

Serapium
infusionis
violarum.
Serapiorū
violatorū
tri gene-
ra.

Simplex.
Compositū.
Infusionis
violarum.

Præter iam dicta, tertium est Serapium violatum, quod infusionis violarum vocant. Verum hoc non distat a Zulapio violaceo alterius generis, ut supra, nempe Sectione nona, diximus. Quum itaq; tria sint genera Serapiorum violatorum, decet certe Medicos ut non simpliciter in suis formulis Serapii violati mentionem faciant, sed primi generis violatum simplex, alterius compositum, tertii infusionis violarum nominent. Ita enim fiet, ut Pharmacopola non vnum pro altero in compositiones medicamentarias permisceant.

Serapium rosatum simplex. III.

Zulapiū e
succo rosa-
rum.

Zulapium
rosatum.

rosatum
simplex.

Medus in-
fusionis:
horū rosa-
rū Nicolai
im; roba-
tus.

Medus in-
fusionis fo-
liorū rosa-
rū opti-
mus.

Mucharū.
Serapium
rosatum
simplex
purgato-
rium.

N febribus calorem exstinguit: ob id sitim quoq; sedat, & ventriculum roborat. In febribus autē pestilentibus præstantissimum, quod putredini, venenis, & aeris vitio subamara & aromatica sua qualitate resistit. Habet aqua in qua macerata sunt folia rosarum, lib. quinq;. Sacchari clarificati, libr. quatuor. Coquantur lento igne ad Serapii consistentiam.

ANNOTATIONES.

¹ Simplex.) Hoc trifariam fieri solet. Vno quidem modo, ex succi rosarum libris tribus coctis igni lento, cum sacchari libris duabus. Hoc Zulapium potius, euitandæ confusionis gratia, e succo rosarū vocetur. Estq; ceteris, ut diximus, efficacius. Altero modo ex stillatitio rosarum liquore, & simpliciter Zulapium rosatum nominatur, paruarumq; est virium. Tertio modo ex infusione, ut hodie loquuntur, rosarum recentium, vel harum penuria aridarum: & Serapium rosatum simplex appellatur. Atq; hoc est, hic ex sententia Ioannis Damasceni describimus. Est vero hæc differentia a Medicis diligenter in suis formulis exprimenda, ne Pharmacopoei vnum pro alio vsurpent.

² Aquæ in qua macerata sunt. &c.) Pharmacopoei hæcenus fere omnes Nicolai Præpositi, macerationis: vel (ut ipsi loquuntur) infusionis modum secuti sunt. Nec aliū in suo medicamentario lib. præscribit Cordus. Mihi tamen non probatur, quod in eo neq; rosarum, neq; aquæ mensura & quantitas exprimitur. Præstat igitur Ioannis Damasceni modum amplecti, qui est eiusmodi. Foliorum rosarum recentium libræ sex, horis 8. in vase terreo vitrato, stricti oris, & operculato macerentur in libris quindecim aquæ calefactæ, postea colantur. Eidem aquæ iterum calefactæ rosarum recentium tantundem immittitur, & tam diu, ut antea, macerantur, colantur. Id si velis seruare, oleo affuso, & vase eodem bene operculato, dies quadraginta insolato: vocaturq; id Mucharum, id est, infusio rosarum. Atq; hinc perspicuum euadit, quod Serapium hoc ex præscripto filii Mesuæ duabus infusionibus fiat, & Rosatū simplex absolute dicatur. Nicolaus ex multis infusionibus cōponit Serapium suum rosatum simplex. Sed si frequen-
tius,

A tins, quinquies maxime, rosæ macerantur, purgatorium serapium rosarum efficitur. Ad purgatorii vero Serapii compositionem accipiendæ sunt Rosæ pallidæ recentes, quas Incarnatas aliqui nominant. Nam non solum omnium sunt odoratissimæ, sed & maxime purgantes. Quapropter tum non absolute simplex, sed cum adiectione Purgatorium nuncupatur. Siquidem si ab vnciis duabus ad vncias quatuor sumatur, bilem purgat. Tres quidem abunde, quatuor vero exquisitè admodum purgant. Simplex autem purgatorium nominatur, ad differentiam alterius Serapii purgatorii compositi, de quo paulo post dicemus. Ceterum ne id silentio transeamus, fit etiam Serapium purgatorium ex quatuor, quinque, aut sex infusionibus florum recentium perfici. Febribus vile, biliosos & tenues humores educens. Hic in locum Serapii de succo Perficorum substitui potest, datur mensura trium vnciarum. Præterea ex iisdem floribus saccharatis, seu cum saccharo contulis, Conferua, ut nominant, purgatoria, præsertim recens. Vis enim ignea & purgatrix ab iis omnibus facile euaporat & vanescit. Valide tamen purgant Perficæ flores & fumentes non raro plurimis incommodis, quod compertum habeo, efficiunt, nempe intestinorum torminibus, crebris tum vomitionibus, tum alui deiectionibus. Quare robustis tantum conueniunt. Porro in penuria recentium rosarum fit etiam a recentioribus serapium ex rosarum aridarum infusionibus, in hunc modum. Recipit rosarum siccarum, vncias quatuor, quæ singulis aquæ colandæ libris iniiciuntur. Id valenter adstringit, & ventriculum roborat, fluxionesque sistit.

Serapium rosatum purgatorium compositum. Auicenna. IV.

F leuam bilem purgat. Caput succi rosarum lib. duas. Mellis optimi, lib. quatuor. Scammony resti, vnciam vnam. Coquantur lento igne ad spissitudinem.

Serapium rosatum purgatorium compositum. Nicolai Myrepsici. V.

C onfert iis qui malo corporis habitu præditi sunt, iocinerosis, lienosis, & male coloratis. Purgat quoque venterem. Accipit, radicis apij, sæniculi, hipposelini, asparagi, & borraginis, ana vnc. duas. Succij apij, iurij latifolij, ana vnciam vnam. Radicis echij, vnc. vnam, & dimidiam. Eupatorij, vnc. vnam. Senæ, cuscute, asari, ana vnc. dimid. Santali rubei & albi, ana vnc. dimidiam. Rosarum, violarum, iridis, ana vnc. vnam. Florum borraginis, vnc. dimidiam. Adianti, scolopendrij, ana Manip. vnum. Spicæ, ammeos, ana drach. vnam. scrup. vnum. Seminum quatuor frigidorum, ana vnc. dimid. Polypodij, vnc. duas. Seminij apij, amisi, & sæniculi, ana drach. vnam. scrup. vnum. Agarici, drach. duas. scrup. duos. Aquæ quod satis est. Sacchari albißimi, rhei barbari, turpeti, ana vnc. dimidiam. Coquantur lento igne ad consistentiam Serapij.

ANNOTATIONES.

1 Nicolai Myrepsici.) Inusitatum quidem, vtile tamen in prædictis vitiis. Quare in malo corporis habitu, &c. Græci nominant, vtendum esse eo puto. Posset itaq; ob egregias suas vires in vsum reuocari: efficax namq; in tollendis iecoris obstructionibus existit.

2 Hipposelini.) Officinis Petroselinum macedonicum vocatur, vt lib. I. dictum est.

3 Succij apij.) Nicolaus habet decocti. Nam illi solenne est, vt in Drosatorum, sic enim Serapia vocat, compositionem permisceat decocta. Siue vero succos, siue decocta vsurpes, parum refert.

4 Echij.) Nicolaus habet, Buglossi. Intelligit autem dubio procul Buglossum recentiorum, quod Buglossum non est nisi Echium. Veterum enim Buglossum est Borrago, cuius ante meminimus.

5 Scolopendrij.) Ceterach officinis dicitur, vt alibi monstrauiimus.

*Serapium * Nymphaea simplex. VI.*

B illis flaua feruorem exstinguit, ideoq; mirifice ardentibus, alijsq; febribus acutis auxiliatur. Somnum quoque conciliat. Fit hoc modo. Florum nymphaeæ lib. duas, vna decoctione in aqua fontana coquantur, dein exprimuntur: expresso adiunguntur sacchari, † libr. dua, & coquantur ad Serapij consistentiam.

*Serapium nymphaea compositum. * Francisci Pedemontani. VII.*

I dem quod præcedens potest, estq; eo validius. Habet florum nymphaeæ, vncias duas. Vngula caballina aquatica, psyllij integri, acetosæ, ana vnc. vnam. Seminum quatuor frigidorum maiorum, ana vnc. dimid. Seminum lactuca, endiuie, scariolæ, portulacæ, ana drach. duas. Radicum sæniculi, vnciam vnam. Bulliant in aqua hordei sufficienti, & addantur sacchari, lib. vna. Aceri albi, succi granatorum acidorum, ana vnc. dua. Coctis ad syrupi consistentiam inyciuntur, santali ruber, spody, ana drach. vna. Spicæ, drachma dimidia.

ANNOTATIONES.

F Duas Serapii nymphaeæ compositiones attulimus, simplicis & compositi. Simplex vsitatus existit, & magna ex parte ad eum quem diximus modum paratur. Nicolai Myrepsii abbreviator, Præpositum vocat, illud inftar violarum ex floribus maceratis in aqua conficiendum esse docet. Parum vero refert, hanc vel aliam sequantur Pharmacopœci parandi rationem.

1 Vngula caballina.) Cordus censet auctorem huius compositi Serapii per Vngulam caballinā aquaticam alteram, luteam nimirum, intelligere Nymphaeam. Sed quum Serapium hoc rursus conferat, Vagula caballina nihil refert, si etiam in propria significatione vsurpemus Vngulam caballinam, p. Tussilaginem: cuius sane

Serapium purgatorium ex floribus Perfici. Conferua florum perfici purgatoria. Serapium rosatum ex aridarum rosarum infusione.

Hipposelinum.

Scolopendrium. * Nenupharinus;

† Alitib. brastres & dimidia addunt. * In curatione iecoris simplicis & composita.

Serapium nymphaeæ simplex.

Cordus, Vagula caballina aquatica.

folia viridia illita erysipelatis, & omnibus phlegmonibus, Dioscoride & Galeno testibus, prosunt, & tussis mirifice iuuant. Atq; hæc recte quoq; aquatica, quod in aquis, aut iuxta aquas verius copiose proueniat, appellatur.

Serapium acidum simpl. x. Ioannis Damasceni. IIX.

Affectibus, ac febribus maxime biliosis auxiliatur: quia bilem tenuitate & caliditate furiosam frangit, retundit, exstinguit, adeoq; suum sedat. Humores quoq; crassos tenuat, incidit, obstructions tollit, urinas mouet, ac sudores. Putredini resistit, ob id pestilentibus febribus est saluberrimum. Capit aquæ fontana, lib. quatuor. Sacchari, lib. quinq;. Coquuntur in vase lapideo carbonibus accensis, aut flamma exigua, citra fumum semper despumando ad dimidias. Dein adijciuntur acetum albi clari, lib. duæ. Stantem valentissimum vis, lib. quatuor. Si viribus mediocre, lib. tres, & percoque in Serapy consistentiam.

ANNOTATIONES.

Serapium
acidum
simplex
Nicolai.
In lapideo
vase cur
coquendū
Acetum
album.

1 *Ioannis Damasceni.*) Nec aliter conficit illud Nicolaus Myrepsus Sectione octaua, de Drosatis cap. 39. nisi quod minus de singulis accipit, nempe aquæ lib. tres. Sacchari, lib. quatuor. Aceti, lib. vnam. Coquit autem hæc omnia, ad mellis crassitudinem.

2 *Lapideo.*) Aut terreo vitrato. Non ab re autem in tali vase coquit. Nam acetum a vase æneo æruginosum aliquid, & corrodens contrahit.

3 *Aceti albi.*) Hoc enim tenuius & potentius est alio. Et caueant Pharmacopœi ne plus acetum adijciant, quod ita integrum sit Medico, ubi ita expedire videbitur, eius quantitatem augere.

Serapium acidum compositum. Ioannis Damasceni. I X.

Alias de radicibus, humores crassos, pituitosos, & eradicatu difficiles incidit, terget, extenuat. Obstructiones, quæ sunt in iecore, liene, & renibus tollit. Accipit radicem apij, fœniculi, & intybi latifolij, ana vnc. tres. Seminum apij, fœniculi, anisi, ana vnc. vnam. Seminis intybi latifolij, vnc. dimid. Coquuntur igne lento hæc omnia in aqua fontana lib. decem ad dimidias. Dein ubi expressum est, addantur sacchari lib. tres, & clarificetur: postea acetum inijciatur quantum libet, prout in Serapio acido simplici est expressum.

Serapium e duabus radicibus. X.

Idem quod præcedens, potest. Recipit radicem petroselinij, & fœniculi ana vnc. quatuor. Coquuntur in aqua fontana lib. quinq;, ad tertia partis consumptionem. Expressum percoquitur cum sacchari lib. duabus, donec ad Serapy crassitudinem redeant.

Serapium e quinque radicibus. Incerti auctoris. XI.

Ad febres putridas, biliosas, ac pituitosas solutu contumaces confert. Habet radicem apij, fœniculi, petroselinij, asparagi, rusci, ana vnc. duas. Coquuntur in libris sex aqua fontis, ad tertia partis consumptionem. Expressum percoquitur cum sacchari libris tribus, addendo sub finem acetum vncias octo. Alij radicibus prædictis addunt seminis apij, petroselinij, fœniculi, ana vnciam vnam, & in libris decem aqua coquunt, ad dimidias. Expressum percoquunt, cum mellis lib. quatuor, & sub finem adijciunt acetum lib. vnam.

ANNOTATIONES.

1 *Ana vncias duas.*) Cordus contra omnium codicum, quos viderim, fidem, in suo Medicamentario libro habet vncias quatuor.

2 *Lib. tres.*) Et hic dissentientibus omnibus codicibus, Cordus legit, lib. quatuor. Ita multis in locis Cordi compositionibus non satis fidendum erit, utpote vel typographorum culpa corruptis, vel Cordi studio immutatis.

* Acerosi
tatis citri.

Serapium ex acido citri succo. Ioannis Damasceni. XII.*

Astum & feruorem bilis flauæ, febriumq; ardentium & pestilentialium, præsertim æstatis constitutione pestilente, ac vehementem sitim potenter restinguit. Cor, ventriculū, & alia viscera ab intemperie calida infirma, roborat. Ebrietati resistit, vertiginemq; iuuat. Fit hoc modo. Succus citriorum acidi lib. 12. in vase vitrato coquuntur igni prunarum lento, ad tertia partis consumptionem. Dein per linteum rarum sine expressione colatur, & residere, donec clarescat, permittitur. Clarissimi succi lib. 7. percoquuntur ad iustam crassitudinem, cum iulebi clari & purgati lib. 5. Aut si afflas est, in sole, donec aquosa eius substantia consumatur.

ANNOTATIONES.

1 *Sine expressione.*) Nisi enim sine vlla vi aut expressione coletur, ubi refrixerit, Serapium coagulatur. Nam hæc est Serapiorum fere simplicium ratio, ut succi residentia, aut coctione purgati, cum sacchari certa portione clarificati & percocti in vsum condiantur.

Cordus
notatus.

2 *Lib. septem.*) Cordus hic in medicamentario suo libro, præter omnium codicum fidem habet lib. sex, & tamen hoc Serapium nihilominus ad Mesuz filium auctorem refert. Ut mirari satis non possim, cur ad præscriptum ipsius illud non conficiendum esse docuerit. Sed est hoc ipsum ei familiare, ut ad Mesuz filium referat compositiones, nec ad illius præscriptum conficiat.

A 3. Iulebi clari & purgati) Per hoc ipsum non intelligit, nisi saccharum in aqua competenti pura dissolutum, ac cum albis ouorum clarificatum, & instar Iulebi coctum. Id enim vere est Iulebum clarum & purgatum.

* Lib. quinque) Et hoc loco Cordus a praescripto Ioannis Damasceni, cui tamen acceptum hoc Serapium, ut diximus, refert, discedens, Sacchari, lib. tres duntaxat recipit, quum iuxta proportionem ad lib. sex succi, recipiendae erant sacchari lib. quatuor.

Serapium * ex¹ acido limonum succo. XIII. * De limonibus.

Predicto non multo inferius, magis tamen refrigerans & penetrans. Cor & stomachum roborat, & spiritus resoluere prohibet, putrefactioni resistit. Capit succi limonum instar citriorum cocti, & per linteum colati, ac clarificati, lib. septem, Sacchari clarificati, lib. quinque. Percoquantur ad iustam consistentiam.

ANNOTATIONES.

1. Ex acido limonum succo) Sunt qui Serapium hoc praecedenti praferant, quod scilicet Limonum maior copia haberi possit, & potentius Citriis proprie dictis malis refrigerent.

Instar huius Serapii, etiam ex acido Arantiorum seu Aurantiorum malorum, item etiam e dulci succo, cum saccharo clarificato, Serapia confici possunt, ut non sit opus seorsim eorumdem referre compositiones.

Serapium ex¹ omphacio, Ioannis Damasceni. XIV.

In magnis astibus ad sitim restinguendam mirifice confert, vomitum & alui profluvium biliosum sistit, febribus succurrit. Gravidarum etiam vomitum reprimat, ac earundem ventriculum firmat, venenisq. aduersatur. Fit ut Serapium e succo citriorum: nempe ex Omphacii coctione & residentia purgati, lib. septem, & sacchari clarificati, lib. quinque, ad consistentiam iustam percoctis.

Serapium e pomis, Ioannis Damasceni. XV.

Cor imbecillum roborat: ob id syncopei & cordis palitationem sanat. Accipit pomorum dulcium, & acidarum succi, an lib. quinque. Coquuntur despumando ad dimidii consumptionem: dein bibulo residere permittuntur, donec clarescant: postea colantur, & cum sacchari lib. tribus, fiat Serapium.

ANNOTATIO.

1. Pomorum) E dulcibus eligenda sunt nostratia sapidissima. Ex acidis, quae Benisling, id est, vinosa, Germani nostri nominant. Efficacius erit, si poma dulcia augeas, quod illa odore cor magis roborant, & gustui longe gratiora sint. Acida ventriculum magis confirmant, sitimque sedant. Sunt qui huic succo nondum per residentiam purgato, immergunt sericum crudum e recentissimo grano tinctorio (Chermes Mauri vocant) infectum, donec is rubescat, & cocci ac ferici facultatem recipiat, quod utrumque, sericum nimirum, & granum tinctorium Arabibus vim cordis roborandi obtinere credatur. Errant autem plurimum, qui pannum sericum ab infectioribus tinctum in Chermes accipiunt, propter aluminis, gallarum, arsenici, & aliorum venenatorum tincturam panni huius necessarium mistam malignitatem. Accipitur autem interdum Chermes libra una, & redacta in pulverem in libras quinque aquae in aeneo lebeti igni suspensa, priusquam feruere incipiat, iniicitur. Dein facta una ebullitione ab igne remouetur, & libra una ferici crudi imponitur, ubi tantisper relinquitur, donec succum probe imbiberit. Postea exprimitur, eaque aqua in usum adhibetur.

Serapium e granatis acidis, Ioannis Damasceni. XVI.

Ebres biliosas, & quae ex pituitosis flammam multam inuoluunt, inuat. Fit ut praecedentia: ita ut non sit opus conficiendi modum separatim referre.

Serapium e granatis dulcibus, Ioannis Damasceni. XVII.

Sitim, tussim, pleurim, idem inuat. Fit ut praecedens.

ANNOTATIO.

Parum recte faciunt, qui Serapium e granatis parantes, dulcia cum acidis miscent: quum separatim iam ex dulcibus, nunc ex acidis tantum, ut ostendimus, conficiendum sit: quod acidorum, quam dulcium, alia sit facultas. Nam Granatorum acidus succus refrigerat, & humectat, ideoque febribus biliosis plurimum conducit. Dulcium autem succus tussim inhibet, & humectando sitim restinguit.

Serapium ex¹ intybo satiuo, simplex. XVIII.

Valeat ad immodicum iecoris & aliorum nutritioni seruientium instrumentorum calorem, ac laterali maxime morbo conuenit. Habet succi intybi satiuo latifolii una seruofactione, dein residentia purgati, lib. octo. Sacchari albisimi, lib. quinque, & dimidiam. Affunditur paulatim saccharum, si purum est, clarificato. Si vero purum non est, succo dissolutum coquitur, cumq. albuminibus purgatur, colatur, percoquitur in Serapium.

Serapium ex intybo satiuo compositum, Gentilis. XIX.

Valeat ad immodicum iecoris, cordis, & aliorum nutritioni famulantiu instrumentoru calorem, & in summa ad omnem calidam interperiem. Soluit obstructions, & partes a calore debilitatas roborat.

Capit succi intybi satini latifolii, succi lichenis, an. lib. tres. Clarificentur prædicti succi ad ignem, ut expedit. Rosarum, violarum, lenticula aquatica, florum nymphaeae, polytrichi, an. unc. dimidiam. Capillorum Veneris, hordei repurgati, seminum frigidorum maiorum, an. unc. unam. Cum saccharo quod satis est, fiat serapium: & aromatizetur cum santalorum alborum, rubeorum, berberis, seminum cydoniorum, ligni aloes, cinamomi, corticum citri, an. scrup. unum.

ANNOTATIONES.

Et si non admodum mihi probetur hoc Gentilis Serapium, adeo ut facile omitti nobis potuerit: tamen quum non desint forte, qui illo uti velint, non fuit prorsus nobis Medicamentarium librum scribentibus prætereundum.

Lichen.
Polytri-
chum.
Capillus
veneris.

1 Lichenis) Hepaticam officinae vocant, ut alibi fusius ostendimus.

2 Polytrichi) Per Polytrichum intelligit herbam, Trichomanes Dioscoridi dictam.

3 Capillorum veneris) Adiantum inaudire oportet, Dioscoridi & aliis veteribus appellatum.

Serapium ex intybo satino compositum, incerti auctoris. XX.

Dem quod præcedens potest. Accipit intybi satini latifolii viridis, intybi satini angustifolii, lichenis, borraginis, * echii, melissophylli, lactuca, eupatorii, an. manipulum unum. Seminum frigidorum maiorum, an. unc. unam. Santali albi & rubei, an. drach. unam. Florum borraginis, melissophylli, rosarum, an. drach. tres. Coquantur in aqua sufficienti, colato addiciatur succi intybi satini latifolii residentia purgati, lib. una. Succu granatorum, uncia tres. Sacchari, lib. quatuor. Percoquantur ad Serapii consistentiam.

* Buglo-
fa.

* Cicho-
rio.

Serapium ex * Intybo sylvestri, cum Rheobarbaro, Nicolai Florentini. XXI.

Confert maxime ictero laborantibus ex obstructione, lientosis, & nephriticis: in summa, adiectionis & lienis obstructiones tollendas efficax, aduersus omnem materiam venenatam, & in febre pestilentiali. Corroborat cor, & instrumenta nutritioni famulantia, expurgat per urinas, & detractionem alui, excitat appetentiam, & inducit somnum, refrigerat nonnihil, & obstructiones citra vehementem calefactionem aperit. Recipit intybi satini & sylvestris, cichorii, taraxacon, an. manipulos duos. Cicerbitae, hepaticae, scariolae, lactuca, fumi terrae, lupulorum, an. manipulum unum. Hordei integri, balicacabi, an. uncias quatuor. Glycyrrhizae, capillorum veneris, aspleni, polytrichi, adiantum, cassuthae, an. drach. sex. Radicum feniculi, apii, asparagi, an. uncias duas. Coquantur in aqua sufficienti, & colentur: dein cum saccharo albo clarificato fiat Serapium, & pro vnaquaque eius libra inter coquendum addiciantur Rhei barbari selecti, drach. quatuor. Spicae nardi, scrup. quatuor. Colligato in linteolo raro, quod crebro, dum consistentiam iustam nanciscatur Serapium, exprimitur.

Hac com-
positione:
pharma-
copoei uti
nō debet,
sed ea quā
ad finem
Annotationum
subiici-
mus.

ANNOTATIONES.

Et si Serapium hoc constat ex multis simplicibus medicamentis, nec auctori ipsi, ut arbitror, nec pharmacopoeis satis cognitum, nullaque methodo constructum est, tamen nihilominus hodie a multis paratur. Verum quam recte, facile prudentes iudicare possunt. Præstaret, in tanta præsertim serapiorum, quæ in omnibus officinis prostant, copia, hoc & similia prorsus desiderari, quam consueti more parata habere. Ut igitur imperiti simplicium pharmacopoei in hoc conficiendo Serapio non errent, de quibusdam simplicibus nostram subiiciamus censuram oportet.

Nicolus
Florenti-
nus sim-
plicium im-
peritus.

1. Intybi satini & sylvestris.) Hic principio omnibus apparet, Nicolum hunc Florentinum nullam prorsus simplicium cognitionem habuisse. Siquidem nemo unquam aliorum recentiorum Endiuia sylvestrem, ut ille, nominauit. Hoc vero secutus Græcos fecit, qui Intybum vocant, quam Barbari Endiuia. Vox enim est corrupta, & ex Intybo voce deprauata nata. Sed quum Intybum satinum, vel, ut Nicolum loquitur, Endiuia domestica sit gemina latifolia, quæ non est nisi Endiuia hodie nominata: & angustifolia, quæ a medicis nunc Scariola vocatur, melius erat Nicolum dixisse, Endiuia domestica vtriusque & postea Scariolæ nullam fecisse mentionem. Quamquam suspicio est, illum per Scariolam intellexisse Lactucam sylvestrem. Præterea quum Endiuia sylvestris non sit nisi Cichorium, bis vnius simplicis, tanquam diuersi, non sine risu eruditorum, & magna pharmacopœorum confusione, mentio ab eo facta est. Atque is primus est Nicoli in hoc Serapio error.

Taraxa-
con.

2. Taraxacon.) Species est Seridis sylvestris, aut Hedypnoidis Plinii: Dens leonis, & Rostrum porci, aum vulgo vocatur.

Cicerbita.

3. Cicerbita.) Itacum Cordo legendum esse puto: non Cucurbitæ, ut nonnulli codices habent, nam non est verisimile inter herbas Nicolum connumerasse fructus. Est autem Cicerbita non nisi Sonchus, quo hætenus officinae nonnullæ pro Endiuia vsæ sunt: ut alibi fusius docuimus. Ita multis hætenus erroribus implicata officinae fuerunt.

4. Hordei integri) Quia magis detergit.

Capillus
veneris.

4. Capillorum veneris) Capillum veneris non esse nisi Adiantum, alibi monstrauimus. Hic tamen Nicolum, non sine magna confusione pharmacopœorum, diuersum ab Adianto facit. Nam paulo post eius tanquam diuersi meminit. Et ne quispiam dicat, per Adiantum, nigrum: per capillum vero, veneris album intellexisse Nicolum, impedit quod in plurali dixit Capillorum: hac ratione vtrunque capillum veneris

Aneris inuens, adeoque sibi ipsi memorandi deinceps Adianti occasionem præcens. Vt sit alter Nicolii error non levis.

5 *Aspleni, polytrichi*) Per asplenum, Ceterach officinis: per Polytrichum autem Trichomanes Dioscoridi appellatum, inaudiendum esse, antea monuimus.

6 *Adianti*) Abundat in compositione, quod antea vtriusque capilli Veneris facta sit mentio. Nisi quod forte per Adiantum, Rutam murariam dictam intellexerit. Erit igitur huius Serapii hæc legitima compositio. Recipit Intybi satui vtriusque, cichorii, taraxaconis, ana manipulos duos. Cicerbitæ, lichenis, siue hepaticæ vocatæ, lactucæ sativæ & sylvestris, fumaricæ, lupulorum, ana manipulum vnum. Hordei integri, halicacabi, ana uncias quatuor. Glycyrrhizæ, adianti albi & nigri, aspleni, trichomanis, saxifragi Plinii siue rutæ murariæ, cassuthæ, ana drachmas sex. Radicum fœniculi, apii, asparagi, ana uncias duas. Polypodii, vnciam vnam. Passularum, prunorum damascenorum, ana vnciam vnam. Florum Buglossi, echii, violarum, ana pugillum vnum. Seminum cucumeris, cucurbitæ, melonum, ana drachmas duas. Coquuntur in aqua sufficienti, colantur cum saccharo clarificato: & rursus colatum percoquitur in Serapio, confricando in singulis eius libris inter coquendum Rheibarbari selecti, drachmas quatuor, ligatas in linteolo raro, cum Spicæ nardi scrupulis quatuor. Præstaret tamen vniuersam Serapii huius structuram in hunc modum digerere. Accipit radicem fœniculi, apii, asparagi, ana uncias duas. Glycyrrhizæ, vnciam vnam. Intybi satui vtriusque, cichorii, taraxaconis, ana manipulos duos. Cicerbitæ, lichenis siue hepaticæ, lactucæ sativæ & sylvestris, fumaricæ, lupulorum, ana manipulum vnum. Hordei integri, seminis halicacabi, ana uncias quatuor. Adianti vtriusque, aspleni, trichomanis, saxifragi Plinii, cassuthæ, ana drachmas sex. Ceterum ut hoc etiam adiciamus, rhabbarum in linteolo raro ligatum leuiter decoquendum, vel in calido serapio infundendum, exprimendumque leuiter. Aliis prædicta omnia coquuntur in aqua fontanæ mensuris duabus, vsque ad alterius consumptionem. In qua per noctem macerantur Rheibarbari selecti, drachmas decem. Spicæ nardi, drachma vna in linteolo raro colligatur. In alio linteolo foliorum Sennæ Alexandrinæ, vnciæ duæ, & rursus in alio linteolo Agarici optimi, vna. Zingiberis, drach. dimid. Mane exprimuntur, & adiciuntur Sacchari albiissimi libræ duæ, & coquuntur rursus ad Serapii consistentiam. Sunt ut obiter moneam, qui semina frigida maiora dicta adijciunt.

Serapio et cichorio, Gulielmi Placentini. XXII.

Eiusdem cum priore facultatis. Habet cichorii, manip. duos. Foliorum borraginis, echii, lactucæ violarum, intybi satui, angustifolii, oxalidis, taraxaconis, ana manip. vnum. Rheibarbari selecti, drach. duas. Herba trita coquantur in lib. duabus aquæ, ad tertie partis consumptionem: colantur. Adduntur expresso sacchari lib. duæ. Clarificatur, & iterum colatur. Redditur igni, & adicitur, Rheibarbaram in puluerem tritum, in linteolum rarum ligatum, & sape confricatur, donec perceptum Serapio erit.

AN NOT A T I O N E S.

Ethoc adicere placuit superioribus, veluti simplicius: ut si quis hoc nomine eo magis vi vellet, in promptu compositionem haberet.

1 *Taraxaconis*) Alii Batifosa legunt, herbam hoc nomine intelligentes, quæ vulgo Battiseuda, & Flos frumentorum dicitur. De qua in historia. Cyani tom. 2. nostrorum de Stirp. historia comment. multa diximus. Nihil autem refert vitam ex iis herbam huius Serapii compositionem indas. Ambæ enim refrigerant.

Oxosaccharum simplex, Nicolai Myrepsici. XXIII.

Confert ad febres tertianas, duplices tertianas, ardentes, lipyrias, & heclicas. Capis aceti vncias quatuor. Succu mali punici acidi, vnc. octo. Sacchari albi & puri, lib. vna. Coquuntur lento igne ad Serapii consistentiam.

AN NOT A T I O.

1 *Ad febres tertianas*) Bilis enim feruorem & ferociam exstinguit, eamque euincit ac concoquit.

Oxosaccharum compositum, Aetnarij. XXIV.

Concalescunt corpora potum inuat, longis iam febribus, quas sanguis aut bilis creauit, & caloris cineris auxilio est, & lienem ab obstructione liberat. Accipit corticem radicem fœniculi, apii, intybi satui vtriusque, ana vnc. duas. Coquuntur in aceti lib. tribus, ad lib. vnius consumptionem deinde expressum cum sacchari, lib. duabus percoquitur, dum Serapii crassamentum consequatur.

AN NOT A T I O.

F1 *Aetnarij*) Hoc, quia simplicius est, quam id quod ex Nicolao (quanquā nec in Latinis nec in Graecis codicibus habetur,) afferunt: placuit hoc loco, altero omisso, referre, ut deinceps pharmacopœi, præterito eo quod ad Nicolaum defertur, hoc potius composito oxosaccharo vtantur.

*Serapio * zizyphorum, Ioannis Damasceni. XXV.*

Confert raucitati, tussi, pleuritidi. Recipit Zizyphorum numero sexaginta. Violarum, seminis malua, ana drach. quinque. Capilli veneris, vnciam vnam. Seminis cydoniorum, papaueris,

Asplenium
Polytrichum.

Legitima
Serapii ex
Cichorio
cum Rha-
barbaro
compositio.

* Deipis
dia.

melnis, lactuca, tragacantha, an. drach. tres. Glycyrrhiza, hordei mundati, an. drach. octo, coquuntur cum aqua fontana lib. quatuor, & sacchari lib. duabus ad Serapii consistentiam.

ANNOTATIONES.

Serapium iuiubini duplex. *1 Zizyphorum* Iuiubinum vulgus medicorum & pharmacopœorum appellat: illisq; duplex existit, simplex & compositum. Simplex, supra inter Zulapia recensuimus: Compositum est, quod iam describimus.

Serapium simplex. *2 Sexaginta* Ita plane legendum: & non, vt nonnulli codices habent, lib. decem. Nam fieri haud posset, vt decem Zizyphorum libræ in aquæ libris quatuor commode coquerentur. Atque is error ex imperitia librariorum irrepit, qui ex numero lx. qui sexaginta denotat, fecerunt lib. x. inter l & x interponentes coma, in hunc modum, l.x. & legerunt lib. x. Ita ex notis ponderum & numerorum plures promanare errores solent, vt præstaret tum veteres, tum recentiores Medicos suas compositiones non per notas ponderum & mensurarum, sed potius integris verbis exarasse, vt nos fecimus.

Serapium compositum. *3 Drachmas quinque* Et hoc in loco nonnulli codices falso legunt vncias quinque. *4 Hordei mundati* Ita vocant, quod a suis corticibus est repurgatum, aut cortice suo nudatum. Hoc enim abstergerendi facultatem cum suo cortice exuisse, ac leniendi aut lubricandi alium vim retinuisse putant.

Hordeum mundatum. *5 Lib. quatuor* Quæ ad dimidias, vt in aliis quoque Serapiis fieri solet, coquuntur. Præstat autem aquæ fontanæ libras sex accipere, vt Serapio gratia addatur. Aqua enim aucta, facilius colatur, colatumq; decoctione ipsa minus mucilaginosum, crassumque, adeoque gratius redditur.

6 Libris duabus Colatum rectius & expeditius ad Serapii consistentiam cum vna, quam duabus libris, percoquitur.

Serapium e papauere simplex, Ioannis Damasceni. XXVI.

Aduersus tenuis humoris, a capite in thoracem & pulmonem, destillationem: frigore enim suo sistit, humoremque incrassatum fluxioni ineptum reddit, & simul cogendo expuitioni abdem, tussim siccam, gutturis & faucium asperitatem confert. Sitim restinguit, somnumque conciliat. Habet caput papaueris albi & nigri, an. drach. sexaginta. Coquuntur in lib. quatuor aquæ pluuiæ, ad consumptionem lib. vnius & dimidia, & cum sacchari albi, & penidiorum an. vncis quatuor, ad Serapii crassitudinem percoquuntur.

ANNOTATIONES.

1 Simplex Quo frequentius vtuntur, quam sequenti composito. Recte autem simplex appellatur, quod præter capita papauerum nihil recipiat.

Capita papauerum recentia. *2 Caput papaueris* Recentiorum scilicet, quia frigidiora sunt, & diu minus coqui desiderant quam sicca.

Pluuiæ aqua. *3 Pluuiæ* Quæ certe, Galeno lib. 7. de comp. med. local. cap. 2. teste, aliquid in se adstringens habet, adeoque ad sistendas destillationes commodior existit.

4 Libræ vnius & dimidia Codices nonnulli legunt lib. duabus. Verum quum recentia esse debeant capita, satis erit si ad consumptionem vnius libræ, vel vnius & dimidiæ coquantur. Sicca tamen si fuerint, ad dimidias, id est, duarum librarum consumptionem coqui possunt.

5 Vncis quatuor Falso quidam codices legunt, drach. quatuor. Nam si largo saccharo, nempe libra vna: aut etiam maiore mensura condias, gratius erit diutiusque suas vires seruabit, licet cum pauciore saccharo sit efficacius.

Serapium e papauere compositum, Ioannis Damasceni. XXVII.

Ad tussim siccam, tabem, destillationem insomniae causam, in summa ad prædicta efficacius. Caput papaueris albi & nigri, an. drach. quinquaginta. Adianthi albi, drach. quindecim. Glycyrrhiza, drach. quinque. Zizyphorum, numero triginta. Seminis lactuca, drach. quadraginta. Seminum malua & cydoniorum, an. drach. sex. Coque in lib. quatuor aquæ ad dimidii consumptionem, colatum cum sacchari & penidiorum vncis octo percoquito in Serapium.

ANNOTATIONES.

Rubrum papauer. *1 Nigri* Quidam codices, rubri pro nigri legunt, nullo discrimine. Quamquam enim nigri legitima sit lectio: tamen si rubrum quis papauer, quod non est nisi Rhœas papauer apud Dioscoridem, accipiat, nihil delinquet: quod illi quoque sit refrigerandi & somnum conciliandi facultas.

Adiantum album. *2 Adianthi albi* Capillum veneris nominat filius Mesuz.

3 Vncis octo Et hic nonnulli codices perperam habent, drach. octo. Ceterum, ne id silentio transeam, vtimur his Serapiis papauerinis ad alui profluuium & dysenteriam, quæ ex biliosi humoris & aeris fluxione excitatur.

Serapium myrtinum simplex, Ioannis Damasceni. XXVIII.

Ventriculum, atque omnia alia viscera firmat. Contra ventris profluvia & dysenteriam valet, menstrua suppressit, tussimq; a calidis & tenuibus humoribus excitatam sanat. Accipit succi baccarum myrti, lib. 12. Coquuntur in vase vitrato lento igne ad tertiam partis consumptionem, dein colantur: & residere, donec clarescant permittuntur. Clari succi lib. 7. affunduntur sacchari clarificati lib. 5. Percoquuntur lento igni in Serapium. Vel si astas fuerit, insolatur, quoad aquosa pars consumatur.

ANNO-

ANNOTATIONES.

A

¹ *Succi baccarum myrti*) Qui utique in Germania nostra, ut in iis, quibus Myrtus provenit regionibus, haberi non potest. Quapropter ut Serapium hoc nostri pharmacopœi & bacci myrtis in aqua maceratis & coctis, parent necesse est. Sed hac ratione paratum fit imbecillius. Sunt tamen qui ad præsentis Serapii compositionem succo baccarum sylvestris Germanici myrti utuntur. De quo tomo altero nostrorum de stirpium historia commentariorum diximus.

² *Lib. septem*) Ita omnia Ioannis Damasceni exemplaria legunt: ut mirum sit, Valerium Cordum contra horum omnium fidem legere, lib. octo.

³ *Lib. quinque*) Ut antea plus, nempe octo, non septem libras usurpavit Cordus; ita nunc minus, libras videlicet quatuor, præter omnium codicum fidem, accipit.

Serapium myrtinum compositum, incerti auctoris. XXIX.

Profluuium ventris sistit, etiam diuturnum, & sanguinis excreationem compefcit. Recipit baccarum myrti, drach. viginti. Rosarum rubearum, santalorum rubeorum & alborum, sumachii, balauftiorum oxyacanthæ, an. drach. quindecim. Mespilorum, drach. quinquaginta. Aqua fontanæ, lib. octo. Coquantur omnia ad consumptionem medietatis. Colato adiciuntur succi granatorum, succi cydoniorum, an. uncia sex. Sacchari clarificati lib. tres. Percoquantur ad Serapii consistentiam.

ANNOTATIONES.

Et si incerti auctoris sit hoc Serapium, tamen in dictis vitiis magnæ est efficacia: ideoque parari a pharmacopœis debet, præsertim eo tempore, quo dysenteria populariter vagatur.

¹ *Ana, drach. quindecim*) Hic Cordus geminat pondus, contra fidem omnium codicum: nec eius rei ullam rationem reddit.

² *Drach. quinquaginta*) Et hic duplicato pondere, Cordus centum accipit drachmas.

³ *Uncias sex*) Cordus hoc in loco quadruplum pondus accipiendum esse docet, nempe vniuscuiusque succi libras duas.

⁴ *Lib. tres*) Cordus lib. quinq; habet. Quod monendum esse duxi, propter pharmacopœos, qui ex præscripto eius hodie omnia fere conficiunt medicamenta.

Serapium e succo oxalidis, Ioannis Damasceni. XXX.

Febribus biliosis, & pestilentibus salubre est, Corais & ventriculi flammæ igneumque calorem exstinguit, ipsaque roborat. Habet succi oxalidis purgati, lib. tres. Sacchari clarificati, lib. duas. Coquantur in Serapii consistentiam.

Serapium e succo borraginis. XXXI.

Corroborat, latitiam generat, syncopi confert: & idem quod saccharum borraginatum potest. **D**Capit succi borraginis per linteum colati & clarificati, lib. tres. Sacchari, lib. duas. Coquantur despumando in Serapium.

ANNOTATIO.

Alii aliter componunt. Nam quidam etiam adiciunt florum borraginis recentium contusorum, & eos in aqua sufficienti coquant, atque colatum prædictis affundunt, & in Serapii consistentiam percoquant.

Serapium e succo echii. XXXII.

Corroborare, latitiamque generare creditur. Fit, ut præcedens,

ANNOTATIONES.

¹ *Succo Echii*) Buglossum officinæ vocant. Difficulus autem ex Echii rûso succus exprimitur, vitæ qui lentus est: quapropter integra nocte in frigido loco collocandus, & postridie tandem exprimendus, & cum oui albuminibus clarificandus.

² *Creditur*) Nam reuera eam facultatem non habet, sed illam potius, quam supra in Saccharo Echii indicauimus.

Oxymeli simplex Galeni. XXXIII.*

Humores crassos, lentos ac pituitosos in ventriculo & venis incidit, extenuat, & abstergit: atque adeo obstructions tollit. Sputum educit, spiritumque faciliorem reddit. Si tamen eo immodice utar, intestina radit, nervosa ledit, tuſſimque excitat. Fit ex aceti parte vna, mellis optimi despumati partibus duabus, aquæ partibus quatuor. Primum autem mel & aqua simul coquantur, ubi probe despumata sunt, addito aceto percoquantur semper quoque despumando, ad Serapii crassitudinē.

ANNOTATIONES.

¹ *Oxymeli*) Latinis Plinio nimirum lib. 14. cap. 17. sonat acetum mulsum, quod ex aceto, melle, & a qua sit compositum.

² *Intestina radit*) Quod Hippocrates etiam lib. 3. de victus rat. acut. morb. aphor. 3. indicauit.

³ *Parte vna*) Verbi gratia, aceti acerrimi lib. vna. Mellis optimi, lib. duabus. Aquæ fontanæ, lib. quatuor. Actuarius accipit aceti lib. viginti. Mellis, lib. quadraginta. Aquæ, lib. sexaginta. Quod plane

Cordus
notatur.

Cordus
errat.

* Buglos-
sq.

* Lib. 4. de
tuen. sani.

in idem recidit, nisi quod maior omnium trium sit quantitas. Hęc autem componendi ratio optima est. A
Nam quum vna omnibus mensura non placeat, quia hi acetosius, illi mellitius magis ament, vt pro cuiusque palato misceri possit, præstat imbecillius, quale est præsens, paratum habere: cui Medicus vtendi tempore, si opus erit, plus aceti addere potest: tantum nimirum, quantum mellis.

4 *Despumati*) Optimum quidem mel, minimum spumę euomit, & breuissimo tempore coquitur: malum vero, multam egerit spumam, quo etiam diutius coqui debet.

5 *Simul coquantur*) Quouique duę scilicet librę fuerint absumptę.

Oxymeli compositum, incerti auctoris. XXXIV.*

* Alias
diureticū.
Oxymeli
e quinque
radicibus.

Alias e quinque radicibus. Humores crassos & pituitosos incidit, extergit: ob id iccoris, lienis, & renum obstructions aufert. Vrinam mouet, sudoremque euocat. Accipit corticum radicem apii, fœniculi, petroselinii, ruscii, asparagi, an. vnc. duas. Seminii apii, & fœniculi, an. vnciam vnā. B
Omnia hæc in aqua lib. duodecim, & aceti lib. vna macerantur, & ad dimidias coquantur. Expressum post cum mellis optimi lib. duabus, ad Serapii consistentiam percoquitur.

ANNO TATIO.

Hoc est officinis usurpatum Oxymeli compositum, & valentius est, quam Oxymeli de duabus radicibus.

Acetum scilliticum. XXXV.

Efficax ad incidendos ac discutiendos crassos & lentos humores, gingiuas humore laxas & putrescentes sanat: eas enim reprimat, & firmat. Dentes mobiles stabilis. Oris putredines compefcit, eiusque odorem commendat. fœtore illius dissipato. Solidescit potu eius guttur, callum faucibus obāncis, validioremque vocem & clariorem efficit. Datur stomachicis, ægri cibum concoquentibus: concoctionem enim iuuat. Comitialibus, vertiginosis, melancholicis, calculosis: item vuluarum strangulationibus, leni tumescenti, & ischiadicis prodest. Admodum imbecillos recreat, & corpus sanū reddit, bonumque colorem præbet. Visum acuit, & difficilem auditum, instillatum iuuat. In summa, ad omnia efficax est, demptis internis exulcerationibus, doloribus capitis, & neruorum vitiis. Conficitur hoc modo. Scilla candida repurgata, in taleolos seu¹ laminas ligneo cultello conciditur, & filo² traiecta³ segmenta modicis intervallis, ne se contingant, ⁴ quadraginta diebus in vmbra siccantur. Sumitur deinde ex ea lib. vna, & in optimi aceti lib. octo, in vase vitrato stricti orificii bene obstructo demittitur, & septenis diebus in sole madescit. Post id tempus scilla eximitur, & expressa abiicitur. Defecatum acetum transfunditur, & reponitur. C

ANNO TATIONES.

Cor.
Cortex.

1 *Laminas*) Ioannes Damascenus filius Meluę eligit eas, quę inter centrum siue cor & corticem externum, seu superficiem medię sunt: propterea, vt quidam arbitrantur, quod partes in superficie constitutę sint nimis siccz. Ad centrum vero sitę, nimis humidę. Et verum certe est, quod aridę tunicę (ita enim Plinius lib. 20. cap. 9. appellat) in superficie positę, tanquam nullius momenti sint abiiciendę: & sumendum reliquum, quod e viuo est. Centrum etiam seu medium Scillę, vnde germen enascitur, etiam abiiciendum erit.

2 *Filo traiecta*) Acule lignea Ioannes Damascenus traiecit, ne ferrum tangat, quo venenari opinatur. Nā contrahit a ferro venenatam quandam rubiginem. Quo nomine, ligneo quoque cultro in laminas, seu taleolos concidenda scilla erit.

3 *Segmenta*) Filo scilicet suspensa.

4 *Quadraginta diebus*) Non enim ob tenacem succum, quem habent, situmque facile contrahunt, præsertim si se contingunt, in vmbra facile siccantur.

5 *Deinde ex ea*) Scillę arida frustra intellige pendencia.

Oxymeli scilliticum simplex, Ioannis Damasceni. XXXVI.

Humores crassos, lentos, frigidos, eradicatu difficiles extenuat, incidit & abstergit: ideoq, ad cicendum vomitum efficax. Dentes vacillantes ac mobiles firmat, & oris suauitatem efficit. Ab illius usu caueant tabidi, & febribus acutis laborantes. Fit ex aceti scillitici, lib. duab. Mellis despumati, lib. tribus. Percoquantur despumando ad Serapii consistentiam.

Oxymeli scilliticum compositum, eiusdem. XXXVII.

Id potentius multo incidit, tenuat, terget, obstructa aperit, in diuturnis quartanis, & quotidianis, quam oxymeli de radicibus. Recipit radicem apii fœniculi, petroselinii, ruscii, asparagi, an. vnc. duas. Seminii apii, fœniculi, an. vnciam vnā. Omnia hæc in aqua lib. duodecim, & aceti scillitici lib. vna macerantur, & ad dimidias coquantur. Expressum post cum mellis optimi libris duabus, ad Serapii consistentiam percoquitur.

Serapium et scabade simplex, Ioannis Damasceni. XXXVIII.

Iuuat omnes cerebri & neruorum affectus frigidus, nempe neruorum resolutionem, epilepsiam, conuulsionem, tremorem, & similes. Destillationibus a capite in thoracem, quas frigidus excitauit humor,

Amor, conducit, ventriculumque firmat. Habet florum stichadis, drach triginta. Thymi, calamint ha. origani, an. drach. decem. Anisi, drach. septem. Passarum vuarum repurgatarum, unc. quatuor. Coquuntur in lib. octo aqua, ad duarum consumptionem. Colato mellis optimi lib. quinque addiuntur, & iteram coquuntur ad Serapii crassitudinem: quod conditur cum cinamomi, calami odorati, Zingiberis, an. drach. una, & dimidia. Ligata in panno raro, in Serapio appenduntur.

Serapium e stichade compositum, Eiusdem. XXXIX.

Idem quod precedens efficit. Capit florum stichadis, drach. triginta. Thymi, calamint hes, origani, ana drach. decem. Anisi, pyrethri, ana drachmas septem. Piperis longi, drach. tres. Zingiberis, dr. duas. Vuarum passerum repurgatarum, uncias quatuor. Coquuntur in lib. octo aqua, ad duarum consumptionem. Colato adduntur mellis puri lib. quinque, & rursus coquuntur ad Serapii consistentiam. Id conditur cinamomi, calami odorati, spice nardi, croci, Zingiberis piperis nigri, & longi, ana drach. una, & dimidia. Ligata in panno raro, sericoue, in Serapio crassiuscule confusa appenduntur.

Serapium byzantinum, sine * aceto, Ioannis Damasceni, XL.

* Alias simplex.

Humores crassos & lentos incidit atque extenuat, obstructione aufert, ac morbo regio succurrit. Accipit succi intybi sativi latifolii, & apii, ana lib. duas. Succu lupi salictarii, & echii kortensis vel sylvestris, an. lib. unam. Feruescant semel, despumentur, & purgentur. Eius succi clarificati lib. quatuor, igne lento coquuntur cum sacchari lib. duabus & dimidia in Serapium.

Serapium byzantinum * cum aceto, Eiusdem, XLI.

* Alias compositum.

Efficacius est priori. Recipit succi intybi sativi latifolii, & apii, an. lib. duas. Succu lupi salictarii, & echii sativi vel sylvestris, an. lib. unam. Iam dictis succis incoquuntur, Rosarum, uncia dua. Glycyrrhizæ, unc. dimidia. Spice nardi, drach. dua. Seminum anisi, fœniculi, apii, ana drach. tres. Colantur & clarificantur. Claro adduntur aceti lib. dua. Sacchari albisimi, lib. dua, & dimidia. Percoquuntur in Serapium.

Serapium ex eupatorio, Eiusdem. XLII.

Ventriculum & iecur roborat, ac frigidis iecoris vitiis, & eiusdem obstructionibus, aqua intercutem incipienti, maloque corporis habitui succurrit. Humores crassos incidit & extenuat, & per urinas expurgat, flatus dissipat, & hypochondriorum tensionem demolitur. Habet radicem apii, fœniculi, intybi sativi, latifolii, an. uncias duas. Glycyrrhizæ, florum iunci odorati, cassiæ, absinthii, rosarum, an. drach. sex. Adianti, spine albe, & Arabice, florum aut radicem echii, anisi, fœniculi, eupatorii, an. drach. quinque. Rheibarbari, mastiches, an. drach. tres. Spice nardi, asari, folii, an. drach. duas. Coquuntur in aqua lib. octo, ad tertie partis consumptionem, & cum sacchari clarificati lib. quatuor, & succorum apii & intybi sativi latifolii, an. lib. duabus. Percoquuntur in Serapium.

ANNOTATIONES.

1 Spina albi) Officinæ hæc tenus barbara voce vsq, Bedeguar appellarunt. Debent autem, vt lib. i. dictum est, in penuria veræ spinæ albæ vti nostratæ, quam tomo primo nostrorum de Stirpium historia commentariorum descripsimus & pinximus.

Spina alba.

2 Arabica) Suchaham itidem barbara appellatione nominant officinæ. Quum vero hodie incognita sit Arabica spina, pro ea albam vsurpare oportet. Germinandum igitur hoc in loco eius pondus, & accipiendæ drachmæ decem.

Spina Arabica.

3 Eupatorii) Ioannis nimirum Damasceni, filii Mesuz. Quanquam si etiam Græcorum, quod iecoris roborandi, & tollendi obstructiones facultatem obtinet, vsurpetur in alterius penuria, nihilo deterius Serapium futurum est. Mesuz tamen Eupatorium ad tollendas obstructiones multo est efficacius, & bile magis per inferna deturbat, præsertim si Graciola vocata herba pro Eupatorio vsurpetur, quæ Centaurii minoris species est. Verum autem Mesuz Eupatorium, est Ageratum Dioscoridis, vt in nostris de Stirp. historia commentariis demonstrauimus.

Eupatorium.

Serapium e glycyrrhizæ, Eiusdem. XLIII.

Tussim antiquam iuuat, thoracem & pulmones expurgat, pleuritidique auxiliatur. Calefacit, incidit, tenuat, terget, expurgat, lenit, siccit. Capit glycyrrhizæ, uncias duas. Adianti, unciam unam. Hyssopi, unc. dimidiam. Horis 24. in aqua lib. quatuor macerantur, dein coquuntur ad dimidias. Expresse addiuntur mellis optimi, sacchari, penidiorum, an. unc. octo. Stillatitii rosarum liquoris, drach. sex. Percoquuntur in Serapii consistentiam.

ANOTATIO.

1 Penidiorum) Penidia ex purissimo saccharo esse debent, ne colaturæ negotium faceffant. Hoc est, saccharum in penidiorum consistentiam percoctum, & pistillo ligneo probe tritum immisceri debet.

Serapium ex Hyssopo, Eiusdem. XLIV.

Asthma, tussim, aliaque thoracis vitia efficax est, humoresque excreatu difficiles extenuat, &

educit. Potenter obstructions liberat, & hypochondriorum dolores lenit. Accipit hyssopi, radicem apii, fœniculi, petroselin, glycyrrhizæ, an. drach. decem. Hordei repurgati, unciam dimidiam. Seminum malvæ, & cydoniorum, tragacanthæ, an. drach. tres. Adianti, drach. sex. Zizyphorum, myxorum, an. numero triginta. Vuerum passarum purgatarum, drachmas duodecim. Ficum siccarum, palmularum pinguium, an. numero decem. Coquuntur omnia in lib. octo aquæ, quoad quinque supersint. Expressum cum penidiorum alborum lib. duabus percoquatur in Serapium.

A N N O T A T I O.

Penidia
alba.

1 Penidiorum alborum) Sic autem vocat, quæ ex saccharo albisimo & purissimo facta sunt: non ex crasso & pingui, vel rubro cum amylo, & sublimato marmore butyro. Nam sic facta penidia ægre, ut dictum est, colantur, & impurum ingratumque Serapium reddunt.

Serapium e¹ prassio, Eiusdem. XLV.

Thoracem & pulmonem expurgat: ideoque earundem diuturnis vitis, & a frigido tenaciq; humore excitatis, atque eradicatu difficilibus succurrit. Hinc senibus & asthmaticis plurimum conducit. Recipit prassii, vncias duas. Hyssopi, adianti, an. drach. sex. Glycyrrhizæ, vnciam vnam. Calaminthes, anisi, radicem apii, & fœniculi, an. drach. quinq;. Iridis, seminum malvæ & sœnigraci, an. drach. tres. Seminis lini & cydoniorum, an. drach. duas. Vuarum passarum purgatarum, vncias duas. Ficum siccarum pinguium, numero quodecim. Coquuntur in lib. decem aquæ ad dimidias. Expressum percoquitur cum penidiorum & mellis despumati, an. lib. duabus in Serapium.

A N N O T A T I O N E S.

1 Prassio) Græca voce ita hodie etiam appellant officinæ, quum illis potius Serapium e marrubio nominandum esset. Viride autem maxime accipiendum.

2 Glycyrrhizæ) In nonnullis codicibus desideratur. Tamen quum ad affectus thoracis plurimum conferat, recte cum aliis huius Serapii compositionem ingreditur. Qui glycyrrhizam omittunt codices, legunt, hyssopi, adianti, siue capilli Veneris, an. vnc. vnam.

3 Vncias duas) In quibusdam exemplaribus est vnciæ quinque. Sed hos plurium codicum lectionem secuti sumus.

4 Penidiorum) In aliquibus codicibus separatim legitur, Penidiorum, lib. vna. Mellis despumati, libris duabus.

Serapium e calamintha, Eiusdem. XLVI.

Lienosis, & alii qui ex humoribus crassis ac lentis obstructione laborant, asthmaticis, & diutina tussis, effluis, reitentiq; mensibus succurrit. Senes quoque, & durū lienem iuuat. Habet calamintha domestica & sylvestris, an. vna & duas. Ligustici, dauci, floris iunci odorati, an. drach. quinque. Vuarum passarum purgatarum, lib. dimidiam. Coquuntur in lib. sex aquæ ad dimidias. Expressum percoquitur cum mellis optimi lib. duabus ad Serapii consistentiam.

A N N O T A T I O.

Calamin-
tha dome-
stica & syl-
vestris.

1 Domestica & sylvestris) Per domesticam, vel eam quæ nobis peregrina est, & in hortis iam plantatur, & cultis in locis provenit: per sylvestrem autem, montanam nostram, quæ in incultis nascitur, aut certe eam, quæ alio nomine pulegium sylvestre dicitur, intelligendam esse censemus. Vtriusq; effigiem, & aliorum quoque generum in commentariis nostris de Stirpium historia offendent studiosi.

Serapium e mentha¹ maius, Eiusdem. XLVII.

Ventriculum frigidum roborat, eiusq; concoctionem iuuat, vomitum nauseamq; reprimis, singultum sanat, alui fluorem a frigidis humoribus natum sistit. Caput succi cydoniorum, vnosorum siue acidodulcium, & dulcium, succi granatorum acidodulcium, & dulcium, an. lib. vnam, & dimidiam. In illis horas 24. macerantur mentha sicca lib. vna & dimidia. Foliorum rosarum, vncia dua. Coquuntur igne lento, ad medietatis consumptionem. Colatum cum mellis vel sacchari lib. duabus, Percoquitur in Serapium: quod cum Gallie moschata tria, & in panno raro ligata drachma duabus aromatizatur.

A N N O T A T I O N E S.

1 Maius) Hoc Serapium posteriori siue minori valentius est, & vsitatum: idq; merito, quod suo calore blando, & leuicula adstrictione ventriculum imbecillum & dissolutum roborat.

2 Vnosorum, siue acidodulcium) Sic vocamus, quæ in vini odorem acescunt. Barbari Muza nominant, non sine risu eruditorum: quum uero illis erant appellanda, quod media sint inter acida & dulcia, adcoq; utrunq; saporem participant, atq; de dulcedine & aciditate aliquid habeant. Hinc aliqui acidodulcia vocant. Nos Dioscoridē imitati, vinosa diximus. Is n. oivōs punica nominat, quæ mediā inter dulcia & acida naturā habent, i.e. quæ neq; plane dulcia, neq; prorsus acida sunt, sed de utroq; sapore aliquid participant.

3 In illis) Sole scilicet, aut residentia purgatis.

4 Mentha) Parum scilicet siccata, quæ superuacaneam humiditatem nonnihil deposuerit.

Serapium e mentha minus, Eiusdem. XLVIII.

Eandem propemodum cum præcedente facultatem obtinet. Accipit succi menthae depurati, lib. vnam.

Vinosa.
Muza.

oivōs pu-
nica.

A unam, Succi punicorum dulcium, & acidorum ad dimidias cocti. lib. duas. Cum mellis vel sacchari lib. una, percoquantur in Serapium.

Serapium ex absinthio, Eiusdem. XLIX.

Serapium
ex absin-
thio sim-
plex.

Ventriculum & iecur roborat, aliaque nutritionis organa: appetentiam excitat, ac vim retentricem firmat. Aduersus regium morbum prodest. Flatus discutit, humoresque per urinam pellit. Recipit absinthii Romani, lib. dimidiam. Foliorum rosarum, uncias duas. Spica nardi, drach. tres. Vini albi, veteris, boni, odori succi cydoniorum, ana lib. duas, & dimidiam. Predicta in iis macerantur in vase marmoreo horas viginti quatuor, dein igni lento coquantur ad dimidias. Colata cum mellis aut sacchari lib. duabus percoquantur in Serapii crassitudinem.

ANNOTATIONES.

B 1. Ex absinthio) Sunt qui compositum nominant, ad alterius differentiam; quod simplex illis non immerito vocatur. Hoc, vt Mesuae filius refert, accipit absinthii Romani drach. centum. Coquitur in aqua lib. tribus, vsque ad tertias. Dein manibus fricatur, ac colatur, atque cum mellis & vini, an. lib. vna, fit Serapium. Magna vis eius est ad iecoris affectus, qui solum absinthium requirunt, vel ad vacuandam bilem ex ventriculo.

2. Romani) Romanum absinthium est, quod alio nomine ponticum dicitur, vt e Ioanne Damasceno, in capite de absinthio manifeste colligitur: in deturbanda flaua bile ex ventriculo, & eodem atque iecore roborando efficax. Errant monachi, qui in Mesuae filium annotationes scripserant, dum rusticum & vulgare accipiendum esse censent.

Absinthii
Romanū.
Monachi
errant.

Serapium e fumaria, Eiusdem. L.

C Ventriculum & iecur roborat, obstructionesque tollit. Viria cutis ex salsis & perustis humoribus excitata, verbi gratia scabiem & impetiginem, emendat. Habet myrobalanorum flauorum, cepulorum, an. numero viginti. Florum borraginis & echii, violarum, absinthii, cassiaha, ana unc. unam. Glycyrrhizae, rosarum, an. unciam dimidiam. Epithymi, polypodii, an. drach. septem. Prunorum, passerum, purgatarum, an. lib. dimidia. Tamarindorum, casia fistula, ana unc. duas. Coquantur in lib. decem aquae, ad librarum septem consumptionem. Expressum cum succi fumarie cocti & depurati & sacchari, ana lib. tribus in Serapii consistentiam percoquitur.

ANOTATIO.

Operosa est huius Serapii, & iniucunda confectio, efficax tamen ad ea quae pollicetur. Decoquenda vero primum Polypodium, pruna, passulae, glycyrrhiza, absinthium, rosa, cuscutha, flores borraginis, echii, siue, vt hodie vocant, buglossae, violarum, myrobalani, dein epithymus, tandem tamar Indi & casiae fistularis pulpa. Simplicium facta decoctione succus fumarie cum saccharo clarificato in Serapium percoquitur. Vim habet etiam leuiter aluum soluentem ac lenientem. Sumptus pondere trium vnciarum, vsque ad quinque vel sex purgat salsam pituitam, & bilem vtramque. Ictericum vtrumque depellit. Sunt, qui hodie succam fumarie coctum, residua purgatum cum saccharo aequali in Serapium coniungunt.

Serapium ex epithymo, Eiusdem. LI.

A tram bilem, & alios humores vstos vasa; ob id morbos ex iis nascentes, scabiem, lepram, elephantiam, idcirco, vlcera maligna fistulosaque praecauet, curatque. Capit epithymi bovi Cretensis, drach. viginti. Myrobalanorum flauorum, indorum, ana drach. quindecim. Cassiaha, fumarie, ana drach. decem. Thymi, calamintha, buglossi, myrobalanorum emblicorum, & bellericorum, glycyrrhizae, polypodii, agarici, stichadis, ana drach. sex. Rosarum, seminis feniculi, anisi, an. drach. duas, & dimidiam. Prunorum, numero viginti. Vuarum passerum purgatarum, unc. quatuor. Thamar indorum unc. duas, & dimidiam. Coquantur in lib. octo aqua ad dimidias, dein remota ab igne macerantur noctem unam. Recolecta exprimuntur. Expressum cum sacchari clarificato, lib. quatuor. Sapia, lib. duabus percoquantur in Serapium.

Serapium ex arthemisia, Matthaei Gradi. LII.

M edetur vitis vteri, & praesertim eius praefocioni, flatui & doloris dissoluit, & ad ciedos mensis aperiendaque obstructiones ex crasso & lenis humoribus natus magnam efficaciam habet. Accipit arthemisia, manipulos duos. Pulegii, calamintha, origani, melissae, phylli, persicariae, sabinae, sampuchi, chamadryos, hyperici, chamapytios, matricaria cum flore, centaurii minoris, ruta, betonica, buglossi, ana manipulum unum. Radicum feniculi, apii, petroselini, asparagi, rusci, saxifragiae, helentii dictamni, cyperi, rubiae, iridis, paonia, ana manipulum unum. Seminis iuniperi, libystici, petroselini, apii, anisi, nigellae, carpobalsami, colli, asari, pyrethri, casiae lignae, cardamomi, calami odorati, phu, ana unciam dimidiam. Quassata macerantur in aqua fluminali sufficienti horas 24. Post coquantur ad aqua dimidia consumptionem. Tunc aufertur igni, dum aqua tepuerit: fricantur manibus omnia, & colantur. Expressum cum mellis aut sacchari lib. quatuor, percoquitur in Serapii consistentiam.

A N N O T A T I O N E S.

Serapia
magistra-
lia.

Hoc Serapium ex numero eorum est, quæ a recentioribus Magistralia nominantur: quod scilicet magna arte & industria, si diis placet, composita sint. Quum tamen recte illa expendentibus, non sint nisi quædam ex catalogo Simplicium nullo iudicio descriptæ coaceruationes. Nam quid rogo hoc præfens Matthæi Gradi Serapium aliud est, nisi confusum quoddam chaos ex catalogo Simplicium mentes mouentium contextum? Quapropter quum singula, vel horum saltem pauca ad mentes euocandos sufficerent, non est cur a nobis tam prolixa & operosa compositio probari debeat. Ceterum habent etiam eiusdem farinæ compositionem aliam Serapii de Matricaria nominati: quam lubens prætereo, quod antea satis magna in officinis nostris Serapiorum sit copia: & quod præfens ei per omnia fere simile sit, idemque possit.

Saxifra-
gia.

1 *Saxifragia*) Quum Itali, e quorum grege auctorem huius Serapii fuisse constat, Saxifragiam nominent herbam, quæ nobis Pimpinella dicitur: eius radix ad Serapii præfentis compositionem usurpanda erit.

Dictamn.

2 *Dictamni, cyperi, rubie*) Non Cretensem intelligit, utpote cuius radix inusitata hodie est: sed eius, quam hodie Dictamnium, vel (ut ipsi loquuntur) Diptamnium album vocant. Quum enim radix illa admodum amara sit, ad tollendas veteri obstructiones, & meatus extergendos, adeoque mentes eliciendos efficax sit oportet. Tamen non prohibemus, si quis etiam veri seu Cretensis dictamni folia usurpet, quod eandem habeant facultatem.

3 *Aqua sufficienti*) Libris nimirum octo, in quibus primum radices, post semina, dein herbæ, tandem aromata bulliant, ad dimidiam partis consumptionem. Expressum cum sacchari & mellis singulorum libra una & dimidia fiat Serapium.

Aqua mulsa. LIII.

Magnarum est virium, ex maiorum nostrorum sententia. Siquidem sitim sedat, affectus frigidos, præsertim cerebri, nervorum & articularum iuuat, Loco vini potatuum humidam, eo quod asperitatem faucium & gutturis mitiget ac leniat, puris & pituita crasse ac lentæ exsiccationem promouet: lauat, tergit, purgat intestina, viscera, meatus urinarios. Quapropter colicis prodest, ac alium subducit, & calculum in viis urinae gigni prohibet. Fit ex mellis boni, lib. una. Aqua fontana dulcis & clara, lib. octo. Coquuntur in vase lapideo vel vitrato, igni lento ad partis quartæ consumptionem: & continenter despumantur, dein colantur per densum pannum, & reconduntur.

A N N O T A T I O N E S.

Aqua
mulsa.

1 *Aqua mulsa*) Græcis μελιχρατον & ὑδρομέλι dicitur, hoc quidem recens, illud verò inueteratum. Veteribus id genus potationis vfitatissimum fuit.

2 *Affectus frigidos*) Biliosis namque naturis, & morbis calidioribus, & iis, quibus tumida & eleuata sunt viscera, quos Græci μεγαλοπληγες vocant, nocet. Dulcedine enim sua promptissime in bilem vertitur mel.

Mel bo-
num.

3 *Mellis boni*) Quod colore pallidum est, odore iucundo, sapore modice acri & dulci, consistentia inter crassum & tenue media, non vetus.

4 *Quarta*) Variant hic auctores: siquidem alii ad tertiam, alii ad quartam, nonnulli ad quintam partis consumptionem coquunt. Nos mediam viam, veluti tutissimam, amplexi sumus. De facultatibus aquæ mulsæ, plura Dioscorides habet.

Mel rosatum, Ioannis Damasceni. LIV.

Ventriculum roborat, & in partibus nutritionis famulantibus pituitam extergit, concoctionem que iuuat. Sic fit. Foliorum rosarum rubearum nondum explicatarum contusorum, lib. dua. Mellis boni & despumati, lib. 6. Coquuntur lento igni, quantum oportet. Vel ita. Succus rosarum, mellis optimi, an. vnc. quatuor. Coquuntur, ut antea. Aut hoc modo. Foliorum rosarum, & succi carumdem, an. vnc. una, & dimidia. Mellis vnc. tres.

A N N O T A T I O.

Mel rosa-
tum cum
foliis, seu
non cola-
tum.
Mel rosa-
tum cola-
tum.

Tres modi compositionis mellis Rosati a filio Mesuæ traduntur. Primum nonnulli appellant Mel rosatum cum foliis, seu non colatum. Et ita paratum habere debent pharmacopolæ. Alterum, ex succo scilicet, & melle, mel rosatum colatum nominatur. Tertium ex succo, foliisque rosarum, & melle constat. Hodie primum genus ex tritis foliis, non deficcatis in umbra, & remotis vnguibus, ut iubet filius Mesuæ, sed recentibus paratur. Id vero postea igni liquatum, linteoque percolatum, mel rosatum colatum vocatur, ad potiones, & alia medicamenta liquida paranda utile. Rectius autem ex infusionis multiplicis rosarum recentium, & mellis pari mensura, in Serapii consistentiam, mel rosatum colatum coquunt nonnulli. Et quo plures sunt infusiones, eo valentius fit: Paratum autem mel rosatum vase vitreo, vel terreo vitreato excipitur, & soli exponitur, & tertio quoque die mouetur, ut vndiquaque incallescant, & diligenter obturentur.

Mel rosatum aliud, efficacius. LV.

Habet rosarum rubearum nondum explicatarum foliorum recentium contusorum, lib. duas. Coquuntur in aqua cælestis lib. quatuor, usque ad quartam partis consumptionem. Expresso addantur succi rosarum rubearum depurati, mellis optimi despumati, an. lib. tres. Percoquuntur ad istam consistentiam.

Mel

Mel violaceum. LVI.

Confert leuiter febricitantibus. Refrigerat enim, & humectat. Fit, ut rosatum, estq; duplex colatum, & non colatum. Eius usus frequentissimus est ad clysteres, quoties intestina detergenda, lubricanda, & refrigeranda. Sunt qui in eius confectioe accipiunt mellis optimi nec veteris libras tres. Florum violarum leniter desiccatarum, lib. vnam. Ponuntur in vase ad solem.

Mel anacardinum. LVII.

Memoria iacturam refarcit, labantes sensus refricat, obliuionem discutit, & mentem exacuit, morbis cerebri frigidis & humidis confert, neruorumque resolutioni opitulatur. Fit hoc modo. Anacardia recentia teruntur, & in aqua coquuntur, donec melliginem quandam in rubeo colore fuscā remittant. Ea aqua innatans aufertur, & reconditur. Quidam anacardia recentia trita diebus septem in aceto macerata coquunt ad dimidias, & colant. Expressum melle ad spissitudinem coquunt. Alii mel anacardinum vocant, in quo anacardia sunt condita, & seruantur. Quod certe ab omnibus parari potest, prius non nisi ab iis, apud quos anacardia proueniunt.

Mel emblicorum. LVIII.

Bisariam fit. Vno modo quando myrobalani emblici melle condiuntur, & seruantur. Alio, quando emblicorum decoctum ad mellis spissitudinem aut consistentiam reducitur.

Mel passulatum. LIX.

Fit in hunc modum. Vuarum passerum intus purgatarum lib. quatuor, macerantur in aqua lib. duodecim, horas viginti quatuor. Dein coquuntur, quoad tertia pars remanserit. Colatum ad mellis crassitiem recoquitur.

Mel myrtinum. LX.

Fit ex succi myrtorum libra vna, & mellis libris duabus, igne lento simul percoctis.

A N N O T A T I O.

Nunc reliquum esset, ut decocta subiiceremus. Verum quum intelligam, hæc non diu incorrupta posse conseruari, & prestare, ut quiuis Medicus pro re nata noua & affectui congruentia componat, non putauim esse faciendum, ut in decoctis describendis non necessariam operam nauarem.

A P P E N D I X.

De decoctis.

Decoctis per se utimur, aut medicamentis quibusdam admiscemus, ad eorum compositionem, aut dissolutionem, ut facilius assumi possint. Decocta vero multa sunt in Mesue antidotario, quæ hoc loco commemorare nihil attinet, quod perinde atque alia decocta, quæ a medicis pro morborum varietate parantur, confici soleant, & nos lib. 3. huius operis cap. 16. de iis abunde agemus. Nos tria tantum subiiciemus, quorum usus in medicorum officinis frequens est.

Decoctum communis clysteris.

Recipit beta, malua, parietaria, attriplicis, mercurialis, an. manipulum vnum. Decoquantur in sufficiente aqua quantitate. Sunt qui adiciunt seminum anisi & fœniculi, ana drachmas duas.

Decoctum commune purgantibus.

EHabet hordei integri, unc. vnam. Prunorum numero 13. Pastularum, unciam vnam. Glycyrrhizæ rasæ, drach. tres. Violæ foliorum manipulum vnum. Seminis anisi, drach. vnam, & dimidiam. Decoquantur ut præcedentia. Vocantur vero utraque decocta communia, quod nulli parti corporis, nec certo alicui humori sint destinata.

Decoctum pectorale.

Sic dictum quod commune aliis partibus non sit, sed pectori siue thoraci potius destinatum. Accipit hordei integri, unc. vnam. Glycyrrhizæ rasæ, unc. dimidiam. Adianti, capillum Veneris vocant; byssopi, singulorum manipulum vnum, Ficuum, palmularum dactylorumue emundatorum. Passularum enucleatarum, sebestæ, singulorum numero sex. Florum violarum, borraginis, utriusque pugillum vnum. Anisi, drach. duas. Decoquantur ut oportet. Usus erit maxime ad medicamenta, quæ in thoracis morbis curandis exhibentur, dissoluenda.

DE PVLVERIBVS ET SPECIEBVS,

Sectio XI.

Pulvis pro epithemate cordis. I.

Accipit santali rubei, unciam vnam. Corticum citrii mali, santali albi, rosarum rubearum, corallii albi & rubei, succini, eboris vsti, ana unc. dimidiam. Florum borraginis, daronici Romani, ana drachmam vnam; Osii cordis ceruini, croci, ana drachmam vnam. Specierum latitia Galeni,

& electuarii de gemmis & diamargariton, an. scrup. quatuor. Florum semperuini, scrup. unum. **T**erantur omnia in puluerem tenuissimum, & commisceantur.

Pulvis pro epithemate iccoris. II.

Recipit rosarum, santalorum albi & rubei, absinthii pontici, floris iunci odorati, eboris vsti, spicæ nardi, spodi, seminis intybi sativi latifolii, an. 3 dimid. Trita in puluerem permiscentur, & reconduntur.

Pulvis aduersus calculum, Noster. III.

* Rectius
fumariæ
primæ
Plinii.

Habet radicem fœniculi, asparagi, filipendula, an. drach. duas. Radicis rubia tinctorum, scrup. duos. Radicis aristolochia rotunda appellata, & althea, an. drach. unam, & dimidiam. Glycyrrhiza rasa, drach. septem. Seminum genista, ammeos, apii, anisi, fœniculi, dauci, cumini, saxifragi, mili folis, an. drach. unam. Seminum melonum & citruli excorticatorum, an. drach. tres. Seminis halicacabi, drach. unam. Lapidis & spongiis marinis, & iudaici, an. scrupulos duos. Parietaria, malua, ana drach. duas. Polii montani adianti, asari, pulegii, betonica purpurea, ana drach. unam. Caryophyllorum, galanga, sanguinis hircini arefacti, & praparati, an. drach. duas. Bdellii ammoniaci, an. drach. unam. Oculorum cancri, cinamomi selecti, iunci odorati, an. drach. unam, & dimidiam. Sacchari, unc. quinq. Contusa & redacta in puluerem minutissimum permiscentur. Optimus hic pulvis non tantum ad excutiendum calculum, verum etiam ad cauendum, ne is vel in renibus vel vesica procreetur. Pondus exhibitionis eius in stillatio saxifragæ vel trichomanis decocto.

Pulvis aduersus pestem, Noster. IV.

Capit radicem tormentilla, betonica altilis, pimpinella, dictamni vulgaris siue albi vocati, ana drach. unam. Seminum citrii mali, portulaca, oxalidis, ana drach. unam, & dimidiam. Specierum diamargariton frigidarum, terra lemnia, boli armenii, an. drach. duas. Coralliorum rubeorum, santalorum rubeorum, alborum, ossis cordis ceruini, an. drach. unam. Croci, ligni aloes, ramentorum eboris, an. 3 dimid. Scabiosa, cardui benedicti, fol. dictamni Cretenfis, an. 3 3. Myrrha selecta, aloes iccoraria, an. 3 2. Radicum buglossi, gentiana, ana 3 2. & dimid. Coriandri praparati, 3 1. Tritis omnibus commixtus, fiat pulvis. Datur drachma una, aut si squadrachma pro atatis ratione.

Pulvis aduersus lumbricos, Noster. V.

* Herbarum
Kunigundis
vocat.

Accipit seminis santonici, quod lumbricorum vocant, unciam unam. Centaurii minoris, stichadis curina vocata, radicis dictamni albi, absinthii vulgaris, calamintha scordii, an. drach. duas. Pulegii, origani, eupatorii Auicenna, abrotoni, mentha, an. drach. unam, & dimidiam. Lupinorum, fol. aristolochia rotunda, an. 3 2 & dimid. Aloes, 3 2. Myrrha, 3 1. Cornu ceruini vsti, 3 1. & dimidiam. Radicis gentiana, Achillea lutea quam Tanacetum nominant, florum, an. 3 2. Trita in puluerem tenuissimum misceantur. Datur quantum de precedenti ex vino, aut Serapio glycyrrhiza.

Pulvis vel drangea laxatiua. VI.

Recipit turpeti, 3 1. Macis, cinamomi, mastiches, galanga cardamomi, caryophyllorum, anisi, hermodactylorum, dacrydii, an. 3 dimid. Fol. sena, 3 2. Sacchari 3 4. Contrita in puluerem commisceantur.

Pulvis medicamenti turpeti. Auicenna. VII.

Purgat humores pituitosos: & de sententia Auicenna, datur pueris, mulieribus, senibus, humidis, delicatis, & otiosis. Habet cinamomi, mastiches, turpeti albi, an. drach. decem. Sacchari albiissimi, pondere omnium. Trita, inq. puluerem subtilissimum redacta, permiscentur.

* Tartarum
barbati
fecem vini
indurata,
& doliis
vinariis vi-
ni optimi
& generosi
si adhære-
tem nomi-
nant. Vul-
go Wein-
stein. Senz
ingratitu-
dinem ob-
tundit.
Odorata
flatulen-
tam & tor-
mentosam
Senæ na-
turam cor-
rigunt.
* Condifi.

Cinamomi) Auicenna habet zingiberis albi. Nos autem substituimus cinamomum, propter causam cap. 88. primi libri expositam. Sunt qui puluerem pituitam purgantem eiusmodi componunt. Accipit turpeti, dr. unam. Hermodactylorum, dr. dimidiam. Cinamomi, scrup. unum. Sacchari, semunciam. Miscantur, terantur, & fiat pulvis. Vfus eius est in articularum, & coxæ doloribus, atq; in podagra cruciatibus. Pituitam ex corporis penetralibus, atq; articularum cavitatibus potenter elicit, ieiunio ex pulli iusculo datus.

Pulvis sena praparata, Montagnana. VIII.

Caput purgat mirabiliter. Adustos & retorridos humores, melancholicum, succum pituitam item salsam vacuat. Cutis scabietatem, scabiem, lepram, aliaq; cutis vitia sanat. Caput folliculorum sena, 3 12. Zingiberis, maceris, an. 3 3. Cinamomi, tartari, an. 3 1. & dimid. In puluerem redacta commiscantur. Dantur in iusculo, 3 3. aut. 4.

Pulvis ad glandes validas conficiendas. IX.

Accipiunt ellebori albi, nucleorum colocynthidis, an. 3 1. & dimid. Esula praparata, hermodactylorum, an. 3 1. Specierum hiera simplicis Galeni, 3 2. Trita in puluerem permiscantur.

Pulvis sternutatorius, Noster. X.

Recipit maiorana, nigella, an. 3 2. Radicum pyrethri, 3 3. & dimid. * Struthii, piperis albi, ana 3 dimid. Ellebori albi 3 6. Cubabarum, 3 1. Zingiberis, castoris, an. 3 3. Trita in puluerem misceantur. Egregie sternutamenta mouet.

Pulvis

Pulvis sanguinem sistens, Noster. XI.

Habet thuris, 3. 2. Aloes, 3. 1. Sanguinis draconis, boli armenij, terra lemnia, ana 3. 1. & dimid. Mumie, 3. 1. Seminis plataginis, 3. 1. & dimid. Baccarū myrti, balauſtiorum, ana 3. dimi. Radicis bistortæ, & symphyti maioris, a. 3. 2. Gallarū, 3. 1. Coralliorū rubeorū, lapidis hamatitidis, a. 3. 1. & dimid. Gypsi, 3. 2. Trita in puluerem permiscetur.

ANNOTATIO.

Gal. lib. 5. theria. methodi c. 4. puluerem sanguinis eruptionem supprimentem tantum ex thuris parte vna, & aloes dimidia componit, & cui candido subigit, ut illic videre licet. Plurimum illum cōmendat ad membranarum cerebri hæmorrhagiam, venarum vulnera, & ad alias sanguinis vnde cunq; eruptiones.

Pulvis* Alexipharmacus. XII.

* Bezcan-
dicus.

Capit boli armenij cum aceto preparati, uncias duas. Rosarum rubearum, drach. unam. Seminis oxalidis, caryi mali, & rutæ, doronici Romani, succini, seminis cardui benedicti, ana scr. quatuor. Corallij vtriusq; ligni aloes, serici crudi, radicis tormentille, ana drach. unam. Dictamni Cretensis, betonica altilis radicis, scabiosa, terra Lemnia, ana drachm. unam, & dimidiam. Croci, scrup. duos. Margaritarum perforatarum, santalorum omnium, ana drach. unam. Ambra, scrup. unum. Moschi, scrup. duos. Redacta in puluerem misceantur. Ex vino odoro & grato, aut cum serapio e citro sumitur. Venenis alijsq; medicamentis deleterijs, & viscera tentantibus aduersatur. Vitales spiritus, & cordis robur deiectum confirmat.

Pulvis violarum odorus. XIII.

Accipit radicis iridis Florentina, lib. unam. Rosarum, violarum, ana unc. unam, & dimidiam. Maiorana arida, unc. unam. Caryophyllorum, drach. tres, & dimidiam. Santali albi, unc. unam, & dimidiam. Moschi, drach. dimidiam. Terantur in puluerem.

Species mixta. XIV.

Habent cinamomi, zingiberis, ana unc. duas. Nucis moschata, unc. unam. Caryophyllorum, macis, ana unc. dimidiam. Granorum paradysi, piperis nigri, ana unc. unam. Permiscantur.

Species Bertholdi. XV.

Capiunt cinamomi selecti, lib. dimidiam. Zingiberis albi, quart. unam. Piperis longi, galangæ, granorum paradysi, ana unc. unam. Cardamomi, unc. dimidiam. Caryophyllorum, macis, nucis moschata, ana drach. tres, & dimidiam. Croci orientalis, unc. unam, & dimidiam. Sacchari albi, lib. tres. Fiat pulvis.

Species incisa. XVI.

Accipiunt seminis anisi, glycyrrhizæ purgata, ana lib. dimidiam. Coriandri preparati, seminis feniculi, carei, zingiberis, ana quart. unam. Calami odorati, unc. duas. Galangæ zedoaria, ana unc. unam. Incidantur, & misceantur.

Tragæa communis. XVII.

Recipit cinamomi, unc. 2. Caryophyllorū, macis, nucis moschata, ana unc. 1. Zingiberis, unc. 1. & dimid. Sacchari albi, lib. 3. Specieb. in crassiore puluerē redactis misceantur, & fiat tragæa.

Sal sacerdotalis. XIX.

Habet zingiberis, radicis acori veri, pyrethri, seminis cumini, ammeos, piperis nigri, seselios, hyssopi, satureia, origani Cretensis, pulegij, ana 3. 1. Cinamomi, unc. dimid. Salis communis, 3. 12. Fiat pulvis.

Sal Marcellinus. XIX.

Capit salis ammoniaci, costi radicis, ana 3. 11. Piperis nigri, 3. 2. Cinamomi selecti, piperis albi, caryophyllorum, galangæ, zedoaria, ana unc. unam, & dimid. Hyssopi, thymi, origani, carei, anisi, apij, petroselinij, leuistici, ana drach. sex. Misceantur, & fiat pulvis.

Pulvis¹ cephalicus. XX.

Vsus eius est in cranij ossē nudato & abraſo, eiusdemq; fracturis. Accipit Sarcocolla, thuris, iridis sanguinis draconis, myrrha, aristolochia longa, ana partes æquales. Fiat pulvis subtilissimus.

ANNOTATIO.

¹ Cephalicus dictus est a capite, cui inspergitur. Alio nomine catagmaticus, quod caluarie fracturis Cephal. adhibeatur. Componuntur ex iis quæ abstergunt, siccant, & adstringunt medicamentis eiusmodi pulueres. Galenus lib. 3. de medendi ratione cap. 2. erui farinam, & mannam thuris addit. Præstat hunc in offi- Catagmaticus.
cinis paratum habere propter Chirurgos, & Medicos, qui chirurgiam exercent, qui hoc ipso crebro vtuntur, quemadmodum etiam aliis, qui sequuntur.

Pulvis Sarcoticus. XXI.

Hoc vniuntur ad vlcera curanda implenda, carnem gignendam, & profunda vulnera aquanda. Habet sarcocollæ, misticis, sanguinis draconis, boli armenij, corticum thuris, myrrhæ, lithargyri, aloes, ana pares portiones. Terantur omnia subtilissime.

Pulvis deterforius. XXII.

Vlceribus omnium partium sordidis, putridis, cuniculosis, fistulosis, & maleficis confert. Sordes n. detergit, putrilagine vindicat, ac virus serpens eluit. Recipit aluminis diligenter triti, drach. duas. Salis, drach. unam. Mellis, unc. tres. Omnia simul mixta cremantur olla, vstis, tritig, iridis drachma tres trita miscentur.

ANNOTATIO.

Pulvis ex vitriolo. Sunt qui vitriolo vsto ad easdem sordidorum & malignorum ulcerum querelas vtuntur. Hoc enim ab illis vritur, diuq; ex aceto tritum circumagitur, deinde siccatur. Pulvis autem is ex vitriolo citra morsum siccatur, & putredines sanat.

Pulvis cicatrices inducens. XXIII.

Dvis corporibus, contumacibus vitis, & humidis admodum utilis est, ideog, desiccando cicatrice ulcera inducit. Accipit balaustrorum, sanguinis draconis, cadmia argenti, aris vsti, loti ana partes aequales. Fiat pulvis subtilissimus.

ANNOTATIO.

Cadmia argenti. 1 Cadmia argenti.) Quae in argenti fornacibus fit, candidior, & minus ponderosa, Plinio lib. 34. cap. 10. teste existit.

Pulvis ad eos qui ex alto ceciderunt. XXIV.

Conferi ruptis, contusis, fractis, ijs qui sanguinem expuunt, & praecipitatis. Habet¹ Rhabbarbari optimi, drachmam unam. Momia, rubia vtriusq; drach. dimidiam. Terra lemnia, boli armenij, viriusq; drach. unam. Sanguinis draconis, balaustrorum, vtriusq; scrup. duos. Radicis symphytimatoris, drach. unam, & dimidiam. Terantur omnia subtilissime in pollinem.

ANNOTATIO.

1 Rhabbarbari.) Veterum nimirum, quod Dioscoride & Galeno testibus, ad praedicta omnia praestantissimum existit.

Momia. 2 Momia.) Ita cum Nicolao Myrepso appellare libet. Hodie mutatione o in u, Mumiam appellant. Alii medicatum funus. Praestat autem pro ea vsurpare Pissasphaltum, quod iam affertur, paulo ante Medicis incognitum.

3 Rubia.) Cuius radix acerbata & amara, Galeno etiam attestante, est. Ratione igitur acerbatae qualitatis praedictis vitis conducit. Quia vero non leuem abstergendi facultatem obtinet, ideo praestabit forte per vsurpare in hoc puluere radicem Heptaphylli siue Tormentillae. Pulvis iste ex vino adstringente sumitur.

* Trochiscis.

DE PASTILLIS, SECTIO XII.

1 Pastillus ex eupatorio, Ioannis Damasceni. I.

Obstructionem & tumorem praeter naturam rectoris & liemis sanat, ac inde natas febres diuturnas, & harum rigorem. Morbum regium, hydropem incipientem demulcet. Habet manna, succi² eupatory, ana unc. unam. Rosarum, unciam dimidiam. Spica nardi, drach. tres. Rhei barbari, asari, anisi, ana drach. duas. Spody, drach. tres, & dimidiam. Cum stillatio cassutha liquore fringantur pastilli, & in loco umbroso, & ventis perflato resiccentur.

ANNOTATIONES.

Pastillus. 1 Pastillus.) Graecis τετραχμο dicitur, qua voce hodie officinae vti malunt quam Latina pastilli, aut orbiculi, aut rotulae, ita enim Graeca vox interpretari potest. Eodem autem modo quo catapotia formantur, sed forma differunt pastilli. Etsi enim instar catapotiorum rotundi sunt, tamen compremuntur. Alii etiam quadrata finguntur forma. Species tenuius teruntur quam ad catapotia. Ponderant magna ex parte drachmam unam, vel duas.

2 Eupatorium.) Filii Mesuae, utpote huius pastilli auctoris, vtendum, si haberi potest. Est autem nunc multis cognitum, & in hortis fere omnibus plantatur.

Spodium. 3 Spodii.) Arabum spodium nequaquam accipiendum: quod quale sit, libro primo indicauimus: sed potius officinarum siue Platearii, quod non est nisi ebur vstum. Quod in omnibus quoque pastillis obseruandum erit, ne sit opus vt id crebrius repetamus.

Pastillus¹ e vipera. Andromachi. II.

Accipit² carnis viperinae in sacabo nouo cum aqua pura, viridi anetho & modico sale bene cocta, unc. octo. Haec in mortarium coniecta valide, paulatim instillato³ insculo, teritur. Vbi autem quam tenuissime fuerit trita, panis triticeus purissimi aridi triti & cribrati, unc. dua adduntur: & rursus insculi quod satis est affunditur, & in conterendo diligentissime uniuntur, ac modice⁴ opobalsamo adhibito finguntur tenues pastilli, & in umbra desiccantur.

ANNOTATIONES.

Vipera. 1 Vipera.) Vipera serpens est, quem barbari & recentiores Medici Tirum vocant. Hinc est, quod praesentem pastillum e Tiro inscribant. Eius serpentis copia in Germania haberi non potest, sed ex Italia peti debet. Est autem vipera, animal colore sufflauium, admodum agile, Galeno in libello de Theriaca ad Pisonem teste.

A teste, collo maxime protenso, oculis subrubentibus, inuerecundis trucibus & feroci aspectu, capite latiore, corpore vniuerso & ventre crassiore, cauda acruatim in tenuitatem abeunte: A masculo foemina iis rebus dissidet, & quod dentes caninos plures duobus exferit.

2 Carnis viperina) Qua ratione autem caro hæc parari debeat, Galenus & alii Græci Medici ex Andromacho docent. Vipera foemina notanda magnitudinis viginti, aut paulo plures pro totius confectura quantitate non quouis anni tempore, sed iam desinente vere, nondum autem inchoata æstate, accipiendæ, & primum ipsarum capita & caudæ præcidendæ. Nam præterquam quod hæ partes virulentiores esse videntur, etiam duræ & modicæ carnis compotes existunt. Sufficit autem in magnis viperis id quod aufertur virobique quatuor digitos æquare. Reliquum verò totum corpus cute detracta, adipè, utpote inutili, & intestinis ademptis, aqua perlutum in fictile nouum, & probe extersum coniiciendum.

3 Bene coctæ) Quod cognoscitur, ubi spinæ & ossa carnis separantur.

4 Fusculo) Scilicet in quo viperarum carnes decoctæ fuerunt.

B **5 Opobalsamo**) Pro succo balsami sumatur succus Leucioi, quod Cheiri officinæ vocant. Et hoc loco Matthiolus me pungit, quod opobalsamum addiderim præter Andromachi institutum, medicamentum quo iam penitus destituimur. Fateor quidem, Opobalsamo nos hodie carere, tamen quum eius in horum pastillorum compositione non solum Paulus, verum etiam Aetius mentionem faciat, quid est cur reprehendere audeat Matthiolus, quod tantorum auctorum exemplo motus feci? Nihil profecto, quam ut me Germanum hominem insectetur, errorumque suspectum reddat, & in se Italum, omnium oculos conuertat. Quum igitur me passim sine meo merito errorum infimulet, faciam & ego, ut vicissim omnes intelligant, Matthiolum potius Matzolum, quasi *ματτωλον*, nominandum esse.

Pastillus scilliticus. Andromachi. III.

R Ecipit^r scilla assa partium internarum, lib. unam. Farina erui, vnc. octo. Teruntur hæc simul valide in mortario, & excepta in pastillos digeruntur, & in umbra siccantur.

ANNOTATIONES.

1 Scilliticus) Quod ex scilla præparetur, ita dicitur.

2 Scilla assa) Assatur autem hoc modo. Scilla recens bonæ habitudinis ex terra sumitur, quum folia ipsius & caules exacte inaruerint. Cortice autem adempto, fermento mundo aut massa farinacea circumlinitur: postea in calido cinere, aut furno torrefit, vsq; dum farinacea massa obducta, in crustam indurefcit. Quod si fornax aliquis habeatur, in illum simul cum pane immittitur. Dein extracta, per ambitum, massa farinacea conficcata adempta purgatur, & internæ partes teneriores acceptæ probe teruntur.

3 Libram unam.) Aetius accipit lib. tres. Scillæ, lib. duas, farinæ eruinæ. Nicolaus scillæ, drachmas sexaginta. Farinæ eruorum, drach. quadraginta. Quod sane in idem recidit. Nam uterq; Scillam pondere farinæ eruinæ sesquialtera esse vult: id est, tres partes Scillæ, duas autem farinæ. Quam ponderis rationem nos etiam obseruauimus: sunt n. Scillæ vnc. 12. quæ ad vnc. 8. sesquialteræ proportionem habet.

4 Excepta) Aetius in iis conformandis rosaceum oleum adhibet.

Pastillus hedychroi. Andromachi. IV.

H Abes^r mari, amaraci, asari, aspalathi, ana drach. duas. Iunci odorati, calami odorati, phu^r xylobalsami opobalsami, costi, cinamomi, ana drach. tres. Myrrha, folij spicæ nardi, croci, casie, ana drach. sex. Anomi, drach. duodecim. Mastiches. drach. vna. Cum vino veteri odorato dulci finguntur pastilli.

ANNOTATIONES.

E Hæc est legitima Hedychroi, quod Arabes corrupta voce Alin daracarôn nominant, Andromachi descriptio. Aliæ autem diuersæ ab illa descriptiones sunt, quemadmodum Galenus lib. 1. de Antidotis fusius monstrat. Astuarius eadem medicamenta e quibus constituitur Hedychroum, simplicia recenset, ne vno quidem vel adiecto, vel omissio. In pondere, tamen variat, quemadmodum etiam Aetius: qui tamen in numero simplicium Hedychroum constituentium consentit.

1 Mar.) Italegit Galenus loco iam citato, & Astuarius: ut non sine maximo errore Cornarius, mendosum Græcum codicem secutus, in Aetio, Ari pro Mari conuerterit. Marum autem, Galeno & Plinio testibus, peregrina est herba, ut in Germania illam prouenire vix crediderim. Quapropter eius succedaneo vtendum, quod non est nisi Sifymbrium: cui, Dioscoride attestante, æquales vires habet. Balsamita igitur vocata, pro Maro Pharmacopœi vtantur.

2 Quid pro Opobalsamo, xylobalsamo, folie, & anomo sit accipiendum libro primo, & in quibusdam compositionibus præcedentibus est monstratum.

F *Pastillus Gallie moschata. Ioannis Damasceni. V.*

C erebrum & cor roborat, oris atque adeo totius corporis odorem commendat. Capit ligni aloes crudi, boni, selecti, drachmas quinque. Ambaris, drachmas tres. Moschi, drachmam unam. Glutinis tragacantha cum stillatio rosarum liquore extracti, quantum ad ea comprehendenda sufficit. Fingantur pastilli magnitudinis folij myrti, sigillentur, & in vase vitreo reponantur.

Scilliticus
Scilla vt
assatur.

Cornarii
lapis.
Marum,
& eius succedaneum

ANNOTATIO.

Glutē tra-
g. canth. excipienda medicamenta, pastillum hunc ingredientia.

Pastillus al. praemoschata. Nicolai Myrepsici. VI.

Valeat pueris laborantibus asthma, & ijs qui angusto sunt thorace, nec lac haustum retinent: presta: & usum optimi & odoriferi suffitus. Accipit ladani purissimi, vnc. tres. Styracis calamitis, vnc. unam, & dimid. Styracis rubri, vnc. unam. Ligni aloes boni, drach. duas. Ambaris, drach. unam. Caphura, ² scrupulum unum. Moschi, scrupulum dimidium. Cum stillatitio rosarum liquore singuntur pastilli.

ANNOTATIONES.

Delicata est compositio, & ad delitias suo odore maxime accommodata, suffitu, & vaporatone grata. Cor & cerebrum roborat, & imbecillum puerorum ventriculum. Dicta est alipta moschata forte, quod in vnguenta & emplastra ad odoris gratiam conciliandam veniat.

² Scrupulum unum. Ita quidem manuscriptus Græcus codex habet. Latini vero codices legunt, scrupulum unum & dimidium. Mihi Græci codicis lectio magis arridet, quod Caphura odor gravis admodum sit, & quod hic magis ut citius medicamentum ignem concipiat, indita esse videatur. Quare scrupuli vnus pondus sufficere potest.

Pastillus e rheobarbaro. Ioannis Damasceni. VII.

Adversus iecoris & lienis obstructionem, malum corporis habitum, & aquam inter cutem prodit. Ad frigidos & pituitosos, ac biliosos etiam iecoris affectus, & icterum utilis est. Recipie rheobarbari boni, drachmas decem. Succieupatorii, drach. quatuor. Amygdalarum amararum, drachm. duas, & dimidiam. Rosarum, drach. tres. Spica nardi, anisi, rubie, absinthij, asari, seminis apij, ana drach. unam. Cum stillatitio cassia liquore fermentur pastilli, pondere vnus aurei.

Pastillus ex absinthio. Eiusdem. IIX.

Ventriculi, iecoris & lienis obstructiones tollit, appetentiam excitat, diurnis febrib. succurrit. Ventriculum, iecur, & lienem roborat. Habet rosarum, absinthij, anisi, ana drach. duas. Rheobarbari, succieupatorii, asari, apij, amygdalarum amararum, spica nardi, mastiches, ¹ folij, ana drach. unam. Cum succo intybi satini latifolij singuntur pastilli.

ANNOTATIO.

¹ Pro eo succedanco vtendum, quod quale sit suo monstrauimus loco. Nardi igitur drachmæ duæ accipiantur.

Pastillus ¹ e spodio. Nicolai Myrepsici. IX.

Efficacissimus ad febres acutas ventriculi, & iecoris phlegmonē sitimq. vehementem. Capit spody, drach. quatuor. Rosarum rubearum, drachmas septem. Seminis portulacæ, succi glycyrrhizæ, ana drachmas duas. Cum ^{*}lento ²psyllij succo singuntur pastilli ponderis drachmæ vnus. Sunt qui addunt, seminum quatuor frigidorum maiorum, gummi Arabici, tragacantha, croci, ana drach. unam & dimidiam.

ANNOTATIONES.

¹ E spodio. Simpliciter nominatur, ut scilicet distinguatur a pastillo e spodio cum adiectione, Cum semine oxalidis, appellato, quem mox subiiciemus. Et hic, quod antea sæpe monuimus, Arabum spodium non intelligendum erit. Siquidem hoc ex harundinis radicibus vtilis constat, quod Auicenna scribit, ac erodendi facultatem habet, quapropter huic pastillo non inserendum: immo potius officinarum nostrarum, quod non est nisi ebur vstum, adstringendi facultate præditum. Qua de re lib. I. huius operis copiose diximus. Ceterum quum non solum Mesues, sed & Nicolaus hunc pastillum describat, ad illum auctorem potius quam Mesue filium referre volumus: melioris nimirum distinctionis gratia, ut scilicet præfens Nicolai, sequens Ioannis Damasceni inscriberetur.

² Psylli. Nicolaus habet, Lini.

Pastillus e spodio cum semine oxalidis. Ioannis Damasceni. X.

Adversus febres acutas & biliosas cum alui fluore valet: ventriculi & iecoris excalesfactionem, & sitim, quæ continenter excruciat, resinguit. Accipit rosarum rubearum, drach. duodecim.

¹ Spody, drachmas decem. Seminis oxalidis, drach. sex. Seminis portulacæ, seminis coriandri aceto macerati, & torrefacti, pulpa ^{*}rhois, ana drach. duas, & dimidiam. Amyli assi, balaustiorum, baccharum oxyacanthæ, ana drach. duas. Gummi Arabici assi, drach. unam, & dimidiam. Cum ^{*}omphacio formantur pastilli.

ANNOTATIO.

¹ Spodii. Spodium Arabum, ut sæpe antea monuimus, hic intelligendum non venit, neque Græcorum spodium e fornacibus zariis petiitum, interaneis nocentissimum: sed ebur potius vstum, ut dictum est.

Pastillus e Myrrha. Rha^zis. XI.

A Menses potenter admodum euocat, ita ut sc̄tum etiam excutiat. Vitis e retentis mensibus natu succurrit. Recipit myrrha, drach. tres. Lupinorum optime tritorum, drach. quinq. Folioru ruta, mentastri, pulegij, cumini, rubia, * succi Medici, sagapeni, opopanax, ana¹ drach. duas. Cum * Al^a foeti de.

ANNOTATIONES.

Descripti sunt ex Rhaze lib. 9. ad Mansore. Exhibetur ex seminis Iuniperi decocto, idq; efficacissime. 1 Drachmas duas.) In priore editione pro drach. duas, typographus magno errore reposuit uncias duas.

Pastillis ex absinthio. Nicolai Myrepsici. XII.

B Ad eos quibus venterculus refrigeratus est, iocinerosos, lienosos, & tumorem in iecore habentes, bonus. Habet absinthij sc̄niculi, anisi, rosarum, amygdalarum amararum, ana drach. tres. Asari, spica, floris iunci odorati, apij, ana drach. duas. Rhei barbari, succi eupatory, ana drach. unam. Trita cum succo intybi latifolij, redigantur in pastillos.

ANNOTATIO.

Quum pastillus ille ex absinthio descriptus a Nicolao, ei qui a filio Mesu^a refertur, praferendus videatur: ideo ut hic quoq; inter pastillos v^uratos suum obtineret locum, volui, ut si quis eo uti mallet quam Ioannis Damasceni, in promptu haberet compositionem.

Pastillus e lacha. Ioannis Damasceni. XIII.

C Ad obstructions iecoris, lienis, & inde natas febres vari^us diuturnas, & ascitem valet: item v^urinam mouet. Capit lacha mundata, succi glycyrrhiza, absinthij, oxyacanthae, succi eupatory, rhei barbari, aristolochiae longa, costi, asari, amygdalarum amararum, rubia, anisi, apij, iunci odorati, ana drach. unam. Cum stillatio eupatory liquore formantur pastilli ponderis drachmae unius.

ANNOTATIO.

1 Oxyacantha.) Berberim officinae non recte vocant. Est enim Oxyacantha diuersa a Berberi planta, v^utrilibi copiose ostendimus. Ingreditur autem hunc pastillum ut obstructions eximat, quandoquidem, Galeno teste, sit tenuium partium, & parum incidat. Habet vero facultatem etiam roborandi iecur. Nicolaus Myrepsus, qui itidem hos pastillos describit, aliam, & a praesenti nonnihil variantem habet, quam mox subiiciemus: ut si quis ea uti mallet, haberet in promptu compositionem.

Pastillus e lacha. Nicolai Myrepsici. XIV.

D Ad iocinerosos, lienosos & stomachicos. Accipit lacha qua tingunt fullones, rosarum, spody, absinthij sacchari, succi eupatory, ana drachmas tres. Rhei barbari, drach. 4. Floris iunci odorati, drach. duas. Trita cum succo sc̄niculi, aut intybi latifolij, digerantur in pastillos.

Pastillus e capparibus. Ioannis Damasceni. XV.

A Duersus lienis duritiem valet, & flatu in eo dissipat. Recipit corticum radice capparis, seminis agni, ana drach. sex. Seminis nigella, calamintha, acori, amygdalarum amararum, nasturij, hammoniaco, foliorum ruta, aristolochiae rotunda, succi eupatory, ana drach. duas. Cyperi, scolopendrij, ana drach. unam. Trita omnia, cum hammoniaco in aceto dissoluto excipiuntur, & in pastillos rediguntur.

ANNOTATIONES.

Huius pastilli compositio in medicamentario libro Valerii Cordi non est integra, ideoq; ad illius praescriptum confici non debet.

E 1 Scolopendrij.) Per Scolopendrium non linguam ceruinam, sed Ceterachium officinis appellatam, Scolopendrium. intelligit. Nam ad lienis obstructions tollendas, v^ulis admodum est haec herba.

Pastillus ex agarico. In erui auctoris. XVI.

P leuitate cerebro & capite elicit. Crassos quoq; humores & lentos e thorace educit. Habet agarici selecti, unc. tres. Salis fossis, quem gemma nominant, unc. unam. Cum serapio acido simpliciter fringuntur pastilli, & loco si. co reponuntur.

Agaricum Trochiscatum: Hoc est, in past. illi formam redactum. XVII.

C Apit agarici selecti, uncias quatuor. Redactum in puluerem cum vino, in quo Zingiber mace- ratum est, in pastillos digeritur. Efficax est ad purgandos crassos & lentos humores minori noxa ventriculi, quam si Agaricus solus propinetur. Agaricus enim quum leuitate sua, & permeationis tarditate ventriculum turbet, merito acria, ut est Zingiber, & penetrantia admittit, ad virium transitusq; per viscera obstructa celeritatem.

Pastillus e colocynthide. Ioannis Damasceni. XIX.

A Accipit pulpa colocynthidis alba & leuis, seminibusq; purgata, drach. decem. Forficib. incidan- tur, & fricentur cum olei rosacei, uncia una. Cum lento succo seu mucagine tragacantha,

gummi Arabici, bdellij, ana drach. sex, stillatio rosarum liquore dies quatuor maceratis, finguntur A
pastilli, & siccantur in umbra. Siccatur iterum minutissime teruntur, & cum ea in mucagine
rursus formantur pastilli, qui in usum reconduntur.

ANNOTATIONES.

Pastilli al-
handal.

1 *E colocynthide.*) Non est autem, nisi pastillus, qui officinis hodie barbaro, & ipsis incognito nomi-
 ne, Alhandal appellatur. Ingreditur Hiera Hermetis apud filium Mesuæ compositionem. Aliis quoq;
 iniicitur compositionibus. Vfus eius pastilli tum erit, ubi pituitam & humores alios crassos ac glutino-
 sos ex profundo corporis, & partibus longe distantibus, ut cerebro, nervis, musculis, articulis, pulmone,
 thorace euellere consilium est. Quare in cephalalgia, hemicrania contumaci, epilepsia, apoplexia, ver-
 tigine, asthma, ischiade, morbis articularum frigidis, item in acuendis clysteribus huius pastillum hunc
 ysurpare licebit. Hodie vsus eius maximus est in acuendis catapotis pro colocynthide non inepte, quod B
 salubrior sit quam ipsa Colocynthis, quæ per hos pastillos quandam veluti emendationem, & vitiorum
 correctionem accipit.

2 *Drachmas decem.*) In omnibus propemodum codicibus filii Mesuæ legitur drachmas decem. Sūt
 tamen qui mendosam esse hanc lectionem, putent, quod olei rosacei quantitas satis magna sit, cum de-
 cem drachmis collata. Sed parum firma hæc est ipsorum ratio, quod decem illæ drachmæ facile aliis, quæ
 adiiciuntur, & in quibus macerantur, in pastilli formam fingi possint. Accedit, quod decem vnciæ colo-
 cynthidis cum vna vncia olei rosacei vix; immo multo difficilius, quam decem drachmæ, in pastilli for-
 mam redigi queant, quicquid cucullati illi Monachi garriant. Deniq; haud satis tutum est, tantam colo-
 cynthidis copiam pastillo huic indere, de quo ultra scrupulum vnum per se assumi parum tutum est.

3 *Forficibus incidantur.*) Et tenuissime etiam terantur, ne asperæ eius partes interaneis adherentes ea
 exulcerent.

Pastillus¹ ramich. Ioannis Damasceni. XIX.

C

Ventriculum, cor, iecur, imbecilla firmat: & lubrica viscera ac intestina roborat ac constringit,
 cholera morbum reprimat, acrimoniam obtrundit, animum reddit tranquillum, omnem san-
 guinis eruptionem cohibet: quapropter sanguine e naribus profluente insufflando impellitur, alijsque
 medicamentis admiscetur. Recipit succi oxalidis, vncias sedecim. Rosarum vnciam unam. Bac-
 carum myrtis, vncias duas. Coquuntur parum, & colantur. His miscentur gallarum recentium ca-
 riosè tritarum, vncia tres. Coquuntur iterum. Deinde sequentia in puluerem trita insperguntur,
 nempe foliorum rosarum, vnc. una. Santali flauī, vnc. una, & drachma dua. Gummi Arabici,
 *Sumachi vnc. una, & dimidia. Carnium² rhois, & spody, ana drach. octo. Omphacij, drach. septem. Succī
 baccarum myrti multum tritarum, vncia quatuor. Ligni aloes, carjophyllorum, macis, nucis mo-
 schatæ, ana drach. quatuor. Miscentur omnia simul, & extenduntur in scutella lapidea, donec siccen-
 tur. Exsiccata teruntur in tenuissimum puluerem, & cum succo semperuiui, atq; stillatio rosarum D
 liquore formantur pastilli parui, & exsiccati in umbra reponuntur.

ANNOTATIONES.

Ramich. 1 *Ramich.*) Hanc vocem nonnulli interpretantur compositionem, ex adstringentibus paratam. Que
 quidem interpretatio huic compositioni, quæ ex eiusmodi rebus constat, bene quadrat. Alii Ramich ex
 Rumice Latina voce corruptam esse putant, quod scilicet largissimam oxalidem, quæ est Rumicis spe-
 cies recipiat. Vt pastillus Ramich non sit nisi is, qui ex Rumice oxalide constat. Mihi posterior sententia
 magis arridet, etsi temere de lingua mihi ignota nihil pronuntiem. Arabum enim inuentum est. Alii mi-
 xturam ex Gallis significare tradunt.

2 *Spodij.*) Hoc est, eboris ysti, ut iam sæpissime monuimus.

3 *Cum succo semperuiui.*) Filius Mesuæ habet Caphuræ. Verum quum calidam esse constet, pro ea
 succum Semperuiui substituiimus.

Pastillus ex¹ oxyacantha. Eiusdem. XX.

Ad calidam intemperiem prodest, alui fluorem, & iecoris dolorem. Habet baccarum oxyacantha,
 drach. duas. Spody, mastiches, ligni aloes, gallia moschata, spica, seminis oxalidis, ana drach.
 unam. Rosarum, drach. quinq. Gummi Arabici, drach. tres. Cum stillatio rosarum liquore sin-
 guntur pastilli.

ANNOTATIO.

1 *Oxyacantha.*) Per oxyacantham, quam Arabes Berberim vocant, non eam, quæ sic hodie officinis
 nominatur, intelligere oportet: Berberis enim officinarum ab oxyacantha diuersa est: sed eam, quam
 Dioscorides sub oxyacanthæ nomine pingit, cuius effigiem, & totam historiam tomo altero nostrorum E
 de Styrpium historia commentariorum dedimus.

Pastillus ex oxyacantha. Nicolai Myrepsici. XXI.

Ad iecoris calorem, immodicam sitim, lingua ariditatem, & febres ardentes. Capit baccarum
 oxyacantha, spody, succi glycyrrhizæ, seminis portulacæ, ana drach. tres. Rosarum, drachm. sex.
 Spica,

A ¹ *Spica amyli, tragacantha, ana drach. unam. Seminis citruli, drach. unam, & dimidiam. Seminis portulacæ, drach. dimid.* Cum aqua vel stillatio rosarum liquore formantur pastilli.

ANNOTATIONES.

Hoc pastillo e Berberis Mauritanorum, hoc est, oxyacantha Ægyptia, Nicolao interprete, nonnulli videntur crebrius, quam superiore. Et describitur etiam a Ioanne Damasceno, sed nonnihil variatis ponderibus, & adiecto croco. Debent autem Pharmacopœi vsurpare ad huius medicamenti compositionem baccas veræ oxyacanthæ.

¹ *Spica.*) Post spicam filius Mesuæ crocum, cuius nulla fit in Nicolai manuscripto codice mentio, subiicit.

² *Drachmam unam, & dimidiam.*) Ioannes Damascenus habet drach. tres, & dimidiam. Parum autem refert, vtrum ex iis pondus arripas: quia alterum validiorem reddit pastillum, alterum minus validum.

B ³ *Seminis portulacæ.*) Nicolaus, & filius Mesuæ, habent Caphuræ. Nam Arabum, Caphuram refrigerare putantium, opinionem amplectitur Nicolaus. Quare pro ea semen portulacæ substituimus, licebit etiam vsurpare pro Caphura semperuii succum.

Pastillus ex ¹ *Halicacabo. Ioannis Mesuæ. XXII.*

C *Contra renum & vesicæ exulcerationem, & natam inde urinæ difficultatem: mictumq. sanguinis pollet. Accipit baccarum halicacabi, drach. tres. Seminis citruli, melonis, cucurbitæ, ana drach. tres, & dimidiam. Boli Armenij, gummi Arabici, thuris sanguinis draconis, papaveris albi, amygdalarum amararum, succi glycyrrhizæ, tragacantha, amyli, nucleorum pinearum, ana drach. sex. Seminis apij succini, terra lemnia, hyoscyami, opij, ana drach. duas. Cum succo halicacabi finguntur pastilli.*

ANNOTATIONES.

¹ Hic pastillus non solum ex Halicacabo, vel, vt corrupta voce, Alcachengi hodie nominant: sed etiam *ἄλκαχιστον*, id est, E vesicariæ, appellatur. Vsu tritissimus ad urinæ ardorem exulcerata vrinaria Alchachifistula, vesica, renibus, & vteribus. Pluribus namq. diebus ex aqua multa, zulapio rosato, aut vino austero sumti vlcera detergent, glutinant, & cicatrice tegunt, urinæ acrimoniam mitigant, eiusq. strigmenta mucosa, aspera & dolorifica complanant, & leniunt.

² *Melonis.*) In Ioannis Damasceni codicibus legitur, Albatecha. Qua quidem voce non intelligit Melonem magnum, viridem, subnigrum & Indum, vt omnes fere interpretantur: sed communem potius, vt ex Serapione & Auicenna satis liquet, qui Batechæ, quæ eadem est Albatechæ, eadem tribuunt, quæ Dioscorides Meloni. Imo Batecham Serapio interpretatur Melonem.

³ *Terra lemnia.*) In Mesuæ filij codice est, Boli simpliciter. Interpretantur autem omnes rubricam Sinopicam, vt quæ Medicis magis in vsu sit. Verum quum hodie ad nos non afferatur, pro ea substitui-
mus terram Lemniam, quam sigillatam hodie vocant, quæ non est nisi bolus officinarum.

⁴ *Opij.*) Paratur etiam hic pastillus sine opio. Quapropter oportet Medicos in vsu huius pastilli dis-
serte in suis formulis exprimere, num pastillum hunc cum opio, vel sine opio medicamenti permiscen-
dum velint.

Pastillus e ¹ *succino. Eiusdem. XXIII.*

A *Vxiliatur sanguinem excreantibus, tabidis, purulenta exspuentibus, cæliacis, & dysentericis: in summa, sanguinem undecunq. emanantem sistit, ac supprimit. Recipit succini, aur. sex. Cornu cerui viti, gummi arabici assi, corallij rubri viti, tragacantha, acacia, hypocyttidis, balaustrorum, mastiches, lichæ, papaveris nigri assi, ana aur. duos. Thuris, croci, opij, ana aur. unam, & dimidium. Cum lento psyllij succo formantur pastilli.*

ANNOTATIONES.

¹ *E succino.*) Officinæ e Charabe Pastillum hunc nominant.

² *Gummi Arabici.*) In nonnullis codicibus desideratur: tamen quum ad spissandum & refrigerandū sit aptum, non video quomodo omitti possit, aut debeat.

³ *Hypocyttidis.*) Quum in codice filij Mesuæ sit Hensistidis, quidam succum Cisthi foliorum inaudiendum esse putant. Sed nihil refert succum foliorum, aut eius quod instar fungi est, germinis, quod hypocyttis vocatur, accipiamus, propterea quod eiusdem sint facultatis. Hensistidis autem esse vocem deprauatam ex hypocyttidis, omnibus notum est, & id ipsum paulo post pluribus ostendemus.

Pastillus e ¹ *Lemnio Sigillo. Ioannis Damasceni. XXIV.*

F *Cruentæ spuentibus, & omni sanguinis profluus succurrit, vt præcedens. Habet sanguinis draconis, gummi Arabici costi, pastillorum Rānich, rosarum rubrarum, seminis rosarum, amyli assij, spodij, acacia, hypocyttidis, lapidis hamatidis, succi foliorum Cisthi, balaustrorum, boli armenij, terra lemnia, Seminis canabis, corallij succini, ana drachmas duas. Margaritarum, tragacantha, papaveris nigri, ana drachmam unam, & dimidiam. Seminis portulacæ costi, cornu cerui viti, thuris, nucum cupressi, croci, ana drach. duas. Cum stillatio o plantaginis liquore finguntur pastilli.*

* mucagi-
ne.

E charabe

* Terra si-
gillata.

ANNOTATIONES.

A

1 *Succi foliorum Cisthi.*) In codice Ioannis Damasceni legitur Henfistides. Nemo autem est qui hanc vocem non esse corruptam videt, & e dictione Cisthi deriuatam. Non significare autem nisi succum foliorum Cisthi, in primis Auicenna testatur, qui lib. 2. cap. 334. ita scriptum reliquit. Henfistides est succus plantæ quæ dicitur Barba Hircina. Quid vero sit Barba Hircina indicat Serapio cap. 115. sui libri de simplicibus inscripti. Nam sub hoc nomine Dioscoridis Cisthum describit, ut ex collatione utriusque loci luce meridiana clarius sit. Diuerfas igitur res hypocystidis & Henfistidis nominibus intelligit Ioannes Damascenus. Hoc succum, ut diximus, foliorum Cisti: illo autem id quod iuxta Cisti radices nascitur. Merito autem succus foliorum Cisti huius pastilli compositionem ingreditur, ut cui insignis sit adstringendi, Dioscoride teste, facultas.

2 *Seminis canabis.*) In Damasceni codice est Sedenege, quæ sane dictio Mauritanis, Serapione ca. 207. auctore, Canabim denotat. Ingreditur autem hunc Pastillum propter immensam suam exsiccandi facultatem. Nec metuendus eius calor erit, quod is a tot frigidis medicamentis non nihil frangatur. Ceterum ut id quoque adiciam, liberale ex naribus sanguinis profluvium sistunt cum succo polygoni, plantaginis, & ouorum candido fronti & temporibus illiti.

Pastillus¹ ex portulaca. Eiusdem. XXV.

Febribus ardentibus, feruoribus sanguinis & flaua bilis, ventriculi denique, & iecoris intemperiei calida, & hectica confert. Capiti rosarum, vnc. dimidiam. Spodij, glycyrrhizæ, ana drach. duas. Seminum cucurbitæ, citri: l. cucumeris, & melonum, tragacanthæ, croci, gummi Arabici, spicæ nardi, ana drach. vnam. Santali flauo, drach. duas, & dimidiam.² Ligni aloes, cardamomi, amyli, seminis portulacæ, ana scrup. duos. Sacchari albißimi, mannæ, ana drach. tres. Cum li. nro psyllij succo finguntur pastilli.

ANNOTATIONES.

C

Inscriptio 1 *Ex Portulacæ.*) Non hæc est eius pastilli inscriptio. Nam apud filium Mesuæ dicitur pastillus e Caphura. Quum vero Caphura, vel ut hodie loquuntur, Camphora nostra, quod inter Arabes Auerroes vnus testatur (quum ceteri omnes, quanquam falso, frigidam esse affirmant) abunde calida sit, huic pastillo qui ardentibus febribus maxime conuenire debet, parum recte iaseritur. Quapropter nos, ut alias semper, & hic pro Caphura, semen portulacæ, vel semperuiui succum, substituimus.

2 *Ligni aloes, &c.*) Neque lignum aloes, neque spica nardi, maxime autem cardamomum, quod impense calidum est, huic pastillo recte inditum esse videtur. Sed Mesuæ filius haud dubie hanc compositionem ex Auicenna mutuatus est, qui Canone quinto, ubi quinque Pastillorum e Caphura descriptiones refert, vnam habet, nempe primam, quæ huic per omnia respondet: nisi quod pro seminibus citruli, cucumeris, & melonum, semen maluæ & portulacæ substituit. Secutus est igitur hic, ut alibi sæpe, Ioannes Damascenus errorem Auicennæ, e quo fere omnia sua ad verbum transcripsit. Atqui nihil mirum, Auicennam interdum calida medicamenta Caphuræ copulasse, quum hanc ipsam iam calidam, (quanquam recte, aut insciēter) appellet & innuat. Nam loco iam citato tria Electuaria de Caphura recenset, ad concoctionem ventriculi & iecoris roborandam, & pituitam crassam incidendam, ac flatu discutiendos vtilia. Vnde omnibus perspicuum euadit, eum Caphuram non ut frigido, sed potius ut calido medicamento usum esse. Quomodo enim frigidum medicamentum pituitam crassam extenuaret, aut flatu discuteret? Et ut calido usum esse illic Auicennam medicamento Caphura, abunde testantur medicamenta quæ ei coniunxit: quæ Santalis exceptis, omnia sunt calida. Quin etiam Canone secundo, ubi ex professo de viridibus Caphuræ tractat hanc parare vigilias, memoriæ prodidit. Si vigilias excitat, quo pacto frigida esse possit non video. Quæ commemoranda nobis hoc loco esse duxi, ut illorum impudentiam retunderemus: qui ne hodie quidem desinunt vociferari, sine Arabum commentariis neminem facere Medicinam posse. Sed ut ad institutum redeam, quum hæc Mesuæ filii compositio mihi parum arrideat, statui aliam hac meliorem subiicere, quæ est Nicolai: ut posthabita priore, Pharmacopœi sequentem deinceps in suis officinis paratam habeant.

Pastillus¹ e nymphaea. Nicolai Myreplici. XXVI.

Ad calorem iecoris confert. Accipit rosarum, gummi Arabici, tragacanthæ, spodij, ana vnc. dimidiam. Seminum quatuor frigidorum maiorum, seminis portulacæ, glycyrrhizæ, ana vnc. vnam. Croci, drach. duas. Amyli, drach. tres.² Semperuiui succi, drach. dimid. Trita cum succo psyllij digeruntur in pastillos.

ANNOTATIONES.

1 *E Nymphaea.*) Et huius pastilli, propter causam supra expositam, immutauimus inscriptionem. Nam Nicolao e Caphura nominatur, ut qui hac in parte Mauritanorum, Caphuram frigidam esse putantium, sequi errorem voluit.

2 *Succi semperuiui.*) Nicolaus Caphuræ habet, pro qua nos succum semperuiui substituimus, non certe temere; quod Caphura calefaciendi, haud refrigerandi facultatem habeat, ut alibi copiose ostendimus. Auicennam, qui loco paulo ante indicato, in tertii pastilli de Caphura descriptione, utriusque etiam Nymphaeæ seu Nenufaris florum meminit.

A *Pastillus e violis. Nicolai Alexandrini. XXVII.*

E *Xcalefactiones mitigat, aluumq; emollit. Recipit florum violarum recentium, drach. quindecim. Amyli, drach. nouem. Seminis papaueris albi, drach. septem. Rheibarbari, drach. quinque. Seminis plantaginis, drach. tres. Balsami, 3. unam. Cum stillatitio rosarum liquore singantur pastilli.*

Pastillus e violis. Nicolai Myrepsici. XXIX.

H *Abet florum violarum recentium, drach. quinq;. Amyli, drach. tres. Seminis papaueris albi, drach. duas. scrup. unum. Rheibarbari, 2. scrupulos quinq;. Seminis plantaginis minoris, drach. unam. Balsami, scrup. unum. Trita cum stillatitio rosarum liquore, digeruntur in pastillos.*

ANNOTATIONES.

1 *E Violis.) Nicolai codex Græcus, vt Latinus etiam, corrupte admodum legit: ὁ δὲ ἄλλος, pro ὁ δὲ ἄλλος. hoc est, e violis. Atq; ita quoq; legitur in Latino codice, qui Ingolstadtii est editus. Et quum hunc pastillum ingredientur violæ (quomodo enim alias ab illis denominaretur) liquet primo, compositionem hanc in manuscripto codice, quo nos vti sumus, mutilam esse. Nulla enim in ea fit violarum mentio. Desunt igitur violæ, & amyli. Dein palam est, accipiendas esse violas Martias (nam illæ a Græcis ita vocantur) noni albas, quæ iisdem λευκοίαι, & nostris Cheiri nominantur, vt putat Cordus & eum secutus Rondeletius. Si enim de iis locutus fuisset Nicolaus, non δὲ ἄλλος sed ὁ δὲ λευκοίαι inscripsisset hunc pastillum. Ardore inter nos mitigant, aluumq; emolliunt, gutturis asperitates leniunt. Vt & hinc palam fiat, violas Martias, vt pote refrigerantes, magis esse huic compositioni indendas.*

Cordus
errat.

2 *Scrupulos quinq;.) Errat igitur Cordus, qui contra fidem omnium codicum, habet in suo medicamento libro, scrupulum vnum.*

Cordi et
rarum.

Pastillus e rosis. Nicolai Myrepsici. XXIX.

C *Adit rosarum viridum, drach. tres. Spodij, drachmas duas. Santali rubri, drach. unam & dimid. grana septem. Santali albi, drach. unam, grana 12. Croci, 3. 2. grana 20. 2. Seminis plantaginis, scrup. dimid. Trita cum stillatitio rosarum liquore digeruntur in pastillos.*

ANNOTATIONES.

1 *E rosis.) Officinæ Græcæ appellatione Diarhodoni magis vtuntur. Non fuit autem a nobis hic pastillus temere pretereundus, quod multas magnas vocatas Nicolai confectiones ingrediatur. Confert etiam dysentericis, celiacis, iocinerosis, & stomachicis. Pondera nonnihil ab aliorum descriptionibus variant. sunt enim legitima, & e Græco codice descripta.*

Pastillus
diarhod.

2 *Seminis plantaginis.) Caphura, habet Nicolaus. Mutationis causam iam antea sæpe indicauimus. Liceret etiam pro Caphura vsurpare succum semperuiui.*

Pastille e rosis. Rhafis. XXX.

D **A** *D ventriculi dolores valent, concoctionem inuant febribus diuturnis, aquæ inter cutem incipienti succurrunt. Accipiunt rosarum, vnc. dimidiam. Ligni aloes, drach. duas. Mastiches, drach. unam, & dimidiam. Absinthij Pontici, cinamomi, spicæ nardi, casie lignea, florum iunci odorati, ana drachmam unam. Cum vino veteri formantur pastilli.*

Pastillus Bechius Albus: Incerti auctoris. XXXI.

A *Vxiliatur tussientibus, & difficulter spirantibus, fauciumq; asperitatem lenit. Recipit sacchari albissimi, lib. unam. Sacchari candefacti optimi, sacchari penidij, ana vnc. quatuor. Radicis iridis Florentinae, vnciam unam, drachmas septem. Amyli, vnc. duas, & dimidiam. Cum succo lento tragacanthæ in stillatitio rosarum liquore macerata singuntur pastilli parui, & signantur.*

ANNOTATIO.

E **1** *Bechius albus.) Non sonat, nisi tussicularis albus. Ita enim Græcè appellatur, quod ad tussim efficax sit. Officinæ pectoralem nominant. Sunt qui hunc aliter componant, hoc scilicet modo. Recipiunt Sacchari albissimi, sacchari candi, ana lib. dimidiam. Amyli, vncias duas. Cum succis lentis, seu mucaginibus gummi Arabici, & tragacanthæ, in stillatitio rosarum liquore maceratorum formantur pastilli.*

Bechius.
Pectoralis
pastillus.
Alia com-
positio.

Pastillus Bechius niger. XXXII.

A *Bfissam vocem recuperat, tussis sicca succurrit, asperitatem faucium lenit, & excreationem spuita accelerat. Habet succi glycyrrhizæ, vncias quatuor. Syracis calamitis, vnc. unam, & dimidiam. Sacchari candefacti, vnc. duas, & dimidiam. Specierum diatridis Salomonis, specierum * eclegmaticis sani & experti, ana vnc. dimidiam. Sacchari penidij, lib. dimidiam. Sacchari albissimi, lib. 2. 3. Cum mucagine tragacanthæ in stillatitio hyssopi liquore macerata singuntur pastilli, & signantur.*

* Lohoc.

Pastillus pro lauando Capite. XXXIII.

C *Apit saluia, rosmarini, maiorana, lauendula, betonica, ana drach. dimid. Stichadis Arabica, asari, caryophyllorum, spicæ nardi, nucis moschata, foliorum lauri, meliloti, ana drachm. unam. Ligni aloes, scrupulos duos. Mastiches, thuris, gummi iuniperi, ana drachm. unam. Aiptemo-schata, galliæ moschata, ana drach. unam, & dimidiam. Rosarum rubearum, chamameli, origa-*

ni. foliorum sene, anapugillum unum. Saponis, lib. unam. Formantur pastilli ponderis drachma-
rum duarum.

Pastillus suffumigabilis. Noster. XXXIV.

Accipit ladani parvissimi, styracis calamita, myrrha, mastiches, thuris, ana unciam unam. Rosa-
rum rubearum, cinamomi, caryophyllorum, macis, nucis moschata, ana drach. duas. * Thymia-
matis, vnc. duas. Maiorana, rosmarini, spica nardi, ana drach. unam. Ase dulcis, vnc. d. mid. San-
tali rubei, & citrini, ana drach. duas. Corticis citrij, drach. unam. Foliorum lauri drach. unam, &
dimidiam. Seminis nigella, oeymi, ana drach. dimidiam. Carbonum tilia, vnc. quatuor. Cum stilla-
tizio rosarum liquore, & mucagine tragacantha formantur pastilli, vel candela.

Candela suffumigabilis. XXXV.

Recipit styracis calamita, vnc. quatuor. Ladani, vnc. tres. Thuris mastiches, myrrha, ana vnc. B
dimidiam. Cinamomi, caryophyllorum, macis, nucis moschata, ana drach. duas. Santali albi, &
flui, ana drach. duas, & dimidiam. Ase dulcis, drachmas tres. Thymiamatis, vnc. duas, & dimi-
diam. Eigni aloës, drach. unam, & dimidiam. Carbonum tilia, vnc. quatuor. Styracis liquidi, vnc.
duas. Terebinthina lota, & liquoris stillatitij rosarum quadrantem dimidiam, finguntur candela.

DE * COLLYRIIS, SECTIO XIV.

Collyrium aridum album. Rhazis. I.

Glutinandi facultatem habet. Caput cerussa lota, drach. sex. Sarcocolle in lacte muliebri mate-
rata, drach. duas. Tragacantha, drach. tres. Opy, scrupulum unum. Cum albumine oui fiant
collyria arida, vel Sieff.

Collyrium aridum rubrum. Eiusdem. II.

Idem quod precedens potest. Accipit lapidis hamatidis, cerussa lota, ana drach. tres. Aeris vsti,
drach. duas. Myrrha, croci, ana drach. unam. Cum vino veteri formantur Sieff.

Collyrium aridum viride. Eiusdem. III.

Erodendi vim obtinet. Recipit floris eris, drachmas tres. Atramenti suori vsti, drach. sex.
Arsenici rubei, nitri, spuma maris, ana drach. unam. Salis ammoniaci, drachmam d. midiam.
Ammoniaci, drachmas duas. Cum succo ruta finguntur Sieff.

Collyrium aridum e plumbo. Eiusdem. IV.

Glutinandi vim obtinet. Habet plumbi vsti, stibij, thuris lota, eris vsti, gummi Arabici tra-
gacantha, ana drachmas octo. Opy, drachmam dimidiam. Trita cum aqua pluuiali redigan-
tur in formam Sieff.

Collyrium aridum e thure. Eiusdem. V.

Idem quod precedens potest. Caput thuris, drachmas decem. Ammoniaci, sarcocolle, ana drachmas
quinque. Croci, drachmas duas. Cum mucagine sanigraci formantur Sieff.

Collyrium aridum e Myrrha. Incerti auctoris. VI.

Ad tenuissimas & acres fluxiones, & eas quae sunt cum exulceratione, valet. Accipit myrrha,
tyrij, ana drach. duas. Cadmia lota, drach. tres. Terra lemnia, lapidis hamatidis, gummi A-
rabici, ana drach. unam. Opy, drach. dimidiam. Aloes bone, drach. unam, & dimidiam. Cum
vino veteri odorato adstringente finguntur Sieff.

Collyrium cygnus albus. Nicolai Myreplici. VII.

Ad incipientes lippitudines, defluxionem acrem, astus, vlcera caua & sordida, pustulasq. con-
fert. Recipit pompholygis lota, 3. dimid. Cadmia vsta, & lota, drach. duas, & dimid. Ceruss-
sa, drach. quinque. Samij asteris, drach. dimid. grana septem. Opy, grana 15. Amyli, drach. duas, &
dimid. Acaciae, drach. dimid. Tragacantha, drach. unam. Gummi, drach. duas, & dimid. Trita
cum aqua pluuiali, digeruntur in collyria arida, seu Sieff.

ANNOTATIONES.

Cygnus.

1 Cygnus. Hoc collyrium praeter ceteris e Nicolao referre volumus, quod veteribus fuerit vstitutissimum.
Et posset hodie paratum in officinis haberi.

Pompho-
lyx

2 Pompholygis. Sic veteres, quod Arabes Thutiam appellant, nominare consueverunt, hodie Nil
album officinae vocant: ut lib. 1. copiose diximus. Thutia vero officinarum, est Cadmia botryites.

Thutia
officinae

3 Cadmia. Lapide calaminari vocato, pro ea hodie vitumur: aut thutia officinarum.

Cadmia.

4 Samii asteris. Samiam terram alij nuncupant. Quum hodie non afferatur, pro ea Lemnia seu sigil-
lata vitumur terra.

Samius a-
ster

5 Sieff. Sic barbari vocant Collyria arida, quae Graecis ἐνεσθον, veta peculiari voce appellantur. Ac-
cipiunt autem haec pyramidis fere formam, & in nonnullis officinis hac forma parata prostant. Ceterum
aridorum collyriorum sylvia est apud Aetium & Nicolaum. Iam vnam & item alteram liquidorum colly-
riorum formulam prodacemus.

Sieff

Colly-

Collyrium liquidum e pompholyge. Incerti auctoris IIX.

Visum acuit. Habet stillatitij liquorum eufrafie, rosarum, chelidony, fœniculi, ana vnc. vnam. Pompholygis lotæ, drach. tres, & dimidiam. Aloes, drach. vnam, & dimidiam. Sacchari candi, drach. duas. Cadmia lotæ, drach. vnam. Commistis omnibus fiat collyrium liquidum.

Collyrium liquidum e cadmia. Incerti auctoris. IX.

Glutinandi vim habet. Caput cadmiæ lotæ, drach. duas. Pompholygis præparatæ, drach. vnam. Cerussæ, drach. vnam & dimidiam. Sarcocolla in lacte muliebri macerata, fragacanthæ, ana drach. dimidiam. Gummi Arabici, scrup. vnum. Stillatitij liquoris rosarum, 3. vnam, & dimid. Stillatitij liquoris fœniculi, eufrafie, chelidony, ana vnciam vnam. Miscentur, & fit collyrium.

DE *PILIS ODORATIS/ SECTIO XIV.

Pila odorata æstiva. Nostra. I.

Accipit florum nymphææ, violarum, rosarum, borraginis, ana drach. duas. Spodij de canna, drach. vnam, & dimidiam. Corticum citrij, drach. duas. Santali albi & rubei, ana drachm. vnam. Croci, scrup. dimidium. Macis, nucis moschatæ, maioranæ, ligni aloes, cubebæ, mastiches, ocymi caryophyllati, ana drach. dimidiam. Succini, styracis calamitæ, ana drach. vnam. Gallie moschatæ, drach. dimidiam. Ambaris, scrup. vnum. Moschi, scrup. dimidium. Ladani depurati, vncias duas. Cum stillatitio rosarum liquore fingantur pila iustæ magnitudinis.

Pila odorata hyemalis. Nostra. II.

Recipit styracis calamitæ, vnciam dimidiam. Ligni aloes, caryophyllorum, cinamomi, cardamomi, ana drach. vnam. Macis, nucis moschatæ, zedoariæ, nigellæ, ana drach. vnam, & dimidiâ. **C**ocymi, maioranæ, ana drach. dimidiam. Asæ dulcis, drach. duas. Aiptæ moschatæ, drach. duas, & dimidiam. Melissophylli, drachmas duas. Ladani, vnciam dimidiam. Ambra, scrupulum vnum. Cum stillatitio menthæ liquore fingantur pila odorata.

Pila odorata alia. Nostra. III.

Habet styracis calamitæ, drach. tres. Ladani purissimi, vnc. dimidiam. Caryophyllorum, cinamomi, ana drach. duas. Ligni aloes, nucis moschatæ, macis, ana scrup. duos. Rosarum rubearum, lauandulæ, ana drach. vnam. Gallie moschatæ, drach. vnam, & dimidiam. Maioranæ, melissophylli, ana drach. vnam. Ambaris, scrup. vnum. Moschi, scrup. dimidium. Teruntur omnia, & cum stillatitio rosarum liquore formantur pila.

Liquor Moschatus Odoratus. IV.

DCapi stillatitij liquoris rosarum, vnc. tres. Stillatitij liquoris nymphææ, vnc. vnam. Stillatitij liquoris borraginis, vnc. dimidiam. Cinamomi, caryophyllorum, ana scrup. dimidium. Ambaris, granum vnum. Moschi, granum dimidium. Succiperuiui, scrupulum dimidium. Santali flauo, grana sex. Miscentur.

DE OLEIS, SECTIO XV.

Oleum rosaceum. I.

Refrigerat & adstringit, adeoq. repellit. phlegmonibus præsidio est, astuantem ventriculum restinguit, erosiones intestinorum clysteribus inditum, & dentium dolores, si eo colluantur, sanat. Fit hoc modo. Folia rosarum rubearum, nondum penitus explicatarum, forpice¹ incisa, & contusa, quantitate sufficienti in vitreum vas conijciuntur: & affunditur olei omphacij, hoc est, ex olivis immaturis expressi, quod satis est: & vase obturato, illic macerantur ad solem, aut in loco aliquo calido, diebus³ quindecim. Dein in⁴ duplici vase⁵ tribus horis coquuntur. Expressis folijs & abiectis, noua inijciuntur, & iterum quindecim diebus macerantur & insolantur: postea ut prius, coquuntur, & exprimuntur. Tertio idem fit, & tandem excolatur.

ANNOTATIONES.

Is modus hodie vsitatus est, & nihil fere abest ab eo, quem secundo loco Dioscorides, item Paulus, Nicolaus, & Actuarius recensent.

¹ Incisa & contusa) Sunt tamen qui forpicebus tantum incidunt, alii duntaxat tundunt.

² Quantitate sufficienti) Paulus vncias tres rosarum rubearum exunguatarum, sextario olei omphacini immittit. Nicolaus eandem vsurpat mensuram. Sunt qui vnc. 4. accipiant violarum, & lib. 2. olei.

F³ Quindecim) Actuarius & alii, quadraginta dies insolant, Nicolaus triginta. Filius Mesuz septem dies. Nos mediam rationem sequi maluimus. Ceterum sunt etiam qui non insolant, sed vnam in puteum demittunt, ut ex frigore eius odoris gratia, & virium efficacitas conseruetur. Alii sub terra defodiunt totidem diebus. Nostra ratio componendi veteribus magis accedit.

⁴ Duplici vase) Ut scilicet alterum alteri incumbat. Verbi gratia: vas vitreum, cui rosæ & oleum iniectæ sunt, vasi alteri aquam calentem continenti insideat & incumbat, ne videlicet ignis aut aquæ contactu, & missione oleum vitetur.

* Poma
ambres bar
bari vocat

5. Tribus horis.) Hodie minus diu coquunt, ideoq; minus etiam efficax oleum efficiunt. Tempus A nobis expressum filius Mesuz constituit.

Oleum violaceum. II.

R Efrigerat calidam intemperiem, ob id phlegmones omnes remittit: ac inde pleuriticis iuuat, asperitatem arteria, pulmonis & thoracis lenit. Tabidis, consumtis & heclicis presenti remedio est inuncto thorace. Iecoris & renum immodicum calorem compefcit. Fit e floribus violarum nigrarum, & oleo rudi, id est, omphacino, ut rosaceum.

*Nenufa-
ria.

Oleum *nymphaeatum. III.

I Dem fere quod violaceum potest, magis tamen refrigerat, adeo ut somnum etiam conciliet. Capitis dolores ex februm incendio natos mitigat, urinae ardori confert. Veneris insomnia arceat. Fit e floribus Nymphaeae albae, & omphacino, ut praecedentia.

*Cydonio-
rum.

Oleum *Melinum. Ioannis Damasceni. IV.

R Efrigerat & adstringit: ideo ventriculi, & iecoris imbecillitatibus, ventrisq; fluxionibus, lienteria nimirum, diarrhaea, ac dysenteria, accommodatum est. Sudorem item plus iusto emanantem cohibet. Fit hoc modo. Caro cydoniorum *pramaturorum¹ cum cortice tritorum, abiectione² gra-
tis, ³sufficienti quantitate, & succus eorum aequali portione in olei omphacini modo sufficienti, in vase vitreo bene obturato diebus quindecim insolatur. Dein horis 4. in ⁴vase duplici coquitur: post hac abijciuntur cydonia, & recentia immittuntur, & rursus insolanur, & coquuntur. Deinde tercio recentia injiciuntur, & ut praedictum est, insolantur, & coquuntur. Tandem in vase diligenter obturato, ne exspires, reconditur oleum.

* id est, nō
perfecte
maturorum.

ANNOTATIONES.

Pauci, aut fere nulli sunt, qui oleum hoc ea diligentia parant: ideoque nihil mirandum, si quae illi tribuuntur, non efficiat. Quapropter curent deinceps Pharmacopoei, ut ad eum struant modum.

1. (Cum cortice.) Quod, Nicolao attestante, in eo sit odor, & adstrictio.

Sextarius
Italicus.

2. Sufficienti quantitate.) Paulus & Nicolaus Cydoniorum vncias tres, olei omphacini sextarium Italicum, id est, vnc. viginti mensurales esse volunt, id est, lib. vnam & dimidiam, & vncias duas.

3. Duplici vase.) Ne vires cydoniorum empyreuma vitiet.

Oleum myrtinum. Nicolai Myrepsici. V.

R Efrigerat & adstringit, ideoq; celiacis affectibus utile. Sanat igne ambuga, pustulas erumpentes illitu emendat. Attritus hyeme concitatos, & intertrigines illitum corrigit. Sedis rimas, condylomata, laxatos artus persanat, & sudores coarctet. Fit ex folijs myrti¹ viridibus, & ²oleo omphacino, & ³vino odorato adstringente: quae omnia coquuntur ad lentas prunas ad vini consumptionem, dein per colum trajiciuntur, & oleum purum in vas vitreum reponitur.

ANNOTATIONES.

Foliorum
myrti quā-
ritas.
Olei om-
phacini.
Vini odo-
rati.
Alius pa-
randi mo-
dus.

1. Viridibus.) Quum apud nos viridia myrti folia haberi nequeant, ideo arida vino veteri odorato sunt aspergenda, & postea tundenda. Quae autem foliorum esse debeat quantitas, Nicolaus itidem indicat, nempe vnc. duz. Aciarius vnciam ynam accipiendam esse docet.

2. Oleo omphacino.) Cuius quantitas & mensura, vtriusq; iam nominatis auctoribus sit sextarius Italicus, hoc est, vnc. viginti.

3. Vino odorato.) Cuius mensura, Nicolao teste, sit sextarii Italici quarta pars, id est, vnc. quinq;. Alii sic parant. Recipit Foliorum myrti viridium, lib. vnam. Olei omphacii, lib. tres. Vini odorati adstringentis, lib. duas. Coquuntur vsq; ad vini consumptionem, dein colo traicitur, & reconditur. Prior ratio veterum est, ideoq; praefenda: Ceterum codices filii Mesuz, quomodo hoc oleum confici debeat, non exprimunt: idq; non sine magna confusione, quandoquidem in sequentibus oleis non raro legatur, fiat quemadmodum oleum myrtinum.

Oleum e¹ myrti baccis. VI.

I Dem quod praecedens potest. Fit e viridibus recentibusve baccis, & oleo omphacino, ut rosaceum.

ANNOTATIO.

Oleum
Myrti
vini

1. E. Myrti baccis.) Omnes fere Pharmacopoei hoc modo hodie parant oleum illud, ac Myrtillorum nominant. Discernendum igitur ipsum a Myrtino erit, utpote quod non e baccis, quas illi Myrtillos, sed e folijs fiat. Et qui ex vtriusq; parant oleum, Plinii auctoritate ac testimonio, quod faciunt confirmare possunt, qui libro 15. cap. 7. & ex folijs, & ex baccis Myrti oleum fieri, scriptum reliquit. Porro quum recentes baccas non habeamus, vino odorato adstringente conspergi possunt. Aut in earum inopia, baccas sylvestrium & nostratum Myrtorum vsurpare licet.

Oleum papaverinum. Ioannis Damasceni. VII.

I Ntemperiem calidam sanat, & inde natum dolorem: somnum quoq; conciliat. Fit bisariam. Vno modo ex semine vtriusq; papaveris, tam albi quam nigri, ut¹ sesaminum, de quo infra. Alio modo ex floribus, capitibus, & folijs vtriusq; papaveris, ut violaceum.

ANNOTATIONES.

Oleum e
sem ne pa-
paveris.

1. Vi sesaminum.) Semen enim papaveris ab excrementis purgatum, aqua parum salsa irrigatur, & manibus

Anibus fricatur, iterumque irrigatur, donec madescat. Postea expassum siccatur, modice assatur, sacco impositum multum diuque fricando excorticatur, corticibusque purgatur: mollitur in farinam, oleumque exprimitur. Discriminis gratia, oleum e semine papaueris vocetur.

2 *Alio modo*) Qui priore est v'sitatio. Oleum e floribus papaueris inscribatur.

Oleum hyoscyaminum. VIII.

Oleum e
floribus
papaueris

Idem quod papauerinum potest, & ad aurium dolores, efficax est. In pessis ad emolliendum vitibus. Exprimitur ex hyoscyami semine, albo, recente vel succo, calida aqua asperso, insolato, trito, eodem quo ex papauere modo.

Oleum mandragora, Nicolai Myrepsici. IX.

Phenitico, febricitantibus, & vigilantibus confert. Inflammationem omnem exstinguit, somnū conciliat, *carpo & plantis pedum illitum. Habet olei communis, lib. duas. ¹ Succu mali punici acidi, succi pomorum, vel radici mandragora, an. uncias quatuor. Succu hyoscyami, unc. duas. Succu papaueris hortensis nigri, uncias tres. Succu foliorum viola, succu ⁴ cicuta tenerissime, an. unc. unam. ⁵ Opii boni, styracis calamita, an. unciam dimidiam. Omnia simul cum oleo mixta reponuntur in ⁶ vase vitreo, & sub astu caniculari insolantur diebus decem: dein ⁷ coquuntur ad aqueorum consumptionem, ut solum oleum remaneat. Colatum reconditur in vase.

*Fronti,
temporib;
& naribus
quoque
illitum.

AN. NOTATIONES.

1 *Succu mali punici*) In latinis codicibus desideratur. Quum autem Græco in codice sic legatur, omitendum esse non putauimus.

2 *Vel radici*) Quum ad nos raro admodum, aut fere nunquam mandragoræ poma afferantur, præstat usurpare radici succum, cuius etiam foliū in manuscripto Nicolai codice sit mentio. Verum quia & hæc **C** ipsa recens raro habetur, oportet ut eius libra una contundatur, & in aqua sufficienti coquatur, colatique decocti uncie quatuor, aut plus etiam, aliis succis adiciantur.

3 *Succu papaueris*) Latini codices, & recte quidem, addunt Capitum. Et adicitur Hortensis, ut syluestre excludatur.

4 *Cicuta tenerissima*) Ita in omnibus latinis codicibus legitur. In manuscripto autem græco Nicolai codice, canchryos falso scribitur, pro καύη.

Nicolai
codex
mandragoræ

5 *Opii*) Hoc quia integrum in oleo dissolui nequit, ideo terendum erit, & tritum oleo inspergendum, ac sæpe permiscendum.

6 *Vase vitreo*) Bene obturato scilicet, ut sæpe numero hæcenus est dictum.

7 *Coquuntur*) Scilicet in vase duplici.

Oleum chamæmelinum. X.

Meatu rarefacit, & vapores discutit, atque acrimonas contemperat. Quia vero modice adstringit, ideo fluxiones inhibet moderatas. Febres non admodum calidas & diurnas quæ citra visceris alicuius phlegmonem infestant, discutit, lassitudines, ut si quid aliud, cum primis iuuat, & dolores mitigat, tensiones remittit, & laxat, quæ mediocriter dura sunt, emollit. Fit ex floribus chamæmeli, & oleo e maturis olivis expresso, ut rosaceum.

Paulus, Actuarius, & Nicolaus Myrepsus, florū Chamæmeli sine foliis in ambitu disci candidis, qui antea diē vnū tabuerint, 3 accipiunt, & in sextarium olei cōmunis dulcis demergunt, ac vas linteum simplici & tenui tegunt, ut oleū transpiret: Nā iniucundū odorē quendam garō similē oleū hoc assumit, si nō trāspiret, & foli 40. dieb. exponunt, colatum dein vase bene obturato reponunt. Hoc parādī modo pharmacopœi etiam nostri uti possunt. Alii accipiunt florū Chamæmeli lib. i. quos 3. dieb. macerant in olei communis lib. duas, 3 4. Quarto die igne lento modice coquunt, & flores extractos abiiciunt. Dein iterū iniiciunt flor. Chamæmeli 3 3. & insolant. Sed modus is, quo paratur, ut rosaceum vel melinum, est præstatio:

Oleum anethinum. XI.

Calefacit & discutit: ob id dolores sedat, & horrorib. certo circuitu remeantib. spina & nervosis partib. illiū accessionis initio, medetur. Venarū spiracula laxat, & capitis dolorē mitigat: Cōvulsionib. amicū. Lassitudinē, tumores erudos, ac scirrhus discutit, articulorū dolores subleuat, uteri durities emollit, & somnū conciliat. Fit eodem quo chamæmelinū modo, vase tamen optime obturato.

Actuarius & Nicolaus comam anethi viridem adhuc existentem, priusquam semen solidum fiat, & ære, accipiendam esse docent, pondere uncie vnus, & in olei dulcis sextarium Italicum coniiciendā, atque vasis ore exquisitè obturato dies quadraginta insolandā. Vnde perspicuum euadit, non per omnia, ut chamæmelinum, in quo vas linteum tenui ut transpiret obturatur, esse parandum.

Oleum liliaceum. XII.

Mliebrib. vitis congruit, calefacit, discutit: ob id dolores thoracis, ventriculi, coli, uteri, renū & vesicæ frigidos sedat, lenit, & coquit. Soluit durities, gravidis faciliē efficit partū, estq. in vniuersum feminariū mensib. eliciendū maxime accommodatū. Cicatrices celerrime illiū ad colores reducit. Sudorib. euocandis vitale. Fit ex lili albi florib. abiecto eo, quod in illis cruceū est, pondere 3. duarum. Olei dulcissimi, sextarii Italici, h. e. lib. i. 3 8. Vase vitreo diligenter obturato, trib. insolantur diebus. Deinde priorib. eiectis, noua iniiciuntur scilia: mox iterū exacto triduo induntur, alia, ter hoc faciendū & colatum reponendum.

ANNOTATIONES.

Sulfonium
oleum.

1 *Liliaceum*) Aut Lilinum, aut Sufinum nominatur. Hic quem ostendimus modus, ab Actuario & Nicolao est praescriptus, & a Pharmacopoeis obseruandus.

2 *Diligenter obrurato*) Ne scilicet quid euaporet.

Oleum Sambucinum. XIII.

L Emit, abstergit, cutem expurgat, ictero medetur, & icteri obstructo, articularum & nervorum doloribus confert. Fit ex floribus Sambuci in oleo veteri clarissimo maceratis, ut Chamamelinum.

Oleum nardinum simplex, Eiusdem. XIV.

C Alescit, tenuat, discutit, ac modice adstringit: proinde affectus omnes frigidos & flatulentos cerebri, ventriculi, icteris, lienis, renum, vesicae, vteri magnopere iuuat; naribus iniectum caput purgat, corporis colorem & odorem commendat. Recipit spicae nardi, uncias tres. Vini, aqua, an. vnc. duas & dimidiam. Olei sesamini, lib. dimidiam. Coquuntur in vase duplici lento igne horis circiter quatuor, frequenter mouendo.

ANNOTATIONES.

Hæc compositio frequens & vsitata est: ideoque alias magis varias, quas filius Mesuæ & Nicolaus Myreplus recensent, non referemus. Poterit, qui illis vii velit, ex iam dictis auctoribus describere.

1 *Sesamini*) Pro eo, dulci oleo vii licebit. Quia filius Mesuæ illud non raro pro Sesamino substituit, dū ait, Sesamini olei, vel dulcis.

Oleum sesaminum, Eiusdem. XV.

I mpinguat, semen genitale auget, asperam arteriam lenit; & ob id vocem claram reddit, aurium dolores sanat, multorumque aliorum oleorum materia est, caloremque mediocre obtinet. Thoraci, tussi & pleuritidi confert. Puerorum tussim sedat, huius olei cochlear cum saccharo candefacto paulatim transglutitum. Fit hoc modo, Sesami semen ab excrementis purgatum, aqua parum salsa irrigatur, manibus fricatur, iterum irrigatur, donec madescat. Siccatur, modice assatur, sacculo impositum aspero multum diuque confricando excorticatur, corticibus expurgatum molitur in farinam: oleumque exprimitur, ut ex amygdalis.

ANNOTATIO.

Olei sesami
succi
cedaneū.

Pauci hodie pharmacopolæ oleum hoc parant. Affertur autem ex Alexandria, Egypti Venetias, syncerum hinc ad nos. Emendum syncerum, quod oleo nucum non est adulteratum. Verum odor & sapor, dolum patefaciunt. Quod si desideretur, pro eo substituendum oleum amygdalarum dulcium.

Oleum amygdalarum dulcium, Eiusdem. XVI.

A speritatem gutturis, pulmonis, & veterarum partium etiam externarum lenit: duritiem omnem, & articularum siccitatem, aliarumque partium emendat. Impinguat, & reficit defectum corpus, hecicis confert, genitale semen auget, ardoriquæ vuluæ & vrina iniectum commodat. Fit hoc modo. Amygdalæ dulces cortice lignoso, & cute membranosa purgata, plurimum teruntur, in offas coguntur, horis circiter quinque loco calido continentur: vel in vase duplici hora una coquantur: aut sub calente arena, aut cinere, sacculo inuoluta & pannis, aliquandiu fouentur. Postea rursus teruntur, & sacculo inclusa torculari exprimuntur. Vel amygdalæ dulces trita in vase, ut maza, in aere & loco calido subiguntur, pauca calida identidem affusa, postea praelo exprimuntur. Torcular vero, quo oleum exprimitur, sit ex assere inferne canato, & declinatum versus & emissarium: superne autem pro cavitatis subiectæ magnitudine, & forma educio, protenso, & gibboso, ut undique cavitatem expleta, aequaliter amygdalæ exprimantur.

ANNOTATIONES.

1 *Purgata*) Vt purius & sincerius fiat oleum.

2 *Plurimum teruntur*) Vt intus merfa humiditas oleosa promptius in apertum proferatur.

Offa.

3 *Offas*) Græci μάζας, Latini massas, barbari pastones vocant. Offam igitur Latini vocant, quicquid est in pulvis modum redactum.

4 *Loco calido*) Aerem calidum intelligit. Calefaciendæ autem amygdalæ, ut copiosius exprimantur. Nā calore tenuata, liquata, fluxilisque magis reddita, foras tracta oleosa humiditas, expeditius & largius exprimitur.

5 *Duplici vase*) In quo sane calefecisse fuerit satius, quod hoc modo empyreuma minus misceri possit. Accedit, quod vitrum resudantem ex amygdalis calefactis succum non ebibat, ut sacculus, panni, arena, cineres, ut quæ bibula sunt omnia. Præterea tutius est, ut calor intendatur in vase duplici, quam cineribus aut arenis, calore sicco magis vrentibus & consummentibus. Denique per vitrum & aquam, corpora perspicua coniectare licet, quando satis incaluerunt, & oleosa sunt redditæ amygdalæ: quod indicium, conuolutis & sepultis in cinere & arena amygdalis, habere non potes, nisi recluseris. Neque tunc in offas coagere oportet, sed mox a mortario, ut trita sunt, in vitrum transferuntur. Quapropter vase duplici calefaciendæ

Aenda potius sunt, quam igni ipso, quam aere, quam affusa calente aqua. Optimus igitur is parandi modus, ut amygdalæ, ea qua diximus ratione purgatæ, plurimum terantur: & dein in vase duplici hora vna coquantur, postea rursus terantur, & sacculo inclusæ exprimantur.

Oleum amygdalarum amararum. XVII.

Obsstructa aperit, flatus resoluit, & dissipat: auditus difficultatem, sonitus aurium, & sibilos discutit, vermes in auribus occidit. Renum vitio & urina difficultate laborantibus, calculosis, viscerum cruciatibus, iecinerosis, suspiriosis, lienosis subuenit. Nauios & maculas faciei tollit, & cutem erugat, oculorum abolet hebetudine, & furfures detergit. Fit eodem quo ex amygdalis dulcib. modo.

*Oleum * balaninum. XVIII.*

Extergit & repurgat maculas, varos, lentigines, cicatrices nigras, albos, & reliqua sæda cutis vitia. Dolores aurium, surditatem, & tinnitum sanat, iecoris & lienis scirrhum mollit, & discutit. Affectibus nervorum & iuncturarum frigidis medetur. Aluum potu soluit, sed stomacho aduersatur. Fit ex balano myrsefica, id est, glande unguentaria, quam Arabes Ben vocant, tusa, assata, affusa aqua calida, & expressa.

*Oleum * ricinum. XIX.*

Prodest scabiei, ulceribus capitis manantibus & erumpentibus, vului qua occlusæ conuersæque strangulant, maculis faciei, lentiginibus, cicatricibus sædis, aurium doloribus. Potu aluum ciet, qua aquis grauat: lumbricos eiicit. Flatus crassos dissipat, pituitam crassam & lentam tenuat & incidit: dolentia, ab iis ventriculo, tenuibus intestinis, & colo confert. Hydropem non solum potu, sed & clysteri injectum, & illitum iuuat. Fit ex semine Ricini repurgato, trito, & in sariagine aut duplici vase torrefacto & cocto, sacculoque incluso, & tandem expresso.

Oleum e semine lini. XX.

Conuulsione, duricie musculorum, nervorum & articularum, sedis phlegmonis & rimis confert, & hemorrhoidum dolores sedat. Fit, ut oleum sesaminum: sed lini semen non excorticatur. Mola trusatilis ab oleariis exprimitur ad usum lucernarum.

Oleum laurinum. XXI.

Excalescit vehementer, & emollit: id eo, quod partibus corporis admodum refrigeratis utile est. Scabiosis, & impetiginibus asperis laborantibus in balneo illitum medetur. Sed eo abstinere conuenit iis, qui inflammatis impetiginibus infestantur, calidis temperamentis, & biliosis. Siquidem frigidis, humidis, ac pituitosis congruit. Item iis omnibus, quorum articuli a frigore affliguntur, & ischiadicis. Vermes, pediculos, culicesque enecat. Furfures capitis, alopecias, & ophiasis emendat. Vtile præterea cerebri, nervorum, & omnium partium frigidis affectibus, ideoque eius potentiam in colici dolore si infundatur quotidie experimur. Fit in hunc modum. Bacca lauri matura & recentes teruntur in pila, & ex aqua in lebeo coquuntur: post torculari plano, non cauo, exprimuntur in vas subiectum, in quo aqua supernatans oleum colligitur. Affusa calenti aqua iterum teruntur, & exprimuntur torculari cauato, colligitur oleum, & reponitur. Sunt qui baccas lauri citra omnem aliam mistionem molliunt, & ita prælo oleum exprimunt.

Oleum e iuglandibus. XXII.

Flatus crassos dissipat, tumores discutit, nervis attritis vel punctis confert. Injectum vino generoso, aut potum, potenter in colico a flatibus procreato dolore, flatus discutit, & dolore liberat. Fit similiter amygdalino.

Oleum rutaceum. XXIII.

Calescit, tenuat, discutit. ob id laterum, vesicae, renum, & vteri dolores a causa frigida excitatos sedat. Destillationibus auxiliatur & obstructions tollit. Fit hoc modo. Foliorum ruta viridum, & succi eorundem, ana uncias tres. Olei omphacii, lib tres in vase vitreo bene obturato dies quindecim insolantur, post in vase duplici horis quatuor coquuntur: & ruta folijs expressis & abiectis, recentia iniiciuntur. & iterum totidem dies macerantur, dein similiter coquuntur, exprimuntur & abiciuntur. Terio iterum recentia iniiciuntur, insolantur, coquuntur, colantur, & oleum reponitur. Hodie paratur ex folijs Ruta recentibus oleo veteri maceratis, & aestate tota insolatis, qua exacta coquitur, exprimitur, reponitur.

Oleum lentiscinum. XXIV.

Stomachum, partes nervosas, articulos & musculos roborat. Scabiem iumentorum canumque sanat, & sudores cohibet. Fit, ut laurinum.

Oleum Mastichinum, Ioannis Mesua filii. XXV.

Optimus
olei amygdalarum
dulcium
parandi
modus.

* Ben

* Echeru

Cerebrum, nervos, articulos, ventriculum, iecur corroborat, tumores duos lenit, dolores sedat. **A**
Habet mastiches, uncias tres. Vini odoriferi, uncias octo. Olei rosacei, lib. unam. Coquuntur in
duplici vase, ad vini consumptionem.

Oleum costinum, Eiusdem. XXVI.

Calefacit, obstructa aperit, nervosum genus roborat, adeoque resolutioni nervorum confert, ven-
triculo & iecori prodest, capillos fouet, caniciemq; remouetur, calorem denique, & odorem cor-
poris commendat. Capit costi amari, unc. duas. Castia, unc. unam. Summitatum sampſychi, unc. octo.
Vini odori quantum sufficit, ut biduo in eo macerentur, Olei sesamini, lib. duas. Coquantur horis sex
in vase duplici, ut nardinum.

Oleum absinthinum, XXVII.

Calefacit, roborat ea, quae sunt refrigerata, potissimum vero ventriculum. Excitat appetentiam,
obstructiones tollit, lumbricosque enecat. Accipit summitatum absinthii Pontici, & succi eius,
an. unc. quatuor. Olei communis, lib. tres. Hac omnia in vase vitreo bene obturato dies quindecim in-
solantur: dein in vase duplici horis quatuor, ut rutaceo in oleo dictum est, coquuntur.

Oleum menthaceum. XXVIII.

Ventriculum refrigeratum & imbecillum calefacit, firmat, nauscam vomitumq; reprimat, ap-
petentiam excitat, concoctionemque iuuat. Recipit mentha crispasatiua, & succi eius, ana un-
cias quatuor. Olei communis, lib. tres. Reponuntur in vase vitreum, ut de absinthino est exposi-
tum.

* Cheiri-
num.

Oleum * Leucoinum. XXIX.

Dolores nervorum, aliarumq; partium corporis articularum praesertim mitigat: & quae in thora-
ce, renibus & vesica sunt, discutit. Fit e floribus leucii lutei saepius maceratis, madefactis, & per-
mutatis, & oleo communi claro, ut rutaceum.

Oleum e castoreo, simplex. XXX.

Valeat ad omnia vitia frigida, praesertim nervorum, & articularum. Resolutioni, conuulsioni
medetur, & vehementissimos in febribus rigores illius spinæ compescit. Fit hoc pacto. Castorei
unciam unam in olei libra una coquitur ad tertias. Oleum in vase vitreo reponitur.

Oleum e castorio, compositum. XXXI.

Idem quod praecedens potest, sed validius est. Habet castorei, bdellii, styracis calamitae, galbani, opo-
panacis, sagapeni, croci, casta lignea, cinamomi, costi, an. drachmas duas. Salvia, lauendula, * ver-
basculi lutei odorati, cyperi, iunci odorati floris, piperis longi & nigri, sabinae, pyrethri, iridis, ana dr-
duas, & dimidiam. Vini odoriferi, lib. duas. Olei, lib. tres. Gummi seorsim in vino dissoluntur, reli-
qua omnia tusa macerantur in vino tribus diebus. Quarto cum oleo & vino in duplici vase coquan-
tur ad vini consumptionem: postea colatur, exprimitur, & reponitur.

* Primula
veris.

Oleum euphorbinum¹ simplex, Ioannis Damasceni. XXXII.

Mirifice frigidos cerebri & nervorum affectus iuuat, cephalalgiam, hemicraniam, lethargum,
naribus immisum: articularum quoque & iecoris, & lienis doloribus illius succurrit. In a-
lopecis, & capillorum defluuii vitium dissipat, attrahitque quod ad capillos producendos utile sit.
Capit euphorbii, unciam dimidiam. Olei * leucoini, vini odori, ana uncias quinque. Coquuntur ad
vini consumptionem.

* Cheirim.

Oleum
euphorbi-
um Ga-
leni.

Galenus lib. 1. de Compositione medicamentorum localium, ex oleo communi, & solo euphorbio
parat: & accipit olei libram unam, atque ei immittit Euphorbii validi unciam dimidiam, augetque ac mi-
nuat pro vario scopo, Euphorbii quantitatem.

1 Simplex Quo hodie omnes propemodum vtuntur. Quod si vero composito quis vti velit,
compositionem eius in Ioanne Damasceno reperiet, aut Auicenna, vnde suam Mesue filius sum-
psit.

Oleum e² piperibus, Eiusdem. XXXIII.

Iuuat morbos nervorum frigidos, resolutionem, conuulsionem, tremorem, epilepsiam, ideo magnam
calefaciendi vim habet: adhuc tenuat, discutit, & foras educit, ac proinde ischiadem, & reliquos
articularum dolores: Vteri, coli, renum, vesica frigida vitia sanant, obstructiones aperit, calculi fran-
git. Accipit trium piperum, an.² drach. tres. Myrobalanorum cepulorum, belliricorum, emblicorum,
indorum, an. drach. quinque. Radicum apti, fueniculi, an. drach. tres, & dimidiam. Sagapeni, opopa-
nacis,³ ammoniaci, drachmas duas & dimidiam. Turpeti boni albi.⁴ drach. duas. Zingiberis, drach.
tres. Brassica recentis, hyssopi viridis, foliorum ruta virentium, an. manipulum unum. Parum tri-

ta coquantur ad tertiam, in aqua lib. viginti quatuor. Colantur, & adiciuntur olei ricinini lib. dua, & recoquantur ad aquae consumptionem. Alii addunt iridis, drach. sex. Casia, drach. duas. Anisi, cardamomi, an. drach. unam, & dimidiam. Calami odorati drach. duas, & dimidiam. Spica nardi, drach. unam. Expressionis tribuli terrestris, sextarios tres. Poni potest loco ricinini, oleum irinum, vel leucinum, vel amygdalarum amararum.

ANNOTATIONES.

B ¹ *E piperibus*) Hoc oleum etiam ab Auicenna, e quo filius Mesuæ, ut omnia fere alia, mutuatus est, & ad verbum transcripsit, sed sub nomine olei Alkechengi, describitur. Deprauatam vero ab interprete, aut potius librario, esse hanc dictionem, hinc fit manifestum, quod præsentem compositionem Alche-
Auicennæ locus e-
mendatus. Alchelen-
gi.

² *An. drach. tres*) In omnibus Mesuæ filii codicibus maximo errore legitur uncias tres, quem etiam Cordus in suo medicamentario libro secutus est. Scribendum autem esse drachmas tres, palam fit tum
Cordus errat.
ex Serapione, tum etiam Auicenna ipso, quorum vterque habet drach. sex. Quum vero Mesuæ filius per vniuersam hanc compositionem, dimidiam duntaxat partem pöderum vsurpet, ut ex collatione omnes deprehendent, in confesso est, legendum esse drachmas tres, ut quod sit dimidium drachmarum sex pō-
C dus. Scio quidem hoc loco meæ sententiæ refragari Franciscum Alexandrum, sed more suo, præteritis a me adductis rationibus. Quare quæ ille affert facile ab omnibus contemnuntur, quum codicem mēdō-
sum efficacissimis rationibus anteferat.

³ *Ammoniaci*) Sic esse legendum ex Serapione constat, qui habet Opopanacis, sagapeni, ammoniaci. Quod non temere monemus, quia in omnibus codicibus filii Mesuæ falso legitur Hyoscyami. Is autem error acceptus referendus est Auicennæ, vnde Mesuæ filius hanc compositionem in suas retulit, vel certe eius interpreti, quem Cordus etiam secutus est. Nemo autem non intelligit, nullum esse prorsus lo-
Cordus errat.
cum Hyoscyamo in hac compositione, quæ ad frigida vitia sananda utilis est, non calida: ad quæ Hyo-
scyamus recte accommodatur.

⁴ *Turpeti, drach. duas*) Et hoc loco in omnibus Mesuæ filii codicibus mendose, & non sine maximo errore legitur, drach. duodecim. Quem itidem errorem Cordus in suo medicamentario libro sequitur. Scribendum autem esse drach. duas, & non drach. duodecim, ut in Mesuæ filio legitur, ex Serapione li-
Cordi er-
ror.
quet, qui habet drach. quatuor. Diximus autem paulo ante, Mesuæ filium duntaxat dimidiam ponde-
D rum partem vsurpare: ideoque quum Serapio drach. quatuor accipiat, consequitur, Mesuæ filium dunta-
xat drach. duas vsurpare. Non est autem silentio tranieundum, in Auicenna perperam legi sextaria qua-
tuor pro drach. quatuor. Sciunt enim omnes, sextarium non aridorum, sed liquidorum mensuram esse.

⁵ *Adterrias*) Auicenna habet, Donec medieta consumatur. Suspicio igitur est, hic quædam desiderari, & locum vniuersam ita esse legendum: parum trita coquantur in lib. viginti quatuor aquæ ad dimi-
dias, dein adiciuntur olei ricinini lib. dua, & coquantur ad aquæ consumptionem.

⁶ *Casia*) In Auicenna, ut multis aliis locis, mendosissime legitur Capsiæ, vel tapsiæ.

Oleum vulpinum, Eiusdem. XXXII.

E *M* ¹ *O* *his nervorum & arti. ulorum frigidis aduersatur, itemque renum & dorsi doloribus suc-
carrit. Potenter admodum discutit, & excalefacit. Fit hoc modo. Vulpes detracta pelle integra
exenterata, in aqua fontane & ² *marina*, an ³ *sextario vno*, olei veteris clari sextarii duobus & di-
midio, & salis uncias tribus coquitur ad aquæ consumptionem, & artium vulpis dissolutionem.
Postea aqua dulcis cui hyssopi & anethi ⁴ *herbarum*, an. manipulus unus incoctus sit, affunditur va-
si. & cum dictarum herbarum an. lib. una, recoquitur ad huius aquæ consumptionem. Dein colatum
oleum, ad usum rponitur.*

ANNOTATIONES.

¹ *Integra*) Ita ut omnes suas partes, præter intestina habeat: potest in partes secari tres, aut quatuor, quo rectius vasi, in quo coquitur, incoqui queat. Paulus vinam aut mortuam totam oleo incoquit. Id quod hodie nonnulli faciunt, qui vbi illam exenterant, semispirantem adhuc oleo incoquunt. Sunt etiam
F qui non detrahant pellem, sed tantum, quod ita statuere videatur filius Mesuæ, exenterant, quod sane me-
lius est. Quid enim attinet stercorea incoqui? Vulpes etiam bene habita & vegeta, non strigosa, qualis per
vindemias vis nutrita & impinguata capitur, ætatis mediæ.

² *Marina*) Qui prope mare minime habitant, si sumant aquam salinam, siue aquam fontium salso-
rum, vbi scilicet salinæ fuerint.

³ *Sextario vno*) Filius Mesuæ habet Kist vno. Est autem Kist, ea mensura, quam Romani sextarium nominant. Id quod ex Serapione liquet, qui ita scriptum reliquit: Kist apud Romanos capit libram vnā cum dimidia, & duas tertias, id est, sextam partem, ut Auicenna etiam interpretatur. Quapropter est unciam viginti, hoc est, lib. vna dimidia, & uncia dua. Ita ut vtriusque aquæ, fontanæ scilicet ac
marinæ, vniuersa mensura sit lib. tres, uncia quatuor. Quæ certe quantitas ad integram vulpem,
præfer-

Aqua ma-
rina suc-
cedant.
Kist.

præsertim grandiorē, coquendam non sufficit. Suspicio igitur est, locum hunc deprauatum esse, & legendum potius esse Kilt duo, seu sextarius duobus, id est, lib. sex, & vnciis octo. Quod si nec illa mensura suffecerit, accipe tantum de iis aquis, quantum abunde ad coquendam vulpem satis erit.

4 *Herbarum*) Fit efficacius, ubi præter has origanum, salvia, betonica, serpyllum, rosmarinus, stæchas, maiorana, melilotus, & lauri folia incoquantur.

Oleum e capparis. XXXIV.

Valeat ad duritiem, obstructionem, dolorem, & omnia vitia lienis. Recipit corticum rad. e m capparum, vnciam vnam, Corticum tamaricis, & foliorum eiusdem, seminis agni, assplen, cyperi, an. dra. h. duas. Ruta, drach. vnam. Aceti, vini albi, clari, odori, an. vnc. duas. Olei maturi, lib. vnam. Coquuntur in duplici vase ad acetum & vini consumptionem. Simplicissimum est, quod ex solo oleo & radice cappari paratur. Radix tusa in oleum conticitur cum aceto momento, mense in egiō insolatur, dein percoquitur, ut acetum expiret, colatur & reponitur.

ANNOTATIO.

1 *Foliorum eiusdem*) Notat me Franciscus Alexander, quod folia Tamaricis, præterita iridis, adiecerim, quum tamen constet Tamaricem vitii lienis, ad quæ oleum hoc confert, mirifice succurrere. Quum vero iris etiam lienosis auxilietur, non prohibeo, si cui ita visum fuerit, quin illam admisceat.

Oleum e spica nostrate. XXXV.

Ad caput roborandum, & unguentis odorem gratum conciliandum confert. Fit e nostrate spica per distillationem. Stillatio namque illius liquori innatat.

Oleum e spica nostrate, Compositum. XXXVI.

Habet spica nostratis vnciam vnam. Syracis, caryophyllorum, an. drachmas sex. Nucis moschata, drach. undecim. Olei lib. vnam. Vini odori, vnc. duas. Coquuntur in duplici vase, ad vini consumptionem.

Oleum e Sarmentis iuniperi, Ioannis Damasceni. XXXVII.

Emendat cutis fæditatem, serpiginem, cancerum, ulcera maligna, qualia quæ in tibiis quorundam, & cruribus existunt. Fit hoc pacto. Sarmentis iuniperi pinguis succosi, non squalidi, obduri si u aut carioli tenuibus, aut minutim incis, vas vitratum angustioris imple, & laminam ferream tenuem multis foraminibus cribri in modum pertusam toti ori applica, ut per eam oleum destillet: & ne sarmenta delabantur, hanc cum ore tum dicti vasis superioris, tum alterius minoris & inferioris etiam vitrati oleum excipiri * luto sapientum siue Chymicorum: hoc enim nomine, si Diis placeat, illi nominantur, non quidem ab aliis sed a seipsis: probe, ne quidquam expiret, obturato & munito. Vbi minus & inferius vas usque ad os superioris terræ infoditur, igne lentissimo maius alterum vas iuniperi frustula capiens, circumda horum duabus, sicque oleum in vas minus destillabit, quod in usus reponitur.

* Terra
regulæ.

ANNOTATIO.

* *E Sarmentis*) Nam fit etiam oleum Iuniperinum e baccis, idque dupliciter, nempe vel per expressionem, quod crassius & impurius est, ut amygdalarum: vel per artem destillandi vel iubilationem.

Oleum e Scorpionibus, simplex, Eiusdem. XXXVIII.

Lapid. um renum, & vesica frangit & expellit pubi, perinao, & lumbis in solii egressu illitum, aut per urinarium meatum inieclum. Fit ex scorpionibus viginti, vel paucioribus, aut pluribus, in olei amygdalarum amararum lib. auat. in vase vitreo probe obstructo triginta diebus insolatis, & dein oleo colato in usus repositio.

Oleum e Scorpionibus, compositum, Eiusdem. XXXIX.

Habet radicis aristolochie rotunda, gentiana hyperici, corticum radicum capparis, an. vnciam vnam. In olei amygdalarum amararum sextario vno diebus viginti insolantur, in vase vitreo accurate operculato: deinde aliquantulum in vase duplici coquuntur, postea scorpiones a decem ad quindecim oleo iniiciuntur, obturatur vas, & iterum mense vno insolatur, postremo excolatum oleum reponitur.

ANNOTATIO.

Silentio transire non possum, quod hoc loco Manardus memoriæ prodidit. Parari nunc, inquit, etiam ex oleo veteri Scorpionum oleum, adiectis multis simplicibus medicamentis ad venena laudatis: esseque mirabile in pestilentia, & venenis omnibus. Scire se hominem, qui hoc solo munitus, sauiissimam quantumvis pestilentiam nihili fecit: nec solum seipsum, sed & famulos secum ad visendos pestilentia affectos accedentes, incolumes conseruauit. Præterea scire se, & ex sola inunctione aliquos esse liberatos, qui sauiissima biberant venena.

Oleum e lumbricis terrestribus. XL.

Nervos refrigeratos roborat, eorumque vulnera, convulsiones, ac resolutiones iuuat, & doloribus articularum utile est. Capit lumbricorum, seu vermium terra, vino albo diligenter lotorum, lib. dimidiam. Olei oliuarum maturarum, lib. duas. Vini, vnc. duas. Coquitur in duplici vase omnia simul, ad vini consumptionem. dein colatum oleum ad vsus reconditur.

Oleum e lateribus. Ioannis Damasceni. XLI.

Calefacit, discutit: essentia² tenuitate in altum penetrat: proinde excrementosam materiam omnem consumit. Igitur comitiali morbo, nam eo laborantes & humi prostratos naribus subditum subito excitat: vertigini, obliuioni, resolutioni, dolori lienis, renum, vesicae, vteri, neruorum, articularum, & reliquarum partium a frigidityate nato medetur, & urinam ciet. Sic fit. Lateres aut tegulas ex terra lutoue rubente confectos, multum antiquatos, in frustra comminutos, carbonibus non fumantibus accende, donec candescant & igniti rubeant: dein e carbonibus exempta fragmenta in concha oleo veteri claro plena restinguo, & illic donec oleo probe imbuantur dimittito: postea oleo exempta probe seccato & per se in casulis, & minutissime terito: & vasi per sublimationem vitreo destillanda indito, & luto chymistarum capitellum claudito, & subius in fornace carbonibus accensis oleum elicito, & in phiala exacte obstructa recondito.

ANNOTATIONES.

1 Elateribus) Habet multa quoque alia nomina; siquidem dicitur oleum Philosophorum, scil. Chymistarum, qui se suis scriptis vbique, & quotidiano sermone Philosophos appellant, & oleum hoc sua industria e lateribus seu tegulis eliciunt. Non autem temere dictum est Chymistarum, quia est aliud etiam oleum Philosophorum naturale; quod Babylonis Naphtha, hodie veto Petroleum nominatur, de quo libro primo diximus. Appellatur etiam oleum sapientiae, quod a sapientibus Chymistis nimirum, si Diis placet, paratur, & perfecti magisterii, & benedictum, & diuinum, & sanctum. Tamen tria postremo magis Petroleo conueniunt, utpote quod Monachi, impostores pessimi, e diuorum sepulchris promanare nugari sunt.

Oleum Philosophorum.

Naphtha. Petroleum. Oleum sapientiae. Perfecti magisterii.

2 Essentia tenuitate) Nam ita tenue est, ut momento latissime spargatur; sique manui infundatur, cito penetret. Atque hinc est, quod urinam moueat, lapidem frangat, vermes enecet, aurium tinnitui a flatu crasso conferat.

3 Multum antiquatos) Sunt qui novos lateres, & eos, qui aquam nondum senserunt: propterea quod oleum melius imbibant.

4 Fressa) Vnciaz vnius Albuchasis; vel, ut rectius dicam, Bulcasis, esse praecipit. Alii nucis Iuglandis magnitudine.

5 Vasi) Quod Chymistae hodie Retortam, aut Cucurbitam appellant.

Oleum tartari. XLII.

Ad tergendam & erugendam faciem & cutem confert. Scabiem & impetiginem sanat. Fit ita. Tartari sacarii dolii lateribus adhaerenti¹ puri lib. quatuor, coniciuntur in vas figulinum olamue, & vruntur in² fornace cum lateribus aut tegulis, aut fictilibus: vel per se, quoad tartarum omne³ candidum reddatur: dein imponantur sacco e laneo panno facto, & inferne acuto, cui parum⁴ vini & aceti superinfunditur, & in cella vinaria suspenditur: atque ex eo clarus quidam⁵ liquor destillat in vitrum, quod suppositum est, ad vsus reponendus.

ANNOTATIONES.

1 Puri) Quod album potius est, quam rubrum.

2 In fornace) In furno, maxime figulino.

3 Candidum reddatur) Et prorsus albescat.

4 Vini & aceti) Nonnulli nihil horum affundunt.

5 Liquor) Ita enim rectius quam oleum nominatur, reuera enim oleum non est, sed acerrimus liquor. Porro alii oleum aut liquorem hunc ita parant. Tartarum lateribus doliorum adhazrens album, ex vino generoso tritum linteolo inuolutum, aceto albo forti maceratur, sub cineribus calidis coquitur, dum nigrescat: iterum teritur, & vasi inclinato decliuue diebus octo loco frigido imponitur, donec in oleum aut liquorem resoluatur. Id si non fit, exprimitur.

Alius parandi modus olei tartari.

Oleum terebinthinum, simplex. XLIII.

Confert morbis frigidis omnibus, neruorum maxime. Asthmaticis, & suppuratis confert. Colicis cruciatibus utile, internosque flatus potenter discutit. Cicatricibus gratiam addit, earumque maculas exterit. Calculum educit, & arenas promouet. Fit hoc modo. Terebinthina, aut laticina resina, lib. quatuor, ponuntur in vas vitreum (Retortam, aut Cucurbitam appellatum) & Chymistarum more oleum elicitor: ita nimirum, ut vas praedictum arena imponatur, a sordibus probe mundata: atque tum primum cum aqua elicietur oleum tenue & clarum limpidumue, secundo aurei coloris fuluumue, ultimo fuscum & crassum: horum unumquodque per se aufertur, & reponitur. Tertium a quod effluit optimum est.

Oleum² Balsami, Ioannis Damasceni. XLIV.

Opobalsamum.

Calefacit, desiccatur, tenuat, discutit, tergit, glutinat. Fit cortice eius arboris, orientem spectante, sub canicula arboribus scarificato & vulnerato: tum enim pinguis lachryma destillat, quam recentiores oleum. Græci Opobalsamum nominant. Alii arboris huius surculos vere inueniunt cum pilaterunt, dein in aqua coquunt, sorculari exprimunt, oleumque Balsami vocant. Sunt qui surculos tritos in oleo veteri dies quadraginta insolant, in vase duplici coquunt, exprimunt, surculos novos tritos immittunt, secundo, & tertio, colant & recondunt.

A N N O T A T I O N E S.

Oleum Balsami. Hoc non est nisi liquor Balsami, quem Opobalsamum tum Græci, tum officina medicorum appellant. Rarissimum hodie, præsertim in nostris regionibus: neque enim hoc modo nisi in iis locis, ubi Balsamum nascitur, parari potest. Quod æquum prioris seculi Medici Petrus de Ebano, Gulielmus Platearius, Bartholomæus Montagnana animaduertissent, olea Balsami, quæ viribus vero balsamo nihil cedere dixerunt, composuerunt: quæ ordine subiciemus.

Oleum Balsami, Petri de Ebano. XLV.

Balsamum artificiale: Chirurgorum.

Idem quod opobalsamum potest. Tenuum namque est partium, calefacit, exsiccatur, terget, ac glutinat, quæ omnia vulnerariis medicis in sanandis vulneribus expetuntur. Cordis palpitacionem & syncopen illitum curat. Recipit myrrha selecta, aloes iecoraria, spica nardi, sanguinis draconis, thuris, momia, opopanax, bdellii, carpobalsami, ammoniaci, sarcocolla, croci, mastiches, gummi Arabici, styracis liquidi, an. vnc. duas. Ladani electi, siue castorei, vnc. duas, & dimidiam. Moschi, drach. unam, & dimidiam. Terebinthina pondere omnium tritis miscetur, alembico destillatur, ut rosarum stillatitius liquor, & reconditur.

A N N O T A T I O.

Balsamum artificiale, veri Balsami penuriam substituit. Viribus enim propemodum ad singulares balsami facultates accedit, atque id potissimum, quod ab Apocensi descriptum est, ab omnibus fere Chirurgis vulgo vsurpatur, ut infra fufius dicetur.

Oleum Balsami, Gulielmi Placentini. XLVI.

* Vaciat.

Valeat ad lapidis vitia, cicatrices eminentes applanat, & balsami loco vsurpatur. Habet myrrhæ, carpobalsami, nucis Indicæ, an. vnciam dimidiam. Hyperici, * drach. duas. Teruntur leniter, & miscentur olei vnc. quinque. Terebinthina, vnc. una, & dimidia, & in fine, moschi, grana tria. Olei de lateribus, vnc. una. Destillatur, ut præcedens.

Oleum Balsami, Montagnana. XLVII.

Accipit terebinthina, lib. unam. Thuris albi, vnc. quatuor. Gummi olea, vnc. sex. Baccarum lauri, vnc. quatuor, Mastiches, galange, caryophyllorum, cinamomi, zedoarie, nucis moschata, cubeba, ligni aloes bene triti, an. vnc. unam. Omnia commissa alembico destillantur leni igne, & quod primo elicitur, aqua balsami dicitur: quod secundo, oleum balsami, quod tertio, balsamus artificialis.

Oleum Balsami, Gulielmi Placentini. XLVIII.

Melius est eo quod præcedit. Recipit olei, lib. unam, & dimidiam. Myrrhæ, xylobalsami, opopanax, bdellii, aloes, carpobalsami, ammoniaci, sagapeni, nucis Indicæ, hyperici, macis, gummi Arabici, thuris, tragacanthæ, an. vnc. unam. Laterum quos aqua nunquam attingit ignitorum, & communi in oleo restinctorum, vnc. tres. Terebinthina pura, vnc. septem. Trita omnia simul, & in pila inuicem subacta, in alembico destillantur.

A N N O T A T I O.

Cur Chirurgi Balsamo artificiali in omnibus sanandis vulneribus vtantur.

Hactenus varia olea Balsami, ut hodie nominant, artificialis commemorauimus. Sed etiam postremum hoc multis est vsitatum, tamen primum quod a Petro de Ebano descriptum est, ceteris omnibus præferendum videtur, quod viribus Balsamo nihil cedat. Habet enim in se medicamenta complura calefacientia, & exsiccantia, item extergentia, & glutinantia: quæ sane omnes facultates in curandis vulneribus maxime requiruntur. Hinc est, quod nostrates Chirurgi, in omnibus sanandis vulneribus, Balsamo hoc artificiali ab ipsis nominato, prospero successu vtantur. Etsi verò non desunt, qui huic descriptioni adiiciant galangam, garyophyllos, cinamomum, zingiber, grana paradysi, & alia quædam: tamen quum metuendum sit, ne ex illis admodum calidis medicamentis intemperies aut phlegmone aliqua laboranti parti accersatur, præstat illa ommittere, & Petri de Ebano descriptione, quæ sane optima est, contentos esse, atque eam pro artificiali Balsamo a Chirurgis vsurpâri.

Oleum sampsuchinum. XLIX.

Calefacit, roborat caput, & neruosum genus omne: ideoque lassitudini vtile, & morbis cerebri ac neruorum frigidis. Ob id spina in balneo illitum, resolutioni, conuulsioni que succurrit. Auribus iniectum, torturam oris vocatam sanat: immixtum vero auribus, a statu fixo diffipatur.

Aduersus

A Aduersus vulua occlusiones ac strangulatus efficax, menses, secundas, & fetu extrahit, scorpionu, que moribus medetur. Habet comarum sampsychi, Manipulos quatuor. Serpyll^l, manipulos duos. Foliorum myrti, manipulum unum. Abrotoni, sisymbrii, an, manipulum dimidium. Cassia lignea, unc. duas. Olei omphacini, quod satis est. Contusa omnia conticiuntur in vas vitreum, & affunditur oleum ea quantitate, ut ceteris supernatet: vase bene obturato, diebus octo insolantur, dein exprimuntur, & expressum oleum de ouis speciebus affunditur: hocq, tertio faciendum. Alii, ut filius quodamque Mesua, ex solis sampsychi comis ter quaterue mutatis, inq, vase duplici coctis, velut rosaceu conficiunt, quae sane conficiendi sampsychini olei ratio melior, utpote magis simplex, existit.

Melior
conficien-
di sampsy-
chini olei
ratio.

Oleum ex hyperico, Incerti auctoris. L.

B C Alescit, siccatur, roboratur, discutit, & attenuat: ideoque vulnera etiam grandia glutinat, maxime nervorum. Ambusta sanat, dolores siue summitatum femoris, & vesica mitigat. Capit comarum dentium hyperici, unc. tres. Macerantur triduo in vino odorifero, quod satis est. Post coquantur in vase duplici, bene obturato, valide exprimuntur: & hyperici nouae come pari pondere similiter macerantur, coquantur, exprimuntur: hocque tertio faciendum. Postea adduntur terebinthina, uncia tres. Olei veteris clari, uncia sex. Croci, scrup. unus. Coquantur in duplici vase, quoad vinum consumatur: dein exprimuntur, & colatum oleum reponitur. Alii hyperici flores iam maturos oleo macerant, & insolant, eoque modo parant quo anethinum.

Oleum de ouis. LI.

E Xperientia comprobatum est, cutim, praesertim faciei, exterere & expurgare, cicatricibus decorē addere, impetiginem, herpetem, & alia cutis vitia persanare, capillos regnere, ulcera maligna & fistulosa curare. Doloribus praeterea dentium & aurium succurrit. Fissuras manuum, pedum, & ani sanat. Ambustus utile. Fit hoc modo. Oua recentia numero* centum elixantur, quoad duran- * alii tri-
tur. Dein vitelli eorundem exempti, & supra mediocrem ignem ligneo aut ferreo cochleari comminu- ginta.
ti in sartagine ferrea, vel terra plumbata friguntur, donec rubescant, & pinguedinem remittant: postea massa feruens in sacculum pilis contextum inditur, & exprimitur, interdum vero alii torculari exprimere malunt. Oleum expressum reponitur.

ANNO TATIO.

Mesuz filius tres olei de ouis conficiendi modos recenset. Primus ex Serapione acceptus, non multum ab eo, quem iam diximus, distat, estque eiusmodi. Vitelli ouorum elixando duratorum triginta aut circiter manibus friati, in sartagine terrea plumbata friguntur igni mediocri, mouendo cochleari ligneo, donec rubescant, & oleum ab eis resoluatur, quod pressi cochleari largius remittent. Alter modus est, ut vitelli ouorum elixando indurati mola frangantur, dein in offas massamue tundantur, & torculari exprimantur, ut in oleo amygdalarum est dictum. Tertius ex Anicenna sumtus est, ut scilicet vitelli vasi imponantur, oleumque ignis violentia eliciatur, ut in oleo de lateribus est dictum. Sunt qui quartum adiciunt minime contemnendum. Oua in cineribus coquantur quoad dura euadant, dein exempti vitelli leuiter in pilea tunduntur, tusi in sacculum lineum reponuntur probe colligatum ac occlusum, qui tandem torculari suppositus valide comprimitur, donec ab eo oleum resoluatur.

Tres con-
ficiendi o-
lei de ouis
modi.
Primus.
Secundus.
Tertius.
Quartus.

Oleum irinum, Ioannis Damasceni. LII.

T Erget, tenuat, coquit, discutit potenter: ob id frigidos dolores aurium, iecoris, lienis, uteri, & articularum sedat. Humores in thorace ac pulmone crassos tenuat, strumas discutit, tumores duos emollit, conuulsioni succurrit, & aurium ac narium fetorem emendat. Sic fit. Accipit radicem iridis, lib. unam, Florum eiusdem lib. duas. Aquae cuius aliae iridis radices incocta sunt, lib. tres. Olei dulcis, vel sesamini, lib. sex. Coquantur in vase duplici, radices & florum folia noua immittuntur, prioribus expressis & abiectis, ut in oleo rosaceo, coquantur denuo ad perfectionem.

Oleum irinum¹ Nicolai Myrepsici. LIII.

V is eius excalfaciens, verum minime acris. Ideo refrigeratis partibus utile. Roborat etiam, & emollit. Recipit radicem iridis², asspalathi, cyperi, helenii, an, lib. duas, & dimidiam. Opopanacis, unciam unam, & dimidiam, Anchusae, unciam unam.³ Iunci odorati, casiae xylobalsami, nardi cel-
F tice, ana uncias tres. Olei puri, sextarios quindecim, Aqua, sextarios duos, & dimidium. Condu-
tur singula crassiuscule, & diebus duobus macerantur. dein duplici in vase horis sex coquantur, & postea iniicitur opopanax, in vino maceratus & liquatus. Colatum dein oleum in usus reponito.

ANNO TATIONES.

¹ Nicolai Myrepsici) Nam compositio a Cordo, sub Alexandrini nomine producta, erroribus non vacat. Variat etiam a iam dicta ponderum ratione, ut ex vtriusque collatione patebit.

Cordo.

Nicolai
locus ex
pensus.

² *Affalathi*) In latinis exemplaribus desideratur, qui pro eo radicem Lili fatui substituunt: & recte quidem, quod hæc itidem ut iridis calefaciat, tenuet, atque emolliat. Iudico itaque sectionem in manuscripto codice Nicolai corruptam esse, & pro ἀσπλάδου legendum esse *αγιν* *αγιν*.

³ *Opopanacis*) Et hoc in Latinis desideratur medicamentum.

⁴ *Funci odorati*) Latini codices Cirramomum pro eo substituunt.

⁵ *Casia*) Falso in latinis exemplaribus Asz legitur, pro Casia. Quum itaque multa sit in hac compositione varietas, præstat uti simplici irino oleo, quale a Mesue est descriptum.

Oleum moschatum, LIV.

Pillis pomisue odoratis cogendis est aptissimum: adhæc roborat, calefacit, discutit. Valet ad frigidum ventriculum, colicum, & renum dolorem. Lateris quoque illitu sanat. Nervorum omnibus propemodum vitis confert. Habet olei communis, libras sex. Folii spica nardi, costi, mastiches, an. unciam unam, & dimidiam. Syracis calamita, croci, myrrha, casia lignea, xylobalsami, an. drach. sex. Caryophyllorum, carpobalsami, bdellii, an. unc. dimidiam. Nucis Indica, drach. duas. Moschi, drach. unam. Vini odori, uncias sex. Trita leuiter omnia, coquantur in vase duplici lento igne, ad vini consumptionem.

ANNOTATIONES.

Muscellinum.

¹ *Moschatum*) Barbaram sectantes Medicinam Muscellinum, itidem a Moscho, quem illi inepte admodum Muscum appellant, oleum hoc nominare solent. Nicolaus, si non corrupta est vox, *μοσχάριον* vocat. Puto autem, *μοσχάριον* esse legendum, id est, oleum moschatum.

Cordus.

² *Nucis Indica*) Cordus hic significari per Indicam nucem, eam quæ Moschata, vel, ut hodie loquuntur, muscata nominatur, annotavit: quod hanc ipsam veteres Græci Carion Indicon etiam appellauerint. Mirari autem satis non possum, cur in eam venerit sententiam, quod constet, veteribus Græcis hanc nucem prorsus incognitam fuisse. Recentiores autem Græci Caryon Indicon non aliam nominarunt nucem, nisi eam, quæ adhuc hodie in officinis Nux Indica nuncupatur.

Cordus erat.

³ *Vini odori*) Cordusaquam pro vino usurpat, quod mihi non probatur. Nam constat, hoc oleum ad frigidum maxime affectus adhiberi, ideo præstat, vinum quam aquam illi indere.

Oleum nucum moschatarum, LV.

Calefacit, siccit, roborat. Frigido & humido ventriculo præditis maxime confert. Illitum os ventriculi mire corroborat, Venerisque tentiginem excitat. Deglutitum anhelitum commendat. Accipit nucum moschatarum pinguium, libram unam. Caryophyllorum, unc. dimidiam. Contunduntur, & inter contundendum paulatim stillatius absinthii liquor affunditur, assidueque in mortario donec probe emolliantur, agitantur. Dein permiscetur olei mastichini, menthacei, an. unc. nouem. Vini chii, unc. due. Macerata diebus septem in duplici vase ad lentum ignem placidissime eundique obturato ad vini usque consumptionem bulliunt. Post exprimuntur, & quod expressum est, vitreo in vase conseruatur. Sunt qui per alembicum vocatum oleum elicere malunt. Alii nucum moschatarum fere quinque per noctem in vino crassiuscule tritarum, in vase vitreo, ut vinum emineat, macerant. Postridie sacco lineo includant, prius tamen in sartagine mediocriter calefactas obligant, & filis passim obductis, ne simul coeant, constringunt, ac torculari exprimunt ligneo, paruo, cum lacu exiguo ut deorsum vergat.

* Dealcia.
na.

Oleum Ligustrinum, LVI.

Calefacit, & modice adstringit, ideoque partes nervosas roborat pleuriticis succurrit, & in quibus ceruix in scapulas conuellitur, item angina laborantibus confert, & capillos a canicie vindicat. Fit ex floribus ligustri foliorum uncias quatuor, coctis in olei veteris uncias decem, ut rosaceum.

Oleum populinum, Nicolai Myrepsi, LVII.

Emolli, tenuium est partium, & calidum: arthriticis & podagricis utile. Accipit gemmarum populi nigrae, veris initio collectarum, uncias quatuor. Olei dulcis, sextarium Italicum unum. Gemmae tusa in oleo macerantur, & insulantur diebus quadraginta.

ANNOTATIO.

Compo-
sicio olei
populini
melior.

Ad hunc quidem modum Nicolaus Myrepsus componit. In latinis autem codicibus aliter describitur, & vinum adicitur. Quare sic componi aptissime posset. Recipit Gemmarum populi nigrae, vere collectarum & tularum, uncias quatuor. Olei dulcis, lib. tres. Vini lib. sex. In vase vitreo diebus quindecim insolantur, & dein lento igne in duplici vase coquantur, ad vini consumptionem, expressum & colatum oleum reponitur.

Petrelaon, LVIII.

Calefacit, siccit, essentia tenuitate in altum penetrat, discutit: ac proinde materiam omnem excrementosam absorbit. Epilepsia, resolutioni, vertigini, obliuioni, lienis, renum, vesicae, uteri, nervorum, articularumq, omnium, aliarumq, partium nervosarum doloribus frigidis auxiliatur.

ANNOTATIO.

Naphtha.

¹ *Petrelaon*) Officinis petroleum dictum non est, nisi Naphtha Babylonis vocata: de qua plura libro I. huius Operis diximus.

DE VNGVENTIS, SECTIO
DECIMA QUINTA.Vnguentum¹ Marciatum magnum, Nicolai Myrepsici. I.

Confert ad refrigerationem capitis, thoracis, stomachi, secoris, lienis, aliosque dolores a frigida-
se natos. Lienem quoque induratum emollit. Præcipue vero ad hydropicos ac lienosos expertum
est. Habet cera alba, lib. unam. Olei communis, lib. quatuor. Rosmarini, foliorum lauri, an. uncias
quatuor. Tamaricis, uncias tres. Ruta, uncias quatuor.² Ebuli, sabina, balsamita, ocimi, salvia,
polii, calamintæ, artemisia, helenii, betonica, branca ursina, spargula, herba venti, pimpinella,
agrimonia, absinthii, herba sanctæ Petri, ab Italis dicta herba paralytis, costi herba, foliorum sam-
buci, semperuiui minoris, herba millefolii, semperuiui maioris, chamadryos, quinque peruia,
centauri, fragaria, quinquifolii, ana uncias duas, & drachmas duas.¹⁴ Malua sylvestris radicis,
cumini, myrrha, ana unciam unam & dimidiam. Fanigraci, drachmas quinque, & scrupulos
duos. Baryri, drachmas sex. Seminis urtica, violarum, papaveris albi, menta agrestis, labiathi,
polytrichi, cardiobiani, mairissylua, herba moschata, florum chamameli, scolopendrii,
crispuli, herba caphura, syracis calamita, medulla ossium cerui, ana drach. duas. Axungia ur-
sina, gallina, & anseris, mastiches, ana unciam dimidiam. Thuris, drach. duas. Olei nardini, un-
ciam unam. Herba omnes concisa macerantur die uno in vino bono odore, altero autem e vino ext-
muntur & contundantur, & in alterum vinum bonum coniiciuntur, illicque diebus septem sinan-
tur. Oculi suo dein die hæc una cum vino coquantur, quo ad dimidium eius absumatur. Postea iniicitur
oleum, & denuo donec vniuersum consumatur vinum, decoquantur. Tandem ab igne amouentur,
& colantur: atque rursus in lebetem iniicitur oleum: cui postquam lentò igne parum fuerit calefa-
ctum, syrax, buiyrum, adipēs, mastiche, thus, oleum nardinum, & cera adiunguntur: omnibus-
que lentò igne dissolutis, ab igne auferuntur, & in vas reconduntur.

ANNOTATIONES.

Hæc est legitima & e græco Nicolai Myrepsi codice ad verbum transcripta vnguenti Marciati ma-
gni compositio. Quæ quum in latinis codicibus mirifice variet, & corrupta sit, ideo ad præscriptum Ni-
colai & iuxta præsentem descriptionem deinceps hæc vnguentum a pharmacopœis parandum erit. Id
vero quum vñtatissimum sit, & qd multa simplicium medicamentorum nomina, non omnibus obuia,
valde obscuratum: ideo nostris annotationibus illustrandum esse putauimus.

D 1 *Marciaton*) Sic in omnibus tum Græcis tum Latinis codicibus legitur. Actius quoque libro 12: *Marciati*.
cap. 44. vnguentum præclarum ad articulorum morbos, corporis languores, & resolutiones Marciaton
appellat. Vt mirari subeat, cur Cordus in suo medicamentario libro vñtatam appellationem mutauerit in
Martianum, præsertim quum Paulus etiam similiter, atque Actius, Marciaton nominent.

Cordus
notatus.

2 *Ebuli*) Nicolaus habet ἐμβύλι, pro ἐβουλι. Nam more suo latinis & barbaris vocibus passim μ litteram
adiicit, Latini codices omnes legunt Esbrii, quæ vox quum sit ex Ebuli dictione a librario imperito de-
prauata, nihil mirum est hanc quoque varietate variis interpretatam fuisse; aliis Saluiam, aliis Maioranam
esse dicentibus. Hanc itaque difficultatem nobis græcus Nicolai codex fustulit, & constat nunc, Ebulum
esse vsurpandum, utpote cuius folia hydropicis illita conueniant; non Maioranam, ut Rondeletius & al-
li nonnulli sunt arbitrati.

Esbrium.

E 3 *Balsamita*) Nos studio hanc dictionem, qua Nicolaus vsus est, in contextu reliquimus, quum hodie
quoque officinis vñtata sit. Est autem Balsamita altera Silymbri species, quam Menthā aquaticam no-
minant, vñ alibi fusiùs diximus.

Balsamita.

4 *Salvia*) Latini codices habent, Lili fragi corrupte pro Elelisphaci. Saluiam autem appellari Græcis
ἐλελίσφακιον, omnibus notum esse putamus. Plurimum in huius vocis interpretatione hallucinatur Ron-
deletius, præsertim vero quum Saluiam syluestrem, esse Verbascum syluestre Dioscoridis tradit. Ex alia-
rum vero herbarum interpretatione abunde constat Rondeletium tempore quo pharmacopolarum of-
ficinam scripsit, herbarum magnam cognitionem haud habuisse.

5 *Branca ursina*) Ita in Græcis & Latinis exemplaribus legitur, Brancæ ursinæ autem nomine duz ho-
die intelliguntur herbæ. In Italia ita nominant Acanthum. In Germania nostra Sphondylium. Nihil au-
tem refert vtram accipias, quia vtraque siccandi facultatem obtinet. Nostrates autem pharmacopœi, quū
vera Acantha destituantur, sphondylium vsurpare debent, cui etiam attenuandi inest facultas. Est autem
geminum Sphondylium, latium & syluestre.

Branca
ursina.
Sphondy-
lium.

6 *Spargula*) Non est autem Spargula, nisi ea herba, quæ Græcis & Latinis Aparine nominatur. Hanc
recentiores herbarii, quod asperitate sua vestimentis quæ contingit, pertinaciter hæreat, Asperulam di-
xerunt. Quam vocem imperitiores subinde vñius adiectione literæ deprauantes, in Aspergulam muta-
runt. Tandem priore litera detrita, abbreviantes in Spergulum, & Spargulam commutarunt. Non igitur
est Gallium, vt Cordus existimauit. Quum enim, Dioscoride teste, Aparine discutiendi facultate dona-
ta sit, eius vsus in discutiendis tumoribus Hydropicorum aptissimus erit.

Spargula.

Cordus
curat.

Herba
venti.

7 *Herba venti*) Græce est, *ἀνέμος*. Herbam autem venti varie interpretantur recentiores. Alii enim umbilicum Veneris esse contendunt. Hæc quum hydropicis competat, si haberi potest, huic vnguento non inepte inditur. Sunt qui Helxinen, seu parietariam interpretantur: alii Solidaginem minorem esse censent. Nonnulli Asclepiada, quam officinæ Hirundinariam vocant, exponunt. Aliqui Anemonem sylvestrem. Vt nihil mirum sit, pharmacopœos, vtpote magna ex parte imperitos, in ista sententiarum diuersitate quid faciendum sit, constituere non posse. Quare vt nostram interponamus sententiam oportet. Licebit quidem, vt iam diximus, vt in iis vbi prouenit regionibus, umbilico Veneris. Sine errore quoque parietaria, ob asterforiam suam facultatem, huic compositioni inditur. Cōsolida nominata minor, prorsus repudianda hoc in loco est. Asclepiadis etiam vsus sine noxa esse posset. Sed præ omnibus iis magis competit Anemone sylvestris, vtpote cui calefaciendi & discutiendi facultas insignis est: adeoque ad frigida vitia, ad quæ vnguentum hoc maxime accommodatur, vtilis admodum.

Pimpinella.
Cordus
errat.

8 *Pimpinella*) Non Italica, vt Cordus censuit, sed Germanica: quod huius facultas in præsentī vnguento acris, potius quā alterius adstrictoria, requiratur. Italica vero Pimpinella est, quam nos Sanguifor-
bam nominamus.

Herba S.
Petri.

9 *Herba S. Petri*) Quæ illa sit, metipse Nicolaus indicauit: vt hinc liceat palam cognoscere, quorundam stirpium nomina Nicolai ætate vsitata, ad nostra vsque tempora promanasse. Est autem Verbasculum odoratum latinis vocatum, quod primo vere in pratis & montanis emicat, discutiendi facultate præditum.

Costus
herba.
Herba S.
Mariæ.
Cordus
hallucina-
tus.
Costus
horrensis.
Mentha
sarraceni-
ca.

10 *Costi herbe*) Latini codices omnes habent, herba sanctæ Mariæ. Hanc autem interpretantur omnes, quos etiam Cordus sequitur, pro Persicaria. Sed errare vniuersos, e Græco Nicolai codice omnibus fit manifestissimum: qui quum Costi herbam appellet, diserte qualis esse indicauit. Nam hac appellatione non eam Costum, quam Dioscorides pingit, inuere voluit: alias enim simpliciter, & sine orani adiectione Costum dixisset: sed eam potius, quam Dionysius Vicensis, quem falso Constantinum nominant, libro vndecimo de Rustica, capite vigesimo octauo. Costum simpliciter, & alii cum adiectione Costum hortensem nominant. Hanc itaque Costum alii, quod Ruellius quoque significauit, Mariæ herbam appellant. Hodie mentha Sarraceni, & Romana vulgo, Unser Frauen mung, Germanis nuncupantur. Eam igitur, vt a Costo Dioscoridis separaret Nicolaus, Costum herbam nominauit.

Herba
crassula.
Quinque-
neruia.

11 *Semperuiui minoris*) Herba crassula, est in latinis codicibus. Sic enim recentiores Semperuium maius nominant.

Centum-
neruia.
Fragaria.

12 *Quinqueneruia*) Latini codices legunt, Centumneruia. Vtrisque autem nominibus Plantago intelligitur: priore minor, posteriore maior. Quum autem easdem ambæ facultates habeant, nihil refert vtra accipiat. Nicolaus tamen minorem sumendam innuit.

Malua
sylvestris.

13 *Fragaria*) Fragula habent Latini codices. Intelligunt autem omnes hac voce, fragariam hodie dictam herbam. Hæc quod lienosis conferat huic vnguento indita est.

Cordi
eror.

14 *Malua sylvestris*) Latini codices, Ebisci habent, nullo sane discrimine. Nam Ebiscus, malua sylvestris, Galeno etiam teste, Althea est.

Mentha
agrestis.

15 *Myrrha*) Falso in Latinis codicibus legitur Myrrha. Nam quum Myrrhæ insit calefaciendi, emolliendi & discutiendi facultas, optime huic compositioni quadret necesse est. Ita vt mirari subeat Cordum, qui Myrtum, adstrictoria donatam facultate, potius quam Myrrham, nō sine errore, huic compositioni indendam esse censuit.

Lapath.

16 *Mentha agrestis*) Latini codices habent Mentha sarraceni, sed falso. Siquidem hæc antea huic compositioni, sub nomine Costi herba indita fuit: igitur repeti hoc loco nequit. Aliam igitur per Mentham agrestem intelligat herbam Nicolaus, quam eam, quæ Sarraceni nominatur, eam nimirum, quam Menthastrum vocant, esse necesse. Nam ita sylvestrem Mentham Dioscoridis, Latini appellant auctores.

Polytrichum.

17 *Lapathi*) Rumicem Latinis dictam inaudire oportet, & maxime eam speciem, quam cum adiectione oxylapathum, officinæ autem Lapathium acutum nominant.

Carduncellus.
Cardio-
botani.

18 *Polytrichi*) Adiantum capillum Veneris officinis nominatum, aut certe Trichomanes intelligit. Nihil enim refert, quum earundem sint virium, vtram accipias.

19 *Cardiobotani*) Latina exemplaria habent, Carduncelli. Carduncellum autem interpretantur Carduum benedictum, herbam notam omnibus. Per Cardiobotan non ego censco, intelligendam esse herbam, quæ etiam nunc hodie Cardica dicitur: idque duabus de causis: Vna, quod hæc iidem Mentha species sit, quarum duæ etiam alia hanc compositionem ingrediuntur: altera, quod hæc ipsa Cardica, crassos humores incidere, attenuare, & discutere possit. Tamen quum idem possit Carduus benedictus, nihil moror hanc etiam si quis vsurpet.

Mari syl-
ua.
Herba
moschata.

20 *Marrissylua*) Non est, nisi Periclymenum Græcis dicta herba, vt alibi fufius docuimus. Vfus est autem voce Marrissylua etiam Scribonius Largus. Alio nomine Caprifolium dicitur.

21 *Herba moschata*) Est autem herba moschata, prima Geranii species: vt alibi copiosius ostendimus. Quæ commodissime huic vnguento immiscetur, eo quod attenuandi & incidendi vim habeat, adeoque lienosis, vt alibi plenius diximus, conferat.

22 *Florum chamemeli*) Hic latini codices Nicolai habent, Aleluia: quæ quidem vox per imperitum librarium in contextum rapta est, ex dictione *χαμαίμελον*, non intellecta & deprauata.

A 23 *Scolopendrii*.) Nicolaus per Scolopendrium intelligit eam herbam, quæ veteribus ita dicta est, & Scolopendrium hodie Ceterachion appellatur. Ea igitur accipienda, aut Hemionitis, quum utraq; lienosis sit accommodata, quibus hæc compositio maxime conuenit.

24 *Crispuli*.) Crispulam hodie omnes fere Bous oculum, seu Buphthalmum interpretantur. Quid Crispula autem Buphthalmi nomine inaudiendum veniat, alibi diximus; nempe Cotula non foetida recentioribus herbariis nuncupata.

25 *Herba Caphura*.) Latini codices legunt, Caphurata, quod in idem recidit. Non est autem herba Caphura, seu Caphurata, nisi Abrotonum: quo hodie passim pro scemina vtuntur, quod odore non nihil ad Caphuram accedat. Non esse autem herbam illam sceminam, sed potius Absinthium ponticum, in commentariis nostris de Stirpium historia diximus.

26 *Anseris*.) In omnibus codicibus desideratur.

B 27 *Vnc. vnam*.) Græcus manuscriptus Nicolai codex habet drachm. vnam, grava quindecim, quod pondus quum videretur nobis satis exiguum, ideo in vnc. vnam mutauimus: idq; Latiorum nobis suffragante codicum testimonio fecimus. Nam quum Latinus Nicolai codex geminata passim habeat pondera in hac cōpositione, & hoc loco vnciarum duarum mentionem faciat: certum est, inde nobis vnc. vnam sumendam esse. Hinc est, quod exemplar Ingolstadtianum diserte legat, olei nardini vnciam, vnam.

Vnguentum Agrippæ. Eiusdem. II.

A D hydropicos, lienosos, & ventrem dolentes vitale est. Dedemata, & nervorum vitia sanat. Vri-
nam mouet, extrinsecus illitum ventrem subducit, doloriq; renum succurrit. Capu bryonia ra-
dicis, lib. vnam. Radicis malua syluestris, scilla, ana lib. dimidiam. Iridis, vnciam vnam, & dimi-
diam. Radicis filicis, ebuli, tribuli marini, ana vnc. vnam. Olei, lib. duas. Tusa omnia maceran-
tur in oleo diebus octo. Dein coniecta in lebetem lento igne coquantur, & cocta exprimuntur, co-
lanturq; aridis abiectis: liquidum autem cum cera pura vncijs septem, & dimidia, in vnguenti for-
mam redigitur.

ANNOTATIONES.

1 *Agrippa*.) Sic omnia Latina Nicolai exemplaria habent, & ad regem Agrippam auctorem compo-
sitionem referunt. Manuscriptus Nicolai codex, Grypa legit.

2 *Radicis malua syluestris*.) Ita in Græco manuscripto Nicolai codice legitur, quum tamen in Latinis sit, Cucumeris syluestris: vt suspitio sit, librarium pro *μαλαχνης ἀγρίας*, substituisse *ἀνυθῶ ἀγρίας*. Quod non alia de causa factum esse arbitror, quam quod huic vnguento subducendi aluum facultas tribuatur: ideoque radicem cucumeris syluestris indere, vtpote quæ vehementem purgandi vim obtinet, voluit.

D Vtriusq; autem vsus in hoc vnguento esse potest. Si enim ad renum calculos deturbandos eo vti volumus, præstat illi Maluam syluestrem immiscere. Sin aluum potius subducere nobis consilium est, radix cucumeris syluestris potius indenda erit. Consultissimū igitur erit utroq; modo paratum in officinis ha-
bere vnguentum, vt nunc huius, nunc illius pro diuersitate morbi vsus esse possit. Desenni ex hoc loco
se explicare nō potuit, Sphingis ænigma sibi propositum, quod non nisi ab Oedipo dissolui posset, putās.

3 *Ebuli*.) Vt hinc perspicuum etiam euadat, Ebulum recte Marciato vnguento inferi.

4 *Lib. duas*.) Græcus codex vnam tantum libram habet: Sed apparet, mensuram minorem esse quam par sit: ideo alteram adiiciendam esse putauimus, idq; mōnentibus Latinis codicibus, qui habent libr. 4. geminata enim passim pondera ad banc nostram descriptionem collata obtinent.

5 *Octo*.) Tribus duntaxat diebus maceranda esse, Græcus codex innuit. Sed sit efficacius vnguen-
tum, si pluribus macerentur diebus.

6 *Vnc. septem, & dimidia*.) Græcus codex manuscriptus vnc. sex tantum habet. Nos Latinos codices secuti sumus, qui habent vnc. quindecim: Dimidiatum itaq; pondus sunt vnciæ septem, & dimidia. Sed relinquendum arbitrio Pharmacopœi, vt tantum accipiat ceræ, quantum ad vnguentum conficiendum

E satis erit.

Vnguentum Aregon. Eiusdem. III.

A D omnem dolorem frigidum stomachi & ventris, ad vterina mulierum vitia, distensiones,
quartanas, epilepsias, resolutiones, spina dolores, & renum. In quartana ante inuasionem inun-
gitur. Accipit rosæmarini, sampsuchi, iridis, serpylli, ruta, radicis malua syluestris, ana vnc. duas,
& drachmas duas. Foliorum lauri, saluæ, sabina, ana vnc. vnam, & dimidiam. Laureole, vncias
quatuor, & dimidiam. Calamintha, vnc. tres. Mastiches, thuris, ana drach. tres. Pyrethri, euphor-
bi, ana vnc. dimidiam. Zingiberis, piperis, ana vnc. dimidiam, & scr. duos. Olei moschati, drach.
duas. Petrolæi, vnc. dimidiam. Adipis ursini, olei laurini, ana vnc. vnam, & dimid. Butyri, vnc.
duas. Olei communis, lib. duas, & dimidiam. Cera alba pura, vnc. nouem. Herba una cum radici-
bus in vino die vno macerantur, altero exprimuntur, & in mortario probe tunduntur: dein oleo iny-
ciuntur, & illic diebus septem macerantur: postea coquantur, & colantur, rursusq; coquantur: &
ubi bullit: inceperint, imponitur oleum laurinum, butyrum, adipēs, & cera: omnib; q; liquatis, in-
ijciuntur oleum moschatum, & petrolæum. postremo imponitur mastiche, thus, zingiber, pyrethrum &
euphorbium, bene trita: omniaq; simul probe subacta, ab igne auferuntur, & in vase reconduntur.

ἀήρων.

1 *Aregon.*) Itz enim, non Aragon, vt haftenus Medicinam facientes consueuerunt, appellari debet. Sic enim Græco nomine ἀήρων, quasi adiutor, ob suam quam in iuuandis ægris efficaciam habet, dici potest. Hinc est quod non inepte illud Salodinus adiutorium interpretetur. In Nicolao ordine vnguentum 48. nec villo nomine priuato insignitum est. Nomen autem Aragon, vel deprauate Aragon, illi impositum est ab aliquo Græcz linguae imperito: qui in Nicolao legens ἀλεια ἀήρων εἰς πάντα πόνον σωματικόν, id est, vnguentum conferens iuuansue ad omnem stomachi, & ventris dolorem: ἀήρων vngueti huius appellationem propriam esse putauit, quod forte ita scriptum inuenerit, ἀλεια ἀήρων, εἰς πάντα πόνον, &c. Deslennius cur ita dictum sit ignorare se fatetur.

2 *Iridis.*) In omnibus Latinis codicibus, falso scribitur Iari, pro Iridis. Fuit enim improvido & incauto librario facilis ab vna in alteram dictionem lapsus. Franciscus Alexander hoc loco, vt dissentientia me occasionem habeat, mauult deprauatos codices sequi, quam veritatem amplecti.

Maluæ syluestria.

3 *Radiciſ maluæ syluestris.*) Id est, altheæ. In Latinis codicibus iterum, vt in priore vnguento, legitur perperam Cucumeris syluestris. Et is locus, priorem lectionem esse legitimam confirmat.

4 *Sabine.*) Posthæc in Latinis nonnullis codicibus subiicitur, Pulicariæ maioris & minoris, id est, ellebori albi & nigri, ana vnc. duas. Et paulo post, a laureola, foliorum cucumeris asinini: quæ sane omnia in Græco, & melioribus etiam Latinis codicibus desiderantur; adeoq; spuria sunt, ideo a nobis merito præterita & omiſſa.

5 *Olei moschati.*) In cuius inopia rutaceo, aut laurino vtendum.

6 *Olei communis.*) In Latinis exemplaribus non sine errore desideratur.

Vnguentum dialthea. Eiusdem IV.

Altheæ.

*Mucogis.

AD neruorum præcisionem, lateris dolores, omnem neruorum incontinentiam & duriciem, atq; resolutos vtile. Recipit radicis* maluæ syluestris, lib. vnam. Seminis lini, fæmigraci, ana lib. dimidiam. Scille, vnc. tres. Radices & semina, bene tusa, tribus diebus in lib. tribus & dimidia aqua macerantur: dein coquuntur, donec* succi crassitudinem acquirant, & per linteum tenue colantur, & exprimuntur. Post accipitur succi huius lib. vna, & adduntur ei olei communis lib. dua, & rursus coquuntur, donec absurtus fuerit. Dein inijcitur cera lib. dimidia. Terebinthina, galbani, gammi hedera, aut eius succi, ana vnc. vna. Postremo imponitur colophonia bene trita, resina alba pura, ana vnc. tres. Concussa, agitata aue probe, vt in lebetæ eliquentur, ab igne remouentur, & refrigerata in vase conduntur.

ANNOTATIO.

Hoc vnguentum vsu celeberrimum est ad emolliendum, calefaciendum, & humectandum. Valet ad thoracis dolorem e frigore contractum. Emollit, leuit, coquit, & discutit.

Vnguentum populeum. Eiusdem V.

*aut gemmarum, id est, florum conuincium.

Somnum conciliat febrientibus ac dolentibus caput propter calorem illitum temporibus, prodest. Febricitantibus, planta manuum ac pedum, & pulsus eo inunguntur. Irrigandum autem cum oleo rosæ, aut violaceo. Habet* oculorum in summo arboris populi, quando flores, apparentium, lib. vnam, & dimidiam. Foliorum papaueris nigri, foliorum* mandragoræ, bb rubi, hyoscyami, solani, vermicularis, lactuæ, semperuiui maioris, cc viola, & cymbalii, ana vnciam vnam, & dimidiam. Adipis suilli recentis, salis expertis, lib. vnam. Herba cum* oculis & adipe in mortario tunduntur, & in massam rediguntur, & sub ea forma diebus octo sinuntur. Dein cum gladiolo in tennes partes concisa in lebetem coniunguntur, & lento igne in vini odori lib. vna coquuntur, donec totum absurtum fuerit. Postea per linteum tenue colantur, & exprimuntur, & in vase reponuntur.

ANNOTATIONES.

1 *Foliorum mandragoræ.*) Quum a paucis haberi possint (quandoquidem mandragora in Germania, nisi sata & culta non proueniat) pro eius foliis, Hyoscyami, geminato eorundem pondere, folia accipi debent.

bb *Rubi.*) Nicolai codex diserte foliorum mentionem facit. Latini codices cymarum rubi, id est, teneriorum coliculorum, quos a prima germinatione, & in summa sui parte profert.

Vermicularis.

2 *Vermicularis.*) Hanc vocem retinuimus, quod ea Nicolaus etiam vsus fuerit. Est autem semperuiuum minus, cum albis floribus: quod sic appellatum est a rotundis suis foliis, & figura oualibus, vermiculosq; referentibus.

cc *Viola.*) Nigræ scilicet.

Cymbalium. Scatucellus. Bardana.

3 *Cymbalii.*) Intelligit folia alterius acetabuli, quod alio nomine Umbilicus Veneris dicitur. Appellatur aut id ipsum hodie quoq; Cymbalaria & Cymbalium, vt alibi fusius diximus. In Latinis codicibus nonnullis est nominata Scatucellus. Ceterum in Latinis codicibus nō recte Bardana fit mentio: quod eius in hoc medicamento, vt potest quod refrigerandi vi præditum est, nullus esse vsus videatur.

4 *Vnciam vnam, & dimidiam.*) In Græco Nicolai codice est vncia dimidia. Nos Latinos sequi codices volumus.

5 *Libra vna.*) Pondus hoc in Nicolai manuscripto exemplari fuit omiſſum, quod nos ex Latinis restituumus.

A *o. Oculis.*) Quia in nostra regione populi oculi, & herbæ quarum hic fit mētio, in idē tempus haud incidunt (oculi enim primo statim vere, id est, Martio mense erumpunt, herbæ autem Iunio vigent) ideo oculos nonnulli in mortario per se trādunt: dein cum adipe suillo diu multumq; tusos in vase operculato duos aut ternos pluresue menses, donec herbæ vigeant, recondunt. Has incisas, ligneo pistillo per se tritas, quia simul ob lentorem & multitudinem teri facile nequeunt, cum oculis populi, & adipe coquant, ut a nobis in contextu est expressum.

*Vnguentum * e¹ citrijs. Eiusdem. V I.*

* Citrijs.

A *D* *liuores & lentigines faciei a mulieribus, ac cicatrices, facientes & dealbandas, a sole factas* *ustiones, impetigines, ac pustulas a salsa pituita in cute apparentes, & in oculis ruborem. Habēt* *enim aliquam detergendi & insignem exsiccandi vim. Capit² borachij, drachmas duas. Succī sem-* *peruiui, drachm. unam. Corallij albi, unc. dimidiam. Amiantij, umbilici marini, tragacanthæ,* *amili, cristalli, Antali, Dentalij, thuris albi, nitri, ana drach. tres. Marmoris albi pari, drach. duas.* *Cerussæ preparata ex dracontio, unc. unam. Cerussæ alterius preparata ex plumbo, unc. sex. Ad-* *ipis suilli recentis, salis expertis, & pari lib. unam. Seui caprini, unc. unam, & dimidiam. Adipis* *gallinacei, unciam unam. Terantur omnia simul, excepta borace, in mortario, in tenuissimum pul-* *uerem. Adipes & seuum simul eliquentur in duplici vase. Eliquantis, & per tenue linteum colatis,* *trita omnia inyciantur, & probe ridicula subigantur. Subacta imponantur citrio uni, aut duob. aut* *pluribus, & coquantur, ebullitione una. dein rursus in lebetem conyciuntur, & additur illis borax* *seorsim tenuissime trita: subacta probe, reponuntur in vase.*

ANNOTATIONES.

C *1 E citrijs.*) Quod ea quæ compositionem eius vnguenti ingrediuntur, in citrijs malis coquantur, ita dictum esse constat. Pharmacopœi nostræ ætatis vnguentum eitrium, a colore nominant. Rectius illis eitrium, aut citreum, a citrijs, ut diximus, appellaretur.

2 Borachij, drach. duas.) Manuscriptus Græc² codex habet, *αἰθρ. β. εγχε.* id est, lapidis Borachij. Quapropter de sententia Nicolai, sumendus lapis ille erit, qui Borachius dicitur. Non est autem, nisi gemma quam fert in capite suo Rubeta, quæ Græcis *βόραξ*, barbaris Buxo, Germanis *Stette* dicitur. Rara vero hæc venenata, rubeta Latinis dicta est, a rubis & vepribus, Plinio lib. 32. cap. 5. teste, in quibus plerumque victitat. Hæc etiam in nonnullis regionibus barbara voce Borax appellatur: ut Boracis vox hoc loco ambigua sit. Nam vel rubetam significat, quæ in capite fert gemmam, quæ ab ea denominationem capiens, Borachia Latinis, Germanis *Rostenstein* dicitur: & hic a Nicolao innuitur. Hæc gemma colore interdum in candido fusca est, interdum in medio cæruleum habet oculum. Nonnunquam nigra, & maculis liuentibus notata est hæc rubetarum gemma. Interdum virides, nonnunquam versicolores eiusmodi gemmæ sunt. Aliquando in iis forma rubetarum apparet, sparsis pedibus. Gestantur in annulis a principibus, quod veneno præsentem colorem suum mutet, & quasi sudans guttas emittat. Hinc saris apparet, inter hanc gemmam & venena, naturalem quandam esse *ἀντιόξιν*. Plinius ex iis ranis lienem, & efficacius cor, ipsarum venenis, quæ ex ipsis fiunt, auxiliari, literis mandauit. Hæc igitur gemma, quod forte etiam ad exterenda cutis vitia utilis sit, huic vnguento inferenda venit. Nostri Pharmacopœi per Boracem, Arabibus appellatam, aliam rem inaudiunt, nimirum Plinio Santhernam, Chrylocollam factitiam recentioribus dictam. Nam hanc etiam barbara voce Boracem officinæ nominant, ut libro 1. huius Operis dictum est. Hæc vero, ut ibidem exposuimus, gemina existit, natia & factitia: utraq; habet calefaciendi, discutiendi, expurgandi, exterendiue & exedendi facultatem, adeo ut hoc nomine etiam huic vnguento sine errore indi possit. Cordus perperam legit, uncias duas pro drachm. duabus. Notat me hoc loco Franciscus Alexander: atqui nullo plane candore, quod aliter in Myrepsio, aliter vero in 1. de compositione medicamentorum libro Borachij vocem interpretatus sum. Quasi vero secundæ cogitationes prioribus non sint meliores. Quum Myrepsium celeriter admodum conuerterim, vna festinanter etiam passim annotationes adieci, ita ut de illis abunde cogitare tum integrum non fuerit. Quæ verò hic de Borachio annotaui, non puto me inutiliter dixisse. Sed mordet perpetuo Franciscus, ubi morsu abstinendum ei erat.

3 Succī semperuiui.) In omnibus tum Græcis tum Latinis Nicolai codicibus, legitur Caphuræ. Nos vero, ut antea multis in locis, ita hic quoque hanc e contextu sustulimus: quod non sit frigida, quemadmodum cum nonnullis Arabibus credit Nicolaus, sed calida. Et si in præsentia, si quis ea uti velit, non prohibeo, quod discutiendi, exsiccandi, & extergendi vim habeat: tamen præstat succum semperuiui usurpare, quod vnguentum hoc ad rubores oculorum præsertim commendetur: ad quos sanandos, Semperuiuum, utpote quod non solum desiccet, sed & refrigeret, commodius existit. Et dubium non est, Nicolaum, Caphuram huic compositioni, ut medicamentum frigidum & siccum, inferuisse: quale quum non sit, præstat pro ea succum semperuiui usurpare.

4 Amiantij.) Ita enim legendum: quum Græce sit *ἀμάντις*: non ut habent Latini codices, quos etiā Cordi secutus est, Amenti dulcis. Quippe incerti sunt omnes fere, quid Amentum dulce significet, Placitarius tamen in sua explanatione Antidotarii Nicolai scribit, hunc esse lapidem candidissimum, eboris ipstar. Ille verò, quum dulcis sit, in hoc vnguento locum habere nequit, quod illud abstergentia maxime medicamenta requirat. Hic lapis nonnullis Entalium appellatur, & ab Entali, cuius paulo post sepa-

ratim mentio fit differt, vt paulo post plenius dicemus. Etsi enim Cordus exponit Gypsum, tamen id facit nullo auctore. Neq; enim villus vel veterum, vel recentiorum, Gypsum dulcis discrimine distinxit. Amiantum itaq; lapidem vsurpent Pharmacopœi, qui non est nisi scissilis ille, & friabilis lapis, quem officinæ hodie Alumen plumosum vocant, vt libro primo fusiùs diximus.

Amiantus

Vmbilicus
marinus.Vmbilicus
Veneris.
Belliculi.

5 *Vmbilici marini.*) Lapis est exiguus, coloris inferna sui parte candidi, superna rubei, in littore maris repertus: & in aëtero suo latere, superno nimirum, hominis, puellarum maxime formosarum, vmbilicum referens, vnde etiam illi nomen inditum est: in altero autem planus, nisi quod lineas, veluti in domunculis ac testis cochlearum ductas in gyrum obtinet. Vocatur autem non solum Vmbilicus marinus, sed & Veneris Vmbilicus, a formosarum, vt dictum est, puellarum Venerique similium vmbilico, quem refert. Barbari Belliculos nominant. Ad quod nomen Nicolaus noster respexit, qui habet, *Βελίκοι δαλακίς*: ita vt potius Beliricus, quam Belliculus, barbaris hic lapis appellandus veniat. Germani magis ad formam eius quæ fabam exprimit, & locum in quo inuenitur, respicientes, *Meerbonen*, quasi maris fabam, vocant. Fertur puellis gratiam conciliare hic lapis. Hodie pueris argento & auro inclusum, pro amuleto appendunt mulieres. Plura de eo in nostris super nonum Galeni de simplicibus medicamentorum facultatibus commentariis.

Antali
Dentali.

6 *Antalii Dentalis.*) Sunt voces barbaræ, quibus etiam Nicolaus vsus est. Habet enim, *ἀνταλὶ δένταλι*. Alii Latinius enuntiant, Antalum, & Dentalium. Quid autem vtrunq; sit, lib. primo huius Operis, cap. 15. copiose explicauimus, vt non sit opus hic repetere. Hinc tamen planum est omnibus, Antalum & Dentalium ab Antalio quibusdam Pharmacopœis appellato, quod lapidis genus est, atq; Plateario, aliisque nonnullis amentum dulce vocatur, vt paulo ante diximus, diuersum esse, alias Nicolaus vnus medicamenti bis, quod absurdum esset in vna compositione, mentionem fecisset.

Cerussa
preparata
cum Dra-
contio.
Cerussa
duplex Ni-
colao.
Cōficiēdi
fuci mo-
dus ex Dra-
contulo.

7 *Cerussa preparata ex Dracontio.*) Latini codices Nicolai habent *Gerusa*, alii *Iersæ* serpentariæ. Videtur autem vtraq; dictio e vocē Cerussa nonnihil deprauata esse deflexa. Ex hoc autem Nicolai loco omnibus palam fit, Cerussam illi esse duplicem. Vnam, quæ fit ex Dracontio, siue serpentaria vera. Eam autem *ῥιμυδιον*, id est, fucum vocat: quod ea Cerussa mulieres ad conciliandam formam, & nitorem faciei inducendum vtantur: vt *ῥιμυδιον* hoc loco generalis vox sit ad omnem fucum. Fit autem hæc Cerussa hoc modo. Radices dracunculi maioris, aut in eius penuria Ari, vere collectæ, repurgatæ, & ad solem siccantur, subtilissime trita, macerantur in stillatitii liquoris rosarum, vnc. quatuor. Dein insolatæ in vitrea patina, linteolo tectæ exsiccantur. Postea secundo tantum liquoris stillatitii affunditur, & simili modo exsiccatur. Tertio rursus tantum prædicti liquoris affunditur. Sunt qui sæpius id faciant. Vltimo ficcata farina, cum vino odorō in pastillos digeritur, & ad vsum reponitur.

Cerussa
plumbaria.

8 *Cerussa preparata ex plumbi.*) Scilicet nigro: quæ ob id Cerussa plumbaria nominatur, quæ altera est Nicolai Cerussa, de qua copiose libro primo huius Operis cap. 17. diximus.

9 *Adipis suilli; &c.*) Horum adipum pondera in Græco exemplari Nicolai non fuerunt expressa. Adiecta igitur sunt a nobis e Latinis.

10 *Elisquaris.*) Ex hoc loco manuscriptus codex deprauatus est mirifice. Nos igitur Latinos secuti codices, hunc sensum verbis Nicolai affinximus. Sunt qui prædictis adipibus, quum liquantur, citrii mali cortices iniiciunt, & illic integro mense macerant. Quo facto, tandem trita omnia iniiciunt, & subacta citrii malis indita coquunt, & conficiunt, vt est in contextu expressum.

* Fuscum.

Vnguentum * nigrum. Eiusdem. VII.

Ad vulnera confert: siquidem in his carne creat, putrida magis, depascit. Accipit olei communis, lib. dimidiam, & vnc. tres, Cera pura, vnc. duas. Colophonia picis naualis sagapeni, vnc. vna. Mastiches, thuris, galbani, resina, terebinthina, ana vnciam dimidiam. Olea cum cera, ubi ad ignem probe liquata fuerint, iniiciatur colophonia primum, dein pix naualis, sagapenum, terebinthina, mastiche, thuris, & galbanum, vnguentumq; refrigeratum recondatur.

Vnguentum Apostolorum. Auicenna. IIX.

Efficax est ad ulcera & vulnera corumaciæ, item fistulas. Sordida ulcera emundat, purgat, exsiccatur, & deterget. Absumit carnem mortuam, & amissam restaurat; duræ emollit, & plagas sanat. Recipit terebinthina, cera alba, resina, ammoniaci, ana drach. quatuordecim. Aeris floris, opopanax, ana drachmas duas. Aristolochia longa, thuris masculi, bdellii, ana drachmas sex. Myrrha, galbani, ana drachmas quatuor. Lithargyri, drach. nouem. Olei, si astas fuerit, lib. duas. Sin hyems, lib. tres. Bdellium, ammoniacum, & opopanax in aceto, quod satis est, nocte vna macerantur: dein calefactis terebinthina permiscetur; postea in oleo adiecta cera, & omnibus reliquis in puluerem tritis coquuntur, & in vnguenti formam redacta reponuntur.

ANNOTATIONES.

- 1 *Apostolorum.*) Sic dictum voluit, quod ex 12. quot numero fuerunt Apostoli, constet simplicibus. F
2 *Aeris floris.*) Quid sit flos æris, libro 1. diximus. Pro eo Aeruginem officinæ vsurpant.

Vnguentum * Aegyptiacum. Ioannis Damasceni. I X.

* Aliis vnguentū de melle dicitur.

Vulnera vetera & fistulosa extergit, carnem excrescentem & emortuam expurgat, ac vehementer exsiccatur. Habet aruginis, 3. 5. Mellis optimi, 3. 14. Aceti acerrimi, 3. 7. Coquuntur omnia simul igne, quoad vnguenti consistentiam nanciscantur. Aliqui addunt thuris masculi, 3. 2. & dimidiā.

Vnguentum Aureum. Eiusdem. X.*

*Nongul-
lis vngu-
entum
Regis no-
minatur.

Vulnera, & plagas glutinat, accurat. Caput cere stauae, uncias sex. Olei boni, lib. duas, & dimid. Terebinthina, unc. duas. Resina pinea, & colophonia, ana unc. unam & dimid. Thuris, mastiches, ana unc. unam. Croci, drach. unam. Cera in oleo liquata, resina, colophonia, & terebinthina affunditur, tandem reliquorum pulvis adijcitur, & formatur vnguentum.

Vnguentum Aureum. Nicolai Myrepsici. XI.*

Relaxat & aperit: ideo calculosis & hydropicis maxime confert. Caput radicis maluae sylvestris, phu, mei, ana unc. tres. Ar. stolochia longa & rotunda, helenij, pulegij, hyssopi, artemisiae, pentaphylli, ruta, acori, lauri, herba venti, rosmarini, shamadryos, saxifragi, zingiberis, asparagi, ruscii radicis, & feniculi, uncias duas. Seminij apij, iridis, libyistici, granorum solis, petroselinij, seselios, cardamomi, anethi, baccarum lauri, iuniperi, lapathi, ana drachmas quatuor scrupulum unum, grana duo. Seminij citry, ocimi, si rapi, urticae, euphorbij, ana unciam unam. Adipis ursini, & vulpini, olei laurini, petrolei, ana unciam dimidiam. Floris iunci odorati, costi, pyrethri, thuris, mastiches, myrrhae, ana drachmas duas. Olei moschati, unciam dimid. Olei communis, & cera, quod satis est: singatur vnguentum.

ANNOTATIONES.

1. Aureum. Ita hoc & praecedens ab auri pretio, quod praestantissima sint, appellata fuerunt. Quamquam praecedens hoc nomen a colore etiam suo, qui aureus est acceperit. Colorem vero hunc a Croco potissimum nanciscitur. Et miror hoc Nicolai vnguentum haecenus non fuisse nostris officinis usitatum, quum tamen in calculo renum laudatissimum sit. Hinc igitur, ut deinceps parari sibi curent Medici. **E** Voluimus autem non solum hac de causa, quam nunc exposuimus, mentionem facere eius vnguenti sed ideo etiam, ut illud e Graeco codice emendatum haberent, quum in Latinis codicibus multis in locis sit deprauatum. Graecus tamen codex nullo alio nomine vnguentum hoc appellat, nisi *εἰς αὐτὰς γὰρ θαυμάσιον*, ad aurium dolorem mirabile.

2. Herba venti. Per herbam venti hoc loco Parietaria intelligenda venit, quae hodie etiam, ob suam extergendi facultatem, maiorem in modum in renum calculo ab omnibus probatur.

3. Lapathi. Latini codices habent, lapidis lyncis. Qui sane ab imperito librario ob similitudinem litterarum cum Lapathi voce, aut a scio lo quodam hic insertus est, quod lyncis lapis calculosis mirifice conferre creditus sit. Quod quidem de Lyncurio Graecorum (liquidem lapidem lyncis recentiores, p. Lyncurio habet & usurpat, q. nō est nisi succinum) recte dicitur. Itē de lapide etiā Belemnite, in quē nomē lapidis lyncis trāstulerūt. Minime autē de eo q. hodie sub hoc nomine in officinis pstat: quē Phrygiū esse lapidē, alibi demonstrauim⁹. Proinde quā tāta sit de lapide Lyncis apud Medicos dissensio, nec eus Graecus codex hac **D** in cōpositione mentionē faciat, prorsus omittendus erit: & Lapathi, seu Rumicis, vel (ut hodie appellant) Acetosae radices, quae, Dioscoride teste, calculos vesicae comminuunt, pro eo immiscendae erunt.

Vnguentum aluum soluens. Eiusdem. XII.*

*Laxati-
uum.

Aluum soluit, ad stillitidū & difficultatē urinae, ac calculos utile. Accipit succi² bryoniae, succi scilla, succi cyclamini, succi radicis³ tithymali, succi radicis ebuli, succi corticis radicis sambuci, lactuca, tithymali parui, succi chamamelis, a. 3. 1. Violarū, succi cucumeris sylvestris, mercurialis, populodij, succi, laureole succi, capilli Veneris, latyridis, elaterij, a. 3. 1. Dacrydij 3. dim. & 3. 1. Nucis Indicae, euphorbij, a. 3. dim. Succos & herbas probe iratas in olei lib. 1. & dim. inijce, & illic dieb. 7. **O**stuo autē die eo usq. coquatur, donec succi absumentur. Dein adijce cera alba, lib. dim. Fellis taurini, unc. unam. Postremo trita in puluerem inijce, & irrigata atq. subacta in vase reconde.

ANNOTATIONES.

1. Aluum soluens. Vel ut hodie nominant, Laxatiuum. Aetnaeus lib. quinto methodi *επιουαλεια* eius generis medicamentum vocat. Nam illitum ventri imo, ac pubi, aluum deicit. Stomacho autem inunctū vomitionem mouet. Non fuit nobis praetereundum hoc vnguentum, quod in Latinis codicibus sit mirifice deprauatum, & quod eius usus in iis, qui adeo delicati sunt, ut purgantia medicamenta bibere auescentur, necessarius sit, & quod ex facile parabilibus conficit. Iisdem fere rebus quibus vnguentum de Arthanita siue e Cyclamino maius Mesues constat, ideoq. Hydropicis admodum utile existit. Vermes etiam necat, & educit, licnemq. efficaciter minuit. Miscetur quoq. huius vnguenti exigua portio magno profectu infusus apoplecticorum.

2. Bryonia. Latinus codex habet, Cucurbitae agrestis: quo sane nomine hodie Latinis non appellatur. **B**ryonia quid igitur hac appellatione veniret, pauci Pharmacopoei intellexerunt. Germani quidem Caninam cucurbitam nominant, quondam tūc: ad quam forte appellationem recentiores respexerunt.

3. Tithymali. Maioris scilicet, quia paulo post minoris faciet mentionē. Nostri Esulam maiorem vocant. Codex Latinus mendose Anabula legit. est enim vox ex Tithymalo corrupta, ut omnibus patet.

4. Lactuca. In Latino codice falso legitur, Lacti. Lactucam autem aluum mollire, non tantum Dioscorides, sed & Martialis iis versiculis testatur:

Prima tibi dabitur ventri lactuca mouendo Vtilis.

ad Chamamelis. Locum illum in Nicolao deprauatum esse mihi suspicio est. Nam pro Chamamelis, legendum esse videtur Chamalex. Quod ex vnguento de Arthanita sit manifestum, cuius compositionem Mesereon, quod non est nisi Chamalex, ingreditur. Nisi quis Chamamelum, calculosorum ratione inditum esse huic compositioni putet.

Capillus
Veneris.

5 *Capilli Veneris.*) Manuscriptus Nicolai codex, quo nos in eo conuertendo auctore vsi sumus de-
prauate legit, *καπὶ τῆς πένης*, pro *καπὶ τῆς πένης*, sæpe enim Græcis literis Latinas exarare voces solet Ni-
colaus. Ceterum Capillus Veneris, siue Adiantum, hic non iniicitur vt aluum molliat. Nam, Dioscoride
auctore, illam potius sistit: sed vt, eodem & Galeno testibus calculos frangat.

Lathyrus.
Elaterium

6 *Lathyrus.*) Cataputia minor hodie appellatur Lathyrus.

7 *Elaterii.*) Elaterium medicamentum est e fructu Cucumeris syluestris factum. Quare paulo ante
per Cucumeris syluestris succum, eum qui foliis eius exprimitur, intellexit. Et hic locus confirmare vi-
detur supra in vnguentis agrippæ, & Aregon vocatis pro radice syluestris maluz, legendum esse syluestris
cucumeris.

Nux Indi-
ca.

8 *Nucis Indica.*) Latinus codex habet, Nucis vomica: & statim interpretationem subiicit, id est,
Castancola Indica: vt inde palam fiat, Nicolaum hic, non de vomica nominata nuce, quæ magis per vo-
mitum, vt appellatio eius ostendit, quam per aluum educit excrementa corporis: sed de Indica loqui, vt
pote quæ duplici nomine confert, & quia mouet aluum, & vesicæ lapidi extenendo conducit.

Vnguentum album. Eiusdem. XIII.

Ad malacutis a salsa pituita orta, pustularumq. eruptiones, confert, & pruritus carnis mitigat.
Recipit cerussa, vnc. vnam. Lithargyri, vnc. dimid. Thuris, drach. vnam, & dimid. Masti-
ches, drachm. dimidiam. Contusa omnia simul fricantur cum rosaceo oleo, donec ad succi crassitudi-
nem redigantur. Dein adijcitur lac muliebre, & stillatitius rosarum liquor purus: & in isto tempore
conquassantur, vt succi crassitiem nanciscantur: dein reponuntur in vase.

ANNOTATIO.

Hoc vnguentum haud dubie ad sanandum pruritus et salsa pituita ortum, est accommodatissimum.
Quare in vsum esse reuocandum censo.

Vnguentum album. Rhazes. XIV.

Idem, non tamen tanta efficacia, præstat. Habet cerussa in stillatitio rosarum liquore lota, vnc. 2.
Cera alba, vnc. vnam. Olei rosacei, vnc. quatuor. Fiat vnguentum. Liquefacta cera cum oleo len-
to igne remouetur semper agitando: quumq. refrigerit, cerussa tenuissime trita adijcitur, probeq. a-
gitatum vnguentum fit.

ANNOTATIO.

Dicitur hodie etiam vnguentum cerussa crudum; aut si coctum fuerit, emplastrum de cerussa. Non-
nulli hodie aliaratione vnguentum album conficiunt. Siquidem alii adijciunt albumina ouorum, alii
lithargyrum, alii caphuram: pro qua tamen ego substituendum esse succum semper uiui, ob causam iam
sæpe dictam, pnto. Exempla aliqua subiiciemus, quibus si qui volent, vt possunt.

Vnguentum album commune. XV.

Ad uersus ulcera, scabiem, & adustionem valet. Capit cerussæ, vncias tres. Olei rosacei, lib. di-
midiam. Cera alba, vnc. duas. Alba ouorum numero duo. Stillatitij rosarum liquoris, vnc.
sex. Bene subactis omnibus, fiat vnguentum.

Vnguentum album cum Lithargyro. XVI.

Accipit cerussa, vnc. octo. Lithargyri, vnc. vnam. & dimidiam. Olei rosacei, stillatitij rosarum
liquoris, ana libram dimidiam. Alba ouorum numero sex. Subactis omnibus, fit vnguentum.

Vnguentum album cum sedo. XVII.

Recipit olei rosacei, vnc. tres. Cera alba, vnc. vnam. Cerussæ, vnc. vnam, & dimidiam. Succo
semper uiui, drach. duas. Alba ouorum duo. fiat vnguentum.

ANNOTATIO.

Cum sedo.) Seu semper uiuo. Alii, cum Caphura, seu Caphuratum nominant. Nos autem Caphu-
ra, vt medicamento frigido, non esse vtendum putamus. Alii variant pondera in hunc modum. Recipi-
unt olei rosacei, lib. vnam. Cera alba, vnc. tres. Cerussæ, vnc. duodecim. Alba ouorum numero sex. Suc-
ci semper uiui, drach. duas, & dimidiam.

Vnguentum e Pompholyge. Nicolai Alexandrini. XIX.

Ad exsiccanda erysipelata, vulnera sordida, & ad sananda ulcera tibiæ valet, aliarumq. par-
tium ulcera caua implet, & ad cicatricem ducit, ac refrigerat. Habet olei rosacei, cera alba, ana
vnc. sex. Succu fructus solani satini, vnc. quatuor. Cerussæ, vnc. duas. Plumbi vsti & loti, Pompho-
lygis, ana vnc. vnam. Thuris puri, vnc. dimid. Oleum cum solani succo coquitur, ad succi consum-
ptionem. tunc adijcitur cera: qua liquata, reliquorum puluis tenuissimus admiscetur, & in mortario
subacta, ad vnguenti formam rediguntur.

ANNOTATIO.

Summa fiducia vsurpari debet, quod nulli veterum compositioni cedat. Variant etiam nonnulli pon-
dera in hoc describendo vnguento. Galenus lib. 2. ad Glaucum. medicamentum ex Pompholyge & solani
succo cancro exulcerato adhibet.

Vnguentum album infrigidansue Galeni. XIX.

Capit olei rosacei, lib. vnam, & dimid. Cera alba, vnc. sex. Liquefiant omnia simul, dein cum
aqua frigidissima, vel stillatitio rosarum liquore multoties lauensur, quoad albescant.

*Quod re-
liquis ma-
gis succat.

*Thuria.
Danda ve-
ro opera
vt nō Cad-
mia, sed ve-
ra Pōpho-
lyx inda-
tur, quæ e
fornacib.
facile ha-
beri potest
quæ admo-
dū li. 9. de
simp. me-
dic. fac co-
pio e dixi-
mus.

ANNOTATIO.

A Hoc quidem hodie alio nomine Galeni infrigidans ceratum nominatur, quod infra etiam describemus inter cerata. Confert autem illud quoque sub vnguenti forma in officinis prostare: Quare vero sic dictum sit, & quæ eius sint facultates, ibidem docebimus.

Vnguentum comitissa. Guilielmi Varignana. XX.

A Bortum prohibet, hamorrhoides sistit, ac laxatos roborat renes. Recipit membrana castaneorum inter carnem & corticem media, membrana glandium inter carnem & corticem media, membrana quercus inter lignum & corticem media, baccarum myrti, cauda equina, gallarum, corticum fabarum, acinorum vuarum, sorborum immaturorum siccorum mespilorum immaturorum exsiccatum, foliorum pruni sylvestris, radicum glauci, ana vnc. unam, & dimidiam. Contusa leuiter coquuntur in stillatitij plantaginis liquoris lib. octo, quoad dimidia pars consumpta fuerit. deinde colantur, & in colatura lauantur nouem vicibus, semper aliquid de eo quod colatum est assundendo, cera noua, vnc. octo. Oleorum myrtini, mastichini, ana lib. unam, & dimidiam. Postea inspergitur sequentium rerum tenuissimus puluis, nempe membrana castaneorum inter carnem & corticem media, membrana glandium eiusdem, membrana quercus inter lignum & corticem media gallarum, ana vnc. unam. Cineris ossium cruris bubuli, baccarum myrti, acinorum vuarum, sorborum siccorum, ana vnc. dimidiam. Pastillorum e succino, vnc. duas. Fingatur vnguentum.

ANNOTATIONES.

1 *Comitissa.* Sumtum est hoc vnguentum ex Varignana lib. 16. de curandis morbis ad menstruorum suppressionem, & abortum prohibendum, quo in nobili quadam comite, quæ iam abortus periculum fenserat, & vteri magna imbecillitate conflictabatur, prospere vsus est. Ex meris enim adstringentibus compositum, locos muliebres firmat, vterum roborat, & renes laxatos constringit, si eo inungantur. Hamorrhoides immodice promanantes sistit.

2 *Glaucii.* Codices omnes, quos ipse viderim, habent Chelidonii. Tamen quum Chelidonium acrimonia multa præditum sit, adeoque a ceteris omnibus quæ compositionem præsentem ingrediuntur, plurimum distet: non video quomodo inter ea locum habere possit. Iudico itaque Memithe scriptum fuisse, quam vocem imperitus quidam Chelidonium est interpretatus, quum Glaucium significaret. Mea igitur sententia Chelidonium ex hoc vnguento prorsus tollendum erit: & pro eo Glaucium, aut radix Bistortæ vel Tormentillæ, supponenda.

Vnguentum potabile. XXI.

D Atur ijs, qui ex alto ceciderunt: glutinat enim vulnera. Habet butyri recentis, salis expertis, lib. tres. Rubæa tinctorum, castorei, * floris maris, radices tormentillæ, ana vnc. unam. Bulliant ^{* Specimen} ^{ccii.} simul in vino odoro, ad eius consumptionem, ac formetur vnguentum.

Vnguentum rosatum. Ioannis Damasceni. XXII.

Phlegmonas, erysipelata, herpes sedat: capitis dolorem a calore ortum, ventriculi ac iecoris intemp:riem calidam mitigat. Sic fit. Axungia porci probe lauatur nouies aqua calente, & toties frigida: deinde teritur cum ea portio æqualis rosarum rubrarum recentium, quæ marcescant cum ea dies septem: coquuntur funditur uel igni lento, & colantur. rursus tantundem rosarum rubearum recentium cum ea tere, quæ dies etiam septem cum ea marcescant: funduntur, ut prius, & colantur. Tunc affunditur succi rosarum dimidium, olei amygdalarum dulcium pars sexta. Coquuntur igni lento, ad succi consumptionem, & reponuntur. Si inter coquendum inijcitur parum opij in stillatitio rosarum liquore soluti, valentius fit.

Vnguentum Basilicum magnum. Eiusdem. XXIII.

Vlcera phlegmone carentia, præsertim partium nervosarum, tergit, carnem implet. Caput cera alba, resina pini, seu vaccini, picis navalis, terebinthina, thuris, myrrha, partes æquales. Olei quod satis est. In alio, Cera, vnc. sex. Picis, vnc. tres. Aliorum, ana vnc. unam, & dimidiam.

Vnguentum Basilicum minus. Eiusdem. XXIV.

Accipit resina, picis, cera, ana. Olei, quantum sufficit. Cera in oleo liquatur, pix & resina trita inijciuntur, quibus liquatis igni auferuntur.

ANNOTATIO.

Hæc duo vnguenta conformia sunt Basilico tetrapharmaco veterum, quod inde appellatum est a mi- Basilicum
ra efficacia Regale, & quod ex quatuor constet medicamentis. Pauli in septimo, recipit ceram, resina, tetraphar-
colophoniam, picem, adipem taurinum, æqualia. Galenus solius resinæ meminit, non addita colophonia. macura.
F Cellas taurinum aut vitulinum adipem memorat: cuius loco filius Mesue, & alij, oleum miscent. Crebro fit eius tetrapharmaci apud Galenum mentio, ideo nobis non prætereundum fuit. Calefacit, humectat, phlegmonis dolorem mitigat, ac pus (Galeno lib. 4. 5. & 13. The. metho, teste) mouet. Cum eo idem est Macedo-
Macedonicum, solo thure (quod præterea æquale recipit) diuersum. Magis itaque ad maius Basilicum ac-
cedit, in quod ichthyocola, ut plerique faciunt, non inferenda: sed, ut nos fecimus, terebinthina. nicum.

Vnguentum pectorale. Nostrum. XXV.

Dolores thoracis mitigat, tussim sedat, excreationem iuuat, & crassitiem humorum attenuat. Recipit oleorum amygdalarum dulcium, chamamelini, violacei, ana vnc. vnam, & dimid. Butyri recentis, in stillatitio violarum liquore loti, vnc. tres. Adipis gallinae, anseris, ana drachmas duas. Mucaginis seminis lini, fenigraci, ana drach. vnam & dimidiam. Radicum ari & iridis, tenuissimetricitarum, ana drach. vnam. Croci, drach. dimidiam. Cera alba, quod satis est: fingatur vnguentum.

ANNOTATIO.

Varia est & multiplex vnguenti pectoralis vocati formula, cuius pro re nata parata, Nobilis tamen visa est hæc omnium esse optima, quod omnia quæ ad educendos e thorace crassos humores sunt necessaria in se complectatur. Vt hoc nomine in officinis suis paratam habere debeant Pharmacopœci.

Vnguentum aduersus scabiem. Nostrum. XXVI.

Habet terebinthina in stillatitio rosarum liquore lota, vnc. duas. Succu auranciorum duorum. Vuellus ouorum numero duos. Butyri recentis, salis expertis, vnc. vnam. Olei rosacei, vnc. dimidiam. Commixtis omnibus, fiat vnguentum.

Vnguentum aduersus scabiem. Aliud. XXVII.

Capit terebinthina in aqua rosacea lota, vnc. tres, & dimidiam. Axungia porcina, ana vnc. vnam, & dimidiam. Salis gemma, drach. duas. Sulphuris viui, drach. tres. Aluminis vsti, plumbi vsti, ana drach. duas. Cerusse, thuris, ana drach. vnam, & dimidiam. Lychargyri, drachm. tres. Cera alba, quod satis est: formeturq, vnguentum.

ANNOTATIO.

Hæc quidem duo vnguenta tutiora multo sunt iis quæ hydrargyron habent, cuiusmodi multa sunt pro vario officinarum numero diuersa.

Vnguentum aduersus lumbricos. XXIIIX.

Accipit oleorum ex absinthio, amygdalarum amararum, ana vnc. vnam, & dimidiam. Succu foliorum persicæ, vnc. vnam. Farina lupinorum, cornu ceruini vsti, mentha, gentiana, centaury minoris, ana vnc. dimidiam. Abrotani, matricariæ, ana drach. duas. Aloes hepatica, drach. tres. Felli taurini, drach. vnam, & dimidiam. Cera, quod satis est: fiat vnguentum, quo umbilicus, & totus venter inungatur.

Vnguentum aduersus pediculos. XXIX.

Recipit seminis staphysagria, lupinorum, salis nitri, ana drach. tres. Ellebori albi, sulphuris viui abrotani, absinthii vulgaris, ana drachm. vna, & dimidiam. Argenti viui exstincti, drach. duas. Auripigmenti, drach. vnam. Olei laurini, lini, ana vnc. tres, & dimidiam. Axungia porcina, vnc. duas. Aceti, drach. dimidiam. Fingatur vnguentum. Illitum pedunculos necat & extirpat.

Vnguentum ad scabiem. Nicolai Myrepsici. XXX.

Habet salis communis puri, vnc. vnam. Adipis suilli puri, drach. quinq. Thuris puri, drach. duas, & dimidiam. Lychargyri, drach. tres. Succu plantaginis minoris, succu fumarie, ana vnc. dimid. Olei laurini, vnc. tres. Cera, vnc. vnam. Oleum & adipem ad ignem adiecta cera liquantur, deinde cum succis bulliunt, quoad succi consumuntur, postea reliqua tenuissime trita iniiciuntur, & fingitur vnguentum.

ANNOTATIO.

Huius vnguenti ideo mentio a nobis facta est, quod nonnulli ipsum, præterito auctore Nicolao, referant: & pro lychargyro argentum viuum, cuius hic nullam mentionem fecit Nicolaus, substituunt. Vt igitur legitima eius in officinis exstaret compositio, non omittendum esse putauimus. Pari modo Enulati vocati vnguenti quidam compositionem anonymam afferunt, quæ itidem est inter Nicolai compositiones vnguentorum postrema, quam etiam hoc nomine subiiciemus.

Vnguentum ex * Inula. Eiusdem. XXXI.

Itidem ad scabiem utile est. Caput radici inula bene lota, & cum aceto cocta, & bene tusa, lib. vna. Axungia porcina, olei communis, ana vnc. tres. Cera noua, vnc. vnam. Argenti viui salua hominis ieiuni exstincti, terebinthina lota, ana vnc. duas. Salis communis bene triti, vnc. dimid. Cera in oleo liquatur, deinde axungia post additur inula: dein argentum viuum & sal, postremo terebinthina, & fit vnguentum.

ANNOTATIO.

Nicolaus ex tribus tantum, nempe radice Inula, adipe suillo, & argento viuo componit hoc vnguentum: reliqua igitur omnia a posterioribus sunt adiecta, qui non nisi ex multis simplicibus compositis medicamentis delectantur. Sunt tamen qui argenti viui loco, salubriore consilio, sulphur addunt.

Vnguentum * Reprimens. XXXII.

Accipit boli armenij, vnc. vnam. Terra lemnia, vnc. dimidiam. Sanguinis draconis, 3. 3. Olei rosacei, vnc. duas. Aceti, drach. sex. Cera, 3. tres. Commixtis omnibus fiat vnguentum.

ANNO.

Enulatum
vnguentum.

* Inula.

* Defensiuum,
Barb.

ANNO TATIO.

A * *Reprimens.*) Defensuum recentiores nominant, quod illitum partibus eas tueatur ac prohibeat ne aliquid ad ipsas confluat. Reprimendo enim fluxum ne quid ad illas decurrat, inhibet.

Vnguentum exsiccatorium. XXXIII.

Recipit lapidis calaminaris vocati, terra Lemnia, ana vnc. quat. Lithargyri auri, cerusse, ana vnc. tres. Succus semperuini, drach. duas. Cera, vnc. quinq. Olei rosacei ex omphacino oleo facti, vnc. duodecim. Formetur vnguentum. Lithargyros cum oleis aliquandiu ad ignem nutritur, cera dein liquatur, reliquorum pulvis tenuissimus additur.

* Caphur
eieimus.
† Oleum
violaceū
sublatum.

ANNO TATIO.

i Alio nomine vocatur desiccantium rubrum. Efficax est ad scabiem humidam ex pituita putri & falsa: eam enim exsiccatur, & pruritus compescit.

Vnguentum Reficiens. XXXIV.

Extenuatos supra modum, & exsiccatos reficit ac recreat. Hecticis ob id, & cibum non sentientibus utile. Thoracem quoque dilatat, ideoque asthmaticis & suspiriosis conducit. Habet olei violacei, vnc. sex. Butyri recentis salis expertis, uncias quatuor. Axungia suilla recentis salis expertis, gallinacea, anseris, anatis, ana vnc. duas. † Oesypi, vnc. dimidiam. Mucaginis tragacanthæ, seminis cotoneorum, lini, & altheæ, mucaginis gummi Arabici, ana vnc. vnam. Cera alba, vnc. quinque. Commixtis omnibus formatur vnguentum.

* Refugit
uum
Barb.

† Hyssopi
humidi
Barb.

Vnguentum tripharmacum. Ioannis Damasceni. XXXV.

Prodest scabiei, & cutis ulceribus. Caput lithargyri tenuissime triti, vnc. tres. Aceti, vnc. vna, & dimidiam. Olei rosacei, † quod satis est. Teruntur in mortario plumbeo sine cera.

* Nutritū,
Barb. & de
lithargyro
nutrito.
† alii, lib.
dimidiam.

ANNO TATIO.

i *Cutis ulceribus.*) Pruritus & desquamata iuuat, siccatur sine morsu, carnem creat, & cicatrice inducit, cruentaque glutinat, Lithargyros namque vino aut aceto tritus & siccatus vulneribus medetur, quæ ob humiditatem vix cicatrice clauduntur. Galenus lib. i. de compos. medic. general. capitibus 6. 7. 8. & 9. lithargyrum vino & oleo, aceto & oleo, item aqua & oleo temperat in mollioribus naturis, paratque emplastrum ex lithargyri parte vna, olei & aceti duplo maiore portione. Coquit omnia, donec omnino cohibitum fuerit oleum, acetum vero exspirasse videatur, nec iam inquinet, & nigro splendeat. Oleum autem accipit vetus, quod multo magis exsiccatur, acetum acerrimum pellucidum, vinum non aquosum. A tripharmaco hoc Mesues alia re non differt, quam quod plus habet aceti & olei. A nutrito autem, quod in illa cruda est materia, unde non ita siccatur. Potentissime Galeni emplastrum siccatur, ulcera curatu difficilia sanat, fistulas quæ nondum callum contraxerunt, eoque parotidas indicatorias quibus iam fistula successit, in pueris sanauit.

Vnguentum cyclamini maius. Eiusdem. XXXVI.

Illitum stomacho, vomitus purgat: hypogastrio autem inunctum, aluum deiecit: ob id hydropicos mire iuuat, serosum excrementum large vacuando. Vermes quoque necat & educit. Adhibetur ijs, qui purgans medicamentum sumere nequeunt. Accipit succi cyclamini, lib. tres. Succus cucumeris syriestris, lib. vnam. Olei irini, lib. duas. Butyri vaccini, lib. vnam. Pulpa colocynthidis, vnc. tres. * Polypodij, vnc. sex. Euphorbij, vnc. dimidiam. Arida hæc tria teruntur, & macerantur in succis & oleo, vase in vitreo angustioris bene obstructo, diebus octo. Postea nono die lento igne coquuntur, & colantur. Colato adduntur sagapeni, aur. quinq. Myrrha, aur. duo. Prius autem hæc duo in aceto, quod satis est, dissoluuntur. Coquuntur iterum, quoad succi absumentur. Dein adde cera, vnc. quinque. Fellis taurini, aur. quinque. Feruefiant simul, donec cera liquatur. Tunc inspergitur paulatim pulvis sequens: nempe Scammonij, aloes, mezerei, colocynthidos, sarpeti, ana aur. quinq. Euphorbij, aur. duo. Salis gemme, aur. tres. Piperis longi, zingiberis, chamamelis, ana aur. duo. Commixtis omnibus fiat vnguentum.

* Arthraul.

* alias quæ
tuor.

Vnguentum cyclamini minus. Eiusdem. XXXVII.

Ienis tumores etiam scirrhusos dissoluit, & strumas discutit. Recipit succi cyclamini succi glutinosi ex radice filicis expressi, succi ebuli, ana uncias nouem. Succus summitatum tamaricis, uncias duas. Olei irini, lib. duas. Oesypi, drach. quinq. Hammoniæ, bdellij, ana drachm. vnam, & dimidiam. Aceti, quod satis ad gummi utriusque dissolutionem. Cera flaua, vnc. sex. Corticum radicum capparis, vnc. vnam, & dimidiam. Spicæ nardi, vnc. dimidiam. Formatur vnguentum.

ANNO TATIO.

i Si cyclamini radices recentes haberi non possunt, tuac fumendæ radicum aridarum lib. sex, & contusa coquendæ sunt in aqua, succusque, ut ex Glycyrrhiza, eliciendus.

Vnguentum ex alabaſtro. Inſerti auctoris. XXXIIX.

Capitis, & oculorum poſſimum morbis, fronti, & temporibus illitum, item podagricis & articuloſorum doloribus conſert. Habet olei roſacei, lib. vnam. Vini albi clariſſimi, lib. duas. Florum chamameli recentium, vnc. quatuor. Ruſea viridis, cymarum rubi, ana manipul. vnum. Foliorum ſeniculi, viridis vnc. duas. Bulliant lentum ad ignem donec vinum abſumatur, dein coletur, & adijciantur cera liquata, vnc. tres. Poſtremo ubi ab igne remota fuerint, adduntur alabaſtri exatiffime triti vncia ſex. Albumina ouorum numero duo, & commiſtis omnibus fiat vnguentum.

DE EMPLASTRIS, SECTIO XVI.

Emplaſtrum¹ diachylon ſimplex. Ioannis Damasceni. I.

Pollet aduerſus duritiem iecoris, lienis, ventriculi, & aliarum partium. Strumas quoq; diſcutit. Habet mucaginis ſeminis ſcenigraci, ſeminis lini, & radicis altheae, ana lib. vnam. Lithargyri purgati, plumbo & ſcoria, tenuiſſime triti, libr. vnam, & dimidiam. Olei veteris clari, libr. tres. Lithargyrum & oleum diu & multum in mortario² lapideo, piſtillo ferreo ſubiguntur & miſcentur. Poſt igni lento coquuntur ſpatha rudiculae ſemper agitando, donec liquetur lithargyrum, & craſſeſcat. Tunc ab igne amouetur, & paulatim frigefcit. Interim mucagines parum ſeruſcunt: ac poſteaquam per ſe cocta fuerunt, paulatim lithargyro & oleo piſtillo ligneo permixcentur. Poſtremo omnia ſimul ad iuſtam craſſitatem percoquantur. Valentius³ ſoluit & maturat, ſi addatur pulvis iridis. Magis item erit anodynum ſi mucago ſeminis meliloti acceſſerit. Praſtantius quoq; fiet, ſi oleo olei communis tritum, & chamamelinum acceperit.

ANNOTATIONES.

¹ *Diachylon.*) Appellatur hoc emplaſtrum a lentis ſuccis, ſiue mucaginibus. Barbari Medici, hodie facientes Medicinam, Diachylon, non ſine eruditorum riſu, nominant. Alio nomine Diachylon ſimplex & commune, & album dicitur, propter lithargyrum & oleum aqua communi vel falſa diligenter lota. Albedinem vero ei addit ſal paucus initio extrahendae mucaginis admixtus, pauca ſeminis ſcenigraci copia, & coctio medicoris. Vtriuſq; namq; immoderatus modus, ſtuum emplaſtrum facit.

² *Lapideo.*) Si fieri poſteſt, in mortario e duriffimo lapide conſtructo ſubigantur. Hodie aere maxime Pharmacepcei vtuntur. Exemplo autem huius Emplaſtri, in aliis quoq; metallica prius oleo, vino, aceto, aut alio quodam liquore citra ignem nutriuntur, & in pila rudicula vel piſtillo continenter mota craſſeſcunt.

³ *Pulvis iridis.*) Vnciam ſcilicet vnam in ſingulas libras. Sed tunc adijciendum cum illo puluere aliquod oleum.

Emplaſtrum dia chylon compoſitum. Inſerti auctoris. II.

Phlegmonas ad ſuppurationem ducit, duritias emollit, & diſcutit. puſq; rupta phlegmone abſtergit. Accipit mucaginis radicis altheae, ſeminis lini, mucaginis membrana inter corticem & lignum ulmi media, mucaginis ſcenigraci, ana vnc. quatuor. Oleorum chamamelini, liliacei, anethini, ana vnc. vna. Ammoniacy, galbani, opopanax, ſagapeni, ana vnc. dimidiam. Cera noua, vnc. viginti. Croci, 3. duas. Terebinthinae, vnc. duas. Gummi in vino optimo diſſolutis, fiat emplaſtrum.

Emplaſtrum dia Chylon magnum. Ioannis Damasceni. III.

Scirrhus emollit, & diſcutit. Recipit lithargyri puri, triti, & creti, lib. vnam. Olei irini, anethini, chamamelini, ana vncias octo. Mucaginis ſeminis lini, & ſcenigraci, & ficuum pinguium, & vuarum paſſarum, ſucci iridis, & ſcilla, & ſypi, * ichthyocolla, ana drachm. duodecim, & dimidiam. Terebinthinae, vnc. tres. Reſina pini, cera ſtaue, ana vncias duas. Formetur vt Diachylon ſimplex, ſiue commune.

ANNOTATIO.

Huius emplaſtro ſi acceſſerit bdellii, ſagapeni, ammoniacy, galbani, ſingulorum vncia vna, Diachylon gummatum vulgo vocatur, aut nigrum. Hoc inflammata & dura ſedando, molliendo, ac diſcutiendo magis eſt efficax, ideoq; magnum dicitur.

Emplaſtrum dia chylon paruum. Eiuſdem. IV.

Tumores¹ calidos diſcutit & maturat. Habet lithargyri, vnc. ſex. Olei veteris clari, lib. vnam. Mucaginis pſyllij, vnc. quatuor. Mucaginis ſeminis hyoſcyami, vnc. vnam, & dimidiam. Mucaginis ſeminis lini, & radicis altheae, ana vnc. duas. Fiat vt primum.

ANNOTATIO.

¹ *Tumores calidos.*) Praecipue phlegmones duras. Efficaciſſimumq; eſt ad mulcendam intemperiem calidam pſyllij & hyoſcyami ratione. Item ad ſiccandum & diſcutiendum lithargyri nomine & aliorum quorundam.

Empla-

A Emplastrum e mucaginibus. Incerti auctoris. V.
E Molli durities omnes. Caput mucaginis seminis lini, althea, fenigraci, membrana inter corticem & lignum vlni media, ana unc. quatuor, & dimidiam. Oleorum lilacei, chamamelini, anethini, ana unc. unam, & dimidiam. Ammoniacy, galbani, opopanacis, sagapeni, ana unc. dimidiam. Croci, drach. duas. Terebinthinae, unc. duas. Cerae nouae, unc. viginti. Fiat emplastrum. Nonnullis Diachylon compositum dicitur.

ANNO TATIO.

B 1 Fiat emplastrum.) Mucagines enim ipsae, cortice vlni inter corticem & lignum medio bene prius contuso, oleis antea residentia purgatis, vel linteo sine expressione colatis in coquendo consumantur. Quibus adhuc calentibus, cera minutim secta immittatur, & gummi aceto, vel chamamelis & meliloti decocto soluta, & linteo colata oleo & cerae calidis commisceantur. Crocus tritus marmoris aspergitur, & manibus magdalias ducendo permiscetur.

Emplastrum diachylon. Nicolai Myrepsici. VI.

A Domum phlegmonem ob duritiem factam confert. Dolores demolitur. Proprie vero podagris, & arthriticis succurrit. Accipit farinae fenigraci seminis lini, ptisanæ, ana lib. dimidiam. Succulentis radicis altheæ, visci, lithargyri, ana lib. unam. Cerae, lib. dimidiam. Olei communis, lib. unam & dimidiam. Coquuntur oleum, lithargyrum, & succus ebisci, donec non inquinent, manus ne contaminent, dein reliqua adijciuntur.

Emplastrum e baccis lauri. Ioannis Damasceni. VII.

C V Entericuli, intestinorum, iecoris, renum, vesicae, uteri, & partium aliarum dolorem a flatibus aut frigida intemperie ortum, placat. Recipit thuris, mastiches, myrrhae, ana unc. unam. Baccarum lauri, unc. duas. Cyperi, costi, ana unc. dimidiam. Mellis colati, quantum ad ea comprehendenda sufficit. Si autem cyperi unc. unam & dimid. & stercus caprae aut vaccae siccum pondere omnium adijcias, ad hydropem fit mirabile.

ANNO TATIONES.

1 Placat.) Praecipue vero in colico dolore a flatibus & pituita calidum ventris salubriter adhibetur, aut infuso supponitur, ad vnciam aut sesquunciam cum eorum quae flatibus dissipant, & tensionem remittunt decocto. Visurpatur etiam in ascite & tympanite ventri extensum, ubi stercora sicca, caprinum nimirum aut columbinum, receperit tuncq; mel largiore copia affundendum est, quantum scilicet omnibus excipiendis suffecerit, quod utrobique calidum & liquatum potius quam colatum esse debet, ne emplastrum æquo durius euadat.

D 2 Colat.) Alias calidi, id est, liquati. Ipsum vero largius addendum est, si stercora misceantur, quantum scilicet omnibus excipiendis satis erit.

Emplastrum e baccis lauri. Incerti auctoris. IIX.

I Dem quod praecedens potest. Habes soliorum ruta aridorum, drach. decem. Seminis ammeos, cari, dauci, nigellæ, cumini, libystici, origani, feniculi, baccarum lauri, piperis nigri & longi, amygdalarum amararum, acori radicis, castorei, ana drach. duas. Opopanacis, drach. tres. Sagapeni, drachmiae quatuor. Haec trita melle cocto pondere omnium excipiuntur.

Emplastrum ventriculorum & iecur calefaciens ac roborans. Ioannis Damasceni. IX.

E Caput ligni aloes, absinthii, gummi arabici, mastiches, cyperi, costi, zingiberis, ana unc. dimid. Calami odorati, thuris, aloes, ana drach. tres. Caryophyllorum, macis, nucis moschatae, galliae moschatae, cinamomi, spicae nardi, florum iunci odorati, ana drach. unam, & dimidiam. Excipiuntur Miua aromatica. Vnus tempore, quum panno intenderis, suffies ligno aloes.

ANNO TATIO.

1 Suffies.) Quo 1 hoc modo fit: Emplastro super panno extenso, lignum aloes minutatim incisum, carbonibus ignitis imponitur, & manibus apprehensum emplastrum sic tenetur, ut accensi ligni fumum in se recipiat, & calefactum tandem laboranti loco imponitur.

Emplastrum e meliloto. Eiusdem. X.

F Molli duritiem omnem ventriculi, iecoris, lienis, viscerum, & reliquarum. Accipit meliloti, unc. sex. Florum chamamelis, seminis fenigraci, baccarum lauri, radicis altheæ, absinthii, ana drach. tres. Seminis apij, ammeos, cardamomi, cyperi, iridis, casiae, spicae nardi, ana drachm. unam, & dimidiam. Sampsuchi, drach. tres. Ammoniacy, drach. decem. Stryacis, bdellii, ana drachm. quinque. Terebinthinae, unc. unam, & dimidiam. Ficuum pinguium, numero duodecim. Seui caprini, resinae, ana unc. duas, & dimidiam. Cerae, unc. sex. Olei sampsuchini, & olei de spica, quod satis est. Aqua cui melilotus, fenugracum, & chamamelum incocta sunt, quantum satis erit aliorum infusioni commiscetur, & secundum artem fit Emplastrum.

ANNOTATIONES.

¹ *Reliquarum.*) Scilicet partium emolliendam, hypochondriorum tensionem laxandam, flatusque resolvendos. Vimur eo igitur ad molliendum, attenuandum, discutendum, & calefaciendum, estque anodynum.

² *Fis emplastrum.*) Alii aliter componunt. A nonnullis seuum hircinum colatum, resina, & cera in oleis liquantur, ficus pingues aut parum humectatae probe tritae per cribrum setaceum, aut mantile stameae cernuntur, & praedictis miscentur. Dein ammoniacum, bdellium in aceto solvuntur & colantur. Acetum namque essentiae tenuitate promptius ista peruat & dissolvit, aqua vero acrius. postea terebinthina, postremo ubi omnia refrigerint, pulveres triti herbarum, radicum, florum, aromatum, & simul cum iis styrax per se diligenter tritus, admiscetur. Haec ceteris, quas misce facimus, expeditior esse videtur; ideoque hanc indicasse vnam, satis sit.

Emplastrum tripharmacum. Eiusdem. XI.

Idem quod unguentum Tripharmacum potest. Recipi lithargyri subtilissime triti, aceti, ana lib. dimidiam. Olei veteris, lib. vnam. Coquitur igne lento, ad crassitiem.

Emplastrum oxycroceum. Nicolai Myrepsici. XII.

A Dossa contusa, nervos, ac dolores, & ad omnem contusum locum idoneum. Habet Croci, Picis navalis, colophonia, cera, ana vncias duas. Terebinthina, galbani, ammoniaci, myrrha, thus, mastiches, ana vnciam dimidiam, drach. vnam, & dimidiam. Galbanum & ammoniacum conjunguntur in acetum, & in eo per noctem macerantur, postridie liquantur igitur, colantur: iterum conjunguntur ad aceti consumptionem tunc pix navalis liquata & colata miscitur, dein cera: qua liquata, colophonia: dein terebinthina, post mastiche, myrrha, & thus, tenuissime trita, semper spatula movendo. Cocta, ubi iam refrigerunt, funduntur super marmor oleo inunctum, & crocus in pulverem tritus inspergitur, ac subigitur, & fingitur massa.

ANNOTATIONES.

Oxycroceum cur dictum?

¹ *Oxycroceum.*) Sic dictum est ab aceto & croco, quae huius compositionem ingrediuntur.

² *Vncias duas.*) Pondera haec plane habentur in Graeco Nicolai codice, quae retinenda esse duximus. Latina exemplaria geminant pondera, ideoque hic habent vncias quatuor, & paulo post vnciam vnam, & drach. tres. Nihil autem refert, siue quis plus aut minus recipiat, modo proportionem legitimam servet. Cordus haec quintuplo plus accipit pondere, nempe vncias duodecim. Tamen in altero pondere proportionem non servat, propterea quod vncias quatuorumat.

Cordus

Emplastrum Apostolicum. Nicolai Myrepsici. XIII.

Omnis nervorum praecisiones & puncturas a ferro factas, a phlegmone arcet, cruentis vulneribus destinatum. Eductis surculos, calamos zela, & omnia venenata. Extrahit omnia aliena, in profundo corporis sita. Facit ad abscessus, carcinomata phygela, & cervicis dolores: strumas perniciose & maligna ulcera rumpit. Prodest ad duritiem lienis, influxiones articularum, & defluxiones genuum. Valet ad eos qui a rabidis animantibus morsusunt, & quaecumque discutere oportet. Caput lithargyri, vnc. duas, drach. vnam, serap. vnum. Cera, colophonia, ana vnc. vnam, scrupul. vnum. Ammoniaci, drach. duas. Galbani, myrrha, ana drach. vnam, scrupul. vnum. Bdellii, drachm. duas. Resina pinea, mastiches, ana drach. quatuor. * Manna, thus, ana drach. 2. Aeruginis rasilis, drach. vnam, scrupul. vnum. Opopanax, aristolochia longa, drach. vnam, serap. vnum. Olei veteris, vnc. duas. Tritum lithargyrum, & per cribrum tenuissimum exscreatum, coquitur cum oleo ad lentum ignem. Aerugo, postquam lithargyrum ad medietatem coctum est, miscetur. Vbi ad iustam consistentiam coactum fuerit, adijcitur cera & colophonia: ubi ab igne summorum fuerit, insperguntur reliqua trita & cribrata. Opopanax autem, & galbanum vino dissoluta, postremum adduntur.

* Thuris pollinis

ANNOTATIONES.

Apostolicum cur dictum?

¹ Haec est Apostolici emplastri apud Nicolaum legitima compositio, quod sic propter suae facultatis efficaciam dictum est: & ut Nicolaus adiicit, ob specierum numerum, qui duodecim apostolorum numerum aequat. Siquidem duodecim species, eius compositionem ingrediuntur, nempe lithargyrum, 2 colophonia, 3 ammoniacum, 4 galbanum, 5 myrrha, 6 bdellium, 7 mastiche, 8 manna, 9 thus, 10 erugo rasilis, 11 opopanax, 12 aristolochia. Quapropter hinc apparet, aliis compositionibus, quae in Latinis habentur codicibus, multa accessisse, quae numerum duodenarium plurimum excedunt, adeoque apostolici nomenclaturam sibi parum recte vendicant. Quae qualia, & quot sint, ex sequenti compositione, quam c Latino Nicolai codice descripsimus, quaeque haecenus in officinis Medicorum usitata fuit, cognoscetur.

² *Postremum adduntur.*) Signum coctionis est, dum medicamento pars aquae frigidae infusa duratur, nec digitos attractu inquinat. Ita percoctum in aquam frigidam infunditur, quae dum refrigit, manibus exprimitur, & super marmor oleo laurino inunctum in magdalias efformatur.

Empla.

Emplastrum Apostolicum Nicolai Alexandrini. XIV.

A Caput lithargyri, vnc. sex. Cera rubea, colophonis, an. vnc. duas. Propoleos, visci quercini, ana vnc. unam. Ammoniacy, lapidis calaminaris, an. vnc. sex. Mastiches, thuris, mumia, an. vnc. dimidiam. Terebinthina, galbani, bdellii, myrrha, aris vsti, sarcocolla, squama aris, dictamni, aristolochia rotunda, prassii viridis, opopanax, an. drach. tres. Olei, quod satis est. Lithargyrum in tenuissimum redactum puluerem in oleo coquatur, & cum spatula agitur, donec fiat massa purpurea & non adhaereat manibus dum refrigerata tractatur. Ammoniacum, galbanum, & opopanax in vino per noctem macerentur, & postmodum ad vini consumptionem coquantur. Postea cera liquefacta & colophonia, dein mastiche, thuris, myrrha, bdellium, & alia trita in puluerem insperguntur, postremo autem dictamnus.

AN NOT A T I O N E S.

Huic compositioni nouem adduntur, quæ in Græcis, & merito quidem, modo nomen suum retinere velit, desiderantur, vt est 1. propolis, 2. viscum quercinum, 3. lapis calaminaris, 4. mumia, 5. as vstum, 6. sarcocolla, 7. squama aris, 8. dictamnus, 9. prassium viride. Quapropter si legitimo Apostolico vt velint pharmacopœi, id quod e duodecim duntaxat constat speciebus, componant, nō id quod e pluribus concinnatur.

1. *Squama aris*) In latinis codicibus mendose legitur. Lapidis calcis. Error autem e Græcis parum recte scriptis promanauit. λέπιδος enim χάλυκος scriptum fuisse videtur: quæ verba imperitus librarius in lapis calcis mutauit. Pari ratione calcecumamenon, deprauate pro χάλυκος καυπύς scriptum est in iisdem codicibus.

2. *Prassii viridis*) Per prassium autem viride hic non intelligenda erit, nisi arugo, quam officina viridis de aris nominant. Prassium viride.

3. *Olei, quod satis est*) Magnopere enim videndum est, vt moderata olei copia nullum emplastro negotium faceat. Liberaliore namque modo appositum, magnum temporis intervallum ad cocturam expetit. Parcior vitionem facit, & priusquam cetera quæ liquefieri debent, apponantur, plus iusto coit emplastrum & adhæsum facit. Iustus est olei modus, si ad Lithargyri pondus, olei sesquipondo addas. As vstum quoque pro liberaliore aut parcior copia, emplastrum nigrum, aut rubrum reddit.

Emplastrum album coctum simplex. XV.

Securrit intertriginibus, & cutis desquamations a uulsionibus, quacunque ex occasione factis. Recipit olei communis lib. duas. Cerussa, lib. unam, & dimidiam. Cera alba, vnc. quatuor. Coquantur secundum artem, & fiat emplastrum.

AN NOT A T I O.

1. *Coctum*) Quia sola coctura ab unguento albo differt. Non secus unguentum tripharmacum & tetrapharmacum cocturæ modo in emplastra transeunt. Dicitur alio nomine Emplastrum de cerussa.

Emplastrum album coctum, compositum. XVI.

Habet cerussa, uncias viginti. Olei communis, uncias decem. Mastiches, vnc. quatuor. Thuris, vnc. sex. Terebinthina, vnc. unam. Cera, uncias quatuor. fiat emplastrum.

Emplastrum ceroneum, Nicolai Alexandrini. XVII.

Ad dolorem scapularum & thoracis a frigore ortum val. Lienis duritiem remouit. Aquam inter cutem a frigida iecoris intemperie natam sanat, & vteri vitii ex eadem causa procreatus prodest. Lumborum, pudendorum, vesicae, & renum frigus vi sua cal. faciente dissipat. Ossium fracturis, & luxatis commodat. In summa repellit, coquit, mollit, carnesque procreat. Caput picis navalis colata, cera, an. vnc. duas, drach. tres. Sagapeni, vnc. duas. Ammoniacy, terebinthina, colophonis, croci, an. vnc. unam, drach. tres. Aloes, thuris, myrrha, an. vnc. unam. Opopanax, styracis calamita, galbani, mastiches, aluminis, fenigraci, an. drach. sex. Styracis rubri, bdellii, an. drach. tres. Lithargyri, drach. unam, & dimidiam. Sagapenum, ammoniacum, opopanax, & galbanum aliquantulum iusa vino tecta per noctem macerantur. Dein ad vini dimidii consumptionem coquantur, tunapix navalis bene colata admiscetur, & spatula mouetur quoad liquefiat. Hac liquata, cera additur: qua fusa, colophonis colata, postea styrax pistillo calido tritus frustatim imponitur: hinc mastiches, ibus, myrrha, bdellium, trita ac creta aliquandiu post iniicitur terebinthina, alumen, lithargyrum, fenugracum. Percoctum, effunditur in aquam frigidam. Ab extracto, aqua omnis manibus exprimitur: dein cum puluere aloes super marmor oleo laurino unctum subigitur. Postremo cum croco in puluerem trito, manibus eodem oleo unctis, finguntur massa.

AN NOT A T I O.

1. *Ceroneum*) Forte Ceroma, a cera dictum est. Hoc emplastrum, vt sequentia aliquot, quæ ad Nicolaum auctorem referuntur, in Latinis duntaxat Nicolai Præpositi codicibus reperiuntur, quæ quum hodie vitata in nonnullis officinis, prætereunda nobis esse non putauimus.

Emplastrum de Ianua, Nicolai. XVIII.

A Ccepit succorum apii, plantaginis, betonice, an. lib. unam. Cera, picis, resina, terebinthina, an. li. dimidiam. Formatur emplastrum hoc modo. In succis reliqua tria, nempe cera, pix, & resina. lento igni coquuntur, & continenter mouentur ad succorum consumptionem: postremo terebinthina mista semel aut bis feruescit. Utuntur eo Chirurghi in ulceribus & vulneribus sordidis detergendis & glutinandis.

Emplastrum Gratia Dei, Nicolai. XIX.

R Ecipit terebinthina, lib. dimidiam. Resina, lib. unam. Cera alba, uncias quatuor. Mastiches, unciam unam. Verbenae, betonica, pimpinella, an. manipulum unum. Herba tusa ex vino albo valenti seu generoso coquuntur ad tertiae partis vini consumptionem: colantur, herbarum substantia abicitur. In colato, cera, resina, mastiche coquuntur, ad instam consistentiam. Auferuntur ab igne: additur terebinthina, spatula mouetur, & fit emplastrum.

ANNOTATIO.

¹ Mastiche) Satius ex cera & resina in colato vini reliquo ad eius prope consumptionem percoctis mastichem addere, quod cocturam propter essentiae tenuitatem vix sustineat, postremo terebinthinam, hac semel feruefacere, auferre igni; & ubi refrigerint, fingere in ossas cylindricas. Vsurpant illud Chirurghi in solidandis & glutinandis ulceribus & vulneribus sordidis repurgandis, inflammatis leniendis, duratis emolliendis, neruorumque praecisionibus.

Emplastrum¹ diuinum. Nicolai. XX.

H Abet galbani, myrrha, an. unciam unam, drach. duas. Ammoniacy, unc. tres. drach. tres. Opopanacy, mastiches, aristolochiae longa, aruginis, an. unc. unam. Lithargyri, olei communis, an. lib. unam, & dimidiam. Cera noua, unc. octo. Thuris, unc. unam, drach. unam. Bdellii, unc. duas. Magnetis, unc. tres. Lithargyrum in oleo diu maceratur & nutritur, postea ad spissitudinem² coquitur. Dein additur cera minutim coacta: qua liquata, aufertur ab igni: adiicitur galbanum, ammoniacum, opopanax, bdellium. si molle est, in aceto vel vino dissoluta, & colata, & cocta: postea puluis myrrhae, bdellii. Si siccum est, mastiches, thuris, aristolochiae, magnetis. Postremo arugo, ne si diu coquatur,³ Emplastrum fiat rubeum.

ANNOTATIONES.

¹ Diuinum) Hoc nomen a felicitatis successu, quem in glutinandis vulneribus habet, meruit. Siquidem Chirurghi eo non solum cruenta & recentia, verum etiam vetera ac diuturna, malignoque humorum vitio fluida ulcera celeriter repurgant, implent, ac inirifice veluti ope diuina glutinant. Neruorum praecisionibus, ruptis, conuulsis optime conuenit, furculos alto corporis infixos, & spicula euellit. Strumas & abscessus diuturnos dirumpit.

² Coquitur) Quae ei ob olei paucitatem expedita est & facilis.

³ Emplastrum rubeum fiat) In permiscenda arugine manus coloris habendus delectus est. Si enim giluum aut luteum emplastrum cupis, semiuistam aruginem imponere oportet, aut conueniente coctura color ille petendus est. Postremo loco imposita arugo longiore coctione ruborem contrahit, eumque praestantior: en, si eius drachmas duas vel quatuor, dum coqui ceperit lithargyrum, immittas: reliquas vero eius drachmas percocto fere medicamento addideris. Fuscum demum, nec ita coloratum emplastrum facit arugo tota postremo loco permista, quae medicamento adhuc valde calido, ne ob eius solidiorem duritiem acrius permisceatur, indiget.

Emplastrum¹ griseum, Incerti auctoris. XXI.

D Essecat, explet, ulcera, & iisdem cicatrices inducit. Caput lapidis calaminarij preparati, unc. unam. Lithargyri, unc. duas. Cerussa, unc. dimidiam. Tutbia, drach. unam. Terebinthina, dr. sex. Cera alba, unc. unam, & dimidiam. Seni ceruini, unc. duas. Thuris selecti, drach. quinque. Mastiches, drach. tres. Myrrha, drach. duas. Succus semperniui, drach. unam, & dimidiam. Formetur emplastrum, iuxta² artem.

ANNOTATIONES.

¹ Griseum) Alio nomine emplastrum de lapide calaminari nominatur.

² Iuxta artem) Lithargyros trita aliquantulum oleo nutriatur, agitetur, modice cocto cera liquetur, dein seuum ceruinum, quibus paulisper refrigeratis, addantur terebinthina, & succus semperniui. Dein paulatim igni reddantur, & inspergantur pulueres.

Emplastrum viride, Incerti auctoris. XXII.

A Ccepit cera noua, resina, terebinthina, an. unc. quatuor. Thuris, mastiches, aruginis, ana drach. tres. Fiat emplastrum secundum¹ artem.

ANNOTATIO.

¹ Secundum artem) Cerae liquatae affunditur resina, dein terebinthina, pulueres postea inspergantur thuris & mastiches, arugo postremo apponitur. Sordida ulcera terget, purgat, & explet.

Empl. Basilicum magnum. XXIII.

Vltera phlegmones expertia, partium maxime nervosarum, tergit, & carne implet. Recipit cera alba, resina pinea, seu vaccini, picis navalis, terebinthina, thuris, myrrha, an. unc. unam. Olei, quod satis est, fiat emplastrum.

Empl. crusta panis, Montagnana. XXIV.

Confert ad vomitum puerorum, & iis qui cibum retinere nequeunt. Habet mastiches, mentha, spodi, corallii rubri, santalorum rubrorum & alborum, an. drach. unam. Crusta panis tosta, & in aceto per dimidiam horam macerata, unc. duas. Olei mastichini, cidoniorum, an. unc. unam. Farina hordei, quantum sufficit, formetur emplastrum.

ANNO TATIO.

Vulgare est, nec contemnendum remedium ad stomachi dissolutionem & ciborum reiectione huic persimile, quod recipit offam panis vstulati, vino Cretico, aut aceto intinctam, & imbutam, pulvere mastiches, zingiberis, cinamomi, caryophyllorum, nucis moschate, maceris aspersam, & ori ventriculi appositam.

Empl. ad bubones pestilentes. XXV.

Capit radicis dictamni albi, aristolochia viriusque, an. uncias duas. Scordii, anagallidis viriusque, coaguli leporis, fermenti an. unciam unam. Galbani, ammoniaci, sagapeni, asa fetida, myrrha, piperis, sinapi, an. drach. dimidiam. Ficuum pinguium, numero viginti unum. Radicis iridis, sterco-
Cru columbini, an. unc. unam, & dimidiam. Axungia anatis, unc. duas. Sulphuris, unc. dimidiam. Gummi dissolutis in vino, reliqua cum melle & oleo veteri redigantur in emplastri consistentiam.

DE CERATIS, SECTIO XVII.

Ceratum liquidum, Galeni. I.

Refrigerat, ideoque febribus ardentibus, erysipelatis, & phlegmonibus, maxime pudendorum conuenit. Accipit cera alba, & elotia, unc. unam. Olei rosacei ex * omphacino facti, unc. quatuor. * Crudo citra sale.
Fiat ceratum in vase duplici: quod quum coiuuit, & refrigeratum est, multum diuque ex aqua frigidissima, & postremo paucio aceto claro seu puro & albo subigitur.

ANNO TATIONES.

1 Liquidum) Hodie infrigidans Galeni & ceratum album nominatur. Describitur autem a Galeno Infrigidans lib. 10. Ther. Methodi, cap. 9. & lib. 1. de Simpl. medicament. facul. cap. 6. & lib. 6. de Tuen. sanitate. Quare Mesue filius recte ad Galenum auctorem refert. Supra vnguentum quoque infrigidans Galeni descriptum, quod nomen accepit, quia consistentia vnguento est finitimum.

2 Refrigeratum est) Mittendo scilicet vas, in quo ceratum est, in aquam frigidissimam, vt Galenus docet.

3 Ex aqua frigidissima) In mortarium paulatim affusa tanta, quantum in se, dum mollitur ac subigitur ceratum, accipere potest. Quod si aceti admodum tenuis & clari paululum addideris, vtique magis adhuc tum refrigerans, tum humectans medicamentum efficies.

Ceratum santalinum, Ioannis Damasceni. II.

Phlegmonas, & omnes intemperaturas calidas ventriculi, iecoris & aliarum partium potentissime exstinguit. Recipit rosarum, drach. duodecim. Santalorum rubrorum, drach. decem. Santali albi & flauo, an. drach. sex. Boli armeniacae, drach. septem. Spodii, drach. quatuor. Succu semperuini, drach. duas. Cera alba, drach. triginta. Olei rosacei, lib. unam. Fingatur ceratum.

ANNO TATIO.

In frequenti vfu est hoc ceratum hodie, sed Vnguenti santalini nomine Paratur autem hoc modo. Cera cum oleo in duplici vase liquatur: dein vbi refrigeratum est & erasum, aqua frigida manibus aut rudicula diu agitur, postea pulueres miscentur. Et accipiendum hoc loco erit spodium officinarum, id id, ebur vstum, siquidem Græcorum calidum admodum est, vt etiam Caphura; pro qua succum semper-
vini substituiimus.

Ceratum stomachicum, Eiusdem. III.

Ventriculum & iecur roborat: horum etiam dolorem a frigidityte ortum lenit, appetentiam excitat, & concoctionem iuuat. Habet rosarum, mastiches, an. drach. viginti. Foliorum absinthii aridorum, drach. quindecim. Spica nardi, drach. decem. Cera pura, unc. quatuor. Olei rosacei, lib. unam, & dimid. Cera & oleum igne liquantur, mox stillatio rosarum liquore aliquoties lauantur: dein iterum liquantur, & vino austero, succo cydoniorum, & paucio aceto lauantur: postea alia omnia in tenuissimum redacta puluerem, insperguntur, & fit ceratum.

ANNO TATIO.

1 Eiusdem) Falso enim Mesue auctoritate Galeno tributum est. Proxime ad Galeni medicamentum, accedit. Aloes namque loco rosas, pro absinthii succo, folia pro vnguento nardino, spicam cum rosacco ponit, sed excessu prope immodico.

Ceratū ſtomachicū.¹ Galeni. IV.

Capit unguentū nardini optimi, cera odore pinguis, & lota, an. vnc. vnam, ſi hyems eſt: ſi verò eſtas, cera, drach. ſeptem. Liguantur in vaſe duplici; refrigerato deinde, & craſo, adduntur pulueres molliſſimi aloes & maſtiche, an.² drachma vna.

A N N O T A T I O N E S.

¹ Galeni) Ex lib. 8. de compoſ. medica. localium, & lib. 8. medendi methodi deſumptum. Ad oris ventriculi phlegmonem Galenus adhibet, & ad ventriculi imbecillitatem in fluore alui a cruditate nidoroſa, in quo caſu robur calidis adſtringentibus ipſi parti acquiritur. Hoc igitur ceratū Galeni ſtomachicum in noſtras officinas reducendum eſt, ſub nomine cerati calidi. Eſt enim alterum, quod refrigerans licet voces, itidem 8. methodi deſcriptum, quod habet, Olei melini, ceræ albæ lotæ, vtriuſque vnciam vnā. B. Hypocithidis ſemunciam. Fiar ceratū, vt decet.

² Drachmā vnam) Vel paulo amplius. Quod ſi maiore adſtrictione eſt opus, tantaque ſit imbecillitas, vt cibum ſtomachus continere nequeat, maſtiche augenda ad ſeſquidrachmam, & omphacii drachma adiicienda. Nonnunquam etiam abſinthii ſuccus admixcendus erit, & quandoque, vt etiam Hypocithidis, aut Sumachii ſive Rhois ſuccus.

Ceratū ſtomachicum, Noſtrum. V.

Accipit mētha, abſinthii Pontici, roſarum, an. vnc. dimidiam. Cinamomi, cardamomi, ſpica nardi, nucis moſchata, caryophyllorum, macis, galanga, calami odorati, an. drach. tres. Ligni aloes, cubebarum, an. drach. duas. Gallie moſchata, drach. vnam, & dimidiam. Baccarum myrti, ſumachii an. drach. vnam. Thuris, maſtiche, ſyracis calamitæ, an. drach. duas. Ladani optimi, vncias tres. C. Oleorum roſacei, maſtichini, nardini, cydoniorum, abſinthii, an. vnc. vnam. Cum cera & terebinthina, quod ſatis eſt. Formetur ceratū.

Ceratū ad ramicem, Nicolai. VI.

Recipit picis naualis, aloes, vnc. tres. Lithargyri, cera rubea, colophonia, galbani, ammoniaci, ana vnc. duas. Viſi quercini, vnc. ſex. Boli armenii, ſymphyti maioris, gypſi, ariſtolochia vtriuſque, lumbricorum terra, gallarum, an. vnc. quatuor. Myrrhæ, thuris, an. vnc. ſex. Terebinthina, vnc. duas. Sanguinis humani, lib. vnam. Pellis arietina, mox ubi detracta eſt, horis 24. coquitur: deinde expreſſa pelle, & abiecta, viſcum quernum in hociure diu coctum ubi fuerit, ab igne auferitur: additurque terebinthina, lithargyros, colophonia: poſtea maſtiche, thuris, myrrhæ, galbanum, ammoniacum, lumbrici terra. Hinc ſymphytum maius, gypſum, bolus armenius. Igni tunc rursus admouetur. & ſanguis humanus, ariſtolochia longa & rotunda, poſtremo aloë iniicitur, ſemper ſpatha ſeu rudicula agitando, tandem imponitur marmor, quod oleo violaceo inunctum eſt, & manibus ſubigitur. Dein biduo, aut triduo, in mortario continenter teritur.

A N N O T A T I O.

Solenne eſt ad Enterocelen, & inteſtinorum ramicem, & ab aliis inter emplaſtra recensetur.

Ceratū ad ramicem, Noſtrum. VII.

Habet picis naualis, colophonia, an. vnc. dimidiam. Maſtiche, thuris, an. drach. tres. Hypocithidis, ſarcocolla, acacie, an. drach. duas, & dimidiam. Opopanacis, bdellii, galbani, ana drach. tres, & dimidiam. Myrrhæ, drach. vnam. Serapini, drach. vnam, & dimidiam. Radicis conſolidæ maioris, gallarum, corticum maligranati, an. drach. duas, & dimidiam. Sumachii, balauſtiorum, lithargyri, an. drach. vnam, & dimidiam. Lapidis hematitis, ſanguinis draconis, boli armenii, ana drach. duas. Aloes optima, drach. vnam, & dimidiam.¹ Pila marina uſta, drach. vnam. Ariſtolochie vtriuſque, an. drach. duas, & dimidiam. Mumie, drach. tres. Viſci querni, nucis cupreſſi, ana drach. vnam. Seni hircini, vnciam dimidiam. Gummi diſſolutis in aceto fortiſſimo, cum cera & reſina quod ſatis, ſingatur ceratū.

A N N O T A T I O.

¹ Pila marina) Quid pila marina ſit, in altero noſtrorum de ſtirpium hiſtoria commentariorum tomo abunde docuimus. Bernardus Deſſennius prorsus ignorat quid ſit, ideoque ſibi neque de nomine, neque de uſu eius conſtare quicquam fatetur. Eodem autem quō Ariſtolochia nomine Ceratū hoc ingreditur, nempe vt extergat. Fieri enim non poteſt, vt vulnera glutinentur, niſi ſint medicamenta, quæ ſordes etiam, horum glutinationem prohibentes, extergant.

Cera rubea conſcienda modus.

Accipit cera pura lib. tres. Terebinthina, quar. tres. Minii ſecundarii, vnc. nouem, Fiar cera rubea, in formulas ſculptas uſa.

Cera viridis faciende ratio.

Recipe cera lib. tres. Terebinthina, quar. tres. Aeruginis æris, vnc. vnam, & dimidiam. Ad lentū ignem liquata miſcentur, & in formulas funduntur ſculptis ſpongia aqua imbuta humectatas.

Cera flaua.

A Cere lib. duas. Resina bona, lib. unam, vel quar. tres. Terebinthina, quar. unam. Ad lentam ignem miscentur.

Atramentum scriptorium.

Habet gallarum, lib. unam, & dimidiam. Vitrioli, quar. tres. Gummi arabici, unc. sex. Aqua & vini mensuras octo.

APPENDIX.

B Hanc compositionem atramenti scriptorii quidam binis versiculis perpulchre cōplexus est, qui sunt eiusmodi:

Vitrioli quarta, media sit uncia gummi,

Integra sit galla, superaddas octo Fal. rni.

Atque hæc est vulgata, multisque communis compositio. Dioscorides in fine quinti habet alias, quas illic videre licet.

DE VSITATA HVIVS TEM-
PORIS COMPONENDORVM MISCENDO-

RVMOVE MEDICAMENTORVM RATIONE,

Liber III.

PROOEMIUM.

C VVM in eo, qui præcessit, libro omnium fere hodie vsitatorum medicamentorum compositiones a nobis sunt traditæ, & annotationibus illustratæ. reliquum nunc est, ut qua ratione illis a Medicis utendum sit, & quomodo ex earundem permixtione formulæ, quas barbari Receptas nominant, struenda sint, exponamus. Quum autem eorum medicamentorum compositorum, quorum hodie vsus est, in vniuersum duo sint primaria genera, vnum, quod intra corpus sumitur: alterum, quod extrinsecus corpori adhibetur, de priore quidem genere

in hoc tertio agemus libro: alterius vero tractationem, sequens sibi vendicabit liber. Eius autem generis, quod intra corpus sumitur, variae sunt species. In quibus sane enumerandis, vulgi nomenclaturæ

D ras aliquot immutauimus, partim quod barbare & inepte fuerunt, partim quod veterum appellationibus quæ puriores sunt, & rei naturam nobis certius exprimunt, & ob oculos ponunt, assuefacere iuniores medicos voluimus: ut tandem contemptis spreisque barbaris, veris & latinis uti discerent. Nisi enim aliquando veras medicamentorum nomenclaturas reducere, inque usum quotidianum reuocare incipiamus, metus est ne perpetuo rerum etiam caligine obruamur. Tamen si qui imperitiores in iis intelligendis hærebunt, ad primum librum confugiant oportet: in quo passim latinis & grecis barbaras appellationes coniunximus, ne nullus nos obscuritatis alicuius auctores fuisse merito queri possit. Quamuis autem medicamentâ quæ in corpus recipiuntur, composita varia sunt, tamen nos vniuersa viginti tribus speciebus, hodie vsitatâs, complectemur, quarum hæc sunt nomina:

1 Antidota proprie dicta.

2 Purgatoria medicamenta, liquida & solida.

3 Catapotia, siue pilulæ.

4 Vomitus elicientia.

5 Sacchara.

6 Conditâ.

7 Ecligmata, vulgo Loch dicta.

8 Zulapia, vulgo lulebia.

9 Succus medicati, vulgo Rob & Miuz.

10 Serapia, vulgo Syrupi.

11 Decocta.

12 Pulueres, seu tritura, Drangea, vel Tragea.

13 Pastilli, vulgo Trochisci.

14 Glandes, barbaris Suppositoria.

15 Clysteres.

16 Collyria, Arabibus Sieff.

17 Gargarizatus, Gargarismiue.

18 Dentifricia.

19 Pessi, vulgo Pessaria.

10 Errhina, Nasalia vulgo.

11 Apophlegmatismi, vulgo Masticatoria.

12 Odoramenta, siue pilz odoratz.

13 Suffimenta, suffitusue.

Duo genera
positiora
medica-
mentorum
primaria
genera.

Species
medica-
mentorum
quæ in
corpus
sumuntur.

De quibus singulis eo, quo posita sunt, ordine differemus, ab Antidotis exorsî.

De Antidotis, Cap. I.

Medicamenta omnia, quæ non foris ad mota corpori, sed intra corpus assumpta vi-
tiis medentur, Græci veteres, Galeno lib. i. de Antidotis teste, antidota, ab ἀντίδοτον dicta, quæ:
quasi aduersus plurima morborum genera & vitia data, & fœminino genere Antidotos appel-
larunt. Vnde cephalica, ophthalmica, stomatica, arteriaca, stomachica, cardiaca, hepatica, splenica,

Antidota
quæ:

Tres veteribus antidotorum differentia.

Antidoti quid appellamus.

nephritica, colica, & id genus alia, quæ ab usu nomina sua habuerunt medicamenta, harum partium vitiiis salubria, antidota dixerunt. In vniuersum autem tres fuerunt illis, eodem *Galeno attestante*, antidotorum differentia. Horum enim quædam aduersus letalia medicamenta, siue deleteria, quæ aliquo malo fato sæpe exhibentur, ac bibuntur, dabantur. Quædam contra feras venenum iaculantes, siue virulentas. Quædam vitiiis & affectibus, ex prauo victu & humoribus vitiatibus obortis succurrebant. Nos paulo arctius *antidoti* significationem contrahentes, hac voce tantum medicamenta intra corpus recepta, quæ letalibus aduersantur, quæ item dolores sedant, somnum afferentia ac stupefacientia, præterea quæ imbecillo corpori, eiusque partibus parum firmis robur afferunt, intelligimus. Neque enim commodior alia nobis occurrebat appellatio, qua a ceteris intra corpus assumptis medicamentis, illa separaremus. Quod si alicui hæc ipsa alio nomine appellare libet, nihil moramur. Nobis certe melior nunc in mentem non veniebat appellatio, qua illa a reliquis in corpus receptis discernereamus. Non melaret autem recentiores vocare *Antidotos*, alias *confectiones*, alias *Electuaria*, sed non sine confusione lectoris. Nos igitur omnia, quæ intra corpus sumuntur medicamenta, & peculiaribus nomenclaturis donata non sunt, *Antidota*, vt diximus, potius appellare, adiectis nunquam non, quæ illa ad certam speciem coarctant, vocabulis, voluimus.

De Antidotorum letalibus aduersantium usu. Cap. II.

Confectiones magnæ.

Vltima.

Non ab re exordimur ab Antidotis, quæ letalibus aduersantur: quod nimirum illa triplicem promittant usum, & eorum, quæ letalibus repugnant, & eorum quæ contra ferarum venenum faciunt, atque eorum, quæ vitiiis ex prauo victu natis succurrunt: vt sunt, *Theriaca, Mithridatios, Esdra, & id genus alia.* Hinc est quod ab huius ætatis medicis confectiones Magnæ, non admodum inepte nominentur: siquidem maiores, quæ ceteræ Antidoti, vires obtinent. Vt valde inepti sint, qui hanc appellationem a magni nominis viris consecutas esse arbitrantur. Igitur iam dicta Antidota, qui hodie medicinam faciunt, hac ratione usurpent. Nonnunquam se solis, citra aliorum vel simplicium vel compositorum medicamentorum adiectionem, vtuntur. Quod, vt recte faciant, illorum pondus: & (vt hodie vocant) *Dosis*, cognitam habeant oportet. Quæ qualis sit, *Lib. 2.* est partim expositum, & paulo post clarius explicabitur. Quanquam in iis certa quantitas, vt etiam in aliis medicamentis, vt pote quæ pro ætatis, naturæ, temporum & morborum ratione varietur, præscribi nulla possit, aut debeat. Non desunt qui, vt eorundem Antidotorum insuauitatem frangant, aut tegant, flores cordi familiares saccharo conditos, illis admiscunt, & serapio aliquo conuenienti excipiunt, in hunc quidem modum: *Recipit Theriaca Andromachi, Mithridatii antidoti, Sacchari borraginis, ana drachmam unam, & dimidiam. Melissophylli, Echii, ana drachmam unam.* Excipe serapio ex acido citrii succo, & redige in consistentiam iustam. Sunt qui prædictis Antidotis adiciunt ex simplicibus aliquot medicamenta corroborantia, vt ex sequenti patebit formula, quæ *Recipit Mithridatii antidoti, drach. tres. Sacchari melissophylli, drachmam unam. Ramentorum eboris, Seminis fœlicis, Ligni aloes, ana scrup. unum.* Excipiuntur serapio ex acido succo citrii, vt prædictum est.

Aliam dictas Antidotos, adiectis Bolo armenio, aut Lemnio sigillo, aliisque id genus venenis aduersantibus medicamentis, stillaticiiis congruentibus liquoribus diluunt, vt ex sequenti manifestum sit formula, quæ *Recipit Theriaces Andromachi scrup. duos. Antidoti Mithridatii, scrup. unum. Boli armenii, scrup. dimid. Liquoris stillaticii rosarum, unc. duos. Borraginis, Scabiosæ, ana. unc. dimid.* Commistis omnibus, fiat potio.

Vsitatum præterea est, vt prædictis Antidotis vnum aut plura eorum medicamentorum, quæ *Antidorum diazæ* constituant: ita nominatum, vt præcedenti libro diximus, quod ex quatuor rebus gentiana scilicet, myrrha, aristolochia, & baccis lauri constet, admisceantur: quemadmodum ea quæ sequitur, formula ostendit, quæ *Recipit Antidoti Mithridatii, scrup. duos & dimidium. Theriaca Andromachi veteris, drach. unam & dimidiam. Gentiana, Aristolochia longa, Myrrha optima. Baccarum lauri, ana scrup. duos.* Excipiuntur serapio ex acido succo citrii, quod satis est.

Non solum vero ad letalia venena propulsanda prædictarum Antidotorum hodie usus est: sed & ad alia, vt diximus, corporis vitia, præsertim mensium suppressionem, aliis scilicet, quibus menses euocandi vis inest, adiectis, vt ex sequenti rescripto patebit, quod

Recipit

A Recipit Antidoti Mithridatii, drachmas tres, Triphera magna, drachmas duas. Antidoti hæmagogi, drachmam unam. Pastillorum e myrrha, drach. dimidiam. Cinamomi, Casia lignea, Rubia, an. scrup. duos. Cum Serapio ex artemisia excepta reponantur. ¶ Saracenica vocatâ Tryphera ad melancholica vitia vsurpamus, conuenientibus illi admixtis aliis tum compositis, tum simplicibus medicamentis, in hunc nimirum modum: Ricipe Triphera saracenica, sacchari buglossa, & violacei, an. unc. unam, & dimidiam. Latifcantis Galeni nominati, unc. dimidiam. Specierum diapleres archonticon, drach. unam & dimidiam. Corticum citrii, drach. unam. Maceris, scrup. duos. Epithymi, scrup. unum. Excepta ex acidi citrii succo serapio, in electuarii formam rediguntur. Ceterum nõ transeundum nobis silentio erit Antidotorũ omnium non eundem esse exhibendi modum, quod nimirum cum iisdem liquorib. haud præbeantur. Siquidem vel ex vino, vel aqua mulsa, vel stillaticio aliquo, vel alio quodam liquore, prout affectus ipse exigit, datur. proinde pro affectuum differentia cõgruum mixturæ liquorem inueniamus oportet, quemadmodum Gal. in lib. de Theriaca ad Pisonem, & post hunc in suo de Compositione medicamentorum libro Actuarius, & Nicolaus Myrepsus docent. Porro pondere & mensura alias alia eodem Galeno in lib. de theriaca ad Pisonem auctore, recte vteris. Interdum enim fabæ Egyptiæ quantitate danda, vbi nimirum exiguum ad Antidotorum coctionem interuallum erit. Interim vero auellanz, aut Ponticæ nucis magnitudine sumes, quũ scil. plus temporis ad gubernationem eorundem habiturus es. Hoc est, si parum temporis ad antidoti cõcoctionem superfit, minus de eo exhibendum erit, vt scilicet in breui hoc interuallo concoqui & alterari possit. Sin plus temporis ad eiusdem gubernationem dispensationemve superfit, plus quoq; de illa exhibendum erit, quod ad alterationem eius copiaz sat sit interualli. In vsu certe Antidotorum anni tempus, & regio maxime inspicienda erunt. Nam per æstatem, præsertim theriaca, neutiquã præbenda. Quippe cõstitutione aeris calida, ex antidotis prædictis corpus calidius euadens offenditur. Quapropter hoc tempore, nisi impendens aliquod periculũ diuersum nos iubeat, iam dictorũ Antidotorũ nullus esse vsus debet. Consideranda quoq; in eorundẽ vsu ætas erit, neq; enim ætate florentib. & multo calore natiuo præditis, magna copia, & sæpenumero danda sunt, nec nisi ex aqua. His vero, qui transacta iam iuuenta declinant, & ad senectam spectant, aut ætate confecti sunt, & multum de prædictis Antidotis, & sæpe, non ex aqua modo, sed ex vino quoq; pondere drachmę vnus sumenda sunt, vt corporis virtus iam emarcescens, & natiuus calor fere extinctus, refocillari & accendi earundẽ beneficio possit. Pueris aut hæc medicamenta haud sunt danda. Quippe horũ magnitudo pueriles vires lōge superat, & corpus eorundem facile resoluit, natiuumq; spiritum cito exstinguit. In vsu præterea eorundem Antidotorum, theriacæ potissimam, vnice considerandum erit, num probe cocta sint. Nam longo tempore, plurimum autem duodecim annis, ad coctionem egent. Vigentiores aut validioresq; iunt ab anno quinto, sexto, septimo: præsertim in iis qui a virulentis feris, aut rabido cane morfi sunt, & medicamentis letalib. petiti. Hi enim omnes quum grauem noxam ab iis venenis acceperint, potentioribus Antidotis indigent. Deniq; Antidotos prædictas exhiberi oportet, quum is, qui sumit, probe concoxerit, nec cibis grauatus fuerit. A ieiunis itaq; minime autem crudis, hoc est, appetente iam diluculo, id genus medicamenta assumenda veniunt. Quare saturis, nisi summa vrgeat necessitas, præbenda haud erunt. Necessitate vero impellente, & hausto veneno expostulante, quauis diei hora exhiberi possunt: vt fufius in libello de Theriaca ad Pisonem Galenus docet.

De antidotorum dolorem sedantium & stupefacientium vsu. C A P. III.

ABSOLUTA vtendi ratione Antidotorum, quæ letalium medicamentorum aut virus iaculantium bestiarum gratia sumuntur: reliquum est, vt ad alterius generis Antidota, quæ scilicet malis ex praua victus ratione natis succurrunt, iam progrediamur. Quum autem hæc ipsa varia sint, vt pæcedenti capite dictum est, primum quidem inter ea locum occupant, quæ Græcis ἀνῳδῶνα & παρηγορητῆς, & πᾶσι δυνάμει, & ἀνῳδῶνα, Latinis vero dolorem sedantia, & lenientia, & mitigantia, & stupefacientia appellantur. Sed differunt inter se ἀνῳδῶνα & παρηγορητῆς. Anodyna enim proprie ea, quæ partium existunt tenuium & non multo q̃ quæ moderata calidiora sunt, appellantur. Proinde necesse est, vt vacuēt & discutiant, rarefaciant, extenuent, cõcoquant, & æquabile reddāt, quicquid in par-

Exhibendi
modus.

Pondus &
mensura.

Quando &
quibus ex-
hibenda.

Antidoto-
rũ conco-
ctionis tem-
pus.

Exhibitio-
nis hora.

Anodyna.

tibus dolore vexatis aut humorum acrium, vel lentorum, aut craſſorum, aut multorum meatibus inſarctorum: vel etiam vaporoſi, vel craſſi, vel admodum frigidi ſpiritus exitum commodum non inuenientis, cohibita atq; ncluſum eſt. Itaq; nihil priuſ adſtrictionis habeant oportet, neſi pars quidem laborans, aut etiam affectus ipſe expoſtuler. Vnde perſpicuum euadit, quod interdum affectum non iuuabunt, ſed dolorem tantummodo mitigabunt, quando videlicet reuera Anodyna dicentur. Interdum vero etiam affectum ipſum adiuuabunt, & tum quidem facultatem habebunt duplicem, nempe Anodynā & ſanantem. Igitur Anodyna proprie vocantur, *qua dolorem leniunt, tenui ſubſtantia primi ordinis calefacientium: vel ita temperata, vt familiaritate elementorum naturæ partium conſentiant:* qualia ſunt, *oleum dulce, etate medium, butyrum, aſſypus, adipēs, aqua tepida, lini ſemē, chamamelum, ſænumgræcum: olea, chamamelinum, amygdalinum & dul-*

Narcotica
ſeu ſtupeſa-
cientia.

Opiata.
Medicamē-
torum do-
lorem ſedā-
tium duo
genera.
Anodynū.
Colicum.

locis petenda veniunt. Ceterum quæ *Narcotica ſeu ſtupeſacientia* nuncupantur, temperamentum ſortiuntur, vel ſumme aduerſum iis, quæ reuera ſunt anodyna. Siquidem omnia corpus refrigerant, & ſenſum eo uſque ſtupeſaciunt, vt ſi paulo liberalius eſt-
bantur, moſtē afferant. Horum compoſitionem plurimum opium ingreditur, hinc recentioribus *Opiata* nominantur. Galenus *lib. 7. de Compof. medic. localium, cap. 5.* duo quodque dolorem ſedantium medicamentorum genera facit. Vnum, quod veteres Medici compoſuerunt iis qui ſanguinem reſciunt, item iis qui tabeſcunt: & ad alios dolores atque affectus, qui circa pulmones, arteriam, thoracem, aliaſque corporis partes, exceptis tamen colicis, conſiſtunt: idque *anodynū* appellauerunt. Alterum colicum nominauerunt, quod ſcilicet colico dolore laborantibus duntaxat adhibuerunt. Atque hoc priore vehementius fuit, vt pote quod vim prædominantem, ex multitudine refrigerantium medicamentorum habebat: vt ſunt, *hyoſcyami ſemen, papaueris ſuccus, & radices mandragoræ cortex.* Primi autem generis medicamenta odoratorum, & vrinam

Narcoticis
quando v-
tendum.

cientum ſeminum (qualia ſunt *cuminum, daucus, ſeſeli, apium, & aniſum,*) miſtura conſtabant. Quod vero ad uſum Narcoticorum & ſtupeſacientium attinet, ſciendum, iis nō eſſe vtendum, niſi ubi ab anodynis dolor ſedari nequit. Ob id uſus illorum perpetuo vitandus, niſi magna neceſſitas nos, vt ipſis vtamur, cogat. Nam corpora viuentium ſimile quid mortificationi ab omnibus, quæ ex opio, mandragora, hyoſcyamo, & id ge-
nus aliis narcoticis conſtat medicamentis patiuntur: nimirum cauſis dolorem inſi-
gentibus, inſenſilibus factis. Et multi proſecto, qui talibus aſſidue in podagra & oculo-
rum doloribus uſi ſunt, ad immedicabilem frigiditatem particulas perduxerunt. Nō igitur continuis diebus, ſed ex intervallis eiſmodi medicamenta danda ſunt. Nec eſt ſtatim poſt mixtionem in uſum accerſenda ſunt narcotica & ſtupeſacientia, ſed poſt

Calefacien-
tia miſcen-
da ſtupeſa-
cientibus.

ſex menſium, aut anni ſpatium. Præterea miſcenda illis ſunt calefacientia: partim vt vim eorum ſtupeſactoriā vehementer non nihil reſrenent & obtundant, adeoq; ſenſum minori detrimento ſtupeſaciant: partim vt frigidas altius penetret. Nam quum frigida per ſe tardi ſint tranſitus, admiſcentur calida, vt refrigerantium ſtupeſactionē

Quibus par-
tibus non
adhibenda.

in altum deducere queant: qualia ſunt, *caſtorium, crocus, caſia, & id genus alia.* Cauendum etiam vni-
ce, ne narcotica partibus iis, quæ principatum in corpore obtinent, verbi gratia, cerebro, cordi, pulmoni, iecori, ventriculo, & iis ſimilibus adhibeantur. Præſtat quoq; ea primum forinſecus admoueri, priuſquam intra corpus ſumantur. Pueris deniq; ſenioribus & aliis imbecillioribus, frigidaq; temperatura præditis, ite mq; graui-
dis ſeu vterum gerentibus ne applicentur. Ceterum in uſu narcoticorum trib. atten-
tum eſſe Medicum oportet. Primo, vt ſenſum tactus obtundat & ſtupeſaciat: ſecundo, vt nihil noxæ ex hac ſtupeſactione in particula relinquatur: tertio, qd eſt maximum, vt affectui ſuccurrat. Quæ tria Philoſophe Tharſenſis diligenter in ſua Antidoto, quæ inſtar exempli, quod in cōponendis Narcoticis imitari debent Medici, ab ipſo propoſita eſt, ſeruauit. Nam ex hyoſcyami, & omnium valētiffimi opii mixtura, facultatis ſenſorioris ſtuporem, & ſomnum torpidum inducere ac moliri voluit. Quo vero citius ſtupeſacientia diſtribuerentur, & vniuerſum laborantium partium profundum penetrarent, calefacientia admiſcuit *pyrethrum, coſtum, euphorbiū, & piper:* quæ noxios humores diſcutere, tenaces extergere, craſſos incidere, flatulentos ſpiritus attenuare & vacua-

In uſu Nar-
coticorum
tribus atten-
tum eſſe o-
portet Me-
dicum.
Philonis
Antidotus
qualis.

te poſ-

Are possunt. Porro Antidotis narcoticis stupefacientibusque, Medici hodie in hunc v-
runtur modum: Interdum illis seorsim, & citra aliorum medicamentorum commix-
tionem, adiunctis tamen semper iis, quæ violentiam earundem frangunt & obtun-
dunt, vtuntur: vt ex sequenti patebit formula, quæ *Recipit Philonii, drachmam vnam. Cro-
ci, Castorii, an. grana duo. Cum zupapio violaceo in unitatem coeant.* Est quædam eadem etiam v-
surpant in litendo sanguine, aut alu. pro fluuiio. Atque tum quidem adstringentes
pastillos illis commiscunt, & cum liquoribus conuenientibus, aut serapiis eiusdem ge-
neris excipiunt: vt ex eo quod sequitur rescripto fit manifestum, quod *Recipit Antidoti
athanasia, drachmam vnam & dimidiam. Pastillorum e succino, e terra Lemnia, an. drachmam
vnam. Lapidis hæmatitis, Radicis symphyti maioris, an. scrupulos duos. Cichorii, scrupulum vnum.*
B Serapii myrtini, quantum ad excipiendum satis erit. Vtiliter etiam iidem Mielea commi-
scetur, cum aliis eiusdem farinae medicamenti, hoc pacto: *Recipe Mielea, unciam dimi-
diam. Rob e ribes, drachmas tres. Sacchari rosacei veteris, Diacydoniati citra species, an. unciam di-
midiam. Miue cydoniorum, drachmas duas. Balauftiorum, drachmam vnam. Symphyti maiori ra-
dicis, drachmam dimidiam. Serapii myrtini, quantum ad excipiendum sufficit.* Nonnunquam
purgantia quædam medicamenta composita illis admiscuntur, vt scilicet hæc ratione
non solum dolorem remittant, verum etiam vt humores noxios adeoque ipsum affe-
ctum auferant, & e corpore tollant. Qui tamen modus hodie non valde vsitatus est, &
pauci sunt qui illum vsurpant. Eius tamen exemplum subiiciemus, quod *Recipit Dia-
phænicon, drachmas tres & dimidiam. Antidoti indi maioris, drachmas duas & dimidiam. Phi-
lonis, drachmam vnam. Vini, quod satis est ad excipiendum.* Porro ex stupefacientibus medi-
camentis dantur magna ex parte scrupuli duo, aut drachma vna. Veteres hæc ipsa
summum nucis auellanae quantitate seu magnitudine præbebant. Sumuntur vesperi,
dum cubitum itur, ex vino, aut aliquo liquore congruente:

De antidotorum somniferorum usu. C A P. IV.

SOMNIFERA, siue somnum conciliantia, aut soporem molientia vocata medicamenta,
Græcis *νυκτωδία* dicuntur. His Medici magni doloris, aut vigiliarum gratia vt con-
sueuerunt. Interdum etiam in vehementiori ac violenta tussi, ne quis eius occasione
conuellatur: vt nonnunquam in sanguinis eruptione, & diffi. ilibus destillationibus
accidere solet. Ceterum ad eorundem compositionem, qui hodie medicinam fa-
ciunt, vtuntur *Serapio violaceo, e papauere, succis aut stillaticis liquoribus solani, lactuca, portula-
ce, & id genus aliis vt ex sequenti formula patebit, quæ Recipit Serapii violacei, unciam vnam.
e papauere, unciam dimidiam. Liquoris stillatici lactucæ, Semperiuiui, an. unciam vnam. Solani,
unciam dimidiam.* Commixtis omnibus, fiat potio. Interim Antidotum diacodion
cum saccharo florum nymphaeæ, violarum, ac aliorum frigidorum medicamento-
rum permiscemus, ac somniferum conficimus medicamentum: quod sequens rescri-
ptum docet, quod *Recipit Diacodion, unciam dimidiam. Sacchari nymphaeæ, Violarum, an. un-
ciam vnam & dimidiam. Succ lactucæ, Portulacæ, an. uncias duas.* Subacta in pila, inter se
commiscuntur: Solenne est, vt hodie facientes medicinam, vnguentis ex frigidis &
stupefacientibus medicamentis confectis, ad conciliandum somnum vtantur: vt est
E id quod *Recipit Vnguenti populei, drachmam vnam, & dimidiam. Olei violacei, drachmā vnam.
Seminis hyoscyami, Corticum radicis mandragoræ, an. scrupulos duos. Opii, grana quatuor. Croci,
Castorii, an. grana duo. Cera quod satis est fiat vnguentum.* Potiones autem somniferæ, nisi al-
liud facere necessitas cogat, dantur vesperi, & cubitum ituris. Eodem quoque tempo-
re vnguenta temporibus sunt illinenda. Quod si tamen dolorum aut vigiliarum vehe-
mentia, vt per diem iis vtamur nos vrgeat: vt cubiculum in qua æger decumbit, turba
ac strepitu omni vacet curemus, nec ille est. Ablegata itaque turba, quæ ægrotanti
molesta esse posset, vnum aut alterum, aut plures etiam, citra tamen strepitum, adesse
satis erit.

De antidotorum robur corpori adiicientium usu. C A P. V.

AB SOLVTIS primis duobus Antidotorum generibus, reliquum est, vt tertium,
quod robur vniuerso corpori, aut eius partibus adiicit, aggrediamur. Hoc a non-
nullis aromaticum, quod scilicet magna ex parte aromatis constat, nominatur. Quo-
rum vsum vt rectius assequamur, sciendum initio erit; hæc bifariam hodie construi:
nempe liquida, vel solida. Liquida sunt, quæ melle excipiuntur, & vulgo *electuaria* vo-

Vfus narco-
ticorum.

Purgantia
stupefacien-
tibus com-
mixta.

Pondus.

Exhibendi
tempus.

Somnifera
quæ.

Vnguentū
somniaferū.

Tempus ex-
hibendi
somniafe-
ra.

Antidota
roborantia.

Liquida.
Solida.

cantur: ſolida contra, quæ ſaccharo, & dicuntur *confectiones*. Ad quas conficiendas mel optimum, ſi fieri poteſt, accipitur, tantumque aquæ quantum neceſſitas exigit, adiicitur. Quo enim mel purius, eo minus aquæ opus eſt: dein coquatur & ſpuma ſubinde cochleari foraminulento plumbo albo obduſto auferatur tantisper, donec iuſtam ſpiffitudinem conſequatur. Cuius quidem inditium eſt, ſi rudicula immiſſa, vel cochleari extracto & eleuato, inſtar fili aſſidue deſluit, in fine vero quaſi abrupitur filum, & ſuperior pars retrahitur, & conglobatur, donec ea quoq; diducta decidat. Vel gutta in ſolidum aliquod corpus lapideum, vel metallicum læue ſtillatur, quæ ſi nõ deſluit, aut inclinato iam dicto corpore nõ decedit, iuſtā cõſiſtentiam naſtum eſt. Sin deſluit, aut decedit, aquoſius iuſto eſt, ac diutius coqui debet. Mel coquitur vt purificetur, purum autem eſſe ſignificat ſpumæ abſentia. Species imponendæ vbi mediocriter refriguit mel, atq; impoſitæ piſtillo aut ſpatha miſceantur, & cõmiſta in fictili vaſe denſo recondantur. Quapropter principio quantum mellis aut ſacchari in eorundem ſtructure ſit adiiciendum, nobis exponendum erit. Animaduertendũ igitur, vt in componendis & liquidis & ſolidis Antidotis roborantibus, ad libram mellis vel ſacchari, nonnulli accipiant vnc. tres ſpecierum, ita vt ſit quadruplum mellis aut ſacchari ad ſpecies. Alii triplum tantum mellis ad ſpecies adiiciunt. Priorum ſententiæ hæc reſpondet proportio. Ad

Mellis vel ſacchari	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Libram vnā,} \\ \text{Libram ſemis,} \\ \text{Vncias tres,} \\ \text{Vnciam vnā,} \end{array} \right\}$	Specierum	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Vncia tres.} \\ \text{Vncia vna ſemis.} \\ \text{Drachma ſex.} \\ \text{Drachma dua.} \end{array} \right\}$
------------------------	---	-----------	---

Posteriorum ſententiæ, quæ melior eſt, adeoq; pharmacopœis ſequenda, repudiata priori, & ea præſertim qua impulſi, ad libram vnā mellis vel ſacchari vnciam vnā duntaxat ſpecierum accipiunt, hæc proportio erit. Ad

Mellis vel ſacchari	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Libram vnā,} \\ \text{Libram ſemis,} \\ \text{Vncias tres.} \\ \text{Vnciam vnā ſemis,} \end{array} \right\}$	Specierum	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Vncias quatuor.} \\ \text{Vncias duas.} \\ \text{Vnciam vnā.} \\ \text{Vnciam dimidiam.} \end{array} \right\}$
------------------------	---	-----------	--

Hanc itaq; rationem proportionis mellis & ſacchari ad ſpecies, vt comprehenſum eſt, in conficiendis liquidis Antidotis roborantibus, deinceps obſeruare debent pharmacopœi: nec minus, vt hætenus conſueuerunt, de ſpeciebus accipiant: & ſtudium iucunditatis & ſuauiſſimæ apud eos tantum non valeat, vt minus efficacia conficiant medicamenta. Nullum Antidotum liquidum roborans, quod ſciam, hodie in noſtratibus officiis Medicorum proſtat, ſed omnia, excepto diapræſſia, cū ſaccharo in ſolidam redacta formā illic habentur, quā veterib. liquida magis in vſu fuerint, forte q̃ ſacchari tractandi rationē ignorarint, aut certe quod magis efficaces ſint. Cõponunt autem non raro Medici huius ætatis noua Antidota roborantia liquida, q̃ priuatiim vocant *Electuaria*, aut *mixturas*. Neq; enim illis mixtura aliud eſt, quam cõpoſitio, quæ ex variis medicamentis tum cõpoſitis, tum ſimplicibus aliquo liquore exceptis, conſtat. Componunt aut̃ ad eum modũ Medici: Accipiunt ſolida Antidota roborantia, & eorundē etiam ſpecies vocatas, illiſq; cõmiſcent ſacchara diuerſi generis, item paſtillos, condita, aluũ lenientia, & ſimplicia alia affectui congruentia: ac ſerapio, aut alio conueniente liquore excipiunt, vt e ſequentib. patebit formulis & reſcriptis, quæ;

I. Recipit Sacchari roſacei, Violacei, Borræginis, Echii. an. vnc. dimidiā. Diatraga cãthes, vnc. vnā. Diatrion ſanton, drach. tres. Manus Chriſti cum margaritis, drach. vnā & dimidiam. Antidoti e prunis damaſcenis ſimplicis, drach. ſex. Specierum diarhodon abbatis, drach. vnā. Paſtillorum e violis, drach. dimidiam. Serapii violacei, quantum ad excipiendum ſatis eſt: fiat *Electuarium*.

II. Recipit Sacchari lauendule, Roſmarini, an. vnc. dimidiam. Florum pœonia, drach. tres. Betonica, drach. duas. Acori conditi, drach. ſex. Specierum plereos archontici, drach. tres. Diambæ. Diamofchi, Dianthos, an. drachmam vnā & dimidiam. Stichadis arabicæ, drachmam vnā. Granorum pœonia numero ſex. Viſci querni, ſcrupulum vnum. Florum tilia femina, drachmam vnā. Verbaſculi odorati, drachmas duas. Seminis coriandri præparati, drachmam vnā. Serapii e ſtichade quod ſatis erit ad excipiendum, & fiat *mixtura*.

Porro in cõponendis eiufmodi electuariis & mixturis vocatis, nulla certa quãtitas præſcri-

Compoſi-
dorum li-
quidorum
Antidoto-
rum robo-
rantium
ratio.
Mixtura
quid.

Quantitas
compo-
nendi.

A præscribi potest, utpote quæ ex aliis potius huius tertii libri capitibus discenda sit. Tamēn vniuersa medicamentorum moles uncias tres, aut summum quatuor, raro excedere debet: quod nimirum maior copia ægrotantibus fastidium pariat. Vna vice, magna ex parte, drachma vna cum dimidia; aut drachmæ duæ, pro diuersitate affectus, & habitus corporis, dari debent. Præbentur autem diluculo tribus aut quatuor ante prædium horis. Vesperis quoque cubitum ituris, totidem a cœna elapsis horis. Ceterum quod ad solidorum, quæ ut gratiores sunt gustui, ita minus efficacia, vsum attinet, sciendum; ea hodie duplici forma, rotunda videlicet seu orbiculari, & oblonga confici. Quæ rotundam formam accipiunt, Latinis *Orbiculi*, vel *placeta* dici possent. Nostræ ætatis Medicis *Rotula*, & *tabula* vocantur. Et ea quidem forma hodie omnia in Medicorum officinis prostant. Quæ vero oblonga aut quadrata forma effinguntur, Medici hodie *Morsellos*, & barbara voce *Lozengias* appellant: latinius forte *Morsulos* nominaturi. Ex iis aliqui sunt æquilateres, alii latiores quam crassiores, alii in medio crassiores, in extremis tenuiores. Coquitur autem in orbiculis conficiendis saccharum ad exquisitam perfectionem, & deinde ab igne remotum ligneo pistillo agitur, & species iniiciuntur, ac probe miscentur. Cauendum autem vnice erit, ne species cito addantur, ne scilicet adurantur, aut vis earundem resoluatur. Ad perfectionem autem coquitur, quum tãtis per donec omne aqueum absumentum est. Cuius quidem rei signum est, quando spatula extractum; & violenter in aerem proiectum in floccos instar nuius crassioris abire videtur. Commixtis omnibus spatula assidue eiusdem quantitatis saccharum extrahitur, & placetæ modo in tabulam cui farina inspersa est decedens, in orbem concrecit. Si vero quid in lebece remanens durefcit, aqua affusa liquefcit. Rotulæ siue orbiculi concreti sigillatim auferantur, & farina illis adhærens absterfa, in cribrum coniciuntur, & magis calido in loco desiccantur, & exsiccati tandem in ligneis arculis reconduntur. Morsuli pari modo formantur, nisi quod illud, quod in lebece coctum est, in tabulam superna sui parte humectatam secundum longitudinem effunditur, ligneisq; tabellis adpositis & vtrinque madefactis cogitur, atq; latitudine ac crassitudine morsulorum formatur, qui dissecti in locum sicciorē transponuntur.

Qui hodie medicinam faciunt, vtraque forma componunt e speciebus multorum roborantium Antidotorum, adiectis quibusdam simplicibus affectui congruentibus medicamentis minutissime tritis, & saccharo in stillatitiis liquoribus conuenientibus dissoluto, ad orbiculorum, aut morsulorum formam redigunt, hoc modo: Coquitur saccharum ad consumptionem liquorum, dein insperguntur pulueres. Massa ex iis composita ab igne remota, & in planum proiecta secatur in tessellas, quarum singulæ ponderent selquidrachmam: veluti e sequentibus innotescet formulis, quæ *Recipit Specierum diamoschi dulcis, Diambar, Aromatici rosati, an. drach. vnā & dimidiam. Diacinnamomi, Plereos archontici, an. drach. vnā. Nucis moschatæ, Macis, Cubebarū, an. scrupul. duos. Cinamomi drach. vnā & dimidiam. Caryophyllorum, Calami odorati, Piperis longi, an. drach. vnā. Ligni aloes scrup. vnum. Mastiches, drachmam vnā & dimidiam. Zingiberis, scrupul. duos. Cardamomi, drachmam dimidiam. Cum sacchari candidissimi uncis sex, dissolutis in liquoribus stillatitiis saluæ & maioranæ; quod satis erit: formentur orbiculi, aut morsuli, pro ægrotantis arbitrio. Aliud, quod *Recipit diarrhodon abbatis, Diatriensantaloni, an. drach. vnā & dimidiam. Rosata nouella, drach. dimidiam. Pastillorum espodio, drachmam vnā. Seminum vtriusq; intybi satini, Cucumeris; Portulacæ, an. scrupulos duos. Lactuce, scrupulum vnum. Santala albi, rubri, an. drachmam dimidiam. Cum sacchari albiissimi uncis tribus dissolutis; in liquoribus stillatitiis caluthæ, & intybi satini, fingantur morsuli.**

Interdu vbi amissas & admodum imbecillas vires reficere ac restaurare studium est, perdicum & caporum pulpas (sic enim Latini vocant partes animalium carnosiores) item nuces pineas, amygdalas, vinas passas, & id genus alia medicamenta speciebus Antidotorum commiscentur: iterum, vt antea, adiecto saccharo, in conuenientibus liquoribus diluto, vt ex sequenti rescripto patebit, quod *Recipit Pulpa capri, unciam vnā. Perdicis, unciam dimidiam. Testiculorum galli, drachmas tres. Nucum pinearum repurgatarum, unciam vnā & dimidiam. Amygdalarum dulcium, unciam vnā. Pistaciorum instillatio rosarum liquore maceratorum, drachmam vnā & dimidiam. Seminum quatuor fri-*

Pondus sumenda.
Tempus exhibitionis.
Solidorum vsum.
Solida duplicia.
Orbiculi.
Rotula.
Morselli.
Lozengias.
Morsuli.

Compositio-
tionis solidorum ratio.

Pulpa.

gidorum maiorum, an drachmam dimidiam. Specierum diamargariton, Dianthon, an. scrupulos duos. Latificantis Galeni, drachmam dimidiam. Plercos archontici, drachmam unam. Cinamomi selecti, Ligni aloes, Macis, an. scrupulum unum. Cum saccharo candidissimo, quantum satis erit, in stillaticis boraginis & echii liquoribus dissoluto, formentur morsuli. Hic nulla certa sacchari quantitas indicata est. Præstat enim in similibus arbitrio pharmacopœi permittere, ut sacchari quantum libuerit adiciat, ne vel friabile plane medicamentum, aut inefficacius, sacchari copia ceterorum vim obruente, reddat. Tempus exhibitionis prædictorum Antidotorum, idem est quod liquidorum. Dant vero vna vice orbiculos duos, aut tres, plus aut minus, pro morbi & corporis ratione. Morsulus quoque dimidius, aut summum vnus, nisi exiguus admodum fuerit, pro vna vice sufficiet. Porro ordinis ratio requirere videtur, ut hoc loco de *Tragæis* vulgo vocatis confortantib. ageremus: verum ut de omnibus, quæ in puluerem rediguntur, vno in loco tractemus, cōsulius esse nobis visum est, ut ad caput de *Pulueribus* tragæas reiciamus.

De antidotorum purgantium usu. C A P. VI.

ANTIDOTA purgantia, Græcis *ὑγιαίνουσα* vocata, perinde atque roborantia, duplici forma effinguntur, & in officinis asseruantur, nempe liquida, & solida. Liquidorum is est usus. Medici huius ætatis duo, aut plura etiam inuicem cōmiserunt: eaq; in vino, liquoribus stillaticis, decoctis, iusculis carniū, aut leguminum, pisorum vel cicerum, aut id genus aliis diluta, bibenda præbent: ut ex sequentibus paradigmatis patet, quæ

I. *Recipit Antidoti indi maioris, drachmas tres. Diaphænicon, drachmas duas. Episcopi, drachmam unam, Misceantur.*

II. *Antidoti e psyllio, drachmā unam. Succo rosarum, drach. duas. Diaphænicon, drachmas tres. Liqueoris stillatici intybi satini latifolii, Cichorii, an. unciam unam. Boraginis, unciam dimidiam. Commixtis omnibus fiat potio purgatoria.* Præstat autem temper stillaticis liquorib. admiscere serapiū, q; vni eorunde augeat, & gratius ac iucūdius reddat medicamentū, in hunc modū: *Recipe Antidoti hamech, Diaphænicon, Diasena solutui, an. drach. duas. Liqueoris stillatici furniterra, Origani, an. unc. unam. Serapii de epithymo, unc. dimidiā. Misceantur.* Interim prædictis antidotis simplicia quædam medicamenta purgantia, quo validior eorundem reddatur & acuat facultas, adiiciuntur: ut sunt, agaricum, rhabdum, barbarum hodie nominatum, turperum, dactyrium, pastilli Alhandal barbaris vocati, & id genus alia: semper tamen illis quæ vehementiam eorundem frangere & remittere possunt additis, ut e subiectis rescriptis abunde innotescet, quæ *Recipit Agariçi selecti, drach. unam. Zingiberis, scrup. unum. Salis fossilis, scrup. dimidium. His omnibus diligenter tritis, adiiciantur, Antidoti indi maioris, drach. duas & dimidiam. Liqueoris stillatici hyssopi, Calamintha, an. unc. unam. Oxymelitis scillitici, unc. dimidiam. Misceantur.* Aliud: *Recipe Turpeti mediocriter triti, drach. unam. Mastiches, scrup. unum. Antidoti diaphænicon, drachmam unam & dimidiam. Decocti vuarum passarum, unc. duas. Mellis rosacei unc. unam. Commisceantur.* Aliud: *Recipe Medulle casie fistularis, drachmas sex. Antidoti diaphænicon, drach. unam & dimidiam. E succo rosarum, drachmam unam. Pastillorum alhandal, drachmam dimidiam. Decocti cichorii, Fœniculi, an. unciam unam & dimidiam. Commisceantur: & fiat potio purgatoria.* Sunt qui in frigidis morbis vinum admisceant, ut eo luauior fiat potio. Sic in calidis non raro zuparium violaceum adiicitur, partim ut alteret, partim etiam ut aluum lubricam reddat: quemadmodum e formula sequenti patebit, quæ *Recipit Antidoti hamech, drach. tres. Diaphænicon, drach. duas. Catholicon, drach. tres. Vini optimi, uncias duas. Serapii de epithymo, unciam dimidiam. Misceantur.* Aliud: *Recipe Antidoti e psyllio, drach. tres & dimidiam. Succo rosarum, drach. duas. Catholice, drachmam unam & dimidiam. Serapii acidi simplicis, uncias duas. Zuparii violacei, unciam unam. Commisceantur.*

Porro in iam dictis liquidis purgantib. Antidotis commiscendis nullus certus modus præscribi potest. Neq; enim omnes, eadem etiā medicamenta, cōsimili sensu percipiunt. Alii namq; ob eam quā induit corpus sensuum duritiem, præpotētiora vix sentiunt medicamenta. Alii rursus vel quævis sensu percipiunt, quemadmodū alii propter fluxam lubricamq; meatuum natiuum inanitatem, aut cedentis materiæ promptitudinem, & instrumentorū mollitiem, mediocribus parent purgatoriis medicamentis.

Qua-

A Quapropter præstat semper a mitioribus medicamentis purgatoriis aspiciemur, ut scilicet simul laborantis sensus exploretur, simul ut vehementiora tolerare exercitante usu condiscant ægrotantes: & si quando validioribus uti oporteat, ne vires labefactent intolerabiliorum medicamentorum transitus. Magna igitur prudentia opus est ne Medicus infra quam par sit consistat, aut quid iustum est excedat. Frequenter autem hodie de iis quæ paulo vehementiora sunt Antidotis purgantibus liquidis drachmas sex, aut paulo plus minusve, pro ætatis, sexus, morbi, anni temporum ratione, & pro sumentis viribus propinant. Ex mitioribus, & iis quæ aluum leuiter mouent, & quorum vis iecur non facile attingit aut transcendit, adeoque sine aliqua perturbatione ac molestia aluum exonerant: ut est, *Antidotus e prunis damascenis, e manna, catholica,*

A mitiorib. purgantib. aspiciendū

Pondus vñtatum.

B & similes, plus exhibemus, unciam nimirum interdum integram. Cauendum autem vix erit, ne inconsideranter medicamenta purgantia vlturpentur. Id quod primum fit, si hæc non nisi egentibus, & minime sanis adhuc existentibus dentur. Nam Hippocrate attestante, *qui sano sunt corpore per medicamenta purgati celeriter exoluitur, & iterum: Qui corpore sunt commoderato, hos purgare periculosum est.* Non recte etiam vlturpantur, ubi autem humorum morbum efficiunt, nisi humores turgeant, concoctionem exhibentur, quod tum dolores, tormina, vertigines, conuulsiones, perfrictiones, animi deliquia, & id genus alias noxas inferant. Minus recte quoque illa propinant, qui non adiciunt odorata, quæ medicamentorum purgantium intulauitatem & horrendum odorem retundunt, ac stomachum firmant. Quum enim omnia medicamenta purgantia, sola excepta aloe, stomacho aduersa sint, illumque subuertant, atque ei negotium facessant: ut illis permisceantur quæ malitiam eorundem frangant ac corrigant, necesse est. Ad quem usum *maſtiche, cinamomum, semen anisi,* & id genus alia adduntur. Commodissime autem propinantur diluculo, ubi scilicet ventriculus ciborum copia non grauiatur, atque concoctionem eorundem iam perfecit, *quemadmodum fufius hæc omnia in nostris Institutionibus docuimus.* Ab horum sumptione non dormiendum, aut sudandum, vtrumque enim medicamenti summi actionem impedit ac frangit. In somno enim medicamentum potum fere concoquitur, eiusque vis ita frangitur & dissoluitur, ut a reio. ioribus partibus trahere subinde nequeat, *ut copiosius Comm. 14. sect. 4. Aphorismorum monstrauimus.* Ut non temere ibidem, Hippocrates ita scriptum reliquit: *Eum qui veratrum biberit, ad corporis motiones magis, ad somnos vero & quietem minus ducere oportet.* Et iterum: *Quum volueris ut veratrum magis ducat, corpus moueto ubi sistendum esse censueris, somnum inducito, & haud moueto.* Non esse autem sudandum, cuius manifestum est, quum sudor sine motu humorum ad exteriora fieri nequeat. Quum autem in purgatione humorum motus ad corporis interiora fiat, sudoris motus qui ad exteriora fit, adeoque humorum motui contrarius plane existit, medicamentorum purgantium tractionem remoretur & impediat, necesse est. Atq; hætenus quis sit liquidorum usus indicauimus. Antidota purgantia solida in duplicem formam rediguntur, nempe orbicularem, vel triangularem. Pauca vero sub hac forma hodie in Medicorum officinis prostant purgantia medicamenta: nempe *Antidotum diaphœnicon, e succo rosarum,*

Purgantia medicamenta non inconsiderate danda.

2. Aph. 36. Ibid. Aph. 37.

Odorata firmantia stomachum purgantibus medicamentis permiscenda.

Exhibendi tempus. Quid a purgatione faciendum. Non dormiendum.

D *diaturpeti, diacartami.* Præstaret autem cetera quoque hac parari forma, quod maxime conducere iis, qui non instructas secum habent officinas. Hac n. forma parata medicamenta in multos dies, adde etiam septimanas, durare possent, quum liquida paucis admodum diebus situm contrahentia pereant. Ut plurimum autem ea, quæ sunt parata forma, citra vilius liquoris adiectionem semuntia, aut drach. quinque pondere propinantur. Interdum prius tusa in iusculo gallinæ, galli, aut capri exhibentur. Sunt qui in iis diluendis etiam iure pisorum, vel cicerum vtantur. Studendum hac in parte Medico erit, ut ægrotanti gratificetur, ne si assumpto medicamento, hunc nauseabundum reddat, illud paulo post vomitu reiciat. Horum nunc formulam vnā & item alteram, propter eos qui parum adhuc in iis rescriptis exercitati sunt, & recens ad faciendam medicinā accesserunt, subiiciemus: *R. Antidoti e succo rosarum solidi, unciam dimidiam.* Per se detur: *R. Antidoti diaphœnicon in tabulis, ita enim hodie loquuntur, drachmas sex.* Propinetur in iusculo capri. *Recipe Rotularum diaturpeti, unciam dimidiam.* Exhibentur per se, aut cum liquore congruente.

Non sudandum a sumpta purgatione.

Antidotorum purgantium odorati usus.

Exhibendi modus.

Bolus
quid.

Bucca.
Buccella.
Boloscopo
nēdi ratio.

INTER multas ac varias medicamentorum purgantium, a Medicis, propter ægro-
tantium mollitiem excogitatas formas, una etiam est, quam *Bolum* appellant. Nō est
autem bolus, nisi medicamentorum purgantium frustulum teres, & in sphaeræ modū
orbiculare rotundumve, esui aptum, mole sua tantum, quantum bucca com mode ca-
pere potest. Sunt vero hac voce, & in eadem quidem significatione, vñ optimi Lati-
næ linguæ auctores: inter quos minime postremus Terentius Comicus ita alicubi in-
quit, *Crucior bolum tantum mihi ereptum subito e faucibus*. Græci hunc *βλῆρον* φάρμακον, non-
nulli Latinorum interpretum Aetii *bucceam* nominant. A qua utique voce diminuti-
uum *Buccella* deriuatum est. Veteres suas buccellas in clibanis, ut ex Aetio liquet, torre-
bant, & in panis formam redigebant. Hodie vero variis effinguntur modis. Siquidem
interdum ex simplicibus tantum medicamentis purgantibus liquore aliquo exceptis
cōficiuntur, adiecto tamen saccharo: ut e sequenti patebit formula, quæ *Recipit Turpe-
ti, drachmam unam. Seminis anisi, Mastiches ana. scrup. dimid. Sacchari scrup. duos. Cum melle ro-
saceo quod satis est excipiantur, & fingatur bolus*. Nonnunquam ex Antidotis tantum pur-
gantibus liquidis, nullo alio simplici medicamento adiecto, saccharo exceptis, hunc
scilicet in modum parantur. *Recipe Antidoti indi maioris, drachmas tres. Diaphænicon, dra-
chas & dimidiam. Sacchari, quantum ad excipiendas Antidotos satis est fiat bolus*. Conficiun-
tur etiam aliquando non ex solis liquidis Antidotis purgantibus sed sacchara vocata
certorum simplicium, ad roborandum ventriculum, aliasque corporis principes par-
tes, illis commiscuntur: ut ex hoc apparet rescripto, quod *Recipit Medulla casie fistularis,
drachmas sex, Antidoti e succo rosarum, drachmas tres & dimidiam, Sacchari boraginis, Echii, an.
drachmam unam. Formetur buccella purgatoria*. Construuntur etiam interdum boli ex An-
tidotis purgantibus solidis, adiectis pulueribus & speciebus simplicium quorundam
purgantium medicamentorum, non neglectis iis quæ vehementiam eorundem re-
tundunt, ac malitiam corrigunt. Atque hæc omnia serapio, aut alio liquore congru-
ente excipiuntur, hoc quidem pacto: *I. Recipe Pulpa casie recens extracta, unciam unā. Rha-
barbari optimi, drachmas duas & dimidiam. Sacchari, quod satis est ad excipiendum: fiat bolus. II. Re-
cipe. Electuarium lenitiui de manna, drachmas sex. Diaphænicon, Specierum hieræ simplicis, ana.
drachmam dimidiam. cum saccharo fiat bolus purgatorius. III. Recipe. Florum Casie, unciam unam.
Specierum hieræ puræ, drachmā unā. Cum saccharo, quod satis est fingatur bolus. IV. Recipe. Diacar-
tami, placentarum, drachmas tres. Turpeti selecti, drachmam dimidiam. Seminum anisi, Mastiches
ana. scrup. dimid. Serapio ex hyssopo excipiat, & formetur bolus. V. Recipe. Pulpa casie, drach. sex.
Rhabarbari drachmam unam. Cum saccharo, quod satis fiat bolus. Recipe. Diacatholi. on, unciam
dimidiam. Rhabarbari, drachmam unam. Cum saccharo fiat bolus.*

Ceterum in componendis bolis diligentissime tam simplicium quam compo-
sitorum medicamentorum purgantium pondera sunt expendenda: quod sine horū
exquisita notitia, ut bolum recte construamus, fieri non potest. Nam vel plus, vel mi-
nus quam conueniat, ingeramus necesse est, si non cuiusque medicamenti purgantis
pondus cognitum habeamus. Qualia vero sint, libro primo huius Operis exposuimus.
Hinc igitur eorundem notitia petenda. Cauendum vero vnice erit, ne vniuersa boli
moles duarum vnciarum pondus excedat, quod scilicet maior quantitas vna vice ci-
tra fastidium ab ægro deuorari nequeat. Aut si deuorabit, non tamen sine nausea hoc
ipsum attentabit, quam subinde facile ventriculi subuersio ac vomitus comitabitur.
Hoc loco de *Tragais*, seu, ut *Nicolaus* vocat, *Drangais* purgantibus nobis agendum esset.
Verum tractationem de iis ad caput de *Pulueribus* reiciemus.

De diluti purgatorii usu. CA P. VIII.

Dilutum
quid?
Infusio.

Macerandi
tempus.

DILUTUM nunc proprie usurpamus pro liquore, in quo aliquid certo tempore ei-
tra elixationem maceratur. Nostræ ætatis Medici *Infusionem* appellant. Purgato-
rium itaque dilutum in præsentia, est liquor, in quo medicamenta purgantia concisa, trita,
vel in puluerem redacta, vel solida etiam, atque integra macerantur. Tempus vero quo mace-
rantur purgantia medicamenta, non vnum idemque omnibus statuitur. Interdum e-
nim per horas octo, duodecim, diem, biduum, triduum etiam, pro medicamenti na-
tura, & vario Medici scopo & necessitate, ut interim vis eorundem tota in illum li-
quorem transeat, macerantur. Non autem sola medicamentorum facultas in liquore
abit,

- A**abit, sed eius substantiæ etiam portio tenuior. Hinc est, quod dilutum Rh. barbari Indici vehementius purget, quam si ipsum per se & citra macerationem propinaretur: quod nimirum crassior eius substantia, & quæ illi inest adstrictoria facultas, in dilutum non transeat, sed in radice maneat. Necesse igitur est, quum amara & acris duntaxat qualitas eius in diluto sit, ut validius tum purget, quod omni sit destitutum adstrictione, qua aliis constringi tandem possit. Interdum tamen fieri potest ut crassioris etiã aliquid, præsertim dum quod maceratum est colando valentius exprimitur, aut per rarius colum transmittitur, in dilutũ transeat. Colandum igitur, & exprimendũ magis aut minus, pro ut plus aut minus purgare, nobis consilium est: & in summa, pro ægri, affectus, & medicamenti natura. Quanto enim medicamenta illa, quibus inest ad-
- B**strictio, magis exprimuntur, tanto minus purgant. Contra, alia quibus hæc minime inest, quanto magis exprimuntur, tanto magis etiam purgant. Quare quid hæc in parte faciendum sit, Medicus ex ægrotantis, affectus, & medicamenti natura, ut comprehensum est, discat oportere. Ceterum macerandi purgatoria medicamenta ratio veteribus parum frequens fuit, ideoque a recentioribus in diuinitum & delicatorum gratiam excogitata. Quorum pilato ut plane inseruiant, diluta ipsa quoque saccharo, & aliis interdum sic condiunt, ut æger se medicamentũ hausisse vix sentiat. Quod sane studium Medicorũ, nisi metus esset, ne purgantium facultas hac ratione prorsus sopiretur, non damndũ esset. Est quando vice diluti, in sculo aliquo purgantia medicamenta nodulo ligata incoquimus. Quæ sane ratio ad decocta magis spectare videtur. In componendis autem dilutis, principio necesse est purgantium medicamentorum modũ ac pondus recte teneat Medicus. Maius vero esse pondus macerati medicamenti purgatorii, quam si per se & in substantia propinatur, nempe duplum fere libro primo a nobis abunde dictum est. Obseruandum etiam, ut purgantibus medicamentis semper commisceantur, quæ eorundem vehementiam refrenare possunt. Tempus quoque & quantisper sint maceranda, ut exprimatũ necesse est, Quod quantũ esse debeat, paulo ante dixim⁹. Vbi vero tẽpus ad macerandũ sufficiens, & a Medico præscriptũ abierit, atque medicamenta satisiã macerata sunt, colantur: ac valide (præsertim cũ ut plus purgent nobis consiliũ est) exprimuntur. Quo peracto, Antidota purgantia liquida, expresso liquoris additis serapiis congruentibus quo suauior fiat potio, commiscantur, ad eũ, quẽ sequentia rescripta præscribunt modum. Formula ubi per se sumitur leniens.
- D***Rhabbarbari, drach. vnã. Serapii & rosis solutiũ, vnc. duas. Misceantur.*
- I.** *℞ Rhabbarbari Indici selecti, drachmas tres. Agarici albi, drach. vnã & dimid. Spica nardi, drachmam vnã. Zingiberis, scrup. vnũ. Concidantur singula minutatim, & macerentur in liquoribus stillat. ciis Intybi satiu latifolii, Cassia, Boraginis, ana vnciam vnã. Durent in iis per horas duodecim: dein in linteolum mundum coniecta, valide exprimentur, & colentur: adiectaque serapii ex Intybo satiuo latifolio semuncia, fiat potio.*
- II.** *℞ Rheibbarbari selecti, drachmas duas. Spica scrupulum vnum. Agarici in pastillos redacti, scrup. duos. Zingiberis, scrup. dimid. Concisa macerentur horis octo, in liquoribus stillaticis Intybi satiu latifolii, vncias duas. Apii, vnciam vnã. Vini optimi, vnciam vnã & dimidiam. Postea probe exprimentur & colentur: adicianturque: Antidoti & succo rosarũ, drach. vnã. Diaphænicon, drach. dua. Fiat potio purgatoria.*
- E****III.** *℞ Agarici optimi, drachmas duas, Zingiberis scrupulum vnum. Salis fossilis, grana duob. Trita hæc omnia macerantur horis duodecim in Vini albi odori, Liquoris stillatici absinthii ana vnc. vnã. Fœniculi, vnc. vnã. Exprimentur subinde, & colentur: adicianturque: Antidoti indi maioris, drach. dua & dimid. Oxymelitis scillitici, vnc. dimid. Fiat potio.*
- IV.** *℞ Turpeti selecti, drachmam vnã, & dimid. Mastiches scrup. vnum: Trita macerantur horis octo in vini odoriferi vnciis tribus. Dein probe exprimentur, & per colum traiciantur, adicianturque: Antidoti indi, drach. tres. Mellis rosacei, vnc. dimid. Commisceantur omnia, & fiat potio purgatoria.*
- V.** *℞ Myrobalanorum flauorum, drach. duas. Seminis anisi, Spica ana scrup. dimid. Trita macerantur diu noctuque in decocti passiarum vuarum vnciis tribus, postea valide exprimentur: & adiciuntur Antidoti & succo rosarum, drach. dua. Eprunis damascenis purgatorii drach. tres & dimid. Zulapii violacei, vnc. dimid. Misceantur, & fit potio.*

Dilutum
Rhabbarbari
Indici vehē
menter pur
gat.

Macerandi
purgatoria
ratio a recē
riorib. excō
gitata.

Dilutorum
componē.
doru ratio.

Peculiaris
diluendi
componendi
ratio.

Atq; hactenus solennes ac consuetas omnium fere, quæ macerantur, medicamentorum purgantium formulas recensuimus. Sunt tamen, qui pro humorum in corpore redundantium diuersitate, peculiaria decocta pro purgantibus medicamentis macerandis conficiunt. Verbi gratia, vbi sanguis plus iusto auctus incaluerit, decoctum e *prunis, myxis, ziziphis, oxyphœnicis, & id genus aliis fructibus adiectis quatuor seminibus frigidis* adornant. Sin pituita exsuperat, e seminibus atque radicibus quæ obstructions tollunt, crassosque humores incidunt, decoctum parant, cuius exemplum infra in capite de *Decoctis* recitabimus. Si flaua bilis exundare cœperit, e violis, in ybis, lactuca, & eiusmodi quæ feruorem bilis obtundere valent, decocta faciunt. Quæ quidem ratio quum sit parum, vt diximus, vtitata, ideo eius vnicum duntaxat exemplum subiiciemus.

VI. Recipe Ficum, numero decem. Vuarum passarum purgatarum, unciam vnā. Glycyrrhizæ repurgatæ, unciam dimidiam. Myxarum, Ziziphorum, ana. numero septem. Cinamomi selecti, scrupulum vnum. Intybi satini vtriusq; Violarum, Rosarum, ana manipulum vnum. Seminum quatuor frigidorum maiorum, ana drachmam, vnā. Coquantur tantisper in aqua iustæ quantitatis, dum medietas relinquatur. Deinde in decocti huius per colum transfusi vncii tribus macerentur per noctem, Rheibarbari, drachmas tres. Spicæ, drachmam vnā. Postea valide expressis, & per colum transmissis, addatur semuncia Zulapii violacei, & fiat potio.

De catapotiorum usu. C A P. IX.

Catapotiū.

Pilulæ.

Catapotia
cur excogita-
ta.

QVVM propemodum omnes purgantium medicamentorum hodie vtitatas formas hactenus exposuerimus, vt de catapotiiis etiam, quod illorum vsus hac ætate frequentissimus sit, agamus necesse est. Porro *catapotium*, Græcis medicamentum est, quod integrum deglutitur, a *καταπιβειν*, quod deglutire significat, ita dictum. Latinis a parua pilæ similitudine, & figura quam referunt, *Pilula* nominatur. Catapotia vero, vt facilius ab ægrotis deuorentur, & vt moram in ventriculo longiorem agant, atque a remotioribus in ipsum & intestina humores vacuandos attrahant, a Medicis sunt excogitata. Massa enim durior, qualis est catapotiorum, ægrius a ventriculo comminuitur: ob idq; tardius agit. Liquida vero contra confestim vacuant, & simul vacuantur. Sunt etiam inuenta, vt simul deuorentur, ne suo ingrato sapore linguam vitient, & ne ventriculum per se satis humidum, nouo humoris genere degrauemus. Quia vero fieri non potest, vt tam celeriter deglutiantur, quin aliquid insuauitatis post se relinquunt: ideo foliis auri, carne fructuum, vel alio quopiam simili interiecta, vel in cinamomi, aut similium rerum odoratarum pulueribus volutata exhibentur. Ceterum quæ cito agere volumus catapotia, damus admodum mollia, præcipue quibus imbecillus est ventriculi calor, ideoque illa liquore aliquo, aut melle emolliuntur. Quæ diu seruanda sunt, ea non ex solo stillaticio liquore, aut solo succo formari debent, quod citius siccantur, vel situm contrahant: nec vires simplicium cohibent, sed serapiis actionem eorundem iuuantibus, vel alio, & glutinoso & iucundo humore formentur. Qui hodie medicinam faciunt, catapotiorum triplicem in quantitate differentiam statuunt. Quædam enim ceteris maiora effingunt, vt scilicet diutius in ventriculo morata, validius ad se noxios humores trahant. Eiusmodi sunt, quæ caput potissimum expurgant, ideoq; ab iisdem Capitalia nominantur. Nonnulla minima, cum aliis collata, fingunt, vt nimirum ocyus in ventriculo dissoluantur, permuteanturque. Atq; hæc quidem ventriculum magis confortant, minusque purgant. Eius generis sunt *aromatica*, siue *alephangina*: & *pestilentialia*, seu *Rufi* vocata. Aliqua mediocri quantitate formantur, vt sunt cætera fere omnia catapotia. Tempus exhibendorum catapotiorum fortissimum, & potenter a toto corpore trahentium, idem quod aliorum medicamentorum purgantium, nempe maturinum esse debet. Hoc enim tempore natura, quæ cibum vniuersum probe iam concoxit, medicamento in humorum expulsionem adminiculatur. Aliis vero temporibus circa ciborum concoctionem occupata, medicamenti actionem iuuare non potest.

Exhibendi
tempus.

Error medi-
corū nostri
temperis
damnatus.

Quapropter medicamentum naturæ auxilio destitutum, minus vacuat. Alimentum præterea, naturæ actionem interturbans, corrumpit, adeoque non contemnendam noxam infert. Damnanda igitur modis omnibus nostri seculi Medicorum consuetudo

A suetudo venit, qui vesperi duabus aut tribus a cœna horis maiora catapotia, minora vero totidem ante cœnam horis sumenda esse præcipiunt. Nam hæc non solum rationi iam expositæ, sed & veterum auctoritati aduersatur. Ex multis autem vnum produxisse Paulum, satis sit, qui *lib. 7. cap. 4.* ita ea de re scriptum reliquit: *Qui vesperi medicamentum purgans exhibent, aut a cibo, noxam inferunt: quippe alimentum corrumpit, humoremque minus vacuat.* Hortor itaque amantes veritatis, vta deterrimâ, & non sine magno errore introducta consuetudine recedant, nec cum multis errare subinde pergant. Non latet autem, quosdam hoc loco Galeni auctoritatem nobis opponere, vt qui *lib. 14. Ther. methodi, cap. 8.* pilulas ex aloë, colocynthide & scammonia cuidâ ægrotanti tumore linguæ laboranti exhibuerit. Verû si historię huius vniuersas circumstantias expendant, nihil illorum errori patrocinari Galenum experientur. Nam etsi vesperi dedit, tamen ieiuno adhuc dedisse constat. Morbus namq; quo ille laborauit, acutus fuit, ideoq; tenuē victus rationem requisit: vt verisimile sit, illum nihil comedisse. Et Galeni temporibus tam exquisita victus ratio, sanorum etiam erat, vt in cœna nihil sumerent, aut saltem exiguo cibo vterentur. Præterea a prandii tempore vsq; ad vesperinum satis spaciū fuit, in quo exquiritē cibum illum, quem sumit, pro huius ætatis more exiguum, concoquere exquiritē potuit. Deniq; si idem paulo ante pilularum exhibitionem aliquid cibi sumisset, haud dubie Galenus silentio minime transisset. Proinde vana spe lactantur, qui ex hoc loco sui erroris patrocinium querere se posse putant. Nec temere a nobis dictum est, *catapotiorum fortium.* Nam prædicta exhibendi ratio non in omnibus catapotiiis seruanda erit. Est enim, vbi ventrem totum inferiorem, ventriculum, & primas venas leuiter exonerare consilium est, & nauseabundum stomachum roborare. Quare tum catapotiiis leuibus vtendum, qualia sunt *aromatica dicta, Rusi, mastichina, ex aloë, & quæ ante cibum a consueto vtendi tempore a nonnullis hodie nuncupantur.* Hæc enim hora vna ante epulas, aut etiam post exhibentur, tuncque parua quantitate sumta, abunde purgant, vnaque potum & cibum absque noxa deturbant. Quod profecto vacationis genus in primis ventriculo magna copia pituitæ referto conducit. Quippe redundans humor tunicis ventriculis adhærens facile tum eluitur, & medicamenti vis in partis substantiam ad vires reficiendas promptissime penetrat, qui sane est præcipuus instituti scopus. Reliquum catapotiorum genus, consuetum exhibendi tempus non mutat, & matutinis horis cum ceteris purgantibus medicamentis deuorandum propinatur. Sub matutina vero hora complectimur etiā mediam noctē, modi qui assumpturi sunt catapotia leuissime cœnarint, & id quod post primum somnum est tempus. Componendorum Catapotiorum ratio hodie vsitata eius modi est. Aliquot catapotiorum genera, tria nimirum, plura aut pauciora, inter se commiscunt, & raro vnius generis catapotiiis vtuntur. Addunt fere semper, quod illorum vehementiam augere potest, verbi gratia *aloë, dacrydium, agaricum in pastilli formam redactum,* & eum qui Arabibus *Alhandal* dicitur. Hæc omnia subinde rursus in mortario, cum stillaticio aliquo succo, vel liquore, aut serapio cōueniente, in catapotiorum formam iterum cogunt: & ea subinde cinamomo, vel auro obuoluunt, vt minori negotio deuorentur, vt etiam paulo supra diximus. Vt facilius deuorentur prunorum aut pomorum pulpâ inuolui possunt, vt & paneczymo vino molliter perfuso: Alexander Trallianus ex ouo sorberi præcipit. Nullo etiam negotio serapio aliquo, verbi gratia, rosaceo solutio illita deglutiuntur, quod aliquot rescriptis palam faciemus, vt instar illorum alia condi queant.

Obiectio diluitur.

Componendorum catapotiorum ratio.

I. *℞ Pilularum alephanginarum, Aggregatiuarum, e hiera simplici, ana scr. vnum. Aloës optima, scrup. dimid. Dacrydii, grana duo.* Cum stillaticio foeniculi liquore fingantur pilulæ duodecim, & in cinamomi puluere volutentur.

II. *℞ Catapotiorum ex agarico, Stomachicorum, ana drach. dimid. Agarici, in pastillos redacti, scrupulum dimidium. Dacrydii, grana tria.* Cum stillaticio hyssopi liquore, tormentur catapotia nouem.

III. *℞ Pilularum azaiareth, scrupulos duos. Lucis maiorum, scrupul. vnum. Sine quibus esse nolo scrupul. dimid. Pastillorum alhandal grana quatuor. Mastiches, grana duo.* Cū stillaticio liquore eufrasie, fingantur pilulæ vndecim. Interdum catapotiiis comp. sitis simplicia quædam medicamenta purgantia, adiectis etiam iis quæ vehementiam eorum

dem corrigunt ac frangunt, addere solent: hunc quidem in modum. *℥ Pilularum cochlearum, scrupulos duos. Azaiareth, De hiera composita, ana drach. dimid. Agarici in pastillos digesti, scrup. duos. Myrobalanorum cepulorum scrup. unū, Mastiches, scrup. dimid. Turpeti selecti, scrupulum unum. Seminis anisi, scrupulum dimidium. Granorum peonia, numero tria. Stichadis scrup. unum. Castorii, grana tria.*

Cum serapio e stichade formentur catapotia ex vna drachma septem, auroque tecta deglutiantur.

Pondus exhibitionis.

Pondus exhibitionis catapotiorum magna ex parte drachmæ vnius pondus non excedit. Licet tamen interdum plus, nonnunquam etiam minus, quanquam raro, pro corporum & naturarum diuersitate, exhibere. Reliqua illis cum cæteris purgantibus medicamentis communia sunt.

De vscorum qua vomitum eliciunt. C A P. X.

Vomitum cientium differentia triplex.

Leuia.

Mediocritia.

Vehementia.

MEDICAMENTORVM, vomitum cientium, triplex est differentia. Quædam n. leuiter admodum vomitum mouent. In quorum numero sunt, aqua calida, & hordei decoctum. pota: item ficuum multa comestio, & sopici illius serui exemplo: oleum, primis digitis coctis, faucibusque immixtis ac intrusis, ingestum. Præterea serapium acidum, oxymel, & aqua mulsa. Alia mediocriter vomitum cient: ut sunt, anethi flos & semen, rapi item, atriplicis, & cruce semina. Denique raphani radix cortex præsertim eius, & semen, betonica narcissi, & cucumeris satiuæ radices. Nonnulla sunt, quæ cum vehementia vomitum eliciunt: veluti, vterq; elleborus, cucumeris sylvestris radix, sesamoides, daphnoidis folia, sparti flores semina & siliqua: nux item vomica appellata, & id genus alia. De his omnibus tribus generibus paradigma & exempla subiiciemus. Leue: *℥ Decocti hordei, uncias duas & dimidiam, Olei communis, Oxymelitis simplicis, ana unciam unam. Commixtis omnibus, fiat potio.* Mediocre: *Recipe Florum anethi, Atriplicis, ana manipulum unum. Seminis raphani, drachmam unam. Rapi, drachmam dimidiam. Radicis betonica, drachmam unam & dimidiam. Hyssopi, Manipulum dimidium.* Coquantur singula in aqua iustæ quantitatis ad tertias, dein colo transfundantur: & *Recipe Decocti colo transfusi, uncias quatuor. Oxymelitis simplicis, uncias duas. Commixtis omnibus, fiat potio.* Vehementia: Qui validiora medicamenta, potissimum elleborus, sumpturi sunt, ii diebus aliquot incidentia, tergentiaque præsumere debent. Eosdem quoque exilem cibum præsumisse iuuat. Corpus etiam lauacro, & quiete humectandum. Id quod maxime faciendum, vbi strangulatus suspicio metusve imminet, aut imbecillitas subest. Munitis enim alio cibo corporibus, vomitus nihil periculi minatur. Vehementis vomitorii hoc adiacere rescriptum voluimus: *℥ Atriplicis, Asari ana Manipul. unum. Seminis geniste, Sesamoidis maioris, ana drachmam unam. Bulbi vomitorii, drachmam dimidiam. Radicis ellebori albi, scrupulum unum.* Coquantur in aqua iustæ quantitatis ad tertias, dein colentur. *℥ Decocti colo transfusi, uncias tres & dimidiam. Oxymelitis scillitici, uncias duas & dimidiam.* Misceantur.

Sumendi ratio.

Potiones, quæ vomitus ciendi gratia bibuntur, tepidæ affatim sumendæ sunt: ita enim ad concitandum vomitum magis sunt efficaces. Immittenda etiam interdum penna oleo intincta in gulam, ad irritandam expultricem facultatem. Quæ mediocriter vomitum eliciunt medicamenta, ieiunis etiam propinari possunt. Ellebori præparationem, si quis eo solo uti velit, ostendimus *Seet. 4. Aph. com. 13.* Mensura decocti vomitorii sint vnc. quatuor cum vnciis duabus oxymelitis.

De saccharorum & conditorum usu. C A P. XI.

Flores saccharati.

Conseruæ.

SOLENNE est hoc tempore, ut stirpium flores & alia complurima ad dulcorationem & conseruationem saccharo vel melle condiantur: idq; non temere, quod hæc conditura ars ægrotis magnū momentū affert, dū eo inuento medicamenta alioqui per se satis fastidita, ita condulantur, ut stomacho & palato grata sint, aut etiā in plures annos integra, & veluti recentia durent. Sic hodie flores stirpium multarum saccharo condiuntur, & ob id flores saccharati rectissime appellarentur, verbi gratia, viola, vel rosa saccharata. Tamen vsus obtinuit ut Sacchara, & conseruæ magis violarum, rosarumque nominentur. Ceterum olim non tantum ex floribus, verumeriam e stirpium succis conficiebantur: quemadmodum ex Actuario, recentiore Græcorum scriptore, abunde liquet: qui Iosacchar, id est, violaceum saccharum, ex violarum succo & saccharo

A factitatum medicamentū esse, memoriæ prodidit. Conditum quoque voce hodie aliter, *Conditum*. ac olim vtuntur medici. Veteribus enim conditum erat, quod ex aromatis, & aliis odoriferis medicamentis vino & melle incoctis parabatur, quale est conditum calculos frangens Pauli, & conditum Oribasii ad calculum in vesica conterendum, & conditum aliud piperatum. Hodie vero Conditā appellant medicamenta, quæ saccharo vel melle, vel utroque condiuntur & dulcorantur, ut gula & stomacho, ut dictum est, sint grata, & diu integra seruari possint, & recentibus proxima. Condiuntur autem hodie maxime fructus, radices, & semina. Et conditi nomen recentiores, ad ea etiam medicamenta referunt, quorum semina & radices saccharo teguntur & incrustantur. Sic semina coriandri, anisi, fœniculi, carei, & alia: item pimpinellæ radices saccharo rectas & incrustatas, *Conditas* hodie vocamus, quæ magis proprie forte *Bellaria* & *Tragemata* dicerentur. Porro quod ad vsum saccharorum & conditorum attinet, sciendum interdum per se, citra aliorum medicamentorum accessionem, in vsum vocari. Nonnunquam eis permiscentur Antidota, quæ certis corporis partibus robur addunt, adiectis eorundem speciebus, & pastillis congruentibus: item, medicamentis aliis simplicibus eiusdem facultatis, & serapio aliquo excipiuntur: vt e sequentibus formulis patebit. Sic parata enim medicamenta, quum mediæ sint consistentiæ, neque fluida nimis, neque dura & sicca, facile ægroti palatum alliciunt: conseruis ipsis plerunque largiore humore diffluentibus, & pulueribus seu speciebus, aut antidotis molesta soliditate præditis.

Saccharorum & conditorum vsum.

E I. ℞ Sacchari rosacei veteris, Diacotoneon sine speciebus, an. unciam unam & dimidiam. Diatrion santalon, unciam unam. Pastillorum espodio, Terra lemnia, an. drachmam unam & dimidiam. Radicis symphyti maioris, drachmam unam. Bistorta, drachmam dimidiam. Balaustrorum, Boli armenii, Sanguinis draconis, an. scrupulos duos. Serapii myrtini, quantum ad excipiendum satis erit.

II. ℞ Sacchari florum betonica, Lauandule, Rosmarini, an. drachmas tres. Maiorana, Salvia, Pæonia, an. drachmas duas & dimidiā. Antidoti diambaris, unciam dimidiā. Acori conditi, drachmas septem. Corticum myrobalanorum, cepulorum conditorum, unciam unam. Zingiberis conditi, drachmas tres. Specierū dianthos, Diamoschi dulcis. Aromatici rosacei, an. drachmam unam. Serapii estichade, quod ad excipiendum sufficiet.

D III. ℞ Conserua cichorii, Betonica, Salvia, an. unciam unam. Zingiberis conditi, Radicis pimpinelle condita, an. unciam dimidiam. Specierum dialacha, Diatrion pipereon, Dianisi, an. drachmam unam. Serapii ex Eupatorio, quantum ad excipiendum satis erit.

Ad eorum rescriptorum exempla, infinita alia strui possunt: quapropter ad aliorum vsum indicandum progrediemur.

De eclegmatum vfu. C A P. XII.

C Ræcis ἐκλέγματα, & ἐλέγματα, & ἐλεκτα, medicamenta sunt, quæ linguntur & lambuntur verius, quam deuorantur, ac si dicas *lingibilia*, & retenta in ore, aut lingue subdita, paulatim liquefcunt, tabescuntue. Latinis *linctus*, & *eclegmata* appellantur. Nostræ ætatis medicis Mauritanam sectantibus medicinam, *Loch*, vel *Lohac* nominantur. Est autem medicamentum ad thoracis & pulmonis vitia efficax, & ad pituitæ in thoracem effluxum educendum idoneum. Porro quotidianus vsum obtinuit, vt eiusmodi Loch inuicem commisceantur. Quanquam interdum etiam per se citra reliquorum accessionem sumuntur. His igitur alia quedam tum simplicia, tum composita medicamenta, pulmonis & thoracis vitiis conuenientia permiscentur: vt est, diatrageantes antidotum, diapennidion, pastilli pectorales appellari, catapotia bechica dicta, succus glycyrrhizæ, tragacantha, saccharū candefactum, gummi arabicum, & id genus alia tenacia, vt diutius in pulmone & thorace retenta, actionem suam exserere possint. Item Conseruæ appellatæ, antidota roborantia, cum eorundem speciebus, vt e subiectis patebit formulis.

F I. ℞ Eclegmatis sani & experti, drachmas duas. Escilla, drachmam unam. Epineus nucibus, Pulmone vulpis, an. drachmas duas & dimidiam. Diapennidion, Diatrageantes, an. unciam dimidiam. Specierum diaireos, drachmam unam & dimidiā. Pastillorum pectoralium, drachmas tres. Succu glycyrrhizæ, drachmam unam & dimidiam. Radicū inula, scrupulos duos. Ari, scrupulum unum. Serapii e marrubio, quantum ad excipiendum satis est.

II. ℞. Sacchari violacei, Nymphaeæ, Rosacei, an. unciam dimidiam. Boraginis, Cichorii, an.

drachmas tres. Diarrhodon abbatis, unciam unam. Eclegmatis de papauere, drachmas tres. Specierum diatrios fantalon, drachmam unam & dimidiam. Tragacanthæ, drachmam unam. Zulapii violacei, quantum ad excipiendum sufficit.

**Exhibitio-
nis tempus.** Exhibentur quouis tempore ante & post cibum sumtum, nucis auellanæ, aut fabæ quantitate. Potissimum autem diluculo & vesperi. Præstat, ut pondere vnius vnciæ lambendo sumantur. Detinentur in ore, donec sua sponte liquecant, atque adeo paulatim descendant, & per asperam arteriam ad pulmonem & thoracem perueniant. Proinde quum crassum & lentum pus, aut similis pituita ex thorace aut pulmonibus educenda est, ecligmata liquore multo ad rem præsentem idoneo sunt diluenda.

De zulapiorum usu. CAP. XIII.

**Zulapium.
Iulebum.**

Actuarius & alii recentiores Græci, barbara quidem voce ζυλάπιον vel ζύλαπον appellant id medicamentum, quod alii *Iulapium*, alii *Iulebum* siue *Iulepum* nominant. Fit autem è stillatitio liquore, vel rectius e succis cum saccharo coctis. Saccharum enim succos a putrefactione conseruat. Seplassarii a legitima componendi Zulapiorum ratione, auaritiæ stimulis agitati, recedunt, ut copiosius lib. 2. huius Operis diximus. Nam ut horum componendorum rationem hic doceamus, non est necesse, quod id ipsum loco iam citato præstiterimus. Ceterum in Zulapiorum usu hodie quidam religiose obseruant, ut simplo Zulapiorum ponderi, stillatitiorum liquorum quadruplum respondeat. Quod fit in iis Zulapiis, qui non coquuntur, de quorum compositione hic agimus. Verbi gratia, si Zulapiorum pondus sit vncias tres, liquorum stillatitiorum esse debent vncias duodecim, ut e sequenti manifestum fit formula, quæ

℥. Zulapii violacei, Rosacei, an. unciam unam & dimidiam. Liqueurum stillatitiorum intybi satui, Oxalidis, Boraginis, an. vncias tres. Commisceantur inuicem, ac fiat potus.

Actuarius.

Actuarius, inter Græcos non contemnendæ auctoritatis scriptor, ex variis simplicibus medicamentis Zulapia componit, non ut hodie fit, ex vino duntaxat & aqua. Ad quam utiq; componendi rationem respicere videntur, qui zulapiis admiscunt serapia, stillatitios liquores, odorata, & species: ut e subiectis rescriptis omnib. innotescet, quæ

I. ℥. Zulapii violacei, Serapii & glycyrrhiza, an. unciam unam. Decocti hordeacei, vncias tres. Cinamomi, unciam unam. Stillatitiorum liquorum, tussilaginis, Scabiosa, an. vncias duas. Commixtis omnibus fiat potio, qua ad esculenta vtatur æger.

II. ℥. Serapii e menta, unciam unam. Ex eupatorio, unciam unam & dimidiam. Hyssopo, unciam dimidiam. Liqueurum stillatitiorum origani, Mentha, Buglossi, an. vncias quatuor. Cinamomi selecti, Caryophyllorum, an. scrupulos duos. Specierum aromatici rosacei, drachmam dimidiam. Diambæ, scrupulos duos. Commisceantur singula, & fiat potio.

Vsus prioris potionis in febribus esse potest, & aliis calidis morbis, ubi vini vices, quo tum abstinendum est ægris, supplet. Alterius in frigidis, tussi præsertim, usus esse potest.

De succorum medicatorum usu. CAP. XIII.

**Succi me-
dicati.**

Rob.

Mina.

**Sapa.
ζύμα.
σπείρον.**

**Defrutum.
Carznum.
Vfus.**

Succos medicatos cum Actuario ipso vocamus eos, qui primo purgantur, & descantur: dein vero solis aut ignis calore sic densantur, ut longiore citra corruptionem tempore asseruari valeant. Arabes, & nostri temporis Medici, *Rob* & *Robus* appellant. Ex quorum etiam numero est is quoque, quem barbara voce *Miuam* vocant. Sic autem nominant succum fructuum, eo usque decoctum, ut sapor aut mellis consistentiam accipiat. Sapa vero non est nisi mustum ad tertiam partem decoctum. Græcis ζύμα & σπείρον dicitur. Sapa calefacit, dolores mitigat, quia rosionis expers est, discutit, & concoquit. Magnam quoque saporis gratiam ad intinctus habet. Nutrit, & aluum lenit. Quod si vero ad dimidiam partem per decoctionem mustum redactum fuerit, *Defrutum* Latinis nuncupatur. Vbi vero tertia deperdita, duæ partes remanserint, *Carenum* vocatur. Succis autem medicatis sic hodie vtuntur Medici in suis rescriptis. Commiscent illos roborantibus antidotis tum liquidis, tum solidis: item saccharis, adiectis aliquot medicamentis simplicibus idoneis, serapio aliquo exceptis, quemadmodum sequens formula perspicue demonstrat, quæ

℞. Succi medicati e ribes, Diamoron, Hydromalon, an. unciam dimidiam. Diacotoneon sine speciebus, drachmas sex. Sacchari rosacei veteris, unciam unam. Radicis symphyti maioris, Bisfortæ, an. drach-

A *an. drachmam dimidiam. Boli armenii, Balaustiorum, Sanguinis draconis, an. scrupulū dimidium. Pastillorum e spodio, Terra lemnia, an. drachmam unam.*

His quibus opus est, in puluerem redactis, singula commisceantur: & cū Serapio myrtino, quantum sufficit, ad mellis consistentiam coeant. Sunt qui succos medicatos cum stillatitiis liquoribus instar Serapiorum, de quorum usu sequenti capite dicemus, permisceant: ut ex sequenti paradigmate patebit, quod

℞ Succī medicatī ē berberis, unciam unam. Hydromeli simplicis, Diacaryon, an. drachmas tres & dimidiam. Liqueoris stillatitiī plantaginis, Oxalidis, Fragorū, an. unciam unam. Misceantur, fiat potio.

B Utimur autem illis perinde atque conferuis & serapiis, tum potissimum, vbi ad strictionis nobis incumbit necessitas.

De serapiorum usu. C A P. XV.

Serapium vocat Actuarius, compositionem eam, quam hodie voce alia magis vsitata *Serapium.* *Syrupum* nominant. Sic vero appellant succos vel medicamenta, cum melle vel saccharo, vel utroque simul, donec concreuerint, & iustam consistentiam consequantur, decocta. Qui hodie faciunt medicinam, in breue & longum (sic enim loquuntur) digerunt serapium. *Breue*, quod parum aquei in se humoris habet, appellant: alioque nomine commune vocant. *Longum*, id est, aquosum, quod ad perfectionem non sit coctus, & humoris aquei in se multum contineat, esse dicunt: alioque nomine *Decoctum* nuncupant. Differt itaque Serapium proprie dictum a decocto duratione, consistentia & suauitate. Serapium enim probe coctum ultra annum etiam interdū citra corruptionem durat, & efficax existit: decoctum vero vix ultra septimū diem seruari potest quin corrumpatur. Præterea Serapium ad iustam spissitudinem decoquitur: decoctū vero, quod plus aquei humoris retineat, nequaquam. Denique serapium plus sacchari aut mellis quam decoctum accipit, ideoque suauius & gustui gratius est. Porro in serapiis commiscendis omnes propemodum hodie Medici hunc obseruant morem, ut ea cum stillatitiis liquoribus idoneis ac conuenientibus permisceant, ac ita potanda præbeant. Et in iis confundendis religiose admodum obseruant, ut sit dupla liquorum stillatitiorum ad simplicem serapiorum mensura, quemadmodum e sequentibus formulis luculenter admodum apparebit. Tamen licebit interdum, ita postulante & ægri, & morbi natura *Breue, siue commune. Longum. Decoctum.* **D** plus aut minus de serapiis & aquis stillaticiis exhibere. Parum serapiorum, & multum stillatitiorum liquorum, vbi sitis vrget & infestat. Plus serapiorum, minus stillatitiorum liquorum, vbi quæ in ventriculo, & aliis vicinioribus sunt partibus, alterare consilium est. Nunc paradiigmata subiiciemus, quorum

I. ℞. Serapii violacei, unciam unam. Intybi satini, unciam dimidiam. Liqueoris stillatitiī cichorii, Intybi satini latifolii, Borriginis, an. unciam unam. Misceantur.

II. ℞. Mellis rosacei colati, Oxymelitis simplicis, Serapii e calamintha, an. unciam dimidiam. Liqueorum stillatitiorum hyssopi, Calaminthæ, Feniculi, an. unciam unam. Commisceantur.

III. ℞. Serapii e mentha, unciam unam. Hydromeli compositi, unciam dimidiam. Liqueoris stillatitiī absinthii uncias duas. Mentha, unciam dimidiam. Misceantur.

E Atque hæc breuium nominatorum serapiorum commiscendi ratio est. Quo autem pacto longa sint construenda serapia, sequenti capite dilucide explicabitur. Exhibentur frequenter appetente diluculo serapia, antea quidem igne, aut feruente aqua, instar aliorum liquidorum medicamentorū, quæ a ieiunis hauriuntur, calefacta. Nonnunquā etiam vesperti, & iam dormituris propinantur: idque potissimum fit, vbi somni conciliandi gratia sumuntur. *Exhibitio. nis tempus.*

De decoctis parandis. C A P. XVI.

Decoctorum varia sunt genera. Quædam enim ad præparandos tantum, & alterandos humores vsurpantur: quædam vero non tantum in hoc, ut præparent & alterent, sed & ut simul purgent, aliosque multos effectus in diuersis partibus corporis præstent, adhibentur, quæ hodie suo more *Magistralia* appellant. Sunt etiam nonnulla, quæ priuatim purgantia vocantur decocta. De quibus omnibus rescripta subiiciemus ordine: modo prius, e quibustrebus decocta componantur, ostendamus. Parantur autem decocta maxime e stirpium radicibus, foliis, surculis, fructibus, seminibus, corticibus & lignis. Et usus obtinuit, ut foliorum quantitas falciculorum manualium seu manipu-

Præparatia. Alterancia. Mixta. Magistralia. Purgantia. Decocta vnde parantur.

Ponderum
in decoctis
ratio.

Aquarum
& liquorū
mensura.

Decoctum
frigidum.

horum: fructuum vero præpmodum omnium, demtis passis uis, & oxyphœnico, numeri: reliquorum autem, ponderis adiectione æstimetur. Obseruât etiam, medicinam hodie facientes, ut plerunque e radicibus sumât uncias tres, e foliis fasciculos manipulares quinque, e seminibus drachmas quatuor, quinque aut sex: e floribus pugillos quatuor, aut totidem manipulos. Reliquorum pondera & mensuræ Medici industria relinquuntur. Coquuntur autem hæc omnia nunc ex aqua, tum simplici, qualis est fontana & pluuia, tum medicamentosa, qualis est stillatitius liquor, marina salsa, aluminosa: nunc ex alio humore, vino uerbi gratia, aceto, sero, vel quouis alio, ut in hunc scilicet medicamenta vires suas deponant. Aquarum autem & liquorum, in quibus prædicta coquuntur, mensura, raro duas libras, vel summum tres excedat: quod maior eius quantitas non solum prædictorum vim & efficaciam frangat, & obtundat, imo etiam caussa sit, ut antequam tota ab ægrotante hauriatur & absumatur, corruptionem induat. Postquam decocta sunt hæc ponderum & mensurarum ratione medicamenta, exprimuntur, & mox cœu inutilia abiiciuntur. Exprimuntur autem horum quedam valenter, alia leniter, pro rerum coctarum & humoris, in quo incocta sunt, natura, & vario Medici scopo. Cuilibet quoque libræ aquæ & liquoris, ne id silentio transeamus, sacchari aut mellis libra dimidia, ut plurimum, adiicitur. Quod si etiam decoctum quibusdam odoramentis, ut suauius fiat, cōdire voluerimus, cuius libræ decocti drachmas duas odoramentorum permiscebimus. Nūc ea, quæ diximus, aliquot paradigmatibus declarabimus, orsi ab eo quod flauam alterat bilem: Hoc vero

I. ℞. Florum violarum, Rosarum, Cichorii, Nymphae, an. Manipulum unum. Foliorum intybi sativi latifolii, angustifolii, an. Manipulum unum & dimidium. Lactuca, Portulaca, an. Manipulum unum. Vuarum passarum, exemptis acinis, unciam unam. Prunorum damascenorum, numero undecim. Zizyphorum, numero nouem. Oxyphœnicon, unciam unam. Seminum intybi sativi utriusque, an. drachmam unam & dimidium. Malonum, Cucurbita, an. drachmas duas. Portulaca, drachmam unam. Radicis cichorii, unciam dimidiam. Glycyrrhiza, unciam unam & dimidium. Cinamomi selecti, drachmam unam & dimidium. Coquantur singula in tribus aqua fontana libris, donec dimidium absumatur. Dein colo transfusus, iuri decocti, saccharo adiecto, dulcedo ac suauitas concilietur, idemq; albo oui purificetur: addanturq; Serapii ex intybo satiuo, uncia tres. Zulapii violacei, uncia una & dimidia. Fiat potio.

I. Quod ad pituitæ, aliorumque crassorum ac lentorum humorum præparationem atque extenuationem prodest

℞. Radicum apii, Acori veri, Iridis, Inula, an. unciam unam. Seminum petroselinii, Dauci, Anisi, Rusci, an. ʒ ij. Fœniculi. ʒ j. Chamæmeli, Adianti, Origani, Hyssopi, an. Manipulum j. Mentha, absinthii, an. Manipulum dimidium. Casia lignea ʒ j. Cinamomi ʒ ij. Lunci odorati drach. dimid. Florum melissophylli, Sambuci, Scabiosa, an. Manipulum unum. Coquantur in aqua libris duabus ad tertias, deinde colo aransfundantur, & sacchari adiectione eius decocti dulce reddatur, purificeturque: & additis serapiorum e marrubio & hyssopo, an. uncis duabus fiat potio.

III. Ad melancholici humoris præparationem, ac eiusdem faciliore eductionem, valet quod sequitur: &

℞. Florum Boraginis, Violarum, Echii, Melissophylli, an. Manipulum unum. Vuarum passarum, exemptis vinaceis, unciam unam. Fumaria, Aspleni, Intybi sativi utriusque, an. Manipulum unum & dimidium. Corticum radicum capparidis, Tamaricis, an. ʒ ij. Radicum fœniculi, Petroselinii, Iridis, an. unciam unam. Glycyrrhiza, unciam unam & dimidium. Polypodii, drachmas sex. Thymi corymborum, Epithymi, an. drachmam dimidiam.

Coquantur singula in tribus libris aquæ fontanæ, donec tertia pars absumpta fuerit. Dein colentur, & adiecto saccharo ius decocti dulce reddatur, alboque oui purificetur. Addantur postea serapii e fumaria, ex epithymo, e buglosso, an. uncie duæ. Fiatque potio.

Decoctum
magistrale
vulgo no-
minatum.

IV. Quod si decoctum, ut hodie vocant, Magistrale, hoc est, quod simul præparat, purgat, & alias commoditates in diuersis corporis partibus affert, construere animus est: ad illius quod sequitur, rescripti exemplum facias oportet. Hoc

℞. Radicum iridis, Fœniculi, Petroselinii, Asparagi, Inula, Acori veri, an. unciam dimidiam. Glycyrrhizæ repurgatæ, unciam unam. Rheipontici, drachmam unam & dimidiam. Seminum rusci, Anisi, Fœniculi, Nigelle, Dauci, an. drachmas duas. Vrtica vera, drachmam unam.

Herbarum

A Herbarum, Hyssopi, Origani, Pulegii, Betonica, Serpilli, Chamemeli, Salvia, Marrubii, an. Manipulum unum. Stichadis, Maiorana, Adianti, Tussilaginis, Eupatorii, Cassutha, Absinthii pontici, Mentha, an. Manipulum dimidium. Prunorum damascenorum, numero nouem. Tamarindorum, unciam unam. Palmularum pinguium, numero septem. Myxariorum, numero sex. Ziziphorum, numero quinque. Ficuum pinguium, numero nouem. Folliculorum sene, drachmas sex. Corticum myrobalanorum citrinorum, Indorum, an. unciam dimidiam. Agarici boni, drachmas tres. Rhabbari selecti, drachmam unam & dimidiam. Spica, grana sex. Zingiberis, drachmam dimidiam. Cinnamomi, Cubebarum, an. drachmam unam. Thymi, Epithymi, an. drachmas duas & dimidiam. Florum boraginis, Echii, Violarum, an. Manipulum unum.

B Coquantur omnia in aqua iustæ quantitatis ad tertias, & per noctem in decocto simul persistent. Postea expressis, & colo transfusis, dulcedo cum saccharo sufficienti concilietur. Deinde adiiciantur *serapii & stichade, unciam dimidiam. Serapii & glycyrrhiza, & ex hyssopo, an. uncias duas.* Fiat potio. Huius decocti exemplum nō ideo produximus, quod Medicis imitandum esse putemus. Fieri enim vix potest, vt eodem tempore humores præparentur, tantum abest, vt illos simul concoquantur (quod tamen illi sibi certo persuadent) & educantur. Accedit, quod in iis variis miscellis, non raro vnum alterius actionem impediatur. Hinc perspicuum euadit, errare eos plurimum, qui in prædictum modum immensum simplicium & compositorum medicamentorum numerum coaceruant. Quamquam præclare se interim rem gessisse censent, & non peritendam laudem ex magistralis decocti compositione, si diis placet, se consecutos esse sibi persuadent.

Magistralium decoctorum compositio improbat.

C Ceterum omnium iam dictorum decoctorum iura per colum transmissa, vt pote iam medicamentosa, serapiorum instar, appetente diluculo, pondere trium, quatuor, plurium aut pauciorum vnciarum, pro morbi aut ægrotantis ratione, assumuntur. Interdum etiam vesperi, præsertim vbi frequentem exhibitionem ægrotanti nullam afferre molestiam, aut eandem morbum ipsum requirere compertum habemus. Atque hætenus alteranrium & præparantium decoctorum formulas produximus. Reliqua adhuc sunt, præter iam commemorata decocta purgantia, de quibus iam dicemus. Non multum a prioribus variant purgantia vocata decocta, nisi quod in iis componendis diligenter ad pondus purgantium medicamentorum est respiciendum; nec quæ illorum vim infrenant, ac vehementiam remittunt & obtundunt, sunt omittenda: sed ex formulis, quæ sequuntur, eorundem componendi ratio facillime constabit.

Tempus & modus assumendorum decoctorum.

Decocta purgantia.

D I. 24. *Hermodytylorum, Turpeti, an. drachmam unam. Polypodii, Folliculorum sene, an. drachmas duas. Macu, Mastiches, an. scrupulum unum. Cinamomi, Seminis dauci, an. scrupulum dimidium.*

Concisa minutatim coquantur in libra vna & dimidia aquæ, tantisper dum tertia pars absumatur. Postea colo transfundantur, & fiat potio. De hoc purgatorio decocto diluculo dantur vna vice vnciæ tres.

Modus exhibendi.

E II. 24. *Florum rosarum, Violarum, Echii, Boraginis, an. Manipulum unum. Prunorum damascenorum numero undecim. Oxyphecon, Passularum, an. unciam unam. Fumarie, Centaurii minoris, an. Manipulum unum & dimidium. Polypodii, Sene, an. drachmas sex. Corticum myrobalanorum flauorum, Ceruleorum, an. unciam dimidiam. Agarici optimi, drachmas tres & dimidiam. Rhei barbari selecti, drachmam unam & dimidiam. Spica, Zingiberis, an. drachmam dimidiam.*

Coquantur in aqua sufficienti, quoad dimidium absumatur. Postea colo transmittantur, & sacchari adiectione illis dulcedo concilietur: tandem, in iure decocti diluantur *manna selectissima vncia due: atque cum rosis, santalis, & ligno aloes, an. scrupulo vno condiantur, fiatque potio.*

F Exstant etiam aliquot exempla decoctorum purgantium apud Mesuen, vt pluribus rescriptis non sit opus.

De puluerum usu. C A P. XVII.

Medicamentis in puluerem reductis, quæ Græcis *ἐνερμα* vocantur, ab inspergendo, vocatur, hodie varietum Chirurghi, tum Medici vtuntur. Primum enim Chirurghi pulueres habent, quæ caua vlcera implent, ex crescentia exedunt, sordida repur-

Pulueres confortantes.

280 Operum Leonhard. Fuchsi Pars II.

gant, cruenta reprimunt, distantia glutinant. Cuti asperguntur qui detergent, fordes exterunt, nitorem conciliant. Alii etiam extenuant, & discutiunt, quales sunt, qui ex acriore materia constant. Medici autem pulveres, quos ad Confectionum nominatarum, aliorumque medicamentorum usus paratos in vitrei vasis, aut coriaceis sacculis reponunt ad roborandas corporis partes principes, nimirum cerebrum, ventriculum, usurpant. Quorum compositio etiam ex Antidotorum speciebus, aliisque odoratis medicamentis simplicibus in leuorem redactis, adiecto etiam saccharo constat, appellantque vulgo *Trageas* confortantes, Nicolaus *Drangeas* nominat. Vtraque autem vox a Græca voce *τετραγματο* deflexa esse apparet. Sic vero illi bellaria & secundas mensas vocant. In quorum certe numero & ea, de quibus hoc loco agimus, medicamenta merito recensentur, ut quæ in hodiernum diem a nonnullis in secundis mensis apponantur. Latinis, non puto inepte, *Tritura* nuncupantur. Ad quod quidem nomen velut alludentes Germani nostri, sua lingua *Trizenet* nominant. Nunc vno & idem altero puluerum roborantium exemplo, quo pacto componantur, ostendemus.

Calefaciens.

I. ℞. Specierum diambæ, Aromatici rosati, Diagalange, an. scrupulos duos. Diamoschi dulcis, Diacinamomi, an. drachmam dimidiam. Cinamomi selecti, drachmas duas. Macis, Nucis moschata, Caryophyllorum, Piperis longi, an. drachmam unam & dimidiam. Radicis calami odorati officinarum, Peonia, an. drachmam dimidiam. Sacchari candidissimi, libram dimidiam. Commisceantur singula, & fingatur Drangæa.

Refrigerans.

II. ℞. Specierum diarrhodon abbatis, Diatrion santalon, an. drachmam unam & dimidiam. Seminum intybi satiui utriusque, an. drachmam unam. Seminum melonum, Citruli, Cucurbitæ, an. drachmam unam & dimidiam. Rosarum rubearum, drachmam unam. Santalorum omnium, an. scrupulos duos. Sacchari, uncias sex, fiat tritura.

Exhibitio-
nis modus.
Pulveres
purgatorii.

Pondera
purgantiæ.

De iam dictis roborantibus pulueribus exhibeto mane ieiunis drachmam unam, aut duas, super pane tosto, in vino optimo macerato. Vesperis eodem plane modo ac pondere, iterum præbentur. Porro purgatorii pulveres, siue purgatoriarum trituræ, fiunt ex medicamentis simplicibus purgantibus, vel compositorum speciebus, adiectis semper iis, quæ vehementiam & malitiam purgantium remittunt, & saccharo, quo omnia excipiuntur. Pondera vero simplicium medicamentorum purgantium, quæ cognita in primis ad hos struendos pulveres necessaria sunt, e libro primo huius Operis petenda sunt. Reliquum igitur iam est, ut exemplis vno & item altero, componendi rationem horum puluerum demonstremus.

I. ℞. Rhabarbari selecti, drachmas duas. Spica, Mastiches, an. grana sex. Sacchari, scrupulos duos. Mixtis omnibus, formetur pulvis purgatorius.

II. ℞. Turpeti optimi & candidi, drachmam unam. Mastiches, Cinamomi, an. scrupulum dimidium. Sacchari, scrupulum dimidium. Tritis omnibus & commixtis, fiat pulvis purgatorius.

Exhibendi
modus.

Pastillus.

Verèd ratio.

Dantur ex vino, iusculo, aut alio liquore cōueniente, ieiunis, & diluculo appetente.

De pastillorum usu. C A P. XVIII.

Pastillum Latini nominant, quem Græci *τερχιον*, & *κικλίσιον*, & *ἀρτίσιον*: quod paruum panem exprimat, & diminutiua formula *τερχισιον*, *κικλίσιον*, appellant. Est autem *τερχιον*, siue pastillus, medicamentum quoduis planum, in rotulæ, orbiculi, pastillive formam redactum, adeoque figura semini lupini persimile. Hac vero forma construuntur, ut medicamenta in pulveres redacta diutius conferuentur: siquidem alias vis eorundem exhalaret, aut tota dissiparetur. Qui hodie medicinam faciunt, interdum solis pastillis tritis ex aqua, vino, aut alio conuenienti liquore vtuntur. In congruentibus itaque liquoribus soluti, vel ebibuntur, vel admoventur. Nonnunquam vero Antidotis magnis, & roborantibus, item succis medicatis, saccharis, catapotis, clysteribus, unguentis, aliisque compositis medicamentis permiscuntur. Exemplum singulorum non est cur hoc loco proferamus, quod suis in locis eadem posita habeant studiosi. Ex illis igitur petant, si quid illorum desiderant. Nos vnum duntaxat exemplum, quo catapotis pastillos misceri demonstrabimus, oculis studiosorum subiiciemus: quod est huiusmodi.

Menses euocans.

- A** *℞ Cataportiorum fetidorum, e benedicta laxativa, an. drach. dimidiam. Pastilli e myrrha ʒj.*
Cum liquore stillatitio artemisiz, quod satis est, formentur catapotia, numero tredecim. Huius medicamenti in eliciendis mensibus usus esse poterit. Ceterum non raro pastillis medicamenta alia simplicia, eiusdem cum iis facultatis miscentur: quæ omnia redacta in puluerem, cum liquore aliquo conuenienti exhibentur: vt e sequenti rescripto patet, quod

Adstringens

℞ Pastillorum e spodio, ʒj. Pastillorum e succino, e terra lemnia, an. ʒj. & dimidiam. Radicis symphyti maioris, Bistortæ, Boli armenii, Balustiorum, Lapidis hamatidis, Coralli albi, an. ʒj.

Tusa & cribrata commiscantur, seque duluis.

- B** Pastillorum qui citra aliorum medicamentorum, tum simplicium, tum compositorum commistionem assumuntur, pondus, vt plurimum, drachmæ vnius pondus, at tamen drachmam vnā cum dimidia non excedat: idque si opium non acceperint. Nam horum parciore esse debet modus: Intra scrupulum igitur, aut semidrachmam consistunt. Quod si vero horum compositionem opium ingrediatur, scrupuli vnius, aut semidrachmæ pondere dantur. Reliquorum pondera ex iis, quæ ipsis permixta sunt, medicamenti æstimari debent: quod cuius, ex iis, quæ hætenus diximus, facillimum erit.

De glandibus. CAP. XIX.

- Q**uod Græci *γάλαρον*, Latini *glandem*: hoc barbari huius temporis Medici, haud dubie a subiiciendo, aut supponendo, *Suppositorium* nominant. Frequenter autem necessitas ipsa postulat, vt glandes subiiciamus: nempe vbi ægri propter imbecillitatem clysteris iniectionem non tolerant, & vbi ab aridis extremis rectum intestinum obstruitur. Nonnunquam etiam, quod iniectione clysterum non sit necessaria. Glandium autem usus in ardentibus maxime febribus, & in soporiferis capitis morbis probatur: item ad educenda, quæ per clysterem iniecta non redduntur. Sunt autem triplices genere glandes. Quædam enim leues, & multis, quibus aliis semper fere adstricta est, suaque sponte nihil reddit, in quotidiano usu familiares. Hæ ex betæ aut brassicæ radice ad digiti indicis longitudinem ac crassitudinem redacta, prius tamen cortice extimo detracto melle peruncta, suillo adipe sale consperso, ficu inuersa, butyro, adiecto sale, & id genus aliis parantur. Quædam vero mediocres: vt sunt, quæ ex oui vitello, croco, additis melle & sale componuntur. Item quæ ex melle duntaxat cocto & sale construuntur, quas officina Medicorum *Communes* appellant. Nonnullæ vero sunt vehementiores: quales sunt: quæ scammoniam, colocynthidem, euphorbium, fel tauri, & id genus alia recipiunt. Ceterum quum omnis propemodum generis glandibus mel accedat, sciendū quidem erit, illud sic glandibus esse cōmiscendum, vt pondere suo specib. respōdeat. Obseruant autem hodie, vt fere drachmæ vni specierum & salis, vncia vna mellis adiiciatur. In vehementissimis tamē glandibus satis est, vt drachma vna aut drachma vna & dimidia admisceatur e speciebus. In construendis vero glandib. species ad mouendæ non sunt, nisi vbi mel satis concretum fuerit: quod alias vis earundē ignis vehementia dissipetur. Species autem, quæ glandium compositioni addūtur, aut aluum deiiciendi aut flatu discutiendi, aut stupefaciendi facultatem obtinet: quod ex subiectis formulis clarius euadet.

Deiiciens aluum.

I. *℞ Mellis cocti & concreti, uncias duas. Pulueris euphorbii, scrupulum dimidium. Colocynthidis grana quatuor. Ellebori nigri, grana duo. Salis vulgaris, drachmam vnā. Commixtis omnibus, fingantur glandes ad formam digiti indicis.*

II. *℞ Mellis crudi, vnciam vnā. Specierum hieræ picæ, ʒj. Salis fossilis, drachmam dimidiam.*

Decoquatur mel, donec crassitudinem iustam accipiat: deinde addantur species & sal, formenturque glandes.

Discutiens flatu.

III. *℞. Seminum anisi, Cumini, Feniculi, ana scrupulum vnum. Carei, scrupulos duos. Dauci, scrupulum dimidium. Colocynthidis scrupulum vnum. Salis vulgaris, drachmam vnā.*

Tundantur singula, cribroque secernantur, & cum mellis concreti vncia vna & dimidia coeant, digeranturque in glandes.

Stupefaciens.

IV. *℞ Opii, scrupulum vnum. Croci, Castorii, ana scrupulum dimidium.*

Tufa & cribrata cum melle cocto, aut cera, & oleo nymphææ in vnum cœant: formenturque glandes, quibus filum appensum sit, vt pro arbitrio extrahi possint. A

Quum glandes subiiciuntur, prius oleo, butyro, aut alia pinguitudine illinendæ erunt. Sic enim minori molestia in anum iatruduntur.

De Clysteribus. C A P. XX.

*κλύσις
inicius.*

*Quæ cly-
sterum cõ-
ponendi
ratio.
Liquores.*

*Purgan-
tia.*

*Olea.
Salis.*

*Pondera
eorũ quæ
clysteres
compo-
nunt.*

*Clysterũ
differẽtia
duæ.
Leues.
Vehemẽ-
tes.*

Kλύσις, Latinis idem, quod *lauamen* siue *ablutio* denotat. Vox autẽ a verbo κλύειν, quod *abluere* & *lauare* significat, orta est. Alio nomine Græcis *ἐνίψμα*, dicitur, quæ quidem vox Latinis *injectionem* sonat: ab *ἐνίψμα*, quod iisdem iniicio significat. Medici huius temporis clysteris & enematis vocibus Græcis, potius quam Latinis vtuntur. Quanquam autem varia sunt enematum genera, septem nimirum, emollientia, purgantia, abstergentia, glutinantia, adstringentia, dolorem sedantia, & nutrientia, tamen ad omnium B compositionem, quatuor potissimum rebus opus erit. Primum liquore, aut iusculo aliquo, carniũ (verbi gratia) elixarum, pisorum, cicerum, pulli gallinacei, capi, aut decocti, colo transfusi, quod subinde pro morbi diuersitate variari solet. Nunc enim ex iis, quæ abstergendi, aut obstructions tollendi, aut adstringendi, aut glutinandi facultatem obtinent, paratur. *Dein*, ad clysteris compositionem medicamenta interdum purgantia requiruntur: quæ si ad ea, quæ per os sumuntur, conferas, duplum plane pondus habebunt. *Tertio* loco olea & pinguitudines ad sint in enematum compositione oportet, quæ iidem pro morbi diuersitate variantur. *Quarto*, salis genera, quæ in hoc potissimum ad iiciuntur, vt excreticem excitent ac prouocent facultatem: ne scilicet, quæ iniecta sunt, diutius quam par sit, in vtre morata, penitus retineantur: id quod ægrotantibus non raro noxæ non contemnendæ occasionem præber. Præter ea, tñ quæ iam commemorauimus, interdum etiam mel, præsertim quod colo transfusum fuerit, aut saccharum, aut vitelli ouorum, aut butyrum, aliaque eius generis, prout morbus postulat, ad iiciuntur. Singula tamen eorum, quæ iam ordine recensuimus, certa quadam ponderum ratione permiscuntur. Nempe iuris decocti, aut liquoris libra magna ex parte vna, aut pro corporis cõstitutione & ætate plus minusue. Medicamentorũ simplicium (verbi gratia) radicũ vnciæ tres. Herbarum manipulos quatuor. Seminũ drachmas quinq. Fructuum paria decem. Florum pugilli, quatuor vt c. 10. de decoctis etiam indicatum est. Purgantium autem medicamentorum pondus, vt comprehensum est, fere geminum, ad ea, quæ ore sumuntur, & deuorantur existit. Oleorum, vt plurimum, vnciæ tres. D Pinguedinum, mellis, butyri, sacchari, vnciæ vna, aut dimidia. Vitelli ouorum maxima ex parte, duo aut tres. Salis communis, drachma vna & dimidia, plus minusue, prout res ipsa exigit. In componendis tamen variis clysteribus ad tabulas paulo ante dictorũ medicamentorum, quas primo lib. huius Operis ca. 49. & sequentibus, reperient studiosi, recurrendum erit. Ex iam commemoratis rebus duplici differentia distantes clysteres componi possunt. Leues, quorum in febribus, debilibus, & iis, qui ex longo morbo reualescunt, item intestinorum mordicationibus, torminibus, & senio extremo, confectis, in quibus sterco induruit, vtimur. Vehementioribus autem, & acerbis, in coxendicum doloribus, lethargicis, attonitis, & id genus aliis frigidis ac torpidis morbis, atque in iis etiam, qui exitiale venenum hauserunt, vt fusiũ libr. 3. cap. 168. Aetius docet. E Quæ certe singula ex subiiciendis formulis clarissime patebunt.

Leniens.

I. R. Iusculi capi libram vnã. Mellis colo transfusi, vnciam vnã. Vitellos oui, numero quatuor. Olei ex oliuis maturis expressi, vncias tres. Commisceantur singula, fiatque clyster.

Emolliens.

II. R. Malua, Althea, Atriplicis, Mercurialis, Acanthi, an. manipulum vnum. Seminũ lini, Fœnogræci, an. drachmas duas. Coquantur ad tertias, & colo diffundantur, accipianturque Iuris decocti, lib. vnã. Medulla casie fistularis, vnciam vnã. Hierapicra, vnciam dimidiam. Mellis rosacei colo transfusi, drach. tres & dimidiam. Olei communis, vncias tres. Salis vulgaris, drachmam vnã & dimidiam. Commistis omnibus fiat enema. F

Adstringens.

III. R. Plantaginis, Equiseti, Polygoni, Ophioglossi, Althea, an. manipulum vnum. Solidaginis saracenicæ, Media, Bellis minoris syluestris, Sanicula, Pedis leonis, an. manipulum vnum & dimidiũ. Rosarum ruberarum, manipuluũ vnum. Oryza tosta, vnciam vnã. Gallarum, Rhois obsoniorum, an. drach.

A drachmam unam & dimidiam. Balaustiorum, drachmam unam. Seminis plantaginis, drachmam dimidiam. Myrti, ʒj. & dimidiam. Acacie. Hypocistidis, an. ʒj. Radicum symphyti maioris, ʒij. Bistortæ, Tormentillæ, an. ʒij. & dimidiam. Coquantur ad tertias, & colo transfundantur: & ʒiuris decocti, uncias quatuordecim. Succi plantaginis, ʒ dimidiam. Pastillorum e spodio, Terra lemnia, an. ʒj. Boli armeni, Sanguinis draconis, Aloes elatæ, ana ʒij. Seni caprini ʒj. Oleorum myrtini, Rosacei, Cotoneorum, an. ʒj. Commixtis omnibus fiat clyster.

Abstergens.

IV. ʒiuris hordei decocti, libram unam. Mellis rosacei, ʒj. Sacchari rubei, ʒvj. Visellorum odororum, numero duos. Olei irini, ʒij. Permixtis omnibus, formetur clyster.

Validus fortisfæ.

B V. ʒi. Betonica, Salvia, Maiorana, an. manipulum unum. Serpylli, Calaminthe, Hyssopi, ana manipulum unum. Rata, Centaurii minoris, Stichadis, an. manipulum dimidium. Radicum polyposi, ʒ dimidiam. Agarici optimi, ʒij. Pulpæ colocynthis, ʒj. Coquantur ad tertias.

ʒiuris decocti, ʒxv. Hieræ picræ. Benedictæ laxatiuæ, an. ʒ dimidiam. Antidoti Indi, Diaphanicon, an. ʒij. & dimidiam. Mellis rosacei colo transfusi, ʒj. Oleorum, Laurini, Rutæ, an. ʒj. & dimidiam. Salis fossilis faciei, ʒj. & dimidiam. Commixtis omnibus fiat enema.

Nutriens.

E decocto pulli, capi, laetæ recens multo, & cremore pisanæ, in quibus oua sorbilia sentremula dissoluantur. Neque mel quod detergat, neq; sal, qui ad excretionem irritat, neq; poleum, quod lubricet, alium adiiciendum.

C Pluribus exemplis opus esse minime arbitror, quod illa, si qui complura desiderent, & nostris de medendi ratione libris peti possint. Initiendi clysteres tempus nullum est certum aut constitutum, modo duabus aut tribus horis, aut longius a cibis sumtis adhibeantur. Detinendi etiam tempus non unum idemque est in omnibus clysteribus, sed pro eorundem diuersitate variatur. Quibus enim abluendi & exstergendi vis inest, hi supra horæ dimidiam partem in corpore haud retineantur. Dolores mitigantes, & tormenta placantes, longiori tempore, extra scilicet vntus horæ spatium, detineri debent. Omnium longissimo, quibus glutinandi facultas inest, ut sunt, qui in dysenteria iniiciuntur. Qui purgandi facultatem habent, sua sponte, magna ex parte, erumpunt. Quod si diutius, quam par sit, in corpore cunctantur, glandem supponere conuenit, ut scilicet excretoria facultas excitata, noxia tandem cum medicamentis expellat.

De Collyriis. CAP. XXI.

Collyria Latinis medicamenta vocantur, quæ oculis induntur ac instillantur. Græcis ὀφθαλμικά nominantur. Duum autem sunt generum. Quædam enim liquida sunt, & hæc priuatim hodie ab iis, qui medicinam faciunt, Collyria appellantur. Quædam vero arida, quæ hodie Barbara voce Sieffiusdem vocantur. Græci priora ὀφθαλμικά posteriora Sieffius nuncupant. Atque hæc quidem pyramidis fere formam accipiunt, & arida instillantur. Pauca eius generis hodie in officinis parata inueniuntur. Ceterum materia collyriorum, e qua componuntur, varia est. Nam succi, liquores, semina, fructus, plantarum partes & metallica, iis inferuntur, quæ pro affectuum magnitudine variantur. Vt mutentur enim iis in oculorum diuersis morbis, vlceribus, vulneribus, fistulis, suffusionibus, & id genus aliis. Hinc est, quod interdum iis adiciamus ea, quibus exstergendi facultas inest: nunc, quibus acris iam vero adstringentia, aliquando etiam discutientia permiscemus, quorum omnium copiam suppeditat Galenus lib. 4. de compositione medicamentorum localium, cap. 4. & Paulus in 7. cap. 16. Porro collyria, quibus reprimendi aut sedandi dolor inest vis in liquore aliquo stillatitio conuenienti diluuntur, atq; adeo oculis instillantur, aut linamenti specie admoventur. Quæ vero vrendi vim obtinent, hæc vnguentis, pinguedinibus, oleisq; admixta adhibentur. Si qua collyria arida in officinis ad vsum retinentur, hæc trita, & in core leuigata, inq; tenuissimum pollinem redacta, aliquo stillatitio liquore dissoluta instillantur. Ultra vero unam aut alteram guttam oculis instillare haud oportet. Sed e formulis, quæ diximus, clariora euadent.

Reprimens.

I. ʒi. Collyrii, albi, aridi, in core leuigati, ʒij. Stillatitii liquoris rosacei, Plantaginis, an. unciam unam & dimidiam. Commixtis omnibus, fingatur Collyrium liquidum.

II. ʒi. Stillatitii, liquoris, Plantaginis, Rosarum, Polygoni, an. ʒj. Collyrii e glaucio drach. unam

Tempus
initiendi
clysteres.
Detinendi.

Collyria.
Genera.
Liquida.
Arida.
Sieff

Materia
collyrio-
rum.

Vfus.

Rosis, drachmam dimidiam. Cerussa elota, Boli armeni, ana scrupulum unum. Opii grana tria, Croci, grana duo. Commixtis inter se omnibus, formetur collyrium liquidum.

Dolorem sedans.

III. R. Cerussa decies in stillatitiis rosarum liquore elota, drachmam unam. Sarcocolle, serapulos duos. Amyli, Tragacantha, ana scrupulum unum. Opii grana quatuor. Omnia leuigata, & succo fœnigraci excepta in collyria digerantur arida.

Constringens.

IV. R. Collyrii e glaucio, drachmas sex. Aloes, Acacia, ana drachmam unam. Licii, Boli armeni, ana scrupulum unum. Gummi arabici, drachmam unam & dimidiam. Tritis omnib. acydoniorum succo commixtis, informentur collyria.

Discutiens.

V. R. Liquoris stillatitiis rosarum, Fœniculi, Chelidonii maioris, Euphrasia, an. unciam unam. Vini optimi unciam unam & dimidiam. Aloes, drachmam unam. Pompholygis elota, drachmam unam & dimidiam. Sagapeni, drachmam unam. Sacchari unciam dimidiam. Commixtis omnibus, fiat collyrium liquidum.

VI. R. Collyrii viridis, drachmas duas. Auripigmenti, Mercurii sublimati, an. grana tria. Vnguenti ægyptiaci, unciam dimidiam. Dialthea, unciam unam. Permixtis omnibus fiat vnguentum.

De Gargarizatu. CAP. XXII.

Gargarismi compositio.

Pondus.

Gargarizatus variis componitur modis. Iam enim ex stillatitiis stirpium liquoribus, nunc vero ex iure decoctorum. His vero pro diuersitate affectus Diamoron, succi medicati e ribes, & ex Berberi diacaryon, mel rosaceum, serapia, hiera picra, & id genus alia permiscuntur. Priora quatuor tum maxime adiiciuntur, quum reprimendi indicatio adest. Mel rosaceum, quum extergendi, aut discutiendi. Hierapicra, ubi e capite & eius partibus aliquid elicere studemus. Ceterum nullum in componendis gargarismis, certum & præscriptum pondus obseruatur. Quanquam non desunt, qui religiose contendunt liquorum pondus simplo Antidotorum, succorum medicamentorum, & serapiorum debere respondere. Vt si verbi gratia, serapiorum, & antidotorum, item succorum medicamentorum sint vnciæ duæ, liquorum admiscant vncias sex. Verum in gargarismis componendis hac superstitiosa obseruatione non est opus. Nos rescriptorum quorundam exempla subiiciemus. Quorum

I. R. Liquoris stillatitiis rosarum, Plantaginis, an. unciam unam & dimidiam. Oxalidis, Lactuca, Fragaria, an. unciam unam. Prunella, unciam unam & dimidiam. Solani, unciam unam. Nymphae, unciam dimidiam. Diamoron, drachmas septem. Succi medicati e ribes, Ex berberi, an. drachmas sex. Serapii e papauere, unciam dimidiam. Succus fragorum, vncias tres. Aceti optimi, unciam dimidiam. Permixtis omnibus, informentur gargarizatus.

II. R. Plantaginis, Prunella, Fragaria, Polygoni, Oxalidis, Salvia, an. manipulum unum. Rosarum rubearum, manipulum dimidium. Gallarum, Calyculorum glandium, an. unciam unam. Rhois, obsoniorum, Balaustiorum, an. drachmam unam & dimidiam. Radicis symphyti maioris, unciam dimidiam. Coquantur in aqua fontana iustæ quantitatis ad tertias, dein colo transfundantur, & iuri decocti adiciantur.

Diacaryon, Diamoron, Serapii myrtini, an. unciam unam & dimidiam. Aluminis liquidi drachmam unam. Bulliant denuo, fiatq; gargarizatus.

III. R. Maiorana, Origani, Serpylli, Betonica, Salvia, an. manipulum unum. Carpesiorum, Piperis longi, an. drachmam unam. Pyrethri, Zingiberis an. drachmam dimidiam. Coquantur in libra aquæ vna, quæ tantisper dum tertia pars absumat, colo transfundantur, & iuri decocti adiciantur.

Mellis rosacei colo transfusi, unciam unam & dimidiam. Oxymelitis scillitici, unciam unam. Commixtis omnibus, fingatur gargarismus.

IV. R. Hierapicra, unciam dimidiam. Oxymelitis scyllitici, vncias duas. Liquoris stillatitiis hyssopi, Betonica, Origani, an. unciam unam & dimidiam. Cômisceantur, formeturq; gargarismus.

Exempla plura alia medendi nostra ratio tibi suppeditabit.

Ufus gargarismi.

Ceterum in vlu gargarismorum obseruandum vnice erit, vt tepida quadam qualitate præditi, ori admoueantur: exceptis tamen iis, qui in destillationibus capitis, ex tenuibus & acribus humoribus ortis, vsurpantur. Siquidem illos, quo scilicet fluxio sistatur, frigidos esse decet.

De Dentifriciis. C A P. XXIII.

Dentifricia, quæ Græcis *δοντορεκτα* dicuntur, ad diuersos vsus varia Medicis componuntur. Sic autem, cur appellata sint, vsus eorundem satis docet. Siquidem iis maxime in expoliendis, extergendis, & stabiliendis dentibus vtuntur Medici, ea illis affricantes. Interdum etiam refrigeratis, & dolentibus dentibus, gingiuisq; laxis admoventur. Item ad parulidas, omniaq; oris, & gingiuarum potissimum vitia, vt liquet ex iis, quæ traduntur a Galeno lib. 5. de compositione medicamentorum localium cap. vlt. adhibentur. Ceterum triplici ferè forma hodie componuntur dentifricia. Aut enim in tenuissimum puluillum redacta dentibus affricantur. Aut adiectis liquoribus aliquot, cum iisdem dentes eluuntur. Aut in linimenti formam digesta, dentibus circumlinuntur: id quod e formulis subiiciendis fiet manifestissimum.

Dentifricia.
Vsu.

Compositio
ratio.

I. ℞. Nitri, Aluminis, an. drachmas duas. Myrrha drachmam unam. Radicis iridis illyrica, Cornu cerui. vsti, Thuris, an. drachmam unam & dimidiam. Salis vulgaris tosti, drach. unam. Piperis, Pyrethri an. drach. dimidiam. Aristolochia rotunda, Mentha arida, an. scrupulos duos. Testarum sepia, Pemicis, an. drachmas duas. Tulus & cribratis singulis fiat dentifricium.

II. ℞. Liquoris stillatisii mentha, Origani, Salvia, Abrotani, Hyssopi, Apii, an. uncias tres & dimidiam. Aluminis scissilis assati, & vino austero extincti drachmas duas. Nitri, drachmam unam & dimidiam. Salis assati, drachmas duas. Commixta sex horis simul perstent, & subinde igni admoda per vasculum, quod Alembicum nominant, stillent: liquorque ad vsum seruetur in vitro vase.

III. ℞. Gallorum, Putaminum mali punici dulcis, an. drach. unam & dimidiam. Rosarum purpurearum, drach. duas. Aluminis scissilis, drach. unam. Sanguinis draconis, drachmam unam & dimidiam. Thuris, drachmas duas. Balaustiorum, Myrrha, an. scrupulos duos. Trita & cribrata excipiantur oxymelite scyllitico, & vsu exigente ad stabiliendos dentes & gingiuas firmandas illinantur.

De Pessis. C A P. XXIV.

Pessæ Græcis, Paulo & Aetio testibus, lana est concerpta, & ad digiti formam rotunda, longitudine, vt plurimum octo digitorum, qua medicamenta excipiuntur, ac genitalibus mulierum partibus induntur. Latini, instar Græcorum, id genus medicamenti *Pessum* appellant. Qui hodie fastidant medicinam, barbara voce *Pessarum* vocant. Quamquam sunt, qui hac voce, non sine magna rerum confusione, pro clystere vteri abutuntur, quum tamen Græcis peculiari nomine *πεσσηνίσκος* vocantur, quarum vsus est ad menses aut mouendos, aut sistendos. Item ad tumores discutiendos vteri, aut solutiones continui persanandas. Constat merenchytes ex vnc. sex aut octo liquorum aridorum & in puluerem tritorum, vnc. dimidia. Inicitur somni tempore. Retinetur horis quinque aut sex. Nascalia vero, barbarissimo ac ineptissimo vocabulo, quos Græci & Latini *Pessos*, illi appellant. Porro generales Pessorum differentia tres existunt. Alii siquidem emolliunt, alii adstringunt, alii aperiunt. Emollientes, vteri phlegmonibus, exulcerationibus, refrigerationibus, suffocationibus, auersionibus, & inflationibus accommodantur. Fiunt ex cera, oleis, pinguedinibus anseris aut gallinae, butyro salis experte, resina, medulla ceruina, scenograeco, & similibus. Aperientibus vtimur, quum suppressos menses reuocare, aut vterum coniuentem, compressumue emendare studemus. Parantur autem hi Pessi ex melle, artemisia, dictamno, brassica, glycyrrhiza, succoruta, porro, sabina, & id genus aliis. Adstringentes, contrarium aperientibus vsum præbent. Quippe muliebrem fluxum cohibent, & apertum laxumue vterum contrahunt, prolapsumque reprimunt atq; propulsant. Materia vero adstringentium e libro primo huius Operis petenda venit. Ceterum, quod etiam ad Pessorum compositionem attinet, non semper, hodie præsertim, lana excepta medicamenta vtero induntur, sed nonnunquam aptis liquoribus, gummi melle perfecte cocto, aut cera, aut resinis additis, ad formam paulo ante dictam coacta vteri ceruici intruduntur. Hæc autem ita magna ex parte miscentur, vt ad vnciam ceræ, aut mellis perfecte cocti, adiiciatur medicamentorum ac specierum morbo congruentium vncia vna. Quamquam præstat hoc componentis industriæ & arbitrio relinquere. Interdum medicamenta ipsa probe subacta, sericoque aut tenuissimo linteo obducta, vtero subiiciuntur. Non tamen negligendum

Pessus.
Pessarium.

Nascalia:
Pessorum
differentia.
Emolli-
entes.

Aperien-
tes.

Adstringen-
tes.

erit, quin pessi filum prælongum habeant appensum, quo facile, vbi visum fuerit, aut necessitas postulauerit, extrahi possint. Nunc aliquot Pessorum exempla subiiciemus.

Emolli-
ens pessus.

I. \mathcal{V} Butyri salis expertis, drachmas tres. Oesipi, drachmas duas. Medulle ceruinae. Adipis anserini, Gallinae, ana drachmam unam & dimidiam. Seminis lini, Foenograci, ana drach. duas. Meliloti, drachmam unam. Mastiches, drachmam unam & dimidiam. Olorum lutea tria. Oleorum rosacei, Irini, ana unciam dimidiam. Ceræ, quod satis est ad crassitudinem iustam inducendam. Dein lana duplicata & contorta, hoc medicamento imbuta vtero subiiciatur.

Menses
eliciens,
pessus.

II. \mathcal{V} Artemisia, Abrotoni, dictamni, ana drachmas duas. Radicis acori veri, Rubia, ana drachmas tres. Seminis nigelle, drachmam unam & dimidiam. Baccarum lauri unciam dimidiam. Ruta arida, drachmam unam. Sabina, scrupulos duos. Castorii, scrupulum unum. Myrrhae, Syracis liquidi, ana drachmam unam & dimidiam. Sagapeni, Ladani, ana drachmam unam.

Tufis & cribratis iis, quæ opus est, mellis quod satis est, vt in coalitum crassorem & vnitatem coeant, adiiciatur: & vbi vsus postulat, fingantur pessi, qui vuluæ indantur.

Adstringens.

III. \mathcal{V} Cornu ceruini vsti, Thuris masculi, an. drach. duas Sanguinis draconis, Calla immature, Balaustiorum, an. drachmam unam & dimidiam, Rosarum purpurearum drachmas duas. Acacia, Hypocisthidis, Mastiches, ana drachmam unam. Boli armenii scrupulos duos. Racicis symphyti maioris, Bisfortæ, an. drachmam unam & dimidiam.

Trita in pollinem leuissimum succo plantaginis, & oleo rosaceo, quod satis est, excipiantur, & linteolis pessorum, quantitate illigata, in mulieris pudendum inserantur.

Iam aliquot clysterum vteri paradigmata adiiciemus.

Menses eliciens.

I. \mathcal{V} iuris decocti artemisia, uncias tres. Oleorum liliacei, Irini, Laurini, ana unciam unam. Myrrhae, Sagapeni, an. drachmam unam & dimidiam. Castorii scrupulum unum. Commixtis omnibus, fiat metrenchytes.

Adstringens.

II. \mathcal{V} Succu plantaginis, Oxalidis, an. uncias duas & dimidiam. Oleorum myrthini, Mastichini, an. unciam unam & dimidiam. Succini albi, Thuris, an. scrupulos duos, Boli armenii scrupulum unum. Pastillorum espodio, Terra lemnia, an. drachmam unam.

Tritis prius, iis quæ opus est, commisceantur, fiatq; metrenchyta.

III. \mathcal{V} Origani, Saluia, Sampsuchi, an. manipulum unum. Chamadryos, an. manipulum unum. Seminis feniculi, Petroselini, Dauci, Anisi, an. drachmam unam.

Decoquantur in sufficienti aquæ quantitate vsque ad medietatis consumptionem.

\mathcal{R} Iuris decocti colo transfusi, uncias sex. Olei irini, Ruta, an. unciam dimidiam. Syracis drachmam unam & dimidiam. Commisceantur, & fiat metrenchytes.

Tempus
vtendi.

Pessi vesperi, & dum somni appetit tempus, subiiciendi maxime veniunt: & sex aut septem horis in vtero dimittuntur, ac dein extrahuntur. Eodem quoque tempore clysteres vtero infundi debent, totidemque horis detineri. Necesse enim est quiete & decubitu, nisi velis vt statim, quæ injecta sunt, rursus effluant. Qui plura exempla desiderat, is medendi rationem nostram accedat.

De Errhinis. CAP. XXV.

appra.
Nasalia.

Errhina Græci vocant, quæ in oblongam ac pyramidis formam coacta, naribus vt cerebrum a pituitosis purgent humoribus induntur. Vulgus Medicorum Nasalia vocat. Sed non solum, quæ hac forma naribus induntur, hoc nomine appellant, sed & ea, quæ hac infunduntur, aut illinuntur liquida. Qui hodie medicinam faciunt, nomine ab ipsis confecto, Caputpurgia, a purgando capite sic dicta, appellant. Ceterum errhina, quæ pyramidis formam ac filum sibi, vt pro arbitrio extrahi queant, alligatum habent, ex medicamentorum huic instituto seruientium speciebus, vt ex rescriptis patebit, liquore aliquo, aut adipe, & exigua cera exceptis componuntur: ad hunc quidem modum.

Caput-
purgia.

\mathcal{R} Maiorana, Saluia, an. drachmam unam. Piperis albi, Nigella, Carpesiorum an. scrupulos Caryophyllorum, Nucis moschatae, Pyrethri, an. unciam unam & dimidiam. Ellebori albi, drach. duos. Cynam, Castorii, scrupulum unum.

Tusa, & in pollinem redacta, terebinthina refina & modica cera excipiantur, finganturque errhina, pyramidis formam referentia.

Porro liquida, quæ naribus infunduntur, aut illinuntur, e succis herbarum, betæ, nimirum, cyclamini, brassicæ, maioranae anagallidis, cæruleum habentis florem, & foliorum

Aliorum inulæ, ac liquoribus iis similibus: item oleis, & speciebus medicamentorum paulo ante commemoratorum, nempe *piperis, pyrethri, nitri, struthii, nigelle, marrubii, castorei, ellebori albi, & horum similium*, componuntur in eum, qui sequitur modum.

I. *℥ Succii beta, Cyclamini, Brassica, ana unciam unam & dimidiam.* Commisceantur, & naribus infundantur.

II. *℥ Succii foliorum cucumeris sylvestris, unciam dimidiam. Beta, unciam unam & dimidiam. Liquoris stillatitii maiorana, uncias duas. Carpesorum, Nigella, Piperis albi, ana scrupulum unum.*

Tritis iis, quæ opus est, permisceantur, & naribus infundantur.

BCeterum, qui iam dictis liquidis errhinis vtuntur, admonendi sunt, vt os aqua compleant, ne scilicet e naribus per meatus in os perfluant succi & liquores: caputq; in posteriora reclinandum. Satis autem erit vna vice semunciam succorum infudisse. Nunc exemplum errhini, quod naribus illinitur, subiiciemus: quod

℥ Radicis cucumeris sylvestris, scrupulum unum. Piperis albi, Myrrha, Nigella, an. scrupulos duos. Struthii, scrupulum dimidium.

Trita & contusa excipiantur oleo irino, aut de piperibus, quod satis est, vt ad vnguenti consistentiam redigantur: & iis nares illinantur, & ab ægro sursum trahantur. Vfus errhinorum.

Errhinorum autem vsus est in diuturnis capitis affectibus, præsertim morbo comitiali, oculorum hebetudinibus, narium obstructionibus, odoratus difficultate, conuulsione cynica, & regio morbo.

De Sternutamentis. C. A. P. XXV.

CMedicamenta, quæ Græcis *σπυρῆ*, Latinis *sternutamenta* siue *sternutatoria* nominantur, eiusdem fere sunt generis cum errhinis, quod ex iisdem medicamentis conficiantur: nempe *elleboro, albo, struthio, pipere, castorio, cyclamino, euphorbio, nitro, ptarmice & cumino*. Atque hæc quidem singula seorsim, ac simul leuissime trita, admota naribus, sternutamenta mouent. Naribus autem per arundinem, calamumue, aut pennam insufflantur. Præstat autem hæc non insufflare, sed pyxidem, in qua hæc continentur, motam naribus admouere: & ægotantes, vt sursum trahât, inspirando hortari, aut per specilli mucronem naribus penitissime indere. Sed compositorum sternutatoriorum aliquot paradigmata subiiciemus.

I. *℥ Maiorana, Nigella, Caryophyllorum, ana drachmas duas. Piperis, albi, Zingiberis, Struthii, ana drachmam unam. Castorei, scrupulum dimidium.*

Singulis diligenter tritis, fiat pulvis sternutatorius.

II. *℥ Nucis moschata, Radicis iridis illyrica, Carpesorum, ana drachmam unam. Pyrethri, drachmam dimidiam. Ellebori candidi, scrupulum unum. Piperis albi, Radicis acori veri, ana drachmam unam.* Trita redigantur in puluerem sternutatorium.

III. *℥ Piperis albi, Struthii, Nitri, ana drachmam unam & dimidiam. Cumini ethiopici, drachmam dimidiam. Castorei, Euphorbii, ana scrupulum unum. Succii cyclamini sicci, Ellebori albi, ana drachmam unam.*

Contusa, & cribrata, in æream pyxidem ad vsum reponuntur. Vfus autem tempore pyxis agitata aperitur, & naribus adhibetur.

ESternutatoriorum medicamentorum, idem qui errhinorum vsus. Nisi quod sternutatoriis interdum vtimur in excutiendis secundis, & iis, quæ naribus illapsa sunt. Vfus.

De Apophlegmatismis. C. A. P. XXVII.

Apophegmatismi Græcis sunt medicamenta, quæ retenta in ore, & commanducata per palati emissaria pituitam, & qui in capite coaceruati sunt humores noxios eliciunt. Barbatam sectantes medicinam, *Masticatoria* nominant. Fiunt ex *synapi, hyssopo, cortice capparis, origano, thymo, pulegio, vna passa, mastiche, cubebis, radice acori veri, zingibere, pyrethro, pipere, staphide agria*, & id genus aliis; præcedentibus capitibus duobus commemoratis. Horum sane vsus varius est. Aut enim medicamenta in partes minutas concisa commanducantur, dentibusque confringuntur. Aut trita & contusa aliquo succo, vel liquore, vel melle excipiuntur, & in maniles pastillos coguntur: & vbi postulat vsus, vnus præberetur mandendus. Aut medicamenta contusa, sacculo e subtili linteo confecto induntur, & manduntur. Aut ius decoctorum medicamentorum diu in ore continetur. Atque hic liquidus, vt priores solidi, dici potest apophlegmatismus. Ceterum oportet manducantem deorsum nuere, & ex interuallis, quo congestus humor effluat, hiare. Vtē

Apophegmatismi. Masticatoria. Compositio materia. Vfus.

Tempus
vendi.

dum autem apophlegmatismis matutino tempore, & tum potissimum, quum a reliquis A
excrementis corpus vacuum est. Adhibentur autem hæc ad omnes capitis vetustos af-
fectus, heberudinem oculorum, auditus difficultatem, lingue resolutiones, pustulasque
omnes, quæ caput aut faciem occupauerint. Post illorum vsum aqua calida os ablu-
endum erit, aut melicrato, aut pisanæ succo. Nunc reliquum est, vt formulas aliquot
subiiciamus, e quibus studiosi componendi rationem nullo labore cognoscent.

I. ℞ Piperis albi, drachmam unam & dimidiam. Pyrethri, drachmam unam. Hyssopi, Origani,
ana drachmam unam & dimidiam. Sinapi, drachmas duas. Zingiberis, drachmam unam. Masti-
ches, 3j. & dimidiam. Trita excipiantur succo betæ, aut melle, & forment manfiles pastilli.

II. ℞ Maceris, drachmam unam. Staphydis agriæ, Cubearum, ana drachmam unam & dimi-
diam. Corticū radice capparis, scrupul. duos. Radicis acori veri, nucis moschatae, an. drach. dimidiam. B

Trita excipiantur mastiche, pistillo calido conquassata & subacta, finganturque
pastilli manfiles.

III. ℞ Carpesiorum, drachmam unam & dimidiam. Piperis albi, drachmam unam. Vuarum
passarum detractis vinaceis, drachmas duas. Staphydis agriæ, Pyrethri, Sinapi, ana drach. unam.

Contusa immittantur in sacculum, qui subinde in ore manducetur.

Magnam & immensam sylvam apophlegmatismorum habetis apud Galenum lib. 2.
de compos. medic. localium, cap. 26. ita vt non sit necesse pluribus exemplis vti: liquidi exem-
plum in capite de gargarismis reperies.

De Odoramentis. C A P. XXVIII.

Odora-
menta.

O Doramentorum nomine hoc loco veniunt intelligenda, omnia medicamenta, C
tam simplicia quam composita, quæ citra ignis accessionem suo odore cerebrum
alterare, roborare, & item grauem odorem, aut pestilentem auram corrigere & depel-
lerere possunt. Horum autem varius est vsus. Interdum enim simplicia medicamenta
naribus duntaxat admoventur. Verbi gratia, Nigella in acero macerata, & deinde ex-
ficcata, aut per se linteolo tenui aut serico inserta adhiberi naribus consuevit. Nonnun-
quam etiam multa simul simplicia medicamenta permiscuntur. Aliquando ex iisdem
linimenta, vnguentaue, aut pilæ odoratæ, Poma nostri vocant, componuntur. Medica-
menta vero, quæ ad compositiones odoramentorum adhibentur, sunt, moschus, ambar,
nigella, ocymum, maiorana, garyophylli, styrax, stacte, spica nardi, lauandula, lignum aloes, lada-
num, rosæ, violæ, nymphaea, santali, & id genus alia: quæ singula e formulis iam subiici- D
endis clarius cognoscent studiosi.

Materia
odora-
mento-
rum.

Calefaciens.

I. ℞ Nigellæ tostæ, drachmam unam & dimidiam. Carpesiorum, drach. unam. Maceris, scru-
pulos duos. Caryophyllorum, 3j. Contusa & trita, deligentur in sericum, ad odorandum.

Refrigerans.

II. ℞ Vnguenti populeon, drachmam unam. Oleorum violacei, Epapauere, ana drachmam v-
nam & dimidiam. Mandragora scrupulum dimidium. Commistis omnibus, fiat linimentum,
quo nares illinantur.

III. ℞ Olei spica, drachmas tres & dimidiam. Ligni aloes. Maceris, ana scrupulos tres. Ambar,
grana duo. Permixtis omnibus, fiat linimentum. E

Calefaciens.

℞. Styracis, drachmas tres. Caryophyllorum, Cinnamomi, ana drachmas duas. Maceris, Nucis
moschatae, ana drachmam unam. Ligni aloes, drachmam dimidiam. Mastiches, drachmam unam &
dimidiam. Moschi, Ambar, ana grana tria.

Trita & cribrata, liquore stillatio maioranæ, & styrace liquido, quod satis est, ex-
cipiantur, finganturque pilæ odoratæ.

Refrigerans.

V. ℞ Florum nymphaeæ, Buglossi, Violarum, Rosarum, ana drachmam unam. Corticis mali citri,
drachmam unam & dimidiam. Maceris, drachmam unam. Santalorum omnium, ana drachmam
unam & dimidiam. Papaueris albi, scrupulum unum. Semperuiui, scrupulos duos. Ladani, drach- F
mas duas. Ambaris, grana quatuor.

Trita excipiantur liquore stillatio lactucæ, & styracis liquidi, formenturq; pilæ o-
doratæ.

In omnibus pilis cōstruendis odoratis, postremum ambar & moschus adiciantur.

De Suffimentis. CAP. XXIX.

A **S**uffitus, suffimentaue, quæ Græcis *συσφύματα*, hodie facientibus medicinam *Suffumiga*. *Suffitus*.
Suffiones dicuntur: sunt medicamenta, quæ incenduntur, aut ignitis carbonibus iniiciuntur. Vfus autem horum incensorum, ad odorem gratum conciliandum. Item ad de- *Vfus*.
 stillationes ex capite in subiectas partes; grauedines, obstructions, frigidos alios cerebri affectus, & pestilentia contagia arcenda. Conferunt etiam asthmaticis, & iis quibus thorax humorum frigidorum ac crassorum copia refertus est: item suppurationibus, tussi, laterumque doloribus: Sanguinem autem exspuentibus suffimenta plurimum aduerfantur: quod nimirum horum usu accadat, ut vasorum ora rursus aperiantur. Parantur triplici potissimum forma, nempe pulueris, pastillorum, & candelarum, ut paulo post plenius dicetur. Ceterum in iam dictis thoracis affectibus, hunc in modum vapor per os est assumendus. Ager vestibis circumseptus, in sede collocandus est, ut diuaticis cruribus prona facie ad utrumque genu decumbat: atque tum euaporatorio intra crura constituto, enitendum, ut per tubum fistulamue siue arundinem vapor exceptus, patulo ore inspiretur. Componuntur ex eadem fere materia qua odoramenta, nempe castorio, *Castorio*, *ladano*, *calamintha*, *styrace*, *thure*, *masliche*, *myrrha*, *ligno aloes*, *salvia*, *castorio*, *moscho*, *ambra*, *spica nardi*, *caryophyllis*, *rosis*, *myrrha*, *casia*, & id genus aliis, pro affectuum diuersitate: ac trita carbonibus insperguntur: aut styrace liquido, oleo, vel alio liquore excepta; digeruntur in pastillos, aut candelas, quibus usu exigente ad suffiendum utimur. E formulis subiiciendis res apertior fiet.

C *Forma pulueris.*
 I. R. Pastillorum gallia moschata, unciam unam. Salvia, Majorana, Rosmarini, ana drachmam unam & dimidiam. Maceris, drachmam unam. Caryophyllorum, Cinnamomi, ana drachmam unam. Foliorum lauri, drachmam dimidiam. Ligni aloes, scrupulos duos. Moschi, granæria. Terantur singula, & commistis omnibus, fiat puluis: qui, postulante usu, viuis carbonibus inspergatur.

Pastilli specie.
 II. R. Thuris, drachmas duas. Cinnamomi, Caryophyllorum, ana drachmam unam & dimidiam, Corticum mali citrii, drachmam unam. Maceris, Ligni aloes, ana scrupulos duos. Myrrha, Mastiches, ana drachmam unam. Pastillorum gallia moschata, drachmas duas.
D Trita styrace liquido excipiantur, & informantur pastilli pro suffiundo.

Candela.
 III. R. Ladani, unciam unam & dimidiam. Thymiamatis, unciam unam. Thuris, Mastiches, ana drachmam unam. Syracis calamita, uncias duas. Caryophyllorum, Cinnamomi, Nucis moschata, Ligni aloes, ana drachmam unam. Myrrha drachmam dimidiam. Corticum mali citrii, scrupulos duos. Carbonum tilia, uncias duas. Asæ dulcis, unciam unam.

Cum terebinthina resina, & stillatitio rosarum liquore, quod satis est, singantur candelæ.

E DE VSITATA HVIVS TEMPO- RIS COMPONENTORVM MISCENDO-

RVMQVE MEDICAMENTORVM RATIONE LI-

BER QVARTVS, LEONHARDO FVCHSIO ME-

dico Auctore.

PROOEMIUM.



F RAECEDENTI libro, qui ordine tertius fuit, componendi rationem, vsumque eorum medicamentorum, quæ corpori ingeruntur, docuimus: in hoc quarto eiusdem tractationis libro, eorum quæ extrinsecus corpori admonentur, formulas vsumque trademus. Neque enim Medicum eorum duntaxat, quæ intro in corpus sumuntur, medicamentorum, sed eorum etiam, quæ forinsecus illi adhibentur, rationem & vsum tenere oportet, ut scilicet undiquaque morbo occurrere possit. Atque hinc est, quod ad localium vocatorum remedium

usum hic liber maxime conducatur. Addit etiam lucem plerisque, rescriptis præcedenti libro commemoratis. Siquidem interdum, re ipsa ita postulante, vnguentorum linimentorumque formulas produximus: quæ nunquam satis cognoscerentur, si non priuatim hic earundem componendi rationem & usum docuissimus. Necessario igitur prioribus tribus, hunc postremum subiiciemus librum: quod sine eo manca esset, quam de compositione medicamentorum instituiamus, tractatio. In quo sane, perinde atque in eo, qui præcessit, principio, quo unumquodque eorum, quæ extrinsecus corpori adhibentur, medicamentorum nomine appelletur: dein, e quibus componantur medicamentis: & tertio, quæ eorundem sit usus ostendemus. Ceterum in vniuersum medicamenta, quæ forinsecus admoventur, numero sunt duodecim.

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Vnguenta. | 7. Sinapismi. |
| 2. Linimenta. | 8. Epithemata. |
| 3. Emplastra. | 9. Embrocha. |
| 4. Cataplasmata. | 10. Fomenta. |
| 5. Cerota. | 11. Sacculi. |
| 6. Dropaces. | 12. Inseffus. |

De Vnguentis. C A P. I.

Vnguentum quid.

Vnguenta hodie vt componantur.

1. Oleum propriè quid. Omphacanon. Communè. Olei communis differentia.

2. Oleum abusiue.

Vnguentum ab vtendi modo vocatum est, quia laborantibus partibus inunctum & illitum diutius, ob crassitiem & lentorem, quam oleum, hæret. Et veteribus hoc nomine appellabantur, quæ ex odoramentis conficiebantur. Hodie quæ ex oleis, speciebus quibuscunque, & cera componuntur, ita vocantur. Oleis interdum adiciuntur adipēs, butyrum, & mucago. Nonnunquam gummi, & lacrymæ prædictis permiscuntur. Species siue pulueres, iuxta affectum, quibus adhibentur vnguenta, diuersitatem, subinde variantur. Cera, vt conuenientem nanciscatur consistentiam, adiicitur. Hodie plerique in componendis vnguentorum formulis obseruant: vt vnciæ vni oleorum, specierum drachmam vnā, & ceræ drachmas duas admisceant, quod hac ratione vnguentorum consistentiam facilius recipiant. Alii plus cera adicere solent. Præstat autem ceræ quantitatem eius, qui componit arbitrio ac iudicio, liberam relinquere, vt scilicet is, quantum ad iustam consequendam consistentiam satis sit, adiiciat. Ceterum cum sine oleis vnguenta confici nequeant, ordinis ratio exigit, vt de iis hoc loco aliquid dicamus. Animaduertendum igitur, olei vocem variè usurpari. Primum proprie, oleum succus est pinguis, ex oliuis tritis prælo expressus, vel immaturis crudus, & ob id *ὀλῆ* & *ἀκὴ* vocatur. Græcis appellatur: vel maturis, quod oleum absolute aut communè dicitur. Vtrunque autem falsum, vel falsis expers, lotum vel illotum existit. Vtrunque item recens, vel vetus, & ex hoc, vel illo, (verbi gratia, Sabino) agro allatum. Quæ quidem olei communis differentia diligenter sunt obseruandæ, vt scilicet medicamentorum ex iis compositio iustior fiat. Siquidem facultatibus secundum has differentias plurimum variant, ac composita, quibus miscuntur, multum immutant. Secundo loco oleum abusiue succus est oleaginus & fluxilis, ex quibusdam tritis & prælo expressis, tum fructibus, tum seminibus, vt iuglādibus, auellanis nucibus, moschatis, amygdalis vtrisque, nuce Indica, anacardiis, nucleis persicorum, cerasorum, pistaciorum, pinearum, seminibus sinapi, canabis, lini, ricini, staphidis agricæ, & aliis propemodum infinitis, pinguem in nucleo ipso, vel semine, ceu medullam sortitis. Huic generi proximum est oleum balsami, & petrelæon. Atque hæc duo hætenus commemorata oleorum genera sunt simplicia, nec illis educendis ac exprimendis aliud misceri consuevit, præterquam quod paucillum aquæ quibusdam extrahendis miscetur, vt aliis oleum commune paucum. Exprimuntur autem olea hoc modo. Semen siue fructus calido pistillo in pilo calida teritur, ac postea per setaceum pannum ligneo aut plumbo albo, induto torculari exprimitur. Quod si vero id, e quo oleum exprimendum est, aridius fuerit, quale est lini semen, torreri debet, probe id ipsum in lebeate versando, & agitando, & dein prælo setaceo inuolutum panno, subiici & exprimi. Tertium genus olei humor quidam, est oleaginus, ignis vehementia, chymistarum opera extractus. Tale ex liquoribus, succis multis, gummi, resinis, cera, melle, lignis, resinosis educitur. Quartum genus oleorum est, omnino compositum ex simplicibus in oleo communi, vel alio simplici maceratis, insolatus, incoctis. Præstat autem simplicium incoquere oleo quam macerare, aut insolare, quod

quod

A quod ita vires ipsorum rectius in se recipiat oleum, illoque coquendi modo Galeni usus sit. Coquenda vero sunt in duplici vase. Quod quidem genus latissime patet, & horum aliqua ex floribus oleo inditis efficiuntur. Quædam ex germinibus surculisue. Nonnulla ex fructibus integris oleo iniectis, quædam per aquam calidam discretis: quorum omnium exempla secundus huius operis liber ostendit. Porro quum flores coctionem nullam admittant, ut insolentur oportet. Qui valentiores habent fragrantiam & constantem, pluribus diebus insolati magis utilia ac tenuiora reddunt olea. Quicumque vero imbecilliores sunt, faciliusque diffillantur flores, insolationem minus perferunt, utpote quorum virtus promte evanescat: ut est liliū, & viola. Nunc vnguentorum formulas aliquot subiiciemus.

B *Ventriculum frigidum confortans.*

I. ℞ Oleorum ex absinthio, Mentha, ana unciam unam. Carophyllorum, Cinnamomi selecti, Piperis longi, ana scrupulos duos. Ceræ quod satis est, fiat vnguentum.

Adstringens.

II. ℥ Oleorum rosacei, Cydoniorum, Mastichini, Myrtini, ana unciam dimidiam. Passillorum & spodio, Terra lemnia, Succino, ana scrupulum unum. Radicis symphyti maioris, scrupulos duos. Sanguinis draconis, Boli armenii, ana scrupulum unum. Ceræ albæ, quantum sufficit, formetur vnguentum.

III. ℞ Oleorum rosacei, unciam unam. Myrtini, unciam dimidiam. Cerussæ, Plumbi vsti & eloti, Lythargyri, ana scrupulum unum. Boli armenii, Terra lemnia, ana scrupulum dimidium. Balaustiorum, Rosarum purpurearum, ana scrupulum unum & dimidium. Semperuini, scrupulum unum. Ceræ candidæ, quod satis est, fingatur vnguentum.

Ad lienis obstructionem & duritiem.

IV. ℞ Oleorum e capparibus, Liliacei, Irini, ex absinthio, ana unciam unam. Mucaginis altheæ, Seminis lini, Fœnigraci, ana drachmam unam & dimidiam. Pinguedinis gallinæ, Anseris, Taxi, ana drachmam unam. Medullæ cruris bubuli, drachmas duas. Corticum radices capparum, Tamaricis, ana drachmam unam. Costi amari, drachmam dimidiam. Centaurii minoris, drachmas duas. Ceterach, drachmam dimidiam. Hammoniæ, Bdellii, Galbani, ana scrupulos duos.

Dissolutis gummi in aceto, cum cera quantum satis est, formetur vnguentum.

Vfus.

D Utimur variis modis vnguentis, iam ut constingamus, ac roboremus: nunc, ut alteremus partes, quibus illinuntur. Interim, ut humores, qui in illis continentur, emolliamus ac discutiamus, veluti ex medendi nostra ratione omnibus liquet.

De Linimentis. CAP. II.

Linimenta, medicamenta sunt, quæ vnguentorum instar illinuntur: hincque ad *Linimenta quæ.* eo suam appellationem sortita sunt. Ex iisdem fere rebus, quibus vnguenta, ceræ duntaxat excepta, quæ linimentorum compositioni non adhibetur, construuntur. Siquidem cum oleis, aliisque liquoribus in vnguentorum consistentiam, paulo tamen molliorem ac liquidiorē, coeunt: idque ob ceræ, quæ destituuntur, penuriam, ideoque denegata ipsis est ea, quæ vnguentis debetur, firmitudo. Omnibus corporis partibus adhiberi possunt. E formulis res clarior euadet.

E *I. ℞ Oleorum chamæmelini, Anethini, Liliacei, ana drachmas tres & dimidiam. E semine lini, drachmas duas & dimidiam. Adipis gallinæ, Anatis, ana drachmam unam. Seminis nigellæ, Altheæ, Dauci, ana scrupulos duos. Commixtis omnibus formetur linimentum.*

Ad resolutos.

F *II. ℥ Oleorum costini, unciam unam. Vulpini, Epiperibus, ana unciam dimidiam. Ex euphorbio, uncias duas & dimidiam. Vini stillatitii, unciam unam & dimidiam. Succus verbasculi odorati, Saluæ, ana drachmas tres. Radicis acori veri drachmas duas. Stichadis, drachmam unam & dimidiam. Florum rosmarini, drachmam unam. Piperis, scrupulos duos. Pyrethri, scrupulum unum. Euphorbii, scrupulum dimidium. Radicis præoniæ, Hermodactylorum, ana scrupulum unum. Tuis & cribratis speciebus fiat linimentum.*

Aliud.

III. ℥ Oleorum vulpini, unciam unam. Costini, E vermicibus, ana unciam dimidiam. Amy-

gdalarum amararum, drachmas tres. Pinguetudinis anatis, Anseris, Taxi, ana drachmam unam & dimidiam. Butyri recentis, unciam dimidiam. Styracis liquidi, drachmas duas & dimidiam. Commixtis omnibus, fingatur linimentum.

Ad scabiem & impetiginem.

IV. \mathcal{L} Terebinthina liquore stillatitio rosarum lota unciam unam & dimidiam. Olei rosacei, unciam dimidiam. Succu aurantiorum duorum dulcium. Vitellos ouorum numero duo.

Permixtis omnibus fiat linimentum. Si fortius ut sit efficere velis, adde sulphuris vivi, scrupulos duos. Ossium sepiæ, scrupulum unum.

De Emplastris. CAP. III.

ἔμπλαστρον.
ἔμπλαστρον
Veteres
empla-
stra ut co-
posuerunt.

Empla-
strorum
differen-
tia.
Compo-
nendorū
emplastro-
rum ho-
die vstra-
torū mo-
dus.

EΜπλαστον φάρμακον, & assumto $\epsilon\pi\eta\mu\pi\lambda\alpha\sigma\tau\epsilon\varsigma$: Græci $\sigma\tau\omicron\upsilon\epsilon\pi\mu\pi\lambda\alpha\sigma\tau\epsilon\iota\varsigma$, hoc est, *fingendo*, & in *massam* formando, aut potius *subigendo* & *versando*, Græcis dicitur. Ceterum veteribus **B** emplastra constabant ex terrestribus, nempe metallicis, lapidibus, terræ speciebus, floribus, cineribus, conchis, stirpium partibus, ut oleis, lachrymis, succis, & liquoribus. Semina vero, herbarum folia, & radices paucas receperunt, secus atque hodie fit, quum nunc non solum integras plantarum partes, verum etiam animalium reliquias, recrementa ac eorum pene integra viscera horum compositioni permisceant. Coxerunt autem emplastra sua, quousque manus non amplius inquinarent. Exempla exstant apud Mesuz filium, præterea in libro huius Operis 2. item apud Paulum libr. 7. cap. 17. ubi etiam varias emplastrorum differentias enumerat: nempe *vulneraria*, *cicatricem ducentia*, *discutientia*, *emollientia*, *siccantia*, *extrahentia*, *pus mouentia*, & *lenientia*. Hodie emplastra quædam citra coctionem, quædam etiam per coctionem fiunt. Quæ citra coctionem, hæc ex **C** axungis, resinis, gummi ad ignem duntaxat liquefactis constant. Quibus subinde adiunguntur pulueres ex herbis, & metallis, quæ ubi inter se commista fuerint, ab igne remouentur, & in frigidam aquam coniecta, manibus tantisper subiguntur, donec in emplastri coierint consistentiam. At quæ per coctionem fiunt, ex herbis, floribus, radicibus, speciebus, oleis aut succis, aut liquoribus commixtis, vnaque coctis componuntur. Curandum vero, ut quæ longiorem coctionem postulant, aliis citius lebeti iniiciantur, deinde autem alia. Liqueores & succi mox inter initia, vel per se coquantur, aut cum aliis. Pulueres postremum imponantur. Emplastra vero ipsa oleo aut alio liquore idoneo coquere conuenit, veterum exemplo, ad liquoris, qui adhibetur, consumptionem, dum manus non inquinant. Species autem emplastrorum compositionem ingredientia, **D** non in tenuissimum pollinem, ut in vnguentis, rediguntur: sed leuiter contunduntur, atque adeo in paulo crassiores pulueres teruntur. Obseruant magna ex parte in componendis emplastris hodie quoque Medici, ut herbarum & florum manus plenæ fasciculo, oleorum, pinguedinum, liquorumque, unciam unam, vel unciam unam & dimidiam adiciant. Sunt qui hoc tempore emplastra cum vnguentis & ceratis confundant: atqui parum recte. Distant enim inter se, ut ex iis, quæ dicta iam sunt, & deinceps commemorabuntur, omnibus perspicuum euadit. Nunc vstratam componendorum emplastrorum formam ac rationem, aliquot productis exemplis & rescriptis monstrabimus.

Leniens.

I. \mathcal{L} Malua, Althea, ana manipulum unum & dimidium. Florum chamameli, Meliloti, ana manipulum unum. Radicis althea, drachmas quinque.

Contusa bulliant in aqua fontana, donec in consistentiam iustā coeant: dein adiectis *oleorum chamamelini*, unciam unam & dimidiam. *Liliacei*, uncias duas.

Bulliant denuo, & informetur emplastrum.

II. \mathcal{L} Florum verbasci, Anethi, Chamameli, ana manipulum unum & dimidium. Seminū *lini*, *Fœnogræci*, *Meliloti*, ana drachmas duas.

Contusa leuiter bulliant in aqua, dum in mellis crassitudine coeant: postea adiciant *oleorum anethi*, *Chamamelini*, ana quod satis est. Ebulliant iterum fingaturque emplastrum.

Pluribus rescriptis nihil opus esse putamus, tamen qui prædictis plura expetit, illa emedendi nostra ratione petat. Compositum ad præscriptum modum emplastrum lin- **E** teolo illitum, laboranti parti adhuc calidum admouetur.

De Cataplasmatis. CAP. IV.

Catapla-
sma.

Multi nostra ætate cataplasmata cum emplastris confundunt, atqui minus recte. Qui proprie cataplasmatibus voce vtuntur Medici, ita vocant medicamentū, quod estur-

Aestirpibus viridibus contusis, vel iisdem ad mollitudinem, usque in aqua decoctis componitur. Atque ea sane ratione ab emplastro, cui post ebullitionem herbarum factam oleum addicitur, differt. Vfus eorum in sedandis doloribus, ac tumoribus maxime discutientis. Item ad fluorem constringendum & menses euocandos valent. Formulæ, quod dicimus, certius deprehenderetur.

Adstringens.

I. ℞. Plantaginis viriusque, Polygoni, Burse pastorie, Numularie, Sanicula, Solidaginis sercenica, Ophioglossi, an. Manipulum unum & dimidium. Viridibus adhuc omnibus contusis, fiat cataplasma.

Leniens.

B II. ℞. Radicis altheæ, unciam unam. Maluæ, Chamemeli, Altheæ, Meliloti, an. Manipulum unum. Seminis fanigraci, Lini, an. drachmas tres. Bulliant in aqua, donec mollescant: dein contundantur, & informetur cataplasma.

Menses euocans.

III. ℞. Artemisia, Origani, Pulegii, Matricaria, Salvia, an. Manipulum unum & dimidium. Rubia, drachmas tres. Calamenti, Mentastri, Hyssopi, an. Manipulum unum.

Bulliant omnia in aqua ad mollitudinem, & confusa cataplasmatum formam accipiant. Ceterum etsi varic vti cataplasmatum, perinde atque emplastris, licet, tamen calefacientia & discutientia hypochondriis, nisi prius vniuerso vacuato corpore, adhiberi minime debent. Nam hæc ipsa instar cucurbitulæ totius corporis excremēta ad se trahunt, adeoque in visceribus phlegmonem, aut obstructionem procreant.

De ceratis. CAP. V.

Ceratum Latinis, κηρώτι Græcis, haud dubie e cera nomen suum accepit, quæ illis misceretur, ut minus promte diffluat. Componitur ex speciebus paulo quam vnguentum crassioribus & oleis, quæ cum cera, aut resina terebinthina vel laricea, aut viriussq; simul, ad solidiorem consistentiam, ut in parte cui admoventur diutius hæreat, perdurantur. Veteres tamen sua cerata citra resinam maximam ex parte confuxerunt, cera sola & oleo contenti. Nō conficitur Ceratum citra ignem. Cera enim nisi prius liquata fuerit, cum aliis non facile coit ac miscetur. Variæ autem ceratorum apud antiquos fuisse formulæ. Quædam enim liquida erant, quæ fracturis adhibebantur, & καταματῖα, ἔχοντες λευκά nominabantur. Picato quoque cerato veteres vsi sunt, si quid contulim esset, si quid coquendum & mitigandum, πικρὸν κηρόν & πικρὸν κηρόν appellabant. Fuit quod ἐπιπικρὸν vocabant, ceræ resina mista, quo in sarcoticis, & ad suppurandam vtebantur. Fuerunt κηρομαλάνματα, quæ mitiore quodammodo corpore mollium emplastrorum locum tenebant. Hæc quia glutinosa esse melius fuit, ἐχέω in illis dicta sunt. Talis fere nostrorum ceratorum ratio est, in quibus larigna, aut terebinthina ceræ & oleo permiscuntur, dum tenacia euadant. Sunt qui ad relaxantia cerata ceram flauam, ad refrigerantia vero & adstringentia candidam vsurpent. Porro in ceratis componendis hodie medici nonnulli religiose obseruant, ut vnciæ vni oleorum, drachmam vnā cum dimidia adiciant. Oleum autem ad ceram quadruplum esse volunt, ut si olei sint vnciæ duæ, ceræ sit vncia dimidia. Sed præstat arbitrio Medici & Pharmacopœi relinquere, ut nunc pro suo scopo solidius, nunc liquidius ceratum faciant. Vt enim corpus durum est & squalidum, vitium etiā acerbius & altius hæret, aerisque constitutio tenuior & crassior: ita & ceratorum consistentiam mutari necesse est. Quo enim plus accipit ceræ, eo solidius est, quo minus, tanto liquidius. Quod ad formam ceratorum attinet, effinguntur ita, ut figuræ partium, quibus admovent, aliqua ex parte respōdeant. Quod enim ventriculo adhibetur, sicut formam obtinere debet. Quod iecinori imponitur, iecinoris: quod lieni accommodatur, lienis; hoc est, oblongam, qualia fuerunt veteribus Splenia dicta. Ac etiam transversim transmissa consueunt: quod barbaram sectantes medicinam, inepte voce Interpassare nominant. Nunc formulas aliquot subiiciemus, quæ planiora reddent ea, quæ de ceratis hæcenus dicta sunt.

Ventriculam roborans.

I. ℞. Cinamomi selecti, Caryophylorum, an. drachmam vnā. Calangæ, Maiois, an. drachmen dimidiam. Nucis moschatae, scrupulos duos. Calami odorati, drachmam vnā & dimidiam. Ligni

Ceratum
quid.
Ceratori
compositio.

Forma ceræ
torum.

Splenia
interpassa.

aloes, scrupulum unum. Gallie moschata, Balaustiorum, an. drachmam dimidiam. Rosarum purpurearum, drachmas duas. Mastiches, Ladani, an. drachmam unam. Oleorum mastichini, e mentha, an. unciam unam & dimidiam. Rosacei, unciam unam.

Cum cere uncia dimidia, & terebinthina resina, quod satis est, fingatur ceratum scuti effigie ventriculo adhibendum, ac serico obducatur.

Ad mouendos mentes.

II. Oleorum irini, unciam unam & dimidiam. Liliacei, Nardini, an. unciam unam. Nucis moschate, Radicis calami odorati, Cinnamonis, an. drachmam unam. Artemisie, Abrotani, Salvia, an. drachmam unam & dimidiam. Opopanacis, Sagapeni, an. drachmas duas.

Dissolutis gummi in vino, cum cera flaua, quod satis est, fiat ceratum, vtero ad mouendum.

III. Cera alba, Terebinthina resina, an. uncias duas. Picis naualis, unciam unam. Thuris, Myrrhe, an. drachmas duas. Opopanacis, Bdellii, an. drachmam unam & dimidiam. Succini drachmas tres. Lithargyri, Lapidis magnetis, an. drachmas duas & dimidiam. Mumie, drachmam unam & dimidiam. Oleorum rosacei, uncias duas & dimidiam. Myrtini, unciam unam & dimidiam.

Commixtis omnibus, iuxta artem fiat ceratum.

De dropace. CAP. VI.

ET si dropacis hoc tempore nullus est vsus, tamen cum veteres Medici, maxime Galenus, atque etiam Poeta huius crebro mentionem faciant, non est, cur eius compositionem silentio transire debeamus: imo annitendum, vt hac diligenter tradita, illud in vsu quotidianum reuocemus. Sciendum igitur erit, veteribus duplicem fuisse dropacem. Simplicissimum vnum, qui ex sicca pice paucissimo oleo liquata constabat. Hunc calidum adhuc toti corpori, aut certis eiusdem partibus, prius tamen derasis, illinebant, & ita agglutinari sinebatur. Eius generis dropacem Græci alio nomine *πίκτων*, Latini Picationem appellauerunt. Vsus huius in totius corporis aut eiusdem partium extenuatione erat. Humeſcat enim, calefacit ac sanguinis copiam allicit, atque adeo amissam carnem reparat, extenuatque, alimentum ad partes flaccidas trahens, reficit. Adhibebant etiam iis, qui crebro vomebant, & qui cruditatem patiebantur, atque celiacos affectus: & in summa, omnibus partibus alimentum non sentientibus. Dropacem hunc, priusquam exakte frigesceret, auellebant, ac dein igne rursus calefactum admovebant, & similiter, vt antea, priusquam frigesceret, auellebant, atque id subinde repetebant. Alter dropax compositus fuit, qui præter picem oleo liquatam, resinam, piper, pyrethrum, rosmarini semen, bitumen, sulphur viuum, salem, cinerem sarmentorum, castorium, elleborum, euphorbium, & id genus alia, quæ trita liquefactis inspergebantur, accipiebat, & ad emplastri, aut malagmatis formam præparabatur, in hunc modum:

IV. Picis liquida, Cera, Colophonia, an. uncias tres. Bituminis, unciam unam & dimidiam. Sulphuris viui, drachmas tres. Piperis, Pyrethri, an. drachmas duas. Staphidis sylvestris, drachmam unam & dimidiam. Euphorbii, Ellebori albi, an. drachmam dimidiam. Arida tusa liquefactis inspergantur, & fiat dropax.

Hunc dropacem cataplasmatibus vice in diuturnis malis adhibebant, & ante sinapismum, de quo sequenti mox dicemus capite, vt scilicet corpus ad Sinapi præpararetur: & post sinapismum, vt affectus seu morbi reliquias discuteret.

De sinapismo. CAP. VII.

Sinapismus
quid?
Componē-
di ratio.

Sinapismum veteres, *Aetio lib. 3. cap. 191. teste*, vocabant cataplasma ex sinapi. Cuius conficiendi is fuit modus. Caricas pingues in aqua tepida pridie macerabant, sequenti autem die fortiter expressas probe conferebant: deinde acre sinapi acceptum priuatim tenebant, & inter terendum dilutum caricarum affundebant, quo facillime teri posset, non tamen aquosum fieret: postea in massam redigentes, priuatim vtrumque inter se miscebant. Atque si vehementem inducere sinapismum volebant, partes duas sinapis cum vna caricarum temperabant: si vero mediocrem, æquales vtriusque portiones accipiebant: sin mitiorem, tertiam sinapis, & duas caricarum. Ceterum in corporibus facili sensu præditis, & in quibus vitium in superficie hæret, panem pro caricis ad synapi ammiscere oportet. Sed nec hoc ignorandum: Si in aceto maceratur sinapi, in-

efficacius

- A** efficacius reddi, quod acetum sinapis vim d. scutiat. Imponitur autē sinapismus, vbi ex alto ad superficiem corporis trahere consilium est: ideoq; alicui parti admotus, non amouetur, dum cutē cruento colore suffundat. Hinc est, quod hodie eiusmodi a nostris emplastra Rubificantia vocentur. Temporis vero longitudinem in omnibus decernere impossibile est. Quare frequenter sinapismus leuandus est, & caro consideranda, an exacte rubefacta est. Et hoc maxime faciendum in partibus hebetiore sensu præditis. In quibus vero celeriter operari ipsum volumus, locus spongiis ex calida expressis fouendus est, incumbente adhuc sinapismo: id est, super lintheum spongiæ imponendæ sunt. Post sufficientem vsum, in balneum ducendus est æger, & in calidū ponendus solum, & pars iterum perfundenda citra inunctionem. Post balneum vero, rosaceo illinendus locus.
- B** locus. Ac in vehementi dolore, aut etiam vlceratione, hapso lanæ aqua & rosaceo imbuto integendus est: & imponenda est malua cōcta, trita cum pane. Post sedatum dolorem, vtendum est cerato rosaceo cum cerussa. In quibus vero balneum adhiberi nequit, in iis per reliquum corpus spongiarum ex calida aqua expressarum fomento vtendum est. Verum in capitis, & præsertim frigidis affectibus, olei calidi perfusione locus mitigandus est. Vfus sinapismi & rubificantis emplastri potissimum in diuturnis vitis, vbi reliqua præsidia non suffecerint, efficacissimus est. Summe autem prodest capitis dolori, hemicrania, morbo comitiali, vertigini, insania, capiti adhibitus. Sed & thoraci, in asthmate, orthopnoea, & tussi diuturna. In destillatione, & caput, & thorax sinapismo illinendus. Stomachus & intestina in omnibus diuturnis affectibus, & maxime in prostrato appetitu, item in nephritis affectibus, ac lumborum, colis & vesicæ resolutionibus. Quin & omnes resolutæ & frigefactæ partes hoc auxilio gaudent. Commodum est quoque præsidium podagricis, arthriticis, & ischiadicis. In acutis contra morbis non admodum probatur: paucis tamen exceptis, nempe seniores & pigrioribus, vt pote lethargo, cataphora, & catocho: in quibus sinapismo vtimur, initio illum quidem cruribus imponentes: vbi vero materia radices egerit ac firmabitur, capiti. In iis præterea, qui continua febre laborant, vlcusque habent, tum in cartilaginosis, tum excarnibus aliis locis vitari debet sinapismus. Vlcera enim efferrantur, nimiaque actimonia exacerbantur: partes vero excarnes, ab ipso sinapismo exuruntur, & nigrescunt. Reliquum est, vt sinapismi siue emplastri rubificantis formulam vnā subiiciamus, quæ

Emplastrum rubificantia.

Sinapismi vsum.

℞. Olei costini, unciam vnā. E castorio, Euphorbio, an unciam dimidiam. Sinapis drachmas duas & dimidiam. Fimi syluestrii columbarum, drachmam vnā & dimidiam. Sagapeni, drachmas duas. Euphorbii scrupulum vnū. Seminis nasturtii, drachmam vnā & dimidiam. Castorii, 3 j. Aceti, drachmas duas. Cum cera, quod satis est, ad emplastri consistentiam cocant:

De epithematis. CAP. VIII.

- E**mithemata veteribus, vt Paulus lib. 7, cap. 18. attestatur, proprie erant malagmata, quæ mediis corporis partibus ventriculo (verbi gratia) iocinori, lieni, & eiusmodi admovebantur. Generatim tamen quæ aliis etiam imponebantur partibus, Epithemata nuncupabantur. Hodie vero epithemata diuersa, ac olim, ratione e stillatitiis liquoribus, adiectis speciebus aliquot, componuntur. Sic autem ea magna ex parte miscent, vt libræ vni liquorum, drachma vnā & dimidia, aut duæ specierum respondeant. Raro etiam aliis, quam iecori & cordi, partibus hodie admovent epithemata. Præterea iis, quæ cordi adhibentur, aliquid vini optimi, modo febris non adsit, & croci, præter alia corroborantia medicamenta, miscent. His vero quæ iecori imponuntur, aceti parum permiscent, vt nimirum ad iecur ac corporis interiora vim medicamentorum deducant. Modum vero in illis miscendis eum seruant, vt libræ liquorum vnciam vnā, vini & aceti semunciam adiciant. E croco sat erit scrupulum dimidium, aut grana aliquot permiscuisse. Porro qui epithematis iis, quæ ventriculo & iecori imponuntur: recte vti voluerit, is nunquam non adstringentia illis misceat medicamenta oportet. Si quidem quum hæc duo viscera communia sint alimenti instrumenta, adeoque eorundem functiones ad vitæ conseruationem sint necessariæ: semper aliquid quod illis robur conciliet, vt sunt adstringentia, adiiciendum erit. Quicumque igitur vitæ discrimen inferre noluerit, is adstringentium in prædictis epithematis vsum haud negligat. Sed præstat, ea quæ diximus, exemplis aliquot illustrare.

Epithema: ta proprie Generatim Epithematum componendi vtilitatis ratio.

Modus miscendi. Adstringentia epithematis ventriculi & iecoris admiscenda.

Cordiale.

I. ℞. *Liquoris stillatitii boraginis, Rosarum, Melissophylli, Oxalidis, an. uncias tres & dimidiam. Specierum Antidoti e gemmis, E margaritis, an. drachmam dimidiam. Ligni aloes, Ramentorum eboris, Corticum mali citrii, Ossis cordis ceruini, an. scrupulum dimidiam. Vini optimi, unciam unam. Croci, scrupulum dimidiam.* Commistis omnibus, fiat epithema, cordi adhibendum.

Iecori adhibendum.

II. ℞. *Liquoris stillatitii utriusque in tribus, Cichorii, Lactuce, Absinthii, an. uncias duas, Oxalidis, uncias tres. Solani, unciam unam. Aceti, unciam dimidiam. Specierum Antidoti diarrhodon abbatis, drachmam unam & dimidiam. Diatriasantaloni, scrupulos duos. Santalorum rubicorum, scrupulum unum.* Mixtis omnibus, formetur epithema, iecori admoendum.

Viſus epithematum.

Viſus autem epithematum is est. Calefactis primum iis, dein pannus laneus charmesinus, si haberi potest, imbutus ipsis, & madefactus, atque subinde leuiter expressus, loco laboranti toties admouetur, quoties necessitas ipsa requirit. Subinde etiam mutantur panni, ne calefacti corpus calefaciant.

De embrochia. CAP. IX.

ἑμβροχία

Viſus.
Compositio.

Eμβροχία vox, Latinis irrigationem sonat. Est autem proprie Embrochia, quum ex alto, pluuiæ instar, in partem aliquam fit destillatio. Sic quidem dicta ἀπὸ τοῦ βροχῆν, quod pluere ac irrigare Græcis significat. Vtuntur iis in capitis vitis, aliarumque partium contusionibus ac fracturis. Componuntur autem Embrochæ ex herbis, radicibus, seminibus, floribus, & id genus aliis, in aqua vel vino, pro affectus diuersitate, decoctis. Adiciunt autem magna ex parte ad manipulos duos, stirpium & aliorum, libram unam liquorum: atque, quoad medietas consumatur, decoquunt. Decoctum autem hoc, quum adhuc calet, capiti aut alteri parti adhiberi debet. Formulæ aliquot propositis, res tota planior fiet.

Capitale calefaciens.

I. ℞. *Betonica, Chamameli, Maiorana, Serpilli, Lauandula, Origani, Hyssopi, Calaminthe, an. Manipulum unum.* Coquantur in libris aquæ fontanæ quatuor, ad dimidias, fiatque embrochia.

Refrigerans.

II. ℞. *Foliorum salicis, Manipulum unum, Florum nymphae, Violarum, Rosarum, an. Manipulum dimidiam. Seminis lactuce, Portulacæ, Cucurbitæ, an. drachmam unam. Corticum papaueris, drachmam dimidiam.* Bulliant in libra una & dimidia aquæ fontanæ ad tertias, fiatque embrochia.

De fomentis. CAP. X.

Fomenta.
ἑμβροχία

κατὰ τὴν φύσιν

supra.
Viſus.

Fomenta a fouendo dicta sunt, quod scilicet suo calore partes corporis, quibus applicantur, foueant. Græci illa generatim ἐμβροχία nominant. Sunt vero duplicia, humida nimirum, & arida, Hippocrate lib. 2. Vict. acut. morborum teste. Ceterum fomentum humidum, Galen. lib. 12. Ther. method. cap. 7. & aliis Græcis proprie κατὰ τὴν φύσιν dicitur. Aridum quidem in vtre, vesica, vasculo æreo, aut testaceo, vel spongia, vel linteo humido imbutum adhibetur: ut e loco Hippocratis paulo ante citato satis liquet. Aridum proprie Græcis πύραυλος vocatur: & a sacculo, de quo sequenti agemus capite, fere nihil distat. Porro fomenta cutim rarefaciunt, & transpirabilem reddunt: ac sanguinem, qui in phlegmonibus est, attenuant, & discutunt. Antè tamen corporis vacationem, ut alia omnia localia, præsertim in corpore plethorico, aut vitiosis humoribus repleto, non sunt temere admoenda. Quippe tum plus humorum ad calefactam partem trahetur, quam id sit quod discutitur. Nunc humidorum fomentorum unam & item alteram formulam subiiciemus.

Anodynum & relaxans.

I. ℞. *Maluæ, Manipulum unum. Florum anethi, Chamameli, Meliloti, an. Manipulum dimidiam. Seminum lini, Fænogræci, an. unciam dimidiam.* Coquantur in lib. duabus aquæ fontanæ, dum medietas relinquitur: & postea aliquo prædictorum modorum adhibeatur.

Ad lienem induratum.

II. ℞. *Centaurii minoris, Ceterachii, siue asplenii, an. Manipulum unum. Rutæ, Manipulum dimidiam. Seminum lini, Fænogræci, an. drachmas tres. Corticum radices capparis, drachmas tres & dimidiam.*

A *dimidium. Radicis althea, unciam unam.* Decoquantur in aqua & aceto iustæ quantitatis ad tertias, spongiaque iure decocti imbuta applicetur.

De sacculis. CAP. XI.

QUæ veteribus arida dicebantur *Fomenta*, hæc hodie sacculorum appellatione veniunt. Nihil enim, aut parum admodum differre videntur. Conficiuntur e radicibus, herbis, floribus, seminibus, & id genus aliis medicamentis. Radices præterea & herbæ conciduntur, aut leuiter contunduntur, perinde atque semina. Adhibentur magna ex parte capiti, cordi, ventriculo, iecori, lieni, & vtero. Ideoque & compositio & forma eorundem iuxta partis laborantis morbum, situm & figuram variantur. Capiti enim, quod ad compositionem attinet, e capitalibus vocatis medicamentis confecti: quod ad figuram spectat, oblongi sacculi, & tiazæ formam obtinentes admoventur. Ventriculo, quæ ex iis, quæ ipsi maxime destinata sunt, confecti, & scuti effigie, adhibentur. Cordi, iecori, lieni, & vtero, ex rebus singulis partibus cōgruentibus compositi, & dictarum partium formam imitantes, applicantur. Et qui capiti & cordi admoventur, serico: reliqui vero lineis pannis obducuntur. Iam e formulis, quæ diximus, magis innotescant.

Componē-
dorum sac-
culorum
ratio.
Quib. par-
tibus cor-
poris & qua
forma ad
hibeantur.

Capiti apponendus.

I. ℥. *Florum rosmarini, Iquandula, Chamameli, Betonica, Rosarum, an. Manipulum unum & dimidium. Salvia, Maiorana, Serpilli, Meliloti, an. Manipulum dimidium. Folliculorum sene. drachmas duas & dimidium. Stichadis, drachmas tres. Caryophyllorum, Nucis moschate, Maceris, an. scrupulos duos.* Contusa in sericum demittantur, formeturq; sacculus capitalis, tiazæ formam referens.

Cordi.

II. ℥. *Florum buglossi veri, Echii, Rosarum, Melissophylli, an. Manipulum unum. Cinnamon electi, Caryophyllorum, Maceris, an. drachmam dimidium. Ligni aloes, scrupulum unum. Corticum mali citrii, Specierum diambra, an. drachmam unam. Ossis cordis ceruini, scrupulum dimidium. Croci, scrupulum unum.* Contritis omnibus, fiat sacculus e serico, cordialis, Leniens & discutiens.

III. ℥. *Florum chamameli, Meliloti, Anethi, an. Manipulum dimidium. Seminis lini, Fænograci, Althea, an. drachmas duas. Origani, Abrotoni, Mentæ sicca, Calamintha, Ruta hortensis, an. Manipulos duos.* Contrusa in linteolum demittantur, fiatque sacculus.

Ceterum sacculi semper acu transuersim missa consueuntur, ne scilicet ea, ex quibus constant, in vnā omnia partem labantur ac declinent. Vt plurimum etiam antea quam adhibentur, lapidi ab igne calefacto imponuntur, ac vino aut aceto irrigantur: ac postea contracto calore, partibus laborantibus admoventur.

De in sessionibus. CAP. XII.

QUOD Latini *in sessionem* aut *in sessionem*, hoc Græci *ἰνὰ σῆμα* nominant. Non est autem, nisi decoctum ex herbis, floribus, seminibus, radicibus, aliisque eius generis medicamentis constans, cui æger insidet. In sessionibus autem utimur, vbi balnea nos deficiunt, aut vbi æger imbecillior est, quam ut balnei, quod vehementius discutit, viresq; resoluit, vsus ferre possit. Vsus autem in sessionum maxime est in renum, vesicæ, coli, ani, & vteri malis. Variantur medicamenta pro morbi diuersitate, nunc hæc, nunc alia requirentis. Præstat autem, ut in sessionis tempore caput operiatur, ne vaporibus sursum elatis repleatur. Restat ut formulas aliquot subiiciamus.

In sessionibus.
ἰνὰ σῆμα
Vius.

Ad calculos.

I. ℥. *Saxifrage, Oenanthes seu filipendula, Helxines, Malua, Althea, an. Manipulum unum. Cicerum rubicorum, drachmas tres. Seminum apii, Lini, Fænograci, an. drachmam unam & dimidium.* Coquantur singula in aqua iustæ quantitatis ad tertias, pro in sessione, affligente calculo.

Ad menses constrictos.

II. ℥. *Artemisia, Salvia, Betonica, Calamintha, Origani, Pulegii, Chamameli, Meliloti, Hyperici, abrotoni, an. Manipulum dimidium. Radicum iridis, Apii, an. unciam unam.* Coquantur, radicibus prius minurim concisis, pro in sessione.

Constringens.

III. ℥. *Plantaginis, Polygoni, Rubi, an. Manipulum unum & dimidium. Corticum mali græ-*

300 Operum Leonhard. Fuchsi Pars II.

nati, drachmas tres. Bursapastoria, Equiseti, an. Manipulum unum. Radicis symphyti maioris, Radicis bistortae, an. unciam dimidiam. Balaustrorum, drachmas tres.

Coquantur omnia in tribus aquæ pluuiæ partibus, & quarta vini nigri adstringentis, pro infessu eorum, qui alui profluuiio, aut dysenteria laborant.

PERORATIO.

Haftenus, quanta breuitate potuimus, vſitaram huius temporis componendorum medicamentorum rationem quatuor libris perſtrinximus: hoc potiffimum nomine, vt non tantum pharmacopœis, verum etiam iis, qui medicinę ſectantur ſtudio, & iis etiam, qui iam medicinam facere incipiunt, prodeſſemus. Nam abunde nobis conſtat, quam exerceat eoſ hæc res, qui iam medendi rationis periculum faciunt, ſi non habeant qui illos quâſi manu ducat. Speramus etiam, hinc eam commoditatem ad pleroſque peruenturam, vt deinceps paulo latiniuſ ſuas formulas poſſint conſcribere. Nos illarum pauca duntaxat exempla paſſim adduximus, quibus qui contenti eſſe nolint, ad medendi rationem noſtram conſugiant: quæ iſſis, quod deſiderant, affatim ſuppeditabit. Reſtat aliud nihil, niſi, vt Patrem Domini noſtri IESV CHRISTI precemur, vt iſ noſter labor quam plurimis vſui eſſe poſſit. Quod ſi conſecuti fuerimus, non eſt quod ampliuſ requiramus.

FINIS PARTIS II. SEQUITVR III.



D. N.

LEON. FVCHSII,
MEDICI ILLVMINATI,
SCHOLÆ TVBINGENSIS
PROFESSORIS PVBLICI, NEC
NON PRINCIPVM WIRTEN-
bergenſium Protophyſici,

Operum Didacticorum Pars III. & IV.

CONTINENS CVM MEDELAM SINGVLORVM
humani corporis partium a ſummo capite ad imos vſque pedes vi-
tiorum, tum Paradoxorum medicinæ ſynopſin.

*Ab Auctore ipſo paulo ante mortem, reſectis mendis & erroribus pernicioſis, reco-
gnita, aucta & locupletata, luculentiffimifque annotationi-
bus illuſtrata,*

CVM MEDICIS TVM PHARMACOPOEIS LONGE
vtiliffima, & ſumme neceſſaria,

Indiſe Rerum & Verborum ſatis locuplete donata.



PRODIT E COLLEGIO
Paltheniano, Quod eſt in nobili Francofurto.

M. DC. IV.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
MEDICAL DEPARTMENT
SCHOOL OF MEDICINE
PROFESSOR OF MEDICINE
J. H. HARRIS, M.D.
CHICAGO, ILL.

Dear Sir,
I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst. and in reply to inform you that the same has been forwarded to the proper authorities for their consideration.

I am, Sir, very respectfully,
Your obedient servant,
J. H. HARRIS, M.D.



AD TYPOGRAPHOS.



Vum tanta hodie quorundam Typographorum sit improbitas & impudentia, ut nostris lucubrationibus haud secus quam inertes fuci mellificio insidientur, & easdem vix pralum egressas, magno me hercle eorum, qui has primum imprefferunt, detrimento, denuo excudant, diutius mihi esse silendum non putavi, ne si horum temeritati & audacia me non opponerem, id sibi quasi suo quodam iure licere, & impune etiam deinceps quoties vellet, se usurpare posse sibi omnino persuaderent. Mirari autem principio subit, cur legis natura, quae praecipit, ne alteri faciamus, quae fieri nobis nolimus, prorsus immemores, ita omnem humanum affectum exsuerint, ut iis, a quibus nulla unquam affecti sunt iniuria, nocere tamen ausint? Ita vero ut faciant stimulis avaritiae agitantur, & nulla prorsus proximi ratione habita, eo feruntur, quo sordidi lucri cupiditas ipsos rapit. Detestandum profecto hominum genus, ut quos Christiana caritatis, ac propria fama & existimationis penitus oblitos, auri sacra fames, tanquam catenis ligatos, quo velit ducat, atque ut suo comodo aliis incommodent, impellat. Verum praeter hoc, quod aliis hac ratione nocent, in eo etiam vehementer delinquunt, quod ea, quae ab aliis primum eleganter, & accurata diligentia excusa sunt, peruersa sua & scelerata imitatione ita contaminant atque conspurcant, ut nulla sit pagina, quae non multis erroribus redundet. Quae sane de causa odio omnium digni sunt, quod non solum auctoribus librorum, sed & ipsis lectoribus plurimum obfint. Auctoribus quidem, quod eos alienis grauant erroribus: Lectoribus autem, quod illis scrupos iniciant, ubi alias nullus futurus erat. Verum nec hac nocendi ratione contenti sunt, sed eo impudentia progrediuntur, ut ea quae non sine consilio per auctores adiecta sunt, prorsus omittant. Quale certe flagitium nuper designauit Lugdunensis ille Typographus, qui omnes fere in medicina conscriptos libros, a nauis & sedulis Germania Typographis, elegantissimo charactere, & ampla forma, multis impensis primum impressos, minutissima, & vsui humano parum conuenienti forma, nec etiam integros, sed compluribus refectis, recudere ausus est. Siquidem praeter epistolam nuncupatoriam, in qua omnem consilii mei rationem, quod in exarandis iis libris secutus sum, & quod cognoscere lectorem necesse est, accurate exposui, multa etiam alia prorsus omisit, praesertim ubi Monachos illos otiosos, ac probe saginatos patres, omni tamen doctrina & pietate destitutos me acerbius perstrinxisse, animaduertit. Metuit forte ne qui totas viduarum aedes deglutire possunt, & ipsum deuorent. Sed quae hac est impudentia, lucri spe in alieno opere quae placent adere, alia vero quae displicet, metu periculi refecare? Immo boni viri officium erat, aut ea forma, quae ab auctore scriptum est, & primo publicatum, recudere, aut auaras manus ab eo prorsus abstinere. Quod si igitur lucrum, quod ex mutilo & misere decurtato opere sentit, gratum & suauis est, faciat ut periculum quoque, quod ex integri operis editione impedere sibi putat, non pertimescat. Proinde ut tandem Lugdunensis illius peruersam imitationem omnium e manibus excuterem, & illius subinde exemplo monitos ceteros quoque Typographos ab eiusmodi imitationibus absterrem, denuo excudendos meos in medicina conscriptos libros, correctos & auctos, maximae accessione non solum compositionum, sed & aliarum rerum accessione locupletatos, atque ab omnibus erroribus repurgatos, cum aliis quamplurimis meis scriptis, fratribus Paltheniis, tanquam legitimis horum impressoribus, tradere volui. Quod reliquum est, ceteros omnes Typographos rogo, moneo, & hortor, ut deinceps ea potius, quae suae fidei ab auctoribus librorum commissa sunt adere, quam mea ab aliis prius recte excusa, recudere velint, & ne deinceps hac peruersa ac fraudulenta imitatione, sui ordinis hominibus incommodare pergant. Quod ni fecerint, non est cur aliud expectent, quam quod ipsos, tanquam falsarios & reipublica nocentissimas pestes sui traducturus, omnesque hortaturus, ut ab eorundem impressionibus, veluti adulterinis, sibi caueant. Valete Typographi, &

nostra admonitioni patulas aures praebe, ne opus sit ut vestram
impudentiam ac sordidam avaritiam toti or-

bi traducam.

ELENCHVS LIBRORVM SIN-
GVLORVM TERTIÆ ET QVARTÆ
PARTIS OPERVM LEONHAR-
di Fuchſii.

- Lib. I.* De morbis vitiiſue capitis pag. 1.
Lib. II. De morbis ſue adfectibus thoracis 76.
Lib. III. De medii ventris & inteſtinorum adfectibus 99.
Lib. IV. De Febris & earum differentiis. 180.
Lib. V. De medendis tumoribus præternaturam 214.
Lib. VI. De medendis vulneribus. 239.
Lib. VII. De medendis ulceribus. 266.
Lib. VIII. De medendis fracturis & luxationibus 283.

Hæc omnia ſequitur Quarta Pars continens tres libros
Paradoxorum Medicinæ. 295.

LEON.

AL E O N H A R T I F V C H S I I D E

M E D E N D I S S I N G V L A R V M H V M A N I C O R P O R I S

partium a summo capite ad imos vsq; pedes vitiiis.

L I B E R P R I M V S.

De Alopecia & Ophiasis. C A P. I.

A *Alopecia* Græcis capitis est vitium, in quo areas deciduos capillos efficit. Vel est Alopecia vitium, quo capillis fluentibus caput nudatur & glabrescit. Sic vero a vulpe appellatum est, quod id ipsum vulpibus crebro accidat. Quippe *αλώπηξ* Græcis vulpem significat. Latini peculiari ac propria destituti appellatione, communi cum Græcis *Alopeciam* vocant. Barbari nostræ ætatis Medici, vt crebro alias faciunt, in mutatione vnus literæ nomen deprauantes, *Alopeciam* nuncupant. *Ophiasis* autem Græcorum Medicis vitium existit, quod capitis partem læsam serpentis instar, quæ *ὄφις* Græcis dicitur, glabram ac capillis nudam ostendit. Latini pariter atq; Græci *Ophiasin* nominant. Barbari Medici Arabicam sectantes Medicinam, *Tyriam* appellāt. Tyrum enim illi omnem serpentem, potissimū *viperam*, vocant. Sunt tamen qui *Ophiasin* in capite perpetuo habere dicant, & infantibus ad elephātiā dispositis solum accidere. Alopeciam vero barbā, reliquasq; corporis partes pilis a natura conuestitas non minus occupare, quam caput, nec minus etiam alias ætates, quam infantiam infestare. Verum nos, perinde atq; alii omnes, vitia in reliquis corporis extra caput partibus pilis vestitis accidentia, ad pilorum defluuium referre volumus. Ceterum vtrunq; vitii genus a vitiatis radicesque pilorum erodentibus humoribus: aut ob alimentū, quod illos augeat, penuriam: aut propter meatuum amplitudinem prouenit. Quemadmodum enim nonnullæ stirpes humoris inopia & defectu desiccata corrumpuntur: aliquæ vero ob alieni naturæ ipsarum humoris occursum: sic etiam capilli vel propter humorum ex quibus nutriri consueuerunt inopiam: aut propter eorundem prauitatem corrumpuntur. Et ob humorum quidem inopiam, caluities fit, quemadmodum sequenti mox capite latius dicemus: propter vero humorum prauitatem, alopecia & ophiasis. Nam, vt *Trallianus auctor est*, tum ex pituita calefacta, ac in falsam qualitatem conuersa, tum ex flaua bile, & humore melancholico nascuntur. Quapropter efficiens vitii causa considerari & agnosci, atq; ita tandem curatio tentari debet. Porro quales sint vitiati humores, ex cutis capitis colore cognosces. Nonnullis enim murata albidior apparet, aliquibus pallidior, aut nigrior. Candida cutis, pituitosā: pallida flauave, bilosā humorum vitiositatem: nigra, melancholicā significat. Ad vitiosi præterea humoris speciem certius dignoscendam, non leue adiumentum præcedens victus ratio adfert: præsertim intelligenti quinam ciborum pituite, & quinam melancholiæ flauæq; bilis succum coaceruent. Quum autem vitium hoc ex prauis humoribus procreetur, vt victus ratio, quæ in eo obseruari debet, ex iis constet.

E cibis ac potibus, qui bonos succos gignunt. Horum autem cognitio, ne hic præternecessitatem longiores simus, ex libris Galeni de alimento. facul. inscriptis, & libello de cibis boni & mali succi petenda erit. Quod vero ad curandī rationem attinet, si adsit plethora: quod cognoscitur ex cutis colore rubeo: sanguis educendus a vena cephalica primo loco, postea tundere venam frontis oportet. Quod si id non liceat, sanguisugæ in occipitio, vel capitis circuitu, aut cucurbitulæ cum scarificatione eodem in loco admouere commodissimum est. Sin vniuersum corpus vitiosis humoribus refertū fuerit, Græci *κακ-χηνιδν* nominant, totius corporis in primis purgatio molienda erit, medicamento aut pituitam ducente, aut flauam bilem, aut melancholicū succum exhibitio, coniectura humoris, vt paulo ante ostendimus, ex cutis colore facta: Si enim is candidior quam pro naturæ habitu sit, pituitosi humoris purgationem adhibebis: sin pallidior, flauæ bilis: haud secus quam si nigrior conspicitur, quæ melancholicū succum detrahent, offores. Pituitosos autem humores, præsertim a capite, *Hiera ex colocynthide* purgare consuevit, quæ describitur a Nicolao Myrepsō sect. 23. capite 13. sub nomine Hieræ magnæ. Hiera quoque amara, quæ a Galeno lib. 7. therap. metho. & lib. 2. de compo. medica. local. cap. 1. describitur, mirifice confert: nigro scilicet interdum elleboro, vt idem Galenus suadet,

2 Operum Leonhardi Fuchsi Pars III.

Cataporia
ex colocyn-
thide & a
loe.

aut epithymo adiecto, vbi melancholicum humorem purgare volueris: interim etiam
scammonia, si flaua bilis purganda erit. Si vero pituita, nihil adiciendum erit. Quin-
etiam ex aloë cataporia commodè sic laborantes purgare solent. Habent vero, *Galeno*
libro primo de compos. medica. local. cap. 2. auctore, pulpa colocynthidos unciam vnā. Aloes, sca-
monia, vtriusque uncias duas. Succus absinthij, unciam vnā. Prædicta vero sigillatim contri-
ta, & permista, absinthii succo excipiuntur, inq; cataporia rediguntur. Ex drachma vna
conficiuntur cataporia vndecim, & vna vice omnia deuorantur. Ceterum, vt id obiter
dicamus, Hieræ picæ triplex vsus hodie existit. Sūt enim qui species vocatas eius Hieræ
in vino, aut iure gallinaceo, aut alio conuenienti liquore propinant. Atqui pauci ad-
modum sunt, amaritudinem immensam abhorrentes, qui has sumere possunt. Qua-
propter præstat easdem cum cassia fistulari miscere, & adiecto saccharo boli forma assu-
mere. Ultra drachmam vnā de speciebus illis vna vice non exhibetur. Alii sub specie
catapotiorū, q̄ passim in officinis medicorū prostant, exhibent. Antidoti forma liquidū
in clysteres adhibetur. Cauendū vero vnice interea erit, ne multo cibo corpus onere-
tur, donec habitus corporis diligenter expurgatus fuerit, ne si alimenti copia illud ex-
pleatur, excrementa tantum communia egerantur, humor autem vitiosus attrahendus
remaneat. Porro post totius corporis purgationem apophlegmatismis, *masticatoria* bar-
bari Medici appellant, pituitam a capite per os educere oportet. Conficiuntur autem
ex *sinapi, hyssopo, staphyde agria, pipere, origano, radice pyrethri, cubebis vulgo appellatis, asaro,*
& similibus, quemadmodum lib. 4. de compo. medica. cap. 27. ostendimus. Valet autem inter
alia hoc potissimum, quod accipit: *Piperis longi, nucis moschatae singulorum drachmam vnā,*
Seminis, staphydis agriae, pyrethri, vtriusque scrupulos duos. Sinapi, origani, vtriusque scrupulum.
vnu. Trita excipiuntur in astiche, aut melle, aut alba cera, vel vtriusq; fingunturq; pastilli lu-
pinorū forma & quantitate manfiles: quorū vnus ad horæ fere vnus medietatem com-
manducetur. Possunt etiam prædicta, postquam trita sunt, in linteum pannum tenuem
ac rarum reposita ac deligata commanducari, vt loco paulo ante ostenso fusi⁹ monstrauimus.
Quamquam hæc minus probanda sunt. Trahunt vero etiam pituitam diu in ore retenta
gargarismata confecta ex decocto fructuum dulcium, vt *ficuum, passularum, & aliarum*
herbarum calidarum, quales sunt hyssopus, stachas, origanum, pulegium, & similes, in quarum
decocto mel rosarum dissoluitur, si medicamentum mirius esse oporteat. Si vero fortius,
in sine decoquuntur *cubebe, piper, pyrethrum, & id genus similia.* Adiciuntur etiam com-
positiones, quæ pituitam trahunt, vt est *diaphænicon.* His peractis, hoc est, toto prius cor-
pore, & etiam capite ipso vacuato, ad localia vocata medicamenta veniendum erit, qui-
bus attenuandi, attrahendi, discutiendique vires insunt. Oportet enim velut in aliis,
sic etiam in iis affectui siue morbo mederi, cuius symptoma est capillorum vitium. Si
igitur vitiatus humor circa vnum locum collectus fuerit, scopus medendi erit, vt is quā
celerrime vacuetur, priusquam ab ipso cutis in quendam malum habitum deducatur:
ita vt etiam quis vitiatum ipsius humorem vacuet, & boni sanguinis influxum præparet,
is etiam a malo in ipsa habitu prius confirmato corrumpatur. Vacuantia igitur esse lo-
calia illa medicamenta oportet, adeoque discutiendi vi prædita, citra tamen vehemē-
tem calefactionem. Quæ enim eius modi sunt, vel cutem exurent, vel cutem capitis ni-
mium exsiccabunt, adeoque humorem, vnde pili nutriuntur, absument. Nec est quod
moderate calidum sit medicamentum, id enim vacuare & discutere noxium in capite
humorem haud poterit. Tenuium quoque partium sit, vt in altum penetrare, & radi-
ces capillorum attingere possit. Quum enim cutis capitis crassa admodum sit & dura,
ideō nisi sit tenuium partium medicamentum, ad radices capillorum penetrare nequit.
Ad quam rem profecto plurimum conducit, si ante omnium medicamentorum vsum
capillos nouacula sustuleris, ac deinde laborantem cutem per linteolum neque asperū,
neque nimis molle confricueris. Sunt tamen, qui variis in locis caput quoque pungen-
dum velint, postquam fuerit fricatum, & a punctura oleo calido dulci irrigandum, ne
tam cito foramina illa coalescant, vel adipe anserino, vel porcino, vel vrsino, aut agnino
vngendum. Obseruandum quoque erit, quantum ruboris ex huiusmodi frictione cuti
accedat. Si enim per modicam frictionē statim hæc rubescat, morbus sanatu facilis erit.
Sin vix post longam atq; multam frictionem rubescat, difficile tum vitium, tū curationē
ipsam minime leuē ominaberis. Vt autē in omnibus aliis medicamentis nō solū quod
cale-

Apophle-
gmatismi.

Pastillus
manfiles.

Localia.

Gargari-
smata.

- A** calefaciant operæpretium est cognoscere, sed & quo ordine & excessu id præstent: ita quoque in iis quæ alopecii conferunt, quod altero calidius sit nosse oportet, ita enim expedite ex illis medicamenta compones. Calidissimum igitur ex eis est *Euphorbium*. Eligendum vero quod mediocri sit ætate. Nam recens acrius est, vetus autem vires amittit. Eo autem minus calidum est *thapsia*, post hanc vero *sinapi*, & *nasturtium*. His succedunt *sulphur*, *nitri spuma*, *nitrum molle vsum*, *aphronitrumque candidum*, *lene ac laxum*, quod nullam in se terream crassitiem habet. Deinde uterque *elleborus*, *eruca semen*, *oleumque laurinum*. Quinetiam *pix liquida*, & *murium stercus*, *anserinus adeps*, sed magis *ursinus*. Item *amygdale amaræ totæ vstæ*, *erinacei terrestres cutis acerrimo aceto subactum*. *Ricinum*, *rutaceum*, *iuniperinum*, & *ys similia*. *Alexander Trallianus* *Asphodeli radicem*, & *abrotanum*, *sinum caprarum*, earumque *ungues crematas*, & ex aceto in laurem detritas, in Alopecia quæ non longo tempore duravit plurimum commendat. Herbam quoque *verbenacam* probe ex aceto tritam illitam, ubi partem prius intro bene infricueris, & linteolo absterferis. *Marrubium* viride tritum illine. *Parietaria* trita cum foliis, assidue locum perfricato, *Equinos dentes crematos*, ex aceto illine. *Murium insuper stercus* aceto laugatum pilos cito producit. Præstat autem locum irritare, cui remedia imponentur raphani radicibus, & cepis transversim incis. Statim Alopecia vitio medetur *Erinacei terrestres cinis*, *pice liquida exceptus*, illitusque. Pari modo facit *ranarum cinis*, itidem *pice exceptus* & illitus. *Nuces anellane integræ combustæ*, & ex oleo leuigatæ illitæ plurimum conferunt. Atq; hætenus simplicia recensuimus. Ex iis igitur tria remedium genera parari debent, imbecilla, mediocria, & fortia. Imbecilla, ut recenti alopecia medeantur: idque in regionibus calidis, & corporibus mollioribus delicatisque. Mediocria, in mediocribus: & fortioribus in robustis, & vetusta alopecia. Hæc vero distinctio diligenter observanda est, ut duo qui passim committuntur errores vitentur, cutis scilicet exulceratio ab acerbis medicamentis: & natiæ partis humiditatis a siccioribus absumptio. Nunc composita commemoremus, quorum hoc primum existit, quod accipit: *Seminis eruce, nasturtij, nitri, singulorum drachmas unam & dimidiam*. *Thuris in aceto acri & valido macerati, drach. unam*. *Sulphuris viui, drachmam unam & dimidiam*. *Adipis anserini, ursini viriusque drach. unam*. *Olei laurini, unc. tres*. Tritis terendis, & commistis omnibus formetur linimentum hodie nominatum. Alterum, paulo validius, quod habet *euforbij, thapsie radicis. viriusque drach. unam*. *Ellebori utriusque singulorum drach. dimidiam*. *Seminum nasturtij & eruce, amygdalarum amararum cum corticibus vstarum, singulorum scrup. unum*. *Sinapi, scrup. dimidium*. *Oleorum nardini, laurini, viriusque unc. duas*. *Cera quod satis est*. Fingatur unguentum, quo caput assidue inungatur. Sunt autem hæc & alia prætidia iis similia in aere & loco aliquo calido adhibenda, & maxime, si fieri potest in loco insolato, auraque frigida destituto. Hyberno tempore in hypocausto, aut balneo medicamentis iis uti satius est. In validorum autem medicamentorum usu vnice cauendum erit, ne cutis ultra quam conuenit, concalescat: id quod tum ex colore ipsius, tum digitorum tactu deprehendes. Color namque in ea rufus magis apparebit, digitorumque contactu ipsam satis esse calidam cognosces. Horum itaq; animaduersione habere oportet, periculum enim est iterum atque iterum repetito eorundem usu, cutem exuri. Quare tum ad molliora minusque fortia trāseundum est, cuius generis sunt *abrotanum cum aceto laugatum*. Item *stercus caprinum*, *caprarumque ungula cremata*, si cum aceto illinantur. *Rosmarinum insuper pluribus diebus cum aceto maceratum*. Ne igitur immedicabilem alopeciam inducamus, præstat, ut sæpe locus inspicatur laborans, ut cognoscamus, ne medicamentum, quod est admotum, debilius, vel acrius sit. Atq; hæc in præsentia nos commemorasse satis sit. Qui plura desiderat is Galenum adeat, & sylvam illorum auxiliorum inueniet.

Medicamē-
ta simpli-
cia & para-
tu facilia.

Cōposita.
Linimentū.

Vnguentū.

De defluvio capillorum. CAP. II.

- F** Capillorum defluuium penuriam substantiæ pilos generantis consequitur, ut capite *Causæ* præcedenti dictum est. Item, ut *Trallianus attestatur*, meatibus cutis dentatis & rarefactis, & ex prauorum recrementorum purgatione id ipsum interdum accidit. Densitas enim meatuum cutis efficit, quo minus materia, quæ crassitiem magnam habet ad pilos peruenire, & ne capilli per cutem nimium adstrictam egredi queant. Raritas autem eorundem causa est, quod pili firmiter herere non possint. Præua excrementa, radices

4 Operum Leonhardi Fuchsi Pars III.

Signa.
Curatio.

Si a penuria
substantiæ
nutrientis
capillos.

Ladanum.

Defluuii ex
meatuum
raritatecu-
ratio.

Victusra-
tio.

arroduunt, eisdemque excidere efficiunt. Notis nullis ad vitii huius agnitionem nullis opus est, quod primo statim obtutu deprehendi ab omnibus possit. Curandi ratio eorum qui defluuium capillorum laborant, non eundem quem alopecia scopum habet. In alopecia enim ut vitiatus humor consumatur, primarius est scopus. In defluuium autem capillorum, ut capitis habitus roboretur, & boni succi præsentia procuretur, cutisq; ad densitatem ac raritatem moderatam reuocetur. His enim tribus efficitur, ut capiti boni succi copia adsit unde capilli enasci possint, & mediocritas temperamenti cutis capitis conseruetur. Ut autem ordine & perspicue curandi ratio, pro causarum diuersitate, a nobis tradatur, principio eius defluuii capillorum, quod a siccitate siue penuria substantiæ pilos nutrientis accidit, curationem prosequemur. In eo quidem defluuium cibis humectantibus, & boni succi, coctionique nihil aduersantibus, & ab omni salugine & acrimonia alienis & qui promte in corpus distribui possint, utendum erit. Frequentius etiam æger lauari debet. Balneum autem esto temperatum, quod non valde calidum vel aerem vel folium habeat. Aqua igitur temperate calida pro balneo vratur æger, caput multo hydrelæo, id est, aqua & oleo, vngat, non autem sapore, aut nitro caput abstergat. Ceterum medicamentis humectantibus aliquid mediocriter adstringens miscere oportet, quale est *Ladanum*, quod vtraque in se moderata complectitur, quæ huic symptomati conueniunt, calorem videlicet mediocre seu temperatum, & adstrictionem ei proportionem respondentem. Substantia præterea tenui præditum est, atque concoquit. Quamobrem oleo mistum, quo illini possit, defluentis capilli symptoma sistit. At cuius constarante medicamenti usum, capitis frictionem præmittendam fore, & pilorum multitudinis præfectionem: aut si anni tempus permittit, etiam perfectam ablationem. Sic enim ob frictiones & illitus, robusta & calida cutis reddetur, & moderatam densitatem, eam scilicet quæ secundum naturam est, acquireret. Ceterum consuevit hoc vitium magna ex parte iis qui antea ægrotarunt, accidere: raro autem citra morbum, ideoque magis salubrem & vires reficientem victus rationem requirit. Multique citra medicamentum perfecte sanati sunt, atq; id breui. Composuerunt tamen nihilominus Medici eius gratia medicamenta mediocre cuti densitatem inducentia, ita tamen ut ne simul eam refrigerent: vehementer enim adstringentia, omnino etiam refrigerant, & affluxum nutrimenti repellunt, quo minus quam par est suppeditato, capilli defluunt. Huc itaq; medicamentorum ratio dirigenda, ut sanguinem qui affluit, non solum non prohibeant, sed etiam alliciant, sensim autem & leuiter contrahant, laxatamque & rarefactam cutem constringant. Tale autem, ut diximus, suapte natura est *Ladanum*, quod quia ceræ similem consistentiā obtinet, liquorem quendam desiderat conuenientem & largum, ut capiti illini possit. Præstat autem huiusmodi liquorem similem esse *Ladano*, hoc est, ex contrariis facultatibus mixtum, attractoria nimirum, & contrahente. Eius generis est *oleum lentiscinum*, suapte natura tale existens, quale est ipsum *ladanum*. Nul- lum itaque medicamentum, *Galeno etiam attestante*, in fluentibus capillis præstantius eo quod ex *ladano* & *lentiscino* mixtum constat. Manifestum autem cuius esse arbitror raris crassius esse medicamentum admouendum: tonsos autem & præsectos capillos habentibus liquidius. Quod enim comam nutrire non conueniat, donec aliquis curetur, euident esse omnibus puto. Quod si vero ex meatuum raritate, & propter humores, qui discutiuntur, & excrementa quæ ipsos nutriunt, extra cutem elabentia, capilli largius defluunt, non alienum erit tunc uti remediis quæ refrigerant, & adstringunt liberalius, similique victu, qui nihil acre in se contineat dilatandis aperiendisque meatibus efficax. *Lactuca* igitur, *Tralliano auctore*, matua, oua, panis siligineus temperata, aut frigida aqua irrigatus, pepones, cucumeres, pisces dura carne præditi, suilla caro non pinguis, & maxime bubula, pedes bubuli prædictis conueniunt. Vino autem hi, & potissimum veteri abstineant. Balneum vero ingressi, aqua frigida caput perfundant, ac rursus in frigida solium descendentes, ex fluente canali aquam frigidam copiose capite recipient, rosaceo ipsum, aut quod ex oliuis immaturis expressum, aut melino, aut myrteo perungant. *Galenus* quoque myrtinum in vicem lentiscini *ladano* in hoc casu permiscendum esse tradit. Est autem *ladani* dimidia pars, cum integra olei myrtini parte commiscenda. Licebit etiam aliquando in ætate frigida, atque adeo temperamento capitis natura frigido, & hyberno tempore, calefactoriæ facultatis adhibere oleum, quale

A quale est *nardinum*. Laudanum autem in duplici vase liquefaciendum, & ubi liquefactum fuerit, cum nardino oleo permiscendum. Verbenaca quoque recta virens cum radicibus in omphacinum oleum coniicienda, atque ubi per plures dies insolaueris, oleum excolato, eoque singulis diebus vttere. Quod si virens defuerit, aridam vna cum radicibus contundito, & per angustissimum cribrum concernito, dein oleo commixto vt strigmenti crassitudinem accipiat, in vas æreum reposito, atque ubi computruerit, pro oleo similiter vtitor, nulli enim remedio cedit. Porro si ob meatuum densitatem pilorum generatio prohibeatur, tunc iis potius vt conuenit, quæ rarefacere possunt, & moderate calefacere. At quia rarefacientia materiam quidem euocant, non sinunt autem ipsam inhærere, & pilos nutrire ac generare, miscere iis conuenit tum quæ cutem roborare, tum quæ densare sensim queant, vt mista in remedio facultas esse deprehendatur, nempe attractrix simul & alitrix retentrixque: ex præsentī quidem caliditate, attractoria: ex frigiditate vero retentrix, Multa igitur sunt medicamenta, quæ vires ex variis naturis conflatas habet, quædam attractoriam, vt thapsia, sinapi, ephorbium, cepa, & similia. Quædam adstringentem, vt oleum myrtinum, omphacinum, lentiscinum. Exiis igitur simul mistis, prout affectus postulat, medicamenta componenda erunt. Laudantur inter alia, quæ sequuntur. *Laudani partes duas, adiant partem unam vino myrinoque oleo excipi, & ubi mellis consistentiam consecutum fuerit, caput ante balneum, & post illud inungito.* Aliud. *Laudani & absynthij partes aequales, baccas iuniperi decem lintcolo illegato, & in oleo ad dies quinque macerato, ex eoque caput illinito, & neque capilli defluent, neque surfures habebunt.* Est Archigenis remedium. *Nigella usta, aquaque subacta & illita plurimum commendatur.* Huius namq; vsus ad eliciendos pilos, siue capiti, siue mento, inprimis autem si superciliis adhibeatur, mirifice confert.

Defluuii et
densitate
meatum
curatio.

De tincturis capillorum. CAP. III.

ET si veteres etiam Medici, Galenus potissimum, tincturæ capillorum parum æqui fuerunt, quod non tam ad ornatum honestum, quam ad malitiam hac plerique vsi sunt: tamen quum interdum regiz ac principes honestæ mulieres vt maritis suis gratificentur illam a Medicis expetant, operæpretium me facturum confido, si paucula quædam eius generis, & paratu facilia subiiciam medicamenta. Primum autem ea, quæ capillos denigrant commemorabo. Denigrant itaque capillos, corticis Salicis succum cum oleo affricatus. Summe autem denigrat. Aliud Gallarum, acacia, squama ferri, chalcanti, aluminis aequales partes in urina pueri Venerem non experti diem unum macerato: deinde pilus deterfis illinito, & caput linteo ad triduum ligato. Aliud. Vini nigri vetustissimi vncias tres in plumbeum vas conijcito: & scobis seu rasura plumbi vncias duas in eo dies quindecim macerari sinito: deinde oleum primi honoris superfunde, & subigens illinito. Aliud. Gallas coctas vitasq; capillis nocte ac die illinito. Alecto autem surgens aqua frigida abluito. Aliud. Nucum viridium corticis, vncias tres. Radicis corticis, Illicis vncias sex, alias tres. Vini nigri, sextarios tres. Decoquito ad tertias, exprimito; & quod reliquum est cum olei myrtini sextario uno subigito. **V**isor quotidie. Aliud. Retrimentum ferri, ac plumbum in aceto cocto ad tertias, illine citra oleum. Aliud. Radicem capparis tritam cum muliebri lacte ad tertias coquito, & ad noctem illinito. Flauos capillos reddunt quæ sequuntur. Lupinos crudos ex aqua illinito. Aliud. Lupinorum cortices, ac parum niri in aqua ad quatrimum macerato, ac vtisor. Aliud. Myrrha partem unam, salis floris tantundem, diligenter lauigato, & redigito ad strigmenti crassitudinem: ac caput ubi exterseris medicamento illinito, sinitoque noctem & diem, & deinde abluito. Aliud. Lithargyri, drachmam unam. Terra cretica, drachmas quatuor. Calcis viue, drachmam unam. A qua ad strigmentorum redigantur crassitudinem, & illinantur, apponanturque Beta folia ad dies tres vel quatuor, deinde medicamenta abluito. Vt capilli nigri flauescant, recipe vini fecem, in balnei sordes mittito, & incerati spissitudinem redacta; ubi dormire voles illinito, & mane capilli flauescant. Vt autem auri colorem referant. Accipe, aluminis, drachmas sex. Sandarachæ drachmas totidem. Herba rubie, drachmas octo. Croci, drachmas duas. Lixiui pileatorij sextarios quatuor. Lixiuum & rubiam contusam ad dimidias coquito, & liquorem exprimito, & cum hoc alumen, sandaracham, & crocum diluito, & in vas vitreum mittito. Vsus autem tempore præfixis illinito. Vbi vero combiberint ex sænigraci, hordei, ac cumini decocto abluito, ita vt aqua tepida sufficienti sapone addito prius obleueris. Aliud. Saponem gallicum cum aqua singulis

Quibus pili
nigrescant.

Quibus capilli
flauescant.

Quomodo
capilli au-
rei fiant.

6 Operum Leonhard Fuchsi Pars III.

balneis affricet. Aliud valde præstans Rhois rubri, unciam unam. Gallarum, drachmas duas. Stercoris muris, drachmam unam. Adianti, Manipulos duos. Absinthij, Manipulum unum. Lupinorum decorticatorum, drachmas duas. Aquasextarios tres. Omnia in vas vitreum coniecta ad dies nouem macerari finito per diem bis agitando. Vsu vero postulante, quod satis est excolato, & in hoc spongiam imbutam capillis affricato, & humectatos combibere finito. Vbi vero resiccati fuerint, sapone in calida aqua dissoluto abluito. Vt capilli albi reddantur, Verbasci albi florem comburito, & aceto maceratum subigito, eoque pilos abstergito. Aliud Verbasci seminis, aluminis rotundi, corticis raphani, singulorum unciam unam. Contundito, miscetoque glutinis taurini drachmas quatuor, ac vitior. Ceterum hic subiiciendum nobis erat caput de medicamentis pilos corrumpentibus. Verum quia eorundem nostra ætate vsus rarus admodum est, & Galenus libro primo de compo. medicamentorum localium cap. 21. copiosissime eadem descripsit, eorundemque triplicem differentiam enarravit, ac quorum vsus periculosus, quorum vero minime diligentissime iudicauit, ideo lectorem ad illum ablegare maluimus.

De porrigine. CAP. IV.

PORRIGO vitium est, in quo tenues ac surfuracea squamula ex capitis cute, nulla relictâ exulceratione decidit: unde etiâ Græcis *πυρριαν* appellat, quasi *surfuratio* siquidē *πυρρον* illis *surfur* significat. Qui barbaram sectantur Medicinam *surfures* vocant. Nascitur hoc symptoma a vitiatis serosis humoribus, hoc est, vt *Trallianus* interpretatur ex *Galeno*, a prauo humore pituitæ falsæ, aut bilioso, & melancholico sanguine sursum in caput elato. Notæ ex iis, quæ in vitii descriptione diximus, manifestæ sunt. Victus ratio talis sit, quæ nec crassos, nec vitiatos alios humores procreet. Sint itaque bonam aluum facientia, quibus vescuntur ægrotantes. Coctionis quoque in primis cura habenda est. Deambulationes lenes plurimæ mane & vespere optimæ sunt. Vinum prodest album & tenue. Ira, indignatio, mora in sole, & vehemens refrigeratio, omnia denique quæ caput implēt vitanda. Quod ad curandi rationem attinet, si vniuersum corpus vitiatis humoribus plenum fuerit, initio illi anteaquam capiti medicamenta adhibentur, medicamentis purgantibus, maxime pituitam ducentibus, vacuandum erit. Purgandi itaque ii, qui hoc vitio laborant, eodem quo in alopecia modo. Quod si vero nullum in vniuerso corpore recrementum conspicitur, sola medicamenta discutioria & exrerforia capiti vitiatis humoribus referro adhibenda erunt, vt scilicet hos ipsos absument. Sunt tamen, qui prædictis medicamentis quædam adstringentia admisceenda esse putant, vt per ea pars laborans roboretur, ne facile in seipsam influentes serosos ac vitiatos humores recipiat, sed resistat, eosque repellat. Abstergent autem a capite porriginem, amygdalæ amaræ decorticatæ, cum aqua aut aceto affricatæ: quumque exaruerint, capilli calida ablundi sunt. Aliud. *Maluam syluestrem*, quam alio nomine *Alhaam* vocant, in aqua marina, donec decima pars relictâ fuerit, coctam terito, & affricato. Detergebitur etiam caput, si intro aspergatur, & fricetur vel sale, vel lixiuio parato ex cineribus cum aliqua quantitate vel mellis, vel succi betæ, vel porri. Aliud. *Nitri spumam*, & astramentum susorium, aquis paritibus cum vino ter aut quater in mense affricato. Hoc adeo vehemens est, vt neque in posterum porrigo regeneretur. Aliud. *Cimolia* & sulphuris viui, aquas partes contritas illine, tum lupinorum decocto, vel fabarum, vel lixiuio ex radicibus betæ & brassica parato, lauato. Aliud. *Lithargyri*, olei rutacei, aceti partes aquas iungito. Radicis cucumeris sylvestris decocto vttere. Aliud. *Scillam* assato, & ubi flaccescere cæperit succum exprimito, & oleo commixtum illine. Syluestrem *stapida* oleo eliquazam illinito. Aliud. *Cimoliam* aqua præmadesactam ad Betæ succum admisce, illine, & donec resiccet sine, deinde ablue, & ihus cum vino ac oleo tere ac illine: postridie vero *staphidem* syluestrem cum oleo illine. Aliud. *Nitri*, facis vini vsta, puniceis, pari portione cum vino aut aqua calida affricato capiti. Aliud. *Fabam* una cum cortice molito, & cum Betæ succo vitior. Aliud. *Cimolia*, unciam unam. *Nitri*, radicis bryonia, corticis radicis cucumeris sylvestris sicci, farina fabarum, singulorum unciam dimidiam. Farina hordeacea ac lupinorum, vtriusque drachmas tres. Singulis seorsim leuissime tritis, ac unitis in balneo vitior. Ad humidiores autem porrigines muria, aut lupinorum decocto ad ablundum vitior. Est enim hoc medicamentum experimentis & vsu comprobatum.

Dysphthiriasi. CAP. V.

A *Dysphthiriasi* non est nisi pediculorum in capite, vel in toto corpore, potissimum in locis calidis, & humidis, ut sub alis, circa collum, & aliis eiusdem partibus frequentibus pilis vestitis, acruatim facta procreatio. Latine *pediculatio*, & *morbis pedicularis* nominatur. Fit hoc vitium ex multis moderate calidis humoribus nec ad tantam caliditatem progressis, ad quantam acres serosi humores perueniunt, in profundo cutis collectis. Quapropter manifestum hinc fit, pediculationis affectum in profundo cutis fieri, ubi etiam pediculos generari contingit, haud in superficie cutis, in qua porrigio consistit. Notis ad eius vitii agnitionem nullis opus est, quod pediculi affatim in capite aliisque corporis partibus procreati, satis quale hoc sit vitium indicent. Ceterum quum in profundo eius vitii & symptomatis causa hæreat, ut iam commemoratum est, medicamenta quæ hanc sanent requirunt desiccantia, & quæ meatus cutis relaxare, & ex alto trahere ac vacuare possunt, magis utique quam ea, quæ porrigini conueniunt, quo facilius qui geniti sunt, simul cum materia eorum exeant, & medicamenta promptius in internam partem penetrent, qualia sunt quæ a nobis subiiciuntur. Ante tamen eorundem usum, medicamentum quod vitiatos corporis aut capitis humores vacuare possit propinandum esse, notius est, quam ut a nobis pluribus dici debeat. A purgatione autem ad localia confestim veniendum erit, inter quæ pediculationi laborantibus id maxime confert, quod *Staphidis sylvestris habet unciam unam. Sandaracha, hoc est, ut hodie officina vocant, arsenici rubei, nitri utriusque drachmas duas, cum aceto & oleo veteri capiti illinito*. Aliud. *Oxylapathiradicem cum oleo eodem modo illinito*. Aliud. *Elleborum album, staphida sylvestrem, & nitrum pari pondere, cum oleo in balneo utitur. Aut cum aqua marina, aut merata muria cum aceto perfundito*. Quod si nuditas pilorum adsit, quod accidit ubi tanta pediculorum copia in capite procreatur, ut laborantes caluescant, depastis nimirum a pediculis humoribus unde pili nascuntur, sylvestrem staphidem cum oleo & aceto tritam imposito: hacque se quod voluit semper esse affectum Paulus scribit. Aut alumen tritum cum oleo illinito. Confert etiam *caput lauare lupinorum, aut tamaricis aut florum stachadis, aristolochie rotunda vel longa radice decocto, aut aqua tepida cum aceto*. Aliud. *Hederae succum melle mixtum illinito. Aut Perdicij, parietariam alio nomine vocant, succum dormituri illinire prodest*. Aliud. *Ligustri florem cum vino tritum, capiti ac toti corpori affricato, ubi cubitum ire voluerit. Oleum quoque laurinum, aut raphaninum inunctum auxiliatur. Lupinorum insuper & baccharum lauri decoctum pediculationi medetur, si quis caput detergeatur. Prodest etiam ipsis potius. Allij drachm. duarum, cum Origani triti drachma una ex aqua mulla*. Ad omnia vero genera pediculorum occidenda nullum est præstantius remedium, quam argentum viuum in quacunque parte fuerint. Quare eius vnguenti quod lib. 2. de compo. medica. descripsimus numero 29. vltus optimus erit.

De achore & fauo. CAP. VI.

A *Achor* Græcis vitium est, quod in capitis extrema cute oboritur, nempe *ulcusculum tennibus admodum foraminibus perforans, per quæ modice glutinosa erumpit ac feritur tenuis humiditas*. Plinius *manans capitis vlcus* appellat. Nostræ ætatis Medici a tinearum in vestibus similitudine, *tineam capitis* appellant. Siquidem ut hæc multo, eoque tenui morsu & erosione vestes perforant: sic capitis cutem ut dictum est, *achores*. Simile autem huic vitium est, quod Græcis *κνίπιον*, Latinis vero *Fauus* dicitur, in eo a priore vitio differens, quod maiora & ampliora foramina habeat, per quæ humor melli, quod in fauo est, similis erit. Generatio ipsis ex humore mixto est, qui partim tenuem saniem & mordacem, partim vero crassum succum in se habent. Tenuis itaque humor, utpote mordax, primum quidem cutim vellicat ipsamque ad scalpendum ægros cogit, progressu vero temporis ad pruritus tum tumor augetur, tum foramina circa ipsum consistunt, unde disrumpitur cutis, & vlcera prodeunt. Paulus Ægineta vitium hoc ex *nitro-sæ salsaque pituita* nasci tradit. Alexander Trallianus *excremento interim bilioso, aut pituitoso, interim etiam melancholico* creari affirmat. Quod si igitur ea, quæ excernuntur & emanant, tenuia admodum consistentia fuerint, & colore subpallida, a biliosa sanie procreari vitium indicio sunt. Sin tenuia non sint, sed crassa potius ac glutinosa, pituitosas superare sanies, & ab illis vitium nasci indicant. Quod si nihil horum fuerit,

8 Operum Leonhard. Fuchſii Pars III.

Viſus.

Curatio.

loca vero, vnde humor manat, dura magis, cutisque superficiem eminentia & angustiora appareant, vt nihil, aut saltem exiguum ab eis effluat, melancholicum subesse a quo vitium hoc oritur excrementum putato. Præterea amarorem sentiunt, quibus causa est biliosa: saltem vero qualitatem, quibus pituitosa: acidam autem, quibus melancholica. Iam eandem ex tractu etiam internoscere poteris. Calidior enim tibi apparet, in quibus est biliosa sanies. Frigidior autem, in quibus pituitosa: minus vero frigidus, vbi melancholica fuerit. Viſus ratio in hoc vitio ex cibis boni succi constare debet, quo recrementorum prouentus tollendus venit. Omnia quoque acria & salsa vitanda, perinde atque crassa & glutinosa. Curandi ratio in vtroque vitio a vacuatione auspicienda venit. Si enim corpus vniuersum humoribus abundauerit, adeoque plethoricum fuerit, sanguis initio mittendus erit. Sin cacochymum & vitiosis refertum humoribus fuerit, purgare id prius oportet, postea ad particularia medicamenta transeundum. Non enim solum corpus frequenter & fortiter, sed & caput purgandum per ea, quæ naribus induntur, & quæ per os pituitam extrahunt, vt in alopecie etiam curatione dictum est. Quod si exiguum est vitium, sola localia & particularia nominata remedia, citra totius corporis vacuationem suffecerint. Conueniunt autem ipsis propter crassitiam & lentorem humoris eos generantis, medicamenta quæ hunc incidunt, quæque facultatem discutiendi & reprimendi necessario habent. Incipientes tamen achori, vbi corpus vniuersum excrementis caruerit, cum adstringentibus reprimentibusque tantum curare licebit, vt sunt myrti bacce, rubi folia illita, plantago, polygonum, salicis folia, & similia. Nec otiosum est, quod diximus, vbi corpus vniuersum excrementis caruerit. Hac namque ratione errori quorundam occurrere volui, qui in cacochymis corporibus, in vitii huius initio humorem vitiosum adhuc influentem repellendum esse censent, quod certe tutum nequaquam est. Siquidem periculum, ne humor prauus intus repulsus, parotidas, vel alios periculosiores tumores in alia parte excitet. His igitur quæ mixtas facultates habent, atque adeo affluentes humores reprimunt, eos vero, qui in laborante parte continentur, concoquunt & discutiunt, in morbi augmento potissimum vtendum erit. Acetum itaque, quod ex incidentium & attenuantium ordine existens, vltra hoc, quod discutit, præcipuum quiddam in se habet, quo reprimat, ac quod influit depellit, vt pote quod substantia sua modice calidum est, plurimum vero frigidum, & partium tenuium, quemadmodum Galenus libro primo de simpl. medica. facul. capite decimonono & duobus mox sequentibus copiose admodum demonstrauit. Sit autem acetum exquisite acre, in quo nulla penitus vini qualitas appareat. Hoc ipso quidem medicamenta metallica nominata, vt sunt cadmia, lithargyrus, pompholyx & similia, alias aliud imbues atque dilues, moderata vtique, in quibus incipit & adhuc exiguum est vitium: fortia vero in maioribus & diuturnioribus, fortissima autem in iam inueteratis, & iis quæ ægerrime curantur. Tollendi vero prius capilli sunt, antequam medicamenta localia adhibeantur, & a leuioribus semper incoandum, præsertim si dolor simul cum achoribus adsit. Supra caput autem non adstringentia frigida & humida, sed ea potius, quæ multum siccant, & humores vitiosos coaceruatos absumunt, densando corroborant. Derasis igitur capillis, caput bis terue, aut etiam sæpius die fouendum aqua calida, in qua Myrti bacca sint decocta, vel rubus, vel bryonia, vel lenticula, vel amari lupini, vel asparagi radix. Quum vero plus saniei emanat, salicis folia cum aqua recte illinuntur, vel lenticula cum melle. Vnguenta vero parabis e lemnia terra, spodio, pompholyge, lithargyro, cadmia, adianto, & rosaico. Prodest quoque sanograci decoctum affricum. Malua item cum vino & farina subacta hordeacea. Melilotum denique cum farina sanograci & vino impositum: Quod si neque ex iis vitium quiescat, medicamentum ex charta siccum aceto dilutum illinendum. Est autem eius descriptio li. 5. de compo. medica. general. cap. ultimo de aridis cicatricem inducentibus, apud Galenum. Siccum autem dicitur, quia vlceribus inspergitur. Additur autem acetum, vt non solum siccandi, verum etiam repellendi facultatem obtineat. Galenus sola charta exusta, & aceto diluta locum laborantem illinens, eoque vno & item altero medicamento vsus, nonnullos perfecte sanitari restituit. Conuenit autem hoc medicamentum iis maxime, qui duræ sunt carnis: Ceterum sunt medicamenta viribus omnino robustissima, adeo vt etiam achoras ex crassis & lentis humoribus abortos, cõtumaciterque cuti infarctos vacuare queant,

atq;

A atque id ita valide, ut etiam si scirrhum quid habeant, id ipsum vacuare valeant: licet ipsum cutis habitum in eiusmodi prauitatem ducant, ut id quod influit, corrumpant, licet benignum sit. Talia sunt *sal, vini fex usta, sandaracha siue arsenicum rubrum, calx viua, fel calidum & siccorum animantium, & id genus alia*. Prudenti igitur viro opus, & qui curandorum morborum substantiam, & ægri naturam probe norit. Hoc vero efficacissimum est, quod accipit, *auripigmenti rubri, calcis viua lota quinquies, ana unciam vnam & dimidiam. Fuliginis furni, unciam dimidiam. Vitrioli, aluminis, ana drachmas duas. Alij tenuissime triti tantundem. Tartari vocati, drachmas tres. Cum melle & aceto subigantur simulque misceantur, & ad formam linimenti reducantur*. Præterea qui medicamentorum facultates non tantum iuxta genus, sed & iuxta quantitatem cognoscat, quo singulis diebus quali præsidio opus sit, coniecit. In augenda namque aut imminuenda medicamento quod prioribus diebus admotum fuit facultate, quantum affectus ipse indicat, congrua curatio consistit. Porro quæ optime discutunt sunt *lilij radix affricata, rosmarinum cum vino & aqua, & lupinorum amarorum, aut sylvestris cucumeris radices decoctum affricatum, ruta folia, farina sænogræci cum nitro, thus ex aceto illitum, malicorium cum oleo laurino illitum*. Quæ hætenus ad Achoras dicta sunt, ea quoque fauo conueniunt, neque enim inter se, nisi ratione maioris & minoris differunt. Quod si vero quis plura iam commemoratis remediis scire cupit, is librum Galeni primum *de compo. medica. local.* adeat, & voti sui haud dubie compos erit. In summa, quæcunque ad alopeciam scripta sunt, ex adassatis & fortiter discutientibus vlcera capitis manantia sanare possunt. *Sulphur per se, vel cum aliis appositum, in corporibus robustioribus efficacissimum est remedium.* Tumor vero eius vsus est, si vel *bolo armena, vel calce nomies* aut decies lota, aut terra lemnia cum aceto permisceatur.

De dolore capitis. CAP. VII.

Vix vlla pars corporis humani æque doloribus oportuna, ut caput est: huc enim facile aliquid ex infernis corporis partibus exhalat. Ipsa quoque pars, propriæ constitutionis atque temperamenti occasione inualida, non difficulter doloris causas in se admittit, ac gignit. Doloris vero capitis Græcorum Medicis tres sunt differentiæ, tribus distinctis nominibus appellatæ, prima *κεφαλαλγία*, altera *κεφαλαία*, & tertia *ημικρανία* dicitur. De quibus ordine differemus, a *κεφαλαλγία* exoriri, quæ non est nisi recens totius capitis laboriosus sensus, non curando an per se accidat, aut alterius affectus symptoma & comes sit. Adiecta vero vox est recens, ut differata cephalæa, quæ capitis est diuturnus, & difficulter solubilis, Galeno libro tertio de labo. locis auctore, dolor, ut suo loco latius dicemus. Quum vero additum est totius capitis, hemicrania excluditur. Diligenter autem considerandum erit, nunquid intra caluariam affectus consistat, vel extra. Dignosces vero id ipsum hoc modo, Galeno loco iam citato teste, si dolor ad oculorum fundamenta extendatur, intra caluariam affectus hærebit. Quippe ab ipso cerebro, & ab utraque eius membrana, atque a vasis quæ in ipsis continentur, veluti germina quædam ad oculos deducuntur, ut prompte ea de causa usque ad ipsos dolor extendi queat. Sin eoque dolor non extendatur, extra caluariam affectus erit. Huius causæ complures sunt. Nunc enim ex sola simplici intemperie citra humores accidit, iam vero ex horum qualitate. Interdum etiam ob plenitudinem humorum, quæ *πληθος* Græcis dicitur, quæ distentionem creat, contingit: præterea quum humores liquorum & vaporum transitus obstruxerunt. Adhæc fit, ubi ob imbecillitatem in quibusdam capitis partibus statim spiritus innascitur. Interim quoque propter aliquam causam externam, quam *προκαταρκτητικήν*, id est, præincipientem, Græci appellant, nempe ardore solis, frigore, ebrietate, & ictu capitis dolor procreatur. Alexander Trallianus has omnes causas in duas contraxit, *προκαταρκτητικήν* nimirum & *αυτογενήν*, externam & continentem. Recte autem dolori capitis, utpote qui perpetuo symptoma est, causas continentes assignat, quod is affectibus, unde oritur, ita connexus sit, ut illis præsentibus ipse etiam adsit, iisdem vero sublatis, ille vna tollatur. Quo autem pacto singulæ iam commemoratæ causæ dignosci valeant, iam dicemus. Si ex simplici & nuda intemperie capitis dolor excitatur calida, vel frigida, dolor ipse vehementissimus est, propterea quod a maxime actiuis qualitatibus generentur. Verum si calida fuerit intemperies, præter vehementissimum dolorem,

10 Operum Leonhard. Fuchsi Pars III.

Frigida. capitis etiam calor aderit, quem admota statim manu primoque attractu percipies ac deprehendes, ac oculorum rubor: frigidis præterea asperginibus siue perfusionibus ægri delectantur, exque illis maximum sentiunt adiumentum: præcessitque magna ex parte causa aliqua externa calefaciens. At si ex frigida intemperie dolor excitetur, contrariis notis & signis dignoscitur. Nam licet vehementissimus quoque sit dolor, tamen caput tactu calidum non sentitur, neque facies, neque oculi rubescunt, nec arida, & collapsa apparet, sed contra plena & pallida: præcessitque externa quædam refrigerans causa, & frigidis læduntur ægri, neque illis oblectantur. Sin ex siccitate ortus fuerit, moderatus erit capitis dolor, propterea quod siccitatis vis in agendo tardior & imbecillior sit: aridior quoque deprehendetur capitis cutis, & aliqua desiccans causa præcessit. A siccis quoque præfidiis non modo non iuuatur æger, sed noxam suscipiunt. Humidam autem intemperiem, quod humiditatis actio sit debilissima, nec tanta vis, ut dolorem ex se excitare possit. Quare hanc per se nullus consequitur dolor, nisi calori, aut frigori, aut humorum plenitudini, aut acrimoniæ coniuncta fuerit. Quod si vero non ex simplici seu nuda tantum intemperie capitis dolor excitetur, sed cum humoris affluxu, itidem suas notas habebit, quas singulas suis indicabimus locis. Qui ob causam quampiam externam proritantur capitis dolores, promte ex ægri, seu astantium relatione percipi possunt. Ceterum quod attinet ad doloris capitis prognostica, non esse opus arbitror ut ea ordine percontemur, quod illa quibus ex aphorismorum sectionibus Hippocratis colligere possit. Quam quidem ob causam neque in reliquis morbis ea percontabimur. Quum vero hætenus generatim de dolore capitis a nobis dictum sit, reliquum est, ut ordine de singulorum affectionum dolores capitis excitantium curationibus, initio a calida intemperie sumpta, agamus.

De dolore capitis ex calida intemperie nato. C A P. VIII.

Causa. **Vicius ratio.** **Curatio.** **C**apitis dolor ex calida intemperie nudæ qualitatibus genitus, fit a solis ardore, flamme vicinitate, motu immodico, balneis, ira, furore, odoramentis, & alijs calidis affectibus. Oes qui hoc modo laborant, domum, in qua decumbunt, natura frigidam postulant, aut eam, quæ nostra industria sic præparata est ex floribus & germinibus frigida facultate præditis per aream domus sparsis, & humi fufis, rosas videlicet, violas, nymphaeas, vitium capreolis, rubramis, & id genus alijs. Refrigerabitur etiam, si humi aqua frigida proiecta sit, & de vasis in vase transfundatur. Euitandus contra aer calidus, qui quæ nullum perflatum recipit, calidique vaporibus refertus est. Cibus sit exiguus & natura frigidus, qualis est lactuca, portulaca, intybum. Panis ex aqua frigida lotus, piscina succus. Carnes pulorum, gallinarum, ac pulli columbarum cum omphacio siue agresta vulgo dicta cocti, gallorum testes, & alie. Pisces petrosi, & teneris carnibus præditi. Malum punicum, vna passa, pyra, & mala quæ apia dicuntur. Abstinendum vero ab iis, quæ proprietatem quandam habent capitis inducendi dolorem, ut sunt palmula, oliua nigra, & lactis esus. Pro potu vero aqua omnino vitandus, a vino vero abstinendum. Quod si vero ex eius potu ventriculus subuertatur, in ea parum cinamomi decoquatur, aut seminum coriandrorum præparatorum: vel misceatur cum aqua succus malorum puniceorum acidorum, seu acidum serapium, vel oxyssacharum. Quod si nec his bene habebit, & aquam bibere non possit, permittendus ei erit ex aquosis vinis aquosus potus, Galeno etiam auctore. Ceterum somni & quietis cura in primis habenda, quæ propter si consuetudo etiam longiores sunt non nocent. Contra vigiliæ, præsertim immodicæ, penitus vitandæ. Alui excrementa, si natura non excernantur, lenibus clysteriis proritanda sunt: ex eorum enim retentione capitis dolor vaporibus prauis sursum elatis, augetur. Pari ratione lotium nequaquam diu retinendum erit, sed ab eo confestim a somno se exonerare debet æger. Exercitationes, frictiones, solem, balneaque fugiat. Animi perturbationes, iram potissimum, & furorem vitet. Proinde clamor, contentio, omnisque mentis perculio fugienda erit, & in bona animi firmitate degendum. Porro dolorem capitis a nuda calida intemperie ortum curant, quæcunque citra vehementem adstringendi facultatem refrigerant, tenui inque partium substantia prædita sunt. Adhibenda vero sunt repellentia in hoc capitis dolore & aliis liquida maxime, tum quia facilius ob tenuitatem penetrant, tum quod minus quam vnguenta, vel linimenta, vel emplastra

A & cataplasmata, quæ tenacius adhærent, suo contactu caput calefaciunt. Igitur initio nihil præstantius, quam oleo rosaceo probe apparato caput perfundere atque irrigare vel intingendo linteos raro ve pannos in hoc oleo vehementer agitados apponere. Et æstiuo quidem tempore frigido existente. Quod si illi parum aceti adiectum fuerit, longe maiorem, & penitus penetrandi, *Tralliano teste*, vim induet medicamentum. Locus autem perfusionis seu irrigationis, illitionisque est iuxta frontem; ubi pilosum caput esse desinit, ut hodie facere consuevere Medici. Occiput autem medicamentum hoc non tangat, quod refrigerantia citra molestiam, quod isthinc spinalis medulla initium sumat, ferre non possit. Inter omnes autem capitis partes, ea quæ in syncipite iuxta coronalem futuram existit, ob articulationis laxitatem, & ossium tenuitatem & raritatem, sunt enim inter suas squamas fistulosa & cauernosa, medicamentis imponendis maxime idonea, quod illic facile tum caliditas, tum frigiditas medicamentorum omnium, quæ adhibentur intro distribuatur. Quare siue refrigerare aliquando ex solis æstu, aliisque ex causis calorem contractum: siue calefacere frigiditatem oporteat, aptissimus erit capitis iuxta synciput locus: Conferunt etiam succi plantaginis, solani, foliorum vitis, foliorum salicis, vel summitatum rubi, vel pyra sylvestris, sic cum aceto permisti apponantur. In defectu autem succorum liquores stillatitii refrigerantes cum rosaceo mixti, vel oxyrhodino adhibendi sunt. Proximum a rosaceo chamæmelinum locum habet, in iis maxime corporibus, quæ vehementi refrigeratione non indigent, qualia sunt mulierum, eunuchorum, puerorum, & eorum, qui molli carne præditi sunt, albumque colorem obtinent. Si vero vehementi refrigeratione opus erit, semperuiui, aut lactuca, aut portulaca, aut polygoni, aut uua acerba & imminuta, aut capreolorum vitis, aut solani, aut seridis, aut psylli succum adiacere conuenit. Atque hic silentio transire non possum, quin *Tralliani* locum mirifice deprauatum emendem. Nam libro primo capite decimo inter alia sic scriptum legitur. Quod si calor amplius superare videatur, etiam refrigerantium vim intendere conuenit, admiscendo semperuiui succum, ἡ ἐπεύλλου, id est, serpilli &c. Nemo autem est facultatis stirpium adeo ignarus, ut non animaduertat, Serpyllum falso inter refrigerantia medicamenta recenseri, quum in calefaciendo tertium attingat ordinem. Quod igitur pro ἡ ἐπεύλλου sit legendum ψυλλῶν, dictionum affinitas in primis horatur. Idem etiam Galeni locus, qui est in libro secundo de compositione medicamentorum locali, capite tertio & a

D *Tralliano* ad verbum transcriptus, clarissime euincit. Nam ibidem inter alia, sic inquit: οὗτος ἐπευβάλλει αὐτῷ ψυλλὸν ἀέριον, ἢ ἀνδράχνης, ἢ θριδακίνης, ἢ ψυλλῶν, ἢ πολυζών. Alexander vero *Trallianus* ita loco supra ostenso ait: τὴν τῶν ψυχόντων, ἢ δυνάμιν ἐπιτείνειν σε χρὴ ἀνίσχοντες πρὸς πλεονεξίαν ψυλλῶν, ἢ ἐπεύλλου, ἢ ἀνδράχνης, ἢ θριδακίνης, ἢ πολυζών. Qui locus quum ad verbum a Galeno transcriptus sit, dubium non est, quin in eo falso ἡ ἐπεύλλου ab imperito rerum Medicarum librario pro ψυλλῶν scriptum sit. Prædicta vero medicamenta, capiti ad mouenda, ad eum parari possunt modum. Accipe olei rosacei, uncias duas. Liqueoris stillatitii rosacei, unciam unā & dimidiam. Aceti optimi, semunciam. Aut recipe liqueoris stillatitij semperuiui, lactuca, solani, singulorum uncias duas. Liqueoris stillatitij chamæmeli, unciam unam cum dimidia. Aceti, unciam unam. Immiscantur inter se singula, & fasciæ hyis imbuta & madefacta fronti aut syncipiti imponatur. Ceterum refrigerabis, æstiuo potissimum tempore, quæcunque adhibere voles medicamenta, aqua summe frigida illa mergens: aut si huius copia non detur, niuem aut glaciem vasculo circumponens, quemadmodum *Galenus* libro 2. de simpl. medicament. facultat. capite septimo. Et libro octauo. medendi methodi, & loco paulo ante citato. Iam dicta igitur medicamenta etiam si humorum aut vaporum copia ad caput impetum fecit, præclare auxiliantur. Licebit etiam alio soleis refrigerandi vi præditis uti, quale est violaceum, ex cucurbita, & nymphae, & cum illis alia quædam refrigerantia medicamenta permiscere, exque illis linimenta vel vnguenta componere ad hunc modum. Accipe leni cremoris, mucilaginem Medici hodie vocant, seminis cotoneorum, malua, psylli, singulorum drachmas tres. Succum portulacæ, drachmā unā & dimidiam. Succum solani, drachmā dimidiā. Olei rosacei, unciam unam. Commistus omnibus formetur linimentū. Poteris etiam adiecta cetera, & accessione aliorum medicamentorum fingere vnguentū in hunc modū. Vnguenti populeon, drach. duas. Oleorum violacei, rosacei, utriusq; drach. tres. Florū nymphae aridorū, rosarū rubearum, utriusque scrupulum unū. Cera quod satis est, formetur vnguentum, quod fronti &

Cui parti capitis medicamenta ad mouenda

Tralliani locus emendatus.

Linimentū.

Vnguentū.

Sacculus. temporibus illinatur. Sacculi item parari poterunt ex *rosis, violis, nymphae floribus, hordeo, portulaca & plantaginis seminibus, ac lentibus*. Neq; alienum ab instituto erit si embrochis *e rosis, violis, floribus nymphae, folijs salicis, portulaca & hordeo compositis utaris*. A stupefacientibus autem, utpote quæ non citra offensam refrigerant, & ab iis, quæ cum eo, quod refrigerant, manifeste etiam adstringunt, abstinendum, nisi id ipsum necessitas exigat, & eis uti propter multas vigilias coacti fuerimus. Quare si quando necessitas postulet, parum quiddam ex eis refrigerantibus miscendum est. *Apapaueris autem & mandragora succis abstinendum erit, quod non citra damnum refrigerent. Solani etiam succum aut neutiquam miscemus, aut prorsum exiguum, quod nos fecisse in linimento paulo ante adducto vident studiosi. Pari modo & mali granati acidi, coronei, & mespili succi, quod nimium adstringant, cauendi erunt. Hactenus medicamenta, quæ inter initia vitii conueniunt, commemorauimus. Quum igitur per ea perfecerimus, quod res postulat, hoc est, in fluxum sedauerimus, mox deinde mitigantia concoquentiaque ac discutientia medicamenta reprimentibus admiscere oportet. Quapropter tum eiusmodi embrocha uti licebit, quæ accipit *florum rosarum, violarum, virorumq; manipulum dimidium. Foliorum salicis, chamemeli, meliloti, singulorum manipulum unum. Seminum malua, fenigraci, utriusque drachmas duas. Hordei decorticati, unciam unam*. Coquantur singula in aqua fontana libris duabus, donec tertia eorundem pars absumatur, & capiti ex alto instilleretur. Egro etiam liquor stillatitius rosaceus cum permissione exigui aceti, naribus ad odorandum adhiberi potest. Proderit quoque, ut æger duabus vel tribus horis ante cibum mane *Zalapium rosaceum, aut violaceum, item eorundem Conseruas, & alia eius generis, quæ corpus refrigerare possunt adhibeat. Eadem curandi ratio etiam vsurpanda erit, ubi ab exercitiis, ira, & aliis calidis causis ortus est dolor capitis.**

De dolore capitis ex frigida intemperie procreato. CAP. IX.

Causa. **D**olor capitis ex frigida intemperie nudæ qualitatibus natus, ab ambiente nos aere frigido, maxime ubi quis nudo & aperto capite, in eo diutius versetur, & ab improvida aliarum rerum frigidarum admotione. Signa eorum, qui caput propter frigiditatem dolent, omnino contraria sunt iis, qui ex calida intemperie laborant. Quippe tum in capite nullus sentitur calor, facies quoq; ipsorum nequaquam contracta, minimeque arida, decolor tamen existit. Oculi denique non rubent, sed contra tumido pallore deformantur. Frigidis nec gaudent, nec iuuantur. Qui sic dolent, ærem caueant frigidum, in calido autem morentur. Lactis, piscium, & aliorum omnium ciborum, qui refrigerare possunt, usum deuitent. Ovis sorbilibus gallinarum, pullorum, perdicum, & phasianorum, aliarumque auicularum carnem. Pro potu dandum illis vinum tenuium partium, quod mediocriter extenuare, ac calefacere potest. Motu corporis utantur, gestatione in equo, & deambulatione. Somnus iis confert moderatus, non tamen solito longior. Plus enim eis vigilandum, quam dormiendum erit. Balnea seu lauacra calida illis profunt. Alium perpetuo apertam habeant, ut singulis diebus excrementa corporis deiciat. Tristitiam, graues cogitationes, aliasque eius generis animi perturbationes fugiant. Curare igitur generatim, qui ex frigida intemperie caput dolent calefacientibus oportet: verum pro intemperiei magnitudine remedium quoq; variandum erit. Natiuum quoq; cerebri temperamentum vnice considerandum venit, quod tale est, ut neq; vehementer calida, neq; etiam admodum frigida, feret medicamenta: Rutaceum autem oleum, ut auctor est lib. 2. de compo. medica. local. Galenus, calidum syncipiti superfusum, perfecte hominem liberare potest. Licebit etiam uti, Tralliano teste, irino, aut nardino oleo, aut pro eis chamæmelino, & anethino. Sin vehementiore opus sit calefactione, frontem ipsorum & tempora medicamentis excipere & euphorbio compositis oleo iniectis illinire conuenit: aut aliquid olei e piperibus, aut oleum euphorbium rutaceo permiscendum. Prædictis medicamentis narium & aurium meatus illinendi sunt. Quidam etiam, ut ibidem testatur Galenus, pedum plantas, ac sedem ex eis illinunt. Proderit haud leuiter vnguentum hoc quod habet: *Oleorum irini & rutacei, utrorumque unciam dimidiam. Maiorana, piperis, betonica, singulorum scrupulum unum. Florum stæchadis, drachmam dimidiam. Cera quod satis est.* Hoc vnguentum vehementius, aut minus, pro affectus diuersitate Medicus efficiet. Mitius quidē cum oleo chamæmelino, vehe-

A vehementius autem cum adiectione castorei, aut euphorbii. Licebit etiam parare *Sacculus*. sacculos, in eum modum paratos: *Foliorum hyssopi, serpylli, verbenacæ, maioranæ, singulorum manipulum dimidium. Florum rosmarini, betonica, utrorumque pugillum unum. Ruta, pulegii, calaminthæ, singulorum drachmam unam & dimidiam. Trita indantur insuanturve in sericum rubrum, formeturque sacculus, qui in modum pilei formetur; ac noctu & interdum per aliquot septimanas capiti impositus gestetur; aut si molestum id ægro fuerit, ex linteo tenuissimo fiat, qui calefactus, acetoque prius irrigatus capiti admoueat. Haud inutil ter etiam adhibebuntur embrochæ ex floribus chamæmeli, meliloti, fœnigraci, maioranæ, origanæ, betonica, saluiæ, stichadæ, & similibus in aqua decoctis paratæ. Ex illis quoque & similibus vaporem per nares ægri attrahere possunt, aut sequentibus orbiculis odoriferis, poma*

B vulgus medicorum ambræ nominat, vti, quæ habent *Styracis siccioris, drachmas duas. Orbiculi odorati. Caryophyllorum; maceris, ligni aloes, singulorum drachmam dimidiam. Florum lauandulæ, drachmas duas. Gallie mofchate, drachmam unam & dimidiam. Styracis liquidioris, ladanii, utriusque drachmam unam. Mofchi, ambaris; utriusque grana tria aut quatuor. Tritis & cribatis omnibus cum stillaticio maioranæ liquore; & cremore lento tragacanthæ quantum satis erit formantur orbiculi odorati. Lauri insuper folia tenera cum irino oleo trita, capiti illini possunt. Conueniunt etiam fomenta interim per spongas calida imbutas, & expressas, maxime si lauri folia tenera aquæ incosta fuerint.*

De dolore capitis ex intemperie sicca, vel humida orto.

C A P. X.

C **N**E V T R A quidem intemperies per se sola, nisi ei coniungatur vel caliditas vel *Siccitas & humiditas* frigiditas, capitis dolorem excitare potest. Quod utique, grauissimus auctor, Galenus *lib. x. de sympto. causis cap. 5.* confirmat, in eum scribens modum. Porro *vehementes, inquit, in tactu a naturali habitu transmutationes, ob violentum calidi frigidique occursum, atque ob eas res quæ contundere, secare, extendere, aut erodere possunt. Nam siccitas humiditasque, nisi calori frigori que coniungantur, occursum suum vim inferre non consueverunt.* Haec tamen Galenus. Ratio vero eius quod diximus hæc est: Quum nulla res nisi eius occursum sit *vehemens ac repentinus, dolorem excitare possit; humiditas autem & siccitas nullam violentam aut molestantem sensationem in corporibus sensu præditis efficere possint: imbecillior enim eorundem est,*

D *alteratio, atque adeo sensum irreperis, quod pati potius quam agere nata sit; ideoque dolorem nullum capiti inferre possunt.* Atque hinc est quod nec Galenus, nec alii veteres Medici Græci ullam doloris e siccitate & humiditate orti mentionem faciant: Nos tamen hic earundem intemperierum meminimus, non certe quod per se excitare posse dolores capitis putemus: sed ut potius medicinæ initiati tum etiam ubi calori aut frigori iunctæ sunt humiditas & siccitas dolorem capitis excitantes, quibus hunc ipsum pellerent medicamentis non destituerentur. Ceterum dolorem a siccitate creat aer nos ambiens siccus, medicamenta exsiccantia, fames, exercitia immodica, coitus immoderatus, & animi perturbationes, tristitia potissimum & inestitia. Ab humiditate autem dolor nascitur propter aerem ambientem humidum,

E *medicamenta eiusdem naturæ, balnea, aquas calidas, & alias res supra modum humectantes. Deprehenditur siccitas, si pauca; aut nulla penitus e naribus excrementis, aut humida profluxerint: si præterea oculi concaui fuerint, multæque præcesserint vigilæ. Contra humiditas aderit, ubi multus ex naribus mucus emanarit, si oculi tumidi fuerint, & ægri plurimum dormiant. Qui ob siccitatem dolent, ii in aere versentur humido, vescanturque cibis humectantibus & boni succi, vitellis ouorum, testibus gallorum, ac eorundem iusculis, phasianis, perdicibus, & aliis quæ plurimum nutrire, atque adeo humectare possunt. Vinum bibant tenue, aquosum tamen. Somno utantur quoad fieri potest largiore. Fugiant motum corporis, ac quiete potius, otioque utantur ægri. Coitus, fames, sitis, & omnia quæ exsiccare nata sunt,*

F *evitanda: Lauacræ quæ humectare possunt, ut sunt dulcium aquarum calefactarum, Galeno libro tertio de tuen. san. cap. 3. teste, si tepidiores fuerint, non parum commoditatis ægrotanti afferent. Latentur denique ægri, & omnes alias animi perturbationes vitent. Sin propter humiditatem dolor accadat, contrariam vitus rationem instituere oportet, exsiccantem scilicet, quæ cuius ex iis quæ iam dicta*

Curatio. sunt, quod contrariorum eadem sit doctrina, nota esse potest. Non est igitur ut de illa priuatim agamus, sed satis erit obiter dixisse, in dolore capitis a siccitate nato, adhibendum oleum violaceum, amygdalinum e dulcibus confectum amygdalis. Non solum autem iis synciput inungendum est, sed & naribus etiam illinenda erunt. Iam vero dictis oleis rectissime commiscuntur pinguedines, ad hunc quidem, vel similem modum. *Oleorum violacei, & amygdalini e dulcibus amygdalis expressi, viriusque drachmas tres. Pinguedinis vitulina, gallina, utriusque drachmas duas. Butyri recentis salis expertis, drachmam unam & dimidiam.* Committis omnibus fingatur linimentum. Proderit non parum embrochas e violis, maluis, aliisque herbis humectandi vi praeditis confectas capiti adhibere. In capitis autem dolore ab humiditate nato, contraria prorsus remedia admouenda erunt. Quae etiam variabuntur prout vel calor, vel frigidity coniuñcta fuerit. Remediorum itaque copiam partim ea, quae dicta sunt, partim deinceps tradentur, suppeditabunt.

De dolore capitis ex plenitudine. C A P. XI.

Plenitudo. *Πλησις.* **H**A C T E N V S de curandis doloribus capitis qui ex nuda qualitarum alteratione proueniunt, egimus: nunc de eo, qui e plenitudine oritur dīserimus. Plenitudinem autem vocamus in praesentia, id quod Graecis *πλησις* & *πλησις* nominatur: quae fit, *Galen. lib. 2. De compo. medi. secundum locos, cap. 1. teste*, quatuor humoribus proportionē adauctis: aut solo sanguine. Idem enim est, quum exquisitè sincerus sanguis in venis, ut attestatur *Galenus lib. De plenitudine*, nunquam reperiatur, quin semper aliquid bilis, vel pituitae, aut serosi humoris illi commixtum sit. Hoc itaque aucto, reliquos quoque omnes humores incrementum, pro sua quemque portione necesse est. Proinde nihil prohibet dolorem hunc capitis, de quo nunc nobis sermo est, vocare sanguine eum capitis dolorem. Proportione itaque, quod *Galenus loco iam citato* & alibi *πλησις* vocat, humores quatuor in plethora seu plenitudine augentur, adeo ut sanguis, quandoquidem copia sua reliquos humores in venis vincat, semper in ea magnopere praecellat, ut *fusus lib. 2. Instit. nostrarum sect. 5. cap. 1. diximus*. Doloris capitis fit ab omnibus, quae plenitudinem in corpore procreare possunt, ut sunt cibi & potus boni succi vberius assumpti: exercitiorum, balnei, sudoris, & aliarum vacationum naturalium & artificialium neglectus. Facies & oculi rubent, venae tenduntur, adeo ut non solum maiores, verum etiam minores, & quae prius sensum effugiebant, & ob paruitatem latebant, nunc visu comprehendantur. Pulsus magnus & vehemens redditur. Urina subrufa & crassa. Venae temporum pulsant. Dolor subsequitur capitis grauius. Urina flaua & crassa. Versetur aeger in aere frigido & sicco. Quod si talis non sit arte paretur, aere frigidiorē per fenestras immisso, & floribus violarum, rosarum, foliisque salicis, & vitis per cubiculi aream sparsis. Arceatur inde hominum turba, ne suo halitu, & transpiratu aerem calefaciant. Viter carnes, oua sordida, & eiusmodi quae copiose nutriunt. Utatur ptisana hordeacea. Oleribus frigidis, intybo sariui utroque, endiuia & scariolam hodie appellant, portulaca, lactuca, & similibus vescatur. Fugiat vinum, bibat aquam in qua parum decoctum sit cinnamomi, aut hordei. Quod si aut consuetudo, aut virium imbecillitas aliter suadeat, aut morbi paruitas permittat, vinum quidem dandum, sed tamen imbecillum, & aqua multum dilutum. Exercitetur mediocriter, fricetur, frequenti utatur balneo, ita tamen, ut corpus prius vacuetur, aegerque minime febricitet. Somnus sit mediocris. Gaudeat & laetetur, omnisque reliqua animi perturbatio absit. Curandi ratio statim a sanguinis missione, nisi aliquid sit, quae hanc prohibeat, auspicetur. Incidenda autem erit vena in cubito exterior, quam *humeralem* alio nomine, & hodie *cephalicam* vocant, aut media si alia non appareat, eius scilicet partis, in qua dolor potissimum viget. Siquidem haec vena capiti continuata est, adeoque non solum per eam a laborante particula in contrarium auellere, verum etiam vacuare licet. Id quod non solum Hippocrates, & post hunc Galenus, verum etiam Rhazes, non contemnendae auctoritatis inter Arabes scriptor, libro suo nono, quem *Almansori inscripsit, capite 1. docet*. Et nos in *libr. 3. Difficilium questionum*, hoc ipsum mani-

Curatio.
Venae se-
ctio.
Humeralis.

Rhazes.

A manifestissimis argumentis demonstrauiamus. Quod si vero ætas, aut virtus imbecilla venæ secandæ consilium interturbaret; cucurbitæ affigendæ erunt, non quidem capiti; sed partibus illi continuatis; & coniunctis; nampe cœruicis lateribus. Id quod Galenus lib. 13. *The. meth. cap. 13.* confirmat, vbi sic scriptum reliquit: *Dum adhuc generantur mala; minime iis partibus quæ laborare incipiunt; sed quæ illis sunt continuata; cucurbita imponi debet, auellendi in contrarium causa.* In hunc usum, & reuulsionis gratia, nexibus, ac frictionibus in partibus inferioribus vti expedit. Quod si dolor iis perfectis intra diem quartum aut quintum non sedetur, appareatque adhuc in oculis; fronte; & facie rubor, sanguis e naribus; fetis porcinis immixtis; eliciatur. Vel aperiatur vena frontis, potissimum si dolor sit in posteriore capitis parte. His iam peractis, refrigerantia & adstringentia medicamenta capiti adhibebuntur, de quibus abunde supra; capite nimirum 8. dictum est, ut nunc ea repetere nihil attineat. Ceterum alius quoque, ut in hoc vitio aperta sit in primis, Medicus curabit, quapropter si sua sponte excrementa corporis non deiecerit, hoc vel simili decocto subducatur, quod accipit: *Florum buglossi; (borraginem nominant) rosarum, violarum, singulorum manipulum dimidium. Seminum quatuor frigidorum maiorum decorticatarum, singul. drachmam unam, Myxorum, sebesten appellant, prunorum damascenorum, singul. numero duodecim. Vuarum passarum, oxyphœnicæ (tamarindos vocant) utriusque unciam unam. Corticum myrobalanorum flauorum, citrinis hodie nominant: caruleorum, Indos appellant: cepalorum, chebulos vocant: empeliticorum, emplicos nuncupant: belezicorum, belliricos appellant: singulorum drachmas tres. Glycyrrhizæ, unciam unam. Fumariæ, adianti (capillum Veneris nominant) utriusque manipulum unum. Tamaricis; ceterachii, utriusque drachmas duas. Foliorum senæ, polyposii, utriusque unciam dimidiam. Agarici optimi drachmas tres. Zingiberis, drachmam dimidiam. Cōquantur omnia in aqua fontana sufficienti, donec dimidium absumatur: dein colentur, & manibus exprimantur. Ius subinde decocti saccharo, quod satis est; dulce reddatur; ac cum albuminibus ouorum spurcitia omnis euertatur; fiatque potio depurata; de qua eger appetente diluculo uncias quatuor bibat. Quod si res ipsa validius exigat medicamentum, tum præstiterit quatuor uncias iuris nominati iam decocti addere, rhabarbari scenitici seu meridionalis redacti in puluerem drachmam unam & dimidiam. Spicæ, drachmam dimidiam. Aut in iisdem dissoluere Casia fistularis, unciam unam & dimidiam; aut mellis acrii, quod alio nomine Mannam appellant, unciam unam. Aut antidoti diaphœmicon, drachmas tres. In eundem usum conducit exhibere serapium violaceum, & oxy saccharum. Posthæc capiti adhibenda sunt remedia; primum, quæ a capite repellendi & auertendi vim habent, ut est oleum rosaceum, & alia quæ cap. 8. sunt commemorata. Deinde ea quæ morbi reliquias discutere valent: ut est altheæ semen, fenugracum, chamæmeli & meliloti flores. Olæ præterea chamæmelinum, anethinum, & iis similia. Licebit etiam oleis iam dictis incoquere serpyllum, sampsucum seu maioranam, & id genus alia. Ex quibus deinceps Medicus pro arbitrio suo & ægroti irrigationes, linimenta, vnguenta, emplastraque componet, ad eum modum, qui in superioribus capitibus expositus est.*

Cucurbitæ.

Localia cōprimantia.

Decoctum purgans. Myxa.

Oxyphœnica. Myrobalani.

Adiantum. Hemionitis.

Mel acriū. Discutiencia.

E De dolore capitis e biliosis humoribus. C A P. XII.

HOC genus doloris capitis fit ab omnibus quæ corpus vniuersum, præcipue caput; præter naturam calefaciunt & exsiccant, adeoque bilem flauam procreant: qualia sunt, Galeno libro 2. *De temp. cap. 8. teste*; sollicitudo, ira, dolor, labor, exercitatio nimia, vigiliæ, abstinentia, & inedia. His accedit victus ratio ex biliosis cibis, allio nimirum, porris, ac similibus constans. Notæ eorum qui sic dolent similes sunt iis, quos ob calorem, solis potissimum æstus, dolor affligit: sed maior ipsis morsus, ob eius acrimoniam accedit, & faciei pallor. Interim etiam oris amaritudo, siccitas oculorum, linguæ & narium adest. Præterea malum hoc ætati vigenti, & temperaturis calidioribus, vitæque sollicitæ, & iis, quemadmodum paulo ante commemorauimus, qui flauam bilem coaceruant, accidere solet. Æger moretur, in aere natura frigido & humido, qui arte etiam, ut supra cap. 7. ostensum est, parari potest, si ædium pauimentum assidue humore frigido irroretur; aut flores ac germina, quæ frigidæ humidæque facultatis sunt cubiculi, per arcam ut sunt rose, viole, vitium capreoli, & id genus similia, spargantur. Vniuersa quidem victus ratio humidior

Causæ.

Signa.

Victus ratio.

16 Operum Leonhard. Fuchſii Pars III.

ſit. Cibis itaque veſcatur humidis, & boni ſucci lactuca, portulaca, oxalide, ſpanachio & intybis, piſcibus exiguis ac ſaxatilibus. Potus ſit aqua, aut aqua in qua parum cinnamomi decoctum ſit. Vino autem in totum abſtineat, bibat aquam, ſi modo eius uſum ferre poſſit. Sin minus, decocto cinnamomi utatur. Quiete utatur, & ſomno largiore. Balneum quoque huic temperatum, vnctioneſque conferunt.

Curatio.
Bilis quidē
interdum
ut vacue-
tur, commo-
de coctio-
nem exigit,
nunquam
autem ut
crasſitiem
adipiſcatur.
Concoctio
quid?

Lætetur, & omnes animi perturbationes declinet. Porro curandi ratio ſtatim a bilioſi humoris vacatione auſpicanda, quod ſcilicet is ipſe tenuis & mobilis ſit, atque adeo euacuationi, perinde atque pituita, propter ſuam crasſitiem, minime reſiſtetur. Quod ſi vero humor ille aliquam corporis partem quietus obſederit, atque adeo incandefcat, eamque partem exurat, & calefacientia medicamenta (*quæ ſunt omnia ea quæ purgant*) reſpuat, antequam bilis purgationem exhibenda erunt, quæ eius calorem ac feruorem reſtinguant, impetumque ipſius obtundant, adeoque illam concoquant, hoc eſt, alterent & euincant. Neque enim concoctio, de qua nunc nobis ſermo, aliud eſt, quam humoris morbum efficientis a natura alteratio. Alterat vero, ubi cauſis morbum efficientibus fortiôr eſt, eaſque ſuo robore permutat & euincit. Ut concocta non ſint niſi ea, quæ a natura euicta atque debellata ſunt. Talia itaque medicamenta ante purgationem eoſque diluculo ieiunis præbenda, donec in urinis decens apparuerit concoctio. Nam hac ratione bilis cocta, & veluti ſubacta, ac edomita, naturæque obſequens reddita, abſque moleſtia minorique negotio ad conuenientia loca euacuationis a purgante medicamento trahetur. Non eſt igitur ut inſiciamur, bilem quæ aliquam partem corporis quietam obſidet, exigere concoctionem, ut educi e corpore queat: ſed hoc potius conſtanter negamus huic opus eſſe, quod putauit Auicenna, & hunc hodie ſequentes Medici fere omnes affirmant, ut crasſitiem adipiſcatur. Sic de humorum concoctione i. Aph. 22. loquitur Hippocrates, dum ait: *Concocta medicari, atque mouere non cruda, modo non turgent: plurima uero non turgent.* Sic etiam Galenus, & poſt hunc Alexander Trallianus. lib. 1. cap. 16. ubi ex proſeſſo de dolore capitis e bili prognato agit. & Actuarius in libro De comp. medica. cap. de flaua bile purganda, de bilis concoctione loquuti ſunt, ut copioſius lib. 2. noſtrarum Inſtitutionum ſeção quinta cap. 20. & in noſtris in Hippocratis iam citatum aphoriſmum commentariis diximus. Sed ad inſtitutum noſtrum reuertamur, ac medicamenta aliquot quæ bilioſos humores concoquere poſſunt, ut ſunt: *Serapia violaceum, de intybo nymphaea, oxyſaccharo, & ſimilia, enumeremus.* Tale eſt quod accipit: *Serapii violacei, unciam unam, Serapii nymphaea, unciam dimidiam. Liquoris ſtillatici intybi ſatiui utriuſque, roſarum, utriuſque unciam unam. Miſcèantur omnia, & appetente diluculo ab agro ieiuno bibantur.* Vel *Serapii oxyſachari, unciam unam, Serapii violacei, unciam dimidiam. Liquoris ſtillatici borraginis, cichorii, utriuſque unciam unam & dimidiam.* In hunc uſum exhiberi poſſunt *Zelapia roſaceum, & violaceum, decocta & ſeminibus cucumerum, cucurbitæ, portulacæ, intyborum ſatiuorum, radicibus corundem & cichorii, roſis, violis, nymphaea, lactuca, prunis damaſcenſis, zizyphis, mixis, & ſimilibus.* Ceterum vacuatur bilioſus humor iam concoctus per abſynthii dilutum, vel aloen, vel hieram picram per ſe datam, aut cum modica ſcammonia, aut catapotiiſ quæ ex aloë conſtant. Neque ab inſtituto aberrabit, qui decoctum purgans, quod ſuperiore capite commemorauimus, bibendum præbebit, in eo drach. tres aut quatuor. Antidoti e ſucco roſaceo, aut e pſilio diſſoluens. Vel hoc medicamento utatur, quod habet *ſorum borraginis, violarum, nymphaea, ſingulorum pugillum unum. Hordei decorticati, drachmas tres. Decoquantur in aqua ſufficienti, & colentur. In colatura diſſoluantur Manna optimæ uncia dua, & Diacatholicon unciam dimidiam, & fiat potio.* Proderit etiam exhibere rhabbari dilutum, quod recipit: *Rhabbari ſelecti, drachmas duas. Spica, ſcrupulum unum. Concidantur ſingula minutatim, & macerentur in ſtillatici liquoris intybi ſatiui latioris, caſſuthæ, bugloſi, ſingul. uncia una. Vini optimi ſemuncia horis duodecim, dein valide exprimantur & colentur, adiectis antidoti e ſucco roſaceo, e pſilio, ſingulis drachmam unam & dimidiam.* Commiſtis omnibus fiat potio purgans, quæ circiter crepuſculum ſumatur horis ſex ante paſtum. Vti quoque licebit catapotiiſ aureis vocatis, alephanginis, e rhabbaro, e hiera ſimplici, & ſimilibus, quæ in libro noſtro ſecundo De uſitata componendorum medica. huius temporis ratione, ordine receſſimus. In delicatis nõ temere quis hoc utetur bolo, qui accipit: *Diacydii, ſcrupulū dimidiū. Maceris, cinnamomi, maſtichis, ſingul. grana dua. Sacchari violacei, nymphaea,*

Purgatio.

Dilutum
rhabbari.

Bolus pur-
gatorius.

utriuſq;

A utriusque quod satis est, fingatur bolus. Vel eo utere, qui habet rhabbarbari drachmam dimidiam. Diacatholicon, unciam dimidiam. Antidoti e succo rosaceo, drachmas duas. Cum saccharo fingatur bolus. Sumat illum mane hora quarta, prandeat decima. Horæ dimidio antequam prandeat utatur hoc lotorio, quod accipit iuris pulli gallinacei salis expertis, unc. quatuor. Sacchari rubei, semunciam. Misceantur. Non absurdum etiam erit clysteribus ^{Clyster.} uti, in hunc vel similem modum paratis. Malua, althea, intybi satini utriusque, violarum, foliorum Beta, singul. Manipulum unum. Hordei integri, unciam unam. Seminum quatuor communium frigidorum minorum, singul. drachmas tres. Coquantur omnia in aqua fontana ad tertias, & colo transfundantur. Dein accipe iuris decocti & colati, lib. unam. Medulla castie fistularis, unc. unam. Hiera picra, unciam dimidiam. Olei violacei, uncias tres. Mellis violacei, unciam unam. Salis, drachmam unam & dimidiam. Commixtis omnibus fiat clyster. Licebit etiam exhibere pilulas de hiera simplici, & iis similes bilem ex capite deducentes. Post biliosi humoris vacuationem localia & ea adhibeantur medicamenta, copia, quæ caput refrigerare ac roborare, ac etiam humectare possunt, quorum multa cap. 8. huius libri commemorauimus. Conuenit autem hoc maxime, quod recipit: Oleorum violacei, nymphaeae, utriusque unciam unam & dimidiam. Commixtis illis frons ilinatur, & tempora, mane & vespere. Quod si vigil supra modum æger fuerit, synciput oleo violarum, rosarum, nymphaeae, & papauerino inungendum erit. Prædictis interdum parum opii verbi gratia grana duo adiciendum erit, ut saltem hac ratione, si aliter non liceat, somnus conciliari queat. Mitiuserit si addas lactis mulieris, unciam unam. Galenus in hunc usum trigoni pastillum, qui a Paulo lib. 7. cap. 12. describitur, ut scilicet eo frons inungatur, commendat. Fiant frictiones brachiorum, & lotiones crurum. Si iam dictis medicamentis dolor non cedat, refrigerantibus medicamentis discutientia miscenda sunt. Tandem mediocriter discutientibus per se utendum erit.

De dolore capitis & pituitosis humoribus. C A P. XIII.

GENERATUR ab omnibus, quæ pituitam in capite procreant, aere frigido & humido, cibis iisdem qualitatibus præditis, piscibus, lacte, oleribus, fructibus, ocio, somno a satietate, & id genus aliis. Dignoscitur capitis grauitate, faciesque si alba & humida fuerit. Si denique æger somno facile tentatur, piger est, sensibus minime viget, & excrementis caput redundat. Aer in quo æger versabitur, calidus & siccus sit natura: aut si haberi eiusmodi non possit, arte per luculentum ignem suffitus, & odoramenta nonnulla, nempe cinnamomum, thus, gariophyllos, lignum aloes, & similia paratur. Inedia huic affectui salubris est, & paucis alimentis utendum erit. Carnibus vescatur magna ex parte assis, & odoramentorum accessione conditis. Inter olera salua, hyssopus, satureia, thymus, petroselinum vulgare, serpyllum & maiorana confert. Propotu utatur vino tenui. Panis sit fermentatus, talitus, bene coctus, sibi commistum anisum habens. Motu mediocri, & aliis quæ cap. 9. commemorauimus. Curandi ratio a pituitosi humoris extenuatione auspicabitur. Quapropter ea, quibus extenuandi & incidendi crassa & lenta vis inest exhibebuntur, præsidia: cuius farinae sunt mel rosaceum, oxymeli simplex, compositum, & scylliticum, serapium & stichade, liquores stillatici hyssopi, betonica, maiorana, salua, & eiusmodi. Paretur igitur medicamentum quod accipit: Mellis rosacei, unciam unam. Oxymelitis simplicis, unciam dimidiam. Liqueoris stillatici betonica, serpylli, maiorana, singulorum unciam unam. Mixtis omnibus fiat potus. Vel id quod habet: Oxymelitis scyllitici, unciam unam. Serapii & stichade, unciam dimidiam, Liqueoris stillatici hyssopi, apii, maiorana, singul. unciam unam. Commisceantur, fiatque potio. Quod si serapiorum & stillanciorum liquorum usus displicuerit, licebit hoc vel simili decocto uti, quod accipit: Radicum fœniculi, petroselini, apii, singul. unciam unam. Radicum pœonia, drachmas tres. Seminum anisi, fœniculi, seselis, siler montanum officina vocant, singul. drachmas tres. Stichadis, origani, serpilli, maiorana, calamintha, betonica, salua, singul. manipulum dimidium. Cinnamomi selecti, maceris, utriusque drachmam unam & dimidiam. Decoquantur tantisper in aqua iustæ quantitatis, dum medietas relinquatur. Ius decocti colo transfundatur, & saccharo suaue reddatur, atque deinde oui albuminibus depuretur, adiciaturque serapii ex hyssopo, oxymelitis simplicis, utriusque unc. tres. Commixtis omnibus fiat potio. Porro extenua-

Causæ.

Notæ.

Vicus rati-

Curatio.

Pituitæ extenuatio.

Decoctum pituitam extenuans.

Purgatio. ris, & ad educationem præparatis humoribus, ea quæ purgandi pituitam vim obtinent A
Pilulæ. medicamenta propinanda veniunt. In quem vſum pilulas has deuorabit æger, quæ
Pilul. cochiarum, drachmam unam & dimidiam, Pilularum hiera compoſita, drach-
mam unam, Pilul. alephanginarum, drach. dimidiam. Agarici in paſtillorum formam. redacti,
ſcrup. duos. Myrobalanarum cepulorum, ſcrupulum unum. Turbit optimi, ſcrupulum dimi-
dium. Stichadis, zingiberis, vtriuſque grana quinque. Maſtiches, grana ſeptem. Seminum pao-
nia, numero 3. Caſtorii, grana quatuor. Cum ſtillaticio lauandulæ liquore ſingantur ca-
taporia pro ſingulis drachmis vndecim. Autillas, quæ habent: Pilularum azaiareth,
drachmam unam. Agarici in paſtillos redacti, ſcrupulos duos. Cum ſerapio & ſtechade formen-
tur catapotia. Competit vero hoc malo affectis non ſemel, ſed bis aut ter purgare:
 quod craſſi & tenaces humores repentinæ ac ſubitæ purgationi non conſeſtim ob- B
 temperent accedant, pedetentim vero & identidem purgando extenuati ac præ-
 parati facilius purgatoriis medicamentis obediunt. Glandes etiam conſici poſſunt,
 quæ habent pulueris hieræ ſimplicis, drachmam unam. Agarici, drachmam unam & dimi-
 diam. Salis foſſilis ſaxeæ, drachmam unam. Mellis quod latis eſt ad excipiendum, figu-
Clyſter. rentur glandes. Conferunt etiam clyſteres, non ſolum propter euacuationem ex-
 crementorum, quæ in inteſtinis continentur, verum etiam propter reuulſionem
 eorum quæ ad caput feruntur. In huncigitur vſum decoctum paulo ante deſcriptum
 conducet, ſic iuris accipiantur vncia duodecim, & in iis diſſoluantur benediſta laxa-
 tiua, vncia dimidia. Antidoti indi maioris, drachma tres. Diaphenicon, drachma due.
 Mellis roſacei, vncia una. Oleorum laurini, rutacei, vtrorumque vncia una & dimidia. Salis C
Capitis ex- foſſilis ſaxeæ, gemma officina nominant, drachma una. Miſceantur ſingula, & fiat clyſter.
purgatio. Vacuato itaque vniuerſo corpore, ea, quæ caput expurgare poſſunt, adhibenda e-
 rant medicamenta, quæ ſunt apophlegmatiſmi, quorum exempla e capite primo huius li-
 bri petes. Purgatur etiam caput per ſuccos maioranæ, bliti, braſſicæ, & ſimilium, de quibus
 in lib. 2. de viſitata noſtri temporis medica. componendorum ratione, cap. 25. diximus copioſe.
Gargarif- Poſſunt & hoc nomine exhiberi gargarismi & ſtillatitici liquoribus hyſſopi, betonica, ori-
mi. gani, hiera picra, & oxymelite compoſiti. vel in eum modum, qui accipit: Hyſſopi, maiorana,
 vtriuſque manipulum unum. Salvia, ſerpylli, thymi, ſingulorum manipulum dimidium. Co-
 quantur in aqua iuſta quantitatis ad tertias. Accipe iuris decocti libram unam. Oxymelitis
 ſcyllitici, uncias tres. Miſceantur & fiat gargarismus, quo vtatur æger mane ieiunus. D
 Vel hunc, qui habet. Radicis pyrethri, piperis longi, vtriuſque drachmam unam & dimidiam.
 Seminis ſtaphydis agria, drachmam dimidiam. Maiorana, pulegii, hyſſopi, organi, be: on-
 icæ, ſingul. manipulum dimidium. Decoquantur omnia in aqua iuſta quantitatis ad ter-
 tias. Iuri decocti colato adice mellis roſacei, vnciam unam & dimidiam. Oxymelitis ſcyllitici,
 vnciam dimidiam. Commixtis vniuerſis fiat gargarismus. Præterea ſternutamen-
Sternuta- torum quoque hoc in vitio locus erit, quæ accipiunt: Maiorana drachmam unam.
menta. Nigella, drachmam dimidiam. Garyophyllorum piperis albæ, cubebarum, ſingul. ſcrupulum unum.
 Nucis moſchata, caſtorii, ellebori albi, ſingul. ſcrupulum dimidium. Terantur ſingula, & in
 tenuiſſimum redigantur puluerem pro ſternutationibus ciendis. Ditiſſimis ali-
Orbiculus quid moſchi & ambaris, vtriuſque nimirum grana duo commiſceantur. Naribus deni- E
odoratus. que odoramenta calida adhibere conuenit, aut orbiculum aliquem odoriferum
Errhina. arte paſatum, qualis eſt quem capite nono commemorauimus. Errhina quoque
 (barbaris naſalia vocantur) indita naribus ſimiliter commodare ægrotantibus ſo-
 lent, quæ recipiunt: Seminis ſtaphydis agria, pyrethri, piperis candidi, ſingul. drachmam
 dimidiam. Nigella, maiorana, vtriuſque ſcrupulos duos. Ellebori albi ſcrupulum dimidium. Tri-
 tis ſingulis cum reſina terebinthina & modica cera ſiant errhina pyramidis formam referentia. A
 capitis purgatione conueniunt inunctiones, embrocha, ſacculi, & id genus alia medicamen-
 ta, ſupra cap. 9. producta, quibus etiam quod reliquum eſt a purgatione totius corporis diſeu-
 tiendi viſineſt. Intra corpus adhibebuntur haud inutiliter cubebæ ſaccharo, obductæ,
 antidota ex ambare, moſcho, aromatici roſacei, e cumino, dianthon, theriaca, antidotus mithri-
 datios, ex acoro, ſacchara maiorana, roſmarini, betonica cum ſerapio & ſtechade. Præ aliis au-
Morſuli. tem hæc potiſſimum antidotus conferet, quæ accipit: Specierum antidoti e gemmis,
 dianthon, vtriuſque ſcrupulum unum. Cubebarum, maceris, vtriuſq. drachmā dimidiam. Ligni a-
 loes, garyophyllorum, ſeminis ſeniculi, ſingul. ſcrupulū dimidiū. Cinnamomi ſelecti ſcrupulos duos.
 Stichad-

A *Stichadis scrupulum dimidium. Sacchari candidissimi instillatio florum peoniae & laurula liquore liquefacti, uncias sex.* Fingantur orbiculi aut morsuli pro ægrotantis arbitrio. Nō ignoramus practicarum (*ut vocant*) scriptores nonnullos, iis quæ nunc commemoravimus subicere. Caput de *Dolore capitis ex humoribus melancholicis nato*, præter tamen decorum ac necessitatem: quum omnia quæ ab illis dicuntur, rectius ad Caput de *Melancholia* transferenda veniant.

De dolore capitis & ventriculi vitio, adeoque per consensum orto.

C A P. XIII.

H Añ: nus capitis primarios primogeniosve dolores ut curare oporteat, monstravimus, nunc reliquum est, ut eorum qui per consensum accidunt, curationes tradamus, initio sumto ab eo, qui a ventriculo male se habente excitatur. Is autem magna ex parte accidit, *ubi exiguis ac tenuis quissiam in eo, & præsertim in ore eius, humor acris coæternatur, a quo vapores pravi excitati sursum feruntur.* Cognoscitur mordaci dolore, quem qui ita dolent percipiunt: & nausea, quæ tum, ore potissimum ventriculi patiente, infestare ægrotantem solet. Porro qui sic caput dolent, si diutius famem & inedia ferunt magis offenduntur. Augetur enim ipsis propter inedia eiusmodi humoris malitia, & prauitas. Curare eos, qui sic infestantur oportet, nihil remediorum capiti adhibentes, quum nullum peculiare ac propriū caput sustineat vitium, sed ab humorum in ventriculo pravis excitantium vapores ascensu molesteretur. Noxios igitur ventriculi humores, quam celerrime vacuare oportet. Euacuantur autē, qui in ore illius continentur, facile his qui ad vomitū proclives sunt, aquæ tepidæ potu. Qui vero ægre vomunt, difficilius: a quo ut etiam nonnulli digitorum, aut pinnarum immisione ad vomitum ventriculum irritantes, nihilo plus proficiant. Porro ad os ventriculi ob naturalem suam leuitatem, flava & pallida bilis promte effertur. Pituitosus autem, aut acidus, aut salus, in spacio & amplitudine magis toti ventriculi, quam in ore ipsi firmatur. Optimum autem fuerit, in fundo ventriculi ipsos contineri, facile enim, relicto ventriculo, ad intestina delabuntur. Pessimus fit affectus, ubi vitiosi humores in ventriculi tunicas sic immerguntur, ut vix elui possint. Si itaq; in tunicas ventriculi receptus fuerit humor, optimum remedium est hiera picra medicamentum. Hoc vacuato, cibus subinde boni succi & ventriculo commodis utendum. Et cum ad prauorum humorum in ventriculo redundantiam, tum concoctricis facultatis imbecillitas, tum oris ventriculi infirmitas plurimum conferant, danda erit opera, ut concoctrix facultas, itemq; os ventriculi per ea medicamenta quibus adstringendi ac roborandi facultas inest, firmetur. Quorum omnium copiam suppediet *lib. 3.* in quo ex professo de ventriculi vitiis tractabimus. Prohibendi autem potissimum sunt vapores ne a ventriculo ad caput & cerebrum efferantur, hoc vel simili medicamento, quod accipit *Coriandri præparati, unc. unam. Anisi sæniculi, cinnamomi optimi, singulorum drachmæ quinq;. Maceris, drachmam unam. Nucis moschate, drachmam dimidiam. Sacchari ad pondus omnium fiat pulvis, qui statim a pastu sumatur, puluereq; sumto potus diu differatur.* Capiti quoq; statim a principio adstringentia adhibenda erunt, ut roborato capite minus vapores

Causa:

Nota:

Curatio:

E ac fumos sursum elatos recipiat atq; admitrat.

De dolore capitis ex ebrietate. C A P. XV.

E brietatem parit maxime *vinum natura calidum, vaporosum, merum, & largum, liberiusque ingestum.* Generant autem calida temperamento vina dolorem capitis, quia vaporibus caput omnino replent, quandoque etiam humoribus temperatura calidis. Notis ad dignoscendum hoc vitium, nullis opus est, cum e sermonibus ægrotantis facile cognosci vitii causa possit. Curandi ratio duabus potissimum rebus perficitur, nimirum Vacuatione, & Refrigeratione. Itaq; si vinum crudū adhuc permanet, & in ventriculo fluctuat, *ut aqua tepida per se, vel paucio oleo admisto epotò vomat*, qui caput dolet iubebis. Quod si etiam post concoctionem caput doleat, refrigerantibus, & vaporibus qui ex alto ad caput feruntur reprimentibus medicamentis utendum est: quale *rosa-cēū* est per se, & cum aceto, aut cum hederæ & brassicæ succo. Quin & ipsa brassicæ folia in aqua calida macerata, & capiti circumdata, illigataque, naturaliter ebrietati resistunt. Eiusdem etiam decoctæ esus in id efficax est. *Amaræ etiam amygdalæ quinque aut septem ieiunio oblata, ebrietatem arcere creduntur.* Præsentem quoq; ebrietatē exstinguunt, centau-

Causa:

Nota:

Curatio:

Viſus ra-
tio.

rii minoris decoctum, Actio auctore: cornu ceruinum, verbenaeque recta semen ex aqua potum. A
Habenda deinceps cura est somni & quietis: quod ubi factum fuerit, per totum diem
ad vesperam in balneo dulcis aquae lauare: ubi laueris, cibis boni succi, non tamen
calefacientibus nutrire oportet. Sunt autem huiusmodi, *ptisana succus, sorbitio ex alica,*
*panis ex aqua, oua sorbilia, & lentis iusculum, praesertim humidior ventriculo prae-
ditis.* Ex o-
leribus *lactuca* boni succi est, & refrigeratoria: *brassica* vapores desiccatur. Ceterum
potum omnino aquae utrum est in iis, qui eius potu assueti sunt, aliasque habent ventri-
culum aestuosum ac exustum. Verum quia nonnullorum *Ventriculus* propter aquae
potum subuertitur, vinum tenue album, & modicum, praesertim si aquam bibere æ-
ger nequeat, malum granatum ipsis concedendum est, aut solū per se, aut cū alica sub-
acta, probe cocta, calida. *Vna praeterea passa, & pyra,* aliqua quidem cruda, aliqua vero
cocta, ut *malum cotoneum*, stomachum corroborant. A palmulis abstinere consilium est
ut quae proprietatem quandam habent capitis dolorem inducendi. At si neque post
hæc probe dormire possint, ad balneum postridie quam citissime ducendi sunt, & a-
qua calida eis frequenter in balneo superfundenda. Deinde ubi dormierint, aut om-
nino interposito tempore quieverint, rursus ad balneum deducendi sunt, dein veluti
pridie nutriendi. Quod si mediocriter habeant, & aquam bibere nequeunt, permittē-
dum est ut aquosum vinū, ut dictum est, bibant. Cibi etiam, ubi mediocriter se habue-
rint, dentur *gallorum testiculi & ala pisces saxatiles, & tenera carne prae-
diti, columbarumque pul-
li.* Porro constat omnibus, satius esse & ipsos, & omnes, qui caput dolent, augescere
adhuc & vigente dolore, quiescere remittente vero & declinante, idoneis locis potif-
simum ante cibum, deambulare. Apta vero sunt iis, qui calefieri desiderant, calidiora:
qui refrigerari, frigidiora. Et ante cibū quidem plurib. deambulationib. utendum, a
cibo autem paucis & lentis. Oportet vero neque comedere multum, neque statim de-
ambulare, sed post duas aut tres, aut etiam plures horas. Quod si aliquando ex vapo-
rib. & humorib. in caput sublatis reliquiae quaedam relinquatur tenuib. meatib. impa-
ctæ, & ob id etiam capitis dolor perseveret, a rosaceo quidem desistendū est, utendū
vero primum chamæmelino moderate calido, postea irino: maximopere n. huiusmo-
di affectus iuuant. In balneo autem caput aqua perfundatur, non solum, ut aliquid eo-
rum, quae intra ipsum habentur, discutiatur: verum etiam somni conciliandi gratia.
Quapropter secundum quoque, aut tertium ad vesperam balneum apparandum est, D
acceptis ab eo lactucis ex aceto. Die sequenti ea quae caput magis calefaciunt, appli-
cabuntur, miscendo irino oleo, nunc nardinum, nunc costinum, nunc alia ei⁹ generis
olea & vnguenta. Hac igitur ratione capitis dolores ex vino curantur. Quanquam nō
ignoro Germanos nostros hanc curandi rationem prorsus contemnere, ut qui longe
alio minusque illis molesto remedio utantur. Nam iuxta vulgares hos versiculos:

Potatio re-
perita
nocet.

Si tibi serotina nocet potatio vini:

Hora matutina rebibas, & erit medicina.

Sed pulchre huius sui moris paulo post poenas dant, ubi ex hac curatione ac frequenti
ebrietate in maximos incidunt morbos apoplexiam, paralyſin, epilepsiam, destillatio-
nem capitis, & id genus alios, unde Medici non parum lucri sentiunt.

De capitis dolore ex ictu, vel casu. C A P. XVI.

Viſus ra-
tio.

NAscitur sæpe capitis dolor ex ictu aut casu, quod ubi accidit, curatio eius magno
studio tractanda erit. Nā periculū inducit, dū humores copiosius ad ipsum caput
confluunt. Quare dum a vino, & carnibus, omnibusque cibis plenioribus solidiori-
busve abstinere oportet, praesertim si ægrotantes febricitent. Potus sit aqua, cui ali-
quid cinnamomi sit incoctum. Ptisanæ vero succus, lutea ouorum, ius maluarum elixæ,
lactucæ, intuba, & cucurbitæ iis sunt exhibendæ. Praeterea quies, corporisq; tranquil-
litas conuenit. Abstinendum etiam a sole, balneo, clamore, distentione partium
corporis, & a cibis acidis, acrib. & salis. Quod si itaq; ictus, aut casus vulneris, vel con-
tusionis causa fuerit, scopi plures erunt inuentionis remediorum. *Vnus* sane, qui pro-
pter vulnus existit, cuius causa glutinantibus medicamentis, & phlegmonem arecen-
tib. uti conuenit, postquā vlcus labia fibulis impositis commissæ fuerint. *Secundus*, qui
ob contusionem: & tertius, qui dolorum causa adhibetur: quos quandoque in ipsis solis
ictis particulis fieri constat, plerumque vero etiam ad vicinas partes propter continui-
tatem

Curatio.

tatem

Aratem substantiæ, extenduntur. Nam membrana, quæ caluariam ambit, & cutis, quæ huic extrinsecus circumtenditur, vtrique propriam substantiam continuam habes, per totum caput extensa est: & ob id sane sæpe caput ipsum dolere contingit, præsertim si ictus vsq; ad membranam os caluæ ambientem penetret: quem membrana caluariam ambiente diuisa rasq; curare oportet, ratione qua caro producitur. Quod si per cõmunionem mēbranæ caluariam ambientis, quā per suturas cum dura mēbrana habet, etiam intra caluariam ipsa inflammatio distribuitur, eiusmodi capitis dolor periculo non vacat. Ceterum non raro accidit in casu ex alto, aliquam cerebri aut membranarum eius particulam abrumpi: quod vbi contigerit, etiam amplius capitis dolor inualefcit, ipseq; totus affectus curatu difficilior, & periculum præsentius & vehementius est.

BNam conuulsiones, *Tralliano teste*, magna ex parte, & deliria comitantur, vt mortem ipsis maxime præcipitem inducant. Optimum igitur in iis, nisi ætas prohibeat, & facultas vitalis imbecilla appareat, curationis initium a sanguinis missione moliri: ita nanque influxus reuelletur. Incidenda autem erit humeralis vena quæ a directo loci patientis sita est: vel ea non apparente, medica. Quod si propter ætatem aut virium imbecillitatem, aut etiam ambo simul, sanguinis detractionem tētare prohibeamur, per clysterem aluum vacuabimus, tum vt huius excrementa vacuentur, tum vt humores qui ad patientes partes ferri consueuerunt reuellantur. Vacuatione igitur facta, & corpore toto recrementis libero, deinceps etiam parti laboranti auxilia ad mouere oportet. Conuenit autem in primis congruis capitis irrigationibus vt: ex lana nimirum oleo dulci imbuta, capiteq; ex ea omni parte contacto, ne scilicet neruorum origo, cerebri nimirum ipsum, refrigeretur. In quem vsu embrochæ etiam probantur. Inde autem remediis ad phlegmonem commodis utemur. Incipientibus nanq; & adhuc nascentibus ipsis, rosaceum cum aceto: in vigore autē consistentibus rosaceum per se adhibemus. Illis vero decrefcentibus, medicamentis laxantibus appellatis utimur: quemadmodum in induratis phlegmonib; absinthium ac pulegium rosaceo admiscemus. At nec circa iniuria indefinite acetū rosaceū permiscendum erit. Cutis enim capitis, aut quæ post eam est membranæ caluariam ambientis phlegmone citra quidem vehementem dolorem oborta, per exigui plane acetū ad rosaceum pmissionem iuuari possunt. Lædentur autē vbi magna fuerit, doloremq; vehementē induxerit. Animaduertendū autē, vbi crassæ cerebri mēbranæ nudæ rosaceū offertur, quēadmodum in iis, quib; aliquid ex capitis ossē excinditur, accidit solum ipsum modice tepidum adhibem⁹. Quum vero citra denudationē, p capitis iuxta principut partem, sana & integra existente caluaria, rosaceum ad cerebri mēbranam peruenire velim⁹, acetū ei, vt eo perducatur, miscemus. Cuius item rursus vehemens virtus tum per viarum transitionem, tum per rosacei mixturam exsoluitur. Ceterum si vigilie vrgeant, etiam *chamamelino oleo*, & non *rosaceo* duntaxat, perfundere debem⁹: plus aut minus p ratione phlegmonis, & ægri tēperamento. Item *rosa arida folia* macerata prius passo, seu *vino dulci*, deinde cocta, atq; trita, & ita imposita, & sertula campana similiter tractata, vel myrti folia tenera ex vino trita, cum myrrha, & pulegium ex vino tritum capiti plurimum p sunt. Sin membrana cerebri fuerit vulnerata, egregie ipsam conglutinat, Archigenis decreto, *Calamintha succus instillatus*, & *mili farina arida inspersa*. Deinde *butyrum*, & *rosaceum* ac *adeps suillus salis expers, vetustus, mista inter se*, & *tepefacta infusa*. Porro in contusionibus citra desperationem ac fixuram circa caput factis, eodem *Archigene auctore*, polenta imposita comoda est. Amplius vero & celypum, atque ipsæ adeo lanæ sordib; sudoris succidæ eodem modo: magis autem proprie similaginem ex aqua pro cataplasmate imponens, aut origanum cum polenta. In mediocrib; autem capitis vulnerib; in quibus nuditas per se non adest, pilos rademus, fibulisque impositis constringemus, ac glutinantib; utemur, de quibus *lib. 6.* vbi ex professo de curatione ulcerum tractabimus, copiosius disseremus.

De dolore capitis in febribus. C A P. VII.

QUOD si febrientes capitis doloribus affliguntur, accurata perpensione considerandum erit, num capitis dolores statim initio cum febribus inuadant, aut postea febribus incrementibus oriantur. Nam si non confestim cum febre dolor capitis irruat, sed interea temporis, dum sc. febris ipsa prope iudicationē venit, tunc nulla penitus remedia quæ-

rantur, quod is vomitum, aut sanguinis e naribus profluvium decretorium portendat, quemadmodum copiose Hippocrates in libris Prognosticorum, & post eum Galenus libro 3. de Crisibus, & libro primo ad Glauconem, capite ultimo, tradunt. Nam ea, quæ admoventur, præterquam quod nihil iuvant, etiam naturam impediunt. Si vero simul cum febribus inuadât, a vaporibus, aut humoribus ob febris magnitudinem fufis, ac velut effervescentibus ad caput elatis, atque ob partis imbecillitatem, accidit. Quare si ab humorum copia oriatur dolor, & in principio cum febre irruit, vena secanda est post primam aut secundam remissionem, si nihil prohibeat, præsertim in corporibus boni habitus, multique sanguinis. In contrarium etiam trahendum, atque adeo reuelandum a capite erit acris clysteribus, quorum exemplâ petes e capite *De apoplexia, & nexibus ligaturis ve, & frictionibus in partibus inferioribus plurimis*. Cucurbitulæ etiam occipitio aut ceruici affigendæ. Capiti vero admoventur sunt irrigationes, quæ ab eo vim repellendi obtinent, ac deinde vacuantibus, postremo vero corroborantibus. Repellunt autem oleum rosaceum, & alia quæ supra capite octauo sunt connumerata. Utendum vero ipsis, in calidioribus habitudinibus ac hora æstiuæ frigidis, & cum modico acetor: in frigidioribus autem ac hyeme, tepidis. Si febris vehemens fuerit, vigilæque crebræ ægrotantem infestauertint, e capitibus papaucrium, sedo, & id genus aliis, quibus refrigerandi & somnium conciliandi vis inest, medicamentis paratis, utendum erit. Trallianus rosaceum per se capiti superfundendum esse, aut cum psyllio, aut hedera, aut semperuiuo. Sciendum vero erit hoc etiam in loco apud Trallianum mendose legi, *ipsum pro* *serpyllo*, id est. *serpyllo* pro *psyllio*, simili quo supra errore. Præterea irrigationibus utendum erit, qualis est quæ accipit: *Florum violarum, nymphaeæ, rosarum, utrorumque manipulū unum. Hordei decorticati, unciam unam. Capitum papaueris, unciam dimidiam. Semperuiui maioris, manipulum dimidium. Coquantur omnia in aqua iusta quantitatis ad tertias, & fiat embrocha*. Vbi cerebrum abunde refrigeratum fuerit, ea subinde adhibenda sunt, quæ caput calefacere denuo, atque adeo vacuare atque discutere reliquias humorum possunt. Quapropter *chamamelinū oleo, anethinū, itinoque* utendum, aut decocto *chamameli, altheæ, & similium*. Et si tenaces ac crassi fuerint humores, *serpyllum, aut pulegii cōmam, vel calamintha, vel menta, vel sisymbrii, in iis decoquere conuenit*. Postremum, caput per *rosaceū oleum, & similia, nempe betonicam, chamamelum, ac melilotum*, corroborandum ac firmandum erit. Porro non solum in iis qui ex febribus caput dolent, sed etiam in omnibus aliis circa caput obortis vitiis cauere oportet hæc quæ sequuntur: *Viticis semen, absinthii succum, lactis potionem, eruum, myrrham, thus, hedera cōrymbos, crocum, peucedanum, cyclaminum & styracem*, quod natura sua capitis dolorem ac grauitatem inducant.

De Cephalæa. C A P. XVIII.

nephalæa. **K**ephalæa, diuturnus & ægre cedens, ac contumax capitis dolor, Græcis dicitur, quia ob exiguas occasiones, maximas habet exacerbationes accessionesve, adeo ut neque strepitum ferat ægrotus, neque vehementiorem vocem neque lucis claritatem, neque vini potionem, neque caput replentia odoramenta, neque motum: sed in quiete & tenebris propter dolorum magnitudinem cupiat decumbere, ut cui videatur caput velut a malleo feriri. Nonnulli etiam tanquam contundantur, aut distendantur ea, quæ circa caput sunt, sentiunt: non paucis vero usque ad oculorum radices dolor pergitur. Ceterum hoc vitium sane nonnunquam continuos dolores habet, nonnunquam vero exacerbationes, & intermissiones, vel ordinatas, vel inordinatas. Iam quidam ex eis cerebri membranas dolitant, quidam vero membranam tantum caluariam ambientem. Fit a plenitudine, aut humorum vaporumve acrimonia intra vel extra caluariam contentorum inflammatione, & capitis imbecillitate. Dolores itaque, qui cum grauitate inuadunt, plenitudinem indicant: qui vero cum erosione infestant, aut humorum biliosorum, aut vaporum acrimoniâ: qui cum pulsus, phlegmonem: qui cum tensione, siquidem citra grauitatem & pulsus obueniant, spiritus crudi & flatulenti copiam demonstrant: cum pulsus vero, membranosi corporis phlegmonem. At si cum grauitate distentio fiat, copiam humorum intra membranas contentam. Ac dolores quidem in superficie hærentes, membranae os caluæ ambientis malum significant. Qui vero in alto ac profundo affligunt, cerebri membranarum. Quibus enim affectus in-

Atra caluariam est, iis ad oculorum radices dolores procedunt, eo quod oculorum tunice a cerebri membranis habeant ortum. Quod si etiam putris humor calidior euaserit, cum febre caput dolent: febricitant autem omnino, & qui ex phlegmone dolent. Porro qualis in hoc vitio esse debeat victus ratio, facile ex superioribus. *De victus ratione.* De capitibus doloribus Capitibus colligi a quouis studioso potest. Consulto itaque hanc, ne temere idem lape repetamus, præteriuimus. Curandi ratio, ubi humorum vaporumve copiam causam esse deprehēderis, siquidem ex totius corporis plenitudine generata sit, ab vniuersi corporis vacuatione auspicienda erit. Veni itaque in hac corporis plenitudine incidenda primum cubiti externa, vel hac non apparente media, eiusdem quidem lateris, quam humeralem vocant: idque faciendum si vires patiantur, aut aliud quippiam non obstat. Si vero velut imbecillum existens, caput ad se quæ seorsum feruntur excipit, materiam in totum corpus reuellere oportet, atque ita mederi parti affligit. Acrioribus itaque clysteribus, & extremarum partium ligaturis, & pluribus infernarum partium frictionibus uti conuenit. Interdum si adhuc sanguis redundare videatur, etiam e naribus, vena ad aperta, quantum satis esse videbitur, vacuato. Mox hiera, cuius vim excaueris intenderisque exhibenda est. Post totius vero corporis vacuationem, tuto ad ea quæ caput euacuant accedes, deinde ad ea quæ firman, ac robur addunt. Caput vacuant apophlegmatismi, & quæ naribus induntur medicamenta, *Localia.* Græci vocant, ut est succus cucumeris sylvestris, elaterium appellant, cum lacte infusus, vel etiam aridum elaterium inspiratum, succusque cyclamini, & porri, & alia quæ supra capit. 13. commemorauimus. Repellit autem oleum omphacinum, hoc est, ex immaturis oliui expressum: & rosaceum per se, & cum aceto illitum: & quod ex capitibus papauerum, & teneris olea germinibus, & hederæ corymbis, ac mentha viridi apparatus, & quæ sunt similia, de quibus in præcedentibus capitibus abunde diximus. Ceterum adhibebis remedia tepida, ubi copia humorum frigidior & crudior fuerit: frigida, ubi calidior & biliosior exstiterit. Post hæc, quæ discutunt medicamenta sunt ad mouenda, ut est oleum chamæmelinum, anethinum, & iis similia supra a nobis commemorata. Siquidem crassior humorum copia fuerit, serpyllum, aut pulegii comam, aut calaminthes, aut sisymbrii in oleo elixabis ac copiam vacuabis. Hæc autem ipsa etiam robur particulæ adiiciunt, quapropter eis ad perfectam usque curationem uti oportet. Omnium vero maxime discutit, & strenue corroborat verbenacæ resina, præsertim viridis: imo & arida, cum radicibus & serpyllo pariter oleo incoctis. Si verbenacæ per se in oleo decocta caput perfuderis, omni capitis dolori diuturno ex frigore oborto, aut ex crassis humoribus, medeberis. Maxime autem profunt sub aquario vase nascentes aselli, si oleo incoquantur.

De Hemicrania. CAP. XIX.

Hemicrania vitium est dolorificum in dimidia capitis parte, nunc dextra, nunc sinistra ortum, quod futura secundum longitudinem eius extenta distinguitur, sub qua intra capitis ossa linea medium cerebrum diuidens protenditur. Hoc cunctis ut plurimum per circuitus exacerbatur, ac quibusdam extra caluariam, quibusdam in profundo capitis, nonnullis iuxta temporum musculos dolor vehemens sentitur. *Causæ.* Causa doloris huius vaporum, aut humorum siue multorum, siue calidorum, siue frigidorum, vel per venas, vel arterias, vel per vtrasque influxu: interim quidem ipsi solis partibus caluariæ internis, hoc est, cerebro, & eius membranis, recrementa sua foras propellentibus: interim partibus corporis, quæ infra caput sunt, viciatos vapores aut humores sursum mittentibus. Trallianus accidere hemicraniam scribit, postquam recrementum aliquod alteri capitis parti infixum fuerit, aut quum procreatum est, in spiritum soluat, irritetque loca singulis diebus, aut vno interposito, aut duobus, pro subiecta specie motus sumens initium. Notæ quibus vapores aut humores copiosi calidi aut frigidi deprehenduntur, e capitibus superioribus studiosis petendæ erunt. Porro quo in loco capitis vitium fuerit, ex iis quæ in capite. *De cephalæa* diximus, cognosces. Quibus hoc adficiendum erit, quod si membrana caluam ambiens patitur, tum adeo vehementer dolent, ut ne manuum quidem contactum facile ferant, adeo ut ne cuti quidē ipsa omnino a vitio immunis sit: quæ admodum si in partibus quæ intra caluariam continentur dolor sentiatur, ique ad radices usque oculorum extendatur, liquido constabit partes intra caluariam laborare, nec manuum contactu dolorem irritari. Victus rationem

Hemicrania.

Causæ.

Notæ.

Vitiatio.

Curatio.

Localia.

Vnguentum.

Vértigo.

Causæ.

promte ex iis, quæ in præcedentibus capitibus commemorauimus, mediocriter etiam docti constituent. Præcipue tamen vitabunt ægrotantes, ea quæ vaporum acrium copiam sursum ad caput mittere possunt, ut sunt *allia, cæpe, sinapi, raphani, & similia*, potissimum si a calidis ac biliosis humoribus ac vaporibus hemicrania nata sit. Neque temere a nobis dictum est, si a biliosis humoribus ac vaporibus nata sit. Nam si a frigidis humoribus, potissimum in ventriculo contentis, hemicrania orta est, iam dicta, & alia calefacientia & extenuantia olera maxime profunt. Cuius rei testis est Trallianus qui ita scribit. *Exoleribus iis, qui hemicrania ex frigida causa laborant, scandix, gingidum, asparagi palustres, beta cum sinapi, & cappares.* Allium vero diuturnos dolores frequenter discussit. Qui igitur hemicraniem curare aggreditur, is principio num sanguinis missione, aut corporis purgatione indigeat æger consideret. Si enim ob plenitudinem vitium ortum fuerit, humeralis vena (quam hodie *cephalicam* nominant) quæ e directo male affectæ particulæ est, incidenda erit. Sin propter vnius humoris redundantiam hemicrania inuaserit, per conuenientia quæque molestantem humorem vacuare possunt medicamenta is humor purgetur, ut in superioribus monstratum est capitibus. Vniuerso corpore vacuato, ad localia vocata præsidia veniendum, ac vel per propriæ manus digitos, vel linteam dimidia frontis pars, & ea præsertim, quæ circa temporum musculos est, fricando calefacienda, atque id ante accessionis tempus faciendum. Post accessionem medicamentis a veteribus Medicis *Hemicranicis* appellatis, utendum, quorum aliqua recenset Galenus capite 3. libri. De compo. medica. localium. Si calor multus in doloribus percipitur, iis quæ aliquid refrigeratorium: si ille non adest, iis quæ vehementer calefaciunt. Vtrisque autem aliquid corroborans, quod adstrictoria facultate præditum sit, misceatur. Optimum vero in frigido affectu remedium erit hoc vnguentum, quod accipit: *Oleorum anethini, irini, singulorum unciam dimidiam. Piperis albi, serpylli, utriusque scrupulum unum & dimidium. Castorei, scrupulum unum. Euphorbii, scrupulum dimidium. Cera quod satis est fiat vnguentum quod dimidia frontis parti, & musculo temporis illinatur.* Mirifice etiam in hoc malo confert, illud tepidum in aurem infusum, quod recipit: *Olei dulcis, unciam unam. Euphorbii, scrupulum unum.* His commixtis, gutta una in aurem instilletur. Plus autem & minus euphorbii adiciendum, prout corpus acri aut hebeti sensu præditum fuerit. Quadam etiam naturæ proprietate euphorbium aceto dilutum, ac latere dextro dolente sinistro applicatum: & contra sinistro dolente dextro illitum, hemicranicis maxime confert, *Actius prodidit.* Trallianus laudat tanquam generosum auxilium Euphorbii vnam partem, castorei tantundem, aqua excepta auri iuxta partem dolentem impositum, ita tamen ut statim in balneum eat, & lauet æger. Recenset etiam alia quædam, quæ apud eundem quisque legere poterit. Idem etiam posse lumbricos terræ tritos, & cochlearum carnes lateri patienti illitas, tradit. Sunt qui persicorum nucleos tritos, ac illitos parti male affectæ mirifice conferre, memorie prodiderint. Quod si vero a calidis humoribus aut vaporibus dimidiæ partis dolor accidit, ea sane auxilia quæ supra in curatione doloris capitis ex calore & biliosis humoribus orti memorauimus, adhibebuntur. Conuenit autem in primis panis ex aqua tepida, ut quæ supra modum ipsis auxilietur. Malua etiam, & lactuca comesta prodest. In vniuersum autem cibus sit humectans, & balnea temperata, postremo purgatio expura & scammonia.

De Vertigine. CAP. XX.

Quod vitium Græcis, hoc Latinis *vertigo* tenebricosa dicitur. Alio nomine Græcis *νεμεσις* Galeno sectio quarta aphor. comm. 17. teste, appellatur. Barbari hoc ipsum corrupta voce *scotomiam* vocant, tradunt. Est autem vertigo tenebricosa, ubi obtenebrationes hebetudinesque oculis obuersiones, adeo ut de repente visus euanescat, & omnia circumagi & rotari videntur. Hippocrates vero, eodem Galeno sectio. tertia aph. com. 17. auctore *νεμεσις* nominatur. Differt autem iam dictum vitium ab eo, quod simpliciter Græcis, & Latinis *vertigo* dicitur. Nam, ut idem Galenus lib. 4. vict. acut. comment. 37. attestatur est, quando caput d. neaxat circumagi videtur, ut fusius lib. 3. Institutionum nostrarum sectione 1. capite 11. diximus. Oritur hoc pathema interdum, cerebro primogenio vitio laborante: interdum etiam, quum oris ventriculi consensu laborat. Cerebrum vero patitur, ubi crassus & lenis humor ipsum occupat, a quo vaporosus spiritus ab imbecilli calore natiuus

A natiuus resolutus, in cerebri partibus inordinate mouetur, & tenebrarum offusiones adducit, & imaginatricis facultatis iudicium peruertit, vnde illa rerum obiectarum circulatio se obicit, simulque se circumagi qui patiuntur, & concidere existimant. Ori autem ventriculi cōsentit, quando propter vitiosos humores in eo acervatos, vaporosa exhalatio ad cerebrum fertur, spiritum animale in illo rotans accircumagens. Qui hoc vitio laborant, iis a quacunq; leui occasione præ oculis tenebræ appa-

Notæ

B tæ agitata, aliisq; iam dictis occurrens, eodem motu circumuehitur, atque ita turbulētus, inæqualis; inordinatusque humoris & spiritus motus redditur. Siquidem consentaneum est humorem & spiritum illum eodem modo impelli; quo res ipsa, quæ cernitur. Humores enim & spiritus, quum ex fluentium & motorum genere; iis agita- is ac circumactis corpus vna commoueri, & ad eandem motionem ferri necesse est. Vbi ex primario cerebri vitio vertigo dependet, tum aurium sonitus, vehemens dolor capitis, grauitasque præcedunt: item *olfactus*, atque *alterius cuiusque sensus a capite prodeuntis oblesio*. Patiuntur autem tum potissimum, quum sub sole æstuarint, vel aliam ob causam calefacto capite humores dissoluti circumaguntur. Vbi vero ab ore ventriculi oritur; stomachi moriionem, *αἰσθησις* Græci nominant; & nau-

C seam præsentunt, *ut plenius libro tertio de labo, locis Galenus capite octauo docet*. Æger, quod ad victus rationem attinet, commoretur in aere puro & lucido, deuitet autem crassum & nebulosum. Accessione tamen ingruente, præstat ægrum in aere obscuro & quieto versari, in quo spiritus & vapores moti, facilius ad quietem deducuntur. Cibis vescatur boni succi, ac concoctu facilibus, flatuque omnino carentibus, carnibus nimirum perdicum, *caporum, phasianorum, gallinarum, vitulorumque*: piscibus denique saxatilibus, ouis sorbilibus, & eiusmodi, quæ nullo negotio concoqui queant. *Vi-* **da** omnia, a quibus vapores sursum feruntur, *ut sunt odoramenta, allia, cepa, porri, sili-* **napi, & iis similia**. A cibo ea exhibenda, quæ vim habent adstrictoriam, & vapores sursum ad caput ferri prohibent, præsertim si vitio stomachi morbus ortus est. Bi-

Vicus ratio

D bendum vinum aquosum, album, tenuissimum, non admodum antiquum, aut hydromeli. Exercitium sit mediocre, in quo, quantum fieri potest, caput quiescat. Somnus diurnus vitetur. Nocturnus sit prolixior. Caueat sibi æger ab animi perturbationibus, Ventris excrementa singulis diebus deiciat. Non intueatur res in gyrum actas & rotatas, aut celeriter motas, ut currentia flumina, neque in præcipitiis ambulet: hæc enim singula vitium exacerbare valent. Porro, quod ad curandi rationem attinet, ver-

Curatio:

tiginosos in accessione odoramentis, frictionibus, & id genus aliis excitare conuenit. Vitium autem attestante robore, si nihil aliud obstiterit, vena humeralis secanda est, siue principium morbi fuerit, siue etiam processerit. In sanguinis vero missione obseruandum, ne confertim sanguis vacuetur, propterea quod a quacunq; leui oc-

Vena secand

E casione æger facile concidat. Pluribus itaque detractionibus per certa interualla vtentes, congruam mensuram explebimus. Quod si vero sanguinis missionem quidpiam prohibuerit, alius subducatur, semper redundanti humori medicamentum adaptando, præcedente tamen eius concoctione ac præparatione: Mirifice vero cōfert primū per aerem vacuare clysterem, non solum propter eorum quæ in intestinis continentur vacationem, ut supra quoq; monuimus, verū etiam ob reuulsionem eorum quæ ad caput feruntur, cuius quidem exemplum in *capite de Apoplexia* proferemus. Præmissis itaq; vniuersi corporis vacationib; capiti localia adhibebuntur præsidia,

Localia?

F In nares deinde anagallidis succus, aut radices betæ, aut cyclamini infundendus. Nitrū vero cū nigella tritum, & oleo antiquo mixtum, per nares egregie purgat. Deinceps æger ad balneū ducend⁹, præsertim naturale sulphureū, ac caput embrocha ex medicamentis discutiendi facultate præditis concinnata, irrigandum. Quod si vero caput in balneo supra modū incaluerit, rosaceo & aceto sæpe fouendum est, atq; re-

refrigerandum. Si igitur per hæc præsidia vitium cessauerit, subinde validioribus abstinentum: si perstiterit, capitis arterias in temporibus circa aures incidere oportet, ventre tamen prius aut medicamento, aut clysteri purgato. Ut autem incidendæ sint arteriæ, ex Paulo Ægineta discas, qui id ipsum perspicue libro 6. capite 4. tradit. Neque temere cauterium hoc occipiti post aures accommodabitur, quod accipit: *Cantharidum, abiectis capitibus, aliis, & pedibus, drachmam unam. Fermenti acris, drachmam dimidiam. Cum aceto & vino e sublimi ignis commercio destillato subigantur, & admoveantur.* Vertigo autem a ventriculi oris contentu, vomitu curari potest, qui hoc moueatur medicamentum, quod accipit: *Anethi manipulum unum. Seminum raphani & vaporum, utriusque drachmas duas. Radicis raphani, semunciam.* Ebulliant in aqua iuxta quantitatis, donec pars tertia abluatur. Ius decocti coletur, & addantur subinde *Oxymelitis scyllitici, sesquialcia.* Commixtis omnibus fiat potus, quia comestione statim tepidus exhibeatur. Proderit etiam deuorare *catapotia stomachica vocata, hierapicra, & similia.* Dentur frequenter a cibo, quæ os ventriculi constringunt, atque adeo ne vapores sursum ad caput ferantur, impedian: ut sunt *diacotoneon sine speciebus, cotonea ipsa, pyra adstringentia, coriandrum preparatum, fœniculum saccharo incrustatum, & anisum, pœoniaque semen, & eiusmodi, de quibus suo loco satis copiose dicemus.* Vendum quoque a pituitu cotoneorum carne. Capiti etiam applicanda, quæ vaporum ascensum inhibent, ut *oxyrhodinum & alia, de quibus supra dictum est.*

Dephrenitide. C A P. XXI.

Phrenitis quid. **Phrenitidis** species tres. **Prima.** **Theophilus** medicus. **Secunda.**

Phrenitis, Galeno libro secundo de Sympto. causis auctore, est cerebri, aut eius membrarum phlegmone. Sic dicta, quod in ea mens, quam Græci φρενις vocant, lædatur. Ceterum, quæ ad phrenitidis definitionem attinent, in annotationibus nostris in librum undecimum Galeni de medendi ratione capit. 18. copiose diximus. Sunt autem phrenitidis, eodem Galeno libr. 4. de male affectis locis, capite 4. teste, species seu differentie tres, prout sensus interiores, qui de illius sententia totidem sunt, nempe imaginatio, cogitatio, & memoria, læduntur. Quippe sunt phrenitici quidam, qui cogitatione manente illæsa, sensib. atque adeo imaginatione deprauate mouentur: veluti Theophilo Meico egrotanti, cuius Galenus in lib. de Sympt. disse. meminit, euenisse constat. Is enim quum alioque imprudenter se gereret, & differeret, atque eos qui tum presentes erant, exacte nosceret, tibicines tamen quosdam arbitrabatur esse in angulo cubiculi, in quo decumbebat, eosque tibia canere & pulsare. & se illos videre putabat, alios quidem stantes, alios autem illic sedentes, atque ita continenter canentes, ut neque noctu, neque interdiu quicquam remitterent. Proinde assidue clamans, iussit eos a cubiculo expelli. Hic vero ubi conualuit, quicquid singuli eorum qui ipsum visitabant, vel dixissent vel egiissent, narrabat. Denique visorum quæ de cantoribus apparuerant, probe meminit. Eiusmodi phrenitidis speciem in se ipso adolescentulo adhuc experius est etiam Galenus, quod lib. 4. De affectis locis, cap. 1. commemorat. Quum enim per astatem ardente febre laboraret, & festucas atro colore ex cubili eminere, & floccos similiter in vestibulis esse putabat, quos auferre tentans, nihilque sub digitis eductum inueniens, accuratius vehementiusque id efficere conatus est. Audiens itaque duos ex amicis qui tum aderant, dicentes: *Videsne hunc iam & floccos euellere, & festucas colligere?* statim intellexit id ipsum quod dicebant se fecisse. Quum vero sic animo constaret, ut rationalis in eo facultas non vacillaret, recte (inquit) dicitis: proinde ne phrenitis me arripiat, auxilio estote. Ex quibus iam planum fit, neque in Theophilo, neque in Galeno cogitationem, rationemve oblæsam fuisse, sed solam imaginationem. Alii rursus de iis, quæ oculis offeruntur recte, quantum ad sensitiuam notitiam imaginationemve pertinet, iudicant, cogitando vero ac ratiocinando a naturali iudicio aberrant. Hoc pacto afficiebatur phreneticus ille, cuius meminit Galenus locis iam citatis: qui quum Roma domi cum lanifici puero contineretur, surgens a cubili, obseratis intus ianuis, venit ad fenestram, per quam & ipse videri, & prater euntes videre potuit. Itaque ex vitreis vasis singula ostendens interrogauit, iuberentne ut ea proiceret, rogabant: tum ipse deinceps omnia arripiens eiicit, at illi magnis acclamationibus riserunt. Postea, iuberentne puerum quoque proicci, quum eos interrogasset, atque id illi iussissent, ilico ipsum deiecit: quem ab alto cadentem videntes, suppresso statim risu, accurrerunt, & confractum iam puerum sustulerunt. Hic sane singula vasa suis nomenclaturis probe nominauit: unde intelligi potest, neque imaginationem circa illa fuisse læsam, neque nominum memoriã deletã, sed solam

A solam cogitationem a naturali iudicio deuiasse. Sunt præterea qui simul & sensus siue imaginationis & cogitationis vitio, quod memoriz etiam sequitur abolitio, laborant. Tali delirii specie per pestilentiam correpti sunt illi, quos Thucydides *libr. 2. belli Peloponnesiaci* scribit omnium, quæ antea nouerunt oblitos fuisse, ita vt non solum suos familiares non agnoscerent, sed ne seipsos quidem. Quæ ideo prolixius a nobis commemorata sunt, vt hinc primum dilcerent huius nostræ artis studiosi, plures esse quam vnum interiores sensus. Neque enim alias imaginatione illæsa, amitteretur cogitatio: aut contra, integra cogitatione, imaginatio obladeretur. Dein, vt scirēt principes facultates esse totius cerebri, adeoq; harum functiones nequaquam in diuersis cerebri partibus, vt *Ætius lib. 6. cap. 2. & post eum recentiores Medici fere omnes censent*, perfici, sed in toto potius cerebro, *quemadmodum fusius in Institut. nostris lib. 1. sect. 8. cap. 3. diximus*. Ceterum oritur phrenitis ex sanguine exuperante, vel bilioso humore, seu, vt *Trallianus* ait, a flaua bile, cerebrum, vel eius membranas occupante. Sciendum vero hoc loco erit, quum ex flaua bile auctores phrenitim procreari dicunt, non ita eorundem sermonem accipiendum esse, quasi ex sincera bile; & a sanguine secreta, eandem nasci censeant, sed quod ex bilioso sanguine, seu bile sanguini permista in cerebrum, aut eius membranas decumbente fiat, *vt plenius in nostris commentariis super 11. Galeni de meden. ratione librum cap. 18. docuimus*. Vtraque phrenitis exitialis est, sed mitior tamen quæ ex immodico sanguine fit: vehementior quæ ex bilioso gignitur sanguine. Pro ut vero maiorem ille aut minorem obtinet acrimoniam, eo malignior aut mitior fit phrenitis. Quod si vero bilis ipsa, ex qua vitium nascitur, perusta fuerit, grauissima ac ceteris omnibus perniciosior phrenitis accidit. Quos phrenitis inuadit, hos febris continua; quod materia quæ affluxit in loco angusto coarctata sit, eiusq; impediatur perspiratio putrescat, & amentia infestant, plurimaq; parte somnus difficilis, & vigiliz continuæ comitantur. Interdum etiā somnus turbulentus accedit, vt exurgāt ægri, exiliant, furibunde vociferent, verba sine ordine & sensu effundāt, in errogantibusq; nihil appositè, aut maiore cum tumultu, aut temeritate respondeant, præsertim vbi aliquis antea dum bene valebat fuerat mansuetus: Non nunquā occipit dolor infestare. Oculos deniq; habent cruentos, vehementerq; squalidos: & sæpe eos perfricant, interim aridos, interim lachrymantes. Lingua eorum tactu est aspera, & ex narib; aliquādo sanguis destillat. Floccos præterea auellunt, & festucas ex stragulis ac vestibulis carpunt. Pulsus ad hæc exiguos, languidos, & quadantenus duros & neruosiores obtinēt. Spirationem quoque (*vt in Prognosticis auctor est Hippocrates*) raram habent. Porro quibus sanguineus humor vitium procreauit, ii cum risu insanunt. Quibus vero flaua bilis, illi ferociter & immaniter sæuiunt; ita vt coherceri nisi vinculis nequeant, omniumque quæ dicunt, faciuntque obliuiscuntur: adeo vt laborātes aliqui, quum matellā petunt, meiere tamen negligunt: aut quum lotium emittunt, matellā ipsam tradere haudquaquam meminerunt. In victus ratione sic se gerat æger: Decumbat in loco tum aeris, tum luminis temperati, variisque picturis carente: in quem amici quidem gratissimi ingrediantur; qui tamen inopportune non interpellent, & non nunquam blande & leniter alloquantur, nonnunquā acerbius increpent. Cibus primum esto prisanæ cremor, aut alica hordei, aut panis medullā cum aqua mulsā, aut mellerosaceo addito citreorum, aut punicorum succo, aut simili, qui humores densare ac cogere possit, vt ægrius ad caput ferri valeat, sæpius lota. Oleribus vescatur intybo, lactuca, & malua elixis, eiusq; generis aliis, quæ refrigerare atq; humectare possunt. In morbi inclinatione pisces squamosi & saxatiles dari possunt. Mala quoq; punicæ, ceræq; si multus intus conficiat feruor, offerenda. Potus sit aqua in qua parum cinnamomi, aut hordei decoctum, cui admixtum sit serapium violaceum, rosaceū, aut nymphæ, quod nenupharinum hodie barbara voce appellāt. Hæc autem non conferunt, hoc est copiose & celeriter, ingurgitanda; sed parcius & per interualla exhibenda sunt: quum alias exiguo vtantur potu. Hinc est, quod eos rectissime Hippocrates *lib. 1. Prenotionum, & lib. 6. Epid. par. 2. aph. 6. & γυνώσκεις* nominet. Porro vbi concoctionis notæ in lotio apparuerint, & febris vehementia remiserit, atque vires non satis robustæ fuerint, vinum tenue & aqua dilutum, quod *ὀψύφει* Græci nuncupant, dandum. Quod tutius certe sit in iis, qui sani hoc bibere cōsueuerunt, & ventriculū natura im-

Tertia.

Causæ.

Notæ.

i. Præf. 271.

Vitus ratio.

Cōfertim.

γυνώσκεις
Vinum ὀψύφει
23 φέει.

becillum ac frigidum obtinent. Nam, *ut Trallianus testatur*, ferociam phreniticorum A mutat, & ferinos mores ad hilaritatem transfert, ſomnumque conciliat. In quiete denique ægri quoad eius fieri licet retineantur: ſi diuites fuerint, ſamulorum adminiculo, ſin pauperes, vinculis. Nam inordinata motio, vires conuellit. Balneum quoque dulcis aquæ, temperatum modo corpus ſqualidum & aridum ſit, confert: idque ſi tepidum tum adhibeatur. Neque enim vitii quantitas tantum, quantum ipſa nocet ariditas, ac vigilæ immodicæ. Quare cum balneum prædictum humectet & refrigeret, quod alibi abunde demonſtrauiſmus: non ſolum ſiccitatem, verum etiam immodicas vigilas, mentisque alienationem vna cum febre profligare poteſt. Non eſt tamen, quod ſæpe antea monuimus, niſi prius vacuato corpore, eo vtendum. Præterea ſupra modum efficiunt phreneticis animi perturbationes: proinde nihil quod B mœſtitiā inferat, aut bilē creet, iis permittendum eſt. Ceterum quod ad curandirationem attinet, ſi ægri vires non obſtiterint, protinus, & nequaquam veluti quidam docent poſtridie, ſanguis mittendus erit: quod non ſit aliud ſalubrius, neq; præſentius auxilium. Secunda vero cubiti venâ exterior, quam humeralem vocant: aut, ſi ea non appareat, mediâ, & quantum tulerint vires educendum. Non tamen uſque ad animi deliquium, vt nonnulli magno cum errore ſtatuunt: præſtat enim minus auferre quā oportet, propter plurimā in illis factā ex vehementi motu reſolutionem. Proſpiciendum quoque diligēter, ne clam brachii vinculum æger ſoluat, aut adimat. Poſtea rectā etiam in fronte venā incidere licebit. Fir autem id recte, ſi collum artificioſe ſalea lanea conſtringatur, vt venâ attollatur. Ita nanque ſi factum fuerit, C ſanguis ſtatim venâ ſecta citra impedimentum erumpet. Quod ſi vero ætas venæ ſectioni obſtiterit, tum cucurbitulæ cum ſcarificatione occipitis ſcapulis, & ſpinæ ad mouendæ erunt. Quæ hoc etiam nomine conducunt, quod humorum ad cerebrum deſluxum in contrarium auellunt atque vacuant. In hanc ſine uſum confert inaxime clyſterum uſus, qui accipiunt: *Florum violarum, nymphae, ſingul. pugillum vnum. Foliorum maluæ, violarum, intybi ſatiui anguſti folii, lactuca ſingul. Manipulum vnum. Hordei decorticati, vnciam vnā. Myxorum (Sebeſten vocant) numero vndecim. Seminum, cucurbitæ melonum cucumeris, ſingul. drachmas tres. Prunorum, numero viginti. Coquantur in aqua iuſte quantitatis tantisper, donec tertia pars abſumatur, & colo transfundantur. Dein accipiantur iuris decocti, vncia duodecim. Medulla caſia ſiſtularis recens extracta, vncia vnā & dimidia. Mellis roſacei, vncia vnā. Olei violacei, vncia tres. Salis, drachma vnā & dimidia. Commixtis omnibus, fiat clyſter. Si volueris vt vehementius purget, adiicienda erit hierapieræ, aut antidoti e ſucco roſaceo, vncia dimidia. Ridiculum vero eſt, quod nonnulli iam doctorum calidorum antidotum prohibent, metuentes ne febrem augeant & agitent. Quasi vero ex noxiorum humorum vacuatione & auerſione, Galeno i. ſect. apho. com. 24. teſte, non maior ſit vtilitas, quā id quod conſequitur ex eis detrimentum. Ad humorum a capite auerſionem non parum conferunt vincula extremis corporis partibus iniect: item pedum frictiones cum ſale & aceto, idque genus alia. Caput autem roſaceo, vel oxyrhodino tepidioribus pannis lineis iis imbutis irrigare oportet. Inflammato enim cerebro, vel membranis eius, frigiditas tuta non eſt, ſicut neq; vehemens caliditas. Si quidem frigiditas meatus conſtringit, neq; ſinit excrementa e capite diſcuti: at ingens caliditas feruorem congeminat. Aſtate itaq; roſaceum exquſite tepidū adhibendū, cum pauco aceto: hyeme autem mediocriter calidum, vt humor a capite repellatur, & ne immodice calefactū, ſed aliqua ex parte refrigeratū ab oxyrhodino, humores ad ſe trahat, illiſq; impleatur. In hunc uſum etiā admixcere illis licebit *succū ſolani plantaginis, aut illarū & ſimilium herbarum ſtillaticios liquores*. Si malum ipſum vehementius fuerit, caput faciemque aſſidue oleo in quo capita papauerum decocta ſunt, fovebis. Trallian⁹ quum morbus vigeat & vigilas, mentisq; alienationem inuehit, *oxyrhodino caput largius madefaciendū eſſe monet, & decocto papaueris caput, pſyllium: eiſin eo mendoſe, vtralia ſæpe, ſerpyllum ſcribatur: & hederam permiscendam docet*. Odorata quoque naribus obuiemus, *roſas, violas, nymphae flores, & eiufmodi*. Nares quoque F ipſas intus, aut frontem ſuccis prædictorum medicamentorum illincemus. Nam ſopire ac ſtupefacere principem facultatem oportet, cerebrum nimirum, quod ſupra modum incaluit, refrigerando. Si vigilæ quoque admodum vident, quæ ſomnum*

Curatio.

Venæ ſectio.

Clyſter.

Myza.

Localia.

Somnifera.

A conciliare possunt, ut est *Diacodyon*, quod *Tralliano teste*, non solum vigiliis, sed etiam febris medetur, & caput tanquam ab igne adustum refrigerare potest: & alia multa quæ supra commemorauimus, non temere adhibebuntur. Inter alia vero hoc non parum conducet unguentum, quod recipit: *Vnguenti populeon, drachmas duas. Olei violacei, drachmas tres. Seminis hyoscyami, corticis radices mandragora, utriusque scrupulum dimidium. Opii, grana duo. Croci, grana tria. Aceti parum, cera alba quod satis est. fiat unguentum, quod temporibus illinatur.* Sunt verò id genus medicamenta caute & cum iudicio adhibenda; quod cerebrum sapientia natura frigidum sit, ac pars corporis princeps. Quapropter imbecillioribus nequaquam fortia & vehementia, sed minori pondere & quantitate adhibenda sunt. Embrocha etiam hæc tepida capit ad mouenda, quæ accipit: *Florum violarum siccarum, rosarum rubearum, nymphaea, singul. Manipulum unum & dimidium. Hordei excorticati, unciam unam. Seminis papaueris albi, drachmas duas. Seminis lactuca, drachmas tres. Decoquantur singula in aqua fontana iusta quantitatis ad tertias, fiatque embrocha.* Possent etiam decoqui in eundem vsum folia lactuca, solani, psyllii, & capita papauerum. Sub puluinari etiam calices papaueris, aut poma mandragora supponenda. Postremum ubi morbus iam non nihil resedit, mitiorque factus est, id quod tertio die vix plurimum accidere solet, discutientia medicamenta, quæ morbi reliquias ad crassos vapores dissipare possunt, adhibenda. In quem vltimum iam commemoratam embrocham ad mouere licebit, adiectis tamen floribus chamæmeli, anethi, meliloti, altheæ, & similibus. Sunt qui hoc tempore gallinas, aut catulos per medium fillos capiti non temere apponant, quæ contra vulgus in morbi principio, ac summo incremento eos admoueant, phlegmonem & febrem hac ratione augens. Alii adhuc calidum arietis pulmonem, vel recens ex animante acceptum, vel aqua feruenti calefactum, vel pullum columbinum, admoueant. Porro si diuturnum iam vitium fuerit, in eo serpyllum, thymum, altheam, & spondylium decoquere conuenit: *Galenus quoque lib. 11. & 13 Ther. method.* castoreo vtendum esse (phlegmonem iam scilicet inclinante) docet: quod nimirum non continuo locis circa cerebrum, sed ossibus interuenientibus occurrat. Inest autem ei medicamento & partium tenuitas; quod ipsum iis (quorum per densa propugnacula transmitti imo porret) est accommodum: vt his de causis castoreum phreniticis etiam magno cum fructu adhiberi queat. Phrenitici ubi sese recolligent, ebrietatem, odium, ciborum corruptiones, & in primis solas æstus cauebunt.

De Lethargo. CAP. XXII.

Lethargus proprie dictus, de eo enim hic agitur, vitium est phrenitidi contrarium, nempe sopor præter naturam continuus, & inexpugnabilis pene dormiendi necessitas, atque obliuio cum lenta febre. Aliqui latine *veternum* interpretantur: Hoc vitio correptis, omnium rerum obliuio accidit, vt verbis nulla suppedietur materia: hinc etiam nomen nactum est. *Lethargus* enim obliuio est, æger vero captura, vel æger iners: vt *Lethargus* non sit aliud, nisi iners obliuio, aut malam obliuionem inducens. Causa eius est pituita atque putrefacta, aut pituitosa plenitudo, quæ frigore remittit, ac humore cerebrum imbuunt, & in somnum impellit. Lethargicos proprie dictos comitatur febris lenta, & nequaquam acuta, putrescit enim in hoc vitio pituitosus humor, *Galenus lib. 13. Ther. meth. teste*, cum profunda in somnum delatione: Pulsus iis magni rarique sunt, & vndosus. Spiratio ipsa nimis rara & imbecillis. Somnolenti præterea sunt perpetuo lethargici, desidiosi, & ignaui. Vix & tarde quocumque modo impelluntur, respondent. Oculos quandoque ad vociferationem aperiunt, & denuo claudunt, ad soporemque reuertuntur. Sentiant enim lethargici, atque ægri, ideoque ægre excitari possunt. Obliuiosi, & dementes, perit enim in iis & memoria, & ratio. Oscitant crebro, & hiante ore aliquandiu persistunt, tanquam claudere id obliti. Sæpe ad meiendum vocati, porrectam matulam manu tenentes, meiendere obliuiscuntur. Deiciunt per aluum magna ex parte liquidiora. Nonnullis contra venter indurefcit: Urinam reddunt iumentis similem, *Videtur ratio.*

F Quidam ex eis tremiscunt, & vndique sudant: Cubile, in quo decumbit æger, splendendum, lucidum, & tepidum sit, æque ad calidum & siccum parum de linet. Cibi sint attenuantes, incidentes, exsiccantes; qui condiantur apio, aniso, cumino, pipere, cinnamomo, garyophyllis, & id genus aliis odoramentis. Ex auiibus æger vescatur montanis aui culis, pullis gallinaceis domesticis, perdicibus, turdis, merulis, & similibus. Oleribus vratur

porro, *aſparagiſ, ſaniculo, & eiufmodi.* Cremore denique ptiſanæ aut ptiſana ipſa, interdum ſola, *Tralliano teſte*, interim cum oxymelite, aut in qua hyſſopi coma, vel pulegii, vel thymi fuerit decocta, præſertim ſi febris non fuerit valida. Potus ſit hydromeli, aut vinum aquoſum, tenue & album ſubadſtringens. Nam ipſum cum tempeſtiuo cibo datum, non mediocriter adiuuat, *ut Celſo viſum eſt.* Ceterum ſi vires permiferint, & nihil aliorum obſtiterit, *Galeno libro 13. Therapeutica methodi ſuadente*, ſanguinem ſtatim initio mittere expedit. Sin minus, clyſteribus acribus *e betonica, ruta, ſaluia, maiorana, centaurio minore, ſemine ſaniculo, agarico, & pulpa colocynthidis*, alius eluenda, quorum formulas in capite De apoplexia reperies. Dein oxyrhodinum capiti admo-
Curatio. uendum: repellendus enim a capite humor eſt, quiſquis iſ fuerit, *eodem Galeno teſte.* In quem uſum etiam frictions cum pyrethro, pipere, ſale & aceto, ligaturæque extremitatum
Localia. conueniunt, maxime a cibo, ne uidelicer vapor ad caput feratur. Odoramenta
Excitatoria quoque a ſomno excitatoria admouenda, ut eſt caſtoreum, funiculus extincta lucerna, capillus hominis, pix humida, bitumen, chalbanum, ſulphur ſagapenum, cornu ceruinum abro-
Historia. tonum, peucedanum, & ſuccus laſerpitii. Saturcia quoque, *Plinio libr. 4. de re medica capite 19. auctore*, ex vino pota, aut cum aceto frequenter capiti infuſa, lethargicos etiam lethaliter dormientes excitat. Extrema, cruraque pun gere, non nunquam pilos quoque in ipſis vehementius euellere oportet, quo excitentur. Licebit etiam in aceto thymum calamintham, pulegium, hyſſopum, & origanum, aliaque eius generis addito caſtorio in-
B coquere, ac naribus ægri admo uere: quo vapor ad cerebrum delatus, humorum craſ- ſitudinem diſſecet. Ac frons illinenda eſt aut caſtorio, aut pilis humanis, *Tralliano au-*
C *ctore*, crematis læuigatiſque ex aceto, quod forſan etiam naturali quadam proprietate le- thargo aduerſentur. Palatum etiam valentibus & acribus medicamentis, verbi gratia, ſinapi cum melle, antidoto mithridatis, theriaca, & puluere pyrethri, inungendum. Conarique oportet, pituitam indidem affixam digitis euicere. Ab iis vero, etiam ſternuramentis ex caſtorio, & pipere, utemur. Si admiſerint, apophlegmatismoꝝ etiam uſus erit. Quod ſi iis vitium non diſcutitur, caput radendum, deinde fouendum eſt ſale, milio, & ſimilibus in ſacculis adhibitis, aut ſerpyllo, hyſſopo, & thymo cum pauco caſtorio, & aceto, ac oleo, decocto: aut caſtorio cum modico aceto trito, additoque oleo irino caput irrigandum. Ad hæc ſinapiſmo uti in capite prodeſt, ex caricis & ſinapi ex aceto contritis (ut in libro tertio De comp. medic. monſtrauiſmus) conſecto, ut a capite & ex alto ad circumferentiam tra-
D hat. Poſtea cucurbitulas occipiti affigere cum plurimo igne oportet, circa primam & ſecundam ceruicis vertebraſ, partim leues, partim cum ſcarificatione, ut nō ſolum a capite attrahant, verum etiam vacuent. Caſtorium quoque capiti illinendum. Quinetiam idipſum, quod docet Alexander Trallianus c. 20. libr. 1. potui dare cum oxymelite expedit. Nam vno hoc medicamento nonnulli multerrime toto corpore impediti, ſani-
E nitati ſunt reſtituti. Sit autem caſtorii, drachma vna. Oxymelitis, uncia vna. In hunc uſum etiam theriaca exhiberi poteſt. Præterea ad excretionē frequenter ſolicitare naturā oportebit, tum clyſteribus, tum iis quæ urinam mouent. Pubem oleo rutaceo, aut iri-
P no, cui ſit adiectum paululum caſtorii, aſpergere conuenit. In potu etiam danda, quæ craſſitiem attenuare & incidere valent: ut eſt apii, ſaniculo, adianti, & ſimilium decoctum, cum oxymelite ſimplici, vel ſcyllitico, & ſerapio byrantino. Nam ut deglutiant eiufmodi potio-
De nes crebrius admi- nendi ſunt: ideoque, ut per bombylium ori ſaltem inſtillantur, cura-
De bimus. In diuturnis lethargis, ubi vires ſuffecerint, danda hiera eſt ex colocynthide, ſternu-
De tamenta que ex elleboro albo ſtruthio, pipere, & caſtorio, aliaque (quorum paulo ſupra facta eſt men-
De tio) medicamenta admo uenda. Porro ubi morbus inclinare inceperit, geſtatio ſtatim continua utilis eſt, & balneum, quod ſupra modum conferre hoc tempore ſolet. Si-
De quidem Alexander Trallianus refert, ſe cognouiſſe quendam, qui grauiffimo lethar- go laborauerit, adeo ut ſe leuari non ſentiret. Is poſt ſeptem morbi dies balneum ingreſſus, tantum ſenſit auxilii, ut a ſomno ſtatim expergiſceretur, alioſque attente intelligeret, & ipſe verba expedite faceret, familiares omnes agnoſcens. Quod ſi
De vero balnei æſtum propter vires imbecillas ferre haud poſſit, ſaltem domi in ſolio a-
De quæ calidæ lauandus erit. Cauendum tamen, ne aqua caput ægrotantis perfundatur. Smegmate autem mordaciore in balneo detergendus, ut vini ſece uſta, ſinapi, pyrethro, pipere, lauri baccis, ſalce uina, & ſimilib. quibus duplum nitri addendum.

Decaro. C A P. XXIII.

KAROS proprie dictus, vitium est, quod sensuum, vniuersarumque motionum priuatio, spirandi tamen facultate manente illaesa, consequitur. Arabibus Rhazi praefertim, *Subet* appellatur. Alio nomine perniciosus dicitur, *ut lib. 3. Institut. nostrarum sect. 1. capit. 12.* copiosius ostendimus. Differt a lethargo, *Actio teste*, quia lethargici interrogati respondent, neque omnino muti decumbunt. Caro autem laborantes somni quidem profunditate occupantur: at si stimulantur, etsi sentiunt, nihil tamen dicunt aut loquuntur, neque oculos aperiunt. Praeterea, *ut Paulus annotauit*, febris earum praecedat, eaque vehementior: lethargum subsequitur. Item carus aliis symptomatibus superuenit: saepe enim febrium accessionibus, comitialibus, cerebri compressio-
Bnibus, nunc quidem esse, hoc est caluaria, fracto & coarctato, nunc vero membrana anteriorem cerebri ventriculum custodiente, compressa. Letargus autem propriam quandam consistentiam obtinet. Distat etiam ab apoplexia, quod in hac spiratio vehementer opprimatur, sic ut quispiam etiam magno conatu vix spirare possit. In caro autem spirandi facultas, *ut testatur Galenus lib. 4. De affectis locis, cap. 2.* haudquaquam laedatur. Fit caros proprie dictus, variis a causis, nempe ab humore frigido, crasso, ac omnino viscido cerebrum occupante. Item a frigiditate morbosa calorem innatum ad interiora reuocante, & cerebrum grauante atque opprimente in pituosarum febrium accessionum initiis. A vehementi capitis ictu, contusione musculorum temporalium: ossis perforatione, & ventriculi cerebri attritione. Signa
Cex iis, quae paulo ante commemorata sunt, facile colligi possunt. Siquidem somni profunditate occupantur, oculique in hoc vitio perpetuo conuiuent. Ceterum victus ratio & curatio eorum, qui caro laborant, eum lethargicorum plane conuenit, nisi quod ad maiorem incisionem attenuationemque declinamus. His vero in primis confert edere nasturtium aut coctum in iusculis, aut crudum in acetariis. Nihil enim est, quod cerebrum magis exsiccat, vimque & vigorem animi magis excitet, quam nasturtium. Vnde prouerbio dicitur, in socordes, somnolentos, ignauos, hebetes, stupidosque, *ede nasturtium*. Vt mirari subeat, aliquos inueniri, qui illud somnum conciliare scribant. Stomacho etiam cataplasmata & alia medicamenta, quae calefaciunt & corroborant, sunt adhibenda, quod is pituita, quae illum refrigerat & humectat, refertus sit. Quorum formulas describemus *libro tertio capit. 1. De ventriculi imbecillitate*.

Caros quid
Subet.
Differentia
eius a Le-
thargo.

Ab apople-
xia.

Causa.

Nota.
Vicus & ra-
tio & cura-
tio.

Decatocha & catalepsi. C A P. XXIV.

KΑΤΟΧΗ & ΚΑΤΑΛΕΨΙΣ Graecis, occupatio, detentio, & deprehensio omnium nimirum sensuum, Latinis dici potest. Recentiores medicinae scriptores *congelationem* nominant. Est autem *subita detentio & occupatio, tum mentis, tum corporis sensu ac motu priuati, aegro in ea corporis figura permanente, in qua fuerit correptus, sine sederit, sine iacuerit, sine clausis, siue apertis oculis perstiterit*. Detentio autem in qua oculi aperti manent, *Catoche* proprie nominatur. Ea vero, in qua oculi clausi sunt, improprie *catoche* vocatur, *ut libro tertio Institut. nostrarum sectione 1. capit. 12. fusius monstrauimus*. Quapropter medium quoddam inter phrenitidem & lethargum vitium est. Nam ratione frigiditatis cum lethargo conuenit: siccitatis autem ergo, cum phrenitide. Hinc est, quod hoc vitio affecti, neque plane phreniticis assimilentur, neque etiam lethargicis. Ac-
Ccidit hoc vitium nonnunquam ob sanguinis, melancholici scilicet, qui frigidus & siccus existit, copiam, *ut auctor est Actius*, in caput irrumpentem, ipsumque implem-
Ftem. Is enim commemorat, se olim hoc vitium conspexisse in adolescente, multo sanguine, melancholico nimirum, referto, qui quum dies tres exegerat neque con-
Fniuens, neque ad obiectas minas oculis nutans, neque respondens, quarta autem ingenti sanguinis, melancholici scilicet, e naribus eruptione facta, protinus omnes turbulentias recessisse. Fit etiam frequenter, *eodem teste*, a melancholico, hoc
Fest, frigido & siceo, humore, cerebri posteriora de Galeni *libro quarto de labo. locis cap. 3. sententia*, potissimum molestante. Galenus *libro primo de sympt. causis capite secundo* per consensum cerebri cum ore ventriculi, ubi scilicet humor pituitosus, aut vapor aut melancholicus sursum fertur. Ab utroque namque *catoche* fit, proprie dicta, a melancholico improprie vocata, a pituitoso, *ut loco supra citato monstrauimus*. Inuadit

Catocha &
Catalepsi.
Cögelatio;

Causa.

Nota.

Nota.

hoc vitii hominem subito, qui voce sensuque priuatur, nihil audit, nihil respondet, A
respiratio nulla ferè apparet, sed quasi mortuus decumbit. Pulsus est exiguus, lan-
guidus, & vehementer densus. Alius & vrina detinentur, aut certe parum reddunt;
idque non siccitatis prorsus ratione, quod æger humido interdum plurimo abun-
det, sed propter sensuum stuporem siue insensibilitatem. Facies alias subrubescit,
cum scilicet a sanguine melancholico vitium procreatur: alias vero liuet, quando ni-
mirum a melancholico humore ortum fuerit. Porro oculi in hoc vitio immobiles
plane manent, velati congelati. Differt autem a caro, quia Galeno *lib. 4. De laboran. af-*
fectis locis, cap. 2. teste, ut in hoc palpebræ perpetuo clauduntur, sic in catoche inter-
dum, vbi scilicet a pituitoso nascitur humore, apertæ manent. Distat etiam a lethar-
go, etsi enim utrunq; vitium sit a vehementi refrigeratione, tamen in lethargo, *ut re-* B
stat Galenus lib. 2. Aph. comment. 3. refrigeratio immixta est humiditati, in catalepsi
vero siccitati. Victus ratio pro causarum ratione variatur: Æger vero interim singu-
lis diebus, interim vno interposito nutrirī debet. Quare quum vitium hoc veliemen-
ter sit periculosum, si aut cibo aut potu erretur, operam dabit Medicus, ut se in vi-
ctus ratione adhibenda prudenter gerat. Alimenta autem sint ptisanæ cremor, &
huiusmodi. Aqua vero pota infestissima est. Flatum enim auget, fluctuationes cit,
lienem attollit, neque sitim restinguit: potus autem sit mulsæ, diutius cocta, & quæ
multum bullierit: aut vino vtatur aquoso, albo, tenui, ac subadstringenti, & bene dilu-
to, ut caput non percutiat. Quod ad rationem curandi spectat, si facies subrubescit, C
atque adeo æger sanguine melancholico abundare videtur, & vires validæ fuerint, C
cubiti venam exteriorem, quam cephalicam vocant, secare ne differas. Postea si ca-
put calidius appareat, ea quæ refrigerant adhibebis. In hunc usum oxyrhodinum,
vel papaueris calyculos in oleo decoquere oportet, ac eo subinde caput inungendum.
In reliquis, quibus scilicet facies liuescit, adeoque ex melancholico humore cere-
brum occupante vitium hoc accidit, primo clysteribus melancholicum suæcum tra-
hentibus aliis abluenda est ex floribus buglossi; capno, thymæ, epithymo; radice polypodii,
folliculis senæ, & iis similibus compositis, quorum formulas infra in cap. De melancholia produ-
cemus, quod si aliis sic non obediāt, ellebori nigri radicem tum quoque incoquere
non alium erit. Caput autem oleo chamamelino, in quo serpillum aut hyssopum, aut thy-
mus, aut simile aliquod coctum fuerit, aut liliaceo aut anethino, aut simili inungendum. Idque D
tum potissimum faciendum, vbi caput frigidius esse appareat. Porro si in vrina crassi-
ties affuerit, dandum etiam anethi, apii, calaminthæ, & aliorum quibus extenuandi facultas
inest, decoctum. Reliqua quæ ad curandi rationem necessaria sunt, partim ex capite De
phrenitide, partim ex eo quod De melancholia inscribemus, partim etiam ex eo quod De
lethargo est inscriptum, petenda erunt.

Diferimen-
inter cato-
chem & ca-
rum, ac le-
thargum.Victus ra-
tio.

Curatio.

De comate. C A P. XXV.

Κῆμα.
Sopor.

Komæ, ut auctor est lib. 3. Epid. com. 1. rextus septimæ expositione Galenus est *καταψυχῆς*, id
est, delatio in somnum, quum ægri vigilare nequeunt, oculos minime apertos, sed conuiuen-
tes potius habentes: vel profundo, aut tenui leuique somno, vel etiam vigiliis detinentur. Quocir-
ca Hippocrati & aliis Græcis Comaduum est generum, vnum quidem *καταψυχῆς*, id est, E
sommiculosum, vel *βαρὺ*, id est, graue: alterum vero *ἄγρυπνος*, hoc est, vigilans. Primum ita
dictum est, quod ægri in eo profunde & diu dormiant, ita ut vix expergisci pos-
sint. Hoc utique vitium Latinis grauis & profundus somnus dici potest. Significat
enim com somniculosum, siue graue profundum, ve non simpliciter longum somnum quod
nonnulli putauerunt, sed Galeno *lib. 2. Aph. comment. & lib. 3. Epid. com. 3. auctore*,
διωδιγῆτος, hoc est, eum a quo quis ægre & difficulter excitatur. Quare *καταψυχῆς* simpliciter, & si-
ne alicuius adiectione, vel etiam cum adiectione illa *καταψυχῆς ἄγρυπνος*, est vitium, in quo
ægri vigilare nequeunt, nec apertos habent oculos, sed conuiuentes; atque & unde facile exper-
gisci nequeunt somno detinentur. Cum hac vero adiectione, *ἄγρυπνος καταψυχῆς*, hoc est, vigilans
sopor, Galeno *com. 3. iam citati libri tertii Epid. teste*, est vitium, in quo ægri apertis ocu- F
lis vigilare non valent, sed conuiuent spe somni consiliandi, & vigiles tamen ma-
nent. Quare ut coma soporiferum a comate vigilante discernamus, necessarium
erit. Commune quidem est vtriusque non posse attollere oculos: statim enim gra-
uantur, & dormire cupiunt, hincque adeo est, ut vtrumque comatis appellationem
forti-

Κῆμα ἁπ-
λῶς.Κῆμα ἁγρυ-
πνόν.

A fortitum sit. Priuatim autem somniculosum id obtinet, vt in eo agri dormiant. In vigilante autem agri oculos quidem claudunt spe dormiendi, vigiles tamen permanent, vt hoc nomine facile discerni possint. De differentia vero generum soporis copiosius *lib. 3. sect. 1. cap. 11. Instit. nostrarum diximus*. Coma soporiferum, vt *testis est Galenus comment. primo, libri 3. Epid.* fit interdum, vbi cerebrum immodice irrigatur, vt nonnullis vsuuenit ebriis; repleto in ipsa ebrietate capite, atque admodum humectato. In febribus etiam soli vapores calidi & humidi a partibus inferioribus, fursum elati, cerebrum implentes & irrigantes, vitium hoc inducunt. Subinde etiam ob solum frigus, quod primum sensitiuum, hoc est cerebrum, occupat. Est cum ambobus iam dictis, hoc est frigiditati & humiditati, succedat somnus ille grauis &

Causa.

Primum
sensitiuum.

B profundus. Quo sane casu profundior & grauior somnus erit: velut tenuior, si a sola intemperie frigida vel humida ortum sit. Fit denique propter virium imbecillitatem, adeo iam languentium, vt apertas palpebras seruare haud valeant. Quare pulsus in ipsis languidissimus, tardus, rarus, & paruus est, quo ab eo comate quod humiditas & frigiditas committit facile distinguitur. Vigilans autem coma a pituita cum bile commixta nascitur. Agri in soporifero comate, *Actio teste*, demissa inferiori mandibula obdormiunt, ac quoties excitantur, nouo repente somno capiuntur. In vigilante autem enormia loquuntur, totoque corpore in composito iacent, & partim ea quæ in phrenitide, partim etiam ea, quæ in lethargo apparent, signa adiunt. Curandi ratio iuxta duplex coma variatur. In soporifero enim eadem quæ

Nota.

Curatio.

C in caro & lethargo adhibentur remedia; atque vt summatim dicam, post vniuersi corporis vacuationem, pro frigiditatis aut humiditatis ratione, calefactio vel siccitas intendenda est. Si enim ex humiditate tantum somniculosum coma originem ducit, iis quæ exsiccant capiti admotis curari debet, ex acerrimo videlicet aceto, cum rosæ, & chamæmelo permixto, eo irrigato, ac eiusdem medicamenti euaporatione per nares suscepta. Sin ex frigiditate, anethinum oleum, vel chamæmelinum calefactum adhibendum: ac quantum intentæ est frigiditas est, tantum etiam calefacienda augenda sunt, vt etiam pulegium & rutam aliquando in oleo coquere liceat. At si ex frigiditate, & humiditate iunctis excitetur, vt lethargus curatur. Si ex virium imbecillitate natum est, per ea quæ illas instaurare valent sanandum erit. In vigilante

D partim phrenitidis, partim etiam lethargi remedia locum habebunt. Vtrum autem aliud superare debeat, ex humore exsuperante cognoscitur. Si enim pituita superauerit bilem; magis ad lethargi remedia declinandum erit. Sin contra bilis pituitam vicerit, magis ad phrenitidis præsidia nos conuertemus. Quare auxilia quæ ad vigilantis comatis curationem sunt necessaria, e capitibus de phrenitide & lethargo petenda erunt. Glandes autem potissimum in hoc vitii genere conferent sedi suppositæ, quod irritando efficaces admodum sint.

De memoria abolita. C A P. XXVI.

M E M O R I Æ abolitio partim per se, partim etiam cum quadam rationis noxa accidit, quemadmodum & rationis noxa per se prius incipit: deinde memoria insequitur. Contingit autem vtranque pati nonnunquam actionem. Abolentur ambæ in lethargis, ceterisque soporiferis morbis. Fit etiam, vt prædictis vitiis iam solutis, obliuio succedat. Quod vbi acciderit, tum frigida omnino intemperies in causa erit, quod vel periit, vel grauiter læsa est memoria. Hæc nonnunquam humiditati, nonnunquam etiam siccitati iuncta est. Interdum autem vnaquæque prædictarum per se causa vitii esse potest. Quapropter causæ diligenter a Medico discernendæ sunt: Si itaque sola intemperies sicca cerebrum pertinaciter obfiscens causa vitii fuerit, vigilæ frequentes infestabunt. Sin humida tantum, torpores, & in somnum propensiones, somnosque longos & graues efficiet. Si vero humiditati frigiditas etiam accesserit, caros & lethargos creabit. Eorum itaque, quorum

F memoria periit, somnos obseruare oportet; vtrum scilicet vehementer an modice somnolenti sint, aut omnino non somnolenti. Sic enim vincetem inuenies intemperiem. Præterea considerandum est, vtrum excernant quippiam ex naribus, vel ab ore quod a capite defluat, vt *mōnet Galenus lib. 3. De affectu locis; cap. 5.* an aridæ huiusmodi partes sint, quippe ex iis affectu ipsum cōiectura consequi poterimus. Victus ratio pro

Causa.

Nota.

Viciu.

34 Operum Leonhard. Fuchſii Pars III.

Curatio.

cauſarum varietate mutatur, vt ex iis quæ paulo poſt dicemus, manifeſtum fiet. His in eum modum definitis, facile curandi ratio præſcribi poteſt. Nam ſi propter vehementes purgationes, ceteraſque immoderatas inanitiones, aut ſyncopas, atque adeo ſiccitatem memoriæ noxa ſuperuenerit, nulla alia re addita, victu tantum reficiente ſuccurrere oportet. Corroborato enim corpore, collectiſque viribus, memoria reparatur. Quæ autem ad eam victus rationem neceſſaria ſunt, ex capite *De hebetica febre* petent ſtudioſi. Si ob extremam ſenectam memoria pereat, fruſtra laborandum, ad moris ſcilicet remediis, non eſt: ſed tantum conueniente victus ratione contentos eſſe oportet. Verum ſi repente memoria defecerit, ceteris partibus incolumibus, epilepſiam, aut neruorum resolutionem, aut apoplexiam vereri oportet. Quare tum omni ſtudio ac diligentia prouidendum erit, ne tale aliquod accidat, quod futurum ſuſpicamur. Quibus enim præſidiis factum morbum repellimus, iisdem futurum arcebiſus. Quod ſi vero ex aliis morbis, vt lethargo & peſtilentia, memoria pereat, tum ſtrenue remediis contra eundem. Peſtilentiam autem ſequi memoriæ abolitionem, ſupra capite 20. ex Thucydidis hiſtoria, quam refert *Galenus in lib. De ſymptom. differentiis*, oſtendimus. Summa vero curationis in calefaciendotum intrinſecus, tum extrinſecus conſiſtit, ſi a frigida plane cerebri intemperie nuda vitium ortum fuerit. Calefactoria itaque medicamenta tam extra, quam intra, vt dictum eſt, corpus adhibenda. Extrinſecus autem inunctiones capiti ex oleo calido, idque æſtate, adhibenda. Hyeme vero iterum cum aceto acriori, interdum ſerpyllo, calamento, & iis ſimilibus in eo decoctis. Quidam etiam adiiciunt piper, & lauri baccas, Vtile & caſtorium, cum oleo occipiti illitum. Confert etiam hoc vnguentum, quod accipit: *Olei a lateribus, de caſtorio, utriusque unciam dimidiam. Radicis acoriphi, utriusque ſcrupulum unum. Pyrethri, ruta, utriusque ſcrupulum dimidium.* Cum cæra quod ſatis eſt, fiat vnguentum, quo raſum occipitium inungatur, & ſubinde ſacculus imponatur, qui accipit: *Florum roſmarini, meliſſophylli, lauandula, ſingulorum manipulum dimidium. Florum ſambuci, manipulum unum. Stichadis, drachmas tres. Nucis moſchata, ligni aloes, maceris, ſingulorum ſcrupulum unum. Contuſa in ſericum dimittantur, formeturque ſacculus.* Eius farinæ medicamenta complura e ſuperioribus capitibus petenda erunt. Intro in corpus autem acorus conditus, ſaccharum florum betonica, maiorana, roſmarini, lauandula, ſpica nardi, meliſſophylli, ſaluia, adiectis pipere, garyophyllis, cinnamomo, & id genus aliis odoramentis ſumantur. Si vero a frigiditate & humiditate memoriæ abolitio fiat, non tantum ad calidum, verum etiam ad ſiccum vergat vniuerſa victus declinabit. Hicra picra exhibenda, quæ vacuando nihil vtile ſecum trahit, ſed id tantum quod moleſtum eſt educit. De n. apophlegmatismi, ſternutamenta, & reliqua, quæ caput per os & nares purgant, admouenda. Sinapiſmus quoque capiti vtiliter applicatur. Quod ad victus rationem attinet, alimenta ſint, quæ calefaciendi exſiccandique vim obtineant. Ab inſtigidantibus omnibus abſtinendum erit, & oleribus, & fructibus bellariis, caſeo, & lacte, aliisque quæ ſtatuſ gignere poſſunt, craſſioris ſucci ac humectantibus alimentis. Acriora vero ex interuallis alimenta afferenda, vt ſunt *origanum, thymbra, quam ſaturciam vocant, pulegium, & eiufmodi.* Cauere autem oportet in vniuerſum cruditates, tanquam rationi ac menti infeſtiſſimas. Dandum ægrotantibus vinum tenue, aibum, & valde antiquum: ſua enim moderata caliditate cum alia non pauca efficiat, animam etiam tranquillam, feſtiuamque reddit, conſonos illi motus præbendo. Plurima vero aquæ, multoque magis vini potio peſſima eſt: vehementer enim humectat caput, ac nihil æque obliuionem inducit, quam humiditas. Somnus ſit temperatus, citra ſatietatem. Veneris uſus rariſſimus: neque enim totius corporis ſanitati, neque rationis actioni, ſi immoderata fuerit, confert. Balneo etiam, potiſſimum a ſinapiſmis, locus erit. Quod ſi ex pituitæ reduridantia memoria amiſſa fuerit, eam prius concoquere & præparare, dein medicamentis conuenientibus vacuare oportet, ad eum modum, qui in præcedentibus capitibus expoſitus eſt. Si ex frigida & ſicca cerebri intemperie obliuio orta ſit, aut ex melancholico humore, curationes e ſuis petendæ locis erunt. Hæc pro reparanda abolita memoria ſufficiunt in præſentia. Alia enim quæ requiri poſſunt, ex ſuperioribus petenda erunt.

De Apoplexia. C A P. XXVII.

APOPLEXIA est, ubi patiente communi neruorum principio, subito omnes corporis parti-
 cula motum simul & sensum amiserunt. Vel est priuatio sensus & motus in vniuerso corpore,
 cum functionum a voluntatis imperio predeuntium lesione subito superueniens. Si in altera dun-
 taxat parte obstructio fuerit, ^{in vniuerso corpore} Græcis, resolutio Latinis dicitur, ut ca-
 pite sequenti clarius docebimus. Fit a pituoso, hoc est, frigido, crasso, lentoque humo-
 re, ventriculos cerebri principalissimos vna vice & cumulativè replente, quem ni-
 mia cruditates, crebræque potissimum ebrietates procreant. Contingit etiam ob
 casum, autictus cerebrum concutientes, atque ut illuc humores confluant efficien-
 tes. Aeris quoque admodum frigidi occursum, qui cerebri humiditates & excremen-
 ta coarctat, & constringit. Præcedit hoc vitium capitis confertus & acutus dolor, & in-
 gularium venarum elatio, vertigo, oculorum splendores, & extremarum partium sine ratione
 refrigeratio, totius corporis palpitatio, difficilis motus, & dentium inter dormiendum stridores:
 urinam emittunt aruginosam, nigram, paucam, & farinaceum sedimentum habentem. Qui au-
 tem in hunc morbum acutissimum & extremum incidunt, sensu omnino carentes,
 mortui viuunt. Quapropter clausis oculis instar dormientium decumbunt, atque
 stertunt. Discernitur vero vitii magnitudo ex noxæ, quam inspirationi infert, vehe-
 mentia. Vbi enim hæc ipsa naturalem ordinem, plurimum egreditur, magnam:
 ubi autem paulum impedimenti est, parvam in cerebro noxam esse conicere oportet.
 Omnium vero pessima spiratio putanda est, quæ intermittitur, & magna cum
 violentia trahitur. Hoc vitio correpti, ut dormientes, oculis clausis decumbunt, &
 nonnunquam stertunt. Spiratio in illis nonnunquam tam est exigua & debilis, ut
 sensum effugiat, iacentque mortuis per similes, ii præsertim qui corde sunt minus ca-
 lido. Lana igitur carpta, aut accensa candela horum naribus, & ori admouenda e-
 rit: aut poculum aqua plenum thoraci: quæ si moueantur, respirationis & vitæ sunt
 indicia. Licet autem nullum vitæ indicium appareat, tamen ante tertium diem ex-
 actum non sunt sepeliendi, quod multi reuixisse visi sunt. Id genus vitii senes maxi-
 me, qui temperatura sunt pituitosiores, & qui simili vsu sunt victus ratione, occu-
 pat. At si in iuuentute atque ætate tempore aliquem inuaserit, vehementem ne-
 cessitatem portendit. Vitium hoc nequaquam, aut raro curatur: neque enim teme-
 re ab Hippocrate est dictum: *Apoplexiam vehementem soluere impossibile, debilem vero*
non facile. Mortem enim minatur celerem. Qui eius periculum effugerint, in diu-
 turnum subinde malum incidere solent, aut quibusdam membris, aut vniuerso cor-
 pore resoluti, sæpe etiam ratione violata. Qui igitur quoquo modo curationem re-
 cipiant, iis statim sanguis ex utrisque humeratis modo plenitudo adfit, viriumque
 robur, detrahendus est. Lata vero venæ sit incisio, ut sanguis crassus eo expeditius
 promanet. Præterea alius clysteribus acribus ducendus est, qualis est qui acci-
 pit: *Salvia, origani, betonica, ruta, stichadis singulorum manipulum unum. Calamintha,*
hyssopi, pulegii, singulorum ad manipulum dimidium. Seminum fœniculi, fœselis (siler monta-
num nominant) ammi, singulorum drachmas tres. Centaurii minoris, manipulum unum. Radi-
cis polypodii, drachmas sex. Agarici optimi, drachmas tres. Seminis cartami, drachmas duas &
dimidiam. Medulla colocynthidis, drachmas duas. Decoquantur in aqua iuste quantitatis, do-
nec dimidium eius absumatur. Dein recipiantur iuris decocti, uncia una & dimidia. Hierapi-
ra, benedicta laxatiua, utriusque unciam dimidiam. Antidoti indi, drachmas tres. Diapheni-
con, drachmas duas. Mellis rosacei colo transfusi unciam unam & dimidiam. Oleorum laurini, ru-
tacei, de castoreo, singulorum unciam unam. Salis fossilis (gemma hodie vocant) drachmam unam
& dimidiam. Commixtis omnibus, fiat clyster. Commendatur etiam mirificæ vsus
glandium, quæ ex colocynthide, agarico, elleboro nigro, sale gemma vocato, & similibus confi-
ciuntur. ut sunt eiusmodi, quæ accipiunt: Mellis cocti & concreti, uncias duas. Colocynthi-
dis, agarici, ellebori, singulorum scrupulos duos. Salis fossilis saxei, scrupulum unum. Redactis iis o-
mnibus in puluerem, cum melle misceantur, & formentur glandes longitudine sex aut plurimum
etiam digitorum, filo appenso, ut pro arbitrio extrahi queant. Post hæc totum corpus po-
tissimum autem spinalis medullæ initium, oleo copioso calido, cui prius serpyllum ca-
lamintha, anethum, aut simile aliquod incoctum fuerit, inungendum. Extremis
etiam corporis partibus ligaturæ, & frisiones vehementes & asperæ cum decocto

Apoplexia
quid.

Causa.

Nota.

Apoplexia
magnitudo.Quos po-
tissimum
occupet.Curatio.
2. Aph. 44.Clyster a-
cria.Sal gemma
Glandes.

Percussio.

36 Operum Leonhard. Fuchsi Pars III.

radicis iridis, adhibendæ. Cucurbitulæ quoque cum scarificatione occipitiõ & humeris affigendæ. Caput denique prius ralum irrigandum oleo chamamelino, anethino, rutaceo, aut eo in quò prius illa, quæ paulo ante commemorata sunt, decocta fuerint. Theriaca quoque & mithridato dissolutis in stillaticio liliorum conuallii, vel lauandulæ liquore vtendum. Naribus admouenda ea, quæ odore suo excitare ægrotantes solent, vt est opopanax, castorium, piper, sagapenum, galbanumque. Sternutamentorum quoque ratio habenda erit, quæ ex pyrethro, elleboro albo, castorio, & aliis quæ in superioribus dicta sunt, constant. Embrocharum etiam vsus conuenit e chamameli, meliloti, saluia, pulegii, maiorana, origani, calaminthæ, & saturiæ decocto paratarum. Præstat tamen siccis vti medicamentis, cuiusmodi sunt sinapismi, qui a nostris hodie emplastra rubificantia vocantur: qualis est qui accipit: Olei costini, unc. vnam. Olei e castorio & euphorbio, vtriusque drach. tres. Sinapis, drach. duas. Castorii, drachmam vnam. Sagapeni, drachmam vnam & dimidiam. Euphorbii, scrupulum vnum. Aceti, drachmas duas. Cum cera quod satis est, ad emplastri consistentiam coeant. Proderit etiam ante Sinapismi admotionem caput inungere oleis laurino, rutaceo, de castorio, adiecta aqua vitæ vocata. Sartago præterea, Raze auctore, calefacienda, & capiti calida admouenda. Oportet etiam ori, vi aperto, digitum vel penam oleo irino madefactam inferere, vt ea quæ insunt, eliciantur. Porro sedes quoque iis medicamentis quæ flatu educunt, ruta, cumino, nitro, & melle illinenda. Vbi vitium remiserit, cibus exiguus, leuis, mollis, distribui facilis, & succulentus, adiecto fere semper melle, assumendus, vt est gallinarum, aut pullorum ius cui hyssopus, serpyllum, saturiæ, maiorana, aut saluia incocta sunt. Si vox nondum redit, & vires permittunt, Cucurbitulæ occipiti cum scarificatione affigantur. Si fieri possit, etiam hypochondriis. Ægri postquam ab accessione liberati sunt, atque euaserunt, remediis ii quæ mox sequenti capite dicemus vtendum erit, dein vehantur curru, aut lectica, aut pensili lecto gestentur. Porus sit mulsa, siue oxymel. Caueant sibi a vini potione. Post 21. diem, ægroti balneo aereo & sudatorio credantur. Verum de medicamentis, quæ ad reliquam curandi rationem requirantur, sequenti capite copiose dicemus.

De resolutione alterius lateris. C A P. XXVIII.

Resolutio. **Παρεσυνα** quæ Latinis resolutio dicitur, Galeno lib. 3. De laborantibus locis, cap. 10. auctore, est, vbi alterum duntaxat latus aut dextrum aut sinistrum, sensum simul ac motum amittit. Interdum etiam in vna aliqua tantum parte (verbi gratia) manu, crure, lingua, accidit. Animaduertendum autem hoc loco erit, quod resolutio ea, quæ sequitur apoplexiam, vt testatur Galenus libr. 4. Vict. acut. comment. 23. priuatim Græcis **Παρεσυνα** nominatur. Proinde paralyssis nomen generalius est, quam paraplegia, quod hæc solam eam, vt dictum est, quæ ex apoplexia fit: illa vero omnem resolutionem ex quacunque occasione ortam, significet. Ceterum quum per resolutionem interdum sensus tantum, interdum motus, nonnunquam ambo pereant: neruorum resolutio potissimum dicitur, vbi modus deperditus est. Cur autem nunc duntaxat sensus, nunc motus tantum, iam vero vterque simul admittantur, Galenus libr. 1. De symptomatibus causis, cap. 5. copiosissime explicat, vt non sit opus hæc a nobis denuo commemorari. Hoc autem in præsentia dixisse satis sit. Neruos ad cutem desinentes, quod cutis motu careat, sensum duntaxat afferre: eos vero qui musculis additi sunt, sensum motumque illis impartiri. Quapropter si cutis nerui fauciantur in vulneratis, aut si eos noxia materia lacescit, atque occupat, tum sensus amittitur. Sin illi nerui læduntur, qui in musculos inferuntur, illis qui ad cutem feruntur illæsis, amitteretur quidem motus, sed persistat sensus: quod si vtrique noxa illata fuerit, & sensus & motus peribunt. Generatur quidem a multis crassis & lentis humoribus neruos aut neruorum principia obstruentibus, qui ne animalis facultas a principe parte ad membra delabatur, impediunt. Hac sane ratione refrigeratio ingens ex niue, compressioque neruosorum corporum, resolutionem efficere possunt. Ad eius vitii dignotionem multis indiciis minime opus est: nemo enim non videt eam partem quæ motu destituta est, resolutione affectam esse. A qua vero causa acciderit, partim ex ægri relatione, partim etiam ex signis supra de dolore capitis & pituitosis humoribus orto commemoratis, deprehendere licebit. **Victus.** ratio in vniuersum attenuatoria & siccans esse debet. Versetur itaq; æger in aere calido & sicco: qui si talis haberi nequit, indu-

- A** industria Medici paretur, igne luculento, suffitibus ex caryophyllis, & aliis id genus. Primisque tribus diebus tenuissimo utatur victu, hoc est, omnimodam sustineat in ediam, aut solius melicrati vii, aut paucis ptisanæ succo contentus sit. Dein cibi boni succi, & concocti faciles, assidue exhibendi, montanarum præcipue auium, & perdicum carnes, oua forbilia, amygdalæ & pineæ. Panis sit bene coctus, admisto aniso, aut melanthii semine. Inter olera utatur æger *feniculo, petroselino, hyssopo, maiorana, salvia, & satureia*. Vitet pisces, fructus, & omnia frigida humidaque. Potus sit exiguus, sitimque quam potest maximam sustineat. Bibat mulsam, cui salvia, aut cinnamomum incoctum aut admixtum sit. Vel utatur potu, qui hodie a barbaris Medicis Hippocras nominatur, qui accipit: *Cinnamomi selecti, uncias duas. Zingiberis, unciam dimidiam. Piperis longi, granorum* Hippocras potus.
B *paradisi, acori, (quem hodie galangam maiorem appellant) sing. drachmam unam. Cardamomi, drachmam unam & dimidiam. Nucis moschate, garyophyllorum, maceris singulorum drachmam unam. Decoquantur in aqua fontana libe sex, donec quarta pars, hoc est, libra una & dimidia absumatur.* Ius decocti refrigeratum colo transfundatur, diligenter iis, quæ decocta fuerunt expressis, & cum sachari libra dimidia, huic dulcedo concilietur, fiatque potus. Vino abstinendum, donec virium totum deficiat. Aut si difficulter propter consuetudinem tanto tempore a vini porione arceri potest æger, aut virium imbecillitas vini usum suadeat, detur quidem, at non nisi modicum, aquosumque, & in morbi inclinatione. Motus atque exercitium, si illis uti conceditur, summe conducunt. Somnum fugiat diurnum. Nocturnus vero sit mediocris. Gaudeat, & animi perturbationes fugiat. Curatio.
C ratio, si permiserit ætas, habitus corporis, anni tempus, & similia, a sanguinis missione auspicanda, potissimum ubi plenitudinis indicia affuerint. Oportet tamen detractio- nem esse moderatam, ne corpus refrigeretur, sanguisque a lateribus incolumioribus auferendus. Dein aliquot diebus a sanguinis missione transactis, alius clysteribus irri- Clyster.
tanda erit, quorum hæc formula, quæ accipit: *Milua, althæa, mercurialis, chamamelis, salvia, beonica, singulorum Manipulum unum. Stachadis, unciam dimidiam. Ruta, calamintha, utriusque manipulum dimidium. Seminum feniculi, ammeos, utriusque drachmas duas. Decoquantur in aqua, quoad tertia pars absumatur. Dein accipiat iuris decocti libra una & dimidia. Benedictæ laxatiuæ, uncia dimidia. Antidoti indi, drachma tres. Mellis rosacei, uncia dimidia. Oleorum laurini, irini, rutacei, singulorum uncia una. Salis fossilis saxei, drachma una. Commistis omnibus fiat clyster.* Post hæc decocta & serapia pituitæ & humores exte- nuantia, atque expulsionem idoneos reddentia exhibebis, quorum formulas supra capi- te decimotertio recensuimus. Quibus peractis, quæ humores molestantes euacua- re possunt medicamenta, bibenda propinabimus. Sunt autem præter ea, quæ capite iam Purgantia
citato commemorauimus, *pilula azieret, de hiera composita, arabica, sterida, quibus nunquam non agaricum admiscendum erit.* Neque semel tantum purgandi sunt ægri, sed sæpius, qua- tuor vel quinque semper interpositis diebus. Atque initio leuius, dein vero fortius me- dicamentum exhibendum. Quid multa? paulatim a leuioribus ad vehementiora pro- grediendum. Namque non semel tantum, sed sæpius purgandi sunt ægri, interposi- tis tamen semper diebus quibusdam: Sequentia purgatione die, *theriaca, & Mithrida- datæ antidotus* magna cum utilitate exhibentur. Purgato iam vniuerso corpore, sternu- Capitis
tamentis, apophlegmatismis, gargarismis, odoramentis, & aliis, quæ in capite 13. com- purgatio.
memorauimus, vtendum. Nam id genus medicamenta pituitam, quæ in cerebro reli- qua est, educunt, & ne ad affectas partes defluat, prohibent. Capiti denique, vnde to- tius morbi radix exoritur, calida medicamenta illinenda, *castorium nimirum, peucedani radix, menta, bacca lauri, irino oleo, cui parum aceri adiectum sit, incocta.* Quare si aeris am- bientis frigiditas haud impedierit, caput radendum, totumque ad frontem vsque in- ungendum. Proderit etiam purgationi subiicere conseruas *salvia, rosmarine, maio- rana, lauandula, ac spica, quæ stachadis sunt species, adiectis theriaca, confectioe diamoschi, di- ambra, & id genus aliis.* Præterea medicamenta etiam, quibus discutiendi inest facul- Discuti-
tas, iis locis, vnde nerui, qui ad latus male affectum, sensum aut motum, aut vtrumque deterentes, oriuntur, ad mouenda erunt. Id quod Galenus libro 3. de male affectis locis, cap. 10. Pausaniæ Syri sophistæ exemplo luculenter ostendit. Verum a leuioribus sem- per auspicandum, nimirum *oleis chamamelino, anethino, e spica, liliaceo, & irino:* quibus latus quoque resolutum fouebimus. Quod etiam hoc nomine, nempe vt calefiat, li-
D D

teis, aut pelle vulpina, & similibus operiemus: aut decocto *salvia maiorana, chamæpitjos, A*
calamintha, hyssopi, lauandula, origani, verbasculi, quod herbam *paralysis* nominant, *chame-*
meli, hyperici, stichadis, & rosmarina fouebimus. Deinde ad valentiora progrediendum, o-
 leum nimirum *costinum, vulpinum, rutaceum, laurinum, e vermib. de castorio, e lateribus*, quod
Philosophorum etiam hodie nominant, & de *euphorbio*. His adiiciuntur nonnunquam vn-
 guenta *aregon, agrippa, martiati, & alia* medicamenta simplicia calefacientia, vt est *beto-*
nica, salvia, rosmarinus, radix acori veri, verbasculum odoratum (herbam *paralysis* hodie vocant)
ruta, calamintha, pyrethrum, piper, castorium, & euphorbium, atq; in eum aut similem modum
 paratur vnguentum, quod accipit: Vnguentorum *aregon, martiati, utriusq; unciam vn-*
guenti agrippa, unciam dimidiam. Oleorum *costini, vulpini, utriusq; drachmas tres*. Olei de *vermi-*
bis, unciam dimidiam. Olei e *castorio, drachmam vnā & dimidiam*. Pulueris *betonica, piperis, sal-*
uia, singul. scrupulum vnum. Castorei, *euphorbii, utriusq; scrupulum dimidium*. Radicis *acori, scru-*
pulos duos. Cera quod satis est, fiat vnguentum. Vel tale, quod accipit: Oleorū *costini, uncias duas.*
 De *piperibus unciā vnā & dimidiam*. Olei de *euphorbio, drachmas duas*. Vini (vt vocant) *subli-*
mati, aut aqua vitæ, uncias duas & dimidiam. Succorū *salvia, verbasculi odorati, utriusq; unciā*
vnā & dimidiam. Radicis *acori, seu galanga maioris, drachmas tres*. *Stichadis, rosmarini, utrius-*
que drach. duas. Radicis *pyrethri, piperis, utriusq; drachmam vnā*. *Euphorbii, drachmam dimi-*
diam. Tusa decoquantur, donec vinum & succi absumentur: dein exprimantur olea, & adiecta cera
 Ceratū. quantum satis erit, singatur vnguentum liquidum, & molle instar linimenti. Ad illorum exem-
 plum componere licebit cerata, in hunc aut similem modum, quæ accipiunt: *Baccarum*
lauri, pyrethri, piperis, singul. drachmas duas. Radicis *acori veri, (nam eum semper hoc nomine intel-*
ligimus, non autem vulgarem) drachmam vnā. *Stichadis, betonica, sambuci, singul. drachmam vn-*
ā & dimidiam. *Sinapi, nigella, utriusq; drachmam vnā*. *Euphorbii, castorei, utriusq; scrupu-*
lum vnum. Olei *costini, unciā vnā & dimidiam*. Oleum de *piperibus, unciā vnā*. Olei de *e-*
uphorbio, drach. tres. Cum cera & resina *terebinthina*, quod satis est, fiat ceratum. Porro membris
 patientibus cucurbitulæ sunt admouendæ leues, & citra scarificationem, vt ad ea lan-
 guinem, atq; adeo calorem & spiritum trahant. Quod si imponendis cucurbitulis minus
 apta fuerint, vicinis saltem applicentur. Post cucurbitulas prædictis vnguentis & ceratis,
 ita tamen, vt prius laborantia membra fricentur, vtendum. Neq; parū conducet ex præ-
 dictis maxime herbis paratum. Decocti namq; iure lapides igniti irrigantur. Laudatur
 autem in sudore præ aliis arctii, *Bardanam* vulgo vocant, radix. Laconicum, aut si haberi
 Balneum. possint balneæ per se natæ (*thermas* hodie vocant) sulphureæ, bituminosæ, nitrosæ, & sal-
 uginosæ: quales sunt in Germania nostra *Badenia, Ferina iuxta Martianam syluam, & Cel-*
lenses, vt in nostris institutionibus lib. 2. sect. 5. cap. 28. copiose diximus. In laconico autem, si vi-
 res ferre possunt, ægrotus diu moretur, mane & vespere. A laconico lecto decumbens ita
 se componat, vt mediocriter saltem sudet. Vbi sudauerit, sudorque abstersus fuerit, vn-
 gatur origo neruorum oleis, vnguentisque paulo ante dictis. Sunt qui non tantum laco-
 nicum ex herbis calefacientibus, & exsiccantibus, atq; attenuantibus, ac sudorem mo-
 uentibus, sed & bituminosum, vel sulphureum hoc modo parant. Accipiūt aquæ quan-
 tum ad innatationem sufficit, atq; ad libras aquæ centum, sulphuris aut bituminis libras
 sex adiiciunt. Verum ideo quod naturale est imbecillius, minusque efficax. Præstat ta-
 men, vt gestationes in curru, vehiculo, aut lectica præcedant. Hæc pro curatione reso-
 lutionis alterius lateris sufficere arbitramur.

De resolutione, quæ vnā aliquā tantum partem obsedit. CAP. XXIX.

ET si quis peritus artis, facile ex iis, quæ diximus *superiori capite*, eam etiam resolutio-
 nem, quæ in vna aliqua duntaxat parte motu voluntatio, vel sensu prædita accidit,
 curare queat: tamen ne imperitiores aliquid desiderent, breuiter etiam resolutio-
 num quarundam partium curationes trademus, auspicati a spalmo cynico. Est au-
 tem *μυωδὸς ἀνακλῶς, musculorum mandibularium resolutio, in qua os & nares, atque omnino me-*
dia faciei pars in obliquum declinant, & distorquentur. Qui hodie fastitant medicinam, hoc
 genus vitii *Torturam oris* vocant. Huic quidem cum resolutione, quam præcedenti ca-
 pite tractauimus, curatio communis est. Nam & sanguinis missio, si nihil impe-
 diat, & purgatio vehemens, & clysteres, linimenta & alia, quæ ibidem produximus
 medicamenta, conducunt. Quæ tamen peculiariter ad hanc pertinent, sunt sangui-
 nis a venis sub lingua missio, cucurbitulæ primæ & secundæ vertebræ affixæ, errhina,
 & apo-

Vnguen-
tum.

Alind.

Ceratū.

Cucurbi-
tulæ.

μυωδὸς
ἀνακλῶς.

Tortura
oris.
Curatio.

P

- A** & apophlegmatismi, quorum hæc sit formula, quæ accipit; *Seminis staphydis agria, masti-* Apophle-
ches, radices pyrethri, singulorum drachmam unam. Hyssopi, organi, viriusque drachmam unam & gmatif-
dimidiam. Sinapi, drachmas duas. Trita excipiantur terebinthina resina, aut rosaceo melle, & cera mus.
adhibita fiant pastilli mansiles. Porro ligatura, quæ in oppositum, æqualiter veluti capi-
strum aliquod, partem resolutam trahit, admoueri debet. In hunc usum etiã condu-
cit crebro specula intueri, quo videntes faciei torturam ægri, eam corrigere summo an-
nitantur studio. Parti autem laboranti, hoc est, nervis a tertio pari ortis, medicamenta,
quæ in præcedenti capite sunt commemorata, imponenda erunt. Sciendum tamen
hoc loco erit, non eam maxillam, quæ peruersa esse apparet, sed oppositam resolutione
infestari. Nam semper pars vbi resoluta fuerit, in diuersum trahitur musculus. Sana
B namq; pars proprio musculorum munere fungens, oppositam sibi partem relaxatam
ad se trahit. Vbi lingua fuerit resoluta, vniuerso corpore prius vacuato, venas sub ipsa ex- Lingua
sistentes incidere oportet, & cucurbitulam mento admouere. Apophlegmatismis quo- resolutæ
que, collutionibus, & gargarismis ex saluia, rosmarinæ, hyssopi, calamintha, stachade, curatio.
sinapi & similibus vtendum. Exercitia denique linguæ non negligenda, occipitque &
cervici vniuersæ acria vnguenta & linimenta illinenda. Cerata quoque & sinapismos
ponere curet Medicus. Postremo admotis cantharidibus cum fermento aut axungia
vesiculæ in ceruice excitentur. Rumpantur deinde, & brassicæ folia superponantur, a- Vesicæ re-
qua tandem vacuata mox loqui incipient. Vesica resoluta, siue vrina detineatur, siue solutæ cu-
præter voluntatem excernatur. Imo ventri & interfoemineo medicamenta communia ratio.
C applicanda sunt. Iam dictis quoq; oleis ac medicamentis tota vesicæ regio ac penis in-
ungantur. Sedi immittendum oleum rutaceum, nardinum, & spica: aut oleum in quo e-
ryngii radix, ruta, aut cuminum, aut anethum, aut simile aliquid decoctum fuerit. Vti-
liter etiam iis butyrum, castorium, galbanum, vel opopanacem admiscebis. Vesicæ quo-
que hæc per colem transmissa valde profecerunt, vel sola etiam suffecerunt. In primis
itaque qui nihil vrinæ reddunt, per vrinariam fistulam (quam *cathetera* vocant) vrina eli-
cienda erit, dein medicamenta, quæ modo diximus, in vesicam per angustissimum tu-
bulum paruo vtri insertum, vt catheteri aperte cohærere queat, infundenda. Dictu e-
nim mirabile est, quanta ex huiusmodi iniectionibus post vrinæ excretionem sequatur
utilitas. Benefaciunt etiam medicamenta vrinam cientia potui data, con similitur casto-
D rium. Præterea laxantibus insidebunt ægri, & cataplasmata inde conficiemus. Cole re- Colis re-
soluto, seminis, non vrinæ, excretio, & concubitus impeditur. Oportet igitur iisdem soluti cu-
præsidiiis (*qua in vesica resolutione commemorauimus*) vti. Priuatim autem lumbis & coxa- ratio.
rum vertribris calefactoria adhibenda, & ea quæ virgam intendere valent, *de quibus suo*
dicemus loco, usurpanda medicamenta. Præter reliqua vero, *Ætio auctore*, cervi puden-
dum foemori tanquam cingulum illigatum, eiusdemque carnes comestæ, & ex auibus
sturni, sic affectis plurimum conducunt. Castorium autem tum huic, tum aliis omni-
bus resolutionibus efficacissime accommodatur. Vitare autem præcipue oportet sic la-
borantes, cibos & potus refrigerantes. Harum partium exemplo facile reliquas etiam
curabit peritus Medicus, modo causas resolutionis diligenter cognoscat, & deinde
E curandi methodum obseruet.

De Epilepsia. CAP. XXX.

- E**pilepsia nihil aliud est Græcis, *Galeno libro 3. De affectis locis cap. 5. teste*, quam *conuulsio vni-* Epilepsia.
uersarum corporis partium, non perpetua, sed qua ex temporum accidit intervallis, cum mentis
& sensuum obtusione. Sic autem dicta est, *Tralliano lib. 1. cap. 17. teste*, quod ægri rerum obli-
uiscantur, & sensus eorum detineantur, vel, quod sensum capitis, atque mentem pariter
apprehendat. Latini, præsertim Celsus *libr. 3. cap. 3. morbum comitialem* nominauerunt Comitia:
quod ea laborantes, in comitiis manifestabantur, comitiaque quo die aliquis concidisset, lis mor-
interrumpebantur. Tres sunt eius vitii differentiæ: quas vbi commemorauimus, bus.
causas simul explicabimus. Gignitur enim primum hoc vitium, vbi cerebrum primo- Tres epi-
F genia ratione laborat: id quod accidit, si crassus lentusque pituitæ, vel melancholicus lepsiæ dif-
humor spiritus meatum in cerebri ventriculis obstruxerit, nervorum principio se- ferentia.
quante, quo id quod noxium est expellat & excutiat. Cerebrum enim partem Causa.
ipsum nullam laxiorem amplioremque ac capaciorem ad excipienda & excutienda
excrementa hæc crassa & lenta, obstructionemque efficientia habet, quam ventricu-

- II. los suos. *Secundo* fit propter consensum oris ventriculi male affecti, quum scilicet cere- A
brum ob acres humores in ventriculo contentos osque eius mordicantes & affligentes
in consensum ducitur: vel propter vapores ab ore ventriculi sursum ad cerebrum ela-
tos, quos illud tanquam noxios excutere nititur. Sic Galenus *libro 5. De affectis locis, capi-*
te 5. Grammaticum quendam iuuenem fuisse tradit, qui quoties vel vehementius do-
ceret, aut cogitaret, aut in ediam sustineret, aut irasceret, comitiali morbo corri-
piebatur: idque non alia ratione, quam quod os ventriculi, utpote quod exquisito sen-
su præditum erat, primaria ratione pateretur, ac deinde per consensum ipsum quo-
que cerebrum, ut nihil mirum sit, quod totius corporis conuulsio postea consecuta sit.
Scribit etiam idem eodem in loco quosdam ob vehementem cruditatem, qua os ven-
triculi affectum fuit: item alios quod meracioris vini plus bibissent epilepsiam incidisse. B
- III. *Tertio* accidit epilepsia, at raro admodum, cum a parte aliqua corporis veluti quædam
frigida aura, ægro id ipsum etiam sentiente, ad cerebrum vsq; ascendit. Hoc genus mor-
bi comitialis, Galen. *lib. 3. de affectis locis cap. 9.* scribit, se vidisse in puero, qui decimum-
tertium ætatis annum agebat. Quum enim ipse adolescens etiam dum, cum optimise-
ius tempestatis Medicis cōuenisset ad idoneam inueniendam curationem, audiuit tum
narrante puero, malum ipsum a crure initium capere, mox illinc recta ascendere per
fœmur, & imminentes illi lumbos, ac per latera ad cervicem, donec ad cerebrum per-
ueniret, quod cum primum tangeret, ipsum haudquaquam sibi constare. Vnde perspi-
cuum fit, epilepsiam primogeniam a crassis & lentis humoribus cerebri ventriculos ob-
struentibus perspicuo fieri. Siquidem propter iam dictos crassos humores spiritus mea- C
tus in cerebri ventriculis obstruentes, cerebrum seipsum quatit & contrahit, ut id quod
noxium est excutiat. Neque enim facile illi ob crassitiem dilabuntur, ut igitur excutian-
tur necesse est. A crasso autem humore vitium hoc fieri Galeno *lib. 3. de affect. locis cap. 7. se-*
ste, argumento est, quod & subito fit, & soluitur confestim. Subitaria namque meatuum
& ventriculorum cerebri obstructio, non nisi a crasso lentoque humore fieri potest. Si-
quidem siccitas sensim & paulatim multoque tempore efficit, ut cerebrum corii instar
contrahatur. Tenuis autem humor laxiores cerebri meatus occupare & obstruere ne-
quit, ut infra latius dicemus. Subito igitur tum facta epilepsia, natura cōfestim humores
in cerebri ventriculis contentos, animales spiritus exire prohibentes, excutere aggre- D
ditur. Ut hinc omnib. veritatis amantibus manifestum fiat, epilepsiam quæ primogenia
fit a tenui humore, ut multi nostræ ætatis Medici, etiam eruditione clari arbitrantur, fie-
ri non posse. Neq; enim obstat quo minus in errore versentur, quod asserunt, citam so-
lutionem, *materia paucitatem & tenuitatem indicare, quod crassa difficile moueantur.* Nam ve-
rum quidem facilius ac citius materię paucitatem esse fatemur solui, hincq; adeo fieri,
q; in epilepsia humor crassus & lentus, quia paucus, in singulos accessionib. soluatur &
excutiat: in apoplexia vero quoniam multus, adeoq; vniuersos cerebri meatus prorsus,
vel ut Gal. *lib. 3. de affect. locis c. 9.* ait, confestim implet ac obstruit, subito interficiat. Ut re-
cte Galenus dixerit *lib. 3. de affe. locis cap. 8.* epilepsiam a pituita transire in apoplexiam: ubi
scilicet materia multa fuerit, nec a cerebro excuti poterit. Falsum vero est, quod dicunt
citam solutionem, materia tenuitatem indicare. Siquidem id perpetuo verum non est, sed E
interdum cita solutio materię etiam crassitudinem monstrat, ut in epilepsia, in qua
crassus humor subitam, *ut paulo ante dictum est*, meatuum & ventriculorum cerebri ob-
structionē facit. Quum enim is ob crassitiem suam promte nō dilabatur, sed cerebrum
præter naturam contrahat, & hunc violenter ac confestim excutiat, necesse est. Sunt al-
li qui crassum humorem cerebri ventriculos obstruere negant, nec tum spirituum transitum im-
pediri concedunt. Nam si crassus & lentus humor, inquit, ventriculos cerebri obstrue-
ret, ut illi putant, qui spiritum quo minus exire posset, impediret, cessaret motus, aut saltem
minor fieret, ut in paralyſi accidit. At tantum abest ut cesset, ut omnes partes præter volun-
tatem ad motum concitentur. Hæc illi. Sed facile quæ ab iis obiciuntur diluemus. Fa-
temur enim si in epilepsia crassi humoris tanta copia esset, ut cerebri meatus & ventri- F
culos confestim & omnino obstrueret, motum omnem, quod utique in apoplexia
fit, cessare. Quum autem in epilepsia cerebri ventriculi a crassis ac lentis humo-
ribus non omnino obstruantur, fit ut in ea motus omnis non cesset. Atque hinc a-
liqua epilepsię & apoplexię differentia apparet. Cessat quidem in epilepsia mo-
tus

Epilepsia
primoge-
nia a te-
nui hu-
more fieri
haud po-
test.
Aduerſa-
riorum ar-
gumenta
impro-
bantur.

Epilepsię
& apople-
xię diffe-
rentia.

- A**rus membrorum voluntarius, is tamē qui prāter voluntatē fit, mox consequitur. Quod Galenus ab iniuria assertus. vero Galenum aberrare censent, ideo quod extra arterias spiritus animales in ventriculis cerebri contineri scribat, in eo ipsi iniuriam faciunt: & se anatomes parum esse peritos produnt. Siquidem ex dissectione constat, a plexu qui ab extimi foetus inuolucti forma χρυσός appellatur in singulos cerebri ventriculos, dextrum & sinistrum, arteriæ ramos qui animalem ad eos spiritum deferunt, conscendere. Docet etiam idem fufius Galenus *lib. 7. de Hippo. & Plato. dogmatib. c. 6.* vt longiorem me esse non sit necesse. Quod vero deinceps dicunt, si epilepsia fit propter aliquam obstructionem, ea erit in meatu illo qui a cerebro ad peluim siue infundibulum, αδυν Græci vocant, peruenit, per quem pituita ad palati foramina descendit: atqui contra accidit in epilepsia, in qua per illam
- B**viam expurgatur materia, quæ insultum excitat, & ea, quæ cum spuma ex ore elicitur ab ægris. Quis vero anatomes tam imperitus est, vt nesciat meatum illum ex communi cavitare dextri ac sinistri ventriculorum, seu a tertio cerebri ventriculo recte decliuem versus peluim siue infundibulum, quod cerebri pituitam excipit ferri? Quod si igitur in epilepsia, veluti a nobis ostensum est, dexter & sinister cerebri ventriculi obstruuntur: tertius quoque obstruatur necesse est, vt mirum non sit per illam viam, tum nihil expurgari. Neque etiam mirandum est, si vt *Galenus libr. 9. de vsu par. cap. 1. scribit*, decliues ii meatus, tum per palatum in os, tum per corpus narium conspicuis & magnis orificiis pituitam & crassa cerebri excrementa expurgantes obstruantur, epilepsia sequatur. Rifu vero dignum est, quod ex spuma, quæ in iis, qui epilepsia correpti sunt, apparet, colligunt, hanc tenui vel spumosa, & acri fieri materia. Quod enim in epilepsia spuma generatur, id nequaquam ob materiæ tenuitatem accidit, sed, *Galeno etiam sect. 2. aphor. com. 43. testē*, ob motuum in conuulsione vehementiam, & quod humor, qui epilepsiam excitat, tenacē consistentiam habet. Hincq; adeo fit, vt epilepticorū spuma, qualis etiam in currentibus equis circa os accumulatur, non facile dissolubilis, sed stabilis sit. Sed pergunt illi hoc modo Galeni sententiam impugnantes. *Non sequitur, aiunt epilepsia subito fit, ergo a crasso viscosoque humore generatur. Quod enim hac repente fiat, id materiam potius tenuem esse, quam crassam indicat, vt cita solutio, materia paucitatem & tenuitatem. Crassa enim difficilime mouetur, tenuis vero facillime.* Hæc illi. Falsum vero est, vt paulo supra diximus, etiam solutionem perpetuo materiæ tenuitatem indicare. Nam contrarium in epilepsia accidit, in qua perpetuo, vt *comprehensum est & paulo post latius dicitur*, obstructio ventriculorum cerebri est, quæ a tenui humore fieri nequit, vt qui laxiores ac ampliores occupare eius meatus atque obstruere non possit, quod Galenus *libr. 4. de causis pulsuum cap. de pulsu Peripneunicorum* confirmat, vbi *tenuem & biliosum humorem fere defluere, & nequaquam visceri adherescere & obstruere posse* scribit, quod pueris etiam notum est. Quod
- E**vero crassa materia, quæ difficilime dilabitur, & per se mouetur in epilepsia cito expellitur, causa est, quod cerebrum in sese contractum quatiendo illum, violenter excutiat. Quod quum antea nobis copiose dictum sit, non est, vt id nunc pluribus doceam. Mirari vero subit, cur aduersarii conuulsionem particularem a pituita, quæ perpetuo crassa est, nunquam vero tenuis, fieri fateantur, & epilepsiam, quæ non est nisi vniuersalis conuulsio, quum tamen diuersitatis nulla sit ratio, ab eadem generari inficientur? Verum eos, qui nouas & a veritate abhorrentes opiniones serere student, satan, errorum pater, ita excæcat, oculosque eorundem præstringit, vt quid dicant aut faciant scire non possint. Ceterum progrediuntur aduersarii & epilepsiam primogeniam fieri a tenui humore, eius quæ per consensum fit exemplo, docere conantur, vt pote quam semper a tenui substantiā oriri dicunt. Vt igitur etiam primogenia ab eadem causa fiat, necessario sequi dicunt. Pro sententiæ vero suæ confirmatione initio producant exemplum Galeni *libr. 5. de affe. locis cap. 5. de Grammatico* quodam, qui quum vehementius doceret, aut cogitaret, aut maiorem in ediam sustineret, aut iraceretur, epilepsia corripiebatur. Verum non vident eius rei nullam aliam causam fuisse, quam quod prædicta
- F**omnia plus bilis, *Galeno quoque libro 2. de temper. cap. 8. testante*, in ventriculo illius Grammatici generarint, quæ ventriculi os facili sensu præditum primo afflixit, & deinceps per consensum cerebrum, & vniuersum corpus conuulsorio motu concussam est. Non igitur epilepsia illa a vaporibus eleuatis a flaua bile, & porracea, vt illi somniant, facta est, sed ab acrimonia bilis in ventriculo contentæ, & os illius affligente. quod deinde per

Epilepsia non fit a tenui humore.

Epilepsia non fit a flaua bile.

consensum cerebri epilepsiam efficit. Atque hinc est, quod Galenus recte libro 3. de A affect. locis cap. 9. obacrem humorem non solum singultum, verum etiam conuulsionem non raro per vniuersum corpus euenire memoriæ prodiderit. Quod vero de vaporibus caput conscendentibus afferunt, ut sit in ventriculi cruditate, & vini meracioris potu, facile quoque diluitur. Nam vapores illi vel sunt crassi ac turbidi, vel admodum humectantes, a materia crassa, vel supra modum humida ad cerebrum delati. Hi igitur vna cum praua substantia materiae conscendentes cerebrum implent, inque eius ventriculis obstructionem efficiunt, quam epilepsia consequitur. Quod confirmat Auicenna, qui Fen. 1. Can. 3. tract. 5. cap. 8. disertis verbis scribit, eos qui puram qualitatem, citra scilicet materiam, epilepsiam facere afferunt, falsum dicere. Accedit, quod Valesius, inter vocatos practicos, non infimæ sortis, vapores iam dictos in ventriculis cerebri creare obstructionem, quod non sint puri, sed sibi commissam substantiam, unde eleuantur, habeant, affirmer. Quare quum aduersarii dicunt, materiam crassam in parte conclusam eleuari non posse, verum est, si tota materia intelligatur, siquidem ea non tota, sed tantum vapores ab ipsa elati, qua cum materia illa communicant, & secum aliquid de eius substantia ad cerebrum deferunt, ad cerebrum ascendunt, in eoque obstructionem efficientes, epilepsiam accersunt. Atque hæc de prima epilepsiæ per consensum factæ causâ dixisse satis sit. De altera causâ iam dictæ epilepsiæ, idem aduersariis respondemus, nempe qualitatem illam a parte subiecta non puram ac solam conscendere cerebrum, sed cum frigida materia, unde eleuatur, vel venenata. Licet igitur spiritualis aura hæc sit, tamen cum frigida substantia communicat, quæ elata cerebrum implet ac obstruit. Porro ob venenatam autem auram, aut veneni vim a parte primo laborante elatam, cerebrum expellere festinat, adeoque confestim sese contrahens & coarctans epilepsia accidit. In omni itaq; epilepsia, excepta ea, quæ ab acri & mordace humore in ventriculo contento sit, siue primogenia fuerit, siue a ventriculo, aut alia quavis corporis parte subiecta consentiente fiat, cerebri obstructio accidit. Nam crassos & lentos humores obstruere cerebrum, in confesso est. Vapores autem quum nequaquam puri, sed vna cum substantia frigida & crassa conscendant, obstructionem efficere posse, paulo ante abunde nobis monstratum est. Venenati vero vapores obstructionem efficiunt, quod propter contagem, quam subiectæ partes cerebri ventriculis impertiunt, contrahuntur & coarctantur, ut scilicet contagem illam a se depellant. Quid multis opus est verbis? Ventriculi cerebri in omni epilepsia coarctantur & contrahuntur, ut quod noxium est a se expellant. Ut iam conspicuum sit omnibus, nullum epilepsiæ genus a tenui fieri materia, nisi hæc vna vel acris, vel venenata fuerit. Primogeniam vero perpetuo a crassa ac lenta accidere. Sed longius progressus ad institutum redeam. Præcedit hoc vitium, corporis animique inconstantia & status minime voluntarius, tristitia, eorum quæ perceperunt obliuio, turbulentæ somniorum imagines, capitis dolor, eiusque plenitudo continua, in iracundia potissimum, pallor faciei, & linguæ inordinatus motus. Nonnulli vero eam mordent. Quamprimum autem inuaserit vitium, ægri concidunt, conuellunturque, stertunt, ac interdum vociferantur. Nonnulli tremunt, atque circumaguntur. Sed peculiaris admodum nota vitii est, oris spuma. Non desunt, quibus etiam vrina & stercus præter voluntatem excernitur, nonnullis genitura. Quibus ab ore ventriculi vitium oritur, palpitatio ipsius præcedit, turbatio, & erosio: & ex inedia, aut cibo tardius sumto affliguntur. Corripit hoc vitii genus maxime pueros, eosque adhuc infantes ac paruulos: quod scilicet humidioris cerebri temperamento præditi sint, qua de causâ πᾶσις, hoc est, infantile, seu puerile nominatur. Deinde adolescentes, & ætate consistentes, minime vero senes & decrepitos. In quibus acutissimum est vitium, statim crebris accessionibus, & symptomatum vehementia iugulat. Plerisque diuturnum esse solet. Proinde si non pubertate, vel menstruorum initio, vel dum vterum ferunt, solum fuerit, sæpe vsque ad mortis diem prorogatur, nisi congruam Medici curationem fuerit assecutum. Id quod Hippocrates etiam testatur, qui sic scriptum reliquit: Quibuscumq; morbi comitiales sunt ante pubertatem, mutationem accipiunt: quibuscumq; autem vigesimo quinto, commoriuntur. Coarguit autem & indicat comitali morbo laborantes ex bitumine, aut gagate lapide, aut cornu caprino suffitus: comestum item iecur hircinum, aut odor costi iecinoris. Porro hoc vitio correptis victus ratio, quæ incidit & extenuat,

Nota.

Quos potissimum corripit. Puerile malum.

1. Aph. 7.

Vitium ratio.

- A** nuat utilis est. Aeris itaque constitutio, in quo æger versatur, calida & sicca sit, potissimum si a pituitoso humore fuerit excitatum vitium. Quæ si natura talis non fuerit, igne luculento, suffitibus cum caryophyllis, cortice citri, rosmarino, maiorana, saluia, serpyllo, stechade & similibus. Si vero ex melancholico succo vitium ortum fuerit, ad calidum inclinans aer deligetur. Fugere oportet carnes omnes, demtis auium mōtanarum; quæ tamen cum aliquo extenuarium medicamentorum, hyssopo scilicet, maiorana, serpyllo, origano, & betonica, exhiberi debent. Item legumina, pisces, & vinum: præsertim antiquum, crassum, & copiosum. Potus autem sit mullus, aut vinum aquosum, tenue, & dilutum. Capparis esus mirifice prodest. Aluum ut apertam habeat ægri, vnice medico curandum erit. Exercitia ante cibum conferunt, & frictiones: sed capiti post omnes reli-
- B** quas partes adhibet. In balneo mora diuturna obest. Deuitandus coitus liberalis, moderat⁹ vero prodest, *iuxta id lib. 6. epid. sect. 5. aph. 32.* Venus morbis, qui a pituita fiunt, confert. Somnus sit nocturnus, & mediocris, impense caueat diurnum. Abstineat alliis, cepis, sinapi, & eiusmodi euaporantibus, præsertim in coena, q̄ ciborum copia multos efferri humores contingat, & morbi comitialis accessionem moueri. Nam etsi vim incidendi habet, tamen fugienda sunt, q̄ caput non nihil repleat. Porro apium etiā virandum esse, Trallianus scribit, ceu naturaliter Comitiales offendens. Potum etiam statim a balneo, vini potissimum meracioris, fugiat. Panis sit rectissime coctus, & bene fermentatus, eiq̄ coriandrum, *Tralliano attestante*, incoctum sit: ita enim comestus humorum vapores ad cerebrum ferri prohibet. Ceterum si infans hoc vitio laborauerit, non admodum medicamentorum præsidii (*Paulo teste*) subuenire studebimus. Nam ætate ad calidiorem ficioremque statum vergente, & victu moderatiore, sua sponte plerumque vitium finitur. Quod Hippocrates confirmat, inquit: *Quicumque inuenies morbo comitiali laborant, 2. Aph. 45: mutatione maxime ætatis, & temporum, & locorum, & victuum quoque liberantur.* Oportet autem solius infantium, & nutricum victus rationem habere. Quapropter nutrix boni succi cibis vtatur, si infans nondum ablactatus fuerit. Præterea ante cibum exercitetur, coitum fugiat: a viri siquidem consuetudine lac tenuius fit, odoris gratiam in deterius mutat, & humidius efficitur, menstruaque eliciuntur. Quid multa? paulo ante præscripta victus ratione calida & sicca vtatur, ut lac scilicet calidius, tenuiusq̄ efficiatur. Mediocriter tamen extenuantibus vtatur, ne ex illorum usu, quæ nimium extenuant, vteri vasa aperiantur mensesque promanent, & lac imminuatur. Præstat itaq̄ sceniculo, aniso, & aliis quæ lactis copiam faciunt viridibus, magis, quā aridis vti, quæ magis acria sunt. Nam, *ut Trallianus testatur*, quum sicca magis sint acria, plus vteri vasa aperiunt, & nimis sanguinis mēstruorum vacationes ab ipsis incitantur, quo nihil est deterius. Dum enim sanguis expurgatione decrescit, lac etiam imminuitur. Vino quoq̄, maxime forti, nutrix abstineat, vtaturq̄ hydromelite, vel cinamomi decocto. Quod si malo succo redūdar, purganda etiam erit. Capita autem infantium assidue oleo anethino, & irino, adiectis puluisculis, cyperis, iridis, adianti, maioranæ, & similibus inungenda. Nunquam tamen aqua calida vel frigida lauanda sunt, multo minus tota immergenda; aut irriganda. Dato etiam ad lingendum mel despumatum. Commendatur etiam a multis hoc ecligma, *Ecligma*
- E** quod accipit: *Sacchari candidissimi, uncias duas. Olei de amygdalis dulcibus, quod satis est, ad instā ecligmati inducendam consistentiam. Detur infanti lingendum.* Sunt qui admiscunt viscū queruinum, & vnicornu, neque sine magno pueri ægrotantis commodo. E collo etiam radix pzonie viridis suspendenda. Quantum enim hæc ipsa ad sanandum hoc vitium conferat, ex historia Gal. quam narrat *lib. 6. de simpl. med. facul. cap. de peonia*, satis liquet. Puer enim totis 8. mensibus a morbo comitiali, ex eo tempore, quo radicem gestabar, liber fuit: sed posteaquam q̄ a collo suspensum erat, decidisset, protinus conuulsione denuo correptus est: rursus suspensio in locum illius alio, inculpate postea egit. Porro q̄ post annos pueriles in hoc vitium prolabantur, eorum partes conuulsas ac distortas inungere, irrigare, & in rectum dirigere ac etiā deligare oportet. Deinde os aperiendum, cuneusq̄
- F** dentibus interponendus, ac penna oleo irino illita, pituitæ extrahendæ gratia, vomitus puocandus. Odoramentis etiam sensum excitare cōuenit, ut peucedano, ruta, bitumine, & silphii succo. Perseuerate vero exacerbatione, glās subiicienda erit, ex agarico, sale gemæ vocato, hiera picra, & melle despumato confecta. Præterea Medicus audacter & violenter illorū maxillas diducat, infundatq̄ in os castorium, aut laserpitii succū cum

Curatio infancium.

2. Aph. 45.

Curatio a dultorum.

44 Operum Leonhard. Fuchsi Pars III.

oxymelite. Clisterem etiam acrem, iam excitatis, iniicere oportet. Cuius quidē formu-
 la e superioribus petenda. Qui conualescunt, viribus antea recreatis, hiera Galeni, aut
 alio conueniente medicamento, quorum formulas iam saepe diximus, purgandi sunt.
 Hæc quidem recentis & acuti morbi comitialis curatio est, quare deinceps quomodo
 inueterato sit succurrendum trademus. Oportet igitur laborantes diu aquam bibere,
 atque initio curationis, nisi quid prohibeat, sanguinem ex vena poplitis mittere, quod
Gal. teste, in lib. de ratione curandi per sanguinis missionem, ex cruribus potius, qui comitiali
 morbo obnoxii sunt, euacuandi sunt, quā ex gibbero. Interpositis dein 4. aut 5. diebus,
 corpus reficere, ac medicamenta extenuantia propinare expedit, serapia nimirum ex
 absinthio, de hyssopo, e stychade, oxymeli scilliticum, decoctum hyssopi, q̄ Tralliano
 auctore plurimum confert. Nam lenta & crassa recremēta attenuat & incidit, nec per-
 mittit, vel in ventriculo, vel thorace recrementū in crassitiē coire ac spissari. aliud n. per
 vrinas, alium per aluum expellit. Radicis pæoniæ, & alia quæ supra c. 13. commemorau-
 mus. Postea purgantib. medicamentis vacuandi sunt, nempe pilulis cochiis fœtidis, de
 sarcocolla, de agarico, & similib. loco iam citato nominatis: idq; si pituitoso ex humo-
 re vitium ortum fuerit, faciendum. Sunt, qui in colocynthidem extracto semine ac me-
 dulla tantum relicta, vinum dulce coniiciunt, totaq; nocte sinunt: dein mane excolant,
 & tepesactum propinant. Si vero melancholico humore cœperit hoc vitium, ea, quæ
 humorem hunc vacuare possunt, exhibenda, quorum formulas in capite *de melancholia*
 reperiēs. Licebit tamen aridi ellebori nigri corticem terere & cribrare, ac ex mulsa cir-
 citer drachmam vnam dare: aut cum melle cocto, adiecto modico pipere, in pilulas re-
 ductum assumere. Vbi satis purgatus est æger, ad balneum ducendus. *Tertio* die hypo-
 chondriis & scapulis cucurbitæ cum scarificatione affigendæ sunt. *Deinde* complurculis
 dieb. interpositis, corpus reficiendū est, & rursus hiera Galeni purgandū. Postea capiti
 & occipitio cucurbitulæ admouendæ. Sequenti die panis in mulsa coctus, additis amyg-
 dalis amaris, contritis, aut serpyllo, aut calam. ntha, aut menta, aut ruta, cataplasmatibus
 instar capiti applicandus. Atq; hoc tribus diebus faciendū. Mox caput derasis capillis,
 peucedani succo in aceto diluto, in quo sphondylium, serpyllū, aut iris incocta sit, per-
 ungendum. Rursus interea corpore recreato, purgandus erit æger tribus tantum hieræ
 drachmis oblatiis. Quibus peractis, sternutamenta, apophlegmatismos, & ea, quæ per
 nares purgant medicamenta, exhibenda. Non negligenda etiam alia medicamēta ex-
 ficcantia & roborantia caput, vt est conferua rosmarini, e pæoniæ floribus, item confe-
 ctiones diamoschi, diambæ, & similes. Tempore interposito, si necessarium esse vide-
 bitur, clystere aluus eluenda erit. Tandem vnguēta, linimenta, & emplastra, quibus dis-
 cutiendi vis inest applicanda, quorum in c. 28. mentionem fecimus. Sunt quædam me-
 dicamenta, quæ naturæ quadam proprietate, atq; adeo a tota essentia huic vitio aduer-
 santur: vt est radix pæoniæ, viscus quercinus, cornu ceruinum, ossa humana combusta,
 & alia multa: quæ lubens prætereo, q̄ copiose a Tralliano *lib. 1. c. 15.* & a recentioribus o-
 mnibus sint exposita. Trallianus loco iam ostenso, experimentum quoddā Rustici cu-
 iusdam refert, nempe Rutam syluestrem contusam naribus inditam & admotam. Hæc
 non solum a morbo excitare, sed ipsum etiam curare tradit. Porro si ob primariam ven-
 triculi rationem epilepsia accidar, vt æger probe concoquat, prouidendum. Panis igitur
 diligēter elaboratus, ex vino antiquo, tenui & albo, mediocriter adstringēte, circa ho-
 ram 3. aut 4. dici assumendus. Dare aut expedit singulis annis, maxime si ob biliosi hu-
 moris inibi generationem vitium oriatur, bis terue hieram picrā, aut absynthii potum,
 vt bilis quæ ventriculum grauat, caputq; tentat, vacuetur. Totum namq; ventriculum
 purgat, viresq; eiusdem reparat. Quæ quidem curationis ratione iuuenem quendam
 Gramaticum a prædicto vitio Gal. liberauit. Si aut a pituitoso humore oriatur vitium,
 agarico purgandus æger erit, Neque parum prodest seselis radix & semen, vel aristolo-
 chia rotunda trita, & ex aqua pota. Confert & mirum in modum assidua crurum scari-
 ficatio. Ceterū vbi ex particula quadam vitū hoc inuadere percipitur, siue ea manus,
 siue pes fuerit, tunc fortiter excipi debet pars, quæ paululū loco, vnde affectus incipit,
 superposita est, vt vapor illi via præcludatur. Cum remittit vitium, peracta totius cor-
 poris inanitione, prius inunctionib. excalfacere corpus oportet. Deinde medicamēta,
 quæ calefaciunt, rarefaciunt, & malam temperaturam partis, vnde vitium oritur, e-
 mendant,

Curatio pas-
 sionis comi-
 tialis inue-
 teratæ.
 Preparatio.

Purgatio.

Discutien-
 tia medica-
 menta.
 Medicamē-
 ta morbo
 comitiali
 naturæ pro-
 prietate ad-
 uersantia.

Curatio e-
 pilepsie ex
 ventriculi
 vitio.

Si a particu-
 la quadam
 oritur vitium.

A mendant, & ea, quæ exurere & exulcerare partem possunt, apponenda, ut est lepidium, & similia. Succedente etiam tempore sinapismis locus irritandus. Cauteriis etiam pars exulceranda erit, cum cantharidum abiectis capitibus & aliis drachma vna & dimidia, admistis fermento & melle anacardino, ut scilicet praua illa qualitas & materia huius vitii causa vacuetur. Post omnia commemorata theriace, & naturalia balnea locum obtinent. Per totum vitæ curriculum cauenda cruditas, & ante coctionem alterius cibi assumptio, alimenta crassi succi, diutina cibi intermissio, commotio turbulenta, vinum largius potum a balneo, ut dictum est, odoramenta acria, & quæ caput replent. Fixis præterea & inconniuentibus oculis ex alto prospectus, diuturna in balneo mora, & capitis a sole vitio fugienda erit.

B

De conuulsione. CAP. XXXI.

Σ *Παρά τις* Græce, conuulsio vero Latine, est vitium, in quo nervi atque musculi præter voluntatem ad principium contrahuntur & conuelluntur, in eumque affectum veniunt, quem etiam in motibus secundum arbitrium factis, tractis videlicet seu reuulsis ad propria capita musculis, assumerunt. Vel aliter, veluti definit Gal. lib. 2. de sympt. causis, cap. 2. Conuulsio est, quæ nervos musculosque ad eundem cogit affectum, in quem ab animali facultate, quum naturalem habitum seruerent, ducebantur. In hoc enim vitio musculus in eas trahuntur partes, a quibus nascuntur. Quippe attractio fieri nequit, nisi ad suam originem retrahatur musculus. Ceterum animaduertendum in conuulsione non perpetuo vnam & eandem partem laborare. Nam interdum cerebrum ipsum noxam sustinet: interim spinalis medullæ initium: nonnunquam nervus aliquis, aut musculus, qui particulari motui deputatus est. Quod ita dignoscendum erit. Si simul cum vniuerso corpore faciei partes conuelluntur, cerebrum ipsum laborat. Si vero totum corpus conuellitur, faciei partibus illis permanentibus, spinæ initium infestatur. Vbi autem pars vna duntaxat corporis conuellitur, nervus aut musculus eius motui destinatus, perpetitur. Quod scire præstat, ut laboranti parti medicus remedia adaptare queat. Eius autem tres sunt species, seu differentię. Prima Græcis *πέναν* dicitur, *disentio* Latinis, Celso *rigor*. Est, quum ceruix vna cum reliquo corpore recta atque immobilis manet, & in neutram partem inflectitur, sed iuxta in utramque partem recta intenditur. Altera *ἐμπύκνωση* Græcis nominatur, Latinis *tensio ad interiora*. Accidit enim, ut ea caput, ceruix, reliquumque corpus in pectus contrahatur. Tertia *ὀπίσθησις* Græcis, Latinis *tensio ad posteriora* appellatur: in ea enim caput in dorsum ac scapulas conuellitur. Quod ad huius vitii causas attinet, animaduertendum, Hippocratem duas duntaxat statuisse, *πληρώσις καὶ ἐκένωσις*, hoc est, plenitudinem & inanitionem nervosorum corporum. Sicut enim videmus lora & chordas extendi, ubi aut multa madent ac irrigata sunt humiditate, aut vehementius exsiccantur: sic & in corporibus animantium nervosæ partes conuulsione corripiuntur, vel nimium humectantur, atque adeo impletæ, vel violentius exsiccantur, ut copiose Gal. lib. 3. de affectis locis, cap. 5. & lib. 2. de sympt. causis, cap. 2. docet. Verum Hippocrates ipse de conuulsione, ut primogenio vitio loquitur. Præter hanc autem alia est, quæ per consensum partis alicuius accidit: & hæc fit, ubi aliquid a parte primo patiente ad cerebrum ipsum effertur, quod ut se expellat, huiusmodi motu concutitur. Iuniores medici barbaram sectantes medicinam, spasmus non proportionatum ad materiam vocant: quod scilicet neque ob materiam quæ implere possit nervosæ partes, neque ob inanitionem siue defectum materiæ accidat: sed a qualitate quadam, alteraris per continuationem partibus: aut substantia, vel spiritali veluti aura vel fluida ad nervorum principium delata: sicut contingit iis, qui a scorpione, aut alia venenata fera icti sunt. Etsi vero hæc conuulsionis species quum a venenata materia fiat, ad plenitudinem referri potest: tamen quum materia hæc pauca sit, ac plerumque mordax, adeoque ex accidente desiccat, ideo Gal. sect. 5. aphor. com. 1. permittit, ut aliquis hanc per inanitionem factam esse dicat. Fit etiā conuulsio propter nervi aut tendinis partis cuiusdam puncturam. Quod si aliquem sanum, Gal. 2. aph. com. 26. teste, repente & statim ab initio, vel non multo post morbi principia conuulsio corripit, præsertim si temulentus fuerit, ac in ocio degens homo repletionem haud dubie originem ducit. Vbi vero post plurimos sudores, aut vomitum, aut alui deiectiones, aut sanguinis eruptiones, aut vigilias, aut famem, aut motus tum multos, tum vehementes subsequitur, inanitio & siccitas in causa est. Conuulsio per consensum facile ex relatione ægri, aut assidentium cognoscitur. Victus victus.

Conuulsio

πέναν

ἐμπύκνωση

ὀπίσθησις

Causa.

6. aph. 39.

Conuulsio per consensum.

Spasmus non proportionatus ad materiam.

Nota.

ratio in conuulsione, quæ fit a plenitudine, eadem est ei, quæ in capite *de resolutione* est. A
 per scripta, nempe calida & sicca. In ea vero, quæ ab inanitione fit, humidã esse oportet.
 Nutriendi igitur sunt ægri in cõuulsione ex inanitione sorbitionibus, & iuribus pingui-
 bus, & carnibus concoctu facilibus & confusis, probeq; nutrientibus. Pro potu, vino v-
 rantur tenui & aquoso, quod facile per omnes corporis partes distribuitur: nisi febris af-
 fuerit, tunc enim ptisanæ cremor utilis erit, aut pro vino danda aqua, in qua cinnamomi
 aut glycyrrhizæ parum sit decoctum. Somnus etiam accersendus erit. Virãda exercitia,
 & omnia, quæ corpus inanire possunt. Oleo dulci, aut amygdalino, aut hydrelæo calido
 inungantur ægri. Lauacro etiam aquæ dulcis tepidioris utendum. Quid multa? victus in
 vniuersum talis sit, qualis est eorum, qui hæctica laborant febre. Curatio conuulsionis,
 quæ a plenitudine orta est, statim a sanguinis missione auspicanda, modo nihil sit, quod B
 eandem fieri prohibeat. Liberaliter autem sanguinem auferre conuenit, ita tamen, vt
 non confertim fiat, sed pluribus vicibus. Aliquid enim symptomati relinquendum. Mit-
 tendus vero sanguis ex gibberi vena media. Post sanguinis missionem, acri clysteri, si ita
 ex re esse ægri visum fuerit, alius eluenda. Partes autem, quæ conuelluntur, valenter
 continendæ sunt, & inordinatis motibus omnino resistendum. Oleo quoque rutaceo,
 aut irino, aut alio quodam ex hoc genere perfricandæ: aut lanis iam dictis oleis imbutis
 contegendæ: aut vesica lata calido impleta oleo, costino scilicet, de piperibus, de ver-
 mibus, e castorio, vel hyperici iis superimponenda. Quod si vero a pituitosis humorib.
 conuulsio euenerit, tum ii primum omnium extenuandi & incidendi erunt, atq; vt ad C
 expulsionem idonei sint, præparandi, modo non sit admodum vehemens, ac dolorem
 ita magnum afferat, qui vires præsternere possit. Tum enim ad maius euitandum peri-
 culum, potentioribus remediis vacuandum erit, sic tamen, vt illis extenuantia & inci-
 dentia iungantur. Præparati subinde confestim medicamentis pituitam purgantibus,
 quorum multa in capitibus *de epilepsia, & resolutione* commemorauimus, vacuandi. Suc-
 currit ita laborantibus *centaurii minoris potus, aut Cardui benedicti appellati ʒj. cū aqua mulsa*
unciis tribus. Aut myrrha, aut castorii ʒj. Castorium enim omnium securissimum, expedi-
 tissimum, & maxime efficax est. Cucurbitulas etiã cum scarificatione admouere pro-
 dest: leues enim lædunt. Si crura contrahuntur, coxis & postremæ vertebræ: si manus
 conuelluntur, dorso & primæ ipsius vertebræ, tum ei, quæ humero superiacet. Caput D
 præterea apophlegmatismis, gargarismis, & similibus medicamentis purgandum. Pro-
 cedente tempore balneo uti confert. Singulis itaque diebus bis aut ter in aquas sulphu-
 reas, vel aluminosas, vel salas descendat: non tamen diu, ne vires deiciant, iis immore-
 tus. Vel si naturalium nullus usus esse potest, laconico uti licebit: aut aqua, cui incocta sint
folia lauri, abrotanum, chamæpitrys, stachas, lauandula vocata herba, pulegium, absinthium, ruta,
salvia, hypericum, maiorana, & beronica. Conuulsæ quoque partes pellibus, luporum & vul-
 pium vestiri debent. Inunctiones etiam, quæ in cap. *de resolutione* diximus, adhibendæ.
 Frigidæ superfusione, cuius Hipp. meminit, non temere vtatur Medicus, nisi singula,
 quæ idem ille requirit, adesse cognouerit, ne pro remedio mortem adferat. Ceterum
 calida medicameta, qualia sunt *theriaca, antidotus mithridati, & eiusmodi, nempe diamoschi,*
dia galange, sæpe sunt assumenda. Omnium tamẽ securissimũ & optimum est *castorium* E
dilutum, ad cochlearis parui, hoc est, drach. vnius, mensuram datum. Verum id ipsum non tan-
 tum haustum, sed etiam extra illitum conducit. Porro conuulsio, quæ ex inanitione &
 siccitate accidit, maximum sane malum, & propemodum insanabile. Victu vrantur
 hoc modo laborantes humectante, veluti in hæctica, cancrorum seu astacium fluui-
 alium carnibus, & aliis restaurantibus humiditatem cibis ac potibus. Pinearum quoque
 comestio laudatur. Eos autem, qui sic conuelluntur, oleo, vel hydrelæo calido fouere o-
 portet. Oleo item violaceo, amygdalarum dulcium, pinguedinibus gallina & porci, adiectis aliis,
 quæ humectant: iisque spina tota inungenda. Ad lauacrum etiam deducere conuenit, tem-
 peratoque solio uti, frictioneque cum oleo lenissima. Confert autem si in balneo de-
 coquantur aliquot capita veruecis, ac herbæ humectantes, qualis est *malua, viola, lactuca:* F
 item *semina lini & fenograci, quod mitigandi vi prædita sint.* Et in vniuersum fere, curandi
 sunt vt hæctici. Si ictu alicuius feræ venenatæ, atque adeo per consensum, conuulsio ac-
 cidit, annitendum initio erit, vt venenum extrahatur: id quod efficies, si vulnus dilate-
 tur, loculusque totus in circuitu scarificetur, super impositis cucurbitulis. Vulnus etiam
 latio-

Curatio
conuulsio-
nis a pleni-
tudine.

5. Aphor. 25.

Cochlear
paruum.

Conuulsio
nis ab ina-
nitione cu-
ratio.

Curatio
conuulsio-
nis ab ic-
tu feræ vene-
natæ.

- A** latioribus cauteriis ignitis inurendum. Postea porri semina, cum sale trita, aut alia, aut cepas illinire oportet. & post crustæ casum usque ad dies quadraginta, aut sexaginta vulnus a cicatrice arcebis. Ad quam si festinabit, rursus vitis aut ficulneo cinere vlcus aperies. Prodest enim ut vulnus diu apertum maneat, quo venenosa sanies extrahi, & emanare possit. Confert *& marrubii, & anagallidis folia illinire*. Locus etiam oxalidis radicis decocto fouendus est. Nam eam mirifice Aetius commendat. Conducit etiam theriaca cum rosaceo diluta, & vlceri apposita, eo quod venenum, aut eius qualitatem a profundo, attrahat atque vacuet. Hæc enim alexiteriorum teste Galeno lib. 5. de simpl. med. facul. c. 17, actio est. Priuatim vero ea actione esse præditam theriacam, idem Gal. in lib. de theriaca ad Pisonem testatur, ubi sic scriptum reliquit: καὶ ὅλος καὶ ἀπὸ τῶν παλαιῶν φάρμακων ἡ θηριακή, καὶ ἐξ ὧν ἐμπιπνύμεν καὶ πινόμεν τοῖς λυσιπυλικοῖς ἀνέλεως βοηθεῖ. Quod est: In summa, theriaca & extrinsecus imposita, & epota, rabiosorum moribus presentanei medicaminis cuiusdam instar exalte auxiliatur. Ut hinc constet, toto cælo errare Gentilem, & alios nonnullos, qui huius placita sectantur, eo quod theriacam extrinsecus admotam intro & in profundum pellere venenum asserunt, quum a tota substantia venenum ad se potius attrahat atque vacuet, ut dictum est. Plura ad institutum nostrum facientia reperient studiosi in curatione iectus canis rabiosi. Si vero conuulsio sit neruo, vel tendine punctis, locus punctus dilateretur & aperiat, ut sanies effluat, & ea quæ iam dicta sunt medicamenta calida ei imponantur. Quod si vero conuulsio hæc remediis nullis compesci potest, neruus, vel tendo a Chirurgo per transuersum, in parte altiori quam punctura, secetur. Præstat enim nerui, vel tendinis actionem petire, quam hominem mori.

De incubo. CAP. XXXII.

- E**ncubus, Græcis, Latinis vero incubus & incubo, est vitium, ubi aliquis noctu, quum somnium ingreditur, se grâdi mole opprimi, inuadique ab alio credit. Neque enim Græcis alia de causa ita est appellatum, quam ἐπὶ τῷ ἐπιδυμῶν, quod inuadere & opprimere significat. Nam qui ita laborant, se ab aliquo opprimi, quod simul vocem impediatur, ac veluti suffocet, arbitrantur. A Themisone πνιγῶν, nimirum a suffocando, nuncupatur: siquidem præfocari in ea ægotantes videntur. Oritur id vitii ex crapula, & continua ventriculi cruditate, unde vapores crassi & frigidi eleuati, cerebri ventriculos replent, prohibentes facultates cerebri per neruos diffundi. Comitatur eo detentos difficilis motus, torpidus in somno sensus, suffocationis imaginatio, & veluti ingruentis alicuius detentio. Ad hæc vox supprimitur, aut incerta indiscretaque editur. Quædam ita inanibus imaginibus afficiuntur, ut se opprimentes audire credant. Cum plurima tandem anxietate attenuato spiritu, & discusso, atque apertis meatibus, repente excitantur. Occurrit enim huic malo per inicia: nam perseuerans, & assidue inuadens, grauius aliquod malum, ut apoplexiam, morbum comitalem, aut maniam pronuntiat, ac inducit, crasso humore in ventricularis cerebri sensum collecto. Victus sit tenuis, & qui flatus minime generet. Parcissime cœnet, cibisque boni succi, & qui facile concoquuntur, alatur. Vino non utatur, nisi aquoso. Somnum fugiat diurnum, nec statim a comestione cubitum eat: A pastu sumat æger ad sit ingentia, pyra, aut cotonea mala, saccharo condita. Dormiat autem in latus, non supinus, & (ut summam dicam) tota victus ratio talis sit, qualis est eorum, qui comitali malo laborant. Curandi ratio, si plenitudo affuerit totius corporis, a sanguinis missione auspicanda. Gibberi autem vena exterior secanda est. Sin cacochymia aderit, purgationibus corpus vacuandum, catapotiiis cocciis, de agarico, & similibus. Et si pituita redundauerit, humores extenuantibus medicamentis ad purgationem præparandi sunt. Vniuerso purgato corpore, localia ad mouere medicamenta oportet, apoplegmatisimos videlicet, errhina, embrochas, quorum omnium formulas ex superioribus petent studiosi. Succurrit autem iis potissimum paonia semen nigrum. Danda vero sunt grana quindecim trita ex aqua. Caput quoque fouendum oleo anethino calido, & pileo regendum, dum cubitum eunt. Intra corpus exhibenda, quæ caput corroborant, aromaticum rosatum vocatum, diamoschi dulcis antidotus, diambas, dianthon, plirisarcoricon barbari nominant, & eiusmodi.

De mania. CAP. XXXIII.

Mania vitium est, quod Latini insaniam vocant, & furorem. Hoc enim detenti ferarum instar redduntur effrenes, & furunt. Differt a phrenitide, quæ in ea sit febris, ma-

48 Operum Leonhard. Fuchsi Pars III.

Causa.

Nota.

o. Aph. 53.

Victus ratio.
Curatio.

Letalia.

Diacodion.

Embrocha.

Balneum.

nia vero citra febrem accidit. A melancholia, quod sine metu & tristitia fiat, sed cum A audacia, aliisque paulo post dicendis symptomatis. Oritur, *Aerio autore*, plurimo sanguine incorrupto ad cerebrum fluente, interdum temperato & multitudine tantum laedente, ut in ebriis accidit, interdum bilioso. Galenus lib. 2. De sympt. causis, hanc a mordacibus & calidis humoribus, qualis est maxime flava bilis, cerebrum cum suis membranis stimulans, vel a calidiori cerebri intemperatura nuda nasci tradit. Præcedit maniam capitis debilitas, aurium tinnitus, splendoresq; præ oculis obuerfantur, ingentes uigiliæ, curæ sibi inuicem succedentes & extraneæ, grauedo vibratioq; capitis. Proecedente tempore hæc omnia increbescunt, rabidioreq; appetitus in illis excitantur, & in Venerem promptitudo. Præterea nocturnæ pollutiones iugiter fiunt, excauantur oculi, ac minime nutant. Caterum a solo sanguine maniam ortam comitatur risus assiduus, B ridiculis quibusdam visis ante oculos occurrentibus. Vbi vero flava bilis sanguini commiscetur, iracundiam reddens tanquam ab ipsa stimulatō interius cerebro & membranis, iracundi, audacesq; euadunt. At si flava bilis etiam superassetur, crassescatq; cerebrum ac membranas stimulans & diuellens, ferinum furorem percipit. Atq; hinc est, quod hanc maniae speciem *caninam* aliqui nominent. Ea enim correpti, assidue rixantur, multa loquuntur, corporisque inordinato motu utuntur, aspectu toruo, & inuerecundo præditi sunt. Arabes *maniam lupinam* cognominant. Quia vero adstantes mordent, amicosque iniuria afficiunt, verberant, & vulnerant, ideo catenis vineiendi sunt, ne alicui noceant, aut sibi manus inferant, aut se præcipites dent, aut in flumina coniciant. Hinc rectissime ab Hippocrate dictum est, *Desipientia, quæ cum visu sunt, securiores.* C *Quæ vero cū studio, periculosiores.* Victus sit tenuis, cibis sordibilis, liquidus, citra satietatem, bonum aluum faciens, & qui nihil aut minimum sanguinis generet, vinumq; omnino prohibere oportet. Curatio a sanguinis missione, ubi a sanguine vitium accidit copioso, ordiēda. Gibberia autem exteriorem venam incidere conuenit: aut si non apparuerit, mediam. In mulieribus mensium suppressione laborantibus, malleoli vena secanda: eo enim de lapsu frequenter menstrua prouocantur. Tantum aut sanguinis detrahendum, quantum vires tolerare possunt. Sedato enim feruore, confestim recreantur, simulque reliquis præfidiis locus relinquitur. Verum quum nonnulli in prima quidem oblatione strenue inanitionem ferant, in sequentibus aut animo linqui consueuerint, expedit iis in prima statim oblatione detrahere quantum postulauerit: ita enim simul euacuatur plurimum flatuosi, vaporosiq; spiritus. In sanguinis itaq; effluxu assidue pulsus tangendus est: qui si conciderit confestim de repetitione cogitandum. Postridie autem, nimirum reparatis iam viribus, repetitio molienda. Porto post sanguinis detractionē caput rosaceo & aceto fouendum, aut succo polygoni, aut melino oleo. Dein succida lana oleo madefacta lyncipiti applicetur, assidueque noua mutetur. Post inanitionem sanguinis, vespere somnus concilietur: euacuato enim sanguine, si uigiliæ successerint, ægri immaniores euadunt. Quare medicamentum soporiferum, *Diacodion* vocatum, cum succo pitane, aut cum aqua audacter pondere unius cochlearis exhibendum: ita enim iucundus somnus allucietur. Et plurimi quidem ipsorum sumto soporifero, omnino resipiscunt. Quapropter ubi prima die post medicamentum satis dormierint, vna die interposita, rursus *diacodion* E propinandum. Consuevit enim a sanguinis missione conuenienti victu adhibito, exactam curationem perficere. Obseruandū tamen, ne postea ulterius offeratur: nam sensus stupidos reddit. Vsum eius, aliorumque soporiferorum medicamentorum monstrauius lib. 1. de compos. med. cap. 4. Probatum etiā oleum violarum cum lacte femina. Item embrocha e violis siccis floribus nymphaeae, salicis, & rosarum foliis lactuca, semine papaueris, & eiusmodi parata, aliæque medicamenta, quæ c. 8. a nobis sunt commemorata. Alius præterea cum idoneis alimentis, & cum chysteribus mollienda est. His peractis, ex venis etiam e fronte, ab ea potissimum quæ media in fronte est, sanguinem, si res postulauerit, detrahemus. Vel hirudines capiti circulatim, syncipiti præcipue, admovebimus. In iis quibus biliosior sanguis fuerit, ex hiera picra, & aliis medicamentis bilem vacuantibus, purgatio prius F molienda erit. Si vero delirantes purgantia medicamenta bibere renuant, interim ut facilius fallantur, cibis, mollissimis nimirum uvis, buccellis, vel ficibus pinguibus, vel palmulis, interdum etiam porionibus admiscenda sunt. Vnice autem ipsos iuuat hippomarathri radix, semenque ex aqua post purgationem potum. Declinante morbo æger ad balneum aquæ dulcis ducendus

A ducendus, ac reliquæ medicamentis discutientibus dissipandæ. Quod si a flaua bile affata generatur, clysteres qui attrahunt & a capite reuellunt iniiciendi. Caput præterea oxyrhodino perfundendum, aliisq; medicamentis frigidis & humidis fouendum. Vtendum etiam purgationibus, & medicamentis frigidis & humidis, feruoremq; bilis restinguentibus ac domantibus. In summa, iis, quæ nõ admodum calefaciunt, sed potius humectant, & adustos & affatos humores vacuant, qualia multa in sequenti capite de melancholia dicemus. Plura igitur, si quispiã requirer, is ad caput sequens de melancholia, sele conferat, atque ea, quæ ad institutum faciunt, inde excerptat.

De Melancholia. CAP. XXXIII.

B **M**elancholia, est mentis alienatio, seu desipientia sine febre, cum timore & mœstitia, ex melancholico maxime humore mentem occupante, ac temperaturam suam immutante, nata. Fit vero id ipsum trifariam. Interdum enim vniuerso in venis corporis sanguine melancholico effecto, ob commune vitium, cerebrum quoque ipsum læditur. Ab eo enim sanguine spiritus vitales & animales inficiuntur & turbulenti fiunt. Quare mens læditur. Nonnunquam vero reliqui corporis sanguis prorsus innocuus & syncerus est, solus autem is, qui in cerebro continetur, alteratur atque melancholicus fit: idq; bifariam accidit. Aut enim aliunde in cerebrũ deriuat, aut in ipsomet melancholicus humor genitus est, cum videlicet internus calor aut flauã bilem, aut crassum atrumque sanguinem superassauit. Interdum etiam ob cruditatem ventriculi, quod hinc manifestum est, quod hoc vitio correpti, Galen. libro 5. de affectis locis cap. 5. attestante, post cruditatem melancholicis symptomatis magis molestantur. Quippe propter cruditatem ipsam primo lienis fit obstructio, postea vero prauus & melancholicus sanguis, vel, ut Galenus ait, vitiosa sanies, ex hoc viscere in ventriculum confluit. Eo vero influente, mœstitia, metus, & id genus melancholica symptomata, propter melancholicos vapores ad cerebrum elatos, excitantur. Nonnunquam etiam ob contentum in ventriculi vasis sanguinem crassiorem & melancholicum, qui propter phlegmonem, vel intemperiem vehementer calidam inflammationemue illic existentem, & hunc adassantem generatus est. In iam dictis vero affectibus sinistrum hypochondrium flatibus impletur, & tenditur, grauitatisq; sensum percipit. Vt hoc etiam nomine merito melancholia hypochondriaca nominetur.

D Igitur ob affecta, quæ circa ventriculũ sunt hypochondria, melancholia iam dicta prouenit, quæ modo auram exhalationemue quandam maligniorem ac melancholicam, modo substantiæ humoris partem ad cerebrum sursum trãsmittunt. Quemadmodum enim nonnulli frequenter eleuata a ventriculo fuliginosa quadam aut fumosa exhalatione, aut omnino crasso vapore quippiam suffusioni simile præ oculis obiici sentiunt: sic ascendente ad cerebrum melancholica exhalatione tanquam fuligine aut fumo, melancholica symptomata circa mentem eueniunt. Quare tres sunt in vniuersum melancholiæ species, seu differentiæ. Vna, cum totum corpus melancholico sanguine redundat. Altera, quando is sanguis ipsum duntaxat cerebrum occupat. Tertia, quando hypochondria ipsa primum affecta, in consensum subinde cerebrum rapiunt. Hæc melancholiæ species Græcis *quæ ὁδὸς καὶ ὑποχονδριακή*, hoc est, *flatuosa & hypochondriaca*, Arabibus & horum sequacibus barbaris *Mirachia* nominatur. Cõmunia omnium signa sunt, metus, tristitia, odium & auersio hominum, iuxta hanc Hipp. sententiam: Si timor & mœstitia longo tempore habentes perseuerent, ex eo melancholia significatur. Metuunt enim & tristantur omnes, odioque habent homines: nec si roges eos quamobrem mœreant, reddere causam possunt. Priuatim vero melancholicorum variæ & infinitæ fere sunt imaginationes. Alii enim credunt se bruta esse animalia, & voces & gestus ipsorum imitantur. Sic Gal. lib. 3. de affectis locis. c. 6. narrat fuisse quendam, qui se gallum esse putauerit: ideoque gallos cantare audiens, vt hi alarum, sic ille brachiorum plausu latera quatit, gallosum sonum imitatus est. Alii vasa fictilia, vt idem eodem in loco testatur, & testas se esse arbitrantur, atque idcirco obuiantribus, ne collidantur, cedunt. Præterea hi mortẽ expectant, atque adeo non raro sibi mortem consciscunt: illi eandem expauescunt. Talis fuit, de quo Galenus scribit, qui timuit ne Athlas, qui mundum sustinere dicitur, grauatus sub tanto onere, ipsum a se excuteret, atq; ipse cum illo collideretur, ac nos quoq; cum ipso periremus. Nonnulli semper rident, Democritumque agunt: alii Heraclitũ, nun-

Melancho-
lia quid.
Causæ.

Tres melan-
choliæ spe-
cies. 1.

Notæ.
6. Aph. 23.

Variæ me-
lancholicorũ
imaginationes.

quam non lacrymantes, referunt. Quidam se numine afflatos esse existimant, & futura vaticinantur, quos *ἐνδιασμένοι* priuatim Græci nominant. Sunt qui perditæ amant, & non nisi de amore loquuntur, quos Græci *ἔρωνες* nominant. Alii se reges, & imperatores esse existimant. Alii se serpentes in ventre habere imaginantur. Sunt ex iis qui noctu per sylvas, luporum more, discurrent, & hominibus insidiantur, ut merito Græcis *λύκοειδεις*, & alii *Lupi* dicantur. Quo sane Plinius & alii respexerunt, dum homines in lupos commutari scripserunt. Ex eorum quoque numero sunt, qui Græcis *μυοειδείς*, hoc est, hominum osiores, qualis fuit Timon apud Lucianum. Sunt & aliæ infinitæ tere, ut dictum est, eorum imaginationes, quæ singulæ connumerari non possunt. Porro peculiare illorum hæ sunt notæ. *Qui ex totius corporis consensu melancholia laborant, iis corporis habitus est gracilis, niger, hirsutus, & ex toto melancholicus, vel natura, vel acquisitus per sollicitudines quasdam, aut vigilias, aut prauorum ciborum esum, aut hæmorrhoidum, aut menstruorum suppressionem. At qui ex hypochondriis vitium contraxerunt, eos sane præter metum & tristitiam cruditates, quas plurimi flatus consequuntur, acidi ructus, æstus, & grauitas hypochondriorum, arguunt. Hypochondria quoque sursum conuelluntur, & nonnunquam inflammatione conflantur, idque potissimum circa vitii exordium. Ventres etiam desiccantur, somnus exiguus fit, somnia turbulenta & enormia, saltus diuersi in singulis corporis partibus, vertigines capitis, & in auribus flatuum sonitus. Deinde ubi vitium accreuerit, atra bilis comitantur symptomata, quæ utique concoctione, vel excretionem, vel multis flatibus, vel vomitu, vel ructu leuantur. Victus ratio eiusmodi fit, quæ melancholicum humorem minime possit procreare. Verandum itaque in aere calido & humido. Cibis utendum boni succi, humidis & temperatis, pane in clibano cocto, ac probe confecto: carnibus caporum, gallinarum, perdicum, phasianorum, piscibus saxatilibus, & eiusmodi. Contra deuitet cibos omnes, qui melancholicum humorem generant, quos ordine & copiose quidem Galenus lib. 3. de affectis locis, cap. 6. recenset. Elixix, non assis, nec frixis utendum cibis. Vinum æger bibat tenue, album, neque valde vetus adeoque debile. Forte enim caput tentat. Crassum vero & nigrum viter. Exercitium sit mediocre, equitatio aut deambulatio per loca amœna & viridia, aut nauigatio. Æger etiam balneo aquæ dulcis (quo se vno præsidio cum victu humido Gal. lib. 3. de affect. locis, cap. 8. vitium hoc, ubi nondum in longum esset protractum curasse scribit) frequenter utatur. Somnus illi supra modum confert: quapropter si sponte non obrepat, conciliandus remediis supra dictis, veluti etiâ coitus, at moderatus. Gaudeat & lætetur in hocque habeat, qui iucundis sermonibus, cantu, aut aliis musicis instrumentis hilaritatem excitent. Ceterum ubi vniuersum corpus sanguine melancholico abundauerit, medendi initium a sanguinis missione auspicari expedit. Secunda vero (Galeno loco iam sæpius citato auctore) cubiti vena: præcipue autem media, quæ scilicet communis est ei, quæ humeraria nominatur, & ei quæ per axillam ad manum fertur, iecorariaque dicitur. Quod si fluens sanguis melancholicus appareat, reliquum similem in vniuersi corporis venis esse speres, audaciusque vacues. Si vero fluens sanguis talis esse non videatur, melancholicum humorem in toto corpore non redundare iudicato, ac statim eum suppressito. Talis vero non est, ubi flauus fuerit, tenuis, & rubicundus. Porro in sanguine crasso, vulnus satis amplum & latum fiat, ut ille egredi possit. Vbi enim solum cerebrum sanguinem melancholicum continet, æger sanguinis detractione non indigebit, nisi forte multum sanguinis sit, ac præseruationis gratia venam incidamus. Quum itaque ex primaria cerebri ratione melancholici efficiuntur, frequentibus balneis, victu boni succi & humido, minimeque flatuoso, vna cum decenti animi delectatione, sine alio potentiori remedio curandi sunt: humor enim qui molestat, ob temporis breuitatem ut excernatur, nondum contumax esse potest. Malum autem si aliquandiu durauerit, valentiora magisque varia medicamenta requirit. Siue igitur ex totius corporis consortio, facta prius, ut diximus, sanguinis detractione: siue solius cerebri primario affectu melancholia orta fuerit, medicamenta quæ per inferna purgant exhibere oportet. Interpositis tamen aliquot a venæ sectione diebus, in aurora quotidie æger bibat hoc decoctum, quod accipit: *Florum buglossi, echii, violarum, singulorum manipulum vnum. Vuarum passarum detractis vinaceis, unciam vnā. Aspleni siue ceterachii, manipulum vnum. Fumaria, manipulum dimidium. Corticum radicum capparum, tamaricis, utriusque drachmas tres. Radicum feniculi, petroselinii, glycyrrhizæ, singulorum drachmam vnā. Thymi, epithymi, utriusque**

Signa peculiariora.

Victus.

Balneum aquæ dulcis.

Curatio.

Decoctum præparans.

A *utriusque drachmam dimidiam. Decoquantur singula in tribus libris aquæ, donec tertia pars absorbatur, deinde colo transfundantur, & saccharo adiecto ius decocti dulce reddatur, alboque oui purificetur, & addantur serapii & fumaria, de epithymo, utriusque uncia dua, & fiat potio. In eundem usum hodie propinant serapium violaceum, & buglossa, & pomis, admixtis aquis stillaticis fumaria, lupi salictarii, intybi hortensis latifolii, endiuia vocant, & buglossi. Verum cum stillaticiarum aquarum usus ventriculo non admodum conferre videatur, præstat prædictarum herbarum decoctis uti, commistis serapiis in hunc vel consimilem modum.*

Potio:

Decoctum purgans melancholiam. Dilutum epithymi. Dilutum foliorum senæ. Pulvis purgatorius.

B *Trallianus miris modis extollit, & similibus. Proderit autem huius etiam decocti purgantis usus, quod recipit: Florum buglossi, violarum, rosarum, singulorum manipulum unum. Prunorum passarum detractis vinaceis, oxyphænicon, utriusque unciam unam. Myrobalanorum ceruleorum, luseorum, empeliticorum, beletzicorum, singul. unciam dimidiam. Folliculorum senæ, polypodii, utriusque drachmas sex. Prunorum damascenorum numero decem. Coquantur in aqua iusta quantitatis ad tertiās, dein in colo transfusis, adiecto prius saccharo, iuri decocti dulcedo ac suavitatis inducatur, de quo in aurora, uncia quatuor exhibeantur. In iis, si non satis purgent, licebit dissolvere antidoti diasenæ, drachmas duas. Mirifice quoque conducit dilutum epithymi, in eum paratum modum. Epithymi, unc. dimidia. Maceretur horis viginti quatuor, in sero caprini lactis unciis quatuor, dein valide exprimantur, & colo transfundatur, atque in aurora, propinetur. Valet etiam dilutum foliorum senæ, quod sic parari potest. Foliorum senæ, uncias duas. Prunorum damascenorum numero duodecim, contusa macerentur in sero lactis caprini horis viginti quatuor, deinde exprimantur, & colo transfundantur, atque in aurora, ut antea est indicatum, bibantur. Licebit etiam hoc uti pulvisculo, qui accipit: Epithymi, unciam dimidiam. Lapidis armenii, agarici, utriusque drachmas duas. Scammonia præparata, drachmam unam. Garyophyllorum numero viginti. Redigantur omnia in pulverem, & singulis septimanis drachmam unam, vel drachmam unam & dimidiam pondere dentur, in serapio rosarum laxativo, vel serapio de pomis. Vtile est etiam lactis sero ventrem subducere: veruntamen id non*

Sero lactis ut patet dum.

C *fit quod ex caseo fuerit expressum. Melius est enim id, quod per decoctionem, teste, ex lacte separatur. In ollam enim novam iniciendum lac, & virgulto ficus mouendum: cumque ter quaterue deferbuerit, aceto mulso irroretur: dein excolatum, potui exhibeatur, a principio quidem admixto melle: cum vero ventris subductio inceperit, non misceatur mel. Neque temere quis a purgatione, interiectis quibusdam diebus, clysteribus utetur, ut qui a capite auertere admodum queant. Sunt autem eiusmodi, qui*

Clyster.

D *accipiunt: Eumaria, lupi salictarii, thymi, singul. manipulum unum. Epithymi, manipulum dimidium. Senæ, polypodii, utriusque drach. sex. Cartami, semunciam. Seminum anisi, fœniculi, ammeos, cumini, singul. drach. duas. Coquantur usque ad tertiās. Dein accipe iuris decocti, lib. unam. Cassia fistularis recens extracta, unciam unam. Antidoti diasenæ, semunciam. Oleorum violacei, chamamelini, utriusque unciam unam & dimidiam. Salis vulgaris, drachmā unam & dimidiam. Misceantur singula, & fiat clyster. Præterea si hæmorrhoidibus aut mensibus suppressis vi-*

E *tiam hoc fuerit concitatum, horum quoque purgationem moliamur. Id quod facere nos monet etiam Hippocrates, inquit: Melancholia vexata, hæmorrhoides superuenientes, bonum. Et rursum: Infantibus si varices, vel hæmorrhoides superuenerint, insania solutio. Danda quoque sunt medicamenta, quæ animi tenebras abigere, atque adeo lætitiā parere valent, viresque reficiunt, ut est saccharum buglossi, intybi hortensis latifolii, violaceum, rosaceum; latificans Galeni vocatum, dianthon & complura alia. Nulla denique ratione, quod antea etiam monuimus, balneorum aquæ dulcis usus est negligendus. Embrochas quoque caput humectare potentes adhibere oportet, qualis est quæ accipit: Malua, althea, violarum, boraginis, singul. manipulum unum & dimidium. Chamemeli, stichadis, utriusque manipulum unum. Florum nymphaeæ, manipulum dimidium. Seminis lactucae, drachmam unam.*

Balnea. Embrocha.

F *nam. Seminis intybi hortensis angustifolii, drachmam unam & dimidiam. Bulliant in aqua iustæ quantitatis, & iure decocti caput rasum irrigetur. In eundem usum conuenit adhibere inunctiones ex oleo violaceo, chamamelino, nymphaeæ, & similibus. Studiosè postremum annitendum, ut imaginationes absurdæ, talisque, & immensa molestia, quæcunque fieri potest ratione propulsentur. Huius rei memorandum exemplum extat*

Historia.

Hypochondriacæ melancholicæ curationis.

Cucurbitularum appositio.

Vomitibus concitandis.

apud Alexandrum Trallianum, qui *libr. 1. cap. 17.* mulierem quandam hunc in modum quendam sanitati restituisse scribit. *Mulier (inquit) melancholia vitio correpta, inter dormiendum anguem se deglutisse putabat. Ciens itaque ei vomitum, anguem extinctum pelui, quæ vomitionem excipiebat, clandestine inserui: quem simulatque conspexisset melancholica, euomuisse rata, omnem falsam suspicionem posuit, & salua euasit.* Ita Philodorum Medicum quendam qui sibi caput amputatum esse, quod tyrannus factus fuisset, putabat, curasse idem tradit, imposito repente capiti ipsius plumbeo pileo, ut grauitatem sentiens, caput se recepisse rursus existimaret, quo plurimum gauisus, vana imaginatione liberatus est. Porro si ob hypochondriorum offensionem vitium constiterit, vtendum assidue potu decocti pulegii, non solum ante medicamentorum purgantium exhibitionem, verum etiam post. Similiter & centaurii decocto. Vnice autem in hoc vitio condunt decoctum hoc, quod accipit: *Florum boraginis, violarum, vtriusque manipulum dimidium. Fumaria, pulegii, absynthii, centaurii minoris, asari, chamædrys, ceriherachii, lupi salictarii, singul. pugillum vnum. Seminum anisi, fæniculi, petroselini, dauici carei, singulorum drach. vnam & dimidiam. Folliculorum senæ unc. dimidiam. Radicum polypodii, drach. quinque. Corticum radicum capparum, drach. tres & dimidiam. Ligni tamaricis drach. tres. Corticum myrobalanorum indorum, citrinorum, chebulorum, singul. drach. quatuor & dimidiam. Thymi, epithymi, vtriusque drach. duas & dimidiam. Decoquantur singula in tribus libris aqua fontana, donec tertia pars absumatur, postea decoctum colo transfundatur, alboque oui purificetur, & adiiciatur Scrapii de fumaria, de pomis, & de epithymo, singulorum uncia vna & dimidia. Deinde quoque absynthii decoctum iugiter exhibendum. Vtile enim est stomacho & ventriculo, plurimique status generationem in ventre impedit, neque extreme ventrem compescit: sed vrinam mouet, optimamque coctionem præparat: adeo ut hoc solo remedio plurimi sanati sint. Exhibenda etiam ea sunt, quæ vrinam mouent, ut anisum, daucus, assarum, careum, hypomarthri semen ac radix, & chamædrys. Horum enim quodlibet aqua decoctum sumitur, vel in puluerem redactum, potuique inspersum. Vtile etiam fuerit, ut hypochondriorum curam habeat Medicus. Foueuntur itaque ruta, anethi, absynthii, abroton, pulegii, agni seminis, baccarum lauri, serpylli, artemisia, seminis nigelle, carei, & similitum decocto. Hæc enim dolores leniunt, flatulque discutiunt, maxime ubi oleo incocta male affectæ parti cataplasmatibus instar applicantur. In flatibus autem stomachi cum punctione, cuminum aceto decoquentes, & pulegium, stomachum fovebimus. Cataplasmata autem habeant in oleo decoctum anisum, aut apium, aut cuminum, absynthium, & iis similia. Cum admoues, plurimo tempore tam vacuo adhuc stomacho, quam post cibum adhære permittes. Cumque cataplasma aufertur, contegenda hypochondria sunt lana latio-
D
riori, vel læuissima ac pura pelle agni, locum prius oleo nardino illinentes. Vtendum etiam appositione cucurbitularum leuium, hoc est, citra scarificationem. Videbitur enim tibi præsidium hoc, *Galeno libr. 12. Thera. meth. teste*, in huiusmodi vitio incantamenti cuiuspiam simile quid efficere. Ilico enim admota cucurbita, qui spiritu flatuoso cruciantur, tum a dolore liberi, tum omnino sani redduntur. Ad phlegmonas autem & durities, cucurbitulis cum incisione vtendum. Quibus vitium diu durauerit, præsentissimum est remedium, ex longis intervallis, etiam a cibis per vomitum purgatio. Non tamen
E
validis vomitoriis vtendum est: talia enim infesta sunt stomacho ac ventriculo anxietatem afferunt. Concitetur igitur vomitus cum aqua tepida, cui oxymeli sit admixtum. Quod si tamen neque hoc modo possunt euomere ægri, digitos aut pennas in os demittendo irritare oportet. Proderit autem iis vnice vomitus, qui per elleborum fit album, in eum modum: *Accipe ellebori albi, drach. vnam. Concidatur in minutas particulas, & raphano satius magno insigatur. Transactis tribus diebus iterum eximatur, raphanusque deinde fortiter exprimatur. Postea accipe succi de raphano expressi, drach. sex. Aqua calida, unc. quatuor. Oxymelitis, unc. vnam, & commixtis singul. vniuersum calidum agro propinato. Vel confice vomitorium in eum modum: Accipe ellebori albi optimi, drach. tres. Et raphano prius perforato insige, ac ibi noctem vnam integram dimitte. Postridie ubi in raphanum vires
F
ellebori migrauerint, amoto elleboro, raphanus in minutas partes dissecetur, & in oxymelite propinetur, diligenter cauendo, ne quidpiam ellebori in raphano relinquatur. A vomitu autem si cruditas adhuc durauerit, quæ ventriculum roborant, eundemque calefaciunt, exhibendæ erunt. Si vero melancholicus humor in ventriculo
vel**

A vel hypochondriis fuerit, a quo melancholica exhalatio sursum ad cerebrum transmittitur, humor ille ad modum paulo ante dictum purgandus erit. Caput denique, ne vapores illos recipiat, roborandum.

De tremore. C A P. XXXV.

Vitium, quod Græcis *τρεμο*, Latinis vero *tremor* dicitur, ex duobus perficitur motibus: vno quidem, dum cogitur membrum ob inorbum atque grauitatem ad inferiora repere: altero, dum sursum a facultate fertur. Vitium hoc in vniuersum ob neruorum imbecillitatem accidit: quod ætas senilis palam testatur. Priuatim vero plures alie causas ipsum efficiunt: nempe frigidius naturæ temperamentum, frigida potio, præsertim in febribus intempestiue assumpta. Frigidi præterea, crassi, & lenti humoris abundantia, vini que multi meracioris vsus, senectus, atque timor. Signa neque ad vitii, neque causarum dignotionem vlla sunt necessaria, quod scilicet partim visu, partim etiam ex ægri sermonibus atque corporis constitutione deprehendi queant. Victus ratio sic constituitur, ut causis plane sit contraria. Cibus vero facilius distributionis offeratur: primum sorbilis, mox volatiliū, & piscium molli carne præditorum. In crassorum lentorumque humorum redundantia, iis uti conuenit, quæ incidendi & extenuandi vim obtinent, de quibus in præcedentibus sæpe dictum est. Vitanda vero in vniuersum omnia, quæ neruos offendere possunt, vini maxime meracioris potio. Bibendum vero dilutum & aquosum, aut hydromeli. Quod ad rationem curandi attinet, qui ex erroribus commisis manifeste tremunt, a noxiis prorsus abstineant. Qui igitur ex vini portione tremunt, iis vinum circumcidendum est, quoad in totum a orbo fuerint liberati. Bant interea hydromeli, cum decocto saluæ, aut betonicæ, vel lauandulæ. Si a frigidis & crassis humoribus tremor accidit, curandi ratio erit adhibenda eadem, quæ resolutioni & conuulsioni a plenitudine ortæ, sanguinis duntaxat missione excepta. Extreme autem corporis partes oleis calefacientibus præunctæ, lanis mollibus contegantur. Dein cucurbitulæ citra scarificationem a priori vertebra vsque ad spinam lumbosque affigantur, ut scilicet crassi & lenti humores vertebrarum foramina obstruentes, ad cutis extimam superficiem trahantur, atque adeo subinde facilius discutiantur. Proderit etiam, ut æger quotidie pipæris grana quinque ex mulsi cyathis, hoc est, *unc. una & dimidia* bibat. Proderunt etiam medicamenta roborantia cerebrum, illudque calefacientia & exsiccantia, *conserua saluæ, rosmarini, lauandulæ, confectioes diagalange, & diamoschi*. Sunt præterea quedam alia medicamenta simplicia, quæ præsumpta trementes adiuuant: nempe castorium, altheæ radices, & eupatorii decoctum, & ex animalibus desumptum leporis cerebrum. Quid multa? medicamentis, vñctionibus præsertim ad resolutionis curationem conscriptis, in huius generis vitio vtendum.

De Ophthalmia, siue lippitudine, C A P. XXXVI.

Ophthalmia Græcis, *lippitudo* Latinis, nihil aliud est, quam tunice vel membrane adnata, quam barbaram sectantes medicinam, *Coniunctiuam* vocant, phlegmonem. Adnatam vero hanc dixerunt, propterea, quod aliis, quæ oculum ipsum constituunt, tunicis forinsecus adnata sit, ligamentum existens toti oculo ad circumiacentia ossa. Hinc est, quod ambientes oculorum partes, ad malas nonnunquam in vehementiori lippitudine simul attollantur. Fit hoc vitium vel ex plenitudine vniuersum corpus grauante, ob quam adnata etiam humoribus referta tenditur: vel ab influentium biliosorum humorum acrimonia vehementer erodente: vel propter crassorum humorum, aut flatulentorum spirituum intensiōem. Dignoscitur, si adnata oculi, quæ natura candida est, ob sanguinis confluxum admodum dolet, ac rubra esse videtur, & ex oculis lacrymæ resudant, atque in maioribus oculi angulis sordes quedam & lacrymæ feruidæ aceruantur. Si vero a biliosis & acris humoribus orta sit, lacrymæ fluentes acres, & rodentes erunt, vniuersumque corpus cacochymum esse apparet. Sin ex crassis humoribus facta est, grauitas magna caliditas, & rubido adnatæ exigua. Si ex flatulento spiritu accidit, adnatæ magna tensio erit, nullæque apparebunt lacrymæ. Locus in quo decumbit æger, obscurus & tenebrosus sit, splendorem enim sine molestia ferre haud possunt: & pro causa diuersitate aut frigidus, aut calidus. Si in propatulum egreditur æger, linteum atrum, aut cæruleum, aut viride oculis obducatur: siquidem ii colores visum morbo affectum,

aut fatigatum corrigunt ac recreant, *ut testatur Galenus libro primo de symptomatum causis*, v. A. bi ex professo de iis quæ oculos aut molestant, aut tristant, agit. Tenui autem prorsus vitendum victu, ac cibo parciore, ne immodice aucti humores ad oculos confluant. Deuitet carnes, lactisque vsum. Vino, præsertim inter initia abstineat, bibatque aquam in qua sit decoctum parum cinnamomi, aut hordei, donec vigor prætereat. Quod si tamen crassiores humores tensionem procrearint, hydromeli, aut vinum tenue & aquosum bibere conuenit. Exercitari haud prodest, sed quiescere. Somno moderato vtantur ægri, & maxime nocturno. Perturbationes animi procul absint. In curandi ratione animaduertendum, num ex plenitudine fuerit contracta ophthalmia: id quod cognoscitur, vbi cum ingenti dolore oculos affligente plurima tensio, rubedo, renitentia, & calor affuerit, feruidarumque lacrymarum copia defluerit: tum enim a missione sanguinis hæc ipsa auspicanda erit. Venam autem secare oportet gibberi exteriorē, quam humeralem vocant, atque eam quæ e directo est laborantis oculi. Et vbi vehemens fuerit phlegmone, ad animi vsque deliquium auferre conueniet. Si vero a rodentibus aut crassis humoribus lippitudo orta fuerit, id quod lacrymæ tenues, salæ, acres, calidæque aut contrariæ, *ut dictum est*, monstrabunt: atque adeo rotum corpus cacochymum fuerit, prauisque abundauerit humoribus, primum, quæ acrimoniam biliosorum & mordantium humorum mitigare & obtrundere possunt, & deinde, quæ noxios illos humores vacuare & purgare possunt medicamenta propinanda: quæ certe pro redundantium ac infestantium humorum varietate immutanda veniunt. Corpore vacuato, humorum, qui ad oculos feruntur impetus deorsum, & ad alias corporis partes ignobiliores, infernarum partium frictionibus, ligaturis artuum, & cucurbitulis collo & scapulis ad motis renellendus erit. Post hæc adhibenda sunt medicamenta repellentia, quæ non exasperant, hoc est, non vehementem sunt sortita adstrictionem: & quæ tum propria sua substantia sunt moderatiora, tum leniētis liquoris admixtione adhuc magis talia sunt. Lenientes autem mitigantesque humores medicamenta sunt, *Gall. lib. 13. ter. med. cap. ultim. teste*, potissimum oui candidum, scenogræci decoctum, & adhæc amplius ipsum lac. In quo sane prouidum esse medicum oportet, vt iuuenulæ simulque boni succi foemine existat, vberibus ipsius in coram, in qua collyrium teritur expressis, quo calidum adhuc oculis infundatur. Hoc vero præcipue in iis qui vehementi dolore affliguntur, vel propter phlegmonis magnitudinem, vel ob influentium humorum acrimoniam, faciendum. Fronti itaque illinendi succi rosarum, plātaginis, solani, semperuiui, foliorum salicis, aut eorundem liquores stillatici, cum oui albo & aceto. His admiscere conuenit *bolam armeniam, thus, acatiam, santalæ rubæ, balustia, & similia, ex quibus adiecto oleo rosaceo, & farina hordeacea, cataplasma aut emplastrum componatur*. Emplastica vero & anodyna, hoc est, dolores sedantia, vt est cæruſsa lota, amyllum, & cicuta, non sunt temere adhibenda. Hæc enim etsi maxime reprimere quod influit, & simul sensum torpescere possunt, tamen (*ut testatur Gal. 6. Aph. comm. 31.*) vehementes fluxiones non reprimunt, sed potius excerni prohibent. Quare si humores confluentes acres fuerint, corneam erodi continger. Si vero multi, magis irritari, & vehementius extendi. Ex quibus profecto nisi medicamentum fuerit summopere stupefaciens dolores impatibiles excitantur. Si vero tale fuerit, visoriam vim mirifice lædet. Quare vehementer stupefacientia, nisi maxima doloris necessitas vrgeat, non sunt admo- uenda: q̄ scil. facultatē visoriam offendant, adeo vt desinente phlegmone, vel obſcure & debiliter, vel nihil omnino videantur. In principio itaq; medicamēta quæ refrigerant, adstringūt & repellūt, admo- uenda. In incremento morbi, repellentib. nōnihil ex iis q̄ discutiunt, admiscendum. At in vigore, mitigatoria applicanda. In inclinatione, ea quæ discutiendi tantum facultate pollent. Vbi igitur concocta iam phlegmone ipsa fuerit, & simul corpus vacuum, vt non amplius ex capite ad oculos fluxio metuenda sit, tum vtique lauaciones iis in balneo temperato sunt aptissimæ. Nam, *ut Galenus loco paulo supra citato scribit*, & dolorem statim sedant, & fluxionem quæ ad oculos fertur sistunt, maxima quidem ex parte inter lauandum per totum corpus excreta, reliqua autem contemperato. Fomentum insuper omnino adhibendum est ipsis oculis per spongiam, si quidē mediocris sit dolor, semel aut bis in die. Si vero vehementior fuerit, præstat ter aut quater, & sæpius vt, in longis præsertim æstiuis diebus. Fiat vero fomentum per meliloti, florum chamæ- meli, &

Vitus.

Curatio.

Astringen-
tia & repri-
mentia.
Liquores
mitigantes.

Emplastica
& refrige-
rantia vehe-
menter nō
temere ad-
hibenda
sunt.
Stupefacien-
tia non te-
mere admo-
uenda.

Balneum.

Fomentum
discutiens.

- A** meli, & fœnugræci decoctum. Est enim hoc medicamentum maxime omnium, quæ oculis admoventur, sine offensa discutiens. Lauandum tamen prius curiose fœnugræcum, ne quid illi vel pulueris, vel sabuli adhærens clam lateat. Aloe etiam per se, vel succo, aut liquore stillaticio fœniculi & rosarum diluta, mirabiliter confert. Poteris itaque hoc uti collyrio, quod accipit: *Liquoris stillatici rosarum fœniculi, & euphrasie, singul. unc. v. nam. Aloes, drachmam vnam. Pompholygis lota, drachmam dimidiam.* Commisceantur singula, fiatque collyrium liquidum. Si a biliosis fiat humoribus, dolor sedandus, & bilis putgantibus medicamentis vacuanda, eiusque feruor, ac fluor compescendus. Pari ratione faciendum erit, si a crassis humorib. lippitudo fiat, nempe concoquendi & alterandi eunt pituitosi humores, postea purgandi, tandem topica adhibenda. Sin ex flatulento spiritu oriatur, itidem humores pituitosi tum alterandi, tum purgandi sunt adhibitis reprimentibus, & postremo flatu discutientibus medicamentis.

De Pterygio. C A P. XXXVII.

- P**terygion nervosa est adnatæ membranæ eminentia, seu membranula, quæ ab angulo maiori quidem oritur, sed vsq; ad coronam seu irim oculi progreditur. Quum vero augetur, pupillam etiam obtegit. Latini *unguem* appellant, barbari *ungulam*. Oritur magna ex parte ob scabiem oculorum, siue scabram lippitudinem, aut continuum humorum crassorum & lentorum defluxum. Signis quibus vitium deprehenditur nullis, est opus, cum oculis ipsis sit manifestissimum. Viæ ratio talis sit, quæ crassos & lentos humores extenuet: quæ qualis sit, ex superioribus facile cognoscitur. Ceterum quod ad curandi rationem attinet, animaduertendum, quod magna & diuturna pterygia sola chirurgia amoliuntur: quam copiose tradit Aetius libr. 7. cap. 60. & Paulus lib. 6. cap. 18. Recentiora, & magnitudine mediocria præfidiis dissipantur abstergentibus: sic tamen, ut vniuersum corpus primum a crassis & lentis purgetur humoribus. Initio itaque ea, quæ crassos & viscidos humores extenuant, & incidunt medicamenta: deinde vero quæ eosdem purgent & vacuent, sunt propinanda: quorum omnium materiam & formulas e præcedentibus petent studiosi. Neq; enim necessarium, neq; etiam decorum esse iudico, singula repetere. Corpore vniuerso purgato, pterygium primum ex aqua temperate calida, & cum decocto, *maluæ, altheæ, chamameli, semine lini, fœnugræci, & similibus* foueatur: deinde quæ extergunt repurgantue medicamenta admoventur: qualia sunt inter simplicia thus in tenuissimum puluerem redactum, item sæpiæ testa vsta. Vehementiora vero æs vstum, *chalcantum, seu atramentum sutorium, squama æris chalcitis, mysi, & fel porcinum.* Pumex præterea torrefactus & tenuissime tritus non inutiliter vino leuigatus illinitur. Fel quoq; caprinum cum succo artemisæ, & melle mixtum inungendum. Est & hoc efficax medicamentum, quod accipit: *Atramenti sutorii, drachmas tres. Gummi, drachmam vnam & dimidiam. Lenigata vino illinantur.* Et hoc quod recipit: *Atramenti sutorii, gummi, salis ammoniaci singulorum drach. duas.* Hæc trita in aceto, in collyria digerantur, ut cum vsus expostulat, adhibeantur. Aliud laudatū: *Chalcitidis vsta, donec in prunâ cōuersa sit, semunciam. Croci, drachmā vnam.* Terito & exsiccato, & vt ere, hoc nimirū puluere vngue affricans. Præstantissima enim sine liquore detrita, siue instar pulueris inspersa & affricata collyria. Mirifice etiam conducunt testæ sæpiæ cum sale ammoniaco trita, & applicata. Hæc collyria commemorasse sufficiat, quod quisq; possit sibi tam e Græcis, quam Arabibus auctoribus complura eius generis medicamenta citra laborem comparare.

De Phlyctenis. C A P. XXXVIII.

- Φ**λυκται pustulæ sunt exiguæ, veluti quædam bullæ, supra corneam potissimum tunnicam eminentes: quales iis potissimum accidunt, qui ex anthematis affliguntur. Sic dictæ ἀπὸ φλέων, hoc est, ab ebullitione & feruore. Barbari *vesicas* nominant, quod feruore humore plenæ sunt. Color phlyctenarum variatur, prout in superficie, aut profundo corneæ sunt. Nam quum cornea tunica ex quatuor veluti membranulis tenuissimis constet, sit ut interdum sub prima phlyctæna oriatur membrana, vnde etiam colore nigrior apparet. Interdum sub secunda aut tertia, quæ & candidior spectantibus offertur, quoniam in profundo occultatur: natiuus enim phlyctænæ color niger est, cornea vero tunica veluti cornu pellucida est, & candicat. Quanto igitur phlyctæna profundior fuerit, tanto candidior apparebit, magisque dolorifica, & molesta. Oriuntur ob copiam sanguinis, aut ab acribus humoribus. Notis ad vitii co-

gnitionem nihil opus eſt, quod aperto oculo ſatis appareant phlyctenz. Cauſſas digno-
ſcere haud difficile erit, ſi & doloris qualitatem ac magnitudinem, ipſarumque puſtu-
larum calorem, & ægri temperamentum, habitum, ætatem, ac eiufdem ante actam vi-
tam, & id genus alia perpendamus. Quod ad curandi rationem attinet, ægri parum lo-
quantur, euitentq; motus, & ſternutationes, iram, ſpiritus detentionem, nimium ſplen-
dorem: deinde cibo & potu vtantur exiguo, molli, & concoctu facili. Si plenitudo fue-
rit totius corporis, ætaſque & alia permiferint, vena humeraria, ſuperior ſecanda erit,
potiſſimum ſi phlyctæna magna fuerit, & rubor acceſſerit. Aluum quoque clyſtere acri-
citabimus, vt humorum deſluxus deorſum vertatur. Aluus etiam cum iure galli, aut cni-
cremore, aut aloe, manna, pulpa caſſia ſiſtularis, oxyphenico, aut alio quopiam ſimplicium aluum
ducentium mouenda. Vehementiora vero medicamenta purgantia, præſertim quæ ſto-
macho aduerſantur, euitanda. Deligationes quoq; , & linteorum lanæue applicationes
ab eiſdem remouebimus: ſunt enim hæ infeſtiſſimæ non eiſ tantum, ſed omni quoque
lippitudini ab acribus humoribus ortæ. Locus igitur initio illinendus eſt, quando phle-
gmone obſederit, leuib. quidem rebus, ſed apte adhærentibus. Sumenda enim linteo-
la tenuiſſima & molliſſima, ſuper quibus extends medicamenta, quæ inſtar fomenti
aut cataplaſmatis adhibebis, & toti oculo appones complectendo malam, ſupercilium,
& répora: actamdiu permittes, quamdiu humida fuerint. Vbi vero aruerint, ſtatim au-
feres, nouumq; rurfus ſimili modo appones. Eligere autē oportet illa, quæ ad phlegmo-
nes conueniunt, hoc eſt, quæ reprimunt, roburque oculo adiiciunt, atq; adeo ne malum
latius ſerpat prohibent: vt ſunt ouorum vitelli, in aqua roſarum ſtillatitio liquore vehementer
agitati, & cum croco, & opii portiuncula, ſapag, vel lacte & pane ſubacti, poma cotonea decocta, &
malicoria in aqua elixata. Obſeruandum tamen vnice, quod antea quoq; monuimus, ne oculus
arcte vinciatur: id enim aduerſiſſimum eſt: imo ſedata phlegmone cataplaſmata & fo-
menta, vtpote quæ grauitate ſua lædunt, remouebis. Quare alii malunt liquidis collyri-
is vti, quale hoc eſt, quod accipit: Licii, croci, vtriuſq; drachmam dimidiam. Acacia ſcrupulum
vnum, Thuris, ſcrupulos duos. Albi ouorum & liquoris ſtillatici roſarum, vnciam vnā. Commix-
tis omnib. fiat collyrium, de quo guttatim in oculū inſtilletur. Si fomenta applicantur, obſeruā-
dum erit, vt principio tepida ſint: calidiora n. phlegmonem exacuunt. Tranſacto initio
balnea, ceteraque calefactoria conceduntur, quæ reliquum diſcutere valent. Quare
non inutiliter oculus decocto chamemelī, ſenugraci. ſeminis lini, meliloti, & ſimilium fouetur,
aut de eo guttatim in oculum inſtillatur. Toto curationis tempore a vino abſtinen-
dum, & aqua, in qua parum ſit decoctum cinnamomi potanda, cibique molles, & qui fa-
cile concoquuntur, aſſumendi. Quod ſi phlyctæna ob multitudinem rumpatur, aut
propter acrimoniam erodatur, vt inde membrana vlceretur, peculiarem curandi ratio-
nem requireret, quam ſequenti capite docebimus.

De vlceribus oculorum. C A P. XXXIX.

VLcera nunc in adnata membrana, nunc in cornea, interdum etiam in palpebris, &
angulis oculorum fiunt. Accidunt nonnunquam a cauſſa externa, ſpina, ictu nimi-
rum, concuſſione, & iis ſimilibus. Magna vero ex parte ab interna cauſſa, puta acrium
humorum eroſione. Si a cauſſa externa, quam primitiuam hodie nominant, vlcus exori-
tur, facile eſt ſermonibus ægri & aſtantium cognoscitur. Si vero ab acribus humoribus, e
pruritu, dolore ac punſtione, promte ſciri poteſt. Ceterum vlcera in adnata membra-
na oborta, non ita ſunt pernicioſa, periculoſaue, vt ea quæ corneæ innalcuntur. A o-
mnium pernicioſiſſimum vlcus eſt, quod corneæ e pupillæ regione euenit. Siquidem
hoc vlcus pupillæ procidentia ſubſequi ſolet quam ocuſſime, ſiue autem in adnata, ſiue
in cornea, ſiue in palpebris, ſiue in angulis, ſiue in quacunque oculi parte vlcus fieri con-
tigerit, communi conſilio curabitur, quemadmodum reliqua totius corporis vlcera. Corpore
itaque pleno exiſtente, a venæ humeralis eiufdem lateris ſectiōe, curationem auſpi-
cabitur. Si vero ab humorum acrimonia vlcus fuerit exortum, purgantibus medica-
mentis vtetur, & clyſteribus aluum eluemus, atque humorum deſluxum ad inferiora F
auertemus. In quem uſum inferiorum etiam membrorum frictio plurimum conferet.
Quod ad localia attinet medicamenta, ob partis affectæ naturam, quam leniſſima ad-
hibenda ſunt. Si itaque vlcus cum phlegmone infeſtet, & inflammatio adhuc circa ocu-
lum exiſtat, aut quiſpiam etiam dolor, oculo per initia collyrium album muliebri lacte
detri-

detritum ac dissolutum immittendum erit. Oculus etiam oui albumine irrigandus, & illinendus linimento, quod ex ovo simul cum vitello ac rosaceo, & vino tepesfacto conficitur, excipiturque lana & applicatur. Subsequentibus diebus fovebis rosarum aut meliloti decocto instillabisque, lac mulieris cum ovo recens multum, vel tepesfactum. Linimentis præterea veteris, quæ ad phlegmones & inflammationes descripta sunt, præsertim, quod ex capitibus papaveris, meliloto, croco, & pane præparatur. Leuia tamen sint linimenta, & superior tantum palpebra illis illinatur, ut commode aperiatur oculus ad defluendas lacrymas excernendas. At si vlcus sordidum fuerit, nulla mediocriter aquosa, & fœnugræci decocto utemur per se, aut adiecto quoque melle.

B me purgari oportet: deinde plurimum ablui: postea in aqua dulci purissima die ac nocte madefactum in fictili exactæ decoqui, vitarique in decoctione vas æneum. Postero die effusa priori aqua, & alia pura affusa, ad ignem splendidum fumo carentem decoquito. Ideo vero primam & secundam aquam abiicimus, ut omnis inde amaritudo eximatur. Tertio igitur purissima aqua adiecta & exquisitissime operata, hanc ad liquidioris mellis consistentiam decoquito: inde per linteam excolabis, fœnugræcum nequaquam exprimens, sed eo tantum succo contentus, qui sponte defluet, quem ad sordes depellendas seruabis. Seruari autem in alteram diem, vel quam longissime in tertiam potest: vltius n. moratus acescit. Vbi vlcus satis purgatum fuerit, a succo fœnugræci abstinerebis, & ea quæ glutinandi ac incarnandi vim obtinent admovebis. E quorum numero est hoc ethure collyrium, quod accipit: *Ammoniæ, sarcocollæ, utriusque drachmam dimidiam. Thuris, drachmas decem. Croci, drachmas duas, Omnia leuigata, ac fœnugræci succo excepta, in collyria digerantur.* Vlceribus iam incarnatis, & ad planiciem (quoad fieri potest) reductis, collyria quæ ad cicatricem ducunt, admoveenda erunt, quale est, quod accipit: *Pompholygos elotæ, drachmas tres. Plumbi vsti & loti, drachmas duas. Croci, drachmam unam. Squama aris, drachmas duas. Gummi vncias tres.* Omnia leuigata, & aqua pluuiali excepta, digerantur in collyria ad vsum. Sunt qui aloem diligenter lotam, & corallia rubra adiiciunt.

Fœnugræci succus, quem barbari mucilaginem vocant, ut patrandum.

Collyriū ethure.

Collyriū ad cicatricem ducens.

De cicatricibus & albuginibus oculorum. CAP. XL.

Post curationem vlcum oculorum, dum continui eorum solutio restituitur, cicatrices illis innascuntur, quæ alio nomine *albugines* vocantur. Hæ autem duplices sunt, quædam enim in summa oculi superficie consistunt, & hæ quidem Græcis *νεφέλια* & *νεφίλια*, Latinis autem *nubecule*, & *cicatrices*, & *albugines* *tenuēs* dicuntur. Quæ vero radices altius agunt, has *αδνώματα* Græci, *albugines crassas* Latini vocant. Ceterum hæ oculi cicatrices recte *albugines* dicuntur, omnes enim cicatrices in nigro oculi candidæ videntur: densata enim cornea tunica, subiectus ipsi cæruleus color non amplius transparet, emittentes vero præcipue albescunt, planæ minus candicant, magis caui autem parti nigræ oculorum quodammodo assimilantur. In exterendis autem cicatricibus vnice opus est congrua victus ratione, ut temperata materia, probusque succus per totum corpus diffundi possit. Ab omnibus igitur acribus, salis, & crassi succi cibis, ac vini copia abstinere oportet: maxime vero concoctioni studere, rebusque boni succi mediocriter vesci. Locus autem affectus siue laborans, illinendus est ante cibum, hesternæ cœnæ exactissime concocta, perceptaque capitis & vniuersi corporis leuitate, alioque exonerata. Neque statim inungendus est, qui modo a lecto surrexit, neque ante cœnam. In curandi ratione, in primis sunt euitanda medicamenta acria, quæ cicatricem excoriant. Nam ex illorum acrimonia defluxus concitantur, & phlegmones, atque interdum dissolutis cicatricibus profundantur vlcera. Eligenda igitur sunt medicamenta expurgantia & extergentia, mixta cum iis, *Aetio teste*, quæ moderate adstringunt. Inter ea autem medicamenta, quæ recentes cicatrices abstergunt, laudatur *equinum lac cum modico melle assidue illitum. Anagallidis item caruleum florem ferentis succus, cum melle oculo instillatus. Mentæ etiam succus mirum in modum confert. Minoris centaurii succus cum melle. Item chelidonii succus ex melle. Vetusiores albugines as solum, aqua tritum, modo collyrii, extenuat. Iisdem butyrum priuatim illitum extreme conducit. Rumicis quoque domestici, & plantaginis semen in fictili crematum, tritumque exactissime. Item sepiæ testa combusta, & cum melle in pollinem reducta. Valet & hoc ad albugines exterendas, quod accipit: *Chelidonii sicci, & succi eiusdem exsiccati, utriusque drachmas tres. Seminis ameos, sachari utriusque drachmas duas. Terantur omnia, fiatque pulvis subtilissimus, oculisque inspergatur.* Præstat tamen iis adiciere aliquid adstringentium, ut est *sarcocollæ*,*

Cicatrice oculorum, siue albugines. *νεφέλια* & *νεφίλια*. *αδνώματα*. *Albugines vnde dicitur.* *Victus.*

Curatio.

Collyriū aridum.

aut thus. Cornu autem cerui & caprarum, combusta, sine omni erosione abstergunt. A
 Aloe vero mixta cuiusdam facultatis est, sicut & rola: inest enim illis quædam amaritu-
 do qua extergunt, inest & adstrictio, qua vnire possunt, & ad cicatricem perducere. Ad-
 iiciamus iam dictis collyrium adhuc vnum aridum, quod recipit: *Ossium, sepia, sarcocolla,*
aristolochia rotunda, myrrha, spuma, nitri, sacchari, singulorum drachmas duas. Tritis omnibus fi-
 at puluis. Hæc commemorasse sufficiat, quia plura alia apud diuerfos auctores conscri-
 pta reperiuntur.

De Sugillatis. C A P. XLI.

ὀφθαλμὸς καὶ ὑπὸ πύριον
 Sugillata.
 Macula
 oculi.
 Causæ.
 Signa.
 Curatio.

Y *Πύριον* Græcis dicitur, quando propter ictum aliquem fractis aut contu-
 sis vasis, intra tunicas oculorū sanguis colligitur, & in extima parte veluti sanguinis
 puncta apparent. Latini *sugillationem* & *sugillata* vocant. Recentioribus Medicis *macula*
oculi appellatur. Causæ ex iam præmissa descriptione satis patent. Signa etiam nulla re-
 quiruntur, quod vitium visui statim se manifestet. Porro cum sanguinis effusio e venis
 facta est, accidit, vt progressu temporis liuescat & denigretur, exiguis nimirum grumu-
 lis ex sanguine in multas oculi partes disperso, coactis. Quare merito ad eius curatio-
 nem statim festinant Medici priusquam denigrescant, eo sane curationis consilium di-
 rigentes, vt sanguinem dissipent: non ignari, quod sanguis qui in grumos coierit, æ-
 gerrime possit discuti. Quia vero tunica venularum, ex quibus sanguis exsilit, contun-
 ditur ac rumpitur, parum quid ex adstringentibus ad discutientia admiscetur. Si enim
 solam discussoriam facultatem haberet medicamentum in principio admotum, non
 solum quod effusum est discuteret, sed & per fissuras aliquid sanguinis, qui in contusis
 venis continetur, attraheret. Postquam vero in naturalem statum redierint venulæ, ci-
 tra adstrictionem ad discutientia medicamenta venire tempestiuum est. Quare venæ
 sectione, si opus fuerit, aut purgatione, si ita visum fuerit, præmissa, statim sanguis pa-
 lumbi, vel columbæ ex teneris præcipue alis expressus, aut lac muliebre calidum, cui
 thuris vel croci paululum sit adiectum, instillandum. In eum quoque vsu albumen
 candidumue oui tepesactum oculo infundendum. Atque amplius lana munda exce-
 ptum, & superimpositum. Recte autem valet & luteum oui tosti, cum vino illitum: aut
 melilotum coctum ex vino, eodem modo impositum. Insuper *rosarum folia & flores seor-*
sim, & cum vino trita, tenuique polenta, aut brassica folia illita profunt. Recens etiam caseus, &
 qui salem nuper accepit, eo quod mixtam facultatem, emplasticam & obturantem
 per se, & discutientem & aliquantulum adstringentem ex sale habeat, initio illitus confert.
 Huius quoque generis sunt, *crocus, melilotum, & rosa.* Hæc autem antequam admoueantur,
 oculus decocto melilori & *sænugraci* fouenduserit. Conducit autem bis in die medi-
 camentum applicare, ac simul prius decocto prædicto calido per spongiam mollem
 fouere. Vbi vero iam sine phlegmone oculus fuerit, & sugillata vetustatem contraxe-
 rint, ex solo *sænugraci decocto* oculi fouendi erunt, & discussoria, citra ea quæ adstringen-
 di facultatem obtinent medicamenta, sunt admouenda. In veteratis vero sugillatis, &
 quando nigrescunt, conuenit *raphanus* applicatus. Discutiens etiam medicamentum
 est *myrrha, hyssopum, sænugracum, chamamelum, folia lilii, & alia, quæ in libro 1. de compos. me-*
dic. recensimus. Ex iis studiosi parabunt medicamenta idonea, quorum etiam copiam
 apud Galenum libro 5. de compos. medic. secundum locos inuenient.

De pure sub cornea. C A P. XLII.

πύριον καὶ ὑπὸ πύριον
 Sanies in-
 tra cor-
 neam.
 Causæ.
 Notæ.
 Curatio.

P *πύριον* vitium Græcis fit, quando pus sub cornea nunc altius, nunc in sum-
 ma superficie colligitur, humani vnguis specie. Hinc est, quod idem vitium Græcis
 etiam *ὑπὸ πύριον* nominetur. Aliqui interpretes *ungulam*, barbari *sanem intra corneam* vocant.
 Fit interdum ab vlcere, interdum etiam sine vlcere, si capitis dolor, aut lippitudo, seu
 phlegmone præcesserit: ob ingentem enim phlegmonem disruptis vasis sanguis effu-
 sus suppuratur. Signa partim nunc dicta sunt, quibus accedit *pulsatorius dolor*, ac circa v-
 niuersum oculum rubor, & temporum dolor. Initio curationis, si phlegmone affuerit, alius
 clysteri abluatur, & inaniatur. Dein, vbi nihil obstiterit, sanguis a superiori gibberi ve-
 na, quam *humeralem* vocant, mittatur, & cucurbitulæ occipitio, aut sanguisugæ tempo-
 ribus affigantur. Quibus peractis medicamentis ad phlegmonem idoneis, & antea
 commemoratis, vtendum. Phlegmone sopita, aut nulla penitus existente, locum
 spongiis, primo moderate, deinde adiectis quibusdam, decocto nimirum *sænugraci & si-*
milium,

A *miliū*, paulatim progrediendo, magis ac magis fouēbimus. Ad curationem autem huius vitii mediocriter discutientia medicamenta, ut est *aqua mulsā, fœnugraci succus, & huiusmodi*, vtilia sunt. Quæ enim vehementius discutunt, & exsiccant, statim quidem ea, quæ tenuia sunt, vacuant: reliquum vero crassius redditum, cogunt atque exsiccant, ut vix extirpari queat. In summa, si vitium citra vlcerationem consistit, valent medicamenta, quæ supra in *capite de pterygio dicta sunt*. Si vero cum vlceratione, tunc ea, quæ mediocriter discutiant, quorum multa in superioribus recensuimus, magis conueniunt.

De Suffusione. CAP. XLIII.

B *Υπόχρου καὶ ὑπόχρους* Græcis, *suffusio* Latinis *cataracta* barbaris dicta est, *humoris lenti & glaciei modo concreti, inter corneam & crystallinum humorem affusio*, quo visus eatenus saltem impeditur, ut non possit discretas rerum species & colores oculis apprehendere. Eius mali causa est, ut ex iam dictis constat, humor crassus iuxta pupillam inter corneam & crystalloiden collectus. Fit etiam Paulo libro 6. cap. 21. auctore, ob frigiditatem & imbecillitatem spiritus visorii: idcirco senibus, & iis, qui longis morbis laborarunt, magis euenit: ob violentum denique vomitum, & istum. Incoante vitio tanquam pusilli culices, vel alia luentia, caliginosæque corpuscula assidue præ oculis aduersari videntur. Quibusdam veluti lanarum filamenta, & telæ araneæ, quibusdam circa lucernas circuli offeruntur. Aucto vitio, symptomata quoque augentur. Hæc autem nonnunquam propriæ noxæ oculi, nonnunquam ventriculi malo feruntur accepta. Quare inter hæc duo discrimen habendum est. Si enim visa ob humorum in ventriculo contentorum vitium oborta fuerint, utriq; oculo similiter accidunt. Quæ vero per proprium vitium apparent, neque incipiunt simul in utroque, neq; similiter apparent. Deinde ex tempore quoque ipso distinguuntur. Si enim tribus quatuorue, aut etiam pluribus mensibus suffusionis symptomata apparuerint, contemplantique tibi pupillam, nihil tenebrosum videatur, ab ore ventriculi malum procedere inuenies. Si vero non ita multum temporis intercessit, querendum est in primis, utrum ex quo incepit malum singulis diebus perpetuo huiusmodi apparitio perseverauerit, nullo scilicet interueniente die, qui omni querela caruerit, an diebus quibusdam laborans exacte videatur conualuisse. Nam assiduitas suffusionem portendit. Intermissio vero, quod vitium a ventriculo prodierit, suspicionem excitat. Idque magis, si ubi quis perfecte concoquens, nullam sibi visum apparere fatetur. Sed multo magis, si quum apparuerunt visa, mordicus in ore ventriculi doluit: maxime vero, si post hæc vomendo, eiecta re mordente, mitigata fuerint symptomata. Vbi vero altera pupilla tenebrosior, aut turbidior, aut non exacte pura videtur, suffusionis esse initium censendum est. Vetus ratio in hoc vitio fit attenuatoria, & exsiccatoria. *Hyssopo* igitur, *satureia*, *sampsuco*, *fœniculo*, *betonica*, *salvia* & *euphrasia* in cibo utendum. A vino abstinence in tota medicatione æger, & pro eo aqua, in qua parum sit decoctum, cinnamomi, aut aquam mulsam bibat. Euitet omnia caput replentia. A balneis sibi caueat, nisi vel lassitudinis, vel cruditatis causa sint necessaria: atq; ne tum quidem in aere balnei diutius immorari, neq; in solio persistere: sed sensum quidem ingredi, confestim vero egredi oportet. Fugiat pisces, fructus, & quicquid corpus humectare potest. Curandi ratio inter initia quum per consensum ventriculi accidit, nec affectus adhuc in oculo est, purgatione, quæ per hieram picram fit, & aliis quæ euaporationem a ventriculo ad caput prohibent, curatur, nisi quid obstat, a sanguinis missione incoanda. Vena autem gibberi secanda exterior, seu humeralis. Acribus etiam clysteribus & purgationibus, utendum, quorum formulas e superioribus petent studiosi. Neq; negligenda sunt medicamenta extenuantia, tam simplicia, quam composita, quæ redundantes humores præparant, ut ex simplicibus sunt paulo ante nominata. Ex compositis serapia ex *hyssopo*, *calamintha*, & *stichade*, qualia multa recensuimus in superioribus capitibus. Inter cetera vero hoc potissimum confert, quod accipit: *Oxymelitis scyllitici vncia una. Mellis rosacet, vncia dimidia. Liquoris stillatici fœniculi, betonica, maiorana singul. vncia una. Commixtis omnibus fiat potio.* Potest parari decoctum e *fœniculo*, *euphrasia*, *verbena*, *ruta*, *cheldonia*, & id genus aliis oculis destinatis herbis. Inter ea quæ purgant, non postremum esse hoc in vitio videtur illud, quod recipit: *Catapotorum cochiorum, lucis sine quib. esse nolo, sing. scrupulū unum. Agarici in formam pastilli redacti, scrup. dimidium. Cum stillatitio liquore fœniculi,*

fiant pilule. Frequenter vero pilulis vtendum erit. Post vniuersi corporis purgationem A cucurbitulæ cum scarificatione occipitio sunt affigendæ, vtendumque per interualla apophlegmatismis, & iis, quæ per nares purgant, quorum formulas in *præcedentibus capitulis* & in lib. 2. de compos. medic. posuimus. Cauterium quoque, quale est, quod cap. 20. descripsimus, occipitio aut post aures apponendum erit. Oculis autem medicamenta, tum simplicia, tum composita, quibus discutiendi vis inest, adhibenda: vt est *melsæniculi succus* & liquor stillatitius, ruta, verbenæ, betonica, chelidonium anagallis, folia vitis, & caprifolium vocatum. Inter composita vero hoc potissimum conducit, quod accipit: *Liquoris stillatitii sæniculi vncias duas. Liquoris stillatitii chelidonia maioris euphrasia, vtriusq; vnciam vnā & dimidiam. Sagapeni, drach. vnā. Pompholygos, drachmas duas. Misce, fiat que collyrium.* Vel illud, quod habet liquorum stillatitiorum rosarum, sæniculi, euphrasia, chelidonii, florum lilii conuallii, singul. vnciam vnā. Vini optimi pellucidi, drachmas septem. Aloes optima thuria præparata, cinnamomi, polii, radices Valeriana, testarum sepia singulorum subtilissime puluerisatorum scrupulum vnum. Sagapeni, scrupulum dimidium. Sachari candefacti, drachmas tres. Caphura scrup. dimidium. Miscetur, fiat collyrium. Præterea omnia fellis genera per se, aut cum sæniculi succo illita profunt. Myrrhæ quoque & piperis partes æquales cum melle. Atque ea, quæ nunc commemorauimus præsidia, suffusionem recentem, & quæ nondum radices egit, curare possunt. Vbi vero vetusta & perfecta fuerit, sola chirurgia sanabitur, quam Paulus loco antea citato abunde docet.

De dilatatione & diminutione pupillæ. CAP. XLIV.

Modulus. **M** *Thapsias* Græcis, dilatatio, aut effusio pupillæ Latinis dicta, fit quando pupilla colore quidem nihil euariat, sed multo quam consuevit latior fit, vt interdum iridis circulo appropinquet: qua nonnunquam omnino visus impeditur, interdum permultum, vt videat quidem eger, sed obscure. Contrarium huic vitium, in quo pupilla angustior, obscurior, rugosiorq; fit, Græcis *spasms*, Latinis *tabes* & *diminutio pupillæ* vocatur. Recentiores constructionem pupillæ nominant. Dilatatio accidit ob humorem excrementitium, qui confertim vel sensim affluens vteam extendit. Diminutio vero propter densationem a siccitate ortam. Hinc est, quod magna ex parte periculosas imbecillitates ab inanitione factas, & vehementissimos capitis dolores comitetur. Signis ad vitii dignotionem nullis est opus, quod visui expositum sit. Præterea qui dilatatione pupillæ laborant, iis omnia quæ vident, propter visibilis spiritus dispersionē, minora apparent. Contra, qui diminutione eiusdem afficiuntur, iis propterea, quod cogatur ac densetur spiritus visibilis veris maiora esse videntur. *Vitæ ratio* in dilatatione sit extenuatoria, alioq; emolliendæ idonea. A vino vltq; ad exactam sanitatem, prorsus abstinendum. Deambulationes lenes ac longæ in obscuro loco factæ conducunt. Ad balneum crebro accedendum non est. Atq; vbi accesserit æger, capitis lotioni parcendum. In diminutione vtendum vitæ ratione humectante, nimirum sorbitionibus boni succi, vinoq; flauo & odorato. Cibum somnus mox sequatur. Balnea quoq; profunt, & capitis cum calida aqua irrigatio. Qui dilatatione pupillæ infestantur, iis primum sanguis a vena gibberi exteriori mittendus, aut purgantia medicamenta propinanda. Quæ si fieri nequeunt, venas in angulis oculorum diuidere oportet: deinde cucurbitulam occipitio admouere. Omni præterea studio annitendum, vt materia ad inferiora trahatur. Clysteribus igitur vtendum, vt aluus humecta sit, & humores noxii ad inferna detrahantur. Marina quoq; aqua frontem & oculos perfundere cōuenit: hyeme quidē tepida, æstate autem frigida. Imo & facies tota in eadem aqua mergenda est, ibiq; apertis oculis aliquo tēpore detinenda. Quod si desit marina, dulci aquæ quidpiam salis adicite, aut poscam aquosam sumito. Ceterum medicamentis localibus vtendum sub adstringentibus. sicut rosa, croco, spica nardi, thuris cortice, pompholyge, acacia, & iis similibus. Item medicamentis mediocriter discutiendis. Vehementiora enim & aciora, humorum copiam attrahunt, atq; adeo membranas distendunt, latioremq; pupillam efficiūt. Plurimum autem adstringentia, & nimium refrigerantia membranas indurant: emplastica vero easdē crassiores reddūt. Pupillam autem plus æquo cogere & coarctare omnino inutile est: nam ita tandem diminutionem incurreret. Ex medicamentis itaq; moderate adstringentibus & exsiccantribus siue discutiendis collyria huic vitio idonea parabuntur. Tale autem est, quod recipit: *Croci, aloes, myrrhæ, singul. drach. duas. Pompholygis lotæ, licii, vtriusq; drach. vnā. Vini optimi, vncias duas.*

A *Mellis unc. tres. Crocus primum ex vino modico teritur, deinde aloë, myrrha, & alia. Vbi crassitudinem acceperint, mel additur. Vnita in vitreo vase reponuntur ad vsum. Diminutioni contrariam adhibere oportet curationem, superiora membra exercendo, humeros scilicet & brachia, cum spiritus detentione, caputq; & faciem diligenter fricando, extremisq; digitis oculos cōtrectando, ac calida tepidaue faciem fouendo: deinde caput vnguento aliquo eorum, quæ moderate calefaciant, verbi gratia irino, vngendo. Tum palpebris paululum diductis illinendum erit oculo acre & rarefaciens medicamentum, quod humores possit attrahere, quale hoc est, quod accipit: *Ammoniaco, drach. unam. Li. Collyrii. cii, drach. tres. Croci, drach. duas. AEruginis, drach. dimidiam. Tritis in aqua, & subactis vti or.**

Curatio
diminutionis.

De visus obscuritate. C A P. XLV.

B *Μαῖστος* Græcis, *obscuritas visus* Latinis dicitur. Est autem *omnimoda, vel maxima ex parte videndi interceptio, sine manifesto pathemate visionis circa oculum apparente: pura enim undiq; pupilla conspicitur.* Hæc interdum paulatim irremit, interdum etiam repente ingruit, vt perquam modicum, vel nihil omnino cernatur. Obscuritatis itaque sensim irrepentis causæ plurimæ sunt, vel enim spiritus crassescit, vel tunice densantur: vel humores oculorum non crassescunt tantum, sed etiam lentiores fiunt, atq; adeo spiritus visorios obscurant. Longus præterea ac diuturnus morbus, & ingens moeror, ob humorum dissipationem, quam veluti oculi corrugatio sequitur, visus obscuritatem efficiunt. Repentinæ vero, nerui viscerii, propter crassos lentosque humores confertim in ipsum incidentes, obstructio, vel eiusdem resolutio causa est. Præcedunt hoc vitium assiduæ cruditates, vini meri potio, mora que sub sole, capitis calefactio aut refrigeratio, post cibum continuæ lectiones, vel balnea, vomitus, concubitus importunus & immoderatus, violenta spiritus detentio: quod tubicinis frequentissime accidit. Hæc itaque iis similia si fuerint moderata *ἀμβλυωπία*, hoc est, hebetudinem efficiunt: immoderata vero obscuritatem. Porro accidit nonnunquam obscuritas ob vehementem capitis percussione aut casum a sublimi loco, neruo visorio resoluta aut contusa: vel, quæ omnium benignissima est, ob ingentem concussionem delapsa humorum multitudine, & neruum visorium obstruente. Neruo resoluta, aut tarde, aut nihil mouetur oculus. Si vero propter violentum capitis ictum, vel casum a cerebri connexionione abscindatur, primum quidem oculis redditur prominentior, postea etiam excavatur, & non alitur. At vbi propter crassorum lentorumque humorum multitudine, absque alia causa nerui cavitatis obstruatur, grauitas capitis, præcipue in radicibus oculorum consequitur. Si igitur repente inuaserit aliquem visus obscuritas, & æger plenitudine laborauerit, gibberi venam anteriorem, aut mediam secare oportet: tunc enim expeditissimum præsidium sanguinis missio est. Aliquot deinde diebus interiectis, iubet Aërius, fasciam collonectere ac constringere venas, iisdemque tumefactis iterum eam soluere, & idem tertio repetere, vt per spiritus motum humores obturati agitentur, & violenter concutiantur. Postea a tumefactis angulorum naso adiacentium venis, vtrinque sanguinem copiose mittendum esse præcipit: atque se quandoque tres cotylas ab iis ipsius venis eduxisse. Quibus omnibus peractis, cucurbitulam cum scarificatione occipitio affigere oportet. Contingit enim plerumque, vt cucurbitula adhuc in hærente, homo repente respiciat. Hirudines etiam in hunc vsum, admonere temporibus cōuenit. Neq; iam dictis prædiis tantum contenti erimus, sed totum corpus quoq; si vires fiant, purgabimus medicamentis, quæ crassos & lentos humores educere possunt, antea tamen præparatos. Clysteris quoque attractorii & ab oculis reuellentis vsus laudatur. Postea apophlegmatismis, sternutamentis, & id genus aliis medicamentis caput expurgandum, qualia multa supra, vbi de capitis egimus dolore, produximus. Sinapismi etiam vsus in capite non erit alienus, & adurentia medicamenta, quæ *καυστικά* Græcis dicuntur, occipitio admota. Collyria denique e *succis vel stillatis liquoribus saniculi, ruta, chelidontii, melle, pipere* longo, *aloe, Pompholyge, myrrha, ammoniaco sale*, & similibus parata, conducunt. Si vero visus obscuritas sensim accidit, idem sanguinem ab angularibus venis mittemus. Et si æger pauci fuerit sanguinis, id protinus ab initio facere oportet. Sin multi, ex humerali primum sanguis auferendus. Deinde cucurbitula cum scarificatione occipitio affigenda. Purgare etiam corpus conuenit. Perseuerante quoque morbo, caput per errhina, & a-

ἀμαρυστος.
Obscuritas.

Causæ.

ἀμβλυωπία.

Signa.

Curatio.

Collyriū.

Viſus.

lia paulo ante commemorata purgabimus. Illitio autem oculorum primo quidem in A
omni obscuritate quouis modo conflata, simplicioribus iam recensitis fiat, postea ad
composita transeundum, quale est, quod accipit: *Liquoris stillaticii betonica, ruta, verbena-*
ca, chelidonii, euphrasie, fœniculi & rosarum, singul. unciam unam. Piperis longi, drach. unam. A-
loes, scrup. duos. Myrrha, scrup. unum. Pompholygis, drach. dimidiam. Arida terantur minutissi-
me, & formetur collyrium. In viſus ratione in utroq; sane vitio concoctionis curam vnice
habere oportet. Aer sit moderatus, siue parum ad siccum declinet. Somnus cōfert mo-
deratus, & nocturnus. Enitendum etiam, vt alimentis præcipue aluum emolliamus. Ex-
ercitio inferiorum partium, vt humores deorsum trahantur, vtendum, pluribusque de-
ambulationibus in obscuro loco. A vino abstinendum, & aquæ potio viriliter toleranda,
aut mulsæ, aut aquæ ex cinnamomo decoctæ. Omne crassioris succi alimentum, assidu-
umque cōcubitum, & capitis insolationem, balneaq; & meridianos somnos vitare cō-
uenit, neque a cibo nimis agitari, neq; legere, aut scribere. Animi perturbationes, ira, &
curæ ingentes, tumores, & eiusmodi fugiendæ, præsertim a cibo. Vitandæ etiam assidue
vomitiones. Confert autem quotidie frigida, præsertim pluuiæ, aqua faciē abluerē.

De Nyctalopis. C A P. XLVI.

νυκταλω-
πης.
Nuscitio-
fi.
Noctur-
na cæci-
tudo.
Causa.
S. gna.
Viſus.
Curatio.

Enthimō.

Purgatio.

N *νυκταλωπης* Græcis, *nuscitiosi* Latinis, dicti sunt, qui interdum quidem vident, sole vero occi-
dente obscurius, sed noctu omnino nihil. Plinius & alii Latini vitium ipsum nocturnam ca-
citudinem vocant. Accidit ob capitis imbecillitatem, præsertim propter visorii spiritus,
reliquorumque humorum, ac tunicarum oculi crassitudinem. Vitium ex ægrotantis
querimonia innotescit. Viſus ratio in vniuersam sit extenuatoria, vitandaque omnia
crassefacientia. Abstinendum a vino. Curatio, si æger boni habitus fuerit, a sanguinis
missione auspicienda. Incidendæ vero in gibbero humeralis, & in angulis oculorum ve-
næ. Si vitioso succo abundauerit, idoneo medicamento purgetur, sic tamen vt antea
attenuantibus & incidentibus medicamentis humores crassi præparentur, aut per cly-
sterem aluus inaniatur. Post totius corporis vacuationem, apophlegmatismos adhibe-
bis, ac per nares materiam attrahes, sternutationesque concitabis. Præter autem alia
medicamenta, quæ supra commemorauimus, vnice hoc confert, quod habet: *Piperis,*
staphydis agrie, utriusq; scrup. duos. Sinapi, scrupulos quatuor. Terito & cribrato: deinde cum
succo radicum betæ ad mellis liquidi consistentiam excipito. Hæc vbi simul subegeris,
naribus ad moueto, iubeq; vt per nares attrahantur: idq; diebus quinque aut septem effi-
cias. Insuper ante cibum *hyssopus, origanum, ruta* decocta potui dentur. Si iis præsidis
morbus non propulsabitur, igitur purgationem molienur. Commendat autem vnice
Actius hoc, quod habet: *Scammonii, drachmam dimidiam. Castorii, scrup. unum. Salis, drach.*
dimidiam, idq; in robustioribus. In imbecillioribus, hodie præsertim, vero *scammonia,*
scrup. unus sufficit. Hæc purgatio, vt idem testatur, sæpe repentinam sanitatem restituit,
aut morbum magna ex parte leuauit. Post dies paucos iterum exhibendū medicamen-
tum, quod pituitam simul & bilem vacuet. Quale est, quod recipit *catapotiorum lucis ma-*
iorum, drach. unam. Catapotiorum arabicarum, scrup. unum. Agarici trochiscati, scrupulos duos.
Formentur pilulæ cum stillatio liquore fœniculi. Oculis autem mel despumatum illi-
nendum, & ad injectum humorem retinendum, oculi claudendi. Alumen etiam cum
melle tritum illines. Sint autem *aluminis scissi artes due, vt scilicet ammoniaci pars vna*
tritæ cum melle aut muliebri lacte. Vel cyclamini recens, vel cepearum succum cum melle, aut lacte
mulieris. Fel quoq; hirci ex melle illitum paucis diebus vitium tollit, vt inquit Alexander.
Acrium tamen medicamentorum assiduus vsus remouendus est: sicut antiquissimum
oleum nunquam mittendum. Traditur a multis conferre sic laborantibus iecur hirci-
num assum, & cum sale absq; oleo feruens comestum. Quidam & sanie seu aquoso hu-
more a iecore illo dum torrefit, effluente, illinendos oculos iubent. Alii idem iecur eli-
xantes, apertis oculis vaporem hinc eleuatum excipiunt. Sunt qui illud cum felle assan-
dum esse, vt validius fiat, putant. Alii iterum assandum ei *folia fœniculi, vel ruta, vel chelidoni*
infigenda esse monent. Elaterium quoque melle per intervalla illitum prodest. Præ-
terea fel perdicis, aut hirci inunctum, ouat.

De expressione oculi. C A P. XLVII.

E *κρηνοειδης*, hoc est, expressio oculi, est vitium, in quo sic exprimuntur oculi, vt exserti perseveret.
Recentiores exitum oculi appellant. Est fere idem vitium, quod *procidetia oculi* nomina-
tur,

A rur, nam eandem propemodum curationem requirit. Accidit iis præsertim, qui in ath- Exitus o-
culi.
Causæ.
leticis certaminibus suffocantur, aut qui aliam ob causam strangulantur. Mulieribus Signa.
etiam nimio pariendi dolore afflictis, & propter vehementem pariendi conatum. Ob Curatio.
plurimum etiam defluxum, confertim a capite irruentem. Vbi a strangulatu, aut dolo-
ribus partus euenit vitium, e sermonibus ægri cognoscitur. Si vero propter humorum
copiam capitis aderit grauitas, & pupilla auctior erit. Porro si ob strangulatum oculus
exprimatur, gibberi venam incidere oportet. Sin ob humores multos acciderit oculi
expressio, purgante medicamento vtendum erit. Quod si ob pariendi laborem expri-
mi oculos contigerit, vteri purgationes superuenientes frequenter vitium sanant: iis igitur
opitulari conuenit. In viris autem, si post sanguinis missionem aut purgationem vi-
B tium non remiserit, cucurbitulam occipitio defigere commodum est. Leuiter autem
comprimendus est oculus, & comprimendo in suum locum reponendus. Oculo vero
lana melle illita cum modico croci apponenda est, linteolumq; duplicatum supra sua-
uiter illigandum. Confert iis aqua marina frigida fronti superfusa. Item quæcunq; alia, quæ re- Reprimē-
tia.
primere & contrahere possunt: vt est polygonon, belus armenia, balaustium, rhu obsoniorum, sidia,
galla, acacia, hypocisthis, lycium, folia, floresq; rosarum, & iis similia, quæ in lib. 1. de compos. medic. c. 7.
commemorauimus. Hæc in aqua pluuiali, vel vino decoquantur, & in eo decocto spongia
imbuta laboranti parti imponitur. Item ex polygoni, plantaginis & rubi foliis in aqua pluuiali
aut vino adstringente decoctis, & acacia, scrupulis duobus. Croci, granis tribus. Licii, hypocisthidis, v-
triusq; scrupulo dimidio cataplasma componi potest. Nec minus collyrium, quod accipit: A. oes
C lota, thutia preparata, sarcocolla nutrita, singul. scrup. dimidium. Spica nardi, croci viriusque grana
quinque. Stibicos vsti & loti, scrup. vnum. Cum tremore tragacanti fiat collyrium.

De agilope. CAP. XLVIII.

Agilope, Galeno lib. 5. de compos. medic. localium teste, est exiguum quoddam abscessus simile tu- agilope.
berculum inter nasi os, & magnum oculi angulum ortum, quod ruptum si negligatur, in fistulam
abit, vsq; ad os ipsum progredientem. Fit a vitiosis humoribus, in eam corporis partē delatis. Causæ.
Vitium ex descriptione satis notum, ideoq; pluribus indiciis non eget. Vitium vero hoc Notæ.
propter corporum tenuitatem, & lubiacentis ossis putredinem curatu difficile est. Non Curatio.
solum autem ob id ægre curabile est vitium, sed & propterea, quod quum multa liquida
medicamenta in experimentum adsumi possint, ea tamen non tolerat pars ipsa: neces-
D sario enim ex eis in oculum quid influit. Situs itaque ratione oculo etiam damnum in-
fert. Neque vilo modo adhærere eiusmodi possunt: nisi deligantur totum oculum com-
plectatur, quam impossibile est tot diebus aliquem perferre posse, quot ad vitii curatio-
nem requiruntur. Incoante itaq; phlegmone, si corpus plenum fuerit, & vires ferre po-
terint, venæ humeralis e directo partis affectæ sectione vtendum. Deinde repellere e-
nitemur iis medicamentis, quæ ad hoc institutū sunt idonea, quorū multa in præceden-
tibus commemorauimus, nempe cucurbitulis, frictionibus partium infernarum, ac
vinculis. Si vero phlegmone perseverauerit, discutientibus medicamentis, minime ta-
men acribus & mordacibus, succurrendum erit. Ab acrioribus enim medicamentis o-
culus simul infestatur & afficitur, inque ipsa parte male habente phlegmone augetur.
E In hunc itaque vsum probefaciunt glaucium & crocus vna cum perdicii, parietariam
hodie vocant, succo leuigata, & imposita. Crebro autem permutare hoc remedium o-
porteret: etenim statim immutatum, vim suam amittit. Scribit Alexander Trallianus, se
huius medicamenti subsidio vsum adhuc incoante agilope, & nondū in suppurationem conuersa, non
solum puris generationem impediuisset, sed integra sanitati restituisse. Quum vero tumor ille cito
suppuret, danda opera erit vt celeriter aperiatur, ne humor vitiosus in eo retētus sinum
creet, & os quoque lædat. Præterea alica in aceto cocta, & probe trita, non solum inci-
pientes, sed etiam in pus mutatos, eodem Tralliano teste, persanat, rumpitq; & ad os vsque
penetrat & descendit. Ruta satiuia vna cum lixiuio, quod primo distillauerit, contrita,
cocta, & imposita, egregie huic vitio medetur. Mordax quidem inter initia, postea o-
F cyssime mitescit, & ad os vsque permeat. Atq; illud mirandum, quod vel nullam plane,
vel non turpem & indecorem, aut euidentem cicatricem post se relinquit. Porro co-
chleas cum testis suis tritas imposito: interdum aloe, vel myrrha admista, præsidium e-
nim hoc antequam in pus vertatur, & postquam ruptus etiam fuerit, agilopem desic-
cat. Curant quoq; agilopem, si nō in profundo os corruptum fuerit, chamæmeli folia

commanſa impoſita: aut maluz folia itidem commanſa, ſi cum ſale imponantur, prius tamen q̄ diſrumpatur. Radix etiam lilii recens ad emplatri formam trita, *Aetio auctore*, & impoſita, ægilopas curat. Rumpit enim & repurgat. Ceterū poſtquam vitium hoc ruptum eſt, vehementer deſiccantia proſunt, vt ſunt quæ ex *alumine, plumbo, iutia vulgo vocata, flore eius, & antimonio dicto conficiuntur*. Hæc enim non ſolum exſiccando, verum etiam ſuo pondere comprimendo iuuant, ac tumorem ſubſidere faciunt. Hæc ſi non contulerint, ad manus opera conſugiendum. Chirurgicam itaque curandi rationem ab Aetio & Paulo petes. Hoc in loco malorum, quæ in oculis accidunt, curationi finem imponemus: reliqua enim fere omnia eorundem vitia chirurgiam exigunt, quam attingere in iis de medendi ratione libris non eſt conſilium. Eam itaque ab auctorib. iam citatis petent ſtudioſi.

De aurium dolore. CAP. XLIX.

Cauſa. **A**urium dolor aliquis ex refrigeratione, in peregrinatione a ventis frigidis excitata, accidit. Aliqui etiam ex frigidis balneis, & ex medicatis aquis, in quibus nonnulli frequenter voluptatibus indulgentes lauant, oriuntur. Fit & auris dolor ex phlegmone, interim quidem ſolius circa meatum auditorium cutis, interim etiam in profundo, quando videlicet auditorius neruus ad phlegmonis affectum peruenerit. Quæ autem ratione phlegmone particulas phlegmone obſeſſas diſtendens dolorem parit, eodem modo etiam flatulentus ſpiritus, aut humor craſſus & lentus tranſitum non habens, dolorem efficit. Saniſſi denique ac ſeroſi humores in corpore aurium generati, conſimiliter vt mordaces humores, qui extrinſecus illabuntur, dolorem cōciliant. Aurium dolor qui frigiditati fertur acceptus, de ægri ſermonibus facile cognoscitur: & inde, quod dolor alte, citra grauitatem, vel diſtentionem, vel ardorem, fixus ſit. Qui ex calida intemperie ortus eſt, ex eo, quod in illo feruoris cuiuſdam ſine grauitate ſeu tenſione ſenſus eſt, deprehenditur. Sin grauitas, diſtenſio, ſimulq; calor & dolor pulſatilis, aut etiam febricula oboritur, phlegmone aurē laborare cenſeto. Sola citra grauitatem diſtenſio ſpiritum flatulentum, cui exitus non pateſcit, indicat. Si vero capitis ipſiusque auditus grauitas affuerit, præceſſitq; victus ratio ſimilis, craſſi glutinoſiq; humores dolorem faciunt. Victus ratio iuxta cauſæ diuerſitatem, facile ex iis, quæ in ſuperioribus dicta ſunt, conſtitui poteſt. Quare nō eſt, cur hanc ſpeciatiim hoc in loco proſequamur.

Nota. Ceterum curandi ratio pro cauſarum varietate mutatur. Si enim dolor a ſola refrigeratione oboritur, calefacientibus præſidiis quam celerrime curabitur: nempe *oleo rutæ, laurino, nardino, cicino, anethino, liliaceo, de caſtorio, de euphorbio, & ſpicato*. Quod ſi rutam quoq; oleo communi incoquas, vel piper, vel caſtorium magnum adferes præſidium. Oleum etiam, in quo allium decoctum ſit, vel cepa, inſtillatum mirifice confert. Sunt qui prægrandes cepas exſculpentes, deinde oleo replentes, & in feruente cinere moderate calefacientes, auribus infundant. Galenus *lib. 3. de compoſ. medic. localium*, euphorbii perquam exiguam portiunculam plurimo oleo veteri commixtam mirifice commendat, quod nimirum hoc medicamētum ex frigore contractos aurium dolores ſtrenue adiuuet. Manifeſtum vero omnibus eſſe arbitramur, quod quicquid adhibetur, auribus mediocriter calidum eſſe oportet. Porro vbi aqua medicata circa auditoriū meatum continetur, oleum quod ſit tenuium partium aſſidue infundere oportet, quo ipſum eluamus: deinde lana molli extergere, ruruſque infundere. Mitigat ipſos admodum oui candidum: item lac muliebre. Plurimum etiam prodeſt *adeps anſerinus, atq; item vulpinus*. Verum ad aquam copioſam euocandam nihil præſtantius, quam oris exſuctio, quæ etiam per calamum canalemue exſugi & extrahi poteſt. Si quis etiam alteri pedi innixus eiufdem lateris cum aure male affecta, capite parum per decliui ſaliat, aquam facile excutiet. Quum a calida intemperie dolor obortus fuerit, tū cōtrariis medicamentis propulſandus erit. Mirifice itaq; confert *oleum roſaceum in aurem inſtillatum, vel acetum roſaceum, vel album oui, aut lac muliebre, aut ſolani ſuccus*, aut tale, q̄ accipit: *Olei roſacei, vnciam vnā. Succo ſolani, drach. duas. Aceti roſacei, drach. vnā & dimidiam. Miſce*. Si vero a craſſis viſcoſiſq; humorib. aut flatib. dolor excitatus fuerit, medicamētis q̄ obſtructiones auferunt, & incidūt, vtendū: cuiuſmodi ſunt omnia amara, quæ ſine eroſione expurgant, exterguntq;. E quorū numero eſt *iris Illyrica, ariſtolochia omnis generis, amygdala amara, vitis alba radix, centaurei minoris ſoma, poliū, & cinnamomū*. Item oleū amygdaliū, & alia quæ citra mol-

ſtam

A *stiam meatus expurgant, abstergunt, & obturata disiciunt, dissecantque.* Exiis itaq; auricularia medicamenta confici possunt, & usu postulante instillari. Conducit etiam *euaporatio ex ruta, maiorana, castorio, & milio.* Præter cetera vero, cremorem porri tepidum auribus ita afflictis instillare conuenit. Vel cepearum succum, melli permixtum. Quod si a phlegmone dolor concitatus fuerit, statim sanguis ex humerali vena eiusdem lateris mittendus est, clysteribusq; defluxus humorum in contrarium auertendus, potissimum ubi alius sua sponte non deiecerit. Reuulsionibus quoque aliis, frictionibus, vinculis, ac cucurbitulis vtendum. Dein oxyrhodinum tepefactum instillandum, aut adeps anserinus, aut gallinaceus cum rosaceo. Per se enim non influente etiamnum humore magis conueniunt, idque duabus rationibus: quia doloris symptoma leniunt, mitigantque, & B phlegmonis affectum curant. At si vehementior fuerit phlegmone, ad sedandos dolores albumen oui cum lacte mulieris tepidum instillatur. Prodest etiam tum medicamentum, quod habet, *Succi, semperuiui, drachmas duas. Olei rosacei, unciam dimidiam. Aceti, drachmam unam & dimidiam.* Commixtis omnibus, & agitat, auri dolenti instillantur. Extrinsecus vero ea, quæ dolorem leniunt, materiamq; impactam concoquunt, admo- ueantur. Vrgente autem dolore, (*qui Hippocrate teste*) quum vehemens grauisque fuerit, 3. Prog. 19. periculum minatur: nam & mentem turbat, & hominem rapit: necessarium est etiam iis, quæ leuiter sensum stupefaciunt, vt. Neq; n. mediocre, vix diximus, periculum est, ne Stupefacientium usus. cerebrum neruo, per quem facultas audiendi distribuitur, vicinum per consensum afficiatur. Miscetur autem tum paululum opium lacti muliebri, & oui candido, quæ & C ipsa per se frequenter aurium phlegmonibus congruunt. Iam & castoreo opium temperatur, oportetque hoc longe ante mixtum, vel æquali pondere, *Galenus auctore*, vel duplicato castoreo præparare: ad vehementissimos quidem dolores, æquali, ad minores, duplicato. Liquor vero quo prædicta medicamenta, diligenter prius trita, & leuigata, diluuntur, sapa esto: quippe hæc multo magis dolores lenit, quam vina dulcia. Est autem sapa, multum ad tertiam mensuræ partem decoctum. Sunt qui opio rosaceum & violaceum miscent oleum, in hunc modum. *Opii scrupulum unum. Oleorum rosacei & violacei, vtriusque drachmam unam & dimidiam.* Philonis quoque antidotum crebro sic laborantibus profuit, dissolutum lacte muliebri, & instillatum. Extrinsecus vero aurem assidue oleo communi, siue ex calido fomento oportet fouere, nempe spongia aqua calente D imbuta, in qua chamæmeli flores, scœnumgræcum, vel lini semen fuerint decocta, lanamq; hoc imbutam in aurem coniiicere, sed ita vt partes phlegmone laborantes quam fieri potest, minime attingantur. Quo autem pacto quis commodissime auribus vehementer dolentibus medicamenta iniicere queat, tradit Galenus lib. 3. De compos. medic. localium. cap. 1. Et huic sane Galeni præcepto, ceu maximo in curatione aurium, mentem adhibeat Medicus. Porro ubi iam dolor inueterauerit, & in suppurationem conuer- tæperit, medicamento ex lini seminis succo vtitor, quod vna cum rosaceo, aut chamæmelino solutum instillabis.

De sonitu aurium. C A P. L.

A *Vrium sonitus, quem Græci ὀξύτης ὁρροῦσιν, recentiores vero tinnitum seu sibilum vo-* Causæ.
cant, plerunque a flatuoso spiritu generatur. Nonnunquam etiam propter exquisi- Signa.
tam audiendi sensus acrimoniam. Generatur quoque vitium hoc ex partium imbecil-
litate, ubi scilicet ex morbis iam conualescentibus incidit, humore neruorum auris ab-
sumto. Nascitur etiam a causis externis, frigore, æstu, ictuque capitis. Si a causis exter-
nis accidit vitium, facile ab ægroti sermonibus dignoscitur. Iam quod sonitus paula-
tim, aut vna vice, aut confertim irruat, id ipsum quoque ad inuentionem affectus con-
ducit. Si enim ex certis interuallis accedant, quæ uerintque sonitus, euidentissimum ar-
gumentum est, quod flatulentus spiritus exitum non habens, interclusus est: qui profili-
re magno nixu contendens edit sonitum, præsertim ubi cibi inflandi vim habentes præ-
cesserint, & cruditate laborauerint frequentius ægrotantes. Si vero huiusmodi aurium
F sonitus non repente, sed sensim ingruant, & grauedo quædam ponderis instar sentitur,
& victus ratio, quæ crudos humores procreat antecesserit, tum crassis ac lentis humori-
bus vitium acceptum referas. Sin suspicio alicui fuit ex spiritu flatulento qui transitum
non habent, aut crassis humoribus vitium prouenisse ac medicamentis, quæ incidunt,
extenuant, & discutiunt adhibitis, nihil profecit simulque apophlegmatismis usus est,

66 Operum Leonhard. Fuchsi Pars III.

& toto capiti prospexit: is magnam occasionem habebit referendi sonitum ad sensus A
audiendi acrimoniam, præsertim si æger acuti auditus fuerit. Eius etiam hoc certissi-
mum esse indicium putatur, si tempore famis & inedia increuerit, crapulæ vero & re-
pletionis remissior fuerit. Curandi ratio, pro causarum diuersitate variatur. Si igitur a
curatio. Si a cras-
sis humo-
ribus. crassis & viscidis humoribus aurium sonitus ortus fuerit, caput initio catapotii cocciis,
aut arabicis cum agarico, aut id genus similibus purgetur: prius tamen iis exhibitis po-
tionibus & medicamentis, quæ incidendi & extenuandi vim obtinent. Dein apophle-
gmatisimis, errhinisque vtendum. In aurem subinde instillandum, *oleum amararum, aut
oleum in quo castoreum, cuminum, ruta, vel anethum fuerit tritum.* Aurem quoque ad vaporem
aquæ, cui, *stichas, absinthium, maiorana, mentastrum, hyssopus & origanum incocta sint*, opor-
tune inclinabis. Succus rutæ coctus in cortice mali granati, mirifice confert. Sacculi B
item ex *betonica, stichade, chamamelo, maiorana, & aliis paulo ante commemoratis, compositi, si
calescenti auribus imponantur, conducunt.* Conferunt etiam sternutamenta, quod flatus non
minus per aures quam per nares discutiunt & expellunt. Si propter sensus auditus acri-
moniam sonitus aurium accidat, tum ea, quæ sensum stupefaciunt, sunt vsurpanda, vt
Si ab ex-
quinta au-
dicendi a-
crimonia. sunt *mandragora, aut papaueris succus: aut rosaceum cum paucis aceto, & paucissimo opio.* In iis ta-
men adhibendis prouidentia magna opus erit. Incipiendum itaque a leuioribus, & si
necesse fuerit, ad validiora progrediendum. Commendatur vnice *oleum rosaceum, adie-
cto vno aut altero grano opii.* Galenus *mandragoræ succum, & papaueris liquorem* hoc in loco
laudat. Ceterum si in febribus, aut harum indicationibus sonitus aurium euenerint,
nullum eis negotium facessere oportet: quippe statim magna ex parte finiuntur. Si au- C
tem post morbum, vel capitis dolorem perseuerauerint, absinthii decocto aures foueri
debent, acutum & rosaceum infundendum, aut raphani succus cum rosaceo, aut aloe
optima ex mulso soluta. Quod si hæc nihil contulerint, veratro nigro ex aceto contrito
vtendum, auribusque instillandum. Si ob imbecillitatem accidat sonitus, vt in conua-
lescentibus accidit, temperatum aliquod oleum non minus calidum, aut frigidum, pro-
ut necessitas postulat, instillandum erit, nempe *chamamelinum, anethinum, vel rosaceum.*

De surditate, & graui auditu. C A P. L I.

Q Vum afflicta aure non solum grauius, sed omnino nihil quis audire cœperit, vitium
αῶφρον. Latini *surditatem* nominant. Grauem vero auditum *κακὴν ἀκοήν* *συνόμιαν* ap- D
pellant. Surditas interdum a primo statim ortu hominem comitatur, interdum etiam
posteaquam nati sumus accidit. Quod quidem vel ob biliosum humorem sursum ver-
gentem contingit, vel propter crudos crassosque humores auditum obstruentes. Non-
nunquam etiam ob sordes, aurium meatus obstruentes. Indicia quibus causæ & digno-
scuntur & discernuntur, facile ex iis, quæ nunc sæpius a nobis dicta sunt, sciri possunt. Si
enim a biliosis humoribus accidat grauitas auditus, post febres maxime recurrente bile
ad cerebrum, derepente infestare solet. Facies etiam natura, ætas, & totus habitus
corporis biliosam temperaturam præ se fert. Si a crassis humoribus oritur, grauitas ca-
pitis, & alia, quæ pituitosos humores ostendunt, adsunt. Quæ a generatione statim, aut
etiam postquam nati sumus, sed longissimæ & perfectæ surditates, consistunt, immedi-
cabiles existunt. Quæ vero non absolutæ quidem, sed diuturnæ tamen, & ipsæ curatio-
nem non recipiunt, aut certe difficilime curantur. Quæ ob biliosum humorem sursum
vergentem nascuntur, vacationibus per medicamenta bilem ducentia ex facili ab-
olentur. Quidam etiam sua sponte vitio liberantur, bile inferius descendente. Quod
4 Aph. 28. Hippocrates etiam iis verbis confirmat. *Quibus, inquit, biliosa accidunt deiectiones, hæc
superueniente surditate cessant: & quibus surditas fuerit hæc superuenientibus biliosis deiectionibus
cessat.* Erit iterum: *Quibus in febribus aures subdurerunt, alius turbata soluit morbum.* Si vero
4 Aph. 60. Si ex cras-
sis humo-
ribus. ex crudis crassisque humoribus prognata fuerit surditas, vel grauis auditio, venæ sectione
aut omnino purgatione ex hiera cōposita, & catapotii cochiis, *azaiaret dictis*, aliisque si-
milibus curabitur. Antea tñ oxymeli, & alia quæ crassos & lentos humores incidere va-
lent medicamenta propinanda. Corpore vniuerso purgato, pituita apophlegmatismis,
errhinis, & sternutamentis ex cap. elicienda. Præterea caput siccandū, & omnimodo cor-
roborandū. Balneis itē sua sponte scaturientibus vel aqua marina vtendum. In ipsam vero
aurem iniicienda medicamēta, q̄ diuidūt, inciduntq; crassos & viscosos humores, qualia
multa

A multa ad sonitus, antea sunt tradita. Priuatim vero cōfert *ruta succus cū melle, aut castoriū cū vomentū oleo anchino*. Fomentis quoque ex *origano, hyssopo, foliis lauri, & id genus aliis constructis v-*
sendum est, quæ per spongas fiunt, & iis quæ vapore per calamos perforatos ventriculo cibis non di-
stento accommodantur. Oportet autem alterum calami arundinisue extremum concavi-

Vicus.

tati auriculæ adaptari: alterum ollæ, quæ operculum perforatum habeat, & vndequaq;
 obturata sit, incumbere. Sit autem in olla *absinthii, menthastrum, maiorana, origanum, sti-*
chas, aut simile aliquid aqua decoctum, vt vapor inde sublatus ad auditorium meatum perfe-

B *De Parotidibus. CAP. LII.*

Parotides sunt phlegmones, quæ in glandibus, quæ auribus adiacent, emergere so-
 lent. Fit ex copioso calido sanguine, qui vel biliosus, vel pituitosus, vel melancholi-
 eus existit. Oritur autem interdum ex capite, humoribus videlicet ei impactis: inter-
 dum a reliquo corpore per morbos, febres maxime, impetu morbi per decretorium

Curandis.
 Causæ.

illuc conuerso. Signis nullis ad vitii cognitionem opus est, oculorum enim iudicio sub-
 iacet. Parotides autem, quæ feruentis sanguinis plenitudini adscribuntur, dolores ve-
 hementissimos pariunt. Quæ vero bilioso sanguini, erysipelata referre magis videntur,
 nullaque grauitate locum male affectum excruciant. Quæ melancholico sanguini ac-
 ceptæ refertuntur, ne modice quidem rubent, neque vehementi dolore torquent, sed
 duriusculæ sunt. Quæ ex pituitoso natæ sunt sanguine, fastigiatæ in tumorem existunt.

Vicus ratio talis, qualis fere in aliis phlegmonibus constitui debet. Curatio a venæ se-
 ctione, si ætas, aliaque permiserint, auspicanda erit. Incidenda vero vena humeralis e-

Vicus.
 Curatio.

iisdem lateris, modo vires ætasque permiserint, & corporis totius plenitudo fuerit,
 propter rationes alibi dictas. Porro non vtimur in parotidibus, quemadmodum in re-
 liquis phlegmonibus, inter initia reprimentibus, sed contra attrahentibus: & si nihil
 notatu dignum effecerint, etiam cucurbitulas affigemus, aut fomenta assidua adhibe-

bimus. Nam humorem noxium ex profundo ad cutem euocare, naturæque opem fer-
 re conamur. præsertim vbi in capite sit firmatum vitium, humoribus in eo pertinaciter
 herentibus. Quinetiam quum citra capitis affectum in febribus acutis natura super-

uacuos humores deponit, ex vasis, in regionem, quæ intra cutem & corpora subie-
 ta habetur, effundens, quando etiam glandulæ ex humoribus effusis opplentur, sa-
 tius esse tunc quoque videtur naturæ opitulari, febribus per humorum decubitus,
 seu ex loco in locum impetuofum illapsum medendi. Quum vero vehementi impe-

tu influxus irruit, nihi nos tentabimus, totum naturæ permittentes, iuxta hoc Hippo-
 craticum: *Qua iudicantur & iudicata sunt integre, neque mouere, neque nouare aliquid, siue me-*

E *dicamentis, siue aliter irritando, sed sinere*. Hæc illæ. Si enim cucurbitulam, vel medica-
 mentum aliquod humores ex alto ad cutem extrahens, admouerimus, vehemens do-

lor hominem apprehendet, vt hinc & vigilæ suboriantur, febres intendantur, & vires
 exsoluantur. Proinde tunc mitigare, non humorum impetum ac influxum promouere
 oportet, per cataplasmatum maxime lenientium vsum. Eligenda vero, quæ cum humi-

ditate moderatum calorem habeant, coloribus mitigandis sedandisue, atque influen-
 tibus humoribus concoquendis & maturandis idoneum: veluti est quod ex *frumenta-*
cea, aut hordeacea, aut lini seminis farina cum mulsâ, aut fenograci, aut althea, aut chamæmeli deco-
cto paratur. vel hoc quod recipit vitellos ouorum duos. Butyri recentis, vnciam vnâ & dimi-

diâ. Olei communis in aqua calida loti, vncias duas. Lenti cremoris seminis lini, & fenograci, an-
 vnc. vnâ. Misceantur, & laboranti loto admoneantur. In eundem vsum, locum assidue butyro
 illinemus, iadicatis ouorum vitellis. Suillum quoque adipem cum butyro liquan-

tes, cera exigua addita, vt molliissimum ceratum fiat, applicabimus. Ceterum mitio-
 res parotidas, in quibus neque humorum in particulas copia irruit tanta, vt vehemen-

tes dolores excitet, neque caliditas humori adest, facile curantur fomentis e muria,
 & cataplasmatibus, & medicamentis exquisitissime discutientibus, quale est, quod
 dyachylon, hoc est, e succis vocatur. Neque enim ad suppurationem festinant, neque
 dolorem inducunt validum: Si vero parotides discuti haud possunt, suppurationibus me-

dicamentis vtendum est: nempe *farina sincerissima, cum caricarum decocto, & oleo*. Item,

quod ex polline, id est, farina ſynceriſſima tritici & fermento conſtat medicamentum, ad hunc quidem modum: *Recipe pollinis, uncias duas. Farina ſeminis lini, & ſenugraci, an. unciam unam & dimidiam. Pinguedinis recentis porcina, uncias tres. Caricarum pinguium incifarum, unciam dimidiam. Miſceantur cum decocto maluarum althea, & chamameli, fiatque cataplaſma.* Vbi vero iam ſuppuratæ fuerint parotides, tunc vel cute ferro diſciſſa pus excernetur, vlcerique, vt in eiſmodi omnibus moris eſt, medeatur, nempe extergentibus, & exſiccantibus, aut ſane acri medicamento rumpetur abſceſſus, quale eſt quod ex allio conſtat, & ſimilibus. Aut tentandum, vt ipſum per medicamenta, quæ attractoriam ſimul & extenuantem vim obtinent diſcutiamus, bis quotidie auferentes, fouentesque, donec aliquid remittant, laxenturque dolores, maiori parte puris diſcuſſa: tunc enim iam primum quidem ſemel ſoluere & fouere, deinde vero ne hoc quidem facere ex re eſt, ſed ipſis medicamentis permittere oportet, vt ſi quid reliquū in profundo hæreat, id ipſum diſcutiant. Quod ſi durities adſit, ea ipſa quoque emollienda eſt. Quare per hoc tempus medicamenta mixta facultate componētur, ita vt emollientia attractoriis ammiſceantur, vt eſt *adeps vitulina, hircina, medulla cerni, bdellium, ſtyrax, ammoniacum, & id genus alia, quæ alibi commemorauimus.*

De Ozenis. CAP. LIII.

Ozena. *O*zena Græcis vlcera narium ſunt profunda & putrida, ac cruſtoſa, ex quibus ingratus & ſæpius exhalat odor. Sic vero, a graueolentia & foetore dicta ſunt. Ex acrium putridorumque humorum, qui ad nares commeant, illuue generantur. Quod ſi acres tantum exſiſtant, vlcera curatu difficilia ſolent procreare, non tamen grauiter olentia. Indiciis ad vitii dignotionem non eſt opus, ex dolore enim, & ægri narratione, imo etiam viſu, in naribus vlcera facile deprehenduntur. Ozenarum curatio in hoc potiffimum conſiſtit, vt principio caput exſicceretur, ei que robur adiciatur: quod nimirum conſtet, has ob malignorum humorum redundantiam, qui ex capite naribus influunt, prouenire. Roborandum vero atque exſiccandum totum caput erit, ne quicquam ex ipſo ſuperuacuum in nares, aut alias infernas partes influat. Quemadmodum igitur alias topicis ac localibus, niſi vniuerſi corporis vacatione præmiſſa, vti non licet: ita hic non niſi toto capite roborato, naribus admouenda remedia erunt. Robur autem capiti ad hunc modum adiciendum eſt. Tondere primum caput oportet, deinde conſeſtim quæ adſtringunt imponenda: qualia ſunt, *oleum roſaceum, myrtinum, alumen, galle imatura, folia ſclæcis, puluis corallorum, ſantalorum rubeorum, maſtichis, manna thuris, acetum, & iis ſimilia.* Hæc capiti perpetuis nouem diebus imponenda, ac illinenda. Vbi itaque illis caput validum robuſtumque reddideris, naribus medendis accingere, eo conſilium ruum dirigens, vt particulam affectam medicamentis mixta facultate prædiſtis, repulſoria ſcilicet & diſcutiente, reſicces. Repellunt igitur, auſtera nimirum & acerba, quæ communem adſtringentibus appellationem ſortiuntur. Diſcutiunt autem calida & ſicca facultatibus. Ad ozenas igitur ſanandas *calaminthe ſuccum* inſtillare oportet, aut ipſam aridam per fiſtulam inſufflare. Vel mel in nares ſtillare, poſt aliquod ſpaciū adhibito ſternutamento cruſtas excutere, quæ tribus quatuorue diebus excidunt. Vbi vero exciderint, adipe anſerino & butyro cum roſaceo curantur. Vlcers etiam in naribus mali punici ſueco in æreo vaſe, viſque ad dimidias cocto, perline. Aut *malum punicum* dulce integrum vino incoctum terito, & forinſecus imposito. Cōfert & hoc quod habet: *Aluminiſ ſciſſi, drachmam unam & dimidiam. Myrrha, drach. unam. Malicorii, rhos, ſalis ſoſſilis, croci, thuris, ſingulorum drachmam dimidiam. Trita inſuffla.* Sunt qui ex iam dictis paſtillos conficiunt, & iis ad ſuffitus narium vtuntur. Quod ſi hæc vlcera dolor comitantur, vt ere vnguento, quod accipit: *Olei roſacei, myrtini, vtriuſque unciam unam. Plumbi uſti, liſhargiri, vtriuſque ſcrupul. duos. Ceruſſæ, boli armenia, balaſtiorū, aloes, myrrha, vtriuſque ſcrupulum dimidium. Ceræ albæ quod ſatis eſt, fiat vnguentum.*

De ſanguinis ex naribus profluio. CAP. LIV.

Caſſa. *P*rofluuii ſanguinis e naribus, haud decretorii, cauſæ partim ſunt Externæ, partim Internæ. Externæ ſunt, caſus ex alto, iſtus, exercitium vehemens, & mora in ſole. Internæ, copia ſanguinis, vel eiſdem tenuitas. Ceterum omnes eius cauſæ ſub iis tribus complecti poſſunt. Siquidem ſanguis profluit ex naribus aut reſerato venarum vel arteriarum,

- A** teriarum, quæ in capite & naribus sunt, ore, aut tunica earundē rupta ac diuisa, aut sudoris instar transcolatus. Referatur atuem venarum & arteriarum os, propter tum vas imbecillitatem, tum sanguinis, qui ad os earum impetu ruit, copiam: ad hæc acrem quampiam, quæ illi extrinsecus incidit, qualitatem. Diuiditur vero tum ex vulneratione, tum contusione, tum ruptione, tum erosione. Sudoris instar transmittitur, tunica quidem ipsa rarefacta, sanguine autem tenuato, *quemadmodum fufius lib. 5. med. meth. cap. 2. Galenus docet.* Non autem temere a nobis dictum est decretorii, quod illud nulla prorsus iam dictorum causa fiat, sed tantum propter facultatis robur noxia expellentis. Quare ipsum plerumque morbi præcesserunt. Indiciis multis ad vitii, cuiusque ^{Signa} causarum dignotionem nihil opus est. Externæ quidem causæ de sermonibus ægri cognosci possunt. Copia sanguinis ex facie, oculisque quæ rubent, dolore capitis grauatio, & aliis, quæ dicta sunt *cap. 10. huius libri*, deprehenditur. Decretorium sanguinis ex naribus profluuium, quod curatione haud eget, e morborum, qui præcesserunt, constitutione agnoscitur. Ratio victus sit eiusmodi, qui in frigiditate & incrassare sanguinem, vias, per quas sanguis fertur, constringere valeat. Tenuem quoque esse oportet. Aer itaque sit frigidus, qui aut natura talis sit, vel arte patetur aceti & stillatici rosarum liquoris irroratione, foliis quoque vitis, salicum, violarum, per pauimentum stratis. Cibus boni succi, & concoctus facilis. Sanguine feruente, æger vescatur *lactucis, intybo satiuo, utroque, pyris, malis cotoneis, pullis gallinaceis assis, aut cum omphacio elixis, aut in aqua chalybeata coctis.* Sumantur quoque cibi ex omphacio, vino malorum, puniceorum, & auranciorum, ut sanguis crassior & ad fluxionem ineptior reddatur. Bibat vinum crassum & rubrum: Contra, album & tenue deuiter. Vel, vbi affluevit per bonam valetudinem, vtatur in potu aqua frigida, aut decocto cinnamomi. Per quod hoc loco, & passim in iis nostris, <sup>Per cinna-
tomi deco-
ctum quid
intelligit-
dum.</sup> de *medendi ratione libris* intelligo aquam, in qua parum cinnamomi decoctum sit, ne scilicet sua frigiditate imbecillum plerumque ventriculum offendat. Parum loquatur, omnemque corporis motum, animi quoque perturbationes, iram potissimum fugiat, quod hæc omnia sanguinis profluuium concitent. Partes præterea capiti subiectas, sublimes habere conuenit. Situs enim partis, ex qua sanguis profluit, in contrarium fluxionis tendere, & inclinari debet. Hæc enim ratione, sanguis in contrariam sui motus partem impellitur. Sic Galenus *lib. 5. ther. meth.* omnem particulam, vnde sanguis manat, sursum spectare oportere tradit. Ita Hippocrates quoque *6. Epid. Par. 7. Aphorif. 3.* inter ea, quæ sanguinem promanantem sistunt, figuram alio tendentem recenset. Quare curandum vnice, ut caput in profluuium sanguinis narium deorsum spectet: id quod fiet, si partes illi subiectæ sint sublimiores. Curandi ratio ab iis, quæ sanguinem ad alias corporis partes auertunt præiudiciis, exordienda. Primum igitur si corporis plenitudo adsit, & ætas permiserit, ægerque adhuc non sit resolutus, vena in gibbero secanda est, quæ profusioni sanguinis ex naribus e directo respondet. Sic enim ut faciamus, suadet Galenus, qui in *lib. de curandi ratione per sanguinis missionem* ita scriptum reliquit: *Porro reuulsionis causa, si venam seces in directe quidem oppositis sanguinis eruptionibus, citissime conspicuam videbis utilitatem. At si contra seces, nihil profuerit.* Hæc ille. Vbi paululum detraxeris, mox vnā horam intermittens, rursus detrahes, post iterum atque iterum pro laborantis viribus. Præterea infernarum partium, brachiorum videlicet, manuum, femorum, inguinum, ac pedum, potissimum per ea medicamenta quæ calefaciunt, frictio mirifice conducit. Vincula testibus maxime iniecta, etiam valentius iniecta, iis remediis quæ reuellant adnumeranda sunt. Sanguinem denique ex naribus erumpentem, retinent magnæ in hypochondriis defixæ cucurbitulæ. Infigendæ autem sunt, si ex dextra nare profluit sanguis, super iocinere: si ex sinistra, super liene: si ab utraque nare, super utroque sunt imponendæ viscere. Scapulis etiam, cum scarificatione, applicandæ sunt. His sic peractis, medicamenta, quæ refrigerant & adstringunt, intra & extra corpus adhibenda. Extrinsecus quidem apponenda fronti & commissura <sup>Frictio:
Ligaturæ:
Cucurbitulæ:
Topica.</sup>
- F**ra coronali epithematae succo plantaginis, rosarum, lactuca, oxalidis, pastoria pera, cauda equina, corrigiola siue sanguinaria, foliorum vitis, polygoni, aut eorundem stillaticii liquoribus parata. Mirifice autem conducit lintecolum in aceto madefactum frigido, iterum atque iterum fronti & cernici admotum. Fons etiam spongiis ex aqua frigida fouenda. Porro proderit hoc epithemate fronti & iocinori imposito uti, quod habet: *Liquo-* ^{Epithemata.}

Epithema. rum stillatiorum rosarum, solani, oxalidis, singul, vnc. tres. Specierum trasantalon, diarrhodon ab-
 basis, singul, drachmam unam. Boli armenia, eboris vsti, lapidis hamathitis, singul, drachmam di-
 midiam. Commixtio omnibus, fiat epithema. Vel eiusmodi, quod habet boli armenia, sanguinis
 draconis, zerrae lemnia, an. vnciam unam. Cum albo oui, & succo plantaginis fiat cataplasma. Na-
 ribus præterea medicamenta sanguinem sistentia indenda: quale est, quod Galenus
 libr. 5. ther. meth. inter omnia alia optimum esse tradit. Recipit autem thuris, drach. duas.
Optimum Aloes, drach. unam. Redacta in puluerem cum oui candido subigantur, donec ad mel-
 lis crassitudinem redeant: dehinc leporis mollissimo pilo excipiantur, & admoueantur
 sanguinem. naribus. Licebit etiam linamentum contortum, hoc medicamento imbutum, naribus indere.
 Menta quoque trita in nares coniecta, haud parum prodesse creditur. Pari modo flos sa-
 licis, lanugo bombacis, ac tela aranea. Item spongia in aceto ac feruens acetum demissa, profluentibus
 naribus extrinsecus imponenda, atque comprimenda specillo, donec impellatur. Quoties vero in
 nares medicamentum immittitur aliquod, os liquore aliquo implendum est, vino ver-
 bi gratia, aut aqua, ne medicamentum e naribus, in os promanet. Præstat autem spon-
 giæ initium deligare filo per acum deducto, vt facile extrahi possit. Extrahito autem,
 quum opus suum perfecisse existimaueris. Quod si inarescat spongia, intusque aggluti-
 netur, auriculario clystere aquam frigidam immittito, ac infundendo humectato, at-
 que ita extrahito. Item hoc quoque medicamentum non inter postrema habetur, quod
 accipit: Putaminis oui, drach. duas, Galla immatura, drach. unam. Trita linamento tortili, aqua
 aut aceto madefacto excipito, & narium foraminibus indito. Item, frontem & nasum gypso, albu-
 mine oui irrigato integre, non parum confert. Aures quoque valide linteis & cera obturare, & in ore
 aquam pluuialem frigidam continere. Succus etiam foliorum urtica linamento exceptus & imposi-
 tus, sanguinem ex naribus erumpentem reprimat. Idem quoque metipsa folia illita possunt.
Paratu fa- Cauda insuper equina succus, aut ipsamet folia trita & applicata, quemadmodum etiam per apa-
 cilia medi- storia, in sistendo sanguine magnam obtinent efficaciam. Cochlearum denique caro cum aceto trita,
 camenta. aut eadem cum suis domiciliis vsta tritaque fronti ac naribus ex aceto admoda, aut in nares insuffla-
Optimum. ta, non parum utilitatis adferunt. Supra omnia confert sanguis, qui ex agroti naribus profluxit,
 si scilicet in vase figulino tostus, ac deinde tritus fuerit. De eo accipe, drach. tres. Boli armenia gy-
 pso, utriusque drach. unam. Caphura, scrup. unum. Cum oui candido, & exiguo aceto reducantur
 ad mellis crassitudinem, & fronti imponantur, naribusque immittantur. Necessitate ipsa urgente,
 grana duo, aut tria opii adiacere licebit. Ab essentia totius proprietate sterco asinuum exsic-
 catum, & in puluerem redactum, aut aceto dissolutum conducere, apud omnes in con-
 fesso est. Idem etiam simus porcinus potest. Intra corpus adhibenda ea, quæ infrigidant
 & adstringunt medicamenta, vt sunt serapia, rosaceum, myrtinum, nymphaea, & e papauere
 saccharum rosaceum, oxalidis, & nymphaea: pastilli de lemnia terra, de succino, & id genus alia medi-
 camenta. Iecori etiam admouendum, si ex dextra maxime nare sanguis promanat, hoc
 emplastrum, quod accipit unguenti santalini, vnc. unam & dimidiam. Oleorum rosacei, &
 myrtini, an. drach. duas. Lauentur hac olea accurate in aqua frigida, dein parum aceti adiacitur,
 cum spica nardi, syrup. vno. Misceantur, & tepida iecori apponantur. Porro si quid interea san-
 guinis in ventrem, aut alia corporis loca defluxit, ipsum si multus ac copiosus fuerit, per
 medicamenta grumos dissoluentia, & educentia, vacuare oportet. In ventre enim
 & intestinis in grumos coactus sanguis, incensionem facit. Quæ autem sint eiusmodi
 medicamenta, suo dicemus loco.

De stillatione, grauedine, & raucitate. CAP. LV.

Catharus. **Defillatio.** **Grauedo.** **Raucitas.** **Causa.**
K Ατρίππος καὶ κατρίππος Græcis, destillatio Latinis dicitur. Fit autem, Gal. lib. 3. de sympt. caus-
 sis teste, vbi ad os & fauces humor delabitur. Grauedo vero, quæ Græcis νέμεζα vo-
 catur, dum ad nares decumbit humor, accidit. Raucedo, quæ βραγυ Græcis appellat,
 vbi ad asperam arteriam destillat humor, contingit. Quemadmodum fufius in Institu-
 tionibus nostris docuimus. Defluxus humoris causa est cerebrum, quod quidem a frigo-
 re, ad frigidam intemperiem deducitur: quod iis potissimum accidit, qui aperto capite
 sese statim ambienti frigido exponunt: ab æstu vero calefit & repletur. Frigiditas etiam
 humores quæ in cerebro sunt, cogenis ac constringens, perinde atque manus spongiam
 imbutam aqua, defluxum eorundem in partes subiectas conciliat. Quum etiam cere-
 brum sæpe ob frigidam intemperiem nutrimentum, quod ad ipsum defertur, conco-
 quere haud potest, ideoque corruptum veluti excrementum in subiectas partes decedit.

Sic non

- A** Sic non raro calor ambiens, humores cerebri dissoluens, destillationem creat. Præterea omnia, quæ ultra modum caput replere possunt, defluxum humorum in partes inferiores excitant. Sic vinum utique; immoderatus ingestum, balnea calidiora, & largior perfusio capitis ex aqua calida, maxime si alias calidius caput existit: & cibus sane, qui in ventriculo crudus perseverat, neque infra excernitur, item ea, quæ sursum euaporant, in caput impetum facere consueverunt. Externæ causæ & sermonibus ægri cognoscuntur. **Qui** Signat. ex calore defluxu humorum ex capite laborat, iis caput incalcescit, acris tenuisque humor destillat, tum per nares, tum per os. Facies denique; rubescit, & nasus iis interim exulceratur. Hos etiam magna ex parte febris comitatur. **Qui** contra ex frigore, iis caput vndique; & frons distenditur, meatusque; qui in ossibus sunt, quæ ethmoidea nominantur Anatomicis, clauduntur, ita ut ne vox deorsum per nares, ut Pauli verbis utar, transmeare queat. Pituita quoque; & crassus humor e naribus. stillat. Fugiant aerem impense calidum & frigidum, præsertim a balneo: ventos austrinos, & aquilonios, laconicum, Venerem & omnia quæ aut constringere, aut dissolvere humores in cerebro possunt. Utantur cibis concoctu facilibus & boni succi. Deuitent eos, qui vaporum copiam ad cerebrum transmittunt, nempe cepas, allia, sinapi, raphanum, & odorameta supra modum calida. Curandum vnicuique, ut alius aperta sit, & singulis diebus aliquid deiciat. Præterea qui destillatione laborant, minus in coena, quam prandio comedant. A cibo nec legendum, nec scribendum. Potus sit aqua mulsa, aut hordei, vel aqua in qua parum cinnamomi decoctum sit. Fugiendus somnus longior, & diurnus, & nocturnus supinus. Moderatus autem & noctu factus confert. Quod ad curandi rationem attinet, consultum est, caput, veluti Curatiō; mali fontem, sanare. Vbi itaque; calida intemperie caput vexatur, iis pugnandum præstidii, quod dolori capitis & tali causa contracto conveniunt. Præsentissimum autem remedium capitis cum aqua copiosiore calida, moderate tamen irroratio & perfusio. Hæc enim generatos in capite vapores calidos euocare & discutere valet. Oportet denique; sic laborantes balneis multis tepidis dulcium aquarum consolari, & temperamentum omne in melius mutare. **Qui** vero caput vehementer calidum & perustum habent, atque; ob id assidue destillationibus vexantur, iis melius est hora æstiva ex rosaceo ungi. Quod si frigida intemperies infestet caput, calefacientibus ac tenuibus oleis; irino scilicet. rutaceo, & similibus perungendum erit. Irinum autem non solum illinitur, sed etiam naribus instillatur. Alia præterea, nempe *chamælinum & anethinum*, quæ supra de capitis dolore ex frigore prædicta sunt, adhibenda veniunt. Si autem calidus humor a capite destillauerit, simulque; febris Si calidus humor. inuaserit, & totius corporis plenitudo fuerit, sanguis e vena exteriori gibberi, quam *humeralem* vocant, mittendus erit. Sin sanguinis missione propter iustas causas ut non liceat, clysteri alius eluenda, atque; a capite exsuperantes humores deorsum trahendi, aut medicamentum bilem per inferna ducens propinandum, ut sunt *cataportia aurea, alephangina, azaiaret, & similia*. Auertendi quoque; a capite sunt humores frictio: extremitatum, ligaturis, & cucurbitulis scapulis admotis. Intra corpus adhibeantur, quibus alterandi, & feruorem atque; acrimoniam bilis extinguendi facultas inest: veluti est *serapiū violaceum, nymphaea, epapauere, diazodion, præsertim ubi iam ager cubitum iturus est*. Siquidem somnum suauem affert, & destillationem reprimat, item eorundem sachara. Embrochæ etiam & odoramenta supra in capite de dolore capitis commemorata applicentur. Emplastrum denique e terra lemnia, aut bolo armentia & plantaginis succo paratum, raso capite imponatur. Si vero frigidus humor sit, qui a capite destillet, per ea, quæ pituitam purgant, corpus vacuabis. In quem usum multum confert validi clysteris iniectio. Præstet tamen prius exhibere medicamenta incidentia & preparantia, ut supra aliquoties dictum est. Quo peracto, a capite auertere atque; retrahere humores oportet. Dein ubi humores coacti fuerint, apophlegmatismis, gargarismis, & similibus medicamentis caput expurgandum. Sacculi præterea capiti admoventi sunt, qui habent: *Florum chamæmeli, maiorana, meliloti, betonica, stichadis, foliorum lauri, pulegii, origani, singul. manipulum dimidium: Cinnamomi, garyophyllorum, utriusque; drach. unam. Maceris drach. dimidium: Nucis moschata, drach. unam & dimidium. Gallie moschata, drach. unam*. Terantur singula, & trita in sericum seu tenue linteum demittantur, formeturque; sacculus, qui futuræ coronali imponatur. Plurimum quoque; Destilla- tionem reprimen- tia: conducit, caput oleis calidis, irino nimirum: anethino, & rutaceo perungere. De destillatione autem reprimunt omnia, quibus exsiccandi inest facultas potissimum

Destillatio vero nigella torrefacta. Et cuminum deustum linteolo inditum & illigatum, præterea A
nem reprimetia. auxiliium adfert, si id ipsum ægotantes odorent. In eundem usum sufficientia adhibere
Pastilli pro conuenit, quale est quod accipit: *Thuris, mastichis, utriusque drach. unam. Ligni aloes, scrup.*
suffita. *unum. Cinnamomi, garyophyllorum, utriusque scrup. duos. Gallia moschata, drach. unam & dimi-*
diam. Foliorum lauri, santalorum luteorum, & rubeorum, sing. drach. unam. Moschi, ambar, utrius-
que granum unum. Trita excipiantur stacte quod satis est, & informantur pastilli, quor-
um vnus prunis inferat. Aliud quod habet: *Salvia, maiorana, rosmarini, singul. drachmam*
unam. Maceris, garyophyllorum, cinnamomi, singul. scrupulos duos. Ligni aloes, scrupulum unum.
Thuris, unciam unam & dimidiam. Terantur omnia prius, & dein commisceantur, fiatq;
puluis, qui, exigente usu, carbonibus ignitis inspargatur. Grauedinis eadem quæ destil-
lationis curatio. Post igitur tum totius corporis, tum capitis purgationem, cerebri re- B
siccationi studendum. Sunt vero qui laminam ferream donec plane candescat, igni
iniiciunt, ac ei postea acetum rosacei instillant atque affundunt, vaporemque indee-
latum in nares recipiunt. Raucitas autem eiusdem fere, quibus tussis, curatur medicamen-
tis, de quibus infra dicemus.

De dentium dolore. C A P. LVI.

Causa. IS dolor, qui Græcis *odontalgia* dicitur, a calida vel frigida intemperie interdum excita-
tur. Nonnunquam etiam propter humorum ex capite in eorundem radices deflu-
xum, qui sua illos acrimonia vel erodunt, aut consimile in eis malum sua concitant co-
pia, quale est circa partes carnosas phlegmone. Dentium vero dolor, siue gingivarum C
Signa. phlegmone, interim in propria ipsorum substantia, interim in neruo, qui illorum radici
inferitur, oritur. Si a nuda qualitaris intemperie dolor accidit, minime grauatiuserit.
Calidaq; intemperies ex totius corporis temperamento, quod itidem calidum est, item
facie subrufa, & præcedenti victus ratione calida deprehenditur. Frigida ex contrariis
indiciis cognoscitur. Si vero ab humore aliquo copioso influente dolor oriatur, non so-
lum in dentibus grauatiuserit dolor, verum etiam in reliquis partibus, quas per-
transit. Calidus autem humor vehementiorem, frigidus vero remissiorem mitiorem-
que dolorem excitare solet. Victus ratio, quæ ne dolor accidat, munire potest, eiusmo-
di sit, ut nullo non tempore quæ supra modum calida aut frigida sint, deuitentur. Vni-
ce autem cauendum, ne statim sese sequantur. Fugienda quoq; acida, acerba, & viscosa D
omnia. Lactis etiam frequens usus, dentibus mirifice obest. Studium & diligentia assi-
dua sit in purificatione dentium, quæ vna sanes eos a corruptione omnium maxime
tutos reddit. Cibi quorum frequens usus est, boni sint succi, & concoctu faciles. Dolo-
Curatio. re vero infestante, pro causæ diuersitate, alia atque alia victus ratio præscribatur. Cu-
Si a frigore. randi ratio, si nuda qualitatium intemperie dolor obortus sit, solis iis quæ alterare va-
lent, præiudis perficitur. Si igitur a frigore sit, proderit vino tepido colluere dentes. Ex-
trinsecus autem maxillæ calefacientibus oleis chamæmelino, rutaceo, irino, & simili-
bus inungantur. Pro oris quoque collutione in aceto decoquantur *origanum, calamintha,*
Si a calore. *hyssopus, pulegium, dictamnus, saturia, verbenaceæ rectæ radix, & similia.* Si autem a calore den-
tes dolere coeperint, in aceto decoquere oportet portulacā, parietariā, semperniuum E
minus, & glycyrrhizā. Quod si intolerabilis existat caloris sensus, utendum est semi-
nibus lactucæ, intybi hortensis, & papaueris, decoctis in aceto. Forinsecus oleis frigidis,
rosaceo, nymphetæ, & id genus aliis partes dolenti denti vicinæ inungendæ. Porro, si
ob humorum redundantiam dolor excitatus fuerit, si ætas, anni tempus, aliaq; permi-
serint, ac corporis plenitudo adierit, a sanguinis missione ordiri curationem oportet.
Incideret autem conuenit venam gibberi superiorem, quam humeralem vocāt, & quæ
e directo male affectum locum respicit. Quæ si non contingat, eam, quæ media existit.
Purgatio. Eo peracto, venas sub lingua secare oportet, aut scapulis cucurbitas affigere. Si vero v-
nus duntaxat humor vitiosus redundauerit, medicamento quod eum humorem pur-
gare consuevit, utendum erit. In eum etiā usum clysteres mirifice conferent, quod non F
Reprimen- solum aluum emollire, verum etiam humorum imperum ad inferiora auertere queant.
tia. Corpore vniuerso exinanito, ea quæ reprimunt medicamentā admouere licebit: ut sunt
succi plantaginis, rosarum, portulacæ, lactucæ, intybi hortensis utriusque, aut prædictorum deco-
ctum, aut stillaticii liquores, cum exiguo aceto. Vnice autem conducit dolentes den-
tes acri

- A** tesacri aceto calido, cum immatura galla colluere. In eundem vsum decoctio solani, lactuca foliorum salicis, radicis penthaphylli, gallarum, & halicacabi vtendum. Extrinsecus partes dentibus dolentibus vicinæ oleo rosaceo, nymphaea, inungendæ, & emplastrum ex hordeacea farina imponendū. Principio vitii iam transacto, reprimentibus admiscenda erunt discutientia: vt est *fenogreci, seminis lini, althea, hyssopi, & id genus aliorum decoctum*. Hoc tempore meliloti radix in vino, donec dimidiū absumatur, elixa, ore ea parte, quæ dolet cōtenta, præcipue auxiliatur. Vtramq; enim facultatē, discutiendi nimirum & reprimēdi, meliloti obtinet. Origanum præterea hoc tempore dolorem dentiū lenit, & protinus tollit, si redactum in puluerem cum nitro gingiuus inspergatur. Ad stupefacientia, nisi summa virgente necessitate, & nisi humorum defluxus calidus existat, perueniendum non est. Illis quoq; paulatim vtēdum. In hunc vsum, *decoctum seminis, aut foliorum hyoscyami, cum aceto adhibere licebit*. Philonii quoq; drach. vna in aqua, aut vino diluta, non parum auxilii adferet. Ceterum si dolores a frigidorum humorum confluxu orti fuerint, calida magis medicamenta sunt adhibenda. Frigida enim humores crassos & frigidos cohibent, ac ne diffilari queant impediunt, atque adeo dolorem vehementiorem reddunt. Quare tum hoc potissimum medicamento vtendum erit, quod habet: *Piperis, pyrethri, meliloti, singul. drach. vnā. Trita dentibus dolentibus aspergantur*. Porro inter ea quæ a totius essentia proprietate conducunt, egregie facere fertur ranæ in aqua & aceto probe elixæ ius, diutius ore retentum. Præclare etiam confert senecta serpentis, in vino, aut aceto cocta. Eadem quoq; vsta & trita, cum oleo ad mellis crassitudinem redacta, dentiq; imposita dolenti succurrit. Quod si vero prædicta nihil contulerint, dens aut ferro, aut medicamentis auferendus erit. Vt autem dentem citra dolorem auferre liceat, hoc medicamento vtendum. Pyrethrum acerrimo aceto in dies quadraginta conditum, deinde tritum in vsum adserua. Qui vbi postulauerit, reliquos dentes cera præmunitos custodito: ipsum vero qui dolet, circumcirca purgatum hoc medicamento integito, & post horæ interstitium digitis extrahito. Præclare facit *lappæ herbarum radix, feruenti cinere calefacta, & denti assidue apposita*: parua enim mora dentes tollit. Cucurbitæ syluestris deniq; radicem cauo impone, & dentē eruet. Vermes terrestres in testa exustos, in cineremq; redactos contrere, & circumcirca prius denti vberim adspere, & per diem & noctē excidet sua sponte. Hoc Actius confidenter esse vtendum monet, quod veluti mysterium iam sæpe sit celebratum. Erucam e brassica natam frequentius ad ipsum dentem adhibe, cadetq; sua sponte. Hæc in præsentia vt paratu facilia commemorare volui. Plura alia habet Actius lib. 8. cap. 34.

Discutiētia.

Stupefacientia.

Quæ a tota essentia conducunt.

Vt dens citra dolorē & absque ferro extrahatur.

De dentibus denigratis, lucentibusq; & mobilibus. C A P. LVII.

- L**uentaliquando dentes ac nigrant per vniuersam eorum substantiam, non dissimile quiddam phlegmoni patientes, ob influxum vitiosorum humorum. Vt autem dentes sint mobiles, interdum ictus, aut casus in causa est. Alias a redundantī humiditate, quæ nervos & ligamenta relaxat, dentes mobiles euadunt. Alias etiam ab erosione aut flacciditate gingiuarum, quibus dentes circundantur. Curatio a vitiosi humoris purgatione aspicienda. Postea vero, si dentes liuore aut rubigine laborant, humores vitiosi, quia dentes confluerunt, exsiccantibus sunt medicamentis dissipandi, vt est *lycium, thus, menta, galla, mastiche, myrrha, nigella, & eiusmodi*. Inter multa vero alia hoc potissimum confert, quod habet: *Nigella, myrrha, thuris, singul. drachmam vnā. Mastichis, piperis albi, vtriusq; scrup. duos. Pistolochia, scupulum vnum. Aluminis scissi, drachmā vnā. Trita redigantur in puluerem, quo dentes perfricentur: aut resina terebinthina excepra, dentibus circumlinantur*. Humoribus vitiosis depastis, dentifriciis vtendum, quibus extergendi & exsiccandi facultas inest, quale est quod accipit: *Nitri aluminis scissi, cornu ceruini vsti, singul. drach. vnā. Myrrha, scrup. vnum Radicis iridis illyrica, thuris, menta sicca, singulorum drachmam vnā & dimidiam. Salis vulgaris tosti, pistolochia, vtriusque drachmam vnā. Pumicis, testarum sepia, vtriusque drachmam vnā & dimidiam. Piperis, pyrethri, pulegij sicci, singul. drach. dimidiam. Parietaria, testarum ouorum tritarum*. Tuis & cribratis omnibus, fiat puluis, quo dentes quotidie fricentur. Ad mobiles vero dentes ea quæ adstringunt, & laxas gingiuas firmanr, atque stabiliunt, admoueantur medicamenta. Præsertim itaq; collutiones oris ex decoctis rerum adstringentium, qualis est quæ habet: *Rosarum rubearum*.

Causa.

Curatio. Dentium de nigratorum. Puluis.

Dentifriciū optimū.

Dentium mobilium. Collutio oris.

rum, menta plantaginis, singulorum manipulum dimidium. Corticum nucum cupressi, drachmam unam. Seminis myrti, rhois, utriusque drach. dimidium. Malicorij, gallarum, utriusque drach. duas. Acacia, scrup. duos. Decoquantur singula in vino nigro adstringente, & cum eo crebro os colluatur. Colluto ore, hoc dentifricio uti licebit, quod habet: Gallarum, putaminum mali punici dulcis, utriusque drach. unam. Balaustiorum, rhois, myrrha, singulorum scrup. unum, Rosarum purpurearum, calyculorum glandium, sanguinis draconis, singul. drach. unam. Thuris, cornu cerui vsti, utriusque drach. unam & dimidium. Radicis bistorta, & pentaphylli, sing. scrup. duos. Tritis & cribratis omnibus, fiat pulvis, quo dentes perfricentur. Aut cum oxymelite scyllitico excipiantur, & vsu exigente illinantur.

De aphthis. CAP. LVIII.

Aphthæ.
Alcolæ.
Causæ.

QUæ in oris superficie fiunt vlcera, ac ignei caloris quiddam obtinent, Græcis ἀφθæ, barbaris & recentioribus *alcolæ* nominantur. Sunt autem nunc subalbidæ, nunc subrubræ, alias crustæ modo nigrescunt, & hæc omnium periculosissimæ existunt. Oriuntur, ut plurimum, infantibus, puerisque lactentibus, quum scilicet aut lac nutricis fuerit vitiosum, aut non probe ipsum infans concoxerit. Fiunt etiam aliquando in iis qui ad perfectam ætatem perueniunt, tum propter vitiosorum humorum ad os defluxum, tum propter acrimoniam eorum quæ comeduntur & bibuntur. Cognitio vniuersarum facilis est, utpote quæ visui & tactui subiectæ sint. Ad tactum quidem calidiores quam conuenit partes fiunt, tumoresque excitantur. Visu vero ex colore cognoscuntur. Quæ enim rubicundiores sunt, sanguinei humoris dominium indicant: flauiores, bilis amaræ: albidiores, pituitæ: liuentes vero & nigre factæ, bilis atræ. Quæ infantibus accidunt, facile curantur per ea, quæ mediocriter adstringunt, vitioso tamen nutricis lacte prius conuenientibus cibis ac potibus temperato. Ea vero ipsis pueris in cibis potissimum offerenda. Oportet igitur miscere cibis aliquid ex malis cotoneis, & aliis acerbis, pyrisque sorbis, & mespilis. Interdum etiam lactucæ quiddam & intybi hortensis, ac portulacæ cibo admiscendum, phlegmone nimirum vlceribus accedente. Conuenit quoque lens cum aceto & aqua decocta, ac modico pane commanducata. Quod si infans ipse cibum capere non possit, nutricem eius huiusmodi victu uti oportet, nec non ora infantium conuenientibus medicamentis illinire. Si enim subrubræ fuerint infantium aphthæ, a principio cum iis quæ mediocriter adstringunt & refrigerant curantur. Quare iis collutiones oris ex succis rosarum purpurearum, plantaginis, solani, oxalydis, aut eorundem liquoribus stillatitiis prosunt. Item ex decocto gallarum, balaustiorum, fantalorum, rhois obsoniorum, acaciæ, & similium, admixto succo medicato *eribes, aut diamoron*. Si vero subflauæ fuerint, iisdem quidem vtendum, sed magis refrigerantibus. Si subalbidæ adstringentibus & exsiccantibus cum quodam calore vtendum. Eiusmodi sunt *thus, myrrha, mastiche, nuces cupressi*. His etiâ ea, quæ paulo ante sunt commemorata, miscere licebit. Si liuentes & nigrescentes fuerint, iis quæ generosius discutunt vtendum. In hoc casu confert *melilotum, chamamelum, anethum, fenogracum*, adiectis tamē semper adstringentibus. In iis, qui iam perfectæ sunt ætatis, vnice corporis natura consideranda venit, numne mollis sit & humida, an dura vel sicca. Siquidē duriorib. & robustiorib. corporib. veluti sunt piscatorū, nautarū, venatorū, & agricolarū, validiora etiam remedia sunt adhibenda: imbecilliorib. autē & molliorib., ut sunt *eunuchorum, & muliercularum*, mitiora. Quod itaq; ad victus rationem attinet, in hac ætate cōstituti, ab omnibus q̄ falsa & acria sunt, quæq; vitiosos succos progenerare possunt, abstineant. Quod v. ad curationem ipsam spectat, in plenitudine totius corporis, si nihil impediat, primum vena humeralis, dein illæ q̄ sub lingua sunt, incidendæ. Si vero cacochymia corpus laborauerit, humoris vitiosi & molestantis purgationem moliri oportet. Corpore a redundantibus humoribus vacuato, medicamēta quibus adstringēdi & reprimendi facultas inest, adpouenda. Moderata vero ad aphthas remedia hæc sunt: *Omphacium in vino austero aut mullō dissolutum. Rhus obsoniorum eodem modo. Rosarum flos, ipsaq; rose sicca cum melle rosaceo*. Vehementiora sunt, quæ paulo antea commemorauimus. Deinceps vero ea quæ citra mordacitatem discutunt, ut est *fenogracum, glycyrrhizæ radix, melilotum, anisum, & alia quæ prius recensuimus*. At qui si exulcerationes putrescere incipiant, præclare facit, maxime in infantibus, ex decocto gallarum & melle illutio. Gallas igitur contusas aqua deco-

Signa.

Curatio
infantium.

Adstringē-
tia calida.

Curatio ad
ulcorum.

Victus.
Curatio.

Moderata
aphtharum
remedia.
Vehementi-
ora.

Ad putresce-
tes aphthas.

A decoque, & cum decocto percolato parē menfurā mellis permiscēs, rursus decoque donec ad mellis crassioris spissitudinem redigatur: eoq; ut maximo remedio utere, ita ut locis illitū satis diu digitis adfrices, aut tomento lanæ purpureæ digito circumuoluto partibus ulceratione laborantibus apprimas. Egregie quoq; facit centaurii minoris exusticinis illitus cum melle. Cupressi etiā pilulæ exustæ eodem modo. Cornu quoq; ceruinū vstum, tritum, & ad frictum mirabiliter cōducit. Ad aphthas vero quæ proserpunt summe efficax est, fœniculi radix vsta per se, & cū melle illita. Itē amurca in æreo vase, donec in mellis crassitudine cogatur decocta, & illita. Nec min⁹ cōfert gallarū, aluminis & balaustiorum pulvis, æquales singulorum partes assumēs per se, aut cum melle illitus.

Defectore oris. CAP. LIX.

B **G**rauis molestusque oris dolor magna ex parte propter putrescentes gingivas, aut Causa. dentes, aut ciborum reliquias illic derentas, accidere solet. Nonnunquam ob cutis oris calidam intemperiem. Interdum etiam ob humorē corruptum, aut putrefactum, in ore ventriculi hærentem. Contingit quoq; ut nonnunquam oris aut pulmonis exulceratione, molestus sit oris halitus. Si propter putrescentes vel gingivas, vel dentes, vel ciborum reliquias oris fœtor accidit, promte quidem cognoscitur aut visu, aut de ægroti sermonibus. Quod si a calida oris intemperie nascitur, tum calor in ore sentitur, ac sitis infestat. Si vero propter os ventriculi, tunc ante cibi sumtionem potissimum oris halitus molestus & grauis esse solet. Oris exulcerationes visui subiectæ sunt. Pulmonis sane, totius corporis extenuatione ac tussi, quæ illius sunt symptomata, facile dignoscuntur.

C In victus ratione orania quæ promte in ore aut ventriculo corruptionē accipiunt, æger Vitus. euitet. Talia sunt, lac, pisces, fructus fere omnes, medulla, pinguis, aqua praua, & similia. Cibi igitur, quibus vititur, sint boni succi, & concoctu faciles. Assis tamen magis, quam elixis vtendum. In fine prandii & cœnæ adstringentibus pyris, cotoneis malis, & eiusmodi vesci licebit, iis potissimum, quibus ab ore ventriculi ingratus exhalat odor. Pro diuersitate causarum potus nunc sit vinum, nunc hordei, aut cinnamomi decoctum. Somnū a cibo statim fugere oportet. Si ob gingivarum, aut dentium corruptionem oris fœtor fiat, corporisq; ad sit plenitudo, ex humerali vena primum sanguis mittendus erit, & cucurbitulæ subinde ceruici sunt affigendæ. Sin cacochymum fuerit corpus, idoneo medicamento redundans ac molestus humor vacuandus erit. Corpore autem vacuato, loca-


D libus vtendum, collutionibus præsertim, quæ hoc in loco mirifice conferre solent. Collutio oris. Inter multas autem hæc non parum conducit, quæ habet: *Rosarum purpurearum, plantaginis, polygoni, singul. Manipulum unum & dimidium. Gallarum, balaustiarum, nucis cupressi, singul. drachmas duas. Putaminum malorum granatorum, drach. unam & dimidiam. Aluminis liquidi, unciam unam.* Decoquantur in aqua iuste quantitatis ad tertias: iuri decocti per colū transfuso admisceatur mellis rosacei colati, diacaryon, virisq; uncia dimidia, Diameron, drachmas duas. Commixtis omnibus, fiat collutio, cum qua mane & vespere dentes & gingivæ colluantur. Proderit etiam frequens collutio ex aqua, cui acervum permixtum sit, mane & statim a cibo. Quod si citra exulcerationem fuerit grauis ille oris odor, iridis radicem in vino veteri odorato maceratam, ad colluendum assidue exhibere, atq; etiam in-

E ore retinere conuenit. Myrrham quoq; in vino meraco dilutam, colluendam præbere oportet. Non parum etiam confert commanducatio pyrethri, tamaricis, & rutæ. Collutio Odorē bonum facies, & dentes dealbans. Si a calida intemperie. item ex aceto scyllitico, aut decocto saluie, aut solo vino. Decoctum quoq; menthæ in aceto & aqua iuuat, si illo assidue os colluatur. Hoc sane bonum facit odorem, & dentes dealbat. Habet salis candidi, pumicis, origani, singul. drach. duas. Radicis iridis, drach. unam. Florum iunci odorati, drachmam dimidiam. Contritis omnibus iis & commixtis, dentes fricato. Si a calida intemperie fiat oris fœtor, contrariis curetur medicamentis. Sin ab humore in ore ventriculi corrupto accidat, per ea quæ humorem illum vacuare possunt, sanetur. Cōmodissime autem ea, quæ in ore ventriculi sunt, per vomitum educuntur. Qua vero ratione vomitus sit concitandus, diximus cap. 34. Post hæc medicamenta, quæ stomachum roborare possunt, exhibenda: qualia sunt odoratum rosaceum, diambæ, hydromalum, & eiusmodi. Medicamenta vero, quæ in omni causa competunt, sunt garyophylli, mastiche: macer, lignum aloes, cinnamomum, rosa, santali, nuxmōschata, cubebæ, & alia huius farina. Hæc sufficiant, quotquot enim sunt alia capitis vicia, quorum nominatim curationem hoc in libro non perstriximus, facile ex iis, quæ diximus, curare cuius licebit.

Remedia in singulis causis competentia.

LEONHARTI FUCHSII DE MEDENDIS SINGVLARVM PARTIVM CORPO- ris humani a summo capite ad imos vsq; pedes malis, Liber II.

De columella phlegmone. CAP. I.



γάργαραν.
κίον.
Columella.
Causa.
Signa.
Victus.

Curatio.
Vena sectio
Auctio.

Collutio-
nes.

Composita
medicame-
ta.

Gargari-
sma.

Discussoria
medicame-
ta.

Arnosa quædam particula in summa oris parte dependens apparet, si quis toto ore plurimum aperto linguâ deprimat: q̄ quidem veterib. Græcis duobus appellata est nominibus, γάργαραν & κίον, hoc est, *gurgulio* & *columna*: posteriorib. v. prope omnibus *κίον*, i. *columella*, vocata est. Hæc sæpe admodum in phlegmone infestatur, id q̄ ex influxu sanguinis, aliorumq; humorum a capite descendentium accidit. Visui vitium subiectum est: acceditq; in deglutiendo difficultas, *dolor, tumor, & rubedo columella, & febris*. Victus ratio talis fere, qualis in reliquis phlegmonibus, constituenda. Conuenit autem maxime quies, & taciturnas, inediaque. In cœna parum, aut nihil comedendum. Curandi ratio, si plenitudo corporis adsit, a venæ sectione ordienda erit. Incidenda v. initio vena in gibbero exterior, quam humeralem nominant, deinde ea quæ sub lingua est. Alius præterea clysteribus aut glâdibus subducenda, vt scilicet hac ratione non solum vacuentur, verum etiam a loco patiente cõfluentes humores deorsum trahantur. In hunc etiam vsum cucurbitulas scapulis affigere oportet. Neque sane prætereunda sunt præsidia, quæ fluxum humorum reprimere valent. Nam vt in aliis omnibus, in quibus ex influxu humorum morbus existit: ita & in hac parte prima auxilia fluxum reprimunt. Adstringentis itaque facultatis hæc esse oportet. Et si quidem moderatus sit humorum influxus, ea quæ moderate adstringunt, qualia sunt, quæ austeram nuncupantur, adsumenda. Vbi autem vehementior fuerit, acerbiora etiam sunt adiungenda. Ambo si quidem adstringunt, sed imbecillius austeram, vehementius acerbiora, vt copiose libro 4. De simplicium medicamentorum facultatibus capite sexto & septimo monstrat Galenus. Collutionibus igitur ex iis paratis vtendum, inter quas moderatæ sunt quæ ex palmulis decoctis, aliquando sola aqua, aliquando etiam adiecto modico melle fiunt. Similiter autem & ex rosis, pampinis vitis, pdsella, rubo, cypero, cytinis, filiquis, radice mori, malis austeris, aut acerbis, feminis plantaginis, & sorbis. His fortiores sunt quæ ex decocto myrti, & baccarum eius, item acerbiorum malorum cotoneorum, & furculis quercus, similiterque glandium eius, mespillerum, & cornorum parantur. Præclarissimæ vero conficiuntur ex gallis, rhu obsoniorum, acacia, & vtriusq; punici mali floribus, & earundem putaminibus. Mirum autem, quantum prædictorum mixturæ, simplicium & immixtorum vsum excedant. Inter composita vero medicamenta plurimum præsidii affert hoc, quod habet: *Liquorum stillatitiorum rosarum, plantaginis, oxalidis, prunella, solani, singulorum vnc. duas Diamoron, succi medicati eribes, vnc. dimidiam. Succi medicati ex oxyacantha, drachmas duas & dimidiam. Aceti in quorum mace-* ratum sit, vnc. vnam. *Succi malorum granatorum, vnc. dimidiam. Misceantur singula, & cum his colluatur.* Aliud æque præstans, quod accipit: *Rosarum purpurearum, rubi, vtriusq; manipula vnum. Balustiorum, putaminis malorum punicorum, gallarum, glandium quercinarum, singul. drach. tres. Rhois, hypocisthidis, acacie, singul. drach. duas. Seminis oxalidis & cotoneorum, vtriusq; drach. vnam. Decoquantur in lib. i. aqua fontana, dum medietas relinquatur. Iuri per colum transfuso adijciatur diamoron, vncia vna. Succi medicati eribes, diacoryon, vtriusq; drach. dua & dimidia. Aceti optimi, drachma sex.* Commixtis omnibus, fiat gargarisma. His quidẽ medicamentis in principio morbi vtendum, & tunc potissimum, vbi affectus non habuerit maiorem causam, nec ægri corpus multis refertum fuerit humoribus, neq; pars affecta phlegmone natura imbecilla extiterit. Sin contra euenerit, sæpe quidem initio, sæpe vero paulo post, hoc est, tertio die, quippiam ex discussoriis medicamentis commiscendum erit, vt est *lini semen, fenogræci, & alihæ, radix iridis, atque mel.* Quare Medicus perspecta caloris in ipsa phlegmone magnitudine, considerataq; influxus ad eam multitudinem, atq; amplius in toto corpore humorum copiam perpenſa, vel eorum quæ adstringunt, vel quæ discutiunt augebit mixturam. Porro quotquot sunt eius generis medicamenta, hæc tepida adhibeantur: si quidem ea quæ phlegmone laborant, frigus non tolerant. Post vigorem discussoria medicamenta tuto adhibentur, nisi columella indurari cœperit, tunc enim emollientibus etiam vtendum erit medicamentis, *lini scilicet semine & fenogræci,*

A malua, althea, tragacantha, & similibus e quibus gargarismata parari possunt. Posthæc discuti-
entibus, ut est hyssopi, origani, pulegij, caricarum, & radice glycyrrhiza decocto uti oportet. Si
verò ad suppurationem tendat, id quod ex eius colore deprehenditur, nec sua sponte a
collutionibus mulsæ, & oxymelitis scyllitici pus erumpat, ferro aperienda erit. Post pu-
ris eruptionem extergentibus & repurgantibus medicamentis, verbi gratia aqua hor-
dei cum melle rosaceo mista, aut aqua mulsæ, ac subinde glutinantibus, potissimum au-
tem eupatorii sacco, utendum.

De laxata columella. CAP. II.

B **N**on raro accidit, ut columella laxata, radici linguæ ac faucibus incumbens, propē-
dat. Vitium hoc latini laxatam columellam, barbari casum vuula appellat. Quapropter
initio eandem curandi rationem quam eius phlegmone exigit. Corpus enim, & caput;
principio vacuanda per medicamenta capite præcedenti dicta. Sunt qui piper nigrum;
quod exsiccat vehementer, in tenuissimum puluerem tritum, ut columellam contingat;
insufflent. Quibus peractis, collutiones & gargarismi ex iis quæ adstringunt & exsiccat
parentur in hunc modum: Rosarum purpurearum, oxalydis, eupatorii, singulorum fasciculum
manipularem unum. Gallarum, drachmas duas. Aluminis, drachmam unam. Myrrha, thuris;
utriusque drachmam dimidiam. Seminis lini, drachmam unam & dimidiam. Coquantur in a-
qua ad tertias, & iuri decocti per colum transfuso adiciatur aceti optimi, vncia dimidia
& fiat gargarisma. Profunt etiam pulveres per calamum vel arundinem insufflati, qua-
lis est qui habet: Rosarum rubearum siccarum, gallarum, aluminis scissi, singulorum drachmam

Gargari-
sma.

C unam & dimidiam. Piperis, cinnamomi, zinziberis, utriusque drachmam dimidiam. Myrrha
drach. unam. Contusa & cribrata per calamum insufflato. Noces etiam accipe virides, & exsiccat
& palmularum ossa ubi velis sufficienter exurito, & amborum aequales partes misceto, ac siccis tritis
vutor. Item gallæ immatura, salis ammoniaci, utriusque drachmam unam. Trita in sufflato. Ci-
nis item hirundinum exustarum tenuissime contritus, cum melle permixtus, vixque il-
litus prodest. Per ea itaque quæ dicta sunt, in naturam suam reducere columellam oportet,
omni conatu & molimine adhibito, neque festinandum ad eius excisionem. Quod
Hippocrates quoque præcipit, qui sic scriptum reliquit: Gurgulio sine periculo præcidi &
scarificari quoad rubidus ac magnus fuerit haud potest, etenim phlegmone & sanguinis profusio ei ac-
cidit. Proinde oportet hunc alijs quibusdam medicamentis per id tempus extenuare eniti. Hæc ille.

Pulvis.

Prog. 23.

D **Q**uam autem per præsidia, quibus extenuandi inest facultas, nihil iuvantur, atque adeo
suffocationis periculum imminet, ad eius excisionem veniendum erit: antea tamen alio
vacuata. Quod Hippocrates etiam loco prius citato diligenter monuit, dicens: Vbi
vero secretum fuerit omne id, quod vuam appellant, sitque pars gurgulionis extrema maior & ro-
tunda, superior autem tenuior: per illud tempus manus moliri tutum est. Sed præstat simul alio
subducere, antequam manus adhibeatur, si tempus ita permittat, ne æger stranguletur.
Porro ut manum commodius adferas, æger in splendenti & claro loco collocetur, &
tunc quidem os eius diducatur: mox vero immisso forcipis extremo, ipsa columella
producta obtorqueatur. Obtorta enim velut stupida efficitur, & illaqueata curvatur
citra magnam sanguinis eruptionem. Quapropter immorari oportet aliquandiu, ac
eam detinere quousque æger tolerare possit: tuncque auferre non supra forcipem inel-
sione facta, sed ad eius fundum. Quam enim pelliculis referta sit ipsa columella, & ob
laxitatem cedat, proluxa sane inspicientibus apparet. Vnde multi in experti Medici, si-
ue per errorem, siue per ignorantiam altius incidentes, eam funditus auferunt, maxi-
mæque incommodi auctores ægro existunt. Columella præcisa, caput reclinetur, ne
sanguis ad interiora repat: ac subinde os cum decocto rhois, acaciæ, gallarum, adiecto
stillarum rosarum liquore colluatur. Postea ea quæ cicatricem inducere possunt, adhi-
beantur.

Columellæ.

De tonsillarum phlegmone. CAP. III.

F **T**onsillæ, quæ Græcis *ραπίδια* vocantur, Galeno lib. 3. Aph. Comment. 26. auctore, sunt
phlegmones eorum, quæ iuxta Isthmum sunt locorum. Hic vero per isthmum o-
portet intelligere partem illam, quæ os & gulam interiacet. Sic autem per metaphorā
nominatur, ab iis, qui proprie dicuntur isthmi, qui angusti quidam terræ inter duo ma-
ria sitæ transitus existunt. Glandium vero, quæ in fine oris vtrinque linguæ appositæ sunt,

ραπίδια:
Tonsillæ.
Isthmus.

arnas.

Causa.
Signa.
Videtur.

Curatio.

Suppuratio
ais notz.

e defluxu ex capite tumores & phlegmones, Græcis *arnas*, ut loco iam citato testatur Gale-
nus, appellantur. Verum ipsas etiam glândulas Græci *ragi&mu&xi arnas*, quod scilicet cir-
ca isthmum, & sibi ex opposito sitæ sint, nominant: quemadmodum Latini *tonsillas*. Bar-
baram sectantes Medicinam, *amygdalas* nuncupant. Hæ sane frequentissime phlegmo-
nem incurrunt: calidi enim & humidi sunt eorum loci. Hoc vitio magis corripiuntur
hi, qui plurimo sanguine abundant, & pueri, atque infantes adhuc lactentes, ex lactis
haustu. Accidit etiam plerunq; adultis a nimia meri potione, & a multa ac auidiore de-
uoratione ciborum, maxime acrium, & asperitatem inducentium. Sic affectis trāsglu-
tiendi accedit difficultas, & dolor, aliquando etiam febris. Incipiente itaque phlegmo-
ne, cibum subtrahere oportet, & aquæ potum, aut aquam, in qua parum cinnamomi sit
decoctum, exhibere, præsertim febre simul irruente. In vniuersum verò victus ratio ta-
lis sit, qualis in aliis phlegmonibus. Cibi autem sint exigui & sordiles, quod alias deglu-
tiri non possint. Quod ad curationem spectat, si levis fuerit phlegmone, gargarismis
adstringentibus & reprimentibus, quales in principio phlegmone laborantis columel-
læ assumuntur, vtendum. Cauendum tamen inter initia, ne mel gargarismis admiscea-
tur: habet enim acrimoniam, & irritat. Verum si phlegmone vehemens fuerit, & peri-
culum suffocationis imminet: vena gibberi exterior, quam humeralem vocant, eius-
dem lateris incidenda est, repetita sanguinis detractione: maxime si iuuenis sit æger, &
multo sanguine abundet. Quod si venter non probe egerat, iniiciendus est clyster.
Infantium vero ventres glande immissa, & sedis illitionibus irritare oportet. Post va-
cuationem reprimentibus vtendum medicamentis, idque ad morbi vsque vigorem.
Quapropter prîsanæ succum, in quo vix passæ decoctæ sunt: aut sapam, vel decoctum
glycyrrhizæ, aut ficuum, aut hyssopi gargarisandum. Hæc vero omnia, ut antea quoq; mo-
nuimus, tepida sunt exhibenda. Extrinsecus autem leniter fouere conuenit spongiis
impositis, aqua in qua flores chamæmeli, vel altheæ, decocti sunt. Cataplasmata quo-
que ex farina hordei, semine lini, fenograci, & similibus imponenda. Remittente autem &
declinante phlegmone, mel in gargarismos admiscere conuenit: quod in principio, &
in augmento minime faciendum, ne acrimonia, quam obtinet, fluxum concitet. Hoc
etiam tempore calidiores gargarismi prosunt. Extrinsecus autem lana mollis, oleo im-
buta, collo circumponenda. Quod si ex vsu acriorum collutionum aut gargarismorum
phlegmone exasperetur, & mordacitas inde accadat, lenioribus vtendum, qualis est pri-
sana succus, lac etiam tepidum gargarisandum. Remittente vero phlegmone & dolore,
prædicta oris remedia sunt illinenda, immisso digito medio: ita vt cum leni adhibita
illitione partes tonsillarum, quæ intumuerunt, comprimantur, quo contentam in se ma-
teriam excludant. Veruntamen non violenter comprimere oportet, quemadmodum
quidam faciunt: qui auctores ob id fiunt, quo phlegmone amplius augeatur. Si tamen
aliquem hac ratione lædi contigerit, contenti erimus exhibitione lenientium gargari-
smatum, nihil illinentes. Quod si a prædictorum remediorum admotione melius non
habuerint ægri, suppurationem expectare oportet, quam etiam ex phlegmonis au-
gmento, & exacerbationibus ad vespertinam fortioribus cum horrore, in æqualitate, & a-
liquando cum febre dignoscere licebit. Vbi autem suppurationem futuram speramus,
coadiuuare oportet, vt quam citissime fiat. Quare tunc exhibendi sunt gargarismi ca-
lidiores, velut aqua multa calida, & decoctum caricarum, hyssopi, & seminis altheæ. Ex-
trinsecus cataplasma ex hordeacea farina, & fenogracio, cum decocto caricarum, altheæ &
melle. Quam suppuratio perfecta fuerit, dolores minuuntur, & phlegmonis tumor mol-
lior redditus, digito cedit: tunc sane acriores collutiones exhibendæ sunt, cuius gene-
ris sunt, pulegium, hyssopum, thymum, calamintha, & thymbræ in sapa, aut mulla decocta, & gar-
garismata, ut scilicet abscessum rumpant. In cibo accipienda frusta panis, aqua macerata, quæ
maxima, & reliqua similiter quæ eis pro cibo offeruntur acervatim ingerant. Vohe-
mentiore enim ex iis circa tonsillas obuolutione facta, consimili modo tumores adfi-
ciuntur, perinde ac si sectionem sustinerent. A ruptura caput ægri inclinetur, ad humo-
ris commodiorem exclusionem, & aquam mulsam gargarisset per se, postea etiam ad-
mixto lenticulæ, & rosarum decocto. Atq; iis sane immoderandum est, donec penitus
ad cicatricem perducatur.

De serpentibus & malignis tonsillarum ulceribus. CAP. IV.

- A** **M**aligna tonsillarum ulcera interdum præcedente earundem fluxu incipiunt. Aliquando autem a consuetis fieri phlegmonibus, potissimum efferatis, perficiuntur. Fiunt autem frequentissime pueris, atque etiam ætate iam perfectis, maxime iis, qui vitiosis humoribus abundant. In pueris vero aphtha præcedente omnino perficiuntur. Colore similia sunt crustis, quæ ferro inuruntur. Accidit etiam ægris siccitas in transglutendo, & suffocatio coaceruatim incidit, maxime quum rubor subit mentum. Vbi humorum acrimonia præcesserit, nome quæ depascitur locus, excipit, succeditque vna putrefactio. Festinanter iis auxilium adferre oportet: & si sunt ætatis perfectæ, & nihil sit quod prohibeat, confidenter brachii venam exterioriorem, aut si illa non appareat, mediâ incidere conuenit. Si vero virgines fuerint, quas circa ætatis vigorem, dum mensiu purgationem appetunt, hoc vitium crebro apprehendit, tunc eis malleoli venæ sunt incidendæ, vnica sanguinis detractione facta: non tamen vsque ad animi defectionem, ne subinde profluentibus mensibus virtus plane concidat. Deinde aluus clysteribus, glandulis, & sedis illitionibus mouenda: atque omnibus modis conandum erit, vt auersio ab affectis partibus fiat. In quem vsu cucurbitulæ iuxta lumbos affigendæ, ac ligaturis extremitatum vtendum. Postea gargarismis vti decet, *supra in capite De columellæ phlegmonibus, & sequenti dictis*. Post morbi principium diamoron colluendum exhibeatur, ex aqua calida, vel mulsæ permixtum. Tum etiam iridis decocto, & aliis loco iam citato commemoratis vtilicebit. Conandum autem est in vniuersum, ne digitum quidem tonsillis ulceratis admoueamus, aut leni saltem tactu manum admoliamur. Etenim inscii, ad quos maxime in rebus dubiis homines errore quodam confugiunt, vehementius illinunt, simulque locum laborantem comprimunt, ac crustam detrahunt: quod minime facere conuenit, priusquam eleuatam & vix innitentem crustam cõspiciamus. Quod si enim adhærentem adhuc crustam auellere aggrediamur, vlcerationes magis in profundum procedunt, & phlegmones consequuntur, augenturque dolores, & in vlcera serpentina proficiunt. Itaque sicca quidem remedia insufflare conuenit: liquida vero cum pinnula illinire, ita vt quantum licuerit, quam penitissime pinnulam immittamus. Mirabiliter autem crustas aufert stercus caninum, cum melle illitum: quod tunc optimum erit, quum ossibus canes antea per biduum fuerint nutriti. Magnopere enim auxiliatur, neque odium sui inducit, neque insauitatem representat in cibo oblatum. Cinis item vstarum hirundinum, & centaurii minoris vsti cinis cum melle. Oportet autem post irritationes a medicamentis factas, lenire cum *glycyrrhizæ decocto*: & eo, qui ex *mastiche, myrrha, tragacantha, amylo, & croco constat, gargarismo*. Cohibito autem iam vlceres pascente, lac gargarissandum, lemnia terra permixtum. Quid multa? in repurgandis explanandisque vlceribus maxime sollicitum esse oportet. Infantes enim pluri in vlcerum repurgatione conuulsionem passi sunt. Aliqui vero via transglutendi exsiccata, sunt strangulati. Forinsecus certe fomenta adhibere conuenit, & cataplasmata, cū cautione, ne refrigeremus. Feliciter enim res procederet, si intrinsecus detentam materiâ extra possent transferre. Contegantur itaque semper post cataplasmatum ablationem, partes circa mentum, circumpositione lanarum mollium in oleo nardino irrigatarum.
- E** Porro vbi crustæ solutæ fuerint, & vlcera ipsa purgata, hoc remedio vtendum erit, quod habet: *Florum rosarum purpurearum, drachmas tres. Croci, drachmam vnā & dimidiam. Balsamum laustiorum, drachmam dimidiam. Myrrhæ, scrupulum vnum. Nucum pinearum repurgatarum, drachma dua. Amyli, drachmam vnā. Rhois culinarij, aluminis scissilis, vtriusque, drachmā vnā & dimidiam. Tritis & subactis melle, ad illitionem vtere.*

De angina. CAP. V.

- K** *Τῶν γὰρ καὶ ἀνδρῶν* Græcis, Angina Latinis, pprie phlegmone est, quæ in gutture vel faucibus fit. Sic dicta quidē ἀπὸ τοῦ ἀνδρῶν ἢ ἀνδρῶν, hoc est, a suffocando, quod exitiosum & acutissimū sit vitium, quod strangulatur presentaneū vitæ discrimen inferre solet. Hippocrates tamen & alii veteres omnia vitia, quæ in locis iam dictis accidunt, & quas spirandi comitat diffcultas, angina nomine appellant. Porro angina quatuor differentiæ existunt. Vna, quæ fauces phlegmone tentantur. Per fauces autem, *ὁδὸς γὰρ* Græci vocant, locū intra os, vbi tū gula, cum aspera arteria extrema conueniunt, intellige. Altera, quum neque fauces, neque reliqua

oris partes, neque etiam externarum partium ulla phlegmone afflicta videtur, ager tamen suffocationis periculum in gutture sentit. Tertia, ubi gutturis partes tū interna, tum externa iuxta phlegmone laborant. Quarta, ubi ad anteriorem regionem cervicis vertebra laxantur, unde cūus apparet locus, & dolorem quum extra attingitur ager sentit. Recentiores Medici, ut Paulus Aegineta, & alij quidam, inter cynanchen & synanchen, item paracynanchen & paralyanchen discrimen faciunt: atq; adeo *πυράγχην* vocant phlegmonē, q̄ in interioribus faucium musculis orif. Quæ v. in exteriorib. eorundē fit musculis, *παράπυράγχην* nomināt. Quod si interiores gutturis muscoli phlegmone cōflicentur, *πυράγχη*, si v. exteriores, *παράπυράγχη* his ipsis appellatur. Galenus tamen libro 4. De male affectis locis cap. 5. & 3. Prognost. Comēnt. 20. hoc discrimen manifestē reprehendit. Oritur angina a sanguine copioso ac calido, præter naturam ad loca nunc cōmemorata confluenta. Dignoscitur iis indiciis: *Spiritus non nisi recta ceruice, aut difficulter trahitur. Trāsglutiendi quoq; difficultas adest, quibusdā etiam febris. Rubor faciei, & colli. Adhuc in nonnullis etiam tumor superuenit. Ager aperto ore hiat, atq; aerem attrahit. Initio itaq; præceps & compendiarium auxilium omnis angina requirit. Quare p̄tinus gibberi venam exteriorem, quam cephalicam vocant, eiusdē lateris incidere oportet, nisi quiddam maioris periculi impediāt. Parce autē, & pluribus interpositis vicibus, non confertim, auferendus sanguis. Quippe cumulata confertimq; facta vacuatione, animo cito relinquuntur, atq; adeo suffocationis periculum superuenit: & alias sane ex refrigerationibus & animi defectione per facile materia a faucibus ad pulmonem deferret, & inuitabile periculum infert. Curandum etiam, vt modica fiat venæ diductio. Nam tum in aliis, tum in magnis venæ diductionibus acruatim animi defectus irruit. Neque tamen iusto angustiorē facere venæ incisionē conuenit, ne sanguis velut percoletur, & crassior eius pars intus remaneat, quæ causa huius vitii existit. Vtilis est autem eis repetita detractio sequenti die, nisi præpediat ægri timor, aut animi deliquium. Quod si ægotans sit mulier, eique menses restricti fuerint, venam malleoli ex Tralliani decreto lib. 4. cap. 9. incidenda quoque est, moderateque sanguis educendus. Idem etiam tentandum est in viris, si ipsos sanguinem per venā in ano exstātes vacuare solitos didicerūt. Sed præstat Tralliani verba referre, quod illis eius venæ sectionis vtilitas quoque exponatur. καὶ ἐπὶ, inquit, γυναῖκες ὅταν ἐπὶ τὸ ἀσθμαλον, γυνὲς αὐτὴν μὴ καθάριον, καὶ πολλὸν ἐκείθεν αὐτῇ συμβαίνει τὴν ἀφορμὴν τῆς νόσου, καὶ συνέχῃ διτλὴν παρακολυθεῖσαι τὴν ἀφελὴν τῇ παρὰ σπινάτων τὸ αὐτὸ, καὶ τῶν συνήθων κατὰ σπινὰ τὴν ὑπομνησιν, καὶ τὸ πένθος ἀπαλλαγὴν: τὸς δὲ καὶ ἐπὶ ἀνδράσι δὲ ποιεῖν, ἐὰν μάθης αὐτὴ διαμορφοῖσθαι εὐθότα αἰμα κενεῖν. Hoc est, Et in muliere etiam venas sub talo secui, quum ipsam non purgari per menses cognoscerem, & illinc magis ei morbi occasione euenire. Atq; duplex commodum agrotanti mulieri ex eo subsequitur est, nempe consuetarum vacuationū admonitio, & a vitio liberatio. Idem quoq; in viro facere oportet, si didiceris ipsum solitum fuisse per hæmorrhoidas sanguinem vacuare. Tralliani igitur sententia est, in muliere, cui menses, & viro cui hæmorrhoides suppressæ sunt, ubi prius exterior in gibbero vena secta est, etiam dein incidendam esse venam malleoli. Id quod ego quoque significare volens adieci, moderate sanguinem educendum esse. Si enim solius venæ malleoli sectio intelligeretur, nihil opus erat monere vt sanguis moderate educeretur. Quum enim hæc vena a laborante loco plurimū distet, nihil si sola incidatur conferre potest, nisi copiose ex ea sanguis vacuetur. At forte pauci tantam etiam quæ sufficeret vacuationem ferre possent: Quare primum e proximis ob morbi magnitudinem & malitiam venis, deinde autem ad mouendos menses, aut hæmorrhoidum euocandū sanguinem, e malleoli quoque vena sanguis educendus est. Hæc olim etiam mea fuit sententia, etsi sinistre a quibusdā sit accepta. Si per hæc quæ iam dicta sunt parum proficitur, eas quoque venas quæ sub lingua sunt, incidere conuenit, idque primo statim die, vel secundo. Quod si quid venæ sectionem fieri prohibear, alius acriore clystere, qualem in capite De apoplexia descripsimus, eluenda erit. Post vniuersales autem vacuationes, cucurbitas affigere oportet. Et si quidem tumor circa maxillas, aut sub mento persistat, ipsi quidem tumori, & cum scarificatione plurimum sanguinis extrahere, saleque respergere scissuras, & confricare conuenit. Quod si nullus extrinsecus appareat tumor, retro in collo iuxta primam vel secundam vertebra cucurbitula apponenda erit, & constanti attractione vtendum, frequentiusque cucurbita auellenda. Vias enim dilatabit, sicque minore molestia cibum & medicamenta sumet. Auertendi quoque humores, ne ad dolentem atque phlegmone affectum locum confluant. In quem*

Causa.
Signa.

Curatio.
Vena se-
ctio.

Clyster.

Auersio.

- A** quem sane vsum pedes aqua calida foueri debent, & externæ partes valide deligari ac fricari. Collum etiam lanis succidis, aut oleo calido imbutis contegendum. ^{Gargari-} Gargarismatis quoque statim per initia vtendum; quæ neque vehementer repellunt, neq; solum discutiant. Quæ enim admodum repellunt, ea humores ad pulmonem trudendo, suffocationis periculum afferunt. Quæ vero tantum discutunt, plus ratione sui caloris, quam par sit, attrahunt. Extrinsecus autem in nullius anginae specie extrinsecus reprimenda adhibenda sunt, vt quæ humorum defluxum ad interiora propellant, & suffocationis periculum afferant. Quapropter vbi initium fuerit cum multa phlegmone, ea quæ leniter adstringunt, offerre oportet: velut est *rosarum, lentium, & palmarum decoctum*: aut certe adstringentibus gargarismis, supra capite *De columella phlegmone* dictis, aliquid medicamentorum discutientium commiscendum. Eius quidem generis est *stos rosarum, aut rhus cum aqua mulsæ decoctus, & myxarum decoctum*. Quum morbus viget consistitve, iis quibus discutienti tantum facultas inest, vtendum præpropere prætidius: vt est *decoctum fœnograci, sicuum, vuarum passarum, glycyrrhizæ, vel valentiorum, iridis nimirum radices, hyssopi, nigellæ, abrotoni, cum oxymelite*. Licebit itaque hoc tempore vt tali gargarismo, qui habet: *Glycyrrhizæ decorticata, unciam unam. Vuarum passarum, unciam dimidiam. Caricarum numero sex. Fœnograci, drachmas duas. Hyssopi, abrotoni, vtriusque manipulum dimidium. Coquantur in libra vna fontana aqua, donec medietas absumatur. Iuri decocti colo-* ^{Gargari-} ^{simus.} transfulo adiciatur *mellis rosacei colati, uncia vna & dimidia. Oxymelitis simplicis, uncia vna.*
- C** Commixtis omnibus, fingatur gargarismus. Item *stercus caninum, quale prædiximus* ^{Stercus caninum.} capite quarto aridum contusumque, & cribratum cum melle, quam penitissime illum, vt transglutire possint, præstantissimum, Galeno etiam auctore, remedium existit. Est autem eiu modi, quod colore candidum est. *Hirundinum similiter vstarum cinis mire efficax esse solet.* Hinc est quod Cornelius Celsus scriptum reliquerit. Si quis pullum hirundinis comederit, angina toto anno non periclitabitur. Foris denique ceruici, quæ concoquere & discutere possunt adhibeantur cataplasmata, quale est quod accipit: *Farina seminis lini, fœnograci, hordeæ,* ^{Cataplasma.} *singul. unciam unam. Seminis altheæ, drachmas tres. Maluæ, florum chamamelis, meliloti, singul. manipulum vnum. Caricarum contusarum, unciam dimidiam. Nidi hirundinis, aut cineris hirundinis vsti, drachmas duas. Coquantur in aqua donec mollescant: dein in mortario contendantur, & informetur cataplasma. Vel adiectis oleorū chamamelini, lilacei, vtriusq;* ^{Emplastrum.} *unc. unam & dimidiam & iterum ebullitis, fingatur emplastrum.* Neque inutile erit, si collū oleis chamamelino, anethino, lilaceo inungatur: aut decocto fœnograci, meliloti, chamamelique ^{Emplastrum.} *fo-* ^{viat.} *neatur.* Qui angina infestantur, triduo aqua mulsæ pro cibo vtantur: inde ptisanæ cremo-
- D** re per se, aut cum suavi quadâ portione. Præditus enim est is succus facultate extenuandi, discutienti, alendi, & refrigerandi. Vbi phlegmone remiserit nonnihil, & æger iam melius deglutire cœperit, ouorum lutea perliquida, ac sorbitio ex alica præbenda: Item *ptisana cum iusculo pulli gallinacei confecta.* Pullorum quoq; gallinaceorum contusorum sorbitione. Quid multa? cibi ægrotantis viribus respondeant: ideoq; immodica alimenta vitanda. Somnus quoq; vt in aliis omnibus phlegmonibus, sic in angina omnium maxime fugiendus. Nam in somno, vt Hippocrates dixit, sanguis intro repit, atq; adeo humorum ad locum patientem defluxum auget.
- E**

De tussi. CAP. VI.

- T** Vssis, quæ non est nisi expultricis facultatis instrumentorum respirationi seruientium motus, adeoq; symptoma: variæ sunt causæ. Nam intemperies frigida instrumentorum respirationi seruientium *Galeno lib. 2. De sympt. causis* teste, tussim efficit. Humor item a capite ad asperam arteriam destillans, & sola asperitas membranæ asperam arteriam intrinsecus ambientis, tussim irritant. Qui præterlabuntur etiam potus & cibi, tussim mouent. Limbrici quoque stomachum intestantes, tussiculas paruas excitant. Acris denique humor stomachum perturbans, ac irritatē aliquam qualitatem ad fauces demittens, tussim facit. Insuper humor in pulmone & thorace detētus, in pulmonis phlegmone, morbo laterali, & tabe, maxime tussis causa existit. Inter ea q̄ extrinsecus adueniūt, atque tussim mouere possunt, sunt fumus, puluis, & quicquid est eorum quæ asperam arteriam exasperant. Signum autem propter solam frigidam respirationis instrumentorum intemperiem tussientium est, quod sic affecti nihil inter tussendum expuunt: ^{Causa.} ^{Signa.}

neque violenta tuffis, neq; coacta, ſed adeo exigua eſt, vt non ſolum per ſpiritus detentionem ſupprimi, & ne eueniat prohiberi: verum etiam, niſi magna admodum fuerit, ſanari poſſit eo quod per ſpiritus inhibitionem frigefactæ particulæ caleſcant. Præterea qui hac tuffi laborant, per crebras inſpirationes magis irritantur, frigida tate videlicet exinde intenſiore facta & aucta. Quare ſi hi leniter inſpirant, ac aerem attrahunt, & in calida domo verſantur, parum aut omnino nihil tuffiunt. Facie denique ſunt pallida, ſiti nulla premuntur: calidis optime, frigidis male afficiuntur. Quæ ſingula, vt alia omnia, Hippocrates libro ſexto Epid. 2. Aphor. 12. breuiter admodum iis complexus eſt verbis, inquiens: *Tuffes ſiccæ, leniter irritantes, non admodum ſiuculoſæ, non a maligno, ſed vento potius accidunt. Id vero hinc manifeſtum ſit, quando loquuntur, aut os aperiunt, tunc tuffiunt: B* quum vero non, minime. Hæc ille. Quæ vero cum titillatione partium ab vtraque parte palati contingunt tuffes, palam oſtendunt deſluxum a capite ad aſperam arteriam deferri, itemque ad pulmonem: id quod ex difficili quæ comitatur ſpiratione, facile deprehenditur. Quod ſi ſic affecti nihil exſpuant, tenuem eſſe deſluxum indicat, qui ex pulſione ſpiritus diſſectus, præ tenuitate ſua non vltra fertur, ſed rurfus fluxum reflectit. Ratio victus pro cauſarum diuerſitate variabitur. Si enim ex frigida intemperie inſtrumentorum reſpirationi ſeruientium orta fuerit tuffis, aer & ventus qui inſpirantur, cibi etiam & potus frigidi vitandi erunt. Sin ob humorem a capite deſtillantem excitabitur tuffis, talis ſit victus, qualem ſupra in capite De deſtillatione deſcripſimus. In vniuerſum autem falſa, acria, & quæcunque arteriam exaſperare valent, fugienda. Porro tuffis ex C frigiditate inſtrumentorum reſpirationis orta, per præſidia quæ eadē excalfacere poſſunt curabitur. Ceruix itaq; lanis calidis veſtiatur, raro inſpiretur: quod ſpiritus cōpreſſio, vt paulo ante dictum eſt, non ſolum tuffim impediatur, imo etiā ſepiſſime ſanetur. Quare multum conducit vt egrotantes in calida domo verſentur, & leniter admodum inſpirent. Thorax etiam calidis vnguentis, quale eſt irinum, liliaceum, chamæmelinum, anethinum, & eiufmodi foueatur. Si vero humor tenuis & acris ex capite in aſperam arteriam & thoracem deſtillans tuffim excitauerit, tum per boni ſucci cibos potiſſimum, & per medicamenta quæ refrigerant, ſpiſſant, leniunt, acrimoniamq; ac mordacitatem temperant & obtundunt, ſanabitur. In quem uſum conuenit exhibere ſerapium viola D ceum, nymphææ, de papauere, antidota diatragacanthæ, diapenidion ſine ſpeciebus, pilulas bechicas, & id genus alia. Item ea etiam medicamenta, quæ a veteribus dolore leuantia & arteriaca nominata ſunt: de quibus copioſiſſime ſcribit Galenus libro ſeptimo De compoſ. medic. localium. Inter alia vero hoc potiſſimum confert ecligma, quod habet: Sacchari violacei & nymphææ vtriuſq; unc. dimidiam. Diatragacanthæ, diapenidion ſine ſpeciebus vtriuſque drach. ſex. Succij glycyrrhizæ, drach. duas. Piſtularum bechicarum, drach. vnā. Syracis calamitidis, drach. vnā & dimidiam, Myrrhæ, roſarum ſeccarum, vtriuſque drach. vnā. Traga E canthæ, nucum pinearum, vtriuſque drach. dimidiam. Serapij violacei quantum ad excipiendum ſatis eſt, fiat ecligma. In eum locum referenda venient & ea medicamenta, q̄ ſupra in capite De deſtillatione dicta ſunt. Ceterū ſi craſſus & viſcidus humor tuffis cauſa fuerit, per ea q̄ incidunt & extenuant, illi medebimur. Quare tum exhibenda ægrotantibus ſerapia de F glycyrrhizæ, de hyſſopo, de marrubio, e calamintha, oxymeli, & ſimilia. Aut decoctum hoc, quod accipit: Radicum iridis, petroſilini, glycyrrhizæ, ſingul. unc. vnā. Radicis helenij, unc. dimidiā. Caricarum numero ſeptem. Vuarum paſſarum mundatarum, unc. vna. Seminum urticæ, aniſi, fœniculi, ſing. drach. duas. Hyſſopi, adianti, ſcabioſæ, marruby ſingul. manip. vnum & dimidiam. Agarici optimi, drach. tres. Coquantur in aqua fontana iuſte quantitatis, donec tertia pars abſumatur: dein colo transfundantur, & iuri decocti adijciantur ſerapij de hyſſopo, e marrubio, vtriuſque uncias duas & dimidiam, fiatque potio. Poſtea, ſi ita e ægrotantis eſſe videbit, corpus per ea medicamenta quæ craſſos & lentos humores purgant, euacuandum. Inter alia vero complura, quæ in ſuperiore libro a nobis dicta ſunt, vnice confert agarici dilutum quod in eum paratur modum: Accipe agarici electi, drach. duas. Zingiberis, ſcrup. vnum. Sa F lis foſſilis, grana tria. Trita macerentur per noctem in vini albi odoriferi, unc. duabus. Liquorisque ſtillatij abſinthij, & fœniculi, vtriuſque unciam vnā. Mane colentur & exprimantur, atque adijciantur antidoti Indi. maioris, drachma dua & dimidia. Oxymelitis ſcyllitici, unc. dimidiam, & formetur potio. Vacuato tandem corpore, ecligmata, quæ officinis hodie Arabica voce loch appellantur, deuoranda erunt, commixtis interdum aliis antidotis in hunc vel conſimile

Vidua.

Curatio
tuffis ab in-
temperie
frigida.Tuffis a te-
nuibus &
acribus hu-
moribus
curatio.

Ecligma.

Tuffis a
craſſis & vi-
ſcidis hu-
moribus
curatio.
Decoctum.

Purgatio.

Agarici di-
lutum.

A Accipe ecligmati & pino sani & experti, e scylla, singul. drach. tres. Diatreos solomonis, unc. unam. Religma Pastillorum thoraci adaptorum, drach. unam & dimidiā. Pulveris diapienidion cum speciebus, drach. unam. Pulveris radices helenij, iridis, utriusque drach. duas & dimidiam. Succu glycyrrhizæ, drach. unam & dimidiam. Serapij de marrubio, quantum ad excipiendum sufficit. Thorax præterea extrinsecus inungatur oleis calidis, liliaceo, irino, amygdal. dulcium, adiectis pinguedinibus, & aliis hoc quidem modo: Accipe oleorū liliacei, amygd. dulciū, utriusq. drach. tres. Pinguedinis ^{Vnguentū.} gallinae, drach. unam & dimid. Butyri recētis, drach. duas. Succu sœnograci, radices altheæ, utriusq. drach. unam. Styracis, drach. dimidiā. Pulveris radices helenij, iridis, utriusq. drach. unam. Croci, scrup. dimi. Cum cera quod satis est, fiat vnguentum. Reliqua quæ ad tussis curationem **B** necessaria sunt, ex cap. De destillatione petenda erunt.

De asthma. CAP. VII.

Qui citra febrē crebro respirant, ut solent, qui citatiore cursu fatigati sunt, a sympto-
mate, quod superuenit, Medicis Græcis ^{ἀσπμα} *aspmat*, Latinis *anhelosi* & *suspiriosi* appel-
lantur, iidem ab alio symptomate, quod scilicet perpetuo vniuersum supra thoracem
corpus penitus rectum habere coguntur, meruentes ne suffocentur, ^{ἀσπμα} *aspmat*, quasi di-
cas, *non nisi recta cervice spirantes*, nominantur. Inspiratio enim minor ipsis contingit, quā
respirationis frequentia expostulat, quamuis thorax plurimum ipsis diducatur. Ex quo
manifestum fit, coarctationem locorum præter naturam intrinsecus adesse, cuius et-
iam manifeste ægri sensum percipiunt. Fit itaque asthma, quum aut crassorum & tena-
cium humorum copia pulmonis bronchiis cartilaginibusve fuerit infarcta: aut tumor
quispiam abscessui similis in ipso constiterit. Similiter vero difficulter spirant, qui aspe-
ram arteriam a multa destillatione repletam habent. Facile autem inuicem hæc mala
distinguuntur. Nam destillatio etiam sanis ex manifesta causa confestim accidit, in
totum fere citra febrē, concomitantibus etiam propriis destillationis indicibus. Si ve-
ro tumor abscessui similis in pulmone fiat, necessario febris consequitur: neque ita diu
post, phlegmone suppurata, pus cum tussi reicitur. Si autem nonnullis crudum tuber-
culum gignatur, ii neque grauitatem magnam sentiunt, neque difficultate spirandi ad-
modum infestantur. Qui vero proprie *asthmatici* & *orthopnoici* appellantur, in totum
febrē non habent, grauitatis autem sensus eis contingit, neque quippiam purulen-
tum per sputum reieciunt. Porro victus ratio in vniuersum calida & sicca sit. Quapro-
pter vitandus aer frigidus & humidus. Carnibus vtendum perdicum, auicularum mon-
tanarum, gallinarum, & pullorum gallinaceorum, caporum, phasianorum, & eiusmodi.
Fugiendi pisces, fructus, legumina, & item omnia alia quæ crassos & lentos humo-
res procreare possunt. Vsus frequens sit hyssopi, oreoselini, & fœniculi. Vini quidem
potio ambobus conuenit vitiis, saltem tenuis substantiæ. Potus vero in vniuersum sit
exiguus, iis quibus abscessus oboritur: multus autem, quibus bronchia, & cartilagine
tenacibus & crassis humoribus sunt obstructa. Nam potus multus eos largiter humectat
adeoque vt humores facilius efferantur tussiendo efficiunt. Siquidem eos humores re-
purgantia & abstergentia medicamenta, necessario tussis commouent. Verum non
facile per sputum reicitur ob crassitudinem, id quod repurgatum & absterium est: hu-
mectatione igitur multa, quo facilius efferatur, indiget. Alias potus multus spirandi
difficultatem auget, ventriculo multo potu distento & septum transuersum premente.
Tutius igitur in pastu parce bibere, a pastu vero aliquantisper a potu prorsus abstinere,
& interea os & guttur aliquo liquore conueniente colluere. Exercitio ante cibum v-
tendum, at nequaquam subito, quod complures hac ratione extincti sint. Frictiones
thoracis profunt. Somnus sit moderatus, & nocturnus. Animi perturbationes, ira
potissimum & mœror, fugiendæ. Ceterum curatio prædictorum vitiorum quiddam ^{Curatio.}
F commune obrinet, quiddam etiam proprium. Commune quidem utrisque, vt re-
dundantia humoris hæc vitia procreantis absumatur & aboleatur. Proprium vero, vt
sia crassis ac tenacibus humoribus oriatur vitium, per extenuantia & extergentia me-
dicamenta sanetur. Si vero a tumoribus abscessui similibus vitium fiat, per extenuan-
tia & exsiccantia. Quæ quidem curandi ratio vniuersis in profundo corporis laten-
tibus phlegmonibus communis est. In crassis itaque & tenacibus humoribus conue-
niunt ea quæ citra vehementem calefactionem extenuant & abstergunt medicamenta:

84 Operum Leonhard. Fuchsi Pars III.

Præparatio
humorum.

Siquidem ab immodico calore, veluti etiam frigore, crassi & tenaces humores magis A
crassescunt, coguntur, contrahunturque; ita ut subinde difficulter abstergi & auelli possint.
Quare ex eis maxime prodest oxymeli scylliticum, ipsaq; scylla assa, cum melle trita & delincta.
Serapia item ex glycyrrhiza, e marrubio, & hyssopo, atq; decoctum quod paulo ante in capite De tussi
commemorauimus. Quod ad euacuationem spectat, si necessitas urgeat, vena in gibbero

Purgatio.

media, aut interna præ omnibus iis incidenda, & tantum sanguinis, quantum vires pa-
tiantur, detrahendum. Sin corpus plethoricum haud fuerit, præmissa humorum ad va-
cuationem præparatione, medicamenta fortiora, quæ crassos & tenaces humores va-
cuant, frequenter propinanda. Quare in hunc usum conueniunt catapotia de agarico,
& cochia vocata, item diaturpetum cum rhabarbaro scenitico, antidotum Indi, & diaphenicon. B
Dandum etiam agarici dilutum, quod præcedenti capite descripsimus. Alius præterea clyste-
ribus validioribus eluenda. Vomendum etiam per interualla ex sumpto raphano, & a-
liis quæ vomitum citant, de quibus cap. 34. libri primi diximus. Interea tamen dum fre-
quentior sit purgatio, exhibenda erunt medicamenta quæ sensim & paulatim humo-
res in thorace extenuare ac discutere possunt. Proinde aristolochia rotunda, helenij & iridis
radices, urtica semen & sphodyli, hyssopus, nigella, marrubium, calamintha, & id genus alia me-
dicamenta, e quibus decocta, vel ecligmata construere licebit, assumenda. In quem v-
sum etiam ea ecligmata quæ supra in capite De tussi recensuimus, competent. Vnice v.
studendum, ut hæc medicamenta quæ exspuitionem crassorum humorum e thorace
iuvant, cum humectantibus, tum sorbitionibus & potionibus exhibeantur, ut li. 5. simpl. c. 13. C

Vaguentur.

Galenus docet. Extrinsecus thoraci cataplasmata e ficibus, & hordeacea farina, magis ve-
ro ex loliacea habente resinam, mel, & ceram commixta, imponenda. Thoraci etiam
olea & vnguenta calefacientia, irinum, anethinum, rutaceum, & eiusmodi admouen-
da. Tale est, quod habet: Oleorum anethini, rutacei, utriusque unc. dimidiam. Olei irini, drach.
tres. Adipis galline, anatis, utriusque drachmas duas. Radicum iridis, helenij, dracontij maioris,
singul. drach. unam. Seminis lini, scrup. duos. Styracis, drach. tres. Cera quod satis est, fiat vnguen-
tum. Thorax tamen nunquam non antea fricandus linteo aspero, quo referatis ac didu-
ctis meatibus, vis medicamentorum ad profunda promptius penetrare valeat. Ceterum
iis etiam medicamentis vtendum, quæ exulcerare cutem, & saniem serolosque humo- D
res extrahere possunt: qualia sunt quæ rubefacientia nominantur. In hunc usum thorax
& pectus cum vrticis confricari & cædi potest. Loci autem rubefacti cum lauacro ac o-
leo calido curandi. Porro in vitio inueterato, & ubi omnis medicina frustra adhibita
fuerit, ad vitionem confugiendum erit. Quæ qualis esse debeat, docet Aetius li. 8. ca. 57.
Quod ad abscessus attinet, qui attenuantibus & resiccantibus indigent medicamentis,
ut dictum est, sciendum eos aromatum maxime facultatibus gaudere, quod scilicet hæc
omnia sint tenuium partium, & exsiccatoria, nec non calefacientia. Quare tum antidota
ex iis composita, ut est theriaca, mithridation, antidotum e moscho dulce, diambra, o-
doratum rosaceum, & id genus alia, maxime danda sunt asthmaticis.

Abscessus
curatio.

De pleuritide. CAP. VIII.

Pleuritis.
Dolor la-
teralis.

Plæuris, exquiste & proprie loquendo, phlegmone est membrana intrinsecus costas & la- E
tera succingentis. Latinis, lateralis dolor appellatur. Quum vero dicitur phlegmonem
esse membranae costas succingentis pleuritim, non intelligendum est solius membra-
nae. Nam una etiam circumpositæ eius partes phlegmone laborant, musculi nimirum
intercostales. Nec temere adiectum est, exquiste & proprie loquendo: siquidem ex
cruditatibus plurimis, cibisque crassis ac pituitosis, crudi lentique & crassi humores in
corpore generantur, qui nonnunquam repente se in vacuum thoracis locum, Actio
lib. 8. cap. 68. teste, ingerunt, aut in ipsum etiam pulmonem, atque sua multitudine suc-
cingentem latera intrinsecus membranam distendentes, inferunt dolores, ut imagi-
natio factæ phlegmonis imperitis exhibeatur. De ea itaque hic nihil agatur, quod cu-
ratio eius ab asthmatis curatione parum, aut nihil absit. Pleuritis, qua succingentis intrin- F
secus latera membranae est phlegmone, fit ex sanguine copioso calido, ad iam dictam mem-
branam præter naturam confluyente, nonnunquam bilioso, aut pituitoso, aut melan-
cholico, id quod sputum indicat, ut paulo post latius dicemus. Hanc consequitur spi-
randi difficultas, tussis, febris continua, dolor vehementer pungens, pulsus durus, &
serræ modo asper. Quod si sputum rubrum & cruentum fuerit, sanguinem superare
signi-

Causa.

Signa.

A significat. Sin flauum & subpallidum, flauam bilem. Quemadmodum si album fuerit, & leuiter spumofum, pituitam: nigrius vero, melancholiam in sanguine praeualere monstrabit. Succo pituitae primis duobus saltem diebus contentus in cibo agetur ^{videtur} sit. Deinde cum pituita amygdalae mundatae & trita decoquantur, idque matutino potissimum tempore. Vespere sumat lac amygdalarum, aut panis puri micas cum iure gallorum, maxime ubi aegri vires imbecillae fuerint. Pisces etiam saxatiles, in declinatione potissimum morbi, dare conuenit. Acerba & adstringentia in vniuersum omnia vitanda. Potus sit aqua, in qua decoctum sit cinnamomum. Frigidam aquam, quod sputum in crudefcere faciat, tanquam summe exitiosam vitet aeger. Vino quoque omnino arceatur. Decumbat in latus affectum, quod is decubitus sit indolentior. Iram & moerorem, aliasque animi perturbationes molestas fugiat. In curandi ratione principio diligenter a Medico erit considerandum, num corpus aegri plenitudinem laboret, nec ne: ut nimirum intelligat, quando calorificis medicamentis inter initia dolor mitigari ac dissolui possit, & quando minus. Si enim corpus plethoricum non sit, tum incipiente phlegmone; calefacientibus medicamentis & fomentis dolor mitigari & discuti debet. Nempe, *Galenus lib. 2. Victus acut. comment. 1. teste*, fomenta calida cutem ipsam ad perspirationes rariorem efficere; phlegmonisque sanguinem tum tenuare, tum per halitum digerere consueuerunt. Quae si facta fuerint, non solum aliquid sanguinis euacuabitur, verum etiam partes affectae, quae minus distenduntur, mitius subinde dolebunt: At si vel plethoricum corpus fuerit, vel malo succo redundet, *ut lib. 13. Ther. meth. testatur Galenus*, curatio per ea quae sic calent, non incoanda: fluxionem enim ad partem affectam citanti. Siquidem pars cui calorifica haec admouentur, plus trahit quam euaporet. Quapropter tum fomentorum calidorum, utpote quae dolorem soluere non possunt, nullus esse usus debet, sed totum corpus venae sectione praevacuandum erit. Huc sane respexit Hippocrates, qui *lib. 2. Vict. acut. ab initio statim sic scriptum reliquit: Lateris dolorem siue is per exordia fuerit, siue postea abortus sit, tentare calidis fomentis dissolvere, non abs re existit. Tentare, inquit, non abs re existit*, quasi dicat: *Quum fomenta calida dolorem non soluerint, is diutius utendum non erit, quod scilicet sanguinis in phlegmone copiam dissolvere haud possint: sed confestim ad totius corporis, per sanguinis missionem, veniendum vacationem.* Quanquam, ut dicam

D quod sentio, iudico Hippo. *lib. 2. de victu acuto morborum apho. 1. 2. & sequentibus*: de omni dolore lateris, tam eo qui citra, quam eo qui cum phlegmone consistit, locutum esse. Quare quae de calidis fomentis scribit, ei dolori lateris competunt, qui citra phlegmonem consistit. Siquidem periculo vix vacat, si etiam in corpore quod plenitudine non laborat, usum talium attentemus. Praestat igitur tum quoque venam initio tundere, *ut alibi fusius docuimus*. Secunda igitur vena gibberi interna, quam *iecorariam & lienarem* vocant, quae *ut Galenus ait, est directo loci male affecti posita est*. Nam (ut *Galenus in libro De curandi ratione per sanguinis missionem ait*.) *Sanguinis missio quae est directo laborantis lateris adhibita pleuritidis fuit, clarissimam saepe utilitatem affert: quae vero ex brachio opposita, aut omnino nullam, aut obscuram, aut certe post temporis intervallum.* Siquidem

E haec unica non solum a parte affecta retrahit reuellitve, verum etiam celeriter, quod in pleuritide, aliisque phlegmonibus internis maxime requiritur, vacuat: quemadmodum in nostra aduersus Brachelium apologia copiose, multisque argumentis demonstrauimus. Quae autem vena in pleuritide est directo laborantis loci sita sit, *capit. 16. Galeni de curandi ratione per sanguinis missionem in nostris commentariis exposuimus*. Eam hodie etiam Medicis apeririendam esse censeo, quod illa anatomes, & dissectionis rationi respondeat, atque rerum successu approbata sit. Eousque autem, Hippoc. loco paulo ante citato teste, sanguis auferendus, donec vel multo rubicundior, vel pro puto rubidoque liuidus fluxerit. Non tamen omni ex parte hanc, *Galenus cap. 14. libri de curandi ratione per sanguinis missionem monuit*, expectare oportet. Accidit enim interdum ut antequam haec fiat cessandum sit, duabus de causis, quod videlicet imbecilla sit virtus, aut phlegmone maligna. Haec enim nihil comedit, quod vehementer impactus sit sanguis. Plura ea de re in nostris super hanc Galeni locum com. diximus. A venae incisione clyster levis aluo, si modo sponte sua, ut conuenit, non deiciat excrementa, infundatur, qualis est qui habet: *Malua foliorum violarum purpurearum, mercurialis spinachia, Clyster*.

Curatio.

Fomenta calida.

Vena lateris.

intybi hortensis utriusq; sing. manip. unum. Hordei integri, unc. unam. Coquantur singula in aqua iuste quantitate, quoad tertia pars absumatur. Dein accipiatur iuris decocti lib. una. Adedulla casia fistularis recens extracta, uncia una & dimidia. Butyri recentis salis expertis, uncia dimidia. Salis vulgaris, drachma una. Commixtis omnibus fiat clyster. A corporis vacuatione calorifica & dolorem leuantia fomenta extrinsecus adhibeantur: vt sunt sacculi, quia posterioribus Græcis *μαζογονοι* vocantur, e floribus *chamameli, anethi, meliloti, verbasci, semini- bus lini, sœnogræci, milio & surfure compositi*. Aqua etiam calida, aut iam dictorum medica- mentorum decoctum, aut olea in vitro, vesica, vel alia vaseulo adhibenda. Quinetiam vtiliter admouetur spongia magna, mollisque prædictis rebus irrigata, & subinde ex- pressa, ac calida imposita. Vestienda vero fomenta sunt, ne scilicet vis eorum celeri- ter euanesca. In hunc etiam vsum conuenit hoc emplastrum, quod accipit: *Florum B chamameli, verbasci, anethi, singul. manip. dimidium. Seminis lini, sœnogræci, utriusque drach. tres. Seminis anisi, drach. unam. Farina hordei, manip. dimidium.* Contuita ebulliant in aqua, dum in melis crassitudinem coeant: postea adiectis *oleorum anethini & chamamelini, utriusque unc. unam & dimidiam, ebulliant iterum, & addantur duo vitelli ouorum, croci, scrup. unum, & singatur emplastrum.* Post septimum vero diem, si eodem modo persistat dolor, cucurbita lateri affigenda est, & cutis scarificanda. Manifestissima enim in pleuriticis vtilitas ex cucurbitæ appositione apparet. Vulnuscula vero scarificati loci sale con- spargenda, si modo sustinere ægri queant. In aliis autem, linteolum oleo madefactum ac sale conspersum imponatur. Sequenti deinde a scarificatione die, optimum est, rursus cucurbitam affigere, quo sanguis saniosus ex impactis vulnusculis extrahatur. C Hæc enim detractio priore commodior existit: non enim sanguis, sed sanies in se- cunda detractioe auferrur. Non negligat etiam Medicus exhibere ægrotantibus me- dicamenta, quæ ad sputi facilem excreationem conducunt: vt est *diapenidion, diatraga- canthes, saccharum violaceum, pastilli pectorales, adiectis aliis ecligmatis capite De tussi comme- moratis.* Extrinsecus adhibenda medicamenta, quibus discutiendi inest facultas, vt est *sœnogræcum, anethum, melilotum, hyssopus, & similia nunc sapius commemorata.* Item *vnguen- tum dialthea nominatum.* Quod si tamen permutationis in pus signa appareant, coadiu- nare permutationem oportet, hoc aut simili vnguento, quod habet: *Oleorum chamame- lini, amygdalarum dulcium, liliacei, singul. drach. tres. Butyri salis apertis pinguedinis gallina, v- triusq; drachmas duas. Succis sœnogræci, seminis lini, altheæ, utriusq; drach. unam. Cera quod satis D est fiat vnguentum.* Rupta tandem phlegmone, ea quæ extergunt, atque a pure ac sanie purificant, exhibeantur: vt est *aqua mellis, aut decoctum hordei, aut sacchari rubei.* Facta puris & saniei absterfione, glutinantia adhibeantur medicamenta. De quibus omnibus co- piose in capite De phthisi dicemus.

De peripneumonia. C A P. IX.

Peripneu-
monia.
Causa.
Signa.

PERIPNEUMONIA phlegmone est *pulmonis, cum febre acuta.* Hæc magna ex par- te a validioribus in pulmonem destillationibus, aut angina, aut asthma, aut pleu- ritide, aliisve morbis fit. Aliquando etiam ipsa phlegmone mali origo est. Hoc qui- dem correptos consequitur difficultas spiritus: pulmo enim cordi incumbens, suffo- cationem infert: febris acuta & ardens, grauitas distensioque thoracis citra dolorem. E Pulmo enim non sentit. Quod si membranæ ipsius, quæ cum thorace secundum longitudinem eius sunt connexæ, fuerint phlegmone affectæ, etiam dolorem perci- piunt. Malæ iis rubent, & tota facies, nasus in summo fit limus, venæ temporum ele- uantur, oculi intumescunt, linguæ adest siccitas, deiectio appetitus, exspiratio calida, aquæ frigidæ, magis vero aeris frigidi concupiscentia, tussis sicca. Si autem quid effe- ratur, spumofum est ac biliosum, ampliusq; cruentum, & floridum vehementer: quod et- iam pessimæ significationis existit. Et si mortale vitium ipsum fuerit, vigilæ amplius aderunt, aut somni breues comarodes, extremitates frigidæ, vngues liuidi incuruatur, quarta, aut summum septima die hi moriuntur. Verum si ad salutem permutetur mor- bus sanguinis eruptio abundanter interdum sequitur, aut crebrius, Galeno libro 3. de I iudiciis capite 3. teste, alui perturbatio, multis exeuntibus biliosis & spumosis humori- bus. Aliquando autem phlegmone in pus commutata, per ventrem aut urinam pus excernitur, statimque ab omni molestia liberantur. Quod si in pulmonem irruerit aceruatim, aut suffocat, aut cum grauibus symptomatis in tabem permutatur. Quod ad ci-

Vicius.

A ad cibum spectat, danda est peripneumonicis primis diebus sorbitio ex pitisanæ cre-
more cum melle, origano aut hyssopo: magis enim quam in pleuritide, extenuatoriis
cibis opus est, potissimum ubi ex pituitoso sanguine vitium ortum est. Chondrus
quoque seu alca ex aqua nulla iis non parum conuenit. Potus sit exiguus: siquidem
humiditas pulmoni noceat. Possunt roboris tuendi gratia, potissimum ubi suffocatio
virget, uti mulla per se, & cum nucleis piteis: aut mulla in qua decoctum sit hyssopum,
aut iris sicca aquæ mullæ inspergenda. In vniuersum autem victus ratio eorum qui pe-
ripneumonia laborant, præcipue vero qui a peripneumonia conualescunt, eadem
fere sit quæ pleuriticorum. In curandi ratione sanguinis detractio vitanda est in iis,
qui ex aliis morbis in hoc vitium incidunt, maxime si diu in hoc statu fuerint, vel si
B per initia sanguinem miserint. Alius clysteribus ducenda, si ægre delicit: aut cucur-
bitulæ, ubi nihil obstat, thoraci & lateribus admouendæ sunt, eæque prægrandes &
multæ, cutē incisa & scarificata. Sin peripneumonia statim ab initio inuaserit, sangui-
nem mittere, si vires & alia permiserint, oportet. Incidenda vero vena in gibbero in-
terna: & ubi vires sustinuerint, ex utroque brachio sanguis detrahendus: primum
quidem modice, & minime vsque ad animi defectionem, ut videlicet aliquid asserue-
tur ad repetendam extractionem. Si vero quid sanguinis missionem prohibuerit, cu-
cubitulas certe vniuerso thoraci lateribusque affigere oportet: iisque tantum sangui-
nis eliciendum, quantum vires patiuntur. Aut acri clystere aluum eluere conuenit, ex
decocto nimirum hyssopi, iridis, rutæ, adiecta colocynthidis medulla, sale fossili, & aliis quæ ad
C eiusmodi clysteres sunt necessaria, quæ facile studiosi ex libris nostris De compositione medicamento-
rum inscriptis cognoscent. Post hæc curandum, ut per crebram spuitionem & excreatio-
nem, quæ certe sit celerrima & facillima, thorax atque pulmo expurgetur. In quem sa-
ne vsum ea quæ superiori capite De pleuritide ac tussi a nobis commemorata sunt ecligma-
ta, vnguenta, & emplastra usurpanda erunt. Quæ in eo tantum diuersa a prioribus
sunt, quod quæ nunc sunt adhibenda, omnia valentiora esse, maiori que extenuandi
facultate prædita conueniat. Dandum igitur ecligma e scylla, e pulmone vulpis, radicis tri-
dis ac elemi, adianti decoctum. Ceratum autem conficiendum ex oleo rutæ, nardino, adie-
ctis medulla ceruina, iride, hyssopo, marrubio, tenuissime tritis, & terebinthina resina exceptis, totiq;
thoraci & lateribus imponendam.

Curatio.

De sanguinis reiectione. C A P. X.

A ^{ἰσχυρῶς} ^{αἰματωρὶς, ἢ αἰμαρὶς, ἢ αἰμαρὶς} vel certe rectius ^{αἰμαρὶς, ἢ αἰμαρὶς, ἢ αἰμαρὶς} ^{αἰμαρὶς, ἢ αἰμαρὶς, ἢ αἰμαρὶς} nihil aliud Latinis significat, nisi san-
guinis reiectionem, aut cruentam spuitionem. Hæc nonnunquam accidit a causâ ex-
terna & manifesta, nempe de lapsu ex alto, plaga extrinsecus illata, percussione ve-
hementi, saltu, aut si grauius aliquod corpus thoraci incidit, clamore deniq; magno,
aut frigore immodico. Nam frigus venas rumpere, Hippocrates etiam testatur. Calor
quoque sanguinis reiectionem efficere potest, iuxta id Hippocratis dictum: *Calidum*
ubi quis sapius utatur, profluvia sanguinis affert. Nonnunquam ex causâ interna & occulta,
veluti plenitudine, sanguine vitioso & venas erodente, atque oris venarum apertione.
Venarum autem ora aperiuntur propter vasis imbecillitatem, sanguinisque qui ad os
E eius impeturuir copiam: ad hæc actem quampiam, quæ illi extrinsecus incidat, qua-
litate. Ipsa vero vasorum erosio ex acerbis contingit humoribus, siue a capite
in pulmonem delabentibus, siue in ipso pulmone generatis. Porro sanguis qui rei-
citur, modo ex thorace ac pulmone, aut aspera arteria venit, modo ex aliis locis oris,
aut gingivarum, aut faucium, aut columellæ, aut ventriculo, ad quem ex venis & par-
tibus adiacentibus, iecori nimirum & liene, sanguis delabitur. Causæ externæ e
fermonibus ægri aut affidentium cognoscuntur. Internæ vero per indicia eiusmo-
di. Si enim ob plenitudinem sanguinis reiectio accidat, tum confertim sanguis
reiecitur, & post vacuationem melius leuiusque agunt. At si propter oris venarum
apertionem, tum calidi affectus præcesserunt: veluti si calidis balneis plurimis usus
F sit æger, habitaueritque in calida regione, consimili existente maxime anni tem-
pore, cibis quoque & potionibus calidis usus sit. Etenim multitudo sanguinis cali-
da existens, venarum pulmoni incumbendum ora aperit & dilatat, atque hoc mo-
do coaceruata effusio contingit. Si vero ex venarum erosione cruentum editur spu-
tum, non confertim, sed paulatim sanguis cum tussi expuitur, & semper peius habent,

Causæ.

6. Epid.
Par. 3.
Aph. 10.

Aph. 16.

Note,

88 Opèrum Leonhard. Fuchſii Pars III.

Poſſibile eſt etiam propter eroſionem vehementem, confertam ſanguinis eduſtione cum tuſſi fieri. Quod ſic deprehendes: ſi enim præcedenti tempore per modica interualla ſigillatim, & cum tuſſi exſpuerit quis ſanguinem, & ſequentibus diebus neque caſus, neque alia externa violenta cauſa acciderit, & tamen copioſa ſanguinis eruptio prodierit, magnam eroſionem factam eſſe euidentiffimum eſt. Porro ſi ſanguis qui educitur ſpumofus ſit & ſubalbidus, atque ex interuallo prodierit cum tuſſi, abſque tamen dolore, firmiſſimum ſignum eduſtionis ex pulmone eſt. Si vero pituitoſa cum leuiore tuſſi aut excreatione reiiciantur, ex aſpera arteria prodiſſe ſcito. Si ater ſanguis, & in grumum concretus cum tuſſi etiam & dolore partis laborantis reiicitur, ex thoſace eduſtum eſſe monſtrat, per pulmonem aut aſperam arteriam facta trãſlatione. Si vero ex locis qui circa fauces ſunt per palatum ſanguis feratur, cum excreatione excernitur. Sin ex aliquo locis oris aut gingiuarum, ſimpliciter exſpuatur. Accidit autem nonnunquam per palatum ſanguinem educi, propter hirudinem deuorata, & alicui indidem particulæ adhæreſcentem: id quod localis dolor qui conceſcit laborantem particulam, & ſanguis ipſe qui tenuis eſt & ſerofus, oſtendunt. Porro ſi a capite ſanguis deſertur, titillatio palati aderit, & frequens excreatione, ac tuſſis nonnunquam, ſanguine nimirum ad guttur delapſo, iterumque ſurſum elato. Ad tuſſim itaque irritantur, & tamen non valde tuſſiunt. Habet & ſuam figuram ſanguis a capite delapſus. Eſt enim non adeo paucus, colore niger, leuis, cum pure aut pituita mixtus, & cum excreatione ſtatim ſe in linguam infert rotundus, facileque per ſputum reiicitur. Præterea magna ex parte capitis dolor, aut grauitas præcedit. Si ex ſtomacho eduſtio fiet, non magna ſanguinis eruptio continget: graciles enim ſtomachi venæ exſiſtunt. Si vero ex iecore ac liene ſanguis in ventriculum deferatur, & ex eo demum vomitione eiiciatur, aderit in dextro aut ſiniſtro latere tumor. Quod ad victus rationem attinet, vtendum cibus qui moderatam quandam obturandi vim, & leuem adſtrictionem obtineant: vt ſunt oryza, ptifana, alica, aliique ſimiles frumentacei cibi, quibus ſuccus mali cotonei, aut granati, aut pyrorum adiectus ſit. Ex herbis oxalis, portulaca, lactuca, & ſpanachia. Ex carnibus ec nueniunt columbæ ſylueſtres, turdi, perdices, gallinarum, phaſianorum, turdorum, ſi cum omphacio ſeu ſucco vuz acerbæ, & rhoe obſoniorum coquantur. Vtendum quoque cotoneis, pyris, pomis adſtringentibus, moris rubi, & aliis ſupra in capite *De ſanguinis narium profluuium* memoratis. Bibendum vinum craſſum, rubèum, aut ſi febris adſit, pro ea aqua, in qua chalybs ignitus exſtinctus eſt. Aer ad frigidum & ſiccum declinet. Somnus ſit mediocris, caputque cubantis ſublime ſit, poſſimum ex ſpirandi instrumentis ſanguis profluat. Aluus ſit aperta, & quotidie æger alui excrementa deſiciat. Cauendum a clamore, frequenti locutione, omni corporis motu, & iracundia. Curandi ratio pro cauſarum diuerſitate variatur. Si enim a capite fertur ſanguis, iſque exiguus, ſimplicior & exigua ſufficit curatio. Adſtringentia enim per collutiones palato adhibita frigida, curationem perficient. Hæc autem ex capite *De columella phlegmone* petenda erunt. A calidis autem & rarefacientibus collutionibus abſtinentum, quod ab iis plus ſanguinis erumpat. Quod ſi multum a capite deſluerit, euacuatio ne opus erit. Quare citius per nares, aut per venæ alicuius inſiſionem vacuare oportet, ne per negligentiam conſuetudo fiat ſanguini in hos locos delabendi. Qui ob deſtillationem ſanguinem exſpuunt, iis protinus in principio venam humeralem, aut mediam, incidere oportet, niſi vehementer acris humor deſtillauerit, ac pro virium modo ſanguinem detrahare. Dein acri ſimul clyſtere adhibito, & vacuata aluo, ac frictis quam plurimum manibus, brachiis & cruribus per medicamentum calefactorium ac extenuatorium, extremæ eorum partes deligentur. Poſtea ſi vitium diutius durauerit, raſo capiti medicamentum, cui exſiccandi & diſcutiendi facultas ineſt, quale eſt quod ex ſimo ſylueſtrium columbarum conſtat, imponendum: & poſt trium horarum interuallum in balneum deducito, ſic vt caput nulla pinguedine inungatur. Poſtea vero mediocriter conſectos, ſorbitionibus auſteris, alito, deinde dormituris theriacis antidorum exhibeto. Sequenti die omnibus corporis partibus, capite tantum excepto, perfrictis, inquiete aduerſato, ruſuſq; ad veſperâ theriacen exhibeto. Quod ſi ex iis deſtillatio non ſiſtatur, tertia die mane mel parum coſum

Victus ratio.

Curatio. Sanguis a capite deſtillantis.

Curatio eorum qui ob deſtillationem ſanguinem exſpuunt.

A præbeto, quiescereque finito, ac totum corpus defricato. Quarto die post acceptam theriacen, rursus plurimum mellis præbeto, capitique medicamentum ex fimo columbino imposito. Quod si vitium diutius durauerit, cucurbitula occipitio affigenda est: Postremum ea, quæ humores, qui in pulmonem defluerunt, expurgare valent, propinato. At si acris admodum fuerit humor, qui destillat ex capite, sanguinis detractio cauere debet, ac purgatione potius utendum, alimentisque & præsidis quæ infra dicemus, & supra ubi *De destillatione* egimus, comprehensa sunt, utendum. Qui ex pulmone sanguinem reiciunt, ruptis scilicet in eo venis aut earundem patetibus oris, iis præcipiendum in primis, ne respirent valde, sonumque edant: & ut parum loquantur, & fere in totum sileant. Decumbant in locis acri expositis, lectoque

Curatio eorum qui ex pulmone sanguinem reiciunt.

B immobili ac figura sublimi. His etiam statim venam incidere oportet in gibbero internam, ac sanguinis detractorem bis aut ter reiterare paulatim reuellendi gratia. Non enim euacuatione copiosa indigent tales, nimirum a vitioso ipso vacuati. In hunc usum, hoc est, ut ad contrarium auersio fiat, frictionibus extremitatum, & earundem cum laxis nitcolis constrictione, & ligatione utendum. His sic peractis, primum quidem poscam dilutam & tepidam bibendam exhibere conuenit, ut si quis sanguinis grumus in viscere hæreat, inde dissolutus eiciatur: neque quicquam obstat bis & ter in tribus horis hanc potionem iterare. Posthæc medicamenta adstringentia, & meatus obstruendi vim habentia, emplastica vocant, intra & extra corpus adhibenda. Per os quidem adsumta proficiunt porulaca comesta, quæ nunquam succus eius bibitus efficacior sit: succus *polygoni*, una acerba, decoctum *rhois*, *galla*, *caliculatorum glandium*, *radicis rubi*, *balaustiorum seminis oxylapathi*, *radicis equiseti*, & aliorum quæ in capite *De sanguinis ex naribus profluvio comprehensa sunt*. Præstantiora prædictis sunt terra lemnia, & lapis hæmatitis in tenuissimum pollinem detritus, & cum succo mali punici, vel *polygoni* sumtus. Pondus autem lapidis hæmatitis erit scrupulus unus. Item pastilli de terra lemnia, de succino triti & cum plantaginis decocto exhibiti. Inter composita vltus esse poterit huius ecligmatos, quod habet: Sacchari rosacei veteris, succi medicati eribes, utriusque vnc. vnam; Diatragacanthæ, diacotoneon simplicis, utriusque vnciam dimidiam. Pulueris coralliorum, lapidis hæmatitis, terra lemnia singulorum scrupulos duos. Boli armenii, drach. vnam. Sanguinis draconis, drachmam dimidiam. Balaustiorum, drachmam vnam. Thuris, radicis sym-

Ecligma.

D phylli maioris, utriusque drachmam vnam & dimidiam. Serapii myrtini quantum ad excipiendum satis erit, fiat ecligma. Extrinsecus thorax ex vino adstringente, oleisque rosaceo, cotoneorum, aut myrrino irrigandus. Si vero multa sanguinis eruptio fiat, potissimum ætate, ac citra tussim eius reiectiones contingant, neque æger debilis sit, sed robustus ac carnosus, acetum pro vino admouendum est, spongiis exceptum. Proderit etiam dictis oleis adicere bolum armenium, terram lemniam, corallia, & similia, atque cum cera componere vnguentum, quale infra libro 3. capite *De appetitu canino* describemus. Cataplasma quoque ex palmulis, acacia, symphyti radice, cortice mali granati, & lentium farina paratum, admouendum. Nec minus confert quod ex carnibus malorum punicorum, thure, coralleis rubcis balaustis, bolo armenio, terra lemnia & eiusmodi componitur ceratum.

E Maximum enim hoc est, & cui animum diligenter attendere oportet, ut mox facta vasorum ruptura, & dum adhuc cruentum est vulnus concreseat, priusquam scilicet phlegmone apprehendat. Nam si phlegmone præuenerit, parum spei est ad huiusmodi vulneris conglutinationem, quippe quæ se in multos dies extendit. Eluere enim oportet tum pus, tum seorsum sanguinem ipsius vlceris, posteaquam phlegmone fuerit soluta. Reliquam autem curationem, quemadmodum in tabidis, fieri oportet. Hic tamen monendus mihi lector erit, ne extrinsecus profluenti particulæ admo-ueantur tum adstringentia, tum citra adstrictionem frigida, nisi postquam in alia prius auersio facta fuerit, alias enim sanguinem intro compellunt, & venas quæ in alto sunt implent. Quare prius semper ad contraria reuellendum, ac subinde adstringentia ex-

Præceptum diligenter obseruandum.

F trinsecus imponenda. Qui ab erosione sanguinem exspuunt, iis primum quæ acres humores in pulmonem destillantes purgare possunt medicamenta, propinanda, veluti antea quoque, & in capite *De destillatione* dictum est. Deinceps ea, quæ alterare & in cassare acres tenuesque humores, atque adeo sistere destillationem valent: ut est serapium violaceum, rosaceum, myrtinum, hydromelon, miuam cotoneorum vocant, & iis similia.

Curatio eorum qui ab erosione sanguinem exspuunt.

90 Operum Leonhard Fuchsi Pars. III.

Curatio eo-
rum qui vo-
munt san-
guinem.

In eum vsum interdum serapium e *papauere*, & alia somnifera, & stuporem quasi in-
ducentia adhibentur. Destillatione desinente, erosæ partes cibis boni succi, & medi-
camentis carnem generantibus reficiantur. Porro qui vomunt sanguinem, ea victus
& curandi ratione quæ antea commemorata est vtantur. Hoc est, vena in gibbero su-
perior, quam *humeralem* vocant, illis statim incidenda est, si ex iecore: sin ex liene in
ventriculum feratur sanguis, ea ex Aetio *Archigene teste*, quæ inter paruum & annula-
rem digitum in sinistra manu est. Ceterum & cibos & potus adstringentes sumere o-
portet, eos qui per ventriculum sanguinem reiciunt, non tamen vehementer & actu
frigidos. Porro ne id silentio transeam, præstat perpetuo lienarem venam, si incidi
& inueniri potest, aperire, quam eam quæ est in summa manu, ob causam a Galeno
capite 14. libri de curandi ratione per sanguinis missionem expositam. Quippe facile curan-
tur, si auxilia quæ bibuntur, particulis ipsis sanguinem fundentibus plane applicentur.
Atqui sanguine in ventriculo instar grumi concreto, coagulum potandum est, maxi-
me leporinum, vel thymbra, seu satureia cum aceto, vel ex aloe sic affecti vacuari de-
bent. Qui per palatum sanguinem excreant, gargarizabunt ex adstringentibus: fron-
tique & capiti admovebuntur ea, quæ sanguinem ex naribus fundentibus accommo-
dantur. Porro postquam omnia, vt postulat ratio, peracta fuerint, & sanguinis fluor
substituerit, vires ipsis reficiendæ sunt, roburque adhibendum. In primis vero cau-
endus frequens vsus balnei, vini potio, ira, & Venus.

De empyemate. C A P. XI.

Empyema.
Suppura-
tio.
Empyici.
Purulent.
Causæ.

E *Μπύημα* Græcis *purulentam excreationem & purulentiam* significat. Latini *suppurationem*
vocant. Hinc *ἐμπύημα*, hoc est *suppurati & purulenti*, qui hoc vitio laborant, &
quibus in thorace vel inter thoracem & pulmonem pus continetur, appellatur. Fit,
quando abscessus in membrana intrinsecus succingente costas, aut aliqua alia thora-
cis membrana factus, acruatim rumpitur, & in vacuum thoracis locum, qui est inter
pulmonem & succingentem costas membranam effunditur. Accidit interdum pro-
pter sanguinis eruptionem, vlcere ad cicatricem non perducto. Interim etiam pro-
pter confluxum ex capite, & aliis superioribus partibus in thoracem manātem. Quod
in angina sæpe contingere solet, iuxta hoc Hippocraticum: *Quicumque ab angina libe-
rantur, iis ad pulmonem vertitur, & in septem diebus pereunt: si vero has effugerint, suppurantur.*
Suppuratos autem hoc pacto cognosces. Grauitas in profundo thoracis adest, tussis
valida siccaque cum dolore, aliquando etiam cum humiditate, ob quā reuelari quo-
que videntur. Febres per initia ipsis accidunt languidæ, inordinatæ, & ad iudican-
dum difficiles. Postquam autem ruptura abscessus iam appetit, vehementius cum
quodā horrore febricitant, & in sermone conturbantur, offensi inspiratione. Rupto
abscessu aliquid in profundo thorace transfluere apparet, iuxta multiplices reclina-
tionis permutationes & maxime quum ab vno latere in alterum decumbunt, cum sa-
ne multitudo puris manifestatur, & fluctuationes cuiusdā sonitus sæpe sensibilibus in
reclinationibus ipsorum auditur. Pus etiam educitur nunc purum, nunc fæculentum.
Erumpunt autem suppurationes aliquæ quidem sursum versus in vacuum videlicet
thoracis locum: & hæ periculosiores existunt. Nisi enim quam citissime pus per spu-
tum reiciatur, tabidi fiunt, pulmone hinc exulcerationem contrahente. Aliquæ ve-
ro deorsum in aluum, & intestina, ac vesicam transfunduntur, per vasa quædā trans-
missione ad eas partes facta. Quæ qualia sunt, Gal. lib. 6. *De laborantibus locis, cap. 4.* osten-
dit. Semper autem hectica febris laborant, quoad sursum omnia fuerinteducta. Qui
suppuratione laborant aerem inhabitent siccum. Cibis vtantur boni succi, & conco-
ctu facillimis: *ptisana cremore iure gallorum, carnibus gallina, pullorum gallinaceorum, perdi-
cum, phasianorum, auium montazarum, turdorum scilicet. Iure quoque cicerum cum herbis, hyssopo,
& petroselino.* Iura enim vlcera magis detergent, ventremque lubricum reddunt. Po-
tus sit *aqua mulsa, ac vinum album & tenue*. Porro nisi in iis qui suppuratione laborant
summa diligentia adhibeatur, protinus puris collectio tabem accersit, pulmone, vlce-
rationem contrahente. Primum itaq; suppurationis concoctio adiuvanda fomentis a-
quæ temperate calidæ per spongas, cataplasmatibus & emplastris, præsertim tardantibus
suppurationibus, ex *hordei, fenograci, & seminis lini farinis, caricis, columbarum fimo,
camamelis floribus, malua, althea, & resina modica paratis*. Cerata etiam ex *butyro, iride, baccia
lauri*

s. Aph. 101.

Signa.

Victus.

Curatio.

A lauri & ruta composita, & alia quæ collectionem maturare & discutere possunt, qualia multa in capite De asthmate dicta sunt, imponenda. Quod si vitium non discutitur, quæ abscissum rumpunt admonenda. Rupturam autem abscessus, promouet in latus sanum decubitus, salforum esus, & catapotia illa dormituro data, quæ habent: *Pulueris hierapicre Galeni, unciam unam. Pulpæ colocynthidis scrup. unum. Cum succo absinthii quod satis est ad excipiendum: formetur pilula*, quarum vna aut altera teneatur in ore. Hac enim ratione accidit, ut æger crebro exspuere conetur, atq; adeo nimium exspuendo abscessus rumpitur. Non est tamen quod catapotia illa deuorent, & in ventriculū assumant. Ruptione facta, diligenter erit animaduertendum, quo pus prorepat, adiuuare enim eius excretionem oportet. Si enim ad aluum proreptet, magis mollientia sunt quæ offeruntur: si vero ad vesicam serpat, ea quæ vrinam cient magis adhibenda. Si vero per tussim puris expurgatio fiat, nihil conuenientius aut familiari⁹ exhiberi potest, quam ptisana optimo melle permixta. Proderunt etiam abstergentia, quæ partim in capite De pleuritide dicta sunt, partim etiam statim in capite De tabe dicuntur. Ceterum quæ vrinas cient, cibus eommode admiscantur, vnde cunq; tandem puris excretio contingat. Ad puris vero expurgationem mirifice utilis est aqua mulsa cum iride, & plurima glycyrrhiza decocta. Radicis enim dulcis succus commanducatus pdest. Conuenit deniq; decoctum hyssopi, iridis, marrubii & similium, quæ ex capite De asthmate petenda veniunt. Ceterum quum ruptio vix periculo careat, ne scilicet æger a copia puris suffocetur, aut copiosum in thorace contentum tabem accersat, optimum erit, iuxta

C Hippocratis consilium 7. aph. 45. ut suppurati in latere secentur, vel vrantur, ut eo aperto vniuersum pus effluere possit. Quare si vniuersum pus expurgari non posse metus est, vel sectio, vel vtitio tentanda erit. Reliqua quæ ad curationem suppurationis necessaria esse videntur, in sequenti capite commemorabimus.

De tabe. C A P. XII.

Tabes Græce, tabes autem latine, proprie est exulceratio pulmonis ad sanguinis sputa confluens, quam Athenienses priuatim, ut sectio. 7. apho. comment. 16. testis est Galeus, phlegmonē minant. Fit magna ex parte, ob acris & erodentis humoris ex capite in pulmonem defluxum. Interdum etiam, quum sanguinis aut puris eruptio in suppuratis, pleuriticis, & peripneumonicis cohibetur. Qui hoc vitio laborant, agnoscuntur toti⁹ corporis & carniū extenuatione. Nares etiā iis acutæ, collapsa tēpora, oculi cōcaui, scapulæq; instar alarū auium pminēt: hinc Hippocrati aliiq; Græcis *πνευμονία* appellantur. Præterea tussunt, ac febre hectica febriunt, difficulter spirant, genæ liuescunt, vagues curuantur, pallidiq; apparent. Vitio vincente venter turbatur, sitis ipsos magis cōficit, capilli defluunt: & id quod p sputum reiicitur, vehementer foedi odoris est. Quæ singula Hippocrates quoq; iis verbis innuere voluit. *Atabe*, inquit, *inquepto profluuiū alui superueniēte letale*. Et iterū: *Quibus cunq; tabe laborantib. capilli a cap. defluunt, iis alui profluuiū superueniēte, moriūtur*. Et rursus: *Qui tabe molestatū, si sputū quod extussunt carbo. iniectū graueolet, & capilli a capite defluunt, letale*. Porro vlcera pulmonis difficillime curantur, ppter ea quod citra tussim non repurgantur. Tussientib. autē vl⁹ dirumpitur ac laceratur, atq;

E malum quasi quodam circuitu reuertitur. Pulmo etiam inter viscera ppter respirationem in ppetuo est motu, & tussiendo quoq; lancinatur. Vlcerata vero quæ sananda sunt quietē vtiq; requirunt. Medicamentorum pterea vires ad vl⁹, priusquam in vētriculū & iecinore pmutentur, puenire nō possunt. Vt cunq; autē ppter causas nunc cōmemoratas difficilis sit curatio, tamen nihilomin⁹ conandum, ut vlceratio illa curetur. In initio itaq; tabidis conueniens victus ratio præscribenda, in eum sane modum. Acrem ficcum, in calore vero & frigore temperatum, inhabitet. Cibus eorum sit ptisana hordei, lac amygdalarum, oua sorbilia, carnes auium mōtararum, pdicum, phasianorum, merularum, turdorum, gallinarum, caporum, vitulorum, hœdiqu; lactantis. Pisces deniq; squamati, saxatiles, potissimū vero cancri fluuiatiles cum lacte porati, aut cocti in cibo sumti. Ceterum lac inter omnia cibaria tabidis optimū, serosa n. sua substantiā vlcerata repurgat, caseosa glutinat, primum quidem humanum, dein asininum & caprinum: quod ex mammis, si fieri potest, sugatur: aut statim mulctum dum adhuc calet bibatur, quemadmodum copiose libro 5. Ther. meth. Galenus docet. Cauendum tamen vitice, ne statim a lactis vsu alium cibum (potissimum autem vinum) sumant: quod alias in

Rumpentia abscessum Carapotia.

Pus expurgantia.

Phlegmonē Tabes Causæ.

Signa.

πνευμονία.

5. Aph. 14.

5. Aph. 12.

5. Aph. 11. Curatio difficilis quæ.

Vitus.

92 Operum Leonhard. Fuchsi Pars III.

ventriculo prorsus corrumpatur. Quod si vero impense admodum febricitant, putrida maxime febre, lactis usus haud conducet. Inter fructus prosunt vix passæ, amygdala dulcia, nuxes pineæ, ficus, palmulæ & pistacia. Exercitia & motus vehementes deui-
tent. Suauiter autem ante cibū deambulare, haud incommodabit, præsertim ubi fe-
bris remiserit. A cibo penitus quiescant. Somno vtantur nocturno, & mediocri. Fugi-
ant irā, tristitiam, vigilias immodicas, famem, sitim, coitum, laconitū, & quicquid cor-
pus exinanire potest. Por^o sit vinum aquosum & tenue: aut si vehemens est febris, aqua

Hippocras: in parum cinnamomi est decoctum, aut bibat potionem quæ a barbaris medicis Hip-
pocras nominatur. Cuius quidē compositionem in libr. i. cap. De resolutione, monstraui-
mus. Quod si vitium a defluxu humoris acris ex capite oriatur, curandi ratio a destilla-

Curatio. tionis amolitione inchoanda erit, quam quidem supra peculiari capite docuimus. In
præsentia igitur quomodo pulmonis exulceratio curanda sit, monstrabimus. In eius
itaq; curatione in primis quæ abstergerendi facultate prædita sunt, & quæ vt facile pus
sursum feratur, efficiunt, exhibenda erunt. In quem vsum potissimum hydromeli con-
uenit, & decoctum hordei cum saccharo & melle. Itē hyssopi, iridis, caricarum, adianti, & similium.
Serapium de hyssopo, marrubio, & glycyrrhiza. Si accelierit febris, prædictis semina quatuor
frigida cōmiscenda erunt. Extrinsecus vero admoventia emplastra & cataplasinata ex
semine lini, fenogreci, & aliis in c. De empyemate commemoratis. Ex capite quoq; De asthma

Saccharum multa remedia ad præsentem vsum conducentia, petenda erunt. Absterfo & a pure
rosaceum. purgato pulmone, ea quæ vlcus glutinare possunt, medicamenta sunt exhibenda. In
hunc vsum ab omnib; fere medicis cōmendatur saccharum rosaceum: hoc n. non solum
glutinandi, verum etiam abstergerendi facultatem obtrinet. Abstergit autē magis quod
recens est, glutinat vero quod antiquius. Mirifice etiam confert bolus armenius, sanguis
draconis, succinum, corallia, semen portulacæ, & similia, quibus abstergerendi & glutinandi facultas
inest. Laudatur vnice symphyti maioris radix saccharo condita. Item cum carnibus cocta. Cōdu-
cunt quoq; ecligmata de pulmone vulpis, & pino saccharum symphyti maioris & adianti. Exi-
is igitur tale parabitur medicamentum, quod habet: Sacchari symphyti maioris & adian-
ti, vtriusq; unciam dimidiam. Sacchari rosei, vnc. vna. Ecligmatis e pulmone vulpis drach. vna
& dimidiam. Ecligmatis e pino drach. duas. Specierū diatragacanthæ drach. 3. Boli armenii, drach.
vnā & dimidiam. Terra lemnia, radicis symphyti maioris, ana. scrup. duos. Serapii de papauere,
quantum ad ea excipienda satis est: formetur ecligma. Plurimum quoq; adiumenta afferet is

Pulvis. pulvis quotidie exhibitus, qui accipit: Seminis papaueris albi, drach. dimidiam. Gummi arabici
vocati, amyli, tragacanthæ sing. drach. i. & dimid. Seminum cucumeris, citrulli, cucurbitæ, melonū,
cotoneorum singulorum drach. tres & dimidiam. Eboris vsti succi glycyrrhizæ, vtriusq; drach. v-
nam & dimidiam. Penidiorum equali omnium pondere: fingatur pulvis, de quo mane dentur
quotidie, drach. duæ, cum serapio de papauere, aut rosaceo. Sunt qui adiiciunt cinerum can-
crorum fluuiialium, & coralli albi vsti. sing. drach. vnā & dimidiam. Eo præterea tempore
quo cicatrix obducitur, extrinsecus thoraci oleum myrtinum, aut rosaceū inungendum,
adiectis interdum rhoe obsoniorū, sumachii officina vocant, hypocisthide, malicorio, acacia, gal-
la, & similibus. Postremum corpus extenuatum iusta & conuenienti victus ratione refi-
ciendum omnibus iis cibis, qui boni sui ci sunt, ac facile concoquuntur, & plurimum E-

Morsuli re- morsuli re-
fectorii. fectorii. pi, vnc. i. Testiculorū galli, nucum pinearū, pistaciōrū, amygdalarum dulciū singul. vnc. dimidiam.
Specierum antidoti de gemmis drach. dimidiā. Specierum diarrhodon abbatis, dianthon, odorati
rosei singul. scrupul. vnu. Santalorū alborū, cinnamomi selecti, vtriusque drach. dimid. Maceris,
scrupul. vnu. Sacchari candidissimi, libr. vna, diluti in liquoris stillaticii buglossi & rosarū: fingan-
tur morsuli. De quibus quotidie vnus fumatur. Thorax etiam illinatur butyro, & oleo
amygdalarum dulcium.

De cordis palpitatione. C A P. XIII.

Cordis pal- Π *ἡ καρδία κλονέται* Græcis cordis palpitatio & tremor dicitur, motus est cordis deprauatus, nimi-
pitatio. rum quum præter naturam dilatatur aut constringitur. Recentiores medici perperam
καρδιακὴ νόσος *καρδιακὴ νόσος* cardiacam nominant. *καρδιακὴ νόσος* enim ad stomachum, quem veteres olim *καρδία*, vt multis in
causæ. locis significauit Galen. vocarunt, pertinet, eiusque plane erosio seu morsus existit, vt alibi
quoq; copiosius monstrauius. Fit ab omni eo quod præter naturam cor affigere po-
test, vt est quæuis intemperies, aut humoris vel flat^{us} multitudo in ambiente cor mēbrana

con-

A contenta, cor ne attollatur impediēte, aut tumor præter naturam, & aliâ quæ a Galeno libro 5. *De affectu loci, capite 1.* recensentur. Ut valde ineptiant, qui cordis palpitatiōnem a calida intemperie nasci non posse putant, quum tamen, *Galeno etiam sect. 4. aphor. comment. 65. auctore*, ab immenso incendio hæc ipsa fieri possit. Et Paulus lib. 3. c. 34. a sanguinis feruore hanc procreari docet. In summa quicquid cordis facultatem deiecit, hoc palpitatiōnem eiusdem efficit. Deiecit autem eam omnis intemperies, igitur etiam calida. Nec obstat, quod Galenus in libro de palp. & de sympt. causis 2. hanc a frigida tantum causa fieri scribat. Nam in illis locis de palpitatiōne, quæ in externis partibus, & musculis, nō in corde, excitatur, loqui illum constat. D. gnoscutur facile de sermonibus ægri, palpitatiōne hanc euidenter sentientis; & ex pulsū. In calida intemperie febris, & pulsus velox atq; magnus existit. In frigida contra. Si humoris copia in pericardio contenta palpitatiōnem accerserit, pulsus est mollis & languidus. Si a flatibus sit, leuissima corporis motione excitatur. Viæ ratio, p. causarum vitium efficientium diuersitate varie instituitur. Siquidem in calida intemperie aer esse debet mediocriter frigidus; in frigida vero, modice calidus. Quare ex capitulis, quæ præmissimus, hæc ipsa facile constitui a quouis leuiter admodum perito potest. In vniuersum autē vitādum quicquid spiritum vitale resoluit ac cōturbat: vt est nimis æstus, ira, fames, vigilia, coitus, frigus immodicum, cibi mali succi. Si multitudo humoris in ambiente cor membrana cōtenta palpitatiōne pteauerit, tota dicta sit extenuatoria. Potus in calida intemperie sit vinum aquosum & tenue, aut zulapium violaceum, vel rosaceū, aut buglossi decoctū. In frigida vinum meraci⁹ bibatur. Qui ob calidam intemperie cordi palpitatiōne corripiuntur iis p. frigida medicamenta, quæ intemperiem calidam corrigere, & robur cordi adiacere possunt, succurrēdū. Talia vero ex simplicibus sunt *rosa, viola flores nymphaea, santali, corallia, & iis similia*, de quibus in libro nostro *De comp. med.* etiam diximus. E compositis est *diarmargari, diarrhodon abbatii saccharū rosaceum, violaceum, buglossaceum & earundem stirpium succi & serapia*. Ex iam dictis itaq; potiones, antidota, & m. sili p. cuiusq; arbitrio componi possunt. Extrinsecus ad mouenda vnguenta, emplastra, maxime vero epithemata vocata, sacculi, & alia quæcūq; calidam cordis intemperiem alterare valent. In primis autem inter vnguenta hoc conuenit, q. habet: *Oleorū rosacei, violacei, nymphaea, sing. drach. 2. Coralliorū rubeorū, santalorū purpureorum, rosarū purpurearū sing. scr. 1. Cera alba quod satis est fiat vnguentum*, quo cordis regio, & spina dorsi inungatur. Inter epithemata hoc potissimum cordi imponatur, quod accipit: *Liquoris stillatici rosarū, oxalidis, & buglossi sing. unc. tres. Liquoris stillatici melissophylli, unc. vnam. Specierum antidoti cordialis vocati, drach. vnam. Santalorum purpureorum, coralliorum rubeorum, vtriusque drach. dimidiam. Succi semperuiui, scrup. vnum. Croci grana quatuor. Commixtis omnibus fiat epithema*. In genere sacculorum is potissimum cōpetet, qui habet: *Florum buglossi, violarū, rosarū purpurearū, sing. manipulum dimidium. Santalorum vniū sing. drach. vnam. Coralliorum rubeorum & alborum singul. drach. vnam & dimidiam. Vniū, scrupul. vnum. Contusa in sericum demittantur, formeturque sacculus*. Ceterum qui frigida cordis intemperie laborant, iis inter simplicia medicamenta præsum *ambar, moschus, crocus, lignum aloes, styrax, garyophilli, macer, zedoaria, melissophyllum, & eiusmodi*. In genere compositorum, *antidotus diambar, dianthon, aromatici rosacei, pleresarchoticum, & similes*. Ex quibus sane varia remedium genera parari possunt, haud secus quam in calida cordis fecimus intemperie. Siquidem vnguenta in eum componentur modum: *Oleorum liliacei, & spica, & de croco sing. drachmas duas & dimidiam. Gallia moschatæ garyophyllorum, vtriusque scrupulum vnum. Ligni aloes, scrupul. dimidium. Maceris, scrup. vnum. Croci, grana tria. Cera quod satis est, fiat vnguentum*. Epithematū hæc forma erit: *Liquorū stillaticiorum melissophylli, maiorana, buglossi, singul. unc. quatuor. Specierum antidoti diambar, diamoschi, vtriusque drachmam dimidiam. Maceris, ligni alpes, vtriusque scrup. vnum. Ambar granum vnum. Vini optimi, unc. vnam. Commixtis singulis, formetur epithema*. Sacculorum hæc esto forma: *Florum melissophylli, buglossi, vtriusq; manipulum vnu & dimidiū. Cinnamomi selecti garyophyllorū, maceris, sing. drach. vnam. Ligni aloes scrup. vnum. Corticum mali citrii, drach. vnam & dimidiam. Croci, scr. vnum. Ambar granum vnum. Contusis omnibus fiat e serico sacculus cordi imponendus*. Quod si ab humore aliquo in pericardio contento palpitatio fiat, extenuanti viæ ratione, & venæ sectione quæ in gibbero fit, *Galeno li. 3. De laborant. loc. 1. teste*, curatur. Siquidem is

Signa.

Viæ

Curatio calidæ cordis intemperie.

Vnguentum

Epithema

Sacculus

Curatio frigidæ cordis intemperie

Vnguentum

Epithema

Sacculus

Curatio palpitatiōnis cordis ab humore

ibidem sic scriptum reliquit: *Palpitatio cordis pluribus integra valetudine degentibus, tum a- A*
dolecentibus, tum adultis, subito sine alio manifesto symptomate euenire visa est; atque omnes
ex sanguinis detractio inuit. Hoc enim pacto plerique perfecte ab hoc symptomate liberati
sunt: praesertim qui utebantur & victu, & medicamentis, quibus esset extenuandi facultas. Hæc
ille. Secunda vero est vena in gibbero interior, aut media: atque deinde vnguen-
ta, epithemata, & sacculi, eiusque generis alia medicamenta, quibus extenuandi &
corroborandi cordis inest facultas, extrinsecus & intra corpus adhibenda. Si vitium
a flatibus sit, exhibenda erunt ea crebro quæ pituitam purgant. Item ea, quæ flatus
discutiunt, qualia sunt, quæ infra in capite de ventriculi inflatione recensentur. Quo-
rum omnium priuatim exempla proferre superuacaneum putamus, quam facile ad-
modum sit cuius ex iam dictis, & alibi commemoratis, componere omnis generis ad
institutum suum facientia medicamenta.

De syncope. C. A. P. XIII.

Syncope.

Causæ.

Notæ.

Syncope
cordis.Syncope sto-
machica.1. Prog. 10.
Curatio.
Eius quæ
propter im-
modicam in-
anitionem
accidit.

SYNCOPE, Galeno libro 12. Ther. meth. capite 5. auctore, nihil aliud est nisi *præcepsum virium*
lapsus. Omnes igitur in syncope vires subito labuntur. Differt itaque a Lipothymia, quæ syncope mitior est, *ut alibi supra ostendimus.* Accidit quemadmodum etiam
 lipothymia, ob plurimam sanguinis excretionem, immodicam ventris inanitionem
 motum vehementem, dolorem ingentem, vigilias multas, sudores copiosos, omnes-
 que alias immoderatas vacuationes, timorem, tectorem, & alias huius generis animi
 perturbationes. Ob crudorum denique humorum in ore ventriculi redundantiam, phlegmo-
 nis magnitudinem, & vitiosos tenues acresque in ore ventriculi mordicationes & excitā-
 tes humores, aut quæ foetide inspirationem. Cognoscitur syncope iis indicibus. Pulsus est
 rarus & obscurus, extremarum partium frigiditas, sudor circa faciem, nitoris cutis quæ in
 ea existit ablatio, & totius corporis quasi resolutio. Ad hæc accedunt desperatio, ani-
 mi angor, & corporis iactatio. Porro euenit interdum syncope cordis vitio, ubi se ipsa
 vehementer intemperatum est: interdum etiā stomachi, siue oris ventriculi, in eo nimirum
 redundantibus & congestis aut crudis, aut acerbis & erodentibus humoribus, *ut dictum est*
 Eius generis syncope, stomachica nominatur. Qui propter humorum crudorum in ore
 ventriculi copiam syncope incidunt, his hypochondria inflata sunt, & totum corpus
 ampliore mole, quā pro naturæ modo cernitur, tum eiusdem coloris ad albidius, quā
 pro naturali habitu sit, est mutatus: & in summa, corpus aqua inter cutem laborantibus
 simile. Nonnullis etiam ad nigrius, aut liuidius, quos quidem plumbei palloris appel-
 lamus, accedit. Pulsus tamen arteriarum omnibus minores sunt, præterea obscuro & in-
 quales. Qui vero propter acrimiam humorum redundantiam syncope corripiuntur, ii
 assiduas in ore ventriculi vellicationes ac mordicationes sentiunt. Qui ob tenues suc-
 cos, ocysissime exhalantes syncope corripiuntur, in iis mortifera illa species in facie ce-
 leriter apparet, nasus acutus, oculi caui, & alia quæ deinceps per Hippocratem sunt ad-
 scripta. Reliquæ syncope causæ ex adstantium sermonibus nullo negotio cognoscuntur.
 Curandi ratione pro causarum diuersitate variari, nemo est qui nesciat. Si n. propter
 sanguinis excretionem, aut aliam immodicam & repentinam euacuationem syncope inua-
 dit, frigida faciem aspergere oportet, aut liquore rosarum stillaticio, qui in hoc casu
 mirificam quandam vim obrinet, moschato, se haberi potest: si minus solus stillaticius
 rosarum liquor, aut cum aceto permixtus. In utriusque defectu, a frigida. Ab alto autem demit-
 tatur in faciem, ut sopiti spiritus excitetur: & si qui adhuc in partibus externis remanserunt,
 resolui prohibeantur. Atque hæc potissimum facienda sit ab æstu, aut febris incendio,
 aut alia causa calida syncope fiat, non autem a frigore. Extremæ corporis partes, ut cru-
 ra & manus, vinctis vehementer sunt cōstringendæ, ac linteis modice asperis perfricandæ.
 Crura quidem, si supra eruptio fiat: manus vero, si infra. Cucurbitulæ quoque leues
 per partium, e quibus vacuatio procedit, aut sanguis erumpit, diuersitate affigendæ. Os denique
 diducendum, cunei aut digitorum, aut alterius rei immittunt: auditorius vero meatus
 & nares cōprimendæ, ut inspiratus aer interiora petens, spiritum reficere, ac excitare
 queat. Confestim etiā variis odoramentis animum reuocare cōuenit. Nihil n. est (Hip-
 pocrate in libello De aliment. teste) quod vires odore citius reuocet. Prodest itaque pullos galli-
 naceos assos, ac per medium scissos atque discerptos, naribus ægrotantium ad mouere.
 Item rosas, violas, mala cotonea, citria, & eiusmodi. Postea iusculis, & aliis sorbitionibus
 conco-

A concoctu facillimis, alendus æger. Vinū huic ppinandum tenuē & dilutum. Aer cubi-
culi sit frigidus, cubiculum vero ipsum nō valde lucidum. Stragula eis incubentia tol-
latur: operaimenta vero, quib. conteguntur, mollia sint. Pavimentum irroretur, ac foli-
is conſternatur myrthi, vitis, quercus; tubi, atq; iſis etiam roſis. In immodico ſudore
exſudantib. partib. oleum myrtynum, roſaceum, & cotoneorum illinendum: in pri-
mis vero collum, thorax, loca ſub aliſ, & inguina. In hunc uſum etiam conducit amyliū
& thuris pollinē candido omi excepta, aliaq; adſtringentia medicamenta illinere. O-
doramenta quoque tum varia offerenda, nimirum roſæ, ſantala, cotonea poma, flores
nymphææ, & eiufmodi. Extremas vero corporis partes tum non oportet vincire. Si p-
pter dolorem ſyncope ſit, diligenter ſe cauſſa inquirere oportet. Si enim extrinſeca
fuerit, facile ei ſuſmotione dolor ſe dabitur, atq; ſyncope curabitur. Si vero a nulla ex-
trinſeca occaſione dolor concitatus fuerit, internam aliquam eſſe cauſſam, quæ dolo-
rē efficit, exiſtimare oportet. Si n. plenitudo diſtendens, dolorem excitauerit, protin-
ſi vires patiantur, ſanguis mittendus eſt e vena, quæ parti dolenti vicina fuerit. Sin vi-
res imbecillæ ſint, tum reuellendum duntaxat, aut ſurſum aut deorſum deriuandum,
aut utraq; aut frictionib. utendum. Vbi verō a vitioſis humorib. dolor oritur, purgare
magis oportet. Si utraq; coeant, ambab. utendum vacuationib. ſanguine prius miſſo.
Dein ſi noxiuſ humor in parte fixuſ & impactuſ eſt, curationē p diſcūſſionem medica-
menta moliri oportet. Reliquorum dolorum curationes ex ppriis capitib. præſertim
ex cap. De dolorib. petendæ. Qui ob mœrorem, tumorem & alias animi perturbationes
ſyncope corripiuntur, ii plane ſuorum contrariorum admonitione curandi ſunt. Nec
in mœrentib. prætereunda ſunt odorifera, & alia quæ intra corpus ſumta ſpirituſ re-
creare poſſunt. Qui propter crudorum humorum copiam ſyncope laborant, ii neq;
ſanguiniſ miſſionem, neq; purgationem ſuſtinent, utpote quos etiam ſine iis ſyncope
ſubito adoriatur. Curare itaque hoſ per frictionem oportet. Initio itaque vitii ſtatim
a frictione incipiendum; ac crura quidem primum a ſuperiore parte deorſum, linteis
non admodum mollib. ſed modice aſperis perfricanda: dein etiam tota manuſ ab
humetis pariter ad infimas partes. Vbi vero iam artuſ omneſ abunde incaluerint, &
metuſ fuerit, ne quiſ ex nimia frictione laſſitudiniſ ſenſuſ ſupueniat, oleo relaxante v-
tendum, quale eſt an- thiſum & chamæmelinū. Cauendum autem quam maxime ab
adſtringente. Quum iā art^o plurimum pfricueriſ, poſtea oleum detergendum, inde ad
ſpinam doſi tranſeundum, hæc q; tota pfricanda ſimiliter, linteo ſc. primum, mox o-
leo. Ab hac ruſſuſ ad crura, & ſubinde ad manuſ, tum ruſſuſ ad ſpinā remeandum, &
ita toto die faciendum: idq; in ſplendido quodā minimeq; humente cubiculo, cuiuſ
aer tēperatuſ ſit. Præterea muſſa in qua hyſſopuſ coctū fuit, iis eſt apuſſima: cauendū
que ne vel cibum, vel ſorbitiōē, vel aquā exhibeas, vel omnino liberaliter bibere ſi-
nas, niſi muſſam trib. primis dieb. duntaxat, alternatim fricando, ut ſolum illud temp^o
interſit q; ſomno datur, qui certe mediocriſ ſit. Quod ſi pulſuſ iis paruſ admodū in-
firmuſq; ſit, aut etiam ſupra hæc vehementer inæqualiſ, ſcire licet extremuſ pericu-
luſ eſſe, faciendā tamen nobiſ quæ retuli^o, nec aliud quicquā molendum. Sin pul-
ſuſ robore mediocri ſit ac magnitudinē, præterea minime intercifuſ & cōpreſſuſ, cō-
ſiderandā quæ ad aliuuſ ſpectant: ac ſi ſua ſponte commodē nō deiciat, audacter p in-
feriuſ aliquid infundeſ. Accidit nanq; poſt aquā muſſam, ut quæ in primis veniſ, quæ
ſcil. circa iecur & meſenteriuſ ſunt, colligi ſuperuacua ſolent, hac commodē delici-
antur. Quod ſi maior iuſto recrementorum impetuſ ad aliuuſ citetur, principio qui-
dem percoquere muſſam ampliuſ oportebit: ita n. minus aliuuſ ſubducet, & magiſ
nutriet. Poſthæc ſi ſuperuacua largiuſ deſcendant, ne ſic quidem ſiſtendā aliuſ, ſed ex-
hibenduſ p aqua muſſa priſanæ cremor eſt. Si vero fluere pergant, aliq; ſorbitiōe nu-
triet, pulſuſ interim ratione obſeruata. Aliquando n. ſubito ad imbecillitateſ, vel
inæqualitateſ, vel paruitateſ mutantur. Quo ſane tempore, panem ex vino diluto
exhibere cōueniet: idq; ſi nec ventriculuſ, nec iecur phlegmone laboret. Hac enim ſi
infeſtentur, iam corpore crudis ſueciſ reſerto, plane deſperata ſaluſ ægro eſt. Ergo in
eiufmodi ægri caſu, teiſpſum a culpa immunē præſtabiſ, ſi morituruſ prædixeriſ, ad
nullo generoſiore medicamento uſuſ fueriſ. Atqui ſi quandoq; craſſi abunde humo-
reſ deprehendantur, oxymeli p muſſa conſeſtuſ exhibendū, Ergo ſi æſtuſ ſit, & æger

Sudores
immodici
concreſcentia.

Curatio ſyn-
copeſ a do-
loriſ

Curatio ſi
ſyncope ſit
ob animi
affectuſ.
Curatio ſyn-
copeſ ex re-
dundantiſ
crudorum
humorum

Primiſ veniſ

frigida potioni assuet^o, frigidum huic oxymeli dabis. Si hyemis sit, omnib. calidum, A
 tum iis qui calida, tum iis qui frigida insueverunt, offeres: atq; ut si immodic^o æstatis
 tēpore æstus sit, etiam qui calida assueti sunt, frigidum: utiq; si nullum sit iis viscus ad
 iniuriā opportunum. Sane iis aduersissima sunt tum balneum, tum aer ambiens, quo-
 ties vel nimium calid^o est, vel frigid^o. Itaq; ut lauandi ii nō sunt, sic & reclinandi in do-
 mo sunt: æstate quidē quæ frigeat, hyeme quæ caleat. Læduntur namq; nō parum ab utroq;
 excessu: videl. in balneo æstate, & omni caloris incremento crudis humorib. li-
 quatis, ac p omnes corporis partes fluentib. ita ut metuendum sit, ne ad pulmones &
 cor ferantur: aliquando etiā ne cerebrum subeant: quum lōge præstet, ut circa iecur &
 primas venas subsistant. In domo autē immodice frigida, & hyeme, & deniq; ambiēte
 frigido, succi qui crudi sunt, & inepti ad concoquendum manent, & iocinoris obstru- B
 ctiones, si leues sunt, augent: si nullæ sunt, eas crassitudine sua hærentes in partib. cre-
 ant. Si vero ad eos, quos syncope iam præmit, sis accit^o, ubi ventriculus & iecur phle-
 gmone vacent, panem exhibebis exiguum, huncq; ex vino aliquo, quod celerē in cor-
 pus distributionem adiuet: statimq; ad frictiones venies, quas etiam p traditam
 modo administrabis. Ac si quidem ætas sit, aut regio naturaliter calens & æstuan, aut
 stat^o cœli vehementer calidus, aqua frigida vinum dilues: si nihil eiusmodi sit, cum ca-
 lida. Quæ tamen secundo & tertio dabitur potio, omnino calidā exhibendā curabis.
 Quippe ad vniuersam eam curationem, cui^o gratia frictiones adhibemus, calor præ-
 stat: ut pote crudorum humorum concoctionem adiuvans. At quib. ex flaua bile, quæ
 os ventriculi infestet, syncope incidit, iis frigida exhibenda potio est. Vinum tamen C
 quod & calidum natura sit, colore saluum, substantiaq; tenue, ætate verus, & quod di-
 stributionem in corpus præbueat, omnib. quos syncope male habet, offerre conueni-
 et: distribui namq; p corpus nutrimentum quod sumtum est, non in ventriculo mane-
 re volumus. Qui tenuium humorum vitium syncope premuntur, eos paulatim & af-
 fidue vacuare oportet, ppter ea quod multā simul vacuationem ferre nō queant. Hos
 etiā paulatim & assidue nutriemus. Summa cutis densanda, & aer cabiculi frigidus &
 adstringens comparandus, quemadmodum copiose Galenus lib. 9. Ther. meth. 14. do-
 cet. Vnguendi præterea sunt adstrictoris vnguentis: tum cibi iis dandi, qui non admo-
 dum pnte diffuant, non aqua mulsæ, non pisanæ cremor, sed panis, & sorbitio ex ali-
 ca, & fructus austeri, qui non facile corrumpantur, tum ipsi p se, tum vero & cum pane D
 etiam alica quæ in aqua sit cocta. Dabis vero aliquando iis & oua, præcipueq; eorum
 vitellos. Albumen eorum ægre concoquitur. Præterea gallinaceorum, qui lacte sint al-
 ti, testiculos. Itemque suillum cerebrum, sed vel diligenter assum, vel in aqua, adiectis
 porro & anetho, legitime elixum. Deniq; omni ratione agendum, ut & succorum ma-
 teriam crassiorem reddas, & cutim denses, & exhalationem inhibeas. Vinum vero iis
 aquosum necessarium inter initia est, sumtum post cibum. Quod si ex sententia nobis
 omnia responderint, etiam carnei saliquid nutrimenti post alia dabimus: potissimū
 post quartum diem, succis iam ad concoctionem venientib. Si ob phlegmonis magni-
 tudinem syncope accidar, artus fricandi & fouendi, manusq; ac pedes vinciendi, vigiliæ
 imperandæ, quia sanguis in somno (ut inquit Hippocrates) ad interiora repit. A cibo & E
 potu penitus arcendi. Quæcunq; ppter vitiosos humores os ventriculi credentes syn-
 copen incidunt, ii curandi sunt vomitus irritati: ne si id nō successerit, alius mo-
 tendus, atq; faciendæ, quæ inf. in cap. De dolore stomachi exponemus. Qui in balneo a-
 nimo linqui incipiunt, eos celeriter educere oportet, neq; multa aquæ infusione hu-
 medare. Qui autem iam inciderunt syncopen, celerrime exportandi sunt, & reliquū
 quidem corpus leui quopiam, velamina cooperiendum. Facies vero spongia frigida
 imbuta madesat, aut frigida, aut stillatio rosarum liquore aspergatur. Fricandæ etiā
 facies, ventriculus, & pedes. Os quoq; aperiendum, pennarum aut digitorum immis-
 sione: omniq; modo conandum, quo humor ipsius syncopes auctor euomat, aqua
 repida ori instillata. Qui perfectiori sunt ætate, iis capilli euellendi sunt. Et vociferatio F
 quidē vnius utilis est: multorum autem & simul edita, nocet. Vbi conualuerint, fugere
 oportet tum in calidam, tum in frigidam aquam demissiones. Aut n. laxat. scorporib.
 calore discusso & resolutio pereant, aut a frigiditate adstringente extinguantur. Reli-
 quæ quæ hic desiderantur, facile quibus ex aliis locis huius methodi petere poterit, &
 ex quinto Atil. bro.

Syncopes
 iam premē-
 tus curatio.

Syncopes
 ex tenuibus
 humoribus
 curatio.

Syncopes
 ab inflam-
 matione
 curatio.

A De lactis defectu. C A P. XV.

LACTIS defectus accidit propter siccam mammillarum, aut toti⁹ corporis intem- Causa.
 periem. item ob boni sanguinis paucitatem, & quia infans imbecillis nō probe ex
 mammis fugit. Quando n. pl⁹ fugendo ex illis adimit, tanto etiam plus attrahitur. No- Signa.
 rz quib. caussarum diuersitas deprehenditur, notiores ferē sunt ex iis quæ antea dicta
 sunt, quam vt nunc repeti debeant. Ne tamen parum periti aliquid desiderare queant
 eas denudō narrare nō grassabimur. Sicca intemperies ex totius corporis, aut mamma-
 rum macilentō & arido habitu, & aliis supra cōmemoratis, dignoscitur. Sanguinis p-
 bi paucitas, e malo corporis habitu, eiusdemq; vitioso colore, & ex corporis quæ præ-
 cesserunt vacuationib. immodicis, mensium nimirum, alui, exercitiis validiorib. inē-
 dia, mēore, sollicitudine, & id genus aliis. Quod ad curandi rationem attinet, de la- Curatio sic
 ctis defectu qui ē sicca intēperie nascitur, hoc in loco nihil dicemus, q; facile ex iis quæ ca intem-
 antea dicta sunt in aliis capitib. & postea in capite De hectica commemorabuntur, curari possit. perici.
 De eius itaq; qui fit ex sanguinis boni paucitate curatione, hic tantum agemus. In hoc
 igitur primum sanguis est contēplandus: sic moriente Galino li. 5. de Simp. med. fac. c. 20.
 Aut n. minor est quam conuenit, aut deterior. Itaq; qui modicus est, vniuersam victus
 rationē expōcit humectantem, & calefacientē mediocriter. Quæcunq; n. plus quam
 expediat calefaciunt, quæq; desiccant aut refrigerant, partim qualitatē ipsius sangui-
 nis vitiantia, partim ipsum modicum reddentia, lac prouenire p- benr. Dare igitur
 conuenit panem purū, lac, carnem vitulinam, pullos gallinaceos, perdices, hēdos, oua sorbilia pi-
 fees saxatiles & squamatos, vinas passas, amygdalas dulces, lactucam, buglossum, melyssophyllum,
 cucurbitas, & eiusmodi. Bibendum vinum tenue & aquosum. Fugiendum immodicum
 exercitium, ira, mēor, & omnia quæ sanguinem pauciorē efficiere possunt. Si vero deterior
 fuerit sanguis, si quidem biliosus sit, primum purgationē desiderat biliosi humoris, Sanguinis
 per leuia quidem medicamenta, quæ non admodum exsiccent: mox victum quem deterioris.
 modo diximus. Sin pituitosus, medicamenta requirit excafacientia aut primo aut
 secundo ordine: non tamen desiccantia. Hæc enim pituitosos humores excafaci-
 entēs in sanguinem vertunt. Verum inter ea potiora sunt, quæ non tantum sunt me-
 dicamenta, sed etiam nutrimenta: vel ut eruca, feniculum, anethum, apium, sim, po-
 lium, ea; virentia priusquam siccentur. Nam sicca plus quam oportet & excafaciūt
 D. & desiccant. Quæ vero desiccant, humorem sanguinis depascentia, crassiorē simul-
 que pauciorē efficiunt. Et si natura quoq; fuerint calida, iusto etiā calidiore: sin fri-
 gida, frigidiore. Debet n. esse modico calidus, ac neutiquam crassus, vt ex eo lac gē-
 neretur. Proinde quæ mediocriter excafaciunt, nullamq; insignem adiunctā obtinēt
 siccitatem, lactis pcreatricem facultatem habent. Inter quæ sane, præter ea quæ pau-
 lo ante dicta sunt, est sesamum in vino decoctum. Item butyrum recens pondere vnius uncie
 cum vino potum. Præterea amygdala dulces, pistacia, nuclei pinearum triti, & cum butyro comesti.
 Laudatur etiam ferculum hoc in primis, quod accipit: Orizam decies ablutam, exsiccatam Ferculum.
 subinde, & in puluerem redactam, coctamque in lacte optimo iuxta ignitos carbones. Inter co-
 quendum autem sacchari candidissimi quod satis est adiciatur, formaturque pulmen-
 tum. Fit præstantius, vbi adduntur amygdala dulces, pistacia, nūces pineæ, farina hordei,
 cicer, & eiusmodi. Annitendum tamen erit, vt etiam cum leni thoracis frictione, a-
 liisque medicamentis calidis & tractoria facultatē præditis, ad mammas lac alli-
 ciatur.

De lactis redundantia. C A P. XVI.

CONTINERIT interdum, vt ob lactis redundantiam mamillæ tumefactæ reple- Causa.
 antur, atq; eousq; extendantur, vt copiam eius vix ferre queant. Quod sane vitii Signa.
 Græci *εμπλασμον* vocant. Fit a causa plane cōtraria, nimirū boni sanguinis copia. Visu & Curatio.
 tactu deprehenditur vitium. Huic quidē statim succurrendum, quod alias metuendū
 sit, ne mammx phlegmone corripiantur. Inter initia itaq; vena secunda poplitis, po-
 F. tissimum si menses detineantur, aut media quæ in gibbero est. Vbi sc. in toto corpore
 sanguis abundat. Deinde vtendū iis, quæ leuiter reprimunt, ne sc. ad pulmonē impetu
 quodam trudatur sanguis. In hunc quidem vsum proderit, spongiam mollem posca
 tepidā imbutam, madefactamq; & expressam imponere, & mammas fasciis circum-
 ligare. Vel palmulæ cum pane & posca tritæ adhibendæ. Vel ouum totum cū rosaceo

imponendum. Conuenit etiam apponere emplaſtrum ex oleo roſaceo, ſantalidis, coriandro, **A**

Emplaſtrū. Farina fabarum, lentium, vtriuſque vnciam vnam. Seminis portulacæ, drachmam vnam. Seminum lini & altheæ, vtriuſque drach. duas & dimidiam. Plantaginis, manipul. vnum. Seminis coriandri, drach. duas. Bulliant omnia in aqua, donec ad mellis craſſitudinem redeant. poſtea adiectis olei roſacei, vnciam vnam & dimidiam. Succu plantaginis, vnciam vnam. Aceti, vnc. dimidiam. Denique ebulliant, & additis duobus oui vitellis fiat emplaſtrum. Aut ſingatur ceratum quod partim adſtringit, partim diſcutit, hoc quidem modo: Accipe oleorum roſacei & myrtini, vtriuſque vnc. vnam & dimidiam. Farina fabaceæ, lentium, vtriuſque drach. vnam & dimidiam. Mentæ, rutæ, vtriuſque drach. vn. Plantaginis, drach. vnam & dimid. Seminis coriandri, dra. dim. Cum cera & reſina laricea quod ſatis eſt: formetur ceratum, mammis a thibendum. **B**

Ceratum. Eryſimon etiam, quod verbenam falſo hodie vulgus herbariorum vocat, mirifice prodeſt, cum aqua & melle illitum. Ricini inſuper folia trita, & apium virens illitum, non exiguum commoditatem oſtendunt. Pyrites deniq; lapid tritus cum roſaceo & aceto impoſitus, mirificam vim in lactis redundantia declarat. Porro vniuerſa victus ratio talis ſit, vt ex ea paucus procreetur ſanguis. Quare inedia huic vitio præ ceteris mirifice confert. Exiguus quoq; potus tribuendus, aqua videl. & nequaquam vinum. Frictiones, vincula, & infernarum partium exercitia præcipienda ſunt.

De lacte in grumos conuerſo. C A P. XVII.

GRUMESCIT lac, & in caſei formam tranſit nonnunquam, & hoc vitium Græci *ἰσχυρὸν*, **C** *beſeßens*. Quasi dicas latine grumefcentiam, nominant. Diſerte autem dixi in caſei formam tranſit, & non caſei modo coagulatur. Siquidem coagulatio ſit, vbi tenue tantum a craſſo ſeparatur, id quod calore valido fieri ſolet. Nam lac in mammillis in caſei formam tranſit, & grumefcit, ſed non coagulatur. Tenue namq; a calido diſcutitur, & remanet craſſum. Fit ob lactis abundantiam, quum nimirum diutius in mammis coaceruatum detinetur, nec exſugitur. Ab intemperie etiam calida, dum ſc. a nimio calore, id quod in lacte tenuium erat partium, digeritur ac diſcutitur, quod veroreliquum eſt concreſcit, & in grumos abit. Itē etiam a frigidityte accidere ſolet, quæ vt alia liquida contrahere, ita quoq; lac ipſum vt concreſcat, efficere poteſt. Interdum etiam lac ipſum ſuapte natura ſatis craſſum & lentum eſt, ob id facile in grumos vertitur ac concreſcit. Notis nullis ad vitium dignoſcendum opus eſt. Ex tactu namq; atq; adeo ægri ſermonibus & **D** relatione, ſtatim agnoſcitur. Victus ratio in hoc vitio præ cauſarum diuerſitate variatur. In calida n. in: emperie mammarum, ad frigidum: in frigida contra, ad calidum declinet. Si propter craſſitiem lactis euenierit vitium hoc, extenuanti omnino victus ratione vtendum erit. Quod ad curationem ipſam ſpectat, ſi lactis fuerit redundantia, nec adhuc in mammis grumefcat, ab adultis, in hocq; peritis mulierib. leniſim leniterq; exſugendum erit. Mammæ autem extrinſecus apii virentis, mentæ, & ſæno-graci ſucco illinantur, aliæq; quæ ſupra in cap. De redundantia lactis dicta ſunt, admpueantur. Item ſurfures in aceto cocti, cum rutæ decocto, mammis imponendi. Folia quoque ſolani cum braſſica foliis, ſi contundantur, pauca myrrha adiecta, & croco, cum exiguo aceto. Leporis vero coagulum ex aqua tritum ſi illinatur, ad omnes mammarum tumores. & præſertim e vitioſa earundem lactis copia euenientes, conducit. Lentes inſuper in muria elixata mirifice conferunt, ſi decocto quidem mamma colluantur, lentes vero contuſæ illinantur. Althea denique & ſæno-graci decoctum, non parum commoditatis adfert. Si quidem nimia mammarum caliditas vt lac grumefcat in cauſa fuerit, tunc portulacæ ſuccus, & ſolani hortenſis, illinendus erit. Item roſaceum cum aceto adhibendum. Alſine quoque, quam vulgus herbariorum morſum gallinæ appellat, illita miram efficaciam oſtendit. Benefacit etiam cimolia terra ex aceto, aut aqua & oleo roſaceo illita. Præterea lentes in aceto elixata, & (vt paulo ante dictum eſt) adhibita. In frigida intemperie mammarum, decocto chamamelis, ſeniculi, anethi ſeminis lini & ſæno-graci vtendum, eoque fouenda mamma. Oleis quoque chamamelino, anethino, liiaco, & ſimilibus inungenda. Cauendum ramen, ne papillam contingant. Fel bubulum illitum con- **F**

Emplaſtrū. fert. Medulla panis cum aceto illita prodeſt. Sed licebit adicere mentam, aut apium, & ſit medicamentum validius. Præter cetera vero hoc potiſſimum valet: quod habet: Mellis, vnc. dimid. Styraçis calamitis, drach. tres. Fellis bubuli, drachmus duas. Olei chamamelini, vnc. vnam. Myrrhæ, thuris, vtriuſque vnc. duas & dimidiam. Miſceantur ſingula, & redigantur in

A in formam emplastri, quod mammis imponatur. At ubi lac iam in grumos cōuersum fuerit, victus ratione extenuante vtendum erit, & ad calidum inclinante, nisi a calore discutiente hoc vitium creatum sit. Extrinsicus lentes in muria decocta, adiecto modico cymino, & croco apponenda. Item parietaria herba viridis contusa confert. Decoctum fenograci, althea, apii, & betæ folia. Farina deniq; fabarum, & id genus aliorum.

Lactis in grumos cōuersi curatio.

De phlegmone mammarum. C A P. XVIII.

ACCIDIT interim, instar aliarum phlegmonum, ppter sanguinis copiosi & calidi ad mammas defluxum. Interim etiam ob lac casei modo concierum & coactum, ac subinde ad suppurationem tendens. Facile iam dictæ causæ discernuntur, quod scilicet prior phlegmone iis quæ neq; grauidæ, neq; puerperæ sunt, accidat: altera vero, iā cō-

Causæ.

Bmemoratis duntaxat. In curandi ratione quæ negligenter administranda minime est, quum n. laxa, & adnosa glandulosaue mammarum substantia sit, facileq; fluctionib; pateat, & frigidior natura, in scirrosus affectum, & demū in canerum promte venit; obseruandum erit, vt in prima phlegmone cōfestum sanguis mittatur ex interna gibberi vena, vel media eiusdē lateris, nisi mensium subesset retentio: tunc n. consultius est, poplitis aut malleoli venam incidere. Post hæc ad reprimentia veniendum medicamenta, quæ non oportet esse valida, ne ad interiores corporis partes nobiles humorum impetus trudatur: aut aliqua quæ discutere possunt, iis miscenda. Quare ad eum maxime vsus conuenit rosaceū cum succo aut stillaticio liquore solani, aceto, & decocto chamæmeli, vt sc. in iis lintei madefacti & intincti, mammis imponantur. Valet

Signa. Curatio.

C etiam emplastrū ex farina hordeacea, semine lini, santalis, bolo armenio, adipe porcino, & rosaceo cōpositum. Quod si medicus nō admodum conferre medicamenta reprimentia animaduertit, ad ea quæ discutunt statim illi est progrediendum. Quapropter hoc emplastrum est adhibendum, quod accipit: Farina fabaceæ fenograci, seminis lini, singul. vnc. dimidiam. Florum meliloti, & chamæmeli, vtriusque drach. duas & dimidiam. Medulla panis triticeī, vnc. dimidiam. Myrrha. Ebulliant in aqua iustæ quantitatis, dum in mellis crassitudinem cōcant, postea adiectis oleorum chamæmelini, & anethini, vtriusque vnc. vnam & dimidiam. Bulliant iterum, & addantur vitelli quorum tres numero, croci, drach. i. singaturque emplastrum. In hunc vsus lini semen, vel fenogracum in oxymelite decoctum illini potest, & alia eiusmodi quibus discutendi facultas inest, de quibus antea

Adstringētia.

Discutiētia Emplastrū.

Dixit dictum est. Quod si vero discutendi spes omnis sublata fuerit, maturatione & suppuratione auxiliabimur, quæ perficitur hoc cataplasmate, quod accipit: Maluæ, altheæ, foliorum violæ nigræ, chamæmeli, sing. manip. vnum & dimidium. Radicis altheæ, drach. vna. Bulliant in aqua, donec mollescant, dein contundantur, & informetur cataplasma. Aut singatur emplastrum ex semine lini & fenograci, caricis radice altheæ, & liliorum candidorum, adiectis oleis chamæmelino & lilieo, adipibus porcina, gallinacea, & similibus. Suppuratione facta, adruptionem sectionemve mammae veniendum. Hæc autem ferro, aut medicamenti perficitur. Medicamenta vero, quæ suppurationis in mammis humores emanare faciunt, sunt, simus columbinus, fermentum cum puluere cantharidum, calx viuua cum fimo anserino. Si ferro vti magis plaueuerit, locus prope papillam lunari sectio-

Cataplasma Emplastrū.

Ene accuratissime incidendus erit, vt in unctione abscessus quidem profunditas denudetur, sed papilla conseruetur: Curatio reliqua talis sit, qualis aliorum vlcerum. Porro si propter lac coactum phlegmone accidit, tunc per initia vtendum est spongia molli tepida posca imbuta, & expressa loco illigata. Item palmulæ cum pancac posca trita imponendæ. Medulla quoq; panis, additis myrrha, croco, menta, & aliis quæ in cap. De reduntantia lactis commemorata sunt, imponenda. His peractis, si phlegmone perseuerauerit, ad alia remedia, quæ paulo supra commemorauimus progrediendum.

LEONHARTI FVCHSII DE MEDENDIS SIN-

GVLARVM PARTIVM CORPORIS HVMANI A SVMMO CAPITE

ad imos vsq; pedes malis, LIB. III.

F De imbecillitate ventriculi. C A P. I.

VENTRICVLVS imbecillitas interdum ex intemperie qualitatum effectricium citra humoris confluxum oboritur. Nam (vt testatur Galenus libro tertio. De sympt. causis, &c.) Omnis vehemens intemperies vires deiecit. Fit etiā ex

Causæ.

Signa.

humore in ipso sinu & amplo ventriculi spacio contento, qui aut calefaciendi, aut refrigerandi, aut humectandi, aut siccandi, aut etiam horum aliqua p coniugatione efficiendi naturam obtinet: interim vero & in ipsas ventriculi tunicas immerso & infarto, ut copiosius li. 7. Ther. meth. c. xi. Galen. monstrat. Nudam qualitatem calidam testantur, sitis vehemens, cibi fastidium, nidorosiq; ructus. Frigidam contraria indicant, modica nimirum sitis, immodica appetentia, acidiq; ructus. Quid multa? si calida vel frigida intemperie ventriculus afficitur, assumptos cibos ad intemperiei naturam pmutat, ut appareant cibi citra alicuius humoris complexum in nidorem aut acorem permutationem accepisse. Præterea frigidis medicamentis, cibisq; & potibus statim adiutum hominem videbis, si calida intemperies extiterit. Si vero frigida, calidis cibis & medicamentis iuuabitur, a frigidis vero lædetur. In humida nulla, vel exigua saltem sitis ægrum affligit, saluæ copia adest, & cibus gaudet humidiorib. In sicca, linguæ siccitas, corporis extenuatio, saluæ paucitas, sitisq; vehementissima. Porro copiam humorum vitiosorum nausea, vomitus, gravitas ventriculi, & ructus potissimum a cibo ostendunt. Quod si flaua bilis redundat, oris amaritudo, bilis vomitus, sitis, ructus nidorosi, & ventriculi morsus aderunt. Sin pituita, nulla prorsus ventriculi erosio excitabitur, nisi falsa fuerit: acidus ructus, nulla sitis, tensioq; ventriculi adsunt. Si vero atra bilis abundet, tristitia metuq; ructus & excreationes foetidae, piscesq; olentes, somnus cum accessione imaginationum alienarum, contractiq; & dolor poplitum & surarum. Intemperies omnis per contraria corrigitur atq; emendatur. Calidam itaq; refrigerare oportet, frigidam vero calefacere: siccam humectare, humidam siccare. Similiter vero etiam compositas intemperaturas aut calefacere & siccare, aut humectare & calefacere, aut refrigerare & humectare, aut siccare & refrigerare oportet. Calida igitur intemperie affecti, refrigerante victu curantur, præcipue vero si ex aceto frigida assumantur. Panis itaq; posca sit imburus. In carnum genere pullis gallinaceis, perdicib. vitulinis carnibus, cum aceto aut omphacio decoctis, vtendum. Inter olera lactuca & portulaca maxime conducunt. Poma item, & pyra acida. Bibenda aqua frigida, si afflucit æger: si minus, decoctum cinnamomi, aut vinum tenue & aquosum propinandum. Extrinsecus ea quæ mediocriter adstringunt & refrigerant medicamenta, imponenda. Frigida intemperie ventriculi laborantes, contrariis medicari oportet, anisi, rutæ, petroselinisq; decocto. Cibi quibus vtuntur, odoramentis, nempe cinnamomo, calamo odorato, garyophillis, pipere, & similib. condiantur. Danda quoq; antidotus *diatrion piperon* nominata *diacalaminthes*, & *theriaca*: forinsecus ea, quæ calefacere possunt vnguenta inungenda. In potu vsus sit vini veteris, & subadstringentis. Humidæ intemperiei auxiliantur cibi, qui citra valentem calefactionem refrigerationemve siccant. Insuper consuetae potionis parcitas. Vtendum igitur victu tenuiore & resiccante: Vino meraciori, exercitiis, & cibi quoad fieri potest, abstinencia. Sicca, instar hecticæ, de qua in li. 4. dicemus, curabitur. Copiosissime vero Galenus eius, ut etiâ reliquarum intemperantiarum ventriculi, curationem prosequitur, li. 7. Ther. meth. vnde ea, quæ hic desiderantur perenda erunt. Ceterum si humor aliquis calefaciendi vel refrigerandi vim obtrahens,

Curatio.

Calida intemperiei curatio.

Frigide intemperiei.

Humidæ.

Sicca.

Curatio imbecillitatis ventriculi ab humore bilioso.

Hiera picra.

ventriculi imbecillitatem effecerit, diligenter considerandum erit, an is humor in sinu seu amplitudine ventriculi innatet, an eiusdem tunicis impactus sit. Si in sinu continetur, ac biliosus fuerit, per vomitum statim, expurgandus erit. Facilem vero vomitum reddit aqua calida, vel mulla dilutissima bibita. Satiuserit, ut ante hæc humectantia exhibeas: vel uti est prusanæ cremor, aut ouilutea. Sin in ventriculi tunicas est receptus humor biliosus, hiera picra aliis purgabitur, qua quidem (Galen. loco antea citato teste) nullum aliud medicamentum ad vitiosos humores qui in ventriculi tunicis detinentur, præstantius inueniri potest. Humore vacuato, victu vtantur eodem, quo eos qui calida eiusdem intemperie correpti sunt uti debere, paulo ante diximus. Intra corpus assumenda sacchara, quib. refrigerandi & humectandi inest facultas, item antidota iisdem viribus prædita. Extrinsecus ventriculo adhibeantur refrigerantia, & mediocriter adstringentia, ut est *oleum rosaceum, cotoneorum, adiectis santalis, balaustris, coralliis, & rosis*. Infrigidantium tamen mediocris semper sit vsus, pro intemperiei contrarietate. Nam immodicus horum vsus, non modo non iuuat, sed etiam sæpe insanabilem morbum efficit: quod scilicet ad concoctionem calore summo opus sit,

A sit. Si vero pituitosi, atque adeo crassi & lenti humores amplitudini ventriculi innarent, oxymelite vtendum est: in quo ex medicamentis, quibus incidendi & extenuandi facultas quædam inest, sint decocta (verbi gratia) *hyssopus, iridis radix, organum, satyria, & marrubium*. Sin tunicis ventriculi immerfi fuerint, tum primum exhibenda quæ lentam & crassam pituitam dissecant, postea vero purgandum: Qualia autem medicamenta sint quæ iam dictam pituitam purgent; capite decimotercio primilibrī diximus. Est vero & ipsa hiera p. cra ad crassorum humorum purgationem non inutilis. **V**ictus quoque ratione extenuante tum vtendum erit: Antidotis item calefacientibus *diatrion pipereon, diagalanges, diacinnamomi, diambar, zingibere condito, diacori, & similibus*. Extrinsecus ventriculo adhiocenda sunt olea calefacientia, quale est *nardinum, e menta, absinthie, mastichinum; & alia consimili facultate prædita*. In hunc vsum etiam commendantur cerata, quæ vulgus medicorum hodie scuta stomachalia nominat, quale est hoc quod accipit: *Cinnamomi selecti, garyophyllorum, piperis longi, singul. drach. unam. Gallie moschatæ, maceris, vtriusque drach. dimid. Calami odorati, thuris, vtriusque drach. i. & dimidiam. Ligni aloes, scrup. unum. Menta sativæ, drach. duas. Mastiches, ladani vtriusque drach. duas & dimidiam. Oleorum mastichini & nardini, vtriusque unciam dimidiam*. Cum cera & resinâ terebinthina, quod latis est, informetur ceratum, ventriculo imponendum & obducatur serico purpureo: Aut vtendum hoc medicamento, quod habet: *Mastiches in puluerem redactæ, unc. i. & dimid.* Quæ subinde spargitur in corio sicuti formam obtinente, & affunditur ei oleum nardinum: Postea igni quoad lique scat singula, adhibetur, & inspergitur iis *cinnamomi selecti, nucis moschatæ, garyophyllorum in puluerem redactorū, singul. drachma una*, & ventriculo admouentur. Quid multa? Hæc & alia ventriculum roborantia & calefacientia sunt adhibenda: verbi gratia, *menta, absinthium, thus, mastiche, cinnamomum, acorus verus aut pro eo quam galangam maiorem hodie vocant, zingiber, macer, lignum aloes, calamus odoratus; & id genus alia libro primo, quem De compositione medicamentorum scripsimus, commemorata*. E quibus omnibus varia remediorum genera, pro cuiusque arbitrio componi possunt.

De nausea & vomitu. C A P. II.

N A V S E A, quæ facultatis expultricis ventriculi deprauatus motus est, quo ventriculus ipse ea, quæ eius corpus contristant, quam citissime per gulam vacuare appetit. Ex vitioso humore, tum calido, tum frigidō, in ventriculo contentō gignitur: qui aut in concavitate ipsius innatat, aut in tunicis eius infartus, instar visci, adhæret, atq; ægre auelli potest: aut serosior existens, in ipsis ventriculi tunicis, velut aqua in spongia, immergitur. Atq; eiusmodi humores ex ventriculi intemperie tum calida, tum frigida nonnunquam nascuntur. Nonnunquam autem ex toto corpore, aut aliis partibus, prius male affectis in ipsum ventriculum, veluti illarum excrementa, confluunt: vt pote ex iocinere, aut liene, aut capite, aut ex vniuerso corpore se expurgante: Si ex intemperie nascuntur, facile id ipsum ex notis capite præcedenti commemoratis, deprehendes. Vtrum vero is humor in cavitatē ventriculi innatet, aut tunicis eius infartus sit, ita cognosces. Humore vitiosum innatantē in ventriculo, ac nausæ excitantem, magna ex parte vomitio sequitur, atq; is ipse cibos corrumpens manifeste eiusmodi humore imbuit, & in suam naturam permutat. Si vero ventriculi tunicis humor tenax immerfus sit, nausæam quidem efficit, sed tamen talē, quam inanes vomendi irritationes comitetur, quæ lancinant tantum, & nullum humorem educunt: Sin serosus fuerit, nō solum ante cibum, sed & post sumtum cibum vomitum inducit, idq; si in ventriculi amplitudine innatet. Qui n. superficie ventriculi infarti adhærent, ante cibum magis inanes vomitiones mouent. Quando vero aliæ partes, e quibus in ventriculum excrementa defluunt, prius male afficiuntur, ipse æger primum laborantis partis læsionem sentit, aut enim caloris sensus iuxta laborantem partem ipsi accidit, aut frigoris, aut grauitatis, aut etiam tactui nostro dura succumbit. Si vero vniuersum corpus vitiosis humorib. plenum fuerit, id ipsum ex colore, & pustularum eruptionibus circa cutem cognoscitur, atq; ex ipsa adeo vrina. In curandi ratione diligenter considerandum erit, num ventriculi tantum pathos sit, aut totius corporis, aut alicuius alterius partis. Si quidem ex alia quadam parte, aut ex vniuerso corpore humores in ventriculum confluant, priorem curā totius corporis, aut partis prius male affectæ habere oportet.

terita tamen vt neque ventriculum ipsum negligamus. Nisi enim vniuersum corpus humoribus vitiosis prius probe expurgetur, nihil egerit quisquis humorē qui se in locum aliquem receperit, expugnare conabitur. Sic quoque is qui primum laborantem particulam curat, velut fontem omnium in ventriculum influxionum excindit. Qua vero ratione partes quæ excrementa ventriculo demittunt, sint curandæ, ex propriis de iis capitibus perdiscendum erit. Ceterum si in ventriculo nati fuerint humores, concitantes nauseam, considerandum num tenues, biliosi & serosi sint, & in ventriculi sinu contineantur: tum enim tenuissimus pituitæ succus dandus, aut aqua tepida, & ad vomitum cogendus æger digitis, aut pennis in os immisissis. Si autem intrinsecus circa superficiem ventriculi infarti fuerint, *drachma vna aloes* in aqua diluta potui exhibenda. Siquidem ealidorum, qui in ventriculo sunt humorum aloes optimum est medicamentum, ita vt sæpenumero ventriculo male habentes vna die sanauerit. Vtile quoque est, si mulsæ in qua absinthium incoctum sit, bibatur. Post humores vacuatos, aliq; medicamenta bilis acrimoniam obtundentia seu temperantia adhibita, quæ præcedenti capite sunt commemorata, calida ventriculi intemperies (vt eodem in loco docuimus) curanda erit. Si autem pituitosi, aut viscosi, & crassi humores sint, qui amplitudini ventriculi innatent, curandi sunt, ad eum modum, qui in præcedenti capite est a nobis expositus. Deinde frigida ventriculi amouenda intemperies. Quod ad vomitum quidem attinet, initio sciendum eum non esse reprimendum, a quo æger melius sese habet, iuxta hoc Hippocratis dictū: *In vomitibus spontaneis, si alia purgentur, qualia purgari oportet, confert, & leuiter ferunt: Sin minus, contra.* Non erit itaq; reprimendus qui decretorius fuerit, aut vbi ex vniuerso corpore in ventriculum confluunt humores, aut vbi in ipso ventriculo ppter intemperies nascuntur. Quare tunc potius is expultricis facultatis motus adiuvandus erit, in calido quidem pathemate aqua calida cum oleo violaceo pota: in frigida vero, oxymelite ppinato, & aliis quæ antea sunt a nobis commemorata. Quod si vero immodicus fuerit vomitus, atq; ægri plane vires iam deicere cœperit, tum suppressioni eius studendum erit. Quare principio decubitus sursum vergens adornetur, in conuenienti & vitio contraria domo: quæ frigida quidem sit, vitio existente calido: contra vero calida, vbi frigidum vitium existat. Extremæ corporis partes fricentur, manibusq; calfactis palpentur, quin & violentius vinctis stringantur. Deinde pedes & manus in aquâ solito calidiorē demittantur. Odoramenta vero narib; admoveantur olfacienda, boni odoris: velut *rosa, mala cotonea, pulegium, menta, feniculum, spicanardi.* Ventriculus extrinsecus oleis absinthie & rosaceo illinatur. Cataplasmata e *palmulis, malis cotoneis absinthio, item cerata ex iis & similibus, nempe menta, lolii farina, mastiche, thure parata, & ventriculo imposita profunt.* Palmulas autem in vino veteri maceratas optime conterere oportet, deinde mastichen & thus vnumquodq; per se optime tritum adicere, & rursus simul terere. In hunc locum etiā reuocanda remedia, quæ partim in capite *De cholera*, partim etiā *De dysenteria* dicemus. Porro malo diutius permanente, & cibus non retentis, cucurbita ad os ventriculi cum plurima flamma affigenda, donec locus rubefiat, atq; ipsa adhuc affixa cibus præbeatur. Ceterum de vomitu sanguinis hic peculiariter nihil dicemus, quod ex curatione sputi sanguinis & dignotione causarum ex aliis capitibus facile curare poterit.

De siti immensa. C A P. III.

Causa. SITIS, Galeno lib. 1. *De simpl. med. facul. cap. 30. teste*, duplici ratione prouenire solet: partim humoris inopia, partim caloris copia. Calefit autem ventriculus multis & variis modis, propter sc. calidam intemperiem nudæ qualitatis, simplicem vel compositam: aut calidos & biliosos humores in eo natos, aut ad eum confluentes. Item ob vini veteris & copiosi potum. Exsiccatur vero propter siccā quæ in eo est intemperiem, aut humores falsos, aut falsæ aquæ potum: item nonnunquam ob consensum totius corporis, vt in ardentibus & hæticis febribus accidere solet. Causarum diuersitas facile ex ægri sermonibus, & iis notis quas in duobus capitibus præcedentibus narrauimus, cognoscitur. Porro causa cognita, vnicuique peculiaris curandi ratio est adhibenda. Quare siti ex calore prouenienti, refrigerantibus est subueniendum. Conueni itaque tum frigidi aeris attractio, & aquæ, aut vini aquosi potio. Item cucumeris semen comanducatum. Decorticatum vero & tritū, ex aqua potatū, siti ex calore ventriculi orto valde

A valde auxiliatur. Eodem modo prodest *lactuca semen manducatum & potum*: item *semen portulacæ*. Optimum ad sitim tollendum est hoc, quod habet: *Cucumeris sativi seminis decorticati, vnc. vnam. Tragacanthæ, vnc. dimidiam*. Tragacantham contundito & cribrato, semen vero conterito, eisque ouorum crudorum recentium candida adicito, & simul omnibus contritis catapotia informato, ac in umbra exsiccato. Ex his deinde vnum detinendum præbeto, vt paulatim dissolutum deglutiatur. Quibus autem longo iam tempore ventriculus æstuat, eis succurrit radice dulcis succus potus, atque ipsa etiam radix ex aqua, & portulacæ succus. Ceterum qui siti premuntur ex calore & siccitate, vt accidit in ardentibus febribus, & peraridis omnibus, & in iis qui æstate, ac in graui æstu laborant, iis optime medetur, Galeno loco iam ostenso, oxycratum, vt

B quod ex aceto & aqua compositum sit. Acerum autem strenue refrigerat, & quouis expedite permeat: aqua vero, supra quam quod refrigerat, omnium quoque est vel humidissima. Nihil enim (vt loco antea citato testatur Galenus) aqua est humidius. Sitim etiam, quæ in febribus oboritur, lenire solet capitis irrigatio ex frigidissimo oleo, aut rosaceo, ex alto nimirum syncipite irrorato. Siccitatis quoque optimum remedium est somnus. Quare recte ab Hippocrate, Aph. 17. dictum est: *Qui noctu bibere appetunt, his admodum sitientibus si superdormierint, bonum*. Proderit etiam in ore retinere cerasa sicca in aqua frigida macerata. Radix item glycyrrhizæ recens e terra euulsa & comman-ducata sitim sedat. Vbi autem caliditas & humiditas coeant, vt accidit in ea aquæ intercutem specie, in qua in ventre salis humoris copia congeritur, aut in iis quibus

C falsa pituita ventriculus refertus est, tum acetum optimum est remedium. Conducit etiam iis absorbere malorum cotoneorum cremorem, aut pyrorum, aut omphacii succum cum aqua. Si autem biliosi aut salis humores in ventriculo innatantes, aut eodem immersi & infracti sitim excitauerint, tum exhibenda erunt medicamenta, quæ eosdem vacuare possunt humores. Deinde vero adstringentibus & roborantibus ventriculorum vtendum est: quorum omnium exempla e superioribus petenda. His qui ob multi vini veteris potum sitiunt, frigida aqua potata succurrit, & alia quæ lib. 1. cap. 14. sunt commemorata.

De dolore stomachi. C A P. IIII.

D OLOREM stomachi Græci καρδιαχὴ & καρδιαγία nominant. Siquidem prisci os ventriculi, vt testatur Galenus 4. Aph. comment. 17. & lib. 3. De affectis locis, cap. 5. & multis aliis in locis, καρδία, hoc est cor nominant. Hinc est quod hoc vitium Hippocrati etiam καρδιαγία, id est, cordis morsus dicatur. Fit hoc vitium, vbi in stomacho prauis, biliosis, & morsu vellicantes humores detinentur. Vnde accidit, vt propter intolerabilem mordacitatem syncopen inferant, quam stomachicam appellamus. Malum ex assidua in ore ventriculi punctura & vellicitatione statim innotescit. In hoc vitio cibi refrigerantes, & qui robur stomacho afferre possunt, offerendi sunt. In quo censu habentur lactucæ, & portulacæ cum aceto acceptæ: item mala punica, & citrea vocata, pyra, vuzacerbæ, & eiusmodi. Panis etiam, aqua egelida maceratus, conuenit. Reliqui quoque cibi tales sint, vt facile concoquantur, & tamen corruptioni non sint obnoxii. Eius quidem generis sunt pulli gallinacei, perdices, aues montanæ, & similia cum omphacio cocta. Item pisces saxatiles cum aceto, limonibus, & acido citrii mali succo cocti. Bibant ægri aquam in qua parum cinnamomi sit decoctum, aut vinum aquosum tenue. Quantum ad curandi rationem attinet, initio vomitus est per remedia, quæ antea dicta sunt, eliciendus. Dein quoque per interna purgare oportet, hiera picra assumpta. Quod si vero syncopen accersat, eo modo quo in capite de syncope diximus æger curandus erit. Quibus peractis, remediis ventriculorum roborantibus vtendum, tam extra quam intra corpus. De quibus non est necesse sermonem prolongare, quod de eis supra capite huius libri secundo, & aliis locis satis copiose dictum sit. Quare ad alia ventriculi vitia progrediamur, atque quo pacto

F ea sint curanda, ostendamus.

De phlegmone ventriculi. C A P. V.

P HLEGMONE ventriculi haud secus atq; aliarum partium corporis fit a confluxu sanguinis copiosi & calidi. Hanc autem testantur dolor immensus, assiduus, & qui

Vitium. nullis medicamentis admotis mitigari poteſt. Præterea tumor, æſtus qui tactu diu-
dicari queat, febris, grauitas & nauſea. Vitium perinde atque in aliis phlegmonibus,
tenuem & exquisitum eſſe conuenit. Quod etiam monet Galen. *lib. 13. Ther. methodi*
capite eiusdem numeri, quod ſcilicet eius munus toti animali commune ſit. Vtendum
itaque piſanæ cremore: abſtinendum vero a carnibus, vino, & aliis cibis calidis. Bi-
bat æger aquam in qua decoctum ſit parum cinnamomi, aut ſuccum malorum gra-
natorum acidorum, aut aliorum fructuum frigidorum & adſtringentium. Parum
dormiat, ſiquidem in ſomno ſanguis intro repit, adeoque phlegmone augetur: & non
multum admodum loquatur. Fugiat quoad fieri poteſt triſtitiam, verſeturque in æ-
Curatio. re mediocriter frigido. Curandi ratio a ſanguinis miſſione auſpicanda, modo cor-
poris vniuerſi plenitudo, ac virium robur adſint. Incidenda vero gibberi vena in-
terna, & pro virium robore ſanguis detrahendus. Vtendum quoque frictionibus
extremarum parium, ligaturis, & aliis ſanguinis accuſum ad ventriculum auer-
**Reprimen-
tia & ad-
ſtringentia.** tentibus. Poſt hæc quæ reprimunt & adſtringunt, foris vbi dolor & tumor maxime
apparent, ſunt imponenda. Ventriculus enim, potiſſimum vero os eius, eorum
quæ adſtringunt complexu ſemper quidem indiget, multo maxime vero vbi fuerit
phlegmone correptus. Quare qui ſolis relaxantibus præſidiis, citra eorum, qui cor-
roborant admixtionem, curationem tentant, periculum vitæ inferunt. Oportet ita-
que ſiue oleum ſit, quo phlegmone laborantes partes fouentur, ſiue cataplaſma ipsis
imponatur, ſemper aliquid ex adſtringentibus admiſcere. Quapropter in hunc uſum
maxime conuenit oleum in quo abſynthium, aut malum cotoneum decoctum ſit,
Ceratum. admixta ſimul maſtiche, adhibere. Item ſuccum cotoneorum, aut pyrorum, adiectis
roſis purpureis, hordei farina, ſantalidis, beſo armenia, & ſimilibus. Licebit etiam v
hoc cerato, quod habet: *farina hordei, vnc. dimidiam. Santalorum alborum & purpureorum,*
roſarum purpurearum ſing. drach. duas. Bolis armenis, drachmam vnã & dimidiam. Aloes, ma-
ſtiches, vtriuſque drachmam vnã. Abſinthii, nucis moſchata, balauſtiorum, ſing. drachmam di-
midiam. Oleorum maſtichini, roſacei, vtrorumque vnc. vnã & dimidiam. Cum cera & reſina
terebinthina quod ſatis eſt, inſormetur ceratum ventriculo imponendum. Quod ſi
maiori adſtrictione opus erit, id quod tum ſit, quando tanta fuerit ſtomachi imbe-
cillitas, vt nec cibum quidem retinere poſſit, recte prædictis miſcetur *omphacium*, aut
abſinthii ſuccus, aut *hypocithis*, & *rhu obſoniorum*. Hæc autem omnia, ſi vehemens ſit
phlegmone, actu frigida ſunt ad mouenda. Quod ſi alius nihil deiiciat, clyſteribus le-
uibus irritanda erit. Neque temere facit, qui æſtus vehementia paululum remiſſa, ca-
ſſia ſiſtularis, vnc. dimidiam, Intibi ſatiui ſiſtaticio liquore diſcutam exhibet. Hoc etiam tempo-
re adſtringentibus medicamentis, quæ extrinſecus imponuntur, non nulla quibus
diſcutiendi facultas ineſt, permixcenda erunt: vt eſt *farina ſenograci, flores chamameli,*
althea, & lini ſemina. Nunquam autem, vt antea quoque monuimus, etiam ne tunc quidem
quum nihil amplius affluit, & repelli quod in laborante particula continetur, non po-
teſt, ſolis relaxantibus & diſcutientibus vtendum: ſed ſemper adſtringentia quæ ro-
bur ventriculi conſeruare valent, admiſcenda, vt diligenter etiam Galenus *lib. 13. Ther.*
Emplaſtrum. *meth. cap. 10. monuit.* Quare hoc tempore illius emplaſtri uſus conueniens erit, quod ac-
cipit: *Farina ſeminis lini, ſenograci, vtriuſque vnc. dimidiam. Seminis anethi, drach. duas. Florum*
chamameli, meliloti, vtriuſque vnc. dimidiam. Abſinthii, balauſtiorum, roſarum purpurearum,
vtriuſque drachmas duas. Hypocithidis, ſcrupul. duos. Oleorum chamamelini, liliacei, roſacei, maſti-
chini ſingul. vnc. dimidiam. Acungie gallinae, anſerinae, vtriuſque drach. duas. Commixtis omni-
bus, reducantur in formam emplaſtri. Antequam tamen apponatur, non ab re erit, ſi hoc
Vnguentum. vnguento ventriculus inungatur, quod habet: *Oleorum chamamelini, anethini, cotoneo-*
rum ſingul. drach. tres. Pulueris radicis althea, abſinthii, ſeminis lini, ſingul. ſcrupulum vnũ. Ce-
re quod ſatis eſt, fiat vnguentum.

De cibi ſaſtidio. C A P. VI.

Apoſieſia.
Appetentia
amiſſio. **C**ibi ſaſtidium diximus vitium, quod Græci *apopſieſia*, Latini vero *inappetentiam*,
aut rectius *appetentia amiſſionem* vocant. Idem autẽ vitium ſect. 4. aph. 17. *intra*, & *doloris*
nuncupatur. Accidit autẽ ob tenſus exſuctionis venarum, qui tane naturalis fames, Gale-
no *lib. 1. de Sympt. cauſis cap. 7. teſte*, exiſtit, amiſſionem: aut quod exſuctio nõ fiat, aut quod
corpus non inaniatur. Contingit etiam ſæpe propter aliquam calidam, potiſſimum
ventri-

A ventriculi intemperiem, quæ solida corpora laxando dissolvit, atque ad attractionis functionem reddit imbecilliora: humida vero fundendo ac liquando supra modum extendit. Oritur interdum ob vitiosorum in ventriculo redundantiam, & ob immoderatam ventris & intestinorum fluxionem, item sanguinis immodicam missionem. Respuunt quoque cibum ægri in continuis & vehementibus febribus, ventriculi, iccinoris, vulvæque phlegmonibus, aliisque multis de causis, quas omnes nō opus est nunc recensere. Indicia quæ calidam testantur intemperiem, supra commemoravimus, nempe capite primo. Quæ biliosorum humorum vitio cibum auersantur, ventriculi morfu torquentur, nauseaque & siti magis conficiuntur. Quibus autem humores computruerint ii etiam interdum febricitant. At quibus crassi lenticque hu-

Signa

B morēs fastidium pariunt, ii nec rofionem ventriculi, nec sitim experiuntur. Communiter autem omnibus superuenit nausea. Si iuxta principium morborum accesserit fastidium, aut iuxta eorundem vigorem, quum vires adhuc sustinere possunt, nihil molestiarum infert: modico enim alimento ægri indigent. Si vero in declinatione totius morbi appetentia perditio accedat, aut in diuturna imbecillitate, aut viribus debilitatis, aut ex immodica inanitione, periculo non vacat. Augetur vitium hoc & ab ætate. Incommode enim eo pueri afficiuntur, utpote qui natura voraces sunt, & assiduo fomite indigent. Quare magnus præter naturam excessus significatur, si pueri appetitus perditione fuerint affecti. Quod ad curandi ra-

Quando fastidium periculo vacet, nec ne

Curatio

Cderandum qualis intemperies vires exolvit: & per contraria ea ipsa corrigenda, veluti suo diximus loco. Si vero vitiosorum humorum præsentia fastidium excitarit, & tenues atque mordaces fuerint, antequam aliam curam adhibeamus, contentos in ventriculo humores vomitu aqua tepida copiose exhibita, vacuabimus. Quod si ægre vomit laborans, sorbitiones ut ptisanæ cremorem, & alia quæ humectare possunt alimenta exhibebimus, quæ eiusmodi humores ad alvum elicere, atque inferne expellere consueverunt. Aut plane hiera picra aliis purganda. Deinde per ea quæ ad hanc rem idonea sunt, corpora ad bonum perducemus temperamentum. Quibus crassi lenticque humores fastidii auctores fuerint, iis medeberis extenuando ipsos, incidendoque rum oxymelite, tum iis quæ ex hoc & ex muria componuntur,

D ut cappari, oliuis, sinapi, & similibus, quæ capite primo exposuimus. Si vero propter phlegmonem, aut obturationem alicuius alterius partis cibi fastidium accidat, tum illius curationem adhibere convenit. Conandum vero vni, ut per odoramenta appetentiam reuocemus, aut vino odore diluto, aut malorum cotoneorum decocto, aut pyrorum. Inunctione item leni idem conabimur per olea, rosacei, mastichinum, & similia, ac moderata corporis frictione. Inseffus etiam lumbos & pubem amplectentes, adhibendi sunt. Cibi apparentur etiam plures & varii, ac optimo apparatu, & ultra dulcedinem quoque illicientes, & appetitum irritantes: frumentacei in primis generis, ac multi alimenti, velut alica ex decocto palmularum, ac prunorum damascenorum lota: ova sorbilia, & ex volucribus non graueolentes, & macræ, & montanæ: pedes suilli in decoctione plurimum eliquati. Eiusmodi enim cibos si gustauerint tantum, sufficiens alimentum deinde corpori afferent. Omnia vero quæ exhibentur eiusmodi esse convenit, ut facile deuorari possint. Quæ enim multa commendicatione indigent, iniucunditatem quandam afferunt, & appetitum evertunt. Nec negligendum, quin præter vnguenta extrinsecus etiam imponantur ventriculo cataplasmata ex palmulis, malis coroneis, absinthio, & similibus, item cerata ex eadem materia apparata, quorum etiam exempla e superioribus petenda erunt.

De appetentia canina. C A P. VII.

C A N I N A appetentia, quæ Græcis *κυνική ἀρεσία* dicitur, contrarium est amissioni appetitus vitium. Qui enim sic laborant, ii plures appetunt cibos: & cum appetitum cohibere nequeant, in ingerendis cibis modum excedunt: deinde multitudine eorum grauati, & assumptos cibos citra noxam ferre haud potentes, ad vomitum diuertunt. Postea rursus cibo se explentes, denuo ad vomitum reuertuntur, quemadmodum canes: unde etiam vitium hoc appellationem accepit. Fit propter frigidiorē ventriculi temperaturam, aut propter viciatos & acidos humores, qui os ventriculi mordent

Canina appetentia

Causa

& irritant. Quippe frigidi humores vitati, eo quod cogendo & constringendo os A
ventriculi vacuant, roſionem quæ ſuctioni proportionẽ reſpondeat, inducunt, cibo-
rumque appetentiam haud aliter quàm naturale pathema excitant. Accidit etiam
nonnunquam propter totius corporis immodicam diſſipationem, quæ aut caloris
vim, aut retentricis facultatis imbecillitatem ſequitur, vt copioſe lib. i. de Sympt. cauſſis cap.
3. Gal. monſtrat. Frigida ventriculi intemperies ex deprauata concoctione, inflatione,
murmure, ac egeſtionibus multis dignoſcitur, aliisque indi-
ciis ſuo loco commemo-
ratis. Acidi humores e ruſtu acido, multa-
que egeſtione & liquida admodum depre-
henduntur. Immodica diſſipatio ſi in cauſſa fuerit, atque ob caloris qui inſtar ignis ci-
bos conſumit, & cutem rarefacit, vim acciderit: tunc pauciores ventris egeſtiones
procedunt, quam pro eorum quæ ingeruntur modo ac proportionẽ, & quæ egerun-
tur ſicciora ſunt. Sin ob retentricis facultatis quæ cibis dominari non poteſt, imbe-
cillitatem prouenerit, tum eorum quæ fuerunt ingeſta, multa ſit deiection: Quod ad
curandi rationem ſpectat, frigida intemperies ad eum quem ſuo loco diximus mo-
dum curatur. Si vero ab acidis humoribus ori ventriculi impactis, ac veluti aqua in
ſpongiam immerſis, canina, atque adeo immodica appetentia, fiat, initio hiera picra
Galenii exhibenda erit. Hæc enim non tantum calefacere, verum etiam diſſecare, ac
repurgare, extrahereque ex profundo ori ventriculi infractos humores, & per aluum
inferne euacuare poteſt. Quin & robur ventriculo addit, vt ſubinde non facile nocuū
humorem ſuſcipiat. Quare ea ad vitioſos humores ventriculo impactos, vt ſupra et-
iam cap. i. præſentis libri a nobis commemoratum eſt, educendos, præſtantiffima eſt. C
Exhibeatur autem pondere drachmarum quatuor, ex vino cum aqua calida diluto.
Si vero puer hoc vitio laboret, qui ob amaritudinem bibere nequeat, in catapocia vi-
nam vel duas drachmas huius medicamenti digeremus, & forinſecus melle cocto
obolinentes deuoranda exhibebimus. Quum vero magna ex parte a pituita acida vi-
tium hoc accidat, iis vtendum cibis & medicamentis quæ hanc incidere, diſſecare, re-
purgare, & calefacere poſſunt: veluti ſunt allia, porrum, thymus, ſatureia, origanum,
pulegium, & quæ illis ſimilia exſiſtunt. Quapropter vacuatis initio vitioſis humori-
bus, hac tandem victus ratione vtantur. Panis non ſit recens, neque bene fermenta-
tus, cui etiam quæ urinam mouent admiſceantur: velut eſt aniſum, careum, cumi-
num, petroſelinum, & quæ eius generis exſiſtunt. Cibi ſint pingues, & oleoſi. Sorbi-
tiones itaque conuenient appetitum deſtruentes, veluti ſunt pul-
tes ex melle multo, & oleo plurimo, aur adipe anſerino, gallinaceo, aut ſuillo. Ex oleribus autem malua.
Cerebella item & pinguioreſ volucrum partes, piſciumque eodem modo, & omni-
no quæ appetitum auertunt, & ſatietatem inducunt, & quæ magno cumulo accepta,
modice alunt. Vinum autem iſtis recte datur copioſum, quantum videlicet bibere
poſſunt, ex eorum numero quæ impenſe calefaciunt: cuiuſmodi ſunt colore ſulua,
ſubſtantia tenuia, odora, adſtrictioniſque expertia. Hoc enim ventriculum excaſa-
cit, & humorem deſtruit acorem, vt ſæpe ſolum ſuffecerit cum pinguibus & oleoſis ci-
bis ad perfectam curationem: ita vt rectiſſime ab Hippocrate dictum ſit, Famem vini
potio ſoluit. Exhibendum vero tam ieiunis, quam iis qui cibum ſuſerunt, etiam ſi
non dum ſitierint. Ieiunis tamen calidum aut certe tepidum. Abſtinere autem opor-
tetur ab omnibus acidis & adſtringentibus cibis ac potibus, maxime vero a fructibus.
Bellaria eorum ſunt, piſtacia, amygdalæ, nuceſ pineæ, & oliuæ ex melle. Lac etiam i-
pſis exhibendum tum per ſe, tum cum paſſo aut melle: ita tamen vt obſeruemus ac
vitemus in eis, quibus in ventriculo acereſcere conſueuit. In iis enim maius nocumen-
tum, quam vtilitas conſequetur. Probe vero concoctum non ſolum appetitum ob-
tundit, ſed & aluum obturatam emollit, fluxioneſque eius ſiſtit. Apparandæ etiam ex
ipſo lacte portiones & placentæ: vt ſunt dulciaria, & oryza, cum lacte decocta exhi-
benda. Lauare quoque per interualla oportet, cuticulamque ipſorum large pingueſa-
cere. Iſto quidem curationis modo tantisper vtendum a malo penitus liberetur æger. F
Si vero ex immodica diſſipatione, ac tranſpiratione canina appetentia oritur, tunc
eorum qui hoc modo patiuntur eutem denſare, ac ſpiſſiorem reddere conuenit, cum
oleo ex immaturis oliuis expreſſo, aut roſaceo, aut myrtino, aut alio in quo quippiam
adſtringens ad lentum ignem decoctum ſit, interim eis admiſto alumine ſciſſo in ace-
to prius

Signa.

Curatio.

Si ex acidis
humori-
bus.

Victus.

2. Aph. 11.

Si ex immo-
dica diſſi-
patione.

to prius

A toptus acerrimo trito. Quæ etiam optima ratione æger in aere frigido ac perspirabili versabitur. Fugiat vero aerem calidum, & balnea consimili qualitate prædita, vitæ potum, & omnia quæ tum extrinsecus, tum intrinsecus calefacere possunt. Potus autem sit aqua frigida, aut cinnamomi decoctum. Ducatur æger ad lauacrum frigidum, si quidem nihil id fieri prohibeat: utpote corporis gracilitas, aut pars aliqua corporis refrigerata, thorax (verbi gratia) aut alia quæpiam. Cibi eis exhibendi sunt stabiles, & ægre corruptibiles: ut sunt cochleæ, & totum genus testaceorum, si ex durum aquarum reitærata decoctione apparentur: carnes item suillæ in vigore existentes, maxime vero ventres. Bubulæ quoque pinguiorēs, & omnia simpliciter pingua, & quæ ventriculo innatant, tardeque concoquuntur ac distribuuntur. Sunt enim qui sic afficiuntur, quandoquidem ipsi calor acris ac mordax, & ut quisquam dixerit, febriculusus inest, ex eorum numero, qui minori negotio bubulas carnes, aliaque concoctu difficilia, quam saxatiles pisces, similiaque concoctu facilia conficiunt, ut *fulius in præfatione libri primi. De alimentorum facultatibus Galenus docet.* Ex ouis, ea quæ coquendo sunt indurata, aut sartagine frixa conueniunt. Similago absq; melle ex pinguib. insculis apparatus, similiter oryza cum butyro decocta, & panes non fermentati. Iuxta portionem autem quantum vitium imminuitur, tantum ex crassi humoris cibis est detrahendum, & ex adstringentibus forinsecus admotis immittendum. Aliquando enim sedata vehementis appetentia accessione, quum corpus crudis & crassis humoribus repletur, in aliud grauius malum transitio fit. Inter adstringentia vero, præter ea, quæ supra dicta sunt, illius vnguenti vltus esse poterit, quod habet. *Oleorum myrtæ, & cotoneorum, utrorumque vinctam dimidiam. Olei rosacei, unciam unam. Succu plantaginis, drach. duas. Santalorum, purpureorum, massiches, bistortæ, rosarum purpurearum, sing. drach. unam. Boli armenii, scrupulos duos. Hypocisthidis, acacie, sanguinis draconis, singulorum scrupulum unum.* Certe quod satis est, formetur vnguentum.

Qui bubulas carnes minores negotio concoquunt.

Vnguentum adstringens.

De Bulimo: Cap. VIII.

Bulimonia Græcis nihil aliud est, quam ingens vehemensque fames, & etiam particula aliis vocibus adiecta, significationem eorum auget. Fit ex ventriculi frigiditate, indigentiaque, & vitium imbecillitate, & fere in totum ab externo frigore initium capit. Siquidem peregrinationes multæ, & longa itinera, maxime per niuem facta, vitium hoc inducunt. Dignoscitur hac ratione: fames initio multa adest, quæ tamen non usquequaque perdurat. Nam postea repente animo linquuntur ægri, cum extremarum partium refrigeratione, & spiritus defectione. Hinc est, quod a canina appetentia differat, quæ sibi famem perpetuo adiunctam habet. Porro huic vitio statim adhibenda curatio erit, quod sint qui in locis desertis, aut in balneo eo correpti, auxilii facultate destituti, confestim perierint. Quare eos qui in itinere, aut alias fame magna citra febrem infestantur, resouebimus aceto, aut pulegio, ad odorandum exhibitio, aut terra quæcunque tandem contigerit aceto conspersa, aut malis, aut pyris, aut similibus aliis fructibus, qui ad manum fuerint. Auxiliatur & panis recens, naribus admotus, & caseus boni odoris, caro suilla assata aut cocta, & in vinum omne quod multum alit, & ventriculum calefacit: maxime vero quod n. dorosum ac probe conditum, sufficientemque odorem habet. Per huiusmodi enim odores, tales ut plurimum refocillantur: quum nihil sit, ut diximus libro 2. cap. De syncope, quod odore citius vires reficere possit. Ceterum extremæ etiam eorum partes fasciis constringendæ sunt, manuumque ac pedum summitates calidæ aquæ feruentiori imponendæ, ipsique tum maxillarum punctura, tum capillorum, & aurium vellatio excitandi. Reuocatis vero iam ab exsolutione, panem ex vino diluto, aut aliud quippiam eorum quæ acuatim vires reparare possunt, offeremus: velut sunt oua sordilia, alicæ cum vino. Compendiosissimum enim auxilium, inquit *Actius*, ex cibo sperare possunt: que etiam si oblatum assumere non possunt, ori indere oportet: violentius, cogereque ut ipsum deglutiant. Euestigio enim & a fame, & ab animi deliquio liberantur, & celeriter excitantur. In hunc quoque usum conueniunt antidota ex odoramentorum varietate composita, ut est *odoratum rosaceum, diambæ, diacanthon, diamoschi, alipta moschata, & id genus alia.* Quod si in febris (quod tamen raro accidit) bulimonia inuaserit, atque circa exacerbationem febrilium declinationem

Bulimonia Causa.

Curatio.

eius accessio irruerit, intrepide cibi, quos diximus, sunt offerendi. Si vero in principio accessionis, aut in vigore acceiderit, per odora menta prædicta reuocandi sunt ægri, maxime per ea quæ sunt frumentacei generis: velut est polenta aqua madefacta, aut panis calidus nidorem adhuc emittens, fictio quoque extremarum partium adhibenda, & cataplasmata ex palmulis, aut malis cotoneis in vino diluto decoctis. Atque hæc usque ad remissionem facere oportet, ut opportune cibum offerre liceat. Quod si ex iis nihil melius habeant ægri, audendum est per ciborum ingestionem auxilium adferre. Cremorem itaque pisanæ, aut buccellas viam & item alteram vino albo & tenui madefactas exhibebimus. His enim refocillati, ac ex improviso respicientes, deinceps usque ad remissionem perueniunt. Vitabimus autem omnino in iis qui hoc vitio sunt apprehensi, longiorem cibi dilationem ac inediam. Verum solerti ratione facta, singulis horis simplicissimum modicumque cibum dabimus. Assiduus enim bulimos & exoluit, & animi deliquia, ut dictum est, affert, quibus ægre auxilium reperitur. Quod autem in ipsa etiam accessione liceat ægrotantes nutrire & cibare, pereleganti historia Galenus lib. 10. Ther. meth. cap. 3. ostendit, ubi multa quoque ad institutum facientia offendunt studiosi.

De cruditate. CAP. IX.

CRUDITAS, quam Græci *Ανρίσια* vocant, ubi cibi in totum non permutantur. Causæ eius intemperies ventriculi, phlegmones, scirrhī, abscessus, & quæcunque eius generis existunt. Aliquando autem ventriculo nequaquam male affecto cibi crudi permanent: aut propter immoderatam ciborum ac potum ingestionem, aut ob vitiosam ipsorum ciborum qualitatem, aut ex intempestiua, aut etiam inordinata functione, aut ob recrementum vitiosum, aut somnum breuem, quemadmodum Galenus lib. 3. De symptomatū causis capite, copiose docet. Causarum diuersitas partim ex ægri & assidentium sermonibus, partim etiam ex indiciis certis deprehenditur. Ex sermonibus ægrotum & assidentium cognoscantur immodica ciborum & potionum, itemque intempestiua & inordinata ingestio, somni quæ breuitas. Vitiosæ autem ciborum qualitates, e nidoribus & ructibus. Corruptiones enim nidorosz in calidioribus & biliosioribus, acidæ vero in frigidioribus natura, & magis pituitosis fiunt. Eodem modo & de excrementis, quæ in ventriculo præexistunt, iudicandum erit: quæcunque enim ex eis pituitosa & frigida sunt, acidæ corruptiones efficiunt: quæ vero calida & amara bile mixta, nidorosa. Ipse quoque ventriculus aliquo modo male affectus, si quidem frigidus morbus existat, acidæ permutationes facit, calidus vero nidorosa. Quum vero citra corruptionem perfecta cruditas oboritur, ut quales assumti sunt cibi, tales permaneant iuxta omnem suam qualitatem: ex hoc cognoscere datur vitium esse ventriculum, aut ab immoderata ciborum quantitate, aut per vehementem insiti caloris refrigerationem. Vt ne quis igitur in cruditatem incidat, cautione in omnibus prædictis est utendum, ut neque in multitudine, neque in qualitate eorum quæ in cibo accipiuntur, neque in acceptionis opportunitate, neque in ordine delinqua: & ut quæcunque concoquere valeat, ea tantum ingerat, & non quæ appetitus exposulat. Mensuræ itaque maxime omnium diligentem curam habere oportet, appetentiamque refrenare, & neque plus quam vires tollerant, assumere. Ordinem etiam præposterum cauere oportet, ne scilicet malæ cotoneæ, aut punicæ, aut aliquid aliud tale in primis ingerat: deinde vero oleræ assumant ex oleo & garo, aut etiam alia quæ aluum emolliunt. Intempestiuam quoque assumptionem cuitate conuenit, ne scilicet antequam vel ipse modice fuerit exercitatus, vel hesternus cibus probe descenderit, prandeat, aut etiam præter consuetam horam. Fugienda etiam omnia quæ natura difficulter concoquuntur, veluti sunt carnes natura duræ, bubulæ nimirum, & ceruinæ: aut ætate, ut sunt omnia seniores. Cauendum etiam a pinguibus, salisque condimento seruatis, ac vetustis. Ex oleribus quæ calidioris sunt naturæ, valdeque frigida: item quæ flatu pariunt, incommoda existunt. Ex piscibus qui duras carnes habent, & repositione arefacti. Abstineant quoque a cibis corruptis, & foetidis ac graue olentibus. Vitent fructus dulces, aut flatu generantes, & immaturos. Bellaria item quæ difficulter concoquuntur. Non minus autem vitandi cibi peregrini & inconfueti, ac medicamentariam vim habentes, quales frequenter placen-

Aplacentis ac panibus immiscantur. Iuxta tempus vero accipiendi cibi neque impetuose, neque aceruatim, neque solidis partibus, aut absque commanducatione eos ingerere oportet. Neque etiam potus cibum interpellet: id enim vnitionem ciborum impedit, singulosque innatare facit. Post assumptum cibum, motus inæquales ac conturbantes vitandi, item æstus & refrigeratio: hæc enim concoctioni ciborum resistunt. Adiuuant autem eandem, calefactio hypochondriorum, & frictio pedum. Quod si grauitas adsit circa ventriculum, & ex ea molestia quædam in vniuersum corpus diffundatur, ex passa manus os ventriculi apprehendendum est, ut puerulus carnosus ad-mouendus. Confert siquidem amplius Galeno *lib. 5. De simpl. med. facul. cap. 5. auctore*, magisque multo familiaris est eo calore, qui a fomentis paratur. Eiusdem utilitatis

Bgratia, quidam paruos catellos per quietem ventri imponunt, copiam coquentis cibos caliditatis adaugentes. Somnus etiam nocte imperturbatus & æqualis procurandus. Adhæc erectior decubitus apparetur, & ea quæ capiti subiciuntur sublimius insternantur, & reclinatio ipsa in sinistrum latus fiat: atque si quis vigilis infestetur, citra corporis vexationem commotionemve permaneat, eandemque decubitus formam obseruet: frequentes enim agitationes cibos perturbant, intestinaque inflata reddunt. Curandi ratio pro causarum diuersitate variatur. Aliam enim intemperies Curatio. ventriculi calida, aliam frigida requirit. Aliam item phlegmone, aliam scyrrhus & abscessus, quas omnes e propriis capitibus petent studiosi. In præsentiarum hæc dixisse satis sit: quum iniucundus ructus proueniens manifeste ciborum corruptionem

Cesse factam indicat, citra cunctationem; modo suapte natura æger facile vomere possit, ad vomitum veniendum erit, atque aqua copiosa tepida paucò serapio acido permixto, ingesta, omnia corrupta ad excretionem cogenda. Si enim in ventre permanserint, & torsionum, & grauitatis capitis causa existunt. Aliquando autem bilis superne ac inferne effusionem aut profluuium ventris, aut etiam febres inducunt. Quare Vomit. eos qui difficili concoctione apprehendi solent, longo ante tempore ad suæ faciemus ut facile vomant: commodissimus enim in plurimis periculis existit. Quod si quis natura difficulter vomat, & ob nullam causam male dispositus sit ad frigidæ potum, non inconueniens erit cyathum vnum aquæ frigidæ puræ absorbere. Corroboratus enim ventriculus celerrime quæ in ipso hærent extrudit, & ad subiectas partes demittit. Sequenti deinde die in quiete æger afferuetur, frictionibusque pedum utatur, & hypochondriorum concalēfactione, donèc murmura & flatus circa intestinum re-ctum eruperint, eructationesque cum qualitate mansuetiori recurrerint. Et tunc sane exurgere conuenit, ut primum alius ea quæ corrupta sunt egerat: deinde ad deambulationem moderatam æger procedat, atque ocium agat, propter commotos vapores ex corruptione in caput delatos. Posthæc autem ad quotidianas actiones mens applicanda est, citra perturbationem ac indignationem. Deinde rursus venter cogendus est ad eorum quæ relicta sunt excretionem. Postea quiescere iuebimus, atque aqua calidiore pedes perfundere ac fouere: frigida vero pura, facie proluta, in lecto quiescere, omnibus conatibus somnum illiciendo. Post quem in modica deambulatione, deinde balneum suscipiatur. A balneo cibum capere conuenit moderatum, & cui concoquendo corpus sufficit. Non prætereunda tamen sunt medicamenta, quæ concoctionem iuuare possunt: veluti est piper, maxime longum, quod vnice concoctionem adiuuat. Si tamen id ipsum non adsit, albo utendum erit: quod si neque hoc adsit, nigro. In eundem usum antidotus diacotoneon conuenit, & diospoliticum Galeno & aliis veteribus dictum. Sunt etiam alia tum simplicia tum composita ventriculum roborantia intra & extra corpus exhibenda, quæ in superioribus capitibus recensuimus. Debent autem omnia hæc medicamenta, potissimum quæ oxypora, Oxypora quando danda. hoc est, cito penetrantia, accipiunt, ut sunt *careum, feniculum, apium, ligusticum, petroselinum, ammi, piper, zingiber, & similia, duabus antecibum horis dari*. A cibo vero nunquam

Fallumenda: distribuitur enim simul cum ipsis aliquid crudorum ciborum, & obstructionem operatur. Quare usus illorum maxime sit post matutinam frictionem, & duabus ante exercitium horis.

Causæ.

VENTRICVLVS ex flatibus in eo generatis inflatur, vocaturque vitium hoc

Græcis πνεύματος παρὰ τὸν καὶ ἀφύσθημα. Generantur autem ex humoribus in ipso pituitosis, aut ex cibis in vapores per deficientem & imbecillum calorem resolutis. Etenim absoluta frigiditas nullum omnino flatum efficit: propterea quod neque extenuare, neque conficere, neque dissolvere cibum possit. Vehemens autem calor, magna ex parte vincens ea quæ comprehendit, plus quam pro vaporis generatione cibum extenuat, nisi is suapte natura facile in statum transeat, verum flatu ita genitus & turbidus erit, & nebulosus: quinetiam paucus, & parum duraturus, ut ad vnum aut alterum ructum statim euanescat. Calor vero in cibos agens, si parum validus fuerit, ut eos quodammodo dissolvit, ita non omnino conficit: unde sane flatuum generationem fieri

Signa.

necesse est, ut copiose lib. 3. De symptom. causis cap. 7. Galenus docet. Accedit ita laborantibus ventriculi gravitas & distentio: aliquando etiam tumor & eminentia quædam iuxta os ventriculi, & ipsum adeo ventriculum efficitur, ructusque inanes fiunt modice allevantes, inhibitoque flatuum qui per aluum excerni consueverunt. Malum etiam ipsum aliquando quidem iuxta totum thoracem, aliquando vero retro iuxta spinam ac dorsum ipsasque vertebrae irruit: sæpe autem & utrinque occupatos tenet. Ultra hæc vehemens difficultas spiritus ob septi transversæ compressionem adest, ut aliqui non dissimile quiddam suffocationi se perpeti æstiment. Leuantur autem cibo inferne

Curatio.

subeunte, & flatibus siue per ructus, siue per aluum exclusis. Murmura denique intus audiuntur. Si itaque ex cibis pituitosis sit ventriculi inflatio, victus sane ratione extenuante utendum erit, & medicamentis iis quæ pituitam dissecant & vacuant, de quibus cap. primo huius libri diximus. Sin ex deficiente & imbecillo calore orta fuerit inflatio, cibis certe utendum erit concoctu facilibus, & boni succi. Parum etiam comedendum: siquidem inedia huic vitio summe confert. Post omnem cibum, vinum meracius exhibendum. Multum tamen potum, tanquam infestissimum hostem devitent. Fructuum quoque atque olerum humidorum, dulciumque omnium esum, semper suspectum habeant. Soliis etiam calidioribus utantur: hæc enim Paulo lib. 1. cap. 51. teste, mitigant, emolliunt, flatu ubique fuerint, dissolvunt, somnumque conciliant. Vbi vero somnus accesserit, non parum leuat ægrotantes, quod scilicet concoctionem mirifice iuvet. Ceterum quod ad medicamenta ipsa attinet, bibant hoc deco-

Solia calida.

Decoctum.

coctum, quod habet: *Calamintha, mentastri, chamæmeli, origani, mentha, pulegii, singul. manipulum unum. Absinthii, manipulum dimidium. Seminum anisi, apii, cumini, dauci, petroselinii, fœniculi, sing. drach. tres. Seminis urticae, carei, utriusque, drach. duas. Radicis helenii, unc. duas.* De-coquantur in aqua iustæ quantitatis, donec tertia pars absumatur: dein transfundantur, adiectoque saccharo sufficienti ius decocti dulce reddatur, addanturque serapii de calamintha unc. tres, & fiat potio, de qua æger in aurora singulis diebus sumat unc. quatuor.

Tritura.

Vel utendum medicamento hoc quod accipit: *Specierum dianisi, diacumini, diacalamintæ, sing. scrup. duos. Seminum anisi, carei, dauci, fœniculi, singul. scrup. unum. Cubebarum, garyophyllorum, utriusque, scrup. duos. Zingiberis, scrupulum unum. Piperis, drach. unā. Sacchari, lib. dimidiam.* Mi-

Glandes.

isceantur singula & fiat tritura, vel ut barbari loquuntur, drangea. Eos qui non ita diu ante cibum sumperunt, primum vomere oportet, Glandes quoque confidenter & citra dilationem supponendæ sunt, ex rebus flatu prolestantibus, in hunc vel similem modum formatæ: *Mellis cocti, uncias duas. Seminum rutæ, cumini, fœniculi, singulorum scrupulum unum. Seminis carei & anisi, utriusque drachmam dimidiam. Salis scrupulos duos. Mi-*

Clyster.

isceantur singula, & fingantur glandes. Aluo autem vehementer adstricta, clyster infundendus, qui accipit decocti paulo ante descripti libram unam, *Benedictæ laxativæ, drachmas septem. Oleorum absinthii, rutæ, anethini, singulorum unciam unam. Pinguedinis anseris & gallinæ, salis expertium, utriusque drachmam unā & dimidiam. Salis vulgaris, drachmam unam. Com-mixtis omnibus, fiat clyster.* Extrinsecus venter in hoc vitio cum oleis iam dictis inungendus erit: aut lana in fasciculum conuoluta, oleis prædictis leuiter calidis madefacta, imponenda. Lanæ vero sic conuolutæ, cuminum tritum, aut apii semen, aut anethi inspergendum. Perseuerante autem diutius malo, cataplasmata ex semine lini, hordeaceaque & loliacea farina, cumino, anethi semine, aut apii, aut fœniculi tritis, centaurii coma, & id genus aliis parata, imponenda. Aut hoc ceratum, quod habet: *Olerum rutæ, anethini, nardini, laurini,*

Ceratum.

A Laurini singulorum unciam unam. Farina seminis lini, fenograci, utriusque drachmam unam & dimidiam. Seminis apii, carei, melanthii singulorum drachmam unam. Baccarum lauri, centaurii minoris, utriusque drachmam unam & dimidiam. Gummi ammoniaci, opopanacis, utriusque drachmas duas. Ceræ & resinę quod satis est, fiat ceratum. Porro cucurbita bohe magnitudinis umbilicum undique comprehendens, cum flamma copiosa admota, præsidium in hoc vitio est quod incantamenti cuiuspiam simile, Galeno etiam lib. 12. The. metho. id ipsum testante, efficit. Castoreum quoque ex posca potum, tum extrinsecus cum oleo anethino appositum, prodest.

Cucurbita.

De singultu. C A P. XI.

A ^{τρυγίς} Græce, singultus Latine, est motus ventriculi violentus, qui est veluti eius convulsio, Singultus quid. **B** ab expultrice facultate noxia volentis extrudere excitatus. Neque temere adiectum est, Singultus non convulsio ventriculi. ^{causæ} veluti eius convulsio: Neque enim absoluta convulsio est, hæc enim solis musculis inesse solet. Atqui neque ventriculus ipse, neque ipsius ostiolum musculus est, ut copiosius Galenus libro 3. De sympt. causis cap. 2. ostendit. Accidit magna ex parte, vel ex plenitudine, vel inanitione, Hippocrate etiam teste, qui sic scriptum reliquit: Convulsio fit vel ex plenitudine, vel inanitione: ita vero & singultus. Interdum etiam fit ob acrium humorum, & medicata qualitate præditorum, mordacitatem. Cibus quoque in mordacem qualitatem mutatus, atque adeo corruptus, aliquos singultire facit, Frigiditas etiam oris ventriculi, & alimenti corruptio singultum inducunt: quo sane nomine pueris omnium maxime frequentes singultus eueniunt. Fit denique in febribus singultus, stomacho præsertim, aut aliquo alio viscere phlegmone obfesso: Causæ externæ facile de sermonibus ægri & assidentium cognoscuntur. Plenitudo ex gravitate, inanitio autem ex iis quæ præcesserunt. Cibus corruptus e nidore eius: acria vero ex vellicatione atque erosione. Singultus itaque ubi a frigidityte ortus fuerit, oleum in quo ruta, cuminum & absinthium decocta sint, lana exceptum, ventriculo imponendum. Oleum etiam mastichinum, & e castoreo inunctum prodest. Pueros calefactorum linteorum admonitio non raro iuvat. Adultioribus & integræ ætatis in potu vinum, aut apium in aqua mulsa decoctum, aut cuminum tritum, aut asarum, aut pulegium, aut dictamnus, aut nardus celtica; quodlibet eorum per se, aut simul mixta in aqua mulsa decocta exhibeantur. Utile & acetum scylliticum, sorbendo acceptum. Castoreum etiam **D** iis, tum ob frigiditatem singultientibus, tum ob humorum multitudinem similiter affectis, drach. pondere ex posca dandum. Quin & ventriculo extrinsecus impositum, utrisque commodum existit cum oleo antiquo. Præterea qui ob frigiditatem singultunt, iis spiritus retensio, quæ calorem augeat, quemadmodum copiose lib. 2. De sympt. causis cap. 6. Galenus docet, præsens est remedium: Quando vero ex plenitudine oboritur singultus, vomitus optimum remedium fuerit. Crassis autem humoribus existentibus, cum oxymelite scyllitico, & calaminthes marrubii, ac similium iam sæpius commemoratorum decocto extenuandi & incidendi erunt. Deinceps ea, quæ in contrarium humorum copiam trahunt & auertunt, sunt adhibenda. In quem usum conveniunt ea quæ per inferna purgant, potissimum vero clysteres, extremarum partium frictio **E** & constrictio, cucurbitulæ cum plurima flamma thoraci, ventriculo, & dorso affixæ. Convenit etiam iis deambulatio longa & concitata, gestatio, atque adhuc magis equitatio. Præterea sternutatio etiam convenienter eis concitatur. Nam Hippocrate teste, a singultu comprehensum sternutatio superueniens liberat. Quando enim a plenitudine fit singultus, violento opus est motu, ut veluti concussæ ipsum efficientes humiditates, diffentur atque vacuentur. Sic quoque vociferatio concinna cum plurimo clamore, & detentio spiritus illis conferunt. Ventriculus denique per medicamenta quæ intrinsecus & extrinsecus adhibentur, roborandus erit. Intrinsecus per antidota corroborantia, de quibus lib. 2. De comp. med. cap. 5. abundè diximus. Extrinsecus vero vnguentis, emplastris & ceratis antea productis. Porro singultus ex vacuatione sanatur per alimenti convenientis assumptione, & per ea quæ defectum explent: quæ partim sunt supra dicta, & copiose infra in curatione hæticæ febris dicuntur. Non mediocriter autem in hoc genere singultus conducit, vertebrae cervicis & dorfi humectante oleo, nempe violaceo & amygdalarum dulcium perungere. Ceterum mordacibus rebus singultum excitantibus, primum sufficiens remedium vomitum

Singultus quid. Singultus non convulsio ventriculi. Causæ. 6. Aph. 39.

Signa.

Curatio singultus ex frigiditate.

Singultus ex plenitudine curatio.

Auctus.

6. Aph. 13.

Singultus ex vacuatione curatio.

Singultus ex mordacitate curatio.

Pilula um
de cyno-
glossa vsus.
ipsum reperiemus: deinde sensus etiam stupefactionem, & morsum inferentium alte-
rationem. Stupefiunt autem sensus per refrigerantia: in quem vsus *Philonium* exhi-
beri potest, aut pilulæ de cynoglossa, quæ in hoc vitio mirifice conferre solent. Ea-
rum vero is vsus erit. Debent ex vna drachma confici sex catapotia, quorum vnum
antequam cubitum eat æger, sumat. Alteratur autem mordacitas & disleuitur per ob-
tundentia, attenuantia & exsiccantia medicamenta. Obtundit autem mordacitatem
intybi sativi succus potatus, cucumeris semen decorticatum, tritumque bibitum. Lactuca semen eo-
dem modo sumtum. Item *portulaca succus potatus, ipsaque portulaca in cibo sumta. Myxarum*
etiam decoctum in potu acceptum. Maxime tamen omnium præstat *lac asininum*: aut si hoc
non adsit, *bubulum, recens mulctum, potatum.* In eundem vsus exhibendum *saccharum*
rosaceum, aut violaceum, aut nymphaea, antidotus diarrhodon, diatriopsantalum, zalapium viola-
ceum, nymphaea, & eiusmodi. Obtundit vero, attenuat, & exsiccatis pastillus, qui accipit:
Costi, croci, spicanardi, rosarum viridium, massiches sing. unc. dimidiam. Asari, aloes, utriusque
drachmas duas. Opii, drachmam unam. Cum succo psyllii fiant pastilli, de quibus detur
drach. dimidia aut drach. vna. Porro *opium, & rosa & psyllii succus* ex refrigerantium
genere existunt, ideoque acrimoniam obtundunt. *Nardi autem spica* ex discutien-
tium & corroborantium. *Asarum* vero, per vrinas vitiosos deducit humores. *Aloe*
vitiatos humores expurgat, & inferne per ventrem propellit. *Crocus* concoquit, &
particulas corroborat: per temperamentum quidem caliditatis concoctionem effi-
ciens: per adstringendi vero vim, quæ ipsi adest, robur addens. *Costus* autem sufficien-
ter calefacit, moderate vero adstringit, quod & ex gustu eius percipitur. Commendat
hoc medicamentum pluribus verbis Galenus libro 8. De compos. medic. secundum locos, cap.
3. estq; ordine decimum tertium.

De cholera. C A P. XII.

Cholera.
Cholerici.**Causæ.****Signa.****Curatio.**

XOXIG Græcis, cholera Latinis etiam appellatur, est *ventriculi immodica perturbatio, in-*
fra & supra per vomitum facta. Barbaram sectantes medicinam, cholicam & cho-
liricam passionem nominant. Qui hoc malo afficiuntur, Græcis *χολεικός*, & Latinis
cholericus vocantur. Accidit ob multam cruditatem, quæ nonnunquam e magna ali-
mentorum, peponum nimirum, pinguium, dulciumque prauitate & corruptione, in-
terim etiam ex vitiosorum humorum copia oritur. Signa quibus vitium deprehendi-
tur, manifesta admodum sunt: nam infra supraque excernunt. Sitis etiam sequitur, &
sudor, & pulsus concisus, musculorumque manuum ac pedum, maxime vero surarum
contractio & tensio. Quapropter cum hoc vitium acutissimum sit, & grauissimam
syncopam, si paulo diutius durer, inducat, accurata opera danda erit, quo confe-
ctum & sine mora huic succurratur. Nemo autem Medicorum, vbi copia vitiosorum
humorum vitium hoc conciliauerit, mox initio, aut confertim ea, quæ effertur
cohibere aggrediatur: inutilia enim cum sint, vacuatione indigent. Quare si nausea-
bundus est æger, & turbatur, cibis etiam num crudis in ventriculo manentibus, a-
quatepida propinari debet: deinde vomere, modo ad vomendum non sit difficilis,
oportet, digito vel pinna ori indita. Neque tamen cum aqua mulsâ, neque aqua cum
oleo mixta vomitus citandus: quod hæc fluxiones augeat, illa vero mordacitatem
operetur, & torsiones augeat. Adiuuare etiam oportet per inferna excretionem:
alienum enim velut venenum insidens, & ventriculum ac intestina rodit, & humo-
res ex vniuerso corpore attrahit. Propinanda vero sunt leuissima medicamenta
purgantia, ut est *aloe, castia fistularis, myrobalanorum decoctum, & similia.* Postquam autem
superuacua educta fuerint, tum quiescere oportet, atque hypochondria oleo ma-
stichino, vel nardino, vel absinthite fouere conuenit, somnumque accersere. Præ-
dictis oleis admiscenda interdum alia quæ ventrem roborare possunt, de quibus su-
pra dictum est, & ex iis conficienda vnguenta. Vbi iam exacta apparuerit concoctio,
balneo aquæ dulcis, & cibis boni succi vtendum est. In quorum numero est *insculum*
pulli gallinæ cum omphacio. Carnes auicularum montanarum, perdicum, turdotum, & simi-
lium, oua sorbilia, & eiusmodi. In potu vtendum succo malorum granatorum, aut sera-
pio rosaceo, aut aqua in qua chalybs ignitus ter aut quater extinctus sit. Ceterum
cum malum perseuerauerit, & gracilitas per ambitum corporis fiat, & maxime si ven-
ter confidat, pulsus minor densiorque euadat, tunc sane plus adstringentia, veluti
mespi-

A mespila, sorba, cytonia, & corna dure, & extremas corporis partes vinculis adstringere, ac oleo multo impinguare oportet. Cataplatmata etiam & emplastra ex adstringentibus & roborantibus composita ventriculo imponenda. Sunt autem eius farinæ quæ ex palmulis, hypocisthida, acacia, rhoe obsoniorum; bolo armenio, thure, balaustis, rosis, ac myrti fructibus componuntur. Efficax quoque remedium est, si linteum in sicco malorum siluestrium madefactum ventriculo imponatur; aut hoc ceratum, quod habet: Oleorum rosacei, myrtini, cotoneorum, singulorum unciam unam. Massiches, thuris, acacia, singulorum drachmas duas. Hypocisthidis, drachmam unam & dimidiam. Santalorum alborum & purpureorum, drachmam unam. Balaustiorum, sanguinis draconis, utriusque drachmam dimidiam. Boli armenii, drachmam unam. Ceræ & resinæ quod satis est, informetur.

Scutum
quod vo-
cant sto-
machi.

B tur ceratum, quod ventriculo adhibeatur serico obductum. In potu vero frigida aqua cyathi mensura, hoc est, uncia una & dimidia, absorbenda præbeatur. Cauendum tamen ne nimium frigida sit. Hæc enim aceruatim exhibita reuomitur, & aliquando innatum calorem suo stupore extreme offendit, aut phlegmonem stomachi, aut visceris alicuius efficit. Instilletur vero huic interdum mali punici acidi succus exiguus, aut rosarum, aut pampini vitis decoctum. Quod si acriora sint ea, quæ excernuntur, vexetque sitis & ardor, cucumeris semen cum aquæ cyathis tribus præbeatur. Datur quoque vtiliter cum amylo. Tum etiam intybi & lactucæ in posca coctæ exhibeantur. Post vero somnus procurandus & quies omni modo. Verum si fluxio sisti nequeat, & pulsus intercidatur, apprehendatque frigiditas & sudor, ali-

Cyathus
quid.

C quando etiam singultus, ad vinum transeundum est mediocriter adstringens, neque viribus validum, dulce tamen, non autem odorum. Interant autem in ipsum calidum, si fieri potest, si vero non, frigidum, micæ panis: aut alicam iniiciant, atque ita paulatim & per interualla absorbeant. Vini tamen multitudo vitanda est, ac omni arte conandum ut ipsos sopiamus, erosus, pampinis, rubo, & similibus antea sæpe dictis, domus pauimento confrato. Odoramenta quoque naribus admoueantur, rosæ, mala cotonea, & eiusmodi. Illitiones etiam soporiferæ, circa frontem adhibeantur. Alio autem adhuc egerente, amyllum cum decocto capitum papaueris per clysterem infundatur: simul enim & cohibet & refrigerat, & somnum inducit. Ad vomitiones vero coercendas succum mespilorum, malorum cotoneorum, punicorum, pyrorum

Vomitus
constrictio

D commanducare & deuorare conuenit. Si ne his quidem auxiliis, & aliis quæ supra cap. 2. huius libri exposita sunt, cibum retinent ægrotantes: extrinsecus ventriculo cucurbita leuis quam maxima admoueatur. Ad contractiones autem in musculis factas, linimenta oleo calido imbuta musculis circumponere oportet; & cerata humida seu vnguenta, quibus adiectum sit aliquid castorei, & olei irini, quorum copiam cap. De resolutione & conuulsione offendes. Vbi malum inclinauerit, cibis reficiendi sunt ægri, pullis gallinaceis, columbis, gallinis, perdicibus, palumbis, turdis, & consimilibus.

Ad contra-
ctiones in
musculis.

De diarrhæa. C A P. XIII

Δ ^{ἰατρίᾳ} Græcis, Latinis vero diarrhæa, copiosum est sine exulceratione & phlegmone alui profluuium. Accidit propter imbecillitatem instrumentorum concoctioni seruientium, alimenta item copiosa humidiora & viscosiora, eorundemque corruptelam, mordicationem denique in ventre contentorum, & defluxum quorundam e supernis ad ventris spacia, imbecillitatemque retentricis facultatis. Notæ quibus discernuntur causæ, manifestæ admodum sunt. Si enim propter imbecillitatem diarrhœa sit instrumentorum quæ concoctioni seruiunt, ventriculi (verbi gratia) intestinorum, iocinoris & lienis, ex propriis de iis capitibus petenda signa erunt. Sin ob alimentorum prauorum multam ingestionem accidat, partim de ægri sermonibus, partim etiam ex iis quæ excernuntur, cognosci potest. Si enim biliosa fuerint, flavo colore infecta erunt, neque citra mordicationem & caloris sensum eiicientur. Aderit etiā oris amaritudo, sitis, tenuis corporis habitudo, & alia quæ biliosam constitutionem ostendunt. Si autem pituitosa fuerint, contraria iam dictis prorsus erunt ea quæ per aluum excernuntur. Quod si a capite in ventrem confluerint humores, egestionem spumosa apparebunt, cerebrique temperies humida admodum erit. Si a plenitudine totius corporis oriatur aut iudicatorius sit alui fluor, signis quæ in aliis locis a nobis commemorata sunt, & a Galeno in lib. De plenitudine, & crisi deprehenduntur. Ce-

Diarrhœa
Causæ

Signa

Curatio

14 Operum Leonhard Fuchsi Pars. III.

Alui pro-
fluum nō
temere si-
stendum.

terum si ab imbecillitate instrumentorum alui profluvium excitabitur, intemperies A
quæ hanc ipsam parit, suo contrario, quemadmodum *cap. x.* huius libri monstraui-
mus, corrigenda erit. Si autem propter alias causas fluere alui laborauerit, & natura per
hunc quæ noxia & superuacua sunt in corpore expellere tentauerit, & ii qui eo cor-
repti sunt facile tolerauerint: tum vsque quo natura omnem suam curam impende-
rit expectare, aut ipsius etiam motus adiuuare conuenit. Etenim oblucri & excre-
tionis cohibitionem moliri, maiorem morbum facit. Siquidem quæ cohibentur, sur-
sum perlata dolores capitis, aut phrenitim, aut lethargum, aut parotidas, periculo
haud vacantes, inferunt. Quare initio ea quæ in corporis commoditatem vtiliter ex-
cernuntur, minime inhibere oportet. Postquam verò iam diutius perseuerauerit
fluor, non solum superuacua expellens, verum etiam habitum corporis veluti col- B
liquans, vireque consumens, tunc sane ei resistendum erit, tum per ea quæ per os
sumuntur, tum iis quæ per anum infunduntur, atque etiam iis quæ extrinsecus ventri
imponuntur. Si itaque pure biliosa excrementa prodierint, in magis salubria permu-
tare ipsa oportet, non tamen per cohibitionem statim eos curare. Biliosum enim ex-
crementum tum in ventriculo, tum in ieiuno intestino aggregatum, atque post coa-
ceruationem retentum, maximopere lædet. Nam & ventriculum subuertit, & visce-
ribus inflammationes infert, & sitim accendit, & febres instaurat, omniaque prædicta
in capite vitia, efficit, atque in totum grauius malum reddit. Quod si itaque humores
biliosi in corpore copiosi fuerint, natura per medicamenta purgantia leuia, vtest ca-
ssia fistularis, cortices myrobalanorum luteorum, aut mel acrium, quod recentiores C
Græci *mannam* vocant, item rhabbarum vsum, iuuanda venit. Lac deinde bubulum
aut caprinum tepidum, recens multum, exhibendum, aut sane ad ignem decoctum,
assidueque agitatum, donec ad tertias sit reductum: quod ipsum & per fluuiales
filices, ferrique aut chalybis laminas igni candefactas, & in lacte extinctas fieri po-
test. In decoquendo vero superstantem concretionem siue spumam auferre oportet.
Hoc sane nullum compendiosius remedium ad fluxiones biliosas reperire po-
teris. Quandoquidem autem febricitantibus lac ipsum in nidorem aut etiam acor-
em conuertri, maiusque noxamentum quam commodum inferre consuevit, præstat
tunc sane, si simul febricitent, ipsum non exhibere. Aquæ verò quarta parte ad lac
ipsum affusa, decoctionem faciemus, donec dimidium eius consumatur, atq; hoc mo- D
do exhibebimus. Si autem in intestinis coaceruata bilis fuerit, clysteres ex *hordeo de-
cocto, saccharo rubeo vocato, oleo rosaceo, ouorum luteis, & similibus* paratos iniicere oportet.
Biliosis tandem vacuatis humoribus, intrinsecus ea quæ adstringunt & robo-
rant, exhibenda: vt sunt *saccharum rosaceum, diacotoneon citra species, diatrion santalon, pastilli
espodio, hydromalon, & similia.* Qualia vero esse debeant ea quæ extrinsecus impo-
nuntur medicamenta, paulo post dicemus. Sedes etiam ipsa ex decocto quopiam
adstringentium foueatur. Ceterum in diarrhœa ex humoribus crassis, pituitosis &
lentis nata, ac eorundem corruptione facta, haud secus quam in priore, a purgatio-
ne auspicanda curatio erit. Exhibendum itaq; tunc agarici dilutum, non obstante
quod quidam Medici illud in diarrhœa vitandum esse censent, cū myrobalanis em-
peliticis, aut simile aliquid, quod prædictos humores educere possit. Conueniunt et-
iam clysteres, potissimum vbi in intestinis viscidorum humorum copia coaceruata
fuerit, e *centaurii minoris decocto, oleo rutaceo, & similibus.* Intra corpus exhibenda *diacotoneon cum speciebus, zingiber coctum nominatum, & alia qua calefacere & exsiccare valent medi-
camenta.* Extrinsecus etiam quæ robur addunt, admouere oportet. Quod si ob reten-
tricis facultatis imbecillitatem orta fuerit diarrhœa, ea sunt sane adhibenda medica-
menta, quæ ad alias immodicas alui fluxiones admouentur. Irrigationes itaq; ex *oleo
omphacino, aut rosaceo, aut melino, cum vino aliquo austero adhibeantur.* Efficacius autem myr-
tinum est, si vehementiori indiget adstrictione, tertia aut quarta vini parte ei admix-
ta. Quod si robustiora sint corpora, *gallas, malicorum, & balaustium in ipsa irrigatione* F
incoquere licebit. Perseuerante autem adhuc fluxione, cataplasmata, emplastra, & ce-
rata ex adstringentibus & exsiccantibus composita, quorum mentionem in eapite
sequenti faciemus, imponenda erunt. Parabile vero & efficax hoc est, quod habet:
Mora præ immaturitate adhuc acerbiora & albicantia septem: quibus vbi probe contusa fuerint,
addun-

Biliosæ diar-
rhœæ cura-
tio.

Lac cum fi-
licibus de-
coctum.

Diarrhœæ
ex pituito-
sis humori-
bus cura-
tio.

Diarrhœæ
ex imbecil-
litate reten-
tricis facul-
tatis cura-
tio.

Gerarum.

adduntur olei rosacei, uncia dua. Cera, unc. una. & fingatur ceratum. In potu vero accepta, A post inutilium euacuationem, ventris fluxiones sanant cuminum, adianti decoctum spinæ alba radix, apii similiter semen drachma pondere datum. Vrinam enim irritat, fluxionesque ad intestina factas eo diuertit. Mora quoque immatura, & adhuc acerbata, ad solem pluribus diebus exsiccata, deinde reposita, vsuq; expectete trita & bibita, mirifice aluum restringunt. Contunduntur etiam & obsoniis admiscuntur, quemadmodum rhus consuevit, qui interdum vniæ vnius pondere cum pullo gallinaceo decoquitur. Magis tamen aluum cohibent rubi mora immatura & acerbata, eodem modo exsiccata, & in potu exhibita. In numero compositorum medicamentorum mirifice conferunt pastilli e spodio, e lemnio sigillo, diacotoneon, diatrion santalon, theriaca, & hæc compositio quæ accipit: Specierum diatrion santalon, diarrhodon abbatis, utriusque scrupulos duos. Coralliorum rubeorum, thuris selecti, rosarum purpurearum, singul. drach. dimidiâ. Spodii, drach. un. B Seminum oxalidis, rhus obsoniorum, utriusque scrupul. unum. Balaustiorum, acacia, utriusque drach. dimidiâ. Mastiches, scrupul. dimidiû. Boli armenii, drach. unam. Sacchari candidissimi, unc. octo, dissoluti in stillaticis liquoribus plantaginis & rosarum, fingantur morsuli. Item huc Eccligma, quod habet: Sacchari rosacei veteris, diacotoneon sine speciebus succi medicati eribes, de oxyacantha, sing. unc. dimidiâ. Hydromali, drach. tres. Diamoroni, drach. dimidiâ. Specierum diatrion santalon, scrupul. duos. Coralliorum rubeorum, scrupul. unum. Spodii, balaustiorum, utriusque drach. dimidiâ. Boli armenii, drach. unam. Serapii myrtini quantum ad excipiendum sufficit, fiat Eccligma. Porro hanc aquam nunquam non paratam habebis, quæ habet: Rhus obsoniorum quartam unam, aquæ pluuialis libr. tres, in quibus die ac nocte semach maceretur, dein ebulliat, C & rhubene ac valide exprimatur. In ea siquidem aqua oryza, milium, & alii cibi coquantur, aut saltem aliqua eius portio iis affundatur. Si propter defluxum ab aliis corporis partibus diarrhoea accidit, curatio ex propriis capitibus petenda erit: verbi gratia, si ex capite in ventriculum defluxio fiat, ad ea quæ in cap. De curatione destillationis dicta sunt, recurrendum erit. Et sic in ceteris etiam corporis partibus faciendum.

De lienteria. CAP. XIII.

Lienteria Græcis, quemadmodum ipsum nomen indicat, *leuor* quissiam intestinorum A est, qualis etiam extrinsecus in corporis cuticula ex cicatrice contingere solet. In hoc siquidem vitio intestina cibos non retinent, sed antequam per mutationem & perfectam concoctionem admittant, dilabuntur, idque ea quæ fuerunt assumpta forma. Cuius rei testis est Galenus, qui libro 6. Aph. com. 1. sic definit lienteriam: *Leuitas intestinorum*, inquit, est *velox exitus eorum, quæ comeduntur & bibuntur, quæ talia deiciuntur, qualia fuerunt deuorata*. Neque enim tantisper retinentur, donec concoquantur. Quare Latinis recte *leuitas*, seu *leuor intestinorum* dici potest. Oritur autem frequenter graui præcedente dysenteria, atque adeo ex profunda intestinorum exulceratione, cicatricibus densis & leuibus succedentibus, quæ deinde propter densitatem quidem suam ciborum per corpus distributionem fieri non permittunt, quod venarum quæ alimenta ex intestinis ad se auellunt, ora sint veluti obdurata. Ob leuorem autem, ut dictum est, cibum antequam perfecte concoquatur, dilabi sinunt. Fit etiam nonnunquam lienteria ex imbecillitate & languore facultatis cibos in ventriculo retinentis. Hac n. infirma & imbecilla, nec concoquuntur nec distribuuntur alimenta: sed cruda, humentia, nihilque immutata excernuntur, alio continenter fluida. Interdum quoque post longum ventris fluxum oboritur. Aliquando etiam aqua intercutem per ventrem vacuata, lienteria consequitur. Ex quacunque itaque causa lienteria orta sit, ægri cibum non sentiunt, & malum corporis habitum acquirunt. Succedit itaque ægris assidua excretio cruda, colore subalbida, inæqualis, & aquosissima, citra sanguinis ac bilis complexum. Adest autem simul & ardor per tota hypochondria se dilatans, quæ cibi concomitatur fastidium. Est autem bonum & amicum signum in iis, qui lienteria longa laborant, si eis acidus ructus accidat, iuxta id Hippocratis dictum: *In longis leuitatibus intestinorum si acidus ructus fiat, qui prius non erat, signum bonum*. Significat enim, cibum in ventriculo aliquandiu contineri, donec principium mutationis accipiat. Ceterum quum eiusmodi vitium sit, facile est intelligere, quod facultatem retentricem & concoctricem tum ventriculi tum intestinorum omni modo refocillare oportet. Id quod in primis per ciborum conuenientium exhibitionem, & victus rationem restituendis & refocillandis viribus aptam, fieri potest. Conueniunt

Compositio in morsulis

Eccligma

Aqua miræ utilitatis

Lienteria

Leuor seu leuor intestinorum; Causa

Signa

Aph. 1.

Victus

itaq; carnes auicularum montanarum, pulli gallinacei assi, in quorum ventre thus, aut mastiche etiam imponi debet, & alia quæ capite sequenti commemorabuntur. Cibus qui exhibetur quantitate paucus sit, & concoctu facilis. Et si acris & biliosa sit defectio, ex oryza, alica, & similibus: quibus cum adstringens aliquod decoquetur, pyrum, malum cotoneum, mespilum, & id genus alia, parabitur. Item lac calidum & recens multum, postea vero ad medietatem, aut etiam tertias decoctum eis proderit. Sin autē pituitosiora excernunt, contrarius ipsis cibis adhibetur. Nonnulla quoq; ventriculo grata, anisum (verbi gratia) cuminum, vel dauci semen admiscuntur. Potus erit vinum aquosum & tenue in priore, in altero vetustius & calidius. In vniuersum vero potus sit exiguus, multus enim non solum lienteria, verum etiam omnibus reliquis ventris fluxionibus infestissimus existit. Somnus potissimum nocturnus, solito longior præcipiatur. Quod ad curandi rationem attinet, si ex imbecillitate facultatum ventriculi creatur lienteria, ad caput De imbecillitate ventriculi recurrendum, atq; illinc curandi ratio petenda. Summatim vero exhibenda intra & extra corpus quæ adstringunt, & tam ventriculum, quam intestina roborare possunt. Exhibendum igitur serapium de absinthio, de menta, aliaque antidota, quæ ventriculo robur adicere possunt. Extrinsecus vero ea sunt admouenda medicamenta, quæ in capite De diarrhœa sunt commemorata, & sequenti dicentur capite. Sed in primis hoc medicamentum conueniet, quod accipit: Oleorum mastichini, de absinthio, de menta, myrtini, sing. unc. dimidia. Pulueris cinnamomi selecti, garyophyllorum galanga, sing. scrup. duos. Balaustiorum, rosarum purpurearum, vtriusque scrup. unum. Cera quod satis est, fingatur unguentum. Vel hoc ceratum, quod habet: Oleorum mastichini, de absinthio, cotoneorum, sing. unciam unam. Olei de menta, unciam dimidiam. Calami odorati, garyophyllorum, thuris sing. drachmam unam. Ligni aloes, scrupul. dimidium. Rosarum purpurearum santalorum alborum & purpureorum, singul. drachmam dimidiam. Mastiches, cumini, vtriusque drachmam unam. Hypocistidis, acacie, rhois, sing. drachmam unam & dimidiam. Gallie moschata, scrup. unum. Cum cera & resina terebinthina, quod satis est, informetur ceratum. Porro quib. cicatricem, quod leuis & lubrica sit, factam esse coniicimus, iis acriorum rerum, sinapi, videl. cepæ, & id genus aliorum, comestio, velut refrigerationem quandā cicatricum operatur, atq; adeo utilis est. Quin & infitum calorem reuiuificat, & concoquendi facultatem quodammodo refocillat. Nec obstat, quod Rondeletius hanc curandi rationem improbat, quod putet, acria, vbi humiditatib. corporis permiscetur, acrimoniam suam amittere, nec asperitatem inducere. Nam fieri nequit, vt acria iam dicta comesta, quum statim ingerantur, atq; sine fere omni mora in ventriculum perueniant, tantillo tempore acrimoniam suam omnem amittant. Etsi vero priusquam ad intestina perueniant acrimoniam aliquo modo amittunt, tamen si paulo maiori copia ingeruntur, tantum acrimoniæ obtinebunt, quantum ad inducendam asperitatem satis erit. Conuenient itaq; in hoc casu, Galeno c. 95. Artis medica auctore, quæ sufficienter abstergunt, & parum adstringunt. Quapropter admiscenda semper adstringentib. medicamentis abstergentia. In reliquis causis lienteria omnib. eodem curationis modo vtendum est, quo in diarrhœa & dysenteria affectis vtimur.

De dysenteria: C A P. XV.

Dysenteria.
Tormina.Cruentæ
dysenteria
quatuor
species.

Causæ.

△ *Tormina* Græcis, proprie nihil aliud est, quam exulceratio intestinorum. Latinis placuit hoc vitium appellare *tormina*, eo quod in eo intestina dolore admodum torqueantur. Neque temere in dysenteria descriptione adiectum est proprie: sunt n. Græcis quatuor cruentæ dysenteria species, quemadmodum testatur Galenus libr. 3. De sympt. causis: quarum prima est, in qua sanguis propter aliquam partem corporis præcisam, aut prioris vite exercitationem intermissam, per circuitus excernitur. Altera, in qua sanguis aquosus, hoc est aqua, in qua carnes cruentæ & recens mactata sunt abluta, similis, deicitur: id quod ob iocinoris imbecillitatem accidere solet. Tertia, in qua & nigrior & splendidior eo qui naturalis est excernitur, ex sanguine & atrabile commixtus. De iis certe nobis in præsentia non est sermo. De quarta vero, in qua paulatim & breuib. intervallis nonnunquam sanguis syæcerus, nonnunquam etiam grumofus cum pure, vel ramentis intestinorum, sæpenumero etiam densum stercus cruentis guttis respersum deicitur, nunc agimus. Hæc quidem, vt dictum est, ob intestinorum exulcerationem fit, quæ interdum a causis externis, frigiditate scil. æstu, & humiditate accidit. Item perniciosorum medicamentorum potu, scammonia scilicet, & similibus.

A fru-

- A** A fructuum comestione, & cruditatibus. Interdum a causis internis, nempe acrium ciborum acceptione, ab humorib. mordacib. & acribus siue bilis siue ex vniuerso corpore ad ventrem confluentib. aut in ipso natis. Hæc quidem nunc a tenesmo, nunc p*er* se incipit. Excernuntur primum biliola, varia, subpinguia: pingui nimirum, quod intrinsecus intestinis adhæret, paulatim cum liquefacto. Quum vero superficies intestinorum perfecte fuerit denudata, exulceratioq; superne consistit, feculenta & cruenta deiiciuntur. Vbi autem altius penetrauerit exulceratio, etiam sordes membranas admixtas habentes expelluntur. Quod si non cohibeatur, breui vicinos locos depascitur: saniosa vero quædam excernuntur, qualia a mortuorum cadauerib. defluere consueuerunt. Vbi igitur tenuia intestina exulcerantur, dolores circa vmbilicum consistunt, biliosaq; & porri colorem habentia, atq; omnino variegata stercorei plurimum commixta excernuntur, cum labore & torminib. mordacitateq; ac exolutione, vt nō procul ab animi deliquio ægri absint: a sitique infestantur, & febriçant, stercus quoque crudius prodit. Exulceratur autem, verum raro admodum, & ieiunum intestinū, quod si contingat, egestionem crudiores apparent, sanguinem nigriorem vehemēter implicatum habentes, bilemque abunde flauam. Sitis multa, itemque nausæ affligent. Vomunt etiam aliquando, & cibos auersantur: dolor quoque vehemens supra vmbilicū confidet, quandoque & febres malignæ oboriuntur. Atque ita affecti decolores fiunt, & ad animi deliquium vsq; exsulant. Vires ipsorum cito deficiunt, neque procul ab interitu absunt. Sin crassa intestina exulceratione laborant, tum stercorea quæ egeruntur
- C** syncera & multa sunt, & coaceruata, & cum flatib. prodeunt, aliquando etiā spumosa. Pinguia quoque iis commixta sunt, & cruor supernatat, veluti latius *libr. 6. De laborantib. locis* Galenus ostendit. Id ipsum autem nosse, non mediocriter ad curationē conducit. Nam si in superiorib. intestinis vlcus est, ab epotis medicamentis præsidium petendū est: si vero in crassis & humiliorib. clysterem iniicere magis conuenit. Principium curationis dysenteria laborantium a quiete & modico cibo, propter ventriculi & intestinorum imbecillitatem, fiat, vndeunque tandem fluor procedat. Permittente itaque febre, lacte reens multo adhuc calido vtendum est: aut pro eo lac coctum, quod in capite *De diarrhæa* descripsimus, exhibendum. Hoc enim primum depurgat, atque simul ea quæ sunt in corpore cōtemperat, ac postremum aluum sistit. Oportet vero insuper & panem madefactum, a lactis acceptione offerre. Pulres etiam ex lacte apparatus, tum medicamentum rationem habent, tum nutrimentum optimum præbent: velut est *oryza cum lacte, amyllum, & oua lacti admixta*. Sorbitiones quoque aut pulres ex *alica, milio, adiecto rhoë*, conueniunt. Apparanda itē *puls ex siccis panib. affusa posca, aut palmularum, aut malorum cotoneorum, aut pyrorum, aut rhois succo*. Lenticula quoque probe assata cum *plantagine, aut malis cotoneis contusis decocta exhibenda*. Olerum vsus non est necessarius, at tamen degustandas exhibebis *serin, seu intybum satiuam & sylvestrem coctas, plantaginem, brassicamque bis coctam*. Damas & ouorum assatorum lutea. Cane dysenteria correptis, quod alimenti valentioris sint, & concoctioni renitantur, non valde commodæ existunt, dandæ tamen eis, qui diuturno malo vexantur. Ex iis autem præ ceteris voluerim eligendæ, *perdicis nimirum, palumbium, merularum, & montanarum aucularum*. Ex pedestribus *carnes caprea & leporis conueniunt*. Lumentorum, & omnium aliorū quadrupedum carnibus interdicare oportet. Pro potu a principio quidē aqua pluuiæ, quæ non sit ex ædibus plumbo testis delapsa, vtendum est. Talis enim aqua sanis etiam potata dysenteriam conciliat. Quod si pluuiæ optima non adsit, fontana, in qua chalybs ignitus extinctus sit, aut in qua oxalidis, plantaginisq; folia decocta sint, vtetur. Lac propinandum, præsertim si per febrem licuerit, quod Galen. *lib. 10. de simpl. med. fac. & li. 3. de alimen. fac.* dysenteria optimum remedium sit, & omnium ventris acrium fluxionum, præsertim vbi aliam quampiam desiccantem facultatem habuerit adiunctam a lapidib. ipsi præcocto iniectis. Si vero laborauerit ventriculus, aut vbi vires fuerint defiectæ, etiā vinū præbendum. Sit autem adstringens, & non valde vetustū, & aqua chalybata dilutum. Somnus sane optimum dysenteria laborantib. præsidium. In curandis ratione medicamentis purgantib. vt pote quæ mordacium humorum confluxū augēt & intestina exulcerata infestant, haud vtendum erit. Priusquam tamen dysenteria & intestinorum exulceratio fiat, proderit vti *myrebalanis flauis, oxyphenico, & aliis qui-*

Signa

Nota exulcerationis tenuium in testinorum

Nota exulcerationis crassorum in testinorum

Videtur

Pomus

Curatio

bus adstringendi facultas coniuncta est. In dysenteria igitur magis uti oportet remediis adstringentibus, obtundentibus, resiccantibus, & urinam mouentibus, atque ad fluxionem alio transferentibus. Quæ adstringunt, hæc quidem sunt, *lapathifemen, rhus, galla, malicorium aridum, rubi radix, ladanum, acacia, hypocisthis, balaustium, folia salicis, symphyti radix, folia & semen: rheum ponticum, si haberi potest, althea radix, equisetum, corallium, mastiche, coagulum leporis, sanguis draconis, cortex thuris, lemnia terra, verbasci radix, plantaginis semen, bellis minor, althea, oxys, sanicula, ophrys, ophioglossum, polygonum, bursa pastoria, solidago sarracenicæ vocata, pes leonis, numularia, solidago media, bistorta seu serpentaria mas, geranium sextum, herba diui Iacobi hodie nominata, siue verbenæ recta, mora acerba, acini vua, maceris cortex, & alia eius generis.* Obtundunt autem & contemperant humorum morsum & acrimoniam, *amylum, tragacantha, gummi, adeps capri, B nus, hircinus, suillus, anserinus, & gallinaceus.* Resiccant *coagulum leporis, cornu ceruinum vstum, teste cancrorum fluuiatum, & salvia.* Urinam mouentia suo loco inuenies. Quare si crassiora intestina exulceratione laborant, clysteres adhibeantur, primum quidem illi quibus abstergendi vis inest, qualis est qui habet: *Decocti hordei integri, lib. unam, Mellis rosacei colati, unciam unam. Sacchari rubei vocati, unciam dimidiam. Vitellos oui numero duos. Olei rosacei, unciam dimidiam. Commixtis omnibus fiat clyster.* Facta primum abstersione, ea quæ glutinare possunt infundantur: quale est quod accipit: *Rosarum purpurearum, plantaginis, foliorum symphyti, polygoni, verbasci, sing. manipul. unum. Gallarum, rhois obseniorum, utriusque drach. duas. Bursa pastoria, manipul. dimidiam. Balaustiorum, drach. unam. Oryza tosta, unciam unam. Radicis symphyti, unciam dimidiam.* Deoquantur singula in C aqua chalybeata, donec tertia pars absumatur. Dein colo transfundantur, accipiantque iuris decocti, *unc. duodecim. Succi plantaginis, unc. duas. Acacie, hypocisthidis, utriusque scr. duos. Boli armenii, sanguinis draconis, utriusque scrup. unum. Seui caprini, unciam unam. Oleorum rosacei, myrtini, cotoneorum, singulorum drachmā unam.* Commixtis omnibus fiat enema. Interdum vehementia doloris non tantum obtundentia, verum etiam stupefacientia medicamenta requirit: Quare tum conuenit hoc uti clystere, quod habet: *Lactis caprini aut vaccini, libr. unam. Butyri salis experti, unc. unam. Adipis caprini, unc. unam & dimidiam. Tragacantha gummi, utriusque drach. unā. Vitellos ouorum numero tres. Catapotiorum de cynoglossa, drach. unam. Olei rosacei, uncias tres. Commixtis omnibus formetur infusum.* Si vehementiore stupefactione opus fuerit, pondus pilularum, de cynoglossa augendum: aut D priori portioni aliquot opii grana, tria nimirum, aut quatuor, vel minus aut plus, pro vehementia doloris, & corporis constitutione, adiicienda: Ceterum si in tenuibus intestinis exulceratio consistit, tum remedia quæ superne & per os assumuntur, magis desiderat. Conuenit itaque decoctum ex adstringentibus supra commemoratis, admixtis serapiis rosaceo & myrtino, cum aliis quæ in capite De diarrhæa dicta sunt medicamentis, exhibere. Neque temere quis hoc propinabit medicamentum, quod habet decocti radicis symphyti, aut aliterius ex adstringentium numero, *unc. tres. Serapii rosacei, unciam unam. Serapii myrtini, uncia dimidia. Pulueris pastillorum e spodio, seminis plantaginis, boli armenii, singul. scrupul. duos. Misceantur omnia, & fiat potio.* Extrinsecus præter ea quæ commemorata sunt in capitibus De diarrhæa & lenteria, imponendum ventri hoc ceratum, quod accipit: *Oleorum mastichini, rosacei, myrtini, cotoneorum, singul. unciam unam. Farina hordei fenograci, utriusque drachmam unam & dimidia. Rosarum purpurearum plantaginis, utriusque drach. unā. Balaustiorum, sanguinis draconis, utriusque drach. dimidia. Boli armenii, drach. unā. Hypocisthidis, acacie, mastiches, singulorum drach. duas. Cum cera & resina quod satis est, informetur ceratum.* Possunt & alia multa ad exemplum iam dictorum præsidiorum componi, quæ singula commemorare & superuacaneum, & inutile esse iudicamus. Veteres quidem in deplorata dysenteria arsenicum sandaracham, calcem viuam, & alia crustam inducentia iniiciebant. Quia vero hæc curandi ratio periculo non caret, & immensos excitat cruciatus, temere vsurpanda non erit.

De tenesmo. C A P. XVI.

Tenesmus. **T**enesmus est assidua, & quæ differri ac evitari non potest, desidendi seu egerendi cupiditas: quæ tamen nihil, præter modicam cruentam vel mucosam, egeritur. Latinis tenesmus appellatur. Plinio vero & nostri temporis medicis tenasmus. Nomen vero sumit ab ipso symptoma-

Amate, Galeno lib. 2. de medendi ratione auctore, quod in eo tensio quædam circa intestinum rectum fiat. Fit nonnunquam propter frigiditatem extrinsecus occurrentem, ac partem iam dictam immodice constringentem, item humores acres & biliosos, expultricem partis facultatem stimulantem, pituitam salivam, vlcus phlegmonemq; in recto intestino obortam. Nonnunquam etiam stercoris in intestino recto ubi colo alligatur coacti obstructio, tenesmus efficere potest. Causam externam frigidam facile de sermonibus ægri cognoscet Medicus, quia nimirum pedice res frigidas verbi gratia lapidem frigidum, attigit, aut hyberno tempore frigus nimium pertulit, aut in aqua frigida diutius commoratus est. Humores ex iis quæ excernuntur dignoscere licebit, quæ vel biliosa, vel pituitosa erunt. In ulcere purulento ac sanioso excernuntur, & in ano

Causa.

Signa.

B pungentis sensus inest. Phlegmone tumorem recti intestini, & dolorem grauiatum una cum febre efficit. Stercoris multitudinem, grauis distensionis sensus circa imum ventris sequitur. Curandi ratio, pro causarum diuersitate variatur. Quapropter si tenesmus frigus præcesserit, vinum meracum calidum propinandum erit: ac pectinem, inguina, interfoemineumq;, Græci *σφυον* vocant, oleis ac fomentis calidis irrigare & fouere oportebit, cuiusmodi sunt rutaceum & lilaceum. Furfures autem in vino decocti, & sacculo excepti, commode sedi adhibentur. Clysteres quoq; decocto mentastri, origani, calamintæ, chamæmeli, abrotano, semine anisi, feniculi, & similibus paratos, adiectis oleis anethino, chamæmelino, lilaceoque, niicere conuenit. Porro mirifice confert, si statim ab excretionis admoqueatur later perquam vetustus, & a fumo denigratus, una cum paleis in eo

Curatio,
Tenesmi
a frigore,
σφυον.

C complexus tussus, dein aceto feruenti subactus, lintheoloq; illigatus sedi subditus. Ceterum si a biliosis humoribus in ano & intestino detentis fiat tenesmus, clysteres quibus abstergerendi & abluendi inest facultas, iniiciendi sunt, qualis est qui accipit: Iuris decocti hordei, lib. i. Sacchari rubei nominati, unc. una & dimidia. Mellis rosacei, unc. una. Lutea ouorum duorum, olei rosacei, unc. dimid. Commixtis omnibus fiat enema. Aut ex caprillo lacte, saccharo rubeo, & oleo rosaceo. Vitanda omnia acria, & vtendum mediocriter frigidis & humidis, & omnibus his quæ bilis acrimoniam contemperare possunt. Si a pituitosis humoribus procreetur, curabitur instar illius qui a frigore factus est, adiectis tantum ac commixtis ipsis clysteribus, quibus vacua in pituitam facultas inest medicamentis, antidoto nimirum Indi, aut diaphenicon, aut benedicta laxatiua vocata. Quod si a phlegmone tenesmus

A pituitosis
humoribus.

D oriatur, pilanæ succus, paucis rosas purpureas simul cum eo decoctis infundatur. Aut vehementiori phlegmone infestante, hoc vtendum infuso, quod habet: Iuris decocti plantaginis, unc. dimidiam. Olei rosacei, unc. duas. Oui vnius candidum. Commisceantur singula, & fiat clyster. Extrinsecus interfoemineum, seu perinæon, hoc est locus inter penem aut anum, oleis rosaceo & myrtino irrigandus. Vel adhibeatur tale fomentum, quod accipit: Rosarum purpurearum, plantaginis, utriusque manip. vnum. Balaustiorum, drach. tres. Sidiarum, unciam vnā. Baccarum myrti, drach. duas. Foliorum rubi, unciam vnā. Decoquantur singula in aqua sufficienti, donec tertia pars absumatur. In huius decocti iure imbuta spongia sedi admoqueatur. Porro ubi opus est suppuratione aut discussione, fomenta ex decocto radicis altheæ, fenogræci, chamæmeli, meliloti, & furfurum composita adhibe-

A phlegmone.

Clyster.
Interfoemi-
neum.
Fomentum

E buntur. Si ab ulcere fiat tenesmus, primum abstergerendi facultate præditis infusis, dein vero glutinantibus, haud secus quam in dysenteria, vtendum. Vnguentum præterea hoc sedi inditum confert, quod habet: Olei rosacei, unc. vnā & dimidiam. Lenti cremoris tragacanthæ, gummi, utriusque drachmas tres. Ceruse plumbi vsti, utriusque drachmam dimidiam. Aloes, thuris, utriusque scrupulum vnum. Cere quod satis est, fingatur vnguentum, quod linamenta imbuta sedi indantur. Si dolor immensus admodum fuerit, prædictis opii scrupulus vnus adici potest. Si a stercoris multitudine oriatur tenesmus, tum initio clysteribus mitioribus ac lenientibus paulatim stercora educi debet, cuiusmodi est hoc quod accipit: Maluæ, altheæ, mercurialis, betæ, foliorum violæ nigra, singul. manipulum vnum. Seminis fenogræci, lini, utriusque, unciam dimidiam. Ebulliant omnia in aqua

Discutiētia

Curatio te-
nesmi ab
ulcere.
Vnguentum

F sufficienti ad tertias. Dein accipe iuris decocti, lib. vnā. Medullæ casie fistularis, unciam vnā & dimidiam. Olei vulgaris, unciam dimidiam. Salis triti, drach. vnā, fiat clyster. Insuper hoc vnice cauendum erit, ne purgantia medicamenta deuoranda exhibeantur, quod inde summum ægrotanti exitium imminet, attractis nimirum aliunde & ex vniuerso corpore ad priorem stercoris copiam excrementis, vt fusi alibi docuimus.

A stercoris
copia.
Clyster.

Cauſſæ.

DO L O R qui in laxiore intestino, quod *colôn* græce vocatur, accidit, multas, quatuor vero præcipuas, cauſſas obtinet. Interdum n. propter crassos ac pituitosos humores intra coli membranulas subsidentes oritur. Interdum etiam ob crassos flatulentos spiritus, in colô retentos; quib. non est exitus. Fit quoq; ppter phlegmonem, intestinum crassum distendentem, ac molestantem. Solet etiam accidere ob acres & erodentes humores, qui intestinum prædictum, cui illi immersæ sunt, vehementius affligunt.

Signa.
Crassi humoris.

Quibus crassus & pituitosus humor dolorē excitat, hi per totum abdomen in alto excruciantur, præsertim vbi coli situs est, ibi enim quasi tundi & perforari intestinum sentiunt. Tormina quoq; hos affligunt, ruet^o, nausea, vomitio varia, potissimum pituitæ. Alius grauer impedita nihil reddit, ac ne spiritum quidem transmittit. Stercus autem quandoq; excretum, bouino simile videtur, leue, & flatus plenum. Præcedit hos quam maxime frigidorum & crassi succi ciborum assiduus vsus, satietas, erudititas, ocium, & iis finitima. Qui autem ex flatulento spiritu dolent, tensionem magis experiuntur, atq; rugitum sentiunt. Qui autem propter phlegmonem, iis interni febris sensus accidit, & febris non ignaua: vrina denique, simul & stercoreis retentio, pulsus quoq; iuxta ventrem molestat, sitis, æstus, nausea, & vomitiones bilis potissimum, quæ nihil leuant malum, vrgent. Hæc q; simpliciter inter colicas affectiones grauissima est, quæ in ileum transitionem minatur. Quibus acres rodentesq; humores dolorem mouent, sicut etiam qui phlegmonem experiuntur, hos ardor, sitis & vigilia torquent, imo febriculæ, sed minus quam illos. Vrina redditur acris, & biliosa deiciuntur. Sapi^o autem alui deiectio maiorem excitat cruciatum, grauiusq; irritant calidiores cibi potusque assumpti. Quo vero pacto coli & renum dolores discernendi sint, docet copiose Gal. lib. 6. De affectis locis c. 2. Ad eum itaq; locum lectorem ablegamus.

Acris & erodentis.

Victus accurandi ratio pro cauſſarum diuersitate variatur. Quum itaq; crassi ac lentis humores doloris cauſſa existunt, victus vniuersa ratio extenuans sit. Panis igitur, quo vescitur æger, recens, ac in clibano aut furno probe coctus sit. Carnes conueniunt in primis volucrium, gallinæ nimirum, perdicum, phasianorū, palumborum, turturū, turdorum, & columbarum. Fugienda omnia volucrium genera, quæ in aquis degunt, tanquam ea, quæ superfluitatibus multis abundant. Ex quadrupedum animantium genere conueniunt carnes vitulina, & hœdina. Legumina omnia vitanda, quod huic malo mirifice incommodent. In olerum genere vtendum feniculo, apio, asparago, pulegio, origano serpyllo, & similib.

Victus coli-
ci doloris a
crassis & pi-
tuitosis hu-
moribus.

Alia quoque cruda, & cepas assumere haud nocebit, maxime iis qui talibus non offenduntur. Ideoq; hoc Galenus *theriacam rusticorum* appellat. Quid multa? alimenta sint conoctu facilia, & boni succi, atq; satietas & cruditas vitetur. Bibendum vinum subadstringens, album, tenue, pellucidum, mediocri ætate, temperatura dilutius, bibaturq; modice. Quod vero ad curandi rationem attinet, medendum sic, vt non vehementer calefaciamus: quippe ab huiusmodi præſidiis diffunduntur & in flatus vertuntur omnes frigidi & crassi humores, qui intestina distendendo, dolores vehementiores efficiunt. Conuenit itaq; eos diffecare & concoquere citra vehementem calorem, & per vsum eorum, quæ minime inflant. In acerbationibus igitur irrigationes fiant ex oleo rutaceo, chamamelino, & anethino. Fomenta item, & sacculi e florib. chamameli, anethi, meliloti, seminibus lini, fenograci, althea, milio, & furfuribus. Mirifice quoq; conducunt clysteres ex oleis iam commemoratis, & prædictarum herbarum decocto, aut radicis cucumeris sylvestris, adiectis cumino, vel ruta, cum adipe anserino vel gallinaceo, in eum quidem modum parati. Malua, althea, chamameli, mercurialis, anethi, sing. manip. vñ. Origani, chalamintæ, pulegii, sing. mani. dimid. Seminum lini, fenograci cumini smyrni, sing. drach. tres. Decoquantur singula in aqua fontana iustæ quantitatibus ad tertias. Dein accipe iuris decocti per colum transfusi, lib. vnam.

Curatio
eiusdem.

Hieræ picæ, vñ. dimid. Benedictæ laxatiuæ, vñ. dimid. Antidoti indi drach. vnam & dimid. Mellis rosacei colati, vñ. dimid. Oleorum chamamelini, anethini, rutacei, vtriusq; vñ. vnam. Lutea oui duo numero, salis communis dr. vñ. commixtis omnib. fiat enema. Glandium enim adimonitiones, illitionesque sedis e succo cyclamini cum melle & nitro, vel sale fossili siue gemma, vel centaurio minore cum melle ac nitro profunt. Exemplum glandium est hoc: Accipe mellis cocti, vñ. vnam cum dimidia. Specierum hieræ picæ, drach. vnam. Colocyntidos, scrupul. vnum. Salis fossilis, scrupulum dimidium commisceantur & singantur glandes oblongæ. Vomitus etiam

Clyster.

Glands.

Vomitus.

- A** iam ante cenam, si quis facile vomat, præ omnibus auxiliatur. Porro ubi dolores, facta iam vacatione, ad plures dies producuntur, in solum olei calidi: aut si hoc haberi haud queat, in hydrelæum descendere alienum non est. Inessus quoq; utilis ex decocto *althææ, pulegii, foliorum lauri, fœnogræci, chamæmeli, arthemisia, anethi, & similium*. In balnei tamen usu id vnice ciuendum erit, ne temere iis, qui ad resolutionem, aut arthritidem procliuēs sunt, admoveatur. Quippe balnei usu & calore humores liqueſcunt, atq; funduntur, & in partes imbecillas decumbunt. Conuenientissimum vero ad colicos medicamentum, *vinum absinthites* existit, si prælibatione a balneo seu exercitio indigent. Estq; etiam non sitientibus valde cōmodum: Decoctum quoq; herbæ ipsius ubi semel tantum ebullierit, pari modo ad vinum, quod alias pro cōsuetudine bibunt, admixtum, vtiliter a balneo præbetur. *Castoreum* deniq; assidue potatum, vitium prorsus demolitur, omnibusq; medicamentis præstat. Datur ægrotantibus *drachma vna in tribus aque mulsæ cyathis*. Quod si dolor non conquieuerit, propinandum erit medicamentum *diatriopipereon, vel theriaca*. Si vero dolor est vehemens, mediocriter lenientibus ac mitigantibus vti conuenit medicamentis inferne inditis; aut potis: Nam quæ valenter stupefaciunt vitare oportet, quod paulisper quidem leniant, sed diuturniorem affectum faciant, dum humores crassiores reddunt, meatusque intestini condensant. Anodynis itaque proprie vocatis medicamentis, quorum aliqua initio huius capituli dicta sunt, iterum vtendum. Porro si flatulentus spiritus doloris causa fuerit, clysteres qui flatus discutere possunt iniiciendi, qualis est qui accipit: *Abrot.*
- C** *ni, origani, pulegii, calamintha, chamæmeli sing. manip. vnum. Ruta, mentha, mentastri, singul. manipulum dimidium. Seminum anisi, fœniculi, carei, cumini, anethi, smyrni, dauci. singul. drach. duas.* Coquantur omnia ad tertias, dein accipiant iuris decocti colati, *libr. vna. Hieræ picra, benedictæ laxatiuæ, utriusque vnciam dimidiā. Castorei, drach. vnā. Specierum diacumini, drachmas duas. Oleorum rutacei, anethini, utriusque vnciam vnā & dimidiā. Salis communis, drach. vnā & dimidiā. Commixtis omnibus fiat clyster.* Potest etiam prædictis addi compositio de *baccis lauri* appellata, quæ ad discutendos flatuosos spiritus nihil est efficacius. Proderit quoq; eius cōpositionis quantitatem nucis auellanæ in decocto aliquo incidentiū & extenuantiū medicamentorum indies propinare. Extrinsecus autem abdomen iis, quæ flatus dissipant fouendum & irrigandum erit; cuiusmodi sunt, præter ea, quæ paulo ante diximus, *nigella, ammi, petroselinum, amygdale amaræ, piper nigrum, mentastrum, bacca lauri, absinthium, semen vrticæ, acorus, maiorana, cinnamomum, & alia quæ libro primo De cōpositione medicamentorum commemorauimus.* Ex iis itaq; cataplasmata, fomenta, aut sacculos parabis. Quod vero omnia reliqua vincit, & incantamenti cuiusdā simile quid efficit, Galeno libro duodecimo *Ther. meth. cap. ult. teste*, est cucurbita maxima leuis cum copiosa flamma toti abdomini affixa. Eger etiam a diluti vini, & frigida aquæ potu, lactis & aliorum refrigerantium, ac flatuosos spiritus gignentium alimentorum usu, sibi caueat. At vini potius meracioris potu, victusq; ratione reliqua calefaciente ac incidente vtatur. Præterea phlegmone intestinum exerceente, vena in cubito aperienda est. Si vero vrinæ difficultas superet ac domineretur, ex malleolo sanguis detrahendus erit. Prædictis etiam vtendum remediis, exceptis acerbis, & vehementer purgantibus. Clysteribus vero potius lenientibus, item cataplasmatibus, & irrigationibus, & in oleum descensu vtendum. Cucurbitulas etiam iis affigimus: Victus autem ratio tenuis sit, & fere febricitantium, donec phlegmone soluatur. Atqui si propter acres rodentesque humores dolitant ægri, per sedem infundere conuenit ea, quæ humores eluere, atque citra mordacitatem purgare possunt: cuiusmodi est ptisanæ succus, aut decoctum *fœnogræci, seminis lini, maluæ, hordei, chamæmeli & althææ, cū adipe recenti anseris vel gallinæ, & rosaceo olco.* Conuenit autem hoc potissimum enema, quod habet: *Foliorum violæ, intybi domestici utriusque foliorū althææ chamæmeli singul. manipulū vnum & dimidiū. Seminū fœnogræci, lini, utriusque vnciā dimidiā. Bulliant in aqua iusta quantitatis, donec tertia pars absorta fuerit.* Dein accipe iuris decocti colo transfusi, *uncias tredecim. Cassia fistularis vnciā vnā. Hieræ picræ, drach. tres. Olei rosacei, vncias duas. Olei anethini, vnciam vnā. Pinguedinis anseris, gallinæ, utriusque drach. tres. Vitellos oui numero duos. Commixtis omnibus fiat clyster.* Porro non solum vacuare, verum etiam temperare infestantem humorem oportet. Quapropter balneis ex dulci aqua vtendum: ea enim mitigare, & so-

Vomitus.

Inessus.

Vinū absinthites.

Castoreum.

Stupefacientia vitanda.

Curatio doloris colici a flatulentis spiritibus. Clyster.

Cōpositio de baccis lauri.

Flatus discutientia.

Cucurbitæ applicatio.

Victus.

Colici doloris ab phlegmone curatio.

Victus.

Colici doloris ab acerbis & rodentibus humoribus curatio. Clyster.

Stupefaci-
catia.

Philonium
Cataportia
de cyno-
gloſſo.

Quæ a tota
ſubſtantia
conferunt
colicis do-
loribus.
Stereus lupi

Menta vi-
ridis.

Ileos.

Voluulus.
Iliaca.
Cauſæ.

Quibus ma-
lū hoc fami-
liare fit.
Signa.

Chordapſo

Curatio.

Si a crudita-
tib. accidat.

Clyſter.

mnium conciliare poſſunt. In quem etiam uſum exhibenda ſerapia *violaceum & roſa-
ceum*, aliaque eiufmodi, quæ contemperate, ac vim mordacium humorum obtunde-
re valent. Utendum etiam cibo ſorbili, piſana nim. rum, ac piſcibus ſaxatilibus. Ab-
ſtinen- dum acribus omnibus & calidis tum cibis, tum medicamentis, fomentis, irri-
gationibus, cataplaſmatis calentibus, necnon vini potione, potiſſimum ueteris. Et ve-
rem omnem paucis perſtringam, tota victus ratio humidior & frigidior ſit. Quum au-
tem dolor nihil remiſerit, ſed vehementius ſubinde ſæuierit, ad ſtupefacietium uſum
confugere oportet. In hoc enim vitio, non ſolum, quod ſenſum ſtupefaciunt, ſed &
quia humores tenues craſſiores reddunt, caloremq; immodicum exſtinguunt, ea opi-
tulantur. In horum vero genere *Philonium* potiſſimum conuenit, de quo integrā ma-
gna ex parte drachmam exhibere licebit. Cataportia quoq; de *cynogloſſo* inſcripta, mi-
ſerice conducunt, ſi *ut antea etiam monſtratum eſt*, ex vna drachma ſex conficiuntur pi-
lulæ, vnaq; ante cubitum deuoratur. Ceterum multa admodum ſunt, quæ a tota eſſen-
tia colicis auxiliantur cruciatibus. Inter quæ non poſtremum locum obtinet *lupi ſter-
cus album, ex aqua, aut vino albo tenui ſumtum*. Melius autem ſtercus cenſetur, quod in ter-
ram non delabitur, ſed in fruticem aut herbā excernitur. Ea enim eſt luporum na-
u- ra, quæ canum, ut ſuſpenſo altero poſteriorum crurum & meiant & cacent, in eminē-
ti quopiam ex terra. Itaq; in ſpinis ſæpe æſtate ſtercus lupinum reperitur, & fruticib.
vepribus, herbisq; procerioribus. Amuleti etiam inſtar colicos dolores iuuat idem
ſtercus lupi, illius vinculo & lana ouina conſecto alligatum. Quod Galenus etiam verum eſſe ex-
perientia cognouit. *Menta viridis, Actioli. 9. c. 31. auctore*, aliquandiu decocta, & ad tres
dies pota, dolorem proſus e medio tollit. Plura alia eodem in loco reperiēs.

De ileo. C A P. XVIII.

Eius vitium eſt *tenuium inteſtinorum, grauiffimos & letales dolores inferens*. Sic dictum
Ea doloris circumactione. *Ilia* enim Græcis eſt *circumuiui*, & *circumagi*. Quare re-
cte Latinis *voluulus* & *conuoluulus* appellatur. Barbaram ſectantes medicinam, *Iliacam*
paſſionem & *Miſerere mei* nominant. Contrahitur id vitii cōtinua ciborum corruptio-
ne ac cruditate, maxime vero ex pinguibus carnibus, quæ ſubinde eorruptionem ex-
pertæ & retentæ, obſtructionem in tenui inteſtino creant. Oboritur etiā ex plagis &
ictibus quibuſdam iis locis, in quibus tenue eſt ſitum inteſtinum, factis. Item ex frigo-
re vehementi conſtringente, ac excrementa retinente. Exaceruata præterea frigida
potione, maxime ſi a ſudantibus plurimum accipiat. Contingit & iis, quibus inte-
ſtinum in ſcrotum vna cum ſtercore delapſum eſt, indeque violenter retruſum, ex eo-
que inflāmatum exiſtit. Fit quoq; ob letalium medicamentorū potum, & propter in-
duratū ſtercus, circa tenue inteſtinum impactū. Magna vero ex parte vel a phlegmo-
ne, vel obſtructione aridi ſtercoris, vitium hoc oritur. Familiare quidem eſt hoc ma-
lū pueris, euadunt tamen naturalis humiditatis beneficio. Senib. non admodū accide-
re ſolet: ſi tamen eo tententur, fere nunquā conualeſcunt. Accedit ſane huic vitio cor-
reptus dolor vehementiſſimus, & tumor aliquiſ in tenuiſ inteſtini parte eminet, ut
videatur idipſum ad chordæ ſimilitudinem conuolutum: vnde etiam *Chordapſon* nō-
nulli id genus mali appellauerunt. Adeſt etiam ſtomachi nimia humectatio, exolutio,
ruſtus inanes, & nihil alleuantes, murmura inteſtinorum, cohibitiō perfecta ſterco-
ris & flatuum. Si vitium intendatur, omnia ſurſum feruntur: ob idque & vomitus pi-
tuitæ ac bilis accedit, frigiditas totius corporis, dolorq; plurimis etiam ſpirandi diffi-
cultas. Morituris autem amplius ſudor frigidus, vrinæ difficultas, podex ita adſtri-
ctus, ut neque ſpecilli extremum ſuſcipere poſſit. Aliquando & ſtercus vomitu reiici-
tur. Quod ad curandi rationem attinet, pueros quidem irrigationibus, cataplaſmatis,
clyſteribus, glandibus, & fomentis, ſicut in capite *De colli doloribus eſt cōprehenſum*, curare
oportet. Adultis vero pro cauſarum diuerſitate medendū. Si igitur cruditatibus, ac
multis variisq; cibis ingeſtis, qui ventriculo adhuc inſident, vitium accidit, vomitus
cum iis, quæ ſupra dicta ſunt, concitandus erit. Si vero nihil crudorum ciborum in vē-
triculo contineatur, omni conatu enitendum, quo tum flatuſ, tum ſtercora infra tra-
hantur: idq; per clyſteres, glandes, & illitiones, magna in ſingulis adhibita diligentia,
efficiendum. Quare poteſt iniici clyſter eiufmodi, qui accipit: *Mercurialis, ruta, foliorū
althææ, centaury minoris, ſingul. manipulum vnum. Hyſſopi, calaminthæ, abſinthii ſingulorum
manipul. vnum cum dimidio. Radicis althææ, vnc. vnam. Radicis cucumeris ſylueſtris, drachmam*

A unam & dimidiam. *Seminum lini, fenograci, utriusque drach. tres. Seminis cumini, drach. duas.* Ebulliant in aqua iustæ quantitatis, donec tertia eius pars absunta fuerit. De n accipe iuris decocti colati, uncias quatuordecim. *Benedicta laxativa, ut vocant, unciam unam. Butyri recentis, mellis rosacei colo transfusi, utriusque unciam dimidiam. Oleorum rutacei, anethini, utriusque unciam unam & dimidiam. Salis vulgaris, drachmam unam.* Conmixtis omnibus fiat clyster, qui ante cibum infundatur, malo autem urgente acibo etiã. Præcipiendumq; ut quândiu quidem queant, hunc ægrotantes retineant. Prodest vero vnice ut principio iniiciantur clysteres emollientes, leuiter detergentes, atq; extremēta inferiorum intestinorum vacuantes, atque ne illa ad locum affectum trahantur, impediētes. Postea paulo vehementiores iniiciuntur, lenientibus tamen ac dolore in

B mitigantibus adiectis, qualis est cuius iam compositionem præmisimus: *Glandes, quemadmodum in coli doloribus parandæ, adiectis semine ruta, cumino, & brassica caulibus.* Longiusculas quoque facere oportet, ut profundius penetrare possint. Præterea *cyclamini succo, aut melle cum nitro podex illinendus.* Cataplasmata & tomentã, quibus hoc vitium curatur, fere sunt talia, qualia in capite. *De coli doloribus dicta sunt.* Conueniunt autem maxime fomenta ex *lanis, oleo, in quo cuminum, anethum, ruta & nasturtium decocta sint, madefactis.* Cataplasmata vero ex *semine lini, fenograco, farina hordeacea, loliacea, ruta, cumino, anethi semine & apii.* In solium quoque aqua & oleo refertum descendere conuenit: in aqua vero althea, ruta, & anethum decoquantur. Post hæc cucurbitulæ affigantur, primum quidem ad remotos locos, leues: deinde ad ipsos etiam dolore affectos, scarificationesque profundiores fiant. Purgationes etiam assumere conuenit, potissimum si prius per ea quæ dicta sunt, stercorea ad inferiora tracta fuerint. Mirifice ipsis conducit, si vomuerint, *anethum coctum potumque.* A potu vero panem in aquam feruentem coniice, eiusque frusta calida confestim edenda præbe. Qui ex venenato medicamento in ileon inciderunt, iis aqua tepida multa bibenda detur, vomereque eogendi. Deinde oleum calidum in potu dandum, aut pinguiora iura, ut rursus vomiant. Postea diebus aliquot interpositis, theriace, cum vino dissoluta, detur. Cibis vescantur boni succi: Quod si obstructio perseverauerit, alius lacte scisso cum modico scammonia, vel aloes, vel alio quodam purgante medicamento inanicienda erit. Si ab phlegmone ileos orta fuerit, a venæ sectione auspiciandum erit: deinde cucurbita phlegmone affectis partibus per ambitum scarificatis affigenda. Clysteres etiam ex decocto *maluæ, fenograci seminis lini, cum oleo & butyro* iniiciendi. Extrinsecus quoque ea quæ phlegmonibus conducunt, & dolorem leniunt, apponenda. His etiã tenuissima victus ratio præscribenda. Si ex intestini in scrotum delapsu ileos accidat, confestim retinandum est, ut decubitu sursum versus vergente adornato, delapsum intestinum ad inguinum partes retrudatur, atque leniter citra violentiã ac compressionem, ligaturâ fasciæ adhibita contineatur.

Glandes.

Illitiones.

Fomenta.

Cataplasmata.

Cucurbitulæ.

Purgatio.

Si ex venenato medicamento.

Si ab inflammatione.

Si ex delapsu intestini in scrotum.

De lumbricis. CAP. XIX.

L V M B R I C O R V M, quos Græci *ἐμύρτας* vocant, tres sunt in vniuersum differentiz. Prima *teretum* seu *rotundorum*, altera *latorum*, tertia eorum quos *ascaridas* nominant: *Teretes lumbrici*, speciem habent omnibus perspicuam: secundum enim crassitudinem rotundi sunt, longitudine vero palmares, & aliquando longiores, aliis que sunt frequentiores. Græcis *ἐμύρταις* & *εγγύριαις* nominantur: In gracilibus plerunque intestinis consistunt, & ventriculum subeunt, ideoq; crebro per os reiciuntur: quibusdã etiam e narib. redduntur. Atq; hoc genus infantib. & pueris, atq; iis, qui ad pubertatē accedunt, peculiare est. *Lati*, qui a Græcis *κατὰ* & *ταπιά*, quod scil. instar institarū & fasciarum sunt lati & longi, appellantur: Incredibilis vero longitudinis sunt, ut *Plin. li. ii. c. 33. testē*, tricenum aliquando pedum visæ sint, aliquando etiam plurium. Nihil autē est latus lumbricus, *Paulo & Aetio auctoribus*, nisi permutatio intrinsecus tenuia ambientis intestina membranæ, in corpus quoddã viuum, & animalis modo mobile. *Ascarides* tenues ac breues, vermibusq; similes lumbrici sunt. In recto intestino, & in extremo ani magna ex parte reperiuntur. Omnium generū origo est ex cruda, crassa, pituitosaq; materia, & putredini accommoda, qualis in pueris maxime, & aliis voracib. colligitur. Eos, qui rotundos lumbricos habent, sequitur incredibilis intestinorū & vetriculi morfus, tussiculæ tenues & exiguæ, ac frequēter irritatæ, & siccæ. Nonnullos comitatur singul-

Tres lumbricorum differentiz: Teretes.

Lati.

Ascarides.

Causæ.

Signa rotundorum.

tus, & ſomnus cū palpitatione, ii etiam præter rationem exſurgunt. Nonnulli & cum clamore erpergeſcunt & proſiliunt, & iterum ſopiantur. Quidam vero & linguā exerunt, oculosq; claudunt, ac taciturni ſunt, excitantibusq; indignantur, quod ſc. ob imbecillitatem vigilare nequeant. Quidam autem oculos ſanguine ſuffuſos habent & pulſum inæqualem, obſcurum, deficientem & recurrentem. Nonnullis quoq; appetentiz amiſſio accedit. Pueris dum dormiunt manducatio linguæ cui accedit cōformatio oris in modum lactentium, aut accipientium cibum: aliquibus etiam dentium ſtridor accedit. Verum hæc paulatim, & ex interuallis ſunt. Quibuſdam ad ſtomachū procurrunt, nauſearumque & eroſionum cauſæ ſunt, & laborantes cibum reſpuunt. Compulſi enim ad cibum nauſeabundi, vix quod aſſumitur deglutiunt, vel etiam reuomunt. Plerisque vero alius cibos corruptos deiicit, & tympani modo inflatur: reliquum vero corpus ſine ratione contabefcit, neque inedia præcedente, neq; immodica euacuatione facta. Contingit etiam aliquando faciem fieri rubicundā maxime circa malas: verum color hic rurfus in liuorem tranſit. Alii inſtar delirantium abſurda in ſomnis loquuntur. Alii decubitus tranſmutant, & ex loco ad locum ſeſe viciffim proiciunt. Febres in eis ſine ordine augeſcunt, cum vehementi extremarum partiū refrigeratione, tertiam, interim quartā, die vel nocte ſine ratione acceſſionem habentes. Ceterum non in omnibus omnia quæ nunc commemorauimus ſigna ſunt ſingulatim inquirenda, ſed quæ reliquis præpollent, ac principatum tenent: aliquando etiam plurima. *Latī* lumbrici continuos ſtomachi morſus inferunt, & ad cibos impotentem & incorrigibilem appetentiam. Nam quod animal euasit in inteſtinis obiectum rapitalimentum, vt alio ſtatim opus ſit: & niſi aſſumſerint, inteſtina rodantur. Eos qui ſic patiuntur, conſequitur corporis gracilitas & imbecillitas cum inæqualitate. Infallibile autem ac certiſſimum iudicium, ſi cum recrementis quædam ſemini cucurbitæ ſimilia excernantur. *Aſcarides* vehementem in ano pruritum excitant, aſſidueque ad egerendum irritant. Et qui hoc vitio afficiuntur, vt plurimum ab excretionemeliuſ habet. Viſtus ratio calida & ſicca ſit, potiſſimum ſi febre ægrotates vacauerint eiſque vtantur probi ſucci, & qui facile in totum corpus diſtribuantur, nec lumbricorum effectricem cauſam adaugeant. Quare omnia quæ pituitoſos humores procreare poſſunt alimenta fugienda. Præterea qui lumbricorum vitio affliguntur, liberalius ſunt nutriendi, famemq; minime ferant: quod lumbrici, niſi cibum habeant quē abſumant, ſtatim ſubinde ſolida corpora arroſant. Dabitur vero tum præcipue eiſ, quum non proſuſ inaniſi fuerint. Vinum bibant aquoſum. Porro curandi ratio non differenda, & interdum ſimul febris, ſi adeſt, & lumbricorū habere curam: interdum autem parum de febre ſollicitos eſſe oportet, ac ſtudioſe lumbricos de corpore eximere. Quare cum multi hoc ipſum non animaduertent, factum eſt vt nulla lumbricorum ratione habita, corroſi ab iſdem ſint, & conuulſi interierint. Curatio verotā rotundorum quam latorum in hoc conſiſtit, vt hos prius occiſos, expellamus. Occiduntur autem amariſ maxime medicamentis, inter quæ vbi febris abeſt, ſimpliciora hæc ſunt: *abſinthium, ſcriphium, abrotanum, calamintha, marrubium, dictamnus, hyſſopus, ruta, folia perſice coriandri ſemen, cornu ceruinum, lupini, menta, pulegium, origanum, centaurium minus, filix gentiana, ariſtolochia rotunda, allia, braſſica ſemen, & helenii radix.* His ſi febris adeſt, iungenda ſunt *intybi vtriuſque ſemina, itemque earundem herbarum ſucci, myxariaque.* Inter omnia autem laudatiſſimum eſt remedium *aloe.* Quia vero infantes aloem grauiter propter ſuam amaritudinem admittunt, ſupinis faſciola ipſis detentis, ore adaperto ac diducto, per fiſtulam quandam valido munitam canali, inuitis illam iniiciemus. Ex nunc autem comprehenſis ſimplicibus medicamentis, varia compoſita effici poſſunt, nimirum *decocta, pulueres, cataplaſmata, emplaſtra & unguenta.* Inter reliqua vero is puluis vniueſ confert, qui habet: *Seminis ſantonici, quod lumbricorum vocant, drach. duas. Centaurii minoris, abſinthii, cornu ceruini uſti, ſing. drach. vnā. Calamintha, pulegii, origani, ſingul, drach. dimidiā. Abrotani, menta, lupinorum, foliorum ariſtolochie rotundæ, ſingul. ſcrupulum vnum. Aloes, ſcrupulos duos, commixtis omnibus ſingatur puluis, de quo detur pondus drachmæ vnius, aut ſemis, pro ætatis & habitus corporis ratione in lacte, aut melle, aut ſerapio e dulci radice. Nā debent ea quæ lūbricos enecant, cum dulcibus liquorib. propinari, quo citius medicamenta dulcedine illa alleſti lumbrici ample-*

Signa latorum.

Signa aſcaridum. Viſtus ratio.

Curatio.

Simplicia medicamenta lūbricos necantia.

Aloe.

Compoſita

Puluis.

A amplectantur. Extrinsicus etiam umbilicus felle taurino, aut hoc unguento illinendus, *Vnguentum*
 quod accipit: Olei amygdalarum amararum, & absinthitis, utriusque unciā unā. Fellis tau-
 rini, unciā dimidiā, Centaurii minoris, absinthii lupinorum, singul. scrupulos duos. Foliorum
 persicae, cornu ceruini vsti, aloes, abrotoni singul. scrupulum unum. Cera quod satis est, fiat un-
 guentum. Aut imponatur regioni totius ventriculi hoc ceratum, quod habet: *Ceratum.*
 Aloes, absinthii, farina lupinorum, singul. drachmas duas. Nigella, menta, origani, pulegii, marrubii,
 singul. drachmā unā. Centaurii minoris, calamintha, utriusque drachmā dimidiā. Olei
 absinthitis, & amygdalarum amararum, utriusque unc. duas. Olei costini, unciā unā. Fellis tau-
 rini, unciā dimidiā. Cum cera & resina quantum sufficit, fiat ceratum. Ad eorundem ex-
 empla facile quispiam emplastra & cataplasmata componet, ita ut necessarium non
 sit singulorum formulas adscribere. Porro ab inferioribus etiam partibus nullam in-
 iicere copiosorem expedit; quo lumbrici mellis dulcedine illecti, deorsum repant.
 Enecatos vero lumbricos per praedicta medicamenta, citra dilationem expellere o-
 porter. Vitiosa n. ex ipsis exhalatio procedit, quae & appetitum deiicit, concoctionēq;
 laedit: sursum etiam delata vertigines, aliaq; mala creat. Expelluntur autem, magna ex
 parte, per glandes & per purgantia medicamenta, potissimum vero per hieram picram,
 & catapotia pestilentialia, aut Ruffi vocata, quae sane miram & in enecandis & educendis
 lumbricis efficaciam obtinent. Ceterum qui cum lumbricis alui etiam profluuium in-
 festantur, eos fluorem inspissando, & concoctionem tum per cibos, tum per catapla-
 smata in melius permutando, curare oportet. Quantum enim profluuium inualescit,
 tantum etiam lumbricorum generatio augetur: vicissimque fluxu cessante, lumbrici
 interquiescunt. Quapropter summa diligentia annitendum, ut aliud adstringatur;
 firmitasq; ei adiciatur. Propinandus itaq; plantaginis succus, vel ipsa etiam arida pla-
 tago assumenda: ex a quo enim utriq; & fluori & lumbricis, efficax est. Cataplasmata
 quoq; cerata & unguenta ex cruda hordeacea farina, malicorio, hypocisthide, & similibus ad-
 stringentib. componenda, adiectis tamen iis, quae ad lumbricos interimendos idonea,
 sunt. Conferunt autem adstringentia medicamenta extrinsecus admoda hoc etiam
 nomine, quod ventriculum ex amarorum medicamentorum frequenti usu laesum, i-
 terum corroborant. Licebit etiam in hoc casu vermes terrenos exsiccatos, & in pulue-
 rem redactos, cum hydromelite exhibere. Ascarides in infantibus educendi sunt cum glā-
 dibus ex melle & sale paratis. In prouectioribus, aut clysteribus ex acri muria, aut decocto
 absinthii, centaurii minoris, calamintha, lupinorum, pulegii, & aliorum supra commemoratorum,
 adiectis oleis, paratis. Post clysteres rectum intestinum simplicibus quidem acacia, hypo-
 cisthide, rhois succo, aut alio adstringente sublinendum est. Coacta enim ab adstringentibus
 caro corroboratur, habilitatemque ad animalculorum generationem amittit, at-
 que ascarides ipsos excludit. Hoc vero quod sequitur, & pueris, & qui prouecti
 sunt aetatis conducit, efficacissimumque existit. Carnem veterem salitam, pingue-
 dine derasa, sublongam & rotundam formabimus, atque ita adaptatam podici intru-
 demus, ligamentoque adhibito, quam diu sustinere possint, inditam sinemus, deinde
 soluemus, simulque ascarides illi adhaerentes educemus. Post haec, quae praedicta sunt,
 infundemus, atq; illinemus.

De haemorrhoidibus. C. A. P. XX.

A *poplitis* Græcis venarum in sede sunt explicationes, dilationesq; a crebro sangui-
 nis defluxu sic appellatae. Harum quidem aliae sunt caecae, quae sc. intumescunt, &
 nihil aut parum admodum sanguinis excernunt. Aliae apertae, quae nimirum certis
 quibusdam temporibus panduntur, & sanguinem emittunt. Fiunt autem haemorrhoi-
 des, ppter copiam sanguinis foeculenti & melancholici, quem iecur ad ipsas reponit.
 Signa p quae vitium deprehenditur, nō admodum requiruntur. Oculis n. conspiciun-
 tur caecae, & dolorem vehementem, potissimum in excernendo stercore, excitant.
 Apertae vero sanguinem fundunt, ideoq; latere agrotantes haud possunt. Quum ita
 que caecae apparuerint haemorrhoides, & magnos in ano cruciatus excitauerint, cor-
 pusq; plethoricum fuerit, vena poplitis aut malleoli incidenda erit. Alius etiā affatim
 mollienda, ne arida stercorea dum excernuntur, dolorem pariant. Apponenda quoq;
 ubi vehemens dolor fuerit, quae illum mitigare possunt. E quorum numero est mica pa-
 nis in lacte macerata, & cum oui vitello decocta, ac instar emplastri admoda. Prodest etiam soliu

*Hemor-
rhoides.
Caecae.
Apertae.
Causae.
Signa.
Curatio et
eorum.*

ex decocto malua, foliis violae purpureae, meliloti, fenogræci chamæmeli, altheae foliis, lini semine **A**
 verbasci floribus, & similibus apparatus. Quod si quis eo uti non poterit, lanæ aut spon-
 gæ in decocto iam dicto irrigatæ & madefactæ, dolenti loco adhibeantur. Quod si
 prædicta nihil contulerint, sanguinem ab iis elicere oportet. Quapropter cyclami-
 ni succum, aut cepæ, aut fel bubulum lana illitum intra anum imponere oportet. Idem etiam
 potest centaurii minoris succus, stercus columbinum, staphys agria, folium ficus, si cum eo fri-
 centur, & medulla colocynthidis in oleo amygdalarum amararum macerata. Inter reliqua ve-
 ro alia multa hoc emplastrum vnice confert, quod habet: Stercoris columbini unciam
 dimidiam. Seminis staphydis agriae, lupinorum, utriusque drachmam unam & dimidiam. Amy-
 gdalarum amararum, drachmam unam. Medulla colocynthidis, drachmam dimidiam. Succus
 cyclamini, cepæ, utriusque unciam unam. Commisceantur singula, & ad formam emplastri **B**
 redigantur, adiecto, si opus fuerit, oleo amygdalarum amararum. Glandes etiam oblon-
 gæ ex radice cyclamini paratæ in anum indiri possunt. Hirudines quoque in harundine in-
 clusæ, ita ut caput duntaxat exerant, hæmorrhoidibus, ut aperiantur, imponi solent.
 Has si deinceps amouere haud poteris, cernere illarum capiti insperso, decidere sua sponte
 facies. In mollibus & delicatis panno aspero podex confricari poterit. Ceterum si aper-
 tæ fuerint, & sanguinem modice per certa intervalla fuderint, minime supprimendæ
 sunt: quod huiusmodi sanguinis eruptio homines hoc vitio detentos a multis aliis
 morbis rutos reddat. Id quod in primis statuit Hippocrates, qui in Epidemiis ita scri-
 ptum reliquit: Habentes hæmorrhoidas neque laterum dolore, neque pulmonis phlegmone, neque
 de pascendi ulcere, neque furunculis, neque terminthis, pariter neque lepra, neque vitiliginibus cor-
 ripiuntur. Hæc ille. Quod si vero immodice ac iusto longius sanguinem fundant, sic
 quod ægri hoc vitio contabescant, ac illorum robur deiiciatur, supprimendæ confe-
 ctim: quod alias periculum sit, ne aqua inter cutem, iocinore propter immodicam
 vacationem refrigerato, sequatur. Cibus itaque, qui supra modum inaniuntur, utatur
 pauci sanguinis, efficacib. & minime recrementiciis, quique siceant, & adstringunt: cu-
 iusmodi est alica & oryza. Ex oleribus intybum, cichorium, portulaca, & similia. Cibus rhu ob-
 soniorum, aut succus immaturarum uicorum admisceatur. Si vires plurimum prosterantur,
 e carnibus expresso succo, cui cotoneorum succus permixtus sit, alendus æger erit.
 Vina bibenda adstringentia. Ceterum quod ad curandi rationem spectat, si plenu-
 do corporis affuerit, venæ interioris in gibbero dextræ manus sectio proderit. Sin-
 minus, auersioni per cucurbitulas hypochondriis & iocinori affixas studendum. In
 quem usum manib. & brachiis etiam vincula iniicere, & frictiones asperas adhibere co-
 nuenit. Præterea intra corpus assumenda erunt ea quæ adstringunt, ut est serapium rosa-
 ceum, myrtinum, cotoneorumque, corallia rubra, bolus armenius, pastilli de succino, & spodio, de terra
 lemnia, & alia quæ in capite De cruento spuito sunt commemorata. Extrinsecus etiam ea appo-
 nenda, quæ sanguinem promanantem sistere possunt. E quorum numero, Actio etiam
 ipso libro 14. capite 5. auctore, aloë existit, cum posca imposta. Idem quoque potest squama
 ferri, aut plumbumustum. Vnice autem confert medicamentum, quod describitur a Ga-
 leno libro 5. Ther. method. & accipit: Thuris partem unam, aloës partis unius semissim. Hæc cum
 oui candido donec ad mellis crassitudinem redeant subiguntur, & mollissimo lepo-
 ris pilo excepta valis sanguinem effudentibus imponuntur, fascia ex tenui linteo fo-
 rinsecus alligata. Proderunt quoque unguentum, balnea, infusiones, fomenta, & alia huius
 generis ex medicamentis adstringendi viribus præditis composita: quorum sanè multa supra in
 cap. De diarrhæa, lienteria, dysenteria & tenesmo diximus. Quod si sacculorum usus erit, præstat
 eos in vino rubeo & adstringente, priusquam admoueantur, bullire, aut saltem irrigare.
 Reliquæ medicamentorum formulæ ex capitibus nunc citatis petantur. Quod si vero
 dolor una cum caliditate vehemens accesserit, oleo rosaceo, violaceo, chamomelino, utendū
 erit, in quibus interdum cogimur opium dissolvere, & una cum mucagine fœnogræci,
 & paucis croco adhibere.

De procidentia ani. CAP. XXI

ACCIDIT interdū, ut propter resolutionem, aut imbecillitatem musculorum lato-
 rum, & tenuium sedem sursum reuellentium, anus peccat. Quare cum a prædi-
 ctis nunc musculis an? retrahi ac sursum euelli nō queat, sit ut manibus aut medicamentis
 opem ferentibus egeat. Fit autem resolutio eorum musculorum post diuinam in a-
 qua

Aqua frigida natationem. Fit etiam malum hoc propter præcedentem dysenteriam, & tenesmum, in quo ob nimiam contentionem in reddendis excrementis anus procidit. Quum vero prociderit anus, diligenter considerandum erit, num a phlegmone liber sit, nec ne. si enim nulla phlegmone occupetur, statim manibus sensim impulsus in pristinum locum protrudi ac reponi debet. Ne autem intrusus ac in locum suum repositus iterum excidat, adstringentia extrinsecus medicamenta apponenda sunt. Primum itaque oleo rosaceo calente circumlinendus, aut vino adstringente detergendus anus, ac subinde in suum locum repositus deligandus erit. Idque statim simulatque æger excrevit faciendum, ne quum ipsum ad egerendum iterum necessitas urget, denuo procidat. Linimentum autem ex *acacia & hypocisthida cum vino adhibendum*. Incoquenda quoque in aqua donec rubescat, *galla, balaustium, glandium calyces, malicorium bellis minor, rhu obsoniorum, cortices cotoneorum, & similia*, ac deinde ex eulmodi decocto infusus & abluiones parentur. Postquam vero vino aut decocto adstringente sedes abluta fuerit, tum arida admouere ac inspergere medicamenta licebit. In quem usum *bolus armenius, thus, sanguis draconis, galla, acacia, myrrha, hypocisthis, cornu ceruinum, & eius generis adstringentia medicamenta, de quibus iam saepe dictum est*, adhiberi possunt. Quod si vero propter phlegmonem anus in tumorem elatus impelli & reponi nequeat, ubi plenitudo fuerit, vena primum secanda erit, vomitusque ciendus. Sed etiam apponenda quæ adstringunt & reprimunt, sed statim inter initia. Si vero nulla adsit plenitudo, æger in scissione vtatur ex decocto *chamameli, malua, althea, seminis lini, fenograci, & similibus concinnata*. Aut in aquam calidam conscendat, & illic ad tempus immoretur. Spongiam quoque aut lanam in decocto prædicto madefactam admouere licebit. Anus denique oleis *chamamelino & anethino*, quousque reponi possit, illinendus. Prompte autem cum illis insit discutiendi vis, tumorem auferunt, atque adeo ut reponi nulla difficultate possint, efficiunt. Postquam vero iam reconditus est, tunc supra commemoratis medicamentis adstringentibus, ne scilicet iterum procidat, vtendum erit. Quod si autem manus propter musculorum prædictorum resolutionem procidat, postquam ille in pristinum locum repositus fuerit, remedia quæ resolutioni debentur, sacco & coccygi ossibus adhibendo erunt.

De rimis ani. C A P. XXII.

RIMÆ sedis, quas Græci *ῥιμίδες* vocant, sunt *scissura, quæ in musculo anum claudente, & quæ in extremitate nominant, aut in circulo, & extrema ani corona fiunt, similes iis quæ in labiis, ob Boreæ flatum asperiores, accidunt*. Euenire solent propter acrium humorum defluxum, aut phlegmonem, aut condylomatum extensionem. Sunt autem condylomata, rugæ seu eminentiæ quædam in ano, reduplicatis eius corpusculis, præter naturam insurgentes. Malum ipsum oculis obuium est, ideoque notis non indiget quæ in eius nos cognitionem ducant. Quod quidem ad curandi rationem attinet, si rhagades ab acris humoribus oriuntur, tum illi omnium primū purgandi ac contemperandi erunt. Si vero propter condylomata acciderint, itidem purgatis medicamentis inter initia vtendum erit. Alius etiam toto curationis tempore cibis humectantibus & pinguibus mollienda, ne aridum stercus conglutinationem remoretur. Huius autem generis sunt *malua, spinachia, lac amygdalarum dulcium, ona sorbilia, iuscula pingua, & id genus alia*. Ceterum rimis ipsis hoc adhibendum vnguentum, quod habet: *Oleorum rosacei, myrtini, utriusque vnc. vnā. Thuris, mastiches, lithargyri, sanguinis draconis, sing. scrup. vnum Aloes, plumbi vsti, cerussa, balaustiorum, boli armenii, sing. scrup. dimidium. Cera alba, quod satis est, fiat vnguentum*. Aut tale quod accipit: *Olei rosacei, vnc. vnā & dimidiam. Galla, myrrha, terra lemnia sing. scrup. vnum. Radicis symphyti maioris, aluminis scissilis, plumbi vsti sing. scrup. dimidium. Ovi assati vitellum, cera quod satis est formetur vnguentum*. Iam commemoratis vnguentis ter die rimas circumungere oportet, lotas prius decocto *rosarum, gallarum & sidiarum*. Quod si locum male affectum ardor & phlegmone affligat, vnguento candido, *capthurato* hodie vocato, illinendus erit.

De imbecillitate iocinoris. C A P. XXIII.

IMBECELLITAS iocinoris a nuda intemperie ipsa producitur calida, frigida, humida, vel sicca. Calida intemperies tum eos, qui prius adsunt, humores, tum hos etiam, qui per venas mesenterii ad ipsum iecur feruntur, adassat, & veluti comburit. Frigida

vero intemperies pituitosum & crudum humorem, qui iam in iecore continetur, A
 crassum & lentum ægreque mobilem reddit: eum vero, qui ad ipsum defertur, *semico-*
ctum relinquit. Ceterum sicca intemperies sicciores & densiores humores facit. Hu-
 mida autem tenuiores, & magis aquosos. Qui itaque facultates & vires iocinoris ha-
 bent imbecillas, & nullo alio vitio iecoris laborant, ii *hepatici* vocantur; *ut testatur Gal.*
lib. 5. De affectis locis, cap. 7. Calida autem intemperie iecur occupante, colliquationes
 fiunt, primum quidem humorum, deinde carnis etiam ipsius iocinoris, & bilis fœ-
 tens & crassa per ventrem euacuatur, abundeque colorata, febris ingens virget, cibi
 fastidium, & vomitus biliosus. Linguam scabrem habent, corpus siccum, & gracilius.
 Sitis denique infestat, vrina est rufa, pulsus celer. Vbi vero frigida intemperies affu-
 erit, neque assidua excretiones, neque multæ fiunt: quippe vitium diutius prolonga- B
 tur, & certis diebus venter maiori copia profluet: sed quæ egeruntur, minus fœtida
 sunt iis quæ per calorem sunt colliquata: neque color etiam, neque consistentiam,
 sed speciem præ se ferunt sanguinis putrefacti, & in grumos coacti. Et si quis diligen-
 ter consideret, neque sanguis niger est, neque grumus, sed veluti limus & fex quædam
 sanguinis crassi, proxime ad atram bilem accedens. Quinetiam plures & varii excre-
 mentorum colores frigidam intemperiem monstrant. In ea quoque febris languida
 apparet, facies non concidit, maiorque ciborum appetentia adest. Harum intempe-
 rierum quæcunque fuerit, si illi accedat siccitas, excrementa adhuc sicciora & pau-
 ciora erunt, ægrique magis sitient. Sin humiditas, liquidiora & copiosiora, sitisque
 minus infestabit. In curandi ratione is præcipuus scopus erit, ut intemperiem per cō- C
 traria emendemus. Calidam itaque intemperiem refrigerare oportet, frigidam vero
 calefacere, similiterque humidam resiccare, & siccam humectare. Coterum in cura-
 tione hoc etiam vnice considerandum erit, ut omnibus iecorariis, tum iis quæ per os
 sumuntur, tum iis quæ extrinsecus imponuntur, aliquid ex adstringentibus admiscea-
 tur, quo firmitas & robur visceris conseruetur, *ut fusius docet libro 13. The. metho. Gal.* In
 calida igitur intemperie, quod ad victus rationem attinet, utendum erit pitisanæ cre-
 more, & aliis cibis mediocriter refrigerantibus, *lactucis, intybis, cichorio, sonchis & pan-*
ex aqua. Pullis item gallinarum, perdicibus, auib. montanis, carnibus vitulinis cum omphacio,
aut limonibus vocatis, elixis. E fructibus ægri vescantur *passulis, limonibus, & amygdalis*
dulcibus. Vinum omnino circumsidendum, nisi aliam ob causam, nempe ven- D
 triculi imbecillitatem, hoc requirant: tum enim tenue & aquosum exhibendum.
 Bibant pro vino succum malorum punicorum, & serapium acidum simplex appel-
 latum, oxosaccharumque cum decocto hordei, aut intybi domestici. Arcendi et-
 iam sunt ab omni cibo & potu melle condito, & admodum calido, & incidendi vi
 prædito. Quod ad curationem spectat, per os sumendum *saccharum rosaceum, diar-*
rhodon abbatis, diatrion santalon, & id genus alia antidota. Proderit etiam hoc, quod ha-
 bet: *Specierum diarrhodon abbatis, diatrion santalon, utriusque drachmam unam & dimidiam.*
Seminum intybi satini utriusque, rosarum purpurearum, singulorum scrupulos duos. Vuarum
passarum, unciam unam. Santalorum alborum, cassuthæ, floris iunci odorati, singulorum scru-
pulum unum. Sacchari, uncias sex. Diluti in liquoribus stillaticis cassuthæ, & intybi satini la- E
tisfolii, singantur orbiculi. Quin & Philonis antidotus semel tantum exhibita, omnem
 aliquando calidam iecoris intemperiem mirabiliter sanauit. Extrinsecus adhiben-
 da fomenta ex *rosaceo, chamamelino, cotoneorumque oleis parata.* Aut absinthium, aut
 palmulæ prædictis oleis incoquantur, & in iis deinde lana vel spongia madefacta,
 illi loco ubi iecur est situm imponatur. Poterit etiam eius vnguenti esse usus, quod
 accipit: *Oleorum rosacei, cotoneorum, nymphæ, sing. unciam unam. Santalorum alborum, & ru-*
beorum, rosarum purpurearum, singul. scrupulum unum. Ramentorum eboris, scrupulum unum
& dimidium. Seminis intybi satini, utriusque scrupulum unum. Aceti, drachmam unam & dimi-
diam. Caphuræ grana duo. Cera quod satis est, fiat vnguentum. Epithemata etiam in hoc af-
 fectu non parum conducere solent, quæ in hunc vel similem confici possunt mo- F
 dum. Accipe stillaticii liquoris intybi satini latifolii, *lactuce, oxalidis, rosarum, nymphæ, sing.*
uncias tres. Succis semperuiui, unc. unam & dimidiam. Aceti, unc. unam. Rosarum purpurearum,
santalorum rubeorum, ramentorum eboris, sing. drach. unam. Specierum diarrhodon abbatis, dia-
trion santalon, utriusque drach. unam & dimidiam. Caphuræ, scrup. dimidium. Commixtis
 omni-

Hepatici
qui.
Signa, ca-
lida.

Frigida.

Sicca.

Humida.
Curatio.

Calida in-
temperiei.

Orbiculi.

Vnguentum.

Epithema.

A omnibus fiat epithema. Adhibenda vero sunt epithemata ætate quidem actu frigida, hyeme vero tepida. Vbi vero frigida in iocinore fuerit intemperies, calefacientibus & robur ac firmitatem addentibus medicamentis vtendum est. In victus ratione, cibis concoctu facilibus & calefacientibus. Exoleribus sane *satureia, hyssopo, fœniculo, petroselino, abrotono, salvia, & similibus*. Cibi quoque aromatis sunt condiendi, *cinnamomi* scilicet, *garyophyllis, pipere, & id genus aliis*. Vinum bibendum tenue, fuluum, & odoriferum, fugiendus piscium etus, fructuum frigidorum, ocium, & in summa quicquid refrigerare potest. Intra corpus sumendum hoc decoctum, quod habet: *Radicum apii, fœniculi, petroselini, singulorum vnciam vnam. Eupatorii, hyssopi, mentæ, absinthii, cichorii, cassuthæ, origani, calaminthæ, asari, sing. manipulum vnum. Seminum anisi, fœniculi, dauci, cumini, carei, singul. drach. duas Iunci odorati, drach. vnam & dimidiam. Mastiches, drach. vnam. Florum chamamelis, rosarum purpurearum, utriusque manipulum vnum. Cinnamomi selecti, drach. vnam & dimidiam. Coquantur omnia in lib. vna & dimidia vini, & lib. vna aqua fontana ad tertias, deinde colo transfundantur, adiectis serapii de eupatorio, vnc. tres. Et serapii de absinthio, vnc. vnam. Et commixtis omnibus fiat potio, de qua mane in aurora, & a prandio iam confecta concoctione, vnc. tres & dimidia sumantur. In eundem vsum exhibenda veniunt antidota calefacientia, nempe *diacinnamomi, dianisi, saccharum salvia, acorum conditum, radices pimpinellæ, saccharo obductæ, & alia eiusmodi*. Extrinsecus illinenda olea calida, vt est *nardinum, chamamelinum, absinthite, & similia*. Vnice vero confert vsus eius vnguenti quod accipit: *Oleorum absinthitis, nardini, utriusque vnc. vnam & dimidiam. Succi eupatorii, drach. duas, Cinnamomi, garyophyllorum, ligni aloes, sing. scrup. duos. Spica iunci odorati mastiches, utriusque scrupulum vnum. Cera quod satis est, formetur vnguentum. Poterit etiam adhiberi hoc ceratum, quod habet: Farina fœnograci, lupinorum, utriusque drachmas duas. Radicis iridis, asari, utriusque drach. vnam. Eupatorii, absinthii, meliloti, iunci odorati, singul. drachmam dimidiam. Gallie moschatæ, scrupulum vnum. Seminum anisi, fœniculi, utriusque scrupulum dimidium. Mastiches, scrupulos duos. Myrrhæ, thuris, utriusque scrupulum vnum. Oleorum mastichini, nardini, rosacci, anethini, singulorum vnc. vnam. Cera & resina quod satis est, informetur cerarum iocinori imponendum. Epithematis quoque illius vsus minime aspernendus erit, quod accipit: *Seminum anisi, fœniculi, ammeos, sing. drach. vnam & dimidiam. Cinnamomi, garyophyllorum, iunci odorati, singul. drach. vnam. Decoquantur in lib. vna & dimidia tartari, per dum medietas relinquatur, deinde colentur, & iuri per colum transfuso admisceantur liquorum stillaticiorum absinthii & eupatorii, utriusque vnc. duæ. Specierum diacinnamomi, diagalanges, utriusque drach. vna. Cassuthæ scrup. duo. Aceti, drach. tres. Commixtis omnibus fiat epithema. In humida vero iocinoris intemperie victus ratione desiccante vtendum, carnibus nimirum volucrum assis, vino tenui: iis quæ sudorem mouent, laconico, & balneis etiam sua sponte prouenientibus. Parum in vniuersum bibendum ac comedendum, pisces omnis generis, & fructus quibus humectandi vis inest vitandi. Intra corpus sumendum serapium de absinthio, antidotus dialachæ & diacurcumæ. Extrinsecus autem quæ exsiccant citra insignem calorem adhibenda, de quibus omnibus dicemus copiosius infra in capite De anasarca. Sicca iecoris intemperies haud secus atque aliz per contraria curanda erit. Quare vt rem paucis perstringamus, victus ratio conuenit humectans, ptisana ius carniū, lac amygdalarum dulcium, & balnea aquarum dulcium, & alia quæ humectare possunt, de quibus suo loco fusius dicemus. Hoc tamen, quod antea quoque monuimus, minime interim negligendum erit, vt humectantibus semper admisceantur, quæ visceri robur addere possunt. Ceterum inter ea, quæ a proprietate totius substantiæ componere videntur, optimum est lupinum iecur, si diligenter exsiccatum & tritum drachmæ vnius pondere cum vino dulci aqua diluto præbeatur. Hoc enim multiplici experimento cognitum, omnibus iecoris intemperiebus commodum existit: vt pote, quod diximus proprietate totius substantiæ hanc efficaciam habens, non calefaciendo aut refrigerando.***

Frigida intemperiei curatio.

Decoctum.

Vnguentum.

Ceratum.

Epithema.

Humida intemperiei curatio.

Sicca intemperiei.

Lupinum iecur.

Causa.

Nota.

De obstructione iocinoris. CAP. XXIV.

IOCINORIS obstructio fit a flatibus vaporosis ac crassis, concoctuque difficilibus, in eius visceris venis, quæ structura sua parua ac veluti capillares sunt, coclusis. Interdum vero a crassis & viscosis humoribus, in finibus venarum ex sima iocinoris parte enatarum, per quas ex ventriculo, & intestinis alimentum ad iecur distribuitur. Porro si vaporosi & crassi flatūs multitudo coacer-

uatur, quæ exitum liberum non habet, atque adeo obstructionem parit, non graui- A
tatis solum iuxta dextrum hypochondrium, sed & distensionis sensus oboritur. Ob-
structionem vero a crassis viscidisque humoribus, consequitur grauitatis cum do-
lore sensus, aliquando quidem obtusæ, aliquando etiam vehementis: & quando-
que quidem absque febre, quandoque cum febre. Crassa enim, viscosa, & multa, o-
mnino reliquis plus obstruunt, & maxime quando ægri a cibo vehementiori motu
vtuntur. Si vero acria sint, & multa quæ in cibo lumuntur, dolor ex obstructi- ne ve-
hementior fit: quum obturata corpora simul & tensionem perferant, simulque pun-
gantur. Cibi his qui sic laborant, dandi sunt calidiores, & qui tollendi obstructiones
facultatem habent. Cuiusmodi est porrum vel cepe ex oxymelite, asparagus, feniculum, petro-
selinum, cappares, & alia olera & obsonia cocta, aut cum condimento aliquo calefaciente obstru- B
ctionesque auferente sumta. Vitanda sunt omnia crassioris succi alimenta, balnea item,

Vitus.

Curatio.
Simplicia
iocrinoris
obstructio-
nem tollen-
tia.

& exercitia a cibo. Vinum in potu vteridum tenui, ac veteri. Præter victus rationem
attenuantium quoque & obstructiones tollentium medicamentorum quam ce-
lerrimus requiritur vsus. Siquidem obstructio inueterata non tantum in iocinore,
sed & in omni corporis parte putrefactionem operatur, febremque accendit. Præ-
clare autem & citra omnem molestiam ab obstructione leuant inter simplicia medi-
camenta, lupi iecur, fumaria, eupatorium, chamamelum, radix acori & dracunculi, asarum, ani-
sum, apium, absinthium, casia, iris, glycyrrhiza, rhabarbarum, lupini, cappares, ammi, cassuta, petro-
selinum, pistacia, amygdale amara, spica nardi, stæchas, gentiana, plantaginis radix, semen, & fo- C
lia sicca: anagallidis femina succus, cichorium, halicasabum, intyba utraque, asparagus, & ru-
scus. Ex quibus subinde varia medicamenta composita concinnari possunt, po-
tissimum autem decocta, admixtis oxymelite simplici, scyllitico, serapio acido compositio, de
absinthio, hyssopo, calamintha, marrubio, & id genus aliis. Ad eundem vsum licebit exhibe-
re pastillos de eupatorio, de absinthio, rhabarbaro seu scenitico, & iis similes. Conferunt quo-
que antidota dialacha, diacurcuma, dianisi, & huius generis alia quedam. Inter cetera au-
tem medicamenta simplicia supra commemorata ad auferendas obstructiones

Pistacia.
Vinum Ar-
uicum.

Purgatio.

vnice conducunt pistacia. Quapropter non solum utile, verum etiam iucundam
erit, si pistacia decem aut duodecim per noctem in vino Aruicio, quod hodie de-
prauata voce *Malmasinum* vocant, macerata, in aurora perfectis iam coctionibus su-
mantur. Extrinsecus quoque admouenda epithemata, vnguenta, emplastra, & ce- D
rata, quæ in capite superiore *De frigida intemperiei iocrinoris curatione* dicta sunt. Atque nunc
quidem commemorata medicamenta sufficient, si vitium nondum inueteratum
fuerit. Nam vbi in vetustatem abierit venæ etiam sectio, & purgatio, si nihil aliud pro-
hibeat, adhibenda erunt. Purgationem autem perficient catapota de rhabarbaro, de
agarico, aut alia antidota quæ crassos & lentos humores per aluum purgare possunt.
Purgandum autem per aluum tum maxime, quando caua iocrinoris laborant. Per v-
rinam autem trahere oportet, vbi gibba eiusdem male habuerint, quod Gal. *libr. 2. ad*
Glaucanem cap. 3. monet, multisque aliis locis. Vacuato corpore per venæ sectionem &
purgantia medicamenta, ea subinde, quæ supra comprehensa sunt medicamenta,
propinabuntur. Hoc potissimum antidotum, quod habet: *Radix iridis & chamapityos, E*
seminum anisi, apii, sing. drach. duas. Asari, drachmas duas & dimidiam. Cinnamomi, zingiberis,
carei, chamameli, sing. drachmam vnā. Stæchadis, gentiane, marrubii, singul. drachmas duas.
Cum oxymelite scyllitico quod satis est, fiat antidotum liquidum. Hoc sane mirifice obstructio-
nes, non tam eas quæ in cauo, quam quæ in gibbo iocrinoris hærent (per urinas enim ve-
hementer expurgare solet) penitus tollit.

Antidotum
liquidum.

Causæ.

Notæ.

De phlegmone iocrinoris. C A P. XXV.

IN iocinore, perinde atque in aliis visceribus, & ob easdem causas, fit phlegmone.
Phlegmone vero laborante iocinore, omnibus quidem ex æquo in dextro hy-
pochondrio dolor & grauitas est, supra ad iugulum vsque, infra vero ad spurias co-
stas perueniens. Tumor quoque dextri hypochondrii consequitur, præsertim si gib- F
bosa pars sit phlegmone affecta. Febris accedit acuta, quæ plerunque ad vesperam
& noctem exacerbatur, tussis exigua & sicca, sitis in exhausta, cibi vehemens fasti-
dium, difficultas spiritus. Linguae color in primis quidem ruber, deinde vero niger ap-
paret. Vomitus tum syncræ bilis, tum eius, quæ ouorum vitellis assimilatur, post autem
& eru-

A & eruginosa. Alius adstringitur. Color etiā corporis mutatur in arquati morbi speciem, singultus quoque conlequitur. Accessionis autem tempore quidam delirio apprehenduntur, & acrem urinam excernunt. Porro quæ in simis iocinoris partibus eueniunt phlegmones, fastidium, nauseam, vomitum biliosum, sitim ingētem magis inducunt. Quæ vero in gibbis partibus oriuntur, maiori quam priores inter spirandum dolore laborantem excruciant, magisque tussim excitant, atque dolorem vsque ad dextræ partis iugulum, adeo vt detrahi videatur, extendunt, vt copiose Galen. lib. 6. De affectis locis, cap. 5. docet. Accidit autem interdum, vt musculi iocinori incumbētes phlegmone infestentur, quare nonnulli decepti, iocinoris eam esse phlegmonem suspicantur. Necessarium itaque inter se has ipsas distinguere. Iocinore enim phlegmone obfesso, tumor secundum lineamenta rotundus, figura, videlicet iecinoris, succumbit, quique ad corporis decubitus simul conformatur. Maior enim apparet corpore ad sinistrum latus reclinato, minor autem rursus ad dextrum deuoluto, nimirum iocinore sub spurias costas cedente, neque visui, neque tactui similiter succumbente. Amplius autem in iocinoris phlegmone incumbens cuticula, naturali modo habere conspicitur. Musculis autem phlegmone obsessis, cutis circumtenditur, vt si quis digitis apprehensum attrahere velit, ea minime sequatur. Tumor præterea iuxta situm musculorum iocinori incumbentium oblongus apparet, & visui & tactui manifestus. Ceterum vbi iecur iam phlegmonem contrahere cœpit, confestim sanguinis detractio-
nem, si ætas & virtus permiserint, experiri oportet. Ergo Galeno lib. 13. Ther. meth. capite
C 9. auctore, pariter tum reuellendus, tum vacuandus qui ad iecur fluit, sanguis erit, interna in dextro gibbero lecta vena: propterea quod & e directo sit, & ampla via cum vena quæ caua dicitur, societatem habeat. Hac non comparente, media secanda est, quod si nec ea se ostenderit, reliqua quæ superior ac tertia est, ac humeralis dicitur, incidenda. Copiosus autem, & quantum satis est, si vires ferre queant, educendus. Si vero non, per vires partiendus. Missione sanguinis facta, post exiguum interuallum simplici ac leui clysteri alius eluenda: præsertim vbi sponte non egerat, qualis est is, qui ex malua, althea, viola foliis, & chamameli, & oleo violaceo conficitur. Sequenti a ve-
næ sectione die cucurbitæ cum scarificatione affigendæ rursusque post vnam diem apponendæ: non pauci enim a secunda earum adhibitione opem senserunt magis, quam a priore. Fomentis quoque vtendum ex lanis oleo imbutis, cataplasmatibus, ceratis, & epithematis. In quibus omnibus ad mouendis vniue hoc obseruandum erit, vt cæteris medicamentis emollientibus & discutientibus, semper adstringentia commisceantur. Fomentum itaque fiat ex oleo cotoneorum, aut mastichino, aut rosaceo, aut myrtino, adiecto vino odorifero. Vel admoveatur spongia in decocto absinthii, meliloti, rosarum purpurearum, chamameli, anethi, plantaginis, intybi satui, & id genus aliorum. Cataplasma-
ta vero, & emplastra e seminibus lini & fenograti, farina hordeacea, malis cotoneis, meliloti flore, absinthio, & similibus in hunc vel similem modum sunt paranda. Emplastrum quod habet: Farina hordeacea, unc. dimidium. Carnis cotoneorum contusa, drach. tres. Absinthii, florum meliloti, iunci odorati, singul. drachmas duas. Seminibus lini, drachmam vnam. Oleorum ro-
facei, cotoneorum, chamamelini, absinthii, singulorum vnciam dimidiam. Aceti, vnciam vnam. Commixtis omnibus fiat emplastrum. Ceratum quod accipit: Carnis palmularum, drachmas tres. Myrrha in vino veteri adstringente macerata, styracis, mastiches, singulorum drachmas duas. Florum meliloti, absinthii, chamameli, singulorum drachmam vnam & dimidiam. Croci, drachmam dimidiam. Oleorum cotoneorum, mastichini, rosacei, singulorum vnciam vnam. Cum cera & resina quod satis est, fingatur ceratum iocinori imponendum. In eundem vsu epithemata quoque ex decocto rosarum, plantaginis, absinthii, chamameli, aut eorundem liquoribus stillaticis componi possunt. In quibus sane omnibus construendis vniue studendum, vt adstringentia vbi vehemens adhuc est phlegmone relaxantibus & emollientibus præualeant, contra vero vbi caloris vehementia remissior fuerit, emollientia adstringentibus. Cauendum præterea, ne prædicta actu frigida admoveantur, sed prius modice calefacta. Porro in iocinoris phlegmone, vbi magni & vehementes circumstant dolores, etiam medicamenta dolorem leuantia in potu sunt exhibenda: ita tamen, vt affideus eorum vsus deuitetur. Simplicibus autem potionibus frequentius vtendum. Senecionis itaq; decoctum, tãquam maxime com-

Simarum
partium iocinoris
inflammationis
signa.
Gibbarum.
Musculorum
abdominis

Curatio.

Venæ sectio.

Clyster.

Fomenta.

Cataplasmata.
Emplastra.

Ceratum.

Epithemata.

Nihil actu
frigidum iocinoris
inflammatione
laborante adhibendum.

modum, aut succus glycyrrhizæ cum aqua calida exhibendus. His non minus confert *intyborum succus, adiecto modico melle*. Ad hoc enim, quod refrigerat, ac firmitatem visceri addit, etiam ora venarum iecoris expurgat. Ceterum alius etiam irritanda est vrticæ vel mercurialis coctæ esu: In declinatione etiam morbi, alius per clysteres inaniri postulat. In quem usum polipodium & epithymum ex mulsa porriguntur: idque potissimum, si in cauo visceris fuerit phlegmone. Caua enim iocinons, *ut antea quoque dictum est*, per aluum: gibba vero, per vrinas expurganda sunt. Porro in iocinoris phlegmone exquisitissimo viâtu, *Gal. lib. 13. The. meth. teste*, opus est. Poscit autem iecur ipsum cibos potissimum, qui obstructa recludere possunt. Eiusmodi vero omnes sunt tenui consistentia, & quæ citra rasonem detergunt, qualis est *ptisana, mulsa, & similes*. Alimentum igitur optimum est sic laborantibus *cremor ptisanæ*, ut qui vim habet detergendi, & obstructions tollendi, in quo apium decoctum sit. Ius etiam *pulli gallinacæ*, in quo petroselinum decoctum sit, dari potest. Bibenda vero *mulsa, aut hordei decoctum, vel intyborum satiuorum*. Quod si phlegmone principium permutationis ad suppurationem iam obtinet, tum omnia prædicta augebuntur, *dolores nimirum, febres delirium, anxietas, cibique fastidium*. Adiuare permutationem ac puris eruptionem oportet, ut scilicet quam celerrime puris generatio fiat, ne maiora inde corpora corrumpantur, idque per usum cataplasmatis, quod accipit: *Rad. cis altheæ, unciam unam & dimidiam. Seminis fenogræci, lini utriusque drachmas duas. Foliorum altheæ, maluæ, utriusque manipulos duos. Caricarum numero sex. Ebulliant in aqua donec mollescant, deinde contendantur, & fingatur cataplasma*. Neque temere fecerit, qui emplastrum quod puris permutationem iuuare potest adhibuerit, quale est, quod habet, *Farina hordeacea, & fenogræci, utriusque drachmas tres. Radicis altheæ, unciam dimidiam. Radicis liliorum alborum, drachmam unam & dimidiam. Seminis lini, drach. unam. Florum chamæmeli, meliloti, utriusque manipulum dimidiam*. Bulliant omnia in aqua, donec ad crassitudinem iustam coeant. deinde admisceantur olei chamæmelini, *unc. una. Olei lilicæ, unc. una & dimidia*. Bulliant denuo, & formetur emplastrum. Ex iam dictis etiam fingi potest ceratum, adiectis nimirum butyro, ladano, resina, & cera. Quum autem perfecta iam suppuratio fuerit, dolores remittent, omnesque accessiones mitiores apparebunt, iuxta hoc Hippocraticum: *Dum pus conficitur, dolores ac febres accidunt magis, quam iam confecto*. Rupturæ autem tempore dolor rursus magis augebitur: quare etiam D tuæ rupturam adiuare oportet, per *stercoris caprini & columbini seminis vrticæ, sinapi aliorumque ad superficiem attrahentium usum, & per portiones caloris, ut est polii, fumaria, radicis chamædryos, & similium decoctum*. Facta ruptione, aqua mellis, aut ciceris decoctum, aliaque quibus abstergendi facultas inest, quæ infra in capite De renum exulceratione commemorabimus, propinanda. Et si puris transmissio per venas sit, vrinam mouentia admiscenda sunt: qualia sunt *sium, asarum, casia, & cinnamomum*. Si per aluum, ea quæ leniter subducunt, *serum nimirum caprinum, oxyphænica, & fistularis casia* exhibenda. Licebit etiam tum clysteribus decocto hordei confectis uti. Peracta absterfione, quæ glutinare possunt medicamenta propinanda erunt:

De intemperie lienis. C A P. XXVI.

Q V E M A D M O D U M reliquæ corporis partes octo intemperierum generibus affliguntur, ita etiam lien. Atqui frequentissime frigidam & humidam sustinet intemperiem. Singulatum vero causas non attinet hic referre. Eadem enim sunt quæ aliarum partium corporis. Petendæ itaque sunt ex capitibus 1. 2. & 3. libri Galeni de morborum causis. Iudicium autem certum & compendiosum intemperiei lienis, ea quæ eduntur & bibuntur exhibent, quæque forinsecus cuticulæ iuxta sinistrum hypochondrium admouentur. Si enim frigida intemperies lienem molestauerit, omnis cibis & potus qui efficaciter refrigerat, facile & manifeste ipsum lædet. Omnia quoque frigida extrinsecus adhibita offendunt, atque adeo frigidam eiusdem arguunt intemperiem. Eam vero ipsam, contra omnia calida iuuant. Quod si calida fuerit F lienis intemperies, a nullis quæ in cibo aut potu exhibentur, aut etiam extrinsecus admouentur frigidis male afficitur. Quod si caliditas augeat, non solum nihil tumori apponitur, sed & contractionem amplius sustinet, præsertim si febris adsit. Ceterum & cibi & potus calefacientes, & quæ extrinsecus calorem corpori addunt, cali-

Viâtu.

Si phlegmone ad suppurationem tendat.

Cataplasma,

Emplastrum.

2. Aph. 47. Ruptura.

Causæ.

Signa intemperiei nude qualitatibus lienis.

Frigida.

Calida.

- A** calidas etiam intemperies augent & exacerbant. Solatio autem eis sunt omnia refrigerantia. Similiter etiā sicca intemperiei in lienem notas colligere oportet, maxime quum *Sicca.* pro magnitudine propriæ naturæ non eminet. Ea item quæ extrinsecus corpori adueniunt, atque intra ipsum deuorantur, si exsiccandi facultate prædita sunt, lienem exsiccant. Porro ubi humida intemperie lien laborauerit, atque ea amplius inualuerit, tantum *Humida.* eius incrementum efficit, ut etiam ventriculum & iecur pertingat. Species quoque doloris una cum prædictis signis, infestantem intemperiem demonstrabit. In calida enim & frigida intemperie minus dolent, aut nihil omnino, neque quicquam etiam in humida: minimum vero in sicca. Ex prædictis etiam coniecturam facere licet compositionum in lienem intemperierum. Fere enim in totum ubi calida intemperies fuerit intensa, sicca eam consequitur, & ad frigidam inueteratam, humida concomitatur. *Notæ intemperiei cum fluore substantiæ biliosæ.*
- B** Quod quidem vero & humores in lienem confluentes tumores producant, eorum quoque diligentem considerationem habere oportet. Bilioso enim fluore existente, uniuersum corpus calidius apparebit, etiam si non adest febris: oculique & urinae per bilem coloratae erunt. Siccitatem semper accusabit æger, & de siti conqueretur, ac bili os infestante. Cibus fastidit, & vigiliis infestatur, frigidamque desiderat, una cum hoc quod linguam subflauam obtinet. Exacerbationes tertianæ fiunt, suntque ipsi ægri moribus iracundi, & qui præcipitanter excandescunt. Si vero atræ bilis sit fluor, eius color tum *Atræ bilis.* in lingua, tum in reliquo toto corpore apparebit: & appetentia ad erit ciborum non naturalis, mœstique ac subtristes ægri sunt, reliquaque atræ bilis indicia eis adiunt. Exacerbationes vero quarto quoque die affligent. Vbi vero pituitosus humor in lienem *Pituitosæ.* deferatur, consimilis pituitæ aderit color, ægrique minime siccitatem, & cibum appetent, nisi falsa fuerit pituita: tunc enim cibum fastidiunt ægri, potusque magis sunt appetentes & sitibundi. Quin & diebus singulis exacerbationes ingruent. Urinae quoque candidæ sunt, ipsique ægri moribus pigri & segnes. Quidam vero ex eis qui frigidam affectionem habent, magnum & durum lienem acquirunt. Quod si sanguineus existat in lienem confluentis humor, possibile est ipsum colorem tum iuxta linguam, tum circa cutem permutari. Quod autem ad appetentiam ciborum & fastidium attinet, medio *Sanguineæ.* quodammodo habent ægri, reliquisque magis languent, quanquam non parem visceris tumorem habent. Venæ vero uniuersi corporis sanguine plenæ apparent, & urinae subflauæ. Hæc indicia prolixius ex Actio commemorauimus, quod nimirum communia, & omnibus fere reliquarum partium intemperiebus cum affluxu humorum adaptari queant. In uniuersum quidem lienis intemperies nudæ qualitatis, fere citra tumorem sunt. Eas autem tum per cibos & potus, tum per simplicissima medicamenta, ac fomentorum irrigationes, olea & unguenta, & id genus alia, quæ intemperiei contraria sunt, corrigere oportet. Calidam itaque intemperiem lienis curabis, perinde atque iocinoris, *Calidæ.* per cibos nimirum ac potus refrigerantes, inunctiones ex rosaceo & melino, atque alia quæ cap. 23. huius libri comprehensa sunt. Frigidam similiter, ut iocinoris, per ea quæ *Frigidæ.* moderate calefacere possunt emendabis. In humida lienis intemperie, præter ea quæ *Humidæ.* cap. paulo ante citato commemorata sunt, proderit *quinquefolij radix, & plantago sicca,*
- E** *spuma & flos salis, ammoniacum, succus salicis, & similia;* si ex iis, affuso sufficienti aceto, unguentum aut ceratum conficiatur, qualia paulo post describemus. Conuenientissimæ etiam huic sunt frictiones, quæ discutiendi facultatem obtinent. Siccam lienis intemperiem balneum dulcium & calidarum aquarum curat: item inunctio ex oleo dulci. Cibi citra refrigerationem humectantes, velut est pituitæ succus. Porro si lien intemperie cum fluore substantiæ afficitur, tunc ubi sanguinea fuerit, ex vena cubiti interna *Curatio intemperiei cum fluore substantiæ.* sinistri brachii, lienarem vocant, sanguis mittendus erit. Aut si ea inueniri haud potest, ex ea quæ inter annularem & auricularem appellatos digitos sita est. Deinde intrinsecus & extrinsecus adhibenda, quæ lienem robur aducere possunt medicamenta: ut sunt *cortex radicis capparidis, scolopendrium, siue ceterachium vocatum, hemionitis, adiantum, tris, calaminta, & his similia,* quæ iecoris quoque robur & firmitatem conseruare valent. De quibus insequentibus capitibus susius dicemus. Si reliqui humores ad lienem confluxerint, primum redundans humor purganti medicamento vacuandus erit: dein reliquo tempore quæ intemperiem relictam corrigere, & lienem etiam corroborare possunt ad-

Causa. Lien, ut reliqua viscera, phlegmone corripitur, quoties sanguis crassior, & calidus preter naturam ad eum confluit. Cognoscitur gravitate, & tumore sinistri hypochondrii, qui ad tactum non cedit: dolore, & distentione loci, febre, & fervore. Irruente vero humoris copia, ex magnitudine & velocitate generationis ipsius phlegmonis deprehenditur. **Victus.** Victus ratio eorum qui phlegmone lienis laborant, simplex sit, atque ea quæ facile concoquuntur in cibo exhibeantur: velut est prisanæ succus, panis madefactus, & alia, quæ supra in aliorum viscerum phlegmonibus sæpe a nobis dicta sunt. Quod si phlegmone diutius duret, auicularum etiam carnes eis concedendæ, & pisces saxosis aquis degentes. Potus ægri sit cinnamomi decoctum, aut vinum tenue aquosum. **Curatio.** Venæ sectio ipsa a venæ lienaris, aut eius quæ inter minorem & annularem digitum est, incisione auspicietur, modo nihil sit quod eam fieri vetet. Venter per clysterem assidue eluatur, potissimum si venæ secandæ medela relinquatur. Deinde imponantur lienī medicamenta adstringentia, quæ id quod influit reprimere, & lienis firmitatem conservare possunt. Neque tamen sola adstringentia sunt adhibenda, sed illis admisceantur quæ citra evidentem calorem extenuant, incidunt, & relaxant: ne scilicet crassus in eo succus obturatus vehementius increpescat, quemadmodum Galenus lib. 13. The. method. diligenter ac erudite monuit. Quapropter si moderata fuerit phlegmone, vinum vetus ac austerum tenuiumque partium oleo dulci permixtum, & lana succida exceptum imponemus. Si vero maior sit caliditas, *rosaceum sit oleum, aut melinum, & chamæmelinum cum aceto.* Miscebis autem illa inter se hunc ad modum. *Olei rosacei, coroneorum, sing. unc. duas. Olei chamæmelini, unc. unam. Aceti optimi, unc. dimidiam.* Commisceantur omnia pro fomento, ac irrigatione. Quod si iam dicta olea non adsint, folia rubi, aut mala cotonea in oleo decoquantur, & quædam etiam tenuium partium addantur, ut est *absinthium & pulegium.* Cauendum etiam, ne aliquid actu frigidum lienī imponamus, sed quicquid est eorum medicamentorum quæ extrinsecus admouentur, tepido calore præditum sit. Post fomenta & irrigationes ad cataplasmata transeundum: in quorum compositionem *hordeacea & loliacea farina, cum caricis, lini semine, oleo in quo absinthium ac pulegium sint decocta,* assumantur. Ceterum cauendum, ne post irrigationes & cataplasmata locus denudetur: sed ubi hæc fuerint oblata, mox serata aut emplastra eiusmodi, qualia in capite *De iecoris phlegmone* descripsimus, imponenda. Siquidem similia genere medicamenta ambo viscera postulant: tanto autem valentiora lienis sint, quanto crassiore vititur alimento. Quare ex capite *De iecinoris vitiis,* medicamentorum formulas huic loco conuenientes, petes: hoc tantum obseruato, ut iis semper acetum, & quippiā quod lienī grarum sit, eiusque robur peculiariter tueri possit, admisceas. Quod si in suppurationem ipsa lienis phlegmone tendat, quod tamen raro contingit, adiuuare eam oportet, ne plura corpora putrescant, per cataplasmata, quæ pus producant, de quibus in iecinoris phlegmone diximus.

Causa. Phlegmone lienis minus recte curata, lien tumorem durum, quem Græci *oxyplov* vocant, contrahit. Cuius mali causa est humor quidā, qui veluti limus est, & lienī pertinacius adhæret. Est vero, quando citra phlegmonem oboritur durities, puta in tumore nimio. Tactu facile vitium, ex quacunque fuerit occasione, deprehenditur. **Signa.** **Victus.** Victus ratio debet esse extenuans, quare in cibo sumenda ea, quæ concoctu facilia sint, & succum bonum ac tenuem generent. Fugienda omnia, quæ duræ carnis sunt, & crassos generant succos, quæque concoctioni renituntur. Bibendum vinum substantia tenue, colore fuluum, ætate non admodum vetus, omnique adstrictione vacans. Plurimum etiam fiduciæ in exercitationibus ponendum, quibus ante cibum uti conuenit, corpore superuacuis non abundante. Manifestum autem est, quod vociferationes quoque oportune & in tempore factæ, in hoc malo summe opitulentur. Quod ad medicamentorum rationem attinet, certe valentioribus admodum, non solum extrinsecus, verum etiam intrinsecus utendum erit. Intra corpus itaque validissimæ potiones, nam eas sine molestia tolerant, exhibendæ. Equarum numero primas sibi partes vendicant *cortices radicum capparidis, caterachium siue asplenos, hamionitis, tamaricis radix & germina, in aceto*

- A** *veloxymelite cocta. Item centaurij minoris succus epotus, & lupinorum amarorum decoctum, cum ruta & pipere assumptum. Anagallidis fœmina scrupulus cum posca, aut oxymelite potus, mirifice confert. Conuenientissimum etiam lieni indurato remedium existit ferrum aqua, aut vino, aut posca sapius subinde exstinctum.* Ea ipsa enim aqua, aut vinum, aut posca in principio exhibitæ, iucunda & vtilissima existit, & per plures ex ordine dies datur. Itaque febrientibus aquam, aut poscam præbeto: eis vero qui teneram carnem habent, ac febre carent, vinum. Sit autem ferrum quod in ipsis exstinguitur, *stomoma*. Est autem ferrum *stomoma*, & in usum aliquē formatum est, hoc est instrumenti alicuius formam redactum, ac chalybe roboratum: a verbo *στούω*, quod *roboro*, ac quasi os & *aciem gladij firmo*, significat. Ipsius quoque *stomomatis ferri squama*, agrestioribus hominibus vtiliter exhibetur.
- B** *Præclare enim hæc lienem liquefacit, vt quæ consumendi facultatem habeat. Tamen ne inde ventriculus male afficiatur, aliquid ei ammiscere conuenit roborantium medicamentorum: vt est scolopendrium, absinty coma, casia, anisum, serpillum montanum, aut id genus alia. Extrinsecus fomentum hoc adimoueat, quod habet: Centaurij minoris, aspleni, ceterachium vocant, hemionitidis, ruta, singulorum manipulum vnum. Radicis corticis capparis, vnc. vnam. Decoquantur omnia in aceto, & simulatque cocta fuerint, spongia in decocto irrigata lieni calida imponatur. Præterea mirum effectum ostendit hoc etiam vnguentum, quod habet: Oleorum e capparibus, liliacei, irini, singulorum vnc. vnam. Medulla ossium cruris bubulini, drach. duas. Leni cremoris radicis altheæ, fœnograci, seminis lini, singulorum drach. vnam. Pinguedinis taxi, gallinacæ, anserinæ, singulorum drach. duas. Corricum radiceis capparis, tamaricis, costi, centaurij minoris, singulorum drach. vnam. Ammoniæ, bdellij, galbani, singulo. drach. dimidiam. Gummi prius in aceto dissolutis, cum cera quod satis est, formetur vnguentum. Plurimum quoque conferre solent emplastra & cerata. ad eum composita modum: Accipe oleorum liliacei, irini, de capparibus, singulorum vnc. vnam. Firina hordeacæ, fœnograci, seminis lini, singul. drach. vnam. Corricum radicem capparis, hemionitidis, vtriusque drach. vnam & dimidiam. Radicis altheæ, drach. vnam. Bdellij, ammoniaci, galbani, singulorum drach. vnam & dimidiam. Opopanacis, myrrhæ, thuris, vtriusque drach. dimidiam. Cum resina terebinthina & cera quod satis est, informetur ceratum. Porro oportet medicum diligenter ad affectum respicere, & pro eius ratione tum addere, tum adimere ea quæ aut emolliunt, aut attenuant, & discutiunt, aut quæ robur addunt. Profunt deniq; non parum cucurbitulæ cum scarificatione affixæ.*

Ferrum in aqua castin- dum.

Stomoma ferrum. στούω.

Fomentū.

Vnguentū.

De lienis obstructione. CAP. XXIX.

- A** *ccidit interdum, vt non solum propter attracticis quæ est in liene facultatis imbecillitatem, verum etiam meatus, per quem atræ bilis feculentus humor ex iocinore in lienem deriuatur, obstructionem, impurus ac vitiosus sanguis deinde in vniuersum distribuatur corpus. Quod si contigerit, tunc color corporis vitiatu ad nigredinem vergit; nonnunquæ etiam immedicabilia vlcera hoc modo affecti obtrinent. Causæ ex iis quæ in cap. De iocinoris obstructione diximus, facile sciri possunt. Malum vero cognoscitur ex grauitate quæ est circa sinistrum hypochondrium, vitiato præterea totius corporis, præsertim vero faciei, colore: spiritus difficultate, turbulentis somniis, & aliis quæ ex iis quæ supra dicta sunt, sua sponte innotescunt. Curatur is affectus, victus ratione extenuatoria, & medicamentis obstructionem tollentibus, quorum magnam copiam studiosi in capite De iecoris obstructione inuenient. Vtraq; enim viscera similibus genere medicamentis indigent. Lien tamen tanto fortioribus eget, quanto crassiore vititur alimento. Quapropter quatenus ad humorum crassiorum vt vacuationi promptius obediant præparationem attinet, iisdem certe medicamentis opuserit: hoc duntaxat obseruato, vt hic sint omnia validiora, & sibi commixta habeant quæ robur visceri addere possunt. Præparati humores dein vacuandi sunt per ea medicamenta, quæ crassos & feculentos humores purgant, quorum iam crebro facta est mentio. Post hæc & intrinsecus & extrinsecus ea sunt ad mouenda medicamenta, quæ cap. præcedente, & cap. De iecoris obstructione comprehensa sunt. Quapropter hæc loca abunde satis medicamentorum nobis suppeditabunt.*

Causæ. Signa.

Curatio.

Præparatio humorum.

De ictero. CAP. XXX.

Icterus.
Causa.

- I** Ktes^o nihil aliud est Græcis, nisi *bilis, modo flaua, modo atra, per vniuersum corpus effusio*. **A**
Celsus *auriginem* appellat hoc vitium, alii *arquatum*, & *regum*. Harum vero appella-
tionum omnium causas diximus *libro Instit. tertio sect. 1. cap. 30*. Fit interdum iocinore
nihil patiente bilis effusio ad cutem, in iudicationibus morborum. Nonnunquam vbi
citra febrem sanguis ab extranea aliqua occasione corrumpitur, ac biliosus efficitur,
sicut a venenatarum bestiarum moribus contingere consuevit. Ita quidam quum mor-
sus a vipera esset, vniuersum corpus porraceo colore maculatum habuit. Quinetiam
fieri potest, vt propter phlegmonem, aut naturalis intemperiei iocinoris permutatio-
nem, eiusmodi humorum corruptio accadat, vt aliquando herbis pallore albicantibus
totum corpus manifeste assimiletur, aliquando etiam plumbi colorem induat. Quem-
admodum etiam eiusmodi colores nigriores fiunt, si ob lienem male affectum accadat. **B**

Signa.

- Fit etiam nonnunquam propter imbecillitatem vesicæ bilis susceptricis, quæ bilio-
sum humorem, veluti consuevit, in se ex iocinore non attrahit, atque adeo impurum
sanguinem relinquit. Flaua igitur bilis, vbi non omnino, vel non rite segregatur, & ex-
purgatur, per totum corpus cum sanguine diffusa, huius vitii causa est. Aliquando et-
iam propter obstructionem & debilitatem vasorum, quorum ora ex ipsa ad iecur deri-
uantur, humorem biliosum non attrahit. Nonnunquam etiam propter meatus, qui ad
intestina vadit, obstructionem. Ceterum vt icteri causas probe discernamus, excre-
mentorum figura & color necessario consideranda erunt, quum in aliquibus multum
colorata per flauam bilem appareant, perinde atque in aliis etiam vrina. In quibus igitur
ratione iudicationis bonæ in febribus biliosus humor ad cutem prorumpit, iis & ex-
crementa & vrinæ naturali modo se habere videbuntur. Si autem cum febris & biliosis
deiectionibus inuadat, & in dextro hypochondrio grauitas adsit, feruens iecoris
phlegmone significatur, cuius vi sanguis in bilem mutatus, per vniuersum corpus de-
fertur. Sin feruor citra grauitatem in ipso substat, ex sola calida iecoris intemperie vi-
tium oritur. Quibus vero citra febrem vna cum grauitatis alicuius sensu circa dextrum
hypochondrium alba excrementa deiciuntur, in iis vesicæ bilis susceptricis meatuum
obstructionem esse factam putandum est. Si vero citra grauitatem talia deiciantur, vi-
res horum esse infirmas existimandum est: vel attractricis, quæ humorem biliosum
ex iocinore elicit: aut expultricis, quæ ad intestina eundem propellit. Statim etiam iis
vrinæ biliosissimæ affatim excernuntur. Porro quibus atræ bilis humor vna cum san-
guine ad cutem delatus est, hi omnino grauius patiuntur. Consequitur enim ipsos tri-
stitia præter rationem, & mordacitas eorum quæ circa ventrem sunt, difficultasque
spirandi, & cibos auersantur, & nigras vrinas excernunt. Stercora vero chalcanthi co-
lorem referunt, & aluus iis magis resiccatur. Ceterum eos, qui ex flaua bile icterum
contrahunt, nulla mordacitas eorum, quæ circa ventrem sunt, consequitur: neque etiā
tantopere auersantur cibos. Stercora candida egeruntur, vrinæ autem crocei coloris,
turbatæ tamen permanent. Communiter tamen omnibus icteris pigrities ad motum
accidit, & ad dulces cibos animum habent alienatum. Pruritus etiam vniuersi corporis
comitatur. Candida oculorum, & partes faciei temporibus propinquæ, itemque malæ
pallorem ostendunt. Venæ etiam sub lingua repletæ reperiuntur, & abundantem humo-
rem significant. Ictero itaque ratione bonæ iudicationis, febribus perfecte solutis cor-
repti, facillime curantur, si lauacris aquarum dulcium vtantur, ac olei discussorii per-
frictione, ac omnibus, quæ cutem rarefaciunt, qualia sunt oleum chamæmelinum, a-
nethinum, irinum, aut similia. Rosmarinus etiam herba oleo incocta, plurimum dis-
cutit. Viçtus ratio vniuersa in iis vt sit humida, & humorum crassitiem moderate ex-
tenuans, oportet. Qui ex virulentorum animalium moribus, & lethalis veneni portione,
ictero corripiuntur, curandi fere sunt alexipharmacis, sicut ii, qui a rabido cane morfi
sunt, de quibus suo loco abunde satis diximus. His qui ob calidam iocinoris intemperie,
aut phlegmonem eiusdem arquati fiunt, curationem, quæ supra *De iecoris phlegmone* di-
cta est, adhibere oportet. Quapropter quæ illic commemorauimus, huc transferenda
erunt. At si propter obstructionem vesicæ fellis susceptricis fiat icterus, tunc duo ma-
xima remedia principatum obtinent, venæ sectio, & purgatio. In quibus igitur mul-
titudine sanguinis vna cum bile in vniuerso corpore abundat, & quos circa iecur aut
lienem grauitas aut distentio infestat, nihil venæ sectione vtilius fieri potest, modo
non

Icterus ater.

Curatio
icteri iudi-
cationis
ratione
accidentis.

Ex morfu
virulètorū.
Ob intem-
periem &
phlegmonē
iocinoris.
Ab obstru-
ctione.

A non sit quod hanc fieri impediat. Secunda vero vena est in dextro gibbero, interna, id- Vena scilicet
 que iecore male habente: liene autem laborante; in sinistro, sanguisque particularim
 & per vices detrahendus, ne per coaceruatam vacuationem vires ægri prosternantur.
 Quod si a venæ sectione excludimur, commodissime clyster adhibet. Comode autem
 & a venæ sectione clyster iniicitur, utpote qui propter stercoreum vacuationem spirandi
 facilitatem efficit, intestinaque irritando, ac mordendo humores ad cutis superficiem
 delatos, ad ipsa retrahit ac reuellit. Sit vero ad eum compositus modum. Accipe *intybi* Clyster.
veriusq., marrubij, eupatorij, adianti, origani, absinthij, singulorum manipulum unum. Seminum
anisi, fœniculi, petroselinij, asparagi, singul. drach. duas & dimidiam. Radicum glycyrrhizæ, apij,
fœniculi, singulorum unc. unam. Bulliant in aqua sufficienti ad tertias, & colo transfundantur, ac-
B *cipianturque iuris decocti, uncia tredecim. Casta fistularis, unc. una. Hierapicra, unc. dimidia:*
Antidoti de succo rosarum, drach. dua. Oleorum anethini, irini, utriusque unc. una & dimidia.
Salis drach. unc. Commistis omnibus fiat clyster. Verum purgationes huic vitio magis pro-
 priæ & familiares sunt, sic tamen ut eduliis & potionibus itemque medicamentis hu-
 mores prius attenuentur. Cibus igitur utendum *concoctu facilibus & extenuantibus; volu-* Vi&u
cribus montanis, piscibus saxatilibus, oleribusque urinam cientibus, præsertim intybis, asparago,
smyrnio, fœniculo, & similibus. Carnes ferinæ mansuetis magis sunt aptæ, potissimum ca-
 prearum. Pro intinctu seu embammate valet acetum, in quo aristolochia macerata
 sit. A fructibus abstinendum. Bellaria tamen sint amygdalæ, sed modice sumantur, &
 cicer modice torrefactum. Eius etiam decoctum assidue potatum, non parum con-
 fert. Vinum conuenit album & tenue, non valde vetustum. Quod ad medicamenta
 ipsa attinet, sumenda ea quæ in capite *De obstructione iocinoris, & libro primo capite duodecimo*
dicta sunt. Præ aliis autem maxime confert *apij, petroselinij, adianti, calaminthæ, verbenacæ*
rectæ, rubiæ radicis, aristolochiæ, serpylli, hypericique decoctum. Extenuatis & præparatis tan-
 dem humoribus, medicamentum quod flauam bilem purgat exhibendum. Sunt autem Purgatio.
 iætero laborantibus purgationes dandæ fortiores: ob ventriculi enim siccitatem imbe-
 cilliores, minusque efficaces in ipsis cognoscuntur. Quæ vero præ aliis conferunt, est
 dilutum rhabarbari *lib. 1. cap. 12. descriptum,* ac hiera picra, antidotus de succo rosaceo,
 de psillio, & diaphœnicon. Quod si primo medicamento purgante nihil proficias, rur-
 sus ad ea quibus tollendi obstructions facultas inest reuertendum, & post triduum
D rursus violentius purgandum. Si liene laborante vitium oriatur, ad caput *De melan-*
cholia, & lienis obstructione recurrendum. Purgatione facta per aluum, deinceps ea quæ Quæ visce-
 viscera expurgant exhibenda sunt medicamenta. In quem usum vnicè confert radix ra expur-
cyclamini trita & pota. Hæc enim non solum viscera repurgat, verum etiam ad bilem gant.
 in vniuersa cute excludendam per sudorem aptissima est. Quare post eius potionem,
 sudorum exclusionem, per velamenta ac concalescentiam in lecto iuuare oportet.
 Dantur autem ex ea *drachma dua, aut tres, ex aqua mulla.* Præclare quoque facit *corricis ra-* Succus cor-
phani succus, vino meraco dulci permixtus, aut vino mulso, sic ut succi uncia dua. Vini, unc. una ticis rapha-
contemperentur. Vermes etiam terreni exsiccati ex vino mulso per triduum dati, iæterum ni.
 per lotium eiicient. Datur item valde commode *cichorii & intybi succus,* febrientibus qui-
 dem per se, febre carentibus cum vino. Cassuthæ quoq; succus mirifice prodest. Com-
 modissimum etiam est *chamamelum,* quæ & *leucanthemus* appellatur, itemq; *buphthalmum.*
 Ceterum medicamenta quæ in potu accipiuntur omnia, si fieri potest in balneo exhi-
 beantur, ubi nimirum ægri in calidum solum in quo decoctæ sint herbæ *chamamelum,*
fœniculum, petroselinum vulgare siue apium, & id genus aliæ conscenderint. Plurimū quoq; Solum ca-
 victus rationi virium refocillatrici hoc tempore intentum esse oportet, per quam facul- lidum.
 tas excretrix reparetur, etsi qua pars læsa sit corroboretur, atque præsens coloris corru-
 ptio repurgetur. Quapropter conueniunt exercitia, gestationes, inunctiones ac exsu-
 dationes. In hunc usum *pyrateria, seu vaporatoria sicca* conferunt, in quibus oleum in quo
F *serpyllum* aut *rosmarinus* herba decocta sit, corpori illinendum. Quod si vero quippiā
 ex iætero circa faciem & oculos relinquitur, urinæ autem apparent puræ, aliussque con- Vitiatus eo-
 saeto more egerit, narium infusus utendum. In quem usum cyclamini succus, item ni- lor faciei &
 gella cum aceto, anagallidis & betæ radicis succus infunditur. Acetum etiam acerri- oculorū ut
 mum naribus attrahat æger in folio desidens, contineatque pressis naribus paulisper, &
 mirifice vacuabitur.

maxima
Causa.

Signa.

Vitiositas.

Curatio.

Kaxetia Græcis nihil aliud est, nisi malus corporis habitus. Eiusmodi vero est, qui in aquo-
litate diffunditur, & in quo vniuersa corporis miscella laxior fit ac mollescit. Hoc
malum vt plurimum ex longo morbo congregatur: iam vero & ex viscere quopiam in
scirrhum indurato consequitur, potissimum iecore & liene. Neque raro in dysenteria
diuturna, & affectionibus celiacis contingit, ob consuetam item aliquam cohibitam
excretionem. Corpus ipsum totum cum virore albicans redditur, ac inualidum, ita vt
crura inter eundem vacillent. & in principio quidem concoctiones impediuntur, ma-
nente etiam dum appetitu: postea vero & fastidium accedit, & respiratio ipsis fit rara ac
debilis, quæ motibus & actionibus condensatur. Alius etiam inæqualia recrementa ex-
cernit. Capiuntur hoc malo maxime senes, & pueri, qui facile pereunt propter vitalis
facultatis imbecillitatem, & quod ob cutis raritatem succi in eis prompte transpirent.
At vero qui in vigore sunt, raro incidunt, & facile se inde extricant. Vitium hoc si diu-
tius durat, in aquam inter cutem transit, ideoque eius curatio non erit differenda. Vi-
tus in vniuersum fit tenuis, & siccus. Cibi itaque eorum sunt simplices, & qui facile co-
coqui possint, ac optimum procreare sanguinem. Vitent bellaria omnia, item nidoro-
sa, humores crassos & viscosos generantia, & quæ difficulter concoquuntur. Vinum
conuenit eis album, tenue, odorum. Quod vero ad curationem attinet, si quidem ex
consuetæ excretionis cohibitione vitium accidat, irritare ac prouocare eam ipsam ex-
cretionem oportet. Quapropter sanguinis detractione, si nihil sit quod eam impediat,
quæ paulatim & paruis vicibus fit, ad tertium vsque aut quartum diem vtendum, in iis
qui ob hæmorrhoidum, aut mensium retentionem vitium inciderunt. In iis autem qui
copia vitiosorum humorum laborant, sanguinis missio noxia est, quare conuenienti
potius aliquo medicamento purgante ex *Hiera*, *Rhabarbaro*, vel *agarico* vacuandi sunt.
Corpore vacuato, aquarum sponte natarum vsus fit, maxime aluminosarum & nitro-
sarum, mox sulphurearum. Hæ namque aquæ robori & viribus reparandis conducunt.
Varie quoque exercitentur deambulationibus, gestationibus, vociferationibus, fri-
ctionibus, per lintheola, & alia moderata exercitia. Deinde inunctione ex oleo absin-
thii maxime vtantur, cui quædam quæ humores resiccant, vt sunt nitrum & sales, sint
infarta. Ad lassitudinis autem curationem, balneum per interualla quædam adhibea-
tur. Minisce quoque ipsos iuuat abinthii potio, & adhibiti dropaces. Quod si iecur
male afficiatur, aut aliquod aliud ex visceribus, mederi his ipsis per remedia ad singula
ipforum supra præscripta conuenit. Iecori autem in primis succurrendum erit, ipsum-
que roborare oportet, quum sanguinis generandi sit organum. Si malum in hydropem
deciderit, aquæ inter cutem curationi subiicietur, quemadmodum exponemus.

De aqua inter cutem. C A P. XXXII.

Aquæ inter
cutem species
træ.

tympani-
tes.

anasarca.

Causa.

HYdropis, sæua quæ inter cutem tres sunt species: vna enim Græcis *ἀσцитς*, alia *τυμ-
πανις*, & tertia *ἀνασάρκα*, *ὑποσάρκα*, *σκιρσις*, & *λευκοσπληγία* dicitur. Ascites fit, quum in-
ter membranam peritoneum appellatam, & intestina, plurimus aquosus humor coacervatur. Sic
autem Græcis dicta est, quod *ἀσς*, hoc est *utriusque* membrana ipsa repleta esse aqua videat-
ur. Tympanites accidit, vbi flatus ac spiritus superuacui plurimus in prædictis ventris
locis colligitur. *Anasarca* contingit, quando per vniuersam corporis molem humor
disseminatur, vt instat spongiarum aut papyri vniuersa caro per humida & madefacta
prorsus appareat. Fit hydrops ob insignem iecoris frigiditatem, aut propter alias par-
tes impense refrigeratas, quæ iecur in eundem deducere affectum possunt. Coafficitur
vero iecur lieni refrigerato, ventriculoque & intestinis, maxime iis quæ sunt iuxta in-
testinum ieiunum, pulmone denique & renibus, ac septo transuerso. Contingit etiam
ex immodica hæmorrhoidum vacuatione, aut effluxu muliebri, aut ob menstruum
retentionem, aut propter alium quendam magnum vteri affectum. In iis enim omni-
bus nullum præter naturam tumorem iecur habet, & tamen aqua inter cutem corpus
corripitur, ex sola refrigeratione iecore in principio affecto, post vero aliquando & du-
rum fit. Quod palam in illis videre est, qui ex intempestiua frigida aquæ potione iecur
aceruatim refrigeratum obtinent, vt statim hydrops consequatur, priusquam ipsum in
scirrhum tumorem eleuetur. Multi autem & a podagra, & coxædico dolore vexati,
aquam

- A** aquam inter cutem inciderunt. Frequentissime autem eos qui cibum non sentiunt, & malo corporis habitu præditi sunt, itemque ictero, infestatos, hydrops consequitur. Coeliacam item affectionem, & dysenteriam. Communiter omnis hydrops spirandi difficultatem, & tumorem, & grauitatem, & vitiatum colorem inducit, ex virore nigrum albicantibus ægris. Fastidiunt etiam cibum, potum autem largiorem appetunt, maxime qui ex ascite laborant. Etenim humor qui in locis prædictis detinetur, salus est, & putrefactus: quare febris etiam sequi ut plurimum solet. Aqua inter cutem minus foeminae, quam viri tentantur. Pueri vero magna ex parte hydropse anasarca corripuntur. Inter vero supra commemoratas tres species, tympanites omnino periculosior, minus ea ascites, anasarca. Victus autem omnium hydropicorum communis est, ut cibibus sit concoctu facilis, & sufficienter coactus, arque aridus. Ex solutus enim & humidus, aptus est ut in aqua sitatem commutetur. Panis itaque optimus clibanites, qui sale, ammi, fœniculum, anisum, aut cuminum habeat admixtum. Debet is etiam probe fermentatus esse, sic enim minus adstringit, aut obstruit. Ex auibz conueniunt sicciore, velut *phasiani, perdices, turtures, turdi, merula, & similes*. Ex terrestribz, *caprea, lepous*. E manuetis & cicuribus, *pulli gallinacei assi, extrema suum partes*. Ex aquaticis, *canceri flumiales*. Oua etiam assata profunt. Olerum rarus sit vsus. Quæ vero eis exhibentur, acriora sint, & extenuandi calefaciendique vi prædita: velut est *apium, petroselinum, daucus, eruca, pulegium, brassica, allia cocta, cepa, porri capitati*. A leguminibus vero abstinendū in totum. Pro liquamine vtantur aceto cum pipere, cinnamomo, & similibus. Sales sint ex *fœniculo, hyssopo, rosmarino, apioque compositi*. In potu tantum præbendum, quantum ad frangendam aliquo modo sitim sufficit: iupra modum enim incommodat hydropicis plurimus potus. Bibendum autem vinum tenue, & quod vrinam ciet. Dulcia vero vina, & mullum, vitanda. Acetum vero mirifice illorum sitim restinguit. Porro maximam quoque ciborum partem in coena accipiant. Plurimos fructus, & secundas mensas vitent. Concedendæ tamen *noces, amygdala, mala punica, palmula, quæ passa, pyra cocta, & carica*. Omnia tamen sumant moderate, nec quotidie. Lectus non valde mollis sit, præsertim eorum qui anasarca laborant. Substernantur autem herbæ resiccantes, velut est *pulegium, calamintha, origanum, & similia*. Mirum est enim, quantum huiusmodi resiccant per somnum: ut constet, iam quoddam frumenti aceruis obuolutos & absconditos, a somno surrexisse firmos. Exercitationes etiam, si æstas & dies serenus fuerit, in sole fiant, capite tamen velato. Sin frigus sit, in domibus per subiectum ignem calefactis, aut iuxta ignem. Expedit vero in primis equitatio, & huc atque illuc in sella circumferri. Ceterum pedibus si per vires laborantis fieri potest, deambulare multum, & quandoque currere, quam gestari, satius est. Obuoluendi etiam ægri in pellibus sole vstis, aut in arenam calidam defodiendi. Post exercitia, sudores per lintea asperiora extergantur. Optime quoque conducit, si quotidie ter quaterve frictione vtantur. Hæc enim meatus conuenientes aperit, humores quoque desiccant, extenuant, atque dissolvunt. Valde itaque celeriter & sudores elicit plurimos, & carnem cogit. Perfricandi vero sunt manibus aridis, aut ex sale in aqua aut oleo calefaciente trito. Post hæc cum aqua aluminosa, aut sulphurea, aut salsa lauandi. Nonnullis enim qui anasarca correpti fuerunt, & huiusmodi balneis assueuerunt, ea ipsa ad deterendum morbum, tum ad habitum valentiorum reddendum suffecerunt. Atque hætenus victus rationem speciebus aquæ inter cutem communem commemorasse satis sit. Quantum vero ad curandi rationem attinet, omnium hydropicorum commune remedium statim initio est, humoris redundantis vacuatio. Hæc vero nunc per venæ sectionem, nunc per purgantia, & per ea quæ vrinam mouent medicamenta perficitur. Quæ autem speciatim huic vel alteri conuenit speciei, in sequentibus docebimus capitibus, in quibus particulatim singularum curationes prosequemur.

Signa.

Victus ratio cōmūnis.
Panis.Sales.
Potus.

Exercitatio.

Curatio cōmūnis.

De anasarca. CAP. XXXIII.

In anasarca quidem totius corporis moles, & vniuersa caro, ut dictum est, instar spongiæ madida & laxa apparet, atque adeo totum corpus intumescit, ac mortuo simile euadit. In ea curandi ratio a sanguinis detractioe auspicanda, ubi scilicet mali origo ex suppressis hæmorrhoidib. aut māsibus existit, aut ab alia plethorica causa inceperit, atque

Signa.
Curatio.
Venæ sectio.

& virtus atque ætas permiserint. Eius rei testis est *lib. 4. victus acuto. commen. 104.* Galenus, A
 ubi sic scriptum reliquit: *Sola anasarca interdum sanguinis detractione indiget, quum scilicet ex
 retentione hamorrhoidum, vel muliebrium, vel ex quapiam, quæ ita sit plethorica causa, inceperit.*
 Idem etiam Paulus, qui ad verbum sua ex Galeno transcripsit, *libro tertio cap. 48. tradit.*
 Quod commemorandum nobis esse duximus, ne quis nos in omni anasarca sanguine
 mittendum esse præcipere putet. Eleganti autem similitudine, Galenus loco iam ci-
 tato utitur, dicens: *Propter plenitudinem prope accedente calore nativo ad extinctionem, ei ut ignis
 contingit.* Ut enim appositis lignis tum humidis, tum multis prope extinguitur, nisi quis
 multitudinem sustulerit: sic & in frigidiore ob copiam sanguine ubi calor nativus fere
 extinguitur, sanguinis missio præsentissimum remedium est. Hac namque ratione
 plenitudo quæ infestat exhauritur, & languentis natura exonerata alacrior fit, & mali
 causa minuitur, ac deinde minore negotio redit sanitas. Licet enim ex sanguine fri-
 gidiore nascatur, & frigiditatis ratione illa non indigeat, tamen quoniam copiz de-
 tractio naturam leuat, ut hæc minorem illum affectum facile superet rationi consenta-
 neum est. Præcis humoribus per sanguinis missionem detractis ac vacuatis, ad purgan-
 tium medicaminum præsidia veniendum. Quod si tamen extenuatione ac humo-
 rum ad expulsionem præparatione opus sit, decocta & alia quæ supra in capitibus De
 iecoris tum imbecillitate tum obstructione dicta sunt, exhibeantur. In quem sane usum et-
 iam serapia ex absinthio, in tybo sativo latifolio, eupatorio, e calamintha, hyssopo, &
 byzantino propinanda. Purgantia vero medicamenta simplicia sunt, rhabarbarum &
 agaricum. Composita autem, catapota de rhabarbaro, de hiera simplici, de agarico, & si-
 milia. Initio etiam hiera picra conveniet, quod hæc ipsa obstructiones auferat, ac vi-
 sceribus robur addat. Cauendum igitur vnice erit, ne validiora, quæque nullum ro-
 bur iecori adiiciunt, medicamenta purgantia exhibeantur. Quin infestans humor
 sensim & paulatim per leuiora medicamenta educendus. Semel enim & confertim
 vacuantes, mirifice vires deiicimus, iecurque refrigeramus. Singulis igitur septimanis
 aliis subducenda, semperque a mitioribus ad valentiora sensim transcendendum. Con-
 uenit itaque antidota diaphœnicon, & indi in hac hydropis specie. Præclare etiam
 purgat, radix sambuci in vino decocta. Prodest itidem & ebuli radix: eadem namque
 utrarumque vis est. Porro reliquo curationis tempore, quo purgantibus medicamen-
 tis abstinet, exhibenda quæ iecori robur addunt: quorum multa supra ubi qua ratione
 eiusdem tum imbecillitas, tum obstructio curanda essent docuimus, dicta sunt: & quæ
 urinam mouere possunt. In quem usum non absurde antidotus diarrhodon abbatis, aro-
 maticum rosaceum, dialacha, diacurcuma, pastilli de eupatorio, rhabarbaro, absinthio, theriaca,
 & similia exhibebuntur. Ceterum vnice proderit hoc medicamentum, quod habet: *Spe-
 cierum diacurcuma, dialacha, utrarumque scrupulum unum. Specierum diarrhodon santalon, diar-
 rhodon abbatis, utrarumque drachmam dimidiam. Specierum aromatici rosacei, scrupulum u-
 num. Rhabarbari selecti, drachmam dimidiam. Seminum in tybi sativi latioris, melonum, fœni-
 culi, singulorum scrupulos duos. Absinthij, chamameli, cassuthæ, singulorum scrupulum unum.
 Nucis moschata, iunci odorati, spica nardi, singulorum scrupulum dimidiam. Sacchari candidissi-
 mi, unciam unam. Misceantur singula, fiatque tritura. Mirifice quoque confert hoc, quod
 accipit: Seminum carei, fœniculi, anisi, singulorum scrupulos duos. Seminum cumini, & hype-
 rici, utriusque scrupulum unum. Seminum ammeos, petroselini, dauci, smyrnij, singulorum dra-
 chmam dimidiam. Radicum iridis & asari, utriusque drachmam unam. Absinthij, scrupulum
 unum. Glycyrrhizæ, drachmam unam. Sacchari aequalis omnibus pondus. Commixtis singulis for-
 metur triura. Et sane danda opera, ut in anasarca magis sint sicca, quam humida medi-
 camenta, propter totius videlicet corporis habitum aquosiores. Porro extrinsecus
 plane adhibenda sunt ea medicamenta, quæ humores desiccare possunt, ut sunt cata-
 plasmata, emplastra & vnguenta, aliaque quibus desiccandi facultas inest. Conuenit
 ita cataplasma ex hordeacea farina, fabaceaque, fœnograeco, radice ebuli, baccis lauri, absinthio, F
 & origano in vino decoctis confectum, & toti ventris capacitati impositum. Item sterces bubulum
 conuenienter roscatum, non inepte cum posca, aut oxymelite imponitur, insarta ac superinfusa
 sulphuris quarta parte. Caleus quoque recens multum coaguli habens, optime ad omnes
 tumentes partes impositus facit. Denique stercoreis columbini & caprini, bupthalmi,
 & chamameli æquales partes tusa, in acerrimo aceto & melle cocta adhibeantur.*

A Emplastris insuper vtendum ex fermento, caricis, nitro, iride, meliloto, salvia, pulegio, cardamomo, sulphure viuo, baccis lauri, staphyde agria, sale ammoniaco, mastiche, thure, abrotano, aristolochia rotunda, fimo columbino, cum oxymelite compositis. Verum cerata pingua & resinosa, vt pote quæ inflent, & tumores, eo quod distillationem impediunt, distendant, vnice vitanda sunt. Debent tamen crura, manus, alixque corporis partes in tumorem sublatae in sole, aut iuxta ignem, hoc medicamento crebro inungi, quod habet: *Vnguentum Agrippæ, vnc. vnā. Axungia suilla, vnciam vnā & dimidiam. Farinarum seminis lini, fenogreci, fabarum, hordeaceæ, sing. drachmas duas. Seminum altheæ, nigellæ, dauci, sing. drachmā & dimidiam. Sulphuris viui, drachmas tres. Boli armenij, drachmas duas. Radicis iridis, drachmas duas & dimidiam. Aluminis scissi, thuris, vtriusque drachmam vnā & dimidiam. Euphorbij, drach. vnā. Oleorum irini, liliorum alborum, chamemelini, sing. vnciam vnā & dimidiam. Cum cera quod satis est, fingatur vnguentum, quo liquefacto ad prunas, creberrime partes tumida illinantur. Quæ ad victus rationem attinent, ea ex præcedenti capite sunt petenda.*

De ascite. CAP. XXXIV.

IN ascite venter totumque abdomen intumescit, eoque concusso, talis auditur sonus, *Signa.* qualem vterque aqua non omnino plenus reddere solet. Reliquæ vero partes corporis superiores præcipue, minime inflantur. Victus ratio in hac aquæ inter cutem specie fit *Victus.* ex montanis auiculis, & aliis concoctu facilibus, & bonum procreantibus succum, *Curatio.* dictum est supra capite trigesimo secundo. Curandi ratio a purgantium medicamentorum vlu aulpicabitur. Sint autem talia, qualia capite præcedente commemorauimus. Reliqua vero omnia superat brassica marina, quam *Soldanam & Soldanellam* hodie vocant, in potu *Brassica marina. Soldanella.* assumpta. Hæc enim in educenda hydropicorum aqua mirificum ostendit effectum: ita vt non pauci solius eius vlu sanitati sint restituti. Dantur ex ea drachmæ duæ, plus aut minus, pro corporis diuersitate, in vino, aut lactis sero. Conferunt etiam plurimum catapotia de sagapeno, & drachmæ duæ aut tres succi radices iridis, adiecta sacchari vncia vna. Clysteres etiā adhibendi acres, nisi venter sua sponte humescat: tunc enim exficcare ipsum magis conuenit. Inter alios autem is potissimum commendatur, qui habet: *Florum daphnoidis, drach. duas. Radicis polypodij, agarici, vtriusque drach. vnā & dimidiam. Cassiæ, drach. tres. Decoquantur in vino aut aqua, donec tertia pars assumatur. Dein accipe iuris decocti colati, lib. vnā. Benedictæ laxatiuæ vocatæ, vnciam dimidiam. Antidoti Indi, drach. duas & dimidiam. Mellis rosacei, vnciam vnā. Olei rutacei, chamemelini, irini, sing. vnc. vnā. Salis fossilis, drach. vnā & dimidiam. Commisceantur omnia, & fiat clyster. In eundem vsum colocynthidis, cartameus, baccæ lauri, semen anisi, ammi & carei, ruta, radix cucumeris sylvestris, alyis quibusdam adiectis, si videbitur, decoqui possunt. Post prædicta auxilia, vtri vniuerso aliquod ex præscriptis cataplasmatis, & emplastris imponatur. Adhibeantur etiam inunctiones, vrinam, & ludores mouentia auxilia, atq; exercitia, de quibus antea copiose diximus. Ceterum ventris punctio, & aquæ in ventre retentæ emissio, qua nonnulli vtuntur, cōfert, si fiat priusquam iecoris sanguinē efficiēs facultas penitus emortua fuerit. Iecoris enim munere perēunte, aqua quoties emissia fuerit, denuo generatur.*

De tympanite. CAP. XXXV.

IN hoc vitio venter inflatur, distenditurque, & concussus tympani sonitum edit: reliquæ vero corporis partes emaciantur. Victus rationem prioribus speciebus similem requirit, in ea tamen præcipue vitanda sunt omnia flatuosa. Exercitia etiam multa, & fitis ingens ægrotantibus strenue succurrūt, auxilia suntque. Curationis initium a purgantibus medicamentis, quorum copiam in superioribus inuenient studiosi, esto. Ceterum non temere etiam clysteres, quibus flatus discutiendi facultas inest, infunduntur, qualis est qui accipit: *Radicum apij, fœniculi, vtriusque vnc. vnā. Seminum anisi, fœniculi, dauci, smyrnæ, petroselinæ, cumini, sing. drach. duas. Carei, drach. tres. Rutæ, asari, foliorum ebuli, meliloti, sing. manip. vnu. Bulliant in aqua ad tertias, dein accipiantur iuris decocti colo transus, vnc. duodecim. Hieræ picræ, benedictæ laxatiuæ, vtriusque vnc. dimidia. Antidoti de baccis lauri, drach. tres. Oleorum rutacei & anethini, vtriusque vnc. vnā & dimidiam. Salis, drach. vnā & dimidiam. Commisceantur, fiatq; clyster. Danda quoq; sic affectis sunt q̄ vrinæ mouent, atque iis quæ flatus discutiunt tam intrinsecus q̄ extrinsecus vtendū, quorum*

Sacculi. copiam in capite De coli doloribus studioſi reperient. Venter certe quotidie panico, mi-
Ceratum. lio, ſale, ſurfuribus, ſolijs ruta, ſeminibus apij, ſæniculi, aniſi, cumini, chamæmeli floribus, cinere,
calido, ſacculis inſutu, fouendus. Poſteſt & hoc imponi ceratum, quod habet: *Florum cha-
mæmeli, melilori, ſing. drach. unam & dimidiam. Mentaſtri, ſatureia, aſari, ſing. ſcrup. unum.
Seminum aniſi, ſæniculi, ruta, cumini, dauci, ſing. drach. unam. Cardamomi, ſcrup. dimidiam.
Myrrha, caſtorej, utriuſque ſcrup. unum. Olei rutacei, unc. tres. Olei anethini, unc. unam & di-
midiam. Reſina & cera quod ſatis eſt, fiat ceratum.* Cucurbitulæ præterea leues, cum multa
Cucurbitu- flamma, crebro toti ventri infixæ mirifice conducunt. Venter denique aſpero linteo,
la. tantisper dum rubor excitetur, perfricandus. Intriſecus vtendum antidotiſ dianiſi, dia-
Morſuli. cumini, & e lauri baccis: vel iſta qua habet, *Specierum dianiſi, diacumini, utriuſque ſcrup. unum. Ba
Specierum antidotiſ de baccis lauri, drach. unam. Specierum diagalange, drach. dimidiam. Seminũ
aniſi, carei, dauci, ſæniculi, ſing. ſcrup. dimidiam. Foliorum ruta, ſeminum apij, ſæyrnii, ſing.
ſcrup. unum. Sacchari, unc. ſex. Diſſoluti in ſtillatitijs liquoribus ſæniculi & apij, fermentur mor-
ſuli. Reliqua remedia ex capite De coli doloribus petenda.*

De renibus cruentam urinam excernentibus. CAP. XXXVI.

Caſſe. Renum nonnunquam vitium accidit, in quo tenue ſanguinis ſerum mingitur. Fit
vero propter renum imbecillitatem, urinam ſubinde ſecernere nequeuntium. Aut
propter dilationem & amplitudinem oſculorum, ex vena caua urinam ad renes ex-
colantium. Quum enim ampliores ac patentiores meatus fuerint, quiddam etiã ex C
ſanguine venæ, emittit, aliaq; itidem craſſa. Sæpe etiã renes iuxta circuitus quosdam
ſanguinem excernunt, ſimili modo vt ex hæmorrhoidibus fieri conſuevit. Quidã deni-
que ſanguinem ex renibus excernunt, propter venæ rupturam in renibus factam: veluti
contingitijs qui graue onus leuarunt, aut valde ſaltarunt, aut ex alto ceciderunt, aut aliud
Signa. quippiã tale violentum pertulerunt. Aliquando autem & ob acres e ſupernis deſuentes
humores eroſio venarum euenire ſolet. Porro ſi malum propter renum imbecillitatem
accidat, ſanguis qui excernitur, ſerofus admodum eſt. Sin propter oſculorum amplitu-
tudinem, tum nihil dolent. Si certis circuitibus excretio ſanguinis fiat, tum vel plenu-
do totius corporis, aut conſuetorum exercitiorum neglectus, aut membri cuiuſdã reſe-
Curatio vri- ctio præceſſit. Quod ſi ob venæ rupturam eueniat, tunc ſanguis copioſiſſime excernitur. D
æz cruentæ Sin ab eroſione, tunc ſenſim & paulatim excernitur, dolorque renes excruciat. Cura-
ab imbecil- bis itaque eam cruentæ urinæ excretionẽ, quæ propter renum debilitatem, aut ampli-
litate renũ, tudinem oſculorum urinas ad renes excolantium accidit, quiete, cibis adſtringentibus,
aut vaſorũ potione vini nigri, & alijs quæ in capite De cruento ſpuſo ſunt comprehẽſa. Ab ijs vero po-
eius ampli- tiſſimum quæ urinam cient, & a coitu omnino abſtinendum. In potu autem præter ea
tudine, quæ capite iam citato dicta ſunt, exhibendum ſymphyr̃i maioris radicis decoctum, & traga-
cantham in vino nigro macerata. Siſtit etiã ſanguinis ex renibus eruptiones cornu ceruini
drachma una ex vino. Folijs item ſalicis trita cum vino, lyſimachia ſuccus, lapidis hæmatiſis dra-
chma una, radicis ſpina alba, & polygoni decoctum. Bolus denique armenius, drachma pondere
ſumptus. Serapium roſaceum, myrtinum, paſtillo de ſuccino, de terra lemnia, & de ſpodio nominati. E
Localia. Ouillum præterea lac vnice commendatur, ſi ieiuno uncia quatuor, quibus drachma una boli arme-
nij commixta ſit, propinetur. Extrinſecus autem renibus & lumbis imponantur ea quæ ad
ſanguinis per ſputum reiectiones, & in capite De dyſſenteria, alijsque ſanguinis eruptio-
nibus deſcripta ſunt, & quæcunque vna cum eo quod adſtringunt & ſiccant, robur et-
iam addere poſſunt: qual. a ſunt rubi folia, & quercus, glandes, myrti bacca, malicorium, ha-
lauſtra, & ſimilia. Poſthæc habitus corporis cibis boni iucci, lacte, & auicularum carni-
bus, ſuillis quoque, at macris, reſciciendus eſt, vt vniuerſum corpus ad priſtinas vires re-
ducatur, & renes corroborati proprium munus obeant, & ſerolum humorem a ſangu-
Curatio vri- ne ſecernant atque excolent. Ceterum ſi renes ſecundum circuitum ſanguinem excer-
æz cruentæ nunt, aut propter venæ rupturam, aut eroſionem acrium e ſupernis deſluentium hu-
per circuitũ morum, tunc ſtatim vena quæ in cubito eſt eiũdem lateris ſecanda erit. His quidem
euenientis, qui per circuitus ſanguinem excernunt, paulo ante circuitum, reliquis vero ſtatim a
aut propter principio. Sanguinis tamen detractionem partiri melius erit, vt paulatim eius reuulſio
venæ ruptu- & auerſio fiat. Loci autem circa renes ſpongijs poſca imbutis cooperiantur, aut lanis
rosionem, ſuccidis cum roſaceo & aceto. Poſt hæc vnguenta, emplaſtra, & cerata locis paulo ante
citatis

A citatis descripta, imponantur. Commode quoque cucurbita adhibetur, præsertim si suspicio sit phlegmonem adesse in iis, qui ob venæ rupturam sanguinē mingunt. Conueniunt etiam potiones supra in capite *De sputo cruento* commemoratæ. Æger interea etiam a falsis, & acribus omnibus arcendus. Vbi vero iam sanguinis excretio cessauerit, victus ratione vtendum est, vnde non multus sanguis gignatur, maxime in iis qui per circuitum excreuerunt. Supernæ quoque corporis partes assidue exercendæ. In iis vero qui ob venam ruptam sanguinem mingunt, si exulceratio in locis relinquatur, ipsam post sanguinis suppressionem curabimus per ea quæ in capite *De renum exulceratione* dicentur.

De renum phlegmone. C A P. XXXVII.

B **R**enes plurimis de causis phlegmone corripiuntur. Nam vt humores corrupti, & *Causæ* plagæ, & attritiones, & medicamentorum potiones phlegmonem eorūdem procreant: præsertim autem equitationes assiduæ & vehementes. Accedit ægris dolor pul- *Signa* satilis retro iuxta primam dorsi vertebam, paululum supra spurias costas. Dolor vero sursum vsque ad iecur distendit, præsertim dextro rene male affecto. Deorsum vero vsque ad vesicam & pudendum, lumbosque & coxendices, pectinem item & femora. Consequitur etiam stupor propinqui cruris, & neque recta erigi possunt, neq; pedibus ingredi. Et siue sternutatio, siue aliqua alia concussio irruat, vehementi dolore lancinantur. Frigent eorum extrema, & magis suræ ac pedes. Adest vrinæ emittendæ difficultas, minguntque assidue ac laboriose: initio quidem tenuia & aquosa, in quibus nihil subsidet: phlegmone vero in peius proficiente, rubicundiora: deinde etiam crassa & mucosa, adfuntq; febres vehemētes. Quod si amplius phlegmone augetur, hæc omnia sunt vehementiora. His accedit nauſea, & stomachi motus, vomitusq; bilis. Quædam vero ipsorum vsque ad animi deliquium anguntur, & exsudant. Siftitur ipsis venter adeo vt inflentur, & assidue ructus emittant. Sequitur fastidium vehemens, & quibusdam continuæ sunt exacerbationes, quibusdam vero per interualla. In vniuersum autem ventris egestio, & vrinæ multæ excretio dolores ipsos præcedunt. Ægrum in lecto *Viſus* mollissimo decumbere oportet: ac primo die a cibo abstinere, non tamen in multos dies in ediam extendere. Vrinæ enim puriores & actiores per in ediam redditæ, vehementissimos morsus infligunt. Itaque in principio forbitionibus tenuibus morsus lenientibus nutrire oportet, vt est ptisanæ succus, aut hordei alica. Malua etiam inter olea summe confert. Potus sit aqua, in qua parum cinamomi vulgaris decoctum sit. Quid multa? victus ratio sit tenuis, & talis qualis in aliis phlegmonibus. Quod ad curandi rationē attinet, initio statim detrahendus sanguis est. Secāda v. erit vena, *Curatio* Galeno in lib. *De ratione curandi per sanguinis missionem teste*, quæ in poplite est, aut certe quæ iuxta malleolos, idque in crure e directo renis laborantis. Interdum etiam, eodem auctore, misso ex cubito sanguini auscultant, vbi videlicet recens fuerit phlegmone, & reuulsione magis opus erit, copiaque sanguinis affuerit. A venæ sectione ad localia voca- *Localia* ra progrediendum medicamenta, cataplasmata videlicet, fomenta, linimenta, emplastra, & similia quæ mediocrem refrigerandi & leniendi vim obtinent, *ex oleis rosaceo, vitellis ouorum, cotoneorum, chamamelino, farinis hordeacea, fabacea, sennograci, lini semine, & similibus, quæ in capitibus De iecoris & lienis phlegmone dicta sunt, parata.* Quod si per ea quæ extrinsecus admoventur, dolor non leuabitur, cucurbita lumbis ac illis est adhibenda, & fissuris impactis plurimus sanguis est extrahendus. Deinde spongiarum fortu vtendum, & aliis quæ dolorem leuare possunt. Cauendum autem vnice, ne hoc tempore ea quæ vrinam mouent medicamenta bibenda dentur, Galeno etiam nostro monitore, qui libro *decimotertio Ther. meth.* ne id ipsum fiat, studiose & diligenter prohibet: obſtunt enim vehementer, mordaces humores phlegmone obſeſſis partibus inducendo. Cauendum quoque a purgantibus medicamentis erit initio phlegmonis. Clysteribus tamen mollibus, potissimum si venter nihil deiecerit, *ex malua & mercurialis decocto, aut seminis lini, & sennograci, aut succo ptisanæ confectis, adiecto oleo violaceo, aut chamamelino, vtendum.* Verum cauendum, ne magna copia infundatur, quod alias intestina, repleta & distenta renes comprimāt. Ceterū vbi perfecte iam sedata accōcta fuerit phlegmone, id quod cognoscit omnimoda doloris remissione, tunc etiā per vrinam

prouocantia purgandum erit. A concoctis enim phlegmonibus vrinæ prodeunt multæ & crassæ, ac in iis quod subsidet bonum est, atque adeo morbum prorsus iudicat. Quæ autem sint medicamenta vrinam mouentia, diximus *libro secundo De compos. medic. cap. 7.* Potissimum vero inter olera conferunt fœniculum, apium, & pastinacæ probe percoctæ. Quod si vero per prædicta medicamenta malum non propellitur, & neque dolor, neque febris, neque grauitas horum vsu conquieuerint, vrinæque difficultas ac frequēs stillicidium ægrum molestauerit, pus hac in parte colligi indicium est. Tunc itaque quam celerrime suppurationem ac puris eruptionem adiuuare oportet. Quæ in re spongiæ aqua & oleo assidue imbutæ proderunt, fœtus gratia ad motum. Eundem etiam vsu cataplasmata præbent, quæ ex farina hordeacea, surfuribus, ficibus pinguibus, althea, & similibus supra *in capite De iecoris phlegmone dictis*, constant. In solum quoque ex emollientibus herbis, malua, althea, chamæmelo, lini semine, fœnogræco, paratum, descendere summe confert. Quod si vero perfecta iam suppuratione (id quod cognoscitur, si febres & dolores minores fuerint, grauitatis autem sensus circa renem laborantem remanserint) ruptura moretur, in potu exhibenda quæ vrinam ducunt, vtest fœniculi, pulegii, origani, & similibus decoctum. Hæc enim rumpunt interdum suppurationem, & pus per vrinam expurgant. Quod si autem vsus illorum nihil contulerit, acribus clysteribus aluus subluenda erit, veluti *cucumeris syluestris radice decocto & diluto vel alliorum, vel raphani*. Macerare autem hæc in muria oportet, parumque olei admiscere, quo infusa lubrica reddantur. Hæc sane per clysterem infundenda, iubendique ægri vt plurimo tempore apud se detineant. Consueuerunt enim sæpe ipsam suppurationem rumpere, vna cum hoc quod ventrem emolliunt. Remorantem quoque rupturam iuuat cuminum cum passo, ruta cum vino mulso. Porro ruptura facta, carunculae parue, oblongæ cum vrina excernuntur. Et si maligna fuerint vlcera, humores fœtidi, liuidi & mucosi: si vero benigna, pus ipsum album, æquale, leue, & absque odore graui, ac paucum excernitur. Post puris eruptionem lac cum melle præbendum, & alia quæ in capite *De renum ulceribus* commemorabuntur.

De calculo renum. CAP. XXXVIII.

Renum calculis profectæ ætatis homines frequentius, quam pueri apprehenduntur. Causæ autem generationis horum calculorum sunt assidue cruditates, unde humoris crassi & terrei multitudo coaceruatur, & ardor igneæ circa renes caliditas, quæ humores adassans, eos cogit, & in lapidem indurat, ad modum toforum qui in aquis reperiuntur, quæ in æreis, præsertim balneorum, vasis coquuntur. Consistunt autem lapides in renibus iuxta ventriculos ipsorum, aut parui, aut maiores: & aliquando quidem pauciores, aliquando autem plures, & magnitudine, & forma, & colore, & asperitate inter se differentes. Nigri enim, & subalbidi & pallidi reperiuntur. Accedit ægris grauis in renibus dolor, aculeique infixi sensum præbens, tumore tamen nusquam foris apparente. Spina ægre flecti potest. Crus quod est directo est renis laborantis ob nerui a vertebrae lumborum orti compressionem stupet, adest fastidium & vomitus. Vrina circa obturationis principium propter obstructionem pauca, & aquosa mingitur. Postea vero perfecta earum suppressio contingit, aluusque nihil excernit, verum promptitudines multas ad egerendum facit. Excernitur autem aliquando sanguis, propter violentiam calculorum, præsertim asperiorum. Vrinam etiam arenosam subdientiam habet, potissimum vbi lapis ex renibus fuerit emotus. Quas singulas fere notas Hippocrates *libro sexto Epid. par. 1. aph. 5.* iis complexus est verbis: *Interim dolor grauis, quando cibo replentur, inuadit, pituitamque vomunt. Quum vero dolores intentiores fuerint, æruginosa: atque tum leniores quidem fiunt. Dolore autem lenantur, quando cibo vacui fuerint. Arena rufa subsident, cruenta que mingunt. Stupor cruris, quod est directo est.* Hæc ille. Porro leues & rotundi facile excernuntur: non item, qui alia quacunque forma præditi sunt: maxime tamen oblongi & asperi difficulter excernuntur. Ceterum quum lapis in renibus obturatus vehementissimos dolores intulerit, ne scilicet sanguinis multitudo intensione & dolore in laborantem particulam procumbat, in corpore plenitudine affecto & robusto, confestim poplitis vena, iuxta Hippocratis loco iam citato consilium, incidenda erit, eius nimirum cruris quod stupet, & est directo renis laborantis est. Qui vero

- A** cacochymia vitiosoue humore ægri laborant, iis purgatio redundantis succi conuenit. Neque sane hæc omittenda est, nisi aliud quidpiam id fieri prohibeat. Id quod etiam Hippocrates iubet, dum iuuenes elleboro purgandos esse docet. Quod si vero sectio-
nem venæ, aut purgationem adhibere minimelicebit, aluum per clysteris infusionem
eludere oportet. Quod tum maxime faciendum erit, vbi multa in intestinis excremen-
torum copia fuerit. Cauendum tamen ynice erit, ne sint validiores, atq; adeo ne aliun-
de humorum copiam ad intestina trahāt, ne meatus vrinarii angantur & comprimantur: sed sint tales, quæ duntaxat excrementa in intestinis detenta vacuare possint, vt est
is qui habet: *Malua, althea, mercurialis, trichomanis, parietaria, singulorum manipulum vnum.* Clyster.
B *Sisymbrii cardamines, manipulu vnum & dimidium, Seminum petroselinum, apii, fœniculi, lini, singul. drachmas tres. Radicis acori, vnciam vnā & dimidium. Furfuris, vnciam vnā.* Ebulliant
in aqua iustæ quantitatis ad tertias, & subinde colo transfundantur, accipianturque in-
ris decocti, vncias vndecim. *Cassia fistularis, vnciam vnā. Hieræ picra, vnciam dimidiam. Mellis
rosacei colati, vnciam vnā & dimidiam. Oleorum anethini, rutacei, chamamelini, singulorum
vnciam vnā. Salis, drachmas duas. Commixtis omnibus fiat clyster.* Nulla tamē ratione com-
mittendum, vt clysteribus, aliis fere omnibus remediis neglectis, vt plerique medico-
rum hodie faciunt, assidue vtamur, sed bis aut ter: sic tamen, ne vltra consuetum tem-
pus retineantur. Retenti enim diutius quam par est, compressionem atque angustiam
renum, ac vrinariorum meatuū efficiunt, vt copiosius lib. 2. Paradoxorum. cap. 15. diximus.
C Porro excrementis alui expurgatis, quæ laxare meatus possunt medicamēta, adhiben-
da erunt. In quem sane vsū hoc vnguento renū & lumborum regio inungenda e-
rit, quod accipit: *Oleorum anethini, amygdalarum dulcium, vtriusque drachmas duas. Olei cha-
mamelini, drachmā vnā & dimidiam. Adipis gallinacei, anserini. vtriusque drach. duas. Butyri
salis expertis, drachmam vnā. Cera quod satis, fiat vnguentum molle.* Infectionibus quoque v-
rendum ex decocto calaminthes, origani, sisymbrii cardamines, brassicæ, foliorum althea, malua,
& similitum. Aut æger in solium tepidum aquæ dulcis frequenter demittendus. Fomen-
ta item ex furfuribus cum foliis althea decoctis loco dolenti admota mirifice conferunt. Cataplas-
mata quoque ex farina tritici, seminibus lini & fœnogræci, lupinorum, peucedani radice quam
minutissime trita, & chamamelo parata. Bonum est, & panem passū decoctum circa lumbos
ac ventrem imponere. Neque temere quidem fecerit, qui cataplasmata & alia paulo
ante commemorata vesicæ & pectini adhibuerit. Oportet vero coaceruatim alia su-
per alia cataplasmata adferre, priusquam scilicet primum frigescat. Siquidem frigus
contrahit & constringit, atque adeo in renibus & vrinariis meatibus lapidem retinet,
eiusque exitum impedit. Quod si non lubet totidem cataplasmatibus vri, calefactorio alio
extra contingere oportet, ne refrigerentur: id quod commodè fieri potest per facellos,
aut alia vaporatoria quæ cataplasmati imponuntur. Hæc interdum, idque non raro, ad
lapidis per vrinam eiectionem sufficere solent. Quod si vero malum non abegerint, ea
etiam, quæ vrinam cient, bibenda dabis. Vrinam autem multam hæc quæ sequuntur
ducunt: *acorum hypericum, petroselinum, oreoselinum, lithospermum, ammi, dauci semen, & fœni-
culi, asarum, radix bryonia, & rubia tinctorum, cortex radice capparidis, asparagus, & iis similia.* Vrinā du-
centia.
E His autem admisceantur ea, quæ deducūt ad renes: vt sunt *radix peucedani, bryonia, apium,
& radícula. Item qua calculos in renibus confringunt, & atterunt: sium scilicet, adiantum, bdellium,
agni seu viticis semen, rustici radix, saxifraga, betonica, damasonii radix, ciceris iusculum, radix cy-
peri, lithospermum, zecolithos (lapidem iudaicum officina vocant) xanthium, althea semen, & ra-
dix pruni gummi, vermes terreni cocti, & ex marinis spongiis lapilli.* Horum singula partim de-
cocta, partim tenuissime trita præbeto bibenda. Ceterum ea quæ vrinam cient, ac la-
pidem frangunt, tunc exhibere conuenit, quum vehementes dolores remittunt: id
quod accidit, lapide iam transmoto, & e sede sua agitato. Quod si ramentum obfirmatum ac
vehementer impactum sint in renibus lapides, plurimus potus vitandus, itemque ea quæ
vrinam ducunt. Nam cum secum excrementorum non contemnendam copiam ad
renes deducant, fit vt meatus vrinarios obstruant, & calculorum e renibus transitum
impediant. Fomentis autem & cataplasmatibus, infectionibusque renes & meatus vri-
narii, vt dictum est, relaxandi. Venter quoque per infusa leuia vacuandus, ne vrinarii
meatus comprimantur. Post hæc vero doloribus aliquantulum lenitis, cucurbitæ etiam
vtiliter ipsius adhibentur, & præsertim pressius affixæ, phlegmone videlicet id non im-
NN

Venæ se-
ctio.
Purgatio.

Clyster.

Clysteribus
crebriorib⁹
non vtien-
dum.Laxantia
meatus.
Vnguentū.

Infectiones.

Cataplas-
mata.Vrinā du-
centia.Deducen-
tia ad renes.Quando v-
rinam ciē-
tia & lapide
frangearia
adhibenda.

Lapis si cir-
ca collum
vesicę detē-
tus fuerit.

pediente. Adeo enim coaceruatim transmouent sæpe cucurbitæ ipsos lapides, vt re-
pente dolores supprimant, lapide nimirum in vesicæ amplitudinem transuecto. Qua-
propter in principio superne a rene cucurbitæ sunt affigendæ, & ad inguina attrahen-
dæ oblique secundum meatuum vrinariorum situm. Porro delati ex renibus in vesicam
lapides, & præ magnitudine circa collum vesicæ detenti, sæpe in extremum periculum
ægrum deducunt, tum propter dolorum acumen, tum quod urinam excernere non
permittunt. Decubitus igitur formam in talibus moliri oportet, ita vt supini collocen-
tur, & longe altiores coxarum vertebrae habeant. Deinde multiformiter eos commo-
uere, quo omnibus machinationibus adhibitis lapidem ex ipso vesicæ meatu excidere
faciamus: post vero ægros iubere, vt alacriter urinam eiiciant, & ea eiecta sinere. At ve-
ro vbi lapis non fuerit eiectus, rursus mouere, atque hoc ipsum sæpe repetere. Quod si
hac ratione nihil profecerimus, catheter instrumentum proliciendæ urinæ aptum im-
mittendum, eoque lapis a collo vesicæ propellendus, & vrina educenda. Post vero per
portiones lapidem in amplitudine vesicæ existentem confringere per medicamenta
conuenientia annitemur. Si vero ex vesica quidem accidat calculus, iuxta medium au-
tem meatum ipsius pudendi offirmeretur, & vulnerando exulcerationis periculum in-
ducat, aqua calida paulatim ab alto pudendorum partibus, donec rubore suffundantur,
instillanda: aut pudendum in oleum calidum quod relaxandi vim obrinet, demitten-
dum. Decoctum etiam quoddam ex iis quæ urinam ducunt, plurimum exhibendum
est, iubendusque æger, vt multam urinam congreget, eamque postea excernat, ac dili-
gentius expellat. Ita enim detractus lapis celeriter excidere consuevit. Quum vero ne-
que hoc modo eum extrahere licebit, secundum erit pudendum, vulnuscule superne
iuxta glandis magnitudinem incusso. Inferne enim secare non expedit, quâdoquidem
fere semper in fistulam proficit, ac postea per ipsam fissuram vrina excernitur. Lapide
tandem amoto præseruare hominem, ne rursus renes lapide infestentur, oportet. Ma-
ximi autem ad lapidis generationem præcauendū momenti est cibus boni succi, con-
coctus facilis, & moderatus. Quare cauere sibi ab omnibus cibis duræ substantiæ conue-
nit, & quæ ægre manducatione atteruntur. Exercitia etiam mediocria sint, rarusque o-
mnis generis leguminum frumentaceorumq; vsus: casei maxime lactis, & quæ ex ipso
præparantur obsoniorum: vini denique nigri, copiarum carniū, & omnium summatim
crassi succi, nimisque calidorum & acrium. Eos autem quos calculus affixit, admonere
oportet, vt a cena sapius vomant, & absinthium assidue bibant: & certis temporibus, si
quidem sanguis abundare videatur, venam secet: aut si vitiosi humores coaceruentur,
conuenienti ipsorum temperamento purgatorio medicamento vtantur. Oportet etiam
ipsam aquam per omnem victum esse purissimam & percolatam. Vinum item tenue,
album, neque valde vetus: hoc enim urinæ ciendę idoneum. Urinam quoque cientibus
tum cibus tum medicamentis vtendū. Quare indies pastinacam admodum percoctam,
feniculum, sium, pulegium, & similia edere oportet. Inter medicamenta vero is puluis
multæ est efficaciar, qui habet *Radicum fœniculi, asparagi, ananthes, singulorum drach. unam.*
Radicis rubiæ tinctorum, scrup. unū. Radicis aristolochiæ rotundæ vocatæ, althææ, vtriusque drach.
unam. Glycyrrhizæ asæ, drachmas duas. Lapidis & spongiis marinis, recoliti, hoc est iudaici, vtriusque
scrupulum unum. Seminum ammeos, dauci, petroselinī, saxifragæ candidæ, fœniculi, anisi, lithosperi-
mi, singulorum drach. dimidiam. Seminum melonum & citruli excorticatorum, vtriusque drach.
unam & dimidiam. Seminis halicacabi drach. dimidiam. Helxines seu parietariæ, maluæ, vtrius-
que drachmam unam. Polii montani, adianti, pulegii, asari, singulorum drachmam dimidiam. San-
guinis hircini arefacti & præparati, drach. unam. Bdellii, ammoniaci, vtriusque drach. dimidiam.
Oculorum cancri, cinnamomi selecti, iunci odorati, singulorum scrupulos duos. Contusa omnia re-
digantur in puluere minutissimū, de quo detur pondus drachmæ vnius quarto quo-
que die, aut singulis septimanis in aurora ex vino tenui. Porro sanguinis hircini, cuius in
prædicto puluere mentio fit, præparationem tradit Aetius lib. 17. cap. 12. Plura alia reme-
dia dicemus in cap. de calculo vesicæ.

Præserua-
tio a lapide.

Puluis ad
calculosus
renes.

De ulceribus renum. CAP. XXXIX.

Causæ.

Renum vlcera accidunt propter venarū, quæ in iis sunt, rupturam. Item suppuratio-
nē phlegmonis, & acres ac mordaces humores huc delatos. Deprehendunt renes
exulcerati

- A** exulcerati dolore in lumbis cum grauitate, & sine impedimēto vrina redditur, id quod in vesicæ vlceribus non fit. Vrinæ quoque pus commixtum reperitur, carnosus particu- Signa.
lis, aut pilis innatantibus iuxta Hippocratis sententiam, qui ita scriptum reliquit: *Si sanguinem aut pus mingant, aut renum, aut vesicæ exulcerationem significat.* Et statim post hæc: Aph. 73.
Quibus in vrina crassa exsistente caruncula, parua aut veluti capilli vna exeunt, his a renibus excernuntur. Permissum vero etiam cum vrina in vesicæ vlceribus pus est, sed dolor ipse, mox locum, vnde illud procedit, demonstrat. His itaque apparentibus æger cruditates vitet Vitus.
& satietatem. Ne quid igitur crudum in cibo accipiat, & neque quod ægre concoquitur, aut facile corrumpitur, aut inflationes parit. In primis autem ab iis absteineat, quæ facile acescunt. Item omnia acria & feruentia, & quæcunque bilem gignere possunt: Vitus.
B vt est sitis, multa abstinentia, inedia, labor, ira, sollicitudo, exercitatio, vigilia, & immodica condimenta. Vitanda vero maxime erit immodica equitatio, & omnis vehemens concitatio: non minus tamen iis perpetuum ocium, & balneorum assiduitas. Vtendum pane recenti, & decēter apparato. Carnibus volucrum montanarum, hœdis quoque, & similibus teneram carnem habentibus. Piscibus saxatilibus, squamosis, in craticula assis. Cancris præterea fluuiales, sorbitio ex ptisana, & amyllum cum lacte coctum mirifice confert. Dandum & lac ouis permixtum, iusculumque gallinaceum pingue. Qua etiam forbilia per se conueniunt. Ex oleribus autem *malua, intyba, rumices, portulaca & lactuca conducunt.* Omnia tamen hæc cocta, crudi enim nihil, vt dictum est, æger sumere debet. Et fructibus vna passa nō incommoda est, & nuces pineæ: amygdalæ etiam, decorticatæ tamen, & probe mundatæ. Multus potus, & meracior vitandus. Aph. 20.
C A frigida quoque potu in totum abstinendum. Frigidum enim, vt ait Hippocrates, vlceribus inimicum. Pro potu vtatur vino diluto, ac parum adstringente: aut lac caprinum, aut ouillum, aut amygdalinum bibat. Coitus non solum vlceribus, verum etiam omnibus aliis renum malis infestissimus, potissimum vbi senes, & natura imbecilliores eo vsi fuerint. Vitanda ea, quæ vrinam ciunt. Balnei, vt dictum est, rarus sit vsus. Naturales vero, & sponte natas aquas experiri non inutile fuerit, maxime aluminosas, sulphureasq;. Frigida lauare commodissimum est: supra modum enim vlcerationes ægre sanabiles tum externas, tum internas destruit. Conferent etiam naturales aquæ post matutinam Curatio.
deambulationem potatæ. Curandi ratio, vbi propter acres & mordaces humores vlcera renum accidunt, ab eorundem humorum vitiosorum & erodentium purgatione Vomit.
aspicienda. Qui vero sic afficiuntur, eos vomitu quoque vacuare oportet. Non autem ad vitiosos duntaxat humores vacuandos confert vomitus, verum etiam si quis singulis mensibus audacter vomuerit, is renum vlcus, & quicquid inde mali accidere potest, dissoluet: humorum siquidem motum in contrarium auertet. Sunt etiam interea propi- Morsus obtundentia Medicamenta. Purgatio vlcis.
nanda medicamenta, quæ morsus acrium humorum obtundunt, vt est *malua, intybum, rumex, portulaca, semen melonum, cucumeris, & cucurbita, serapium violaceum, rosaceum, nymphaea, & eorundem sacchara.* Ceterum vitiosis humoribus vacuatis, aqua multa bibenda, aut decoctum fœnogræci cum melle, aut cucumeris, aut maluæ, aut melonum semen cum hydromelite. Lac præterea cum melle præbendum; recens mulctum & calidum: ad vlcera enim purganda conducit. Serum item caprinum, decoctum hordei, vuarum passarum, & glycyrrhizæ: quæ quidem, perinde atque eius succus, mirifice confert. Quum vero iam purgata & munda fuerint vlcera: quod inde tibi palam fiet, si neque testorium vlceri obdura cum vrina excretum apparet, neque pus excretum est feculentum, sed subalbum, leue, æquale, & paucum: tunc ea quæ resiccant, adstringunt, & glutinant medicamenta adhibeantur. In quæ sane vsus datur bolus armenius, gummi, tragacantha, amyllum, terra lemnia, & similia alibi commemorata. Præter cetera tamē mirifice confertis puluis, qui accipit: *Terra lemnia, boli armenii, vtriusque drachmam vnam & dimidiam. Tragacantha, spodii vsti, vtriusque drachmam vnam. Amyli, nucum pinearum tostarum, vtriusque drachmam dimidiam. Seminum lini, cucumeris repurgati, melonum, singulorum drachmas duas. Seminis apii, scrupulos duos. Sanguinis draconis.* Conterantur singula, inque puluerem redigantur tenuissimum, de quo dentur quotidie ægrotanti drachmæ duæ cum lacte recens mulcto. Porro extrinsecus quæ renes exsiccare ac roborare possunt, admoueantur emplastra, cerata & vnguenta ex oleis rosaceo, myrtino, farina hordei, thure, mastiche, rosis purpureis, similibusque composita, quorum Renes exsiccantia & roborantia.

Formulas e superioribus petent studiosi. Plura remedia alia infra in capite de *ulceribus A vesica* recensēbimus.

De Diabete. CAP. XL.

Diabetes
quid.
si laxos.

Causæ.

Signa.

Curatio.

Vitus.

Medica-
menta.

Localia.

Emplastrū.

Diabetes diuturnum est vitium circarenes consistens, multam sitim inducēs: unde quoque si laxos ¹⁰⁰⁹ Græci idem vitium nominant: una cum hoc quod quicquid bibitur, simul ut & quale assumptum est, per urinam redditur. Quidam hoc vitium, ut testatur Galenus capit. ultimo libri de symptomatum differentiis, urinæ fluorem, & *ὑδραγωγίαν* quædam, id est, aquam inter cutem ad matulam vocant. Origo ipsius ex retentricis renum facultatis imbecillitate contrahitur, attractricis vero tanto robore, ut totum corpus ob immodicum calorem exhauriat. Immodicus itaque calor, ut renes attrahant efficit, idem vero relaxando retentricem ipsorum facultatem, dissolvit. Renum itaque proprium malum Diabetes existit, quo videlicet imodice humorem appetunt ægrotantes, ipsumque propter debilitatē retentivæ in eis facultatis continere non possunt, sed eum aceruatim in vesicam excernunt. Concomitatur ægros pertinax sitis, neq; vlla satietas ex alicuius liquoris exhibitione contingit: ideoq; assidue potum assumere coguntur, propterea quod citissime per urinam expellatur id quod ingestum est. Viscera etiam ægrotantibus vri videntur, intumescunt lumbi, testes, & coxæ. Quod si amplius adhuc mordense caliditas in visceribus augeatur, superior venter corrugatur, & venæ in ipso eleuantur, vniuersum habitum gracilem habent, & tabes totius corporis gravis accedit. Ceterum curationis scopus in iis consistit, ut humorum acredinem obtundamus, sanguinemque, ac cum eo pexmixtum serosum humorem ad motum tardiores reddamus, & renum intemperiem corrigamus. Mox itaque ubi cœperit vitium, nondum ad perfectionem progressum, optimum est gibberi venam secare, reulsionis gratia, & moderate sanguinē auferre. Utendum etiam mediocriter urinam cientibus, quæ vitiatum, inque renes imbibitū humorem expurgent. Quod si vero inueteratum sit malum, neque venæ sectione utendum, neque quicquam quod urinam mouet exhibendum. Hæc enim corporis tabem & colliquationem, quæ sponte sua in hoc malo accidit, accelerant. Concidunt enim inueteratis vires, & ex venæ sectione totū corpus acrius redditur, & urinam cientia in ipsis multiplicat, augentque malum. Maximum vero ac præcipuum eius vitii remedium est, ut quod potum est, statim remoueatur. Sic autem per quam frigidus potus ipse, quandoquidem reliqua etiam victus ratione frigidiores uti conueniat. Cibi igitur exhibendi boni succi, quique difficulter commutari possunt, & mordacitate careant, aut qui mordacitatem & acrimoniam obrundere valeant: ut sunt oua sorbilia, alicuius sorbitionis modum appaata, carnesque porcinae macrae plurimum coctæ. Neque vero incommode exhibetur eis caseus recens compactus, salis expers: & lac per silices, aut ferrum ignitum scissum, seroso adempto humore. Pro sorbitione etiam, ptisanæ succus frigidus probatur. Ex oleribus autem *intybum, lactuca, & portulaca*. Ex fructibus *pyra, poma, mala punica*. Inter pisces, saxatiles conueniunt. Vinum bibendum rufum, crassum, aqua amplius dilutum, ad falsuginosorum humorum, qui sitim inferunt, proolutionem. Vinum enim corporis temperaturam ad dulcorem permutat. In potu quoque exhibendus succus malorum granatorum, succus medicatus e ribes, aut oxyacantha. Quod ad medicamentorum rationem attinet, polygoni seu sanguinariæ succus recte ipsi, ex vino nigro propinatur. Symphytum item, palmularumque & baccarum myrti, pyrorumque decoctum. Serapia rosaceum, myrtinum, & similia. Pastilli quoque e spodio, ex polygoni succo, aut vino nigro propinandi. Extrinsecus hypochondriis, lumbis, & pectini illitiones, cataplasmata & cerata refrigerantia adhibenda: qualia sunt quæ ex aceto rosaceo, *polenta, lactuca, lenticula, palustri, parietaria, foliis visis, portulaca, & similibus conficiuntur*. In quem etiam usum proderit inunctio, ex oleis, *rosaceo & myrino: aut illitio e succo solani, aut pampinorum vitis facta*. Farina quoque hordeacea, aceto & rosaceo subacta, cataplasmatibus modo hypochondriis imponenda. Utendum denique hoc emplastro, quod habet: *Farina hordeacea unciam dimidiam. Pampinorum vitis extremitatum salicum, bursa pastoris, singul. manipulum dimidium. Corticum granatorum, drachmas duas & dimidiam. Portulacæ, manipulum unum. Seminis cotoneorum, drachmam unam. Rosarum purpurearum, manipulum unum & dimidium*. Ebulliant singula in aqua

A aqua, donec ad mellis crassitudinem, perueniant. Deinde addatur *olei rosacei, uncia dua*, *Sudorum Olei myrtini, uncia una. Denuoque bulliant, & fingatur emplastrum.* Ex iam commemoratis *euocatio.* potest fieri ceratum, adiectis *hypocisthida, acacia, bolo armenio, resina & cera.* Porro sudores quoque excitandi erunt, ut scilicet vitiosi humores ad exsudationem vertantur. Optima vero est in dolio facta ex herbis aut aliis rebus calidis euaporatio ad sudandum, eo modo facta, ut caput extra dolum prominat. Vel vas aqua calida plenum pedibus ægrotantis, inque lectulo decumbentis admoueat, atque sudor eliciatur.

De vesica calculo. CAP. XLI.

B Generantur in vesica lapides pueris frequentius, quam ætate prouectis: voraces enim sunt pueri, & perpetui motus, ac cibis utcumque oblatis & nociuis utuntur, neque horam cibum capiendi seruant certam & ordinatam. Quinetiam priusquam prior assumptus cibus concoquatur, alium ingerunt, ideoque cum vehementius a cibo moueantur, fit ut crudus & incoctus in venas cibus distribuatur. Mollia autem cum sint adhuc illorum corpora, & quæ facile cedant, ob id obturationem circa renes non perferunt. Quum vero crassissima vrina in vesicæ amplitudinem perferatur, ibidem veluti fex vini & limus aquæ sublit, ac postea propter caliditatem, qua pueri præditi sunt, desiccata & firmata lapidescit, id quod extrinsecus etiam in aquis suapte natura calidis, & in vasis in quibus quotidie calefit aqua, accidere conspiciamus. Hinc est quod aquæ impuræ, & multo limo refertæ, item quæ duriores & vehementer frigidæ sunt, lapidis in vesica generationem adiuuant. Dux itaque potissimæ generationis lapidis in vesica causæ sunt, crassities vrinæ, & puerorum calor. Quod Hippocrates etiam *lib. 6. epid. par. 3. aph. 11.* iis verbis innuere voluit, *Considerandum*, inquit, *an a mictione facta concretio puerulis magis, eo quod calidiores sint, accadat.* In cuius quidem sententiæ explicatione quæ annotauimus in nostris commentariis, sane multa ad institutum facientia reperient studiosi. Error vero quorundam qui perpetuo lapidem vesicæ a renibus initium capere putant, iam dictis Hippocratis verbis exploditur. Experientia etiam constat, multos pueros calculo vesicæ laborare, qui renum lapide antea nunquam affecti sunt. Quare Ferneliū, & eos, qui huius sententiam sequuntur, in errore versari notius est, quam ut pluribus a nobis ostendi debeat. Pruriunt laborantes calculo vesicæ crebro, & vrinas crudas mingunt, & subalidas, sedimentum arenosum, atque contrectant pudenda, quæ etiam intenduntur, ac continuo ad mingendū vrgentur, stillicidioque vrinæ vexantur. Curatio huius vitii eadem fere est, quæ renum quum calculo laborant. In eo tamē diuersa, quæ val diora requirant medicamenta lapidis vesicæ: & quæ vesicæ adhibenda sunt, quæ renibus alias admouerentur. Lapides autem in vesica oborti, iis potissimū medicamentis atteruntur, *Lapides in vesica atterentia.* *semine nimirum & radice feniculi, smirni, granis pæonia nigris, artemisia, chamæmelo, althea, radice & semine, sfo, adianto, rumicis radice, lapidibus spongiarū, tæcolitho, litospermo, rusti radice & semine lapide, quæ ab ægris cū lo:io eiectus est, trito & potato semine xanthii, cortice capparis, abrotani semine, hyacinthi, viola alba, apii, petroselini, & aliis in similib. quæ vrinā ciere possunt, & quæ in capite de renū calculo sunt commemorata.* His coniungendū laudatissimū remediū, passer troglodytes, qui minimus passerculus est, iuxta sepes & muros victū quæritans, ut *Aetius & Paul. tradunt*, caudā semper subrectā & albo colore retro interpunctā habēs: iuxta summū alæ lineamentū cinerei coloris. Hic sane totus sale conditus, & crudus in cibo sumtus, morbum perfecte sanat. Calculos enim iam creatos per vrinam expellit, in posterumque generari prohibet. Sanguis denique hircinus ad calculos tum renum, tum vesicæ præsens remedium est. Nam præexistentes soluit, atque per vrinam excernit, & ut alii amplius non generentur prohibet, ac dolorem sedat. Præterea si vesicæ lapides per vrinæ meatum excerni haud possunt, sed illic sunt obrurati & impacti, atque adeo vrinæ suppressionem efficiunt, ægtum supinum decumbere oportet, ita ut coxarum partes magis sursum vergant, indeque huc atque illuc multiformiter commouere, quo ex meatu excitat lapis, post vero ita adhuc supinum & positu sursum vergentem mingere iubere. Si vero neque sic excernere queat, per catheterem instrumentum vrinam prolectare: deinde ea, quæ lapidē in vesica atterere valent medicamēta exhibenda. Quod si neque per hæc curatio procedat, ad sectionem veniendum erit. Lapide igitur hac vel

illa ratione exacto, victus ratio constituenda est eiusmodi, ne subinde renascatur, quam A
in capite de lapide renum descripsimus.

De sanguinis ex vesica eruptione, & grumis eiusdem. C A P. XLII.

Causa.
Signa.

Rumpi nonnunquam in vesica venam accidit, atque tum partim quidem sanguis foras mittitur, partim vero intus condensatur. Sanguine vero condensato, & grumis iam coactis, æger animo linquitur ac palleſcit, pulsusque exiguos & obscuros & densos habet, mœrore angitur, refrigeratur, viribusque destituitur. Quum vero grumus aliquando in vrinarium meatum inciderit, tum is etiam vrinæ excretionem supprimit. Porro quam celerrime, velut etiam in aliis sanguinis eruptionibus, auxilium ferre oportet. Quapropter si nihil prohibeat, venam in gibbero secare, partita sanguinis detractione conuenit, ut hac ratione sæpe & paulatim sanguis detractus reuellatur. Aegri vero in decumbendo, sursum versus collocentur, & coxendicibus ipsorum leuandis, & simul refrigerandis spongiæ polca imbutæ subdantur. Extremæ quoque partes constringendæ, & pecten ex spongiis polca imbutis irrigandus. Vrgente malo summe profunt cucurbitulæ iliis ac lumbis affixæ. Post irrigationes cataplasmatibus ex poligono, rubo, plantagine, balauſtiis vtendum. Item ceratis ex *hypocistide*, *acatia*, *boloarmenio*, *terra lemnia*, *sanguine draconis*, & iis similibus in capitibus, de sanguinis sputo, & dysenteria commemoratis. Vesicæ infundendus polygoni, plantaginis, aut millefolii succus, commixtis *acacia*, *boloarmenio*, *pastillis e spodio*, & similibus. Inſusus etiam ex consimili materia constructi conueniunt. Nam & polca, & lentisci decoctum, itemque rubi, ac similibus eis conuenit. Danda quoque in potu medicamenta educationi sanguinis apta, ut sunt *rheum ponticum tenuissime tritum*, & *paonia grana rubra duodecim*, *terra lemnia*, *hippuris*, *centaurii magni radix*, *thuris cortex*, & similia. Ceterum quibus sanguis in vesica in grumos cogitur, primum tentandum est ut medicamentis conuenientibus dissoluatur ac diffundatur. In potu itaque præbenda est *artemisia*, *elichrysium*, *absinthium*, *abrotonum*, *ramenta vitis*, *raphani semen*, *leporis aut hœdi coagulum*, vnumquodque cum *oxymelite*. Imo ipsum *oxymeli* per se exhibitum, mirifice prodest: grumos enim dissoluit, ut subinde paulatim cum vrina prodeant. Extrinsecus autem balnea, vnguenta, irrigationes, & alia quæ relaxandi vim obtinent adhibenda, quæ sane singula ex capite, de renum calculo sunt petenda. Præter cetera vero ceratum hoc plurimum confert, quod accipit: *Oleum rumiliacei & chamamelini*, vtriusque vnciam vnā & dimidiam. *Calamintha*, *cumini*, *foliorum sambuci*, singulorum drachmas tres. *Bituminis iudaici*, *ammoniacy*, vtriusque drachmas duas. *Coaguli leporis*, drachmas tres. *Abrotani*, *farina seminis scæno-graci*, vtriusque vnciam dimidiam. *Ambar subalbidum*, *sperma ceti* vocant, drachmam vnā. Cum resina & cera quod satis est, fiat ceratum, quod pectini imponatur. Quod si hoc modo nihil proficias, sed vrina supprimitur, necessitatem inducet catheteris adhibendi. Per quem ubi vrinam eduxerimus, rursus quæ dicta sunt in potu exhibeamus, & extrinsecus quæ grumos dissoluant admoveamus. Si vero neque sic grumi dissoluantur, ad sectionem haud secus, quam vesica calculo laborante veniendum.

De phlegmone vesica. C A P. XLIII.

Signa.

Morborum qui circa vesicam oboriuntur grauissimus, & maxime mortalis phlegmone existit. Consequuntur ægros hæc signa. Febri acuta infestantur, vigilant, delirantes aliena loquuntur, vomunt biliosa pura, & vrinam reddere non possunt. Durus fit pecten, & pubes cum vehemēti dolore, & egerendi appetentia, veluti in tenesmo fieri solet. Quod vero egeritur tenue est, & subsidētiā non habet. Aliquando etiam inflationes sequuntur, & alius adstricta est, intestino recto a phlegmone vesicæ cōpresso. Sic laborantibus, si nihil aliud prohibeat, citra cunctationem venam poplitis secato, vel ex malleolis sanguinem detrahit. Victus quoque rationē, perinde atque in aliis phlegmonibus, tenuem adhibeto. Vino denique abstinendum, atque aqua in qua parum cinnamomi decoctum sit vtendum. Extrinsecus ea sunt adhibenda, quibus leniendi ac mitigandi dolores potestas inest. Quapropter oleo in quo anethum, lini semen, interdum etiam ruta & althæa incocta sint, vesicæ locus irrigandus. Frigida autem & reprimētia medicamenta prorsus admoveere non oportet: idque primum, quod vesica nervosa admodum sit, frigidum enim, Hippocrate teste, inimicum nervis. Dein, quæ frigida occludant

- A**occludant & stringant, atq; adeo vrinae suppressionem, quae huic vitio sua sponte accidit, augeant. Postremum, quod frigida, ne humores phlegmonem efficientes discutiantur aut concoquantur, prohibeant. Quare potius mediocriter calida sunt admo-
enda, quae quidem dolorem leuare possunt, vrinae fistulam & meatum laxare, atque phlegmonem discutere. Clysteribus quoq; lenibus ac mollibus aluus subluatur, & post ster-
corum educationem oleum anethinum, aut tale aliquod, leniendi doloris gratia ini-
ciatur. Praestet autem & papaueris calycem simul cum oleo incoquere, & adipem anse-
rinum aut gallinaceum recetem in ipso oleo eliquatum simul infundere. In vehemen-
tiori dolore solutam in oleo anethino drachmam vnam pilularum de cynoglossa infun-
dere oportet: aut opium cum myrrha & crocolanthe illitum in podicem indere. In deco-
Bthū itē seminis lini, foenugraeci radicis altheae seminis dauci, & similium infideat æger,
admoneaturque quo in aqua decocti desidens mingat. Vesica enim non satis robusta
est ad amplectendam expellendamque vrinam: quare ipsum egrum, aut aliquem ex ad-
stantibus scire ac placide pectinem premere oportet, neque id ultra modum, ne dolor
inde intēdatur. Ceterum post clysteres & infusus, fomentis etiam per aquam calidam,
& oleum in vesicis bubulis aut aliis vasculis semiplenis admotis, vtendum: aut sacculis,
vt in cap. de pleuriti de est ostensum. Quod si neq; sic vitium cesset, cucurbita vna cum scarifi-
catione locis afflictis affigenda erit. Porro abstinendum ab iis, quae vrinam vehemen-
ter citant, potioque multa vitanda. Vbi euidentis declinatio apparuerit, ad ea quibus dis-
cutiendi & emolliendi vis inest, de quib. iam sæpe dictum est, transeundum. Catheteris
Cimmissione vesica phlegmone laborante non facile vtendum, in viris potissimum: cum
enim non nisi laboriose immitti queat, dolores exacuit, & phlegmonem auget, verum in
mulieribus ipsum adhibere nihil absurdum: brevis enim ipsis vrinae meatus existit, &
recta situs: vt citra dolorem hoc molimen admittant. Si vero vrinae suppressæ pericu-
lum admodum vrgeat, necessario in viris etiam ad catheteris vsum confugimus: non sa-
ne quod mali molestiam tollat, sed vt potius urgentem vrinae suppressionem corrigat,
& a præcipiti periculo liberet. Post vrinae profectionem rursus ad auxilia, quae dolo-
rem leuant, veniendum, vsquequo phlegmone soluat aut suppuretur. Solet autem sæ-
pe phlegmone repente solui, erysipelate iuxta cutis superficiem oborto, & permanen-
te, neq; rursus intro recurrente. Imo & vrina multa eiecta sæpe iudicatum est malum. Ni-
Dhilominus tamen etiam si hæc apparent, iisdem remediis insistere oportet: quandoqui-
dem vt plurimum tensione perfecta cōtinua oborta, cōtinuæ exacerbationes fiunt, & ma-
li cōstitutio diuturna. At vero vbi periculosa accessiones cessarint, & morbi cōstitutio
iam fuerit inueterata, ad vnguenta quae humores ex profundo euocant, & transferunt,
& ad emplastra, quae cutem rubefacere possunt, transeundum est. *De quibus alibi diximus.*

De ulceribus vesicae, & eius cervicis. CAP. XLIV.

- E**xulceratur vesica aut propter abscessum, aut tuberculum quod præcessit, aut ruptu-
ram, aut fluxionis erosionem, aut aliam similem ob causam. Aegros comitatur dolor
vesicae acutus omni quidē tēpore mictionis, & excretionis puris. Et vbi sordida fuerint
vlcera, foeculenta simul excernuntur, & mucosa, & quae crassam subsidentiā instar
Efarinae habent. Interdum autem & pelliculae tenues instar foliorum & lanarum cum
vrina excernuntur. Si vero serpendo depascant vlcera, subcruenta excernuntur,
& saniosa, & foetentia. Ad hæc accedunt difficultas emittendae vrinae, & pudendi ar-
rectio ac petulantia. Dolor vero non solum cum vrinae meatus fuerit exulceratus, sed
& quum in profundo exulceratio consistit. Cognoscetur autem num in profundo
exulceratio sit, aut iuxta vrinae meatum, fistulamue, ex eo, quod si in amplitudine vesicae
fuerit, dolor circa pubem consequatur. Sin iuxta cervicem vesicae vlcera existant,
tempore mictionis tantum, & maxime vbi mingere inceperint ac desierint, dolor
sentitur: atque id amplius contingit, si vrina sit acrior. Qui hoc vitio affliguntur, ii aut
assidue decumbunt, aut erecti stare nequeunt, neque reclinati quiescunt. Ab immenso
Fac continuo dolore febribus, vigiliis & colliquatione perimuntur, alii quidem citius, alii
tardius. Ceterum insanabilia, aut saltem curatu difficilima sunt vesicae vlcera, tum
quia ipsa neruosa est, tum etiam, quia vlcera eius vrina, quae natura acris est, assidue con-
tingat, atque adeo erodat, nec glutinare permittat. Et si enim plurima excernitur vrina,
tamen vniuersa vesica vacuari non potest, sed semper ex vrina quippiam in ipsa relin-

Clysteres.

Fomenta.

Catheteris immis-
sio.Causa.
Signa.Insanabi-
lia, aut
saltem cu-
ratu diffi-
cilima
cur vesicae
vlcera.

Curatio.
Lactis po-
tus.

Adstrin-
gentia
medica-
menta.

Decubi-
tus forma
eius cui
clyster ad-
hibetur.

Dolorem
levantia
medica-
menta.

Mixtura.

quitur, quod assidue vlcera contingit. Imo cum vrina copia vacuatur, tum vesica con-
trahitur atq; concidit: vt quod in ea relictum est quantumvis exiguum, id ipsum omnes
eius partes contingit. Verum cum saepe etiam praeter expectationem quaedam eueni-
ant, cura aggredienda est, per quam, si nihil aliud certe accessorii dolores minuentur.
Primum igitur persuadendum est laboranti, vt decumbat, & in lecto quiescat, idque
maxime vbi febres simul adsunt. Deinde remedia febribus intermittentibus adhiben-
da. Maximum vero hic fuerit lactis praesertim asinini, aut caprili, paucis ad recto melle
potus, neq; post vllum aliud remedium secundo loco id habendum. Nam & asperitates
lenit, & vlcerationes eluit, malumque extergit. Reliqua vero victus ratio talis sit, qua-
lis ea quae in renum exulceratione adhibetur, per medicamenta etiam aegrum consola-
ri oportet, ne vrina acris generetur, quae mordeat & irritet vlcera. Et si quidem cum
phlegmone exulceratio consistat, cataplasmata ex lini semine, & foenugraeco, aliaque
quae supra in capite *de vesica & phlegmone* dicta sunt, apta erunt. In hunc usum in vesicam;
Paulo auctore, mulsio dilutissima infundenda est, vel lac cum paulo mellis, aut cum cucu-
meris semine, seu candido ouiliquore, tum pompholyge. Porro si exulceratio pascen-
do serpat, subadstringentia extrinsecus imponenda sunt medicamenta, atque haec qui-
dem calida, vt scilicet ob calorem partes circum dolitantes leniendo iuuent, ob pote-
statem vero ipsorum vicinos locos exulcerationem depascere prohibeant. Sunt autem
adstringentia medicamenta, *galla, malicorium, alumen, acacia, hypocisthis, & similia. saepe antea
& alibi nobis commemorata.* Utendum etiam iis, quae per catheterem infunduntur medi-
camentis. Infundendum autem exulceratis, atq; adeo exasperatis locis lac recens mul-
ctum, aut optimum rosaceum tepidum. Si vero nihil horum adsit, aqua dulcissima tepi-
da assidue infundenda, mordacitatis potissimum tempore instante. Per sedem quoq;
prisanæ succus, aut decoctum ex *semine lini, cucumeris decorticati, foenugraeci, malua, aut lac
cum rosaceo infundendum.* Porro vbi clysterem adhibere vis, ei qui vesicam habeat affe-
ctam, non supinum ipsum decumbere oportet: non enim permittit vesica infusum in-
tra transire, vt pote recto intestino incumbens: verum in genua prouum reclinare homi-
nem oportet: atq; ita infusum adhibere. In hac enim sitis figura vesica secedit, & inte-
stinum laxat quo infusum assumere queat. Frequenter autem & in aquam calidam de-
spondeat aeger, & in decocta relaxantia: nam haec dolores leniunt. Atqui vbi vlceram iam pa-
scendo serpunt, per catheterem in vesicam iniicienda sunt, quae depastionem sistere
possunt: vt sunt *acacia, hypocisthis, terra lemnia, bolus armenius, & alia paulo ante commemorata.*
Quod si vero sordida sint vlcera, medicamenta infundenda sunt, quae expurgandi & abster-
gendi facultatem obtinent: velut est *mulsio dilutissima, vel lac cum paululo mellis, vel cum cu-
cumeris seminis decorticato.* Si vero acrimonia consequatur, & mordacitas, lac recens mul-
ctum cum optimo amylo infundatur, aut Pompholyx pluribus aquis elota & exsiccata,
atq; subinde cum lacte diluta. Cum vero exurgata fuerint vlcera iuuare oportet vt ad cic-
atricem perducantur, atq; id per in se ipsas adstringentes, & eiusdem facultatis emplastra, fomen-
ta, & irrigationes. Ceterum si multo tempore exulceratio duret, quemadmodum magna ex
parte accidit, tunc sane & exacerbationes, & interualla, siue remissiones aegros appre-
hendunt. Quare in exacerbationibus quidem cataplasmata & irrigationes leniendi vim
habentia admoveantur. Remissionis vero tempore, iis quae malum destruere possunt
utendum. Pestini itaq; rubefacientia ac sinapismi imponantur, ac victus ratione viribus
reparandis idonea eger vtatur. Quod si non mansuescat vitium, crustas circa pubem in-
figere oportet, aut per medicamenta, aut per ferrum, finireq; vt multo tempore vlce-
ra se per effluxionem expurgent. Non inepte vero medicamenta dolorem levantia in
potu exhibueris, si vehementes insistent dolores. In hunc sane usum, praeter cetera quae alibi
produimus, conueniunt pastilli de halicacabo cum opio. Plurimum etiam exulceratio-
nis dolorem mitigat *semen cucumeris, malua, papaueris albi, tragacantha, amyllum, nuxes pineae,
& amygdala.* Potest itaq; hoc medicamentum exhiberi, quod accipit: *Sachari violacei, vni-
cias tres: Seminis malua, drach. duas. Quatuor seminum frigidorum maiorum, sing. drachmam v-
nam. Glycyrrhizae, drach. unam & dimidiam. Gummi, scrup. duos. Boli armenii, drach. dimi-
diam. Pastillorum e terra lemnia, drach. unam. Cum serapio & glycyrrhiza unitatem coeant.* De eo
quotidie in aurora exhibeatur quantitas nucis auellanae. Porro in vesicam quoque iniici-
enda, quae dolores leuant, & exulcerationem sanant medicamenta.

De stillicidio vrina. CAP. XLV.

- A** *Στεργνεία* Græcis, *stillicidium vrina* Latinis dicitur: & nihil aliud est, quam *vbi paulatim* *Strangu-*
& guttatim vrina destillat, atque assiduam ad mingendum irritationem facit. Accidit pro- *ria.*
 pter vrinæ acrimoniam, vel exulcerationem vesicæ, vel abscessum iecoris aut renum, *Causæ.*
 qui ruptus, pure ad vesicam translato, propter acrimoniam eiusdem, assiduam ad min-
 gendum irritationem inducit. Porro acrimoniam esse causam iudicabis, si vrinæ bilio- *Signa.*
 siores sint, totusque corporis habitus, vel etiam reliquæ notæ, bilem testantur, & mor-
 dacitas circa vesicam contingat. Vesicæ autem exulcerationem, perinde atque renum
 & iecoris abscessum ex notis in superioribus commemoratis cognoscas. Si itaque ob *Curatio.*
 acrimoniam vrinæ stillicidium accidat, tum sane exsuperantem vitiosum humorem
 quam celerrime purgare oportet. In quem usum præter ea, quæ iam sæpe dicta sunt, mi-
 rifice confert serum lactis cum calia fistulari, aut aliud medicamentum, quod bilem e-
 ducit. Humore bilioso vacuato, cibis contemperantibus, & acrimoniam obtundenti- *Vitæ.*
 bus utendum: ut est *ptisana cremor, malua, lactuca, portulaca, viola, cucumeris ac melonis semina,*
& eiusmodi, nempe aqua hordei, aut palmularum, siue radicis glycyrrhizæ decocto. Ab omnibus
 autem acribus & falsis omnino abstinendum, vino præterea, exercitiis, ira, & tarda co-
 mestione: hæc enim omnia bilem in corpore acervant. Piscibus utendum saxatilibus,
 & balneo aquæ dulcis, quod mirifice humores vitiosos contemperare solet. In poru
 plurima aqua dulcis calida exhibenda, aut decoctum hordei, cum serapiis violaceo &
 rosaceo. Vinum vero, ut dictum est, non præbendum, nisi dulcius, & dilutum. Opti-
 mum est etiam ipsum lac calidum potatum. In summa, quod ad vitæ attinet ratio-
 nem, utendum cibis humectantibus, ac aluum emollientibus iusculis. Oleribus igitur
 lactuca, buglossa, malua, & portulaca vescendum. Ceterum æger assidue ad mictionem
 cogendus. Si enim acritercrementum diutius in vesica moretur, partes ipsas erodit, &
 exulcerat. Quinetiam ad obtundendam humorum acrimoniam medicamentum,
 quod in fine capituli præcedentis descripsimus, porrigendum. In eundem usum præ-
 bendum decoctum *glycyrrhizæ, cum serapio violaceo, nenupharino, & intybaceo, aut pulvis ille*
qui habet: Seminum melonis excorticati, citruli, cucumeris, sing. drach. tres. Seminum cucurbitæ, *Pulvis.*
portulacæ, lactucæ, singul. drach. duas. Rosarum purpurearum, drach. unam. Succus glycyrrhizæ, glan-
dium, utriusque drach. unam & dimidiam. Terantur singula, & fiat pulvis tenuissimus, de
 quo detur quotidie pondus *drach. unius & dimidiæ* in aurora, ex serapio & glycyrrhiza,
 aut zulapio violaceo, aut rosaceo. Supra modum etiam conducit terebinthina resina, *Terebin-*
 lota in aqua stillatitia rosacea, aut intybi, nucis ponticæ magnitudine, aliquando dua- *thina res-*
 rum triumue accepta. Hæc enim, ut testatur Galenus lib. 5. de tuenda sanitate, non solum al- *na.*
 uum citra noxam soluit, atque adeo acres humores ab vrinariis meatibus auertit, ve-
 rum etiam viscera, renes potissimum, abstergit. Et fuerunt qui huius tantum usu sanita-
 tem recuperant. Non parum etiam prosunt clysteres ex decocto hordei, maluæ, viola-
 rum, altheæ, foliorum salicis, nymphææ, & aliis supra commemoratis parati, adiectis ca- *Clysteres.*
 sia fistulari, saccharo, & oleis violaceo & rosaceo. Quod si verò acrimonia adhuc augea-
 tur, etiam per colem lac ipsum cum amylo in vesicam iniiciendum. In eum etiam usum
 decoctum papaueris albi iniicere oportet. Extrinsecus pubes oleis, violaceo, nymphææ,
 adiecta succi semperuiui exigua quantitate inungenda. Si vero stillicidium vrinæ ob
 vesicæ exulcerationem, aut aliam corporis partem male affectam, & se per vrinam ex-
 purgantem accidat, manifestum est illis priorem curam deberi, sicut tamen ut præsens
 malum haud negligatur. Curationes autem vniuscuiusque partis ex propriis locis ac ca-
 pitibus studiosis petendæ erunt.

De difficultate vrina. CAP. XLVI.

- Δ** *Τροχία* Græcis, *vrina difficultas* Latinis appellatur. Et est vitium, in quo vrina ægre & *Dysuria.*
 & difficulter excernitur. Fit ob vesicæ imbecillitatem, atque adeo frigidam eius- *Causæ.*
 dem intemperiem, quæ actionem eius lædit. Interdum etiam propter pituitosos atque
 adeo crassos humores vesicæ ceruicem obstruentes accidit. Frigidam intemperiem, si *Signa.*
 a causa extrinseca facta est, ex ægri sermonibus cognoscere oportet, & vrinæ tenuitate
 & albore. At si præter alborem etiam crassities in vrina appareat, pituitosus humor cén-
 sendus est qui vesicæ ceruicem, ut dictum est, obstruxit. Frigida intemperies per ea, quæ *Curatio*
 calefaciunt curatur. Cibis itaque calefacientibus utendū, vino quoque calido, & odora- *frigida*
 riis. *intempe-*
riæ.

mentis condito. Medicamentis præterea urinam cientibus, ut est *pastinaca probe cocta, fa- A*
niculum, apium, asparagus, hyppocelinum, & similia. Urinam etiam commodè cient cancri,
 & herinacci terreni. Carnem enim illorum exsiccare oportet, & drachmæ pondus in
 potu accipere. Aromatum deniq; decocta in potu exhibenda, aut antidota ex iis confe-
 cta, atque adeo ab illis denominata. Præter alia vero summe conferunt antidotus ex a-
 niso, diacalaminthes, dialachæ, & diacurcume. Theriaca quoque in potu data mirifice
 conducit. Extrinsecus pectinem oleis calidis, *rutaceo, nimirum, anethino, irino, liliaceo, scor-*
Fomenta. *pionum, & de castoreo fovere oportet.* Admouenda etiam fomenta, & sacculi ex *chamælo,*
abrotono, betonica, artemisia, ruta, calamintha, sabina, & similibus herbis compositi. Aegrum et-
 iam oportet in prædictarum herbarum decoctum desidere, acimum ventrem conte-
 gere, & calefacere. Interdum etiam proderit per sedem earundem herbarum decoctum, **B**
 oleis admixtis calidis infundere. Si vero frigidus & pituitosus humor difficultatem uri-
 næ fecerit, tunc oxymelite vtendum erit, & decoctis hyssopi, pulegii, origani, thymi, &
 similibus supra sæpe commemoratorum. Item vsus sit quoque fomentorum, irrigatio-
 num, & sacculorum calidorum, de quibus paulo ante, & in præcedentibus capitibus,
 diximus. Proderit etiam in cacochymia totius corporis, pituitam purgantia exhibere
 medicamenta. Præterea siue crassus humor, siue calculus, siue grumos, siue aliud eius
 generis obstruens urinæ transitum impediatur, catheterem indere ex vsu est, nisi particu-
 lar, quod supra etiam monuimus, phlegmone impediatur.

De suppressione urine. C. A. P. XLVII.

Ischuria. **1. Causa.** *Ἰσχυρία Græcis, suppressio urine Latinis,* vitium est, in quo acri in totum urina supprimitur, ac **C**
 cohibetur. Accidit hæc interdum propter vesicæ imbecillitatem, ea quæ in ipsa conti-
 nentur arte complecti ac exprimere nequeuntis. Interdum etiam obstructo inferiori
 eius meatu, aut a crassis humoribus, aut lapide impacto. Nonnunquam vero superueni-
 re solet vel a phlegmone, vel scyrrho, vel alio quopiam tumore præter naturam, angu-
 stiores reddente meatum, vel etiam omnino obstruente. Quandoq; etiam ob carun-
 culam, aut callum in meatu natum. Sanguis quoque in grumos concretus in vesica, sup-
 pressæ urinæ causa existit. Pus item per ipsam vesicam a renibus, aut iocinore, aut alia
 quapiam superiori parte excretum, urinæ suppressionem efficit, perinde atque humor,
 crassus atque lentus. Accidit etiam interdum propter obtusum vesicæ sensum, ut
 non reddatur urina, citra tamen expultricis facultatis læsionem, ubi scilicet proprii **D**
 eius nervi patiuntur. Sic Galenus cuidam, torpente ob affectos nervos vesicæ sensu, sup-
 pressam fuisse urinam tradit. Quum enim inter dormiendum non sentiret homo vesicam
 impleri, ipsa extensa, nihil excernere potuit. Sic sanis etiam quibusdam accidit, aut
 urgentibus negotiis, vel in concionibus, vel senatu, vel foro, vel conuiuio: rum enim re-
 tenta longo tempore urina, extenditur vesica, atque urina cohibetur, contractrice fa-
 cultate læsa propter immoderatam tensionem. Imo quantum ipsius vesicæ amplitudo
 repleta circumtenditur, tanto angustior seipso fit meatus. Quæ omnia fusius prosequi-
 tur Galenus *lib. 1. de locis affectis, cap. 1. & lib. 6. cap. 4.* Ceterum si propter vesicæ imbecillita-
 tem sit urinæ suppressio, ex iis quæ frigidam eiusdem intemperiem notis monstrant, co-
 gnoscitur. Si a crassis humoribus ex victus ratione quæ præcessit, deprehenditur. Siqui- **E**
 dem in otio educatus multis cibis, qui crassos & lentos humores generare possunt, vsus
 est. Si a lapide, ex notis quæ supra in peculiari eius capite dictæ sunt, agnoscendum. Si a
 phlegmone, aut alio tumore, dolore, febre, ac visu dignoscitur. Vbi ob carunculam ali-
 quam, aut callum suppressio urinæ orta fuerit, ex præcedentibus vlcus notis, & ex eo
 quod trajecto cathetere urina vacuatur, intelligi potest. Immissus etiam catheter in ea
 videlicet meatus parte, ubi antea vlcus esse coniiciebatur, dolorem mouet, fractaque
 sub cathetere carne sequuntur cum urinæ excretionem & cruor & carnis fragmenta. Si
 grumi obturationem fecerint, sanguinis præcessit excretio & effluxio. Vbi vero pus ob-
 struxit, ex præcedentium notitia scire licebit. Nam vel vesica, vel renes antea vitio ali-
 quo laborauerunt, per quod tale tantumque pus colligi potuerit: aut in parte aliqua re- **F**
 nibus superiore fuit abscessus, quo erupto pus in renes, & subinde in vesicam transum-
 tum est. Reliquæ causæ e sermonibus ægrotantis possunt cognosci. Curandi ratio pro
 causarum diuersitate variatur. Si enim propter vesicæ imbecillitatem urinæ suppres-
 sio contingat, calefacientia, ut in ea præcedenti est dictum, adhibenda erunt. Omnino e-
 nim fri-

Curatio.
 Si propter
 vesicæ im-
 becillita-
 tem.

A nim frigida intemperies, quæ actionem vesicæ deicit, amouenda. Si autem a crassis & lentis humoribus vrinæ retentio oriatur, fomentis, iniectionibus ac cataplasmatibus ex herbis calidis & incidendi facultate præditis compositis, similique victus ratione curanda erit. Præter ea autem quæ in capite præcedenti de vrinæ difficultate commemorata sunt, ad vitii amolitionem vnice confert hoc vnguentum, quod habet: *Oleorum scorpionis, nardini, liliacei, sing. drach. tres. Sagapeni, bdellii, opopanacis, sing. scrup. duos. Pinguetinis ansegi, anatis, vtriusq. drach. dimidiam. Radicis helenii, scrup. duos. Pulegii, calaminthe vtriusque drach. dimidiam. Dissolutis gummi in vino, cum cera quod satis est, fiat vnguentum.* Vesicæ etiam iniiciendum per syringam oleum scorpionum, aut liliaceum, aut aliud quod crassos humores dissoluere ac incidere potest. Si a lapide aut grumis suppressa vrina fuerit, curatio ex propriis capitibus petenda erit. Lapis enim qui meatum vrinarium obstruit, eloco mouendus, quemadmodum dictum est cap. 41. huius libri. Grumi vero dissoluedi, vt dictum est, cap. 42. Si propter phlegmonem vel alium tumorem præter naturam vrina supprimitur, curatio itidem ex propriis petenda capitibus erit. Quod si ob carunculam aut callum retenta vrina fuerit, balnea, & alia remedia relaxantia, ac vrinæ fistulam dilatantia admoveantur, quorum formulas ex capite de calculo renum petantur. Quod si ita non procedat, ad catheterum vsum confugiendum, perq; hoc ipsum instrumentum immissum vrinæ prolestandæ. Si propter obtusum vesicæ sensum vrina supprimitur, irritando admonere ac excitare eius actionem oportet, & per iniectiones, fomenta, & alia calida medicamenta, quæ torporem eius auferre possunt succurrendum. Vitanda tamen sunt vnice ea, quæ vrinam mouent, ne scilicet copia eius vesica distendatur, atq; adeo contractrix eius facultas lædatur. Nitro præterea, aut pediculo viuo, vrinario meatui imposito, aut alio quod excretoriam vesicæ facultatem irritare potest, vrina prolestanda. Excretoria etiam facultate affecta, Galeno lib. 1. de affectis locis, cap. 1. teste, æger sic figurandus, vt decliuus sit ceruicis vesicæ positus, ac manibus supra pubem admotis, vrina sensim, comprimendo tumorem præter naturam, expellenda. In sanis autem, quum ob negotiorum importunitatem vrina diutius retenta vesicam imbecillam ac debilem reddiderit, auxiliari ipsi oportet ambabus manibus supra pubem, vt iam comprehensum est, admotis, & vrina sensim ac paulatim exprimenda.

De exulceratione pudendi. CAP. XLVIII.

Naturalium ac pudendorum vlcera citra phlegmonem oborta, tam externa, quam interna medicamentis indigent, quæ vehementer & citra morsum resiccant, quod partes illæ corporis sint humidiores, & excrementis per eas expurgandis parata: cuiusmodi sunt charta combusta, anethum, aridum vsum, & aloë arida in puluerem redacta, quo sane remedio vix aliud præsentius reperies. Radix etiam pistolochia, quam vulgus herbariorum rotundam appellat aristolochiam, præsens exulceratis pudendi remedium adfert. Porro inter composita medicamenta hoc est efficacissimum, quod habet: *Aloës iocinoraria, drach. duas. Galle, drach. vnā & dimidiam. Sanguinis draconis, boli armenii, pompholygis, sing. drach. vnā. Radicis pistolochie, drach. dimidiam. Myrrha, scrup. vnum. Gummi arabici vocati, drach. duas. Alaminis vsti, drach. dimidiam.* Contritis omnibus fiat pulvis subtilis, qui partibus exulceratis inspergatur. Quod si humidiora ac sordidiora vlcera fuerint, primum dilutione mulsæ, mox lacte caprino abstergantur. Quo peracto, puluere etiam dicto vtendum, aut lapide hamatite, aut malicorio, aut lemnia terra, in puluerem redactis. Si simul phlegmone accesserit, hæc primum remouenda erit, linteis in aqua stillatis rosarum purpurearum, aut solani, aut aizoi, aut portulacæ, adiecto oui candido, madefactis, & loco laboranti admotis. Reliqua remedia ex aliis petenda capitibus erunt.

De Priapismo. CAP. XLIX.

Priapismus, auctore Galeno libro 6. de affectis locis, capite 6. & 13. meden. method. est, quum genitale membrum & in longitudine, & in latitudine augetur, nullo stimulante ad libidinem aut desiderio, aut acquisito calore. Quod si pudendi accidat palpitatio, tunc Satyriasis dicitur. Appellationem autem hoc vitium accepit a Priapo, quem suapte naturæ huiusmodi pudendum habentem finxerunt & pinxerunt homines impii. Fichoc vitium, vt eodem in loco testatur Galenus, vel ob arteriarum ora immodice patentia, vel vaporosum spiritum in fistuloso neruo ortum. Crebrius tamen ora arteriarum patentia sequitur. Quippe facilius est hæc distendi, quam statuosum spiritum in neruo

fistuloso generari. Nam calefactis lumbis, par est ut arteriæ calidiores reddantur, & magis etiam pateant ipsorum ora: quamobrem non exiguum tunc spiritus essentiam in fistulosum neruum effundunt, qui paulatim impletus colem extendit, ita ut tota ipsius essentia in fistuloso neruo consistere videatur. Aliquando vitium hoc accidit iis, qui longo tempore præter consuetudinem a concubitu abstinēt: atque hoc potissimum iis euenit qui plurimo sanguine abundant, & nō student ut multa exercitatione sanguinis abundantia dissipetur, ut *copiosus loco iam citato Galenus ostendit*. Qui hoc vitio laborant, perinde atque ii qui distensione neruorum correpti sunt dolent: inflatum enim & distentum pudendum conuulsionis modo afficitur. Sic conuulsi celeriter pereunt, nisi confestim eis auxilium feratur. Quum vero moriuntur, ventre inflantur, & frigidum excludant. Curandi ratio pro causarum diuersitate variatur. Si enim propter patientia arteriarum ora, atque adeo earundem caliditatem vitium accidat, protinus vena secta sanguinem mittere conuenit. Quod etiam faciendum erit, ubi vitium hoc comprehendit eos qui sanguine abundant, & longo tempore præter consuetudinem Venere abstinēt. Secunda vero est vena nigra, quam mediam etiam vocant, non autem poplitis: quod hæc ad pudendum sanguis fluxum magis deducat: illa vero ab eodem magis sursum trahat. Utendum quoque victu tenui, & a vino abstinendum. Cibum autem exhiberi frumentaceum paucum, atque omnino nihil inflantem, & sitim indicere, potuq; aquæ uti conuenit. Exercitium, frictioq; spiritibus recte discutiendis adhibentur. Vacationem etiam per vomitum moliri expedit. Aluum autem obturatam & adstrictam clysteri non admodum acri, qualis est, qui ex *beta, malua, & mercurialis decocto fit*, submollire oportet. A purgantibus autem medicamentis in totum abstinendum, ne deorsum trahantur humores. Eadem de causa cauenda quoq; quæ vrinx ciendæ facultatem habent. In summa annitendum, ut ea medicamenta adhibeantur, quæ redundantiam, vacuare, & sursum trahere, atq; adeo a pudendo auertere humores possunt. Quod si diutius vitium durat ac prorogatur, cucurbitulæ cum scarificatione affigendæ sunt. Si vero plenitudo adfuerit, hirudines adhibendæ. Lumbis vero quæ euidenter refrigerant imponenda, ut est *solanum, portulaca, hyosciamus, & semperuium*. Necessario etiam pudendū, & intercapedo inter anum & pudendum ex aliquo succo & liquore herbarum leniter refrigerante illinitur. Optime autē facit in ipsis ceratū ex rosaceo optimo apparatus, & frigida aqua sæpe elutum, si tum pudendo, tum lumbis imponatur. Eius autem cerati, D quod liquidum vocatur, constructionem docet Galenus *lib. 1. de simp. med. facul. cap. 6. Et lib. 10. Ther. Meth. cap. 9.* Ceratum hoc conferet, quod habet: *Cera alba decies in aqua frigida lota, quartam unam. Succus semperuini, drach. duas.* Commixta redigantur in formam cerati. Quid multa? adhibenda, atq; in potu etiam exhibenda ea medicamenta, quæ semen extinguere possunt. De quibus copiose in *cap. sequenti de profluvio seminis* dicemus. Porro supino cubitu conuiescere nociuū, at in latus decumbere ipsos ex re est. A spectaculis vero & narrationibus, ac cōmemoratione eorum, quæ ad Venerem excitāt, penitus sunt arcendi. Si vitium hoc ob vaporosum spiritum in fistuloso neruo natum accidat, ad eiusdē dissolutionem tota curatio conuertenda erit. Quare ad caput de curatione inflationis ventriculi, & coli doloris flatuosi recurrendum, illic n. remediōrū copiam reperire est. E

De seminis profluvio. C A P. L.

Gonorrhoia. *Γονόρροια* Græcis *seminis profluvium* Latinis dicitur. Vox hæc composita est, ex *γονή*, quæ semen significat, & *ῥοιή*, quod est fluere. Est enim seminis præter voluntatem, citraque pudendi tentiginem excretio. Fit propter retentricis in vasis seminariis facultatis imbecillitatem, aut ob aliud vitium, quod seminariorum vasorum partes eodem modo, quo expultrix secundum naturam facultas mouet: veluti in comitialibus, & aliis violentioribus conuulsionibus cōtingit. Oboritur autem aliquando etiam ex seminariorum vasorum fluxione. Semen quod profluit aquosum est, tenue, citra coeundi appetētiam, & ut plurimum quidem, citra sensum, quandoq; vero cum voluptate quadam promanat. Corripitur hoc vitio affectis sensum vniuersum corpus, ac gracilescit, præsertim circa lumbos. Consequitur & debilitas multa, non ob seminis multitudinē, sed ob locorū principatum. Et si pudendo non intento euenierit, retentricis in seminariis vasis imbecillitate sequitur. Si vero intento pudendo contigerit, cōuulsioni quodammodo simile malum erit. Non viris tantum, sed & foeminis vitium hoc accidit, & in foeminis quidem ægre tollitur.

- A** tollitur. Curandi ratio communis est cum ea, quæ in omni fluxione adhibetur. Primum Curatio.
igitur in quiete, paucio cibo, atq; aquæ potu ægros adseruare oportet. Deinde etiam lû-
bos & pubem contegere lanis vino & rosaceo, aut melino madefactis. Neq; vero ineptæ
sunt spongiæ posca imbutæ. Sequentibus vero diebus cataplasmatibus, emplastris & vn-
guentis ex *palmis, cotoneis, acacia, hypocistide, rhoe & similibus*, supra sæpe commemoratis,
utendum est. Inessibus quoque adstringentibus ex *rubi, plantaginis, myrti*, & id genus
aliorum decoctis paratis uti oportet. Decoquenda vero prædicta in vino austero, aut et-
iam aqua. Ciborum qui ægre corrumpuntur, & difficulter permutantur, & resiccandi-
vim habent vsus sit. Vitent summo studio alimenta flatulenta. Dandum etiam cum ci-
bis ac potu, *agni seu viticis, & cannabis semen, præsertim tostum: ruta item semen & folia, lactuca*
B *semen & caules, ac nymphaeæ radix*. In potu vero quotidie pro aqua communi, aqua in qua
ferrum sæpe extinctum est, præbeatur. In summa, acrium rerum vsus, & multi vini po-
tum, & olerum exhibitionem vitare oportet, victusque ratio vniuersa resiccatoria & ad-
stringens constituenda est. Ea quoq; medicamenta, quæ semen extinguunt, propinan- Semen
extingue-
tia.
da, ut est *agni semen tostum & perfritum. Folia item & eius flores, Venerem cohibere creduntur,*
non comesta tantum, sed & in potu sumta, & substrata. Portulaca comesta, & lactuca semen potatum,
& nymphaeæ radix & semen in cibo accepta, semen refrigerando extinguunt. Ruta vero comesta
calore suo semen corrumpit. De quibus Galenus lib. 5. de simp. med. facul. cap. 23. Calamin-
tham autem assidue edentes, generandi potentiam amittunt: id quod similiter & violæ
albæ semen facit. Ceterum aqua fabrorum ferrariorum, in qua ferrum sæpe extinctum
C est, assidue potata, citra molestiam imminuit semen. Porro etiam commemoratis me-
dicamentis simplicibus varia componi remedia possunt, hæc in primis tritura, quæ ac- Tritura.
cipit: *Specierum diacumini, diacalaminthes, utriusq; drach. unam & dimidiam. Seminis agni, ru-
ta, utriusq; drach. unam. Calaminthæ, drach. duas. Seminis lactuca, portulaca, utriusq; drach. v-
nam. Sacchari æquale omnium pondus.* Misceantur singula, & fiat tritura, de qua *drach. una, aut
drach. una, & dimidia* in vino austero diluto exhibeatur. Optimum quoq; esse censetur, Lamina
plumbea.
laminam plumbeam lumbis supponere: multum enim refrigerare consuevit. In his ve-
ro qui plumbi duritiem ferre non possunt, consulere oportet, ut ex prædictis paulo ante
herbis quasdam arefactas sibi substernant. Ad quem vsus præter ceteras viticis folia, ru-
ta, calamintha, & rosa ipsa commendatur. Pro sunt enim hæc, absque id, quod renes læ-
D dant. Vehementes namq; refrigerationes eorum, quæ lumbis subduntur, renes iniuria
afficiunt. Præterea stratum ipsum non valde molle sit. Decubitus ut plurimum in latus fiat,
curvata forma decubitus supina, ne lumborum arteriæ inde calefiant. Post prima autē
morbi tempora exercitiis egrum committere oportet, quib. totum corpus, & præsertim par-
tes laborantes, confirmentur. Bonum etiam fuerit, si nihil aliud impediatur, ad frigidam
clauationem defugere, quæ omnem morbum ex fluxione ortum abigere consuevit: id-
que maxime, si medicamentaria aliqua qualitate aqua sit prædita. Conuenit item per
intervalla quædam iis, quæ rubefacere, eaq; quæ in profundo sunt ad superficiem trans-
ferre possunt, uti. Omnem insuper de rebus Veneriis cogitationem excludere oportet.
- De iis qui re Venerea uti non possunt. CAP. LI.*
- E** **Q**ui mariti existunt, & re Venerea uti, ac debitum vxoribus exigentibus persolvere Causa
cupiunt, ignaua vero & impotentia membra, propter frigidam qua laborant inté-
periem, aut aliam ob causam pudendi resolutionem efficientem, obtinent, ii infernas
partes exercere debent: & cibis calefacientibus, infantibus, nec non seminis gignendi Vicius.
facultate præditis, bonumq; succum generantibus, carnibus nimirum gallinarum, ca-
porum, perdicum, phasianorum, iuuenum columbarum, auicularum montanarum,
sturnorum, passerum maxime gallorum testiculis, & similibus uti. Edulia vero non so-
lum bene nutrientia, sed etiam flatuosa ipsis cōueniunt, ut est cicer, faba, bulbi, porrum,
pastinacæ radix & semen, nuces pineæ, amygdalæ dulces, rapi semen, & id genus alia.
Qua item perdicis, ad Venerem ignauos excitant. Vinum bibant odoratum, rubeum, &
F ab aquæ potu abstineant. Dormiant in mollibus lectis, legantq; quæ ad coitum cohor-
tantur, aut lectionibus assideant. Naturalia continuo ex oleis, vnguentis, aliisq; calefaci-
entibus medicamentis confricent. In quem vsus hoc vnguento utendum, quod habet:
Olei liliacei, unc. unam & dimidiam. Olei e castorio, unc. dimidiam. Piperis, nigellæ, pyrethri, singul. Vnguen-
tum.
serup. unum. Myrrha, drach. dimidiam. Euphorbiæ, grana tria. Cera, quod satis est, fiat vnguentum,

Simplicia
medica-
menta co-
citantia.

Antido-
tum liqui-
dum.

Ceterum medicamentis etiam, quæ seminis copiam efficiunt, ac calefacere possunt, utendum. Inter simplicia hæc potissimum coitum concitant, *eruca, sinapi, nasturtium hortense, urtica, & lini semen, ari, radix, piper, satyrium, orminum, anisum, scylla, orchis*: cuius quidam maior bulbus cum lacte potatus tentiginem cit, minor vero cum aqua potatus tentiginem remittit: feniculum & anethum. Testes vulpis sicci triti bibiti, innocuam & minime vanam membri tentiginem faciunt. Partes etiam scinci renes amplectentes, ad tentiginem pudendorum excitandam bibuntur. Præterea pudendum cerui aridum vrito, & de eo pondus drachmæ vnius ex vino meraciore præbe. Inter composita hoc medicamento uti licebit, quod accipit: *Antidoti dianthon, pleres archon, diagalange, singul. drach. tres. Diasatyrium, drach. sex. Nucum pinearum, amygdalarum dulcium, pistaciorum, singul. drach. duas. Satyrii, drach. unam. Radicis ari, scrup. unum. Seminum eruca, urtica, nasturtii hortensis, singul. drach. unam & dimidiam. Scinci, drach. dimidiam. Nuclei Indica, drach. unam. Piperis longi, zingiberis, utriusq; drach. unam & dimidiam. Scobis pudendi ceruini, scrup. unum. Scirpi & mentha, & sachari quantum ad excipiendum satis est, fiat antidotum liquidum, de quo ante coenam, aut ieiunis per se, vel ex vino detur pondus drachmæ vnius, aut duarum.*

De Ramice. C A P. LII.

Cele, Ra-
mex. Her-
nia.

ὀπισθεν
ῥαμικῆς
ῥαμικῆς
ῥαμικῆς

ῥαμικῆς
ῥαμικῆς
ῥαμικῆς

ῥαμικῆς
ῥαμικῆς
ῥαμικῆς

ῥαμικῆς
ῥαμικῆς
ῥαμικῆς

ῥαμικῆς
ῥαμικῆς
ῥαμικῆς

ῥαμικῆς
ῥαμικῆς
ῥαμικῆς

ῥαμικῆς
ῥαμικῆς
ῥαμικῆς

ῥαμικῆς
ῥαμικῆς
ῥαμικῆς

ῥαμικῆς
ῥαμικῆς
ῥαμικῆς

ῥαμικῆς
ῥαμικῆς
ῥαμικῆς

ῥαμικῆς
ῥαμικῆς
ῥαμικῆς

ῥαμικῆς
ῥαμικῆς
ῥαμικῆς

ῥαμικῆς
ῥαμικῆς
ῥαμικῆς

ῥαμικῆς
ῥαμικῆς
ῥαμικῆς

ῥαμικῆς
ῥαμικῆς
ῥαμικῆς

ῥαμικῆς
ῥαμικῆς
ῥαμικῆς

ῥαμικῆς
ῥαμικῆς
ῥαμικῆς

ῥαμικῆς
ῥαμικῆς
ῥαμικῆς

ῥαμικῆς
ῥαμικῆς
ῥαμικῆς

ῥαμικῆς
ῥαμικῆς
ῥαμικῆς

ῥαμικῆς
ῥαμικῆς
ῥαμικῆς

ῥαμικῆς
ῥαμικῆς
ῥαμικῆς

ῥαμικῆς
ῥαμικῆς
ῥαμικῆς

ῥαμικῆς
ῥαμικῆς
ῥαμικῆς

Rήλη Græcis, *ramex* & *hernia* Latinis, *ruptura* barbaris medicinae scriptoribus dicitur, variisque fit modis, ac varias propter adiectiones accipit appellationes. Si enim peritonæo rupto intestina in scrotum deoluuntur, ῥαμικῆς Græcis, *ramex* autem *intestinarum* Latinis vocatur. Quando vero intestina supra inguinibus hærent, ῥαμικῆς Græci, *ramicem* autem *inguinis* Latini nominant. Quod si ociosus & aquosus aliquis humor in parte aliqua membranarum scrotum implicantium colligitur, ῥαμικῆς Græce, *ramex aquosus* Latine dicitur. Quæ vero intra testium tunicas dura increscit caro, σαρκοῦς Græcis, *carnosus ramex* Latinis nūcupatur. Quid multa? ramicis genera nomenclaturam semper a rebus opplentibus accipiunt. Proinde si omentum in scrotum descendat, ῥαμικῆς, hoc est, *ramex omenti*, vocatur. Si intestinum quoque delabatur, Græce ῥαμικῆς, id est, *amenti intestiniq; ramex* nominatur. Ita ubi venæ, quæ testiculos nutriunt, varicum more dilatantur, & ultra modum repletæ glomerantur, Græci vitium hoc ῥαμικῆς, hoc est, *varicosum ramicem*, appellant. Ramices intestinorum & inguinis fiunt, vel quod peritonæum plus æquo extenditur, vel quod rumpitur. Vtrunq; vero ex violenta quadam occasione præcedente, nempe ictu, aut saltu, aut clamore, aut immensæ molis sublatione accidit. Aquosus vero *ramex*, quandoque ex occulta, quandoque ex manifesta contingit causa. Ex occulta quidem, quando ad auctis vas in scroto contextis, aquosus humor propulsus, & sanguini permixtus ad eas partes decubuerit. Ex evidenti autem, quum propter ictum collisus aut fractis vas, sanguis subinde alimenti ratione defluens, in aquosam serosamque substantiam mutatur. Colligitur autem humor vel intra tunicam erythroidem, vel exterius inter ipsam & tunicas adiacentes: vel in peculiari tunica tanquam in quadam vesica, comprehenditur. Carnosus sane ex latente causa nascitur, testiculo fluxionem experto, induratoque, aut ex ictu, aut imperita post ramicis succissionem curatione. Reliquorum ramicum causæ ex eorundem descriptionibus patent. Notæ utriq; intestinorum nimirum & inguinis ramici, communes sunt. Conspiciunt enim in scroto aut inguine tumor est, qui in exercitiis, itinere, spiritus retentione, aliisque occasionibus maior, quam prius euadit: cōpressus tarde quidem recurrit, celeriter autem rursus deuoluitur. Peculiaria ramicis ad extensionem relati indicia sunt, quod non vniuersim, sed particulatim temporis spatio, & ob causas quaslibet intestinum deuoluatur, tumor æquabilis & profundus appareat, intestino quod deuolutum est peritonæo conficto. Ex ruptura facti ramicis signum est proprium, quod vniuersim ab initio intestinum deuoluatur, idq; ob causas violentas duntaxat: tumor immensæ magnitudinis, inæqualis, & per summa protinus in cute emineat, quod scilicet intestina extra peritonæum elabantur. Aquosi ramicis cōmunis nota est tumor dolore vacans, firmus, ac stabilis in scroto, quacunq; tandē occasione non euanesceat, sed in ijs, qui modicū continent humorem cedens: in illis qui copiosum habent, non item. Ac in quibus erythroides tunica humore distenta est, tumor rotundus paululū, & oui modo lōgiusculus apparet. His testiculus in conspectū nō venit, ut qui vndeque sit implicitus. Si extra erythroidē membrana sub darto habet, per pauca corpora sublabit, testiculusq; intra notas tactui occurrat.

- A** At si humor ex superuenienti coierit, propter contractionem ex omni parte & rotunditatem, tumor alterius testiculi imaginem exhibet. Et cum aquosus humor extiterit, tumor concolor pellucet: cum fœculentus, aut sanguineus, aut rubicundus, aut liuidus apparet. Cum vero in vtraq; scroti parte hæ apparuerint notæ, duplicem ibi ramicem cognosces. Carnosum ramicem color vbiq; sui similis cū duritia subsequitur. Si autem tumor in scirrhum coalescat, nullus nec color, nec sensus adest. Si maligni referat naturam, dolor vrget punctorius. Ceterum ramicem intestinorum & inguinum curamus hunc in modum: Ægro resupinato diductis cruribus intestina sensim reducere, atque reducta deinceps idoneis ligamentis retinere oportet. At si loca scroto aut inguini adiacentia vehementissimis doloribus cum phlegmone affligantur, torminaque & flatus superuenerint, atque adeo intestina reductioni minus obtemperent, emollientia, ac phlegmonem doloremque leuantia, & flatus dissoluentia fomenta, linimenta, balneaque adhibeantur: qualia sunt quæ ex malua, chamæmelo, anetho, seminibus lini, fœnigræci, cære, anisi, cumini, & similibus componuntur. Lana quoq; succida vino & oleo madefacta, loca doloribus exagitata foueantur. Reductis intestinis, conandum, vt eadem idoneis vinculis retineantur, impositis primum ceratis aut emplastris constrigentibus ac glutinantibus, quale est hoc, quod habet: *Picis naualis, mastiches, vtriusq; drach. tres. Thuris, drach. duas. Hypocisthidis, sarcocolla, acacia, sing. drach. vnā & dimidiā. Lapidis hamatidis, sanguinis draconis, aloes, singul. drach. duas. Boli armenii, symphitæ radicis, gallarum, malicorii, singul. drach. tres. Visci quercini, drach. vnā & dimidiā. Aristolochiæ vtriusq; drach. duas.*
- C** *Rhois, balaustiorum, vtriusque drach. vnā. Sepi hircini, drach. duas. Resina terebinthina, & cera, quod satis est. Gummi prius in aceto aut vino dissolutis formetur ceratum, quod in pelle arietis impositū alligetur, nec anted diem septimum soluat. Interea æger in lecto triginta diebus maneat, & a cibis flatuosis abstineat, vinoq; copiosiore, motu vehementi, cursu, saltu, clamore, & id genus aliis. Interea autem bibat hoc decoctum, quod accipit: *Saniculæ vtriusque, solidaginis sarracenicæ, ophioglossi, pedis leonis, eupatorii, numulariæ, singul. manipulum vnum. Polygomi, clematidis, daphnoidis, prunellæ, plantaginis maioris, singulorum manipulum dimidiū. Radicis symphyti maiusculi, bistortæ, pentaphylli, cynoglossi officinarum, vtriusq; drach. dimidiā. Radicis geranii sexti generis, drach. sex. Seminis myrti, drach. tres. Balaustiorum, drach. duas. Foliorum lauri, drach. vnā & dimidiā. Ebulliant in vino rubeo & aqua iusta quantitatis, donec tertia pars absumpta fuerit. Dein colo transfundantur, & sacchari adiectione ius decocti dulce reddatur, purificeturque, & fiat potio suavis, de qua quotidie in aurora dentur unc. quatuor. Porro annitendum vnice ne aluus indurescat. Si enim nimio conatu stercora excernere necessum fuerit, simul etiam intestina iterum prolabantur. Vtendum quoque apta & conuenienti deligatura, vt antea monuimus, idque tum præcipue, vbi occasio aut necessitas motum exigit. Ceterū ram ex aquosus per ea quæ calefaciunt, & exsiccant medicamenta curandus, e quorū numero sunt farina fabacea, lauri baccæ, lini semen, dauci, althææ, nigellæ, & id genus alia, quæ in capite de ascute, & reliquis aqua inter cutem generibus, enumerauimus. Porro chirurgicam prædictorum aliorumque omnium ramicum curandi rationē e Paulo Ægineta petent studiosi, qui eandem copiose tradidit li. 6. c. 62. & sequentibus. Nā eam iis in libris tractare nō est nostri instituti, quare ad vteri vitia p̄grediemur.**

De suppressis mensibus. C A P. LIII.

- S** Vpprimuntur mulieribus menses vel naturaliter, vel præter naturam. Si naturaliter, hinc deprehendemus potissimum, quod mulier nulla inde molestia vel totius corporis, vel vteri afficiatur. Etatis itaq; ratione plurimis menses quartodecimo anno fluere incipiunt, paucissimis ante decimum tertium, vel duodecimum, plerisq; autem post quartumdecimum erumpunt: vt plurimumq; purgatio ad duos tresue dies, pluribus ad quinque, aliis ad septem vsq; perdurat. Desinunt vero aliis anno quinquagesimo, aut quinquagesimo quinto, paucis autem ad sexagesimum vsq; extenduntur. Steriles etiam mulieres, in ytero habentes, & saltatrices, naturaliter non purgantur. Nam quicquid in eis est excrementi, exercitationis vehementia absumitur. Et vt summatim dicam, mulieres calidioris temperaturæ, validisque exercitiis vtentes, & agrestes, parum aut nihil purgantur. Nonnunquam vero menses præter naturam, ob nimiam scilicet crassitiem aut gracilitatē suppressi solent. Pingues enim reliquis magis ex sanguine sunt, minimasq; & angustas venulas habent, quique illis inest sanguis paucissimus, tere in pinguedinem

Ramicis
intestino-
rum & in-
guinum
curatio.

Ceratum.

Vitis.

Decoctū
glutians.Ramicis
aquosi
curatio.

Causa.

Quibus
naturaliter
menses
supprimuntur.Quibus
præter
naturam
menses
detinentur.

transit. Graciliores vero ob diuturnum aliquem morbum extenuatae, nihil prorsus su-
peruacui sanguinis continent. Præterea menses non profluunt, quibus sanguis vel cras-
sus, vel lentus, vel per alia loca delatus ac vacuatus fuerit, verbi gratia per nares, aut se-
dem. Aliis etiam, quod e thorace sanguinem multum eiecerint: Aliis, quod e disse-
cta vena plurimum sanguinis promanauerit, menses suppressi sunt. Sed & reliqua excre-
tionum genera idem sæpe effecerunt, ut sudoris multitudo, assidui vomitus, alui proflu-
uia, ac pustularum omne genus, quæ in cute efflorescunt. Præter causas nunc comme-
moratas non raro etiã menses detinentur propter acutos maximosq; morbos & alimen-
torum vel paucitatem, vel multitudinem. A paucis enim alimentis paululum quippiam
confestim expirat atq; exhalat: a copioso autem meatus obstruuntur, & menstruum
excretio intercipitur. Atq; eas ob causas maxime menses supprimuntur toto corpore
laborante, & affecto. Detinentur autem non minus, ubi vterus ipse peculiari vitio con-
flictatur: id quod ei accidit, interdum propter frigidam aut calidam eiusdem intempe-
riem. Nonnunquam etiam propter callum in ore vteri abortum, aut carnis excrescen-
tiam, aut pinguedinis copiam purgatio menstrua impeditur. Quibusdam etiam sta-
tim ab initio membrana quædam circa vteri collum aut orificium adnascitur, quemad-
modum iis accidit, quæ *imperforata* appellantur. Aliis cicatrices vicerum, quæ in vtero
antecefferunt, vasorum ora, a quibus sanguis in vterum ferebatur, obstruxerunt. Qui-
busdam post abortum vteri ore exulcerato, ac deinceps ad cicatricem ducta, coitio vel
compactio superuenit, quæ præterquam, quod alias omnes vteri transpirationes prohi-
bet, sanguinis etiam excretionem moratur. Curæ denique pertinaces, metus immodi-
cus, & ingens moeror, menses intercipiunt. Suppressos menses vniuersi corporis gra-
uitas, nausea, fastidium, & horridi quidam discursus, quales iis quæ cõceperunt accidunt,
consequuntur. Præterea dolores circa lumbos, fœmora, collum, sinciput, & oculorum
fundamenta existunt. Item febres continuæ, & vrina nigricantes, cum rubra quadam
sanie, perinde ac si quis aquæ, in qua nuper maceratae carnes ablutæ fuerunt, fuliginem mis-
cuisset. Nonnullis etiam vrina aut difficulter redditur, aut omnino supprimitur. Causa-
rum diuersitas partim ex habitu totius corporis, partim etiam, idq; magna ex parte, de
sermonibus ægri cognoscitur. Frigidioris tamen intemperaturæ mulieres ex iis potissi-
mum dignoscere licebit, quod somnolentiores sint, & ad omnem motum segniores, ac
colore candidiores, ac veluti plumbei coloris, vrina deniq; aquosa, & ceteris signis, quæ
iam sæpe supra dicta sunt. Pituitam quoq; assidue exscreant, interdum etiam pituitosos
humores euomunt. Calidioris autem temperaturæ indicia, iam cõprehenfis plane con-
traria sunt. Plenitudinis notæ, præter alias, quæ *ex præcedentibus capitibus* colligendæ sunt, eius-
modi potissimum esse solent, ut quæ hac ipsa laborant mulieres menstruum tempore
magis grauentur, doloresq; vehemētiore circa lumbos & pubem sentiant, venæq; illis
in tumorem insignem attollantur. Ceterum curandi ratio pro causarum diuersitate varia-
tur. Si n. frigida vteri intemperies mensium profluuium impedit, cum cõtrariis, hoc est,
calefacientibus, tum cibis, tum medicamentis, abigenda erit. Cibos itaq; calidos exhibere
oportet, vinumq; fuluū, odoratum, & antiquum. Exercitia quoq; præscribenda, & alia,
quæ corpus calefacere possunt ad mouenda, quorum aliqua paulo post subiungemus. E
Valent autem præter alia, *pulegium, thymus, calamentum, abrotonum, dictamnus, radix iridis, casia, acorus, asarū, & sauina, e quib. decocta & fomenta parari possunt.* Vinū etiam merum cali-
dum, post balneū ieiunis propinandum. Sumendis aut iis medicamentis tempora ma-
xime idonea sunt, alterum quidem cum purgationis tempus appetit, alterum post bal-
neum, fomentationem, aut inunctionem si protinus scil. biberit, ut calido adhuc & so-
luto corpori medicamentum occurrens vires suas efficacius ostendat. Quod de tempo-
ribus consilium Medici, nisi accurata diligentia obseruent, frustra nō rare in eliciendis
mensib. laborant. Porro calidiores & plurimū exercitatae mulieres, curatione quidem
haud egerēt: rectius n. & consultius foret ad integram sanitatē tuendam, eam victus ra-
tionem præscribere, a qua mulieris corpus ita desiccaretur, ut menstrua purgationis nō
indigeret, sed hoc conceptioni aduersaretur, neq; n. concipiūt, quæ non purgantur. Causa
ergo cõceptionis, & quoniam omnes fere mulieres inconsulto vitant, purgationes
sunt necessariae. Quare conuenit curationem quoq; subiicere, qua menses ob calidā in-
temperiem intercepti euocantur. Mulieres itaq; calidiores, & quæ plurimū exercitan-
tur,

Imperforata.

Signa.

Frigidioris temperaturæ.

Calidioris. Plenitudinis.

Curatio intemperiei frigida.

Tempora sumendorum medicamentorum.

Calidioris temperaturæ curatio.

- A** tur, quam maxime humectare oportet vberiore humidioresque cibo ac potu: quales ptisanæ & alicæ sorbitiones sunt, & qui e carnibus agni, hædi, ac piscibus teneras carnes habentibus, quibus altilibus, lacte: oleribus, lactuca, cucurbita, & e fructibus, ficibus recentibus parantur. Vino autem vtendum iis candido, non admodum antiquo, & diluto. Balneis quoque aquarū dulcium: & vt in pauca rem contraham, victus ratione quæ hecticis adhibetur. Porro si plenitudinis ratione, qua mulier laborat, menses detinentur, & nihil aliud prohibeat, a sanguinis missione curandi ratio auspicetur. Secunda vero vena malleoli aut poplitis, idque non ante statum mensium tempus. Neque etiam inutile erit, si cruribus cucurbitulæ affigantur. Vacuato sanguine poriones, quæ menses mouere possunt, fomentationes, balnea, inunctiones, & alia, quæ paulo post subiiciemus admoüenda. Sin plenitudo nulla fuerit, sed qui mensium profluvia morantur humores crassi ac pituitosi fuerint, initio victus ratio extenuans præscribenda, aliaque medicamenta, quæ prædictos humores incidere, & ad expulsionem faciliores efficere ac præparare possunt exhibenda, cuiusmodi est hoc decoctum, quod habet: *Radicum acori, iridis, petroselin, asparagi, sing. unc. unam. Seminum apii feniculi, rusci, anisi, dauci, ammi, urtica, singul. drach. unam. Calamintha, absynthii, utriusq. manipulum semis. Origani, abrotani, artemisia, pulegii, asari, sing. manipulum unum. Hyssopi, manipul. unum & dimidium. Cinnamomi electi, drachmam unam.* Decoquantur singula in aqua iustæ quantitatis, donec tertia pars absumpta fuerit. Dein collo transfusus, saccharo adiecto iuri decocti dulcedo concilietur, & albo oui purificetur, adiectis *serapii de calamintha, de hyssopo, & de marrubio, sing. unc. unam & dimidiam*, fiatque
- C** porio, de qua quotidie in aurora detur pondus vnciarum quatuor. Ea exhausta purgatorium aliquod sumatur medicamentum, quale est *hierapicra, diaphænicon & indi compositio, catapotia de agarico, e benedicta, aut iis similia*. A purgatione mulieres sunt exercendæ, potissimum deambulationibus, & inferiorum partium frictionibus. Præterea fomentationes & balnea ex chamæmelo, artemisia tenuifolia, mentastro, & aliis, quæ in decocto præcedenti commemorauimus parata, adhibenda. Inunctio quoque fiat hoc vnguento, quod accipit: *Oleorum liliacei, rutacei, utriusque unc. unam. Artemisia tenuifolia, pulegii, calaminthæ, singul. scrup. unum. Radicis iridis, scrup. duos. Hyssopi, origani, utriusque scrup. tres.* Cum cera quod satis est, fiat vnguentum. Post hæc medicamenta, quæ detentos menses euocant protinus, propter causam supra dictam, exhibenda: qualia sunt *myrrha, castoreum, bacca lauri, rubea tinctorum, piper, salvia, ruta, sauina, dictamnium, casia, & alia quæ paulo supra, & alibi a nobis comprehensa sunt*. Vnice autem hoc confert, quod habet: *Castorei, drach. unam. Mentastri in puluerem redacti, drach. dimidiam. Vini veteris, aut mulsæ unc. quatuor.* Misceantur singula, & a balneo propinetur calidum. Benefacit etiam decoctum pulegii, artemisiæ, rutæ, cumini, dauci, saluæ, anethi, ammi, feniculi, inulæ, & similibus. Calamintha quoq; in puluerem redacta pondere drachmarum duarum. Aut sauina pondere vnius drachmæ in vino, aut mulsæ, pota plurimum confert. Mirificè deniq; conducunt pastilli e *myrrha*. Absynthice autem vinum per totius curationis decursum bibendum. Pessis etiam in vterum demissis, necessitate ita exigente, vtendum, qualis est is qui accipit: *Triphera magna opii expertis, drach. unam. Farina, erui, nigella, rubia tinctorum, artemisia, pulegii, singul. scrup. unum & dimidium. Succus rutæ, unc. duas.* Commixtis omnibus fingatur pessus, qui cum lana vel gossipio subdatur. Et hic qui habet: *Myrrha, bdellii, styracis, singul. drach. unam. Calamintha, abrotani, absynthii, sing. drach. unam & dimidiam. Radicum acori, rubia tinctorum, utriusque drach. unam. Seminis nigella, ruta arida, baccarum lauri, sing. scrup. duos. Sauina, drach. unam. Castorei, scrup. dimidium.* Redigantur singula in puluerem subtilissimum: & cum melle, aut triphera, aut mithridatio antidoto, quod satis est excipiantur, & fiant pessi, qui mulieris pudendo inserantur. Mitiores pessi fiunt ex *anserino, vel gallinaceo adipe, saccharo rubeo, & pauco croco*, quibus parum *herba mercurialis* contusæ adicitur, aut tantundem *artemisia, vel sauina, & pulegii* quandoque. Ac si validioribus opus erit, *myrrham, bdellium, galbanum, styracem, aristolochiam, rubiam tinctorum, abrotanum, calamintham, resinam, terebinthinam, & eiusmodi* adiicienda sunt, iisdem prius contusis, ac serico linteo, aut lineo tenui ad formam digiti humani inuolutis. Metrenchyitis quoque vtendum. In quem vsum vtero infundimus olea calida, nempe *irinum, liliaceum, laurinum, & similia*. Suffitis etiam ex *styrace, galbano, thure, bdellio, radice aristolochie, artemisia, garyophyllis, cinnamomo, & similibus paratis vtendum*. Quorum formulas in libris nostris de med. comp.

Vitiolorum succorum curatio.

Decocti.

Purgatio.

Exercitia. Fomentationes.

Vnguentum.

Menses euocantia.

Medicamentum præstans.

Absynthice vinum. Pessus.

Alius.

Metrenchyitis. Suffitus.

monstrauimus. Euaporandus denique vterus ofloratis rebus, *maiorana, serpillio, calamintha, chamamelo, pulegio, artemisia, radice iridis*, & similibus in olla decoctis: quam operculo perforato operire oportet, arundinemque aut alium canalem foramini insertum vndique circumlinere, vt deinde sedens mulier excepto canali foueatur. Proderit etiam, vt mulier huic decocto vsque ad vmbilicum insideat, & inde pessos paulo ante memoratos sibi admoveat. Pinguiore mulieres victus ratione curabimus extenuante, exercitiis velocibus, aliisque medicamentis, quæ exilius corpus reddere possunt: vt est *assidua ventris deiectio, vnguenta euaporandi vini habentia, & similia, quæ copiose traduntur a Galeno nostro lib. 14. Ther. meth. cap. 15. & lib. 6. de tuenda sanitate*. Quæcunque vero propter gracilitatem non purgantur, siue id per morbum, siue alia ratione acciderit, eas primo reficere oportet, & corpori carnem per conuenientem victus rationem, aliaque medicamenta, quæ Galenus *loco iam citato* recenser, restituere. Si enim carnosæ euaserint, bona spes erit menses sua sponte erupturos esse. Quod si tamen non euenierit, tunc potionibus, fomentis, & aliis medicamentis supra commemoratis eos euocabimus. Si vero menses propter aliquod vteri vitium non profluxerint, principio malum, quod detentorum mensium causa, fuerit curabimus: quo curato, deinceps ad mensium prouocationem progrediemur. Curatio vero vitiorum vteri e suis locis petenda erit.

Deredundantibus mensibus. C A P. L I V.

Redundare menses in mulieribus dicimus, quando vltra consuetum tempus purgationis magna copia effluerint. Tempus autem, id est, duratio mensium purgationis, nullum statum ac ordinatum est. Multis enim ad duos tresue dies, haud paucis vsque ad quintum profluit: aliis etiam, vt dictum est, ad septimum vsque. Rarissime ad duodecimum vsque purgantur. Accidit autem, menses supra modum profluere, propter aperta aut fracta vasa, vel magna, vel parua. Aperiuntur autem vsu calidarum rerum, & erosione. Immodicæ etiam purgationes mulieribus oboriuntur, interim ob partus grandiores, quæ plerumque etiam sponte sua cessant. Crebro autem post abortus vehementi laborant profluvio, & præceps interdum periculum affert. Amplioribus vasis ruptis aut apertis, confertim sanguis promanat. Minoribus vero apertis, sensim, nec magna copia profluit. Ab erosione, si accidit, non solum paulatim, verum etiam cum maximo dolore effluit. Porro quum immodice profluxerint menses, color fædus consequitur, pedes molli tumore attolluntur, corporis robur prostermitur, vitatur ciborum, tum appetitus, tum concoctio: atque in totum omnia, quæ immodicam sanguinis vacationem, siue ex hæmorrhoides, siue alio quopiam sanguinis fluore euenientem sequi consueuerunt. In primis igitur artus & extrema corporis, incipiendo ab alis & inguinibus, vinctis excipere oportet. Cucurbitulas etiam, leues, magnas, subter mammillas, iuxta Hippocratis sententiam affigere, conuenit. Cibis quoque & potionibus austeris, atque adstringentibus vtendum est, vt est oriza, & similes. Assis autem potius quam elixis vescatur ægra: carnibus maxime, quibus suapte natura desiccandi facultas inest, vt auium montanarum, & agrestium animalium. Motu & vino abstinendum, ac pro eo adstringente aliqua potione aqua pluuiali, in qua ignitum ferrum fuerit extinctum, vtendum, aut posca non quidem frigida, sed tepida. Ouum item sorbile. Porro adstringentia etiam medicamenta simplicia in potu propinanda, qualia hæc sunt: *balausthium, hypocisthis, acacia, corallia, lyciū, terra lemnia, galla, polygonum, symphytum utrunque, hamatites, calyces glandium, plantago, oxycantha, & similia*. Composita sunt serapia, rosaceum, myrtinum, pastilli e succino, & terra lemnia. Mirifice autem in constringendis mensibus valent hæc catapotia, quæ accipiunt: *Terra lemnia, boli armenii, thuris, mastiches, gallarum, sing. scrup. duos. Sanguinis draconis, hamatidis, vtriusque scrup. vnum. Cornu ceruini vsti, drach. vnam. Hypocisthidis, acacia, coralliorum rubeorum, sing. drach. dimidiam. Balaustiorum, rosarum purpurearum, vtriusque scrup. duos. Succini, scrup. vnum*. Excipiantur serapio myrtino, & formentur catapotia, de quibus pondus drachma vnius, aut drachma vnius & dimidia propinetur. Extrinsecus loca oleis, rosaceo, myrtino, cotoneorum, & vino austero foueantur, adhibeanturque vnguenta, emplastra, cerata, & epithemata adstringentia, qualia multa supra in capitibus de dysenteria, diarrhœa & lienteria dicta sunt. Inseffus etiam ex decocto paulo ante commemoratorum medicamentorum parati conueniunt. Vti etiam debemus iis, quæ per *metrenchyas* vtero infunduntur. In quem usum mirifice commendatur succus plantaginis, quo se Galenus quatuor conti-

Obasari
curatio.

Extenua-
rarum cu-
ratio.

Curatio
carū quæ
propter
vteri vitium
non pur-
gantur.

Menses
quando
redundat.

Causa.

Signa.

Curatio.
s. Aph. 50.

Medica-
menta
menses
constringentia.
Catapotia.

Localia.

Inseffus.
Metren-
chyas.
Succus
plantagi-
nis.

A continuis diebus delatum ab utero sanguinem cum nullo alio praesidio sisti posset, suppressisse scribit. Quantitas autem iniicienda, ad cyathi mensuram accedat. Idem posunt succi polygoni, aut solani, aut hypocisthidos, aut acacia, aut similes inieci. Pessulorum quoque usus non contemnendus, inter quos is potissimum laudatur, qui habet *Thuris, balaustiorum, gallarum, sing. drach. unam. Gummi arabici, acacia, succini, cornu cervini vsti, sing. drachmas duas. Seminis plantaginis, myrtillorum, sing. scrup. unum. Boli armenii, scrup. duos.* Redigantur singula in tenuissimum pollinem, & lana rosaceo intincta excepta, in mulieris pudendum immittantur.

De fluore muliebri. C A P. LV.

B **V**teri fluor, qui Græcis *ῥοινα* dicitur, totius corporis expurgati diuturna est destillatio. Talem vero speciem id, quod euacuatur, representat, qualem humor in corpore superans. aliud enim rubrum, veluti sanguinis ichor, saniesve: aliud candidum, quod pituitæ soboles est: pallidum aliud, quod biliosum: aliud vero aquosum, quod quidem serosum est. Atqui si sanguis purus, sicut in venarum dissectione efferatur, attendendum accurate est, ne quædam in utero erosio sit excitata. His notis fluor deprehenditur. Locum continui madent humoribus, colore variantibus: laborans decolor est, cibum non sentit, eumque fastidit, obambulando difficulter spirat, oculos habet prætumidos, nunc cum dolore, nunc etiam citra illum, aut cum exulceratione, aut sine illa, aut inflammata ulceratione, aut sordida, aut pura. Causarum vero diuersitatem, ex colore eorum, quæ promanant, ut dictum est, dignosci licebit. Quod si rubro fluore mulier vexabitur initio, ubi ætas & alia permiserint, ad sanguinis missionem vertamur oportet. Siquidem multa incommoda sequerentur, si confestim sanguinis impetum localibus remediis reprimere conaremur: hydrops nimirum, neruorum vitia, aut oris ventriculi, aut capitis. Ablationem vero sicut in iis, quæ sanguinem exerceant, partiri oportet, ut paulatim prolixiori tempore auersio fiat. Secunda vero in gibbero vena erit. Post hæc summities corporis vinculis deligandæ, & ea omnia admouenda, quæ in contrarium fluxum auertere possunt. Quare conueniunt remedia omnia, quæ capite præcedentia nobis dicta sunt. Vicius ratio vniuersa sit astringens, & crassitudinem inferens. Potus sit aqua, aut in virium defectu, vinum crassum & adstringens. Ceterum fluore albo, aut seroso infestante, initio quidem resistendum non est, ut aliena e corpore excernantur. Neque etiam præter rationem erit, quandoquidem id, quod effluit, a pituita ortum habeat, si medicamentum, quod pituitam purgat, adhibeatur. Toti quoque corpori auxilia quæ exsiccant, quum vitium ipsum humidum sit, admouenda. Exercitationes itaque, superiorum præcipue partium, & frictiones conducunt. Carnes etiam quibus desiccandi facultas inest, ut aues montanæ, & agrestia animalia, deligendæ. Initio etiam mali, ea possunt exhiberi medicamenta, quæ crassos humores extenuant, & subinde per urinam educunt: ut sunt *asarum, fœniculum, apium, & iis similia iam saepe commemorata.* Transacto principio utero moderate adstringentia applicanda, ut sunt rosaceum & cotoneorum oleum, & alia præcedentia eapite comprehensa. Abstergentibus etiam medicamentis utendum, ne scilicet ab humore effluente ulceratio fiat. Quare aqua calida iugiter serosus humor abluendus. Post absterfionem sordium, oleum rosaceum, aut melinum, aut myrtinum illinendum. Pari ratione, ubi pallido fluore mulier laborauerit, initio non resistendum, sed medicamento bilem educente corpus purgandum. Dein reuulsioni studendum, aliisque medicamentis adstringentibus utendum, non neglectis etiam abstergentibus, quibus maxime propter effluentis humoris acrimoniam indigemus. Porro ubi fluor accesserit, a veloci deambulatione, a frictionibus abdominis & lumborum multis, ab esu acrium, a calefacientibus & iis quæ urinam mouent, diu abstinere oportet.

De vteri suffocatione. C A P. LVI.

Suffocatio seu strangulatus vteri nihil aliud est, nisi eiusdem ad superiora retractio. Græcis *ῥοινα* dicitur, quasi *uterina suffocatio* dicitur. Fit Galeno lib. 6. de affectis locis, cap. 5. teste, obtensionem, quæ creatur a plenitudine, quæ ad menstruum retentionem sequitur. Neque enim veluti animal errabundum, alias ad alium locum discurrit in mulieribus uterus, sed ab extensione retrahitur, ideoque fit ut tum intestina, tum ventriculum, item etiam septum transversum comprimatur, & spirationis difficultatem inducat. Accidit

Signa

etiam non raro, eodem teste, propter cohibitum semen. Nonnunquam etiam ob refri- A
gerationem, quæ vtero tempore quo menstrua effluerunt purgationes euenit. Inter-
dum etiam ob difficilem quempiam abortum, vel ubi quis sanguinis eruptionem ab v-
tero repente sistere properauerit. Comitatur hoc vitio laborantes quum accessio pro-
pinqua est, torpor mentis, pigritia, crurum imbecillitas, faciei pallor, aspectus mœstus.
Quum vero iam instat suffocatio, inclinatio ad somnum, desipientia, detentio instru-
mentorum sensus, vox obmutescit, cruraque cōtrahuntur. Pulsus parui ac debiles fiunt,
sæpe etiam penitus abolentur. Nonnullis quoque spiratio, quæ ab ore ac naribus prodit,
manente tamen ea, quæ in arteriis fit, in totum intercipitur. Quum remittet vitium, cor-
pus firmari incipit, rubescere malæ incipiunt, oculi attolli & aperiri: Humiditas etiam B
quædam a locis muliebribus tactu perceptibilis excurrit, ac intestina immurmurāt, ipsæque
vterus paulatim laxatur, atque sic ipsi mens, sensus, & motus redit. Ceterum malum hoc
iuxta circuitus mouetur, perinde atque epilepsia: idque nimirum vtero, ut dictum est,
repleto aut seminali, aut alia quæ in eo putrefit materia. Vbi autem vterus sua ipsius ra-
tione laborauerit, pro quantitatis vel qualitatis ratione, tamen menstruum tum se-
minis, alias aliarum symptomatum species oriri solent. Etenim lædente causa vniuersum
corpore refrigerare potente, adeo vehementer infrigidatur corpus, ut spiratio & arte-
riarum pulsus sensu deprehendi nequeat. Quæ si vel crassa fuerit, vel acris, conuulsio-
nes: si vero atra bilis naturam habuerit, mœsticiam inducet: quemadmodum animi quo-
que defectiones, & fortes extensiones, & refrigerationes, & stomachi vexationem se-
qui consueuerunt. Superuenit id mali genus omni quidem tempore, sed præcipue hye- C
me & autumnio. Eoque magis corripuntur iuniores, & ad Venerem procliuēs, steriles,
præsertim si vi medicamentorum tales factæ fuerint. Præterea multæ se a malo hoc re-
colligunt, nonnullæ vero in ipsis accessionibus subito, aut saltē intra paucas horas per-
eunt: id quod accidit, ubi pulsus crebriores & inordinati fiunt, ac subinde in totum abo-
lent. Postremo frigidus & modicus humor superficiem irrorat. In accessionibus igitur
extrema deligare oportet, cumque deligationibus crura tota, ac vniuersum corpus per-

Curatio,

Quæ in ac-
cessione fa-
cienda,

fricare, & veluti animo deficientes recuperare. Egrotam autem ceruice & scapulis ac-
cliuioribus collocare oportet, fœmoribus vero & inguinibus decliuioribus. Naribus
foetida admoveantur, verbi gratia, *feniculus lucerna nuper exstinctus, pluma præsertim perdi-
cana, aut lana laciniæque combustæ, solia calciamentorum, aliorum aut ceparum cortices: capilli, præ-
sertim si ipsius egrotæ fuerint, cremati: vel capra cornu combustum, pix super carbonibus, eliquata, gal-
banum, bitumen, castorium, & alia eiusmodi.* Reliquis deficientibus, matulam ex veteri lotio
naribus adhibere licebit, aut pannos sulphuratos veteres combustos. Inferius autē pu-
denda ex odoratis suffiantur, *styracem nimirum, aloes ligno, cinnamomo, garyophillis, & similibus.*
Cucurbitulas quoque inguinibus & imo ventri, nequaquam vero super umbilicū, cum
multa flamma, & leues affigere conuenit. Confestim autem accedente accessione fo-
menta, ac sacculi calefacti imo ventri ac pectini imponēdi, quibus vix aliud in huius ma-
li accessione præsentius auxilium reperies. Parabis autem eisdem ex *artemisia vtrique,*
origano, betonica, chamæmelo, calamintha, absinthio, pulegio, seminibus lini, & smyrnii, atque id
genus aliis. Quod si accessio prolongetur, etiam quæ flatibus educendis conducunt, sup-
ponere oportet, quorum omnium formulas & nomina e capitibus de vetriculi inflatio-
ne, & coli doloribus, petent studiosi. In vterum quoque tum vnguenta & olea odoratis-
sima infundere oportet: ut est *amaricinum, & quod spicaceum hodie appellatur, irinum, &*
similia. In hæc etiam obstetrix digitos intingat, atque subinde vsque ad vterios immit-
tat, leniter & multum defricans, ut eo irritamento crassus humor excernatur. Præter-
ea mulier etiam maximis vocibus exciterur, propriumque nomen inclametur. Hoc
etiam tempore ea sunt admoveenda, quæ sternutationes excitant: ut est *struthium, casto-
reum, piper & similia.* Sunt qui in sessionibus ex decocto *baccarum foliorumque lauri, pulegii,*
calaminthæ, artemisii, marrubii, fauina, altheæ, chamæmeli, serpilli, iridis, aristolochiæ, & sanograci
paratis utendum esse putent. In sessionum tamen tempore cerebri curam non omitemus, F
sed rosaceo & aceto caput irrigabimus. Ego tamen fomētis & sacculis potius quam in-

Quæ post
accessionē
statim agē-
da.

sessionibus utēdum esse iudico, præsertim quum ut plurimum, quamuis velis maxime,
in sessionibus in hoc vitio locus non sit. Vbi accessio quieuerit, ad vomitum cogantur.
Omnes enim vomitus leuat, sed eas præsertim quæ a cibo infestantur. In tertio die, lum-
bis &

bis &

- A** bis & aliis cucurbitulæ cum scarificatione applicentur. A septimo die purgatione vtendum ex hiera de colocynthide, aut catapotis de agarico. mox ad castorii portionem veniendum, quod iugiter potum ab hoc vitio protinus liberat. Dandum autem singulis diebus ad *drachmæ unius pondus*, interdum cum mulsâ, interdum cum artemisiz decocto, nunc cum vino tenui. Hoc sane tempore potius quam in accessione, vt dictum est, in sessionibus & pessis emollientibus ex adipe anserino, styrace, mastiche, amoniaco, & similibus compositis vti licebit. Vterus quoque iis, quæ calfaciendi, statumque educendi vim obtinent, sufficiens. Sit autem huius potissimum suffitus vsus, qui habet: *Pastillorum galliæ & aliptæ moschatæ, vtriusque drachmam vnâ & dimidiam. Styracis, drachmas tres. Garryophyllorum, maceris, vtriusque drachmam vnâ. Ligni aloes, scrupulos duos. Cinnamomi selecti, foliorum lauri, vtriusque drachmas duas. Ladani, vnciam vnâ & dimidiam. Trita in pol-
linem excipiantur stacte, & informantur pastilli pro suffitu.* Castorii portio.
Pastilli pro suffitu.
- B** seleti, foliorum lauri, vtriusque drachmas duas. Ladani, vnciam vnâ & dimidiam. Trita in pol-
linem excipiantur stacte, & informantur pastilli pro suffitu. Cibo interea & potu paucis admodum contenta sit mulier, totaque victus ratio exsiccatoria sit. Atque hæc curatio in huius vitii accessionibus adhibenda. In totius vero corporis restitutione, potissimum vbi malum diuturnum fuerit, plerunque a sanguinis missione inchoandum, præsertim si menstruæ purgationes detineantur. Deinde ad purgationem ex hiera picra transeundum. Peracta vacuatione, cucurbitulæ leues quidem, sed cum plurimâ flammâ affigendæ, & violenter detrahendæ. Interdum etiam loca scarificanda, & scarificata sale inspergenda, deinde conuenientibus medicamentis ad cicatricem ducenda. Nec inutiliter sinapismi, & dropaces ex *euphorbio, pyrethro, pipere & synapi* constructi applicantur. Non parum etiam recta victus ratio opitulatur, nempe deambulationes matutinæ, gestationesque vel in curru, vel in naui, vel iumento. A gestationis motu vociferatio, & lectio clara & concinna utilis est. Vinctio præterea, frictio, & ex conuenientibus interuallis repetita, eisdem conueniet. Balneum aquæ dulcis rarius, & non nisi sordium abstergendarum gratia admittendum. Balneis autem naturalibus vti optimum est, atque adeo postremum quasi confugium. Præ ceteris autem conueniunt, quæ sunt in Badenia, Marchionis. Porro si ob cohibitum semen vteri præfocatio euenit, post sedatam accessionem, ea quæ semen corruptum ex vtero deducunt medicamenta adhibenda erunt. Victus ratio.
Totius corporis curatio.
Victus.

De vteri procidentia. CAP. LVII.

- P**rocidere vterum dicimus, quando ita eueritur, vt exterius emineat. Neque enim vterus, vt imperiti suspicantur, a suis solutus propaginibus totus prolabitur & excidit: nam si ita procideret, restaurari haud posset. Quamquam autem vterus raro procidat, nihilominus tamen multæ sunt procidentiz eius causæ. Ab alto enim delapsa mulier, si in coxas deciderit, membranæ quæ vterum continent, ac vicinis partibus connectunt, ruptis, eo vitio corripitur. Accidit etiam nonnunquam, vt in difficili partu procidat vterus, propter secundæ scilicet violentâ extractionem, quam vterus qui illi adhæret, sequitur. Nonnunquam propter negligentem aut inartificiosam foetus, præsertim mortui, extractionem. Præterea ob ictum, vel immensum ponderis eleuationem, vel animi vehementiorem perturbationem, filiorum nimirum interitum, aut hostium accessum, vel ob periculosa navigationem, aut eiusmodi aliquâ causam, omni eo quod in toto corpore concretum est soluto, atque adeo vtero quoque simul prolapsa. Interdum etiam hoc vitium citra iam dictas causas accidit, tota corporis mole soluta propter resolutionem, aut partium, membranarum scilicet & musculorum, imbecillitatem: id quod senescentibus maxime euenire solet. Procidit sæpe vterus propter humoris plurimi ac tenacis defluxum, partuumque frequentiam laxatis ac solutis appendicibus. Procidit autem potissimum secundum os eius, & quod procidit ouo struthiocameli simile est, maioris tantum & minoris ratione differens. Notis pluribus nihil opus est, quod causarum diuersitas partim ex corporis constitutione, partim etiam de ægrotantis, & assidentium sermonibus cognosci queat. Quum vitium adhuc recens est, studendum vt vterus inferatur, ac in suum reponatur locum. Siquidem initio repositioni prompte parer, & locatus perseverat, præcipue si ætas conuenierit. Nam in prouectioribus vterus quidem reponitur, sed rursus qualibet leui causa relabitur. Conuenit igitur, si in recto intestino feces & stercora dura fuerint, vt clysteri educantur. Simili modo si in vesica lotium collectum fuerit, per cathete- Procidentia vteri.
Causæ.
Signa.
Curatio.

rem euocetur, vt vndiquaque vterus ſit liber. Euenit enim alias, vt eorum detentione vterus, qui inter vtrumque, rectum inquam inteſtinum & veſicam medius ſtatuitur, compreſſus, & intra locorum anguſtias coactus, in prolapſu ſuo impediatur, ne repelli & in proprium ſitum reduci queat. His autem r. te peractis, ægram ſupinam figurare oportet, vt coxas habeat ſublimiores, poplites flexos, cruribus inuicem dilatatis & diuaticatis: deinde prolapſam vteri partem oleo tepido, vel butyro, vel malua, alihea, ſenograci ſeminis lini, aut ſimilium decocto affatim fouentes, conuolutam lanam præparabimus, ſigura ex craſſitudine ſinui muliebri proportionalem, tenui & puro linteo exterius circumdatam: ac deinceps in ſuccum acaciæ, vel hypocithidis vino dilutis merſam vtero inferemus, & citra violentiam ac ſenſum totum, quod procidit ſurſum torquebimus, quoad integer in ſinu tumor excitetur, & vterus in proprium reponatur locum. Deinde alium lanæ ſapſum vino adſtringente imbutum ſuperponemus. Extrinſecus autem pubem ſpongia in poſca expreſſa operiemus. Mulier vero iacebit extenſis adaptatiſque inuicem cruribus, vt alterum alteri incumbat. Tutius tamen erit pedes ſimul vinciri, ſaſciam vſque ad genua deducendo. At ſi prolapſus vteruſtemporis diuturnitate intumuerit, plurimoque humore infartus fuerit, ita vt tumor reductionem impediat, betarum decocto irrigabimus: deinde acetum circumfundemus, ſalemque tenuiſſimum inſpergemus: & vbi detumuerit, ſicut dictum eſt, reponemus. Deinde cucurbitæ cum flamma copioſiore, vmbilico & vtriuſque ilibus affigendæ. Naribus odorata iugiter admouenda, inferne vero quæ grauem odorem habent. Tercio die lana adhuc in ſinu perſiſtente, mulier in vino nigro aſtremo, modice tepido, aut in decocto myrti, rubi, malicorii, radicis biſſortæ, & ſimilium inſidebit. His peractis, ruſus ſupina accliuibus coxis locabitur, ſublataque e ſinu priori lana, altera in locum prioris eodem medicamento madefacta imponitur. Cataplaſmata etiam & emplaſtra extrinſecus imo ventri ex palmulis, malicorio, lenticula, & ſimilibus compoſita imponantur. Cerata etiam ex maſtiche, ligno aloes, laudano, thure, iunco odorato, acoro, nuce moſchata, gummi, tragacantha, & eiufmodi medicamentis parata conueniunt. Singulis vero tribus diebus hæc vſque ad perfectam curationem permutentur. Toto etiam curationis tempore mulier motum, & ea quibus ſternutatio excitatur, euitet. Ceterum vterus ab infernis, ſcetidis rebus ſuffendus eſt: paribus autem odoratiſſima, vt dictum eſt, ſunt adhibenda, quod is odorata ſequatur, ſcetida contra reſugiat. Cibi etiam boni ſucci, & vina odorata offerenda. Venter etiam liniendus ac lubricandus, ne ſi cum difficultate ſitegerendum, ſimul vterus procidat. Cauendum tamen vnice, ne venter nimium ſubducatur: exſoluitur enim, relaxanturque propinquæ partes, & vteri loca procidunt. Porro, ſi pars vteri prolapſa temporis diuturnitate propter incuriam putruerit, obque aſſiduam vrinæ irrigationem & ſordes inherentes exulcerata fuerit, amputandum, aut inurendum, quod inutile fuerit, nullius metu periculi. Conſtat enim, Pauli etiam teſtimonio, totum vterum, eo quod computruerat, ablatum fuiſſe, ac mulierem ſuperuiſſe.

De Mola. C A P. LVIII.

Mola quid.

MOLA, hoc eſt, mola, Aetius & Paulus vocant *induratum tumorem, interim in vteri oſtiolo, interim in toto ipſo prominentem, ad tactum ſere lapideum*. Galenus autem libr. 14.

Mola cur
dicta.
Cauſa.

Ther. meth. mola definit eſſe *carneſem informem*. Paulus adiuſcit *tunicis vuluæ adheſcentem, ac factus modo in lucem edi*. Nomen a difficultate motus accepit, quam ſane quæ hoc vitio premuntur mulieres ſentiunt. Informis vero recte dicitur, quod nullius animalis formam habeat. Fit a ſeminis muliebris, & plurimi ſanguinis menſtrui craſſi in vteri cavitare retentione & affluxu, quem calor immodicus cogit, ac in carnis formam tranſmutat.

Signa.

Conſequitur hoc vitium tumor durus cum hypochondriorum contractione, corporis gracilitate, decoloratione, appetentiæ deiectione, menſiumque ſuppreſſione. Item in hoc vitio mammillæ intumeſcunt, vt conceptionis veræ quibuſdam per initia ſuſpicio ſuboriat. Temporis vero progreſſu diſcernuntur: mola enim punſtionis ſenſum inferens: dolor ſubſequitur, nec in ea motus vllus, ſicut in cōceptione percipitur. Nonnullæ vero præbent aquæ inter cutem ſuſpicionem, a qua tamen vitium hoc diſtinguitur, quod tumor durus ſit, neque ſicut in hydrope manuum aut digitorum impulſu cedat, aut excanetur, aut tympani modo ſonum edat. Nonnunquam tamē tempore procedente

- A** cedente secur refrigeratur, & hydrops superuenit. Vitium hoc magna ex parte insana-
bile est, nisi initio remedia adhibeantur. Vt cunque tamen accidat, curatio negligenda
non est, sed omnia quæcunque conuenire videbuntur, adhibenda. Primum vero o-
mnium alimenta boni succi offerenda, ac vini potione vtendum moderata. Mulier ve-
hementi motu non vtatur, is enim fluxionem commouet: sed potius gestationibus, de-
ambulationibus, & balneis. Pedes quoque decumbendo elatiores habeat. Interea vbi
plenitudo affuerit, venæ gibberi incidenda erit, ac subinde purgatione per catapotia
fœtida vocata vtendum. Corpore vacuato, cataplasmata, fomenta, infusiones, pessi,
vnguenta, & cerata quæ relaxandi vires habent, admouenda: qualia sunt, quæ ex *althea*,
malua, *chamæmelo*, *meliloto*, *sænograce*, *semine lini*, & similibus parantur. In hunc vsum non a-
B lienæ erit vnguenti dialtheæ, aut emplastri diachilon simplicis admotio. Vel adhibea-
tur hoc quod accipit: Olei amygdalarum dulcium, drachmas tres. Olei liliacei, drachmas duas &
dimidiam. Pinguedinis anseris & gallinæ, vtriusque drachmam vnā & dimidiam. Lenti cremo-
ris seminis lini & sænograci, vtriusque drachmam vnā. Ammoniæ, bdellii, vtriusque drach-
mas duas. Radicis altheæ, seminum nigellæ & dauci, singulorum scrupulos duos. Cera quod satis
est, fingatur vnguentum, gummi in vino prius dissolutis. Pessi quoque subiiciendi ex
butyro, *adipe porcino*, *medulla cœruina*, *passulis*, *caricis pinguibus*, *seminis lini* & *sænograci*, confecti.
Post hæc, quæ menses euocare possunt, propinanda medicamenta. In quem quidem
vsum præter ea quæ in cap. de suppressis mensibus commemorauimus, conuenit hoc me-
dicamentum, quod habet: Specierum diacinnamomi, diagalangæ, diacimini, singulorum drach-
C mam dimidiam. Specierum diambar, scrupulum vnum. Specierum dialachæ, scrupulum dimi-
dium. Cinnamomi selecti, hyperici, calami odorati, asari, radicis acori, seminis anisi, singulorum scrupu-
lum vnum. Seminis rutæ, zingiberis, artemisiæ, marrubii, dictamnii, saluæ, singulorum scrupu-
lum dimidium. Sacchari dissoluti in liquoribus stillaticis artemisiæ & hyperici, quod satis est:
fingantur morsuli, de quibus quotidie pondus duarum aut trium detur drachmarum.
Proderit etiam hunc subiicere pessum, qui habet: Radicum asari, acori, rubi tinctorum,
singulorum drachmas duas. Seminum rutæ, nigellæ, vtriusque drachmam dimidiam. Maiorane,
nucis moschatæ, garyophyllorum, baccarum lauri, sing. drachmam vnā. Sauinæ, scrupulum vnum.
Castorei, euphorbii, vtriusque scrupulum dimidium. Tuis & cribratis iis, quæ opus est, cum
terebinthina resina formentur, pessi. Quid multa? vtendum medicamentis relaxanti-
D bus & dissoluentibus sanguinem concretum: Sic enim plurima sanguinis atrii & gru-
mescentis excretio sequetur. Mirifice etiam ad huius vitii amolitionem, potissimum
vbi diuturnum fuerit, vti confert balneis naturalibus, & per se natis, quibus dissoluendi
ac discutiendi facultas inest. Porro multa etiam remedia huc ex capitibus de aqua inter-
cutem, transferenda erunt.

De phlegmone vteri. CAP. LIX.

- V**terus plurimis de causis phlegmone corripitur, nempe icu, mensuræ retentione,
aboru, vlceratione, cōcubitu metas rationis excedente, tellæ nimis duræ infessio-
ne, longissima, intensissimaque deambulatione, sæpe etiam transpiratione, propter fri-
E gus, prohibita. Comes phlegmones vteri est febris acuta, dolor capitis, pubis & lumbo-
rum, & radicis oculorum: brachialis, digitorum & colli conuulsio, & in aduersum decli-
natio: stomachi ex cōsortio dolor, oris vteri conuiuentia: pulsus exigui crebrique. Si
languida fuerit phlegmone, haud valida prædicta symptomata erunt, maioriq; dolore
vterus afficietur. Sin vehemens, & ipse totus pullatilis dolor percipit, omniaq; sympto-
mata vehementiora erunt. Vniuerso aut vtero phlegmone laborante vndiquaq; dole-
bit: parte vero eius aliqua phlegmone obfessa, in ea dolor magis inteditur. Nā si poste-
riora ipsius phlegmone corripiuntur, dolor lumbos magis vexabit, durumque stercus
detineat, quod tum rectum intestinum admodum comprimatur. Si anteriora, dolor
pubem occupat, & vrinæ stillicidium aut difficultas, vesica expressa, excitatur. Lateri-
F bus autem phlegmonem expertis, inguina tenduntur, & crura grauantur, ac difficul-
ter mouentur. Quum aut os vteri phlegmone affligit, in abdomine dolor est, digito-
que immisso os occurrit durum, rigidum, clausum & feruidum. Initio itaq; curationem
aggressi, si neque ætas, neque habitus corporis, neq; anni tempus obstiterit, neq; phle-
gmone post abortum, aut immensam sanguinis vacationem superuenerit, venam po-

plitis aut malleoli ſecabimus: idque ex Galeni traditione, qui in libro *de curandiratione per ſanguinis miſſionem*, vteri phlegmonem a venis in crure ſectis magis, quam in gibbero iuuari ſcribit. Nam venæ illæ non ſolum ab vtero reuellunt, verū etiam vacuant, quod in omnibus internis phlegmonib. maxime requiritur, *vt alibi copioſius diximus*. Ægram ſubinde in domicilio obſcuro, & moderate calido ſeu tepido collocaſimus, quietem imperantes, ac crura eius ab omni motu prohibentes. Deinde artus & extrema perfricabimus, vt fluoris ad vterum imperum auertamus. In cibo, qui quantitate modicus ſit, vtendum piſanæ cremore, & ouis ſorbilibus, vno tamen die interpoſito. Potu vini abſtinendum, ac pro eo vtendum iure decocti cinnamomi, aut aqua calida. Alius quoque, præcipue vbi ſua ſponte non deiecerit, leuibus & emollientibus clyſteribus eluenda, & vacuanda. Extrinſecus lana ex oxyrhodino madefacta, pubi & lumbis imponenda. *Palmula quoque, aut mala coronea, in vino aſtero decocta, & roſaceo admixta, admouenda*. Item ſuccus ſemperuiui, vinum aſterum, farina hordei, balaſtia, & mali granati cortex. Cataplaſmata etiam ex farina ſeminum lini, ſænogræci, meliloto, plantagine, lentibus, polygono, portulaca, ſedo, & ſimilibus compoſita, adhibenda: idque potiſſimum, ſi eryſipelatis naturam phlegmone fortita ſit. Lana denique cum roſaceo, aut melino oleo, aut ſucco portulacæ, aut ſedi madefacta, in vteri ſinum immittenda. At vbi phlegmone declinare ceperit, ad ea veniendum, quæ quadantenus remittendi diſcutiendique vires habeant. Ægotam igitur in ſænogræci, altheæ, ſeminis lini, maluæ, interdum etiam artemiſiæ, marrubii, & ſaluia decocto, vſque ad lumbos ſedere iubeſimus. Pubi quoque & lumbis hordeaceam farinam cum ſænogræco, & ſemine lini in mulſa elixatam, aut caricarum decoctum illinemus. Peſſi quoque ſubiiciendi ex butyro, medulla ceruina, adipe anſerino, gallina, & ſimilibus parati. Vbi curatio proceſſerit, varius magis cibus & leuior vtilis erit. Et quidem in manifeſta declinatione ad balneum etiam ducantur ægotantes, vinumque aquoſum maxime & tenue detur.

De inflatone vteri, C A P. L X.

Cauſa. INflatur vterus ex frigore, vel humoribus in eo corruptis, vel ex abortu, vel difficili partu oſtiolo eius conſtante, aut grumo in ipſo obſtrente. Flatus vero ſæpe in concauo ipſius ſpatio colligitur, ſæpe in ſinu, qui ſenſui patet, nec raro in rarioribus ſenſuique non patentibus partibus corporis ipſius vteri. Vitium hoc ſequitur tumor imi ventris cum duritie & dolore punſtionis ſenſum inferente, qui vſque ad ſeptum tranſuerſum & ſtomachum peruenit: ac nihilominus vtrinque in lateribus extenditur, ſæpeque alteri inguini, interdum vtrique, interdum & vmbilico lumbiſque ac peſtini dolor communicatur, cui caput quoque aſſentitur. Nonnunquam flatus per muliebrem pudendum erumpit, & ab ægra percipitur. Si itaque flatus in vteri cavitare collectus fuerit, murmura & ſonitus quidam in corporis flexu audiuntur, quales in teſtibus accidunt, quæ torminibus vexantur, impulſuque digitorum ſonus tympani modo redditur. At vbi flatus in rarioribus vteri meatibus continetur dolores vehementiores, ac curatu difficilioreſ inſeſtant. Auxiliatur huic malo primum, niſi ætas, regio & anni tempus obſtiterint, corporiſque plenitudo ſi aſſuerit, ſanguinis miſſio, inedia, & purgatio ex hiera picra Galeni.

Localia. Quibus peractis, fomentis & inunctionibus ex oleo rutaceo, aut oleo in quo anethum decoctum ſit, vtendum. Infeſſionibus præterea ex decocto ruta, pulegii, calaminthæ, marrubii, artemiſiæ, altheæ, & ſimilibus paratis. Cataplaſmata quoque adhibenda ex ſemine apii, ſeniculi, carei, cumini, ſmyrni, dauci, aniſi, lolii farina, & ſimilibus. Vtero etiam inſundenda, quæ laxandi, flatuſque diſcutiendi vires habent, vt eſt oleum rutaceum, ammi, origani, & paulo ante commemoratorum decoctum. Et ſi flatus grumorum cauſa includantur, poſt prædictorum, infeſſionum maxime uſum, obſtetrice digitorum prius perunctum in pudendum muliebrem inferat, ac grumum ſenſim ac leniter diſſoluat & educat. Quod ſi diutius ſe vitium prorogauerit, ad efficaciora remedia veniendum erit. Quare vtendum linimentis, emplaſtris & ceratis paulo vehementioribus, quale eſt quod habet: Abrotoni, origani, calaminthæ, ſingul. drach. duas. Seminis agni, ſcrup. duos. Centaurii minoris, drach. vnam. Seminum carei, ammi, vtriuſque, drach. dimidiam. Caſiæ, ſcrup. vnum. Bdellii, ammoniaci, vtriuſque drach. vnam & dimidiam. Oleorum rutacei & anethini, vtriuſque unc. vnam. Cum cera & terebinthina reſina, quod ſatis eſt, inſormetur ceratum, quod vtero adhibeatur. Interdum etiam vſque ad dropaces ac ſinapiſmos progrediendum. Cucurbitæ etiam

A etiam locis in ambitu leues, & quæ violenter auellantur, affigendæ. Nam hæ incantamenti cuiusdam simile, vt nunc sæpe dictum est, efficiunt. Interdum etiam scarificatio adhibenda est. Omninoque iis vtendum, quæ vim habent ex alto in summum euocandi. Alimenta quoque attenuantia, & flatum discutientia exhibere oportet, necnō medicamenta quæ idem possunt, vt dianisi & diacumini, ac diacalamenthæ antidota, & alia quæ in capite *de ventriculi inflatione* exposita sunt. Vitus.

De vteri exulceratione. C A P. LXI.

E Xulceratur interdum vterus propter difficilem partum, aut foetus extractionem, Causa. aut eiusdem corruptionem, aut ex acribus medicamentis, aut fluxione, aut abscessibus disruptis. Hoc vitio affecti in laborante parte dolorem punctorium percipiunt, Signa. atque ex interuallis foetidi saniosque humores ab vlcere sordido excernuntur, ceteraque signa consequuntur male habenti vtero peculiaris, vt capitis, & præcipue sincipitis, tenontum, radicisque oculorum dolor, qui ad manum etiam fundamenta & digitos vsque protenditur, ac reliqua quæ in capite *de phlegmone* prædiximus. Vlcus itaque in conspectum veniens, specillo oriculario deprehenditur. Altum vero & reconditum, ea quæ excernuntur indicabunt. Humor enim diuersus excernitur. Phlegmone quidem oblesso vlcere, paucus, cruentus, aut foeculentus, cum magno dolore. Sordido autem existente, copiosior, & sanies cum minori cruciatu. Depascente vero, foetidus, niger, cum doloribus vehementioribus. Porro vbi cum phlegmone fuerit vlcus, Curatio. venæ sectione & aliis medicamentis ad illam scriptis vtendum. In reliquis medicamentis purgantibus, maxime si corpus vitiosis redundet humoribus, vtendum. Localia. Deinde adhibenda quæ reprimunt humorum defluxum atque calidam intemperiem corrigunt, vt est succus aut liquor stillatius portulacæ, plantaginis, bursæ pastoris, Repurgantia medica-
menta. & similes iam sæpe expositi. In sordido subinde expurgantium medicamentorum vltus erit, vt est ptisanæ cremor cum melle, mulsa cum decocto radicis iridis, aristolochiæ absinthii, aut agrimonis. Ea vero, quæ depascunt efferanturque vlcera, equino vel asinino lacte recenter mulso abluenda sunt. Lacti vero mel admiscendum, & iridis radix. Hæc quidem, si vlcera conspicua fuerint, illinuntur: sin profunda infunduntur per metrenchyras. Vbi vlcera probe purgata fuerint, iis quæ ad cicatricem ducunt Ad cicatricem ducen-
tia. vtendum, primo quidem mitioribus, postea efficacioribus. Placet in primis ceratum Aetii, quod habet: *Cera alba, vnciam vnam. Rosacei optimi, vncias tres.* Hæc super carbonibus liquato, & quadantenus subinde refrigerato, tum in mortarium coniecito, lacteque muliebri, aut asinino, aut caprino recens mulcto, cum pistillo diluto, quousque totum abescat. deinde effuso priori lacte nouum imposito, ac rursus subigito. postea croci circiter scrupulum vnum adicito. Quod si maiorum mitigationem quæsieris, addito *rosacei olei, vncias duas. Adipis & medulle anseris, vtriusque vnciam dimidiam.* Licebit & pro rosaceo melinum admiscere. Hoc ceratum abdomini & coxis imponendum. Si quidem eius facultas per latentes meatus in vterum traducetur. Possunt etiam eius farinae medicamenta vtero iniici, vt est *decoctum malicorii, rosarum, malorum cotoneorum, rubi, myrti, rhois coriarii, bistortæ, bursæ pastoris, acaciæ, hypocistidis ex vino adstringente.* Ad hunc locum transferenda sunt medicamenta e superioribus libris, ex capitibus *de ulceribus renum, vesicæ & virgæ.* Ceratum.

De phimosis vteri. C A P. LXII.

P himosis, obturatio seu coarctatio est in ore aut ceruice vteri, qua ea loca tam Phimosis. angusta redduntur, vt non amplius semen admittant: vel si admiserint, non retineant. Ob callosam enim duriciem contrahi nequeunt. Interdum tamen semen admittitur, & intra angustissimum os vteri continetur, atque inde foetus concipitur, conceptus vero prægnanti moriendi occasionem affert, quum propter nimias locorum Causa. angustias efferri nequeat. Fit autem phimos in ore vteri, aut ex præcedenti ulceratione, aut durata illic phlegmone. Signis ad mali cognitionem nihil opus est: de sermonibus enim ægrotantis, & tactu facilis est deprehensio. Curatio ipsa fit fomentis relaxantibus & emollientibus, itemque cataplasmatibus & in sessionibus simili facultate præditis. Signa. Fomenta itaque ex hydrelco & foenigræci decocto adhibenda sunt. Pessis etiam vteri.

dum quæ relaxando emolliunt, ut est is qui ex cæsypo, nitro, & resina terebinthina conficitur. Quid multa? ad huius vitii amolitionem, & ut satis aperiatur vterus, utendum medicamentis emollientibus, *malua nimirum, althea, nigella, fenograceo, lino, ammoniaco, bdellio, resinis, adipibus, & similibus, e quibus cerata, emplastra, pessi, & omnis generis localia medicamenta componi possunt.* Quod si vitium inueterauerit, suffimentis vaporibusque aromatatum utendum. At ubi iam loca tactui molliora offeruntur, tunc spongiam aridam funiculo appensam intra locorum angustias, dilatandi gratia imponemus. Quæ si exciderit, aliam crassiorē immittemus. Quare plures diuersasque spōgias exarētes præparatas habere oportebit. Postea aliquod medicamentum ex alumine elaterio, melle exceptis, paratum, spongiæ imponendæ illinendum, ut scilicet locus apertior fiat. Quod si postea sublata spongia locus non satis apertus videbitur, phlegmoneque propter erodentia medicamenta admota superuenerit, infra scriptum medicamentum spongiæ illinetur, quod habet: *Olei irini unciam unam. Resina terebinthina, drach. duas. Adipis anserini, drachmam unam. Radicis iridis, thuris, utriusque drachmam dimidiam. Cera quod satis est, fiat unguentum.* Porro si in phlegmone vehemens fuerit, pro irino violaceum aut rosaceum sumatur. Vbi phlegmone cessauerit, & locus apertus fuerit, cerarum ex oleo rosaceo & adipe anserino confectum spongiæ illinemus, & in eo usque ad cicatricem obductam persistemus, locum solidiorem paulatim reddentes. Spongia tamen usque ad perfectam curationem nunquam non imponenda, ne os vteri rursus coalescat.

De sterilitate remouenda. CAP. LXIII.

Causæ.

Sterilitas aut viri, aut mulieris ratione accidit. A viro est, cum semen eius vel calidum, & veluti torrefactum: vel frigidum, tenue, aquosum, languidum, quale decrepitorum est: vel crassius quam oportet emittitur: vel quod viri semis padones sint, penemque breuissimum habeant, ut in vuluæ recessum semen iaculari nequeant. Quod etiam interdum nimia obœsitate contingit. Obœsi enim tam ventricosi euadunt, ut semen ad profundiores vteri partes iaculari non possint. Mulier vero sua ipsius ratione non concipit, quod vterum habeat vel calidum & igneum, vel frigidum & humidum, vel squalentem & aridum. Nam, ut Hippocrates ait: *Quæcunque frigidos & densos uteros habent, non concipiunt: exstinguitur enim in eis genitura. Et quæcunque siccos magis & torrefactos: nam ex defectu alimenti corrumpitur semen.* Ceterum crassæ admodum & obœsæ haud concipiunt. Cuius rationem Hippocrates iis verbis reddit: *Quæcunque, inquit, præter naturam crassæ, non concipiunt utero, iis omentum os vteri comprimit, & priusquam extenuentur, non concipiunt.* Graciles denique & macilentæ non concipiunt: aut si concipiunt, statim abortiunt, eodem Hippocrate teste, qui sic scriptum reliquit: *Quæcunque præter naturam tenues existētes, utero gerunt, abortiunt priusquam crassescunt.* Quædam etiam non concipiunt, eo quod vterus earum debilis est, vel angustus, vel brevis: aut quod vasa eius obstructa, & clausa sint, aut cicatricis superuentu excæcata: aut quod vteri ceruix in obliquum ducatur: aut quod os eius nimis angustum, vel nimis amplum sit. Sed & inuiti concubitus, inanes & steriles magna ex parte sunt. amor enim genituram conciliat: ideoque foeminae amantes creberrime pariunt. Etas etiam vel iunior, vel prouectior conceptum impedit. Propterea nunc primum pubescentes a Venere arcere oportet, ita ut vir trigessimum annum, mulier decimum octauum attingat. Præcipue vero inepta mulieris forma sterilitati occasionem præstat. Fœcunda enim mulier habere debet proceritatem corporis moderatam, lumborum, & pettinis latitudinem, nates eminentes, commodam alui molem, thoracem angustum, mamillas amplas. Signa quibus causarum diuersitas cognoscitur, hæc sunt. Calidius viri temperamentum facile ex pilorum copia, nigrorum potissimum in partibus genitalibus, & omnibus quæ circumstant, a supernis quidem usque ad media fœmora deprehenditur. Petulca etiam est hæc temperatura, & prona ad libidinem, statim vero satiatur. Frigidius temperamentum monstrant partes circumpositæ testibus glabræ. Neque etiam hoc temperamento præditi, ad libidinem prouisi sunt. Vteri vero caliditas ex reliqui corporis caliditate cognoscitur, quodque pauca menstrua, & cum dolore deferuntur, ut genitalia interdum mulieris exulcerentur. Sed & quæ educuntur, nigriora sunt. Hanc etiam temperaturam insignis salacitas, & totius corporis siccitas sequitur.

Signa
calide tem-
peraturæ.

Frigide.

A sequitur. Frigidiorē vteri temperaturam monstrat menstruorum suppressio, stupor in pube, lumbis & crurib. obortus. Veneris etiam vsum aspernantur, & os vteri contractum habent, hoc temperamento præditæ. Humiditatis vero vitio fecunditatem frustrari indicat, si in coitu humores admodum perfundantur, & si iis fuerint tenuia, copiosaque menstrua. Siccitas contrariis plane deprehenditur notis. Reliquæ causæ partim visu, partim de sermonibus ægræ, v. aliorum cognoscuntur. Communiter quidem ambobus, viro scilicet & mulieri, congruit vniuersum corpus conseruare probe temperatum, laboris, cibi, balnei, & reliquorum omnium mediocritate. Viri igitur, qui propter deprauatam viuendi rationem semen corrumpunt, ad magis compositum salubrioremque victum conuersi, genituræ fecunditatem acquirunt. Mulier autem neque ingenti labore defatigetur, neque prorsus ociosa sit: hoc enim inperuacuis excrementis molem corporis replet: illud vero sanguinem desiccatur, & purgationes absument. Potu & cibis concoctu facilibus vtatur, & quos ventriculus probe superet atque conficiat. Illud vero potissimum circa rectam viuendi rationem est obseruandum, vt nec vir, nec mulier obæsi reddantur. Qui enim tales fuerint, liberis procreandis inepti sunt, eo quod genitalibus mutuo se contingere non possunt, & paucum semen emittant. Porro conuenit etiam, vt iis qui liberis procreandis operam dare cupiunt, quædam consueta, esuque aut potu grata ante cibum offerantur, quæ Veneri excitandæ & semini generando aptissima sint, qualia existunt, quæ calefaciunt mediocriter, Galeno libro quinto, de simpl. med. faculi capite 20. teste, & insunt. Vinum itaque in hunc vsum, modice sumtum, aquæ præfertur. Sine enim Cerere & Baccho, vt ille ait: friget Venus. Ex oleribus vtendum eruca, arminio, erysimo, & aliis quæ in capite de iis qui re Veneri vt non possunt, commemorauimus. Ruta, calamintha, & menta omnino vitanda sunt. Calamintha enim & menta, etsi plurimum semen, languidum tamen & imbecillum gignunt. Ruta vero prorsus corrumpit. Ceterum vbi mulier vitio quodam humorum non concepiat, eas purgante medicamento vacuare, & proba victus ratione emendare expedit. Peculiariter vero mulieribus conuenit, curam eorum, quæ sunt circa vterum, quam fieri potest, maximam habere, & vt iis menses sine omni impedimento promanent. Quum igitur propinqua est per menses purgatio, cibi potusque quantum fieri potest mediocritatem curæ habebunt, & quippiam ex iis, quæ mensuram purgationem irritare & stimulare possunt, assumet, vt sunt olera odorata & acia, gingidium, sceniculum, apium, smyrnium, & similia, quorum copiam ex capite de suppressis mensibus petes. A purgatione menstrua, optimum & opportunissimum concipiendi tempus est. Quoniam, vt testatur Hippocrates noster, post mensuram purgationem iam dextra, iam vero sinistra vteri pars aperta est. Porro vteri intemperiem frigidam per fomenta, cataplasmata, suffusus, & alia quibus calefaciendi vis inest, corrigere oportet: vt sunt quæ ex artemisia, pulgione, salvia, ruta, aniso, cumino, acoro, & similibus parantur. Castoreum etiam bibere proderit, & semina odorata, cuminum, anisum, iuniperi quoque fructum, & alia quæ in capite de suppressis mensibus dicta sunt. Calidiorem vero vteri intemperiem, per ea, quæ refrigerant & humectant, emendabimus: cuiusmodi sunt olera quidem lactuca, malua, cucurbita, portulaca, atriplex, & iis similia. Vinum bibendum tenue, album & dilutum. Proderit sic laborantibus somnus, & dulcium aquarum balnea. Lumbis etiam ac pubi refrigerantia adhibenda sunt, vt solani succus rosaceo admixtus, qui etiam lana exceptus in vteri sinum vtiliter imponetur. Quæ ob vteri humiditatem non concipiunt, iis victus siccior vtilis est. Exercentur etiam eas plurimum oportet, ac in superioribus corporis partibus perfricari, vacuationisque & auersionis gratia interdum pransas, interdum ieiunas vomere, & cibi parsimonia exsiccari, carnesque ætate vigentium animalium tostas comedere, vinumque potens & meracius, sed parcius bibere. Arida præterea fomenta crebro adhibenda. Profuerit & vuluæ adstringentia apponere, qualia sunt rosarum, foliorum rubi, gallarum, rhois obsoniorum, myrti, polygoni, malicorii, & similibus decocta. Id autem nisi totum antea corpus purgatum sit, faciendum minime erit. Sicciorē vero vterum contrariis curare oportet, balneis aquarum dulcium, inunctione, & alimentis humectantibus. Vino diluto, non nimis veteri. Quod si a crassioribus humoribus concipere mulier impediatur, siquidem rodentes fuerint, mulierem probe purgare conuenit hiera picra, sero lactis: & victu exquisitiori, cibisque boni succi vtendum. Pituita

Curatio viro & mulieri communi.

Curatio mulieris a coenymia laborantis.

Curatio frigida intemperiei vteri.

Curatio calidioris intemperiei.

Humidioria.

Siccioria.

Curatio humoris crassi.

Cutatio flauum.

Clausi vteri.

Aperti vteri.

Peruersionis.

tosos vero humores laboribus plurimis, sudoribus, vomitu, vel per inferna purgatio. ne absumere oportet, aliaque omnia quæ in capite *de suppressis mensibus* commemorata sunt, quæ nihil attinet hic membratim recensere. Iam vero flatus quoque in vtero concepti fecunditatem impediunt. Quibus primum parcior cibo medebimur, dein quæ flatus discutiunt medicamentis, vt est *cuminum*, *ruta*, *anethum*, *apii semen*, & *similia*, quæ in capite *de vuulua inflatione*, & *alibi dicta sunt*. Ea autem partim potanda, partim extrinsecus adhibenda sunt. Clausum ac conuiuentem vterum aperiemus iniectionibus clysteribus odoriferis, fomentisque & iniectionibus *ex fenograce*, *semine lini*, *malua*, & *id genus aliis*, supra in capite *de phimosi vteri etiam commemoratis*. Postea ad validiora progredientum, *artemisiæ* nimirum, *calaminthæ*, *pulegii*, & *maioranæ*. Quibus os vteri nimirum hiat, iis victus aridus, fomenta sicciora, medicamenta adstringentia, qualia sunt *gallarum decoctum*, *rubi radix*, *myrtus*, & *eiusmodi in curatione humidioris intemperiei recensita*, conueniunt. Postremum peruersiones vteri emollientibus fomentis dirigemus: id enim fomenta maxime possunt. Sed & mollientes pessuli vultu supponentur. Præcipue vero *pulegii* & *artemisiæ* decocta, & *castorium* & *posca bibicum*, vtero auerso conferre solent. Paulus tradit, tum Venerem a tergo exercitam ad concipiendum conducere. Nos hic generatim atque per capita tantum curandi rationes perstrinximus. Particulares enim curationes, e propriis petendæ sunt capitibus.

De difficultate partus. C A P. LXIII.

Naturalis figura foetus prodeuntis.

Signa.

Curatio obœsæ.

Difficilis partus aut vitio patientis, aut foetus, aut secundarum, aut extrinsecus aduenientium accidit. Parturientis quidem, si crassa obœsaque sit, aut animo pusillo, & dolorum imperita: aut vterus totus exiguus fuerit, aut phlegmonem vteri, aut alterius partis habuerit, aut alio quouis morbo laborauerit: aut naturaliter imbecilla sit, vt foetum propellere nequeat, aut ante tempus pariat. Item si os cervicis vteri fuerit obliquum, aut eidem caro aliqua propter vlus quod præcessit adnata sit. At foetus vitio, si vel inusitata magnitudinis existat, vel exiguus & modicæ grauitatis, vel magni capitis, vel mæstrosus (verbi gratia) biceps, tricepsue: vel mortuus, qui nihil opis parturienti præstet, aut intumescat: aut viuus quidem, sed imbecillis, vt foras non possit progredi. Vel si gemmini vel plures fuerint, & repente omnes simul collo vteri impingantur. Vel si figuram naturæ aduersam & contrariam obtineat. Naturalis siquidem figura foetus prodeuntis est. Prima quidem in caput, manibus super fœ moribus porrectis & extensis, & capite in neutram declinante, sed recta ad os vteri directo. Proxima huic, ubi in pedes manibus super utroque fœ more extensis, recta defertur. Aliæ omnes præter has duas a natura abhorrent: vt si caput in dextram aut sinistram vteri partem inclinat: vel si altera aut vtræque manus exseritur, cruraq; interius a se inuicem diducuntur. Aut si foetus altero pede prodit, altero interius retento. Aut si duplicatus alicui vteri parti innititur. Ob secundas partus redditur difficilis, si aut non auellatur ob crassitiem, aut priusquam opus sit propter tenuitatem abrumpatur. Tunc enim humor in vtero collectus ante congruum tempus excernitur. quare pudenda sine humore, siccaque in ipso partus tempore manent, cum necessaria est humiditas, quæ exitum lubricum & facilem foetui præbeat, atque adeo præ siccitate ægre foetus elabitur. Ab externis etiam causis pariendi difficultas oritur: a frigore nimirum, quod vterum densat, & meatus angustiores reddit: aut calore immodico, qui vires dissoluit. Causæ quidem externæ laborantis, & assistentium sermonibus cognoscuntur. Imbecillitas vero patientis, veluti pinguedo, ex corporis habitu facile deprehenditur. Ex morbis etiam præcedentibus prompte imbecillitatis notitiam, & nonnullorum aliorum vitiorum veniunt. Foetus imbecillitas ex debili actarda motione cognoscitur. Qui si mortuus fuerit, a motu protus cessat, ventris frigiditas adest, atque dolor iuxta umbilicū grauis. Spiritus exhalatur foetidus, faciei color prauus. Magnitudo autem foetus ex parentum corporis constitutione, ac ventris patientis mole coniicitur. Crassities secundæ inde colligi potest, quæ prædictorum signorum nullum adsit, & parturiens robusta, facilisque foetus motus sit. Porro quod ad curandi rationem attinet, variatur quidem iuxta causarum diuersitatem. Obœsam itaque mulierem in lectulo pronam, hoc est in caput propendentem, & vultu in terram

- A** in terram deiecto, figurare oportet, flectentem inclinātemue genua ad fœmora, quo vterus ad abdomen tendens, e directo oris sit. Digitis vero pinguedinibus (verbi gratia) *butyro, oleo, axungia anatis, gallina, & similibus delinire os vteri oportet, & sensim dilatare.* Timidæ vero addendus animus. Inexpertam autem dolorum partus admonere, vt validissime spiritum comprimat ac contineat, & ad ilia validiore conatu prortudat. Si autem difficilis partus ex adstriptione, stupore, aut veluti fœtus ad arctatione oriatur, relaxatione succurrendum erit, infundendo largiter oleum dulce & calidum. Item decoctum fœnogræci, aut maluz, aut seminis lini, aut etiam oua, quod leniendi facultate prædita sint. Dein & pubem cum abdomine & lumbis prædicto decocto, aut alio relaxante medicamento fouere oportet. Proderit etiam in sessionibus calidis & euaporationibus, tum aere domus ad caliditatem vergente, tum infusionibus, & illitionibus ex oleis tactu & virtute calidis, cataplasmatisque conuenientibus vti. Quod si neque febris, neque quippiam aliud obstitit, balnea relaxantia adhibere oportet, mouereque patientem gestatione in sella, in aere mediocriter calido. Nonnulli & in his corporis quassationibus violentis vtuntur. Quod si aliqua debilis fuerit, & difficilem partum ob resolutionem habeat, densantibus & contrahentibus, atque cum quæ reficiunt, & robur addunt cibis & potionibus refocillanda: quales sunt in sessiones, & asperusiones ex *myrto, pampinis, vitis, malis punicis, rosis, aceti odore, & illitione ex vino, oleo rosæ mixto frigido.* Vbi infans præmagnus fuerit, ei adhibenda quæ dilatare & laxare os vteri possunt. Si vero ex præternaturali fœtus figura difficilis partus contingat, ad naturalem quantum possibile fuerit, ducendus est figuram, partim pellendo, partim adducendo, partim flectendo, partim in rectum agendo. Et si manus pesue præmittitur, non attrahere membro prehensum oportet: magis enim firmatur ac impingitur: vel luxatur, vel abrumpitur: sed digitis humero vel coxæ fœtus innixis, rursus id quod prominet in conuenientem locum diducere. Porro si cum oris vteri compressione, totius infantis indecora fuerit figura, sursum prius ipsum ab vteri ore sublimem detrudere consilium est, deinde prehensum iterum ad os dirigere. Si autem gemini, aut terni, pluresue fuerint, ac ceruicem vteri obsederint, reliquos propellere ad fundum vteri oportet, & eum, qui magis paratus videbitur, prius educere. Verum si non procedat, quod infans mortuus sit, aut caput nimis magnum, vel aliam ob causam, ad fœtus extractionem seu sectionem, quam Græci *ἐμβρυοτομία* appellant, veniendum est. Eam autem copiosissime Aetius libro decimo sexto, capite vigesimo tertio, & Paulus libro sexto, capite septuagesimo quarto, tradunt. Neque enim manualet curandi rationem docere instituimus. Porro si fœtus tunica, seu secunda crassior fuerit ac solidior quam vt rumpi possit, dissecanda erit. Quibus autem humor in tunicis contentus, ante congruum tempus effluerit, ita vt loca exaruerint, ouorum albuminibus cum maluz aut fœnogræci decocto excolato, aut prifanz cremore tepido perfundemus. Medicamentum vero quod in vniversum omnes difficulter patientes iuuat, est hoc quod habet: *Cinnamomi electi, drachmas duas. Pulvis optimus ad dissecandam partem.* *Myrrhe, casie lignee vocata, vtriusque scrupulum vnum. Succini candidi, drachmam vnā & dimidiam. Poliorum dictamni cretensis, drachmam vnā.* Terantur singula, & fiat pulvis subtilissimus, de quo in vino odorifero detur pondus drachmæ vnus. Porro fœtu excusso, frequenter accidit, vt secunda in vtero firmiter adhærescat. Quod si euenit, tum interdum os vteri apertum, interdum clausum reperitur, secundaque ipsa nonnunquam vteri fundo adhuc coniuncta, nonnunquam seiuncta est. Si itaque os vteri diductum fuerit, & secunda quæ inibi relicta est alicui parti vteri orbiculatim, ac pilæ modo conuoluta inhæserit, facile educitur. Manu siquidem sinistra calida, pinguique illita in fundum demissa, secundam sublabentem extrahere oportet. Si autem fundo vtero sit connexa, demissa simili modo manu calida, & pingui inuncta apprehensam secundam trahemus: non tamen in rectum, ne vterus procidat, neque violenter admodum, sed leniter ac placide, primum in obliquum deducemus, hucaque illuc circumagentes, deinde paulo validius attrahemus: hoc enim pacto obsequuntur, & a connexu soluuntur. Quod si vuluæ os clausum fuerit, perfusionibus vtetur, & sinistra manus digitis leniter aperire, & paulatim dilatare conabimur. Quod si non successerit, mulieris pubi fomenta, perfusiones, vnguentaue emolliētia & relaxantia adhibere conuenit. Si robusta fuerit, eo tempore etiam sternutamenta ex castoreo, pipe-

re, & similibus confecta natibus admouenda. Hinc est quod Hippocrates s. Aph. 49. A sic scriptum reliquerit: *ut secunda procidat, sternutatorio appposito, & nares apprehendito, & os.* Potiones denique ex earum numero, quæ menses prouocant, propinandæ. Quæ quidem omnia primo aut altero die peragenda sunt. Præterea suffitu vtendum, decoctis in olla *artemisia, iride, sauiua, pulegio, calamintha, dictamno, & similibus*, olla sellæ supposita, cui mulier vestimentis vndiquaque circumsepta infideat. Postea si os vteri apertum inuenimus, manu inserta, secundam sicut prædictum est, educere enitemur. At si non obediatur, dilaceranda non est, haud multus enim postea diebus putrefacta, & in saniem soluta excidet. Quia vero odoris grauitate & caput replet, & stomachum putrefacta euerit: odora menta iugiter suffiendi sunt, quæ huiusmodi vitia aduersantur, & secundam subducunt. Ad quos vsus excellunt, *cardamomum, bdellium cum sauiua, thus, styrax, ladanum, lignum aloes, & id genus alia.* Lapis etiam Gagates per fistulam, quæ ori vteri subditur suffitus, mirabiliter prodest. Conueniunt & simpliciora ex iis, quæ menses ducunt, *artemisia decoctum, & lauri bacca cum vino mulso.* Pessuiositem conficito ex *myrrha & cyclamino, cum oleo mixtis.*

Odora-
menta.

De Ischiade. CA P. LXV.

Ischias. *I*stius Græcis proprie dicitur dolor grauissimus, qui circa iuncturam, quam Græci, *ἰσχίον*, Latini *coxam* appellant, accidere solet. Vitium hoc Latinis *ischias*, atque *coxendix*, & qui eo affliguntur, *ischiadici* nominantur. Barbari *sciaticam*, & eo laborantes *sciaticos* vocant. Fit propter crassum pituitosamque humorem, qui in coxarum articulo concretus infidet. Ideoque ischiadis generationem non parum adiuvant assidue cruditates, & immodicus rei Venereæ vsus. Aliquando etiam deambulationes concitiores, & hæmorrhoides suppressæ, & vomendi consuetudo intermissa, & purgationes menstruæ, aut etiam aliæ familiares ac consuetæ excretiones impeditæ, exercitiorumque neglectus. Hæc singula pituitosi humoris copiam conciliare possunt. Antecedit autem, & quasi auspiciatur hoc vitium, aliquando quidem vicinorum musculorum dolor, & maxime lumborum. Aliquando vero ab ipsa coxa initium fit. Iam vero etiam contingit, vt coxæ dolore sublato, circa poplitem solum afflictio hæreat: aliis autem iuxta talum, quibusdam vero totum crus æqualiter dolore afficitur. Multis item dolor circa inguina figitur, & tum sane vesica ipsa molestiam transsumens, vrinæ difficultatem inducit: & tunc maxime totum crus a coxendicibus vsque ad calcaneum dolorem perfert. Initium autem curationis fiat ab affligentis humoris vacuatione. Et si quidem humoribus ex æquo omnibus redundarit corpus, præ aliis omnibus remediis vena secanda in poplite, aut malleolo externo, si a laborante loco vacuare: sin vero auertere magis volueris in gibbero, Galeno libr. 10. de compos. med. secundum locos cap. 2. teste: idque in latere affecto. Nam interdum ischias vna die per hanc ex eruribus vacuationem curatur. Sin pituitoso atque crasso humore corpus refertum fuerit, a purgatione eius humoris auspicabimur curationem. In quem quidem vsum clysteres crebri exhibendi erunt, in hunc vel similem modum parati, quique habent. *Centaurei minoris, saluæ, verbasculi odorati, ruta, chamæmapitrys, singulorum manipulum vnum. Radix acori, unc. unam. Stachadis, drach. tres. Seminum anisi & fœniculi, vtriusque drach. duas & dimidiam. Agaxici optimi, drach. duas. Radix polipodii, drach. quinque.* Decoquantur singula in aqua iustæ quantitatis ad tertiis. Dein accipiantur iuris decocti, *uncia tredecim hieræ picræ, unc. dimidiam. Antidoti indi maioris, drach. duas. Olei liliacei, unc. duas. Olei rutacei, unc. unam. Vitellos ouorum duos, salis, drach. unam & dimidiam.* Commixtis omnibus fiat enema. Auxiliantur etiam ischiadicis vomitiones, atque magis vtrique quam vacuationes infernæ per ventrem, vt quæ humorem deorsum repentem appellant. Elicendi itaque sunt vomitus in principio, statim ab accepto cibo. Postea vero etiam vomitoria medicamenta, initio facta a mediocribus. In quibus autem vehemens humorum coactio, densatioque, quæ ægre dissolui potest, a Medicis intempestiue acribus medicamentis vtentibus facta est, iis cucurbitula quam maxima cum scarificatione affixa auxiliatur. Ceterum medicamentis fluxum reprimentibus, in ischiade non vtetur. Quum enim in profundo coxa sita sit, sanguis ex vicinis & ambientibus venis ac musculis ad illam pellitur. Mitigatoriis igitur in principio medicamentis opus est.

Ischiadici.
Causa.

Signa.

Cursio.

Clyster.

Vomitus.

Cucurbita magna.
Adstrin-
gentibus medica-
mentis in
Ischiade non vtendum.

Est in hoc dolore, quæ neque refrigerent multum, neque vehementer calefaciant. Vt enim ea, quæ refrigerant, ad coxam impellunt: sic quæ vehementer calefaciunt, aliam amplius materiam ex adiacentibus partibus attrahunt. Porro post venæ sectionem, aut per purgantia medicamenta vacuationem ad actia medicamenta, non ante, veniendum est. Si enim quis prius quam corpus vacuet, actia medicamenta ad laborantem particulam adhibeat, agere curabile vitium reddet, utpote multitudine ibidem indissolubiliter condensata. Præter alia enim crassa & viscosa fit, & ob actrium medicamentorum caliditatem & siccitatem non dissimile quidpiam assationi perpetitur. Affectum itaque locum primum ex oleo rutaceo irrigare oportet. Postea vero efficaciora ad mouenda medicamenta, quæ scilicet sensum calefaciant, & humores ex alto ad superficiem trahere queant, ut sunt *oleum vulpinum, de piperibus, costinum, iuniperinum: unguenta aregon, martiatum, & agrippæ. Item salvia, ruta, folia lauri, sambuci, ebuli radix, pulegium, sauina, opopanax, bdellium, ammoniacum, & similia.* Ex quibus subinde fomenta, vnguenta, emplastra, & cerata componi possunt. Principio itaque spongia in decocto iuniperi, aut saluiæ, aut foliorum sambuci madefacta, loco laboranti iterum atq; iterum imposita, hoc subinde vnguento vtendum erit, quod habet: *Vnguenti martiati, drach. tres. Oleorum irini, liliacei, utriusque vnc. dimidiam. Succirutæ, & chamæpityos, utriusque drach. duas. Mellis, drach. unam & dimidiam. Saluæ, pulegii, piperis, singulorum drach. dimidiam. Pyrethri, staphydis agriæ, utriusque scrup. unum.* Cera quod satis est, fiat vnguentum. Proderit etiam huius cerati vsus, quod accipit: *Oleorum costini, vulpini, utriusque vnc. duas & dimidiam. Olei de piperibus, vnc. dimidiam. Opopanacis, bdellii, styracis, singulorum drach. tres. Radicis bryonia, nitri, foliorum sambuci, singulorum drach. duas. Fumariæ Actii (rotundam hodie aristolochiam nominant) rutæ, utriusque vnciam unam & dimidiam. Euphorbii scrup. unum. Gummi in acerrimo dissoluantur aceto, ut cum resina terebinthina & cera quod satis est, fiat ceratum.* Quod si vitium adhuc remoretur, clysteribus denuo vtendum erit: & deinceps cucurbita quam maxima cum plurima flamma coxæ affigenda, vulnuscule etiam altioribus per scarificationem impactis. Quod si vero neque sic vitium finitur, ad purgationem vomitum, & alia, quæ supra dicta sunt, redeundum erit. Quibus peractis, ad dropaces & sinapismos, adeoque ad adurentium medicamentorum usum veniendum. Inter quæ non postremum obtinet locum herbæ iberidis radix recens, ætate effossa, & diligenter tusa, ac veteri axungia modica excepta, articulo coxæ, ac vniuerso cruri imposita & alligata. Idem etiam folia possunt. Sic vero admota incumbere finito, mulieribus quidem non infra duas horas, viris autem horis quatuor, si possibile sit id ipsum perferre. Excitat enim tumores cum ardore & rubore, ut sinapismus facere solet. Postea in balneum inducito ægrotatē, in quo ubi modice exsudauerit, in solium ob feruorem mordacius desiderare iubeto, idq; fortiter perferre cogito: morsum enim cum ardore initio inferre consuevit: deinde educito: ferme enim semper, *Actio attestante*, quamuis ab aliis fuerint importati, sua sponte pedibus ingredientiētes exhibunt. A balneo ad oleum multum, vinum paucum admodum admisceto, & conquassata illinito: ac humore cum aspero panno deterso, crus ipsum cum leuissimis lanis cooperito. Et sane cōsuevit hoc præsidium nullo alio inde auxilio indigere. Quod si tamen aliquādo vestigium vitii relinquitur, vicienis diebus interpositis, rursus eodē præsidio vtaris. Interiectis tamen dieb. ceratum paulo ante descriptū imponi potest. Porro inter medicamenta adurentia hoc etiam locum nō postremum obtinet, quod habet: *Mellis anacardini fermenti, utriusq; drach. unam. Cantharidum abiectionis alis, drach. duas. Aceti quod satis est: misceantur.* Et hoc quod accipit: *Euphorbii, nitri, utriusq; scrup. duos. Saponis, calcis vine, utriusq; drach. unam. Mellis anacardini quod satis est, ut ad mellis cōsistentiam omnia commixta redeant.* Ceterū vitii ratio sit eiusmodi, ut cibis mediocriter tenuis existat, & cōcoctu facilis. Exercitia sint deambulationes, cōtinuæ flexiones, saltationes, & cursus. Aliū semper probe solutā habere expedit. Quod si vero vitium longius durauerit, nec prædictis medicamentis propulsari poterit, vitionē in trib. aut quatuor locis adhibere oportet, ad eum quidem modum quē docet Paulus lib. 6. cap. 76. & Aetius lib. 12. cap. 3.

De Podagra & arthritide. C A P. L X V I.

Podagra & arthritidis vitia eiusdem speciei sunt. Differunt itaque non toto genere, sed locis laborantibus. In utroq; n. articuloꝝ est imbecillitas, & humor a natura alienus ad hos ipsos confluens. Quod si in pedib. hæc constiterit fluxio, podagra appellatur. Sin

Arthri-
tis.

reliquos artus occupauerit, *ap. spinas* Græcis, hoc est, *articularis morbus* nominatur. Hoc vi-
tium interdum repente irruit, æqualiter per omnes articulos dispersum. Vt plurimum
vero clanculum & paulatim fluxus irruere solet. Alteri enim cuiusdam magni digiti pe-
dis articulum dolor inuadit: aliis vero calcanei extremum. Rursusq; aliis cauum pedis,
aut ex calciamenti, aut ex consimilis rei affricu. Initium podagra a pedibus sumit, vnde
etiam nomen sortitum est, paulatim ad genua procedit, ad coxendicum item ac fœmo-
rum iuncturas, deinde ad manus, singulis articulis particularim affectis. Qui vero ex-
treme ab hoc vitio apprehunduntur, iis & spinæ vertebræ & costarum iuncturæ, & ge-
næ dolent, aliquibus autem & guttur: neq; est aliqua ossium connexio, quæ ab hoc vitio
sit immunis. Generatur autem a cruditatibus assiduis, & ebrietatibus, vini fortioris, præ-
sertim si ieiunus id faciat, potionem, immodico rei Venereæ vsu, vehementi & concitatio-
re deambulatione, statione diutius extracta, equitatu crebro, cōsuetarum excretionum
suppressionibus, ac familiarium exercitiorum intermissionibus. Mœrores autem, curæ,
vigilæ, & reliquæ animi perturbationes, non hoc modo vitium suscitant, sed & noxios
quoque succos procreant. Nonnunquam etiam colicus dolor perperam curatus, causa
cur arthritis sequatur, esse solet. Quod palam testantur ea, quæ *libro 4. par. 4. Aphorismo 3.*

Causa.

Hippocra-
tes.

scribit Hippocrates in hunc modum: *Cuidam intestinum colum vocatum, simulatque articu-
lari morbo detinebatur, dolore vacabat. Postquam vero ab eo sanatus est vitio, plus doluit.* Cuius
quidem sententiæ vberiore explicationem in nostris commentariis offendunt stu-
diosi. Ceterum vt plurimum habilitas ad hoc genus vitii a parentibus in filios ac poste-
ros propagatur. In vniuersum autem amplius omnium crudorum humorum copia vi-
tii huius causa existit. Humores tamen superantes, qui se iuncturis inserunt, vel sangui-
nei sunt, vel biliosi, vel pituitosi, vel melancholici. Interdum etiam ex humorum com-
mixture vitium contrahitur. Porro causæ externæ facile de sermonibus ægri aut assidue-
tium cognoscuntur. Humor autem discrimina iis notis deprehendere licebit. San-
guineus quidem humor si multus fuerit, plenitudinem efficit & tumorem ingentem,
non venarum modo, sed totius partis affectu circa cutem, eumque rubentem. Qui hoc
vitio affliguntur, neq; refrigerantia, neq; calefactoria valde præsidia adhiberi sustinent,
& assidue exacerbantur, quandoquidem assidue & æqualiter sanguinis defluxus cōtin-
git. Urinæ eorum fuluæ sunt, & mediocri præditæ crassitudine. Venæ etiam in his co-
piose suscepto sanguine replentur, & in tumorem attolluntur. Ætas vero apta huic vi-
tio iuuentus. Edulia item boni succi, & copiose nutrientia præcesserunt, neglectusq; ex-
ercitiorum. Tempus vero, in quo affliguntur maxime ægrotantes, est ver ipsum. Porro

Signa.

Sanguini
dei deflu-
tus.

Bilios.

biliosum defluxum color cutis sufflaues ostendit. Interdum vero rubor cum flauo per-
miscetur colore, vbi videlicet flaua bilis sanguini commixta est. Item caloris sensus, do-
lorisq; lancinantis modo acris. Humor quoq; in cutem subito sine euidenti tumore e-
rumpens. Refrigerantibus medicamentis sic afflicti gaudet & iuuantur, a calidis autem
offenduntur. Febris in ipso accessionis statu accedit, validaq; siti conficit. Urina eorum
subfulua, quandoq; etiam acris. Curæ autem ingentes, & iræ, & vigilæ, & fatigationes,
& in summa, victus ratio bilem procreans, præcedere solent. Ætas, temperamentum,
& tempus, calida & sicca, ad eum defluxum apta sunt. Quod si pituitosa sit fluxio, ad di-
gitorum impressionem cauus fit tumor, subluxus & moderatus. Color membri male af-
fecti candidus. Ætas hoc modo magis afficitur senilis, temperamentum humidum & fri-
gidum, in consimili aeris statu, & tempore hyberno. Urina tenuis est & aquosa, præceditq;
otium, & victus ratio, quæ pituitosum humorem progignit. Si autem salsa fuerit pituita,
pruritus maximus & mordacitas partes laborantes infestat. Si ex melancholico succo
fuerit fluxus, q; raro tamen contingit, color tumoris nigrior est. Ætas quæ magis hunc
fluxum generat, est vigoris inclinatio. Temperamentum item frigidum & siccum, tem-
pus autumnii, regio frigida & sicca, aeris consimilis status, victusq; atram bilem gignens.
Porro cum sanguinei humoris fuerit influxus, protinus sanguis mitti debet, non solum
semel, sed iterum atq; iterum, detractione paulatim repetita. Si enim venæ sectione o-
missa, repellentibus medicamentis fueris vsus, magni mali auctor eris: ex ignobilibus e-
nim partibus ad principes, & vitæ necessarias repulsus irrues. Quapropter summe neces-
saria est sanguinis in sanguineis influxionibus vacuatio, præsertim in his qui sanguine re-
dundant. Secunda est autē vena in brachio inferne e directo cruris inflexione infestata.

Pituitosi
defluxus.Melan-
cholici
humoris
influxus.Curatio
sanguinei
humoris.

Quod

- A** Quod si vero manus dextra dolore afficietur, venam in dextro crure secamus iuxta poplitem, aut talos, aut plantam pedis. Habet enim miram vim vena e directo membri affecti, *Galeno & Actio lib. 12. cap. 23.* testibus secta. Quod nos alibi etiam copiose demonstrauimus. Tum vero potissimum sanguinis missio ceteranda erit, cum quempiam virium hoc primum inuadere coepit. Qui enim saepius huiusmodi defluxione sunt conflictari, plus noxae quam auxilii ex sanguinis detractioe sentiunt, praesertim si corpore sint imbecillo ac frigido. Post missionem sanguinis laboranti particulæ remedia adhibere Localia oportet, quæ neque valde refrigerant, hæc enim humores cogunt ac condensant: neque immodice calefaciunt, hæc siquidem caloris ratione ad partes laborantes plus attrahunt. Quapropter aceto veteri cum rosaceo locum affectum rigare oportet, praesertim
- B** si in alto herere dolorum causa videatur. Etenim acetum propria sua tenuitate usque in altum progressum expeditam rosaceo viam exhibet, quod natura sua lenire dolores potest. Si vero in superficie dolor consistat, per vini & olei usum magnopere iuuetis æstate quidem repidorum, hyeme vero calidorum. Deinde cataplasmatibus quoque utendum, quæ dolores lenire possunt, absque hoc ut fluxiones prouocent, ex farina fœnograci, hordeacea, fabacea, lapinorum chamæmelo, & similibus. Oportet autem, ut ea semper calida omnino sint: id quod commode fieri potest, si assidue permutantur, & lana forinsecus contegantur. Non parum proderit & hoc medicamentum, quod habet: *Lactis caprini, aut ouilli, vnciam dimidiam. Vitellos ouorum duos, olei rosacei, vnciam vnam. Croci, drachmam dimidiam. Medulle panis, quod satis, ut recipiat cataplasmatibus formam.* Hæc itaque terantur,
- C** donec vniantur, & vnita tandem membro dolenti imponantur. Potest quoque ex oleo rosaceo, aceto, resina, cera, galbano, ammoniaco, thure, croco, & similibus componi emplastrum, aut ceratum. Tale enim repulsoriam vim, propter crocum & acetum tum obrinet: concoctoriam vero, discussoriam & moderate siccantem, rursus propter crocum & aliorum commixtionem. Ceterum cibos ei adhibere oportet, qui extenuant, & parum nutriunt: quales sunt olera. Carne autem, nisi volucrum montanarum, prorsus abstineant. Piscibus utantur saxatilibus. Vinum si fieri per intemperantiam ægrotantium potest, ex toto circumcidendum: nam hæc fere vnica ratio est, qua sanitas consequitur. Quam cum ex millibus vix vnus sequatur, nihil mirum, paucos admodum esse qui ab hoc vitio hodie liberentur. Fuisse autem qui abstemii ab hoc vitio sese asseruerint notius est, quam ut a me pluribus dici debeat. Non est igitur cur nostri temporis Chymici, homines indoctissimi, & ad fallendos tantum miseros nati ac nugis egregie instructi, nobis obiciant, methodica ista curandi ratione, quam Hippocrates, Galenus, & alii veteres posteritati memoriæ prodiderunt, nullos plane curari podagricos. Quomodo enim hæc ipsa eos curaret, qui illam despectui habeat, & voluptatibus suis obsequi magis in animum induxerunt suum. Quum igitur Galeno etiam viuentis, & medicinam faciente, hoc nomine multi curari non potuerint, quid mirum si hodie in ista vitii rationis corruptela, nullus fere curetur. Non est tamen quod impostores illi sibi persuadeant, de suis arcanis: quæ recte ita appellantur, quod neque a se neque ab aliis intelligantur: hoc vitii genus curare queant. Testatur enim quotidiana experientia, quod nullo recte curant, sed eos vel mox interimunt, vel fucata curatione lætant: ut paulo post, redeunte morbo, magis excarnificent, aut in deteriorem morbum coniciant. Hortor igitur omnes, qui ad rerum gubernacula sedent, ut a somno profundo excitati, in hos nebulones, tanquam humanæ vitæ pestes, grauitèr animaduertant, & prorsus cõculcent. Quod ni fecerint, Deo in extremo iudicio rationem reddituri sunt grauissimam. In vicem vini utendum aqua, in qua cinnamomum, anisum, aut similia decocta sint, aut certe ea potione, quæ hodiernis temporibus ridicula atque insulsa voce, *Hippocras* nominatur. Eius confectioem petent studiosi e cap. de resolutione. Fructus & Venerem diligenter caueant ægrotantes. Alium præterea facile solubilem, ac sua sponte deicientem habere eosdem oportet. Quod si tamē officio suo parum recte fungatur, simpliciori aliquo clysteri eluatur. Vbi vero propter bilis influxum dolores excitantur, tunc Cur pauci hodie a podagra liberantur. iis communis scopus humoris affligentis est vacuatio, quæ tum per vomitum, tum per ventrem fieri debet. Per medicamenta itaque bilem ducentia cõfidenter purgandi sunt sic afflicti. Deinde usque ad vigorem apponenda medicamenta, quibus refrigerandi & adstringendi facultas inest: qualia sunt, quæ ex semperuino, rosis viridibus, rumice acuto, solano, plantagine, & similibus, iam saepe commemoratis apparentur. In hoc influxus genere
- E**
- F** Bilio fluxus cõfatio.

Stupeſa-
ſcientia.

nonnunquam propter doloris vehementiam, iis quæ ſtuporem inducere poſſunt vtendum medicamentis. In quem quidem uſum conuenit adhibere medicamentum, quod paulo ante deſcripſimus, ex lacte caprino, medulla panis, croco, & ouorum vitellis conſtans, cui ſeminis papaueris, drachma dimidia, aut opii, drachmam dimidiam, aut plus, aut minus, pro ratione doloris admixtum ſit. Proſunt etiam in eundem uſum cicuta ſolia; & hyoſciami, impoſita & adhibita. Sed animaduertendum erit, vt cum in feruentibus doloribus ad ſtupefacientium uſum fuerimus coacti, poſtea reſoueamus partes per ea, quæ calefaciunt. Niſi enim idipſum fecerimus, debiles & intemperatas atque adeo perpetuo fluori obnoxias partes reddemus, & vt in actionibus facile offendantur efficiemus. Calorifica vero ſunt, origanum, ſatureia, ſinapi, piper, & id genus alia. Porro adiuuare etiam oportet ſudorū excluſionem, corpus calefaciendo & fricando, ita tamen, ne locos affectos contin-

Viſus.

gamus. Præbenda denique in potu ea, quæ vrinam cient. Nam talia bilem per vrinam vacuant. Soporem quoque inducentia, quod fluores ab ipſis reſiccantur & ſiſtantur: atque id maxime, ſi poſt corporis purgationem exhibeantur, conferre ſolent. Cibi illis dandi refrigerantes, non tamen humectantes: humiditas enim auget fluxionem. Famem & inedia ne tolerant: nam bilem actiorem reddunt. Ex fructibus, vtantur pomis adſtringentibus & meſpilis, aliſque quæ refrigerant, & ſimul fluxus cohibent. A vino prorsus, vt priores, abſtineant. Qui ob pituitæ influxum ægrotant, horum curationem a pituitæ vacuatione auſpicari oportet. Euacuatur autem humor pituitoſus per vomitus, nihilominus tamen & inferne per ventrem. Vtilior vero in hec vitio per inferna purgatio, ſiue iuxta manus, ſiue iuxta pedes hæreat morbus: & multo magis, ſi iuxta omnes corporis articulos fluxus conſiſterit. Familiarior enim pituitæ via, & minus periculosa per inteſtina exiſtit. Si enim in ſuperiorem ventrem violenter attracta non vacuetur, periculum inducit. Quapropter tutius eſt, vt ad infernam excretionem ducatur. Anteramen purgantia medicamenta, ea quibus incidendi & extenuandi facultas ineſt exhibenda, vt hac ratione ad purgationem craſſi humores præparentur, & idonei reddantur. Si vacuatio per purgationes fieri haud poteſt, tum inedia ac fame vtendū eſt ad plures dies. Qui n. natura pituitoſi ſunt, eam facile & citra noxam tolerare poſſunt.

Pituitoſi
fluxus cu-
ratio.Pituitoſi
famem fa-
cile ferūt.

7. Aph. 60.

Nam pituita in iecore contenta ex dimidio, coctus ſanguis exiſtens, in fame & inedia concoquitur, & in optimum ſanguinem mutata in venas rapitur, partibusque corporis alimentum præbet. Hinc recte ab Hippocrate dictum eſt: *Corporibus carnes humidus habentibus, famem adhibere conuenit. Fames enim corpora ſiccant.* Vtendum etiam frictionibus diſcuſſoriis ampliusque efficaciſſimis clyſteribus, & medicamentis vrinam cientibus. Ceterum extrinſecus medicamenta, quæ dolores leniunt, & quæ diſcutere ac moderate reſiccare poſſunt, adhibenda, de quib. paulo ſupra diximus. Illis vero in morbi principio aliqua quibus adſtringendi potentia eſt, commiſcenda. A principio autem ſolis diſcutientibus vtendum. Manſuetiſſimum vero hoc, quod habet: *Althea ſolia cocta trita, tum per ſe, tum cum polline aut hordacea farina impoſita. Radix prætereæ eiſdem cocta in aqua mulſa trita, & impoſita confert.* Et hoc vnguentum, quod accipit: *Oleorum laurini, & irini, vtriuſque vnc. vnam. Adipis ſuilli, veteris butyri, vtriuſque drach. tres. Medulla ceruina, drach. duas. Reſina terebinthina, drach. quinq. Galbani in aceto diſſoluti, drach. vnam. Hyſſopi, radicis althea ſeminis ſenogræci, ſingulorum ſcrup. duos.* Cerę, quod ſatis eſt, fiat vnguentum. Porro quæ ratione nutrimenti præbentur edulia, natura ſicciora ſunt, & minus nutriunt: vt eſt *oryza ſuccus, auena, & eiſmodi.* Carnes tamen auium montanarum aſſæ iis haud incommodant. Cappares ex aceto mulſo mirifice proſunt. Vinum autem præbeat quam minimum, interualli tempore, tenue, fuluum & vetus. Qui melancholici humoris fluxionibus moleſtantur, ii venę ſectione, aut purgatione ſunt vacuandi. Venę quidem ſectione, quando ſanguis melancholico ſucco inteſtus eſt. Purgatione vero, quādo melancholici ſunt ægrotantes. Si vero ambo hæc ſimul redundarint, non vnum aliquod ex prædictis adhibere ſuffecerit, ſed prius ſecta vena, deinde medicamento purgante vtendū. Quod ipſum & in aliis vitiis duplici vacuatione indigentibus faciendum erit, vt in lib. 2. *Paradoxorū* noſtrorum abunde monſtrauimus. In principio autem morbi, & in ipſo vacuationis tempore, reprimentibus & ſimul ſenſim calefacientibus vtendum eſt. Poſt vacuationem vero iis, quæ leniter calefacere, attenuare, & diſcutere poſſunt, de quib. ſupra ſatis ſuperque dictum eſt, Ceterum quoniam topi & duri tumores, ſubinde in articulis creantur, modo

Vnguentum.

Viſus.

Tophorū
curatio.

propter

- A** propter humoris qui ad eos decubuit crassitiem, terrestremque duritiem: modo propter immodicum discutientium & resiccantium medicamentorum, sine eorum quæ molliendi facultate pollent mistura: ideo ad eos remouendos iis, quæ in cap. de lienis duritia a nobis producta sunt, medicamentis vtendum. In primis vero confert vetustissimus acerrimusque caseus, cum suillæ carnis præpinguis & veteris decocto contritus & impositus. Ad hoc malum conducunt etiam *ficus iriti & impositi*. Item *althæa bus cocta, auena, vrtica, bryonia radix, bulbi, aneti, abrotoni, buphthalmi, marrubii que folia, cum pice & sulphure viuo permixti*. Admiscendi etiam *adipes, suillus, caprinus, vitulinus, & anserinus. Medulla item omnes, & alia quæ emolliendi vi prædita sunt*. Balneum sane, ne id quidem silentio transeamus, post phlegmonum remissionem omnibus podagricis commodissimum existit. Dum lauât, **B** spongiæ aceto & sale permixtis madefactæ, locis laborantibus circumponendæ, vt a fluxione immunes permaneant. Lauare autem eos non semel tantum, sed iterum atque iterum in aere per omnia moderato oportet. In aqua tamen calida nō diutius morandum. Consultissimum itaque, vt aqua calida perfundantur. Vtile quoque, vt totum corpus linteis siccis perfriceretur. Præterea curati a podagra, hac se ratione a podagra deinceps tuebuntur. Si primum bis in anno, vere nimirum & autumno, modo nihil sit quod id ipsum prohibeat, sanguinem large detraxerint. Deinde si iisdem temporibus, & crebrius etiā, medicamentis purgantibus vsi fuerint. Porro cibis, vt etiam aliquid demant, & a satietate sibi caueant, necesse erit. Vtendum autē cibis concoctu facilibus, & qui promte in partes corporis distribunatur, excrementisque vacent. Vino aut prorsus abstinendum, aut parce admodum vtendum. Exercitiorū creber sit vsus, idque ante cibum. Labores enim, vt Hippoc. noster prucipit, cibos præcedant. Et vt rem vniuersam in pauca contraham, qui a podagra immunes esse cupiunt, hoc vt breuissimum, ita & saluberrimum Hippocratis præceptum secum reputent: *ἀσθενὲς ὕπνῳ, ἀσθενὲς ἐν τρεῖσι, ἀσθενὲς πρὸς τὸν πότον*. Quod est: *Sanitatis studium est, non satiari cibis, & impigrum esse ad labores*. Somnus etiam & Venerea, vt idem docet, sint mediocria. Quod ad præsidiorum partem attinet, sal minutim in oleo tritus, & articulis affricus, omnes qui se ab hoc vitio vindicare volunt, magnifice iuuat, nisi præter modum sicca intemperie sint præditi: eoque illitu & mane & vespere per totum vitæ curriculum vtendum est. Causam eius rei exponit Galenus lib. 2. de simp. medica facul. cap. 14.

An balneum conducat podagricis.

Quomodo quis a podagra se tueatur

6. Epid. par. 4. Aph. 28. 6. Epid. par. 24. Aph. 28.

LEONHARTI FVCHSII DE SANANDIS FEBRIBVS, LIBER IV.

De Diaria. CAP. I.

- D**IARIA febris, quæ Græcis *ἡμερῆα* dicitur, ea est, quæ vnicam habet accessionem, vno vt plurimum die, ex ipsius saltem natura, circumscriptam. Desistit enim post primam accessionem, nec integrum diem excedit, si quis eam recte tractet, idque propter materiam, in qua subsistit, nempe spiritum, qui facillime discutitur. Hinc recte a Galeno li. 1. de ratione curandi ad Glauconem *simplicissima* vocatur, quod scilicet breuissima, placida, minimeque maligna sit. Quare quæcunque, vel per Medicorum ignorantiam, vel ægrorum intemperantiam, vel ministrantium errorē in eiusmodi febre cōmissa, in aliud ipsam genus transferunt, ea non suæ naturæ ratione eueniunt. Est autem Galeno lib. 9. Ther. meth. auctore, duplex diaria: Vna, quæ simpliciter & citra adiectionē sic appellatur, hæc quidē vltra vnius naturalis diei spatium, hoc est, horas viginti quatuor, nō extrahitur. Altera, quæ cum adiectione plurium dierū diaria nominatur. Galeno loco citato, *Synochus non putrida, vt sequenti cap. dicemus*, appellatur. Hæc in tertium vsque diem extenditur. Neque est cur quispiam miretur hanc febrem dici diariam, cum tamē de substantia eius, diariæ vocabulum non sit: in triduum n. vt iam dictum est, extrahitur. Quū n. proprio, atque adeo conuenienti nomine careat, clarioris simulque breuioris doctrinæ gratia, non obstante quod nomen aduersetur, cum natura huic eadem sit, quæ aliis diariis, vnicam namque duntaxat accessionem obtinet, rectissime diaria nominatur. Si quidem præter tria prima febriū genera, quorū vnū est in quo spiritus seu vapor plus iusto incalescit: alterum in quo humor putrescit: & tertium in quo solidæ corporis partes febrilem calorem, vt habitum susceperunt: quartum excogitare atque statuere genus

ἡμερῆα quid.

Simplicissima febris diaria.

Diaria duplex.

Diaria simpliciter.

Diaria plurium dierum.

Diaria triduum.

Diaria tria prima.

Diaria non putrida.

Diaria tria prima.

Diaria tria prima.

Cauſa. neceſſe eſſet; ſi non ſub diaria complecteretur. Oritur diaria febris, quum abſque vlla putredine ſpiritus præter naturam incaleſcit & ſuccenditur. Id quod multis modis accidit: nempe ob cutis conſtipationem ſeu denſitatem, quæ ſolitum effluuium vaporum & ſpirituum cohibet: quod quia calidum acreque eſt, ideo febrem gignit. Propter laſſitudinem ac vehementem fatigationem, itemque vigilias, cruditatem, triſtitiã, timorem, iram, curas animi vehementes, vſtionem a ſole, refrigerationem, famem, ebrietatem, adenum tumores, aliaque ſimilia, quæ ſpiritus accendere poſſunt. **Signa.** Signa vero quibus deprehenduntur diariæ, duplicia ſunt: quædam enim omnium diariarum communia: quædam autem particularia. Communia quidem ſex numero exiſtunt, quorum vtrique primum eſt pulſus. Omnes autem diariæ, *Galeno lib. 3. de prædictionibus & pulſibus auctore*, in magnitudinem celeritatem, frequentiamque, quantum in iſtis eſt, pulſus mutant. Exquiſite vero ſeruant eam, quæ ſecundum naturam eſt æqualitatem, mollitiem, & ordinem. Alterum ſignum commune, vrina eſt, quæ eam omnino, quæ ſecundum naturam ſe habet imitatur, aut a naturali ſtatu parum deſlectit. **Vrina ſecundum naturam.** Vrina vero ſecundum naturam, colore quidem ſubrufa, & ſubſtantia mediocris, in qua, quod reſidet candidum, leue, ac æquale eſt. *Tertium*, eſt caloris qualitas, quæ in omnibus diariis febribus ſuauiſ & mitis exiſtit. *Quartum*, ſolutionis modus. Siquidem ſingulæ ſoluuntur in halitum, qui ſenſum effugit: aut copioſos vapores, vel madores, vel ſudores ſuaues. *Quintum*, deſectus malorum ſymptomatum: verbi gratia, vehementis doloris capitis, & ventriculi, & aliarum partium, ſaſtidii ciborum, inquietudinis ſitis inexplibilis, & id genus aliorum. *Sextum*, quod omnes diariæ a cauſſa extrinſeca, quam primitiuam hodie Medici appellant, oriuntur. Quæ ſingula fuſius explicat *Galenus libr. 1. ad Glauconem, cap. 2. & libr. 1. de differ. feb. cap. 7. Nec non libr. 2. de iudiciis, cap. 13.* Porro ſigna quibus quæuis diaria particularim cognoscitur, hæc ſunt. Qui ex peruiſiſ febribus, hos vitioſus color ſequitur, & faciei tumor, grauiſq; oculorum motus: vix enim palpebras attollunt: humiditas palpebrarum, pulſusq; exigui. Siquidem vigilæ, cum concoctionem impediunt, *Hippocrate lib. 2. de victu acut. morb. aphor. ult. teſte*, humorum ac vaporum crudorum copiam pariunt, innatum calorem imminuunt, corpusq; reſoluunt: vnde conſequitur vitioſus color, faciei tumor, palpebrarum humiditas, earumq; mouendarum difficultas. Per vigilias enim cerebrum ſenſusq; inſtrumenta aſſidue exercentur, vnde plus facultatis & ſpiritus animalis abſumunt: quibus tandem reſolutis, & in actiones obeundas inſumtis, vitales ſpiritus antequam integram elaborationem ſint experti, aſſidue alliciunt. Quid multa? vigilie naturam a coquendi munere auocant: quocirca magnam cum in reliquo corpore, tum in cerebro cruditatem relinquunt. Ceterum fatigatis animalis facultatis inſtrumentis, caput imbecillius redditur, vnde cruditas, & natiui caloris imminutio ſequuntur. Ex quibus rursus fiunt vitioſus color, tumor faciei, palpebrarum humiditas eorumque motus grauitas: ſcilicet reſoluta facultate, & vaporis humorisq; copia degraunte. **Curæ & mœroris.** Curæ & mœroris ſigna, corporis macies, ex mœrote luculētior, ex curis obſcurior. Quoniam in mœrore intro reuocantur ſpiritus, vbi facile ob loci caliditatem accenduntur & diſcutiuntur, humorq; in vapores diſſipatur: vnde corpus temporis ſpatio exſiccatur, emaciaturq;. In curis vero ac cogitationibus ad caput feruntur, in quo minus ob caloris penuriam, quam in interno corpore abſumuntur. Minus enim ob loci frigiditatem inflammantur, & reſoluuntur. Proinde corporis habitum minus exſiccant, ac extenuant. Oculorum quoq; cavitates & ariditas vtrunq; affectum ſignificant. Sed in curis & cogitationibus minor, quia ſpiritus & humores minus abſumuntur. In mœrore autem maior, ob loci caliditatem, ſpiritus & humores reſoluentem. Inſueta quoq; decoloratio quædam hos affectus ſequitur, ſcilicet cute ipſa natiuo calore. Qui per iracundiam furoremque febricitant, iis neq; oculorum cavitates aſſeſt, neq; vitioſus faciei color: ſed magis oculi prominere videntur, ſcilicet delatis eo ſpiritus. ipſos diſtenduntibus. Hac ratione facies non decoloratur, ſed rubet, vt in quam ſpiritus & humor cõfluat. Cũ iis calor e corporis profundo foras emergens, non ſolũ illuc, ſed ad vniuerſam cutem fertur, vnde pulſus magnitudo perſeuerat. Sic reliquarum etiam diariarum ex animi perturbationibus natarum ſigna, e pulſu maxime petenda ſunt. **Triſtitia.** In triſtitia enim ſpiritus intro feruntur, ſed non aſſatim, ibiq; coarctantur, ac velut ſuffocantur: nec rursus vt in iracundia foras ſparguntur, ſed ſeſe accendunt, ac conſumunt, vnde temporis progreſſu humiditas abſumitur, & virtus conſopitur, obruitur, deſeſque

- A**lesquereditur. Eam ob rem pulsus parui fiunt, languidi, rari, quia neque necessitas vir-
get, neque valida facultas est. In timore recenti celeriter intro velut ad suam scatebram mo-
uentur sanguis & spiritus; mens quoque conturbatur. Natura enim commoto, atque ut sibi
provideat sollicita, modo huc, modo illuc impellit spiritus, qui motu accenduntur:
vnde fiunt pulsus celeres, urgente scilicet necessitate. Mens vero concitata, in æqua-
les ac vibratos reddit. In inveterato autem dissipatis spiritibus, virtuteque languescen-
te, pulsus quales in tristitia esse monstravimus, redduntur. Qui ob solis visitationem æ-
stusque febricitant, iis cutis sicca est & calida, ut quam suo contactu solis ardor exsic-
cavit ac calefecit. His caput deuri videtur, propter spiritus accensos. Oculi rubicun-
diores, vaneque iis in oculis, temporibus, fronte, & tota facie interdum extenduntur.
- B** Qui ex frigore febricitant, ii grauedinibus & destillationibus corripiantur, quod sci-
licet frigus constringat, & intra cutem fumosa excrementa detineat. Cutis denique
eorum minus calida, corpusque totum maiorem præ se fert humorem, quod solitus
effluxus frigore cohibeatur. Præterea nullus in facie squalor, eandem ob causam.
Quibus lassitudo febrem attulit, iis cutis aridior quam in aliis diariis redditur, quod
scilicet exercitatio corpus exsiccet, eiusque humiditatem exhauriat. Pulsus quoque
iis dissimiles sunt. Supra modum enim exercitati & defatigati paruos, ob virium im-
becillitatem, obtinent pulsus. Qui autem exiguos labores subierunt, quod iis non-
dum vires collapsæ sint, magnos. Qui ob temulentiam aut famem diaria corripun-
turi, ii ad digestionem nullis notis indigent, de sermonibus enim ægrotantium eius-
- C** modi causæ deprehendi possunt. Qui ex adenum tumoribus febricitant, pulsus ha-
bent maximos: quia virget necessitas, id est, febrilis calor, necessitati que morem gerit
facultas. Hinc celeres etiam & crebri sunt. Pulsus quoque huius est æqualitas, quod mo-
uendi instrumentum non sit impeditum neque obstructione, neque humorum vel va-
porum aerium abundantia, neque compressu, nisi sit admodum ingens phlegmonie.
Calor iis multus, & a vigore statim humor quidam ex alto corpore ad cutem fertur
calidus, sed tamen suavis. Fit enim a materia benigna, quod nihil acrimoniæ eiusmodi
febres habeant, cum solus bubonis calor, non etiam fumus putris ad cor permeet. Fac-
ies his omnino rubicunda, ac tumida, propter caloris abundantiam. Et vrinæ subal-
bæ apparent, quia materia quæ vrinas colorationes reddere debebat, ad bubonem
- D** translata est, & quia caloris suauitas sanguinem ultra modum non calefecit, ideo
nec bilem, quæ vrinæ colorem addit, procreauit. Curandi ratio diarium febrium
per victus rationem perficitur, cuius quidem in omnibus diariis simpliciter nomina-
tis communis scopus est; *Galeno lib. 8. Ther. meth. cap. 2. teste*; ubi cibi boni succi, &
concocti faciles, ac distributioni idonei præbeantur. Vitis quidem a sole, & iratis,
qui refrigerent & humectent. Refrigeratis, qui minus nutrant, & moderate calefa-
cant. Vigiliis, aut tristitia, aut nimia confectis cura, qui humectant pariter ac so-
mnium conciliant: ut a siccitate, quæ ab iis iniuriis illata est, vindicentur, præterea ut
vires recreent. Qui ex fatigatione febrem contraxerunt, iis tantum cibi permitten-
dum, quantum concoquere possunt: semper enim vitanda cruditas est. Siquidem
- E** labore dissipata corporis substantia, vberiore cibo, & concoctu facili reparanda
est. Modum autem cibi sumendi metiri oportet viribus, ætate, naturali tempera-
mento, & consuetudine ægrotantis. Præterea tempore anni, regione, & id genus a-
liis. Ceterum in quibus corporis temperatura calidior & siccior est, hos in primo sta-
tim accessionis insultu cibare oportet. Nisi enim quis hanc naturam statim cibet,
ocysime in ea diaria febris in putridam & acutam mutabitur, *ut Galenus lib. 10. The-
method. cap. 5. copiose ostendit*. Tenuiter vero præcipue sunt alendi, qui ex bubone labo-
rant, ut in quibus substantia corporis deperdita non sit. Vinum omnibus propemo-
dum diariis proprie & simpliciter nominatis febribus confert, album colore, & sub-
stantia tenue. Nam præter id quod concoctionem iuuat, vrinas etiam & sudores,
- F** *Galeno libro 8. The. meth. cap. 3. teste*; elicit. Sed vigiliis, mœrore, & cura afflictis vberius
concedendum, utpote quibus magna copia spirituum sit exhausta, quos vinum fa-
cillime & celerrime reparat. Quibus tamen caput dolet, siue vigilarint, siue alia
occasione affecti sint, a vino sibi temperare debent, ut quod facile caput tentet. Atqui
excandescencia ac furore febricitantibus tuto vinum, nisi omnino a perturbatione

Timoris
visitationis
solis.

Lassitudinis.

Temulen-
tiæ & fa-
mis.
Bubonum
seu adenum
torem.

Victus.

Vinum dan-
dum diariis.

Curatio.

Non in omnibus diis eodem modo, nec eisdem balnei partibus uti debent.

Fricatio molis.

Ius album.

Si a cruditate.

Tepida ventriculi rebus dissolunt.

Somnus coequit.

quieverint, haud datur, ut in quibus spiritus & sanguis maxime ferueant. A vino etiam, qui ex bubone seu adenum tumore febricitant, donec is solutus sit, arceudi sunt: non tam quod febris sit inutile, quam quod bubonis curationem remoretur. Auget enim humorum in laborantem locum defluxum, proinde & phlegmonem, quare ratione & febrem. Curare autem oportet omnes diarias simplici et dictas, Galeno teste, balneis. Quapropter omnes qui his febribus laborant, in primæ accessionis inclinatione in balneum ducendi sunt. Non omnes tamen eodem modo, nec eisdem balnei partibus uti debent. Nam qui bubonibus febrem contraxerunt, vtiliter in aere balnei immorantur, tum quod cutem rarefaciat, tum vaporem e corpore foras eliciat. Nec ægrotos siccitate lædit, quemadmodum eos qui ex lassitudinibus, vigiliis, curis, & aliis animi perturbationibus febricitant. Siquidem quum iam ab iis causis ressecatum sit corpus, ab aere balnei arceudi sunt, ne noxam augeant. Igitur in balneo aquarum dulcium calente diutius versari possunt, ut amissam humiditatem eius madore refarciant. Postea vero oleo copiosiore tepido, cui nihil adstrictionis insit, mollibus manibus fricari debent. Hæc enim frictio humectat, laxat, solidas partes emollit, & quæ in corporis meatibus detinentur, discutit. A solis uestione febricitantes, protinus ab initio refrigeratione, & crebrioribus balneis aquæ dulcis, solaque exigui olei perfusione, citra frictionem, quod hæc ipsa calorem excitet, curare decet. Sin autem quæ refrigerant capiti admota, rosaceum & omphacinum quod salis expers est, aliaque quorum *libro 1. capit. 3.* mentionem fecimus. Hæc quidem primum frigefacta, deinceps lana sunt excipienda, ac in sublime suspensa, manu expressa sincipiti instillanda: idque assidue, donec febris inclinauerit. Postea in balneum æger ducendus. Si quis ex frigore febricit, is quoque ad balneum in accessionis remissione ducendus est, caputque ante & post balneum irino, & nardino oleo, aut simili fouendum. Calefacientibus enim & constipationem amolientibus medicamentis indigent, qui hac de causa febricitant. Qui ob famem diaria febre laborant, inclinate accessione statim ad balneum ducendi sunt, plurimoque oleo dulci ac tepido perfusi, molliter perfricandi, diutiusque in calidi solii aqua continendi, ut scilicet siccitas quam fames corpori conciliauit, olei & balnei humiditate corrigatur. Vbi a balneo egressi fuerint, vires cibis conuenientibus reficiendæ, deinde rursus ad balneum ducendi. Vbi denuo exierint, balnei perturbatione sedata, aqua calida propinanda: mox pristinæ cremor exhibendus, & interdum lactuca assumenda, piscesque saxatiles ac molli carne præditi ex albo iure comedendi. Quod quale fuerit veteribus, *Galenus libr. 4. de tuenda sanitate, & libr. 3. de Alimentorum facultate capite De piscibus molli carne præditi*, ostendit. Si propter cruditatem febris diaria euenit, considerandum in primis erit, num alius lubrica sit, an adstricta. Si lubrica erit, & ea tantum quæ corrupta fuerunt, vacuata esse videbuntur: tum lauandum, tum nutriendum in remissione febris erit: sed non, nisi prius quæ iuxta ventriculum prospexerimus. Sin ita copiosa inanitio aut prius facta sit, aut nunc etiam duret, ut virtus ægrotantis defessa sit, satius est omissa lauatione cibare, sed prospicientes prius iis quæ circa ventriculum sunt. Prospicietur autem laborantibus modo vacuatio non amplius duret, irrigatione ventriculi ex oleo & absinthio, aliisque quæ supra, *lib. nimirum 3. cap. De ventriculi imbecillitate*, dicta sunt. Ea vero quæ ventriculo imponuntur, abunde calentia sunt. Nam quæ tepida sunt, ea omnia ventriculi firmitatem dissolunt. Si autem venter omnino adstricta est, contrectatis hypochondriis, mox toto ventre, considerandum est num cibus in gracile intestinum, aut cœcum descenderit. Quod si alimenta adhuc in ventriculo persistant, conetur æger plurima tepida aqua epota, immisso digito aut penna, totum quod infestatur grauare euomere. Deinde fouere oportet hypochondria, & quiescere. At ubi iam ad intestina alimentum descenderit, iubendum ut decliui facie ac ventriculo recumbant, venterque fouendus, ac somnus conciliandus: is enim mirifice cruditatem concoquit. Post somnum ad educenda alui excrementa glans supponenda, aut leui clysteri alius mouenda, quemadmodum copiosius *Galenus libr. 8. Ther. meth. cap. 5. docet*. Qui ex adenum tumore febrem contraxerunt, ii ne Medicum quidem, ut ceteri propemodum omnes qui diaria laborant, quid faciendum sit interrogant. Tamen vlcus in primis quod

A quod bubonem attulit, curandum est, ea quidem ratione, quam Galenus in libris De medendi ratione docuit. Declinante autem accessione lauandi sunt. Tenui præterea vi-
 & nutriendi, quod in iis corporis substantia non sit deperdita. Arcendi quoque a vi-
 no, non tam quod febris sit inutile, quam quod bubonis curationem remoretur. Au-
 get enim humorum in laborantem partem defluxum, proinde & phlegmonem: qua
 ratione & febrem. Hæc quidem ad curandi rationem febrium diariarum simpliciter
 dictarum sufficiant.

De diariis plurium dierum. C A P. II.

EDIARIA RVM numero est etiam, quæ plurimum dierum nominatur, non alia qui
 eadem ratione, quam quod in tertium vsque diem extenditur. Alio nomine syno-
 chus non putrida vocatur. Diariam vero veteres hanc febrem appellauerunt, quod
 eiusdem cum diariis simpliciter dictis naturæ sit. Quippe post primam accessionem,
 si modo quis eam recte tractet, desistit. Merito itaque inter diarias connumeratur,
 nihilque obstat quod eius accessio ultra vnum protendatur diem, *quemadmodum cap.*
precedenti fufius a nobis dictum est. Oritur hæc febris, ex densatione seu stipatione mea-
 rum cutis. Densatio autem ipsa, *Galen. lib. 9. The. meth. cap. 1. teste,* vel obstructis exilibus
 meatibus, vel conuiuentibus, vel etiam corpore ipso moderatius densato: id quod a
 frigore, aut qualitate vel balnei, vel medicamenti affatim acerba & adstringente, so-
 le feruente, & aliis quæ cutem siccare valent, euenire solet. Quia vero propter sti-
 pationem fumida ac fuliginosa excrementa intra corpus detinentur plurima, foras
 autem quod de iis effluit perexiguum est, sit vt hoc nomine febris accendatur. Hæc
 primum tactu deprehenditur, neque enim densitas exercitatum tactum latere potest. 1.
 In iis enim cutis durior & compactior sentitur. Caloris etiam motu hæc febris cogno-
 scitur, vt qui primo occurfu mitis ac suavis sit: postea vero si diutius admotam ma- 2.
 num contineas, actior. Nam per adstrictæ cutis exiguos meatus halitus paucus ex-
 halat, qui foras calorem fert, proinde mitis esse sentitur. Spacio autem temporis im-
 positam manum magis ac magis calefacit, ita vt sensim auctus acrior appareat. Tercio 3.
 ex vrina deprehenditur, quæ neq; consistentia, neque colore a naturali multum est a-
 liena. Sanguis enim nõ admodum feruet, neq; bilis multa quæ vrinæ coloratione red-
 dar, gignitur. Quarto ex mole corporis, quæ manet, & non concidit, quod cutis den- 4.
 tas vaporis ac humoris resolutionem impediat. Proinde neq; oculi caui sunt, neq; ari-
 di: sed prominentiores ac humidiores, quam pro naturali constitutione, visuntur.
 Quinto ex pulsu, qui æqualis, maximus, celer, frequens, & vehemens existit. Qui ita
 laborant, iis, modo recte curare velis, sanguinis missio adhibenda erit: tantumq; san- 5.
 guinis detrahendum, quantum vires tolerant. Pro certo quoq; habendum, nisi iis qui
 hoc per naturam sunt habitui, vt corpus ex abundantia ad transpirationem inhabile
 habeant, id adhibeatur præsidium, fore vt vel suffocentur, vel certe syncope omnino
 periclitentur, nisi eos vel virium robur, vel plurimus sudor, vel largum sanguinis pro-
 fluuium a morte vindicet. Corpore per sanguinis missionem vacuato, non multo post
 cibos & medicamenta ex iis quæ detergunt, exhibebis. Quæ autem in febribus hoc
 præstant, in alimentorum ratione, vt attestatur libro 8. The. meth. cap. 4. Galen. sunt ptisana
 & mulla: in medicamentorum vero; oxymeli, & quæcunque incoquere in mulla li-
 cet, ceu calamintha, & hyssopum, & origanum, & serpyllum, & iris, & apium. Verum hæc o-
 mnia iusto sunt calidiora, ideoq; febres accendunt, ita vtique vt vinum. Oxymeli au-
 tem solum nec febres accendit, & strenue deterget, sic vt ea quæ glutinosa crassaque
 sunt dissoluat, & meatus obstructos liberet. Ex hoc victu obseruabis, quantum de fe-
 brili calore minuitur. Etenim si tertio die mane videris minimum esse quod de febre
 relinquitur, ac neque putredinis humorum in pulsu nota subsit, neq; in vrina crudi-
 tatis suspecta vero hora qua primo die febris occupauit, extra meridiem sit, audacter
 hominem quam ocysime lauabis, longe ante sextam horam. Abunde tamen sit, si intra
 tertiam horam lauationem compleueris. Ad eundem modum & si decimam horam su-
 spectam habueris, vsque ad septimam laues licet: quum tres & quinoctiales horas, qua-
 tuorve inter balneum accessionisq; tempus interponi, abunde sit satis. Vbi in balneo
 corpus iucaluerit, dulci prius oleo tepido vnctum, ac moderatissime frictum, mox de-
 tergeri extrinsecus, abluiriq; debet. Moderatissime vero detergent tum crui farina,

Diaria plu-
 rium dierum.
 Synochus
 non pu-
 trida.

Causa.

Signa.

Curatio.

Detergen-
 tia.

A quod naturæ quæ animantes gubernat iucundius, vtiliusque sit inuenire potest. Deinceps in eiusmodi corporibus necessario superuenit alui deiectio, nonnunquam etiam bilis vomitio. Quas res statim a toto corpore madores, sudoresve excipiunt. Optimum igitur factum est, statim non numero dierum, sed vni virium robori in febribus illis attentum esse: quippe quod si seruatum est, non solum sexto, septimoque, sed etiam sequentibus dieb. sanguis est mittendus. Quod si vero curare aliquando infirmum cogeris, cui non solum antea secunda venæ remedium prætermisum est, sed nunc quoque vel per Medicorum ignorantiam, vel ipsius laborantis propinquiorumve eius timiditatem procedente tempore sanguinem mittere prohiberis, ad frigidam exhibendam accedes: sed diligenter ante discernens, quantum ex ea nocuum cōtingere possit. Nam si id aut exiguum erit, aut nullum, offerenda potui est quæ prorsus sit gelida, quantum ægro bibere libet. Quinimo magis id audebis, si frigide potioni insueuerit. Sin magnum timeretur incommodum, ab hac quidem abstinendum, atque aliis auxiliis quibus obstructio eximatur, & abundantia vacuetur, & feruor febris deferbeat ac sedetur, vrendum. Porro incommoda quæ frigidam potionem intempestiue, immodiceque exhibitam sequuntur, in iis consistunt, primum quod lentos crassosque humores, siue obstructions, siue putredinem, siue phlegmonem, siue qualis erysipelas, aut scyrrhum, aut œdema est affectus creauerint, attenuari digerique prohibet. Quoties igitur ex iis febris accenditur, ad eorū vacuationem frigida non conducit: ad præsens tamen non paruum adfert leuamen, propterea quod iam accensam febrem exstinguit. Verum quæ causa eius adhuc permaneat, aliam denovo febrem accendi necesse est, atque ea quæ præcessit, nonnunquam difficiliorem, propterea quod densatum ex frigida corpus est. Atque hæc vna incommodi species est minime contemnenda. Altera est, quod multas laborantis imbecillas particulas, siue ita se ex naturali intemperie habeant, siue ex vitio adscititio, frigida lædat. Sic compertum est, aliis gulam adeo vehementer esse læsam, ut vix deglutirent, quemadmodum eius rei historiam elegantem recenlet *Gal. lib. 7. The. meth. cap. 8.* Aliis ventriculum, ut vix concoquerent. Aliis ipsum ventriculi os, aut iecur, aut colum, aut pulmo, aut septum transversum, aut renes, aut vesica, aut tale quippiam aliud a frigido percussum, ad propriam actionem infirmum est redditum. Nonnullis autem ex intempestiua immodicaque eius potione, non multo interposito tempore, nec postmodum, sed ilico difficultate spirandi & conuulsione & tremore corripuntur, ac toto, ut semel dicam, nervoso genere læduntur. Ut igitur in paucam contrahamus, quibuscumque in principe particula tumor aliquis phlegmatodes, aut œdematodes, aut scyrrhi naturam obtinens constiterit, iis frigidam offerre non oportet. Sed nec iis quibus obstructio, putredinis humor non coctus, incommodat. Quod si vero euidenter percipis absque iam dictis tumoribus coctionis in vrina notas, neque pars aliqua temperamento adeo frigido fuerit donata, ut in hanc noxa procumbat, audacter frigidam dabis. Quippe solidarum animalis partium natura roborata, præternatos iam humores aggreditur, ita ut qui viles sint, atque ad nutriendum habiles, hos quidem ad se trahat: inutiles vero vel per ventrem, vel per cutim eiiciat. Quod si etiam frigida assuetus æger fuerit, maiori cum fiducia frigidam exhibebis, ipsa scilicet experientia iam edoctus, omnia viscera eius occursum familiariter tolerare. Omnino namque si quod frigidum adeo esset, ut ab hac offenderetur, per sanitatis tempus euidenter offensam suam ostendisset. Nulla vero per sanitatem particula quicquam ab hac læsa, nec etiam inter febricitandum quicquam lædetur. Vbi namque nonnulla quæ frigida potioni non assueti, tamen propter ardentem febrem eam bibere coacti nullum incommodum senserunt: multo profecto minus eorum qui assueverunt, quisquam lædi debet, cui etiam pro munimento maximo accedit ipsa caloris copia. Hinc namque quum in vasorum sinibus plurimus contineatur, utpote tum ærea in his substantia, tum etiam succis omnibus inflammatis, quantum a frigido patitur refrigeratus, tantum rursus calefaciendo in ipsum agit. Ideoque minus ruit iis, qui exiguum sanguinem, carnemque obtinent, frigida potio est. Celeriter namque ad solidas animalis partes pertuenit, nulli quod eius vim frangat occurrens. Eo etiam fit, ut hecticæ febres nec perinde eam quæ prorsus sit gelida, nec multam desiderent, ceu quæ extenuatis omnino, exiguique sanguinis corporibus incidunt.

Frigida quando exhibenda.

Frigida incommoda.

Quibus frigida non exhibenda.

Continen-
tium febriu
duo maxi-
ma reme-
dia.

In crudita-
te ciborum
non mitten-
dus san-
guis.

Victus ra-
tio.

Quando
cōtinente,
febre labo-
rantes sunt
alendi.

Ex iis itaque quæ iam dicta sunt, omnibus perspicuum fit, continentium febrium A maxima remedia esse hæc duo, sanguinis detractionem, & potionem aquæ frigida. Verum illa nullo non tempore, modo vires sustineant: hæc, quum & in pulsu, & in v-
rinis cōtiones euidenter cernuntur notæ, febris autem maxima est. Attenden-
dæ vero cum venæ secandæ indicationibus sunt, tum quæ eam præcedunt, tum ve-
ro quæ sequuntur. Nam si præcedat ciborum cruditas, tanto tempore differre ve-
næ sectionem iubebis, quantum satis facere tum ad eorum concoctionem, tum vt ex-
crementa descendant videbitur. Sin sequeretur necessario vacuatio quæpiam, tan-
tum illi de superante relinquendum, quantum est per eam vacuandum. Itaque si tem-
pore mittendi sanguinis menses moveri contigerit, siue etiam hæmorrhoids fit reclu-
sa, si inspecto fluentis impetu, ipse satis fore videbitur, qui solus quod requiris vacuet, B
naturæ rem omnem permittes: sin minus, tantum ipsi detrahes, quo ex coniunctis
ambobus perficiatur quod postules, quemadmodum copiosius Galenus libro 9. The. method.
capite 5. docet. Victus autem ratio in iis febribus hæc potissimum fit. His quibus ve-
na secta est, post duas a sectione horas ptisanæ cremorem exhibebis, quietemque
imperabis. Vbi vero a somno excitati fuerint, rursus ptisanæ cremor præbendus. In
hac victus ratione vsque ad tertium diem persistendum. Animaduertendum au-
tem, in synochys febribus tum alendos esse ægrōs, quo tempore saniali consue-
runt, & vbi maius leuamen sentiunt: ita enim alimentum facilius ferent. Quod si vti-
que vires robustæ fuerint, & vigor morbi statim expectetur, tenuissimo victu vt en-
dum erit. Sin contra vires imbecillæ fuerint, haud sine ingenti dispendio victus te- C
nuis exhibetur. Ergo in cibis offerendis virium robur diligenter perpendendum erit.
Plura qui de huius generis febrium curatione scire desiderat, Galenum loco paulo an-
te citato legat.

De continuis Febris. C A P. IIII.

Febris con-
tinua.

Febris con-
tinua & synochus
differunt.
In quo
synochus & con-
tinua conue-
niant.

Causa.
Differentiæ
continuarū
febriu tres.
Ardens fe-
bris siue
causus.
Continua
eiusdem ge-
neris cum
intermit-
tentibus.

Continua-
rum & in-
termitten-
tium dif-
ferentiæ.

Signa.

FEBRIS Latinis continua Græcis autem *συνεχὴς* dicta, est, quæ non antequam ex to-
to fuerit soluta, ad infebricitationem desinit, remissionem tamen aliquam sensi-
lem in singulis accessionibus obtinet. Vnde omnibus perspicuum fit, *συνεχὴς ἔστι συνέχης*, hoc
est, *continentem & continuam* febres inter se differre. Siquidem in synocho continente-
ve nulla fit feruoris remissio, donec desinere incipiat. Synechis autem, siue con-
tinua in singulis accessionibus remissionem sensilem habet. Item synochus vnicam dū-
taxat accessionem obtinet, synechys vero plures. Ceterum conueniunt hæc febrium
genera in eo, quod neutrum horum ad infebricitationem peruenit. Græci quidem
Medici, vt hanc, quam diximus, statuerent differentiam, solœcismum committere
potius voluerunt, quam formam istarum febrium sine nomine relinquere. Quippe
Græcis *συνεχὴς ἔστι πυρετός* recte dicitur, non autem *συνεχὴς*. Porro continua febris fit, vbi vnus
duntaxat humor intra vasa putrescit. Suntque huius febris, pro putrescentis in venis
humoris diuersitate, differentiæ tres. Nam si flaua bilis intra vasa putrescit, tercia-
nam continuam, quæ alio nomine Græcis *τρίτηνη* Latinis vero ardens appellatur, effice-
re solet. Sin pituita putrescit in venis, quotidiana continua generatur. Si vero me-
lancholicus humor, quartana continua nascitur. Quare eiusdem generis sunt cum E
intermittentibus: cum tertiana quidem exquisita intermittente, tertiana continua,
quod scilicet perinde atque illa tertio quoque die accessionem habeat. Quotidiana cō-
tinua, cum quotidiana intermittente, quod nimirum singulis diebus accessionem ob-
tineat. Quartana continua, cum quartana intermittente, quia quouis quarto die in-
uadat. Differunt tamen etiam ab inuicem, non obstante quod eo qui vtriusq; facit hu-
more communicent, duplici ratione. vna, quod in continuis humor putrefactus intra
vasa, vt *comprehensum est*, continetur: in intermittentibus autem per singulas corpo-
ris partes dispergatur. Altera, quod intermittentes ad infebricitationem desinant.
Impetu enim delationis ipsæ per seipsas expurgantur. Continua autem ad infebri-
citationem non perueniunt, nisi ex toto fuerint soluta. Proinde nullum certius indi-
cium febrium continuarum est, quam quod nulla earum ad infebricitationem per-
ueniat, donec de integro & prorsus desierit. Alia signa sunt illis cum intermittentibus
communia. Exquisita enim ardens febris omnes alias exquisitæ tertianæ intermitte-
tes notas seruat: hoc tantum discrimine varians, quod neque cum vigore inuadit, neq;
in quie-

A in quietem definit. Pari ratione quæ singulis diebus accessionem habet, exacerbaturve, omnes exquisitæ quotidianæ notas præ se fert: sed quod haud intermittit, hac re a quotidiana intermittente differt. Simili modo & ea quæ quarto quoque die accessionem obtinet, quartanæ exquisitæ notas retinet, sed ad quietem non peruenit. Porro quum continuas febres ex putridarum genere esse, ex iis, quæ diximus constet, necesse erit, ut qui illas commode curare volet, putredinem primum inhibeat. Ita duæ statim se indicationes exhibent, quarum altera a febre, altera vero a putredine sumitur. Atque a febre rursus duæ, scilicet ut portio febris quæ iam accensa est, percuretur: quæ vero in generatione est, inhibeatur. Aliæque duæ a putredine, ut & quod putredinis iam factum est, sanemus, & quod in generatione adhuc est, sistamus. Quod

Curatio
methodus.

B in generatione est, id perspiratio impedita facit. Ita ab hac quoque duæ aliæ indicationes nascentur, tum ut quod retentum est vacuetur, tum quod retinendum est prohibeatur. Prohibebitur autem iis præsiidiis, quæ obstructioni medentur. Huius rursus obstructionis, quod iam occupavit sanandum est: quod futurum est, arcendum. At curabitur quidem id obstructionis quod iam factum est, per ea, quæ obstructione liberant. Propulsabitur quod futurum est, si effluxum obstruentium humorum compescuerimus. Vnde satis liquet, quod vltima in ipsa resolutiva methodo est inuentum, id omnium primum in curatione esse peragendum. Quum igitur particulatim

Quinq; sūt
res a quib;
in febribus
continuis
indicatio-
nes colli-
guntur.
Venæ se-
ctio.

C struentium copia, a postremo curatio auspicanda erit. Copia itaque humorum obstructionem efficientium requirente vacationem, principio si valida fuerit virtus, tempus & ætas, atque alia consentiant, sanguinem mittere oportet. Mittendus vero tum magis sanguis erit, quando vniuersum corpus plus solito tumet, aut venæ eminētes ac distentæ sunt. Ea namq; sanguinis abundantiam significant. Vacuata multitudi-
ne, ad alterius, puta obstructionis, curationem accedendum, medicamentisque quibus obstructio tollitur utendum. Quoniam vero horum pleraque calida sunt, metuendum ne tum putredinem, tum febrem augeant, itaque iis quæ citra calorem ab obstructione liberare possunt, utendum. Qualia autem hæc sint, diximus supra, capite nimirum huius libri secundo. Vbi vero quæ obstruunt deterfa & dissecta sunt,

D per aluum, vrinas, ac sudores ea vacuare tentandum. Quum vero materiæ quæ hæc efficiunt calidæ sint, necesse est tum putredinem, tum febrem augeri. Quare quoad licet id agendum, ut quæ minus calefaciat materia deligatur: aut si qua inuenire potest quæ non calefaciat, quemadmodum in hoc casu balneum, utique ea perenda est. Balneum vero id ipsum posse, Galen. libr. 3. De tuenda sanit. capite 3. iis verbis diserte docet: *Dulcium calefactorum aquarum si temperata sint, vis calida & humida est: sin tepidiores sint, humida & frigida.* Et paulo post: *Balneum si probe adhibeas, duras, tensasque partes emollit, excrementum, liquamentumque si quod intus ad cutem hæret, euocat.* His peractis, & deterfis iis quæ cuti impacta fuerunt, adeoque obstructione ac impedita transpiratione amota, ad putredinis curationem veniendum est. Quocirca hoc tempore in primis vires roborare,

Obstructio
ut sananda.

Balneum re-
frigerat.

Putredinis
curatio.

E quo & putredinem superent, & humores concoquant, studebimus. Putredinem quoque sanabimus, si id quod corruptum est, omni ratione vacuabimus. Quod reliquum est, moderatis motibus, & refrigerante perspiratu ad exquisitam mediocritatem reducemus, ac vacationem eorum per vrinam, deiectiones alui, vomitum, ac sudores moliemur. Vltimo ad febris curationem progrediendum; quæ quidem per refrigerantia fieri solet. Omnis enim febris, qua febris est, humectatio refrigeratioq; remedia sunt. Quo vero modo horum quodq; recte fieri debeat, partim antea dictum est, partim in sequentibus commemorabitur. Porro in febribus continuis, quibus morbi vigor non longius septimo futurus est, & vires validæ sunt, ætasque consentit, exquisitus omnino & tenuis victus instituendus est. In quibus vero longius septimo totius morbi

Victus re-
ctio.

F bi vigor erit, aut virtus imbecilla est, per initia quidem liberalius, instante vero vigore parcius, vigente morbo tenuissime cibare oportet. Postea rursus semper vberius, eodem modo cibum augendo, quo ante vigorem minuebatur, quemadmodum sectione 1. Aphorif. Hippo-

erates docet.

Causa.

AR D E N S febris, quæ ^{Græcis, ut præcedente capite ostensum est}, dicitur, & continuaturum est genere. Et fit quidem, quando flaua bilis in venis putrescit. Eiusdem itaque generis est, cum exquisita tertiana intermittente, eo quod ab eodem quo ipsa humore nascatur. Differt tamen etiam ab eadem, quod videlicet in hac flaua bilis per vniuersum feratur corpus: in ardente autem febre idem humor in vasis vna cū sanguine continetur. Hinc fit, quod in ardente febre singulæ accessiones ad infebri-
 4. Aph. 58. tationem non perueniant. Quando vero in iis bilis vehementius agitur, & a natura inualecente impellitur, tunc rigor superuenire solet, & febris ipsa soluitur. Quod

Ardentis a
tertiana dif-
ferentia.

Signa.

Hippocrates iis verbis significauit: *Qui ardente, inquit, febre correptus est; si rigor successerit, a morbo liberatur.* De cuius quidem sententiæ explicatione copiosiore, videntur
 4. complexus est. Hac febre laborantes decumbant in loco frigido, ad suauem au-
 ram exposito, a qua purus diffletur aer: culcitra etiam molli, quæ frequenter ster-
 nenda est. Stragula tenuissima sint, & minime sordida, quæ assidue mutantur: ha-
 beatque lectus insignem latitudinem, vt ad diuersas subinde partes membra calefa-
 cta transferri commode queant. Tum aer ignauior flabello excitetur. Cibi offe-
 rendi sunt, quibus refrigerandi & humectandi vis inest, vt est lactuca, cucurbita, oxalis, C
 cremor ptisanæ, & eiusmodi. Potus sit aqua, in qua parum cinnamomi decoctum sit,
 aut omphacium. Si æger affueuerit, aut aliud nihil impediat, post cibum frigidam de-
 glutiendam dato, cochlearis vnus aut duorum mensura. Vel cum decocto hor-
 dei misceantur zupia violaceum, rosaceum, & iis similia. Succo præterea rosarum sto-
 machus recreandus, alixque refrigerationes machinandæ, virentibus vitis, rosarum,
 nymphææ, violarum foliis & floribus solum sternendo, & aquam frigidam sæpius irrigando,
 riuulos aquarum moliendo, quæ ex propinquo suauiter instrepant, vt in superioribus sæpius est a no-
 bis dictum. Quoad curandi methodum spectat, initio statim venâ incidere oportet,
 modo ætas, tempus, virtus, & alia permiserint. De quibus copiose Galenus libro
 primo ad Glauconem, capite 13. differit, & in libro Decurandi ratione per sanguinis missionem. D
 Hinc est, quod, sectione 1. Aphorismorum commentario 23. ita scriptum reliquerit: In
 ardentissimis febribus, si vsque ad animi defectionem sanguis mittatur, statim totius corporis ha-
 bitus refrigeratur, & febris exstinguitur, plurimis etiam alius citatur, & sudores emanat. Tho-
 rax & stomachus subinde palmulis cum rosaceo, aut oleo cotoneorum, Aetio teste,
 aut nymphææ tritis fouendus. Conueniunt & alia medicamenta refrigerantia, vt
 sunt palmites triti, intybum, polygonum, lactuca, oxalis, folia vitis, & similia. Sudariolum
 quoque tenue complicatum, oleoque & aqua calentibus madefactum, stomacho &
 thoraci applicandum: id enim febrium ardorem mirum in modum sedat. Lanz
 quoque quantum manu capitur, aqua & rosaceo calefactis imbuta, e sublimi in tho-
 racem expressa, feruoris vehementiam facile obtundit. Hæc autem calida esse oportet:
 nā tepida membrorum vigorem exsoluunt. Nec temere etiam in febribus arden-
 tissimis acetum admiscebis. Epithemata vero & reliqua refrigerantia medicamenta,
 in principiis & incrementis accessionum non sunt ad mouenda. Hoc nāque tempore
 corporis affectus adhuc ambigit, & calor viscera obsidet: quapropter frigida adhibi-
 ta calorem in profundum repellendo, maioris nocimenti occasionem præstant. I-
 gneus enim calor intus repressus, vehementiori rursus ardore excitatur. In vigore
 itaque accessionum, calore iam per vniuersum corpus explicato, hæc frigida com-
 mode admouebuntur: tum enim residuum caloris præter naturam circa viscera ad-
 huc hærens, prompte exstinguetur. Hinc ægri melius spirare incipiunt, & leuiori
 fiti infestantur. Quidam etiam rorido efflante vapore deliniti, somnū capeunt. F
 Epithemata vero, quibus in iis febribus vtendum erit, habeant stillaticiorum rosarum
 & lactuca liquorum, singulorum uncias tres & dimidiam. Stillatici vtriusque intybi satui
 liquoris, singulorum unciam vnā & dimidiam. Aceti optimi, unciam vnā. Santalo-
 rum trium, singulorum unciam dimidiam. Acidi citri succi, unciam dimidiam. Commixtis
 omnibus

Videturatio

Curatio.

Localia.

Tepida me-
brorum vi-
gorem exsol-
uunt.
Refrigeran-
tia quo te-
pore ad-
mouenda.

Epithema

A omnibus fiat epithema. Porro vigore morbi instante, & nullo eorum, *quæ supra capite tertio dicta sunt* prohibente, sincera frigida iam tuto exhibeatur. Quod si timor, quamvis minimus, obstiterit, primam potionem refractam propinabimus. Refrangeretur autem in hunc modum. Sumito temperatæ *aquæ cyathum unum, cui quinque syncera frigida admisceto*, & sic suspectis corporibus præbeto. Quid multa? in ardentium febrium curatione horum alterum fieri necesse est, ut aut biliosi humores excernantur, aut iidem extinguantur. Excernuntur autem per sudores, vomitiones, & aluum. Exstinguuntur vero potu frigida, quo sane sæpissime ex toto ardentissima febris curantur. Ceterum *balneum aquæ dulcis* iis solum conuenit, qui citra tumorem ad phlegmonis, aut erysipelatis naturam tendentem ardenti febre laborant. Quod si vero concoctionis notæ in urinis appareant, multo magis comperet. Aeger autem qui in ardentissima febre frigido uti cupit solio, sit iuuenis, moderatoque corporis habitu, *ut Hippocrates etiam monet*. Nec id facere in animum inducat, nisi æstatis tempore, ac anni constitutione calida, inque febris vigore, & sit quoque frigida lotioni per sanitatem assuetus. Moderatori vero existente febre, robustaque virtute, simul cum coctionis indicis, solum aquæ dulcis & temperatæ sufficit, ac confert. Ex vñctionibus, *oleum chamamelinum*, præsertim ubi aer ambiens frigidus sit, conducet. Ceterum materię copiam, ex qua ardentibus febribus competentia remedia componuntur, sequentia capita suppeditabunt.

Frigida quando exhibenda.

Balnei qui bus confert

s. Aph. 17.

Vñctiones.

De exquisita tertiana intermittente. CA P. VI.

TERTIANA febris intermittens exquisita, ex flaua bile per sensiles corporis partes delata, & sui ipsius naturam puram sinceramque seruante oritur. Quapropter, quum ex bile sincera, nullique alteri humori permixta procreetur, exquisita medicis dicta est. In biliosioribus natura corporibus consistit, & vigenti ætate, tempore æstiuo, calidis & siccis regionibus, similique aeris constitutione, vita etiam laboribus, vigiliis, curis, intensis cogitationibus, ac solis feruoribus dedita & exposita. Hæc etiam statim ab initio, inque singulis accessionibus rigorem vehementem affert: qua vna quidem ratione ab ardente febre, *ut supra est ostensum*, differt. A quartana vero rigore in hoc distat, quod corpus pungere, ac veluti ulcerare videatur, quum quartana refrigerationem habeat simillimam ei quæ hyberno tempore sentitur. Tertianam itaque febrem non contingit fieri sine rigore vehemente, pungente ac vulnerante carnem. Quartana vero, neque primo statim die cum rigore inuadit vehemente. Nam progrediente ipsa, atque aucta, vna quoque rigor augetur, sensusque ægrotantium non est quasi eorum, qui punguntur, sed potius qui refrigerantur, & veluti ad ossa vsque molestantur. Est & in tertiana pulsuum exactus ordo & æqualitas, qui tamen ad vehementiam ac magnitudinem atque frequentiam in accessionum incremento excitantur. Præterea in vigore, etiam sitim inuehit, ac hominem exurit, ut abiectis vestibus æger denudetur, ampleque & frequenter spirer, exsuffletque veluti flammam, frigidamque potandâ efflagitet. Calor æqualiter subinde per totum corpus diffunditur, nihilque magis thorax quàm extrema calent: Et ubi manum intecieris, primo quidem contactu calor plurimus ac mordax occurrit, veluti cum vapore quodam erumpens: non multo tamen postea a manu remanente vincitur. Bilis denique vomitio superuenit, aluiusque soluitur, & biliosum mingunt, subruffum, sufflauiumque, & moderate crassum. Vrina quoque statim nubeculam albam, aut sublationem laudabilem habet. Ruffiore autem existente vrina, neque suspensione, neque nubecula in primo circuitu apparentibus, febris ad septem circuitus extendetur. Præterea ad infebri citationem desinit, ubi accessionis spacium horarum æquinotialium ad summum duodecim durauerit. Nam hoc tempus longissimum est in veris tertianis. Breuior vero aliquando prædicto spacio temporis accessio, in eo quod magis ac minus plurimam habens differentiam, ob quantitatem videlicet, aut qualitatem ipsius bilis, aut propter laborantis vires, aut propter præsentem eo tempore corporis laborantis affectum. Febrem igitur quæ intra duodecim horas terminatur, exactam tertianam nominamus: quæ vero diuturniorem accessionem habet, ea non tertiana exquisita, sed extensa vocatur *quemadmodum Galen. libr. 2. De differ. febr. capite 8. fusius monstrat*. Quod si quotidie febris cum vehemente rigore inuadit, & cum aliis

Causa.

Exquisita tertiana cui dicta. Signa.

Tertianæ rigor quo differt a rigore quartanæ.

Duplicis tertianæ notæ.

tum vinarum, tum mulsum, tum ceterorum notis quas diximus, duplex tertiana nuncupatur. Quæ singula signa copiosius prosequitur Galenus *libr. x. ad Glauco. cap. 5. & libr. 2. De differ. feb. capite 3. & libro secundo De iudiciis capite 3.* Ceterum exquisitam tertianam, quæ ex sincera flaua bile commota constat, quoad fieri maxime potest, humectare & refrigerare oportet. Quippe is humor inter omnes alios qui in corpore sunt, *Galen. cap. 5. lib. De inaequali intemperie, teste*, calidissimus & siccissimus existit. Ager itaque decumbat in loco frigido ad auram suauem, *ut cap. huius libri tertio etiam dictum est, exposito.* Arcenda quoque turba a domo est, ut quæ halitu calefaciat: solum spargatur frequenter aqua frigida, *liquore rosarum stillatio, violarum item & similium.* Humi iterantur *folia salicum, vitis flores rosarum, violarum, nymphaea, & id genus altorum.* Cibis vitantur ægrotautes, quibus refrigerandi & humectandi vis inest. Tantum vero de iis dari debet, quantum optime concoqui potest. Ex oleribus quidem atriplex, blitum, malua, lactuca, cucurbita, lapathum, intybum, & id genus alia. Ex aliis autem cremor ptisanæ, & sorbitio exalica. Ex piscibus vero laxatiles. Hi enim præter id, quod refrigerant & humectant, boni sunt succi, ac facile concoquuntur. Ex volatilibus quæ molli sunt carne, ut sunt gallinacei perdices, columbae, & passeris iuniores, phasiani, & similia. Quæ vero talia non sunt, eorum alæ, ut quæ ob crebram exercitationem excrementis vacant: & gallorum gallinaceorum testiculi & suum pedes, quia exercitati excrementis carent: ac cerebra, præsertim si rite coquantur. Porcellorum quoque si liquefactas coctura carnes præbueris, nihil nocebis: ita n. facilius a ventriculo conficiuntur. Sed & oua forbilia, id est, quæ tantummodo incalescunt, permittuntur, præsertim eorum vitelli: ii enim, *Galeno & Paulo testibus*, facilius quam album concoquuntur & mediocriter refrigerant. Ex fructibus gustari conceduntur, qui non omnino ad concoquendum difficiles sunt: ut sunt cerasa, pruna mora. Abstinendum autem a melle, ut quod facile in bilem vertatur, *sinapi, salsamentis, & omnibus acribus.* A vino autem, priusquam morbus concoquatur, omnino arcendus æger. Bibat autem interim aquam in qua parum cinnamomi decoctum sit. Vel hoc vitatur potu, qui habet: *Zulapii violacei, uncias quatuor. Aqua in qua parum cinnamomi sit decoctum, libram unam.* Commisceantur inuicem, & de altero in alterum vas sæpius transfundantur. Vbi vero concoqui cæperit morbus, dandum erit initio vinum tenue, paucum, & aquosum. Liberalius vero, ubi in propinquo est morbi solutio. Hæc quidem victus ratio multorum est, non omnium, ad coniecturam tradita & exposita. Qui enim molliter non educantur, sed duram vitam agunt, ac robusti sunt, iis tenuior victus instituendus est, nempe ptisanæ cremore usque ad febris iudicium contenti sint. Quod ad somnirationem attinet, in accessione non est dormiendum, sed vigilandum potius: ut scilicet sanguis & spiritus, adeoque caloris natui ad interiora motio impediatur, inque contrarium, & ad exteriora trahatur: alias enim febres vix dissoluuntur, & ad consistendi tempus tardissime perueniunt, fluxionesque multiplicantur. Finita accessione, somnus non improbatur. Exercitia, & omnes alii vehementes motus fugiendi, necum Herodico, cuius *libro sexto, Epide.* meminit Hippocrates, ægrotautes interficiamus, Animi deturbationes, ira potissimum, timor, inestitia, & similes longe absint. Ceterum non solum iam dicta victus ratione, sed & medicamentis quæ refrigerare & humectare possunt, uti oportet. Initio autem ad bilis feruorem restinguendum, caloremque mitigandum hoc decocto vitendum, quod accipit: *Florum violarum, boraginis, rosarum rubearum, singulorum manipulum unum. Florum nymphaeae, manipulum semis. Intybi sativi utriusque, lactucæ, singulorum manipulum unum & semis. Passularum repurgatarum, unciam unam. Prunorum damascenorum numero undecim. Seminum intyborum sativorum, lactucæ portulacæ, cucurbitæ, singulorum uncias tres. Radicis cichorii, drach. sex.* Coquantur singula in duabus libris aquæ fontanæ, quoad tertia pars absunta fuerit. Dein collo trahantur, & sachari adiectione ius decocti dulce reddatur, alboque oui purificetur, additis *serapii de intybo sativo latifolio, & zulapii violacei, utriusque uncias duas & dimidiam.* Commixtis omnibus fiat potio, de qua singulis diebus in autera ieiuno detur *pondus unciarum quatuor & dimidia.* Quod si æger delicatior est, & a potione abhorret, sumat quotidie ex hoc medicamento, quod habet: *Sacchari violacei, boraginis, rosacei, nymphaeae, cichorii, singulorum unciam dimidiam. Antidoti e prunis damascenis citra diacrydion, drach.*

Victus.

Oua forbilia.

Potus.

In accessionibus haud dormiendū

Para. 3.
Apho. 24.

Curatio

Decoctum concoquens bilem.

Mistura.

Adrachmas septem. Diarrhodon abbatis, unciam unam. Specierum diatriosfantalon, uncias duas. *Vacuatio.*
 Zulapii violacei quod satis est ad excipiendum, fiat mixtura. Summouenda præterea
 causa, quæ febrem attulit, id quod fit ubi biliosus humor vacuatur. Eum itaque qui
 ad stomachum repit, per vomitem educere oportet. *Vomitio.*
 Hic vero qua ratione sit cien-
 dus, in superioribus libris est expositum. Eum autem qui deorsum fertur, per alui ex-
 cretionem elicere conuenit: quod quidem etiam sponte interdum in exquisita ter-
 tiana fieri solet. Quare qui tum rhabarbarum exhibent Medici nequaquam, quod
 nonnulli faciunt, reprehendendi sunt. Siquidem illud abunde bilem flavam primum e-
 ducit & edomat, postea vero visua adstrictoria partes corporis inter purgandam læ-
 sas, ventriculum potissimum & intestina, roborat. Neque enim natura, alia de causa
 hanc ei facultatem indidit, quam ut a purgatione roborat. Quapropter hæc adstri-
 ctio quæ minime vehemens est, febrem haud lædit. Vomitiones vero eliciuntur ma-
 xime accessionis initio, ut auctor est Galenus libro cui titulus est: Quos nam purgare oportet
 at quibus medicamentis, & quando. Nam eo tempore natura illuc bilem producere so-
 let: quemadmodum in remissione ad internas partes, aut ad eutem. Igitur per id tem-
 pus molles ac leues clysteres iniiciendi, tum quod facile bilis educatur, tum eius acri-
 monia quæ intestina molestat atque mordicat, clysteris lenitate frangatur. Talis vero
 est is, qui accipit: Malua foliorum viola purpurea, lactuca, mercurialis, myrsini utriusque
 singulorum manipulum unum. Seminis portulacæ, melonum, singulorum drachmas duas. & semis.
 Coquantur in aqua iusta quantitatis, donec tertia pars absumat. Colo traiciantur, & iuri decocti
 ipsius adiciantur, casia fistularis recens extracta medulla, unciam unam. Olei violacei, uncias tres.
 Salis communis unciam unam & dimidiam. Commixtis omnibus fiat clyster. *Clyster.*
 Per urinam
 quoque & sudores bilis exigenda præferuntur illæ natura feratur. Quod recte fiet
 medicamentis quæ urinam cient, non tamen omnibus, sed quæ citra exsiccationem
 id præstare possunt. Urina quoque potionibus, in quibus apium & anethum madaue-
 runt, prouocanda. Et si concoctionis notæ apparebunt, iam tuto absinthium exhibe-
 bis, quod a iocui summum est ventriculi remedium, ubi hunc bilis infestauerit: si præ-
 fertim ex ipsius coma, quantum sufficiat, accipiens, in melicrato maceraueris. Bilem
 enim per aluum ex ventriculo purgat, ex venis vero per urinas. Sudorem vero hoc vel
 simili medicamento euocabis quod accipit: Radicum apii, asparagi, cichorii, singulorum un-
 ciam dimidiam. Seminum petroselinii, feniculi, rusci, lybistici, singulorum drachmas duas. Cicerum
 nigrorum, drachmas tres. Anethi, manipulum semis. Coquantur singula in aqua fontana iustæ
 quantitatis ad tertias, dein colo traiciantur, & sacchari adiectione ius decocti dulce reddatur, ad-
 dis oxymelitis compositi uncias duabus, fiat potio. Aut singula prædicta redigantur in
 puluerem, & de iis qualibet vice drachma una, aut drachma una & dimidia, cum tri-
 bus oxymelitis simplicis uncias exhibeantur. Hæc autem medicamenta quæ sudo-
 rem eliciunt, in accessionis declinatione, aut die in qua æger a febre liber est, propi-
 entur. In hunc usum etiam non parum confert inunctio ex oleis chamæmelino,
 anethino, & id genus aliis. Balnea denique calida ex aqua dulci & potabili profunt
 duplici nomine, tum quia aliquid bilis euocent, tum etiam quia sua qualitate pluri-
 mum iuuent. Nam huiusmodi balnea, ut etiam libro tertio De tuendi sanitate testa-
 tur, humectant, & potentia refrigerant. Balnea vero ex aquis marinis, salis, nitrosis,
 & sulphureis, plus quidem bilis educunt, sed multo minus quam potabiles profunt.
 Præstat autem neque ipsa vtilia dicere, quandoquidem plus exsiccatendo obfunt, quam
 vacuando iuuent. Semper autem oportet contrarias qualitates, Galenus ad Glauconem
 teste, illis quæ præter naturam inualuerunt opponere: quum hoc multo commodius
 sit, quam quouis modo vacuare. Ex quibus sane verbis satis liquet, Galeno parum pla-
 cere, in exquisita tertiana vacationes, præsertim eam quæ fit sanguinis missionis, &
 vehementer purgare medicamento. Nec me latet hoc loco esse qui merentur, imo
 me non obscuris verbis suggillant, quod in tertiana exquisita sanguinis missionem
 parum probem. Et pro suæ opinionis confirmatione locum Galeni ex libro methodi me-
 dendi 11. capite 14. male tamen intellectum, producant. Quod vero locus ille ipsorum o-
 pinioni non patrocinetur, in enarratione huius loci in nostris commentariis, & in
 fra capite præsentis libri 12. prolixè ostendimus, ut opus non sit eius explicationem hic re-
 petā, & inferā. Sunt enim id genus purgatiua omnia medicamenta facultate calida. Quæ

Vacuatio.

Vomitio.

Clyster.

Urinam
mouentia.

Absinthium.

Sudorem
eliciens.Balneum
quæ dulcis.Sanguinis
missio, vehē-
mensque pur-
gatio in
tertianis
exquisitis,
parum Ga-
leno pro-
bantur.

vero febris hæc omnium calidiſſima ſit, ideo refrigerari & humectari potius deſide-
 rat, quam vehementer purgari. Alias autem vacuationes magis permittit, præſer-
 tim ubi humorem natura expellere tentat. Iuuanda quoque natura eſt, ubi ex ſe ſo-
 la opus perficere non poteſt. Quod vero ad balneum attinet, hic plane in eo ſco-
 pus ſit, vt corpus madeat & humectetur. Idcirco neque nitrum, neque ſalem, ne-
 que ſinapi inſpergere oportet, ac calente oleo plurimum perſuſos ægros ad aquam
 perducere ac proluere conuenit. Et ſi in eo natate velint, iis quamdiu poſſunt per-
 mittendum eſt. Et qui balneis delectantur, ſi etiam bis die lauare permiferis, nihil
 peccabis. Sed illud in memoria habeto, vt id opportune fiat. Si enim iam conco-
 ctionis ſigna appareant, tunc etiam ſi frequentius laueris, nihil erraueris, vt *Galenus lo-*
co antea citato perſpicue docet.

De tertiana notha. C A P. VII.

TERTIANA notha ſeu ſpuria ſit, quando bilis maxima ex parte pituita miſcetur.
 Hinc eſt, quod non ſingulæ notæ, vt in exquisita, puræ ac ſincerioris bilis naturæ
 præ ſe ferant. In ea etiã tempus acceſſionis duodecim horas excedit, neq; vt exquisi-
 ta ſeptenis circuitibus iudicatur. Tardius denique in hac ipſa ſpuria tertiana coctio-
 nis ſigna apparent, neque tantus in eius vigore calor. His omnibus accedit, quod
 non finitur, vt exquisita, ſudoris copia. Quare victus ratio in hac febre non ſit in
 vniuerſum quæ refrigeret ac humectet, vt in tertiana exquisita, ſed quæ aliquam cale-
 faciendi & incidendi vim aſſumat. Bilis enim in ea craſſior, neque adeo calida exiſtit.
 Hacigitur laborantibus plurimum prodeſt piſtanæ ſuccus, cui inieſtum piper ſit, &
 muſta in qua coctum ſit hyſſopum, origanum, & nardi ſpica potui danda. Sorbitiones
 etiam concoctus faciles dandæ ſunt. Porro quum acceſſionis tempus longius ſit, atque
 adeo integrum diem duret, non ſane quotidie, ſed alternis tantum diebus cibum ex-
 hibere oportet. Hac enim ratione cauebimus, ne a ſuo munere auocetur natura, ad-
 eoque morbus augeatur. Proſpiciendum autem vniice erit, ne morbus augeatur ne-
 ue agrotantis vires, quas conſcultare diutius oportet, deiiciantur. Difficile vero eſt v-
 trumque ſeruare, quod inedia quantum ad morbi concoctionem prodeſt, tantum vel
 amplius etiam vires offendit. Cibo autem quantum agrotantis robur augent, tantum
 concoctiones impediunt. Proinde inedia vtendum, ubi valentiores fuerint vires &
 morbus concoctu difficilis. Largiore autem cibo, ubi vires fuerint imbecilliores, ne-
 que morbus concoctu contumax. Potus ſit aqua in qua parum cinnamomi, & aliquid
 hyſſopi aut origani decoctum ſit. Quies conducit, exercitia vero nocent. Hac enim
 naturam ac calorem natium, qui crudam materiam intus concoquere debet, foras
 euocat. Quod ad urandi rationem attinet, ſi ſanguinem mittere oporteat, neque
 hoc omittendum, ſed ab initio ſtatim, adhibita ætatis, temporis, regionis, habitus cor-
 poris, & ſimilium quæ ſanguinis miſſionem vel ſuadent, vel ab ea dehortantur diſtin-
 ctione: tantumque ſanguinis detrahendum, quantum præſens exigit ſtatuſ. Statum
 autem præſentem intellige tum ægri, tum morbi. Ager enim ſi viribus valet, ſangui-
 nis miſſionem admittit: ſi minus, reſpuit. Si morbus ex humorum copia conſtat, ſan-
 guinis miſſionem expoſcit, non quidem mediocrem, ſed pro eius copia. Verum quã-
 do diu duraturus eſt morbus ob cruditatem, mediocriter extrahendus eſt, vt in finẽ
 morbi vires ſeruentur. Clyſteres quoque non admodum molles, vt inertem mate-
 riam euocent, alio indantur, qualis eſt qui habet: *Malua, mercurialis, foliorum viola ni-*
gra, origani, hyſſopi, ſingulorum manipulum vnum. Seminis cartami, drachmas tres. Coquantur
omnia in aqua iuſtæ quantitat. Colato iuſi adiciantur benediſta laxatiua nomi-
nata, hiera picra, ſingulorum drachmas tres. Mellis roſacei, drachmas ſex. Olei violacei, chama-
melini, ſingulorum vnciam vnã & dimidiam. Salis vulgaris, drachmas duas. Fiat clyſter. Ex-
hibenda quoq; decocta, quibus inſunt quæ citra plurimam calefactionem & exſicca-
tionem incidere, & vrinam ciere poſſunt. Cuiuſmodi eſt quod accipit: Radicum apii, ſe-
niculi, cichorii ſing. vnc. vnã. Intybi ſatium vtriuſq; origani, hyſſopi, ſing. manip. vnum. Lactuca,
manipulum vnum & dimidium. Seminum quatuor frigidorum communium ſing. drach. vnã.
Seminis ſeniculi & apii ſingulor. drachmam vnã & ſemis. Coquantur in aqua lib. duabus, donec
tertia abſumatur pars. Iuſ colo expurgatum ſacchari adiectione dulce reddatur, oviqtie
albuminib. purificetur. Dein addantur ſerapii acidi ſimplicis, mellis roſacei colati, oxymelitis
ſim-

Balneum.

Cauſſa.
Signa.

Victus.

Curatio.
Vena ſec-
tio.

Clyſter.

Decoctum.

A simplicis singula una & scilicet, & fiat potio, de qua quotidie in aurora datur vicia, quatuor. Post hæc, quæ placide ventrem subducunt, medicamenta sunt exhibenda, ut est dilutum rheubarbari, vehementer expressum, ut liquor in qua maceratum est, aliquid etiam adstrictionis in se recipiat, ob causam præcedenti capite expositam. Item antidotus le psyllio, diaphenicon, & alia eiusmodi, quæ per se aut aliâ admixta, bilem una cum pituita educere possunt, qualia multa in superioribus libris, & lib. 2. De comp. medica. annotauimus. Post septimum diem decoctum absinthii iugiter dandum est. Multos quoque iuuat oxymeli per se potum. Vomitus autem a cibo adeo iis febribus inueteratis utilis est, ut multum Galeno lib. 1. ad Glauconem, hoc vno præsidio curati sint. Febris enim diuturnitas multa in stomacho excrementa pituitosa parit, quibus vomitu reiectis, a febre vindicantur. Hypochondria quoque calidis fouenda sunt medicamentis, ut scilicet flatus qui ea distendunt, per illa discutiantur. Inter reliqua vero hoc potissimum conuenit, quod recipit: *Florum rubeam meli, meliloti, anethi, singulorum manipulum unum. Absinthii, manipulum dimidium. Rosarum rubearum, manipulum unum. Seminum lini, fenugraci, singulorum drachmas tres.* Ebulliant omnia in aqua sufficienti ad tertias. Dein spongia in hac irrigata hypochondria foueantur. Proderit quoque ventriculum hoc, aut simili vnguento ungere, quod accipit: *Oleorum mastichini, rosacei, chamæmelini, singulorum drachmas tres. Caryophyllorum, drachmam unam & dimidiam. Cera quod satis est, fiat vnguentum.* Porro balneum in hac febre ante concoctionis signa salutare non est, quia crudos humores, vitus coquendos, ad eum euocat, obstructionemque auget.

Purgatio

Vomitus

Fomentum

Vnguentum
Balneum

De quartana. CAP. VIII.

ALTERRUM genus febrium intermittentium est exquisita quartana, quæ ex solo melancholico humore putrescente generatur. Hæc quidem non statim primo die cum rigore inuadit vehementi, sed talis est, qualis iis, qui vehementer gelu frigescent. Progredientem autem ipsa & aucta, una etiam rigor augetur, inualefcitque quotidie usque ad totius morbi incrementum, sensusque eius non pugnans stimulanisve curam, sicut in tertiana exquisita, sed vehementem algorem inducentis, & tanquam ossa frangentis existit. Pulsus admodum rarus & tardus in principio accessionum obtinet. Quam vero viget, vel adhuc etiam augetur, necessario veloces & crebri fiunt. Seruatur tamen & tunc nativa ipsius tarditas & raritas, si accedentem velocitatem datque frequentiam in accessionibus consideres. Verum caloris motus, incrementum, & vigor tertianis febribus contraria sunt. In ea enim paulatim humor velut lapidealis, aut testa, aut os, aut tale aliquod huiusmodi corpus frigidum & sic cum succenditur. Vbi vero aliqua ex eo flamma fuerit accensa, nihil humidum aut a se incombuustum in accessione relinquit. Atque idcirco in humore longiores sunt cessationes, quam in pituita, atque intermissio exquisita pura videtur: quoniam hic quicquid atræ bilis fuerit accensum, exhauritur atque dispergitur, Bilis præterea flauæ vomitus quartanam haud comitatur. Urinæ tanquam per crassiorem materiam excolatæ sunt tenues, albæ, & aquosæ. Ad hæc in autumno potissimum incipit, erraticis superueniens febribus. Ceterum inspicienda & laborantis natura, seu temperamentum, victus ratio quæ antecessit, regio, ætas, & alia eiusmodi. Si enim frigida & sicca fuerint, tunc certius quartanam futuram sperabimus, potissimum ubi eo tempore quartanæ febres populariter vagabuntur. Quartana laborantes per initia moderate leniterque tractandi, neque vilo vehementi medicamento, aut vacuatione irritandi. Quippe humor qui quartanam efficit, tractui est contumax. Agre igitur inter initia, & antequam concoctus sit, trahens medicamentum sequitur: idque propter suam crassitatem ac frigiditatem, & quod vias angustas, per quas illi transeundum est, obstruat, quemadmodum Galenus in libello cui titulus est. Quos nam purgare oporteat, quibus medicamentis, & quando, copiosius docet. Tamen si sanguis admodum exuperare videatur, tum is erit auferendus. Et si secta vena sanguis niger & crassus, qualis maxime in lienosis conspicitur, profluat, audacter mittendus est. Nam huius magna copia extracta, natura reliquo humori concoquendo superior euadet, febremque breuiorem reddet. Secunda autem vena in gibbero sinistræ manus interna, lienarem vocant, vel media. Hæc enim vena ex liene maxime, qui in febre quartana affici solet, vacuat humorem melancholicum. Si vero tenuis ac flauus appareat, statim est supprimen-

Causa
Signa

Quare in
quartana
longiores
cessationes

Curatio

Vena
sectio

Viſceribus -dus. Eiuſmodi namque humor inutilis non eſt, ſed craſſum ac frigidum humo-
rem, tum ſua ſubſtantia, tum qualitate emendat. Viſtum inſtituere conuenit opti-
rum, cum nimirum, qui minime flatuoſus ſit, bonumque ſuccum generet. A ſui-
dis itaque carnibus arcendi ſunt ægri, atque ab omnibus aliis eduliis quæ viſcida & te-
na- nacia ſunt, tardeque exire ſolent. Ab omnibus denique quæ corpus refrigerant &
-ex- ſiccant. Utendum eſt volatilibus montanis boni ſucci, quæ autem in paludibus de-
gunt inſalubres ſunt, & excrementis ſcatent, craſſumque humorem gignunt. Piſci-
bus autem ſaxatilibus, & qui molli carne, tenacitate carente, præditi ſunt, utendum.
Salla vero ac ſinapi in hiſce febribus cibis ſunt adhibenda, ut craſſos & glutinoſos hu-
more- ſes incidant & extenuent, ſuperuacuaque humiditatem depaſcantur. Vino u-
tendum eſt albo, tenui, & mediocriter calido. Hoc enim ſua tenuitate humoris
melancholici craſſitudinem extenuat, caloris autem mediocritate corpus humore
melancholico refrigeratum modice calefacit, coſtioneque iuuat, & urinam pro-
uocat. A frictionibus autem & deambulationibus, aliſque conſuetis ſtudiis, non ſunt
penitus arcendi. Hoc eſt, permittenda quidem hæc ſunt, ſed minus tamen quam
per ſanitatē. Neque tam crebro, tamque vehementer fricare, deambulare, aliterque
corpus exercere licet, quam per ſanitatē: quod alias obſtructionis, ut dictum eſt, pe-
riculum immincat. Sed ſi moderate hæc adhibeantur, idque in intermiſſione fe-
bris, & longe ab acceſſionibus, excrementa vacuabunt, & alia commoda a *Galeno libr.*
2. De tuen. ſani. expoſita, adferent. A balneis tamen, ſi poſſunt, omnino abſtinere debent,
ſolis contenti frictionibus. Nam eſi quatenus calefaciunt proſint, tamen quatenus
ſoras euocant, obſtructionis periculum afferunt, præſertim ubi corpus excrementis
redundat. Et ſi breuis quarrata ſit, minimeque violenta, non male per acceſſionum
intermiſſio- nes, id eſt, diebus inter acceſſionem mediis, ægroti ad ſolitas exercitatio-
nes ſe transferent. Ceterum venter, ſi omnino fieri poteſt, conſuetis alimentis, vel pu-
Clyſteres. ris, vel medicamentoſis emolliendus: aut clyſteribus primum mollioribus, deinde a-
-rioribus. Senſim enim augenda eſt eorum vis, prout ſenſim febris materia coqui-
-tur. Nam per initia, ut dictum eſt, leniter has febres tractare oportet. Exemplum mol-
lium ex præcedente capite petes. Paulo vero acrior eſt hic, qui accipit: *Malua, chama-*
-meli, *mercurialis foliorum viola uigra, ſingul. manipulum vnum. Foliculorum ſenæ radice polyp-*
-di, ſingulorum drachmam dimidiam. Hamoniditis, manipulum vnum & dimidium. Coquantur
omnia in aqua ſufficienti ad tertias. Iuriper colum tranſuſo admiſceatur medulla caſſiæ fiſtularis,
uncia vna. *Antidoti diaſenæ laxatiua, uncia dimidia. Olei communis, uncia tres. Mellis roſa-*
**-cei, ſalis ſoſſilis, drachma vna, fiat clyſter. Interpoſitis quibuſdam diebus, medicamentum
quod *diatrion pipercon* vocatur, & *dioſpoliticum,* dandum eſt. Hæc enim quia vehemen-
ter calefaciunt, non quotidie ſunt adhibenda. Quorum quidem componendorum
ratio & utilitas, ex 4. *Gale. De ſani. tuen. lib.* petenda eſt. Recte autem fecerint ægrotan-
tes, ſi ſolum piper cum aqua quotidie biberint, *Galeno libr. 1. ad Glauc. auctore.* Calefacit e-
-nim, & flatuoſi ſpiritus craſſitudinem ſoluit, & quæ in hypochondriis ſunt congeſta
cruda concoquit, & extenuat. Datur autem commodiſſime in iuſculis, & condimen-
-tis, vel conſernis conuenientibus. Hæc quidem per initia uſq; ad vigorem peragenda
ſunt. Quod ſi in morbi vigore ægrotuſ iam eſſe videatur, tunc tenuiori quam ante vel
poſt viſtu utendum eſt: ſtatimque longa quieſ imperanda eſt, ne natura circa morbi
materia concoquendam occupata, a ſuo munere auocetur. Deinde prouidendum vi-
-ſceribus, quæ diſtendi ſolent tum viſcoſi, tum craſſi humoris, ac ſpiritus etiam flatu-
-lenti copia, quibus reſolutis atque vacuatis, emolleſcunt ac laxantur. Illinenda igitur
quæ mollire & laxare poſſunt: ut ſunt quæ ex *ſarina hordeacea, ſemine apii, iridis radice, ru-*
-ta, & iis ſimilibus componuntur vnguenta. Inter cetera vero ſiniſtrum hypochondri-
-um hoc vnguento illinendum erit, quod habet: *Olei de cappariſ, drachmas tres. Oleorum*
-irini, amygdalini dulcis ſingulorum drachmas duas. Seminis apii, cumini, radice iridis ſingulorum
ſcrupulum vnum. *Cera quod ſatis eſt, ſingatur vnguentum.* Poſthæc utendum medicamentis
quæ ciendi urinam vim obtinent, antea vero nequaquam. Si enim priuſquam viſcera
ab obſtructione libera ſunt, ea adhibueris, humores (calida nanq; ſunt) ſecum rapiunt,
obſtructionemq; augent. In hunc ſane uſum muſſa, ppinanda, in qua anethum, aut ru-
-ta, aut apium decoctum ſit. Si cōcoctionis notæ apparuerint, mox purgantib. medica-
-mentis**

A mentis vtendum est, quæ melancholicum succum educunt, idque non semel tantum, sed sæpius, si res ita exigere videatur. Semel enim ea edici non potest, quando tam vehemens medicamentum, quod vniuersum hunc humorem tractui contumacem semel purget, corpus sustinere non queat. Formulas autem horum medicamentorum ex libro 1. capite. De melancholia, petes. Præter alia tamen Aetius laudat vinum dulce infusum in cavitatem eolocynthidis, sic tamen vt illi admisceatur quippiam apii, aut dauci, iucunditatis gratia. A cibo vero vomitus est ciendus, si nihil prohibeat, Vomitum. veratro albo, primum acum raphano permixto, *vt in superioribus est ostensum.* Quod si parum aut nihil effecerit, veratrum ipsum per se dandum. Et si quispiam ab eleboro abhorreat, hoc aut simili vti licebit, quod recipit: *Succi raphani, aut eius liquoris stillicitii, uncias quatuor. Oxymelitis simplicis, uncias duas.* Misce, ac tepidum bibendum exhibe. Qui vero vomere nequeunt, per inferiora purgandi sunt. Tales autem sunt, qui pressum angustumque thoracem obdient. A purgatione dandum medicamentum e viperis, quod theriacam vocant, aut quod illi facultate simile sit: quale est quod ex liquore cyrenaico conficitur, capitque *liquoris cyrenaici, myrrhe troglodytica, piperis, æquales partes.* Scorsum trita rutæ succo colliguntur, in pilulasque finguntur. Dantur oboli pondere. Qui autem per initia morbi, aut omnino ante vigorem, aliquod ex iis medicamentis dederunt, ex simplici quartana sæpe duplicem, aut sine dubio maiorem ac difficiliorem: ex duplici vero triplicem, aut omnino ambas maiores difficilesque reddiderunt.

E De quotidiana. C A P. IX.

QUOTIDIANA febris intermittens expituitæ putredine, per sentientes corporis partes a natura detrusa, ortum habet. Græcis *ἀμφιμέρινα* dicitur, quod scilicet Causa. Amphimerina. singulis diebus accessiones facit. Quod si vero priuatim vitrea pituita, quæ aliarum omnium frigidissima est, ex dimidio putrescat, hoc est, si non tota ipsius substantia æqualiter, sed aliquæ ipsius partes putruerint, aliquæ vero non, *Epialos* febrem appellatam excitat: in qua ægri febricitant simul & rigent, atque eodem tempore in omnibus corporis partibus vtrumque, calorem nimirum & frigus immodicum, sentiunt. Si quidem partes humoris putredinem nondum expertæ, per omnes venas, aut etiam reliquum corpus sparsæ rigorem creant: putrefactæ vero, febrem accendunt. Epialos febris. Ceterum quotidiana haud quaquam cum rigore primo statim die inuadit, sed progressu temporis refrigeratio potius quam rigor occupat. Pulsus, quum primum accessio fit, inordinatus est & inæqualis, tardus, parvus ac debilis. Neque etiam in augmento velocitas motus, magnitudo, atque vehementia quotidianæ adsunt. Calor illi non tam acris ac vehemens, vt in tertiana: neque enim adurit, neque denudari corpora, & vestitum iactari cogit, neque multum & crebro spirare compellit, ac veluti flammam ex ore efflare, vel frigidam expetere, sed humidus & fumosus, cura multo vapore commixtus est. Ægre quoque accenditur, ac longum consumit tempus, dum inualescendo peruenit ad summum. Minime denique qui sic febricitant sitiunt, quod scilicet non duntaxat lingua, sed & vniuersum corpus in hac febre humidissimum sit. Vrinæ Signa. in quotidianis vel albæ, tenues, & aquosæ: vel crassæ aut turbulentæ. Nullus omnino sudor in primis diebus erumpit, neque vnquam exacta febriendi quies attingitur. Occupant fere decem & octo horarum spacium. Vomitus etiam pituitosi iis accedunt: & quæ per aluum excernuntur frigidiora, humidiora, crudiora, aquosiora, & pituitosiora sunt. Ceterum quotidiana febris humidas, pituitosasve naturas maxime infestat. Anni quoque tempore humidior, hyeme præsertim, humida ex frigida constitutione, senili ætate, & puerili. Hinc est quod Galenus adolescentem biliosum & natura siccum, nunquam hoc febre correptum se vidisse scribit. Ex grandioribus vero, qui pituitosi magis, ac corporis habitudine crassi sunt, vitamque agunt ociosam, gulæ indulgentes, & ebrietati debiti, crebro balneis, maximeque a cibo vtentes, quotidiana facile capiuntur. Quas singulas certe fusius libro 1. ad Glauconem cap. 7. & libro 2. De differ. feb. cap. 4. & libr. 2. De iudiciis capite 5. Galenus prosequitur. Vicius ratio. Vicius ratio in hac febre in vniuersum sit incitoria & extenuans: ideoque ad ea nunc capitale lectori recurrendum erit, in quibus qualis hæc sit victus species, a nobis est abunde commemoratum. Primis quidem diebus, hoc est, quando cruditatis adhuc signa

apparent, pituita incidenda eſt, & meatus obſtructi detergendi. Ideoque oxymelite A eſt vtendum, vtpote quod ſtrenue detergit, glutinoſa incidit, & meatus ab obſtructio- ne liberat: & iis quæ viam mouent, vt ſcilicet pituita iam extenuata expeditius per meatus tranſire ac vacuari poſſit. Conueniet itaque decoctum e radice apii, petroſeli- ni, iridis, ſeniculi, & id genus aliis ante ſapiffime commemoratis, cum ſerapii acido composito mel- le roſaceo, & duabus radicibus vocato, & aliis quibus incidendi & extenuandi ineſt facultas. Circa vigorem de ventriculo, maximeque eius ore, habenda eſt ſollicitudo. Proſpiciendum igitur illi eſt iis, quæ foris ad mora robur addunt, cuiuſmodi ſunt maſtiche, nardus, ab- ſinthium, & id genus alia. Quapropter ante cibum hoc vtendum vnguento, quod ac-
 Vnguentum
 cipit: Oleorum maſtichini, abſinthii, nardini, ſingulorum drachmas duas & dimidiam. Maſti- ches, earyophyllorum, ligni aloes, ſingulorum ſcrupulum dimidium. Cinnamomi, ſcrupulum vnum. B Cum cera quantum ſatis eſt, ſingatur vnguentum, quo ventriculi regio inungatur. Confirmato ventriculo, vomitus imperandus eſt. primo ſumpto raphano, dein cibis aſſumptis, præſumtus enim cibum ſubleuat, proindeque vomitionem faciliorem reddit. Poſt medicamenti quæ pituitam eliciunt, vtendum eſt, tunc enim pituita, vtpote conco- ctionem experta, opportune purgatur. Qualia vero ſint eiufmodi, ex præcedentibus libris patere cuilibet poteſt. Atque hæc pro quotidianæ febris, quæ raro admodum accidit, curatione dixiſſe ſatis ſit.

De heſtica febre. CAP. X.

Heſtica
 quid.
 Heſtica vn
 de dicta.

HECTICA febris appellatur, quando calor præter naturam non ſolum in ſpiri-
 tribus & humoribus, ſed iam partibus etiam ſolidis conſiſtit: Heſtica vero dicta C eſt, vel quod firma, fixa, & ſtabilis ſit, difficulterque ſoluatur, quemadmodum habi- tus: vel quoniam habitum corporis complexa ſit. Sic enim vocare conſueuerunt ſo- lidas corporis partes, eas humidis diſtinguentes. Hæc certe dolorem neſcit, & qui ea detinentur, nequaquam febricitare ſe exiſtimant: neque enim calorem percipi- unt, quum vniuerſæ iſtis particulæ æqualiter ſint excalefactæ, vt copioſius in libello De inæquali intemperie Galenus oſtendit. Febris autem heſtica duplici modo generatur. Primum quidem magna ex parte ab ardentibus febribus, quæ adeo protrahuntur, vt longitudine temporis humorem in corpore cordis contentum abſumant, vel etiam ſi copioſius adhuc ſubſiſtat. Illæ vero non tantum heſticæ ſunt, ſed etiam
 μαρομυδus, hoc eſt, tabidæ. Quæ autem manente adhuc humiditate generantur, vbi D corpus cordis occupauerint, hinc maxime acceduntur, haud ſecus quam lucernæ flamma ex ellychnio. Atque hæc vna quidem febris heſticæ generatio. Reliqua eſt, quum ſtatim inuaſerint, ſimilem primum ſui ortum diariis facientes aut ex mœrore, aut ira, aut laſſitudine nimia, vna cum ſolis feruore natæ. Hæc autem febres non eſt admodum difficile curare. At quæ ex iſtis in tabem marcoremve, qui Græcis μαρομυδus
 μαρομυδus. dicitur, ex Medicorum inſcitia peruenerunt, vbi iam exquiritæ conſiſtunt, & non ad- huc incipiunt, hæc non modo curare difficile, imo etiam impoſſibile eſt. Earum enim natura calida & ſicca eſt, vt tale aliquid patiatur cor, quale lucernæ funiculus, quum plu- rimum peruſtus fuerit. Nam qui ita torrefactus eſt, frangitur & diſſoluitur, atque E ex ariditate continuitatem admittit, adeo vt etiam ſi copioſum ſuperinfundas oleum flamma abundantior non poſſit accendi. Semper enim parua & imbecilla in ipſa palpitāt, ac continue ſit minor, donec ex toto exſtinguatur. Talis quidem eſt febris quæ omnino μαρομυδus, hoc eſt, tabida exſiſtit. Heſtica vero, quæ in maraſmum inci- dit, cognitu promptiſſima atque faciliſſima exſiſtit. Nam priuſquam pulſum atque calorem tactu perpendas, videbis oculos immodice concauos, veluti quibuſdam
 Signa. quaſi ſcrobibus reconditos, exhausta iam vniuerſa in iſtis humida ſubſtantia, ita vt oſſium quibus palpebræ cohærent, eminentiæ conſpiciantur. Sordes qui- dem in iſtis aridæ apparent, & quidam ſqualidus affectus, qualis maxime ineſt his qui toto die ſub ſolis ardore iter longum per puluerem fecerunt. Flos etiam ille vi- talis periit, cutiſque in fronte arida diſtenſaque eſt. Palpebræ frequenter veluti ſom-
 nolentæ conuiuent. Verum malum eorum ſomnus non eſt, ſed potius vigilandi im- potentia. Contabuerē quoque carnes, quæ in temporibus ſunt, vt collapſa videantur, & concaua loca. Quid enim aliud præter oſſa & cutem ſolam habent? Nam ſi denu-
 datum,

- A** datum ventrem inspexeris, neque intestinum; neque viscus vllum super esse tibi videbitur. Hypochondria sursum ad thoracem conualluntur: Quod si eos tangere libeat, cutis quidem apprime est arida: quam si digitis apprehendas extenderis, instat corii cuiusdam consistit: Pulsus tenuis, durus, debilis, & frequens. Caliditas quum primum manus admouetur, debilis est: paulo post acris, & rodens erumpit; & magis quum amplius tangendo immoraberis. Maxima quoque erit hæc & minime anceps nota: adhibito cibo calor incenditur, pulsusque magnitudinis & velocitate intenditur. Tamdiu vero hectica febris dicetur; quamdiu natua humiditas reseruatur. Vbi autem ambigitur, ne nihil amplius humoris super sit, absoluta iam tabes est, quæ Græcis *πυρεγος* vocatur. Hecticas vero febres priusquam ad tabem deueniant, omni *Curatio* *Victus*
- B** natu refrigeremus. Summa itaque curationis in refrigerando ac humectando collocatur, tam iis quæ extra admouentur, quam iis quæ intra sumuntur. Aer igitur inspiratus frigidus sit & humidus. Et si natura talis non sit, arte paretur, *ut dictum est super capite 6. De tertiana curatione.* Cibus vtendum iisdem viribus præditis, *ptisana* nimirum cremore, pane modico in aqua frigida macerato: *carnibus* hædæ, phasianorum, volucrum montanarum, testiculis gallorum, *carnibus* caporum, *ouis* sorbilibus, *caseo* recenti salis experte: *piscibus* saxatilibus, lactuca, intybi, cucurbita, spanachia, malua, & similibus: *cerasis*, *pruinis*, *malis* punicis, *melonibus*, *ficibus*, & eiusmodi. Lac etiam mirifice iis prodest, modo alia febris ab humorum putredine orta non complicitur. Quæ vero ad huius exquisitam exhibitionem sunt necessaria, vt alia multa huic instituto conuenientia, tradit Galenus *libr. 7. Ther. method. capite 6.* Potus sit aqua frigida, præsertim si ea assuetus est æger, moderate sumpta, aut aqua in qua parum cinnamomi sit decoctum, aut vinum aquosum ac tenue. Conuenit denique hecticis sæpius die cibum accipere, vt nimirum hac ratione caueant, ne vna vice magnam ciborum copiam, quam virtus inualida vincere haud potest, ingerant. Motum immodicum; & quicquid vires resoluerè potest, depuerit. Ceterum medicamenta purgantia illis, quos hectica affligit, non sunt propinanda: calidiora enim atque vehementiora sunt, quam quæ illis conuenire queant. Sed si alius plus æquo adstrictus sit, lenibus & refrigerantibus ac humectantibus clysteribus, adiecta medulla casæ fistularis, hanc eluere oportet. Intra corpus ea exhibeantur medicamenta, quibus refrigerandi & humectandi vis inest: quæ
- D** lia inter composita hodie vsitata sunt terapia, *violaceum, ex intybo satiuæ, acidus, oxyssacharon, & similia.* Item antidota, *diarrhodon* abbatis, *diatragacanthæ*, *diapapaueris*, & id genus alia. Ex simplicibus, *succi & liquores stillatici lactucæ, portulacæ, intybi satiuæ, & papaueris.* Inter ea vero quæ foris admouentur, balnea huic malo obnoxiiis quouis tempore idonea sunt. Balnea nimirum aquarum dulcium, ad quæ sane æger in lectulo; aut si nondone deportari debet, sintque in singulis angulis qui sindonem ferant quatuor: Aquam vero solii temperatissimam esse oportet: in ea etiam moderate commorandum ne sc, quippiam e propria humiditate hauriatur, tantum abest vt in ea sudare debeat. Sunt qui in aqua balnei herbas, nempe violas, maluas, lactucas, flores intybi, papaueris, & iis similes: alii pedes vitulinos, & capita agnina, quoad ossa carnibus separantur, coquunt. Cauendum etiam, ne capiti eius, Galeno libro decimo *Ther. method. capite decimo teste*, quicquam infundatur, quum sit satis id quoque bis terue, cum toto corpore in aqua mergi, demissa mediocriter deorsum sindone, ac rursum per quatuor iuuenes qui eum portant, leuata. Mox hinc eductus, in frigidam semel totus tingatur; ne vel breuissimo quidem spacio illic moratus. Hectica vero laborantes, qui ad balneum accedunt, Galeno loco iam citato attestante, nisi in frigidam sint immissi, nihil iuuantur. Protinus autem ubi extractus fuerit, alter paratam habens sindonem ipsi iniiciat, ac deinde aliam. Tum in lectulo collocatus, primum spongiis detergeatur, deinde mollibus linteis. Nec committent, qui eum detergebunt, vt violentius eum contrectent, sed quoad fieri potest blandissime. Quid multa? eam sane curam & diligentiam, si fieri potest, omnino in balnei vsu adhibeant, quam Galenus loco paulo antecitato requirit. Post hæc oleis frigidis, & aliis humectantibus inungendus erit. Inter cetera vero hoc conuenit, quod accipit: *Olei violacei, unciam dimidiam: Olei de cucurbita drachmas tres. Butyri recentis & salis experti pinguedinis porcina, drachmam unam & dimidiam.* Misce, & fac linimentum, quo vniuersum vngatur corpus. Vel adiciantur *lenti succi*

Oleum rosaceum. *tragacantha, drachmas duas. Medulla cruris vitulini, drachmas tres. Cerae quod satis est, si at unguentum. Valet quoque oleum violaceum, amygdalarum dulcium, de papauere, & rosaceum, quod Galenus libro tertio. De simplicium med. facultat. capite 16. teste, a rentia corpora mirifice humectare potest. Vbi vnctus fuerit, ac vestibus amictus, rursus super lectulo aut sindone in domum vbi cibatur, reducendus ac nutriendus erit. Proderit etiam cor atque iecur epithematis refrigerare & humectare, qualia sunt quæ habent: Stilla-
Epithema cordis. *ticii violarum liquoris, nymphae, & lactuca singulorum uncias tres. Aceti optimi, unciam dimidiam. Rosarum purpurearum, santalarum omnium, singulorum drachmam unam. Specierum di-
margariton, drachmam dimidiam. Caphura, grana tria. Croci, scrupulum dimidium. Miscean-
tur, & fiat epithema, quod cordis regioni adhibeatur frigidum. Aliud recipit stilla-
Epithema iecoris. *ticii lactuce liquoris, uncias duas. Aceti, unciam unam. Specierum diarrhodon abbatis, drachmā
unam & dimidiam. Rasura eboris, drachmam dimidiam. Caphura, scrupulum dimidium. Misce-
antur, fiatque epithema, quod iecori admoveatur. Conferunt etiam hecticis medica-
Odora-menta. *menta, quæ dolore suo refrigerant & humectant, ut sunt nymphae flores, caphura, viola,
rose, & eiusmodi. Plura quoque ad curationem hecticæ conducentia reperient studio-
si in capite De tabe. Et in sananda hectica hoc vnice studendum, ut corpus non solum per
ea, quæ intra corpus sumuntur, refrigeremus & humectemus, verum etiam per ea,
quæ extrinsecus admoventur, per olei potissimumunctionem. Quantum enim
hoc ipsum foris adhibitum ad corporis ac virium conseruationem & reparationem
conducatur, celebri Pollionis Romuli exemplo docemur. Hunc nanq; centesimum iā
annum excedentem, ut auctor est Plinius libro 22. cap. 24. quum diuus. Augustus hospe-
Pollio Ro-mulus. *interrogaret, quanam ratione vigorem illum animi corporisque custodisset, respondit: Intus
mulso foris oleo.*****

De hemitritæo, seu semitertiana. CAP. XI.

QUANTO VARIA SINT genera compositarum febrium, ut patet ex capite septimo
libri secundi De different. febrium, & capite 9. & 10. libri secundi. De iudiciis Galeni: nos etiā
summatim ea capite 26. nostri Compendii indicauimus: tamen de ea hoc loco duntaxat a-
gemus, quæ ex tertiana intermittente, & quotidiana continua componitur, & Græ-
Hemitritæus quid. *cis ἡμιτρίταιος dicitur, non alia certe de causa, quam quod tota eius natura dimidia parte
alterutram prædictarum febrium habeat. Ut scilicet hoc genus febris complicatæ
sit instar exempli, ad cuius similitudinem omnes aliæ febres compositæ curentur. Fit
Causa. Signa. *itaque hemitritæus, vbi putrescens pituita putrefactæ bili admiscetur. Constat tertiana
cum rigore inuadere, quotidiana cum refrigeratione extremitatum. Quare
quæ & ambarum mixtura constat, horrorem inducit, qui rigore quidem minor est,
maior autem ac vehementior refrigeratione, adeoq; iis simul confusis neutrum vere
eminer. Generatur autem duplici modo: vel enim duæ accessiones statim ab initio in-
uicem iunguntur, simulq; cōgrediuntur, vel seorsim singulæ accedunt. Vbi igitur ter-
tiana præpollet, magis horrida febris efficietur, & rigoris etiam non nihil in progres-
su accessionis assumit, adestque omnino calor maior & ardentior, & bilis vel vomitu,
vel deiectione pellitur, aut humidus vapor exhalat. Quando altera pituitosa superat,
perfrictiones quidem summa exercent, pauci vero horrores: neq; tamen sitis, neque
Exquisitus hemitritæus. *ardor in iis affligit. Quum pares magnitudine sunt tertiana intermittens, & quoti-
diana continua, insultus quidem accessionis cum horrore accidit. At quum ex pitui-
ta proueniens febris præcelluerit, submissiones pulsum fiunt, & horrores. Si vero
calidior præualeat, subito incalescunt. Talis sane est exquisitus hemitritæus, ex æqui-
ualente duarum febrium, puta tertianæ intermittens, & quotidianæ continuæ tem-
peratura proficiens. Non exquisitus vero, vel ob bilem largiorem, vel pituitam cau-
Curatio. *satur, quemadmodum fusi nos sect. 4. aphoris. commentar. 43. & libr. 2. De different. febr. capite 8.
tradit Galenus. Ex prædictis quiuis intelligere potest, quæ in hac febre sit curandi ra-
tio. Nam quum hemitritæus exquisitus ab æquiualente commixtione duarum fe-
brium, tertianæ scilicet & quotidianæ constet, curatio quoque adhibenda est tū ter-
tianæ tum quotidianæ ex æquo conueniens. In non exquisito autem, quum vel bilem
largiorem vel pituitam habeat, pro humoris excessu variatur etiam curatio ipsa. Si
enim flaua bilis sit superior, præfidiis maxime utemur, quæ in tertianæ exposuimus cu-
ratione. Sin pituita, iis quæ in quotidianæ curatione comprehensa sunt. In summa, ei
quod****

A quod maxime vrget incumbendum: ita tamen, ne alterum prorsus negligatur. Quapropter nihil opus est hoc loco, remedia quibus hæc febris demolitur percellere, quum quiuis ea pro humorum diuersitate & natura promptius ex capitibus de tertianæ ac quotidianæ curatione discet. Quod si itaq; quis primum simplicium febrium curationes exacte cognouerit, nullo labore etiam compositas curabit. Simplicium enim curatione perspecta, promatissimum cuiuis erit compositas curare, vt hoc nomine non sit opus de compositarum febrium curatione seorsim scribere.

De pestilentia. C A P. XXII.

Q V M multorum hodie passim recentiorum Medicorum de pestilentia scripta exstent, iique omnes propemodum pestem inter febres connumerent, quod hæc nunquam sine febre adeoq; simplicem esse putent, idq; non sine maximo errore, ideo eius definitionem, quatenus per se morbus est, & simplex, subiicere placuit, quæ est eiusmodi. *Pestis quæ Græcis, λοιμός, vel λόιμος, λοιμώδης, ἢ λοιμωδὸς dicitur, est lues pernicioſa, contagioſa, ex aere, qui per os alioſque corporis meatus inspiratur, pestilente seu venenoſo orta, quæ uno eodemque tempore homines promiscue inuadit.* Vnde omnibus palam fit, luem hanc morbum esse a tota substantia corpori nostro contrarium, ideoque non nisi alexipharmacis ac medicamentis tota substantia veneno pugnantis curari posse, vt infra plenius ostendetur. Pestem autem sine febre esse posse, Galenus libro 9. de simpl. medica. facul. in capite de bolo armenia testatur, vbi pestem interdum diserte omnino sine febre esse: *πυρρὴν καὶ ἀνὸς αἵμα* scribit.

Cremente, sane alioqui homines concidant, nulla in ipsis existente putredine, adeoque febre. Atque id euenisse in peste quæ suo tempore Parisiis grassata est, Ioannes Andernacus in eo, quem nuper de peste germanica lingua scripsit libello etiam testatur: In quo quidem, præter aliorum Medicorum imperitorum sententiam, pestem sine febre esse posse manifestis verbis ait. *Sed quum ea de re alibi egerim plenius, non est cur nunc prolixius de ea differam: sed satis sit, si breuiter, vt in aliis quoque vitis corporis fecimus, causas, indicia, & curandi rationem indicauerimus.* Pestilentia causas potiores Galenus lib. 1. De differentia febrium, cap. 5. duas esse tradit. Vnam, aerem vitiatum pestilentem ac putridum. Alteram, humores corporis vitioso victu collectos, & ad putrescendum paratos, quum leuem aliquam occasionem ad febris originem & venenositatem ab aere ambiente acceperit animal. In pestilenti itaq; constitutione, inspiratio maxime causa est, sine qua diu animal prorogare vitam haud potest, cur homines peste corripuntur. Magna enim ex parte incipit ex inspiratione aeris ambientis, siue ea per os, siue alios corporis meatus fiat, a putrescibili euaporatione vitiatum. Putredinis autem principium est, vel cadauerum multitudo non crematorium aut humatorum, vt in bellis accidit: vel ex aliquibus lacubus, aut paludibus astituo tempore euaporatio. Contingit vero quandoque, præcedere ambientis aeris immensam caliditatem. Quum igitur aeris temperatura a naturali habitu ad immodicam caliditatem & humiditatem conuersa fuerit, pestilentiam sequi necesse est.

Hinc est quod Galenus lib. 1. De tempe. cap. 4. omnium aeris temperamentorum pessimum id esse quod humidum & calidum est, scribat. Non raro etiam prauitas victus humores, vt comprehensum est, qui sunt in corpore putredini obnoxios reddunt, adeoque causa exstistit, cur eiusmodi corpora pestilentia corripiantur. Et tunc sane ii potissimum laborant pestilentia, qui praua victus ratione vtuntur, atque adeo omni genere superuacuum pleni sunt. Proinde mirum videri non debet, si interdum vnus aliquis ex multis, quod rarissime tamen accidit, aere nondum in totum pestilente; hoc morbi genere corripitur. Quicumque enim probe victitant, & redundantis vacant, ii quidem nequaquam, aut certe minimum, aere etiam ipso vitiato mali sentiunt, ac facile ad naturalem habitum reuertuntur. Hinc facile est respondere iis qui quaerunt, quomodo eueniat, vt non omnes ex æquo pestilentia corripiantur, quum tamen aerem pestilentem inspirare singuli cogantur. Prima enim cur aliqui illæsi maneant hæc causa est, quod superuacua humiditate pleni non sunt, & moderatis tum victu tum laboribus vtuntur, ac corpus bene spirabile est. Altera causa est, quod corpora non sint æqualiter affecta. Quum enim corporum affectus dissimiles sint ac multiformes, quidam facile vincuntur, & promptissi-

Causæ

Putredinis principium vnde

Temperamentum aeris calidum & humidum pessimum est;

Cur vnus interdum aliquis aere nondum pestilente hac lue insciatur.

Quare nonnulli a pestilentia illæsi permanent;

nie patiuntur, a cauſſa efficiente: quidam vero inſuperabiles ſunt, ac omnino non patiuntur, aut difficulter. Quare qui præpotenti cauſſæ quoad eius fieri poteſt aduerſantur & renituntur, peſtilentia non capiuntur. Qui iis contrarii ſunt celerrime hanc patiuntur, & maxime illa laborant. Siquidem maxima portio generationis morborum eſt, corporis quod patietur habitas. Nulla enim cauſſa ſine eius quod patitur habitate efficere aliquid poteſt. Alioqui omnes qui ſub æſtuo ſole commorantur, aut qui nimio motu utuntur, aut vini potu grauantur, aut excandefcentes, aut triſtitia affecti febricitarent, quemadmodum copioſius libro primo, De differ. feb. cap. 4. Galenus oſtendit. Tamen interea non negamus, quin interdum propter ſcelera & flagitia hominum Deus diras peſtilentias immittere, quibus delictorum noſtrorum gravitatem puniat. Exſtant enim eius rei multa perſpicua in prophetis teſtimonia, apud Ezechielem præſertim, qui cap. 5. ita ſcriptum reliquit: *Ecce Hieruſalem, pro eo quod ſanctum meum violasti in omnibus offenſionibus tuis, & in cunctis abominationibus tuis: ego quoque te conſringam, & non parceret oculus meus, nec miſerebor. Tertia pars tui peſte morietur, & fame abſumetur in medio tui, &c.* Ceterum tempora quibus potiſſimum naturali lege graſſatur peſtilentia, ſinem æſtatis & autumnii eſſe initium conſtat. Tum enim aer atque hominum corpora multis de cauſſis ad putrefactionem ſunt magis habilia, quas in enarratione Aphoriſmi noni, ſectionis tertię, ordine expoſuimus. Signa futuræ peſtilentię multa & varia a recentioribus commemorantur, inter quæ *primum*, eſt temporum anni mutatio. *Alterum*, crebra in aere phænomena, potiſſimum autumnii tempore. *Tertium*, ubi exanthemata nedum pueros, verum etiam adultos crebro affligunt. *Quartum*, frequentes autumnii tempore venti meridionales & occidentales. *Quintum*, aer autumnio tenebroſus & turbidus, minans pluuiam, cum tamen nihil pluatur. *Sextum*, ſi prægnantes ex leui quauis occasione abortiunt. *Septimum*, quando æſtate a pluuiis ſubito magna ranarum in tergo cinericiorum, in ventre autem luteorum, aut alterius diuerſi coloris comparuerit copia. *Octauum*, numeroſa inſectorum, vermium, & reptilium multitudo. *Nonum*, quadrupedum & natatiliū interitus. *Decimum*, auium e nidis ſuis, illic oua ſua relinquentium, profugium. *Vndecimum*, anno næ caritas. *Duodecimum*, quod omnium certiſſime peſtilentiam præſagire videtur, eſt calida & humida totius anni conſtitutio. Notæ autem quæ hominem iam peſtilentia eſſe correptum demonſtrant, plurimæ quoque eſſe ſolent, *Primum*, autem

Diuinitus etiam peſtilentia interdum immititur.

Tempora quibus potiſſimum peſtilentia graſſatur. Signa vitia- ti aeris.

1. mutatio. *Alterum*, crebra in aere phænomena, potiſſimum autumnii tempore.
2. *Tertium*, ubi exanthemata nedum pueros, verum etiam adultos crebro affligunt.
3. *Quartum*, frequentes autumnii tempore venti meridionales & occidentales.
4. *Quintum*, aer autumnio tenebroſus & turbidus, minans pluuiam, cum tamen nihil pluatur.
5. *Sextum*, ſi prægnantes ex leui quauis occasione abortiunt.
6. *Septimum*, quando æſtate a pluuiis ſubito magna ranarum in tergo cinericiorum, in ventre autem luteorum, aut alterius diuerſi coloris comparuerit copia.
7. *Octauum*, numeroſa inſectorum, vermium, & reptilium multitudo.
8. *Nonum*, quadrupedum & natatiliū interitus.
9. *Decimum*, auium e nidis ſuis, illic oua ſua relinquentium, profugium.
10. *Vndecimum*, anno næ caritas.
11. *Duodecimum*, quod omnium certiſſime peſtilentiam præſagire videtur, eſt calida & humida totius anni conſtitutio.

Signa hominem eſſe peſtilentia eſſe correptum demonſtrant, plurimæ quoque eſſe ſolent.

1. *Primum*, autem eſt, ſi exteriora frigent, interiora vero ardent.
2. *Secundum*, totius corporis grauitas, laſſitudo, ſegnities, & difficultas ſpiritus.
3. *Tertium*, capitis dolor, & grauitas.
4. *Quartum*, animi anxietas & triſtitia.
5. *Quintum*, propenſio mira ad ſomnum magna ex parte, interdum enim vigilæ ac deliria moleſtant.
6. *Sextum*, oculorum aſpectus toruus ac varius.
7. *Septimum*, appetentiæ deiectionio.
8. *Octauum*, ſitis immenſa, & creber vomitus.
9. *Nonum*, oris amaritudo & ſiccitas.
10. *Decimum*, pulſus frequens, exiguus, & profundus.
11. *Vndecimum*, vrina magna ex parte eſt veluti iumentorum turbida craſſa, & foetida. Quanquam interdum hæc a ſanorum vrina non multum abeſſe videtur. Quapropter ex ea aliarum notarum imperiti facile decipiuntur, nihil mali ſuſpicantes propter vrinæ colorem bonum.
12. *Duodecimum*, quod omnium eſt certiſſimum, ſi poſt aures, aut ſub alis, aut circa inguina potiſſimum bubones, ſine manifeſta aliqua cauſſa, aut in aliis etiam partibus carbunculi ſubito oriantur. Verum quum exoriuntur, naturæ robur præ ſe ferunt, ut quæ adeo ſit valida ac potens, ut venenum e corpore pellere conetur. Partes quoque corporis præ aliis laborantes, & a ſe venenatos humores protrudentes demonſtrant. Quippe in ceruice ſi apparuerint, cerebrum potiſſimum laborare oſtendunt. Si ſub alis, cor: ſi vero in inguinibus, iecur. Quod Hippocrates etiam libro 6. Epid. ſect. ſecunda, aphor. 4. iis ſignificare verbis voluit: *Absceſſus, veluti bubones, ſigna ſunt earum partium vnde extuberant.* Verum quum non ſemper appareant bubones: quod tamen pernicioſiſſimum eſſe ſolet, quod naturam tum imbecillam eſſe, nec venenatos humores expellere poſſe ſignificat: ad alia etiam ſigna, quæ paulo ante ſunt expoſita, reſpiciendum erit. Porro ſi iam comprehenſa ſigna apparuerint, aut ſuſpicio ſit ægrum peſtilentia correptum eſſe, nequaquam, aut peſtilentiſſimus apud omnes fere Medicos mos hætenus inoleuit, primo ſanguis mittendus eſt, ſed conſeſtim antidotum ſiue alexiterium aliquod dandum, & quod tota ſub-

Bubones exorti quid portendant.

Curatio.

A substantia pestilentia veneno aduersatur, quodque illud ad se trahit, & a corde quo reperere coepit, reuocat, opprimit, mutat, alterat, & expellit. Hæc enim Galeno *lib. 5. de simpl. medica facul. cap. 17. teste*, alexiteriorum actio est. Nisi enim antidotus veneno mox restiterit, humores adeo mutabi, vt æger sanitatem recuperare nequeat. Nec est cur initio aliquem quo minus a sanguinis missione abstineat, Galeni auctoritas moueat, qui *lib. 11. medendi methodi cap. 15.* ita scriptum reliquit: *Optimum est in febribus venam incidere non modo continentibus, sed etiam omnibus aliis, quas putrescens humor concitat: ubi præsertim nec ætas, nec vires prohibent. Leuata namque qua corpus nostrum regit natura, exonerataque eo, quo velut sarcina premitur, haud ægre quod reliquum est vincet.* Nam is locus Galeni, vt propemodum omnes faciunt, non est simpliciter de omnibus febribus putridis inaudien-

Galeni loci
cus enarra-
tus.

Bus, alias in tertianis singulis, etiam exquisitis, itemque in febribus putridis e cruditate natis, sanguis mittendus esset, quod tamen cum Galeni sententia ex diametro pugnat. Siquidem *lib. 1. ad Glauconem cap. 9.* vbi ex professo tertianæ exquisitæ curationem tradit, non solum sanguinis missionem, verum etiam reliquas omnes vacuationes in ea febre, tanquam parum commodas, negligendas esse suadet & hortatur, inquit: *At contraria qualitas, ei qua præter naturam excedit, semper opponenda est, quum id longe commodius sit, quam quomodo libet vacuare.* Quibus vtique verbis Galenus manifestissime innuit, alterationem, quæ per contraria perficitur medicamenta, in tertiana exquisita plus conferre, quam quouis modo, verbi gratia, vel per venæ sectionem, vel per purgationem, vacuare. Cui sententiæ ratio quoque ipsa subscribit, quæ est

Ceiusmodi. Exquisita tertiana quæ minimum ea, quæ sit per sanguinis missionem vacuatione eger, quod inter putridas fere simplicissima, & breuissima, per se ipsam ad vigorem & iudicium properet. Nam, vt Hippocrates *sect. 4. apho 59. ait*, tertiana exquisita septenis circuitibus, quum tardissime, indicatur. Non est igitur cur magna præsidia, qualis est venæ sectio, exposcat. Præterea tertiana exquisita in biliosis temperamentis, & calidissimo cœli statu plurimum accedit, vt hoc quoque nomine sanguinis missionem haud desideret. Humor insuper qui in ea febre putrescit, non modo obstructions non facit, sed factas potius recludit. Proinde si aliqua in biliosis corporibus obstructio accadat, sicut lenior erit, ita minus operæ vt tollatur requirit. Denique humor qui in exquisita tertiana putrescit, extra vasa est, adeoque venæ sectione educi nequit. In febre autem putrida e cruditate nata non esse mittendum sanguinem, Galenus *capitibus 6. & 10. libri de curandi ratione per sanguinis missionem* expressis verbis docet, dicens: *Vbi crudi humores in corpore exuperant, & iam febris corripuit, sanguinem nequaquam mittes.* Nisi igitur sibi quispiam pugnantem facere velit Galenum, vt fateatur non in omnibus febribus putridis de ipsius sententia mittendum esse sanguinem, necesse est. Quod autem in citato loco non de omnibus putridis febribus Galenus loquutus sit, sed de iis tantum, quæ ex obstructione quam plenitudo, & immodica vitiosorum humorum copia excitauit, natæ sunt, metipse Galenus confirmat, qui *lib. 8. meden. methodi cap. 4.* in diariis ex obstructione procreatis, sanguinem mittendum esse hortatur, etiam si nulla plenitudinis signa adsunt, eiusque rei causam mox subiicit,

Ratio. 1.
Tertiana
exquisita
sanguinis
missionem
non requi-
re.

2.

3.

4.

In febre putrida e cruditate nata non mittendus sanguis.

De quibus febribus putridis Galenus locutus sit.

Dne educi nequit. In febre autem putrida e cruditate nata non esse mittendum sanguinem, Galenus *capitibus 6. & 10. libri de curandi ratione per sanguinis missionem* expressis verbis docet, dicens: *Vbi crudi humores in corpore exuperant, & iam febris corripuit, sanguinem nequaquam mittes.* Nisi igitur sibi quispiam pugnantem facere velit Galenum, vt fateatur non in omnibus febribus putridis de ipsius sententia mittendum esse sanguinem, necesse est. Quod autem in citato loco non de omnibus putridis febribus Galenus loquutus sit, sed de iis tantum, quæ ex obstructione quam plenitudo, & immodica vitiosorum humorum copia excitauit, natæ sunt, metipse Galenus confirmat, qui *lib. 8. meden. methodi cap. 4.* in diariis ex obstructione procreatis, sanguinem mittendum esse hortatur, etiam si nulla plenitudinis signa adsunt, eiusque rei causam mox subiicit,

E inquit: *Quia plurimo vitioso succo una cum sanguine vacuato, tutum est iis qua obstructions soluant, uti. Si enim obstructionibus liberandis priusquam vacuaueris studeas, metus est ne ipsas magis impingas.* Si igitur in obstructione ex multis vitiosis humoribus citra plenitudinem nata, sanguis vt mittatur, Galeno suadente, necesse est, quanto magis in ea quæ ex plenitudine procreatur mittendus erit. Præterea quod Galenus in eo loco vbi optimum esse scribit, *in omnibus febribus putridis sanguinem mitti*, de iis duntaxat putridis febribus, quæ e plenitudine ortæ sunt, inaudiendus sit, ratio quam ipse mox subiicit, luculentissime monstrat, quum inquit: *Leuata namque, qua corpus nostrum regit natura, exonerataque eo, quo velut sarcina premitur, id est, plenitudine: haud ægre quod reliquum est vincet.* Siquidem plenitudo naturam sua copia sic premit, vt non facile putredinem, nisi plenitu-

Fdo prius sublata fuerit, expellere queat. Hinc est quod *lib. 10. meden. metho. cap. 2.* Galenus inter alia sic scribat: *Obstructionum ipsarum alia est, qua ex plenitudine, alia qua ex qualitate humorum, qui scilicet, aut lenti, aut crassi sunt, incidit. Præfertur autem inter remedia in ea, quæ plenitudo facit, sanguinis missio. In ea qua ex humorum qualitate consistit, attenuantium usus.* Vt etiam dictis clarum sit, Galenū prædicto loco nō simpliciter de omnibus putridis

Obstructio
num duo
genera.

Obiectio
diluatur.

Cur febre
tertiana
correptis
hodie san-
guis mitti-
tur.

Pestilens
acr.

Semina
pestis.

Cur Gale-
nus pestilen-
tiales inter
putridas
recenset.

Multæ ac
varie cau-
sæ, cur in
peste non
sit mitten-
dus san-
guis.
Primaria
ratio.

febris, sed iis tantum quæ ex obstructione quam plenitudo, aut multi succi vitio si
A procreantur, natæ sunt, loqui. Nec impedit quod hic nonnulli obijciunt, multis videl.
nostra ætate exquisita febre tertiana correptis, magna utilitate, esse detractum sangui-
nem, eosq; protinus febre liberatos. Contra illos qui hoc auxilium neglexerunt, ma-
gnas, & vix expugnabiles febres incidisse. Sed facilis & expedita est responsio. Nā con-
stat hodie, ob immentam hominum crapulā, ac creberrimam ebrietatem, rariores vi-
deri tertianas exquisitas: at si incidunt, suspectæ certe nobis esse debent, q; ob plenu-
dinem, q̄ ex largiore victu contraxerunt ægrotantes, ortæ sint. Vt mirum non sit tum
sanguinis missionem, utpote illis maxime necessariam, conferre. Quapropter quum
hoc nostro seculo, ob crapulā, cui fere omnes obnoxii sunt, singulis propemodum fe-
bribus putridis plenitudo coniuncta sit, cōsentaneum est, ut illis sanguinis missio plu-
B rimum conferat. Sed ut tandem ad institutum redeamus, quum Galenus *supra citato*
loco, de iis tantum febribus putridis quæ ex obstructione, & quidem citra veneti pēt-
mitionem, natæ sunt loquatur, *ut iam ostensum est*, non debet ab imperitis quibusdam
Medicis locus ille ad pestilenciales detorqueri febres, utpote quas constat non ex
interna obstructione, sed potius externa causa, nempe venenati pestilentisve aeris
attractione & inspiratione, ortas esse. Pestilentem autem aerem dicimus eum, qui
e putridis exhalationibus: siue cadavera hominum, aliarumve animantium putre-
dinem hanc expirent, siue cænosi quidam lacus, vel stagna, vel paludes, siue visce-
ra terræ: aut ex tetris & mortiferis spiritibus quos *Charoneæ scrobes* exhalant, contra-
minatus est. Has utique Galenus modo exhalationes putridas, quod reuera tales
C sint, eisque aer inquinatus sit: modo putridam qualitatem, quæ similiter aer contami-
natus sit: modo pestis semina, quod ex ipsis hæc oriatur, eaque in aere versentur: nunc
vero calorem putridum, quod exhalationes calidæ existant, vocat. Quinetiam pu-
tredo illa calida, venenum calidum, & magis quidem proprie, dici potest, quod non
secus atq; alia quædam calida venena calefaciat, putrefaciat, & interimat. Hinc est, q
lib. 1. de diff. feb. ca. 7. pestilenciales febres non immerito inter putridas recenset, quādo
quidem aer ille putridus ac pestilens intra corpus receptus, mox, nisi antea ægrum in-
terficiat, calefaciat, putrefaciatque, & venenata sua qualitate interimat. Quamquam
vero pestilentialis febris putrida est, tamen quia admistā sibi venenatā qualitatem ob-
tinet, ideo inter initia nunquam, sicut quædam aliarum putridarum febrium genera,
D sanguinis missionem, secus atque hætenus magna Medicorum pars arbitrati sunt, ad-
mittit, idque multis ac variis de causis, quas ordine commemorabimus. Harum au-
tem prima hæc est, quod Galenus *in libris de theriaca ad Pisinem*, ubi ex professo de pesti-
lentialibus constitutionibus agit, sanguinis missionis non meminit, & solam theriacā hoc
vitio correptis profuisse, nec vllum aliud præsidium ei resistere potuisse dicit. Acce-
dit, quod alii etiam veteres Medici Græci, liquæ omnium præstantissimi, de pestis eu-
ratione scribentes, sanguinis missionis nullam mentionem faciant, sed solius tan-
tum antidoti, quod scilicet tota substantia, & innata sibi quadam proprietate vene-
no aduersetur, eiusque vires aut oberat, aut hebetet, aut foras excernat. Quemad-
modum enim illi veneno quod morsu canis, aut istu scorpionis, ac serpentis, aut alte-
E rius feræ venenatæ eiacularum, corpori illapsum est duplici ratione occurrebat: vna
quidem, ut virus iniectum antequam altius irrepens viscera tangeret, convenienti an-
tidoto coercerent, eiusque perniciem rerunderent, hebetarent, aut prorsus concul-
carent: altera vero, ut venenum ea parte quæ intrauit, appositis cucurbitulis cum mul-
ta flamma, & circumstantibus locis altioribus vlcusculis scarificatis, aliisque tractoriis
remediis adhibitis, ne partienlatim insinuaretur, foras reuocarent: pari profecto ra-
tione in curatione pestis in hanc vnam quoque curam incubuerunt, ut primum, &
mox inter initia morbi, neglecta prorsus sanguinis missione, antidotum darent, non
ignorantes moram in hoc morbigenere esse periculosissimam, quandoquidem vene-
num pestilens parvis momentis, si ei antidotus non resisterit, adeo mutare humores
possit, ut homo deinceps sanitatem recuperare haud nequeat. Dein ut per sudorem,
F & extrinsecus emplastris, aliisque medicamentis attractoriis buboni impositis, vene-
num e corpore euocarent, operam dederunt. Proinde quum non solum ratione, verum
etiam experientia cognouerint iam dictā curandi rationē in omni veneno vel hausto,
aut ab

Aut ab aliqua fera corpori iniecto, atque etiam pestilentia ipsa, esse omnium optimam & expediitissimam, utpote per quam ocysime veneni vis retunditur, & ne viscera peccat impeditur, & foras excernetur, vnam & eandem tam veneni, quam pestilentia esse curandi rationem memorie posteritatis prodiderunt, ut ceteri quoque ipsam arriperent, ac sectarentur. Atque hinc est, quod neque Hippocrates, neque Galenus peculiarem librum *de pestilentia curandi ratione* posteritati reliquerint, quod hanc haud secus atque reliqua venena curandam esse docuerint. Quare odio omnium digni sunt nostri seculi Medici, qui hac ipsa curandi ratione contempta, & posthabita: quum tamen ei prosper succellus nunquam non responderit, & felicissima fuerit: Arabum, hominum magna ex parte indoctissimorum, potius curandi rationem, qua a-

Bliquot hominum myriadas interfecerunt, sequi voluerunt. *Altera ratio* cur vena inter pestis initia secanda non sit, hac est: Quum de Hippocratis *1 aph. 1.* sententia, occasio propemodum omnibus in morbis, potissimum vero in letalibus ac venenatis, præceps sit, danda in primis Medico opera erit ut hanc nulla prorsus ratione negligat, quod hac semel temere amissa & præterita, fieri non possit, ut a peste quæ tanquam bestia aliqua furiosa impetum maximum in hominem facit, violentia æger vindicetur. Negligatur autem tum in hoc morbi genere curandi optima occasio, quum inter eius initia priusquam antidotum detur, sanguis mittitur. Nam interea temporis dum antidoti exhibitio, prætrahitur, veneni vis inualefcit, ac cor ipsam occupat, sequi in totum corpus diffundit, paucisq; iis horis eiusdem humores alterat, putrefacit, & inficit, ut ho-

Cmo sanitatem postea consequi nequeat. Quum igitur mora, & occasionis neglectus ægro non solum periculum creet, verum etiam illum in certissimum mortis discrimen cõiciat, & necesse afferat, Medico nequaquam in antidoto exhibendo cunctandum, verum, posthabita sanguinis missione, quæ primum aliquem peste correptum animaduernerit, ad antidoti quæ innata sibi proprietate veneni ac putredinis vim frangere potest exhibitionem, ut præcedenti quoque ratione dictum est, ei confugiendum erit. Quod si fecerit, sed antea vena sectione vilius fuerit, haud dubie, ut quotidiana etiam experientia confirmat, cõplures ista sua peruersa curandi ratione interficiet. Hinc est quod Andernacus est, vir sane doctissimus, & cõplures alii nostræ ætatis Medici non verentur disertis verbis affirmare plures qui pestilentia laborarunt, sanguinis missione, quæ antidoti ab initio viles,

Dperiisse. *Tertia ratio* qua sanguinis in peste missio repudiatur ac pergitur, eiusmodi est. Quum Galenus, & omnes in arte medica præstantes viri in eo contentiant, sanguinis missione non esse utendum, nisi in eiusdem redundantiâ ac plenitudine quæ obstructiorem efficit: aut ubi nulla plenitudine præsentem, metuendum sit, ne propter ictum, aut dolorem, aut partium imbecillitatem phlegmone procreetur, ut *cap. 8. libri de curand. ratione per sang. missionem plenius a Galeno docetur*: nulla vero iam dictarum causarum in peste subit, peripicuum hinc omnibus euadit, in ea sanguinis missione opus non esse. Si enim iam dictis non expensis, nihilominus iis qui peste conflantur sanguis detrahitur, ægroti vires non parum minuuntur ac debilitantur. Quum enim sanguis in eo non redundet, adeoque secundum naturam se habeat, & ad nutritionem necessarius sit, nec inter huius morbi initia adhuc sit, valde saltem alteratus, putridus, & infectus, fieri non potest quin vires eius detractio plurimum labefactet, & ita sane illas deiiciat, ut postea veneno aduersari, illudque frangere, obtundere, ac vincere nequeant. Huc accedit, quod venenum pestilens per se cordi, totique corpori adeo est infestum, ut nihil æque ac illud eius vires deiicere possit. Quum igitur vires hominis pestilentia conflantis duplici ratione, e sanguinis, nimirum minime necessaria, sed modis omnibus noxia, missione: & item pestilenti veneno, ita labefactentur, deiiciantur, ac concidant ut postea veneno resistere nulla ratione possint, non immerito ea de causa omnes a sanguinis missione, quæ ab initio eius morbi sit, tanquam ab ea re vnde certa mors speranda sit, abstinebunt.

E Quate non temere factum est, ut Galenus passim, omnibusque in morbis, præsertim letalibus. *Cornarii error detestatus*
Fac pestiferis, virtutem maxime respiciendam esse moneat, quod scilicet ea labefacta, de ægri salute actum sit. Ut errare toto cœlo necesse sit Cornarium, qui in suo libello quem de peste inscripsit, asserere ausus est, quanquam virium ratio nusquam negligenda est, tamen hic minus habenda est, quasi vero parum referret peste correptos validos aut imbecilles esse, quum ex iis quæ diximus, omnibus mente ac ratione præditis

conſtet, venenum nec obteri, nec hebetari, nec frangi, nec excerni ſine virtutum robo-
re poſſe. Quod quum ita ſe habeat, non eſt cur in Cornarii conſilio acquieſcamus,
& inter peſtis initia venam ſecemus, ſed mox nullaſque proſus interpolita mora, &
priuſquam a ſanguinis miſſione, & veneno vires ægri frangantur ac imminuantur, an-
tidotum, quod a tota ſubſtantia, & innata quadam proprietate peſtilens virus oppu-
gnare, obtundere, ac foras excernere queat, demus. Quod ni factum a nobis fuerit,

Quarta

more imperitorum Medicorum, qui haſtenus venæ ſectionem antidoto in vniuer-
ſum omnes præmiſerunt, multorum ſalutē prodemus, & neci trademus. *Quarta ratio*
cur in præſenti morbo ſanguinis miſſione initio vtendum nō ſit, hæc eſt. Sanguine, &
ſpiritu eidem permixto, per venæ ſectionem vacuatis, eaſque ratione vniuerſo ſanguine
concitato ac vehementer commoto, venenum extrinſecus nos circumfundens, & e-
iuſmodi in nos demiffa pernicies, in pulmonem, cor, & venas inanitas facilius per-
meat, penetrat, maioreſque ferocia inualeſcit, ſanguisſque promptius labem contrahit.
Quemadmodum enim venenum quod corpus noſtrum ingreſſum eſt inter initia ve-
no in loco in alto nimirum corporis aliquandiu quieſcit, nec admodum mouetur, mi-
nuſque corpori moleſtum eſt: ita idem vena ſecta ſanguineque emiſſo commotum ac co-
citatum, ſeſe latius diffundit, & penitus in venas penetrat, ac ſanguini ſe inſinuat, æ-
grumque magis moleſtat ac vexat. Natura enim ita comparatum eſt, & quotidiana id-
ipſum experientia confirmat, cauſſam motā, quieſcente eſſe moleſtiorē. Si quidem no-
xium quieſcens, nō raro conſuetudine nobis familiare efficitur. Quod etſi Gal. lib. 2. de

Cauſſa mo-
ta quieſcen-
te moleſ-
tior eſt.

ſympto. cauſſis cap. 7. abunde moſtrauit, tamen vt clarius idipſum cognoscatur, exemplis
aliquot rerum externarum oſtendere haud grauabimur, quorum illud primum eſto.
Si in aquā quieſcentem ac minime perturbatam pauxillum fellis inieceris, id quidem
ſpatio temporis, loco ſuo hæret, nec mox cū aqua ipſa permixcet. Quod ſi vero quiſ-
piam aquā hanc cōmouerit atque agitauerit, tum ſtatim ſeſe hinc inde diffundit, ac
per totam diffiuit aquā, eamque amaram efficit. Pari modo flamma exigua mota & ſuf-
flatione ſolicitata, mox in ingentē ignem euadit. Nonne formicæ acervo terræ in quo
deliteſcunt immoto ac quieſcente, & ipſe quieſcunt? Si quis vero illū perturbet, mox
magno numero formicæ erumpent, & ei qui acervum cōmouit moleſtæ erunt. Quē-
admodum igitur omnis cauſſa mota, quieſcente eſt moleſtior, vt dictum eſt, ita venenū
peſtilens aliquo modo quieſcens, venæ ſectione agitatū ac concitatū, magis ſeſe in

Aliud.

corpus diffundit, & in vaſa elicitur, adeoque ægrum magis vexat, & moleſtat, ac ipſius
vires minuit, atque ita inſicit, vt illum interire neceſſe ſit. *Quinta ratio*, qua oſtenditur
ſanguinem inter peſtis initia & ante datum antidotū non eſſe mittendum, eiſmodi
eſt. Quanquā peſtilens venenum extrinſecus in nos demiffum, niſi antidotum mox da-
tū eidem reſtiterit, omnia ea quib. ſe inſinuat, putrefacit, inſicit, ac corrumpit, adeoque
febrem etiā putridam excitat: etſi ab aliis putridis febribus, vt pote veneni permixtio-
ne ac coniunctione deſtituta, diuerſam: atque hoc nomine neceſſe ſit in ea etiam putre-
dinē eſſe, tamē non eſt cur ob id venæ ſectio tum locum habere poſſit. Quippe vt nulla
alia putredo, ita multo minus peſtilens, ſanguinis detractio curari poteſt aut debet.

Quinta.

Nam veluti *lib. 11. metho. meden. cap. 9.* Galenus reſtatur, putredo omnis tribus rationibus
curatur, & e corpore expellitur, nempe per vrinam, alui deiectionem, & ſudorem.
Quum vero inter hos modos tres, primis duobus natura in veneni expulſione, ſi pro-
be excretiones ſuas inſtituat, haud vtatur: neque Medicus, vt qui naturæ miniſter eſt,
hos uſurpare debet, quod ſine maximo ægri incommodo & periculo fieri non poſſit:
vt putredo cui venenum admixtum eſt, in ventericulum & inteſtina, aut veſicam detru-
datur, trahaturve. Quapropter tertius modus Medico arripiendus erit, dandumque ab
eo antidotum aut medicamentum, quod vtrunque venenū nimirum & putredinē, ſi
qua a deſt, per ſudorem excernere ac pellere poteſt, ac modis omnib. ſanguinis miſſio
omittenda illi erit, vt quæ corporis vires labefaciet ac minuatur, nec putredinē multo-
minus venenum, pellere, vt oſtenſum eſt, queat. *Sexta*, & omnium efficaciffima, cur

Nulla pu-
trede ſan-
guinis miſ-
ſione cura-
tur.
Putredo tri-
bus ratio-
nib. cura-
tur.

ſanguinis miſſione inter initia in hoc morbo vtendum non ſit ratio eiſmodi eſt. Na-
tura quidem in peſtilentia venenum, & alia noxia ſemper quidem foras conatur ex-
pellere, bubonibus, tuberculis, puſtulis, & tumorib. excitatis, quare per venæ ſectionē
iatroſum, & venas reuocari ac retrahi non debent. Qua quidem de re infra plura di-
cemus.

Sexta.

ſanguinis miſſione inter initia in hoc morbo vtendum non ſit ratio eiſmodi eſt. Na-
tura quidem in peſtilentia venenum, & alia noxia ſemper quidem foras conatur ex-
pellere, bubonibus, tuberculis, puſtulis, & tumorib. excitatis, quare per venæ ſectionē
iatroſum, & venas reuocari ac retrahi non debent. Qua quidem de re infra plura di-
cemus.

Acemus. *Septima* ratio priori non minus efficax hæc est. Quum in confesso sit apud omnes medicinarum peritos, illique unanimiter seuerè prohibeant ne vno die geminæ vacuationes: quæ saltem alicuius momenti sint, & altera earundem; vt hoc in loco sanguinis missio, inutilis fuerit: corpori adhibeantur, quod nimirum illis eiusdem vires mirifice imminuantur, labefectentur, ac deiciuntur: quanto magis ne id fiat in pestifero hoc morbo, in quo quam primum pestilens virus in corporis vires impetum facit, quod illis tota substantia aduersetur, eas frangit ac minuit, summo opere cauendum erit. Quum enim aduersariorum etiam confessione, neque venæ sectio, neque per sudorem expulsio ultra naturalem diem, & viginti quatuor horas extrahi debeat, vt geminæ iam dictæ vacuationes intra nominatum iam tempus breue admodum perficiantur necesse est. Quis vero est tam stupidus, quis tam mentis rationisque omnis expertus, vt non intelligat iis duabus vacuationibus intra breue hoc temporis spacium sese excipientibus; vires, quibus venenum ipsum per se satis insidiatur, easque obterit, frangit, ac minuit, omnino deici & extinguere, vt ne tantillum veneni ferocitæ aduersari queant? Proinde fieri nequit vt æger, nisi validissimis viribus fuerit, ex hoc morbo conualescat. Si igitur extra hanc rationem nulla esset alia, tamen sufficere deberet, vt aduersarii relicto veteri ac maxime pernicioso errore, sanguinis missione deinceps inter huius morbi initia penitus abstinerent, & veram legitimamque veterum curandi rationem sectarentur. Sed sunt hodie, qui vtique fateantur, iam quidem; de errore moniti; curandi rationem semper ab antidoti exhibitione incipiendam esse, tamen post eius potionem nihilominus prodesse, vt sanguis etiam mox mittatur. Respondeo, nequaquam. Nam sanguinis missio nunquam nisi coniuncta plenitudine, facienda erit; vt paulo post dicemus. Sanguinem autem nisi plenitudo adsit, non esse detrahendum, causa est; quod sanguis tum non redundet, veluti ratione tertia ostensum est: & quod venis sanguinis detractione vacuatis, venenum in totum diffundatur corpus, vt ratione quarta dictum est: & quod eadem vires onere non leuentur; vt postea plenius monstrabitur: & quod hac ipsa putredo non curetur, vt ratione quinta ostendimus. *Postremo*, quod altera vacuationum; quæ scilicet sanguinis missione fit, inutilis est, & alteri quam antidotum efficit, plane contraria. Hæc enim foras pellit venenum, illa vero id ipsum intro; hoc est, in venas eliciat, & in contrarium reuocat, vt infra fufius dicetur. Quapropter ne vna alterius motum impediat, vno tempore fieri non debent. Quum itaque iam *Epilogus.* abunde nobis demonstratum sit, veteres Græcos Medicos; eosque longe peritissimos, neque in peste, neque in aliis venenis, extrinsecus in corpus eiectis, sanguinis missione vfos fuisse: sed ne intempestiua & longiori mora occasionem agendi negligerent; ac interea venenum ad cor permearet; & per venas diffusum humores putrefaceret; inficeretque initio curationis mox antidotum quod ipsius vires frangeret, obtunderet, hebetaret, & iam dicta omnia impediret, dedisse, idque ideo quod inter initia eius morbi sanguis, neque redundet, neque adhuc putridus, corruptus; ac veneno infectus; sed adhuc bonus sit, adeoque extractus vires non leuiter minuat; commotusque ac concitatus promptius labem contrahat; latiusque se diffundat; & si etiam nunc sit corruptus ac putridus, tamen venæ sectione putredo curari nequeat; sed tantum per sudorem educendus sit, neque faciendum esse putarint, vt breuissimo tempore binis vacuationibus vires corporis ita labefactarent & extinguerent; vt deinde veneni resistere, illudque vincere haud posset: danda & nobis opera erit, vt tantorum virorum exemplo, sanguinis missione posthabita, quam primum quis pestis semina se hausisse senserit; nulla prorsus interposita mora; antidotum demus. Quemadmodum igitur pestilens vires sua malitia ac putredine; tanquam bestia aliqua ferocissima, maximo impetu hominem petit, totaque sua substantia ei aduersatur, illumque inficere, tandemque interficere conatur: ita vicissim ei a Medico confestim apponendum erit antidotum, quod iidem tota sua substantia, & insita quadam proprietate, veneni virulentiam & impetum frangere, obtundere, hebetare, & foras per sudorem excernere, naturamque in expulsionem eiusdem, bubonis excitato, iuuare possit. Quod si vero accidat, vt antidotum humores pestilentes, ac putredine, venenataque infectione cor-

ruptos non excernat, tamen eosdem nihilominus sine sudore mutare & alterare po-
 test. Ceterum si huic morbo magna coniuncta sit plenitudo, cum virium robore,
 ægerque ætate florens, morbusque adhuc in initio sit, mittitur, perinde atque in aliis
 febribus putridis e plenitudine natis, sanguis sine periculo poterit, ita tamen ut an-
 te sanguinis detractionem horis fere decem aut duodecim antidotum æger sumat,
 ac sudet, postque sudorem tum cibis, tum medicamentis idoneis vires reficiantur,
 indeque æger aliquid virium resumat. Buboni præterea, si is apparet, attractoria &
 conuenientia medicamenta sunt imponenda, quæ veneni ad interna reuulsionem
 impediant. Quibus omnibus peractis, eo quidem in latere, ut hætenus quoque facti-
 tatum est, in quo bubo excitatus est, vena incidatur. Sin bubo nullus adest, ex eo late-
 re mittatur sanguis, ubi maior grauitas esse apparet. Hac quidem venæ sectione ple-

Obiectio. *nitudo tollitur, & obstructioni medetur, calorque febrilis minuitur. Sed hic haud du-
 bie pro excusando suo errore aduersarii dicturi sunt, quandoquidem in eo, quem iam com-
 memorasti casu, in hoc latere in quo bubo exortus est venam incidere liceat, cur igitur tu nos qui
 idem facimus, & sanguinem non nisi ægro adhuc valido detrahimus, erroris accusas? Hæc præ-
 terea, inquit, sanguinis missione corpus quo premebatur onere ac farcina, leua-*

Responsio. *mus, ac viribus suppressis opem ferimus. Sed facilis & expedita est responsio, non e-
 nim eos damnamus simpliciter quod venæ sectionem usurpant, sed potius quia illud
 intempestiue, & præter necessitatem, inque hoc morbo, in quo haud conducit, ad-
 hibent. Intempestiue quidem, quia ante antidotum: citra vero necessitatem, quia in-
 ter initia statim sanguis nondum corruptus & infectus, sed adhuc bonus est: nec si
 iam putrefactus sit, sanguinis detractione, veluti iam aliquoties diximus, curati
 queat. Vires insuper onere oppressas non leuant, sed detracto sanguine easdem
 non solum imbecilliores reddunt, sed & venis vacuatis veneno occasionem præ-
 bent, ut latius iam & expeditius per totum corpus diffundi possit. Quæ quum o-
 mnia paulo supra copiosius a nobis demonstrata sunt, non est cur nunc denuo lon-
 gius reperamus. Instant alii, qui præ cæteris sibi practitorum nomen magno super-
 cilio sibi arrogat: sic enim illi eos appellant qui assidue medicinam faciunt, qui-
 que omnium exercitatissimi videre, & ab omnibus habere volunt: in hunc quidem
 modum. Sanguinem, inquit, in peste inter initia esse detrahendum, hinc omnium maxime
 liquet, quod pestis nunquam sit citra internam aut externam phlegmonem, nemo autem est qui
 ignoret, immo in confesso est apud omnes solidioris medicinæ peritos, inter phlegmonum initia
 eum qui ad certum aliquem corporis locum præter naturam confluit, sanguinem per venæ sectio-
 nem a laborante loco esse reuellendum & vacuandum: cur igitur non eadem ratione in peste san-
 guinem vitiatum & infectum initio statim morbi a corde in contrarium reuellere & vacuare
 licebit?*

Alia obiectio. *Respondео, argumentum quidem hoc procederet, si omnia essent in peste
 paria, & si nunquam non pesti internam phlegmonem coniunctam esse aduersarii
 demonstrassent. Verum quum omnia sint dissimilia, hoc ipso sane argumento suo
 perspicue docent, quam longissime absint ab eo quo de summe gloriantur nomine,
 immo ne principia quidem medicinæ adhuc teneant. Principio namque quod illi
 pro confesso assumunt, nempe pestem nunquam sine interna vel externa phlegmo-
 ne esse, nemo sanæ mentis facile puto illis concedet, quandoquidem falsissimum sit,
 & cum quotidiana experientia quod illi affirmant ex diametro pugnet. Quum enim
 sæpe sine externa glandularum phlegmone pestis hominem occupet & inuadat, quā-
 to magis id ipsum citra internam fieri potest. Non cōiungi autē internam phlegmonem
 cum peste, nisi rarissime, hinc colligi potest. Verisimile namq; non est ut vno & eodem
 tempore aliquē tum pestis, tum interna phlegmone inuadat. Quum enim natura hoc
 tempore quo pestis aliquem inuasit tota in eo sit, ut venenum ac putredinē ab illo cō-
 tractam expellat, fieri vix posset, quin sanguinem redundantem tum ad princeps ali-
 quod membrū, verbi gratia cerebrū, cor vel iecur, aut ad aliam quampiam partem de-
 cumbentē, vna cum veneno eiicere exteneret, & externam aliquam in glandulis
 phlegmonē excitaret. Atq; hinc est, qd hanc excretionem Hippoc. *ἀνίμων*, id est, absces-
 sum, nominet, quemadmodū lib. Epid. 6. sect. 2. apho. 4. ubi ita scriptū reliquit. Abscessus, vel-
 uti bubones signa & indicia sunt earum partū, quæ germina, siue propagines (græce βλαστῆμα) eidem
 appellantur) habent. Hoc est glandularū tumores interna viscerū habitudinē indicant, quarū ger-*

Responsio. *mina,*

Amina & propages sunt. Glandulæ enim sunt velut publica viscerum totiusq; corporis sentina, in quam a bene habita natura horum eluuius & excrementum derruditur, ideoq; viscerum & internorum membrorum laborantium indicationem ac significationem præ se ferunt. Quum itaq; excrementum hoc ad glandulas, velut ex interno penu demittatur, facilis ex bubone de viscerum habitudine, ac tota vitiosorum humorum mole estimatione existit. Recte igitur id excretionis genus abscessus dicitur, q; scil. noxia; reliqua iam quæ prius obsidebant parte, in aliam abscedât. Priuatim quoq; id est, abscessus per repositionem; Hippocrati dicitur, q; per eam noxia ab vna in aliam partem reponantur ac transferantur. Præterea si interna phlegmone pesti perpetuo coniungeretur, tunc ægri, perinde atq; in aliis id genus phlegmonibus, maximos in laborante loco dolores perciperent, q; tamen nequaquã aut certe quam rarissime accidit. Et si aliquando euenit, vt quispiã simul phlegmone interna & pestilentia infestetur, tamẽ is nunq; aut rarissime curatur, sed plerunq; & fere semper, nisi robustissimis virib. fuerit æger, interimitur. Proinde quum res ita se tum habeat, vt de curatione fere nulla spes Medico ostendatur, consultissimũ est, vt in Galic. consilio acquiescat, nullumq; remedium sic affecto adhibeat. Nam, vt ille *lib. II. med. meth. ca. 9.* ait, in quo desperata est omnino salus, imprudentis consilii fuerit, apud vulgum infamare præsidia, quæ multis fuisse salutis. Accedit, q; hac ratione Medicus non solum aliis, qui tamẽ iuuare possent, contempta & suspecta remedia reddat, sed fame quoq; suæ pessime cõsulat, vt qui ægro mortuo, passim ab omnib. fere traducatur, ac si illum interfecerit, necisq; illius auctor fuerit, credatur. Quod vero casu iam dicto salutis nulla spes super sit, in causa est, quod quiuis duorum morborum per se, citra alterius cõplexum, satis potens sit, vt ægrum neci tradat. Accedit, q; quisq; paruis momentis curandi rationem ppriam ac suã, eamq; omnium difficillimã, requirat. Quod si igitur Medicus vel rogatus, vel alia quadam de causa eiusmodi ægrum curandum aggrediatur, id præmissa solemnî protestatione faciat, & principio antidoto dato, ac paucis horis interiectis, viribusq; antea recreatis & refectis, sanguinem mittat, ex vena, quæ e directo locum laborantem respicit. Si vero vires ægri imbecilliores sunt, quam vt venæ sectionem perferre possint, cucurbitulæ potius affigendæ erunt; aliaque, prout morbus postulat, peragenda. Præterea supra producto argumento aduersarii satis indicant, quale inter pestem & phlegmonem sit discrimen se nondum tenere. Siquidem, vt cap. 2. libri de inæquali intemperie attestatur Gal. phlegmone fit vbi calida fluxio, id est, sanguis calidus copiosius, in aliquã corporis partem præter naturam confluit, venasq; & arterias ita opplet ac distendit, vt in iis contineri amplius nequeat, sed partim per ipsarum ora, partim per tunicas, veluti colatum foras transmittitur, & vacua spacia quæ inter partes similes sunt implet, tumoremq; efficit. Quare rectissime fit si in interna hac phlegmone statim inter initia, & eo in latere in quo dolor sentitur, sanguis mittitur, apertaq; vena a parte ad quam cõfluere cœpit, in contrarium reuellitur. In peste autem quæ nequaquã ex copiosioris sanguinis affluxu, sed potius ex venenati aeris inspiratione fit, venia secanda haud erit, quod nulla tam eius in corpore fit redundantia; adeoq; ex ipsius detractione multæ, & non contemnendæ noxæ sequantur. Proinde quum sanguis in pestilentia præter naturam ad aliquam corporis partem non cõfluat, & inter initia adhuc bonus sit, nec si putredo in eo nascitur, venæ apertione educi & sahari possit, vt in superioribus monstratum est, falsissimum fit quod non sine maxima ignorantia suspitione de reuulsione per sanguinis missionem inter initia faciendã afferunt argumentũ. Fatemur quidem, & inficias ire non possumus, in pestilentia reuulsione vtendũ esse, atqui nõ per sanguinis detractionem, sed aliis plane rationib. duabus, quarum utiq; prima fit per antidota siue medicamenta quæ venenũ a corde attrahunt ac reuellant, obtundunt, alterant, vel per corporis meatus sudore expellunt; altera vero, quandoquidẽ constet Medicum in extrudendis noxiis naturã, cuius minister est, modo recte motus suos instituat, perpetuo sequi debere, hæc verò pestilens venenum a principib. ac nobilib. membris ad ignobilia, nempe glandulas, vt plurimum protrudat, & in eis bubonem excitet: per emplastra, & alia medicamenta quæ extrinsecus buboni imposita venenum e corpore trahunt, & naturæ expulsionem iuuant, perficitur. Atq; hinc omnibus tam peritis, quam imperitis clarissime innotescit, quam crassus, manifestus, atqui perniciosissi-

Abscessus.

Διὰ τὴν ἑξῆς
καὶ τὴν
ἐξ αὐτῆς.

Desperatis
non sunt re-
media adhi-
benda.

Phlegmone
vt fit.
Calida fluxio.

Pestis.

mus sit error, se bubone pestifero aliqua in corporis parte iam apparente, in eadem A
perinde atque in internis phlegmonibus, vena inter initia aperiatur. Nam quum na-
tura iam tota sit in eo, vt venenum e corpore eiiciat, immo magna ex parte etiam-
num illud extruserit, tamen tanta est horum asinorum, practicum dicere volui,
ruditas ac stupiditas, vt nihilominus naturæ institutum & actionem impedire atque
interturbare, venenum præterea per eam venæ sectionem rursus in corpus inque ve-
nās reuocare, ægrumque haud secus, quam si gladio illum iugularent, interficere non
vereantur. O cæcos homines, o insignes carnifices, cur non exoriuntur Catones qui
de hac vestra crassissima insciitia condignas sumunt pœnas? Cur non hoc Hippocra-
tis dictum: *Quæ ducere oportet, quo maxime natura vergit, eo per conferentia loca educere*

L. Apho.

conuenit: expenditis? id enim facile vos vestri erroris commonefaceret. Quum enim B
natura vbi vicerit, pestilens venenum perpetuo per bubones & sudores e corpore
pellat, quæ vestra est tum cæcitas, tum audacia, ac contumacia, vt illam non imite-
mini, sed eius actionem pertinaciter, ac citra omnem pudorem per sanguinis mis-
sionem impedire non timeatis? Quemadmodum enim in phlegmonibus internis
sanguis in corpore redundans, & aliquam in partem præter naturam confluetis illisq;
sefe accumulans per venæ sectionem alio, & in contrarium reuellitur & foras educi-
tur: ita quoque virus pestilens quod a natura & medicamento iam expellitur & eici-
tur, per sanguinis missionem vestro consilio adhibitam, rursus intro in venas vacuatas
reuocatur, & in contrarium trahitur. Accedit, quod hæc ipsa sanguinis detractio eo-
rum etiam medicamentorum quæ buboni imposita sunt actionem, penitus intertur- C
bet. Vt enim illa venenum foras trahere & e corpore educere conatur: ita vos per san-
guinis detractioem, illud rursus ab eo loco in corpus reuellere studetis. Proinde hinc
conspicuum fit, quam impudenter vobis practicum, vt loqui vobis consuetudo est,
nomen arrogetis, quum carnificis potius appellatio vobis competeret, quædoquidem
hac venæ sectione ægrotantis vitam, haud secus atq; carnifex hominis iugulum, gla-
dio petatis. Ex iis igitur quæ hætenus a nobis dicta sunt, nulli non perspicuum euadit,
quod non ideo per sanguinis missionem reuellendum, quod natura extrinsecus bu-
bonem excitauit, sed cōtra potius naturæ impetus a Medico iuuandus, & venenum
foras per conuenientia præsidia trahendum, atque e corpore educendum sit. Nec est
cur hoc loco nobis denuo insultent, dicentes. Quum vobis licere putetis, vt in peste D

Obiectio.

cui obstructio coniuncta est, sanguinem mittatis, idem profecto inde vobis, quod no-
bis accidat, nempe quod per sanguinis missionem venenum rursus intro reuocetis.

Responsio.

Respondeo, minime gentium. Nam in obstructione quæ pesti complicatur non sta-
tim inter initia, & priusquam antidotus aliqua exhibita fuerit, quod vos perpetuo fa-
citis, sanguinem detrahimus, sed tum, vbi prius antidoti præsidio veneni vis sopita,
alterata, & magna ex parte, aut tota fuerit eiecta & excreta, & æger abunde sudauerit.
Accedit, quod per sanguinis missionem qua nos vrimur, redundans duntaxat sanguis
educatur, a quo velut onere quodam, natura grauata fuit. Leuata igitur hoc pon-
dere natura, virtus nequaquam, quemadmodum per vestram venæ sectionem, dei-
citur, sed validior redditur. Quod si vero per æquo sanguinis etiam educatur, ta- E
men non est cur venenum a bubone reuelli, & rursus ad interiora trahi queat: quan-
doquidem ne id fiat, medicamenta buboni imposita, & foras vehementer trahentia
id ipsum impediant. Quid multis opus est verbis? nihil eorum quæ vestram venæ
sectionem sequuntur incommoda, nostram, modo iam dicto adhibitam, sequi pos-
sunt, quod vtriusque ratio diuersa sit, vt antea monstratum est, Quare passim vos im-
pingitis, vt nulla plane vobis euadendi reliqua sit via ac ratio. Ceterum vt ad institu-
tum vnde digressi sumus redeamus, indicatio curandi in hoc morbo, quæ sane o-
mnium praua est, & a morbi substantia sumitur, non nisi medicamenta quæ eidem
tota substantia aduersantur, primum omnium esse adhibenda abunde insinuat. Vt
mirari subeat Andernacum, qui in libello supra citato, pestilentiam nullam habere F
curandi indicationem scribere ausus est, quum tamen prima in omnibus curandis
morbis indicatio, ab ipso morbo petatur. Inter antidota vero quæ multa & varia sunt,
vnice laudatur, id quod *Electuarium de ouo* dicitur, quo olim Maximilianus, optimus &
prudentissimus Imperator, vsus est. Hoc cur omnibus propemodum aliis præferam,

Electuariū
de ouo.
Maximilia-
nus Impera-
tor.

fecit

A fecit mirabilis eius affectus, quem sæpe in multis ægrotantibus ostendit, & quod sit paratus facile, & legitima habeat quæ eius compositionem ingrediuntur simplicia: ex ceptu nucæ vomica quæ ne hodie quidem satis cognoscitur, & pro qua radix perasitæ indi debet, & radice dictamni albi, pro qua melius est ut folia veri dictamni, quæ nunc bene haberi possunt, usurpentur. Licet & radix illa venenis aduersetur. Datur prædictum electuarius iis qui prouectioris sunt ætatis, pondere drachmæ vnius. Junioribus autem interdum scrupuli duo sufficiunt. Diluitur autem in stillaticio rosarum, aut intybi, aut scabiosæ vocatæ liquore. Est & huius medicamenti vsus non contemnendus in præseruando, si quotidie ex eo sumatur pondus grani vnius, vel duorum hordeaceorum, aut magnitudine pisi. Plurimum confert etiam huius potionis Potio.

P sumtio, quæ habet: *Theriaces. Andromachi, scrupulos duos. Antidoti Mithridatis, scrupulum unum. Boli armenii præparati, scrupulum dimidium. Liqueurum stillatiorum rosarum, scabiosæ & buglossi, singulorum unciam unam.* Quanta vero sit boli armenii in pestilentia abigenda vis & potestas, *libr. 4. De simplici medicamentorum facultate* abunde docet Gale- Boli armenius.

nus, qui in magna peste, quæ Romæ grassabatur, quotquot hoc medicamentum biberunt, celeriter sanatos esse scribit. Quare debet huius medicamenti, pestis tempore, maximus esse vsus. Præterea non parum auxilii affert & hic puluis, qui accipit: *Foliorum dictamni veri, radicis tormentilla nominata, radicis pimpinellæ, zedoariæ, gentianæ, radicis betonica altitilis (quam hodie officina corrupta voce tunicam appellant) singulorum unciam dimidiâ. Boli armenii præparati, unciam unam. Terra lemnia, drachmas tres. Aloes iecoraria, myrrhæ, singulorum unciam dimidiâ. Croci, drachmâ unam. Mastiches, drachmas duas.* Terantur omnia subtilissime, & fiat puluis. De quo ægrotanti detur pondus drachmæ vnius in stillaticio rosarum, aut oxalidis liquore. Plura in præsentia alexiteria haud commemorabimus, quod iis omnium recentiorum, qui de peste aliquid memoriæ prodiderunt, libri referti sunt. Infra tamen, ubi de præseruandi ab hoc malo ratione agemus, aliqua prædictis adiciemus. Sumto igitur aliquo prædictorum medicamen- Pulvis optimus.

D re prompte sudorem mouebunt. Toto autem hoc tempore quo æger sudat, vnice cauendum erit, ne dormiat, edat, aut bibat. A sudore purissimis linteis sudor diligenter abstergendus. Dein lecto, si lubet, aut potest, æger surgat, aeremque extraneum vitet. Aer autem cubiculi in quo æger decumbit, cum odoratis rebus ac fragrantibus suffimentis quotidie quater aut quinquies emendetur, ac repurgetur. Cubiculum autem præstat mutare: quod vnius cubiculi aer, ex assidua habitatione ægri plurimum vitiat, emendari facile non possit. Cubiculi autem aer in quod transfertur æger, prius suffimentis corrigatur. Qualia vero hæc esse oporteat, paulo post dicemus. A sudore duabus aut tribus horis, pro viribus, facto iusculum gallinaceum ægrotanti offerendum: idque subinde sæpius fiat. Sensim enim & paulatim reficiendus æger erit. Quapropter illi confert sæpe comedere, at parum admodum. Et qui hac ratione cibantur, ceteris citius conualescent. Carnibus quoque pullorum gallinaceorum cum oxalide, aut limonum succo, aut omphacio coctis huic vti licebit. Sudor.

E Ager etiam primo die omnino a somnio confabulationibus ministrantium, dehortationibus strepitu, frictione extremorum, aurium, nasi, & pilorum vellicatione, arcendus erit. Ad quod institutum non inutile erit, spongiam acerrimo aceto imbutam naribus ad mouere. In vehementiori siti, licebit usurpare hanc potionem, quæ accipit: *Zulapii violacei, uncias tres. Serapii ex acido citrii succo, unciam unam & dimidiâ. Serapii de intybo satiui uncias duas. Decocti oxalidis, scabiosæ, & florum buglossi, uncias decem, vel tantundem liquoris eorundem stillatici.* Commisceantur, & fiat potio. Licebit etiam ut aquæ in Quid a sudore facienda. Aëris correctio.

P qua hordei parum decoctum sit, succum rosaceum, aut oxalidis, aut limonum, vel omphacium admisceas, & potus vice exhibeas. Ceterum exhibenda medicamenta, potissimum si vires inualidæ fuerint, quæ cor, aliasque corporis partes in corpore principatum habentes roborant & confortant, quale est quod habet: *sachari violacei, rosacei, buglossacei, singulorum unciam unam & dimidiâ. Boli armenii præparati, drachmâ unam. Coralliorum* Cibus quid exhibendus.

- Epithema.** *rubeorum, scrupulum unum. Corticum mali citrii, drachmam unam & dimidiam. Caphura scrupulum dimidium. Cum serapio de acido citrii succo, quod satis est, fiat antidotus liquida. C.* rdis etiam regioni, maxime vbi iuxta thoracem adhuc subesse æstum senserit æger, epithema hoc imponendum, quod habet: *Liquoris stillatici rosarum, buglossi, oxalidis, singulorum uncias quatuor. Specierum antidotie gemmis, drachmam unam. Ligni aloes, santalorum rubeorum, corticum mali citrii in puluerem redactorum, ossis cordis ceruini, singulorum scrupulum dimidium. Croci, grana sex. Commixtis omnibus fingatur epithema.* Animaduertendum tamen, vt epithemata non nisi calefacta adhibeantur. Postquam autem refrigerantur, statim sunt remouenda: tum enim meatus constringunt, ægro tantique molestiam haud exiguam afferunt. Quocirca sacculis præstat vt, cordialibus nominatis, qualis est qui accipit: *Florum rosarum rubeorum, nymphaea, violarum, singul. drach. duas. Santalorum omnium, B corallii albi & rubei, spodii, margaritarum sing. drach. tres. Cinnamomi, charyophyllorum, ossis cordis ceruini, ligni aloes, corticum citrii mali, croci, singulorum scrupulum unum. Seminis oxalidis, scrup. duos. Caphura, grana quatuor.* His omnibus tritis in puluerem, formentur sacculi duo quadrati e serico, & alternis vicibus calefacti applicentur. Porro vnice studendum etiam erit, vt venenati humores ad locum vnde bubones emerferunt, appositis cucurbitulis, aut medicamentis aliis trahendi vim obtinentibus alliciantur: quale est
- Sacculus.**
- Localia.**
- Emplastrum.** hoc quod accipit: *Ficum pinguium numero sex. Vuarum passarum, unc. dimidiam. Salis fossili, drach. duas. Mellis, unc. unam. Cum oleo chamæmelino ad emplastri formam reducuntur, quod calefactum buboni imponatur.* Aut eiusmodi, quod plurimum ab omnibus commendatur. Accipe e cepis, quæ maxima est, eiusque capite amputato, totam perforato, & An-
- Aliud.**
- Error Gentilis & Valesci.** *dromachi theriaca comple, adiectis rutæ vel saluæ succis. Quo quidem peracto, foramen, quod in capite cepæ est luto obturetur, & cepa igni admota torreatur. Vbi satis tosta videbitur, cortices eius auferantur, & subinde in mortario contundatur, donec emplastri consistentiam nacta videatur, ac buboni imponatur. Nee est, quod te Gentilis, Valesci, & nonnullorum aliorum auctoritas moueat, cur minus theriacam bubonibus imponas. Neque enim, vt illi toto cœlo errantes putauerunt, a se propulsando theriaca, aliudve huic simile alexiterium medicamentum, agit: sed potius ad se trahendo, vt supra libro primo capite De conuulsione, ex Galeni monumentis abunde monstrauimus. Valer etiam hoc emplastrum, quod ad suppurationem bubonis plurimum conducit. Habet farinae fenograci, seminis lini, florum chamæmeli, singul. unc. dimidiam. Radicis altheæ, liliorum alborum, singul. drach. dimidiam. Ficus sex numero. Foliorum dictamni veri drachmas tres. Radicis phu, drachmas duas. Seminis sinapi, drachmam unam & dimidiam. Fimi columbini, unc. dimidiam. Oleorum chamæmelini, liliaci, singulorum unciam unam & dimidiam.*
- Aliud.** Redigantur in formam emplastri, aut pultis consistentiam, Laudatur & hoc quod accipit: *Emplastri diachylon simplicis, uncias duas. Ammoniæ, galbani, singulorum unciam unam. Contusis omnibus, ad emplastri consistentiam redigantur. Ceterum si prædictis admotis bubo sua sponte non rumpatur, imponendus subinde fimus asferinus in oleo vulgari, aut chamæmelino dissolutus. Hæc de curatione eorum qui pestilentia correpti sunt, dixisse satis sit. Nunc quo pacto aliquis se a pestilentia, quæ certum quandam infestat locum, præseruare, ac munire debeat, breuiter quoque exponemus.*
- A pestilentia præseruatio.** Quum vero initio huius demonstrauerimus, pestilentiam non fieri nisi ex pestilentis ac putridi aeris inspiratione, satis constat, nullum esse fuga ipsa præsentius remedium. Neque enim vlla alia aeris pestilentis euitandi ratio est, quod inuitis etiam nobis hauriendus sit aer, nisi in locum aliquem vbi minime vitiosus est aer, sed optimus plane concefferimus. Quod eo citius magisque faciendum erit, quo malum ipsum contagioni magis est obnoxium, quemadmodum certe quotidiana experientia abunde testatur. Fugiendum etiam longius, in eum nimirum locum, vbi, vt comprehensum est, aer adhuc purus omnique vitio destitutus esse deprehenditur. Nec ab eo loco nisi tardissime est redeundum domum. Hinc non temere vulgo dici solet, pestilentia tempore plus opis & auxilii præstare tria hæc aduerbia, cito, longe, & tarde, quam tres, optime etiam instructas medicas officinas. Quare quibus commode per officia licet, ii nulla ratione se induci patitantur, vt in aere pestilente morentur. Quod nisi fecerint, se præsentis mortis periculo temere exponunt. Næ, vt Gal. et in li. De theriaca ad Pisonem attestatur, pestis tanquam & ipsa exsistat quædam belua, haud paucos interim, verum ciuitates quo-
- que

A que totas depascens, male conficit. Quæpe praua quadam aeris ad corruptionem prompta mutatio efficitur: & homines quum respirationis necessitate periculum euitare nequeant, ipsum acrem, veluti venenum quoddam ad se per os attrahunt. Quamobrem etiam, ait, Hippocratem illum multis modis admirandum, laudo, qui lucem illam ex Aethiopia Græcos inuadentem non aliter curauit, quam aeris mutatione, alterationeque ne talis amplius inspiraretur. Quum igitur ignem per totam Athenarum urbem incendi iussisset, non simplicem lignorum materiam, verum ferta floresque suauissimis alimentum ipsius esse consuluit, vnguentaue pinguisima & odorifera ipsis superfundit, ut aerem purum hoc modo redditum, homines in mali subsidium inspirarent. Hæc ille. Quem locum Galeni ideo recitavi, ut perspicue hinc omnes intelligerent, loci mutationem & alterationem præstantissimorum Medicorum omnium

B testimonio inter remedia pestilentiae primum obtinere locum. Sed non latet, esse quosdam hæc tempore morosos sane homines, & plane Stoicos, qui clamitent, piis & Christianis hæc in parte non esse Medicorum consilii obtemperandum. Quippe Christianorum esse ut mortem non metuant quidem, tantum abest ut illis fugere liceat. Belli mehercules homines, qui hoc a nobis exigunt, quod nemo sanctorum, imo ne Christus ipse, quem exhoruisse mortem sacræ testantur literæ, præstare potuit. Et quod exhoruerint, nihil mirum quidem, quum omnibus a Deo sit insitum, ut vitam rucantur, mortem fugiant. Hinc D. Paulus ad Ephes. 4. scriptum reliquit: *Nemo unquam suam ipsius carnem o deo habuit, imo eam potius nutrit, ac fouet.* Exhoruisse autem, imo declinasse mortem sanctos, multis scripturæ exemplis ostenditur.

Aduersus
quosdam
morosos
theologos.

C Abraham metu mortis, Saram uxorem suam appellare sororem voluit, Genesis 20. Iacob mortem exhorrens, Esau fratrem fugit in Mesopotamiam. Dauid vitam seruare cupiens, Saul & Absalonem filium fugit. Elias propheta audacissimus, post occisos prophetas Baal, minis Isebelis reginæ territus, in desertum fugit. Moses quum quæreretur a rege Aegyptiorum, fuga in Midiam sibi vitæque suæ consuluit. Verum dicent hoc loco morosi illi, exempla nunc producta non docent, mortem quam pestilentia affert, sed eam, quæ persecutiones sequitur, fugiendam esse. Quibus vicissim respondeo, mortem esse mortem, e quacunque causa ortam. Deus inter cetera supplicia famem etiam, ut quæ mortem affert, numerat: quam si fugere licet, cui non etiam pestilentiam? Famem autem fugisse Abrahamum, Isaacum, & Iacobum, notius est, quam

D ut longius a me demonstrari debeat. Quod si nulla supplicia diuinitus inflicta fugere licebit, certe Turcam, aliosque tyrannos, quos tamen flagella Dei esse constat, persequentes nemo Christianus fugere debet. Peccant igitur, qui oppida & pagos his aduentantibus deserunt. Pari ratione domo aliqua conflagrante nemo excurreret, nemo etiam ad sopiendum incendium accurret: nam & ignem inter supplicia a Deo immissa numerandum esse, nemo inficias ibit. Incident præterea vndas, nunquam nationes sibi consulet, sed aquam veluti Dei supplicium sibi adimere vitam æquo patietur animo. Parte denique aliqua corporis vulnerata, aut fracto osse, nemo Christianus chirurgi operam requirit: Dei enim supplicium perferet. Nemo frigora, utpote Dei supplicia, arcebit vestibus, & id genus aliis rebus ad ea propulsanda necessariis utetur.

E Quid multa? nemo Christianus villo remedii genere aduersus vllam morbum hæc ratione uti audebit, quod nullum sit genus morbi inter supplicia a Deo immissa non connumerandum. Non debere itaque mortem metuere pios, ita intelligendum erit, non debere illos metu mortis despōdere animum, nō debere etiam ut deuitent mortem non concessis mediis vitæque peccare: in summa, in morte non debent desperare. Sed existat ea de re doctissimorum nostri æui theologorum Lutheri & Brentii libelli, in quibus Stoicorum illorum somnia pulchre refutantur: quorum ego hæc in re iudicia pluris facio, quam centum aliorum. Quid multa? fugere mortem nemo potest, quandoquidem mori omnibus statutum sit. Pestem tamen fugere, utpote alios contagiosos morbos, elephantiam, morbum gallicum, & id genus alios licet. Quare hanc aliaque

Pii quomodo
mortem
non metue-
re debent

F illorum obiectiones missas facio, & ad institutum reuertor. Si vero certis ac iustis de causis, ut fugias, tibi haud licuerit, tum prima cura sit, ut domus, in qua tibi comorandum est omni foetore careat, & a sordibus atque spurcitiis sit aliena. Fenestræ eiusdem clausæ sint, diebus potissimum nebulosis ac pluuiosis, ne pestilens aer ingrediatur. Quod si tamē aperire vis, cura ut sint versus orientem aut septentrionem constitutæ; idque fiat a sole iam ali-

212 Operum Leonhard Fuchsi Pars.III.

quot. horis orto. Raro, & non nisi æthæro sereno, in publicum prodeundum: neque id A
etiam, nisi prius sumta antidoto, quæ a contagione conseruare valeat. In ædibus quo-
tidie succendendus ignis lignis quercinis, iuniperinis, tamaricis, lauri, aut simili-
bus, quo aer in iis viriatus corrigatur, purgeturque. Quippe miram esse ignis vim
ad aeris putredinem emendandam, Hippocratis exemplo, quod paulo supra pro-
duximus, abunde docemur. Viuis etiam carbonibus sequens puluis crebro insper-
gatur, qui habet: *Rosmarini, manipulum dimidium. Salvia, betonica, absinthii, maiorana,*
origani, singulorum Manipulum unum. Terantur omnia subtilissime, & fiat puluis,
Velille, qui accipit: *Baccarum iuniperi, unciam unam. Myrrha, drachmas tres. Thuris,*
mastiches, singulorum drachmas tres & dimidium. Radicis garyophyllata, seu benedicta vul-
go vocata, drachmam unam. Ruta, unciam dimidiam. Corticum cupressi, drachmam unam B
& dimidiam. Radicis angelica sativa, lavandula, singulorum drachmas duas. Tritis omni-
bus fiat puluis. Pauperes ligna iuniperina fissa, aut baccas ipsas carbonibus ignitis im-
ponant. Ditiores ligno aloes, aut pulvere galliæ moschata, garyophyllorum, & simi-
lium vtantur. Dum in publicum prodire necessitas cogit, hanc aut similem odora-
tam pilam secum circumferant, quæ habet: *Ladani, drachmas tres. Styracis calamitis,*
drachmas duas. Cinnamomi, maceris garyophyllorum, nucis moschata, singulorum drachmam
unam. Ligni aloes, scrupulum unum. Spicanardi, scrupulum dimidium. Myrrha, mastiches,
thuris, singulorum drachmam dimidiam. Moschi, ambaris, singulorum grana tria. Trita & cribra-
ta stacte, stillaticio maiorana liquore sufficientibus madesiant, & excipiantur. singaturque pila odo-
rata, pomum hodie vocant. Æstatis tempore aer frigidis rebus depuretur, floribus ni- C
mirum rosarum, violarum, nymphæ, pampinis, foliis salicis, & id genus aliis. Pau-
mentum etiam stillaticio rosarum liquore, item oxalidis, similibus irroretur, aut aqua
frigida cui aliquid aceti commixtum sit. Iuuat etiam odorare rosas, acetum, caphu-
ram, santala, & eius generis alia. Vel hanc pilam, quæ accipit: *Ladani, unciam dimidiam.*
Styracis calamitis, drachmas tres. Florum nymphæ, rosarum, violarum, singulorum drachmam un-
nam. Corticis mali citrii, drachmam unam & dimidiam. Santalorum omnium & singulis, drach-
mam dimidiam. Maceris, cinnamomi, singulorum scrupulum unum. Mastiches, drach. unā. Papa-
ueris candidi, succi semperuiui, scrup. dimid. Ambaris, moschi sing. grana duo. Trita excipiantur
stacte, liquore stillaticio rosarum, fiatque pila odorata. Ceterum quum Galenus libr. 1. D
differ. febr. cap. 4. unam & primam quidem eorum, qui a pestilentia tuti esse cupiunt, cu-
ram fore tradat, vt corpus quam maxime superuacuis atque excrementis vacet, & o-
prime spirer, nihil certe æque, fugiendum erit, ac nimia cibi & potus ingestio ingur-
gitatiove. Cibus igitur in vniuersum facilis concoctionis, & bonum procreantibus
sanguinem, ac putrefactioni minime obnoxius vtendum. Qui quales particulatim
sint, ex Galeni libris *De alimen. faculi.* & cibus boni & mali succi discendum erit. Quare
de singulis seorsim hoc loco differere, superuacaneum esse iudico. Semper quoq; ci-
bis, quibus hoc tempore vescimur, aliquid aceti admiscendum erit, aut acidus alius qui-
ssimam succus amphiacum nimirum, aut citrii mali, aut limonium, arantiorumque vocatorum suc-
cus. Æstatis tempore oleribus vtendum, buglosso, intybis, oxalide, & lactuca. Hyeme salvia,
petroselino, apio, maiorana, melissophyllo, & hyssopo. Fructibus omnibus abstinendum, nisi a- E
cidi fuerint: vt sunt mala punica, citria, limones, arantia, & iis similia, quibus vti expedit. Potus
sit vinum tenue & aquosum. Caueat sibi quisque a meracioris potu, & musto. Quid
multa: tota victus ratio sit refrigerans & desiccans. Exercitio itaque non vtendum, ni-
si mediocri, Galeno etiam libr. 1. *De differ. febr. capite 5. teste:* & in loco temperato, atque
aere prius per medicamenta ac suffimenta purificato & emendato. Cauenda igitur
choreæ publicæ, item cursus, saltationes, & quicquid esse eius generis exercitii quod
crebram aeris inspirationem requirit. Quapropter hac etiam de causa pestilenti tẽ-
pore choreas magistratus, publico edicto proposito, vetare debet. Quippe experien-
tia ipsa satis docet, multos dum choreas agerent infectos hac lue, mortem oppetiisse.
Somnus, vigilia, vt omnia alia, sunt moderata. Dormiendum vero in cubiculo bene
obturato ac clauso, ne scilicet pestilens aer ingrediatur, cuius subinde aer suffitu ali-
quo mane & vesperi purificetur ac corrigatur. Linteis vtendum puris ac mundis, &
aliquandiu cum rebus odoriferis repositis. A somno vbi experrectus fueris, prima hæc
cura sit, vt corpus a superuacuis exoneres. Vniuse vero cauendum tibi erit, ne aliu villo
tem-

Suffimenta

Pila odora-
ta.

Pila alia
odorata.

Victus ratio

Exercitium

Choreæ pu-
blicæ cau-
enda.

Exercitio

- A** tempore adstrictam habeas. Proinde si sua sponte quotidie non deiecerit, catapotiiis Ruffi vocatis, aut molli clysteri, aut glandibus in hoc paratis irritabis. Corpore a redundantis tum per alium, tum vesicam repurgato, medicamentum aliquod sumendum, quod a pestilentiae contagione munire potest, qualia multa paulo post commemorabimus. Et si propter occupationes necessarias in publicum prodeundum erit, *zedoaria, aut angelica, aut pimpinella radicem* commanducabis, aut *rutam* odorabis: mirifice enim huius odor pestilenti auræ aduersatur. Coitus, immoderatus præsertim, vñ. cesugiendus. A coitu sese quisque ab aere publico & infecto contineat. Balnea, publica potissimum, in vniuersum, veluti præsentissima venena, detestanda, quod nimirum apertis horum calore corporis meatibus, aer pestilens promptissime sese in profunda corporis recipiat. Qui priuato balneo vti volunt, ii sese ab egressu eiusdem ab aere vitiatò diligentissime muniant. Consultius tamen est vt frictionibus domi, & in aere emendato vtamur, quam balneis. Caput tamen lixiuio, cui *asarum, maiorana, la- uendula, rosamarinus, betonica, saluia, chamamelum*, & id genus alia incocta sint, singulis septimanis lauandum. Ceterum iuuenibus, & qui sanguine abundant, pestilente tempore appetente venæ sectione vtendum erit. Neque semel tantum, modo nihil aliud impediatur, sed iterum atque iterum sanguinem educere interdum illis maximum ad tuendam sanitatem, & vt a peste præseruentur, momentum affert, quod corporis habitum non nihil refrigeret, & ad commodationem caloris ducat. Purgandum quoque re ipsa poscente, corpus medicamentis purgatoriis nominatis, idque vere præsertim & autumnò, *iuxta Hippocratis sententiam*. Qualis vero esse debeant, e præcedentibus libris cuius pater. Nos enim hic capita tantum istarum rerum attingimus, Quod ad animi perturbationes attinet, *tristitia, ira, odium, timor, grauioribus cura*; & quicquid est cogitationum seueriorum, fugienda omnia. Gaudio & hilaritate mediocribus vtendum. Nunc reliquum est, vt præter sanguinis missionem & purgationem, ad alia medicamenta, quæ ab hac lue tueri ac immunes conseruare possunt, progrediamur. Inter quæ sane primum locum obtinent catapotia Ruffi nominata, vel pestilentialia, vel comunia, quæ habent: Aloes iecorariæ partes duas, croci orientalis, myrrhæ, vtriusque partem vnā. Cum vino albo, aut cum stillaticio scabio sæ liquore singantur catapotia. De quibus quotidie sumatur scrupulum vnum, plus aut minus pro ætatis & virium ratione. Quanquam autem hanc compositionem omnes hodie officinæ *pilulas Ruffi* nominant, tamen ab ea quam olim Rufus memoriæ prodidit, differt, atque alia est. Quippe Ruffi compositio crocum non habet, sed pro eo potius guttam ammoniacam recipit. Præterea ea quam Rufus composuit, potio est, non catapotium, *ut satis liquet ex libro secundo capite 35. Pauli Aeginetæ*, ibidem enim hanc describit. Ceterum catapotia quibus vulgo vtuntur officinæ, propter aloen & myrrham, vtpote quæ putrefactioni plurimum aduersantur, miram quandam aduersus pestiferæ luis contagionem efficaciam habere constat, ideoque minime contemnenda sunt. Licebit autem & sequentibus vti pilulis, quæ accipiunt: Aloes iecoraria, drachmas tres. Myrrha, drach. vnā & dimidiam. Agarici preparati drach. vnā. Croci orientalis, drach. dimidiam. Boli armenii preparati scrup. vnum. Seminis mali citrii, scrupulos duos. Mastiches, scrupul. dimidium. Radicis pimpinella, drachmam dimidiam. Cum stillaticio rosarum liquore fiant ex drachma vna pilula tredecim. De quibus vna, vel duæ sumendæ. Potest etiam vsus esse illius medicamenti, quod officinæ *Electuarium de nucibus* appellant. Accipit iuglandinum numero viginti. Ficum pinguium numero quindecim. Rutæ, manipulos duos. Absinthii, parthenii, cotulam fetidam vocant. scabiosa, singulorum manipulum vnum. Radicis aristolochia longæ, vnciam dimidiam. Radicis aristolochia rotunda vulgaris, vnc. vnā & dimidiam. Radicum tormentilla, petasitis pimpinella, dictamni vulgaris, sing. vnc. duas. Foliorum dictamni veri, manipul. vnum. Baccharum lauri, drach. tres. Cornu cerui vsti, drach. duas & dimidiam. Mâceris myrrhæ, boli armenii, terre lemmia vera sing. drach. tres. Salis marini, drach. vnā & dimidiam. Florum buglossi manipulum vnum. Corticum mali citrii, vnciam dimidiam. Contula ac trita omnia accipiantur, vncis duabus mellis despumati, fiatq; medicamentum liquidum, in modum ecligmati. Valet quoque plurimum is puluis, qui habet: Foliorum dictamni veri, vnciâ dimidiam. Radicum zedoaria, betonica, altilis, pimpinella, tormentilla sing. drach. dimidiam. Corticum citrii mali, drach. tres. Terra lemmia, drachmas sex. Boli armenii, vnciam vnā. Myrrhæ selecta, aloes ie-

Rutæ odot
pestilenti;
auræ aduer
satur.
Venus.
Balnea.

Venæ se
ctio.

Purgatio.

Animi per
turbationes

Præseruan
tia vocata
medica
menta.
Catapotia
Ruffi.

Compositio
Ruffi.

Pilulæ.

Electuarium
de nucibus
appellatum

Puluis.

corariæ. ſingulorum unciam dimidiam. Croci, drachmam dimidiam. Maſticheſ, drach. unam & dimidiam. Radiciſ glycyrrhizæ, drachmam unam. Scabioſæ, oxalidiſ, ſingulorum drachmas tres. Santalorum purpureorum, drachmam unam. Ramentorum eboriſ, antheræ, ſing. drach. dimid. Offiſ cordiſ ceruini, coralliſ rubeorum, ſingulorum ſcrupul. duos. Caphura, grana tria. Trituſ omnibuſ in pollinem, fiat puluiſ. Si lubet, ex iſ conſicies orbiculoſ, aut morſuloſ cum ſacharo, & liquoribuſ ſtillaticiuſ roſarum & ſcabiſ, & de iſ quotidie drachmæ uniuſ ponduſ exhibebiſ, pluſ aut minuſ, pro ætate & viribuſ. Commendatur quoque vnice boluſ armeniſ cum aceto ſumtuſ, ut ſupra eſt commemoratuſ. Item theriaca, mithridatiſ antidotuſ, & id genus alia, quorum paſſim eſt copia apud eoſ qui de hac lue aliquid memoriæ prodiderunt. Noſ hic finem dicendi de hoc genere vitii facimuſ. Exſtat enim cõpluriuſ doctoꝝ virorum in Italia, Gallia, & Germania non pauci de peſtilentia commentarii, vnde varia remedia excerpere omnibuſ licebit.

LEONHARTI FUCHSII DE MEDENDIS

TUMORIBVS PRÆTER NATURAM,

Liber V.

De phlegmonè. C A P. I.

Inflamatio
φλεγμονή.
bifariam
ſumitur.
Generatim



VA M latini aliqui, licet parum proprie inflammationem, Græci φλεγμονή nominant. Vox autem φλεγμονή illiſ bifariam ſumitur. Generatim, p̄ omni calido & dolorifico, cum feruore, tumore: vt plane tum idē quod φλόγος, hoc eſt efferueſcentia, ac inflammatio ſignificet. Sic ſane herpeteſ, eryſipelata & carbunculi, phlegmoneſ dicuntur, quia in ſignificatione ab Hippocrate & aliſ veteribꝫ vox eſt uſurpata. Proprie autem phlegmone, eſt tumor ex ſanguine copioſo in locum aliquem præter naturam confluentefactuſ, ſupra feruorem efferueſcentiæ ue rubenſ, dolenſ, duruſ, & tactu renitenſ. Quod copioſiꝫ tradit Galeniſ libr. 13. Ther. meth. ab initio ſtatim. Noſ hoc loco de phlegmone, quæ proprie ſic appellatur, & in externiſ partibuſ oboritur (nam de internarum partiuſ phlegmonibꝫ ſuperioribꝫ libris actum eſt) differemus. Fit hæc ipſa a ſanguine bono, & craſſitie mediocri, qui in particulam aliquam vniuerſim influir, atque propter copiam impactuſ inhæret: id quod propter vulnera, fracturas, contuſioneſ, luxationeſ, vlcera, & id genus alia quæ dolorē cõcitare, & fluxionem accereſcere poſſunt, euenit. Phlegmone in particula aliqua orta, vehemens dolor vrget, niſi ei uſmodi ſit quæ ſenſum omnino difficilem habuerit: pulſuſ in profundo moleſtuſ accidit, tendiqꝫ præforſuſ ac frangi particula apparet, & vehementem calorem perſentit, vt quaſi comburi videatur, vnde & refrigerari deſiderat. Taliſqꝫ rubor per ſumma viget, qualis ex balneis aduenit, aut ex igne, aut quoniſ alio modo calefactiſ. Renixuſ partiſ tangenti eam, præ tenſionis modo. Quæ ſingula fuſiꝫ loco iam citato, & libro primo ad Glauconem capite 1. Galeniſ proſequitur. Quum itaque phlegmone particulam quampiam, ſine manifeſta potiſſimum cauſa præcedēte, obſederit, principio totum corpus euacuare oportet, præſertim vbi hoc ſanguine plenum fuerit, & valida viſ laborantiſ, tempuſque anni, regio, ætaſ & id genus alia nō impedierint. Quod ſi itaque in inferiore aliqua parte, verbi gratia genu, phlegmone conſtiterit, tum ſanguiniſ euacuatio ex ſuperioribuſ partibuſ faciendā. Incidere itaque oportet in gibbero venam aut interiorem, aut mediā: niſi alterum cruſ maliſ ſcarificare, aut in eo venam pertundere. Si vero aliqua pars ſuperior patitur phlegmonem, per inferiora ſanguis eſt educenduſ. Semper enim fluxionis motum ad contrarium trahere expedit. Debet tamen reuulſio fieri ſecunduꝫ rectitudinem, Galeniſ in libro De curandi ratione per ſanguiniſ miſſionem teſte. Poſt venæ ſectionem, partem phlegmone laborantem perfundere ac illinere oportet medicamentiſ, quæ id quod influit repellere ſint idonea: & quod iam in male affectam partem ſe recepit, vacuare queant, quæque robur iſ quæ laborant partibuſ addant. Qualia vero ſint medicamenta quæ idipſum præſtent, in ſuperioribuſ libris ſæpe a nobiſ expoſituſ eſt. Galeniſ quidem mirifice commendat poſcam, oxycraton Græci vocant: nempe ſpongiā hoc ipſo perfuſam & imbutam, parti phlegmone laboranti imponendo. Item cataplaſmata ex ſemper uiuo & mali punici cortice in vino decoctiſ, & rhoea polenta compoſituſ, ſi non vehemens vrgeat dolor. Repellit enim id, quod influit, adſtringēdo, atqꝫ

Proprie.

Cauſa.

Signa.

Curatio

Venæ ſectio.

Localia.

Cataplaſmata.

Ado, atque id quod continetur exsiccando vacuat, & partes adiacentes utroque nomine corroborat. Si vehemens dolor fuerit, cataplasmata ex plantagine, lente, solano, pane, & oleo rosaceo imponenda. Paulo vero ante, supra particulam male affectam, spongiam vino austero, aut aqua frigida madefactam apponere oportet. Melius vero fuerit, si aliquid aceti admisceatur. Quod si pus se in particula ostenderit, cataplasmatra imponenda erunt, quæ suppurationem iuuant: ut sunt *farina triticea, seminis lini, fenograci, butyrum, pinguedo porcina, radix althea, & similia in superioribus libris saepe admodum commemorata.* Suppuratione facta, quod ex doloris, febris, & caloris remissione coniectamus, secare, atque pus vacuare conuenit. Eo vacuato, vulnus abluere & abstergere oportet melicrato vel oxycrato, vel vino & mulso. Imponendum vero, si adhuc phlegmone aliqua affuerit, cataplasma ex lente, aut oleum rosaceum cum luteis ouorum, aut aliud quod phlegmonem arcere potest. Si vero sine phlegmone fuerit, aliquod ex iis medicamentis quæ emplastica vocantur, & glutinantia, imponendum: ut est *amylum, cerussa, pompholyx, malicorium, as ustum, & eiusmodi.* De quibus copiose differtit Galenus libro 2. ad Glauconem & 3. Ther. method. Nos hic capita tantum rerum attingemus, quod de iis fere omnibus in præcedentibus libris a nobis copiosius sit dictum.

Suppurantia.

Sectio, Absterfio.

De herpete. C A P. II.

Quæ in flaua bilis non naturalis sola, & nullo infecta humore excreta in aliquam particulam decumbit, vitium *herpes* vocatur. Quæ si substantia crassior acriorque fuerit, totam cutem ad subiectam usque carnem exulcerat, appellaturque *herpes exedens*. Si vero tenuis & minus acris calidaque fuerit, exiguas pustulas milio similes per summam cutem excitat, ob eamque similitudinem, *miliaris herpes* nuncupatur. Fit herpes, ut dictum est, ex flaua bile. Miliarem tamen, Gal. lib. 14. Ther. meth. ex bili, quæ pituitæ aliquid admixtum habet, procreari tradit. Signa ex paulo ante dictis patent. Quod ad curandi rationem attinet, initio utendum victus ratione frigida & humida, perinde atque in febre tertiana. Vino in totum æger abstineat, & pro eo bibat aquam, in qua *cinnamomum vulgare* exigua portione decoctum est. Corp⁹ etiā medicamento aliquo, quod bilem ducit, vacuandum, de quibus saepe in præcedentibus libris est dictum. In miliari autem utendum medicamento, Galeno loco citato teste, quod mixta est facultatis: quod sc. bilem simul & pituitam educat. Corpore itaque prius purgato, mox ea, quæ influentem humorem reprimunt, repelluntque medicamenta particulæ laboranti imponenda. Sed hic diligenter considerandum erit, quod non omnino similis eura particulæ laboranti in hoc vitio adhibeatur. Nam qui exedentes sunt herpes, refrigerari quidem desiderant similiter aliis herpetibus. non tamen ea ferunt medicamenta, quæ præter id quod refrigerant, etiā humectant: sed sola admittunt refrigerantia, quæ etiā maxime exsiccant: non igitur vel lactucam, vel polygonum, neque exstagnis lentem, vel psyllium, vel portulacam, vel serin, vel sempiuuium, vel tale aliquid quod refrigerare possit atque humectare, apponere oportet. Neque unquam etiam fidas spongiæ frigida aqua perfusa, neque solano: quamuis refrigerandi atque vna exsiccandi vim habet sed mediocris: illi vero maiorem quam solano adsit, expetunt siccitatem. Igitur initio cataplasmata ex capreolis vitis, foliis rubi, plantaginisque applicanda erunt. Postea vero lens his misceretur, interim & mel & polenta. Plurimum quoque commendatur liquor, qui e vitis caudice sua sponte, aut ignis vi expressus exudat. Ipsas autem partes exulceratas, hoc vel simili medicamento illinere conuenit, quod habet: *Citiorum, galla, utriusque drach. tres. Myrrha, thuris, aloes, sing. drach. duas & dimid. Aluminis fisci, drach. duas. Radicis aristolochie rotunde vulgaris, drach. duas & dimid. Calamintha, drach. una & dim.* Trita vino subaustero excipiantur, & fingantur pastilli, qui dissoluti cum aqua mellis illinantur. Valet etiā medicamentum, quod ex bolo armenio, & terra lemnia, stillaticio rosarum liquore, & aceto exceptis, componitur. Mirifice vero confert hoc, quod fit ex latia veteri succida & illota, in olla combusta donec nigrescat & ardeat: quæ subinde in puluerem redacta, cum stillaticio rosarum liquore dissoluitur, ut quasi atramenti scriptoris formam habeat, & pluma illinitur bis in die. Herpetes vero, qui exedentes non sunt, si expurgato prius corpore, medicamentis quæ reprimunt, ut comprehensum est, curantur. Vberiore curandi rationem tradit Gal. lib. 14. Ther. meth. & lib. 2. ad Glauconem. Satis itaque sit, locum nunc monstrasse:

Herpes.

Exedens herpes. Miliaris herpes. Causa. Signa. Victus ratio. Purgatio.

Localia.

Cataplasmata.

Pastillus.

Erysipelas
quid.
Ignis sacer.
Causæ.
Signa.

ERYSIPELAS Græcis, *Ignis sacer* Latinis, *Galeno libr. 2. ad Glauco. teste*, geminum existit, non exquisitum, & exquisitum. Non exquisitum quidem, est tumor ex feruente, tenuiq; sanguine conflatu. Vel est ex sanguine & flaua bile, calidioribus quam oporteat, mixta fluxio. Causæ ex iis, quæ diximus abunde patent. Erysipelas phlegmone calidius est, magisq; colorem flauum pallidum ve refert. Et si tetigeris, facile sanguis subterfugit, rursusq; illabitur exquisite tenuis, & aspectu rubidus, non tamen dolet veluti phlegmone: neque vt aliqua phlegmones species pulsus, aut compressionē aut tensionem similem inuolit. Tumor etiam exiguus in cute potius consistens, quā alte descendens adest. Sed accidit vt interdum valde parum infestet, ac tum præfertim, quando per solam cutem diffusum fuerit, nihil inferiorem carnem molestant. **B**

Exquisitū
erysipelas.

Et hoc quidem sæpius euenit, atque hoc est exquisitum erysipelas. Proinde quod attingit subiectam carnem, neque ex sola tenui bile consistit, neque simplex est erysipelas, verum iam affectus permixtus ex erysipelate atque phlegmone. Exuperant autem in ipso quandoque propria erysipelati symptomata, atque hoc vitium a iunioribus Medicis *Erysipelas phlegmonosum* nominatur. Nonnunquam vero phlegmones, & tunc ipsum nominant *phlegmonem erysipelaceam*. Quod si neutrius symptomata manifeste exuperauerint, sed æqualia apparuerint, tunc erysipelas & phlegmone mixta esse dicuntur, veluti clarius in *Institut. nostris docuimus*. Curatio partim victus ratione, partim medicamentis perficitur. Victus ratio sit talis, qualem in febribus & similibus calidis vitiis supra descripsimus. Quum vero vitium hoc geminum curationis scopum, nempe

Erysipelas
inflammatus.
Inflammatio
erysipelaceæ
Curatio.

vacuationem & refrigerationem habeat: inter initia vero si sanguis in eo, *Actio etiam attestante*, abundauerit, adeoque erysipelas non exquisitum fuerit, ac vehemens feruor affuerit, vena secanda erit. Si in facie fuerit eiusmodi erysipelas, vena in gibbero humeraria dicta incidenda. Si autem inferiores collo partes erysipelas tale patiuntur, interior, quam iecorariam vocant, vena secanda: vt media, si neutra harum apparuerit. Si in cruribus fuerit vitium, itidem in gibbero vena interior, sed eiusdem lateris incidenda. At si quid sanguinis missionem impediat, aut erysipelas exquisitum fuerit, hac prorsus, *Galeno etiam libr. 14. med. meth. cap. 3. suadente*, omissa, purgatione potius vtendum ex medicamento quod bili ducendæ idoneum est: quale certe est *Rhaindicum*,

Venæ sectio

barbarum officinis vocatum, quod ad domandam bilē efficac, *Actuario auctore*, existit. Idq; maxime faciendum, vbi bilis flaua redundarit. Plurimum etiam profunt clysteres in hunc vel similem modum parati, qui accipiunt: *Malua, foliorum viola nigra, lactuca, intybi utriusq; singul. manip. vnum & dimidium. Mercurialis, manip. vnum. Seminum cucurbitæ, melonum, portulacæ, singulorum drach. duas. Florum nymphaeæ, manip. vnum. Hordei, unciam vnam. Coquantur omnia in aqua sufficienti ad tertias, iuris colati libræ vni admisce medulla casia fistularis, vnc. vnam. Hierapiæ, vnc. dimidiam. Olei violacei, uncias duas. Olei nymphaeæ, unciam vnam. Salis vulgaris, drachmam vnam & dimidiam, & fiat clyster. Post totius corporis vacuationem reprimentibus auxiliis vtendum. Refrigerabimus itaq; particulam afflictam, liquoribus stillaticius, solani, semperuiui, portulacæ, psyllii, hyosciami, lactuca, & intyborum, aut succis eorundem. Valet etiam lenticula palustris, & ceratum liquidum ex aqua frigida, cuius confectionem tradit *Galenus libr. 1. De simpli. med. facult. cap. 6. Et copiosius libr. 10. Ther. meth. capite 9. Item polenta cum aliqua prædictarum herbarum parti afflicta imposita confert*. Quæ autem illi inuntur medicamenta refrigerantia, frequenter admodum immutanda sunt, vt quousque refrigerandum sit cognoscere liceat. Refrigerationis enim terminus, *Galeno libr. 14. Ther. method. teste*, ipsa coloris mutatio est. Etenim quod exquisitum & purum erysipelas est, statim cum hoc quiescit. Quod enim non purum est, sed iam quodammodo phlegmonodes, si plusculum refrigeres, liquidam cutem præfert. Sin*

Purgatio.

Clysteres.

ne sic quidem quis desistat, nigricat, potissimum in senili corpore: sic vt quædam ita refrigeratorum, ne discutientibus quidem medicamentis ad perfectionem farentur, sed scirrhusus quidam tumor in particula relinquatur. Ergo satius est, vbi laborantis particulæ alteratum colorem videris, a refrigerantibus ad contraria transire, priusquam vel liuida, vel nigra prorsus fiat. Vbi itaque feruor ægrotantis particulæ iam desit, refrigerantibus admiscenda sunt discutientia medicamenta, idq; priusquam liueat. Quare cum confert stillaticius liquor solani, commixtus stillaticio li-

Reprimētia

Refrigerationis terminus.

quorū

Discutientia
mixta refrigerantibus

quorū

A quori chamæmeli. Imponendū etiā cataplasmata ex farina hordei & fœnograci, & id genus alia. Quod si iā liuor occupauerit, incisa cute cataplasma superponendū est, perfundendusq; locus plurimum quidē ex aqua calida, sed & marina aqua & muria interrim conducet. Quinetiam ipsi cataplasmati eiusmodi aqua, vel acetum, vel oxalme misceatur. Erysipelati autem phlegmonoso, & phlegmoni erysipelati, mixta quantū fieri potest curatio adhibenda, semperq; illi quod exuperat magis resistendum, non tamen prætermittenda ea quæ a mixto præstatur indicatione. Sicuti autē subindē erysipelati admiscetur phlegmonē, ita etiam aliquando œdema: ac vocatur, quod ex ambobus tum est conflatum, erysipelas œdematosum: non secus, quam vbi ex refrigerando durum ægreq; resolubile redditur, vocabitur erysipelas scirrhiolum: In quib; curatio ipsa, veluti in omnib; compositis, mixta administratur.

Erysipelas
œdematosum
Erysipelas
scirrhiolum

De carbunculo. C A P. IIII.

CARBUNCULUS, qui Græcis *ἀνθράξ* dicitur, fit, cum sanguis crassus & feruescens & impense calidus in aliquam particulam decumbens, cutim exusserit. Errant itaque recentiores, qui anthracem & carbunculum diuersa esse vitia putant, ut copiose libro 2. Paradox. capite 18. demonstrauimus. Arabum placita sectantes, prunam & ignem persicum nominant hoc vitium: Incipit hoc plerumque a pustula: aliquando vero, licet raro, & sine hac. Ceterum inter initia, quibus hoc instat vitium, scabunt particulam omnino. Mox oritur pustula quædam maiuscula, qua rupta vlcus cum crusta gignitur. Sæpe vero non vna oritur scabētibus pustula, sed multæ exiles, veluti milii semina, crebræ in particula residentes. Quibus perruptis, similiter crustosum vlcus prouenit, quale ferramenta cadentia excitant. Crusta vero ipsa modo cineris colorem præfert, modo nigrorem. Omnibus præterea his circumposita caro in summam peruenit inflammationem, non tamen colore aspicitur erysipelatis, imo qui adhuc phlegmones colore sit nigrior, veluti si plusculo rubro minus misceas nigri, qualis certe bituminis, aut picis color est. Quod autem necessario febricitent; qui ita sunt affecti, idque non minus, imo magis quam illi quibus erysipelatosa est phlegmonē, id vtrique latere neminem potest. Curatio incipienda ab incisa vena, & adhibenda sanguinis vacuatio, si nihil obstat, vsque ad animi defectum. Inciditur autem vena partem affictam e directo respiciens, atque pro eius situ nunc humeraria, nunc interior, interim etiam media, & ea quæ in malleolis est secatur. Quinetiam scarificare eiusmodi tumores post sanguinis missionem, alienum non sit. Sint autem incisiones mediocribus altiores, profundioresve, propter infestantis humoris crassitudinem. Sunt qui ipsas incisiones salta aqua calente statim perfundunt, ne in illis sanguis coeat, concrelcarve, sed foras egrediatur. Imponi vero sibi laborans particula, quod ad inflammationem feruoremve spectat, refrigerantia desiderat. Ceterum propter humoris crassitudinem atq; malitiā, nec fluxionem auertere poteris: & si quando id feceris, aliud quippiam quod in alto sit corpore, offendes, atqui nec affluere is humor permittendus est, quin potius inquirenda remedia sunt, quæ cum modice reprimendo etiam discutere possint. Tale profecto est cataplasma quod ex plantagine conficitur, tum quod ex biscocta lente, scilicet miscentibus his nobis micā panis qui in clibano sit coctus. Esto autem panis nec omnino a furfure purus, nec nimium eius habens. Siquidem qui omnino purus est, eius substantia in cutis meatibus hæere est apta. Furfuraceus autem crassiorum est partium. Super ipsum vero vlcus, valens aliquod medicamentum, quod vehementer exsiccat, cuiusmodi est *pastillus Andronis*, vel *Polyde*, qui describitur a Galeno libro 5. De compos. med. *u. 2. 3. 4. 5.* vel is pastillus quem supra in capite De herpete produximus, adiecto chalcanthi scrupulo. Liquari autem debent cum vino aliquo dulci, ad fordium strigmenticiamve crassitudinem. Item radix dracunculi, vel aristolochiæ, vel sulphurii liquor, singula ex aceto illinenda. Quæ autem reliquis adhiberi vlceribus solent, nempe quæ concoquant & pus moueant, ea nunc adhibenda non sunt, quando ita particula putredinem foueris. Porro partes adiacentes quæ consortii lege afficiuntur, succidis lanis ex liquore stillatio rosarum, aceto, & bolo armenio irrigandæ. At vt radicitus carbunculos euellas, dirimasque ab adiacentium commercio, malum punicum acidum minutatim concisum in aceto coques: vbi intabuerit, in leuiorem dete-

Carbunculus.
Anthrax.
Causa.

Signa.

Curatio.

Venæ sectio.

Scarificatio.

Localia.

Cataplasmata.

Pus mouentia non adhibenda.
Adiacentes partes mouentia medicamenta.

res, linteoque illitum impones. Cum vero siccescit, aceto humectabis. Cessante vero iam inflammatione & feruore, vlcus ac cicatricem similiter reliquis vlceribus perducas. Id quod fiet, si primum adhibitis iis quæ expurgant medicamentis, glutinâtia im-
 posueris, quale est hoc vnguentum, quod habet: *Olei rosacei, uncias duas. Cerussæ, plumbi vsti, lithargyri, singulorum scrupulum unum. Rosarum purpurearum, scrupulos duos. Radicis symphyti maioris, balaustiorum, boli armenii, singulorum scrup. dimidium. Succis semperuiui, scrupulum unum. Cera candida quod satis est, fiat vnguentum.* Inter simplicia vero medicamenta plurimum laudatur symphytum inter duos contritum lapides, quod diuino quodam miraculo carbunculum sanare dicunt. Miranda etiam referunt de herba vulgo *Scabiosa* vocata. Ceterum crustas adimunt, *butyrum recens, axungia porci*, & id genus alia pinguia.

De Gangræna. C A P. V.

Gangræna quid.

GANGRÆNA Græcis non est, nisi partis, quæ ex magnitudine phlegmones fit mortificatio, nondum tamen integre facta, & iam confirmata. In gāgræna itaq; pars nondum mortua est, nec sensu priuata, sed emoritur, atq; ad extinctionem tendit. Eius vitii tanta vis est, vt nisi ocysime succurras, facile pars laborans mortis habitum repræsentet: hoc est, promptissime vitæ, sensus, & motus extinctionem contrahat. Vbi vero membrum ipsum languens perfecte, & in totum emortuū, sensuq; ac vita destitutum fuerit, tum hoc vitium non amplius gangræna, sed *phlegmon* Græcis, Latinis *Sideratio*, recentioribus *Esthiomenon* vocatur. Differunt etiam alia ratione gangræna & sideratio, quod scilicet gangræna carnosus tantum partibus & vasis: sideratio vero ossibus etiam innascatur. Ceterū absolutā hanc laborantis partis corruptionē, sensus penitus auferentem, vulgus *ignem sancti Antonii* appellat. Fit autē gangræna & sideratio, quando vel parti vitalis denegatur facultas, vel quando in magnis phlegmonibus natiuus calor perit & exstinguitur, perinde atq; exigua flamma a maximo igne. Cognoscuntur iis notis: *Color floridus, qui in phlegmonibus adfuerat, in ipsis exstinguitur.* Deinde dolor & pulsus recedunt, non finito adhuc affectu, verum sensu iam emortuo. Vnde membrum mox nigrum conspicitur: molle quoque & putridum, foetoremque expirans, cadauerosum efficitur. Quum constet sanguinis copia generari gangrænam, eius curandi præcipuus scopus erit, vt celerrime, qui in laborante impactus est particula sanguis, & cuius occasione emoritur, scilicet arteriis ob loci angustiam sese dilatare nequeuntib. vacuetur & exsicceetur. Fit autem larga illa sanguinis ita impacti ex laborante parte vacuatio, vel vena incisa, si quæ amplior, ac turgens circa eandē partem cōspicitur: vel vniuersa cute, vna cum subiecta carne excisa: vel multis profundisq;, vel frequentibus & altis scarificationibus incidenda. Alii ad eundem finem sanguifugas admovent, & venas minores proximas aperiunt. Verum profundæ illæ ac frequentes sectiones aut scarificationes, ad eius vitii curationem sunt multo efficaciores. Ceterum pro affectus magnitudine vel maximæ sectiones fiunt, vel incisuræ vtræq; frequentes: illa vbi putredini vitium vicinus est, hæc vbi tantū putrescere incipit. Quo enim vitium maius est, eo maiore remedio indiget. Proinde altis plagis multisq; cutem ac totam ei subiectam carnem, si vitium ad ossa perueniat, vulnerabimus: sin minus, solis scarificationibus ac simplicib. incisuris vtetur. Vbi autem abunde sanguinem ex altis illis incisuris emanare permiserimus, locus aqua salsa abluendus erit, vt sanguis crassior, & qui alioqui ibidem concrederet, foras egrediatur. Deinde medicamentum aliquod quod ad putria facit vlcera, hoc est, quod putrefactionem prohibeat ac dissoluat, imponendum. Cuiusmodi est *farina cruina, aut loliacea*: vel si harum facultas non sit, *fabacea ex oxymelite*: atque ipsum *oxymeli* per se. Quippe hæc sua siccitate pus & putrilaginem absumunt ac detergent: frigiditate vero, quod nondum vitiatum est roborant, & a putredine arcenr. Vbi vero iam ipse veluti feruor subsederit, ac vitii furia sese remiserit, *unguentum* id quod vulgo *Egyptiacum* dicitur, ex flore zris, alumine, melle, & aceto, ad æquas portiones mixtis & coctis compositum, superimponendum erit. Hoc enim putrefactionem prohibet ac dileuit, putrefactum quoque ac corruptum ab integro & sano adhuc dirimit, & decidere cogit. Denique crustam inducendo, quod sanum est conseruat, ac tueretur. Quod si valentius atque efficacius vsurpare medicamentum velis, adiiciendus prædictus sal est: aut si vitium ma-

phlegmon.

Causa.

Signa.

Curatio.

Putrefactionem prohibentia.

Vnguentū Egyptiacū

Agis adhuc increuerit, aliquem ex pastillis Andronis; Polyidæ; aut Pasionis exquisi-
te ac curiose tritum admiscere oportet. Probatum in ea re ante omnia *arsenicum* quod
vocat *sublimatum purum* aut *correctum*, idque vel in pulvere, vel ex vino dissolutum, aut
linamento, aut xylo exceptum, inter sanum & corruptum applicatum. Hoc enim
confestim vitium sistit, & id quidem sine dolore. Quod si necessitas exigit, spe-
cillo separandum est sanum a corrupto. In eiusmodi autem medicamentis adhiben-
dis, ut res securius tractetur, naturam corporis ægroti attente considerare oportet.
Nam, ut *Galenus etiam libro 2. ad Glaucoriam attestatur*, rustici corpus quod natura durum
est, vehementissima efflagitat remedia: muliebre vero molle, imbecilliora. Infantis
quoque vel pueri, & virile corpus, quod quidem album sit & molle, ac balneis assue-
tum, & in exercitatum, mollia exposcit medicamina. Consideranda insuper est par-
tium quæ male affectæ sunt, nedum totius corporis, natura, quando id, quod iam com-
putruit, abscindis, aut circumcidis. Quædam enim sunt partes, quæ citissime putre-
scunt, si negligenter curentur: aliæ vero tardiuscule. Quædam item medicaminum
vires ac beneficia tardius sentiunt, aliæ citius. Porro si nihilo magis vitium his causti-
cis medicamentis constiterit, vti id quod est inter integrum ac vitiatum locum, de-
bet. Solent vero hæc auxilia omnia nihil interdum proficere: atque tunc vnicum, tã-
etsi, ut Celsus inquit, miserum auxilium est, membrum quod paulatim emoritur, ab-
scindere, ut cætera pars corporis tuta sit. Nam quod computruit, veneni in modum suo
contactu quod adhuc sanum & integrum est, inficit ac corrumpit. Si quando autem
C putrefactam huiusmodi atque emortuam partem abscideris, vel quod in membro quopiam
computruit usque ad sanum corpus concideris, eam quæ veluti radix est, sanæ & inte-
græ parti adiunctam, ob maiorem securitatem candenti ferro adurere conuenit. Itã
enim celeriter sanguinis profluuium compesces, & putredinem arcebis. Facta vero
adustione porri succo, vel sale cum porro utendum est, vel aliquo ex iis pastillis, quos
paulo ante diximus. Hæc enim siccant, & stringunt putredinem, atque humorum afflu-
xum prohibent. Vbi vero his remediis adhibitis, tibi cessare putredo videbitur, ut cru-
sta medicamentis adurentibus, vel ignito ferro inductæ citius decident, cataplasma-
te utendum est ex pane vel hordeacea farina, vel triticea, ex hydrelæo incocta. Item
medicamento, quod cephalicum vocant, ex mellé illito. Hæc enim detergendo, cru-
stam a subiecta carne resoluunt. Quinetiam medicamentum quod *tetrapharmacum* di-
D citur, præterea & *Macedonicum*, pus mouendo & emolliendo, crustas a subiectis parti-
bus deducunt: quemadmodum etiam omnia quæ ad suppurationem perducunt. Pa-
nis quoque cum apio, aut ocimo intritus crustas a sanis partibus citra erosionem deter-
gendo, rumpit ac separat. Sic & iris, vel radix panacis, aut aristolochiæ, aut acori cum
melle. In mollibus autem corporibus abunde facit erui farina, cum melle aut thure.
Solent etiam vulgo ad resoluendas crustas vti butyro, aut alio quouis pingui. Vbi cru-
sta deciderit, locum aceto abluunt, postea sequens emplastrum admovent, quod re-
cipit: *mellis selibram, vitellos ouorum crudos tres, aut quatuor numero, farina hordei, selibram.*
Hæc miscentur in formam emplastri. Post biduum vero vel triduum, ut melior fiat
E purificatio, huic emplastro adiaci possunt drachmæ decem myrrhæ selectæ. His rite
peractis, huiusmodi vlcera ad sanitatem perducenda sunt medicamentis, quæ carnem
producent, & cicatricem inducunt.

De impetigine. C A P. VI.

IMPETIGO, Græcis *λεηγι* dicitur, vitium cutis est, quod celeriter in scabiem & lepram, quam
Græci sic nominant transit. Sunt qui cutis asperitatem interpretentur. Fit ex tenui acri-
que sanie, crassioribus aliis commixta. Vitium est insauissimum, & pruritus inferens,
& circumtensionem, & periculum non minus. Proserpit enim aliquando per totam
faciem, & oculos ipsos contingit. In curandi ratione, diligenter ea quæ mitior est, a fe-
ra impetigine, quæ mentagra etiam dicitur, & recens ab ea quæ longiore tempore du-
F rauit, discernenda. Siquidem quæ recens ac mitis est, curatu facilius est, quam ea quæ
diuturna & fera existit. Principio autem curationis, si plenitudine laboret corpus,
sanguinis missio adhibenda: Sin minus, purgatio quæ tenues & crassas sanies purget,
exhibenda. Supra modum vero confert hæc potio, quæ habet: *Florum violarum, buglos-
si, melissophylli, singul. manipul. unum. Glycyrrhizæ rasæ, unciam unam. Prunorum damascenorum*

Crustas a
partib. exu-
tis soluenda

Emplastrum.

Impetigo.
λεηγι.
Causa.
Signa.
Curatio.
Mentagra.Purgatio.
Potio pur-
gans.

numero duodecim. Oxyphænicon, unciam unam. Seminum melonum, cucurbitæ, cucuma-
ris, citruli, decorticatorum singulorum drachmas duas. Fumaria, manipulum unum & dimidium.
Radiciſ polypodii, foliorum ſenæ, utriuſque drach. ſex. Corticum myrobalanorum flauorum, ceru-
leorum, utrorumque unciam dimidiam. Agarici optimi, drachmas duas. Rhabarbari ſcinitici vo-
cati ſelecti, drach. unam & dimidiam. Spicæ nardis, grana ſex. Zingiberis, drachmam dimidiam.
Decoquantur in aqua iuſta quantitatis, donec dimidium abſumatur, & ea qua decocta ſunt per in-
tegram noctem ſimul perſtent, poſtea colo transfundantur, adiectaque ſacchari conuenienti quanti-
tate ius decocti dulce reddatur, & ſubinde in eo diluantur antidoti hamech & diaphænicon utriuf-
que drachmas tres. Fiatque potio, de qua quotidie in aurora exhibeantur uncia quatuor.

Localia.

Corpore vacuato, ad localia progrediendum erit, quapropter ſi recentes fuerint impetigines, parietariæ folia cum aceto trita illinenda: aut ammoniacum cum parie-
tariæ ſucco in aceto tritum, illinendum. Idem facit braſſicæ ſuccus, aut quod ex eius cau-
læ dum aduritur deſtillat, illitum. Confert etiam plurimum cortex radicis oxylapathi
commanducatus, & illitus. Puerorum impetigines, hominis ſaliua continue deſtricta
curantur. Hiſ etiam opitulatur gummi pruni illitum. Et linimentum hoc, quod acci-
pit: *Reſina terebinthina in ſtillaticio liquore roſarum lotæ, unciam unam. Olei roſacei, unciam di-
midiam. Olorum lutea duo, ſucci duorum malorum arantiorum dulcium.* Commixtis omni-
bus fiat linimentum. Vbi vero iam diu durauerint, impetigines, tum valide ſiccantia,
& abſtergentia, *Galeno lib. 5. De compoſitione medicament. 19. & 21. & 22. teſte*, requirunt. Quare il-
lis viticis folia cum aceto trita & illita profunt, aut aſphodeli radix in aceto decocta &
trita, ſi affricetur. Probatur etiam ad impetigines hoc vnguentum, quod habet: *Reſina C
terebinthina in ſtillaticio roſarum liquore lotæ, unciam unam. Olei roſacei, unciam dimidiam. Bu-
tyri recentis, axungie porcine, utriuſque drachmas tres. Sulphuris viui, drachmas duas & dimidiam.
Nitri, drachmam unam & dimidiam. Aluminis facticii, ſucharinum vocant, drachmam unam.
Salis ſoſſilis, drach. unam. Seminis ſtaphydis agriæ, lithagryi, utriuſque ſcrupulos duos. Vitellos ouium
duos. Cera quod ſatis eſt, ſingatur vnguentum. Actius lib. 8. cap. 16. inter multa alia hoc
vnice commendat, quod habet: *Piciſ ſiccæ, reſina colophonia, radicis ellebori albi triti, olei ro-
ſacei, cera ſingul. partes æquales, fiat vnguentum, vel ut Actius vocat, emplaſtrum liquidum.**

Linimentū

Vnguentū.

Verum ubi vitium iam ſtabile factum fuerit, & medicamentorum molimini reſiſtit, v-
tendum erit excoſiatoriis, quale eſt quod accipit: *Lithagryi, nitri, aris uſti, foliorum viti-
cis ſing. drach. unam. Chalcantiſ, ſcrupul. unum. Sulphuris viui, ellebori albi, utriuſq; drach. dimid. D
Æruginiſ, ſcrup. duos. Vnumquodq; per ſe contere, deinde ſimul contuſa o: eo roſaceo &
cera excipe, ac in vnguenti formā redige. Poſt excoſiatoria, medicamenta, quæ ylcera
repurgant, admouenda. Vlcerib. autem repurgatis, vtendum iis quæ glutinant medi-
camentis, quorum aliqua ſupra commemorauimus*

Vnguentum.

Aliud.

Excoſiato-
rium.

Defcabe. CAP. VII.

Scabies.
Cauſa.
Signa.

SCABIES, quæ Græcis *ψωρα* dicitur, *ſumma cutis aſperitudo eſt, pruriens, in qua corpus
ſpaulatim abſumitur.* Originem ex atra bile ducit, aut pituita ſalia, craſſa ac lenta, vt
teſtatur *Galenus libro 2. De ſympt. cauſſis, capite 10.* Scabies ſummam corporis cutem exedie
variaſque figuras habet, ac furfurea magis ex ſe corpuscula edit. Principio vero opus
eſt, vt conuenienti viſtus ratione vtantur ægrotantes, quapropter a cibis atram bilem E
generantibus, aut ſalſam pituitam, abſtineant: quæ quales ſint, in capite *De cancro* dice-
mus. Vtantur vero potius iis quæ facile concoquuntur, & bonum procreant ſanguini-
nem. Vinum bibant tenue & antiquum, aquoſum tamen. Curandi ratio, ſi corpus ple-
num fuerit, a venæ ſectione auſpicabitur. Incidenda autem erit vena media, & tantum
ſanguinis educendum, quantum ægrotanti ex re eſſe videbitur, aut quantum vires fe-
rent. Sin minus, purgatio ex iis quæ atram bilem ducunt, eſt exhibenda. Præter de-
coctum autem in capite præcedenti poſitum, & ea, quæ in capite *De melancholia* com-
memorauimus, mirifice profunt catapotia de fumaria, & hæc quæ accipiunt: *Aloes ie-
corariæ, drachmas duas. Corticum myrobalanorum flauorum, drach. duas & dimidiam. Foliculo-
rum ſenæ, agarici optimi, epithymi, ſing. ſcrup. unum. Fumariæ ſcrupul. duos. Dacrydii ſcrupul. dimi-
dium. Tragacanthæ, roſarum purpurearum, utriuſq; drach. dimidiam.* Cum ſtillaticio liquore
fumarie fiant catapotia, de quibus detur pondus drachmæ unius, plus aut minus, pro æt2-
tis ac vitium ratione. In ſalſæ pituitæ abundantia catharticum imperiale, & antido-
tum hamech ſumopore valebunt. Corpore vniuerſo vacuato, uſus eſſe poterit balnei
aceti,

Viſtus ratio

Curatio

Purgatio.

Catapotia.

Balneum.

A acrei, aut aqua dulcis, in qua tamen radix oxylapathi, fumaria scabiosa, beta oxalis, & id genus alia, quæ in capite De pruritu commemorabimus, decocta sint. Reponi quoque in sacculos debent farina lentium fabarum, hordei, & furfures, & cum iis abstergi totum corpus. A balneo æger in lecto stragulis opertus sudet. Extrinsecus ad solem, vel in balneo, quæ illinuntur fere eadem sunt, quæ supra De impetigine diximus. Inter simplicia vero potissimum ad eum usum adhibentur staphis agria, lupini, sulphur viuum, cicer, lilii radix, & lutea ouorum. Inter composita hoc vnice conducit, quod habet: Resina terebinthina in stillatio liquore rosarum lota, vncias duas. Oleorum rosacæ, costini, vtriusque vnciam dimidiam. Sulphuris viui drachmas tres. Seminis staphidis agria drachmam vnā. Salis fossilis, drachmam vnā & dimidiam. Lutea ouorum tria, butyri recentis, vnciam vnā. Commixtis omnibus fiat linimentum. Smegmata quoque ex solis lapathii, oxylapathio præsertim, mirifice conferunt ad scabiei amolitionem.

Localia

Vnguentum

De pruritu. C A P. VIII.

PRURITVS, est *scalpendi assidua cupiditas*. Hic vero senibus maxime accidit. Contrahitur ex prauo humore, qui nimirum biliosus, atque adeo acris, aut pituitosus, putris falsusve est. Vitium de ægri sermonibus promte dignoscitur. Humorū vero pruritum efficientium diuersitas, ex ætate, temperamento, victus ratione, anni tempore, regione, & reliquis iis similibus agnoscitur. Si plenitudine corpus simul laboret, a sanguinis missione curatio ipsa auspicabitur. Sin cacochymia tantum affuerit, medicamenta exhibenda quæ redundantem vitiosum succum educunt. Corpore ipsō vacuato, ad externam curationem diuertemur. Lauandum itaque prorsus ieiuno est, nonnunquam & modico cibo sumto iterum lauandum: quippe vitium hoc vix inhumescit. Detergitur autē fœnograciæ, aut betarum, aut furfurum, aut malux, aut althææ, aut hordei decocto. Præter hæc valent farinæ etiā fabacæ, vel lupinorū. Si inueterauerit vitium, lauatio similiter quidem conuenit. Fomentum autē ex saluæ, myricæ, herba mercurialis, origani pulegii, baccarum lauri, cucumeris syluestris radice decocto, & oxalme fiat. Potest & linimentorum supra commemoratorum vsus esse: Ad pruritus etiā mirifice confert, si nūcum iugladium corticis vnc. vna, sulphuris viui tantundem; cum apii succo terantur: & cum iis in balneo corpus affatim defricetur. Hoc enim solum, Paulo teste, multis tum scabiosis, tum pruritu detentis, abunde fuit. Apium etiā per se viride tatum, infricatumq; in balneo, vehementer auxiliatur: Smegmata quoque ex lapathi radicib. in aceto coctis, confici possunt.

Pruritus.
Causa.
Signa.

Curatio

Balneum.

Smegmata

De exanthematis. C A P. IX.

Exanthemata Græcis sunt *tumores sponte in cute florentes*. Sic dicti, quod turgentium ad florem gemmarum in plantis modo tumeant. Hippocrates tertio Epid. libr. *cutis pæge*, hoc est, ab erumpendo; quod scilicet sponte e cute erumpant, in eaque floreat, vocauit. Plinius *papulas*, & interdum etiā *pituitæ eruptiones* nominat. Interpretes aliquot Latini *pustulas* appellant. Sunt autem duplicia exanthemata, quædam enim sublimia, quædam vero lata. Sublimia, ab iis, qui barbaram sectantur medicinam, Variolæ nuncupantur: Germanis autem, *Kindsblattern*. Lata & humilia, Barbaris *Morbilli*, Germanis, *die Kindsflecken* appellatur. Procreantur autem ex crassis & cuti impactis humoribus. Sublimia tamen a calidiore & tenuiore humore fiunt, lata vero, a frigidiorē & crassiore. Totum autem hoc genus exanthematum nascitur, natura corporis profundum expurgante. Quare paucissimi admodum sunt, modo ad legitimā ætatē perueniant, qui hoc malum effugiant. Non ignoro autem vulgo appellari morbillos; quæ Galeno & alijs Græcis *exanthemata sublimia*: & Variolas quæ illi *lata exanthemata* nominant: quanquam parum recte, quemadmodum scēt. 2. sexti Epidemicon aphor. 18. copiose demonstrauimus. Ad quæ quidem locum, ne eandem rem cum maximo aliorum fastidio, sæpius repetamus, nunc lectorem ablegamus: Exanthematum eruptionē grauiā quædam symptomata sequuntur, vehemens nimirum dorsi capitisq; dolor; difficultas spiritus, pruritus narium & aurium, febris, punctiones vniuersi corporis, pādiculationes, & oscitationes crebræ. Vbi iam egrediuntur, initio faciēs maculas quasdā ostendit, quæ vel in sublime tolluntur, vel in latum extenduntur. Sublimia itaq; exanthemata, cutem in tumorem manifestum attollunt, atq; exulcerāt, pruritusq; excitant. Lata exiguū admodum tumorem efficiunt, neq; tamen exulcerant, neq; etiam

Exanthemata.
cutis pæge.
Papula.
Pituitæ eruptiones.
Duplicia exanthemata
Sublimia.
Variolæ.
Lata.
Morbilli.
Causæ.

Signa.

pruritus excitant, quod scilicet in latitudinem extenta diffidentur, humorque ea faciens acris non sit. Quod etiam Hippocrates in Aphorismis testatur, dicens: *Lata exanthemata non admodum pruriunt*. Postquam vero iam eruperint, saucedo vocis, dolorque in faucibus ac gingivis accidit. Porro difficilis exanthematum sit eruptio & progressus iis, quorum cutis crassa & densa existit. Difficilior autem semper latorum est exitus, utpote quæ ex crassioribus, ut dictum est, ac tenacioribus humoribus oriuntur, atque adeo hoc nomine non facile cutem penetrare possunt. Quare si accedit cutis etiam densitas plerumque, intus detentis exanthematis, moriuntur. Contra pauci admodum, modo in victus ac curandi rationibus error absit, in sublimium exanthematum eruptione pereunt quum ex tenuioribus humoribus, ac prompte erumpentibus generentur. Exanthemata etiam magna ex parte infantibus, eveniunt & iuuenibus rarissime senibus. Meliora ex iis sunt rubei coloris: deteriora, imo pessima, quæ atrum, aut viridem præ se ferunt colorem. In curandi ratione diligenter ad ætatem est respiciendum. Si enim infantibus erumpere per cutem cœperint exanthemata, cauendum vnicui ne naturæ motus impediatur. Quare initio aerem deuitare frigidum oportet, senim cutem densat, atque adeo exanthematum eruptionem prohibet. Versentur autem potius in eo, qui mediocriter calidus est. Corpus etiam vestibus aut stragulis ab iniuria aeris frigidi probe muniat. Cauendum tamen ne, quod vulgus facere solet, supra modum calidis hypocauftis, aut nimis tegumentis ac stragulis syncope accersatur, atque adeo æger suffocetur. Infantes ipsi neque plenior, neque nimis tenui cibo alantur. Et si venter illorum non respondeat, tunc melle quod cibo additur aut resina terebinthina ciceris magnitudine mœdus. Vehementiora enim medicamenta, ne adultis quidem danda, tantum abest ut pueris conuenire queant: prompte enim dysenteriam concitant, potissimum in sublimioribus exanthematis, quorum generatio ex acris humoribus. Quod si natura probe excreuerit exanthemata, nullum sane facere negotium oportet, iuxta hoc Hippocratis: *Qua iudicantur, & iudicata sunt integre, neque mouere, neque nouare aliquid, siue medicamentis, siue aliter irritando, sed sinere oportet*. Sunt tamen, qui infantes inuoluant panis rubris aut puniceis, ut ad crebrum illius aspectum & intuitum ad exteriora, atque adeo summam cutem ferantur humores. Qui ubi euocati fuerint, facile discutiuntur.

Decoctum. Quod si tamen natura in expellendis humoribus tardior, ut imbecillior esse apparet, hoc, aut simile decoctum, quod obstructions tollit, exhibendum erit, quod habet: *Radicum apii, feniculi petroselinii, sing. vnciam dimidiam. Seminum anisi, asparagi, rusci, singulorum drachmas duas. Caricarum numero sex. Calamintha, manipulum unum*. Coquantur in aqua sufficienti, donec medietas absumatur. Iuri per collum transfusi, & sacchari adiectione dulci admisceantur *serapii acidi simplicis, vnc. tres*, & fiat potio, de qua detur quotidie mane & vespere pondus, vnciæ tres, plus aut minus pro ætatis ratione. Si adulti corripuntur exanthematis, initio curationis, si corpus plenum fuerit, sanguis mittendus, idque faciendum antequam appareant exanthemata. Si vero humorum copia in alto constitit, purgatio primum tentanda est. Nam si hac neglecta prius discutere aggrediaris, obstrues ipsos potius, quam per cutem vacuabis. Sin autem nulla in alto deliteant humorum superuacua, per cutem vacuare oportet, & non procul attrahere, per aluum, aut vomitum vacationem molitus: sed humorum qui cuti impacti sunt, curationem medicamentis quæ exalfaciunt & discutiunt, experiaris: idque maxime, quum lata sunt exanthemata. A frigido enim admodum & crasso humore hæc ipsa orta sunt. Quam quidem curationem Hippocrates etiam ipse libro sexto Epid. par. 2. *Aphorismi decimioctauum* probat, ubi ita scriptum reliquit: *Lata pustula, quales hyeme Simon habuit, non admodum pruriunt. Hic sane quum ad ignem inungeretur, vel calida lauaretur, iuuabatur. Vomitiones non expediebant. Puto utique eum qui calidis abunde fouisset, huic prodesse potuisse*. Quibus sane verbis manifeste innuit Hippocrates, humores crassos ad cutem repentes non esse per medicamenta ad profundum corporis trahendos, sed per cutem potius, calidis tum fomentis, tum medicamentis vacuandos. Quæ autem sint eiusmodi, in superioribus libris sæpe est dictum. Porro si post eruptionem exanthematum oculi male afficiantur, liquor stillatius rosarum, in quo parum succi temperuiui, aut porrulae, aut licii sit dissolutum, instillandus erit. Faucium vero & oris noxam medendum compositione diamoron, & id genus aliis medicamentis, suo loco expositis. Reliqua curandi ratio,

6. Aph. 5.

Latorum exanthematum eruptione multi moriuntur.

Curatio infantium.

2. Aph. 20.

Decoctum.

Curatio adultorum.

Hippocrates.

Atio, quæ post plenam exanthematum apparitionem requiritur, in desiccando sita est. Quare humectatio omnis externa ablit.

De ambustis. C A P. X.

CORPORIBVS quæ ab igne, aut feruente aqua exuruntur, tria accidunt sympto-
mata, dolor, bullæ seu pustulæ, & exulceratio. Igitur ambusta igni, *ambusta* vocant
Græci, indigent medicamentis quæ moderate abstergunt, absque eo quod eiden-
ter calefaciant, aut refrigerent. Protinus ergo inhibendas pustulas terra quæuis le-
uis, cimolia præsertim, in teneris quidem corporibus cum aqua, in durioribus autem
cum aceto non admodum acti, aut posca madefacta, illinenda. Sunt qui præferant
eam terram quæ sub vasis aquariis reperitur, si cum albo oui excipiat. Cimolia stil-
laticio etiam rosarum liquore excepta, mirifice confert. item ouum integrum cru-
dum statim impositum, lana molli exceptum præclare facit, pustulaeque excirari pro-
hibet. Etenim refrigerat leuiter & citra rosionem desiccat. Idem efficit atramentum
scriptorium illitum, aut thus aqua dilutum, vel lens cocta tritaque, vel eruum illitum.
Betæ etiam folia cruda contusa, postea elixata, & cum vino illita conducunt. Item
hederæ folia in vino decocta, & illita. Alumen item omne cum aqua & oui albo. San-
tala etiam trita, & cum stillaticio rosarum liquore excepta, adiecto succo semperui-
ui, prædesse plurimum possunt. Itidem valet bolus armenius illitus. Locus autem,
qui vitionem patitur, manu contingendus non est: quare medicamenta ipsa pen-
na illinenda sunt. At ex aqua feruente vitionibus priusquam pustulæ oriantur amian-
tum scissile, (*alumen plumosum* vocant officinæ) tritum cum aceto illinitur, aut fel tau-
rinum cum aqua copiosiore liquatum inungitur aut bulbi liliorum, aut hyacintho-
rum cum rosaceo triti, & in sordium spissitudinem coacti delinuntur. Porro pustulæ
si fuerint excitatæ, principio ne frangito. Si vero persistant, frangito cum acu, ut a-
queus humor effluat, alias enim partes subiacentes corrumpit, & exedit. Partibus
exulceratis adiantum aridum, leuigatumque, aut myrti folia combusta, pertritæ in-
sparguntur. Laudatum est remedium, *unguentum candidum* vocatum cum succo sem-
peruiui, & id quod in capite De carbunculo descripsimus.

De formica, verruca & clauo. C A P. XI.

FORMICA, quam Græci *μυρμηκία* vocant, *tumens & callosa, magna ex parte rotunda*
est excrescentia, colore nigricans, latiore basi, & in cute sessilis, quæ in scalpendo & attritu mor-
dentis formica sensum efficit, unde etiam nomen accepit. Græci enim *μυρμηκία* formicam vocant.
Verruca vero, quæ Græcis *ἀνδροειδής* dicitur, itidem exigua est cutis excrescentia an-
gustiore tamen basi, ac pensilis, ut chordæ nexu suspensa esse videatur. Hæc autem
dum abscinditur, longe maiorem sanguinis quantitatem, quam suæ paruitati con-
gruat, reddit. Clauus rotundum est tuberculum, clauorum capiti simile, quod ple-
runque in calcaneis & pedum plantis nascitur, in gradiendo afferens dolorem & im-
pedimentum. Græcis *ῥαός* nominatur. Generantur ex humoribus frigidis & crassis,
pituitosis atque melancholicis. Signis non est opus ad dignoscendum, sed promte ex-
iis, quæ diximus, discernuntur. In curandis iis tumoribus, cauendum initio erit æ-
grotanti ab omnibus iis, quæ frigidos & crassos humores procreare possunt. Dein
corpus purgandum medicamento, quod pituitam, aut melancholicum educit hu-
morem, aut virosque. Corpore purgato, ad localia veniendum erit, inter quæ sane me-
dicamenta maxime laudatur liquor tithymali, aut fici arboris illitus. Elaterium quoque
cum sale infricatum, eos tumores tollit. Thus item cum aceto, hircinum fel, nitrum cum urina pueri
Venerem non experti stercus ouillum, aut hircinum, cum aceto illitum. Valet etiam arugo cum sulphure
ignem non experto combusta, & ocimi folia cum chalcantho, item ruta cum nitro & pipere. Ve-
rum antequam prædicta medicamenta apponuntur, euelli debent verrucæ, maximæ
potissimum, id quod bifariam fit. Vel enim pilo equino iuxta basim excipiuntur, qui
quotidie magis atque magis constringitur, donec e corpore decendant. Vel circum-
fscarificatæ, scalpro radicitus eximuntur. Nonnulli ne rursus succrescant, candenti
ferro vtuntur. Galenus libro 14. The meth. capite 17. Romæ fuisse quendam tradit, qui ver-
rucas & formicas ore sanauit. Formicas enim certa primum labiorum applicatione,
ceu suctu ad se traxit, atque a radice euulsi: deinde primoribus apprehensam dentibus,
totam simul exemit. Sed, ut idem scribit, scalpro ad myrtacei folii speciem forma-

Curatio am-
bustorum
igniCuratio v-
itionum ex
aqua fer-
uente.Pustularum
curatio.Exulcera-
tionis.
Laudatum
quid.Formica.
μυρμηκία.Verruca.
ἀνδροειδής.

Clauus.

Causa.
Signa.

Curatio.

Localia.

Euulsio ver-
rucarum.

Scolopomacharium.

to, & ferramento eo quod *scolopomacharion* Græci vocant, quiſpiam manibus exercitatus, facile eas excidet, quum propriis lineamentis a circumposita cute circūscripta discernantur. Est autem scolopomacharium Græcis non nisi cultellus acutus, vel pali instar erectus. Nam *σκολοπιον* illis est acies & acumen, *μαχαιρα* vero culter siue gladius. Aque vero & valente aliqua penna, quales sunt veterum gallorum, anserum, & aquilarum, circulo formicæ imposita, ipsam educimus. Debebit porro pennæ concava fistula esse formicæ crassitudini par, vt eam vndique prorsus constringat. Quæ postea circumacta, ac simul deorsum impulsat, celerrime ita formicam etiam cum ipsa radice totam educet. Constat vero, & quod finis ipse pennæ quæ eam circulo secabit, non tenuis modo, sed etiam acutus & firmus esse debebit. Abscindere ab iis tantum radicem versus oportet, quatenus reliquæ partis fistula completi formicam possit. Sane ex ipsa statim abscissione, si modo scite fiat, etiam acumen ipsi comparabis. Ceterum sunt & alia medicamenta ad tollendos prædictos tumores idonea, quale est quod habet: *Fecis vini vstæ, calcis viuæ, aruginis, singulorum partes aquas, cum urina pueri impuberis exceptas.* Hoc medicamento statim decidere formicas, Orib. sius memorizæ prodidit. Et quod accipit, *aruginis, auripigmenti, sandarachæ (arsenicum rubrum vocant) salis ammoniaci, singulorum drachmam vnā.* Redacta in puluerem cum liquore tithymali excipiantur, & in calycibus glandium, aut nucum auellanarum putaminibus verrucis & formicis clauisq; imponantur, ne scilicet circumiacentes partes ei odant. Vbi deciderint, communis curatio vlcerum adhibeatur. Mirifice autem prodest *millesfolii, & geranii species, quam herbam Roberti hodie vocant.*

De vitilagine. C A P. XII.

Vitiligo.
Leuce.
Alboras.
Alphos.Alphos duplex.
Causæ.

VITILIGINIS, quæ cutis est vitium, duæ sunt species. Vna enim *λευκή* dicitur, quæ nihil aliud est, nisi coloris ad albidius mutatio. Latinis *vitiligo alba* nominari potest. Arabibus autem *Alboras* vocatur. Altera vitiliginis species *αλφός* Græcis appellatur, cuius generatio eiusdem cum leuce modi est: non tamen omnino in profundo caro in ea patitur, sed summa tantum cutis, & veluti squamulæ quædam vitilignes ipsæ infixæ adhærent. Et hæ quidem duplices sunt, albæ & nigræ: faciuntque duplicem alphi, album & nigrum. Auicenna & Arabes alii, hoc vitium *Morpheam* nuncupant: & eam quoque duplicem esse statuunt, albam & nigram. Leuce a viscoso, glutinosoque sanguine contrahitur. Galeno siquidem libro tertio *De symptomatum causis, cap. s. teste*, cum pituitoso viscosoque sanguine diutius caro alitur, caro quidem manet adhuc, sed mutatur eius differentia, & in aliam speciem conuertitur: & media caro fit inter eam quæ sanguine prædita est, & eam, quæ sanguine caret. Atque quum talis existat, accidit vt ne tentet quidem postea affluens sibi alimentum in rubentis carnis speciem transmutare: haud aliter quam polypis, locustisque accidit. Hac occasione, ipsa tota quam celerrime & alba & pituitosa euadit, quando & ipsa alimentum in ruborem posthac transmutare non potest: & id quod influit pituitosum est. Qualis enim protinus ab initio & locustarum & ostreorum fere omnium caro est, talem ex transmutatione acquirunt ii, qui leuce infestantur. Iam alphi haud diuersum (vt dictum est) a leuce habent generationis modum: Verum per hos non E tota caro afficitur, sed cutis duntaxat superficies, veluti squamis quibusdā inspergitur. Atque albi quidem ex pituita, nigri vero ex melancholico humore proeunt. Leuce tam alte in corpus penetrando radices agit, vt & pili in ea cani, & lanugini similes enascantur. In alphi, vt comprehensum est, squamulæ quædam affixæ cuti inhærent. Porro in curatione leucæ, initio omnia fugienda erunt, quæ sanguinem glutinosum ac pituitosum procreare possunt. Deinde cum non quolibet leuce curationem recipiat, notas ipsius tales habeto. Acu per summa leucæ puncta, sed cute non penitus, si sanguis emanauerit, sanabilis est: sin lactea humiditas, desperata est. Vel panniculo laneo asperiore infricata cutis, siquidem rubicundior euaserit, medicinæ locus est: sin idem color remanet, non conſanescit. Et quæ plura loca corporis obsidet leuce, difficilius tollitur, quam quæ pauca deturbarit. Item vetustior, quam recens, minus in medicina spei habere censenda est. In curabili itaque leuca statim exhibenda medicamenta quæ glutinosos humores extenuare possunt, vt est hyssopus, calamintha, anisum, oxymeli, & id genus alia, quæ in præcedentibus libris,

primo

A primo potissimum, cap. De dolore capitis ex pituita, dicta sunt. Deinceps quæ eosdem purga- Localia.
re valent medicamenta exhibenda. Corpore purgato, ad localia veniendum medi-
camenta: quare leucæ, hoc vel simili medicamento affricandæ. Fici folia viridia ma-
cerato in aceto: sit autem aceti tantum, ut ea superet, & penitus contegat: deinde con-
tusa & trita cum sufficiente calce viua misceto, & locis prius exterfis, in sole illinito,
vsquequo lentigini similem imaginem ipsa leuce induat, atque deinde fici succum
recentem supra istam illitionem inducito, ipsamque leucem solam aliquandiu con-
fricato, & ne vicinas partes exulceres obseruato: Egregie enim auxiliatur. Laudatur
& hoc quod in eum paratur modum: *Iuglandium nucum immaturarum & adhuc acerba-
rum exteriorem corticem viridem detrahito, & fici nigra sylvestris ramulos amputato, adhuc li-
B thargyrum conuicito, ac cum aceto coquito terito, & ad vnguenti formam reducto, idque ipsum in
sole illinito.* In decoquendo etiam hordei grana septem addito. Hinc enim sufficientis
decoctionis signum habebis, vbi videlicet hordei grana cocta videbis. Fortiora iam
dictis sunt, sulphur viuum, veratrum, sandaracha, chalcanthum, alumen rotundum &
scissum, ventres cantharidum, sal ammoniacum, nitrum & id genus alia, e quibus vn-
guenta confici possunt, quale est hoc quod habet: *Sulphuris viui, nitri, utriusque drach.
duas. Aluminis scissi, rotundi, elebori albi, drach. vnâ. Salis ammoniaci, drach. dimidiam. Fari-
ne lupinorum, drach. duas & dimidiam.* Redacta in puluerem cū vnguento flauo, citrinum
vocant, quod faris est excipiantur. Porro cutis prius quā medicamenta adhibeantur,
nitro defricanda erit. Sunt etiam, qui prius acu transfixa purgant, quoad eruo ema-
C net, antequā medicamenta illinant. In alphis curandis victus ratio sit, quæ neq; pitui- Curatio al-
tæ, neque atram bilem in corpore acruet. In albo igitur, principio quæ pituitam edu- phi.
cunt medicamenta: in nigro, quæ melancholicum humorem vacuât, exhibenda sunt.
Corpore vacuato, vtriusque cōmune prodest auxilium, elota calx aqua soluta, aut dra-
cunculi, aut ari racix, cum aceto illita. Simili modo vtrumq; veratrum eisdem efficax
est. Item lupinorum amarorum decoctum superfusum, eorumque farina ex aceto vel
oxymelite illita. Capparis quoque radice cortex cum aceto, lilii que radix cum mel-
le, cepa ex aceto in sole, peruncta. Alia quoque medicamenta, quæ paulo supra com-
memorauimus admota, plurimum adiumenti afferre solent.

De œdemate. C A P. XIII.

O idem Galeno, & aliis post eum Medicis Græcis, est tumor mollis, laxusve, & dolo- Œdema
ris expers. Barbaris, corrupta & inepta voce, *Vndimia* dicitur. Nonnullis ineptius quid.
multo, *ximia*. Fit ex substantia pituitosa, aut spiritu vaporoso. Signa iam fere dicta sunt. Causa.
tumor enim atlest mollis, qui si summis prematur digitis, cedit, fossulamque reddit, Signa:
nec amoris digitis resilit, sed prementis vestigium retinet, colore albus, qualis in pe-
dibus ac cruribus eorum quos aqua intercus vexat, & in tabidis, & aliis qui malo
corporis habitu (*νεκρῶσις* Græci vocant) laborant, prouenire solet. Verum in illis peri-
culosis affectibus, œdema quidem symptoma est, nulla propria præcipuaque cura-
tione indigens. Sola enim fractio ex oxyrhodino, cur nonnunquam ex sale & oleo,
vel etiam ex sale iniecto oxyrhodino ipsum sistit. Quum vero propter pituitam Curatio:
E particulæ influxam œdema constitit, duplex eius curandi scopus erit. Alter, ut hu-
mores partem occupantes vacuentur: alter vero, ut fluxio restringatur, reprimaturve.
Quare initio corpus purgetur medicamento, quod pituitam ducit. Eo va-
cuato, quæ reprimunt, & siccandi simul ac discutiendi facultatem obtinent medi-
camenta, adhibenda sunt: ut est spongia, aqua quæ parum aceti habuerit imbuta,
cum ligamento leuiter stringente imposita, quæ ab inferiori parte incipiens supra
finiat, vitium abigit. Esto autem spongia, modo conductura sit, recens: hæc enim Spongia res-
plus exsiccat, atque discutit, Gal. lib. ii. De simpl. med. facul. teste. seruat enim etiam num cens.
eam quam a mari accepit facultatem. Aceti etiam in posca sit tam moderata tempe-
ratura, ut possit ipsam quispiam bibere. Quæ autem ex ea plus aquæ continet, in pri-
F cipio adhibenda est, maxime in mollibus corporibus. Quæ vero hac fortior fuerit, in
robustis & duram habentibus cutem, & quæ ad primam spongiæ appositionem non
iuuantur. Quod si spongiæ nouæ occasio non est, hanc detergebis abluesque nitro, &
aphronitro, & lixiuio. Quod si sub his œdema non subsidat, vbi rursus deligabis, pusil-
lum aliquid aluminis adicies, ac nouam spongiâ admouebis, atq; tum (ut præscriptum

est) deligetur ab inferiore sursum. Sit autem arctatio mediocris, ac primæ quidem A fasciæ in citiones, quæ scilicet inferne incipiunt, magis arctandæ: quæ deinceps, sunt remittendæ: ceterum non adeo, ut laxa sit aliqua deligationis pars: Curationis siquidem intento in œdemate, ut diximus, mixta est: vna quidem, ut eius substantia dissoluatur: alia, ad constringendum & congregandum: Quod si diuturnum œdema fuerit, œdema prius oleo inungens, deinde spōgiam ex lixiuo impones, atque stringes vehementius. Discutit etiam ac comprimit œdemata qualibet terra illita, tum illatis sativa. In discutendis etiam œdematis mirifice conducit emplastrum diachylon, & oxycroceum nonniatum. Sic etiam emplastrum ex radice altheæ, liliorum alborum, malua, acantho, oxylapatho, senecione, semine lini; & iis similibus compositum, miram in discutendis œdematis vim obtinet. Cocta autem & subacta, & cum axungia vel butyro B inmixta, in formam emplastri rediguntur:

De inflationibus. C A P. XIV.

INFLATIONES Græci *μφοσιμα* vocant, tumores sunt, qui ex flatulento spiritu in aliqua parte coaceruato geniti sunt. Differunt autem ab œdemate, quod illa, Gale-
no etiam libro 14. Ther. method. cap. 7. attestante, ex pituitoso humore ortum habent. Proinde prementibus nobis cedunt, digitique admodum alte in ipsa descendunt. Inflationes vero ex flatuloso spiritu collecto, ut comprehensum est, nascuntur alias sub cute, alias sub membranis quæ ossibus circundantur: aut musculos viscerumve aliquod includunt. Porro colligitur aliquando non parum etiam in ventriculo & intestinis, itemque in medio spacio horum, & peritonæi. Differunt quoque hæ ab œdemate, quod & pressæ digitis non retinent vestigium, & sonitum veluti tympanum reddunt. item quod in cavitare sensibili continentur, atque hac nonnunquam maxima. Causa autem flatulenti spiritus, qui & flatus dicitur, est caloris nativæ imbecillitas, qui humidam materiam sensili transpiratione discutere non potest. Quapropter suscitatur quidem vaporem ex humida materia, sed eum haud ob suam imbecillitatem discutit. Quemadmodum copiosius lib. 3. De symptomatis causis Galenus monstrat. Quod si cum caloris imbecillitate adsit meatuum per quos flatus evaporatur, densitas, inflatio maior erit. Signa inflationum sunt, tumor tactui renitens, cum lucido quodam splendore, sonum, ut vter, vel tympanum, dum percutitur, reddens. Adhæc persæpe sentitur flatus per vniuersum corpus, modo huc, modo illuc discurrens, ac dolorem tensionis pariens. Quum igitur tria hæc, materia humida, coloris imbecillitas, & meatuum densitas inflationem generent, curationis ipsius scopus erit caloris substantiam roborare, vaporem extenuare & meatus recludere. Porro posteriora duo, nempe densi corporis rarefactionem & crassi spiritus extenuationem, iisdem omnino medicamentis & prædiis assequimur, extenuantibus nimirum & calefacientibus, magis aut minus, pro laborantium partium densitate vel varietate, & vaporum quoque crassitudine vel tenuitate. Pro horum namque differentia facultas medicamentorum quæ admouentur, intendi & remitti debet. Itaque raræ partes, & vapor seu spiritus non admodum crassus, minus: densæ vero, & vapor multa crassitie præditus, magis ex tenuantibus, & calidis egent. Caloris autem E substantia si perit, aut imminuta est pro ratione iacturæ eius relarcienda erit. Si vero alterata fuerit, ad mediocritatem reducenda. Quod si dolor cruciat, ad anodyna transeundum est. Principio itaque in curatione eius vitii vnice curandum, ut æger ab omnibus iis quæ flatus generare possunt tum cibis, tum potionibus absteineat. Utendum autem potius calidis & siccis, item attenuantibus, ac flatum discutientibus. Concoctrix quoque facultas odoratis & flatum discutientibus medicamentis, ut sunt diacuminum, diacalamintes, odoratum rosaceum, & id genus alia, quæ in libro 3. in capite De inflatione ventriculi dicta sunt, roboranda erit. Extrinsecus ventriculus ex milio, aut sale, ut crudo lini semine fouendusest: si quidem dolor mediocris sit. Sin vehemens, utendum est oleo tenui quod rutam incoctam habeat, aut aliquod calidorum seminum, cuiusmodi sunt cumini, apii, & petroselini. Quibus si non sedetur dolor, cucurbita magna cum longa flamma, sine scarificatione ventri affigenda est, ita ut umbilicum complectatur. Quod si artubus & musculis qui sub cute, aut etiam membranis, quæ ossa vestiunt, oriatur inflatio, si citra dolorem sit, liquor aliquis tenuissi-

Inflatio
quid.
Inflationū
ab œdema-
te differen-
tia.

Causa.

Signa.

Curatio.

Anuissimarum partium, cuiusmodi est lixiuium spongia noua exceptum, imponi debet. Sin dolor quoque vrget, vngenda pars oleo est, quod relaxandi ac remittendi vim habet. Iacidunt porro eiusmodi affectus, vbi vel musculus, vel membrana quæ os circumcui, est contusa. Ac super membranam quidem quæ os ambit, antedicta imponenda est spongia. Ad musculos vero, medicamentum quod magis mitiget, est adhibendum. Quo fit, vt ad hos solo lixiuium non vtamur, sed immissa ei tum sapa, tum pauculo oleo. Satius autem fuerit in principio non addidisse lixiuium, sed sapa cum vino & exiguo oleo vti, ac quod mediocre sit olei adicere. Vbi mixta sunt, modice excalfacere, ac lanam succidam ipsis imbutam imponere. Vbi celsus præsto non est, aliquid cerati quod ex celsypo componitur, recte admisceueris. Debent enim contusi musculi leni medicamento, cui mixta sit facultas: quippe quæ simul consoquat, discutiat, & modice adstringat. Quippe si nihil habet adstrictionis aliquando phlegmonas, in plethoricis maxime corporibus, auget. Quæ singula longius Galenus libro 14. Ther. method. cap. 19. prosequitur. Quid vero faciendum sit, si inueterauerit inflatio, Galenus ibidem monstrat. Ceterum si huiusmodi flatulentus spiritus fumosus fuerit, malus, corruptus, & a materia venenata excitatus, cum dolore intolerabili, & vehementi calore, per membra discurrens, nullum tutius ac melius consilium dari potest, quam quod vbi in parte quapiam substiterit, pars ipsa protinus infra supra quæ deligetur, ac in medio nouacula, vel ferro candente tumor aperiatur, ita vt facile vapor ille venenosus egred: possit. Deinde hilans plaga implenda erit aloë, & bolo armenio ex rosa eo & acetato dissolutis. Transactis vero diebus tribus aut quatuor, vulnus carne implendum erit, & ad cicatricem perducendum.

Contusorū
musculorū
remedia.

Si flatulentus
spiritus ve-
nenatus fu-
erit.

De scirrhis. C A P. X V.

SCIRRHVS exquisitus est tumor præter naturam sensus ac dolores expers, & durus. Non exquisitus vero, non omnino insensibilis est, difficulter tamen sentit. Scirrhus igitur qui sensu prorsus vacat, sanari non potest: qui ægre sentit, facilem curationem non admittit, nec tamen prorsus incurabilis. Fit, Galeno libro Therapeutice methodi 14. cap. 3. teste, ex humore glutinolo, & crasso, qui particulis induratis impactus, solum contumaciter repugnat. Interdum statim ab initio consistit, augeturque. Magna vero ex parte Medicorum imperitia euenit, qui erysipelata & phlegmones vehementer refrigerant, & adstringunt. Signa iam dicta sunt in scirrhi descriptione, nempe tumor durus, & valenter renitens, colore inter rubrum & nigrum medio. Inchoante itaque scirrho, & quempiam adhuc imbecillum sensum seruante, curationem adhibere conuenit. Curandi vero eius communis indicatio est, vt quod præter naturam in particula est, totum vacuetur, vniuerso tamen prius, si res ita exigat, vacuato corpore. Modus tamen vacuationis eius proprius est. Nam detergere id vbi contumaciter inhaeret, oportebit. Quod si quis iis quæ vehementer trahunt discutiuntque medicamentis vacuare tentet, nec iis quæ humectant & excalfaciunt molliat ac liquet, huic paucis primis diebus egregie processisse curatio videbitur: ceterum quod de affectu restabit, id insanabile erit. Siquidem toto quod in eo tenuium partium erat discusso, quod reliquum est, veluti lapidosa concretio linquetur. Quippe etiam qui in articulari morbo visuntur calli, ex humore crasso glutinosoque proueniunt, quando is non paulatim est discussus, sed violentis medicamentis totus simul siccatus. Hac igitur de causa ad scirrhosos affectus, nullum vehementer excalfaciens siccansue medicamentum est aptum, sed ea tantum, quæ cum emolliendo discutere commode possunt. Huius generis sunt omnes medullæ atque adipēs. E medullis autem primas tenet ceruina, & vitulina. ex adipibus commendantur aserinus in volucrium, leoninus vero in quadrupedum genere præstat. At gallinaceus post aserinum sequitur, & pardinus leoninus, ac deinde vrsinum & taurinum. At caprinus crassior & siccior prædictis est, magisque hircinus. Inter resinas terebinthina & laricina eligendæ. Emollit etiam ammoniacum thymiana, & bdellium utrumque, magisque Scythicum, quanto videlicet est humentius. Pari modo & styrax qui humentior est, sicco valior est. Eiusdem generis etiam sunt butyrum, althea radix, & alia quæ supra in capite De lenis duritia commemorauimus. E quibus vnguenta & cerata componi possunt, vt ibidem monstrauimus. Ceterum inter curandum male affectam particulam, calido oleo

Scirrhus
quid?

Causa.

Signa.
Curationes.

Emollientia.

fouere oportet, & glutinosa medicamento postquam apposita fuerint, nunquam remouere, priusquam sponte decendant. Imo si etiam lauandus sit æger, omnino permittenda sunt. A balneis tamen medicamentosis ac sponte natis, prorsus abstinendum. Hæc enim huic malo plurimum aduersantur. Quid multa? quo pacto scirrhus relictus in aliqua parte corporis sit curandus, eleganti historia Galen. lib. 2. ad Glaucon. cap. 9. docet, quam illic studiosi legere possunt. Præterea cum membrorum alia rariora sint naturaliter, alia densiora, etiam vacuationem eorum diuersa specie remedia postulare est necessum. Hac igitur de causa tum in tendonibus, tum in ligamentis, quum scirrhosa fuerint, satius est ei curationi, quam per mollientia molimur, aliquid incidentium admiscere. Ex quorum numero vel in primis acetum est. Interim vero & in aliis partibus, quas scirrhus afficit, eo utimur. Verum in tendonibus & ligamentis in hunc modum. In aceto acerrimo candentem igni lapidem extinguere oportet, ac si quidem haberi potest, pyriten: sin eius copia non datur, molarem. Deinde ascendente post infusum lapidi acetum vapore calido, in hoc dimoueri scirrhosum ligamentum vel tendo debet, atque exinde rursus medicamentum, quod molliat, imponi. Multi enim hoc modo curationis perfecte sanati sunt, ut fere magicum opus, Galeno attestante, videretur. Initio tamen oleo, non aqua, quotidie omnino laborantem particulam perfundere oportet. Esto autem id oleum haudquaquam adstringens, sed planetenium partium, cuiusmodi *Sabinum* est. Incoquimus autem oleo interdum *fenogracum*, *anethi comam*, aut *althea*, ac *sylvestris cucumeris* radicem. Ceterum curationi, quæ per acetum administratur, utilis est vitio iam adulto, & quum præparata iam sub mollientibus pars fuerit. Siquidem aceti vis, modo quis ea modice & debito tempore vtatur, salutaris eiusmodi affectibus est, ceu crassos humores dissecans, ac resoluens: sin vel immoderatus, vel in tempore non idoneo, tenuiores partes violentè absumens, id quod reliquum est lapidescere facit. Sed & si quis eo diutius vtatur, substantiam ipsam neruorum attingit. Ob id igitur nec sæpe, nec inter initia, nec longo tempore, medicamentis, quæ ex aceto componuntur, ad ligamenta & tendones vtendum. At in liene, & carnosus muscoli partibus scirrho affectis, tutus eius est vsus. Quippe raræ sunt naturaliter hæ partes, nec est, quod metuas, ne quis neruus eius vi lædatur. Ac ammoniacò quidem thymiamate cum aceto, etiam non pauci lieni imponentes vtuntur, ad luti scilicet crassitudinem, quod ex vtriusque est mixtum, redacto. Vtendum autem eo tum maxime erit, cum per emollientia medicamenta antea scirrhosus tumor mollitus est: hoc namque tempore aceto liquatum ammoniacum maximum vsus præstat. Sufficit autem eo vno alterove die vsos, rursus ad mollientia reuerti. Ac rursus his pluribus dies vsos, de nouo ad medicamen quod ex aceto fit redire, siue id ammoniacum, siue quid aliud habeat eorum quæ molliunt. In medio tempore etiam radice *altheæ* in adipe anserino, aut gallinaceo, aut suillo liquata, & cataplasmatibus more imposita vti licebit. Sylvestris etiam malus folia cum aliquo supradictorum rusa proficiunt. Quæ singula copiosius prosequitur Galenus lib. 14. The. meth. & 2. ad Glauconem.

De Strumis. C A P. XVI.

Strumæ.

STRUMÆ, quas Græci *xygides* vocant, sunt glandule induratae. Vel (ut Galenus lib. 13. The. meth. definit) sunt scirrhosiores glandularum phlegmones. Barbari *scrofulas* vocant.

Scrofulæ.

Scrofulæ enim, id est, suæ colla habent glandulosa, & magna ex parte strumosa. Fiunt magna ex parte in collo, alis, & inguinibus, quod his locis glandulæ vasis sub-

Differentiæ

strumarum.

Magnitudi-

ne.

Natura.

Mites.

stratæ collocantur. Differunt strumæ inter se, magnitudine, natura, loco, ortu, multitudine, & vasorum complicatione. *Magnitudine*, quoniam quædam parvæ, quædam magnæ, quædam maximæ, quædam mediæ. *Natura*, quod aliæ mites, aliæ malignæ sint. Mites sine phlegmone & dolore, cum mediocri duricie apparent. Neque enim molles sunt, sicut steatoma: neque duræ, sicut scirrhus: sed mediam quandam inter hæc tactus proprietatem obtinent, tumoremque omnino circumscriptum, rotundum, æqualemque efficiunt. Malignæ vero, phlegmones, pulsantesque dolores inuehunt, tumoremque inæqualem præ se ferunt, in quo vasa prominent, cōtrectatuque manuum efferantur. *Loco* præterea differunt, quoniam quædam in posterioribus colli partibus, quædam in obliquis, quædam circa guttur oriuntur. Item quædam super-

ficiunt.

- A**ficiem statim sub cute, quædam prope magna nobiliaque vasa penitiores partes occupant. *Ortu*, quod quædam quasi suspensæ, quædam insertæ oriuntur. A c suspensæ quidem huc illuc facile moventur: insertæ vero subnituntur, validiorum corporum imperum tolerantes. *Multitudine*, quod morbo vna, modo plures generentur. *Vasorum complicatione*: quædam enim venas arteriasque implicatas habent, quædam prorsus non habent. Omnes autem suis membranis includuntur, perinde atque steatomata, atheromata, & melicerides. Generantur perinde atque scirrhi, ex crassis & glutinosis humoribus. Notis ad vitii huius cognitionem nihil opus est: sensibus enim, visu nimirum, & tactu, statim deprehenditur. Patux strumæ maioribus facilius curantur, sicut mites & blandæ phlegmone obsessæ. Malignæ vero, sanari non possunt. Quum enim omnes huiusmodi strumæ cancerosæ ac vasis refertæ sint, dum curantur per matium, curationi non cedunt: & dum curantur, erumpendi sanguinis periculum afferunt, præterquam quod quum plefunque penitiores inueniantur, minime abscindi possunt: vasa enim nobilia tanquam radices obtinent. Sed pro loci ratione, superficialiæ profundis curatu faciliores sunt. In curatione etiam strumarum diligenter glandularum scirrhi affectatum natura consideranda. Sunt enim quædam, quæ in medio vasorum spaciò consistunt, & quod ibidè scissum & diductum est implent, atque adeo eius diductionis pro firmamento sunt. In iis cum earum haud magnus animantibus usus sit, curandi ratio est, vt totum quod vitiatum est, scalpello excindatur, vel medicamentis putrescere cogeribus. Quæ autem sit ratio excidendi, non est nostri instituti docere. Eam tamen luculenter admodum tradit Aetius libro 15. capite 5. & Paulus libro 6. capite 35. Præterea sunt quædam glandulæ, quæ vel saliuam, vel lac, vel genitale semen, ad hæc quæ pituitosum quendam humorem in mesenterio, vel faucibus, vel larynge generant. Harum certe maior est usus. Ideo quum in scyrroso affectu sunt, non aliter quam reliquæ partes quæ scyrro laborant, sunt sanandæ. Corpore itaque primum per ea medicamenta, modo ætas & alia permittant, quæ crassos & glutinosos humores educunt, vacuato, ad emollientia primum, deinde vero ad discutientia progrediendum. De emollientibus satis copiose capite præcedenti est dictum. Inter discutientia laudatur priuatim farina lupinorum, ex oxymelite cocta & illita. Bonissimum item stercus aceto incoctum & illitum. Probe etiã discutit strumas calx viva, melle, vel oleo irino, vel adipe suillo excepta. Valet etiam hoc ceratum quod habet: *Sulphuris, seminis nasturii & vrtice, singul. drach. duas. Nitri, drach. vnam & dimidiam. Myrrhæ, galbani, ammoniaci, sing. drach. vnam. Olei veteris, vnc. tres cum dimidia. Cum cera & resina terebinthina quod satis est, informetur ceratū. In pus conuersas strumas rumapit loliacea farina cum fimo columbæ, & semine lini vino incocta. Ceterum strumalaborantibus aliud reddi facilis debet, tenuisq; victus adhiberi. Quare ab omnibus crassos generantibus succos abstineant. Bibant vinum tenue, & album. Fugiat potionem aquæ frigidæ, ac rûridæ. Deniq; iis assidue vomitus prouocari debet, & per os illis pituitam educere oportet, atq; caput exsiccate.*

Ortu.

Multitudine.
Vasorū cō-
plicatione.
Causa.
Signa.
Curatio.Glandula-
rum natura
cōsideranda.

Vacuatio.

Discutien-
tia.

Ceratum.

Victus.

De abscessibus. CAP. XVII.

- A**bscessus, qui Græcis ἀποστήματα vocantur, vitia sunt, in quibus a seipsis, quæ prius inungebantur partes, abscedunt. Spacium igitur in medio vacuū necesse est fieri, quod materiam aliquam aut flatuosam, aut humidam, aut ex vtraque mixtam contineat. Male itaque nonnulli recentiores Medici apostematis & phlegmones nomina confundunt, quum sint diuersa inter se vitia. It abscessus ex vaporoso spiritu, aut humida materia, vt dictum est, aut vtraq; mixta. Quocunq; autem modo abscessus fiant, id spatium quod abscedentes partes interiacer, humoribus illum efficientibus impletur. Qui si diutius aliquando maneant, in varias formas mutantur. Etenim lapidibus, arenis, testis, lignis, carbonibus, luto, strigmento, amurcæ, fœci, multisq; id genus aliis similia sæpe in abscessibus contenta deprehenduntur. Priuatim tamen abscessus, in quo pulci similis continetur humor, *Atheroma* dicitur. Qui vero mellis substantiam referentem in se humorem habet, *Meliceris* nominatur. Abscessus autem in quo veluti adeps est, *steatoma* appellatur. Signa ex iis quæ iam dicta sunt, abunde patent. Porro curantur abscessus vacuata, quæ in spacium abscessit materia. Quoniam autem ex varia est, vt modo diximus, ideo non eadem ratione omnes vacuantur. Nā si in sinu minime profundo tenuis & pauca

Abscessus
qui?
Recentiores
male apo-
stematis &
phlegmo-
nes nomina
cōfundunt.
Causa.Atheroma.
Meliceris.
Steatoma.
Signa.
Curatio.

materia resoluiq; idonea contineatur, cutisq; rara sit, discutientibus molienda curatio est. Sin ob humoris crassitudinem aut copiam, cutis densitatem, & abscessus altitudinem discuti non possit, ad suppurationem transeundum est: ut in phlegmonibus, maxime quæ in abscessum iam versæ sunt. In quibus vero abscessibus nulla ob crassitudinem nec discussionis, nec suppurationis spes relicta est, ut in steatomatis vno præsidio utimur nempe excisione: quemadmodum in aliis, quibus pus ac alia materia discuti non potest. Nonnulli enim abscessus solâ manus curationem efflagitant, in quibus scilicet materia propter crassitiem nec discuti, nec putrescere potest. Quidam vero tam sectionem, quam suppurationem admittunt, ut in quibus humor suppurari quidem potest, sed ob crassitiem, aut lentorem discuti non potest: cuiusmodi est: atheroma. Alii triplicem curationem nempe discussionem, suppurationem, & sectionem recipiunt: quales sunt qui ex tenuioribus constant humoribus, sed non ut toti discuti possint. In iis vero abscessibus, qui in alto corporis constitunt, ac potissimum in visceribus, medicamenta quæ ex aromatis componuntur, maxime sunt utilia: utpote quorum vis collectum humorem tum in habitum resoluat, tum digerat. Sunt profecto & alia eius generis non pauca, quorum laudatissima sunt tum antidota quæ ex viperis componitur theriacen vocant; & quod ex cretica calamintha est compositum, a Galeno lib. 4, *De tuenda sanitate cap. 6.* descriptum. Priuatim vero meliceridas dissipat hoc emplastrum, quod accipit: *Passularum detractis vinaceis, lib. vnam. Cumini minutissime triti, unc. tres. Omnia simul in mortario subacta conficito, & alligato.* Et hoc, quod habet: *Salis ammoniaci, lithargyri, cerussa, sing. lib. unâ. Cera, cerebithina, galbani, opopanacis, sing. unc. vnam. Rubrica sinopice, unc. sex. Aceti, uncias septem, & semissem. Lithargyrum, cerussam, & salem ad exactum leuorem ritum simul decoquito, deinde rubricam prius ex aceto tritam injicito, & cum uniuersa liquabilia, postremo omnibus simul confectis, & ratis opopanacem & galbanum aceto soluta admisceto, & utere.* Ceterum si medicamentis adurentibus cute superposita prius denudare expedit: e quorum numero, Paulo attestante, simplicius quidem est quod constat *calce viua, sapone, & lixiuio.* Aliud magis varium, quodq; reconditum diu seruari potest, capit *Calcis viua, drach. quatuor. Fecis vini combustæ, nitri liquidi costi, singul. drachmas duas. Rubrica sinopice, drachmam vnam.* Terantur in lixiuio, & ubi ad mellis crassitiem reducta fuerint, ter feruesfacito, ut mediocrem consistentiam habeat, & pixide plumbea reposito, lixiuium super destillans, ne nimis cito exarescat. Ergo circumfusam cutem eiusmodi medicamenti crustam inducentibus, primum abrupto. Postquam vero crusta deciderit, exedentia exhibeto. Eroditi autem valide citra vellicationem & morsum quod habet: *Squama aris, drachmas quatuor. Sandaraca, arsenicum rubrum nominant, drach. duas, Ellebori nigri, drachmas duas, cum rosaceo vitæ.* Sed quæ adiacent atq; in ambitu sunt partes omnes, prius cerussa cum oleo delinito. Verum ubi tales abscessus sectione curare voluerimus, in ea quidem curatione siue pultaceus, siue melleus, siue adiposus, siue cuiusdam alterius substantiæ humor in eis contentus fuerit, vnus scilicet nobis scopus perpetuus est, nimirum ut tunicam qua humor concluditur, auferamus. Sed dum hoc molimur, impense cauendum est, ne temere membrana vulneretur, aut dilaceretur, unde humor qui in ea continebatur effusus operationem impediat, & portio ipsius relinquatur. Si enim dissecta tunica, ac humore perfuso tenuior subfederit, difficulter admodum tunica excoriari curariq; poterit. Si vero humoris aliquid relictum fuerit, periculum est, ne morbus reuiuiscat & renascatur. Quod si tale aliquid incidit, melius est non consuere, & exedentibus medicamentis supra commemoratis, aut consimilibus reliquias absumere.

De cancro C A P. XVIII.

Cancer quid. Cancer est *inaequalis, liuescens, aspectu tæter, & cum dolore, tumor.* Nomen accepit a cancro, quemadmodum enim in isto pedes ex vtraque parte sunt corporis, ita in hoc vitio venæ oppletæ, & in ambitu tensæ, canceri animalis pedibus omnino sunt similes. Fir in omnibus humani corporis partibus, sed sæpius in foeminarum mammis, quæ a natura purgationem non habent, quod raræ & laxæ sint, ac crassissimam melancholici humoris materiam promte excipiant. Generat ex melancholico humore feruescente: qui si acrior existit, exulcerationem etiam efficit. Sunt enim duæ supremæ cancerorū differentiæ. Nam quidam eorum vlcere carent, & ab omnibus fere antiquis oculi appellantur. Quidam etiam exulcerantur. Tumor is magis quam phlegmone nigricat, sed

Causa.

Oculi canceri signa.

- A sed ita ut tantam caliditatem non experiatur. Venæ quæ in ambitu sunt, intumescunt, intendunturque, cancri animæ pedum, ut diximus, modo. quoniam vero a profundo inutilis sanguinis multitudo attrahitur, ideo varicosæ venæ redduntur. Color cancri cinericius, ad purpuram vergens, subliuidus: ac spectantibus quidem mollis apparet, tangentibus vero durissimus. Pungentes etiam dolores ac late diffusos infert. At si exulceretur, iugiter erodit, & profundum suffodit, nec sisti potest, saniemque emittit quocunque ferarum veneno nequiores, copia & odore abominandam. Hoc vitium per sui initia, priusquam in membro figatur, curari potest. Sed ubi in molem satis insignem attollitur, insanabile efficitur, nemoque illud sine manus opere curabit. Id ipsum autem accidit propter succi crassitiem, qui nec repelli, nec discuti potest, nec rotatus
- B corporis purgationi cedit. Mitiora etiam remedia contemnit, vehementioribus vero irritatur, excandescitque. Incoantes itaque cancos prohibere ne augeant, id quod principio fit commoda victus ratione, in qua vitanda sunt omnia melancholicum succum generantia, ut sunt *carnes bubula, cervina, leporina, fassa, faba, lécres, caseus, & eiusmodi quæ in capite de melancholia sunt commemorata*. Utendum vero vberime pisanae cremore, malua, atriplice, beta, & huiusmodi elixis, piscibus saxatilibus, quibus vniuersis, præter eas, quæ in aquis versantur: carnibus gallinae, hædi, luteis oui, & similibus concoctu facilibus, & sanguinem bonum procreantibus. Bibendum vinum tenue, album, nec valde anti-
- C rint, vena incidenda in gibbero media. Mox purgatione utendum, per initia quidem ex simplicioribus petita, cuiusmodi est epithymum pondo vnciarum quatuor in sero lactis mulsæ exhibitum. Deinde vero compositorum aliquo, quæ in capite de melancholia recentuimus. Purgantia vero medicamenta tertio quoque die offerenda sunt, ut scilicet melancholicus humor, qui in venis collectus est, & cancro generationem dedit, sic sensim, atque ex intervallo vacuetur, quando quidem vniuersum simul vacuare vix datur. Utendum etiam ante purgationem, in iis potissimum qui a crebra potionum sumptione non abhorrent, decocto præparare, quod in eodem loco commemorauimus. Si hæmorrhoides in viris, quibus emanare consueverunt, suppressæ sunt, recludantur. In mulieribus autem menses euocare oportet. Post hæc humorem, qui in partem decubuit
- D repellere vel discutere: adhuc particulam ne quid humorum redundantem ad eam confluat, firmare oportet. In hunc autem usum conuenientissimus est succus solani, linteo duplici in eo tincto positus. Extrinsecus lana molliuscula & ipsa succo illo imbuta circumdatur, cura adhibita, ne hæc siccelcat, succo continenter superinfuso. Quod si noluerit ægotans medicamento adeo humido illiniri, cum præsertim domum exit ad consueta negotia peragenda, hoc unguento erit utendum, quod habet: *Olei rosacei, vnc. vias duas. Succus fructu solani hortensis expressi, vnciam unam & dimidiam. Cerussæ lotæ, plumbi vsti & loti, vtriusque scrupulos duos. Litargyri, drachmam dimidiam. Thuris drachmam unam. Pompholygis, drachmam dimidiam. Cera alba, quantum satis, frangat unguentum, quo locus laborans quotidie illinatur*. Licebit interdum adicere lemnium sigillum, & bolum armenium, & succum semperuiui, vel vix acerbum, in plumbeo mortario, cum plumbeo pistillo usque ad glutinis consistentiam subacta. Porro quantum valeat plumbi facultas, præsertim combusti & eloti, in omnibus cancris affectibus, satis nouerunt, qui de hac re aliquando periculum fecerunt, & qui attente quæ Gal. de plumbo in lib. 9. de simpl. scribit, legerunt. Nec parum prodest cancri vsti cinis cum cadmia lora inspersus, vel in cerato illitus. Panis etiam cum symphyto apponendus, ita quantitate moderando, ne aggrauet. Folia quoque altheæ elixa per se, aut cum pane commixta, illinenda. Item rosæ, melilotum, papaueris semen cum passo trita, & paululum decocta, ac subinde cum luteis ouorum subacta applicanda. Porro assidue etiam hoc vitio correptis danda sunt medicamenta, quæ venenatis aduersantur, ut est theriaca, & antidotum mithridaticum. Viceratis cancris, ut
- F obiter hic moneamus, quum lib. 7. curam hanc copiose sumus tractaturi, quia constet illos medicamentis & manuum tractatione exacui & irritari, ideo placidissima medicamenta sunt imponenda, quale est hoc unguentum, quod habet: *Olei rosacei, vnc. tres. Adipis porcini, z. j. Litargyri, vnc. dimidiam. Vitellos oui assos quinque numero. Cera alba quod satis, fiat unguentum*. Quod si vlcus dolore vacauerit, adicito etiam iridis, myrrhæ, aristolochiæ;

Victus ratio. Curatio.

Venæ sectio.

Purgatio.

Localia.

Vnguentum.

Cancer vici. Cerati curatio.

Vnguentum.

232 Operum Leonhardi Fuchsi Pars III.

Cancer
per chirur-
giam ab-
latio.

singul. drach. vnam. Hoc itaque vnguento cancer illinendus. Cōmendatur etiam suc- A
cus solani & plantaginis, admixto puluere auripigmenti, si iis locus laborans illinatur,
& linteum in iis madefactum superponatur. Ceterum si quando cancerum per chirur-
giam curare audebis, cōpisse quidem a vacuando per purgationem melancholico hu-
more oportebit. Vbi vero totum quod vitiatum est, prorsus excideris, sic vt nulla super-
sit radix, si nes effluere sanguinem: nec propere eum inhibebis: imo premendo potius
vicinas carnes: exprimes ex his crassiores sanguinem: mox aliis vlceribus similiter
curabis.

De Elephantia. CAP. XIX.

Elephan-
tiasis a le-
pra Arabū
nihil dif-
ferre.
Satyriasis.
Elephan-
ti ci cur. ad
Venerem
elaeriores.
Leontia-
sis.

Causa.

Signa.

Vitus
ratio.

Balaneum.

Elephantiasis, *ἡ ἐλεφαντίασις* vniuersi corporis cancer est. Sic vocatum vitium hoc, quod corio B
elephantis, cutis in eo persimilis videatur. Nam maculis quibusdam ad atrum colo-
rem vergentibus inficitur, inæqualiterque aspera, crassa, & veluti squamis fœda, liuens,
ferinaque redditur. Vnde satis liquet, elephantiasim a lepra Arabū nihil differre, *vt de-*
monstrauimus lib. 2. Parad. c. 16. Dicitur etiam *Satyriasis*, *Gal. lib. de causis morb. c. 5. teste*, quod
facie, qui sic laborant, satyris similes sunt, *vt inf. dicemus.* Quin & alacritas vehemens ad
coitum ipsis adest, quemadmodum de satyris fertur, & scilicet semine abundant: largior
si quidem ipsius generatio in seminariis vasis ob materiæ crassitiem accidit. Vocatur et-
iam *Leontiasis*, quod frons ægrotum cum quodam tumore laxior reddatur, ad similitu-
dinem pellis flexilis superciliorum leonis. Est autem graue vitium, & prope ex eorum
numero, quæ incurabilia existunt. Et graue quidem est ipsi ægro, intolerabile autem
conspicietibus, utpote qui ipsum omnino auersantur, adeo vt pleriq; ex ægri necessa- C
riis & domesticis, ipsius conuersionem deuitent. Et sane malum est cum eis conuer-
sari, inquinatur enim aer, quem inspirando attrahimus, ex vlcerū fœtore, & ex vitia-
spiritus exhalatione. Origo vitii est ex atra bile, quæ ex crasso & fœculento sanguine, aut
flaua bile nimium vsta procreatur, aut pituita falsa. Quare hoc ipso magis corripuntur,
qui ex praua victus ratione crassum & viscosum ac melancholicum sanguinem aceruat.
Consequitur eos, qui obnoxii futuri sunt huic vitio, segnities, spiratio tarda, spirandi
difficultas, motus difficilis, assidua constrictio alui, vinarum, veluti sunt iumentorum
lotia, excretio, respiratio grauis & fœtida, ructus continui, qui etiam ipsis ægris aliquid
molestiæ addunt, appetitus non obtusi, impetus in Venerem intensus. Iam vero vbi ad
cutem progressum fuerit vitium, primum malæ crassiores fiunt, & mentum dilatatur, D
deinde rubescunt, non florido, sed liuido colore. Capilli etiam capitis magna ex parte
rari fiunt, pilique superciliorum decidunt. Nasus fit simus, aures erosæ, labra crassa, vox
rauca, & sub lingua venulæ varicosæ fiunt, nigrescuntque, quod signum est, etiam visce-
ra ipsa in simili constitutione esse, eiusmodi plane qualis in porcis quibusdam circa in-
terna videtur, quæ grandinis nomine insignitur. Quandoque vero & per omne corpus
eminentiæ apparent, & præsertim iuxta summam frontem ac mentum. Corpus præterea
ipsum magnum esse videtur, & cuiusdam intolerabilis grauitatis eis sensus adest. Pu-
sillanimes fiunt ad omnia. Quidam porro ex eis admodum eorum qui strangulan-
tur, maxime circa somnos, afficiuntur. Quamquam vero vitium hoc fere incurabile sit,
tamen humanum est, *vt ait Aetius*, & plenū beneuolentiæ signum, in extremis etiam E
malis vsq; ad experimentum procedere, ad difficultatem eorū compescendam. Princi-
pio itaque victus ratio eiusmodi præscribenda. A somno membra eorum plurimum &
leniter manibus contrectari debet. Deinde curandum, vt alius excrementa deponat.
Post hæc deambulent, aut gestationibus committantur, & clamore exerceantur, aut
frictionibus aliisue generibus exercitationum vtantur. Sudore subinde, quem illinc
contraxerunt, absterfo, adipe vrsino, aut vulpino illinantur: qui si non adsint, caprino
aut taurino, aut pro iis aliquis ex volucrum genere, aut butyrū recens fumatur. Pauxil-
lo temporis interposito, cum scenogræci aut ptisanæ succo, qui parū ammoniaci cum
aceto liquefacti ammixtum habeat, perfundantur, atque ita lauacro vtantur. Nocuum
enim est vitio, si quis non lauet. Commoda sunt etiam arida fomenta, & post sufficien- F
tem ex dictorū vsu exsudationem, natationes in mari, aut sulphurentis & aluminosis
aquis. Fomenta vero parabuntur ex fumaria, origano, scabiosa, oxylapatho, chameme-
lo, meliloto, mentastro, & similibus. A balneo detergi, ad acrimoniæ & mordacitatis
curationem ex oleo myrteo, rosaceo, aut mastichino cum aceto & vicino conuassatis
illinan-

- A** illinantur. Aut decocto aliquo eorum quæ adstringunt, plantaginis scilicet, aut betæ, aut helxines, perfundantur. Optimum est & butyrum recens illitum. Post lotionem & extersionem per tenera lintheola, ad horæ dimidium quiescant: deinde aqua tepida hausta sponte vomant, digitis in os, aut pinnis demissis. Postea modico interuallo temporis interposito, vinum absinthites, aut ex origano confectum bibant, non infra hemina mensuram, & paulo post cibus eis apponatur. Cibus autem erit panis hordeaceus, aut triticeus recens. Inter olera, *beta, lactuca, malua, lapathum, sisarum, porrum, brassica binis aquis edulcata, & capparis*. Recte etiam ipsis datur ptisana, oua sorbilia, alica lora, lac cum melle. Carnibus auicularum montanarum vtantur, & hœdorum, gallinarum, caporum, & iis similibus. Piscibus molli carne præditis. Ex fructibus conueniunt ficus & vuz arefactæ, pyrum coctum in aqua mulsæ. A reliquis fructibus omnino abstineant. Deuitent etiam legumina omnia, salita, & acria. Bis cibum capere præstat, quam semel se replere. Prandium simplicissime paretur: cœna magis varia sit. Potus sit vinum tenue, album & aquosum. Aut aqua in qua parum cinnamomi decoctum sit. Vino forti & vinoso, perinde atq; Venere, per totum morbi curriculum abstinent. Somnus porro diurnus nocius, nocturnus aptissimus. Post longum a cœna interstitium, deambulatio læta ac sensum facta, commoda est, vt cibi eo melius descendant. Quod ad curandi rationem attinet, protinus inter initia sanguis mitti debet, & magis vere, in quo potissimum hoc vitium nascitur, & intenditur. Reuiuiscit enim inde aliquo modo insitus calor, & sensus.
- B** liter corpus ipsum alleuatur. Auferendus autem particulatim ex vtroq; gibbero, ac incidenda interna aut media quæ in gibberis existit vena. Habendus etiam modus est in vacuando, in multo enim prauo ac vitiato sanguine parum quiddam boni sanguinis inest. Post sanguinis detractionem, nouem decemve diebus interpositis, alius interne subducatur. Quibus vero medicamentis purgandum sit corpus, in *capite De melancholia, & alijs quibusdam*, vbi de vitiis cutis egimus, dictum est. Post dies autem aliquot sero lactis vtendum, ex eoq; non minus tribus acetabulis, neq; vltra quinq; accipiendū, *Aetio & Paulo testibus*. Admiscendum est illi aliquid *scammonia, epithymi, vel sene*: ita vt hæc ipla cum modico sero ieiunis præbeamus, atq; deinde ipsum serum paulatim exhibeamus. Hac purgatione frequenter vtendum est. Omnino namq; conandum est, vt omnem corporis habitum ab hoc vitio occupatum liquefaciamus, aliumq; quendam veluti ex integro regeneremus. Id ipsum vero fiet, si per interualla oportune purgationes adhibeantur, & cibi apponantur, qui facile cōcoqui & distribui possint. Deinceps vomitus citetur a cibo, aut ieiunia a radiculis. Postea ad veratrum perueniendum. Post hæc autem virium refocillatrice victus ratione vtendum est, ac medicamentis quæ summam cutem desiccant, adstringantq;. Leues igitur cucurbitulæ ori ventriculi, & hypochondriis vtrinque affiguntur. Et primo quidem auxiliorū circuitu hoc modo perrecto, rursus ad principium reflectendum est. Et venæ quidem sectio videtur, vt quæ plus noxæ quam præsidii esset allatura, ab hiera vero principium purgandi sumatur: & reliqua deinceps ordine facienda, velut prædictum est, ter & quater in anno eodem ductu repetito. Malignum enim & difficulter recens vitium est, quapropter plurima cura opus est, ne in peius euadat. Quod vero vitium hoc hodie raro aut nūquam curatur, multæ sunt causæ, quarum hæc præcipua est, quod eo laborantes methodica & cōuenienti curandi ratione, nec ea quidem tempestiue vtantur. Siquidem medicorum operam non requirunt, nisi vbi vitium iam confirmatum fuerit, & vniuersam corporis substantiam occupauerit, ac omnem curationem respuit. Vt odio omnium digni sint nostri temporis Chymici, homines imperiti, nebulones, & impostores pessimi, quos Hippocratem, Galenum, & id genus alios methodi auctores carnifices vocare nihil pudet, quū tamen constet ipsos potius hoc nomine esse appellandos, vt qui suis mendaciis, imposturis, compilationibusque maximis totum mundum excarnificent, ac suis arcanis, non nisi a Satana mendaciorum patre, excogitatis illorumque animis instillatis, nō solum plebeiis, verum etiam magnatibus ac principibus impudenter fucū faciunt, ac fumos suos vendunt, digni vt hoc nomine, veluti fumi venditores, fumo necentur, vt alibi copiosius diximus. Ceterum theriaca ex viperis Andromachi mirifice prodest, & quasi compendium totius curationis est, si post purgationes per modica interualla præbeatur, & ea cutis etiam obliuenda. Mirabile quoq; elephantiaæ remedium viperarū esus existit, vt restatur Gale. li. 2.

Cibi.

Deambulatio.
Curatio.
Venæ sectio.

Purgatio.

Viperarū esus.

Viperarum
preparatio.

ad Glanc. cap. penult. Eas autem hoc modo apparatus edere oportet. Primū quidē capite amputato, & cauda vsq; ad digitos quatuor, & detracta pelle, & omnibus interaneis exemptis, corpus ipsarū aqua bis aut ter lotum, in olla instar anguillarum coquitur, aqua quidem sufficiente affusa, & oleo modico cū porro & anetho. Liquet autem, q; carnes sint decoquendæ, donec molles reddantur. Post sufficientem cocturam, iusculū moderato sale conditur, atq; ita ægro in sole desidenti exhibeatur, capite tamen probe velato. Neq; vero semel tantum aut bis viperas edere satis est, sed sæpe id fiat, quum extra periculum sit, & insuper commoditatem afferat. Sint autem vipera recens capta & ex humectioribus locis accipiantur. Nam quæ iuxta mare, aliaq; falsa loca degunt, vehementer siticulosæ existunt. Viperarum autem esus mirifice conferre elephantia corre-

Extrinfecus
quæ admo-
uenda.

ptis, multis historiis *lib. 11. De simpl. med. fac. c. 2.* Galenus comprobat. Porro extrinfecus, in balneo potissimum, medicamenta quæ extergunt & repurgant, sunt adhibenda. ut est *nitrum, sulphur vinum, pumex, testa sepie, nigella, rumex acutus*: quæ interdum arida affricari possunt. Aut trita cum aceto, aut rosaceo oleo, aut mastichino, corpori illinenda sunt. Profunt etiam ea medicamēta, quæ supra in capite *De impetigine* dicta sunt. Præterea tuberosi tumores efferati & inflammati in facie, illinantur cum succis plantaginis, polygoni, portulacæ, lycio, hypocisthidae, aloe, & similibus. Si autem non fuerint inflammati, utendum est iis remediis, quæ supra *De impetigine & scabie* dicta sunt.

De morbo gallico. C A P. XX.

Morb. gal-
licus quid.

MORBUM quem vulgus modo *Gallicum*, modo *Hispanicum*, modo *Neapolitanum* vocat, esse nouū omniq; æuo priore incognitū, alibi demonstraui. Detestandus sane morbus, ut quia a malignis quibusdam pustulis incipiens, pudenda plerumq; deinde reliquas corporis exteriores partes ingrediatur: doloresq; circa articulos & ossa, noctu præsertim, excitet, & abscessus duros, in pessima vlcera, quæ ossa quoq; plerumq; vitiāt, post longum tempus desinat. Fita causa externa, nempe ex contagio quod interdū e solis osculis, interdum vero e consuetudine fœdæ mulieris, aut vteri contrahitur. Fit etiam a plenitudine: & ab humoribus quatuor a sua naturali temperie, ad malignam conuersis. Cognoscitur hoc vitium, si primū circa pudenda pustulæ crustosæ, siccae, & lentæ interdum sanie stillantes exoriant. In fronte præterea, & circa radices capillorum in capite pustulæ, tumoresve diuersi coloris efflorescere incipiunt, modo citra vllum adhibitum medicamē exsiccata & decidētia, modo hinc inde repullulātia. Capitis præterea adest grauitas, cū colli & humerorum cruciatibus, qui tēporis progressu ad brachiorū, & crurum articulos descendunt, atq; de nocte magis, quam die affligunt. Adueniunt item cū doloribus tumores præter naturam in articulis, qui difficile discutiunt, ac tarde admodum suppurantur. Sæpius quoq; in nodos, & durities transeunt. In palato, & circa oris intimos angulos nigra & fœtidæ excitantur pustulæ. Fauces quoq; & lingua in hoc vitio non raro exulcerantur. Porro in curatione morbi Gallici spectandum initio erit, nū recens sit morbus, aut iam diu ægrotantes affligerit. Si enim recens fuerit, leuioribus sæpe tollitur remediis. Quod si itaq; vitium hoc non ita pridem se ostendit, medicus curet ut in aere mediocriter calido degat æger, nec permittat ut se ventis, præsertim borealibus, temere exponat. Quod si talem naturam habere haud potuerit, ut odoramentis, & suffumigiis conuenientibus eiusmodi efficiatur, curabit. Cibi omnes sint boni succi, faciliq; concoctionis: & vitentur omnia falsa, dura carnis, & quæ lentum, frigidum, ac crassum succum generant, quæq; flatulenta existūt. Præterea acri ad caput euaporātia, & supra modum calida, sanguinem inflammantia, & adurentia. Vino vratur pro potu albo ac tenui. Exercitium, somnusq; sint moderata. Coitum tamen, durante maxime curatione, fugiat æger. Nam præter alia multa, quæ intempestiue factus secum adfert incommoda, in hoc vitio articulorum dolores vehementer augeat. Perturbationes ani-

Curatio
morb. gal-
lici recens.

Vitæ ra-
tio.

Vena secatio.

Decoctum
preparans.

mi, ira scilicet, furor, tristitia, metus, sollicitudo, & id genus alia, deuitandæ sunt. Quod si corpus eius, qui hoc vitio recens laborare cœpit, plethoricum existit, modo ætas, anni tempus, & alia non impediunt, vena secanda erit in gibbero media. Si vero corpus nō fuerit plethoricum, sed potius cacochymū, prauaq; maxime pituita refertum, purgatione per alium vtendum, præmissa tamen conuenienti præparatione, hoc est, meatibus prius reſeratis, & humorib. crassis attenuatis. Vtendū itaq; aliquot diebus hoc decocto, quod

- A** quod habet: *Florum violarum, boraginis, buglossi, singul. manipul. dimidium. Fumaria, scabiosa, hemionitidis, vel in eius indigentia aspleno, quod vulgus Ceterachium nominat: Casubia, eupatorii, cichory, singul. manipulum unum. Folliculorum sena, drach. duas & dimidiam. Seminis anisi, feniculi, rusci, singul. drach. duas. Vuarum passarum, glycyrrhizæ repurgatæ, singulorum drachmam unam. Corticum myrobalanorum cepulorum, flauorum, singulorum, drachmam dimidiam. Prunorum numero quinque. Polypodij, drachmas sex. Thymi, epithymi, singulorum drachmam unam & dimidiam.* Coquantur in aqua iustæ quantitatis quoad dimidium eius ablumatur. Deinde colo transfundantur, & saccharis adiectione ius decocti dulce reddatur, albisq; oui purificetur, additis *oxymelitis simplicis, serapij & fumaria, singulorum uncias duab.* Fiatq; potio, de qua singulis diebus mane & vesperi dentur uncia quatuor & dimidia. Purgatio.
- B** Humoribus ad vacationem præparatis, & meatibus reueratis, purgatoriū aliquod propinetur medicamentum, quale est quod accipit: *Antidoti Indi. hamech, singulorum drachmas duas & dimidiam. Antidoti e sena solutiui, drach. unam & dimidiam. Decocti paulo ante descripti, uncias tres.* Cōmiscantur, & fiat potio purgatoria. Potest etiā horū catapotiorū esse vsus: *Pilularum & fumaria, e hermodactylis, aggregatiuarum, singulorum scrupulum unum. Agarici in pastillos redacti, scrupulū dimidiū. Dacrydij, grana duo.* Cum stillatio fumariæ liquore singantur catapotia numero quindecim. Dentur in aurora. Quod si multa est cacochymia, sæpius iam dicta reiterare medicamentum expedit. A purgatione corporis, scapulis, brachiis, natibus, & femoribus cucurbitulæ cum scarificatione sunt ad mouendæ. Cucurbitulæ.
- C** Tum etiam prodest adhibere *Engolusias*, hoc est, *balnea sicca*, quæ ad proliciendum sudorē, & reliquias vitiosorum humorum educendas sunt aptissima. Sæpius autem iis vtendum est, interuenientibus tamen certis dierum aliquot interuallis. Et quo die vsurus est balneo æger, eo hanc potionem mane præsumat, quæ habet: *Radicum apij palustris, petroselinæ vulgaris, feniculi, singulorum uncia una. Seminis rusci, asparagi, lebistici vulgaris, singulorum drachmas tres. Mentastri, calamenti, abrotani, singulorum manipulum unum & dimidium.* Coquantur in duabus aquæ fontanæ libris vsq; ad tertias. Dein colo transmittantur, & saccharo sufficiente ius dulce reddatur, & purificetur albis ouorum. Iuri decocti addatur: *Serapij acidi simplicis, oxymelitis compositi, singulorum uncias duas.* Fiat potio, de qua mane dentur, *unc. quatuor.* Hac ceteratione morbus Gallicus, qui nuper cœpit, sanari facilius me poterit. Quod si vero is morbus iam longo tēpore corpus infestauit, ad ligni vsum, Balneum siccum.
- D** quod Barbaragens, quæ nobis illud transmittit, vernacula lingua *Guaiacum* appellat, cōfugiendum erit. In cuius certe vsu, principio curandum, vt optimum deligatur. Ex eo autem optimum censetur, quod recens satis, neque admodum vetus & cariosum existit. Tale autem est, quod igni impositum ob resinaceos fauos, quibus interius nigrū meditullium discriminatur, citius accenditur, & flammam agit. Laudatur item, quod buxæ colore est, sed nigrescens. Item quod in gustu præter adstringentem saporem, etiam leniter linguam erosionem mordicat. Præparatur autem hunc in modum. Lima, vel torno, aut alio instrumento in frusta quantum licet tenuissima comminuitur, aut in scobem redigitur. Dein desculpta frusta, aut elimatam scobē in aqua fontana selectissima & pura decoquere oportet, in vase vitreato. Singulis autem libris pulueris ligni, vel in scobem redacti triplum aquæ adicere conuenit, in qua diem & noctem maceratur, dein ad prunas vel lentum ignem horis amplius sex, aut ad tertias, vel paulo plus, iuxta morbi indigentiam, magna cura & attenta custodia decoquitur. Aliqui plus, vel minus aquæ addūt. Semper autē inter coquendum glutinosa & lenta spuma detrahenda, quæ vlceribus, & pustulis ac tumoribus illinitur, aut affricatur, aut linimentis excepta imponitur. Sic decoctum ubi percolatum fuerit, in ampullam vitream defunditur, & medicata vocat aqua: Germanice, *das starck wasser.* Quod ex prima ligni bullitione post colo expressum decoctū relinquitur, cum tripla portione claræ aquæ rursus lento igne bullitur, donec quarta aquæ pars consumata fuerit. Hoc tenue decoctū Germanice, *das flein oder gering wasser* nominat, quo loco vini in prædio & cœna vtendū. Purgato itaq; prius ægrotante modo paulo supra dicto, sequenti die mane in aurora sumendum decoctū primum medicatum pondere uncia quatuor, aut alia quātitate cōuenienti, spacio a præcedente cœna septē aut octo horarum, bibendumq; calidum. Dein stragulis & vestibus bene contextus, in lecto se per tres horas cōtineat, & sudet, si fieri potest, æger. Postea surgēs, & excrementis vndiq; probe expurgatis, leuiter & pedetērim in cubiculo obam-
- Potio mirifice conueniens pustularum eruptioni.
- Morb. gallicus inueteratus quomodo curandus. Ligni Guaiaci vsus docetur. Optimum Guaiacum quod? Preparatio Guaiaci.
- Spine vsus.
- Medicata aqua.
- Decoctum tenue.
- Vtus medicari decocti.

bulet, fenestris & rimulis, hyeme præsertim, vndiquaque bene obturatis & occlusis, ne a vëto, vel frigore meatus corporis obstruant. A potu decocti assumpto, sex horis prandium tenue appareat, in quo præter panis vncias quatuor, aut quinque, aut summum sex, & pullum gallinaceum elixum in aqua, nihil conceditur. Panis autem sit bene fermentatus & coctus, modiceque salitus. Potus sit decoctum tenue, & secundum. A prandio leniter in cubiculo aut hypocausto obambulet, vel in sella sedens se contineat, cum amicis & familiaribus iucundos & hilares miscendo sermones, instrumentis musicis & dulcibus sonis sese oblectet, fabulas, & alia ludicra ac iocularia legat. Aut alex, alterive ludo iucundo operam det, caueatque sibi a somno diurno. Quod si propter dolores nocturnos, aliasque causas insomnes accedant noctes, in die parum dormiat, sed non statim ab assumpto cibo. Nam is somnus qui cibum statim excipit, fumosis exhalationibus caput replet, destillationesque parit. Septem horis a prandio peractis cœnet æger. In qua non plus quam in prandio sumendum: imo si caput defluxionibus obnoxium habet æger, cœna multo leuior & minor sit prandio. Duabus a cœna horis, modo & ordine quo supra eadem decocti medicamenti mensuram assumat ægrotus calidam, & post leuam in cubiculo ambulationem lecto se ad dormiendum componat æger. Idque per sequentes triginta vel quadraginta dies, iuxta assidentis Medici consilium, faciendum. Prædicta tamen omnia poterunt vel augeri, vel minui, prout vires ægroti, & morbi ratio postulabunt. Hinc aliqui præter panem, pruna Damascena, uvas passas, amygdalas, pistacia saccharo operata nihil exhibent ægrotanti. Sed peritus Medicus facile quid hac in parte faciendum sit cognoscet, utpote cui perspectum est, unam atque eandem victus rationem omnibus non competere. Sustinent a magis inedia pituitosa temperatura, & humida, minus omnium biliosa & sicca. In victus vero ratione consuetudo, ætas, regioque maxime consideranda veniunt. Quapropter Germani nostri, & alii homines ad septentrionem inclinantes, propter ambientem aerem paulo quam in aliis calidis regionibus frigidiores, quam vehementius appetant, & melius concoquant, pluri & copiosius etiam alimento indigent. Liberalius igitur in usu etiam Guaiaci cibandi sunt, non tantum regionis, sed & consuetudinis nomine. Minus enim etiam per sanitatem, quam ceteri populi, Germani temperantes sunt. Quod quum parum hactenus a multis medicis, præsertim vero ab indoctis Empiricis, unam atque eandem victus rationem omnibus corporibus præscribentibus, animaduersum sit, nihil mirum, plerisque ex tenui & exquisito illo victu, & vehementioribus per Guaiaci decoctum transpirationibus ac vacationibus, accedentibus vigiliis, & immensis doloribus, virtutem mirifice prostermentibus, in hecticis febres, & marasimum deductos esse. Suspecta itaque esse debet Germanis nostris tenuior ille & exquisitior victus, præsertim ubi biliosus ac melancholicus sit sanguis, qui humectantibus cibis ad temperamentum reducendus erit. Sed hac de re in præsentia satis est dictum. Nam exstant hodie aliorum de morbi Gallici curatione, & quidem multorum libri, qui eandem copiosissime tractant, ut nihil attineat me esse longiorem. Ceterum sunt ut hoc obiter dicam qui hodie in curatione huius morbi non solum ligno Guaiaco, verum etiam radice Chinæ, & salsa parilla non infelicitè utuntur. Eorum tamen sententiam, qui inunctiones, ex argento viuo, & id genus aliis confectas usurpant, probare non possum. Nam etsi vitium hoc tollunt, tamen ita corporis vires perturbant, ut non ita multo post in longe deteriores morbos labantur, ut alibi plenius monstrauimus.

INSTRUMENTA TELIS ATQUE INFIXIS ALIIS rebus extrahendis idonea, & necessaria.



Quum ea quæ in sequentibus libris, proximo præsertim capite tradent, nisi aliquot instrumentorum cognitionem habeamus, intelligi nequeant, operæ pretium me facturum iudicavi, si aliqua saltem quibus res extraneæ nostris corporibus infixæ extrahunt, hoc loco percererem. Quum n. multa ac varia admodum sint, tamen sat erit horum nos in præsentia septem, quæ apud Chirurgos sunt versatiora, magisque communia, genera connumerasse. Quorum utique:

Forceps denticulata.

Primum est forceps, seu ut vulgo loquunt, tenacula denticulata, instar limæ capita habens. Atque huius tria quidem sunt genera, ut ex formulis, quas paulo post subiiciemus, patebit. Harum omnium usus ad spinas, aspera & pungentia officula, aculeos quoque, & mucrones infixos, aliaque id genus acuta euellenda, idoneus ac utilis est.

Secundum

- A** *Secundum*, est forcipis genus denticulate, quod in modū rostri avis est confectum. *Rostrum coruinum.*
Hinc nonnullis Rostrum coruinum appellatur. Aliis vero, rostrum serpentium.
- Tertium*, est forceps in modum cannæ siue arundinis, aut scriptorii calami concaua, quam vulgo tenaculam cannulatam nominant, ad globos educēdos, & sagittas spiculis e intras, quas vulgares chirurgi barbatulas vocant, extrahendas accommoda. *Forceps concava.*
- Quartum*, est terebellum inuersum, quod ad extrahendum ferrum infixum, tubulum seu cauum arundine seu hastili vecuum habens, est idoneum. Quippe in ferri infixi tubulum immisum, ferrum apprehendens, leuiter id ipsum, ferro sequaci, educit. *Terebellū inuersum.*
- Quintum*, est terebra in longū porrecta, directā nuncupata, dilatādis ac ampliandis ossibus, quibus tela firmiter inhærent, apprime idonea. *Terebra directā.*
- B** *Sextum*, est excisorius culter, ad amplificanda in carne accepta vulnera, quo facilius infixa eximantur, vtilis. *Excisorius culter.*
- Septimum*, est propulsorium nominatū instrumentum, quod certe geminum est. Vnum solidum, siue sardum, quod propulsorium mas appellatur. Alterum cauum, quod propulsorium foemina dicitur. His duobus tela protrudimus, donec ab altera parte apprehendi, & extrahi possint. *Propulsorium. Mas. Foemina.*

FORMVLÆ INSTRVMENTORVM, QVARVM MENTIO


ne fecimus modo, quæ telis extrahendis idonea sunt, ex Tagaultio delumi possunt.

Adiiciam aliqua alia neotericis vsitata Gallis.

Qua arte fracta in vulnere sagitta sint extrahenda.


- Q**uod si forte telum fractum in vulnere sic relictum fuerit, vt forcipibus commorādis comprehendere nequeat, eliciendum, extrahendumque tum venit rostro gruino vel coruino, & aliis mox depingēdis idoneis instrumentis. Quā si hastile se iuxta ferrum abruperit, adeo vt gruino nostro prehendi sui antiam non præbeat, terebello glandium illic in sclopetorum vulneribus depicto defigēdum & abducendum veniet, nam si eiusmodi terebello defigendi se in plumbum vis inest, multo & in lignum magis. At si ferrum multis sulcis fuerit cuspidatum, cuiusmodi fere esse solet, Anglicanis sagittis, tum si fieri potest, instrumento ad id apto, vltra partem impellendum est: nempe qua tendebat. Nam si qua venit retrahatur, periculum non leue imminet ruptionis laniatusque vasorum & neruorum ab ipsis tanquam hamatis sulcis. Quare satius est e regione, qua nempe tendebat ferrum, sectionem moliri, hacque ipsi exitum, si quidem compedio id fiat, aperire. Sic enim & tutius & facilius detergetur vulnus & consolidabitur. Contra vero si qua tendit ferrum os aliquod oppositum habeat, vel multorum muscutorum & dentæ carnis obicem, vt contingit in femore, crure, & brachiis nonnunquam, tum non qua tendit compellendum ferrum est, sed potius qua venit dilatato instrumentis idoneis, vulnere, neruis & maioribus vasis ex anatomes peritia vitatis, retrahendum & foras reuocandum est. In eam igitur rem dilatatorium cauum in vulnus immittatur. Hoc ferri gemini sulci, & tanquam hami comprehendantur. Hinc rostro gruino stringatur ferrum arctius, sicque demum vna & eadem opera illa omnia extrahantur, vt sequenti deformatione indicatur.

Dilatatorium parte interna cauum, cum rostro gruino hamatum ferrum tenente.



238 Operum Leonhardi Fuchsi Pars IV.

Instrumentorum extrahendis sagittarum & telorum ferramentis, quæ in vulnere, hastili vacua relicta sunt idoneorum, deformatio.





Hoc cochlea, qua in cannulam eius inditur, opera diducitur.

Hoc compresso manubrio dinaricatur.

Forcipes cochleati cum rostro cornino. Illi quidem cochlea opera diduci & contrahi solent, ad sagittarum telorumq. ferramenta abducenda, hoc vero loricarum orbiculi nexiles in corpus una cum telo impressi & relicti eximuntur.

Vncus extrahendis loricarum orbiculis nexilibus, & aliis peregrinis corporibus, quæ tanquam fibula & vncu lubnesti, stringi & comprehendi poterunt extrahendis idoneus: cuius etiam in vulneribus sclopeto illis vsus esse poterit.



Quod si forte seu sagittæ seu lanceæ, seu cuiusvis alterius teli sulcatum multipliciter ferrum in parte aliqua corporis, vt femore aut crure relictum hæserit, cum hastilis portione frustulatim seu assulatim abrupta, tum oportebit Chirurgum excisoriis forcipibus hastile supra frustra comprehendendum excindere, moxquæ fornicibus dentatis ferrum extrahere, vt ex præsentis figura pater.

LEONHARTI FUCHSII DE MEDENDIS VULNERIBVS, LIBER SEXTVS.

De vulneribus in vniuersum CAP. I.



Vlnus, quod Græcis *τραύμα* dicitur, *Galenolib. 3. Ther. method. capite 1. teste*, est *vuln^a quid.*

solutio continuitatis ex vulnerādo in carnosa parte relicta. Auicennæ interpres, & recentiores fere omnes, *plagam* appellant. Huius quidem causæ *Plaga.* censentur, quæcunq; extrinsecus aduenientia vulnerare, perforare, inci- *Causæ;*

dere, abrumperere, ac contundere valent. Vulnerant autem, perforant, ac incidunt, quæcunq; acuta sunt, & morsum inferre possunt: vt est gladius, & animalia pungentia, aut mordentia. Abrumpunt, quæ violenter distendunt: contundunt autem, grauia. Notæ *Signa;*

vulnerum non aliunde petendæ sunt, quam ex iudicio sensus, sed visus maxime. Porro *Curatio*

nedum vulneris, sed omnium solutionum continuitatis, *Galenocapite 90. Artis medica*

attestante, communis curandi indicatio, est vnio. Hæc autem prima & generalis indicatio a duobus perficitur, nempe a natura, tanquam a præcipuo agente, & causa effe-

ctrice, adiuta suis viribus & conuenientialimento: & a medico tanquam ipsius naturæ ministro. Vt autem Medicus propositum sibi curationis finem, nempe vnitionem, tan-

dem assequatur, quinque sunt necessaria. Primo, vt quæ extrinsecus incidunt, atque ne

vulneris labra coire possint impediunt, amoueantur. Verbi gratia, si ossis aliqua parti-

cula pungens & aspera, aut telum aliquod, aut sagitta, vel mucro, vel spina, vel harundo

sit quæ intercidit, adeoq; vulneris labra coire haud patiat, vbi satis diducta fuerint la-

bra vulneris digitis, aut vulsella, vel forcipe, aut alio id genus instrumento, prout res ex-

postulat, apprehensa, leuiter & citra dolorem euelli debet. Ceterum extrahendorum

telorum, quæ infixæ corporibus intus hærent, duplex est modus: vnus quidem per attra-

ctionem, alter vero per protrusionem, seu impulsionem. Attractio fit ab ea parte maxi-

me, qua venit telum, sed interdum etiam ab ea in quam tetendit. Protrusio autem, fit

in partem oppositam ei, cui infixum est. Horum autem modorum indicationes delu-

mendæ sunt tum ab ipsistelorum generibus, tum ex illis sedibus, in quas illa penetraue-

runt. Proinde tela quæ iaciuntur ac vibrantur, magna ex parte vel oblonga, & angusta,

cuiusmodi sunt sagittæ: vel lata, vel rotunda, vt plumbea glans: aut angulosa, nempe tri-

angula: aut trifurca, hoc est, tribus ex partibus acie prædita: aut spiculis cincta, quæ vulgo

barbulata appellant: nonnulla spiculis carent. Quod si itaq; telum oblongum est & an-

gustum, cuiusmodi, vt diximus, sagitta est, & facile corpori infigitur, & altissime insidit.

Sæpius igit alia parte, q̃ qua venit, hoc est, antrorsum, sagitta educenda est: præsertim

vbi spiculis cingitur, quæ magis laniant si retro, quam si contra trahant. Sed inde aperta

via, caro diduci debet, ferramento ad similitudinem facto Græcæ literæ \perp . Item si ex al-

lia parte vulnus aperit, laxius esse debet, quam vt telo postea transeunte amplifietur.

Deinde vbi apparuerit, si mucroni arundo inhæret, propellenda est sagitta, donec ex

altera parte apprehendi, & extrahi possit. Si iam illa, arundo in quam seu hastile decidit,

solumq; intus ferrum est, mucro vel digitis apprehendi, vel forcipe, atq; ita educi debet.

Neq; alia ratio extrahendi est, vbi ab ea parte qua venit, hoc est, retro, euellere tibi con-

silium est. Nā nouacula, aut scalpello ampliato vulnere, quo facilius ea sequatur, quoq;

minor phlegmone oriatur: q̃ maior quidē sit, si ab illa ipsa sagitta dum redit, corpus la-

niatur: aut arundo si inest, euellenda est: aut si ea non est, ferrum ipsum. Porro eximetur

ferrum vel terebra inuersa, in tubulum immissa: vel forcipe, qua dentes atq; eorū radices

euelluntur: vel ferramento, quoda telo extrahendo *βέλωνος* Græci vocant, aut alio quo-

piam instrumento ad id accommodo. Nonnunquam etiam carnes prius incidentes, si

vulnus instrumentum haud recipit. Quod si spicula apparuerunt, eaq; breuia & tenuia

sunt, forcipe ibi comminui debent, vacuumque ab his telum educi. Aut si ea maiora va-

lentioraq; sunt, fixis scriptoriis calamis, vt libro septimo capite 5. *Celsus* consulit, contegenda

sunt, ac ne quid lacerent, sic euellenda. Alii spicula ipsa forcipibus seu tenaculis, vt vo-

cant, cannulatis apprehendunt, atq; ita telum eximūt. Quod si telū spiculis utroq; ver-

sum spectantib. cinctum in neutra partem sequat, iuxta ipsum alia incisione patefacien-

das locus est, nisi vena, aut tale aliquid impediatur. Nā summa cura cauendum, ne neruus,

vuln^a quid.

Plaga.

Causæ;

Signa;

Curatio

Quæ extrin-

secus vulne-

ribus inci-

dunt, vtra-

mouenda.

Primum in

curatione

vicerū ne-

cessarium.

Tela e cor-

pore vt ex-

trahenda.

Attractio:

Protrusio.

Telorum

differētia

Telum ob-

longum &

angustum

vt extrahē-

dum.

βέλωνος

vena maior, aut arteria incidatur. Quod si horum aliquid detectum fuerit, excipendum hamo retuso est, abducendumque scalpello. Vbi autem satis incisum est, ferrum vndique explicatum modeste, ac sine ulla vulsione tollendum est. Quidam etiam spicula eiusmodi fixis calamis, seu exiguis arundinibus, prius contegunt, ne quid laceret: deinde ita euellunt, ea scilicet parte, quæ educationi magis congruere videbitur. Latum vero telum si conditum est, ab altera parte educi non expedit, ne ingenti vulnere, ipsi quoque ingens vulnus adiiciamus. Euellendum ergo est genere quodam ferramenti, quod Dioclis *βέλυσκος* Græci vocant, quoniam auctorem Dioclem habet, quem inter priscos maximosque Medicos fuisse memoriam proditum est. *Tertium* quoddam telorum genus est rotundum, aut angulosum, ut plumbea glans, lapis, aut simile aliquid, quod ex funda, aut bellicis tormentis mittitur, & perrupta cute integrum in corpus desigitur, ac intus insedit. Tela autem huiusmodi intus condita esse, his notis deprehendes. Moles aspera, atque inæqualis, si contrectetur, tubesse sentitur. Plaga seu diuisio non omnino in rectum tendit, sed & maior etiam ac amplior apparet. Caro item contusa liuida; cernitur. Dolor præterea cum grauitate quadam infestat. In omnibus iis latius vulnus aperiendum, idque quod inest, ea qua venit, aut vncis, aduersave scalpelli parte, aut vulneratio specillo recipendum est: aut denticulata forcipe, si fieri potest, & eam vulnus admiserit, extrahendum. Quod si telum infixum sic intus later, ut nullo modo reperiri queat, aut non satis commode extrahi, tantisper dimittendum est, donec natura ipsum protrudat, aut manifestet. Aut si telum aliquod infixum primis conatibus commode ac salubriter euelli non possit, sic eousque admittere debes, donec circumposita caro emarcescat, putrescatque. Deinde intermissum opus aggredere, telum ipsum quod infixum est, modo huc, modo illuc agitando, ac manibus vel forcipibus leuiter ipsum contorquendo. Ita enim leuius multo ac facilius telum extrahes. Interdum vero tela infixæ integra intus cicatrice obducto vulnere, citra aliquam noxam diu delituerunt. Post longiore temporis spacio, partem eam abscessu occupante ac disrupto exsiliere: quo facto vulnera statim ad sanitatem perducta sunt, ea illis curatione adhibita, quæ illis deberetur vulneribus, quamque iam edocebimus. Atque hæc de indicatione ea diximus, quæ a telorum sumitur differentiis. Nunc eam, quæ a laborantibus petitur sedibus, persequemur. Sedes autem in quas tela penetrarunt, vel caro sunt, vel ossa, vel articulus. Atque in iis quidem partibus, vel alte telum insedit, vel in summo duntaxat hæret, vel saltem non admodum alte, & citra medium infixum est. Adhuc vel membrum vnum duntaxat telo ictum est, vel particulæ plures simul confixæ sunt, ita ut particula vnate-
lo traiecta, alteri affigatur. Quocirca si in summa carne telum impactum est, aut certe magnas venas, & loca neruola non transit, nihil melius est, quam qua venit id euellere. Similiter etiam quod alte infixum est, obiectæ vero partes, id est, quæ ex aduerso respondent, si conuulnerentur, vel ex sanguinis profusione, vel ex aliorum membrorum consensu, & consortii lege periculum inuehant, euulsione qua parte infixum est, eximi debet. Illud autem digitis, vel ipsius teli arundine, seu hastili, quod plerumque ligneum est, inferri tubulum immisso, extrahendum. In quibus vero alte telum in carne infixum est, & plus est, hoc est, longius spatium, per quod telo reuertendum, quam quod per-
rumpendum est, iamque venas neruosque id pertransiit: breuiter, cum parum admodum integræ carnis ex aduersa parte superest, neque aliquid obstat, quo minus contra mucronem incisio commode fieri possit, melius est aperire quod superest, eoque propulsatu telum educere. Nam & propius petitur, & tutius euellitur, & in maiori membro, si medium mucro transit, facilius sanescit quod peruium est, quia vtrinque medicamentum fouetur. Protrudi autem debet vel hastili ipso, si inhæreat: vel si exciderit, propulsorio instrumento, cauo quidem vel solido, quod surdum quidam vocant, prout res exigit. Porro si telum acumen habeat: quod specillo deprehendimus, propulsorii instrumenti fœminam: si vero tubulum seu concauitatem habuerit, marem demitemus, atque ita
ferrum inserto instrumento protrudemus, quoad educi facillime possit. At si in opposita, seu vltius telum processerit, nec ea parte ipsum possit extrahi, qua infixum est, diuisis iis quæ opposita sunt, per illa ipsum eximemus, vel euellentes, ut dictum est: vel per eam partem inquam tetendit, ut modo diximus, propellentes: summa cura, ut paulo ante monuimus, semper habita, ne vel neruum, vel tendinem, vel maiorem venam, aut arteriam inci-

Latum telum
quomodo
educendū.
Dioclis
βέλυσκος.
Rotundum
telum ut
extrahendū.
S. gna.

Sedes labo-
rās in telo-
rum extra-
ctione ut
consideran-
da.
Si telum in
summa car-
ne hæret.

Si telum in
opposita
processerit.

Si telum ossi
inhæret.

- A** incidamus. Si telum ossi inhaerit, non nisi attrahendo ipsum eximere tutum est. Eo autem usque, Celso loco supra citato attestante, donec is locus laxetur, qui mucronem mordit, & tum vel manu, vel forcipe telum extrahendum est. Quae ratio in dentibus quoque eliciendis est: & vix vnquam ita telum non sequitur, sed si morabitur, excuti quoque ictum aliquo ferramento poterit. Quidam tenaculis, ut vocant, seu forcipibus alligant arcum, quem vulgo balistam nominant: & laborante bene stabilito, intensum ipsius instrumenti neruum seu chordam remittunt, & ita telum extrahunt. Quod si telum altius in osse defederit, quod cognoscimus, si firmiter id infixum nulla vi moueatur, aut labet: excisorio cultro, osse quod iuxta est, exempto, aut etiam terebra, si crassum sit, Si telum altius in osse demersum sit.
- B** sit, prius perforato, telum ipsum extrahemus. Sunt qui ab eo foramine, quod Celsus faciendum esse suadet, terebra facto ad speciem literae \downarrow contra telum os excidunt, sic ut lineae quae diducuntur, ad telum spectent. Quo quidem facto, id necesse est labet, & facile auferatur. Quod remedium vltimum est. Alii terebra in rectum ac longum porrecta, quae illis directa vocatur, ossis percussis rimas coniucentes, & telum infixum mordicus prehendentes, diducunt, atque ita facile quod infixum est, extrahunt. Inter duo a. ossa, si per ipsum articulum telum proruperit, circa vulnus duo membra, ita monente Celso, fasciis habenisve deliganda, & per has in diuersas partes diducenda sunt, ut tendones, ligamenta, & nervos distendant. Quibus extentis, laxius inter ossa spacium est, ut sine difficultate telum recipiatur. Sed illud quoque videndum est, sicut supra aliquoties Directa. Si telum in articulari se inter duo ossa demerserit.
- C** monuimus, ne quis neruus, aut vena, aut arteria a telo laedatur, dum extrahitur, eadem scilicet ratione quae supra posita est. At si plures particulae confixae fuerint, hoc est, si membrum aliquod telo traiectum, alteri affigatur, verbi causa, brachium thoraci, aut crura inter se, hoc modo faciendum est. Si non per totum vtrumque membrum penetret sagitta aut hasta, eam ab exteriori parte, perinde atque in vno fieri conlucuit, apprehensam extrahemus. Sin penitus ambae partes transfixae fuerint, dimidia ligni parte terra resecata, eas ligni partes quam facilimo fieri poterit modo, sigillatim euellemus. Porro si si venenato quoque telo vulnus factum est, iisdem omnibus, si fieri potest, etiam festinante actis, adicienda curatio est, quae velepoti veneno, vel a serpente, vel a quouis alio venenato animante ictis adhiberi solet. Ceterum quod ad chirurgiam attinet, totam carnem, quae veneno iam mutata est, si quidem fieri potest, praecidemus. Agnosces autem eam, quod a sana carne admodum diuersa sit. Pallida enim supra modum, subliuida, & veluti mortua apparet. Sin carnem totam a veneno immutata circumcidere non possis, haud alienum erit circa vulnus scalpello incidere, hoc est, scarificare, quo plus vitiatum sanguinis extrahatur. Deinde venenum ad mota vulnere cucurbitula, extrahendum est. Si cucurbitula non est, tum quodlibet simile vas, vitrum nimirum, aut tale aliquid, quod idem queat. Si ne id quidem est, quod tamen vix accidere potest, homo vilis aliquis adhibendus est, qui vulnus exsugat. Sed illud ante attendendum, ne is qui vulnus exiuxerit, aliquod in gingiuis, aut palato, aliaeue oris parte vlcus habeat: hoc namque pacto & ipse tutus erit, & tutum hominem vulneratum praestabit. Si quidem venena, Celso lib. 5. c. 27. Si plures particulae confixae fuerint.
- E** teste, non gustu, sed in vulnere nocet. Verum priusquam haec aggrediamur, telum ipsum, uti docuimus, eximendum erit. Atque hactenus, methodus de telis e corpore eximendis tradita est. Porro spinae, piscium ossicula, lapides, vitri fragmenta, surculi, ossium frustula, aliaque pungentia & acuta, denticulatis forcipibus sunt euellenda, aut medicamentis ad hoc paratis & vtilibus. Inter quae hoc praestantissimum & efficacissimum esse putatur, quod recipit: *Fermenti, mellis optimi, propolis, singulorum uncias tres. Visci quercini, vnciam vnā. Ammoniā, vnciam dimidiam. Olei, vnciam vnā cum dimidia.* Ex his omnibus conficiatur emplastrum, quod loco cui fixum intus inheret, superponatur. Radix etiam arundinis per se, Dioscoride attestante, concisa, aut cum melle contusa, & appolita, infixa sine dolore extrahit. Sunt & pleraque alia praeter iam dicta, quae vim habent cuspidis & Si venenato quis telo ictus est.
- F** surculos extrahendi, & infixa euellendi: cuiusmodi sunt *aristolochia, anagallis, dictamnus, sagapenum, oxyacantha, narcissus, rana combusta, simacum carnes, & id genus alia.* Atque haec de primo quod ad vulneris vitionem est maxime necessarium, dixisse satis sit: ad secundum ita nobis progrediendum erit. Secundum autem quod in curatione vulnerum necessarium est, ut dissidentes seu distantes partes coniungamus, id quod per orarum adductionem, Medicamenta ad infixa extrahenda accommodata. Emplastrum.
- seu labiorum vulneris inuicem distantium attractionem, & applicationem assequemur, Infixa extrahuntur a.
- Disiidentia coniunctio.

partem ipsam læsam quam fieri poterit lenissime tractando. Dissidentium namque conjunctionem seu agglutinationem, necessario præcedit orarum adductio. Quæ autem diducta sunt, in idem adducuntur, *Gal. lib. 3. The. method. cap. 4. teste*, aut vinculo ex duobus initiis circumdato, aut futura, aut fibulis, quas Græci *ὑπὸ φασίας* vocant, impositis, aut horum quibusdam, aut omnibus. Quod si vulnus, ut supposuimus, simplex sit, hoc est, solum continui in carne solutio, cum quo neque affectus ullus, neque symptoma ullum adsit, nec valde magnum sit, sola fascia orbiculatim circumdata, diductas partes committere oportet. Ita enim vulnus proculdubio coibit, & citra aliquam aliam extrinsecus adhibitam curam coalescet. Huius autem coitionis & coalescentiæ effectrix causa, sola natura est. At si magnum vulnus sit, adeo ut diductæ partes in totum, atque exacte prædicta deligatura committi nequeant, futuris ipsæ adducuntur. Deinde ubi sic deligaturæ, aut futuris adductæ fuerint, glutinatoriis præsiidiis utemur, quæ collectam humorum subluuii deficcare, & consumere queant: aliam vero ne influat, prohibere. Plaga vero ea sui potissimum debet, quæ in molli parte accepta est, maximeque si discussa auris ima est, *ut lib. 5. c. 26. Celsus ait*, vel imus nasus, vel frons, vel bucca, vel palpebra, vel labrum, vel circa guttur cutis, vel venter: vix enim iis partibus deligaturam vulnus admittit. Si vero in carne vulnus est, hiatque, neque in vnum oræ facile attrahuntur, futura quidem aliena est: imponendæ vero fibulæ sunt, quæ oras paulum tantum contrahunt, quo minus lata postea cicatrix sit: fere autem fibulæ latius esse patiuntur. Atque hætenus de secundo quoque chirurgus in curando vulnere simplici faciendum est, diximus. *Tertium* quod in curando prædicto vulnere medico proponitur, est, ut diductorum oræ ita ut in vnum per adductionem coactæ & commissæ sunt, conseruentur, & maneant. Conseruabuntur autem optime huiusmodi extrema, quæ in vnum coacta sunt, iisdem fere auxiliis, quibus & in idem adducta sunt, nempe, decenti ligatione, appposito membri situ, & futuris, si necessariæ videbuntur. Porro bifariam simul manent, & agglutinantur, *Gal. lib. 3. The. method. cap. 4. teste*, quæ commissa sunt: alia enim per se, alia ope aliorum subsistunt ac manent. Per se quidem, quæcunque secum concrescunt, ac coalescunt: aliorum ope, ut ea quæ colligantur, & glutino aliquo tenentur, ac quæ coalescant coalescantque, omnino mollia naturaliter sunt oportet. Talis sane est tum caro ipsa, tum quæcunque carnea ex ipsa constitutione sunt. Quæcunque vero dura siccaque sunt, eorum diuise partes coire simul nequeunt, alienum enim terminum nequaquam admittunt: sed glutinum aliquod vinculumve, quo commissa maneant, requirunt. Nunc quomodo vulnus ligari conueniat, primum docebimus. Deligaturæ autem modi seu differentiæ tres sunt. Vna dicta agglutinatoria, barbaris incarnatiua nominatur, recentibus tamen vulneribus fracturis accommodatur. Debet autem fascia in hoc genere deligaturæ a duobus initiis versus medium eiusdem circumuolui, & principium deligaturæ fieri ex parte aduersa loci vulnerati, ducendo atque iniiciendo alterum fasciæ principium versus partem superiorem membri, alterum versus inferiorem. Ea vero latitudine esse debet fascia ipsa, *Celsus lib. 5. cap. 26. attestante*, ut semel injecta, non vulnus tantum, sed usque ad aliquid vtrinque et oras eius comprehendat, quantum videbitur necessarium. Si ab altera parte caro magis recessit, ea melius attrahitur. Si æque ab utraque, transuersa comprehendere oras debet: aut si id vulneris ratio non patitur, media primum iniicienda est, & tum in vtramque partem ducatur. Ceterum arctior esse debet ligatura super locum læsum, quam in partibus adiacentibus. Cauendum tamen semper est, ne vel nimis arcta, vel nimis laxa sit. Quando quidem quæ laxior est, non continet: quod autem non continetur, elabatur. Ad vero quod vehementius est adstrictum, dolorem premendo excitat, & proinde fluxionem proritat, & phlegmonem accersit, quandoque etiam gangrænam. Danda igitur opera est, *ut Galenus lib. 6. Ther. method. cap. 5. ait*, ut vitato ambarum incommodo, vtriusque fruamur commodo. Id fiet, si quod nimium est declinabimus. Ergo nec adeo arctare deligaturam debebis, ut iam comprimatur: nec adeo remittere ut laxa sit. Porro extrema fasciæ acu assuenda sunt. Nam nodus, inquit loco citato Celsus, vulnus lædit nisi tamen longe est. Et si necessitas desideret, plures fasciæ iniiciantur, & modo qui supra dictus est, reuoluantur. Itaque hoc deligandi modo vulneris labra ad amissim committuntur: & quo minus circa vulnus exciteretur phlegmone, cuius rei in primis cura habenda, prohibetur. Hæc de prima ligaturæ differentia. Secunda deligaturæ differentia, expulsoria vocatur: ea antiquis vlcerebus & sinibus, quos cauernosa vlcera nominant, proprie dicata est, hoc enim

Vulnus simplex.

Commissorum conseruatio.

Bifariam coniuncta manere quæ committuntur.

Deligaturæ tres modi.
1. Agglutinatoria.

2. Expulsoria.

- A** enim commodi præstat in illis, quod a fundo ad os collectam humorum colluuiem extrudit: & ne quid amplius in locum laborantem confluat, valide prohibet. Hæc autem fit, fascia ab altero tatum principio reuoluta, incipitque ab inferiore parte membri laborantis, ubi arctior esse debet. Ab hinc ad superiorem partem facta circumuolutione, eam paulatim soluendo, dispensatur: si saltem os per quod sanies emanat, ad superiorem partem porrectum sit. Interdum enim inferius spectat. Per partem vero superiorem intellige eam, quæ versus cor, aut iecur, vasorum radice, spectat. Radicem autem vasis, *Galenoli. 5. The. method. cap. 3. teste*, priorem eius partem, quæ iecinori propior est, vel etiam cordi. Huiusmodi quidem deligatura adaptari solet partibus inæqualibus, id est, quæ non sunt æqualis crassitudinis, cuiusmodi sunt tibia, scindendo fasciam ipsam, singulo quoque palmi intervallo: & eam valide acu assuendo, ab ea parte maxime, quæ gibba est: laxæ autem, a parte altera dorsali. Hoc autem genus deligaturæ vtilissimum est, ut diximus, in antiquis vlceribus, varicibus, & tibiaturum inflationibus. Tertium deligaturæ genus, retinens, eo quod medicamenta retineat, dictum, accommodatur membris in quibus arctatio fieri nequit. neque alia deligatura, ut in collo, & in ventre, atque in omnibus abscessibus, & affectibus dolorificis. Hæc perficitur linteo lo seu fascia vnicum finem, seu caput habere: vel quæ sit multorum capitum seu brachiorum, prout res exigit. Atque eius deligaturæ principium, super laborantem locum iniicietur, & in parte opposita, vel nodus, vel potius sutura fiet. Talis autem deligatura leniter & citra dolorē, quā appetet **C** tempus, solui debet. Quod si linteola nimis adhæreant, ea tantisper vino madefacito, donec facile separari possint: fascia vero ad vulnus deligandum, lintea aptissima est, *Gal. lib. 5. Ther. method. cap. 4.* quæ nec nimium mollis, nec nimium dura sit. Quæ enim mollis nimium est, & algæ ritu fragilis, nō tuto continet. Quæ vero dura nimis est, premendo offendit. Sit igitur ex panno vteri, non tamen nimis detricto, suauis, lenis, & mundo. eaque latitudine & longitudine, quam natura partis desiderat. Ut si humerus tibi deligandus sit, fasciam quæ latitudinem sex digitorum habeat, assumes. At si femur, quinque: si tibia quatuor: si brachium, trium digitorum. Si vero digitus ligari debeat, vnius digiti latitudine fascia assumenda erit. Eius vero longitudo sit, pro ratione numeri iniectionū, hoc **D** est, pro necessitate reuolutionum. Hactenus de modo deligandi. Nunc de qualitate & modo fuendi. Triplex a. in vulneribus sutura fieri solet. Vna agglutinatoria, quam barbari incarnatiuam vocant, quæ vulneribus in molli parte acceptis competit, quorum labra sic diffident, ut sola deligatura in vnum adduci nequeant, & quibus nihil iam extraneum inter ipsas oras intercipitur. Sed & recentia esse debent vulnera, quibus hoc genus futuræ accommodatur: vel saltem si vetera fuerint, ac dura, callosaque labra habuerint, per scarificationem, aut cutis ablationem sanguine emisso, renouata. Hæc a. quinque fit modis. Primo filo forti, æquali, & læui, cuiusmodi est sericum, in communibus saltem vulneribus, primum punctum faciendo, in medio diuisionis vulneris, deinde alterum in medio spacio vtriusque lateris, & ita deinceps præcedendo, ut inter duo quæcunque puncta, punctum intercedat, donec vulneris labra rite commissa fuerint. Itaque neque nimis rara, neque nimis crebra sutura esse debet. Si enim nimis rara est, non continet: si nimis crebra est, vehementer afficit. Quia quo sæpius acus corpus transiit, quoque plura loca iniectionū vinculum mordet, eo maiores phlegmones, *Celsoli libro 5. capite 26. attestante*, oriuntur. Sic igitur sutura oras iungat, ut ne ipsæ quidem inter se ex toto contingant: quo scilicet, si quid intus humoris concreuerit, sit qua emanare, ac effluere possit. Solent autem communiter vni digiti transuersi spaciū inter iniecta vincula relinquere. Porro acus longa ac læuis esto, cuspide triangulari: cauda vero excavata, ut in ea filum recondatur, & transitum acus non remoretur. Ceterum cannula habeatur fenestrata, cui incumbat ac innitatur altera pars labii vulneris, ne scilicet huc atque illuc euagetur, dum acus intermittitur: & ut per fenestellam videri possit, quando acus pertransierit. **F** Atque ubi iam acus traiecta fuerit, vna cum filo trahatur: sed interim vulneris labrum, quod prope filum est, specillo huic parti applicato, veluti fulcimento & adminiculo innitatur, ne dum filum extrahitur, labrum etiam consequatur. Ligeretur autem primo duabus inuolutionibus, secundo vna duntaxat, deinde filum scindatur aliquantulum remote a nodo. Secundo, fit sutura agglutinatoria acubus, aut pinna cum acu introducta. Hac autem utimur in magnis vulneribus, & profundis, in quibus labra plurimum

Pars superior.
Radix vasis.

Deligatura retinens.

Sutura vulnerum triplex.
Agglutinatoria.

Modi quinque futuræ agglutinatoriæ.
Primus.

Acus qualis esse debeat.

Secundus.

inter se distant. Atque tot numero acus imponendæ sunt, cum filo in eas intromisso, quot necessariæ videbuntur. Filum autem circa eas reuoluendum est, eo modo quo mulierculæ facere solent, dum suas acus super manicas aut capitia asseruant: atque hoc modo relinquuntur vsque ad vulneris coalescentiam. *Tertio* modo, fit futura agglutinatoria dicta, veruculis æqualibus ex stupis vehementer contortis, & gracilibus, ad modum scriptorii calami, vel festucæ, longitudo fere mediæ digiti. Quod si velimus futuram longo tempore perdurare, pinna seu scriptorius calamus, loco stuparum assumi debet: fit autem ad hunc modum. Vtraque vulneris ora traici debet, acu filum ducente. Deinde facto per idem foramen recursu, ex ea parte qua venerat, recipienda est: sic quidem, ut ansa vna remaneat ea parte qua remeavit. In qua alterum veruculi extremum imponendum erit. Postea fines amborum filorum, euntis nimirum & redeuntis constringito, & super alterum veruculi caput ligaturam facito, ibique fila rescindito, & veruculum hoc pacto vsque ad perfectam vulneris coitionem relinquito. *Quarto*, agglutinatoria futura fit fibulis, disunctas atque hiantes vulneris oras committentibus. Sinto autem fibulæ ipsæ vel maiores, vel minores, pro ratione partis vulneratæ: ab utraque vero parte recurvæ, figaturque hamus vnus in altero vulneris labro, & versus alterum ducatur, in quo & alter hamus infigatur, ut facere solent qui pannos rundendo apparant. Hæ autem fibulæ, quibus hiantis vulneris oras sic contrahimus, nullam vim desiderant, sed eatenus vtilis sunt, quatenus cutis ducentem quasi sua sponte subsequitur. *Quinto* modo, deductæ vulneris oræ committuntur, pannis utrinque admotis, qui figuram triangularem referant, & ea sint magnitudine, quæ membro læso congruere videatur. Qui futuræ modus in iis maxime locis conuenit, in quibus volumus cicatrices facta vulneris agglutinatione, non apparere, ut in facie. Panni autem eiusmodi, viscoso linimento, ac pertinaciter adhærente oblini debent, quod recipiat puluerem sanguinis draconis, thuris, & mastiches, sarcocollam, picem, & pollinem, id est, farinam volatilem molendinariam. Quæ omnia cum candido oui liquore subigi debent, & in vnitatem redigi. Atque vbi linimenti formam ea iam induerint, supra dictos pannos extendi debent, qui utrinque postea ad latera vulneris, ad pollicis vnus distantiam supra vulneratam partem agglutinandi sunt. Vbi autem hæc panni frustula sic linimento oblita desiccata fuerint, ingeniose, & ut oportet, consui debent. Quo facto vulneris labra coibunt, & agglutinantur. Altera futura sanguinem supprimens, vel suppressoria sanguinis, fit acu filum trahente, traiectis oris vulneris utrisque per modum reuolutionis, ut pelles consui solent. Ea autem utimur, quando alia non datur uti, propter magnum prorumpentis sanguinis impetum, accepto in venis vulnere. Sed & hæc utilis est ad transeunda intestina, quum fauciata sunt: ad membranas quoque vulneratas, & loca carne destituta. Verum non admodum tutus est hic consuendi modus. Quod quidem disrupto puncto vno, cetera relaxantur. Sutura tertia labiorum in vnum adductorum cõseruatrix, fit ut reliquæ, verum non æque arcta esse debet. Eo enim duntaxat nomine fit, ut simul maneat, quæ commissa sunt, tantisper dum vulnus coaluerit. Competit autem huiusmodi futura vulneribus in carne, aut molli parte acceptis, in quibus magna facta est dilaceratio, & carnis amissio. Hac enim facto vnionis diuortio, seiunctæ partes in vnum adducuntur, quo citius coalescant. His etiam vulneribus recte accommodatur, e quibus in posterum aliquid extrahendū est. Illud autē de futuris ac fibulis in vniuersum diligenter obseruandum est, ut illis nunquā utamur, antequam vulnus intus purgatum sit: nisi quum magna sanguinis profusio supprimenda est, ne quid ibi conereji sanguinis relinquatur. Id enim & in pus vertitur, & phlegmonem mouet, & glutinari vulnus prohibet. Sed ne linimentum quidē, quod supprimendi sanguinis causa indicū est, inibi relinquendum est: nam id quoque inflamat. Comprehendi vero futura vel fibula, non cutem tantū, sed aliquid etiā ex carne, vbi suberit hæc, oportebit, quo valentius in hæreat, neque cutē abrumpat. Vtraque optima est, *Cello loco iā sepe citato attestate*, ex acia molli, non nimis torra, quo mitius corpori infidat. Sed neque rara nimis, neque nimis crebra, ob superius adductas rationes, futura aut fibula iniicienda est. Neutra etiā vim vllā desiderat, sed eatenus utilis est, qua cutis ducentem quasi sua sponte subsequitur. Ceterum tunc appetit tempus remouendæ futuræ, quū ea, quæ desideramus effectum præstiterit. Modus autem remouendæ talis est. Specilli caudam, id est, angustum mucronē, filo supposito, filumque

Tertius.

Quartus.

Quintus.

Pulnis.
Pollē quid:Suturæ mo-
dus secundusSuturæ mo-
dus tertius.Tēpus re-
mouendæ
futuræ.
Modus.

- A** filumq; ipsum mox abscindito. Postea latum ipsius specilli mueronē, labro vulneris per quod filum educitur, superponito. Ita enim pulcre vitabis, ne quid filum euellendo laceretur. Porro locus nunc exigit vt de puluillis, qui vulgarib. chirurgis plumaceoli, Germanis *Meißel* nominantur, aliquid obiter dicamus: hi enim ad multa vtilēs sunt, quandoquidem dissolutas ac diductas partes fulciunt & comprimunt: partis q̄ suæ vnionis diuortium patitur, natium calorē fouent, & conseruant. Deniq; a graui molestoq; vinculorum ac fasciarum pondere, vulneratā particulam tuentur. Fieri autē quondā solebāt ex pluma inter duos pannos candidos & mundos cōsuta, vnde & nomen illi a veteribus inditum est. Verum quoniā eos subinde mutare, & innouare, q̄ valde molestū erat, co-
- B** gebat necessitas, magis postea placuit eiusmodi puluillos ex stupis canabinis conficere, præsertim diligenter ac studiose pexis, emundatisq;. Fiunt etiā interdū ex lana vel xylo, quod cotonem appellant. Pleriq; a. hodie loco puluillorum, panniculos admovent læues, id est, non asperos, duplicatos, aut triplicatos: alii vero spengiam adaptant. Porro duo, vel tres, pluresve, prout res expostulat, apponuntur. Quandoq; quidem sicci, ac nullo madentes liquore: nonnunquam vero imbuti oui candido, vel vino, vel poscā: aliquoties etiam oleo, p̄ affectus ratione. Inueniuntur autē huiusmodi puluilli triplicē obtinere figuram. Alii enim triangularē, alii rotundā, alii vero quadratam habent. Qui figura constant triangulari, glutinandis vulnerib. sunt dicari. Ita vero disponi debent.
- C** Vnus ex utroq; latere orarum seu labrorum vulneris cōstituatur, ita vt super plagā inter se iungantur lateribus. Qui rotundam habent figurā, sicci aliis superponuntur, natui caloris particulæ læsæ conseruādī gratia, & vt saniosam pluuiem, ac sordidos ichores in se recipiant. Sed qui quadrati sunt, ideo apponuntur, vt partem læsam a fasciarum & vinculorum iniuriis vendicent. Sunt autē penicilla, & linamenta, turundas barbari ac tentas vocant, maximo vsui in curandis vulneribus: proinde vt de iis, quoque hoc loco aliquid dicamus, necesse erit. Vtimur autem illis octo modis. *Primo*, quum vulnera vel amplianda sunt, vel detergenda, vel quum aliquid ab eorum fundo vacuandum est: vt in profundis vulneribus, in quibus necesse est alibi vulnus aperire, vt ex fundo, & sinu ipsi⁹ ichores, hoc est, saniosē colluies, inibi collecti vacuentur. *Secundo*, illis cogimur vti in
- D** cauis vulneribus, in quibus necessaria est carnis amissæ recuperatio. *Tertio*, in vulneribus ab aere alteratis, & sordidis, quæ deterfione egent. *Quarto*, in vulneribus contusis. *Quinto*, in vulneribus quæ cum phlegmone, aut quouis alio tumore præter naturam fatigant. *Sexto*, in vulneribus quæ per morsus fiunt. Talia namque vulnera non sunt festinanter agglutinanda, & ad cicatricem perducenda. Quin potius longo tempore aperta, & hiantia manere debent. Omnis enim feræ morsus, vt testis est lib. 5. cap. 27. *Celsus*, quoddam virus habet, quod foras semper euocandum est, non intro repellendum, nec occluso vulnere intus relinquendum. Sed de iis fusius suo dicemus infra loco. *Septimo*, penicillis & linamentis vtimur vulneribus, in quibus persanandis circa ossa manus admo- uenda est. *Octauo*, in vulneribus quæ iam vetustate in vlcera defluxionibus scaturētia degenerauerunt. In omnibus vero aliis vulneribus inducendæ cicatrici studemus, absq; linamētis. Animaduertendū a. est, in iis nō exiguam esse diuersitatem pro ratione finis, propter quem admoventur. Fiunt enim interdū ad detergendas, vt comprehēsum est, vulnerum sordes. Atq; tum ex panni non asperi, & præsertim veteris laciniis, vel floccis euulsis formātur. Nonnunquam vero ideo in vulnus immittuntur, vt ipsum hians & apertum maneat. Ac tunc quidem ex stupis bene pexis, & a sordibus rite emundatis, vel ex prædicti panni frustulis efformantur: vel etiam ex xylo, *cotonē* Latini vocant. Sed & ex canna ænea, vel argentea perforata fiunt penicilli ad eundem finem: vt verbi gratia, in naribus ad aeris inspirationem: & in altis vulneribus vt sanies, & purulenta colluio, per hanc velut emissarium ferat, & foras egrediatur, non autem intus retineatur. Quādoque etiam linamenta & penicilla vulneribus inferunt, vt ipsis os magis dehiscat, & amplietur: fiuntq; tunc ex spongiolis vehementer compressis, & intortis, aut ex radice gentiana. Hæc enim dum multum humorē, quo scatet vulnus, combiberint, turgescūt, & ita magis hians vulnus reddunt. Ceterum forma linamentorum æqualis esse debet, penicillorum vero inæqualis, in modum clauiculi lignei, quem Latini *impagem* vocant, ne scilicet intro labantur. Hæc autem aliquoties quidem sicca, quandoq; vero quopiam delibuta vnguento admoventur, prout res ipsa exigit. Quartū quod in curādo simplici

Puluillorū
vsus.
Puluillus
quidē

Ratio no-
minis.

Materia
puluillorū.
Xylon.

Numerus.

Figura.
Triangula-
res.

Rotundi.

Quadrati.
Penicillum
& linamen-
tum quidē
Vfus peni-
cillorum.

Vfus & ma-
teria lina-
mentorum.

Impages.
Substantia
læsa partis
cōseruatio.

vulnere medico proponitur, est vt læsæ partis substantiâ conferuet, ac prohibeat ne ipsa dolore, vel phlegmone, aut aliquo alio prauo symptomate, quod vulnerebus accidere solet, infesteretur. Hunc autem scopum assequimur, ad motis emplastris, & linimentis ex oui candido, & aliis huiusmodi refrigerantibus vt est ceratum liquidum, *Galeno lib. 6. ca. 5. teste*, primis saltem diebus factis. Postea vero vino adstringente particula perfundenda, & figura aptissima collocanda est. Talis autem est, *Galeno loco iam citato attestante*, quæ maxime a dolore abest, & in qua æger diu immotus perseverare potest. A pertio quoque, & ea interdum ex aduerso in vulnerata parte molienda est. Necessaria etiam nonnunquam sanguinis missio, item & purgatio, *vt mox docebimus*. Omni autem recens facto vulnere, nisi in ventre sit, ex ipso statim, *Hippocrate in libro De ulceribus, & Galenus lib. 4. Ther. meth. cap. 6. testibus*, sanguinem plus minusve effluere expedit. Quippe hoc modo phlegmone minus tentabitur tum vlcus ipsum, tum quæ circumposita loca sunt. Quum itaque medicum imitatore esse oporteat non naturæ solum, quod Hippocrates monet, sed etiam eorum quæ quum sua sponte eueniant, conferunt: in recenter autem acceptis vulneribus, præsertim magnis, & præualidis, expedit sanguinem effluere: hic certe si minime, vel minus quam par est effluxit, quod deest, ipsi adicias oportet, sanguinẽ scilicet ex vena detrahendo. Trifariam autem vulnera, vt & reliqua omnia vitia, magna grauiaque, *Galeno ubi supra capite sexto teste*, redduntur: nempe vel propter laborantis partis præstantiam, vel propter affectus magnitudinẽ, vel propterea quod sunt cacoerhe, i. maligna: cuiusmodi sunt omnia in articulis accepta vulnera. Hęc enim doloris, vigiliarum, cõuulsionis, & delirii periculum adferunt: quod scilicet ibi tendones, & nerui, & carne vacua atque ossea loca sunt. Vulneris igitur magnitudo, vna cum virium robore, mittendum sanguinẽ indicat: quanquam qui vulneratus est, prorsus redundantia sanguinis expers sit. Sanguis vero in recentibus & nuper acceptis vulneribus, nõ solum ne pars læsa, aut circumposita loca, aut comprehensum est, phlegmone tentetur: sed vt impetum quoque ruentis sanguinis cohibeamus, & nimium profluium impediamus, detrahitur. Hi enim præcipui sunt mittendi sanguinis in recenter illatis vulneribus scopi. Ceterum si perpetuum est, quod ab Hippocrate didicimus, incipientem fluxionem ad contraria trahendam reuellendamve esse: fixum vero iam in laborante particula vacuandum esse, vel ab ipsa particula quæ affligitur, vel a maxime vicina: in promptu nobis & de sanguinis detractione colligere nunc est, quod in principio hæc longinquo, postea ex ipsis exulceratis partibus, *vt lib. 13. Thera. method. cap. 6. & lib. 2. ad Glauconem, & cap. 19. libri De curandi ratione per sanguinis missionem Galenus fusius docet*. Quid autem per longinqua intelligendum veniat, & quando ex longinquis, & quando ex maxime longinquis sit mittendus sanguis, alibi luculenter exposuimus. Modum vero seu quantitatem vacationis, tũ ex redundantie modo, tum ex copia sanguinis quæ e vulnere effluxit, inuenire oportet. At hæc ex ætate, natura, tempore anni, regione, & cõsuetudine, & ante hæc ex ipsa laborantis virtute. Qualis a vena secanda sit, ex laborante particula discitur. Si enim vulnus in capite, collo aut facie acceptum sit, humeralis in gibbero, vel manu secanda est. Si vero partes collo inferiores vtq; ad renes & vmbilicũ vulneratæ sunt, interiorem quæ vulgus medicorum basilicã vocat, incidere vtile est. Quod si vero partes quæ renibus inferiores sunt vulneratæ fuerint, quæ venę per poplites aut malleolos decurrunt secandæ erunt. Ac perpetuo quidem in omnibus siue reuellere, siue vacuare volueris, vena quæ e directo est, & cum laborante parte rectitudinem haber, incidenda erit, *vt a nobis copiosissime in commentariis, quos in libellum Gal. de Curandi ratione per sanguinis missionem exarauimus, monstratum est*. Porro si vulneratus aluo adstricta fuerit, ea indita glande, aut iniecto clysteri subducenda est: vel casia fistulari, aut manna, aut oxyphenico, aut aliquo eiusmodi leniente medicamento deuorato, citanda. Quod si vero vitiosi in vulnerato corpore subsit redundantia, vel vulnus præualidum sit, puro etiamnum existẽte corpore, & cacochymia experte, iam dictis leuibis auxiliis nequaquam contentus eris, sed fortioribus pharmacis purgationem per aluum molieris. His autem præsertim vulneribus, *Hippocrate in libro de ulceribus teste*, quæ in capite sunt accepta, item quæ in ventre & articulis, purgatio per aluum vtilis est. Præterea iis in quibus periculum est ne fiderentur, corrumpantur. Præterea in iis quæ siuntur, & exeduntur, & quæ serpunt, & reliquis quæ vlcera diuturna reddunt, etiam quæcunque deliganda sunt: hoc est, adeo

De sanguinis in vulneribus missione.

Vulnera trifariam magna.

Modus vacationis.

Interior vena.

De purgatione in vulneribus molienda.

A magna sunt, ut futuris indigeant, aut si non his, certe deligatura. Purgatio itaque, *ut attestatur libro quarto Ther. method. cap. 6. Galenus*, vulneribus duabus potissimum de causis suscipitur, nempe vel propter redundantiam alterius cuiuspiam humoris, vel propter vim morbi. Ceterum potiones vulnerariæ ex symphyto geraniis quibusdam plantagine, lycopli, sanguisorba, sanicula dicta, pede leonis, ophioglossio, bistorta que appellatis hodie herbis, & id genus aliis confectæ, tum commodissime exhibentur, quum spes est certa, citra alia auxilia has posse vulnera glutinare. Postremum & quintum, quod in curatione vulnerum est observandum, victus ratio existit. Vulneratis itaque, primis septem diebus, intra quos ut plurimum a febre & phlegmone securi esse solent, victus tenuis, & parvus, frigidus quoque & humidus, præsertim si iuvenes & plethorici fuerint, atque ambiens aer calidus, præscribendus erit. A carnibus duris, & valentibus magnis piscibus, & prauum succum generantibus, pane non fermentato, male subacto, & improbe cocto, eos arceto. Allia, cepas, sinapi, salita, & acria omnia ne gustent vulnerati. Perdicibus, pullis gallinarum, auiculis, & id genus aliis concoctu facilibus, & bonum sanguinem procreantibus vescantur. Ex oleribus lactuca, portulaca, & boragine. Vini usus omnibus usque ad septimum interdictus esto: nisi ex largo sanguinis profluuiio, viribus destituti fuerint. Tunc enim ante ullam curationem vino reficiendi sunt. Transacto autem die septimo illis, si nihil aliud obstiterit, citra noxam vinum modicum, & aqua multa dilutum, exhiberi potest. Nam si ad hunc usque diem nec phlegmone tententur, nec dolore afficiantur, in posterum tuti erunt. Aquam in qua parum cinnamomi coctum sit interea temporis bibant. Breui & frugali coena utantur. Ut quiescant iubeto. Optimum enim illis medicamentum quies est, moueri vero & ambulare alienum, iis potissimum qui in inferioribus partibus vulnus acceperunt. Venerem summo opere vulnerati fugiant. Iram item, continentiam, & omnes vehementes animi motus. Ceterum ubi vulneratus a phlegmone fuerit assertus, pleniore victu uti potest. Utatur igitur tunc generosiore aliquo vino, & carnibus probum succum generantibus, ac vires refocillantibus. Atque hæcenus vulneris in vniuersum curationem prolixius etiam tradidimus, ut scilicet vlcus generalem curationem eo breuius subinde sequenti libro nobis tractare liceat.

De portio-
nibus vul-
nerariis.Victus ra-
tio.

De vulneribus magnis in superficie acceptis, & minime profundis.

CAP. II.

Horum vulnerum causæ ex ægri relatione patebunt. Notis ad dignotionem nullis opus est: oculis enim intueri possunt. In horum autem curatione hoc in primis attendendum, ut sanguinis in primis profusio inhibeatur. Quod sane tum faciendum est, ubi moderatus aque affatim effunditur. Moderata namque sanguinis ex recenter accepto vulnere vacuatio, non parum sæpe multis profuit: quandoquidem & phlegmonas, & obstructions, & febrem subinde fieri prohibuit. Quæ quidem symptomata vulneribus, nisi diligenter prouideris, superuenire, ipsiusque agglutinationem & curationem magnopere impedire consueverunt. Atque hoc est Hippocratis in libello De vlcibus præceptum, quod & a Gallo lib. 4. Ther. method. cap. 5. & refertur & approbatur. Fit enim, inquit Hippocrates, effluente sanguine vulnus siccius, proinde sanius. Quod si vero tantus fuerit ruentis sanguinis impetus, ut cum iis quæ sistendo sanguini in vulneribus admoueri solent, cohiberi nequeat, iis suppressendus remediis erit, quæ in capite De venarum vulneribus postea dicemus. Dein si prædictorum vulnerum oræ sola deligatura, vinculo scilicet, ut Galenus lib. 3. Ther. method. cap. 4. interpretatur, ex duobus iniis circumdato, nec adduci, nec committi possunt, sutura aut fibulis coniungendæ erunt. Atque hac sola partium dissidentium coniunctione vulnus glutinatur. Sunt tamē hodie, qui in hoc agglutinando vulnere, hoc utuntur puluere quem labiorum vulneris agglutinatium, & futuræ conseruatium nominant. Recipit boli armenij, terræ lemnæ, singulorum drach. sex. Thuris, mastiches, sarcocolla, singulorum drach. duas & dimidiam. Myrrha, aloes, singulorum drach. unam & dimidiam. Tragacantha pista, sanguinis draconis, singulorum drach. unam. Farinarum hordei, & fabarum, singulorum drach. dimidiā. Verum interim vnicuique cauendū erit, ne vel pilus, vel oleum, vel quidpiam aliud in medio adductorum labrorum vulneris interuenierit. Nam tunc eiusmodi vulnus sola dissidentium partium coniunctione glutinari non potest. Hæc enim quæ ita interiacent, Galenus etiam lib. 3. Therapeuticæ methodicæ. 4. attestante,

Causæ.
Signa.
Curatio;

Pulvis cruentis vulneribus aptus.

Cauendū ne quid labris vulneribus intercidat.

iam vnionem diſpeſcunt, & earum quæ copulandæ ſunt partium coalitum impediunt. A
 Ex prædictis vero ſingula cum oui candido liquore agitari poſſunt, donec in corpus v-
 num cocant, quod glutinis inſtar lenteſcat. Poſtea vero ſtupis leuib. excipiendū erit
 medicamentum, & ita vuln. admo. uendum: ſupra quod & aliæ ſtupæ ſolo oui candi-
 do imbutæ, & intra pannum lineum eodem madefactum liquore inuolutæ, apponendæ
 ſunt. Sed & ſupra vulnus nulla alia intercedēte materia, pannus aliquis tenuis prædicto
 imbutus liquore, admo. ueri debet, ne ſcilicet dum remouentur ſtupæ, futuræ iam facta
 puncta abrumpant, aut dilacerent. Quod ſi etiam loca adiacentia vuln. roſaceo inun-
 gantur, læſam particulam ita a dolore & phlegmone vindicabis. Ceterum quæ cruento
 vuln. primum appoſita ſunt, ante diem tertium, aut quartum remoueri non debent,
 niſi forte dolor aliquis vehemens ſuperueniat, aut ſymptomata aliquod moleſtum in- B
 cidat. Porro ſi poſt quartum diem tranſactum vulnus nō coaluerit, vino aliquo adſtrin-
 gente, eoque calente ablucendum erit. Deinde ſtupæ prædicto vino imbutæ & expreſſæ,
 ſupra vulnus ipſum apponendæ & alligandæ erunt, quas & quotidie mutare oportebit.
 Intra enim dies paucos hoc modo vulnus agglutinabitur, & perſanabitur. Recte itaq;
 & decenter primo puluis prædictis cum candido ouorum liquore adhibetur. Hic enim
 & ſanguinis profluuium infrenat, atq; in. hibet, dolorem ſedat, & phlegmonem creari
 vetat. Quod vero vinum omnis vuln. quæ vulnus eſt, optimum medicamentum ſit,
 Galenus loco paulo ante citato, & lib. 4. Ther. meth. cap. 5. luculenter admodum oſtendit.
 Quippe vulnus omne, quæ vulnus eſt, ſiccari atque adſtringi deſiderat. Atqui vinum
 ſubauſterum & adſtringens, hæc duo commoda præſtat vuln. : igitur optimum eius C
 medicamentum. Vuln. itaq;, vt Hippocrates etiam in lib. de Vlc. eribus docet, madefacere,
 & abluere vino oportet. Poſt quam ſane abluſionem infra ſcriptum puluerem, qui effi-
 cax eſt, inſpergere vuln. oportet. Recipit myrrha, drach. tres. Aloes hepatica, drachmas
 quatuor. Thuris, drachmas duas. Miſceantur, & fiat puluis.

De vulnere profundo, & recondito, citra amiſſionem ſubſtantie, in carne
 accepto. C A P. III.

Vulnus quod in profundum penetrat, & reconditum eſt, futura & decenti deligatu-
 ra ſubinde curationem recipit. Si vero hoc modo curari non pōt, propterea quod
 partes quæ diſiunctæ ſunt, exacte ad imum vſq; ob nimiam diuiſionis profunditatem, D
 ſibi coniungi nequeant: vel potius, quia in fundo collecta ſit ſanies, aut pus, cui nullus
 pateat effluxus, ipſum per effluſionem, Galeni ſequentes conſilium, curabimus. Ipſam
 autem effluſionem, tum ex eiſdem, tum ex contrarii loci diuiſione, & ſitu ſeu figura
 partis accommoda moliemur. Porro ſitum partis vulneratæ accommodum, ſeu con-
 gruentem ſitus figuram intellige, qua vuln. hiatus & oriſcium ſemper deorſum ſpe-
 ctat, fundū v. ſurſum ita vt ſanies ex ipſo vuln. prona & libere effluat. Proinde ſi vul-
 neris figura non ad ſuperiora, ſed ima potius vergit, nec ſututa, nec ſibulis, nec deligatu-
 ra, partes diſiunctæ ad amuſſim cōmitti, cc ſibi applicari poſſint, atq; in profundo ſiſtat
 ſanies: niſi prius ad effluſū vitiati humoris ſectiōnem feceris, nihil vnquam ꝑficiēs, ſiue
 carnem generare, ſiue agglutinare volueris. Vbi vero conuenientem poſitionis figuram
 vulnus in laborante parte ſeruauerit, ſiue id ex natura vuln. ſiue de induſtria contingat,
 ſectiōne noua opus non eſt, vt lib. 2. ad Glauconem, cap. 14. Galenus copioſus docet. Verbi
 gratia, ſi in coxa figura ſinus ad ima vergit, & ſinus ipſe verſus genu terminatur, os vero
 altius, circa mediā nimirū femoris regionem cōſiſtit, molle cervical popliti laborantis
 ſubiiciendū, vt inferiorem ſitum habeat inguen, q̄ genu. Hac enim cōueniente poſitio-
 nis figura in læſa parte obſeruata, facile per os ſanies & purulenta colluuiēs elabunt, &
 effluunt. Quod ſi igitur hac conuenienti ſitus figura, laborans particula collocari non
 poſſit, nec ex vuln. ipſo ſanies elabi, ex aduerſo ſectiō moliēda erit, vt ſcilicet illi efflu-
 xus pateat. Effluxus v. moliendi duplicem rationem, Galenus lib. 3. Ther. method. ca. ult. F
 eſſe tradit: alias ſcilicet tota cavitāte diſſecta, alias in fundo tātum aperta. Quando vero
 harum alterutra ſit ineunda, docebit tum locorū ipſorum natura, tum v. vlceris magni-
 tudo. Si namq; ea loca dubiam, ſeu fallacem, ac periculola ſectiōnem faciant, & vlcus
 magnum fuerit, in fundo aperire magis expedit. Sin contra ſe habeant, præcindere ſeu
 diuidere præſtat. Deligatio vero eius incipiat quidem, vt dictum eſt, ſuperne, finiatur
 infra,

Cruentis vul-
 neribus ad-
 mora quā
 de remo-
 uenda.

Vinū vlc-
 rib. & vul-
 neribus o-
 ptimum.

Puluis opti-
 mus.

Vulnus
 quando per
 effluſionē
 curandum.

ſectiō in
 parte op-
 poſita quā
 do facien-
 da.

Effluxus
 moliendi
 duplex ra-
 tio.

ubi scilicet patet effluxus. Sectione etiam facta, aliquod medicamentum repurgans leui
 A stupa, aut panno exceptum imponi potest, & bis die mutari.

De cauo vulnere. CA. P. IV.

IN cauo vulnere non modo ipsa periit cuticula, quam Græci *ἐπίδερμιν* vocant, verum
 etiam reliquæ cutis suppositæ natura vniuersa, & subiectæ carnis portio aliquando nō
 exigua. Quo fit, vt geminus in eo curandi finis sit propositus, *Gale. lib. 3. Ther. method. ca.*
 2. *attestante*, vnitio scilicet, & impletio: sicuti etiam duplex est affectus, nempe vulnus,
 quod est vnitatis solutio, & cauitas, quæ ex amissa aliqua animalis propria substantia est
 contracta. Proinde continui diuortium vnitionem, cauitas repletionem desiderat. Ve-
 rum enimvero quoniam in proposito vulnere vnire, quæ dissident, non possumus, nisi
 prius cauitatem impleuerimus, ordinem curationis a cauitatis impletione ordiri ne-
 cesse est. Particulares autem indicationes, ex quibus inuenire licet quæ cauitatem vul-
 neris implent, sunt quatuor. *Prima*, ex ipsius vulneris substantia sumpta, nobis insinuat
 carnem eandem specie cum ea quæ periit regnendam esse. Impleri enim non pote-
 rit quod cauum est, nisi substantia omnino similis ei quæ periit regnatur. Atqui carnis
 gignendæ materia sanguis bonus est, *Galeno libro iam citato cap. 3. teste*: opifex vero, seu
 effectrix causa, ipsa natura. Erit autem sanguis qui influit, & ex quo regnenda caro
 primordium habeat, bonus, si nec qualitate, nec quantitate vitiosus fuerit. Sed nec sa-
 tis etiam hoc loco fuerit naturam dixisse, nisi etiam quorum natura, sit adiectum, & ubi.
 C Constat itaq; subiectorum corporum, quibus superinduci debet caro, naturam ipsam
 gignendæ carnis opificem esse. Opificis autem rationem natura subiectarum partium,
 quibus restituenda est caro, habere non poterit, nisi iustum & minime vitiatum calidi,
 frigidi, humidi, & sicci temperamentum obtineat: si quidem ex horum temperatura,
 cuiusq; corporis natura consistat. In omni igitur cauo vulnere, duo illa primū sunt con-
 sideranda: nempe q̄ subiectum est, iustane temperie sit, id est, an secundum naturam se
 habeat: & præterea sanguis qui influit, bonus ne, an modicus sit. Fingamus igitur & sa-
 nam esse partem subiectam, atq; afflictam: & sanguinis confluxū citra vllum vel in qua-
 litate, vel quantitate vitium. Porro his ita se habentibus, nihil est præterea quod obster,
 quo minus prima carnis generatio prospere contingat, idq; nullius externi medicamē-
 ti ope. Quippe causis ambabus vnde nascitur præsentibus, nulloque extrinsecus quod
 D impediatur obstante, non potest prohiberi carnis generatio. Verum in ipsa primæ car-
 nis generatione duplex prouenire excrementum necesse est: alterum quidem crassius,
 alterum vero tenuius. Quod in vulneribus tenuius est, Græcis *ἰχθὺς*, Latinis *sanies* nomi-
 natur. Quod vero crassum est, sordes. Ac ex tenui quidem excremento, vulnus humidū
 redditur: ex crasso, sordidum. Eoq; duplicibus medicamētis eget, vtiq; vt humidum est,
 siccantibus: vt sordidum, expurgantibus. Ergo quum nullo vnquam tempore natura
 cesset, certe nec tempus vllū erit, in quo nō ambo hæc in cauo vulnere colligant. Qua-
 re nec tēpus vllum erit, in quo non vtrunq; medicamenti genus desideretur: vtiq; quod
 siccet, & quod expurget. Verum non satis adhuc fuerit, cuiusmodi quidem genere esse
 medicamentum debeat, inuenisse: sed & species aliqua inuenienda est, q̄ eiusmodi vul-
 E neri sit commoda, & statuto ordine graduve circumscripta, vt carnē producere possit.
 Quippe quod super hunc fuerit, ita vt non modo humoris qui influit, redundantiam
 consumat, sed etiam affluentem sanguinem popule: id refici carnem, ceu materiā eius
 absumens, prohibebit. Proinde præsentī negotio aptissima sunt, *thuris lachryma*, *hordea-*
cea, & *fabacea*, & *erui farina*. Item *iris*, *aristolochia*, *cadmia*, *panax*, & *pompholyx*, q̄ vulgo *tutia*
 dicitur. Omnia vero hæc tum maioris minorisve discrimine inter se dissident: tum alia
 eorum simplices qualitates vincentes habent, alia compositas. Siquidem *aristolochia* &
panax, tum ceteris plus siccant, tum natura magis calent. Hordeacea, fabarumque fari-
 F na, multo his minus siccant, nec vllum calorem obtinent. Thus modice calet, minus ta-
 men illis siccatur, adeo vt quasdam corporum naturas omnino non siccet. *Erui farinā*, &
iris, horū atq; *aristolochia*, & *panacis*, medium locum tenent, vt loco paulo ante citato *Galenus* fusi-
 us monstrat. Altera indicatio curandi caui vlceris, tum ex totius corporis, tū ex particulæ la-
 borantis tēperamento sumpta, insinuat nobis medicamenta vel calidiora, vel frigidiora,
 vel humidiora, vel sicciora, ipsū vulnere esse adinuenienda. Duæ itaq; sunt primarum in-

ἐπίδερμιν.
 Gemina in
 curando
 cauo vul-
 nere indi-
 cationes
 generales.

Quatuor
 indicatio-
 nes parti-
 culares.
 Prima.

Hypothesis

In carnis
 generatio-
 ne duplex
 prouenit
 excremen-
 tum.
 Sanies.
 Sordes.

Medicamē-
 ta carni p-
 ducendæ
 apta.

Secunda.

dicationum differentiarum: quarum una ab eo quod secundum naturam se habet, altera vero ab eo quod præter naturam sumitur. Quod secundum naturam se habet, sui custodiam indicat, & propterea quæ similia sui sint, postulat. Quod vero præter naturam est, sublationem sui, eoq; contraria requirit. Perit enim quidq; in contrarium, & a contrario. Igitur vulnus quidem, quia præter naturam est, quo est humidius, eo sane medicamento quod magis siccet, indiget. Corporis vero natura, propterea quod secundum naturam est, quanto est humidior, tanto quod minus siccet, medicamentum postulat. Proinde si qua sunt in diuersis corporibus vulnera, quib. par sit humiditas: quod in sicciore corporis temperamento consistit, utiq; magis siccari postulat: quod in humidior, hoc sane minus, quo natura naturæ interest. Siquidem productam carnem, ei quæ præfuit, similem esse oportet. Vbi igitur pristina sicciior fuerit, nouellam quoq; sicciorem fieri conueniet. Quare vberius hæc siccari postulat, quanto magis sicca fuerit, tanto quod admo- uetur medicamentum, magis siccam facultatem habere debet. At in humidior natura, tanto rursus iis quæ minus siccant medicamenti est opus, quanto caro ipsa minus est sicca. Quo fit, ut thus, quod cum temperatis & mediis naturis consentit, in quibusdam tum ulceribus, tum naturis, pus quidem mouet, carnem non producit: in quibusdam etiam carnem producit. In humidior namq; natura siccare, & pro ducere carnem potest, in sicciore non potest. Præterea in modice humidis vulneribus carnem efficere potest, quod scilicet moderate desiccet. In iis vero quæ præhumida sunt, prorsus non potest, quod scilicet non satis desiccet. Quæ singula Gal. in eo, quem supra citauimus loco, fusius persequitur. Tertia indicatio, ab iis quæ coniugata & annexa dicuntur sumpta, insinuat nobis inueniendum esse remedium, quod proportionem, & statuto quodam ordine, ipsis affectibus, qui simul cum ipso vulnere incidunt, respondeat: illosq; ipsos affectus prius summouendos esse, quæ ipsum vulnus carne implere tentemus. Itaq; si intemperies vulnere accesserit, atq; vulnerata caro, vel prius etiam ex quauis occasione, vel ipso vulnerationis tempore, iusto calidior, frigidiorq; est effecta: utiq; medela exigit quæ non modo moderate siccet, sed etiam in tantum calefaciat, refrigeretve, in quantum subiecta caro a naturali suo habitu recessit. Fieri enim nequit, ut in ulcere vel carnis productio, vel sinus impletio, vel agglutinatio, vel cicatricis inductio recte unquam cedat, nisi subiecta caro pro naturali modo se habeat. Quocirca legitimi vulneratarum partium temperamenti, quoties eas vel carne implere, vel glutinare, vel cicatrice inducere studes, maior tibi sollicitudo erit. Cõgruis itaq; & oportunis auxiliis aduersus illos, qui cum vulnere incidunt, affectus pugnare oportet, priusquam vulneris ipsius curationem aggrediamur. Veluti igitur si phlegmone una cum vulnere esset, nemo vulnus ipsum vel carne implere, vel glutinare vel cicatrice inducere, attentare debet, priusquam illa discussa sit. Ad eundem modum etiam, si citra phlegmonem sola subsit intemperies, nullum horum fore prius putabimus, quam illa sit sanata. Quod si igitur hæc ita se habent, sicuti profecto habent, inspiciatur etiam conuenit & circumdantis nos aeris temperies. Siquidem veluti medicamentum quoddam is quoq; corporibus nostris forinsecus incidens, ubi immodicus calore vel frigore est, sanationem remorat. Danda igitur opera est, ut medicamenta excessui eius occurrant. Ideoq; Hippocrates, in calidioribus anni temporibus, iis, quibus frigidior facultas sit, medicamenti utitur, calidioribus per frigidiora. Adeo, inquit, perpetuo verum est illud theorema. Quæ singula Gale. libro. 3. Therapeutica methodi, capite 8. copiosius profequitur. Quarta indicatio in sanando cauo vulnere obseruanda, a contrarietate indicationum sumitur: non quidem earum quæ in diuersis temporibus perficiuntur, sed earum quæ in vno eodemq; tempore ipsius curationis subinde offeruntur. Ut exempli gratia, si ægri temperamentum iusto sit humidius, particula vero ipsa quæ laborat, sicciior: aut contra, si hæc sit humidior, & totius temperamenti siccius. Pari modo in calore, & frigore, quod contrario temperamento sit pars cum toto. Diuersa sane in his est ea, quæ a patiente particula accipitur, indicatio, ab ea quæ ex ægri sumitur natura. Proinde hæc quæ nunc tractamus indicatio, insinuat nobis medicamenta vel humidiora, vel sicciiora, vel calidiora, vel frigidiora, aut prout res postulabit, media ac temperata, deligenda esse, quæ ipsi vulnere admovent. Ponamus igitur, totum corporis laborantis temperamentum humidius esse, eoq; medicamenta desiderare quæ minus siccant: ipsam vero ægram particulam ex earum numero esse quæ sicciiores sint, qualia sunt ea quæ minus sunt carnosæ: cuius

Tertia indicatio.

Circumdantis nos aeris temperies consideranda.

Quarta.

Hypothesis.

- A** cuius generis sunt quæ circa digitos & articulos habentur: præterea quæ circa aures, & nasum, & oculos, & dentes sunt: ac ut semel dicam, ubi crebræ cartilagines, & membranulæ, & ligamenta, & nervi sunt: adeps vero, & caro vel omnino nulla est, vel perquam exigua. Quare si quanto ægri temperamentum medio temperamento est humidius, tãto particula iusto sit siccior, nec adiiciendũ, nec detrahendũ medicamẽto quicquid est, sed tale adhibendũ, quale si vulnus in medii tẽperamenti particula consisteret. Sin siccior debito particula fuerit, quam corporis temperamentũ iusto est humidius, utiq; in tantum intendi siccitatem medicamenti cõueniet, quantum particulæ temperamentum, totius temperamentum excedit. Veluti si quatuor numeris pars vulnerata medio temperamento siccior sit, ægri vero natura gradibus tribus humidior: manifestum est, particulam q̃ nunc vulnerata est, vno gradu siccior desiderare medicamẽtum, q̃ pars quæ sit temperata. Sed ut hæc omnia coniectura accipiunt & cognoscunt, ita diligẽtẽ in hominum naturis, & medicamentorũ facultatibus contemplantis exercitationẽ postulãt. Non est autem, quod de indicationibus, quæ a calido & frigido sumunt, dicamus, quandoquidẽ ad portionẽ dictorũ intelligi possunt. Quare certe singula Galenus copiosius *lib. 3. Ther. method. cap. 9.* docet. Ex iam dictis omnibus liquido patet, huic qui probe & certa methodo cauũ curare vuln⁹ voluerit, theorematũ opus esse. Quippe non modo de corporis natura meditatũ sit oportet, quisquis commode & ex arte sanare vulnus eiusmodi studet: verum etiam diligenter speculationem omnem de medicamentis didicisse tũ sicci humidiorisq; corporum temperamentũ notas callere: ad hæc tũ ambientis tẽperiem, q̃ utiq; tum ad præsentẽ status, seu anni tempora, tum vero regiones extenditur, tũ partium nature, tum indicationũ inter se pugnantium cõtrarietatem considerare. Sed pro Deum immortalem, magna pars hodie medicorũ, Theisalũ illũ impudentissimum nugatorem, imitantes, ista nec norunt, nec inquirere volunt. Quin potius imperiti furoris exemplo, vno calopodio, ut in puerbio est, omnes calceant, nullo naturarum, aut partium, aut id genus aliorum factõ discrimine. Ceterum hoc modo in cauo curando vulnere recentiores chirurgi vtuntur. Stata iam sanguinis profusione, & laborante parte a phlegmone & dolore vindicata, vino calente vulnus abluunt: Mox ipso abluto ac desiccato, puluerem aliquem carnẽ regenerantem, aut vnguentum aliquod sarcoticum carnemve generans admovent. Proinde linamenta iis sarcoticis imbuta, aut conspersa, in sinum vulneris demittunt. Post hæc stupas aridas, vel quæ vino maduerint, superponunt. Ac demum quæ medicamenta ad probe continere possit deligaturam adhibent: atq; æstate bis, hyeme semel duntaxat auxilia eiusmodi permutãt. Porro medicamenta quæ vulnorum cavitates implent, medio critere citraq; morsum abstergentia & siccantia sunt, *ut lib. 3. Ther. method. cap. 4. fusius Galenus monstrat.*

In impet-
tos medi-
cos.

Communis
chirurgorũ
praxis.

De equali, siue impleto vulnere. CAP. V.

- V**bi vulnus purgatum impletumq; carne fuerit, *equale* tunc, *planum* atque *impletum* nominatur. Hoc autem cicatrice tantum induci postulat. Hæc igitur tum regnare, tum sibi vnire oportet. Ad cicatricem vero quod iam impletum est perducit ex gignenda cute, quæ ex subiecta creatur carne. Atqui quum ex semine ortum habeat cutis, talis omnino qualis erat quæ periit, prorsus restitui non potest: simile tamen quiddam cuti, & quod eius officium suppleat, restitui potest, non tamen plane cutis. Quando igitur ut cutis regeneretur fieri omnino nequit, quod superest, efficere tentandum: nempe instaurare aliquid, quod cuti deperditæ simile sit, & carni veluti aliquod naturale tegumentũ existat. Id est enim vulnus iam impletum, planumq; redditũ ad cicatricẽ ducere. Huius efficiendi hæc est ratio. Portio quæ piã subiectæ carnis nuper genitæ, & restitutæ, ea sc. quæ sum motenus euidenter apparet, sic alteranda est, ut non amplius caro permaneat, sed veluti cutis euadat. *Quo pacto igitur, inquires, alterabitur?* Profecto alicuius alterantium qualitatũ ope. Ergo quoniam cutis carne ipsa tum siccior est, tum etiã densior, si carnem siccabimus & adstringemus, cuti etiam per similem reddemus. Et hæc quidẽ est medicamẽti q̃ cicatricẽ inducit summa. Verũ ea non satisfacit, nã & glutinatoria tũ siccabant, tum adstringebant, sicuti & ea quæ cicatricem inducũt. Adiciendũ ergo est, quo ordine siccare debeant medicamenta q̃ cicatricem inducunt. Id autẽ ex ipsa rerũ substantia facile inuenies. Nam quoniam inglutinatione vulnerũ siccandũ q̃ cõstit est,

Acquale
vulnus.

Methodus
inducendæ
cicatricis.
Cutis eadẽ
specie cõtĩ
ea quæ pe-
riit, regigui
nõ potest.

Tres deficcantiū me-
dicamentorū gradus.
Sarcoticū.
Glutinatoriū.
Cicatricem inducens.
Per se, & primario.

Malicoriū.

Cicatricem ex accide-
re inducentia.

Cicatrices vt in vulne-
ribus corri-
gendæ.
Lithargyr⁹ nutrita.

quo videlicet pars laborās superuacuis vacet: in cicatrice inducenda nō modo q̄ influit, A
verametia humor qui in ipsa subiecta carne continet, est cōsumendus. Quo fit vt multo
pfecto siccus q̄ cicatricem inducat, q̄ quod agglutinet, medicamentū esse conueniat.
Tres itaq; gradus deficcantium medicamentorū in curatione vulneryū necessario sta-
tuendi sunt. Sarcoticorum n. id est carnem regignentium, facultas ex primo ordine est
deficcantium. Agglutinatoriorum, secundo vel tertio ordine resiccat. Cicatricem in-
ducentium facultas, prædictas superat. Nam hæc non modo eius quod præter naturam
est redundantiam consumūt, verum etia ei, q̄ secundum naturam est aliquid deradunt,
Priusquam igit vulnus cicatrice possumus obducere, eo vsq; resiccanda caro est, donec
calli similitudinem induerit, & cuti similis euaserit. Quod sane per se, primario, ac pro-
prie, hoc est, peculiari facultate, medicamenta effecerint, quæ adstringendi modice fa- B
cultatem habent: & eiusmodi quidem vt plurimum frigida sunt & sicca. Cuius generis
sunt, *galla immatura, malicorium, id est, mali punici seu granati cortex, balaustium, fructus spinae
Aegyptiae, vel eius loco acatia, rhis, sumach officina vocant, & eius generis vniuersa, qua modice
adstringunt atque deficcant.* Ex accidente tamen, & secundo carnem alterando, & calli in-
star indurando cicatricem etiam inducunt calida medicamenta, q̄ carnem detrahere,
ac colliquare sunt nata, & Gal. li. 5. simpl. ca. 14. *αδαυεννα*, hoc est, detractoria, dicuntur. Vt
sunt *chalcitis, vitriolum album* nominant hodie, *as vstum non lotum, æris squama, & mysi atramentum*
flauum officinis dicitur: & *fissum alumen* quod plumosum officina vocat. Hæc certe vere
primario, & per se cicatricem inducentibus multo sunt valentiora. Mysi quidē, & chal- C
citis præcipue. Mitior autem æris squama, atq; hoc etiam mitius æs vstum: q̄ etiam si la-
uabis, vtiq; minus mordens medicamentum habebis. Vnde si quādo is vti ad cicatricē
inducendam in aliorū penuria cogimur, parcissime ipsis vtemur. Largius enim admota
mordicant, colliquantq; carnē, & vlcus cauum efficiunt. Summū igit tantū specillum,
hoc est, specilli cuspidem, in ea ad exactissimū læuorē tusa dimittemus, ac post velut te-
nuissimū quendā pollinem partibus q̄ cicatrice induci postulant, leuiter eas contingē-
tes imponemus. Quod si illa etiam aduras, vt minus acria, sic ad cicatricē inducendam
reddes magis apta. Si vero etiam laues adhuc fient mitiora: *quemadmodū lib. 3. Ther. meth.*
cap. 5. & 6. copiosissime tradit Galenus. Deformes atq; in decoræ cicatrices teneræ quidem
adhuc, & recentes emendantur admoto diachylo, aut lithargyro nutrita. Lithargyrus
autem nutrita dicitur, vbi tenuissime teritur, ex aceto & rosaceo diu exercetur in mor- D
tario, vt quidam volunt, plumbeo. Modus est, vt inde crassior fermentetur & exsurgat.
Cicatrices nigras tollunt *oleum in quo radix brionia tum candida, tum nigra incocta sit, dñ suc-
cum reddat impositum. Calamintha ex vino cocta, argenti quoq; spuma cū rosaceo albo lota.* Crassio-
res vero & iā inueteratæ reparant *oleo balsamite appposito, vel radice cucumeris sylvestris trita,*
& admota. Quod si iis, aut similibus non tollantur, id totum quod supereminet atq; ex-
crescit, cultro rasorio rescindendum est, vel cauterio admouendum. Atq; ita quidem
faciendum esse, recentiores chirurgi censent.

De vulnere supercrescentem carnem habente. CAP. VI.

Q Vemadmodum cauum vulnus morb. est ex eo genere, quod in magnitudine par- E
tium indecenti ac vitiata spectatur: ita vt vulnus quod supercrescentem carnem
obtinet. Et vt vulnus cauum non vnū est vitium, sed pariter cavitās & vulnus: ita vulnus
supercrescentem habens carnem, non vnus est morbus, sed simul caro supercrescens, &
vulnus. Prior itaq; morbus, qui instrumentarius est, nempe magnitudo vitiata, primam
indicationem, quæ veluti meta est inueniendorum remediorum, nobis insinuat, ipsius
scilicet redundantis, & supra modum excrescentis carnis ablationem. Alter vero mor-
bus, qui vtriq; partibus, tam similaribus quam compositis communis est, nempe soluta
vnio, coniunctionē indicat. Porro ipsa agglutinatio, seu dissidentium coniunctio, vti &
carnis generatio, naturæ quidem opera perficitur. At supercrescentis carnis detractio F
nullum quidem naturæ opus est, sed solis medicamentis, seu medicamentorum quæ
vehementer siccant, & natura acria sunt, ope perficitur. Huius generis sunt atramentū
sutorium, quod Græcis *chalcanthum*, officinis *vitriolum* dicitur, *spongia, radix asphodeli, her-
modactyli, stupa minutim incisa, linamenta epanniculo carpta muria acriori imbuta & resiccata,*
unguentum viride, & id genus alia tum simplicia, tum composita. Ceterum id perpetuo fideli
teri-

A retinendum memoria erit, pro diuersitate temperamentorum, tum corporum, tum partium eiusdem, varianda esse remedia. Eadem enim medicamenta quibusdam naturis carnem excrescentem insunt, aliis vero cicatricem inducunt, aliis glutinatorio minus præstant. Quippe medicamenta, quæ carnem minuunt, proxima sunt, tum iis, quæ valenter deterguunt, tum iis, quæ cicatricem inducunt. Sic ut non pauci interim per errorem medicamentum, quod carnem minuat, vel pro eo, quod sordem deterget, vel pro eo, quod cicatricem inducit, accipiant. Exempli gratia, *myfi & chalcitis*, quæ inter ea, quæ cicatricem inducunt numerantur, si naturæ humidæ applicantur, potius carnem demunt, quam cicatricem inducunt. Adde quod inter ea, quæ tenellam carnem vulneribus supercrescentem colliquant & absument, quædam valentiora sunt, quædam imbecilliora, & mediocria. Quocirca nonnulla mediocres carnes redundantias excedunt. Alia vero carnis immodicas excrescentias minuunt, & usque ad penitiora crustis obducunt. Cuius generis est, quod recipit *calcem viuam, squama aris, & manna thuris pares modos*. De quibus omnibus copiosius *lib. 3. Therapeutica methodi cap. 6. & lib. 5. simplicium, cap. 15.* Galenus differit. Nos etiam infra, *lib. nimirum 7. cap. 5.* vberius de iis dicemus.

Carnis detractoria medicamenta.

De vulnere contuso, & cum alio præter naturam affectu coniuncto, & implicito, CAP. VII.

Vulneris, ut in superioribus est dictum, simplicis, sanatio mediocris siccatio est. At vulneris, quod cum aliquo præter naturam affectu coniunctum est, eius curatio, ut vulneris solius non est, sed prior illius affectus, qui cum vulnere consistit, secunda vero ipsius vulneris. Nam siue phlegmone quæpiam, siue nigritia, siue erysipelas, siue œdema vulneratam carnem obsederit, primum eius molienda curatio est. Verum quod vulnus interim non solum non commode curatur, sed multo etiam maius redditur, id neminem latet. Proinde siue contusa fuerint circumposita vulneri loca, seu phlegmone, aliusue tumor præter naturam in his constiterit, propria eius affectus sanatio inuenienda nobis est: illud pro certo habentibus, fieri non posse, ut vulnus sanetur, nisi locus in quo constitit prius sit sanatus. Ceterum quum hi affectus præterquam quod vulnera ipsa ad malitiam præparant, fluxionem etiam in vnum locum dolentem concitant, ideo etiam si corpus nec sanguine, nec vllō vitiōrum succo redundet, tamen prout res exigit, vel venæ sectio, vel purgatio adhibenda erit. Posthæc ad topica seu localia remedia veniendum. Quocirca recte in contuso, cruciante, & phlegmonoso vulnere feceris, si statim per initia, purgato iam corpore loca circumiacentia illineris vel *rosaceo*, vel *myrtino oleo*: vel vnguento, quod constat *bolo armenio, oleo & aceto*. Supra vero dolentem partem oleum aliquod admouendum, quod vel leniendi, vel molliendi, vel maturandi, ut res exigit, vim habeat. Ponamus igitur carnosam aliquam partem telo, tum cæsam, tum contusam esse: huic sane de Hippocratis in libello de ulceribus sententia, medendum est, ut quam celerrime suppuret. Necessè est enim carnes sic contusas putrescere, ac in pus verti. Vbi vero putrefactæ in pus versæ fuerint, liquari, & tandem nouam carnem nasci oportet. Adde quod hæc curandi ratio obseruata, minus eodem Hippocrate attestante, phlegmone vrgebitur caro ipsa sic cæsa, contusaque. Duo itaque scopi in curando contuso vulnere nobis proponuntur, nempe suppuratio, & nouæ carnis generatio. Porro quum pus fiat cum aliqua putrescentia, & omnia, quæ putrescunt ex calido & humido, sic afficiantur, certe quæ calefaciunt humectantque hisce contusis vulneribus, adeoque omnibus affectibus, quibus pus moueri expedit, admouenda erunt. Cuiusmodi sunt *malua cocta, radix althea, tetrapharmacum*, quod Celso libro 5. cap. 19. teste, ex *cera, pice, resina, & seuotaurino vel vitulino* constat: panis triticeus, hordei farina ex aqua & oleo, item panis ex aqua & oleo: præterea fomentum multæ aquæ calidæ. Hæc enim & similia omnia, quæ sic calefaciunt & humectant, celerrimè pus mouent. De quib. copiosius agit libro 4. Therapeutica methodi, cap. 5. Et libro 5. simplicium, cap. 5. & 8. Galenus. Inter composita vero medicamenta hoc, quod sequitur ad suppurationem in proposito vulnere plurimum conducit. Recipit *radicis althea, cucumeris sylvestris, singulorum unciam dimidiam. Origani sylvestris seu vulgaris, hyssopi, singulorum manipulum semis. Florum chamameli, seminis lini, singulorum pugillum vnum. Ficus pingues sex, uuas passas pari numero. Vna bulliant, ac tandem iis pressis, ac diligenter tuis, adde galbani, myrrhæ, stactes (styracem liquidum vocant) æsypi, singulorum drachmam unam & dimidiam. Sanguinis draconis, adipis porcini, singulorum unciam di-*

Affectus vulneri coniunctus primo sanandus.

Vulneris contusi curatio.

Pus mouentia. Tetrapharmacum.

Malagma

Emplastrum. *midiam*, formetur malagma. Conducit haud parum etiam hoc quod in emplastri formam redactum est. Accipit *foliorum maluarum & violarum, singulorum manipulum unum. Radicis althea, libram semis. Decoquantur in iure carniū absque sale, postea subigantur in mortario, & cribro incernantur.* Ex cribatura, cum prædicto decocto, & farina hordei ac tritici, quantum satis esse videbitur, fiat emplastrum solidum, siue malagma: addendo *butyri, & olei communis singulorum uncias tres. Vitellos duorum ouorum, & croci momentum.* Hoc autem, ut & præcedens malagma, super vulnus, & contusam carnem imponendum est. Vulneri autem medicamentum ex terebinthina resina, & ouorum luteis compositum, imponendum. Ceterum perducto ad suppurationem vulnere, his quæ pus mouent relictis, ad purgatiā & detergentia transeundū erit: ut sunt *tincta in melle linamenta, vel succo apii, & id genus alia.* In omnibus vero eiusmodi vulneribus recte inditur penicillus *melle rosaceo, aut vnguento Apostolorum nuncupato, imbutus.* Supra autem id purgans detergentiue medicamentum aridæ stupæ imponendæ sunt, adaptandaque est deligatura, quæ ad mora medicamenta probe retineat. donec perfecte expurgatum vulnus fuerit. Tum demum vero purum vulnus est, quum rubet, ac nimium, neque siccum, neque humidum est. Ac quodcunque sensu caret, quod non naturaliter sentit, quod nimium aut aridum, aut humidum est, quod aut pallidum, aut albidum, aut liuidum, aut nigrum est, id purum non est. Purgato, ut decet, vulnere, ipsum carne implere oportet, qui secundus erat in curando hoc contuso vulnere scopus. Carnem igitur modo, quo dictum est, generare oportet, & iam impletum vulnus ad cicatricem perducere. Quem scopum facile assequeris, si penicillum indies paulatim imminueris. Ita enim solius naturæ opera, ac citra vllum medicamentum vulnus carne implebitur, & cicatrice obducetur. Quod si caro contusa multum esset dilacerata, & futura utilis videretur, consuatur laxa quadam futura labra retinente. At si labra vulneris ab ambiente alterata fuerint, ac dura, callosaq; appareant, scalpello illa, modo alius nullus obstiterit affectus, corium amouendū dorenouare oportebit, deinde cōsuere. Porro si cæsa contusaq; caro enumeratis modo auxiliis ad suppurationem perducere non possit, videaturq; in gangrænam, ac partis corruptelam degenerare: quod ex tarda difficilique maturatione, & fusco, liuido, & nigro loci laborantis colore deprehendes, vnguentum *Ægyptiacum* nominatum, aut aliquod aliud simile medicamentum, quod ad eiusmodi corruptionem & mortificationem sit idoneum, protinus erit admouendum. Quod si alia quædam symptomata, vel affectus huic contuso vulnere superuenerint, ut dolor, phleginone, aut quouis alius tumor præter naturam, aduersus illa congruis, *de quibus suo dicemus loco,* remediis pugnandum erit.

De Ecchymosi. C A P. VIII.

Ecchymosis quid. **E**cchymosis, siue ecchymoma, sanguinis subter cutem effusio & coitus est, adeoque solutæ continuitatis genus, quod, ut lib. 4. Ther. meth. cap. vlt. testis est Galenus, vna cum contusione, ruptioneue incidit. Adeo ut non fuerit ab *instituto* alienum, si propter asinitatem, quam cum contuso vulnere obtinet, hoc loco *dicto* malo agamus. Incipit itaque interdum hoc vitium cum sola contusione, citra carnis musculosæ in profundo hærentis corpore ruptionem, ex violento, verbi gratia, ictu, vel graui casu. Aliquando vero cum sola ruptione, absq; etiam carnis contusione consistit, veluti quum motu quopiam valente & confertim facto citra graue aliquod extrinsecus incidens, caro dirumpitur. Nonnūquam etiam cum utroq;: ut quum graui, ac duro quopiam corpore, quod extrinsecus superciderit, vel casu ab alto, non modo carnosæ musculorum partes, sine cutis diuortio contunduntur, sed etiam ex distentione violenta, & confertim facta ab-rumpuntur. Tunc n. venis exiguis, in ea sic contusa ac rupta carne, diuortium expertis, sanguis exsilit, vnde ipsa ecchymosis sub cute collecta nascitur. Fit aliquando etiam ecchymosis ex oris vasorum apertione, quam *ἀναστόμωσις* Græci appellant: & ex ea, quæ *ἰσχυρὸν ἀσπληνὸν*, id est *exsilitio*, vel *transmissio*, aut *subsultus*, dicitur. Porro anastomosis, *Galenus libro 5. Therap. method. cap. 2. teste*, accidit propter tum vasis imbecillitatem, tum sanguinis qui ad os impetu ruit, copiam. Adhæc ob acrem quampiam, quæ illi extrinsecus incidit, qualitatem. Diapedesis vero, ex tunica ipsa rarefacta, sanguine autem tenuato oritur. Accidere præterea interim potest & ex gracilium vasorum ore aperto. Ex iam dictis palam fit, sub ecchymosi cōplecti etiam ea, quæ Græcis *πύκνις*, Latinis *sugillata* vocantur.

- A** cantur. Item *liuores ex ictu prouenientes*, Græcis *ἰσχυράματα* nominantur, Latinis vero *vibices*. Ecchymomatis autem apparentes notæ sunt, mollis tumor, & tactui cedens, li- Vibices.
Signa ec-
chymo-
scos.
uidus, & magna ex parte dolore vacans. Propter unitatem vero solutam affatim factam, interdum etiam dolores, & ob sanguinis in profundo concursus abscessus nonnun-
quam insequuntur, qui tamen magna ex parte per halitum digeruntur. Ecchymoma
verò, quod cum contusione accidit violenta, periculo non vacat. Solet enim frequen-
ter, si negligatur, non modo afflicta particulæ, sed & corporis totius corruptionem af-
ferre. At si in contusione, quæ cum ecchymosi consistit, cutis a carne seiuncta maneat
pendula, raro vel nunquam agglutinatur. Proinde satius est, eam præscindere, & exsic- Curatio.
cantia medicamenta ad mouere, vel absque deligatura locum sic relinquere. Aer nam-
que ambiens cutis ipsius instaurationem non mediocriter adiuuat. In curanda vero ec-
chymosi, initio fluentem ad laborantem locum materiam auertere & vacuare conue-
nit. Quod optime fit venæ sectione, quemadmodum omnes artis periti testantur. *Se-*
cundo, dolorem sedare, & laboranti parti, ne fluxionem excipiat, robur adferre, rebus
frigidis, & adstringentibus eam perfundendo atque illinendo, oportet, in quem vsum oui
candidum rosaceo permixtum, loco dolenti & laboranti ad mouendum. *Tertio* sanguis
ipse totus, qui subter cutem effusus est, dissipandus ac resoluendus: idque confestim pri-
usquam ingruerit, & in grumosiæ coierit. Quod factum quidem non difficile erit, si & Propria
ecchymo-
matis cu-
ratio.
sanguis effusus tenuis, & prope summam cutem, non autem in profundo situs fuerit.
Quod si discuti non possit, tum infrascriptis discutientibus medicamentis, tum scarifi-
cationibus educendus erit. Et si nihil iis profeceris, affectus is more abscessuum curan-
dus erit. Quocirca sanguinis sic per contusionem ruptionemque subter cutem dispersi
dissipatio, & vacuatio, propria est ecchymomatis curatio. Hinc est, quod in fine *quarti*
Ther. method. libri Galenus sic scriptum reliquerit: *Sane ecchymosis omnis vacuationem pro re-*
medio curationis indicat. Quare calefacientibus huic, & modice siccantibus medicamentis est opus.
Quippe quæ vehementer siccant, discutiunt illa quidem in principio euidentius, quam quæ sunt im-
becilla: ceterum nonnihil ipsius vitii scirrhusum, curatuque difficile relinquunt. Curandum vero
est, ut ruptis, quæ in profundo hærent corpore, hæc tum vires habeant magis intentas,
tum ipsa magis acria, magisque incidentia sint: tum, ut semel dicam, tanto efficaciora,
quanto magis a cute ad profunda ecchymosis recessit. In talibus sane, nec cucurbitæ
vltus sit inutilis: id enim instrumentum ad violentum attractum a Medicis est excogita-
tum. Verum enimvero quoniam tunicæ venularum, ex quibus sanguis exsiliit, contu-
sæ sunt, per initia sane, *ut Galeno libr. 5. de compos. medic. local. cap. 1. & Paulo etiam visum est,*
nonnihil adstringentium iis, quæ discutiunt, admiscere oportet. Contusæ enim venula-
rum tunicæ aliquam densationem requirunt, ut ad naturalem suum statum reducan-
tur, & ne noua materia ob dolorem attracta ad locum contusum delabatur. Quando-
quidem si solam discutientem facultatem haberet medicamentum initio admotum,
non modo id, quod effusum est, discuteret, sed & per contusionem aliquid sanguinis,
qui in contusis venis continetur, extraheret. Quando vero in naturalem statum venulæ
redierint, tum ad sola discutientia medicamenta citra vllam adstrictionem venire tem-
pestiuum est. Porro in quibus sic modice adstringentium quiddam, nec non per halitum
digerentium miscere conuenit, perspicuum est, imbecilliora primò debere assumi, va-
lidiora autem inueteratis, & iis, quæ nigrescunt, ad moueri. Ad inueterata itaque ec-
chymomata, Paulo etiā auctore, radícula illitu prodest: quippe discutit ea, ubi erodere
inceperit. Vel ipsius radiculæ succus, cum micis panis inductus. Ex moderate discuti- Modera-
te discuti-
entia.
entibus sunt, quæ vino, melle, & sale constant. Itē quæ ex farina hordei, calamintha, & vino
conficiuntur. Quæ ceram & cuminum accipiunt, quæq; ex chamæmeli floribus, meliloto,
stichade, & cumino in vino decoctis componuntur. Præterea, quæ ex maluis, furfure,
absynthio, cumino, aut anetho, aqua vel vino incoctis fiunt. Item, quæ ex farina hordei,
& fœnigræci, & croco, aqua incoctis constant. Solent & potiones quædam parari, quæ Potiones.
si assumantur, sanguinem concretum, & extra vasa effusum dissipare ac resolvere cre-
duntur. Cuius generis est ea, quæ constat bdellio, costo, centaury, & serapio acido, &
huic aliz quædam consimiles, in casu ab alto, offensione, & violento membrorum tractu,
ac distentione offerri consueuerunt. Quum vero totum ecchymoma discussum fuerit,
siccare iam vehementius id, quod ruptum est, permittitur, ac deligatura coniungere, omnia-

que in summa, facere, quæ ut vlcus coalescat efficiant. Ergo si discussum celeriter totum A
ecchymoma sit, facile coalescit ipsa caro. Sin longiore spatio, sordes multa subnascens,
medium inter vlcis labra spatium occupat, ita ut iam coire ruptio non possit. Atque
inde adeo fit, ut qualibet leui de causa nos hæc sui admoneant. Nam siue quis obrigit,
siue parum concoxit, siue febris laborauit, siue se vehementius fatigauit, eiusmodi parti-
culis illico dolet. Non enim in idem coire eruptionis labra, sed tantum prope sunt ad-
mota. Quo fit, ut leuis occasio ea facile separet, & medium locum superuacuo humore
repleat. Et quid quæso aliud quam assidue nouum ecchymoma his gignitur, & primo illi,
quum videlicet primum caro est rupta, persimile? nisi quod nunc ex tenui magis sanie
constat, quàm a principio e sanguine ecchymoma esset: ideoque facilius etiam nunc, quam
intra initia discutitur. Quæ singula etiam Galenus *cap. ult. libri Ther. method. 4.* docet. B

De vulnere ex morfu vel ictu animantium tum venenatorum, tum rabidorum. CAP. IX.

Morsus
ictusque a-
nimanti-
um dupli-
ces.
Venenati.
Non ve-
nenati.
Signa.

Morsus ictusque animantium duplici constant differentia: alii enim sunt venenati,
alii minime. Venenati dicuntur, qui a virulentis feris inferuntur, ut sunt serpentes,
canes rabiosi, scorpio, mus araneus, & id genus aliarum ferarum. Non venenati sunt, qui ab ani-
mantibus non ita virulentis infiguntur, cuiusmodi sunt canes domestici, simia, homo,
fues, equi, & similes. Porro venenatos morsus aut ictus sequentibus notis deprehendes.

Vulnus infixum valide dolet, punctiois & mordicationis sensus vehemens in afflicta
parte perferitur. Vulneris atque laborantis loci color perit, ac mutatur: aut enim ru-
bet atque inflammatur, aut liuet, vel nigricat. Laborans grauib. angitur molestiis, ac
totus ardet. Præterea vniuersum eius, qui ictus est corpus ita nonnunquam obtupe- C
scit, ut tangentem non sentiat. Verum nihil fere in iis perpetuum est. Neque enim do-
lor semper vehemens adest, aut atrociter molestans in omnibus eiusmodi ferarum ac
bestiarum venenosarum ictibus aut morfib. sed in quibusdam satis remissus est, ut in
morfucanis rabiosi. Virulentorum autem omnium animantium morsus generalis &
communis medendi ratio gemina, Galeno *lib. 13. Therap. method. cap. 7.* teste, indicatio-
nem habet, nempe liquoris virulenti vacationem, & eius quod dolorem creat altera-
tionem. Virus autem ei aculatum vacuant, tum ex calefactoria medicamenta omnia, tum

Virus va-
cuan-
tia.

que citra calefactionem vehementer trahunt: veluti & cucurbitule, & cornua quædam,
quibus nonnulli cucurbitularum vice vtuntur. Sunt autem & qui ore suo virus extra-
hunt, ægræ videlicet particulæ admoti, ipsumque vulnus labiis complexi. Huc sane perti- D
net & cauterium, & medicamenta, quæ cauteriis similiter crustam efficiunt. Atque omnia
totam eius, quod infestat substantiam exinaniunt. Alterum auxiliorum genus est eorum,
quæ qualitatem per contrariam qualitatem alterant: scil. exhibentibus nobis, si vehe-
mentem calorem æger vel in ipso demorso loco, vel in toto corpore sentiat, auxilia re-
frigerantia. Sin frigus sentiat, calefacientia. Proinde primis statim diebus (deinceps e-
nim frustra adhibentur: quod virulentam illam materiam, quæ iam ad intima penetra-
uit satis euocare nequeant) quæ venenum extrahunt atque eliciunt medicamenta, admo-
uenda erunt. Prius tamē supra vulnus, membrum id quod vel morsum, vel ictum est, de-

Membru
demor-
sum supra
vulnus de-
ligandum.
Oris su-
ctio.

ligandum erit: non tamen vehementer, ne torpeat. Hac enim deligatura impediens, ne
tam subito virus interna subeat. Quod si itaque leuior morsus ictusque est, oris suctio appri- E
me conuenit. Homo igit aliquis statim adhibendus est, qui vulnus exsugat. Sugentē ve-
ro ieiunum non esse, sed & cibum summisisse, & vino os colluuisse, necesse est: postea exiguum
olei in ore continens, ictum exsugat, & exspuat venenum. Cauere etiam oportet, ne qui
vulnus id exsucturus est, internam aliquam oris partem exulceratam habeat. Siqui-
dem venena, ut supra ex Celso retulimus, non gustu, sed in vulnere nocent. Sed & locus
ipse priusquam exsugatur, spongia in poscam calidam immersa, fouendus, ac proluendus
erit. Alii vulnus abluendum aqua censent, in qua coctum sit chamæmelum, & syluestris
lapathi radix. Sunt qui gallinarum, aut aliarum quarundam auium podicem vulneri
admovent ad virus exsugendum. Quod si quæ applicatæ fuerint volucres moriantur, F
venenum extractum esse suspicantur. Post hæc vero cinis aceto subactus pro cataplas-
mate imponatur. Maxime ad hanc rem conducit cinis sarmentaceus, id est, ex lignis vi-
tis: vel ficulneus, aut laurinus. Qui si non adsit, eo qui haberi potest, vtendum est: dilige-
tia ad hoc potissimum adhibita, ut phlegmone in loco excitetur, & materiam ad morsum
euocentur. Morfib. vero aut ictibus venenatis magnis ac vehementioribus commo-
de illi.

Medica-
menta
magnis
morfibus
congrua.

- A** de illinuntur cepæ, cum sale, & ruta, sinapi quoque & animalium quorundam stercore. ^{Medica-} Item iuglandes nuces, cum alliis, tam sylvestribus, quam sativis coctis tritis, & cum fer- ^{mēta ma-} mento, oleo, sale & melle mixtis. Emplastra quoque, & cataplasmata ex dictamno, & a- ^{gnis mor-} liis medicamentis calefactoriis, quæ vehementem trahendi vim habent, apparatus. Plu- ^{ribus con-} rima enim ex iis non modo virus ipsum potenter eliciunt, sed & vulneris oras latas & ^{grua-} hiantes seruant. Neq; enim permittendum, ut hæ cito coeant, aut committantur. Præ-
ter opinionem autem facit, Aetio attestante, theriace Andromachi emplastri modo
imposita. In magnis quoque, ac vehementioribus, tum ictibus, tum moribus potens est
hoc subsequens emplastrum, quod acrioris est potentia. ^{Empla-} Recipe galbani, sagapeni, opopa- ^{strum.} naci, assæ, fetida vocata, myrrhæ, piperis, sulphuris, singulorum semunciam. Stercoris columbini, &
B anatis, singulorum uncias duas. Calaminthæ, mentastri, singulorum unciam unam. Dissolvantur ^{Cucurbi-} gummi in vino, & in vnum misceantur omnia cum melle, & oleo antiquo, & fiat em- ^{tula.} plastrum. Præterea in vehementiori morfu cucurbitulam cum largiori flamma ad vul-
nus affigito. Sed antea circumstantia loca altioribus vlcusculis scarificato, quo scilicet
plus vitiatæ sanguinis extrahatur; & ut hac lege prohibeatur, ne venenum membratim
insinuetur. Si cucurbitula non est, tum quodlibet simile vas, vitrum verbi gratia, quod
idem possit, admoueatur. Optime autem auxiliantur, si statim in principio post amotas
cucurbitulas, super vulnus imponantur & coeoluantur animalia parua discerpta, & per
medium diuisa, intus adhuc calentia: veluti sunt gallinaceus pullus, sed mas præsertim,
hoedus, agnus, & porcellus. Sic vero calida eorum statim caro percusso loco imponen-
C est, ut pars interior corpori iungatur. Venenum enim exsugunt, & dolores leniunt. Fe- ^{Vitio.} re autem inter cetera animantia magis profunt *gallarum pulli*: quippe qui calidiore
natura sunt præditi, argumento quod deuoratum insigne virus eliquent, & aridissima
quæq; semina consumant. Item nonnūquam harenas lapillosq;, quos faucibus insinua-
rint dissoluunt. Proinde animantis caloris, spiritus ictæ partis imperum capefens, vene-
num extrahit. Quinetiam vltio, aduersus virulentos morsus, quum locus nervosus non ^{Vitio.}
est, & tuto inuri potest, expeditissimum censetur auxilium, utpote quum ignis cetera vi-
ribus præstet: simul quod virus domet, ipsiusq; vires hebetet, & penitus ferri, hoc est, ad
intima illabi non patiat: simul quod pars ignem experta, deinceps non vilem, nec in-
decoram loci instaurationem efficiat, manente diutius exulceratione. Præstat etiam ^{Membri}
D interdum membrum, quod a virulenta fera ictum est, præcidere & amputare. Sic me- ^{de morfu}
moræ prodidit *libro 3. de laborantibus locis cap. 7.* Galenus vinitorem quendam a vipera ^{amputa-}
morsum, ubi feram agnouisset, confestim læsum digitum sibi falce abscidisse, atque in ^{tio.}
totum sic periculo liberatum fuisse. Porro ei vulnere quod expertum ignem non est, ea
medicamenta, quæ vehementer exedunt, quæque adurunt, & crustas vlceribus indu-
cunt, adhibenda. Et animaduertendum ex eo tempore, quum crustæ, quæ vel per ignem, ^{Vulnera}
vel adurentia medicamenta inductæ sunt deciderint, ne vulneris oræ coalescant, & ci- ^{ex virulē-}
catrice obducantur. Apertas enim longiori esse tempore conuenit, quo virosa mate- ^{to morfu}
ria semper effluat, non autem intus contineatur, & ad intima se insinuet. Id autē prom- ^{in longū}
te præstabit vulneribus indicium *salsamentum, & sylvestre allium detritum, item cepa, & id ge-* ^{tempus}
E nus alia. Si vero ante legitimum tempus cicatrices committantur & coeunt, manum ^{prorogā-}
postulabunt. Quare eas diducere, carnemque scalpello circinare, aut iterum inurere ^{da.}
expediet. Vbi autem legitimum tempus præterit, vulnus ad cicatricem perducendum
erit. Atque hæc est communis morfus ictusue animantium venenatorum medendi ra-
tio. Peculiarem vero singulorum venenatorum vulnere curationem ex Dioscoride,
Aetio, Paulo, Celso, & id genus aliis auctoribus petant studiosi. De iis enim hoc loco,
quod rarissime accidunt, scribere superuacaneum iudicamus. Prætermisiss igitur aliis
omnibus, de eo tantū, quod a rabido cane infertur, agemus: quod hoc animal frequens,
& plane domesticum sit.

De morfu canis rabiosi. CAP. X.

- F** Q Vum canis animal sit, quod domi homines alunt, & rabie sæpius corripiatur, adeo-
que tale, a quo difficile sibi cauere possit homo, ideo reliquis feris venenatis præter-
itis, de vnius rabiosi canis curatione dicemus. Et quia periculū maximum ac ineuitabile
hominē a cane rabioso manet, ideo notas quibus is dignosci queat, initio exponemus. ^{Canis ra-}
Rabiosus canis potum & escam auersatur, *Dioscoridis etiam libro 6. cap. 35. nobis suffragante* ^{bio finit}

testimonio : siti premitur, neque tamen bibit : anhelat plurimum, idque exserta lingua : A
aures inclinat, largam spumantemque pituitam naribus & ore proicit. Mutus præter-
ea in totum est, & veluti infans, ut ne domesticos quidem agnoscat. Torue, & solito
tristius intuetur, in omnes passim sine latratu irruit, & æque feras hominesque, tam fa-
miliares quam ignotos mordet. Vbi autem momorderit, protinus nihil infestum infli-
git, præterquam ex vulnere dolorem. Progressu autem temporis morbus ille, qui ab a-
quæ metu *ὑδροφοβία* appellatur, exoritur. Miserrimum sane morbi genus, ut *Celsi verbis*
utitur, in quo simul æger siti, & aquæ metu cruciatur. Porro magna ex parte circa quadra-
gesimum tere a morfu diem, solet hic morbus ingruere, quibusdam & post sex menses:
aliis proditum est post septem obuenisse. Sunt & qui post annum vnum, vel etiam duos
interdum a morfu impresso, morbum hunc erumpere testentur. Narrant & aliquos post B
septimum annum hoc aquæ metu fuisse tentatos. Quo fit, ut qui a cane rabido morfi
sint, non valde tuti esse videantur. Non enim statò definitiq; tempore post morsum a-
quæ pauor exoritur. Quum itaq; non confestim a morfu huiusmodi aquæ metus homi-
nes inuadat, quidam decepti canem qui momorderat non fuisse rabie percitū arbitrati
sunt, & proinde vulnere cicatricem inducere properarunt. Atq; hoc pacto ipsimet hu-
ius mali auctores, sibi perniciem attulerunt, dum scilicet huic malo causam dederunt.
Hac autem vsus probatione atq; experientia, facile deprehendes, rabiosus sit canis, nec
ne, qui momordit. Iuglandibus nucibus concisis, & accurate tritis, vulnus diligenter ob-
struito, & postea circumligato: sequenti die ablatas, gallinaceo aut gallinæ in cibo appo-
nito. Ac primum quidem non attingent: fame autem urgente, si eas vorauerint, rem at- C
tentius considerato. Nam canis qui momordit, si non fuerit rabiosus, sospites, ac super-
stites aues, quæ nuces illas deuorauerint, permanebunt: sin contra rabie correptus fue-
rit, postera die peribunt. Atq; tunc ad vulneris dilationem properandū erit, iterumq;
post paucos dies eadem experientia vtendum: & si non perierint gallinacei, tunc vul-
nus ad cicatricem perducemus, nullum iam veriti periculum. Si itaq; rabiosus canis fue-
rit, cucurbitula virus eius extrahendum. Deinde si locus neq; nervosus sit, vulnus id ex-
urendum. Si vri non potest, sanguinem homini mitti, ut *Celsus lib. 5. ca. 27. testatur*, si qui-
dem plenitudine laboret, non alienum. In summa, omnia ea agenda, quæ in superiore
capite sunt exposita. Quidam post rabiosi canis morsum protinus, ut *Celsus loco citato*
scribit, in balneum mittunt, ibique patiuntur desudare, dum vires corporis sinunt, vlce- D
re ad aperto, quo magis ex eo quoque virus destillet, deinde multo meracoque vino ex-
cipiunt. Quod omnibus venenis contrarium est. Solet autem ex eo vulnere vbi parum
occursum est, aquæ timor nasci. Quo quidem malo oppressis vnicum remedium, *Celsus*
attestante, est, nec opinantem in piscinam non ante ei prouisam proicere. Et si natandi
scientiam non habet, modo merum bibere pati, modo attollere. Si habet, interdum
deprimere, ut inuitus quoque aqua satietur. Sic enim simul & sitis, & aquæ metus tolli-
tur. Sed aliud periculum excipit, ne infirmum corpus in aqua frigida vexatum, nervo-
rum distensio absumat. Id ne incidat, a piscina protinus in oleum vel solum calidum
dimittendus est.

De vulnere cum sanguinis profusione ex venis & arteriis. C A P. XI.

Causæ. H Aftenus de vulneribus, quæ carnosiss partibus incidunt, diximus: nunc de iis, quæ
in arteriis & venis fiunt, vulneribus agemus. Profluit autem ex vena vel arteria san-
guis, aut tunica earum diuisa, aut resecato earum ore. Fluor autem sanguinis ex diuisio-
ne tunicæ venarum, aut arteriarum, sunt *vulneratio, contusio, rupcio, erosio*. Quæ autem vul-
nerant, ea sunt acuta, atq; ad secandum habilia: cuiusmodi sunt *sagittæ, & gladii*. Quæ cō-
tundendo soluunt, ea grauiora, duraque sunt: ut lapides, aut quæ piam grauis molēs. Quæ
rumpunt, omnia id tensionis interuentu faciunt. Idem & intensior actionis vehemen-
tia, succi abundantia, non utique virium respectu, sed quæ quum a vase suo non conti-
netur: etiam casus ab alto, & graue quippiam durumque incidens. Erosio autem venis
arteriis intrinsecus saltem accidit, ex succo aliquo cui mordens natura insit: ut est *flaua* E
bilis, vel atra superaffata. Ex iis itaque manifestum euadit, quod venæ & arteria vulnerari
non possunt, quin cutis & caro vulnerentur. Signum venæ atque arteriæ incisæ, est san-
guinis profusio. Quod si sanguis cum impetu, ac saliendo profluat, & tenuis ac flauus
feruensque appareat, arteriam diuisam esse significatur. Si vero crassior & nigrior con-
spiciatur,

- A** spiciatur, ac quiete sine pulsu & citra saltum effundatur, indicium est ipsum à vena effluere. Quum vero sanguinis profusio sit periculosa (nisi enim supprimatur, mortem adfert ineuitabilem) ideo in eius curatione celeritate opus est. Quinque autem potissimum sanguinis profusio sistitur. Primum iis, quæ fluxionem auertunt, tum reuolendo, tum deriuando. Ex iis autem, quæ sanguinis profluuium auertunt, tam a venis, quam arteriis sanguinem fundentibus, quædam id efficiunt citra ullam extra corpus vacuationem, alia vero cum vacuatione. Citra vacuationem fluentem e vasis sanguinem auertunt, & alio trahunt, cucurbitulæ leues, hoc est, citra scarificationem, & cum flamma admotæ. Item frictiones, & ligaturæ seu vincula, primum in propinquo-ribus partibus, dein in remotioribus adhibita. Cum vacuatione autem auertitur, at-que ad alias partes conuertitur sanguis, tum ad proxima deriuatus, tum ad contraria reuulsus, vena in ea parte incisa, quæ e directo profusioni respondet, quæque ipsis partibus sanguinem fundentibus coniuncta est. Vbi autem paululum detraxeris, mox vnam horam intermittens, rursus modicum quid detrahes, post iterum atque iterum pro laborantis viribus, *quemadmodum fufius lib. 5. Ther. method. capite 3. Galenus docet.* Secundo, sanguis profluens infrenantibus, atque fluxionem intercipientibus sistitur. Horum quædam hunc sistunt incrassando, ac inspissando: vt sunt *lentes, oriza, cotonea, & in vniuersum omnes fructus adstringentes.* Alia stupefaciendo, veluti aqua frigida, tum epota, tum circa locum ex quo profluit sanguis proiecta, & adfusa, non autem supra vulnus ipsum. Vulneribus namque, *Hippocrate attestante*, frigidum mordax. Sed & posca, & vinum acerbum, aliaque quæcunque vel adstringendi, vel postremo refrigerandi vim habent. Item syncope, seu animi deliquium, utpote propter sanguinis ad interiora reuocationem totum corporis habitum refrigerans, affluere sanguinem prohibet. Quæ singula loco nuper citato, cap. 5. *Galen. copiosius* docet. Et ante eum Hippocrates, qui lib. 6. *Epid. par. 7. aph. 3. ita* scriptum reliquit: *Sanguinem e venis & arteriis promanantem sistunt, animi deliquium, figura alio tendens, interceptio, linamenti in orbem conuolutio, appositio, & deligatura.* His peractis, adeoque sanguinis confluxu auerso, atque aliorum translatore, tertio ipsius vulneris labra in idem adducenda sunt nostrarum manuum opera: vbi sic ad manum vulnera se exhibent, tum per deligaturam, tum vero per ea remedia, quæ refrigerant & adstringunt. Neque enim scire possumus arteriæ venæue vulnera, veluti dicerent, qui nullam a vulneratæ partis substantia naturaque indicationem sumi aiunt. Non erit itaque absurdum, si vulneri puluis adstrictorius aspergatur, & stupæ oui candido liquore, & puluere aliquo adstringente imbutæ superimponantur. Quibus rite peractis, membrum laborans deligendum erit, & situ appposito collocandum. Appositus autem vulneratæ partis situs est, *Galen. loco citato teste*, vt dolore pars vacet, & sursum spectet. Si vero vel prona spectet, vel doleat, nõ solum profluuium non sistetur, sed etiam si non sit prouocabitur. Obstruetur, occludeturue etiam sanguinem fundentis vasis osculum, & sanguine ipso concreto, seu in grumos conuerso, & iis, quæ foris illi imponuntur. Grumosus enim sanguis osculum vasis fundentis sanguinem obstruit. Possunt autem superimponi, tum carnosæ ipsæ, quæ circa vulnus sunt partes, tum in nonnullis vulneribus ipsa cutis, ad hæc quæcunque ipsi comminiscimur. Ea sunt linimenta, & medicamenta ea, quæ idcirco, quod ex lenta crassaque substantia consistant, meatus obstruunt, Græci *ἐμπλαστὴν ἐμπλαστὴν* vocant. Linamenti autem vtendum primum siccis: deinde si hæc parum proficiunt, acetum, vel iis medicamentis, quæ sanguinis supprimendi facultatem habent imbutis ac madefactis, supraque spongiam ex aqua frigida expressam imposito, ac manu superposita eam comprimito, vel alligato, & post hæc membrum apposite, *vt dictum est*, collocato. Medicamentorum autem emplasticorum, & lenticia sua meatus obstruentium, sanguinemque sistendi vim habentium optimum est, quod a Galeno in libro toties citato, cap. 4. describitur, & accipit: *Thuris partem unam aloes, partis vnius semissem.* Mox autem quum vtendi tempus instat, tantum huius pulueris cum oui candido subigendum, quærum mellis reddat crassitudinem. Hoc dehinc leporis mollissimo pilo excipitur, deinde tum vasi ipsi, tum vulneri toti liberaliter imponitur. Alligandum autem id forinsecus fascia ex tenui linteo, cuius fasciæ primi quatuor quinqueue amplexus ipsi profluenti vasi iniiciuntur. Ab hinc vasis radicem versus ducentur, in quibus videlicet partibus radicem versus ducere licet. Licet autem fere in omnib. præterquam cerebri mem-

Curatio.

Quinque sanguinis profusio sistitur.

Auerentia.

1. Cucurbitulæ leues.

Infrenantia.

2.

5. Aph. 20: & 23.

Vulnera occludentia.

Venarum & arteriarum vulnera sui nequeunt. Situs vulneratæ partis appositus.

Localia remedia.

Medicamenta emplastica.

Radix va-
sis.
Puluis.

branis. Radicem autem vasis, cum Galeno vocamus priorem eius partem, quæ velociori propior est, vel etiam cordi. Hæc in collo ab interiore ista parte, in manibus & crucibus a superiore. Laudatur & hoc medicamentum, quod recipit: *Boli armenii, sanguinis draconis, thuris, alres, succo citrina, pares portiones.* Terantur in puluerem: qui apponitur, ut comprehensum est. Ceterum medicamentis iam dictis ad motis, ante tertium diem deligatura soluenda non erit. Vbi autem tertio die solueris, si tuto adhuc medicamentum emplasticum vulnere adhæret, aliud rursus super ipsum accommodabis, ac veluti linamentum id quod ex pilis factum in hæsit madefaciens, deligabis ita ut initio deligasti. Sin prius sua sponte reiecerit linamentum radicem vasis digito blande comprimens, ne videlicet quippiam confluat, hoc quidem suspenſa manu ac sensim adimes, atque alterum impones. Adhunc modum quod carne obducetur, ac munietur vas curare debebis, utique a principio ad finem usque particulam supinam seruans. Sit tamen figura situs mediocris. Vitandum enim, ne dolor incidat, ac rursus profluuium exciter: quum nihil sit quod profluuium magis quam dolor proritet, & phlegmonas augeat.

⁴
Crustam in
duccoria.

Quarto, sanguinis e vasis excretio sistitur per medicamenta, quæ crustam efficiunt, *ixæmna* Græcis vocantur. Quippe hanc quoque ceu septum quoddam huiuscemodi vulneribus veteres excogitarunt. Maxima vero necessitas vel crustificis medicamentis, vel ignitis ferramentis, *Galeno citato in loco teste*, utendi est, ubi ex erosione putrescencia cuius profluuium sanguinis concitatur. Hic certe modus sistendi sanguinem perficitur, tum candentibus ferramentis, tum medicamentis crustam inducentibus, quibus cum calore adstringendi facultas est coniuncta. Cuius generis sunt *chalcanthos, misy, & chalcitis, siue iis vstis siue inustis utaris.* Quæ autem ex calce viua, id est, non extincta conficiuntur, valentiora quidem his sunt: ceterum quia adstringendi vim non habent, crustæ quæ ab ipsis sunt, citius decidunt. Hærent autem diutius, quæ ab adstringentibus. Quod utique est longe vtilius, quando ita prius nascitur in imo earum caro, efficiturque profluenti vasi velut operculum. Vnde nec nosmet præcipientes esse, veluti nonnulli sunt, ad crustas detrahendas oportet, ubi profluuii sanguinis periculum imminet. Si enim properes illas detrahere, tantum inde accidit interdum sanguinis profluuium, ut vix cohiberi queat. Quocirca adustio facienda est ferramentis vehementer ignitis, & valenter in profundum adactis, quo crassæ ac profundæ crustæ fiant, quæ nec facile separentur, atque decident. Hinc sunt, qui crustificis omnibus præferunt *arsenicum*,

Arsenicum
sublimatū.

⁵
Præcisio va-
sorum.

ut vocant, *sublimatum*, idque ideo, quod protinus omnem sanguinis profusionem sistat, & altam, ac diutius hærentem crustam indicat. *Quinto*, sanguis sistitur, si totum vas sanguinem fundens per transuersum præciditur. Huius autem necessitas, *ut loco iam sapius citato testatur Galenus*, in iis maxime incidet, quæ ex profundo loco recte assurgunt, præsertim per angustas, vel principes partes. Quippe ita retrahitur ex utraque parte, pars utraque, celaturque, ac integitur superiacentibus corporibus vulnus. Post hæc pulvis aliquis sanguinem cohibens vulnere inspergendus, & stupæ vel spongia medicamentis facultatem supprimendi sanguinem habentibus imbuta superalliganda erit: & figura particulæ vulneratæ accommoda, adhibenda. Tutius tamen est, vinculum seu funiculum vasis sanguinem fundentibus iniicere. Proinde si alia auxilia profluuium compescere nequeant, vasa nudanda sunt, & hamulo apprehensa, mox funiculo aliquo gracili, ut filo serico, excipienda, ac fortiter stringenda sunt. Post medicamentum agglutinans vulnere apponendum erit, & membrum fasciis, ut oportet deligandum, situque appposito collocandum. Vinculum autem radici vasis iniiciendum erit. His peractis, implendum carne vulnus quam primum est, priusquam funiculus a vase decadat. Nisi enim producta caro prius locum, qui circa præcisam arteriam est impleuerit, si locus aliquis vacuus superfuerit, utique quod Græci *ἀρτηρομα* dicunt, comitatur. Vbi itaque vas vinculo es complexus, aut ferramentis ignitus usus, illudque tibi curationis propositum restat, ut quæ circa vulneris labra sunt carne impleas, iidem omnino medicamentis utendum erit, quæ in caui vulneris curatione sunt dicta. Siccioribus autem medicamentis, ut hoc etiam adiciamus, eget arteria, quam cioribus quæ vena, quanto ipsa est suapte natura siccioris temperamenti, quam vena: quemadmodum hæc omnia Galenus copiosissime *libr. 5. Ther. methodi, præsertim eius capit. 7.* prosequitur.

Arteria sic-
ciorib quæ
vena medi-
camentis
egret.

De punctura nerui, seu punctim vulneratis neruis. C A P. XII.

Nerui, Galen. libr. 6. Ther. method. attestante, quandoque punctim, quandoque cæsim vulnerantur. Eorundem quoque vulnera interdum sine contusione, interdum vero cum contusione accepta sunt. Ex puncturis autem quædam hiant, atque apertæ sunt: quædam cæcæ atque occlusæ manent, adeo ut earum ora sic conniueant, ac inter se coeant, ut conspectum effugiant. Quarum omnium vulnerationum causæ sunt ea, Causæ. quæ incidunt, pungunt ac penetrant, & contundunt. Neruis autem vulneratis aut punctis, ex sentiendi, quod obtinent, acumine, phlegmone, & ingens dolor accidit. Signa Quare & febres conuulsiones iis oboriuntur: quibusdam & delirium, ob neruorum cum cerebro consensum. In nerui autem puncti, *de quo in hoc capite præcipue agimus*, curatione, Curatio. neque vnitionem moliri statim oportet, neque coacta, siue in vnum coniuncta conseruare. Quin potius vulnus apertum, inglutinatumque custodire. Itaque infixæ duntaxat, si quæ neruis inhæserint, extrahenda, & oblæxæ particulæ substantia seruanda. Ceterum qua ratione infixæ sint euellenda, *capite primo, huius libri abunde est expositum.* Partis vero ipsius laborantis, hoc est, puncti nerui substantia optime seruabitur, si & dolori, qui ob exquisitum & excellentem laborantis partis sensum vehementissimus excitari solet, sedulo, ac mature occurramus, & phlegmonem fieri prohibeamus. Quæ sane duo necessario, nisi obstiterimus, nerui puncturam consequuntur, & subinde conuulsionem accersunt. Proinde ut geminum hunc scopum assequamur, hoc est, Vitæ ratio. dolorem ac phlegmonem prohibeamus, primum necesse erit, ut is cui neruus punctus est, victu extreme tenuissimo vtatur. Locus etiam, in quo ille cubabit, repidus esse debet, quum frigidus neruis maxime aduersetur, calidus vero phlegmonem accersat. Lectulus vero mollis sit. Sed & pars ista certa ratione collocari debet. Optimum etiam est, laborantem quiete vri: moueri enim & ambulare, nisi sanis, alienum est. In quiete igitur, ac lectulo molli hominem continere oportet. Secundo loco materiam, quæ Materiæ confluentiæ subtractio. doloris ratione ad laborantem locum confertim confluere potest, subtrahere oportet. Qua quidem in re Galeni nobis omnino sequendum consilium, qui libro sexto, Ther. method. capite secundo, iubet in nerui punctura totum corpus sanguinis missione inanendum esse, utique si virtus robusta fuerit, & nihil aliud obstiterit, etiam si nulla adsit in laborante corpore sanguinis redundantia. Morbi enim magnitudo, ac doloris Sanguinis missio. vehementia, corpore etiam nequaquam plethorico existente, hoc genus auxilii plerumque, *ut copiose capite octauo, libri de curandi ratione per sanguinis missionem Galenus ostendit*, desiderat. Porro in hac per sanguinis missionem vacuatione, partium rectitudo & consensus, ut alibi fufius docuimus, semper seruandus erit. Quod si vero vitiosis humoribus corpus refertum sit, protinus, *eodem Galeno teste*, illud congruo medicamento purgandum erit. Purgatio. Leuis etiam frictio recte adhibetur, sed his partibus, quæ a vulnere longius absunt. Tercio loco dolorem plane sedare, & æruginosam saniem educere oportet. Quapropter quæ vulneri imponuntur medicamenta ad vtrumque sint comparata, tum ut dolorem mitigent, tum ut exitum saniei patefaciant. Tutius vero fuerit etiam in neruis Doloris sedatio. acu, aut pexillo, aut quopiam tali compunctis, præsertim si in altum punctura descendit & conspectum effugiat, cutem in vulneris orificio aperire, ac latius incidere, quo melius sanies effluat, & commodius ad profunditatem loci, medicamentorum vires perueniant. Porro aliis cultro rasorio, aliis vero cauterio cutem ipsam aperiendam esse, magis placet. Galenus in id genus puncturis, orificium duabus in cutem sectionibus rectis diuidere, *lib. 3. de compos. medic. generalium* præcipit. Proinde nisi oræ angustiorum eiusmodi punctuum aperiantur, conuulsiones periculum imminet: quod scilicet obcæcato ita cutis vulnere, nihil a profundo extrorsum expiret. Facta autem cutis apertione, mox vulnus exsiccandum est aliqua substantia tenui, ac modice excalescente, adeoque citra dolorem exsiccante: quum sola hæc ex profundo trahere saniem, neque contracta, neque demorsa particula, possit. Cuius quidem generis est oleum Sabinum, Puncturæ dilatio. præsertim vetus, quod tanquam vtilissimum ad præsentem curationem. *lib. 6. Therapeutica methodi, & 3. de compositione medicamentorum generalium* Galenus deligit. Vitandum autem omnino est oleum crudum, & quod adstringendi vim habet, cuiusmodi est oleum myrtinū, tribus saltem primis diebus. Hoc enim per halitum non digerit, sed obstruit, & perspiratum prohibet. Præstat igitur neruos punctim ictos tenui oleo, & adstrictione

Prigida ner-
uis non ad-
hibenda.

s. aph. 18.

Doloris se-
datio.

Remedia
per metho-
dum inue-
nta experien-
tia confir-
mare de-
bet.

Emplaſtrū
Galen.

Conuulſio-
nis pręui-
ſio.

Vnguentū.

Si nerui vul-
nerati phle-
gmone oc-
cupentur,
aut putre-
ſcant.

prorſus carente, perfundere: quale dulciſſimum eſt, quod longe melius erit, ſi duos aut A
tres annos tranſegerit. Sed neque Sabinum etiam ipſum oleum, quamuis ſit tenuiſſi-
mum, aut aliud quoduis ſimile, frigidum ad mouendum eſt, calens: frigidum namque,
præterquam quod neruis aduerſatur, Hippocrate atteſtante, tenues quoque meatus ob-
ſtruit, & ipſos anguſtiores efficit: calidum vero diſcutit, ac dilatat, doloresque magis
demulcet. Si vehemens dolor laborantem diſcruciat, oleum ex vitellis ouorum com-
mode adminiſtratur. Eandem ob cauſſam Galenus ſæpe uſus eſt terebinthina reſina,
per ſe quidem in pueris, ac mulieribus & generatim iis qui molli eſſent carne: cum eu-
phorbio vero emollita, in duris corporibus. Non ſecus autem & propoli, non per ſe
modo, verum etiam cum euphorbio ipſam molliens, uſus eſt. Quod ſi durior eſſet, cum
tenui quopiam oleo. Quin & ſagapeno in duris corporibus uſus eſt Galenus, utiq; cum B
oleo & terebinthina id miſcens. Sed & opopanace ad eundem modum, quo & ſagape-
no. Mihi vero & lacryma, inquit Galenus, Cyrenaica non inutilis fore videtur, ſi quis
emplaſtrum ex ea faciat, cuiuſmodi eſt, quod nos ex *Euphorbio* compoſuimus. Verum,
inquit, nondum id experientia, *quemadmodum reliqua omnia*, comprobauimus. Quippe
præcedere oportet eam, quæ a vera methodo proficiſcitur, remediorum inuentionem:
huic vero experientiam, ad certiorem etiam fidem ſubſcribere. Siquidem ex tali me-
thodo etiam ſulphur, quod neque ignem expertum, neque lapidoſum ſit, ſed omnino
tenuium partium, ei, cui neruus vulneratus eſſet, conductionem ſperauimus, tantum e-
ius tenui oleo miſcens, dum quod ex utriſque mixtum erat ſordium haberet craſſitu-
dinem. In valentioribus vero durioribusque corporibus etiam ſi ad mellis craſſitudi-
nem redigas, ſic quoque iuueris. Nam id quoque experientia comprobatum eſt. Re-
cenſet etiam alia quædam remedia ad inſtitutum noſtrum accommodata loco citato Ga-
lenus, quæ apud eundem reperire licet. Inter multa vero alia emplaſtrum ſe ex cera, re-
ſina, terebinthina, pice & euphorbio compoſuiſſe refert, quo plurimi ſua ætate Medi-
ci felici ſucceſſu uſi ſint. Recipiebat autem ex cera partem vnā: ex terebinthina & pi-
ce, utriuſque partis vnus dimidium: ſic ut quod ex utriſque conſlaretur, ceræ par eſſet: ex
euphorbio vero ceræ partem duodecimā, etiam plus aliquando, ubi ſcilicet valentius
efficere eſſet in animo. Licet autem interim & plus ſit, quod ex terebinthina & pice
conſit, quam cera, licet rursus & alterum eorum tantum ceræ admiſcere. Quin etiam D
in penuria terebinthinæ reſinæ abietinā, aut lariceā cōmode admiſceamus. Em-
plaſtro vero aliquo ex prius memoratis appoſito, lanā mollem oleo calente madefa-
ctā ſupra decenter alligabis, *quemadmodum lib. 6. Ther. method. c. 3. de compoſitione medi-
cament. generalium Gal. monſtrat.* Porto ſi puncto neruo, vel quouis modo vulnerato, aut
etiam cōuulſo, cōuulſio acciderit, aut eius metus ſaltem ingruat, protinus caput, collum,
atque vniuerſam doſi ſpinā, oleo liliorū vel coſtino, laurino, ſpicato, vel ex pulegio,
vel communi, addito caſtorei & euphorbii momento, fouebis. Quod ſi in ſuperiori-
bus partibus, ut manu, vel brachio, id genus vulneris neruus acceperit, præter iam cō-
memoratas partes, axillas quoque vbertim calenti oleo delinies. Si vero punctus, aut
quouis modo vulneratus neruus, ex iis ſit, qui in cruce habentur, inguina, pubem, & lo-
ca vicina, largo ſtatim oleo imbues, per vniuerſam ſpinā ad collum & caput uſque E
aſcendendō. Sed & tendones, & ligamenta, ac loca ipſa vulneri ubiuis illato propinqua
eodem modo fouebis. Inter alia vero multa præſidia, hoc probatur vnguentum, quod
accipit olei moſchati, muſcellinum vocant officinæ, unciam vnā. Petrolei nominati, ſemunciam.
Olei communis, butyri, ſingulorum uncias quatuor. Cera, unciam vnā. *Stiracis calamithæ, ſti-
racis rubræ, ſingulorum drachmas duas & dimidiam. Maſtiches, olibani, lacrymæ hedere, ſing. unc.
vnā & dimidiam.* Ex iis omnia quæ liqueſcere poſſunt, igni admoveantur. Alia vero
trita & in puluerem redacta illis remiſceantur, poſtremo addatur ſtyrax, & fiat vnguen-
tum: ex quo moderate calefacto ceruix, & vniuerſa ſpina, ut comprehenſum eſt, inun-
gatur. Ceterum neruorum vulneribus, maxime punctim infixis, perperam a principio
curatis, maxima omnino phlegmone, & putredo ſuperuenit. Ergo quum nerui vul- F
nerati ſiciam phlegmone tentantur, & putreſcūt, farinā hordeaceā, aut fabaceā,
aut potius eruinā, in aqua lixiua, aut oxymelite, vel ſerapio acido decoctā, loco
phlegmone occupato, & putreſcenti ſtatim illinere oportet. Non autem triticeā fa-
rinā, aut eius generis cataplaſmata, quæ particulam putrem efficiunt: imo vero ne-
que aquam

Aquæ aquam calidam adhibebis. Hæc enim tametsi reliquis phlegmonibus est accommodatissima, ut quæ eas valde mitiget, vulneratis tamen nervis est infestissima. Ab humectantibus namque, & calefacientibus medicamentis, putredo huiusmodi affectibus comparatur. Quod si vehemens phlegmone cum maximo dolore infestaverit, erui- Aqua calida vulneratis nervis infestissima. nam farinam, aut fabaceam, cum optima sapa, addito paucissimo aceto, decoctam, illinito, prius tamen laborante parte oleo calido affatim perfusa. Tanta vero interdum exciusmodi puncturis, & nervorum vulneribus oboritur putrefactio, ut candenti ferro, vel caustico aliquo medicamento, cuiusmodi est *Aegyptiacum*, eam adurere cogamur. Quo autem pacto ceteris quæ vulnera sequuntur symptomatis, ut sunt *resolutio & syncope*, sit medendum, ex prioribus libris discendum erit.

De nervo cæsim vulnerato. CAP. XIII.

Si nervus non punctim, sed plane cæsim vulneratus fuerit, diligenter considerandum est, *Galeno libr. 6. Ther. method. cap. 3. teste*, quo pacto facta sit vulneratio: *utrumne per transversum nervum, an per longitudinem eius: tum vero, quantum incumbens seu præiacentis cutis diu sum sit.* Adhæc spectandum etiam est, *num totus nervus dissectus sit, an non ex toto præcisus.* Eiusmodi namque vulnerum differentiarum curandi rationem non parum evariant. Quapropter si cutis quæ incumbit sectio non satis pateat, ampliori divisione aperienda est, ut supra etiam monuimus. Proponatur igitur primum, satis esse cutis ad-
Capertum, non ita tamen hiare vulnus, ut nervus ipse incisus sensui nudus adhuc appareat. Sane huiusmodi nervi scissura siue per longitudinem, siue per transversum facta diuisio sit, ultra communes tres in punctura nervi observandos scopos, tres adhuc alios obtinet. *Primus* est, ut in loco vulneris magis declivi linamentum aliquod molle, blande imponatur. *Alter*, ut aliquod medicamentum anodynum, seu mitigatorium, nervis dicatum, vulnere superponatur. *Tertius*, ut lana mollis succida, vel oleo calente delibuta, desuper blande alligetur. Ergo non ita exquisitè vulneris oræ committendæ sunt, & glutinandæ, quin emissarium aliquod relinquatur, per quod collecta sanies effluere queat. Hæc enim si in profundo retineatur, nervis putrefactionem & corruptionem inducet, atque ita etiam convulsionem accerset. Eam ob rem profuerit, primis saltem diebus, linamentum aliquod molle ex terebinthina, oui luteo, & croci momento illitum loco vulneris, ut dictum est, decliviori molliter immittere, donec nullum amplius phlegmones, aut convulsionis periculum sit. Medicamentum autem his nervorum, ac etiam tendinum vulneribus, cæsim non punctim acceptis expeditissimum, apprimeque idoneum esse ab omnibus creditur, quod unguentum ex vermibus vulgo vocatur. Recipit vero *centaurii minoris, cynoglossi, plantaginis minoris, pilosellæ nuncupata, consolida maioris & minoris, singulorum man pulum unum. Lumbricorum, seu vermium terrestrium, libram semis. Olei communis, libram unam, & semis.* Subigantur simul, & ita septem diebus fermententur. Deinde illis addantur *sepiæ arictis apilibus emundati, libra una. Picis nigra, resina, singulorum quarta una. Ammoniæ, galbani, opopanax in aceto dissolutorum, singulorum drachma quinque.* Simul omnia lento igne decoquantur usque ad vini & aceti consumptionem, & colentur. Vbi vero hæc pene refrigerint, adde *terebinthina, quartam semis. Thuris, mastiches, sercocolle, singulorum drachmas tres. Croci, drachmas duas. Spatha* agitentur in mortario, & fiat unguentum. Porro longe alia multa medicamenta, paratu etiam facilia, hisce nervorum divisionibus valde accommodata referuntur a *Galeno libr. 3. de compositione medicamentorum generalium, & sexto Ther. method.* Cuiusmodi est quod ex *oxymelite, fabarum farina, vel eruorum, velliti, vel cicoris, vel lupinorum amarorum, vel hordeacea farina cataplasma conficitur.* Item, *pix liquida fermento temperata, atque vulnere imposita. Eruorum quoque, aut alia ex prædictis farina, fermento permixta. Imo & interim fermentum ipsum solum.* Quin etiam *oxelaum solum quod caleat, modo acetum abunde acre & vultum sit. Propolis quoque recens, liquida, & pinguis vulnere imposita, sæpe præsidio fuit, interim quidè per se, interim fermento comixta.* His itaq; præsidis ad nervorum vulnera tam in agris, quàm in urbibus, felici admodum successu Gal. sæpe usus est: non solum in iis quos iam phlegmone phenderat, sed etiam protinus ab initio. In summa, oportet medicamenta omnia quæ nervorum vulneribus tam cæsim, quàm punctim inflatis ex usu futura sunt, ea pollere facultate, Qualia in unguentum medicamentum esse debent, nervorum vulneribus accommodata.

quæ & modice calefacere, & citra dolorē exsiccare queat. Tum ea, vt dictum est, sub-
stantiæ quoque esse natura, quæ ex alto saniem atque humores educere, & discutere
valeat. Atque ex iis minus molesta esse consueverunt, quæ liquida sunt. Super eiusmodi
vero medicamenta lana mollis succida, vel oleo calente resperfa apponenda est, & le-
niter obstringenda. Ceterum quoniam frigus tum omnibus, tum vero maxime neruo-
rum vulneribus infestissimum est, plurimum conferet lanam ipsam superpositam per-
manere calidam, siue oleo tantum, siue oxelæo quoque imbuta fuerit. Hoc fiet si aliæ
lanæ siccæ vellera, aut panni calidi subinde mutati extrinsecus circumponantur, & æger
intra tectum, si modo hyems fuerit, ad quintum vsque, vel septimum morbi diem se-
contineat. Nam si eo vsque phlegmone non tentetur, vacetque prorsus dolore, & nul-
lam sentiat tensionem, in posterum, *Galeno attestante*, tutus erit. Atque hæc de neruo cæ-
sim vulnerato generatim dicta sunt, siue per transversum, siue per longitudinem seu di-
rectum nervus diuisus sit. At si nervus per transversum vulneratus sit, nō tamen ex to-
to præcisus, maior conuulsionis metus impendit, phlegmone scilicet a dissectis fibris
ad integras & non sectas succedente & communicata: ceterum cōuulsione ab ipsis non
sectis excitata. Huic sane prius memoratis præsidiiis quam citissime occurrendum est.
Ergo in quiete omnino, & strato mollissimo continendus æger est, plurimoque oleo
affatim & assidue inguina, spina axillæ, collum, & caput perfundendum. Ceterum in
hoc vulnere *Gal. lib. 6. Ther. meth. cap. 3. auctore*, sanguis largius mittendus est, & victus te-
nuior adhibendus, quam in neruo per longitudinem inciso. Quod si conuulsio iam
superuenerit, & nulla conuenientium medicamentorum vi remittatur, reliquæ fibræ
quæ integræ remanserant, præcidi debent. Si enim totus nervus præcisus sit, nullum
quidem præterea conuulsionis periculum sequetur, mutila tamen particula manebit.
Verum læsio: quam mors, potius optanda. Porro si transversa hæc diuisio, tam insigni-
ter alta in musculo facta sit, vt deligatura nihil prodesse possit, non dubitabis muscoli
distantes inuicem partes, præsertim si vulnus recens fuerit, futuris altioribus contrahe-
re: cera tamen semper adhibita, ne ab acu nervus, vel tendo cōpungatur. Carnosa nam-
que ipsa musculorum pars, dum acu suitur, periculo vacat. Nerui vero aut tēdines, non
mediocri periculo consuntur. Quod exemplo gladiatoris cuiusdam *Gal. lib. 3. de comp.*
med. generalium, copiosius monstrat. Has autem futuras in eiusmodi vulnere ideo non
superficietenus, sed altius moliri conuenit, neq; in imo sunt, inglutinata dehiscant. Re-
liqua vero quæ ad vulneris curationem attinent; hic quoque sunt eadem, etiam si totus
nervus præcisus sit. In solo itaque per transversum accepto vulnere, eodemq; insigni-
ter alto, quum deligatura nihil prodesse potest, ex sola futura curatio absoluitur. Ete-
nim in vulneribus iuxta membri longitudinē factis, deligatura vulnerati muscoli par-
tibus inuicem contrahendis sufficit *Galeno*. Porro futura decenter facta, biduo consu-
tum vulnus vouendum erit rosaceo, in quo lumbrici terrestres prius decocti fuerint: ac
supra pulvis aliquis qui futuram contineat aspergendus erit, cui parem ipsorum lum-
bricorum desiccatorum & contritorum portionem, si lubet, adicies. Quidam enim
memoriæ prodiderunt, eiusmodi terræ intestina contrita, neruisque diuisis imposita,
protinus mirum in modum prodesse, *vt libr. simpl. 11. Gal. refert*. Sunt qui & centaurium
arefactum, & contritum etiam inspergunt. Medicamen enim est admodum desicca-
torium, mordacitatis expers: quodque si glutinatoriis & desiccatoriis miscetur, vlcera
maligna sanat. Sed de huius stirpis facultatibus *lib. 7. simpl.* plura *Galenus* tradit. Nudato
autem neruo, omne curationis consilium huc tibi dirigendum est, vt minima cum ro-
sione sicces. Proinde si nervus non punctim, sed plane cæsim vulneratus fuerit, cute et-
iam quæ incumbibat diuisa, adeo vt vulnus appareat, nullum iam supra memoratorum
medicamentorum, quæ ex euphorbio, ac similiter acribus emplastri specie sunt, ap-
plicabis. Nudatus enim nervus vehementem ipsorum vim ferre nequit, ita vt quum
interposita cutis erat, tulit. Optime igitur eo casu feceris, si & calcem, & pompolygem,
thutiam officinæ appellant, ac metallica omnia, resinas quoque, olea, mel & ceram, quæ
eiusmodi medicamentis nudato neruo ac diuiso apprime idoneis miscenda sunt, elue-
ris: quo scilicet citra rosionem vllam sint siccatura. Quippe medicamentis omnibus,
vt lib. 6. Therapeutica methodi, cap. 3. & lib. 9. simplicium testis est Galenus, quæ lateris, acris,
mordenque humor eluendo detrahatur. Tunc igitur præstantissimum erit, calcem
æstatis

Nerui per-
transuersum
cæsi cura-
tio.

Historia de
gladiatore
in femore
vulnerato.
Futura cur-
altiores ef-
fecte debeant.

Centauriū.

Nerui cæ-
sim vulne-
rati & nuda-
ti curatio.

Nudatus
nervus ve-
hementem
medicamē-
torum vim
ferre non
potest.

A zstatis tempore, in diebus canicularibus sub sole aqua salubri atque dulcissima sapius elotam, & exsiccata, plurimo optimoque oleo rosaceo admixtam apponere. Congruit & hoc casu medicamentum quod a pompholyge, vt dictum est, elota sit, largiore itidem, ac probatissimo rosaceo salis omnino experte solutum liquatumue. Salubre quoque medicamentum est, quod ex melle optimo sub emplastri specie componitur. Solui vero id etiam rosaceo oportet, quod tum reliquis conditionibus sit optimum, tum salis omnino experte, vt scilicet minima cum rosione siccet. Si vero robustus sit qui vulnus accepit, & cui sit corpus a superuacuis humoribus mundum, in hoc fas est eum valentioribus remediis nonnullis vti, vt pastillis seu trochiscis ex Polyida auctore, *lib. 5.*

B De compositione medicamentorum generalium a Galeno descriptis, sapa calida solutis, & in linamentum illitis. Id autem vel imprimis semper habendum curæ est, ne quid ex iis quæ vulnus contingent, frigidum sit: quandoquidem ipsa laborans particula, & sensibilis maxime est, & principum partium potissimum principi, cerebro nimirum, continua, & temperamento suo frigida. Quorum omnium occasione, & ex facili a frigido offenditur, & suam offensam cerebro impertit. Ceterum eiusmodi vulnus oleo perfundendum non est, præsertim quum nunc commemoratis pastillis curatio suscipitur. Nam oleum illorum viribus aduersatur, & sordidum vlcus reddit. Neque enim parum interest, nudone neruo oleum, an per interpositam cutem admoueas. Abluenda igitur a vulnere sanies est, molli lana specillo circumuoluta, in sapa tepida intincta, & mox expressa. Quod si omnia bene atque ex animi sententia succedant, etiam vino dulci, non acri & mordaci, vulnus madefacere citra periculum licebit. Vulnere autem iam pene ad cicatricem ducto, vtile etiam fuerit album, tenue, & quod multam aquam tolerare nequit. Aquæ vero vsum, ob causam prius commemoratam, sicuti & relaxans cataplasma in eruo nudato semper deuitabis. Blande quoque ac suauiter vulnus, si necessitas vrget, detergebis vnguento ex vermibus facto, vel aliquo alio deterforio medicamento, quod recipiat probatissimum mel, terebinthinam, & farinam hordei, aut fabarum. Postquam autem neruum denudatum contexeris, linamenta extrinsecus circumducere oportet, ex medicamento, *inquit Paulus*, quod angustis vulneribus faciat: nempe eo quod ex euphorbio præparatur, aut fimo columbino, sed ita vt etiam sanas partes ampliter comprehendat.

Nihil frigidum nudato neruo admouendum.

De nerui constitutione. CAP. XIII.

Neruorum contusio eandem habet cum carniū contusione generationem. Signa vero ex ægroti narratione cognoscuntur. Contusis autem neruus, vbi cum hoc vna cutis contusa exulcerataque est, medicamenta postulat, quæ partes per contusionem a se dissidentes contrahere, constringereque sunt apta. Si vero absque cutis contusione neruus contusus sit, huic auxilia quibus euocandi ac discutiendi facultas inest, adferenda sunt. Contuso igitur neruo, si cutis simul contundatur, & vlceretur, fabarum lomentum oxymelite dilutum, aut si magis siccare voles, eruinam farinam cum sapa, & modico aceto illines. Quod si amplius adhuc siccare desideras, irim quoque illyricam, vel eam quam vulgo florentinam vocant, immittes. Recentiores in hoc affectu per initia rosaceum cum cui candido liquore admouent, & mitigato dolore laborantem particulam vino tepidato fouent, quod crassæ sit substantiæ, & adstrictionis particeps. At si vna cum contusione dolor infestet, liquidam picem cataplasmati e farina fabarum adicies: & vbi simul bene decoxeris, calens medicamentum applicabis. Vniuersi autem corporis curatio eadem est cum ea, quam paulo ante docuimus. Verum si neruus quidem contusus sit, cutis vero nihil quod sensui appareat, a natura recesserit, oleo calente discussorio, quale *anetinum* est, & *rutaceum*, *irinum* quoque, continue locum irrigabis perfundesque sæpissime, & lana oleo imbuta fovebis, ac totius corporis cutem prædictis similem adhibebis. Porro si neruus totus sit præcisus, metus præterea nullus instat

Causa.
Signa.
Curatio.

Si cum heruo cutis contusa sit.

Si citra cutem neruus contusus sit.

Si neruus totus sit præcisus.

conuulsionis, mutila tamen particula manebit, præsertim si dissectus neruus

insignis magnitudinis fuerit. Curatio vero eius communis

est cum ea, quæ aliorum est vl-

cerum.

LEONHARTI FUCHSII DE MEDICINIS VULNERIBUS, LIBER SE-

PTIMVS.

De ulcere simplici, & quod solum consistit. CAP. I.

Vlcus quid?



VLCUS, quod Græcis *ἔλκος* dicitur, est solutio continuitatis citra vulnerationem, in carnosâ parte relicta. Vlcus vero simplex, Galeno lib. 3. Therapeutica methodi cap. 4. teste, est carnosæ particulæ diuisio, citra vllius portionis amissionem. Vlcus autem quod solum consistit, est, cui nec affectus vllus simul

Causæ.

Signa.

Curatio.

adeft, nec symptoma. Causa vlcum est cacochymia, hoc est, succorum vitium, qui corporis ipsius particulas arrodere, & tandem corrumpere possunt. Signa vlcum, perinde atque vulnerum, e sensus, visus præsertim, iudicio, petenda sunt. In vlcum autem curatione duo nobis spectanda proponuntur: nempe, num vlcus simplex & solum sit, ipsumque adeo per se, aut cum alio quopiam vno affecto, multisue consistat. De eius autem, quod solum est, & simplex, curatione hoc loco dicemus. Omne itaque vlcus, quia vlcus est, vnam communem habet curandi indicationem. Siquidem, vt Galen. lib. 4. Therapeutica methodi cap. 5. testis est, vlcus, quia vlcus est, sanatio, mediocris siccatio est. Principio itaque necessarium est, vt humores prauos ac vitiosos, quibus laborantis corpus refertum est, quique in partem vlceratam influunt, vacuentur, corrigantur, & fluxionem ipsam intercipiendo auertantur. Auxilia autem, quibus humorum vitium commodè tollitur ac corrigitur, sunt, purgatio, & proba victus ratio. De quibus iam sæpe in præcedentibus est dictum libris. Fluxiones vero intercipiuntur ligaturis, perfusionibus, epithematis, item vnguentis ex bolo armenio, & aliis refrigerantibus, ac adstringentibus. Quum igitur exulceratis partibus influit succus, nec multo plus iusto, nec multo deterior sit, auerti hunc regerique conueniet, adstrictis scilicet, refrigeratisque iis particulis, quæ ante exulceratæ sunt. Incoanda quoque deligatio est a laborante ipsa particula, deducendaque versus sanam. Talis enim deligatura meatu adstringit, per quos materia ad vlceras particulas influit. Quod si sisti compescique medicamentis influxus nequeat, causa eius inuestiganda est, atq; hæc prius adimenda. Ac si quidem ob partis, quæ fluxum recipit, imbecillitatem id fiat, huic nimirum medendum est. Deinde vbi corpus iam a vitiosis humorib. abunde purgatum fuerit, & humorum influxus cohibitus, ad vlcus curationem, hoc est, vnicionem, quæ per siccantia fit medicamenta, progrediendum erit. Dictum autem est de hoc copiose supra lib. 6. cap. 1. & 2. Quare ne eadē identidem vbiq; repetenda sint, ex iis locis, quæ ad rem præsentem attinent, requirenda erunt. Hactenus vlcus simplicis, & quod solum consistit, curationem breuiter perstrinximus. Nunc reliquum esset, vt caui vlcus curationem subiiceremus. Verum quum caui vlcus curatio a caui vulneris curatione nihil differat, e superioribus hæc ipsa petenda erit. Nam capis. 4. prædicti libri hanc ipsam copiose tractauimus.

Cui vlcus curatio.

De ulcere cum intemperie. CAP. II.

Signa.

Curatio.

COMPlicatur interdum cum ulcere intemperies carnis calida, frigida, sicca, vel humida. Quod calidior, quam par est, aut frigidior caro fuerit, partim colore, partim tactu, partim laborantis sensu agnosces. Quippe alias calorem sentire se fatentur, alias manifestum frigus in particula, gaudentque vel frigidis medicamentis, vel calidis. Et aliis quidem rubor levis insidet, aliis calor magis albicat. Sicca, si squalens siccaque videtur caro, intemperies cognoscitur. Humida vero, si humidior quam pro naturali habitu caro fuerit. Quæcunque autem partes vlceratæ per intemperiem aliquam a naturali habitu recesserunt, eorum sanationem per quæ cōtraria viribus sunt, fieri omnino est necesse, calidam vtique intemperiem refrigerando, frigidam calefaciendo, siccam humectando, humidam siccando. Squalentem igitur & siccam carnem, aqua temperata fouens humectansque corriges. Quoties autem eo remedio vteris, esto tibi perfusionis humectationisque meta, vt quum primum rubescit, attolliturq; particulæ moles, tum desinas. Quippe si vltra perfundas quod attraxisti, id discuties: itaque nihil profeceris. Quinetiam medicamentorum humectandi facultas plenior esto, quam in sana carne præceptum est. Si vero humidior caro fuerit, contraria ratio ineunda est, ac medic-

A medicamentorum facultas ad ficcius transferenda, aqua vero nullatenus ad mouenda. Imo si lauandum vlcus videtur, vinum, aut posca, aut decoctum cuiusquam herbae præparandum. Quod si frigidior humidiorque locus sit, calefaciendo pariter ac siccando, & in aliis ad eundem modum vincentem videlicet qualitatem contraria semper oppugnans. Atque vbi intemperiei affectum iam sanaueris, deinde etiam exulcerationis affectum sanabis. Non aliter plane nunc curata intemperie, quam si citra vlcus incidisset. Quo manifestum sit, non esse vlceris, sed intemperiei propriam, omnem eiusmodi curationem, quæ tamen vlceris ipsius sanationem omnino præcedere debet. Siquidem fieri non potest, vt in vlcere vel carnis productio, vel sinus cavitatis sue impletio, vel agglutinatio, vel cicatricis inductio recte vnquam cedat, nisi subiecta caro pro naturali modo se habeat, *quemadmodum lib. 3. Ther. meth. cap. 8. Galenus copiosius docet.* Hæc autem recte se habuerit, si proprium temperamentum tueatur. Ergo si exulcerata caro iusto calidior, frigidiorue effecta fuerit, vtrique medelam exigit, quæ in tantum calfaciat refrigeretue, in quantum ipsa a naturali suo habitu recessit. Subiecta namque carnis affectus, causæ rationem obtinet ad id quod efficitur. Quippe ex hæc, & per hanc tum quæ dissident glutinantur, tum quæ caua sunt carne implentur. Itaque temperatam esse subiectam carnem ad vlcera tum glutinanda, tum carne implenda, prorsus oportet. Non est autem necesse, vt de curatione intemperierum longiorem instituamus sermonem, quum in præcedentibus etiam libris de corrigendis intemperiebus sæpe dictum sit.

De vlcere cum tumore particula. CAP. III.

A De eundem sane modum & partium, quæ cum aliquo præter naturam tumore exulceratae sunt, prius sanandus tumor est: fieri enim non potest, vt vlcus manente tumore ad sanitatem perducatur. Quapropter omni studio laborandum est, ne phlegmone, aut quouis alius tumor in loco vlcerato excitetur. Quod si tamen id prohiberi non potest, remediis dicatis curari debebit, vlcere interim non neglecto. Quæ autem omnis præter naturam tumoris curandi ratio sit, libro quinto abunde expositum est. Nunc quantum eius rei coniunctum cum vlcerum curatione est, obiter ac breuiter tractabitur. Compendiaria autem obsessarum phlegmone partium, vlceratarum curatio, *Galeno libro quarto Therapeuticae methodi, capit. quinto, sese*, per id genus præsidia obitur, quæ sane vel affectum prorsus summouent: vel si quid exiguum quod supputet reliquerint, alterum medicamentum acré, quod educere pus queat, requiritur: vel si tenuis circumposita cutis sit, velisque celerius explicatum ægrum, sectio petenda est. Quod si cataplasmate ex hordei farina, aqua & oleo, quod calefaciat humectetque, illinantur partes vlceratae, quæ phlegmone infestantur, lenientis tractatio est, non medentis, & aduersus malum pugnantis. Id enim non ex prima ratione fit, hoc est, non vt remedium affectus, sed vt symptomatis mitigatio existit. Siquidem ipsius phlegmones remedia, *ut auctor est in libro de vlceribus Hippocrates*, sicciorum sunt virium. Proinde si phlegmone vlcera obsideat, vsus esse debet medicamentorum quæ desiccant, atque phlegmonem arcent. Ex liquidis igitur, Paulo attestante, laudatissimum est vinum adstringendi facultate præditum, deinde posca. Si vero sordes quoque cum phlegmone occupent, mulsæ diluta conuenit. Ex his autem medicamentis quæ siccandi potestate prædita sunt, communiter quidem conferent phlegmonibus dicata, quæ libro quinto descripta sunt, si oleosa acriaque excipias. Priuatim vero hoc proficit. Malum puni- cum dulce, vino incoctum tritumque illinitur. Mirabile nimirum, & multiplici vsu commendatum est remedium. Facit enim tum ad capitis, tum naturalium vlcera, tum etiam ea quæ toto corpore excruciant, oculorumque phlegmonas. Quod de phlegmone diximus, id etiam de reliquis tumoribus præter naturam, ac symptomatis intelligendum venit. Si itaque erysipelas, aut eiusmodi quippiam vlceri accesserit, his vtendum erit præsidii quæ aduersus illa superius scripta sunt. Quod si vero dolor (nam & is vnum est ex symptomatis quæ vlcerum curationem remorantur, & impediunt) aliquis vehemens vlceratae parti incidat, protinus hic aut tollendus erit, aut saltem quoad licebit demulcendus. Dolor enim, præsertim vehemens, vires prosternit & fluxionem prorit, adeoque vlceris ipsius curationem prohibet. Proinde tamen si quæ vlceratis parti-

Phlegmoni vlceris curatio.

Malum puni- cum, dulce.

Vlcus crucians.

In complicatis
affectibus
quid faci-
endum.

bus ut dolor fedetur ad mouentur, vlceri aduersantur, tamen quia ex vehementi dolore A
plerunque laboranti imminet periculum, & propriam vlceris curationem moratur, ne-
glecto ad tempus vlcere, dolori tanquam ei quod magis vrget, primum maximeque in-
tendendum est. In complicatis namque affectibus, id ex quo primum maximeque homini
imminet periculum, quodque magis accelerat & vrget, primum curari atque tolli debet.
Quibus autem praesidiis dolor mitigatur, in praecedentibus libris copiose est dictum.

De vlcere confuso. C A P. IV.

Pus mo-
uentia.

Tetra-
pharma-
cum.

Catapla-
sma sup-
puratoriū

VLcera omnia, *Galenilococitato, & Hippocratis testimonio*, praeter ea, quae confusa sunt,
siccari debent. In iis enim, quae cum contusione facta sunt, quam celerrime pus mo-
uendum. Siquidem necesse est carnes sic confusas putrescere, ut noua tandem caro gi-
gnatur. Pus autem ipsum, siue carnis confusae suppuratio, cum aliqua putrescentia fit. Por-
ro quae putrescunt omnia, ex calido & humido sic afficiuntur. Proinde fit, ut ea, quae calefa-
ciunt & humectant, omnibus his affectibus, quibus pus moueri expedit semper ad mouen-
da sint. Hordei namque farina ex aqua & oleo temperata, item panis ex aqua & oleo, pre-
terea fomentum multae calidae aquae, tetrastaphylae vis, omnia denique, quae calefaci-
unt & humectant, celerrime pus mouent. Ceterum tetrastaphylae, cui non conte-
mnendus plane auctor, Cornelius Celsus, primas mouendo puri tribuit, constat pice,
refina, cera & adipe. Vnus tempore oleo, vel butyro subigitur. Pix sit mollior, refina fri-
cta, vel colophonia: quae in teneris corporibus oleo molliori potest: cera pinguis, adeps
in mollibus corporibus vel suillus, vel vitulinus: in durioribus taurinus vel hircinus fit. C
Cataplasma quoque, quod ex farina triticea in aqua & oleo temperate ac mediocriter
cocta constat, ad pus mouendum non inutile est. Celeriter enim, quae digestionem non
cesserunt, ad suppurationem perducit. Siquidem & calorem habet nostro calori per-
similem, nempe temperatum & mediocre: & ratione farinae & olei, quae lentoris
quippiam habent, quo meatus obstruendo partis calorem natium discuti prohibent,
vi emplastica praeditum est. Quae duo maxime in maturantibus & pus mouentibus me-
dicamentis desiderantur. Laudatur etiam cataplasma ex radice altheae, & caricarum dul-
cium ac pinguium decocto, quod mellis crassitudinem representet, & farina triticea compositum. Ac-
cipienda autem praedicti decocti, libra una. Farina triticea, libra semis. Incoquantur si-
mul, & in formam cataplasmatum reducuntur. Est & puri mouendo apprise idoneum, D
quod habet corticis radice altheae, radice lilii, senecionis, foliorum maluae, singulorum manipu-
lum unum. Farina triticea, quartam unam. Farina seminis lini, unciam unam. Axungia suilla
recentis, libra semis. Coquantur herbae in aqua, quantum satis esse videbitur, & tundantur
cum reliquis in mortario, fiatque cataplasma. Vulgo quoque nota est medela e cecis, &
neribus coctis. Mirabile & hoc ad suppurandum, quod accipit cera, terebinthina, medulla
cerui, adipis vituli, anserini, bubuli, butyri recentis, mellis optimi, olei rosacei, myrrhae, singulorum
unciam unam. Myrrha cum melle subigitur, & prunis leuiter incoquitur, ex quo reliqua
adiecta sedulo misceantur.

De carne in vlceribus supercrecente, quam hyperfarcosin Graeci nominant,
tollenda. C A P. V.

MOrbusis, quem Graeci *ὑπερφάρκωσις* vocant, ex eo genere est, quod in quantitate magnitu-
dineue partium spectatur: ex quo etiam genere & cavitates existit. Veluti igitur vlcus quod
cauum, appellant, non vnum est vitium, sed pariter & cavitates & vlcus: ita vlcus, quod
supercrecentem carnem habet, non vnum est vitium, sed simul caro supercrescens,
& vlcus. Indicat autem magnitudo, quae praeter naturam est, primam indicationem
ipsius scilicet exsuperantis ablationem. Atque haec sola medicamentorum ope perfici-
tur, non opera naturae: contra quam in carne restituenda aut glutinatione se habet.
Haec enim naturae ipsius sunt opera, medicamentis tantum, quae actioni eius obstant,
summoventibus. At supercrecentis carnis detractio, nullum quidem naturae opus
est, sed medicamentis perficitur, quae vehementer siccant. E quorum sane numero,
Paulo lib. 4. cap. 43. teste, sunt: *Diphryges inspersum, aut cataplasmatum instar inductum: item squa-*
mae aris, omniaque testacea combusta. Erinacei praeterea utrique, tam terrestres quam marini, cum
toto corpore cremati. Verum haec non admodum eximie, sed modice a mediocriter dun-
taxat pur-

A xat purgant, & supercrescentia compescunt, *ut lib. 5. simpl. cap. c. 14. & 15. Galenus fufius docet.* Afia vero petra flos longe validius id muneris obit: atque hoc magis adhuc *fori, chrisocolla, chalcitis, mify.* Quæ si combufta fuerint, minus vellicantur, ac rodunt: item *aris flos.* Ceterum ærugo his adhuc omnibus valentior est. Sales autem cremati, carnes cum humore flaccidas confumunt ac liquefaciunt. Sic etiam linimenta e panniculo difcerpta, muria acriori imbuta, & denuo reficcata atque impofita, mediocres carniū supercrescentias liquefaciunt atque exedunt. At maximas carniū excrescentias ad vique penitiora cruftis obducunt, *Fauftiani* pastilli triti atq; infperfi. Item medicamentum quod recipit calcis viuæ, id est, aqua nō exstinctæ, squamæ æris, & mannæ, quæ mica est thuris concuffu seu attritu elifa, pares modos, hoc est, æquales partes. *Fauftini* autem pastilli habent, *auripigmēri, drachmas duodecim. Sandaracha, quæ est rubrum auripigmentum, & a natura magis excoctum, drachmas sex. Calcis viuæ, drachmas octo. Charta combusta, drachmam unam. Baccarum myrti succo vel decocto excepta, in pastillos redigito.* Ad hoc institutum vfitatum admodum est *Aegyptiacum unguentum.* Ceterum dum hæc caustica atq; erodentia admoventur medicamenta, partes quæ in circuitu sunt, refrigerantia desiderant: ne scilicet in partem ex rosione vlceratam calore, & dolore humorum fluxio aduoceatur. Deinde cruftæ vlcerebus inductæ resoluendæ erunt, & vlcus ad sanitatem perducendum.

Calx viuæ.
Manna.
Fauftiani
pastilli.
Sandaracha quid?

De vlcere cum duricia, & labrorum decoloratione. C A P. VI.

C Vum labra vlceris tantum decolorata, duraue plusculum fuerint, excindenda ad sanam vsque carnem, *Galeno libr. 4. Ther. meth. cap. 2. auctore,* sunt. Alii eiusmodi labra scarificanda esse præcipiunt, & ab eis sanguinem, ad motis etiam cucurbitulis extrahendum. Sanguine autem quod satis esse videbitur educto, spongiam siccam, hoc est, nullo liquore madentem, ac postea etiam medicamenta quædam resiccantia superimponere iubent. Nec ab Hippocratis instituto hæc curandi ratio abhorret. Hic enim quum vel liuidum, vel nigrum, vel rubrum conspicitur vlcus, scarificandum, ac sanguinem emittendum esse docet. Mox spongiam sicciorē magis, quam humidiorē, hoc est, siccam potius quam humefactam, superimponendam. Post hæc vero etiam siccantia remedia applicanda. Ab his, si res postulet, rursus sanguinem auferendum.

D Ac mox iterum talia peragenda, donec omnino parta sanitas sit. Quod si labra vlceris dura callosaque appareant, etiam ea excidenda monet. Quum vero amplius progressus huiusmodi affectus est, deliberatio incidit, excidendum ne omne id sit, quod præter naturam vifitur, an spacio potius curandum. Proculque dubio est, ægri animum hoc casu consulendum esse. Aliqui enim longiori tempore curari citra sectionem malunt: aliqui quiduis subire, dummodo citius sanentur, sunt parati. Ceterum excidere res est promptissima: maius vero quippiam, atque artis egens, medicamentis sanare.

De vlcere cum varicibus complicato. C A P. VII.

V Aricum supra exulceratum locum existentium occasione, contumax ad sanandum sæpe vlcus redditur: quod scilicet ex iis humiditas aliqua ad exulceratas partes defluat. Eas igitur, *ut testis est loco paulo ante citato Galenus,* prius sanare oportet, ut deinde mox vlcus sanemus. Igitur varices, qui cruribus, & alibi quam in testiculis prouenire solent, hoc modo ex Hippocratis, Aetii, & Pauli sententia curantur. Primum in cute, vasi elato, seu venæ in fastigium tumefactæ, hoc est, varici, adiacente simplicem sectionem scalpello per longitudinem facito: ita tamen leuiter, ut venam sic in verticem elatam non diuidas, & scalpello penetres, sed sola cutis incidatur. Ducta sic leuiter in cute sectione, oras vulneris hamulis diducito, & membranulas cultro ad ramicem aquosum accommodo, sensim ac blande excoiato. Mox vena detecta, nudataue, & a circumiacentibus corporibus vndiquaque explicata, eam vulsella, aut obtuso hamo attrahito, ac suspensam teneto. Deinde acum duplex linum, seu lineum funiculum duplicem trahentem subiicito, subterue transmittito, linique habenulam amputato, sic ut duo funiculi efficiantur. Tum venam dilatatam, non aliter quam in venæ sectione fieri solet, scalpello per medium diuidito, ac sanguinis quantum satis esse videbitur, detrahit. Deinde altero funiculo superiorem vasis partem constringito, cureq; eleuato, san-

Varicum
curatio.

guinem qui in ipso apparebit, mannum expressione vacuato. Quod ubi factum fuerit, A
venam ab altera parte lino altero rursus deuincito. Partem vero illam venæ, quæ inter
duo vincula est, vel statim excindito, vel manere finito, vsque dum putrefacta sua spon-
te cum funib. excidat. Peraçto opere sicca linamēta in vlcus inferenda sunt, splenium-
vino cui oleum adiectum sit, madens superi imponendum, ac deligandum. Tum lina-
mentis medicamento aliquo ad pus faciendum apto imbutis, curatio persequēda erit,
cetera, quæ reliquis vlceribus communia sunt peragendo. Sed interim quies agro im-
peranda, seruato accliuo membri decubitu, ne si decliue iaciat, humores ad ipsum con-
fluant. Pranso autem magis quam ieiuno, & parum pleno, potoque item concalescente,
& vt Paulus *lib. 6. cap. 82.* suadet, loto, dieque calido potius, quam frigido, venā eiusmodi
secabis, atque ex ea sanguinem mittes. Hæc enim omnia sanguinem in venis crassio-
rem dissoluunt, effluxuique aptiorem reddunt. Proinde si varix crus, vt magna ex parte
solet, occupauerit, loto prius homine funiculum superiori femoris regioni circumda-
to, ac vt inambulet iubeto. *Deinde* venam ita repletam atramento scriptorio, aut colly-
rio notato, iuxta eius sitū trium digitorū spacio, aut paulo ampliori interposito. Postea
reclinato seu decumbente agro, crusque ipsum extendente, alterum vinculum paulu-
lum supra genu iniicito, ac mox qua atramēti nota est, sectionem facito, & reliquam cu-
rationem, vt supra dictum est, prosequitor. Quidam ex veteribus, funibus siue vinculis
minime utebantur: sed venā, vel statim ubi a carne absoluta erat, & vnde quaque nuda-
ta, excindebant: vel ab imo etiam adhærentem, violenter extrahendo abrumpebant.
Alii vero vstionem eligentes, digitalibus interuallis innixa cauteria vasīs admouent. C
Atque ubi crusta deciderit, vlculque incarnatum, & cicatrix inducta fuerit, locum ro-
borant. Verum omnium tutissimus chirurgiæ modus est, quem supra exposuimus. Por-
ro varices in imo ventris suborientes consimiliter tractandi sunt. Illi item, qui in tem-
poribus existunt, ea ratione, quam in exentione vasorum Paulus *lib. 6. cap. 5.* docuit,
tolluntur.

De verminoso vlcere. CAP. VIII.

Vermes in-
termentia.

VT vermes qui in vlceribus procreantur arceas, primum quidem est, *Paulo lib. 4. cap. 42. attestare*, vt humiditatem putredinemque eorum opificē tollas. Proinde vermes
in vlceribus exortos interficiunt, & putredinem simul auferunt, succus & decoctum D
absinthii, & eupatorii, vel centaury, vel marrubii, calaminthæ quoque succus iugiter in-
stillatus, atque id genus multa, quæ etiam aurium vermes enecant. Priuatim autem ad
vermes, qui vlcera infestant, commēdatur Archigeni & Theodoro, medicamentum,
quod accipit *cerussa & polii parem mensuram, cum pice liquida illitum*. Conducit etiam ma-
gnopere linamentum salua ieiuni hominis illitum, & applicatum. Hoc etiam vermes
in auribus perimit, & concolores cicatrices, vt *Actius testatur*, reddit.

De vlcere disrupto, & cum ossis corruptione complicato. CAP. IX.

Ossis vitia-
ti signa,
Curatio.Quæ ossiū
squamas ex-
cedere fa-
ciant.

Emplastrū.

VLcerum nonnulla obducta cicatrice, postea tempore haud ita multo interiecto,
denuo phlegmone tentantur, rursusque sua sponte, & per se rumpuntur, atque a
sua continuitate recedunt. Osse enim quopiam subtracto male affecto, hoc est, vitiato E
& corrupto, circumdata ac superiacens caro, ex facili quidem interdum ad cicatricem
ducitur, & sana ex toto ad vnguemque restituta esse videtur: verum cursu humoris vali-
do, paulatim ex osse in alto contabescēte ac putrescente, tum phlegmone, tum pus ob-
oritur, quod cicatricem lacerat, ac dirumpit. Ceterum vitiatum ac corruptum osse signa
hæc sunt. Primo fere pingue sit, deinde vel nigrum, vel cariosum. Quænam igitur ho-
rum vlcerum curatio erit? Certe eatenus exficcare, quatenus squama ossis exciderit.
Ossium autem squamæ facile excident, si siluestris papaueris, & fici arboris foliis cum
polenta leuigatis, atque ex vino illitis, ipsius ossis sinus concavos repleueris: aut alteri
siue hyoscyami semen, & atramentum sutorium pari pondere contrita imposueris.
Sed & peucedani radix contrita, subito squamas ossium remouet, ac separat. Squamas F
etiam ossium breui detrahunt, & nouam probamque carnem desuper renasci facit me-
dicamentum hoc, quod recipit: *Aristolochia, iridis, myrrha, aloes, corticis panacis, terra æretria
adusta, scorix æris, corticis pini, singul. æquas portiones*. Melle omnia excipiantur, & in em-
plastrū formam redigantur. Oportet autem ante omnia, vitiatum & corruptum os
nudare,

A nudare, vlcere exciso: & si latus eius corrupti ossis vitium est, quam vlcus fuit, carnem subsecare, donec integrum os vndique pateat. Osse autem sic nudato, totum id quod pingue & corruptum est, candente ferramento semel iterumue, vt res exigit, ad moto adurendum est, vt ex eo statu secedat. Aut certe eradendum, donec aliquid cruoris ostendatur, quæ integrius & minime corrupti ossis nota est. Neque alia facienda sunt, vbi caries nigriciesue in summo osse est. Siquidem id vel paulo diutius eodem ferramento adurendum, vel radendum est. Porro qui radit hæc, *Celfo teste*, adaucter imprimere ferramentum debet, vt & agat aliquid, & maturius desinat. Finis est, quum vel ad album os, vel ad solidum ventum est. Albo namque finiri ex nigritie vitium, soliditate quadam ex carie manifestum est. Accedere etiam cruoris aliquid integro, supra dictum est. Ceterum si caries alte descendit, per terebram vrgenda crebris foraminibus est, quæ altitudine vitium æquent. Tum in ea foramina demittenda candentia ferramenta sunt, donec inde siccum os ex toto fiat. Simul enim post hæc & resoluetur ab inferiore osse quodcunque vitiatum est, & is sinus carne replebitur, & humor aut nullus postea feretur, aut mediocris. Sin autem nigrities est, aut si caries ad alteram quoque partem ossis transit, oportet excindi. Sed quod totum vitiatum est, totum eximendum est. Si inferior pars integra est, eatenus, hoc est, vsque ad subiectam partem ossis integram, quod corruptum est, excindi debet. Sunt qui post abrasionem cauterium admouendum esse suadent, nec immerito sane. Nam si corruptela ossis ex humiditate excrementosa & superuacanea ipsius ossis substantiam labefactante ortum habet: vt certe magna ex parte habet: nullum præsentius aut tutius remedium excogitari potest, ipsa vitione. Hæc enim decenter admota, & cito & tuto, in summo quoque & in alto, haud secus quam ignis ipse, desiccat. Post vitionem vero ferro candente factam, rosaceum calefactum infundunt. Alii post vitionem cauterio, *vt dicunt*, actuali decenter factam, rosaceum oui candido liquore, permixtum, tribus primis diebus admouent: triduo vero alio sequente, albuminis loco luteum oui rosaceo commiscunt. Postea butyrum cum melle rosaceo infundunt.

De vlcerebus ægre cicatricem admittentibus, & malignis. C A P. X.

Vlcera, quæ ægre ad cicatricem ducuntur, Græcis δυσπρόσλητοι nominantur. Quæ vero ægre sanabilia, dolosa, maligna, contumacia, & rebellia sunt, iisdem κακὴν vocantur. Multæ autem & varix sunt causæ, quæ eiusmodi malignorum, contumacium, atque ægre sanabilium vlcerebus coitionem & sanationem remorantur & impediunt. Nempe fieri aliquando potest, vt labra exulceratæ partis callosa & dura, causæ sint quo minus sanescat vlcus. Potest etiam causæ esse intemperies, vel quæ citra tumorem præter naturam in vlcerebus partibus consistit, vel quæ cum tumore quidem aliquo coniuncta sit. Potest & varix superiacens, vel iecur, aut lien male affectus, aut imbecillitas ægræ partis, quæ ipsa quoque intensa quædam est intemperies, vlcerebus curationem in multos menses protrahere. Quinetiam vitiosus in toto corpore succus maxima causarum est, quæ incommodare vlcerebus possunt, & ea diuturna contumaciaque efficere. Signis ad vitii cognitionem nullis est opus, vtpote quod tempus ipsum abunde prodatur.

E Quod si vero eiusmodi vlcerebus ægre cicatricem admittentibus, maleficis, contumacibus atque inueteratis mederi velis, necesse est causas, quæ illa creant, primum summoveas atque abscindas, deinde maligni vlcerebus curationem aggrediaris. In morbis namque omnibus nedum vlcerebus, in quibus effectrix causæ adhuc manet, ab hac inchoanda curatio est. Magna igitur attentione inspiciendum venit, num corpus totum plethoricum vel cacochymum existat, vel lien, aut iecur male afficiatur: vel labra vlcerebus dura & callosa sint. Item num aliqua insignis sublit partis vlcerebus intemperies, aut etiam varix aliquis superiacens fuerit, cuius occasione ad sanandum contumax vlcus redditur. Ergo si vniuersum corpus plethora vel cacochymia laboret, prius expurgare, vacuareque illud expedit, quam medicamentum vlcerebus admoueas. Si vero lien, aut iecur male afficiatur, his prius providere, deinde ad vlcus curandum venire oportet. Ad eundem modum, & varices, qui sæpe supra exulceratum locum sunt, prius, vt supra docuimus, tollendi sunt, deinde mox vlcus sanandum. Intemperies quoque atque imbecillitas, quam sæpe insignis quædam parit intemperies, antea quam ad vlcerebus curationem accedamus, corrigenda erit. Breuiter ei quod fluxionis in vlcerebus partem

Dyspep-
lora quæ
Cacoethē.
Causæ.

Signa.
Curatio.

Ab effe-
ctrice
causæ, si
adhuc
manet,
inchoan-
da cura-
tio.

Maligno-
rum vlce-
rum sum-
mus cura-
tionis sco-
pus.

decumbentis est causa, atque ægre sanabile vlcus reddit, providendū, ac si fieri potest, A
medendum prius erit. Deinde maligni ipsius vlceris & contumacis curationem aggre-
di oportebit. Malignorum autem & difficulter cicatricem recipientium vlcerum cura-
tionis summus scopus est, valida citra demorsum exsiccatio. Hæc enim ab aliis vlcerib.
hoc vno dissident, quod medicamenta citra demorsum atq; erosionem vehemēter ex-
siccantia desiderant. Quæ enim mordendo vlcus, & manifestam in eo exasperationem
excitando, dolorem inferunt, fluores, hoc est, humores vlceratis partibus influentes, ir-
ritant, & phlegmonem concitant. Talis igitur medicamentorum materia, quoad eius
fieri potest, ad talia vlcera inuenienda est, vnde vlcus citra mordicationem & dolorem
siccescat. Vt autem validam vlcerum exsiccationem assequaris, duo tibi scopi propo-
nuntur. *Vnus*, vt id quod influit regeras, repellasue, si saltem qui vlceratis partibus influit B
succus, nec multo plus iusto, nec multo deterior sit. *Alter*, vt quod laboranti parti inhæ-
ret, infixumque est, discutias. Atque ea contrariæ vires præstant. Siquidem influxum
reprimunt, quæ adstringunt medicamenta. Digerunt, discutiuntque impacta, iamq; ex-
cepta, quæ trahendi potestate prædita sunt. Porro, quæ adstringunt, vt plurimum ex-
asperant, atque hac occasione molesta sunt. Trahentia vero ac digerentia ex alto hu-
miditates, non citra acrimoniam id efficiunt. At acrimoniam dolor aliquis necessario
sequitur, vlceratam partem molestans. Proinde propter dolorem, quem exasperantia
rodentiaq; concitant, humores vlceratis partibus influentes irritari, & vlcus phlegmo-
ne obsideri, exedique contingit. Vnde omnibus pater, prædictis vlceribus malignis præ-
sidia non ita promte inueniri posse. Quid igitur agendum erit, vt talia vlcera ad inte-
gram perducantur sanitatem? Deligenda sane medicamenta erunt, quæ vtraq; faculta-
te, nempe adstrictoria & discutiente, polleant, atque ita quod influit repellant: quod
vero iam laboranti parti inhæsit, discutiant. His itaque mista facultate præditis medica-
mentis, vlcera, de quibus agimus, citra erosionem demorsumue desiccabis. Ceterum
tamen si medicamentum ex ambobus compositum, erodente puta & adstringente, ne-
cessario validum existat, sordes tamen & humiditatis copia id genus vlceribus incum-
bens, veluti propugnacula quædam vlceratis particulis facta, rosionem valentibus me-
dicamentis adimunt, soluuntque. Porro artificio hac in re vti potius, quam experimen-
to inniti debet Medicus: quod nimirum rationalis Medicus sciat, vlcus non alia me-
dicamentorum virtute curari, quam dum laborans pars eam siccitatem consequatur, D
quam in naturali statu sita possidebat. Quod factum intelligimus, vbi neque tennis am-
plius sanies influat, neq; pus producat. Eo autem peruenient, quo dicebamus modo
siccescentia, hoc est, adstricta, discussaque. *Dein* vbi sicca quidem fuerint, verum sordida
adhuc appareant, deterforiis medicamentis repurgantur. Ceterum quum manifesto
constet omnibus in artis operib. exercitatis, rationem sine operum exploratione pro-
babilem non esse, Medicus diligenter attendere debet, quem effectum medicamen-
tum vlceri adhibitum, quotiescunque ipsum soluerit, in vlcerata particula præstiterit,
quantum scilicet humiditatis in vlcere desiccauerit: vel si etiam sordes adsit, quantum
inde absterferit. Sed & animum intendere oportet, vtrum vlcus carne, quæ subest ex-
esa ac colliquefcente, sordidum euaserit: an quia medicamē sordibus auferendis aptum E
requirat, impositum vero tale non sit: id quod Medicis etiam bonis existimatis, *Galeno*
attestante, nonnunquam imposuit, ac nostris quoq; chirurgis adhuc quotidie imponit.
Vbi enim vlcus post vnam aut alteram medicamenti appositionem sordidius conspe-
xerint, statim non cogitantes an id ex rosione medicamenti acciderit, ad absterforium
valentius acriusq; se conferunt: vnde iterum vlcus erosum ex æquo sordidum, vel etiam
magis adhuc altera solutione visitur. Carne enim a medicamēto colliquata, id fœdatur.
Nam ita in prauam saniem degenerat. Quicquid autem in his ipsis tenuioris substantiæ
est, a medicamento diffatur: reliquum ibidem vlceribus infixum sordes ipsis redditur.
Ceterum quum sit ampla latitudo vtrinque in eo, quod alterum vlcus altero magis mi-
nusque difficulter cicatricem admittat, malignumque sit, corporaque omnia quibus F
mederi cogimur, non eandem omnino temperaturam habeant, sed alia vitioso succo,
alia plethora laborent, quædam dura & robusta sint, quædam vero tenera & mollia, at-
que assentiendum insigniter habilia: fieri non potest, vt vno eodemq; medicamento
omnibus indifferenter prædictis vlceribus quauis corpora occupantibus medeamur:
sed

Diligen-
ter inspi-
ciendum
vnde sor-
des in vl-
cere nata
sint.

A sed tantum sanantium medicamentorum esse numerum oportet, quantus ipsorum quoque ulcerum extiterit. Quapropter in curandis eiusmodi ulceribus ægre sanabilibus, supposita eorum natura, & maiori cuiusque minorive a naturali habitu recessu, laborantis, cuiusque corporis affectus diligenti animadversione considerandus erit. Deinde eiusque medicamenti, tam simplicis quam compositi vis & facultas adamussim discenda: quæ scilicet desiccant, non tamē ulceris detergent sordes: item quæ abstergunt quidem, non tamen probe desiccant: ac quæ utrunque etiam possunt efficere. Sed & accurate prospiciendum est, ex quo to quodque medicamentum ordine existat: hoc est, an imbecillum, an moderatum, an validum. Atque in unoquoque ordine maioris minoris sue ratio attendenda erit, *ut copiosius libr. 4. de compositione medicamentorum generalium Galenus monstrat.*

B Expressam igitur mentionem eorum ex loco Galeni iam citato faciemus, quæ vehementer, quæ moderate, & quæ obscurius exsiccant, a metallicis, quibus etiam terree species adnumerantur, exorsum. Siccant itaque modice, lemnium sigillum, siue ut hodie vocant, terra sigillata, & cadmia, quam climiam barbari appellant, præsertim, quæ sponte sua nascitur. Hæc autem pluribus diebus sub canis feruore ex aceto trita, aut vino plane giluo, & substantia pellucido, facultatem acquirit magis siccantem. Quod si ex aceto teratur, siccataque reponatur, valde etiam magis commode inspergitur. Valentius cadmia medicamentum est chalcitis, quæ species est vitrioli, ut alibi demonstrauimus, combusta, eodemque modo, ut cadmia trita, atque in puluerem redacta, & postea exsiccata. Nam cruda, hoc est, ignem non experta, tanta pollet efficacia, ut iam crustas inducat. Lotam igitur ipsam, deinde tunsam habere satius est. Lota enim quam vsta minus desiccet, tum longe melior est, minusque mordax. Persimile medicamentum est ærugo cremata, quæ vulgo viride æris nominatur. Quæ autem ignem non experta est, fortissimum medicamen est, sicuti chalcitis. Verum hæc non nihil etiam adstringit, & eo multo magis chalcanthum, quod inter metalla maxime siccet. Myi autem & lori chalcitidi genere cognata sunt, ex vna, ut ita cum Galeno dicam, radice producta: tenuius tamen myi apparet, tum minus mordax & vrens: crassius lori est, & utrisque siccet imbecillius. Subi, siue stibium, vulgo *antimonium vocatum*, magis quam lori desiccet & adstringit. Porro *diphryges* appellatum medicamentum, ulceribus ægre humiditatis vitio ad cicatricem venientibus aptissimum est. Valide enim desiccet, tamen si modice mordax sit. Ad hæc præter acrem tum qualitatem, tum facultatem vim habet adstrictoriam. Quodlibet etiam alumen ulcera exquisite desiccet, & genereose adstringit. Vnde nemo solis iis ad ulcera vtiatur, sicut nec cruda chalcitide, & æruginē: vsta vero & hæc myi, vitilia sunt: ut elota morsum quidem remittunt, verum minus siccant. Sunt & alia præter hæc iam commemorata plurima adhuc simplicia medicamenta, quæ malignis curandis ulceribus idonea sunt: ut est *sarcocolla, chrysocolla, plumbum vstum, ferri squama, æris squama, lapis specularis, & multa alia, qua loco prius memorato Galen. ordine percenset.* Ex iam itaque dictis, & aliis a Galeno ibidem commemoratis simplicibus medicamentis, varias remediorum formulas, nempe cerata, vnguenta, emplastra, & pulueres confici possunt, quæ ad eiusmodi maligna, & ægre ad cicatricem venientia ulcera mire proficiunt. Commendatur autem inter cetera hoc, quod recipit *cadmia, aluminis, chrysocolla, singul. partes octo. Floris æris, qui sponte ex are profilit, & aruginis vstorum, singul. partem unam. Gummi cupressi, partes quatuor. Cera olei rosacei, aut myrtini,* quantum satis esse videbitur: fiat vnguentum. Porro quum vnum omnibus medicamentum, *ut saepe iam monuimus,* commode adaptari non possit, tutiorque sit lenium medicamentorum usus, mordacium vero periculosior, optimum erit ex loco Galeni paulo supra citato, quæ sint composita mitiora, quæ item validiora & potentiora, discere. Ingens enim ibidem eorundem est catalogus: quem ut hoc loco infererem, superuacaneum mihi visum est.

De vlcere exedente. CAP. XI.

Quod si ulceris malitia adeo crescat, ut non modo ulceratas atque corruptas carnes, sed etiam sanas absumat depopuleturque, vlcus iam depascens exedentive, Græcis *edēs* quod *vuln.* *Galeno libr. 5. Ther. method. cap. 4. teste,* quod pergere pascendo ab ægris particulis ad eas, quæ integræ sunt, atque harum semper aliquid ægris adicere soleat, nuncupatur: Excitantur autem eiusmodi ulcera a prauis humoribus, sed præsertim biliosis, acribus, & mordacibus, qui propter adustionem malignitatem acquirunt. Atque hæc ma-

Siccantia
medice
simplicia.

Chalcitis.

Ærugo.

Subi.

Compo-
sita.

Vnguentum.

Vlcus ex:
edēs quod
vuln.
Causæ.

Curatio. gna ex parte oriuntur poſt herpetas, & prurientes puſtulas, quas acris & bilioſus humor A
 excitauit: atque etiam poſt vulnera, quæ mordacibus medicamentis exacerbata atque
 irritata fuere. Ceterum ad perfectam ſanationem vt perducantur eiufmodi vlcera, tri-
 plici egent auxiliorum genere: nempe victus ratione proba, & conuenienti purgatio-
Victus ra- ne, quæ prauo & acri ſucco, eroſionemque in laborante particula excitanti ſit accom-
 tio. moda, & localibus remediis. De victus ratione iam ſæpe in præcedentibus libris dictum
Purgatio. eſt, ideo vt ea repetamus nihil attinet. Purgationem autem recte inſtitues, ſi quis hu-
 mor redundet in corpore cognoueris. Inuenies tum ex vlceris ipſius ſymptomatis, tum
 ex notis quas totum corpus præ ſe fert, cuius maxime generis ſit is, qui redūdāt humor.
 Facta redūdantis humoris vacuatione, ad curationē particularis affectus, hoc eſt, ipſius
Localia arrodentis vlceris, deueniendum erit, quæ quidem per localia vocata remedia perfici- B
remedia. tur. Ergo ſi particulam exulceratam atq; arrolam, ſupra modū calefactam videris, ipſam
 ſtatim frigidis adſtringentibus deſiccantib. refrigerabis. Commode autem feceris, ſi vl-
 cus ipſum, & particulam totam vlceratam aqua aluminofa ablueris: hæc enim ablutio
 magno vſui talibus vlceribus eſſe ſolet, quod ſcilicet influentes humores potenter re-
 pellat, & ſiccandi facultatem obtrineat. Poteris etiam laborantem locum irrigare liquo-
 re ſtillatio plantaginis & roſarum, vel aqua in qua candens ferrum exſtinctum ſit: aut
 etiam decocto *cyperī, myrobalanorum, cupreſſi, plantaginīs, malicorī, balausti, & conſimilium.*
Pulvis ex Vt autem ab iniuria influentium humorum vlcerata particula vindicetur, optimum C
ſiccato- fuerit circumiacentes partes vnguento ex *bolo armenio* ill. nere. In medio vero vlceris,
rius. pulvis aliquis, qui vim deſiccandi habeat apponendus erit, qualis eſt, qui ex *liſhargyro,*
uſto plumbo, pompholyge, ſtimmi, are combuſto, corallio, lapide hamatite, & ſpodio loī componitur.
 Item *ſidiis, myrobalanis, & id genus aliis.* Præterea pannorum laciniæ in linamenta formata,
 ſiue ſplenia vnguento albo illita, aut vnguento quod ſextam partem liſhargyri recipit, vel vnguen-
 to, quod *diapompholygos* nuncupatur ſupra vlcus ipſum imponenda ſunt. Ceterum ſupra eiuf-
 modi pulueris ac linamenta vlceri impoſita, puluillus aliquis, quem *plumaceorum* vo-
 cant, poſca aquoſa imbutus, adhibendus erit. Deinde conueniens deligatura, quam
exprimentum nominant. Guido a Cunliaco in talibus vlcerib. ſolebat poſt lotionem abſ-
 que vſlo alio adhibito auxilio ponere laminam plumbi tenuē perforatam, in qua virtus
 argenti viui, cum liquore ſtillatio plantaginis erat infixæ, & ligare deligatura expri-
 mēte. Itaque tria hæc, plumbum, aqua aluminofa, & deligatura decenter facta, miram D
Deligatu- ac fere incredibilem vim habent in ſanandis eiufmodi vulneribus. Porro deligaturam
ra qualis talem eſſe conueniet, quæ ad vſum magis quam ad elegantem formam conducat. Hoc
ſit. autem duobus modis ſit: nempe vel vñico vinculo, ſeu fascia vna, vel duabus. Proinde ſi
 vna tantum fascia fuerit, principio eius verſus ſuperioris vlceris partem ſtatuto neſcen-
 da erit, ſiue ſura, ſiue genu, ſiue malleolus, ſiue cubitus, ſiue manus ſumma, aut alia quæ-
 uis particula laborauerit. At ſi duabus fasciis vtī malueris, altera a parte laborante, hoc
 eſt, ab ipſo vlcere, ad ſuperiorem regionem feretur: altera deorſum prius ducetur, mox
 in ſuperiore parte deſinet, eo videlicet loco, quo prior incepit. Ceterum præter reliqua
 commoda, quæ ex hac deligatione proueniunt, illud etiam accedet, quod vlcera, quæ
 ob rotunditatem coaleſcere nequeunt, oblonga reddentur. Solutio autem non ſin- E
Soluenda gulis diebus, ſed alternis faciendæ eſt. Neque in ſolutione vlcus aqua inſpergendum, ſed
quando molli linteolo puro & ſicco ſanies detergendæ. Quod ſi partes vlceri adiacentes iam
deligatu- phlegmonodes quippiam repræſentent, platyſinati, hoc eſt, linteo lato cui empla-
ra. ſtrum illitum eſt, exterius plurimo ſpatio liquidum medicamentum illinere oportet:
Platyſma quale eſt Galeni *phænicinum*, hoc eſt, e palmulis confectum: vel aliquod ſimile, non
quid quocunq; contigerit dilutum, ſed vino adſtringente, quantum imbibī poterit. Sitque
 oleum, quod adicitur, refrigerans & adſtringens, cuiuſmodi ſunt *myrtum & melinum.*
 Quod ſi hæc non adſint, omphacium nominatim adhibebis. At ſi durities circa partes
 vlceri adiacentes apparuerit, ipſum phænicium oleo veteri, aut ricinino, quod offi-
 cinæ oleum de cherua nominant, diluendum eſt. Tutiusque fuerit, ſuperpoſitæ regio- F
 ni quodpiam ex medicamentis repellentibus liquidis adhibere: quo, ſi quid vel pra-
 uum, vel pluſquam pat eſt inſluit, regeratur. Atque id maxime, quum in crure vlcus ob-
 ortum, ſuperpoſitam venam varicoſam habet. Quæ dum magna eſt, ac ſanguinem, nec
 colorem rubrum, nec probum, ſed attriorem & melancholicum continere videtur, ex-
 ſcin-

- A** scindenda auferendaque est. Ceterum si vlceræ eiusmodi admota medicamenta contemnunt, indiesque magis atque magis erosio serpat, & augeatur, corpus subinde a vitiosis humoribus repurgandum erit, ac materia ipsa depascens atque arrodens, inustione seu actuali cauterio absumenda & desiccanda veniet: modo laborans id auxilii tutum atque vtile, ceterisque aliis longe præstantius, non reformidet ac renuat. Quod si ferrum candens ob humiditatem, aut delicatam nimis naturam pati, atque admittere noluerit, medicamenta acriora, & quæ ignis vires habeant admovebis: cuiusmodi sunt pastilli Andronis, Musæ, aut Pasionis, a Galeno *libr. 5. de compos. medic. generalium cap. 19.* descripti. His etiam atramentum scriptorium magna utilitate admoventur. Quod si hæc parum profecerint, arsenicum, quod *sublimatum* nominant, modica tamen quantitate, tuto adhiberi potest. Locus autem ambiens, hoc est, circumpositæ vlcerei partes, interim refrigerantibus perpetuo muniendus erit, ne tam vehementibus admotis præsidis, fluxio irriteretur. Porro si ne his quidem tam potentibus auxiliis vitium aliquando vitæ fuit, nec erosio ipsa depascens quouis modo susti possit, membrum amputare oportet.

De sordido & putri vlcere. CAP. XII.

- V**lcus sordidum, quod Græcis *πύραα* dicitur, est, quod crassiore illo ac viscoso cremamento, quod *sordem* appellant, scætet. Putre autem est, ex quo vapor aliquis graueolens, & cadauerosus expirat, & attollitur, persimilis illi, qui a putrescentibus ac corruptis iam carnibus exhalat. Ac tale etiam recentiores *fraudentum* appellant. Huius si malitia ulterius progrediatur & serpat, in sphacelum, quem vulgus *Esthiomenum* vocat, degenerat, & homini vitam adimit. Horum vero vlcerum causæ sunt pravi & crassi humores, sanguinis naturam quodammodo referentes, hoc est, sanguinei, qui feruore quodam velut ebullientes, venenositatem atque malignitatem quandam indispiscuntur. Et hæc quidem magna ex parte carbunculos maleficos, abscessus, & vulnera male curata consequuntur. Signa ex vtriusque definitione innotescunt. Ceterum talium vlcerum curatio consistit in proba victus obseruatione, de qua iam sæpe est dictum: & vacuationibus commodis, quibus corpus vniuersum ab excrementis, atque a natura alienis humoribus expurgatur. Vbi autem iam purum ab excrementis vniuersum corpus tibi apparuerit, tum laborans ipsa particula, hoc est, vlcera cucurbitulis, scarificationibus, hirudinibus, atque fotibus a corruptis ac deprauatis succis ipsam occupantibus vindicanda erit. Posthæc vero propriam ipsius vlceris curationem aggredieris. Sordes igitur primo tibi abluenda erit, aut mulsæ, aut marinæ aqua: vel si eius copia non est salsa. Deinde mundificandum vlcus vnguento, quod vulgo *Apostolorum* dicitur, aut eo, quod *Ægyptiacum* nominatur. Posthæc, quidam desuper adhuc esse admoendum monent, quod mundificet, ex *succo absynthii, rosaceo melle, myrrha, & farina hordeacea* compositum: & circumiacentes vlcerei partes vnguento ex bolo armenio illinunt, ac supra cetera prædicta puluillos ex canabinis stupis studiose pexis, aut ex lienis pannis læuibus, posca aquosa imbutos apponunt atque alligant. Si vero sordes in putredinem, aut corruptionem degenerant, locus abluendus erit posca, aut aqua cineris, vel saponis. Deinde emplastrum ex carnibus piscium salforum, farina probi, & aristolochia longa, non autem rotunda, & scylla, omnibus ex vino coctis, & cum melle mixtis, super accommodandum est. Ad hoc sane institutum sequens medicamentum, vepote multa experientia comprobatum, plurimum confert. Habet autem *tragacanthi rubri, unciam unam. Calcis viuæ, aluminis, corticis granatorum, singul. drachmas sex. Thuris, gallarum, singul. drachmas quatuor. Cera & olei, singul. quantum satis fuerit.* Et hoc, quod accipit, *vitrioli partes duodecim. Chalcitidis, partes decem. Tragacanthi partes nouem.* Coquantur in aceto, & ex eis fiat linimentum. Ac semper quidem vnguentum ex bolo in ambitu vlceris, *ut supra monuimus*, apponito. Desuper vero stupeos puluillos, posca madefactos. Porro si vlceræ eiusmodi depascentia putridaque, cœque feritatis & malitiæ deuenerint, vt partes adiacentes magis atque magis semper erodant, ac sine modo in illis corruptelam excitent, vehementissimis medicamentis, qualia supra in curatione malignorum vlcerum recensuimus, indigebunt. Imo vero frequenter inustiones, atque etiam excisiones illis erunt necessariæ: ita vt quicquid vitiatum ac corruptum est, prorsus extirpetur, & viua ac sana duntaxat caro relinquatur, quam ex nativo

Sordidū
vltis:
Putre.Esthiomē
nūm.
Causæ.Signa.
Curatio.

Linimentum.

ipsius colore, & sanguinis bonitate facile deprehendes. Inter cetera vero meditamen-
ta acria, quæ viuum a corrupto separant, & in hoc affectu celebrari solent, omnium præ-
stantissimum atque efficacissimum quotidiana experientia deprehenditur *arsenicum*,
quod *sublimatum* vocant. Hoc enim confestim vitium sistit, & id quidem sine dolore.
Quod si medicamenti eiusmodi vitium non cesserit, membrum tali depascente ac pu-
trido vlcere laborans cogimur abscindere, vt reliqua pars tuta sit. Id autem miserum
atque extremum præsidium nunquam tentandum est, nisi vbi cetera nihil proficiunt,
& vitio prorsus victa sunt.

De profundo & cuniculoso ulcere. C A P. XIII.

Vlcus cuniculosum, quod alii *cauernosum* appellant, cuius orificium strictum & an-
gustum est, profunditas vero in latum se diffundit, & sensum effugit, multosq; an-
fractus seu cuniculos modo rectos, modo obliquos, citra tamen duritiem & callum ha-
bet, dicitur. Græci hoc ipsum *ὥλον*, Latini *sinum* nominant. Fit, cum adiacens vlceribus
cutis diutius subiectis corporibus non coalescit, glutinaturque. Huius autem multæ ac
variæ sunt differentię, ex cauernarum magnitudine, situ, figura, ac numero desunt.
Aut enim breues sunt, aut alte penetrantes, iuxta carnem desinentes: aut ad ossa, vel car-
tilaginem subeuntes, sursum, deorsum, vel ad latus tendentes, recti aut flexuosi, simpli-
ces ac duplices, triplicesue. Causæ eiusmodi sinuum sunt abscessus, siue suppurantes af-
fectus tardius dissecti, & vulnera perperam curata. Pus namque longo nimis spatio in
suppurato abscessu, aut in profundo vulnere, quod non rite expurgatur, retetum ac de-
litescens, malignitatem, & veluti acrem atque erodentem quandam naturam acquirit:
& tandem cuniculos molitur, qui difficile admodum carne impleri, ac glutinari que-
ant. Ad laborantem namque particulam, quæ iam imbecillitatem contraxit, vndique
ex circumiacentibus ac vicinis partibus, imo vero & ab vniuerso corpore, superuaca-
nei humores confluunt, atque ita ægre sanabile redditur vlcus. Differentię cuniculo-
rum deprehenduntur specillis, siue contis argenteis, vel plumbeis, aut alia consimili
materia factis, in ipsos cuniculos leuiter & blande immisissis. Item minutis quibusdam
atque exilibus radicibus, & cereis candelis, necnon & coloratis quibusdam iniectioni-
bus. Dolor vero materiæ, quæ ab ipsis sinibus egreditur, qualitatem eius manifestè mō-
strat. Si enim tenuis fuerit, & loturæ carnis per similes appareat, calidam esse haud teme-
re eam iudicabit. At si candida visitur & serosa haud dubie frigida erit. Sed & pus boni-
tas & paucitas, doloris quoque ac tumoris, qui prius aderant priuatio, sinum carne im-
pleri & glutinari demonstrant. Si vero contraria his adfuerint, glutinationem nequa-
quam adhuc nobis fieri indicant. Ceterum siue magnus, siue paruus, aut brevis, vel al-
tus, aut iuxta superficiem consistens, simplex, vel duplex, triplexue fuerit sinus, eadem
semper est eorum curandi ratio. Ac si vel sursum, vel deorsum, vel ad latus, vel intro ad
ossa tendit, curationem variat. Quum enim sursum tendit, facile per eius os saniosa col-
luies, atque ipsum pus effluit, adeoque non multum negotii Medico in sanando facesset.
Quum vero deorsum vergit, intus retentum pus, aut sanies, contiguas partes erodit.
Quare nisi factò ex aduerso emissario, nihil omnino profeceris, siue carnem generare,
siue glutinare velis. Quum autem ad latus declinat, aut sursum vergit, aut intro fertur:
sed ita locari laborantis pars potest, vt libere sanies aut pus e sinu effluere possit: incisione
ex aduerso facta opus non est. Quum vero sinus deorsum vergit, aut ad latus declinat,
vel intro fertur, vt situm laboranti parte commodum dare non licet, quo sanies atq; pus
libere effluat, nihil promouebis, vt dictum est, nisi prius collectioni purulētæ effluxum
molitus fueris. Porro saniosæ & purulentæ illi colluiei, bifariam effluxum moliri po-
teris: nempe vel factò tantum in imo sinus vulnere, vel tota cavitare dissecta. In imo, seu
radice sinus fit sectio, si vlcus magnum fuerit, & locus totus sine periculo secari non po-
test. Præstiterit autem semper, si nihil obstitit, totam ipsius sinus cavitatem dissecare,
quam ex aduerso plagam facere. Ita enim facilius, ac citius multo ad sanitatem vlcus
perducetur. Tota igitur cavitare dissecta, ellychniis & pannorum laciniis in linamenta
formatis, congruisque medicamenti sic expurgandus atque resiccandus sinus erit, vt
tandem caro regignatur, cavitata impleatur, & ad perfectam sanationem, modo quo
libr. 6. cap. 4. de cauo vulnere docuimus, perducatur. Ceterum priusquam ex aduersa parte
diuisio fiat, purulenta colluies sinenda est magna satis copia in fundo ipsius sinus colli-

gi, quo

Arsenicū
sublima-
tum.

Cunicu-
losum vl-
cus quid.

Signa.
Sinus.
Differen-
tia.

Causa.

Signa.

Curatio.

- A**gi, quo sinus parietes magis attenuentur: atque ita melius specillum, supra quod sectio fieri debet, in cavitatem demittatur, sinu scilicet ex puris copia distento, & ampliore facto. Specillum autem ipsum, quod sic in sinum immittitur laue, hoc est, minimo asperum esse debet, ac vinctuoso aliquo, ut citra dolorem immitti possit, illitum. Ad hæc parte posteriore perforatum esse decet in modum acus, ut in eo imponi possit ceto aliquis, *ut vocant*, ex canabinis stupis, aut aliqua gracili fascia, aut certe funiculo quoquam molli, ut canabino, factus. Incisione autem facta, dolor qui per eam excitatus est, sedandus erit: & impetus profluentis sanguinis, ovi candido, atque aliis id genus suppressendis sanguinis profusioni dicatis auxiliis compescendus. Post hæc autem cento alius, quando opus erit, detergente aliquo medicamento imbutus, indendus erit: atque ut id commodius fiat, alteri, qui sinum adhuc occupat, aut affuetur, aut alligabitur. Poterunt & ellychnia seu linamenta mundificatio aliquo imbuta in sinum ipsum imponi, superque atque in ambitu adhibenda sunt, quæ mox infra dicemus. Porro si neque in imo sinuosi viceris plaga commode fieri possit, neque cavitatis tota disseccari, sinus totus eluendus erit colutionibus, primum quidem deterforis, si inhærens pus, vel saniem subesse suspicaris. Deinde carnem generantibus, postea vero ad glutinans medicamentum transeundum erit. Proinde Galenus libro 2. ad Glauconem cap. 14. sinum ipsum nunc melicrato, hoc est, mulsa sola, nunc quidem puro vino, nunc vero mulso eluendum esse monet. Ad detergendum itaque, expurgandumque sinui inhærens pus, mulsa præferenda est. Præsertim in sinu cuius os deorsum spectat, per quod pus & sanies libere effluant. Huius namque sinus profunditatem totam, ad glutinationem aptam, Galeno ibidem attestante, sola redde potest iniecta mulsa. Ad purgandum vero simul & roborandum, ubi scilicet aliqua adhuc levis cuiusdam sordis derelictæ suspicio est, vel ipso etiam Aetio auctore, mulsum deligimus. At ubi carnem iam in sinu mediocriter regentam omnino puram esse coniecerimus, & glutinationem querimus, vino puro subadstringente sinum ipsum eluimus. Vinum enim eiusmodi, quod medium est inter dulce & adstringens, leuiter glutinat. Si autem cruentus foetidusque sit humor, qui e sinu excernitur, oxymeli ceteris præstat. Alii sinum, præsertim maligniorem & vehementer sordidum, detergent ac eluunt aut lixiuio, aut marina aqua, aut etiam aluminosa, quæ in hoc affectu præstantissima est. Hæc enim præterquam, quod potenter fordes abluit, a parte quoque laborante fluxionem arcet, ac repellit. Alii vnguentum Ægyptiacum cum aqua & melle liquidum, in sinum eiusmodi deterfionis & corrigendæ malignitatis gratia immitti iubent. Galenus quoque ubi sinus ipse, aut situs, aut alterius cuiusvis occasione sordidior aut humidior est, medicamenta, quæ valentius, quam mulsa desiccant, & detergant, admo- uenda esse suadet: quale est *medicamentum ex combusta charta compositum*, quod ad hunc modum temperatur. *Squama, galle, myrrha, singularum pondo drachmas octo. Sandarache, ar- senici, elaterii, singularum pondo drachmas quatuor. Thuris, pondo drachmas tres. Chalcantibi, tan- tundem. Charta, quantum satis est ad inducendum colorem.* Debet autem exigua eiusmodi me- dicamenti portio largo rosaceo misceri, quo & eius vehementia remittatur, & per an- gustum foramen in profunditatem sinus per fistulam aut æneam aut corneam, recto ductus foratam possit injici. Iniecto autem medicamento, viceris os linamento concet- pto claudendum est, ne id refluat. Nisi enim diutius maneat, exsiccare non poterit. Ce- terum si vlcus sinuosum calidam intemperiem sibi adiunctam habuerit, non alienum fuerit ipsum abluere aqua mulsa recenti, in qua lenticula, hordeum, rosæ, & balaustrum incocta fuerint. Si vero frigidam sibi adiunctam intemperiem habuerit, mulsa in qua marrubium, absynthium, pimpinella vocata, & myrrha incocta sint, eluendum est. Por- ro ubi sic ab omni sorde purus sinus effecerimus, carne replentibus medicamentis, si caui saltem fuerint, deinde glutinantibus, & tandem cicatricem inducentibus, similiter reliquis vlcerebus, vtendum erit. Quæ autem carnem generent, glutinent, & cicatri- cem inducant medicamenta, copiose admodum libro 3. Therapeutica methodi, cap. 2. & 4. docet Galenus. Ergo si cauus sinus carnem requirat, primum medicamenti, quod ex Si cauus sinus car- nem re- quirat. charta combusta constat, aridi paululum cum multo rosaceo inferi conuenit. Deinde capto linamento os obturari. Inde emplastrum Isis, aut Machætionis, aut simile quod- dam vna cum rosaceo cerato liquidiore solutum iniicitur. Vbi medioeriter carne re- pletus est sinus aliquod ex glutinantibus medicamentis, non vehementer siccantibus,

**Enhema medica-
menta.
Medica-
mentum
glutinās.**

**Modus
deligandi
sinus post
glutina-
torii me-
dicamen-
ti im-
positionem.**

**Cirrhum
medica-
mentum.**

**Spongia
qualis ef-
fe debeat.**

adhibendum est, quod crescentem tenellam carnem blande & sine morſu cogat, non aliter ac recens ac si cruentum vulnus curaretur. Curatur autem hoc mollibus, blandis, minimeque dolorem excitantibus medicamentis: qualia sunt *enhema* vocata Græcis, quorum facultas est coniungere, & diuisas partes glutinare, vt in pristinam vnitatem particula reducatur. Horum autem multa sunt, quæ loco citato Galenus commemorat. Ceterum sequens medicamentum, quod in frequenti apud chirurgos vsu est, miram in glutinandis vlceribus vim habet. Accipit *decocti hordei, libram vnā. Mellis rosacei, uncias tres. Sarcocolla, drachmas duas. Myrrha, thuris, singul. drach. vnā. Vini odoriferi, uncias sex. Coquantur omnia simul vsque ad tertias.* Quibus adici potest aliquando aliquid aloes. Ceterum post glutinantis medicamenti impositionem, sola spongia noua ex mulſo, iuxta Galeni consilium circumponenda est, quam fieri potest mollissima. Eius autem deligatura a sinus fundo incipiat, & eius ore finiat. Fasciarum vero spiræ siue circumflexus, sinus profundum sine dolore arctent, ac paulatim vsque ad os eius elaxentur: eademque indatur medicamentum molle, circumducto forinsecus emplastro ad os ipsius sinus forficibus discisso, vt sanies effluere possit. Effluet autem e sinu sanies, supposito aliquo alio paruo emplastro ad solutionem vsque: quam tertio quoque die faciens, hoc ipsum tanquam operculum circumpositum auferes, relicto eo quod totum ambit sinum medicamento. Tertio autem quoque die, aut certe citius aut tardius, prout res efflagitabit, demenda spongia est, ac paruum quod superpositum erat emplaſtrum, vt si qua humoris colluuius in ore sinus collecta sit, vacuetur: exploremusque, an altæ sinus partes coaluerint, an minime, quod ex manante sanie deprehendetur, si scilicet ea vel multa, vel pauca, cocta vel cruda sit. Proinde altas ipsius partes coaluisse demonstrat pus coctum ac paucum, præsertim si neque in ipso sinu dolor sentiatur, nec tumor appareat, sed locus totus æquabilis sit, siccus ac doloris expers. Quumque spongiam rursus imposueris, rursusque ad alligaueris, postero vel tertio die, vt dictum est, soluto semper linteolum sinus ori admotum permutans, quod eodem emplastro illitum totum os ambitu cingat. Neque vero omnino appressum esse debet, sed ita vt per id tota sanies vacuari possit. Itaque quum secundo vel tertio quoque die, vt comprehensum est, spongia, vel paruum emplaſtrum eximitur, considerandum multane an pauca, cruda an cocta materia ad os vlceris affluerit. Deinde expers ne sit, an particeps doloris locus laborans: & an tumor remanserit, aut diminutus sit. Altas enim sinus partes coisse, vt dictum est, testatur pus coctum ac paucum, præcipue si dolor & tumor non adsint. Contra multum & crudum, & foetore, ac loci humiditate, dolore & tumore, nondum coaluisse significant. Neque vero, si primo vel secundo die tenuis quædam sanies ex sinu manet, de glutinatione omnino desperandum est. Sæpe enim vis medicamenti laboranti particulæ admoti, ex ipsa cute & subiecta carne tenuem humiditatem vehementer exprimit, quoties eius qui curatur corpus ita affectum est, siue ex natua intemperie, siue mala victus ratione. Hac humiditate expressa, loca mediocriter siccata glutinantur. Quod si tertio, aut quarto ab initio die sanies cruda in ore apparuerit, scito sinum non esse glutinatum. Quare laboranti loco medicamentum quod vehementer quidem exsiccat, sed nec mordeat, nec cutem contrahat, circumponendum est. Cuiusmodi est medicamentum Galeni, quod a fuluo colore cirrhum dicitur, ex concoctis metallicis, oleo ricinino, & aceto sine cera confectum. Cuius compositionem & vsum *lib. 2. de compos. medic. generalium Galenus docet.* Exsiccat enim vehementer, idque sine morſu. Atque hanc curandi rationem sinuosi vlceris Galen. *lib. 2. ad Glauc. copiosius docet.* Guido a Cauliaco iubet post glutinantis medicamenti impositionem, emplastra desuper esse imponenda, & pannos aliquo quod habeat, vt verbo illius vtat, rectificare illa, illitos. Cuiusmodi sunt, emplaſtrum quod a palma Græcis *ποσειδων* appellatur. Item emplaſtrum nigrum vel flauum cum gallis, & mel coctum cum puluere thuris, myrrhæ, & aloes: vel quædam horum, vel omnia simul: & vinum adstringens crassum. Postea ligare præcipit. Paucis vero interiectis specillum imponendum esse canulatum, sic enim loquitur, aut duplicatum, vt pus continuo effluere queat: & spongiam super orificium esse ponendam docet, vt pus sugendo extrahatur. Spongia namque ideo circumdatur & alligatur, vt exsiccat, manansque e sinu pus excipiat, alioqui partem erosurū, aut pruritum excitaturum. Imbuta autem mulſo spongia sit, vt detergeat: mollis, ne asperitate la-

A dat: noua vero, vtraque marina adhuc imbuta laborantem partem deficcet. Ceterum quum sinus non sit nisi cauum vlcus, ordo curationis postulat, vt a cavitatis impletione ordiamur. Ideo omnia, quæ *lib. 6. de caui ulceris curatione* dicta sunt, hic etiam consideranda veniunt. Spongia qualis esse debeat.

De Fistula. CAP. XIV.

Fistula, siue fistulosum vlcus, a sinu seu cuniculoso vlcere nihil differt, nisi quod anfractuosa ac sinuosa meatus, callosos & duos habet. Est itaque fistula, quam Græci *Fistula quid.* *nerve* nominant, arctus oblongusque, & callosus sinus, aliquatenus indolens, qui magna parte ex abscessibus parum dextre curatis oritur. Quum enim quis sinum ex abscessu exortum statim curet, callo obducitur, durusque temporis progressu fit, nec conglutinare ipsum cum sibi subiectis est possibile. Atque sunt fistularum multiplices differentie, quas omnes Celsus *libro 5. cap. 28.* recenset. Fistularum autem dignotiones hæ sunt. Simplicisne sint, an in plures partes diducantur, cognoscitur ex modo puris. Cuius si plus fertur, quam quod simplici spatio conuenit, plures sinus callosos esse manifestum est. Quumque fere iuxta sit caro & neruus, & aliqua neruosa: quales fere tunicæ, membranzque sunt: genus quoque puris docebit: num plures sinus intus diuersa corporis genera perferant. Siquidem ex carne pus lzue, album, copiosius fertur. At ex neruoso loco, coloris quidem eiusdem, sed tenuius & minus. Ex neruo pingue, & oleo non dissimile. Sed & ex aliis notis, quam ex pure, deprehenditur nerui fistula, nempe dolore: stuporis enim punctioisque sensum incurrit. Deinde motus qui ab eo neruo perfici solet, deterior apparebit. Sed in specilli attractu molestus acutusque sensus redditus rem manifestissime indicabit. Porro si locum erodente fistula, vena suberit, plurimus, & is crassus sanguis effunditur. Sin arteria aperiatur, tenuis & flauus cum multo spiritu, stridoreque exibat. Ante omnia autem demitti specillum in fistulam conuenit, vt quo tendat, & quam alte perueniat, scire possimus. Simul etiam protinus, humida, an siccior sit, quod extracto specillo patet. Si vero os in vicino est, id quod disci potest sic, iam necne eo fistula penetrauit quatenus nocuerit. Nam si molle est, quod ultimo specillo contingitur, intra carnem adhuc vitium est. Si vero magis id renititur, ad os ventum est. Ibi deinde si labitur p specillum, nondum caries est: si non labitur, sed æquali innititur, caries quidem, verum adhuc leuis est. Si inæquale quoque & asperum subest, vehementius os exesum est. At cartilago vbi sub hæsit, ipsa sedes docet, peruentumque esse ad eam ex renixu patet. Ceterum si oblique fuerint fistulæ flexumque aliquem, vel plures habuerint, vt specilli apex progredi nequeat, virgulam, vel ex nigro, vel albo plumbo conflabimus, aut ceream potius candelam assumemus, qua iter pertentemus. Quum enim flexilis admodum sit, ad fistulæ figuram accommodabitur. Porro fistulæ si altius penetrant, vt ad vltimas demitti collyrium non possit, si tortuosæ atque anfractuosæ sunt, si multiplices, maius in manu quam medicamenti præsidium est: minusque operæ est, si sub cute transuersæ feruntur, quam si rectæ intro tendunt. Expedita quoque curatio est in fistula simplici, recenti, intra carnem: adiuuatque ipsum corpus, si iuuenile, si firmum est, inimica, contraria his sunt. Itemque si fistula os, vel cartilaginem, vel neruum, vel musculos lz sit, si articulum occupauit, si vel ad vesicam, vel ad pulmones, vel ad vuluam, vel ad grandes venas, arteriasue, vel ad inania, vt guttur, stomachum, thoracem, penetrauit. Ad intestina quoque eam tendere semper periculosum, sæpe pestiferum est. Quibus multum mali accedit, si corpus vel ægrum, vel senile, vel mali habitus est. Ægre etiam confanescit in ano fistula, quæ orificio caret: tum quæ delitescit, & in os terminatur, multifariamque fissa est. In curandis autem fistulis in primis genus victus conueniens, & quod substantia & qualitate caussis, quæ fistulæ glutinationem, impediunt, aduersatur, summe est necessarium. Deinde vt corpus vniuersum a superuacaneis & noxiis humoribus, illis tamen prius, si ita res exigat, expulsionis paratis, idoneo medicamento purgante vacuetur. Mox potionibus roborandis & desiccandis interioribus partibus accommodis, fistula ad glutinationem præparetur. Tametsi vero multæ ad hoc institutum vtilis a variis auctoribus descriptæ sint, duæ tamen præcipuæ, quæ in frequenti vsu, & felici successu sunt, a recentioribus Medicis inuentæ sunt. Prior accipit *supatorii, agrimoniam vulgus Medicorum vocat, partes tres. Plantaginis partes duas. Foliorum olivæ, partem unam.* Scindantur minutim, & contendantur, postea in vino albo coquantur. Potiones fistulis idoneæ.

tur, & fiat colatura, de qua singulis diebus sub auroram cyathus vnus exhibeatur. **Alte-**
ra, habet *filicis maris*, partes tres. *Gentiana*, partes duas. *Centaurii minoris*, partem vnā. Co-
quantur in vino albo, & fiat potio, quæ vt prior administretur. Optimum autem fuerit,
si in prædictis decoctionib. non nihil ligni Guaiaci aliquot horis maceretur, postea mo-
derato igne leuiter decoquatur, & ex colatura, quantum Medico satis esse videbitur,
Localia. ægrotanti mane bibendum offeratur. Quod vero ad localia medicamenta attinet,
primum quidem fistulæ orificium, si non satis hiet, & nimis strictum fuerit, imo vero &
sinus ipse fistularis vsque ad fines eius, si fieri commodè possit, dilatari debet. Ergo si nec
aduri ferro, nec incidi commodè possit fistula, & eius os, aut sinus totus, siue vnus ac sim-
plex, siue multiplex fuerit, non satis late pateat, immisso collyrio aliquo, seu specillo am-
pliari ac dilatari debebit. Materia autem ad conficienda collyria, dilatandis fistulis ido-
Bnea, sunt radices *gentiana*, *aristolochia*, *bryonia*, & *dracontii maioris*, aut *ari*. Sed in primis
huic negotio accommodata sunt frusta spongiæ contorta, & valide compressa. Ex his igitur
fiant collyria, siue penicilli, altera quidem parte tenuia altera, paulo crassiora. At-
que ea parte, qua tenuia sunt, demitti oportet in fistulam, sed filo semper appenso, vt
Trifaria tutius, si altius descenderint, & promptius, si nimis hæreant, extrahi possint. Demittan-
fistula de- tur autem horis duodecim, aut certe longius aut breuius, donec scilicet satis dehiscat
struitur. fistula. Ceterum orificio fistulæ atque eius sinu sufficienter dilatatis secundo loco ipsius
destructio prorsus molienda est. Id autē trifariam fieri consuevit. Primum medicamen-
Callos ex- tis acrioribus & callum extercentibus. Callos autem, *Galeno*, *Paulo*, *Actio*, & *Celso*
tercentia. *testibus*, elidunt atque excindunt, radix *sphondilii*, officinæ Germaniæ nostræ *Bran-*
cam vrsinam vocant, circumrasa, & fistulis imposita. Item *veratrum nigrum*, duobus
tribusue diebus infertum idem præstat. Ad hæc *amurca cocta*, & in collutionem adhibi-
ta. Ad idem *elaterium terebinthina exceptum* in collyrio cogito, impositoque. Vel *la-*
serpitii radice succum infundito. Id quod sequitur, etiam, *Paulo attestante*, exterit. Ha-
bet *eruginis*, drach. duodecim. *Ammoniacy*, drach. duas. Excepta aceto in longum in-
ducuntur, & fiunt penicilla. In communi vsu apud recentiores chirurgos sunt penicil-
Pastilli a- la siue collyria ex pastillis asphodelorum, quorum descriptio ex antidotariis vocatis
sphodelo- petenda est. Item ex *calce* & *sapone*. Ad hæc quæ arsenico illinuntur penicilla, nemi-
rum. nem vnquam fefellerunt. Si vero fistulæ multos, & valde contractuosos aliosque cu-
niculos habent, ita vt in eos collyria eiusmodi, prout res exigit, indi non possint, ea-
dem ex aceto aut liquore aliquo ad rem accommodo, per auricularium clysterem
intro infundenda sunt, vt scilicet per omnes multiplicis ipsius fistulæ anfractus per-
ferantur. Mirifice vero in antiquis fistulis, & admodum callofis, sequens iniectio
prodest, quæ accipit: *Vnguenti Aegyptiaci*, semunciam. *Mercurii sublimati*, drachmam di-
midiam. *Lixiuii*, uncias quatuor. *Aquæ rosarum*, uncias duas. *Arsenicici*, scrupul. vnum.
Liquoris stillaticii plantaginis, uncias quatuor. Bulliant vsque ad tertias. Iniecto medica-
mento fistulosi vlceris os linamento concepto, aut quouis alio claudendum est, ne re-
fluat. Nisi enim aliquamdiu maneat, nullum effectum effatu dignum præstare pote-
rit. Si autem duplices, aut multiplices eiusmodi fistulæ sint, sic tamen vt breues, intra-
que carnem sint, eadem etiam medicamenta, quæ callos elidunt, arida in calamum
E scriptorium coniicienda sunt: isque ori fistulæ aptandus est, inspirandumque, vt ea
medicamenta intus compellantur. Aut eadem ex vino liquanda. Si vero longior &
transuersa fistula est, demisso specillo contra principium huius incidi commodissimum
est, & collyrium vtrumque demitti. Aqua fortis chymistarum, saltem prima, in eius-
modi tortuosis, atque labyrinthi modo flexuosis fistulis, mirifice prodest. Alter abolen-
di fistulas modus est, qui primum per incisionem totius cavitatis fit, deinde per adustio-
nem, quæ vel caustico medicamento vel ferro candenti & ignito inducitur. Ceterum,
quæ in magnas arterias, vel neruos, vel tendines notatu dignos, aut membranam costas
succingentē, aut aliquam principalem particulam deueniunt, vel nequaquam, vt in su-
P *perioribus etiam libris monuimus*: vel certe cū multa artificiosaq; diligentia, ac prudētia at-
tingendæ sunt. Reliquis vero hunc in modū manū admoiemur. Primū quidem tenta-
bimus, an rectæ sint vel obliquæ, demisso intro specillo, vel cerea candela. In quibus au-
tem duæ pluresue oræ habentur, quæ specillo aut cōsimili instrumento tentari minime
possunt, ita notantur. Clystere in sinū per vnum os liquorem compellimus, exq; transi-
tu eius

- A** tucius reliqua ora facile deprehendimus, vna ne, quæ multas oras habet, an multæ sint fistulæ. His ita exploratis, si in summo fuerit sinus, atque is angustus, specillo demisso explicandus est, supraque id accommodata figura, scalpello incidendus. Idem faciendum, si plures se quasi ramuli ostendunt. Vbi ad fines fistulæ ventum est, diuisio ulceri imponenda sunt specilla, oui candido liquore imbuta, quæ labra solutæ continuitatis distendant, & inuicem coire non sinant. Postera die locus adurendus erit, vel ferro candente, vel caustico, seu adurente aliquo medicamento, nempe vel puluere asphodeli, vel arsenico, vel consimili alio, quod facultatis sit vtentis. Alii *hydrargyrum*, id est, *argentum viuum sublimatum* admovent, quo efficitur, vt nihil corruptum, nihil callosum, nihil denique, quod præter naturam sit, in ulcere remaneat, quod non omnino desiccetur, elidatur, & absumatur. At si non summa occupauerint fistulæ, & sub eute non transuersæ ferantur, sed rectæ intro tendant, vbi quam profundissime potest, & quatenus licet, incisus fuerit sinus, orbiculatim totum callum, modo qui nuper dictus est, si fieri possit, auferemus. Quod si aliquid ex eo relictum fuerit, adurente id medicamento absumemus. Si autem multum sit, quod ex callo remansit, nec medicamento cedat, candentibus ferramentis adurendum est. Superponenda vero sunt, atque in circuitu semper admouenda, quæ refrigerent, & reprimant. Nam fere, quæ circa fistulam sunt, *Celso teste*, aliquid habent phlegmonis. Signum autem quo dignoscimus medicamentum acreatque adurens suum affectum, quod satis est, induxisse, est ulceris elatio sine tumefactio; ac trium dierum mora, vt communis usus habet. Adusta itaque, & vt oportet resiccata fistula, mitigatorio aliquo medicamento primis diebus vtendum, vt oleo cum oui luteo mixto. Deinde ea, quæ crustas ferro ignito, aut adurente medicamento inductas resoluunt ac deiiciunt, admouenda: cuiusmodi est butyrum, aut aliquod aliud simile pingue ac vntuosum. A quorum usu non prius desisto, quam crustæ deciderint, & in pus conuersæ fuerint. Mortificatæ autem fistulæ euident argumentum est, quum pus quod ante multum & crudum apparuerat, nunc paucum & coctum visitur. *Tertius* modus abolendi fistulas est, qui fit per incisionem citra vstionem, cum calli euulsione. Facta itaque, vt ante proditum est, incisione vsq; ad fines, seu fundum ipsius fistulæ, callus totus vel vnguibus, vel acie scalpri, vel rasorio cultro, id est, nouacula detrahi debet, ita vt locus, seu sinus ipse purus, & ab omni sorde mundus appareat, quod
- D** viuæ ac probæ carnis præsentia deprehenditur. Et hæc vera est fistulæ curatio, quam statim, si nihil obtiterit, aggredi debemus, quoties fistula nobis sananda, & abolenda proponitur. Ceterum dilatata fistula, atque in totum abolita, detergentibus si quæ sordes adhuc superfit, & carnem generantibus medicamentis vtendum. Ergo callo fistulæ eliso atque absumto, si sordes aliqua subsit, mullso, vel aqua in qua eruum coctum sit, sic vt huic quoque mellis paulum adiciatur, locum abluito, vel sequenti medicamento repurgandis fistulis, post remotum callum longe accommodatissimo vtendum, quod habet: *Terebinthina in aqua vitæ, vt vocant, abluta, vncias tres. Succus apii. Succus cynoglossi, singulorum drachmas sex. Mellis rosacei colati, sesquiuineiam. Aristolochia rotunda, drachmas duas. Farina lupinorum, semunciam.* Coquantur succi & terebinthina cum melle rosaceo, vsque ad medietatis succorum consumptionem, deinde reliqua commisceantur. Si prædicto medicamento absterfitorio *myrrha, sarcocolla, radicis arida peucedani, & iridis*, singulorum momentum adieceris, optimum sarcotiæum carnemue generans medicamentum effeceris, modo ex eo linamentum aut penicillus illinatur. Aliud, Aetii libro. 14. experimento comprobatum, callum exterens, & carnem generans. *Radicum liliorum crematarum cinere* fistulam repleto, & callus excidet: quo ablato, *Elxinam* cissampeloso maiorem herbam sumito arundinibus se implicantem, flore candido, foliis hortensi similis, quæ arefacta, vsta, & trita, fistulam repleto, & caro in ea procreabitur. Sequens quoque medicamentum fistulam agglutinat, insigniter desiccât, & laboranti parti robur addit. Accipit *aquæ vitæ, vncias duas. Vini Chii, maluiticum vocant, vnciam vnam. Mellis rosacei, drachmas decem. Myrrha, radicis peucedani trita, utriusque drachmas duas. Sarcocolla aloes hepaticæ, utriusque drachmam vnam & sensissimam.* Misceantur, deinde bulliant omnia ad ignem moderatum vnico feruore, & per oricularium clystetern, quam syringam vocant, in fistulam iniiciatur. Plura remedia alia apud Aetium, & alios reperies auctores.

Argentū
viuū sub-
limatum.
Si fistulæ
sub eute
intro ten-
dant.

Mortifi-
catæ fistu-
læ signū.

Vera fistu-
læ curatio

Medica-
mentum
fistulas re-
purgans
& deter-
gens.

Elxinæ
cissampe-
lomena
quam nos
volubile
maiorem
vocamus

Causa.
Signa.

Curatio.

Quia nam
cancro vl-
cerati vs-
tionem
aut sectio-
nem defi-
derent.Vitus ra-
tio.

Vacuatio.

Localia.

Cancrorum, qui citra exulcerationem fatigant, curationem *lib. 5.* tradidimus. Nunc itaq; de iis tantum, qui exulcerati sunt, differemus. Causas a quib. canceri excitantur, ibidem etiam exposuimus. In cancro autē exulcerato, vt de signis aliquid dicamus, præter *dolorem, duritiem, tumoremque*, vlcera erosa, ac inæqualia conspiciuntur, plurima ex parte sordida, labris præhumidis, aspectu horrenda, & concreta humorum colluue nigrata. Quod si itaq; eiusmodi affectus manus operam desiderat, a vacuatione humoris melancholici curatio auspicanda est. Deinde *totum carcinoma*, si locus patiat, prorsus rescindendum, sic vt nulla supersit radix: sinendumque vt sanguis effluat, nec statim is inhibendus. Immo pressis vicinis partibus, crassus ac melancholicus sanguis exprimendus. Postea aliis vlceribus similiter curandus, vt *libr. 14. Ther. method. cap. 9. copiosius Galenus* docet. Sunt qui exciso carcinomate, & crassiore sanguine ex circumstantibus partibus expresso, ferramentis igni flagrantibus locum adurunt. Alii vero a sectione & vsitione, quæ fit ignito ferramento abstinentes, cortosione valida ex adurentibus medicamentis facta vitium hoc totum extirpant & destruunt. Porro medicamenta eiusmodi si quando adhibenda sunt, valentis admodum facultatis esse debent. Tantā n. est huius vitii malignitas, vt mitiora plane contemnat remedia. Inter cetera vero præstantissimum ac tutissimum in hoc malo auxilium Guidoni prædicatur, arsenicū sublimatum. Ceterum magna locorū circumstantium, interim dū admouetur, cura semper habēda est, nescilicet ea ipsa phlegmone, atq; humorum cōfluxu, occupentur. Quod incommodū facile euitabis, si partes illas vicinas & carcinoma cingentes, bolo armenio illeueris. Sed tñ iusta quantitate adhibēdum arsenicum. Vbi autem effectū, quē desideras præstiterit, quod ex loci inflatione siue tumore, & mora tridua deprehendes, dolor mitigandus erit, & crustæ casus, modo quo supra docuimus, procurandus. Cancro vero sic penitus extincto, ac radicitus extirpato, vlcus ipsum quod remansit, similiter aliis cauis vlceribus curabis. Carcinoma autem prorsus extinctum agnosces, si proba & sana caro apparuerit, si & nulla virulenta proluuiēs se in parte laborante ostenderit, nullaque amplius graecolentia eorum, qui proxime astant nates offenderit. Ceterum soli illi canceri vlcerati curationem, quæ vsitione vel sectione fit admittūt, qui in summa corporis parte hærent, quiq; adeo laborantes fatigant & molestant, vt ipsi vltro chirurgi manum efflagitent: & simul in talibus consistunt partibus, quas resecare & exurere vna cum radicibus possis. Proinde si in penitioribus corporis partibus constituti sunt canceri exulcerati, aut in talibus quidem, quas nec adurere, nec excindere vna cum radicibus possis consistūt, vel si loca principibus membris vicina occupēt, vel laborans ob vitium imbecillitatem tale curationis genus sustinere non possit: aut forsā, quia nimis timidus sit & pusillanimis, extrema hæc remedia subire nolit: adhæc si ex hac curādi ratione deterius aliquod malum sequeretur: breuiter, si periculum ex sectione aut vsitione timetur, nec curari aliter malum possit, satis fecerimus, si hunc augeri prohibeamus, proba in primis victus ratione, & commodis vacuationibus, solisque leuibus & quasi ad blandientibus medicamentis vtentes. A vehementibus vero & acerbis, quibus vitium hoc veluti crabro irritatur & excandescit, prorsus abstinentes. Ergo imperanda ægris talis victus ratio est, quæ tenuis sit, bonumque & minime melancholicum succum generet. Quod si ob iecoris caliditatem & siccitatem excedentem prohiberi non possit, quin crassus & melancholicus in corpore sanguis procreetur, cibis refrigerantibus & humectantibus erit vtendum, quibus iecoris intemperies paulatim emendetur. Conueniunt itaque tum pitisanæ cremor, *Galeno libro 2. ad Glauconem teste*, lactisque serum vinum, paucissimum & aquosum, pisces saxatiles, atque omnis generis auēs, præterquam palustres. Ex oleribus malua, atriplex, bleta, cucurbita, & id genus alia. Acrum esus, & repletio omnis vitanda. Sed & crassior ille, qui in venis colligitur succus ex intervallo vacuandus erit, interdum purgante medicamento: interdum, nisi quid prohibeat, venæ sectione. In mulieribus quoque, si quidem liceat per ætatem, menses euocandi: atque etiam in viris hæmorrhoides proritandæ, si modo eas pati consueuerint. Loco autem laboranti imponenda remedia sunt, quæ dolorem leniunt, & ita ipsum firmare possunt, vt nihil redundantiæ humorum amplius excipiat: quæ item refrigerent & exsiccent, minime vero, mordeant aut irritent. Cuiusmodi sunt *solani succus, vel liquor eius stillatitius*, cum succi copia

- A** succicopia non est: plumbum vstum & elotum, vnguentum album, vnguentum ex lythargyro & plumbo vsto: item medicamentum, quod ex pompholyge, vel chalcite constat, aut aliis id genus metallicis vstis & elotis. Aquæ etiam, vt vocant, camphorata, similiter & succi in plumbeo mortario ducti, huic vitio efficacissime admouentur. Laminæ quoq; plumbeæ maximo & pene incredibili vsu cancris ipsis exulceratis superinducuntur. Modus autem vsus succi solani talis esto. Solani succo linteam molle duplicatū imbuito, & laboranti loco imposito. Extrinsecus lanam molliuiculam eodem succo madentem linteo circumdato: atque hæc ne siccescant, eo succo subinde irrigato. Hoc remedium loco dolenti inductum, sine dolore ac molestia, Paulo attestante, exulceratis cancris subuenit. Valet & hoc vnguentum ad vlceratos cancrōs, quod habet lithargyrum & cerusam in plumbea pila cum oleo rosaceo tantisper contrita, dum plumbi colorem, quod ex iis fit acquiesuerit. Aliud quod magnopere probatur. Recipit plumbi vsti & eloti, pompholygis, thuris, singulorum unciam dimidiam. Absint hii, unciam unam. Olei rosacei, libram dimidiam. Ceræ, unciam unam & dimidiam. Succi solani, quod sufficit, ad vnguenti crassitudinem. Insigniter etiam leniunt, solanturque plurimum in ipsis exacerbationibus, & cruciatus tempore, aut malua alba, in mulso subacta, liquefacta, & rosacei paululo lauigata, instarque cataplasmatibus illita. Cataplasma denique ex ficibus aridis, melilotho, thure, nipo, diligenter cum oleo contusis.

Modus vsus
succi sola-
ni.

Vnguentū.

LEONHARTI FVCHSII DE MEDENDIS FRACTVRIS ET LVXATIONIBVS, LIB. OCTAVVS.

BVS, LIB. OCTAVVS.

De fracturis in vniuersum. CAP. I.



Vando quidem duobus libris præcedentibus de soluta continuitate, quæ carnosæ & mollioribus corporis partibus accidit, abunde satis diximus, ordinis ratio iam postulat, vt de ea, quæ in durioribus, adeoq; ossibus euenit, hoc est, de fractura & luxatione differamus. Ac primum quidē de fractura agemus. Est autē fractura Gal. lib. 6. Ther. meth. c. 5. attestante, omnis

Fractura
quid.

- D**ivisionis, siue continuitatis, quæ in osse fit, solutio, Græcisque proprio nomine κατάγμα dicitur. Recentiores tamen chirurgi *fracturam* vocare consueuerunt, solam eam ossis diuisionem, quæ sine incisione a violentia quadam, vt ruptura extrinsecus accidente, aut re quæ contundit, fieri solet. Vulnus verò ossis appellat, præcisionem enle, aut quopiam alio simili in profundum penetrante factam. Nos Gal. secuti, vtramq; diuisionem fracturæ appellatione complectimur. Ceterum primariæ fracturarum duæ sunt differentię, aliæ namq; simplices, aliæ vero compositæ. Ex simplicib. quidem aliæ sunt, quæ fracti ossis partes iam prorsus separarunt, easq; Græci καυλιδόν, id est, caulium fractorum specie, Gal. ubi supra teste, factas dicunt. Hæ etiam a iunioribus ραφανιδόν & πιπιδόν, hoc est, raphani & cucumerum similitudine facta appellantur. Patet vero eiusmodi diuisionem per

κατάγμα

Differentię
Simplices.
καυλιδόν.
ραφανιδόν
& πιπιδόν.

- E**transuersum esse factam. Aliæ vero per longitudinem fiunt. In iis quidem non omnino separantur a se partes, sic affecti ossis, sed veluti per rectitudinem finduntur. Hoc genus Græci χιδαμιδόν, id est, assulatim seu asseris modo, fieri dicunt. Præter has sunt, quæ a iunioribus Græcis εἰς ὄνυχον, id est, instar unguis, aut ad unguis formam fieri affirmantur, quum scilicet in aliqua parte rectæ sunt, in extremo tamen lunatæ euadunt. Quæ etiam καλαμιδόν, Paul. lib. 6. c. 89. teste, appellantur. Aliæ ἀριτιδόν, hoc est, ad farinæ vel pollinis similitudinem, quum scilicet os in multas tenues partes confringitur, quæ ipsa, καρυιδόν, id est, nucarim, aut nucis in similitudinem facta, a quibusdam vocatur. Aliæ κατὰ τὸ πλάγιον, id est, iuxta refractionem seu abruptionem, quum pars ossis per summitatis rupturam, seu superficiem abruptionem detrahitur, ita vt pars ea, quæ detracta est & recessit, superemineat, vt fere fit, quum

χιδαμιδόν
εἰς ὄνυχον.καλαμιδόν.
ἀριτιδόν.
καρυιδόν.
κατὰ τὸ πλάγιον.

- F**iquamula ab osse resoluitur. Atq; hæ fracturarum differentię ambitiose, vt Galeni verbis utamur, a medicis Hippocrate iunioribus, iis propriis nominibus appellatæ sunt. Breuiter autem, de Galeni sententia duæ sunt tantum fracturarum simplicium differentię, a quibus curandi indicationes sumuntur, nempe quæ per transuersum, & quæ per longitudinem fit. Compositę ex simplicibus facile cognoscuntur. Iuniores medici morborum

Compositę.

& symptomatum cum ossium continuitatis solutione, compositas fracturæ differen- A
tias esse non recte statuerunt: proprie enim loquendo differentia non sunt. Nam quod
consistere seorsum & per se potest, *Galeno lib. 3. Ther. method. cap. 10. attestante*, id nullius
vnquam erit differentia. Vulnus autem, phlegmone, gangræna, & id genus alia seor-
sum, & per se consistere possunt. Sunt namque corporis nostri affectus quidam præter
naturam. Dolor autem & pruritus, ex symptomatum sunt genere: proinde veræ fra-
cturarum differentia non erunt. Causæ fracturarum internæ nullæ sunt, omnes autem

Causæ.

externæ, quicquid videlicet contundere vel diuidere ossa potest. Quæ contundunt, ea
dura grauique, & mole non exigua sint oportet, vehementique impetu deferri ac ir-
ruere. Ossia diuidunt, quæ vulnerando incidunt: item casus ab alto, præsertim si ossa sic-
ciora sint, nec admodum crassa. Fractura quoque interdum accidit ex circumtortione B
in luctantibus. Id quod in lignis quoque, quæ a nobis ipsis contorquentur, videre licet.

Signa.

Si enim lignum aliquod neque magnum, neque validum, sed paruum & imbecillū su-
pra femur positum ex vtraque parte deorsum vehementer manibus vrgeas, statim id in
medio frangi conspicias. Signa autem ossis fracti, præsertim per transuersum, atque in
artubus hæc fere sunt. Tactu ossis partes disiunctæ, separatæ ac variæ reperiuntur,
membrum figura inæqualis percipitur: dum membrum dimouetur, & manu varie tracta-
tur, ossa colliduntur, & veluti crepitus quidam ex ea collisione auditur. Pars afflicta con-
tacta dolet, corpus membro fracto haudquaquā iniri potest: causæ præterea quæ fran-
gunt, aut contundunt, præcesserunt. In osse vero quod per longitudinem fractum est, C
substantiæ eius crassities non naturalis tactu percipitur. Cetera signa non adsunt, nisi quod

Curatio.

dolor & inæqualitas iudicio sensus etiam deprehenditur. In curandis autem fracturis
finis seu scopus saltem primus vnio est. Quod si is per laboratium partium siccitatem
perfici non possit, restat alter: qui est, vt alterius cuiusdam interuentu disiunctæ ossis par-
tes glutinentur. Quod si nec ipse comparabilis aduertitur, insanabile esse vitium dixe-
ris. Quod igitur coalescere nequeat tam durum os, quam id quod in iuuenibus & a-
dolescentibus, viris, multoque magis in senibus cernitur, id profecto vel cuius patere
potest. Quæcunque enim concreescere ac coalescere debent, omnino mollia humida-
que sint naturaliter oportet. Quæ igitur dura siccaque sunt eorum diuisæ partes coire
simul nequeant, sed glutinum aliquod vinculumue, quo commissæ maneant, requirunt.

Itaque potest certe illud os tantum vnitionem per se, & nullius alterius interuentu re- D
cipere, quod abunde molle est: cuiusmodi in puerulis cōspicitur. In adultis vero & sic-
cioribus corporibus, separatæ fracti ossis particulae, non per se vnquam, sed substantia
duntaxat quapiam interueniente, ceu glutino quodam, ferruminari, colligariq; secum
possunt. Interuenit autem ea substantia, quoniam omnis particula sibi familiare trahit
alimentum: os autem crassius ac terrenum magis quam aliud quoduis nostri corporis
membrum, alimentū ad se allicit, exsugitque. Quod itaque ex hoc proprio & maxime
idoneo ossis alimento redundat, & in labris fracturæ concreescit, suo ipsius interuentu
ossis extrema dura licet ac sicca glutinat. Vocatur autem corpus Græcis *κάρφος*, Latinis
vero *callus*: qui vt mediocritatem in crassitie & tenuitate, duritie etiam & mollitie seruet
oportet. De quo quidē *infra* latius dicemus. Ceterum videamus, quomodo vnitionem E
assequi valeamus, initio sumpto ab ea fractura, qua per transuersum os frangitur, quod
scilicet hoc fracturæ genus sæpius incidat. In hac itaque fracturæ differentia curanda,
primum est opus, vt fracti ossis partes recte committantur, & in naturalem situm coa-
ptentur, quum autem in ea partes fracti ossis sic a se dissideant, vt e directo non iaceant,
clarum est, primum id esse agendum, vt in directum agantur. Sane eum situm habuerint,
si quis ea quæ sic dissident, integræ partis exemplo vsus, in contrarium adducat. A qua
nimirum certissima indicatio transpositionis eorū erit. Fieri enim potest, vt tum prorsum,
tum retrorsum, tum in hanc partem membri, tum in illā facta translatio sit. Quæ-
cunque igitur retrorsum magis sunt acta, ea prorsum impelli conuenient. Nec minus
alteram quoque fracti ossis partē modice ad contrarium retrudi. Contra quæ prorsum F
sunt emota, hæc rursus ipsa quidem retrorsum, reliquam vero partem sensim duci prorsum.
Eodem modo, & eorum, quæ ad dextrā sunt detorta, medicatio est, si ad sinistram
ducuntur: contraque eorum quæ ad sinistram, si mutantur ad dextram: semper scilicet al-
tera parte modice in contrarium acta. In directum itaque agi, non est nisi in pristinam
figura m

Notæ.
Fractura
per transuer-
sum, quo-
modo cu-
randa.

In directū
agi.

- A** figuram naturalemq; situm reduci. In reductione igitur fracturæ aliqui præcipiunt, in primis membrum fractum, si ossa suis sedibus exciderint, aliudq; super aliud efferatur, decenter intendendum esse. Deinde os depressum attollendum, & eleuatum deprimendum, atq; ita quatenus fieri licet sine dolore, donec fracti ossis fines recte concurrant, & in naturalem situm coaptentur. Cauendum autem semper est, ne immoderatus cōfractum membrum extendatur. Immoderata n. distentio in duris præsertim & siccis corporibus vehementes dolores, febres, conuulsiones, & resolutiones interdum inducit. Quin etiam per eam diuelli ac dirumpi musculorum ac neruorū fibras aliquando contingit. Proinde summa in hac re prudentia est opus. Igitur ægro in sedili locato, vel resupinato potius, ministris duob. iubebimus, huic supra fracturam, illi infra digitos circumponant, atq; sic tensionem perficiant. Quod si valentius opus sit intensiōe, nō solum manibus, sed etiam habenis aut funib. intendere aggrediemur. Ergo duos funes æquales confracto membro circumdamus, vnum supra fracturam, alterum infra: atq; vni ministro ad ægrotantis caput consistenti, alteri iuxta pedes capita funium tradentes, iubebimus in diuersa membra perfractum distendere. Vbi paulo longius, quam naturaliter esse debet membrum vis fecit, distentio remittenda est, ac tum demum ossa manib. in suam sedem compellenda. Ossis autem repositi certum indicium est, dolor sublatus. Alius modus fracta ossa reducendi in suum locum, & naturalem sitū per distentionem, ab Hippocrate in libro De fracturis traditur, qui etiam a Paulo *lib. 6.* refertur. Sed hic, quem retulimus, modus longe facilius, & magis ad manum est, atq; in frequentiore usu.
- C** Oportet igitur aut manibus ipsis, vtiq; si confractum membrum exiguum est, aut vinculis impositis, si maius est, & validiore tractu opus sit, retrorsum trahere ossa ipsa, vt e directo committantur, exactaq; eorum coniunctio fiat, sic vt pristinam vñionem imitentur. Postea vero quam abunde retracta fuerint, & nullus amplius super sit metus, ne se in adducendo contingant, tum in directum opponere, vinculaq; relaxare, ac musculis ipsis diductorū in idem commissionem permittere opus est. Interim vero te ipsum quoque, qui operi præes, manibus subseruire expedit: ac sicubi aliquid paulum subsultat ac præminet, corrigere atque formare. Ceterum in adducendis sic contrario motu partibus, ne aliquæ frangantur ossium exstantiæ, non leue periculum est. Non enim veluti in terra defectis visitur, leuis est semper vtriusq; partis finis. Nam si illæ frangantur, non poterunt adamussim secum coaptari fracti ossis fines, tum quia forsā fragmenta inter partes vñiendas interciderint, tum etiam quod quidpiam ossium forte extra ceciderit, & comminutum perierit, vnde spatia inter applicata simul ossa maneat inania, in quæ sanies collecta, atque temporis tractu putrescens, totum pariter membrum secum corrumpet. Atque hæc tractandæ fracturæ ratio omnibus propemodum confractis artibus conuenit, vbi præsertim ossa fracta suo loco exciderint, aliudque super aliud efferatur. Neque enim semper, dum franguntur ossa, suis sedibus moueri contingit, sed interdum fracta in suo loco, & naturali situ remanent. Quod ante omnia, vt *Celsus admonet*, considerari debet. Et sunt certæ notæ, quibus id discrimen deprehenditur. Nam si suis sedibus mota sunt, resima apparent, punctioisq; sensum exhibent, ac tactu, vt dictum est, inæqualia sunt. Vbi vero loco suo non exciderunt, nihil prædictorum adest. Festinandum vero est, vt in tempore ossa fracta, & suis sedibus mota, reponantur. Si enim primis diebus reposita non sunt, haud leue phlegmones periculum subest. In qua quidē & difficile, & periculose vis neruis & tendinibus adhibetur. Atque hæc primo locū agenda. *Secundo* annitendum, vt ossibus probe iam coaptatis, & e directo ad motis, eorundem positura seruetur, & exquisitè coniuncta maneat. Siquidem nequaquam prohibere poteris, quin diuisa eiusmodi ossa, quæ sic effinxeris, & adamussim secum coaptaueris, sua sede moueantur, & rursus diffideant, si laborans quoquo pacto, vel vigilans, vel dormiens membrum fractum dimoueat. Vnicè itaq; curandum, vt perfractum membrum prorsus immotum consistat. At si ipsi quidem ægrotanti, vt quietudini membri prospiciat, permiseris, vigilans fortassis probe id curauerit, at dormiens omnino membrum mouebit. Vt igitur nō dormientis modo hominis, sed etiam ad desidendum itemq; quū cubile resternitur surgentis, eorū quæ rite formata & exquisitè coniuncta sunt, positura seruetur, tuta deligatura complecti fracturam oportet, quæq; fracti ossis partes secū coarctare ad amussim possit. Tuta a. nō erit deligatio, si vel nimis arcta, vel nimis laxa

Modi reducendi ossa fracta.

Immoderata distentio.

Æger quomodo collocandus.

Distentio quando remittenda.

Ossium exstantiæ haud frangenda.

Notæ ossis fracti, & sua sede moti.

Deligatur
modus.

fuerit. Per laxiorem namque ossibus moueri licet, per arctiorem vero ac vehementius A
adstringentem, & alimenti in locum laborantem distributio prohibetur: & dolor, qui
humorum in ægram partem affluxus euocat, & phlegmonas creat, excitatur. Danda
igitur opera est, ut utrumque declinemus excessum. Constrictio igitur mediocris esto,
tum nostri sensus, tum ipsius ægrotantis iudicio. Ac si quidē æqualis esset crassitudinis
membrum quodque, utique latissima fascia commodissima esset, utpote quæ totum æ-
qualiter continenterque ex omni parte fractum os complecteretur. Sed quoniam id
non est, quod deest nobis ex fasciarum latitudine circuituum numero pensabimus, ut
in artubus ipsis, qui omnium maxime fracturæ per transversum factæ expositi sunt. In
talibus namque utilior est angusta deligatura, quam valde lata & remissa. Quippe quæ
nec rugas, ut ea quæ latiore fascia fit, contrahat, & totius membri cui circumdata est, B
cutem contingat. Ea igitur usque augere tibi fasciæ latitudinem licet, quoad nulla eius
pars laxior efficiatur. Ceterum in eiusmodi deligatura, quæ fracturis, in medio præser-
tim brachii, vel tibiæ, aut femoris existentibus adhibetur, duab. fasciis lineis, mollibus
iuxta Hipp. dogma opus est: quas ille peculiari nomine *istroquidas*, id est, *subligamina*, seu
subfascinationes, appellat. Primæ fasciæ initiū super fracturam iniici debet, ac circa eam
bisterne conuoluta, sursum versum ferri, & quasi in cochlea serpere, atque illic desine-
re. Id tamen perpetuo obseruandum est, ut multum partis sanæ fascia hæc cōplectatur.
Ita enim fiet, ut & firmitus reposita ac cōformata ossa contineantur, & magis a laborāte
loco in vicinas partes humores elidantur: magisque ne hi a superiori parte eo defluant,
impediatur. Altera etiam super fracturam incipere debet, priori aduersa: deorsumque, C
vbi primos complexus super fracturam fecit, rendere: atque inde iterum reducta, in su-
periore parte ultra priorem fascium desinere. Quocirca dimidio longior priore esse
debet. Terminus autem longitudinis earum fasciarum nō vnus ac certus statui potest,
sicuti nec etiam latitudinis, sed pro magnitudine fracturæ, & præfacti membri crassitie
utraque dimensio varianda est. Hipp. tamen in lib. de med. offic. & lib. de fracturis, trium aut
quatuor, aut quinque, aut sex cubitorum longitudinem, digitorum vero totidem lati-
tudinem constituit. Cubiti vero & digiti intelligēdi sunt eius qui deligatur, nempe vel
viri adulti, vel pueruli. Hæc autem duplicis deligaturæ ratio ex ipsa rei natura desumi-
tur. Siquidem duo hæc prima lintea fracturam muniūt, ac stabiliunt, nec phlegmonem D
oriri sinunt. Ab integris enim ad laborātem partem sanguinis confluxum arcent, & quæ
iam collectum in ea est, exprimunt. Prior namq; deligatura quæ in læsa parte continetur,
ad superposita loca expellit atq; elidit: quæ vero ex iis in locum perfractum confluit, re-
pellit. Altera vero primis quidem complexibus, quos, ut dictū est, super fracturæ locum
facit, itemq; dispensatione deorsum tendēte, quædam ad inferiora extrudit: quædam,
ne quid ex iis in locum fracturæ confluat, prohibet. Reliquis vero deinceps complexi-
bus, quib. videlicet ab infimis partibus sursum versus recurrere diximus, ut eodem scil.
loco cum priore fascia secunda desinat, tum ad superiora repellimus, tum confluxum
ab iis prohibemus. Porro priusquam fasciis huiusmodi fractura deligatur, vnus aut alter
panniculus lineus candido oui liquore & rosaceo delibutus, nudo membro non teme-
re a recentioribus chirurgis accommodatur, ea quidem magnitudine, ut etiam aliquid E
sanæ partis comprehendat. Sunt autem eiusmodi fasciæ duæ prælongæ, nempe qua-
tuor, aut quinque, aut sex cubitorum, & trium quatuorue digitorum latitudine, aqua
aut potius posca madefactæ, & postea exptessæ, præsertim si fractura phlegmone vacet,
recentiq; sit. Si vero dolor vehemens, aut phlegmone adest, lanis tenuibus mollibusque,
aut stupis leuibus oleo vel posca imbutis membrum contegendum est, & non ita arcte
deligandum. Satis enim fuerit, ut tūc deligatura adhibeatur, quæ & membrum utrum-
que fulciat, & ad mota medicamenta ad hæc symptomata profliganda idonea conti-
neat. Ceterum quum hæc duæ primæ deligaturæ ad ambos hos quos diximus vsus, nem-
pe ad tracturæ munimentum, & ut phlegmone excitare prohibeatur, non satis adhuc
faciant, præsertim solæ, ad earum quidem tutelam, & fracturæ stabilimentum Hippo- F
crates excogitauit remedium, ut scilicet splenia, seu plagulæ vna cum exterioribus fa-
sciis, quas *istroquas*, id est, *superligamina* vocat, desuper adhiberentur. Splenia itaque eius-
modi duarum primarum fasciarum, quas *istroquidas* appellat, firmamenta sunt. Ne au-
tem phlegmone suscitetur, medicamento quoque ex iis, quæ phlegmonum iniurias
arcent,

istroqui-
splenia cur
adhibetur.

- A** arcant, uti censet. Quale nimirum est ceratum liquidum, quod a Galeno. *libr. decimo*, Ceratum liquidum
Ther. meth. cap. 9. describitur. Quod si vero ossis fracturæ carnis quoque vulnus accessit, neque ceratum, neque rosaceum tuto admouetur, quod scilicet hæc vlcusum sordidum, tum putre efficiant: sed in vicem eorum puluelli prælongi nigro & adstringente vino imbuti, superiniiciendi sunt. Porro ubi decenter sic confractum membrum deligaueris, de apposita repositionis ipsius figura maxima tibi sollicitudo habenda est. Si quidem sub alia figura membrum perfractum deligare, in aliam vero mutare ac reponere, non dolorem modo excitare potest, verum etiā ossa intorquere. Necesse enim est mutata figura alios musculorum tendi, ac velut contractos rotundari, alios vero solui ac remitti. Vbi autem tenduntur, tum premi eos a deligatura est necesse, tum ex compressione ipsa dolere. At ubi tensio remittitur, quo loco deligatura est laxa, ibi fracturam fulcimento destitui oportet. Ceterum appositissima fuerit in ossium fractorum repositione, sicuti etiam in retractione & coaptatione, & deligatione partis, figura, quæ a dolore maxime abest, & in qua æger immotus diu persistere possit. Hæc enim rectissima est, & membro maxime naturalis, ac fere consueta. Rectissimam autem partis figuram cum Galeno vocamus, quæ venas, arterias, & musculos quàm rectissimos habet. Proinde angulosa figura, quæ *ἰγνυῖο* Græce dicitur, brachio quidem naturalis est: cruri vero, quæ paulo minus porrecta est. Hæc namque rectissima est, & a dolore maxime aliena. Est autem figura angularis, *Galeno libro primo, Fractu. comment. 11. & libro secundo, de morbu musculorum, & lib. 3. de medici officina, comment. secundo, teste*, in qua brachium cum cubito rectum efficit angulum. Quo plerunq; posito eos qui dolore afficiuntur, si diligenter inspexeris, manus tenere deprehendes. Porro ut dolor vitetur, quum ad quietem reponitur membrum, nō modo naturalis habitus cuius instrumentum est utilis, verum etiam consuetudo quoque non nihil conducere videtur. Ergo ut apte membrum perfractum & decenter ligatum reponatur, ea situs figura illi inuenienda est, quæ & naturalis est, & consueta, & a dolore maxime aliena. Ut autem in hac figura immotum proprius membrum persistat, recentiores Chirurghi secundum deligaturam protinus, ferulas etiam circumponunt, ipsas quidem constringentes, prout sensus & tumor ex phlegmone, si qua adsit, postulat. Veteres autem, ut Hippocrates & alii, a die tantum septimo, vel etiam nono & vndecimo, ferulas accommodabant. Verum non in consulte fit, si statim etiam ab initio post deligaturam ferulæ iniiciantur, modo nimis premendo dolorem non excitent, aut phlegmonem accersant, vel præsentem exacerbent. Quæ igitur a principio adhibentur, non eo nomine ut adstringant, sed ut adaptationis figuram contineant, & ossa in suam sedem reposita vtrinque fulciant, accommodantur. Quocirca primis diebus quum phlegmones diuitandæ consilium vincit, tutum non est, perfractum membrum ita ferulis premere. Quum vero nullus iam amplius futuræ phlegmones metus est, ut ea quæ prius discussa, membrum aliquantulo gracilius quam pro naturali habitu apparuerit, (quod intra septimum diem fere solet contingere) tum licebit ferulas circumponere, & eas ut fracturam stabiliant, valide defatis adstringere. Ferularum itaque usus idem est, qui & plagularum, seu spleniorum, nempe ut fractum os contineant, & deligationem stabiliant ac firment. Sunt autem ferulæ leuigatæ & planæ, æquabiles: id est, neque in latus, neque in superiorem aut inferiorem partem distortæ: in summis partibus, id est extremitatibus, resinæ, id est, leniter derasæ ac retusæ minores hinc inde quam deligatio est: & ea parte crassiores, id est latiores & valentiores, qua fractura erupit. Quorum omnium rationem exponit Galenus *libro tertio, Hippocrates, de medici officina, commentar. duodecim*, quas consulto nunc præterire volumus. Modus autem & ratio adhibendi ferulas, talis est. Splenia triplicia aut quadruplicia oleo delibuta super fascias similiter atque æqualiter, si membrum in crassitie fuerit æquale, circumdato. Si vero inæquale, partibus magis concavis per splenia repletis, membrum vndique æquale ferulis accommodandis efficit. Deinde ferulas lana aut stupam mediocriter inuolutas in orbem, non minorem quam vnus digiti spacio inter se distantes, fracturæ circumdato, easque leniter ac moderate constringito. Sed in hac ferularum accommodatione summo opere cauendum, quatenus fieri potest, ne articulus aliquis, & præcipue interior flexus pars, ab eis attingatur. Vlcera siquidem in ipsis nonnunquam, & neruorum phlegmones pa-

Repositio-
nis aptissi-
ma figura.

Rectissima
figura quæ?

ἰγνυῖο.
Figura an-
gularis.

Ferulæ quæ
do in fractu-
ris circum-
ponendæ.

Ferularum
usus.

Mor^{ae} ac ra-
tio adhiben-
di ferulas.

riunt. Proinde iuxta articulos ipsos deligatione aliquanto breuiiores, tenuiores, laxiores, & magis flexibiles ferulas esse oportet, quemadmodum valentiores qua fractura excidit atque inclinatur. Ceterum si nulla prurigo, nulla phlegmone, nulla suspecta exulceratio, nullusue dolor adest, & ossa recte commissa fuerint, fracturaque recte procedat, sic manere ferulas & ligamenta, ad decimum vsque diem, vel quintum & decimum, aut etiam vigesimum vtile est. Si vero in membro perfracto præter solitum coopto, vel dolor exciteretur, vel pruritus creetur, vel eius quod iam infixum fracturæ est perspiratio prohibeatur, propter quam non modo noxius pruritus quibusdam accidit, sed etiam erosæ a saniei acrimonia nonnunquam cute, exulceratio concitatur, non temere feceris, si tertio quoque die, vt iussit Hippocrates, deligationem solueris, & membrum ipsum aqua temperata perfuderis ac foueris. Hac enim perfusione & ac-
 crem atque erodentem saniem discuties, & dolorem mitigabis, ac prurigini pulcre medeberis. Porro quum nec ferulis, nec deligatione, nec figura situae membri appo-
 sito diuissæ ossis partes, tamen si exacte atque admissim coniunctæ fuerint, citra glutinum aliquod vinculumue coire ac concreescere possunt, maxima calli gignendi sollicitudo habenda est. Ad hunc igitur gignendum cogi concreescereque aliquid proprii ossium alimenti crassi terrenique oportet, vt dictum est, quod in labris fracturæ coalescit. Ipsum igitur nec eluendum, nec foras euocandum est, sed sinendum. Crassa autem hæc terrenaque substantia ex genuino maximeque idoneo ossis alimento redundans (quæ propria est calli materia) diem circiter duodecimum, aut decimum quintum ab ossis fractura fere gigni atque accrescere incipit, vt aliqui recentiorum testatum reliquerunt. Huius autem generatio, quæ in aliis citius, in aliis vero tardius aduenit, iis fere deprehenditur notis. Dolor qui prius aderat, sedatur, nullus amplius phlegmones, aut tumoris alicuius præter naturam metus est, in perfracto membro bonus ac natiuus color efflorescit. Præterea vniuersa victus ratio callo gignendo accommodata, talis esto. Cibi qui boni succi sunt, & multum nutriunt, nisi vulnus ad sit, exhibeantur. Sed & quæ offeruntur alimenta talia sunt, ex quibus prouenire succus soleat non tantum bonus, sed etiam tenax, ex quali maxime expedit callum fieri. Quippe quum ex serosa ac tenui humiditate gigni prorsus nequeat, ex crassa vero, sed quæ fragilis sit, ac pinguitudinis expers, gigni quidem poterit non segniter: ceterum tempore siccescens friabilior, atque ita fractioni obnoxius redditur. Proinde callo gignendo conueniunt oriza, panis similagineus, frumentum triticeum tam diu in aqua coctum, donec instar pulvis efficiatur. Ad hæc pedes, ventres, & capita animalium, sed præsertim hædi & veruecis. Hæc enim & multum alunt, & crassi & tenacis succi sunt. Circa initium fracturæ vsque dum callus gignitur (quod fere circa decimum diem contingit) ægrum tenuissime cibato. Cibi namque subexiles, vt censuit Hippocrates, & non validæ materiæ tunc satis sunt. Venam interdum, quum scilicet res postulat, secato, & per ventrem superuacua expellito. Carne & vino vsque ad decem dies, ex Hippocratis præscripto, abstineto. Post hoc tempus, vinum crassum & adstringens audacter concedito. Magnitudo calli nec minor quam par est, nec maior iusto sit, sed mediocritatem ad vnguē seruet. Qui enim iusto maior est, dolorem musculis inuehit: qui minor est, hic ossa parū tuta reddit. Breuiter igitur, calli magnitudo ea sit, quæ & ossibus tuto vinculo sit, nec musculos tamen comprimatur. Attendendum vero diligenter est, vt vel promoueatur, si minor iusto proueniat: vel inhibeatur, si immodice crescat. Vtrumque autem vitium corrigitur perfusionis quantitate & qualitate, ciborum etiam ac medicamentorum quæ extrinsecus apponuntur, facultate. Nam dum nimis siccantur ossa, callus ægre prouenit. Expedit igitur ita resiccatis ossibus, tertio vel quarto die mediocri quantitate calidam aquam infundere: hanc metam finiendæ perfusionis habentes, quum carnes in rubrum tumorem attolluntur. Arque in iis quidem priusquam subidere incipiant, desistendum est. Contra vbi discuti quid volumus, non prius est desistendum, quam quæ ex perfusione intumuit, subsidat. Si vero humiditas abundantior calli generationem impediatur, ibi hanc siccare conuenienti deligatura & perfusione aquæ, quæ vel minima omnino sit, vel plurima conabimur. Quippe minima quum prius desistat, quam aliquid confluat, & qui in superficie sunt humores per halitum digerit, & qui in alto sunt modice liquat. Expedit autem ita solui liquarique ea, quæ per deligaturam sunt expectanda.

Calli generatio.

Callus qui-
 bus notis
 generari de-
 prehendi-
 tur.
 Victus cal-
 logignendo
 aptus.

A lenda. Plurima vero perfusio plus discutit, quam attrahit: atque ita commodat superflua humiditati. De cibo, adeoque victus ratione, iam supra est dictum. Ex medicamentis vero quaecumque emplasticam substantiam habent, cuiusmodi est emplastrum, quod ex pice conficitur, ac modice calefaciunt, ea callos tum promouent, tum vero augent. Alimentum enim copiosius in locum perfractum attrahunt, sicuti & moderata aqua temperata perfusiones, & idoneae frictiones. Quae vero discutiendi vim obtinent medicamenta, ea callos maiores iam factos imminuunt. Si vero nec augere callum, nec minuire studes, sed eo sicut ultro prouenit es contentus: medicamento aliquo enhamo, id est, quae cruentis vulneribus adhibentur, vttere: quae quum modice siccant, etiam coagulari ac concrefcere medioeriter callum faciunt. Quum recens adhuc callosus est, medicamentis valde adstringentibus, Paulus vtendum esse censet, compressamque admodum deligationem adhibendam, lamina plumbea etiam interdum imposita. Haec enim calli excrescentiam mire reprimat, ac imminuit. Huic rei efficaciter quoque subuenit, *Celsi teste*, multa leuisque ex oleo, & sale, & nitro, membri perfrictio, plurimusque ex aqua salsa fatus. Posthaec malagma, quod discutiat imponendum, adstrictiusque alligandum esse admonet: imo vero oleribus, & praeterea vomitu vtendum. Siquidem per haec vt existimat, cum carne callus quoque extenuatur. Confert etiam eidem aliquid de sinapi, cum ficu, in alterum par membrum imponere, donec id paulum erodat, atque euocet materiam. Atque vbi is tumor extenuatus, & qui nimius supercreuerat callus ad mediocritatem redactus fuerit, rursus ad ordinem vitae reuertendum erit. At si lapideus solidusve callus, qui sic immodice increuit, euasit, aperta ibi cute deradendus est: parsq; eius eminens scalpris, & terebris etiam, si res exigat, admotis, excidenda est. Ceterum solent aliquando in fracturis diuersa inter se ossa conferuere, & membra distorta callo firmari, difficultate functionum obeundarum haud exigua subsequente. Quod vbi contingit, & breuius membrum, & indecorum fit, & si capita acutiora sunt, assidue punctiones sentiuntur. Ergo vbi perfracta ossa sic conferbuerunt, & perperam ferruminata sunt, si tener saltem adhuc callus est, & non ultra sex menses radices egerit, frangere rursus, & dirigere ea oportet. Id autem hoc fit modo: Calida aqua multa, vel decocto aliquo emolliente diebus aliquot id membrum fouetur, & ex cerato liquido perfricatur, aut emplastro ex althaea, vel cataplasmate ex carieis pinguibus, aliisque medicamentis callum soluentibus contegitur. Deinde facta sufficienti emollitione, modo quem supra exposuimus a ministris duobus intenditur: & interea Medicus pertractans ossa, vt callo adhuc tenero existente, manibus ea diducit, compellitque id quod eminet in suam sedem. Et si parum valuit ab ea parte, in qua os se inelinat, inuolutam lana regulam obicit, atq; ita deligando assuescere iterum vetusta sedi cogit. Nostra aetatis chirurgi male ferruminatum os, in fractura non admodum diuturna, diebus plus minus quindecim primum emolliunt. Deinde id in diuersa extendi iubent: & genu vehementer impulso, iterum frangunt: quod tamen vetustiores Medici non probarunt. Mox fracti ossis fines ad amissim secum coaptant, ac, vt supra exposuimus, curant. Si vero perperam ferruminatum os vetustas iam occupauit, ac callus vehementer obduruit, satius est manum illi non admoliri. Quicumque enim id rursus frangere aggressi sunt, post vehementes cruciatus in extrema discrimina laborantes adduxerunt, adeo vt pauci admodum eorum qui hoc tormenti genus perpeffi sunt, mortem euaserit. Quocirca melius est, eum qui sic laborat, claudicantem aliquot adhuc annis superstitem fore, quam post talem tantumque cruciatum miserrime inter manus crudelis chirurgi occumbere. Quod si tamen laborans, & qui illi assident amici, importunis precibus te compellant, vt ossis eiusmodi male ferruminati, & cuius callus iam obduruit ac inueterauit, curatione suscipias, in angusto spem esse vbi coram illis praefatus fueris, opus aggreditor. Summam igitur cutem, & carnem callo superiacentem ratorio cultro aut scalpello dextre ac prudenter secato, magna cura habita, ne nerui musculive laedantur: deinde ossium quae non recte coaluerunt glutinationem excisoriis scalpris dissoluito, mox vero eorum sic diductorum fines secum ad amissim coaptato, ita vt pristinam unionem quoad licebit, imitentur. Demum cetera fiant quae supra scripsimus. Ceterum fracturae quaedam supra definitum naturae tempus sine callo interdum permanent: quod ob

Male ferru-
minati os-
sis curatio,
desenten-
tia recentio-
rum chirur-
gorum.

Cur fractu-
ra diu sine
callo inter-
dum per-
mancant.

varias causas solet accidere, nempe vel ob assiduas solutiones, vel ob immodicas su-
 perfusiones, vel ob intempestiuum motum, vel ex fasciarum multitudine: nonnun-
 quam etiam quia totum corpus non sufficienter alitur, quo in casu membrum quoque
 ipsum gracilius euadit. Oportet igitur cum aliis, tum præcipue maciei corporis oc-
 currere: quod commodè fiet, si vel calidis admotis materiam ad membrum perfra-
 ctum euocemus, vel alimentum copiosius subministremus, & balnea reliquasque a-
 nimi voluptates adhibeamus. Porro eorum, quæ iam callo firmantur, indicio esse cum
 alia, tum illud præcipue potest, si fasciolarum cruentæ conspiciuntur, nullo in parte obor-
 to vulnere. Quod ideo fortasse accidit, quoniam calli dum coit substantia, in ossium
 cauernosos meatus perrumpens, sanguinis guttas aliquot inde extrudit, exprimitque.
 Atque hæc de pori generatione dicta sufficiant. Postremum vero, ut symptomatum quæ
 fracturam sequuntur correctionem subiiciamus necesse est. Hæc autem fere sunt, do-
 lor, phlegmone, pruritus, vulnus, & gangræna. Si dolor aut phlegmone adsit, deliga-
 tionem, si iam facta est, statim soluito, & lanam, oleum, & acetum, congruaque id genus
 alia auxilia parti dolenti, atque phlegmone occupatæ admoueto. Sed neque priusquam
 hæc sedata fuerint, vel deligaturam adhibeto, vel ferulas circumponito, nisi duntaxat
 eatenus ut membrum fulciant, & ut impositum medicamentum contineant: hoc est,
 laxè admodum. Si noxius pruritus accidit, & erosa a saniei acrimonia cute exulcera-
 tio concitatur, aquæ temperatæ tantum superinfundere oportet, quantum ad euocan-
 dam eiusmodi sanie est satis. Hoc quidem Hippocratis & Galeni cõsiliu fuit. Re-
 centiores autem chirurgi aquam salinam infundi præcipiunt, aut albo vnguento, vel eo
 quod vocant vulgo *populeum*, membrum illini, & deligari. Quum ossis fracturæ carnis
 quoque vulnus accessit, siue statim ab initio id factum sit, siue postea a chirurgo indu-
 ctum, ut ossium fragmenta, & ea præsertim quæ pungunt, eximantur, siquidem sanguis
 profundatur, hunc prius aptis remediis sistito. Si phlegmone oriatur, præsidis ad eam
 efficacibus utitor. Si carnes contusæ sint, partem laborantem, ut gangræne periculum
 euitetur, scarificato. Quod si gangræna quoque ipsa, aut alia quæpiam serpens putredo
 iam occupauit, conuenienter occurrito. At si nihil horum adfuerit, neque magna ossis
 pars nudata sit, hamulis futurisque vsu, his medicamentis, quæ cruentis imponuntur,
 medebimur, prius tamen fragmentis ossium euulsis. Ceterum deligatio fracturæ eius-
 modi cum vulnere factæ, hoc modo adhibenda erit. Orbiculares fasciæ partibus vul-
 neris utroque, hoc est, ab utraque vlceris parte, iniici debent: oblique vero supra ipsum
 vulnus in longitudinem collocandæ sunt, sic ut decussim ad literæ X similitudinem,
 iuxta hiatu occlusio ex omnibus fiat. Hippocrates tamen a primâ statim circumuolu-
 tione, fascia latiore totum vlcus cõprehendit, ita ut nulla eius pars nuda relinquatur.
 Itaque si sordidum adhuc vulnus est, expurgantia medicamenta, quando opus est, im-
 ponet. Si purum, carnẽ producentia, lintheolis illita, aliamque vsu comprobata materiam
 adhibebis. Hippocrates tamen statim ab initio picatum ceratum, quæ ceram in rosaceo,
 aut oleo colliquatam, & picis siccæ aliquantulum assumit, supra vulnus in lintheolis ad-
 hibet. At Galeno auctore, vtilius a tertio die, quum ea, quæ in vlcere sunt, concoquat, ad-
 hibetur. Si æstiuum tẽpus est, Hippocrate attestante, splenia vino frequenter sunt irriganda:
 fin hyemale, lanæ multæ succidæ ex vino & oleo super imponendæ sunt. Lanarum nam-
 que superpositione, & olei commistione refrigerationis vehemẽtia, quæ in huiusmo-
 di affectibus conuulsionis periculum interdum affert, obtunditur. Vino autem madefa-
 ctæ plagulæ, ob vinu reprimendi vim obtinent. Ceterum ubi purgata vlcera fuerint, a-
 liqui ferulas iniiciunt, aliqui vero etiam ab initio ipsas accommodant, vlceris locu eui-
 rantes, & prout necessitas ac vsus tulerit, ipsas modo constringunt, modo remittunt.
 Sed hæc curandi ratio Hippocrati non probatur. Hic enim pluribus tantum & latio-
 ribus fasciis, ferulas, ne videlicet comprimendo lædant, similiter & omnino canales
 reiiciens, deligaturam in eiusmodi fractura quæ cum vulnere incidit, fieri iubet, laxius
 scilicet, quam si ea plago non esset, ita ut affuleitæ quidem, non compressæ tamen fa-
 sciæ ipsæ esse videantur. Ita namque numero fasciarum efficietur, ut laxæ quoque æ-
 que contineant. Ac satius quidem est sapius circuire, quam astringi. Sed & in eas fa-
 scias multipl. ces ingerendum subinde oleum est calidum, & vinum: magisque ubi cum
 vulnere fractura a principio incidit, exquisitiore victu utendum, vulnus calida aqua
 fouen-

Fasciolarum
 cruentæ
 conspiciun-
 tur.

Symptoma-
 rum corre-
 ctio.
 Doloris.

Pruritus.

Vulneris.

A fouendum, frigusque omni ratione vitandum, & transeundum ad medicamenta quæ puri mouendo sunt idonea, maiorque vulneris quam ossis ratio habenda. Quod autem ad ferularum rationem attinet, sic statuendum erit. Quum fractura cum vulnere interdum in longitudinem membri contingit, tunc ex vtraque vulneris parte ferulas etiam ab ipso curationis principio circumdare licitum est. Quum vero transversum vulnus euasit, idque si maius sit, ferulas statim ne imponito. At si squamula aliqua ex osse resoluitur: id quod ex eo colligi potest, quod & copiosior, & tenuior humor profuit, & caro circa vulnus laxa & mollis effecta intumescit: deligatura laxiore vtendum est, ne scilicet pus intercludatur, sed effluere facile queat: frequentiusque, vt consuluist Hippocrates, religandum, quoad os recesserit, ferulæque nequaquam apponendæ. Vbi vero vel hamulo, vel quopiam alio eiusmodi instrumento squamam euulseris, deligatura iterum validiore membrum adstringendum. Præterea per totum id quo vulnus curatur tempus, medicamentum aliquod ex iis quæ phlegmonem arcent, linamentum continens vulnere incumbet: & simplices fasciæ iniiciuntur, quæ singulis curationibus resoluentur, quum aliæ supra dictæ remaneant. Inter hæc autem si quod paruum fragmentum ossis eminet, id si retusum est, in suam sedem reducendum: si acutum, ante acumen eius longius est præcidendum: si breuius, lauandū, & vtrinque scalpro limandum, tum ipsum recondendum est: ac si id manus facere non potest, vulsella, quali fabri vtuntur, iniicienda est, recte se habendi capiti ab ea parte, qua summa est: vt ea parte, qua gibba est, eminens os in suam compellat sedem. Si id maius est, & membranulis fragmenta cinguntur, sinere oportet ea sub medicamentis resolui, idque os, vbi nudatum est, abscindere: quod maturius faciendum est, potestque ea ratione & os coire, & vulnus sanescere. Nonnunquam etiam in magno vulnere euenit, vt fragmenta quædam velut emoriantur, neque cum ceteris coeant. Quod hinc quoque ex modo fluentis humoris colligitur, quo magis necessarium est sæpius vulnus soluere, atque nutrire. Sequitur vero vt id os per se post aliquot dies excidat, quum tam misera antea conditio vulneris sit, tamen id interdum maius diutiusque facies. Sepe enim integra cutis osse abruptitur, protinusque prurigo & dolor oritur. Quæ soluere, si accidit, maturius oportet, & fouere aqua per æstatem frigida, per hyemem egelida, deinde ceratum myrteum imponere. Interdum fractura quibusdam velut aculeis carnem vexat: quo a prurigne & punctationibus cognito, aperire id melius, eosque aculeos præcidere necesse habet. Reliqua vero curatio in vtroque hoc casu eadem est, quæ vbi ictus protinus intulit puro iam vulnere, vt copiosius Celsus lib. 8. cap. 10. prosequitur. Ac de transversis quidem fracturis hæc satisfaciunt. De longis vero, quæ non tam crebro contingunt, reliqua omnia ad eundem se habent modum: ceterum comprimendæ hæc magis, Galeno lib. 6. Ther. method. cap. 3. attestante, in ipso fracturæ loco sunt: tum quod recessit, retrudendum introrsus est. Ac de fractis quidem ossibus hæc tenus in vniuersum dictum sit. De particularibus autem fracturis caluarie, narium, aurium, maxillarum, clavicularum, costarum, spinæ dorsæ, humeri, brachii, femoris, crurum, & digitorum, vt aliquid subiiciamus, non esse necessarium iudicamus, quandoquidem harum omnium curationes Paulus in sexto, a capite 90. vsq. ad 111. & Celsus lib. 8. a capite 4. vsq. ad 11. compendiose admodum tradiderint, adeoque nostram hac in re operam anteuerterint. Ad luxationes itaque progrediemur.

Ferulæ quæ
do in tra-
ctura cum
vulnere ad-
hibendæ.

Fracturæ
in longitu-
dine cura-
tio.

De luxationibus in vniuersum. C A P. II.

Q V V M luxationes fracturis proximæ sunt, ordinis ratio expostulare videtur, vt de iis generatim nunc differamus. Est autem luxatio, articuli e nativo positu, seu proprio sinu in alienam atque insolitam sedem prolapsus, quo voluntarius impeditur motus. Græcis ἐκδοσμεν vocatur. Huius vero, vt Paulus lib. 6. cap. 111. testatur, nullæ aliæ differentie habentur, præter eam quæ ex maioris minorisque ratione sumitur. Quum enim articulus sua sede in totum exciderit, communi generis vocabulo Græcis ἐκδοσμεν dicitur. Si autem e compagibus suis paululum duntaxat emorus est, aut vsque ad sinus supercilium prolapsus, Græcis ὑποδοσμεν, nobis subluxatio, nominatur. Hoc fere innuere etiam videtur Celsus, quum lib. 8. cap. 11. inquit, ossa duobus modis suis sedibus moueri. Nam modo quæ iuncta sunt inter se duntaxat dehiscunt, vt quum latum scapularum os ab humero recedit, & in brachio radius a cubito, vel porius vlna, & in crure tibia a sura, vel fi-

Luxatio
quid.


Differen-
tiæ.

ὑποδοσμεν
ὑποδοσμεν
ὑποδοσμεν

bula, atque etiam interdum saltu calcis os a talo, quod raro tamen fit. Modo articuli A
suis ſedibus excidunt. Vertebra namq; & articuli propemodum omnes, tamenſi valis
dis ligamen- is comprehendantur, ſæpius tamen ſuis ſedibus elapſi decidunt: aut vi ſci-
licet expulſi, aut aliquo caſu nerueis ligamentis vel ruptis, vel infirmatis, faciliuſq; in
pueris & adoleſcentulis, quam in robuſtioribus. Itaq; modus poſterior, exarthrema
prior vero quo tantum oſſa dehifeunt, & ſuis ex toto ſinibus haudquâquam prolabu-
tur, pararthrema appellatur. Præter has tamen poſterioris ætatis Medici & chirurgi
multas alias excogitarunt, quæ reuera differentiæ non ſunt, ſed potius quidam præter
naturam affectus, aut horum ſymptomata. Cauſæ luxatorum oſſium, & a ſua ſede mo-
torum quædam ſunt extrinſecus ingruentes, vt caſus, percuffio, violenta & incongrua
membri alicuius extenſio, aut diſtorſio. Quædam vero intrinſecus eueniunt, vt cum B
mucofus aliquis & pituitofus humor in articulis aceruatur, qui articulationis ligamē-
ta primum madefacit, deinde laxiora reddit, & tandem ob eius multitudinem ſua ſe-
de os ipſum protrudit. Luxatio deprehenditur mala partis laborantis compoſitione:
in ea quippe tumor præter naturam ea parte qua os prorumpit, & ſinus inſolitus ea
qua receſſit, manifeſta apparent. Item a dolore, quo luxationem ſequitur, & a motus
laborantis partis difficultate, aut priuatione. Ceterum vna communis omnium luxa-
tionum curandi indicatio eſt, nempe luxati articuli, & ſuo loco moti in propriam &
naturalem ſedem reductio. Quod vt conſequamur, luxatum membrum decenter ex-
tendendum eſt, adeoque id os, quod ſuo loco excidit, ab ea parte, in quam prolapſum
eſt, in contrariam partem impellere oportet, atq; in germanum ſuum ſinum reduce- C
re, vt ſinus ſeu inſolita cavitatis vacuitas impleatur. Non eſt vna eademque in omni-
bus extendendi ratio, ſed alia atq; alia, pro natura ſcilicet luxatæ partis, proutq; nerui
ac tendines valent, aut oſſa huc illucve ſederunt. Modo enim manibus ſolis, modo ha-
benis ac funibus iniectis, vt i. libro expoſitum eſt, vtendum: modo vero quædam alia ma-
chinamenta, quale eſt *gloſſocomon*, adhibenda ſunt, vt ex libris *De fractis & luxatis Hippo-
cratis diſcere licebit*. Gloſſocomi vero hæc eſt effigies.

Galenus libro 7. *De uſu par. Et in ſecundum Hippoc. de fracturis librum com. 64.* huius in-
ſtrumenti deſcriptionem tradit.

Tam ad femur, quam ad tibiā fractā:



- A** Posthæc membrum quod excidit, & iam repositum est, vt non amplius deinceps sua sede prolatur, sed inibi continenter persistat, curandum. Repositus igitur articulus modis omnib. statim firmandus ac roborandus est. Firmabitur aut optime, si rosaceo perlinatur, ac postea pānus aliquis lineus gracilis, vetus, & levis rosaceo delibutus, ipsi applicetur. Deinde si stupæ leues, & panni multiplices ouerum cādido imbuti superaccommodentur, & postremo si fasciis posca madentibus pro ratione particulæ longis latissq; subligetur. Quinetiā ferulæ ex corio, aut densa papyro factæ, si necessitas postulet, circumdādē sunt. Cauenda vero semper est vehemētior adstrictio, ne phlegmone moueat. Quibus rite apparatis, membrū in figura ei maxime naturali, atq; a dolore alienissima, ad quietem reponendum est. Nec vero ante diem septimū, aut etiam decimū, si nullū symptoma prauum accesserit, ipsum soluere oportet, sed ita sinere. Nihil vero incōmodaueris, si dum legitimo tempore soluitur, & secundo curatur aqua modice calida foueris. Hic enim fortis tunc gemina ratione pdest. Nam & dolorem, si quis adsit, demulcet: & quod in laborante particula noxium cōceptum est, discutit. Vbi aut ita vt res exigit, luxatum membrū foueris, mox huic emplastrum adhibebis, q̄ constet *polline, id est farina volatili, puluere rubro communiter appellato, & albo oui, in vnu corpus redactis*. Posthæc vero membrum strictus deligandum erit. Ad eundem quoq; modum verus omnis luxatio, & quæ spatio temporis callo iam obduruit, nō modo totum eiusmodi aquæ simplicis calidæ, qui in hæc re plurimum confert, anteq̄ reducat, considerat: sed et eum qui fit ex decocto *maluæ, althææ, fenogræci, atq; id genus aliorum*, q̄ scilicet molliat, laxet, discutiat, & membrum extensioni aptius efficiat. Recentes vero luxationes, & quæ nuper inciderunt, eius naturæ fortis tanquam sibi haud parum incommodantes auersantur & respuunt. Hi enim calefaciendo ac humectando relaxant, & dissoluant, vnde pars ipsa afflicta imbecillior redditur, & ad recipiendā fluxionē pronior. Proinde & phlegmoni opportuna efficitur, & luxati membri sinus superflua humiditate oppletur. Hinc consequitur, vt articulus in nativo suo sinu diu persistere nequeat, sed lubricus ac subterfugiens delabatur. Neq; etiam panni impense calidi mēbro recenter luxato admoueri debent, ne videl. fluxionem euocent, & phlegmonem eo loci excitent. Quin potius eos, cerato refrigeratorio, aut vino aliquo austero imbutos adhibere conuenit. Ceterum luxato membro, ita vt dictum est, in suam sedem reducto, firmatoq;, & ad quietem conuenientem figura qua decet reposito, ipsum a dolore & phlegmone vindicandum est. Quod si consequi studueris, humorum in partem laborantem influxum modis omnibus prohibebis. Si enim fluxione tentetur, & dolorē statim persentiscet, & phlegmonem experietur. Quæ duo incommoda tum in luxatis, tum etiam fractis maxime vitanda sunt. Hæc autem deuitalis, si quæ roborant & repellunt luxatæ parti apposeris. Si præterea tenuem ab initio probamq; victus rationem ægro imperaueris illiq; venam, si nihil phibeat, secueris: & aluum, si opus est, purgante medicamento subduxeris. Vtroq; enim auxilii genere fluxionem a laborante particula auertimus. Verum enimvero, si anteq̄ curationē aspiceris, luxata pars iam dolore infestetur, aut phlegmone occupetur, nō prius eā in locum suum, a quo excidit, reponere tentabis, q̄ dolor finitus fuerit, & phlegmone cōquieuerit. Si n. mēbrum dolore aut phlegmone affectū, distendēdo laceffiueris, periculum est, ne cōuulsio, aut aliud prauum symptoma suscitetur. Proinde quicquid suo motum est loco, ante phlegmonem reponendum est, vt recte de Hippocratis sententia Celsus lib. 8. cap. 11. præcipit. Si vero illa occupauit, tum eonquiescat, haudquaquā enim laceffendum est. Vbi finita est, tentandum est in his membris, quæ id patiuntur. Oportet autem phlegmonem ipsam atq; dolorem leuare succida lana ex aqua & oleo moderate calido, aceti q; momento, superinposita. Si vero febris etiam accessit, & ossa quæ suis locis mota sunt, validis plenissq; musculis & tendonibus contineantur, curiosius omnia facienda sunt: sed maxime quæ ad victus rationem, venæ sectionem, & purgationem attinent. Porro
- F** sedato dolore, & finita omnino phlegmone, plenior victu laborans refici potest, cibissq; vti bonis, ac vino modice. Ac sub finem quidem curationis, si e sententia res cesserit, luxatum membrum perfusione decocti rosarum, absinthii, & musci albi quercini roborabis. Peracto fortu, oxycroceum imponi potest. Sed tum ad vsus quoque suos, id membrum sensim ac suauiter promouere oportet. Motus enim, vt in dolore atque

Aquæ calidæ fortis cōmoda.

Puluis ruber.


Luxatio cū
vulnere.

phlegmone, noxius, sic alias luxato, præsertim iam obfirmato, saluberrimus. Ceterum A si luxatis ossibus vulnus quoq; accessit, multa diligentia, ac etiam prudentia est opus. Dum enim hæc reponuntur, ingens periculum, nonnunquam etiam mortem inferunt. Nam quum ex distensione adiacentes nervi & musculi inflammantur, dolores validi, conuulsiones, & acutæ febres oboriuntur, atq; hoc præsertim in gibbero, genu, superioribusque articulis magis. Quanto enim principalibus membris luxati cum vulnere articuli viciniore sunt, tãto maior timor est. Sed eo quoq; grauius periculum concitatur, quo maius membrum est, quo ve validioribus nervis aut musculis continetur. Ideoq; humeris femoribusq; metus mortis est. Ac si reposita ossa sunt, spes, ait Celsus, nulla est. Non repositis tamen, nonnullum periculum est. Eoq; maior in utroq; timor est, quo propius vulnus articulo est. Eam ob rem Hippocrates in libro De luxato. B rum fracturumve ossium coaptatione, horum repositionem, valentiorēque deligaturam omnino aucturatur, soliusque phlegmonem abigentibus, & mitigantibus prædiis per initia uti iubet. Sic enim, inquit, ipsis superesse licebit. Itaq; nihil tuto reponi posse præter digitos, plantas, & manus dixit: atq; in his quoque diligenter esse agendum, ne præcipitent. Verum ne digitus quidem, in quo minimum ut malum, sic etiam periculum est, reponi debet, nisi ante phlegmonem, aut postea quū iam vetus est res. Porro quod ipse in solis digitis faciendum consulit, id nos in reliquis quoque articulis facere aggrediemur, ac statim quidem inter initia dum pars adhuc phlegmone vacat, prolapsum cum vulnere articulum mediocri intensione (validam enim citra periculum perferre non potest) reponere tentabimus. Quod si iuxta animi institutum euenerit, C in sola ratione, quæ phlegmonem arcet, persistemus. Si vero phlegmone aliqua, aut conuulsio, aut quippiam ex supradictis reposito osse acciderit, rursus id, si modo sine vlla vi potest, suo loco protinus expellendum est. At si hoc quoque discrimen metuamus, (non enim phlegmone laborans articulus sine vi fortasse cedit, & sua sede iterum propelleretur) satius fuerit per initia in maioribus quidem membris, ut femoribus & humeris, superfedere, ac repositionem differre. Vbi vero phlegmone quiescit, id autem fit communiter post septimum nonumve diem, præfati etiam periculum apud necessarios ægotantis, quod ex repositione futurum sit, tum quod si non reponatur debilem ea parte hominem & claudum prorsus fore, conabimur tuto & sine vlla violentia, os in suam compellere sedem. Vlcis vero curationem eandem quæ proposita D est in fracturis cum ulcere, administrabimus. Omne præterea membrum, quod cum vulnere loco motum, neq; repositum est, sic, Hippocrate & Celso auctoribus, iacere conuenit, ut maxime cubantem iuuat: tantum ne moueatur, neve dependeat. Quod si luxatio cum fractura, sine tamen vulnere, euenerit, communi ratione membrum extendendum est, ac manibus conformandum: ut in simplicibus fracturis superiore capite docuimus. Si vero etiam vulnus accedit, rursus ab iis quæ de fracturis cum vulnere, & luxationibus etiam cum exulceratione incidentibus, priuatim a nobis dicta sunt, congrua repetenda curatio est. Sed, ut vno verbo singula complectamur, si cum fractura luxatio incidit, hæc primum, si fieri potest, illa vero secundo curanda erit. At si ante fracturæ administrationem luxatum commode reduci non possit, fracturam ipsam E primum curabimus: deinde cum fractura callo iam obfirmata fuerit, luxationis curationem aggrediemur. Quod si luxatio inueterauerit, & ob temporis spacium callosa inibi durities contracta fuerit, ea decocto malux & altheæ perfundenda est, deinde unguento dialtheæ vocato illinenda. Posthæc emplastrum quod diachylon magnum nominatur, superimponendum erit: vel eius loco, lana succida, viscillagine quapiam emolliente delibuta. Ad hoc etiam efficax habetur, cortex radicis altheæ in aqua decoctus, & cum axungia, vel anserino pingui subactus, ut quasi malagmatis lentor contrahatur. Loco itaq; sub his sufficienter emollito, luxatum in suam sedem reducendum est. Et de luxatis quidem hætenus in vniuersum dictum sit. De particularibus enim fracturis cōpendiose scripserunt Paulus in sexto, a capite 112. usq; ad finem libri: & Celsus in octauo, a cap. 11. usq; in libri illius finem. Ad eos itaq; auctores lectorem ablegamus.

Luxatio cū
fractura.

LEONHARTI FUCHSII PARADOXORVM MEDICINÆ LIBER PRIMVS.

Proœmium.



NEMO est, qui nesciat, eum minime bonum artificem esse posse, qui sua instrumenta ignorauerit. Proinde haud conueniet, fabrum lignarium, aut ferram, aut asciam ignorare: quemadmodum nec sutorem subulam, aut sarctorem forficem. Quod sit atq; in

Boni artificis est, ut suæ artis instrumenta cognita habeat.

manuariis illis artibus, omnes eum ridendum esse putant artificem, qui artis eius, cuius se peritum esse iactat, materiam non satis perspectam habuerit: quanto magis ridendi erunt hi, qui hodie Medicos sese esse profitentur, quum tamē medicæ materiæ, quæ illis in persanandis agris instrumenti vice esse debet, prorsus ignari sint? Qui enim probe mederi possent, quibus auxiliorum materia penitus, vel magna ex parte, incognita existit? Quomodo autem non incognita esset, quum ferme nemo Medicorum nostra tempestate sit, qui simplicium medicamentorum cognitionem Seplasiariis illis hominibus rudibus & ἀναλφάβητοις pene, non committat? Indignum enim existimant esse Medico, eiusmodi rebus operam nauare: quasi cuiusque simplicis medicaminis nosse effigiem, non Medicorum, sed pharmacopolarum munus sit. Ipsi interim in scholis magna pompa desides manent, de lana caprina disceptantes, & inanibus disputatiunculis tempus temere terentes, nec vel semel tantum cogitant, quo pacto veteres imitentur, qui haud quaquam aspernati sunt altissimos perreptare montes, densissimas peragrarē syluas, longinquas terræ regiones petere, ad intima etiam terræ viscera penetrare, quo exactam medicæ materiæ notitiā assequerentur. Sic Dioscoridem, ut ipsemet in primi libri sui prologo testatur, ob inge ac indefessum materiæ medicæ cognoscendā a primā iuuentū studium per multos remotissimos mundi tractus peragrasse constat. Ita & Galenum ob vniū terræ Lemniæ veram cognitionem in Lemnum enavigare non piguit. Nostri itaque temporis Medici curam omnem & studium lucri causa instituentes, atque hunc tantum sibi rerum agendarum scopum proponentes, ut breui efficiantur diuites, laborem quam in materia medica exacte cognoscendā veteres adhibuerunt, plane inutilem esse censent, ut quibus abunde a Seplasiariis remedium copia suppetet, quum tamen vix vna aut altera planta qua utantur, genuina sit, adeoque de his nihil apud illos nisi nomen supersit. Verum esse quod dicimus multa hodie plantæ ostendere possunt: potissimum autem Endiuiā, Bedeguar, Eupatorium & alia quadam. Nam quisque pene peculiarem habet herbam, quam ignaris Medicis pro vera Endiuiā, Spina alba, aut Eupatorio vendat. Neque mirum admodum inter se dissentire Seplasiarios, ut qui nullam aliam herbarum notitiā, quam eam quæ astolidissimis mulierculis tradita est, habeant, a quibus certe, utpote indoctis & deliris, boni nihil expectare possunt, ut quæ errorem potius errore cumulent. Quum itaque vita hominum hodie plane Seplasiariorum manibus credita sit, nihil mirum est, si multo plus periculi sit a medicamento, quam a morbo. Vtunque vero medicæ materiæ nostri seculi Medici ignari sint, falsisque & adulteratis pro veris & genuinis utantur, adhuc tamen illis se, haud secus quam olim Æsculapius Tyndaridam, quamplurimos ad vitam reuocare, si diis placet, & regiam Plutonis, quod olim de Galeno dictum est, depopulari credunt. Quantum autem fallantur primus hic Paradoxorum liber satis monstrabit, ut qui illorum in materia medica errata non tantum indicabit, sed & optimorum auctorum scriptis, addet etiam rationibus firmissimis, funditus explodet, ita & nihil sit quod posthac in erroris defensionem prætexere queant. Proinde veritatis amore flagrantem hortor, quo singula hæc nostra candido animo expendant, quando nihil sit in iis quod non in horum commodum produxerimus, discantque veterum (oro) potius in exacte perscrutanda medicæ materiæ sectari studium & diligentiam, quam nostra ætatis Medicorum inertiam, ut qui nullum plane sibi cum herbis, aliisque medicamentis simplicibus negotium habendum esse censeant, sed eo omnibus nervis tendunt, quo multis commessationibus, assentationibus & id genus scurrilitatibus familiares fiant, atq; adeo plus pecuniarum emungere possint.

Nostri temporis medicis simplicium cognitionē Seplasiariis cōmittunt,

Dioscoridæ medicæ materiæ studium,

Seplasiarii quæ herbarum notitiā habeant,

Aloen per se ora venarum non aperire, neque sanguinem ciere, quemadmodum multi Seplasionis, Mesuesq; peruerso dogmate seducti opinantur: sed eadem potius occludere, atq; sanguinem undecunq; fluentem sistere:

CAP. I.

Næ hæc paradoxorum tractatio nulla via ac ratione procedat, atq; adeo confusio. nem quandam pariat, semper hunc dicendi ordinē obseruare conabimur. Primū verba eorū qui erradi occasione nostræ ætatis Medicis dederūt, bona fide, nihilq; illo-

Ordo tractandi Paradoxorum,

Collatio, lo-
corum ad
intelligen-
dos probe
auctores
mire utilis.

Serapion
rudis atq;
herbarum
imperitus.

Arabib. in
citandis
Græcis pa-
rum fiden-
dum.

Arabum vo-
lumina e
Græcis tra-
ducta mul-
tis addita-
mentis re-
ferta.
Mesue Sera-
pione velu-
ti duce vri-
tur.
Aloes vis.

rum immutatis verbis recitabimus: idq; ideo, ne quis data opera illa deprauasse, & se-
cus quam illi scripserint retulisse nos dicere queat. Deinceps veterū, Hippocratis &
Galenī potissimum, aliorumq; optimorum auctorum scriptis, ac locorū collatione, ho-
rum sententiā falsam esse demonstrabimus. Neq; n. in medicina, omnq; alio discipli-
narum genere, aliunde certius, quā ex auctorum locorumq; collatione, ac diligenti il-
lorum obseruatione, veritas indagari potest. quod ita inter se passim collatis locis, non
tantum quid vere senserint auctores certo sciatur, sed etiā si perperam quædam ab A-
rabibus in libros suos digesta sint, ea ex Hippocratis, Galenī, Dioscoridisq; collatione
possint corrigi. Cū itaq; ex accuratā auctōrū, locorūq; qui in iis sunt collatione, veritas
optime rimetur: summo studio & nos curauim⁹, vt id quod præter vulgi ac Arabū, e-
olq; sequentiū opinionē adstruximus, multorum probatissimorum scriptorū collatio-
ne ratum ac firmum faceremus. Post hac ratione quoq; si ita necessitas tulerit, addita,
quod sentimus roborabimus. Postremum ad Montui annotationes, si quas habet, ob-
iter diluendas, sermonē conuertemus. Quod itaq; ad præsens hoc paradoxon attinet,
animaduertendū Serapionem palā ausum fuisse docere *Aloenora venarum aperire*, et si
diuersum omnes veterum libri clament. Neq; mirum herbarium illum rudem, qui ne
tot quidem plantarū, quot ad modicā saltem coenā satis esse possent, notitiam habuit,
tam absurda docere, quando haud secus de illis quā, vt dici solet: cæcus de colore iudi-
cet. Perpetuo n. eorum, ex quib. sua transcripsit sententiā sectatur. Non est tamē, quod
ob id prorsus abiiciendum esse illum censē. Quum n. complura ex Dioscoride & Ga-
leno ad verbum descripserit, hoc saltem nomine retinendus erit, vt interdū in locis
dubiis & iniuria temporis corruptis ad ipsum recurrere, & veræ lectionis vestigia in eo
intueri liceat. Verba vero eius, quib. falsam suā inculcat sententiam, habentur in c. 201.
operis sui *de medicamentis simplicib.* inscripti, vbi ex Pauli Aeginetæ, si Dñs placet, sentē-
tia ita scribit: *Aloe aperit ora venarū, quæ in ano sunt.* Quam n. iniurius fuerit Paulo, qui ne
per somniū quidem id ipsum cogitauit, facile constat iis, qui diligenter eius scripta ex-
cusserunt, quando euidentissimum sit, p totum illius librum nihil tale de Aloe scriptū
esse. Vnde discant velim studiosi, Arabib. in citandis Græcis parum fidei adhibendum
esse, q nonnunquā illis tribuant, quæ scripsisse nusquā cōperimus. Id autem cur fece-
rint, hæc in primis ratio est, quod singula ex iis libris, qui e Græca in Arabicā linguam
translati fuerunt, transcripserint, quos certe genuinum auctorum sensum, minime re-
ferre in confesso est, vt quibus multa præter Græcorum mentem per interpretes ad-
iecta, multa etiam omissa sint. Verum quod asserimus esse deprehendet, qui vel vnam
veterum librorum Galenī ad Glauconem versionē cum Græco & *απὸ γράφῃ* exempla-
ri conferre voluerit. Proinde quum Arabum volumina e Græcis traducta multis ad-
ditamentis referta sint, nihil mirum hoc loci a Serapione, vt qui non ex proprio fonte
aqua hausit, sed alienis pastus est erroribus, Paulum perperam citatum. Ceterum Se-
rapionem sequitur Mesue, omnia enim sua ex illo & Auicenna desumit, ideoquē iis
veluti ducibus passim vtitur. Is enim cap. I. sui *de simp. med.* libri inter cætera sic ait: *Aloe a-*
perit orificia venarum, apertione sanguinem manare faciente. Et paulo post: *Noctet hamorrhoi-*
dibus & ano. Falsos vero esse utroque experiētur, qui dogma hoc erroneum, cum ve-
terum sententiis de vi aloes proditis, contulerit: hi namque vno omnes ore aloem cō-
trariam potius vim, adstringendi nimirum & hæmorrhoidas sistendi, habere affir-
mant. Diosc. siquidem li. 3. c. 24. ita de aloes facultatibus differit: *ἀλὼν δυνάμειν ἔχει συνήκειν, καὶ μὲν*
ὑδατὸς συρροῦν πρὸς τὴν αἵμαλὸς ἀναχωρεῖς ἐκτρέχει, καὶ μὲν ἰσχυρὰς τὴν ἐξ αἱμορροῖδων hoc est, *Aloe vim habet ad-*
stringendi, & cū aqua frigida pota sanguinis excreationes cohibet. Gal. quoq; lib. 6. de med. simp. fac.
haud aliter aloes vires depingit, inquiēs *ἀλὼν ἐστὶ τὰ φλέγμα καὶ ὑλκων καὶ μακρὴν, ἰάται δὲ διὰ τὸ πύλωμα* ἔχει
καὶ ἐν μέλει τὰ κατ' ἐσθῆτα τε καὶ αἰσθησι. Id est, *aloe medicamen est quod sinus glutinat: sanat vlcera, quæ a-*
gre ad cicatricem duci possunt, & maxime, quæ in ano sunt & pudendo. Et libro quinto th. meth. c. 4.
vbi profluuī sanguinis curationē ex professo tractans, vim mirā in sistendo sanguine
aloe inesse iis verbis indicat: *ἀριστὸν ἀπὸ πάντων ἀνὶ δίδω φαρμάκειν, καὶ κατὰ τὴν ἐν μηνίγγων αἱμορροῖδων ἀσφαλισ-*
την καὶ τὸ λεχθεῖν ἔμμενον ἐστὶν. λείπονται τὸν μέγιστον ἐν ἀλὼν ἡρίσει μερίσθαι μέρι. καὶ πᾶσι τῆς χρεῖας ἐπιστάσις, αἵ τῶ λευκῷ φυ-
εῖσθαι τὸ σπύτω τὸ πᾶσι δὲ ὡς μελιτώδη σπύσσειν ἔχον, εἴτ' ἀναλαμβάνει τὰ τὸ λευκῷ δειξὶ τῆς μελακωτάτης, καὶ πᾶσι
τῶ ἄλλων καὶ τῶν ἄλλων παντὶ πᾶσι ἐπὶ τὴν δίδω. hoc est: *Optimum omnium, quæ noui, medicamentorum,*
quo etiam ad cerebri membra narum sanguinis eruptiones tuiissime vti licet, est quod nunc dice-
tur. Thuris pars vna aloes parti dimidiata miscetur, & deinceps quum vtendi tempus in-
stat,

A stat, tantum huius cum oui candido subigatur, ut mellis crassitudinem reddat, dehincque leporis mollissimis pilis excipitur, & tum vasi ipsi, tum toti ulceri imponatur. Quod sane medicamentum, ut obiter moneam, Auicenni quoque ipse *Fen. 17. Can. 3. capite 9.* in sistendis hæmorrhoidibus probat. A iam dictis, quicquid nugetur Serapion, non dissentit Paulus lib. 7. ita scribens: *aloe inflammationem prohibet: ulcera quoque, quæ agre ad cicatricem perducuntur, sanat, præsertim quæ circa sedem & pudenda sunt.* Inter Latinos etiam omnium cuiusdam Arabum de aloe sententiam explodit Plin. lib. 27. cap. 4. ita scribens: *aloe sanguinis excreationes si modica sint, drachmæ pondere ex aqua sin minus, ex aceto pota sedat. Vultum quoque sanguinem, & undecunque fluentem sistit per se, vel ex aceto. Alias etiam est vulneribus utilissima, ad cicatricem perducens. Eadem inspergitur exulceratis genitalibus virorum, con-*

B dylomatibus, rimisque sedis, alias ex vino, alias ex passio, alias sicca per se, ut exiguit mitiganda curatio, aut coercenda. Hæmorrhoidum quoque abundantiam leniter sistit. Subscribit prædictum auctorum de vi aloe sententiæ inter Arabes princeps Auic. cap. 67. *Can. 2.* dum inter alia sic scribit: *aloe quando ponitur cum vino super hæmorrhoidas & rimas ani, tunc sanguinem ex eis manentem sistit.* Sanat quoque ulcera ani & virgæ cum vino illita: ita ut mirari satis non queam, quæ impudentia ausus fuerit Montuius in Mesues sententiam pertrahere Auicennam, quum illi ex diametro pugnent. Sed solet hoc hominum genus perdere auctorum abuti testimoniis, quo fucio talem aliquo suam inscitiam occultant. Hinc eadem impudentia Mosen illum Ægyptium citat, quasi suæ non nihil faueat sententiæ, quum tamen *digessim secundo suorum Aphor. libro,* ne verbo quidem meminere, aloen ano officere posse, sed contrarium potius, quod scilicet veteres, potissimum, qui in ano sunt, sanat, docuerit. Neque Auenzoar, quod sciam, hanc quam Serapion ac Mesue tradunt, aloe facultatem inesse scribit. Quicquid tamen sit, ex iam dictis sole clarius fieri, re, vehementer, veterumque placitis reclamare in vniuersum omnes, qui aloen per se ora venarum aperire, anoque officere affirmant. Neque obstat, quod interdum assumpta aloe, sedis venas aperiri cernamus: id enim non per se, sed ex accidenti, quia videlicet acres humores, qui sua acrimonia ani venas aperiuere faciunt, id quod & alia quædam medicamenta possunt, quæ admodum Gal. lib. 6. aphor. comm. 47. docet; ubi atra bile vexato homini ex acrimia humorum purgatione sedis venas posse aperiri, his verbis monstrat: *οὐδὲ γὰρ ἡ τῆς αἵματος ἀκρίβειας ἀποκαθάρσις, ὅτι καὶ αἱ ἀκρίβειαι τὰ ἀσθενῆ, τὰ τῆ ἀκαθαρσίας τῶν ἐκκρεμῶν ἀνὰ τὴν ἀνοσθεσίαν ἐν τῇ βρογχίτι καὶ ἀποστήσει, συνεχίζονται καὶ αὐτὴν ἀπὸ τῶν πνεύματων.* quod est: *Homini huius expurgatione ambo hæc optima eueniunt, quod scilicet superuacua expurgantur, & quod ex acrimonia eorum, quæ excernuntur, paulatim aperitur os venæ, quæ hæmorrhoidam vocant, ut & ipsa sanguine vitiosum simul excernat.* Proinde perperam aloe viribus tribuunt Serapion & Mesue, quod acris excrementis, id ipsum suæ acrimonia agentibus, magis tribuendum erat. Sed obtrudet hic quispiam dogmatis Serapion assertor. *Si huiusmodi vis non magis Aloe adest, quàm reliquis medicamentis acres humores purgantibus, qui factum est, ut Aloe potius quam alia eiusmodi medicamenta sedis venas aperire credita sit?* Respondeo cum Manardo nostro, nulla alia causa hominum mentes occupasse hoc dogma, nisi quod frequenter Aloe, quam alio quouis purgatorio medicamento vrantur, Plerumque enim omnes, qui subducendæ alui, vel ventriculi expurgandi gratia medicamento purgatorio opus habent, ad catapotia ex Aloe confecta, tanquam ad sacram anchoram confugiunt. Adeoque factum est, ut quod ab excrementis ab aloe modis fieri viderunt, id genuina quadam ac nativa malicia illius, & per se factum esse crediderint. Parum autem erat hoc credere, nisi & erroneum hoc dogma mundo libris editis patefacerent, ac pro verò obtruderent. Præterea neque obest nostræ sententiæ Iacobi de Partibus cauillatio, quam hodie multi, tanquam aheneum quendam murum, ad tuendam falsam illorum sententiam arripiunt, qui adstringendi vim quidem Aloen habere fatetur, quum extrorsum admota fuerit: aperendi vero venas, quum intro in corpus sumta fuerit. Nam statim a Dioscoride & Plinio exploditur, quorum vterque in potu etiam sumtam Aloen sanguinem profluentem compescere tradunt. Et Plinius certe, ut penitus aduersariorum ora, ac elabendi passim vias obstruere, undecunque profluentem sanguinem sistere posse dixit. Ceterum iam ad Sebastiani Montui obiectiones diluendas accingamur: is enim errori Serapionis atque Mesues patrocinatur, cæcam (ita enim vocat) proprietatem obicit, quasi Aloe occulta quadam essentia proprietate, & minime manifesta qualitate sedis venas refe-

Montui in
citandis
auctoribus
impudens.

Aloe ex ac-
cidenti ut
alia quædam
medicamē-
ta, sedis ve-
nas aperit.

Cura Aloe
potius quàm
alia medica-
menta ubi
venas aperi-
re creditur
sit.

Iacobi de
Partibus
cauillatio
diluatur.

Ad Montui
obiectiones
respon-
detur.

Aloe propri etate et
ca non ap-
rit venas.

rarer, anoque noceret, & hoc pacto sese omnem reprehensionem euitare posse arbi-
tratur. Atqui fallitur, & τῆς πατρὸς ἰδίῃ ἀφαιρούμενος, bonus ille senex: si enim Aloe insita qua-
dam totius substantiæ proprietate venarum ora aperiret, tunc semper in catapotis,
aut alio quouis modo deuorata id ipsū efficeret: id quod tamen nemo sanæ mentis di-
cere potest, quum contrarium quotidiana experientia monstret. Quod vero semper
quoties assumeretur sedis venas refereret, ita colligi potest. Quemadmodum nam medi-
camenta purgantia substantiæ proprietate perpetuo humores sibi familiares attra-
hunt, ut in sequentib. clarius docebimus, verbi gratia Scammonium bilem, Cnicus pituitam: ita

Aloen etiā
extrinsecus
admotam
sedis venas
non ape-
rire.

aloe nunquam non ob inſitam ſibi proprietatem venarum ora aperiret. Nam quum i-
pſius ſubſtantiaꝝ aperire venas inſitum ſit, vt Montuus delirare videtur, fieri nequit, vt
non perpetuo quoties ſumta fuerit, hoc ipſum agat. Vel dicat diuerſitatis rationem **B**
Montuus, & in ſuam nos pertrahet ſententiam. Sed diceret fortassis, aloem venarum ora
aperire poſſe, non quum intro in corpus ſumta, ſed quum extrinſecus ſedis venis illita
fuerit, tum enim maxime id ipſum cæca illa proprietate efficere poſſe. Quantum au-
tem hoc veritati, optimorumq; auctorum ſententiis aduerſetur, ex iis; quæ paulo ante
diximus, clarum eſſe poteſt. Pugnare vero non tantum rationi, verum etiam experi-
entiaꝝ omnibus paulo eruditionibus in conſeſſo eſt. Qui nanq; extrinſecus admotæ aloë
venas aperiret, quæ Avicenna etiam, qui Montuus & eius ſarinx Medicis numiniſin-

Aloe erosio-
nis experts.

star habetur, auctore, citra erosionem valde exsiccat. Quum itaq; non erodat, & vehementer etiam exsiccat atq; adstringat, qui per Deum immortalem venarum ora aperire possit? Insuper quum a Galeno & Paulo inter ea medicamenta, quæ vlcera ea, quæ ægre ad cicatricem ducuntur, sanant, aloe connumeretur, quomodo inter ea, quæ erodendo aperiunt venas, collocari potest, quum omnia *επιυλκωγῆ*, hoc est, quæ cicatricē inducunt. eadem Galeno lib. 5. de compositione medi. per genera auctore cum eo, quod citra ero-

Duo instru-
menta qua
iis quæ re-
cte inventa
sunt, fiden-
tiam faciunt. i

inducunt, eadem Galeno lib. 3. de compositione meat. per genera auctore, cum eo, quod citra ero-
sionem adstringunt, magis etiam exsiccant? Nulla itaque nec ratione, nec experien-
tia, quæ tamen duo sunt apud omnes homines instrumenta, teste Galeno lib. 1. ther. metho.
capite 3. quæ fidem his, quæ recte inuenta sunt, faciunt, cæcam illam suam aperiendi ca-
ra venarum in aloe proprietatem Monituius probare potest. Iterum instat Monituius,
ac velut adamantinum & inexpugnabile argumentum producentis, ita colligit: Idem
medicamentum persæpe contrarias obtinet vires, aloe igitur & constringere & aperire ora venarū
potest. Fatemur quidem plerique medicamenti contrarias, tum qualitates, tum fa-

Quibusdā
medicamē
tis cōtraria
sunt qua
litates.

cultates inesse, id quod luculenter Galen. lib. 3. de simpli. medic. facultatibus capite 13. ostendit. Ita aloem adstringendi sistendive potestate præditam esse concedimus, nihilominus tamen & per inferna bilem excernere, ac ventrem etiam subducere posse dicimus, quemadmodum Galenus libro iam citato c. 14. in eum modum scribens testatur: θαμνός τε τῆς καὶ ταύτης ἀφ' ἧς τὸν πικρὸν ἐκ τοῦ ζυμοῦ ἀπορροῖ ὑπὲρ χεῖρας, εἰ σφόδρ' ἑμμεν. καὶ ἀφ' ἧς πρὸς τοὺς αἰσιν ἀλλόη, id est: Sane permultos huius rei admiratio detinet, remque rationis expertem absurdamque existiment, si corpus quodpiam adstringens purgare queat, veluti aloë. Quibus sane verbis Galenus manife-

Galenus e
quæ a Dio
scoride pr
dita sunt.
diligenter
explorauit

ste innuit, aloen & adstringere & purgare per inferna corpus posse, id quod & nos fa-
temur. Inesse vero huic vim quandam referandi & constringendi venarum ora, *vt Se-*
bastianus Montuus putat, id est quod constanter negamus, nec perpetuo, vtcunque
se excruciet, probare poterit. Et vt finem tandem faciamus, si Galenus, quem omnia
a Dioscoride de simplicium medicamentorum facultatibus prodita diligentissime
excussisse, ac per experientiam, num vera essent comprobasse constat, vim talem,
quæ venarum ora referaret, in Aloe esse cognouisse, hanc certe silentio non præteris-
set, id quod cum in Coriandro, prunis Damascenis, & plerisque aliis fecisse notum
est. Diuersam autem quum in ea esse facultatem, nempe adstringendi venarum ora,
experientia explorauerit, factum est, vt & illius constanter in suo *de simplicibus medica-*
mentis libro meminerit. Non est itaque, cur quempiam Montui annotationes in di-
uersum rapiant, leuioris enim momenti sunt, quam vt tot tantorumque auctorum
quos produximus, testimonia, rationesque quas hic opposuimus euertere queant.
Quod si vero quispiam ea de re plura scire desiderat, is nostras aduersus Puteanum ac
Montuum scriptas apologias legat. In iis n. multa institutum conducentia reperiet.

*Aloen melli commixtam non minus, imo plus purgare, contra Auicenna & Mesues
erroneam sententiam.*

C A P. II.

ADVERSATUR nostræ sententiæ Auicenna capite 67. Canone secundo, in hunc modum scribens: *Permixtio ipsius cum melle, minuit virtutem eius, adeo ut forsitan non soluat atrahendo.* Quem veluti ducem sequitur Mesue libr. sui de simplicibus medicamentis capite primo, sic scribens: *Aloe mixta cum melle est minoris solutionis.* Verum quantum a veritatis tramite aberrant utique, nemo sani cerebri est, qui nesciat: non enim rationi tantum & experientiæ, sed & veterum auctorum sententiæ plane, quod asserunt, contrarium est. Quum enim melli suapte natura vis subducendi aluum insit, qui fieri posset, ut non idem magis alteri, quod similem vim obtinet additum efficeret? Mel autem per se subducere aluum, in primis Hippocrates libro de affectibus testatur, dicens: *τὸ μέλι ἐν τῇ ἐντέροις ἐδιδόκειτο καὶ τρέφει καὶ ὀξυνοῦν παρέχει, αὐτὸ δὲ ἐφ' ἑαυτῷ λεπτοῦν καὶ πολλὸν ἡ κομιὰ καὶ γὰρ εὐκρίεται καὶ καὶ ὑγρῶν ἐστὶν καὶ πολλοῦ μετεῖν*, hoc est: *Mel cum ceteris comestum nutrit, coloremque corporis bonum reddit: solum vero potius attenuat quam reficiat, lotium enim cit, supraque modum purgat.* Diosc. quoque libr. 2. cap. 73. in hunc modum scribens: *ἂν μέλι τὸ ὡρὴν φρεσὶ δίδωσι, καὶ λίαν ἐξεδιπνῇ*, quod est: *Mel crudum inflat, aluum quoque ac tussim proritat.* Et Galenus lib. 3. de alimentorum facultatibus iis verbis: *μέλι δὲ λεπτομέρως ὑπάρχει, καὶ ἀνάγκη ἔχει καὶ, θαλερὸν, διὸ αὐτὸς ἵκαται ἐν τῇ ἐντέροις τὴν γαστέρα* id est: *Quandoquidem mel tenuium partium est, necessario etiam acre sentitur, ideoque aluum ad excretionem proritat.* Et paulo post *εἰ χειρὶς ὕδατος μίξεως ἐκλήρηται τὸ μέλι μέσον, ἡ τῶν ὀστέων τρέφει, καὶ πολλὸν ὑπάρχει τὴν γαστέρα*, hoc est: *Si citra aqua admixtionem mel purum per se quis delingat, nutriet quidem minus, sed alui excrementa magis deiiciet.* Paulus quoque libro primo capite 96. *Mel coctum, alit magis alit, quam aluum subducit: crudum contra.* Id quod & libro 7. repetit. Vtitur & capite 6. libri primi solo melle ad puerorum deiiciendum aluum, cum ita scribit: *Porro si pueri, infantisve aluus adstricta fuerit, mel cibo adiectum dabis.* Alexander quoque Aphrod. sectione 2. probl. 66. *mel crudum abstergere & purgare, coctum vero alere tantum posse, docet.* Ex quibus omnibus abunde liquet, mel per se quidem aluum deiicere posse, idque adeo magis, si non coctum crudumve fuerit. Quod vero aloë melli addita aluum plus subducatur, satis ex Dioscor. liquet, qui nulla alia causa mel addere docet, nisi ut hoc pacto plus excrementorum deiiciat. Verba Dioscor. quæ habentur libr. 3. cap. 24. hæc sunt: *κατὰ ῥητίνης ἢ κατωπομένη, ὕδατος, ἡ μέλιτος ἐφ' ὃ ἀναληφθῆναι καὶ ἡλιον λῦει*, quod est: *Deuorata cum resina, aut cum aqua vel melle cocta sumta, aluum soluit.* Id quod & Plinium fecisse constat qui libr. 27. capite 4. de aloë ita tradit, *Deuorantur pilula cum mellis decocto, aut terebinthina resina ad purganda interiora.*

DHac ratione & Gal. libr. 7. Ther. method. capite 11. hieram picram, in cuius confectione ceterum aloës drachmæ sunt, melle esse excipiendam suadet, ut scilicet aluum magis deiiciat, id quod verba eius de hac ipsa luculenter admodum demonstrant: *ἔναι δ' ἀποπνέουσαι τὸ φάρμακον ἀνακαμβάνοντες ἀπὸ τοῦ μέλιτος, καὶ γινέται ὁρμήν, ἥτις ἐξ ὀστέων τὴν καλὴν, καὶ πολλὸν ὑπάρχει*, id est: *Sunt qui reponunt medicamentum id excipientes despumato melle, & fit ita quidem durabilis, sed minus ventrem roborat, & magis subducit.* Psellius quoque libro primo de ratione victus capite de iis quæ ventrem citant, Fœnogræco, Damascenis, itemque aliis, ut aluum magis deiiciant, mel adlici præcipit. Inter cætera enim ita ait: *Φαινίγρακιος ἐκ μέλιτος coctum, inde potum aluum subducit secum agens in intestinis humores. Mel admixtum parum esse oportet, ne vel-*

E*licet.* Et paulo post: *Δαμασκήνα quoque humida & arida melle confecta, madefacta ut plus teneant mellis, mansaque solitaria. Si bis mellis compositio absorbeat, plus subducit, quam si dulce vinum potites.* Ita ut sole iam clarius sit tam Auicennam quam Mesuen infantiliter lapsos esse, quod Aloën melli commixtam minus purgare docuerint, quum & ratio & veterum auctoritas diuersum monstret.

Aloë addita melli plus purgat.

Aloën stomacho & iocinori non nocere, ut falso plerisque Auicenna & Mesue persuasum.

C A P. III.

AVICENNA alteram tantum sententiæ nostræ partem cap. 66. 2. Canon. impugnat, dum sic inquit: *aloe obstructions hepatis aperit, sed ipsum tamen ledit.* Mesue autem vtriusque contradicere non veritus est: nam capite 1. sui de simp. med. libr. ita scribit: *aloe contrahit, dolorem ventris faciens, & nocet stomacho & hepati.* Nemo tamen usque adeo lippis est oculis, qui vtrunq; falli non videat, quando ne vnus quidem ex veteribus classicisque scriptoribus sit, qui non diuersum docuerit: Dioscorides nam amicum stomacho aloën esse tradit, ut si mixta sit aliis medicamentis quæ purgatio sunt, ea minus noxia sto-

Aloë neque stomacho neque icco non nocet.

macho reddat. Verba Dioscoridis *libr. 2. cap. 37.* hæc sunt: *μυζη τοις ἀλλοις καθαρτικῶς ἡσος καλῶς.* *μαζα πρῶτι;* id est: *aloe aliis commixta medicamentis purgatoriis, præstat ut minus stomachum infestent.* Apertius id ipsum Galenus *libr. 6. de simp. med. facultat.* docet, in hunc de aloe scribens modum: *ἡ γὰρ ἀλὸς μαζαζ ἔστι τὸ φάρμακον, ὑπὸ τῇ ἀλὸς, hoc est. Nam & gratum est stomacho medicamen, ut si quid aliud.* Et Paulus libro 7. *Est, inquit, aloe stomacho valde grata, ut si quid aliud.* Et libro eodem, capite quarto: *Quum medicamenta corpus purgantia omnia stomacho noxia sint, sola ventriculo amica & utilis est aloe.* Quibus subscribit etiam Oribasius in *medicinæ Compendio*, dicens: *aloe vehemens quidem catharticum non est, stomacho autē aptissimum.* Psellius quoq; *lib. 1. de victus ratione*, aloe n inter ea, quæ stomachum cōfirmāt recenset iis verbis: *Maximè conducibilia stomacho absynthium & aloe.* Nec dissentit Plinius qui *lib. 27. c. 4.* scribit: *Confirmat stomachum aloe, adeo ut nulla vis contraria infestet.* Grata autē *B* est stomacho aloe haud aliter, quam absynthium, *Gal. libr. 6. de simp. med. fac. auctore*, quia aliquam adstrictionem obtinet. Quum vero veteres aloea stomacho siue ventriculo gratum esse medicamentum scribunt, de ea non simpliciter, sed quatenus est medicamentū purgans loquuntur, ut ex verbis illorum satis liquet, & nos id ipsum fusius in apologia nostra aduersus Puteanū ostendimus. Quod autē iecur non offendat, probat *Gal. ad Paternianum*, qui cum oxymelite darā aloen stomachicis & hepaticis magnū adiumentum afferre scribit. Paulus etiam *lib. 7.* docet, quum Dosithei cataporia iecoraria aloes vnc. vnā accipere ait. Et cum, *Plinio teste*, loco iā citato, aloe in regio morbo, qui plerunq; iocinoris vicio oritur, vtiliter bibatur, fieri haud potest, ut iocinori nocere queat. Hinc mirū admodum est Auic. in eam deuenisse opinionē, quum tamen & *C* ipse fateatur, aloen iocinoris obstructionibus & arquato morbo esse perutilem. Atqui per plures eiusmodi contradictiones, ut ex sequentibus perspicuum fiet, in Auic. libris inueniuntur, ut certe hoc nomine tyronibus medicinæ nondum exacto iudicio præditis valde suspectus esse debeat, præsertim in *secundo suo Canone.*

Rhabarbarum nostrum & vulgare, in plerisque a veterum Rheobarbaro differre, atq; adeo diuersum esse.

C A P. III.

**Ambigua
discutienda**

QVVM de rebus disceptantibus id vnice cauendum sit, ne qua vox illis ambigua imponat: nam alias non raro fieri solet, vt alter alterum non intelligens, acerrime inter se de lana caprina rixentur, & in immensum temere sermo progrediatur: animaduertendum erit, ne nominum quæmpiã ignorantia fallat, Rheobarbarum nostrũ seu vulgare esse id, quo passim nunc ad subducendam, nobilium præsertim, aluũ Medici vtuntur. Veterum vero, quod Dioscorides, Plinius, Galenus, & qui his etiam vetustiores sunt, describunt. Quemadmodum autem veteres suum variis nominib. vocant, Dioscorides enim interdum *Rheon*, interdum *Rhian*, aliquando *Rhaponticum*, Galenus *Rheum* & *Rha*, Plin. *Rhacoma*, Celsus *radicem ponticam* appellat, ita Punici *Raued-seni*, & vulgus Medicorum *Rheubarbarum* nominant. Rheobarbarum vero quo nunc passim officinæ vtuntur, differre ab eo, quod veteres depingunt, quicquid nostræ tēpestatis garriant Medici, nullibi rectius nisi ex notis, quæ illi ab vtriusq; tribuuntur, colligitur. Veterum nimirum *Rha*, Dioscoride *lib. 3. c. 3. teste*, *γεννῆται ἐν τοῖς ὑπὲρ ἑσπερίου τόπου, ὅτε, καὶ ἡμεῖς τὰ ρίζα μέλανα, καὶ πορφυρὰ τὰ μέλα, ἰσχυρὰ, μικρὸν πικρὰ, ὥς τοις ἐν τοῖς ὑπὲρ ἑσπερίου τόπου, ἄρσμος, χαλκίτη, καὶ σκευφες* id est, nascitur in iis, quæ supra Bosphorum sunt regionibus, unde etiam affertur: *radix nigra. Centauro magno similis sed minor & magis rubens, sine odore, laxa, & parum levis.* Nec dissentit Galenus, vel quisquis eius libri auctor fuit, capite 228. *lib. de simplici med. ad Paternianum*, qui *Rheon* his verbis describit: *Radix est magna & nigra, laxa, levis, inodorata, gustu calefaciens, & leniter adstringens.* Libro quoque octauo de simplici med. facultatibus. *Rha* tum laxitatem tum leuitatem in se habere scribit. Iam dictis iuscribit *Plin. lib. 27. cap. 11.* in hunc modum loquens: *Rhacoma affertur ex his, quæ supra Pontum sunt, regionibus, radix Costo nigro similis, minor & ruffior paulo sine odore, calefaciens gustu & adstringens.* Rheubarbarum autem à nostris vocatum, & quod hodie in frequenti Medicorum vsu est, alios a priori natales habet, ex meridionalibus nanq; regionib. ad nos fertur, non aquilonaribus, vbi Bosphorus, & *Rha* fluuius, qui radici huic nomen dedit, existunt. Nullum denique cum Costo nigro, vt antiquorum, similitudinem habet. Adde, quæ solo a veterum Rheobarbaro discernere nostrum sufficiens nota est, vulgare & quo hodie vtimur, habere

Rheobar-
barum vul-
gare.
Rhabarba
rū veterum
Nomina
varia.
Rhebar-
bari.

**Locus nati-
uus Rha-
barbari ve-
terum.**

Natales no
stri Rheu-
barbrai.
Rhabraba-
ro nomen
vnde inditū

A odorem vehementem, veterum autem plane sine odore esse. Præterea grauitatem in vulgari commendat Mesue, veteres contra leuitatē. Accedit, quod veteres suo Rheobarbaro nullam purgandi vim inesse scripserint; in quem tamen vsus; ætatis nostræ Medici suum, & recte quidem, plurimum valere dicunt. Sed obtrudet quispiam, *nihil mirum esse Rhabarbarum iam siccum odorem esse, veteres autem de viridi ac recenti locutos esse, quod odore plane caret, haud aliter quam alia quædam, quæ humiditate superflua obtrudente, donec ea resoluatur, absque odore perseverant.* Obiectioni huic pulchre per historiam respondet reconditæ eruditionis vir IO. MANARDVS, libro suarum epistolarum medicinalium 6. atque se à Sigismundi regis Sarmatarum Medicis didicisse, in eo bello, quod contra Moschos strenue gesserat idem rex: Rheon inuentum fuisse; quod et si vulgari satis

Rhabarbarum veterum purgandi facultate caret. Obiectio.

Ioann. Manardus.

B quidem simile esset, penitus tamen inodorum fuerat, in eoque omnes veterum notæ deprehensæ sunt: fuitque procul dubio id Rheobarbarum, quod veteres pingunt. Ceterum veteres suum Rheobarbarum non ad alui purgationem, sed ad alios plerosque vsus adhibuisse, manifestius est, quam vt probari debeat: neque enim Dioscori: neque Plinius, neque etiam Galenus, in vniuersis suis operibus, quæ hodie exstant, ad alui subducendam Rheobarbaro vsi sunt: sed quum huius maximam & præcipuam adstringendi vim adscripserint, in contrarium potius vsus adhibendum esse præceperunt, atque adeo sanguinem exspuentibus, coeliacis, & dysentericis conferre dixerunt. Aetius quoque, qui sub Constantino Magno vixit, *sermone 9. cap. 47.* inter ea, quæ adstringendo ventrem cohibent, rheon ponticum recenser. Quin etiam constat nec Auic:

Veteres suum Rhabarbarum ad alui purgationem non adhibuerunt.

in cap. 585. secundi Canon. Rheobarbaro purgandi potestatem tribuisse, sed diuersam potius: id quod & Fen. 16. *Canon 3. Tract. 1. capite 4.* vbi Rheubarbarum inter medicamenta aluum cohibentia enumerat, & in plerisque aliis locis facit. Et certe veteres suo esse vsos ad cohibendam aluum testatur Abenrois Cordubensis, qui *lib. 5. Collect.* Galenum & alios Medicos Rheobarbarum ventrem constringere scripsisse ait, notans in hoc eosdem, tanquam falsa dixissent. Sed ignorauit impia illa bestia, Galenum atque alios veteres diuersum a suo habuisse Rheobarbarum, ita vt non immerito illi alios etiam effectus tribuerint. Ex iis itaque omnibus notum fit, nostrum hodie Rheubarbarum ab antiquorum differre, quod hoc ad aluum deiciendam, nunquam vsi fuerint: At-

Montui an notatiuncula diluitur.

D qui hic reclamationt Montui: atque Pauli auctoritate, veteres quoque Rhabarbaro ad ventris sanorum purgationem vsos esse probare nititur. Pauli locus est *in li. 1. c. 43.* vbi ita scribit: *Aluum soluebant, iubentes iam dormituros resnam therebinthinam, quæ oliuæ magnitudinem æquaret, deuorare.* Quod si magis citare voluerimus, paulum radicis ponticæ miscbimus: Sed meminere velim, nos de antiquis, inter quos Paulus Aegineta, vt qui longo post Galenum & Plin. tempore vixerit, connumerari non potest, locutos esse. Neq; n. mirum Paulum, vt alios recentiores Medicos, ad contrarios vsus Rhabarbarum adhibuisse, vt cuius tempore, Rheubarbarum, quo hodie vtimur, innotescere mudo coeperit: quum Medicis, qui ante illum fuerunt, quemadmodum in Corollario suo Herimolaus quoque testatur: plane incognitum fuerit: Vixit autem Paulus post Oribasium Iuliani archiatrum. Hinc deceptus Paulus, haud aliter quam Abenrois, ac multi alii hunc

Paulus Aegineta inter veteres non connumerari debet.

E sequentes Medici, idem Rhabarbarum, quod suo tempore inuentum erat, cum Rheubarbarum esse putauit, atque adeo tam antiquorum instar restringendi facultatem, iam vero recentiorum modo, aluum subducendi huic inesse existimauit. Proinde factum est, vt *cap. 1. lib. 1.* ad reprimendum prægnantium vomitum, & *li. 7.* ad dysentericæ curationem vsus sit, cum tamen in vtrisque affectibus purgatoria adhibere medicamenta, vt post dicemus, minus consultum sit. Pari modo ad veterum Rheobarbarum respexit libro eodem, cum ex professo Rhabarbari vires describens, hoc ipsum sanguinem exspuentibus coeliacis, & dysentericis prodesse scribit. Fuisse autem notum Paulo Rheubarbarum nostri temporis, satis ex tribus illis compositionibus, quibus *lib. 7. cap. 11.* ad podagram vtitur, liquet. In illis enim *rheubarbaricum* instar Arabum, alias autem *Rha*, & *radicem*

Nostrum Rheubarbarum Paulo notum fuit.

F *ponticam* nominauit. Primæ compositioni nomen *Diakorallion* est: Secundæ, *Antidotus Agapeti*. Tertiæ, *Antidotus Atactos*. Quarum descriptiones qui scire cupit, a nobis iam citatum Pauli locum petat:

Cassiam Arabum & recentiorum, a veterum atque Græcorum Cassia aliam ac diuersam esse. C A P. V.

Nicolaus
Leonicens

Nisi Nicolaus Leoniceus, vir dignus, cui medicinarum studiosi multum tribuant, memouisset, fuisse quosdam ex Medicis iunioribus tantæ inscitiae, ut cortice Casiae fistulæ Arabicæ ad citanda menstrua vterentur, quum Græcorum uti potius; ex Dioscoridis ac aliorum Græcorum Medicorum sententia, debuissent, nunquam in numero Paradoxorum hoc ipsum, quod iam tractamus, collocassem. Neque enim mihi persuasissem unquam, esse tam stupidi animi Medicos, qui nescirent Arabum a Græcorum Casia esse diuerfam. Esse autem aliâ Arabum a Casia antiquorum, in primis vtriusque descriptio monstrat: quas nondum satis recognoscentes conferre poterunt, & quod dicimus, solè meridiano clarius deprehendent. Arabum nimirum partim in India, partim in Ægypto nascitur, folio Iuglandis, siliquas habet prælongas ac teretes vtrinque fastigiatas, duos fere pedes proceras, carne intus non gra, gustu prædulci, sed plane medicato, ligneis distinguentibus membranis, & ossibus siliquarum intercurrentibus. Græcorum vero, *Gale. in lib. de Theriac. ad Pisonem auctore*, rubescit, & rosam expirat, sicut etiam dulcem gustum præfert, fistulis plena, & vinum naribus obolens, & aromatum modo vehementer odorata. Differre easdem etiam usus vtriusque manifestat. Arabum enim & quæ hodie in officinis venditur, ad leniendam aluum pulchre conducit: id quod Græcorum non facit: ea enim urinam atque menses cit, aliasque vires a priori diuersas habet. Proinde quum veteribus Græcis plane incognita fuerit ea, de qua Arabes scribunt: neque enim Galenus, neque etiam Dioscorides eius mentionem faciunt: consultum erit, ut si quando in libris Græcorum Casiam fistulam legere contingat, ne pro ea alteram, de qua Arabes atque recentiores agunt, capiamus. Prodesset itaque quò aliqua in iis nominandis certa haberetur differentia,

**Cafia li-
gnea vera
earemus.
Cafia vera
qualis.**

quò Arabum, siliquam Ægyptiam, aut *Casiam catharticen*, Græcorum autem *Casia* fistulam aut odoratam appellarem. Est enim, ut diximus, vehementer odorata. Vnde liquet *Casiam*, quæ hodie passim officinæ vtuntur, ligneamq; nominant, non esse eam, quam Dioscorides & Græci alii describunt; illa enim tetra, inodora, & penitus nihil cum vera *Casia* commune habet, quam Dioscorides *lib. 1. c. 12*, ait esse *ἑκαμύνη, ὀσφύνη, καρχαλί-
ξουσι, σπυγί λαν, μυρεψή & παρχαίαν τοῖς σπυγχοῖς παλαιοῖ, διὰ τοῦτο ἐν τῇ γαστρὶ ἐν σφύραι μετὰ ποσὶς περιττοῖς, ἀρωματίζουσα, οὐκ ἔστιν ἰσχυρὴ, ἰδιόχουσα τῷ ὀσμῇ*, id est, *rubescentem, boni coloris, Corallio lapidi similem, per quam angustam, longam & crassam, fistulis plenam, mordentem pungentemue in gustu: & cum aliquanto feruore adstringentem, aromatum modo odoratam, vinique odorem referentem*. In eundem modum eam describit Galenus in libro de theriaca ad Pisonem dicens: *ἡ δὲ καοσιὰ κατὰ τὴν κάρδαμιν ἐρεθίζεται, ὡς καὶ ἐν τῇ γαστρὶ ἐν τῇ γαστρὶ ποικίληται, σπυγχοῖς τε ἔστιν, ἐν ἰσχυρῇ, & πολλὰ τὸ ἀρωματίζον ἔχει*, hoc est, *Casia* laudatissima rubescit & rosam spirat sicut etiam dulcem gustum inter gustandum refert, fistulis plena, & vinum obolens, & aromatum modo vehementer odorata. Oribasius etiam *lib. 2. de simplic. facult.* scribit, eligendam esse *Casiam*, quæ rubea sit, boni coloris, Corallio similis, angusta, nitida, valde longa, & crassa in fistulis, in gustu erodens, cum feruore multo adstringens, aromatum modo odorata. Neque dissentit Plinius *libro dodecimo, capite 19*. vbi probandam tradit eam, quæ recens maxime, & quæ sit odoris molliissimi, gustuque quam maxime feruens, potius quam lenito tepore leniter mordēs, colore etiam purpureo. Hic referre placet, quod dum hæc scriberem contigit. Simplicium medicamentorum nō imperitus, Georgius Ellingerus, pharmacopola Nurnbergensis; *Casiam*, quam ipse veram esse putabat, mihi ostendit: quæ nihil minus quàm *Casia* erat: etsi enim rubescens, & Cinamomo nostro per omnia similis colore videbatur: tamē quia nullum plane odorem præ se ferebat, *Casiam* veram fuisse non credo, sed aliquam potius pseudocinamomi speciem. Laudo tamē viri ardens in perquirendis simplicib. studium, quod hodie omnes ferme reliqui Germaniæ Seplasiarii contēnunt. Quod si homo ille literis ingenium excolere voluisset, potuisset certe rē herbariā nō parū iquare. Ceterū quū vera *Casia* tenuitate corticis, odore, & gustu Cinamomo, quod hodie hoc nomine passim venditur, simile sit, factū est, ut quidā mentitū hoc Cinamomū, *Casiam* verā esse di-

Quidā pleu-
docinamo-
mum no-
strum Ca-
siam veram
esse putant.

Hodie

Mel acium
quid.

[illegible]

**Auicênz de
Eupatorio
sentencia**

IGNORASSE Eupatorium Græcorum Arabes, Auicennam præsertim atq; Mesue-
lex eorumdem libris manifestissimum sit. Nam hanc si cognitam habuissent, nunquā
in ea describenda tam varii fuissent. Auic. enim Eupatorium 2. *Can. cap. 244.* herbam es-
se aromaticam scribit, habereq; folia Cannabis, & florem Nenupharis. Mesue autem
libro

Nymphsai

**Eupatoriū
verum.**

**Eupatorû
descriptio.**

Agtrimonía
vocatze effi
gies.

Seplafiatii
Agrimoniz
pro Eupato
rio vero y-
tatur.

**Montui in
dialecticis
in scitia.**

Nō omnia
accidentia
adesse vel
abesse prae-
ter subiecti
corruptione
nē possunt.

Definiendi
forma ex
genere &
accidentib.
plurimum
momenti
habet.

quod herbarum descriptiones a veteribus traditas fallaces esse ait, cum nulla certior A
cognoscendi herbas ratio tradi aut excogitari possit, quam, ut ad veterum, Dioscori-
dis præsertim, qui reliquos omnes superasse ab omnibus creditur, descriptiones con-
fugiamus. Nam hac ratione agnoscendi herbas ab illa, nunquam ad exactam eorun-
dem cognitionem perueniemus. Præterea impudenter hallucinatur Montuus, iniu-
riamq; Galeno facit, quod hunc ideo simplicium medicamentorum formas figuræ
non depinxisse asserit, quoniam fallaces admodum putauerit. Non enim hoc nomine
earundem figuras perscribere abstinuisset Galenus ipse *lib. 6. de simplicium medicamen-
torum facultatibus*, testatur, sed quod post Dioscoridem, qui, *eodem etiam teste*, omnium
perfectissime hoc præstitit, denuo id ipsum aggredi minime necessarium existimauit.
Verba eius habentur capite de abrotono, ubi sic scribit: *ταύτης τῆς πένος οὐτε τὴν ἰδίαν καὶ ἀσφύ* B
καὶ τοῦ τῆς πένος οὐτε τὴν ἰδίαν καὶ ἀσφύ quod est: *Herba huius nec speciem formamve scribere post tot tantos-*
que viros oportet. Referendum autem ad veteres materiarum medicarum scriptores, Diosco-
ridem præcipue, quorum omnium capite præcedenti meminit. Et certe post Dio-
scoridem iterum pingere herbas minime necessarium Galenus esse putauit, quod ita
rem illam absoluerit, ut nemo hætenus repertus sit, qui descriptiones suas tanquam
falsas reprehendere voluerit. Præterea Plinium quoque in sententiam suam pertrahere
Montuus conatur, at frustra: neque enim is *lib. 25. cap. 2.* herbarum descriptiones falla-
ces esse inquit, sed picturam ex coloribus tam numerosis, præsertim in æmulatione
naturæ, fallacem esse docet. Neque enim natura, utcumque quis numerosos colores in-
ter se misceat, satis imitari aut exprimi potest. Proinde longe melius est, ut verbis etiā C
herbarum formas, quam pictura tantum exprimamus. certius enim sermone, qua pi-
ctura, quod conamur assequemur: multum enim, *ut Plinii verbis utar*, degenerat tran-
scribentium fors varia. Quare ceteri sermone eas tradidere. Quibus sane verbis Pli-
nius nihil aliud indicare voluit, quam multo consultius esse etiam verbis, quam pictu-
ra tantum, quemadmodum quidam fecerunt herbarum effigies exprimere. Atque ad-
deoque probe facimus, dum ad veterum, Dioscoridis maxime, qui vnus hodie pro multis
est, descriptiones, tanquam ad sacram anchoram, in agnoscendis herbis confugimus.
Neque obest, quod propter soli diuersitatem subinde mutantur: ea enim quum in quæ-
ritate tantum mutatio sit, non tanta esse potest, ut veterum notis adhibitis internosci
non queant. Caueant ergo studiosi, ne Montui ineptiis seducantur, quando tales sunt D
quas quisque paululum latem iudicii nactus, non solum oppugnare, sed etiam peni-
tus interimere queat. Quid autem de Dioscoride, & picturis, quas hodie constat esse
multo, quam olim fuerint, meliores ac veriores, *in præfatione in nostros de stirpium historia
commentarios* clarius & copiosius diximus.

*Eupatorium Græcorum non habere vim purgatoriam, secus atque id quod a Mesue describi-
tur, veteres omnes uno ore affirmare.*

CAP. VIII.

Mesues apud nostræ
etatis medi-
cos auctori-
tas.

LV BENS in iis erratis, quorum Mesue occasionem dedit, recensendis versor, ut quæ
sciam a quibusdam, imo ferme omnibus nostri seculi Medicis, ita admirari, ut ne-
minem de simplicium medicamentorum facultatibus, exactius scripsisse putent, atque adeo
illius nomini ita se manciparunt, ut hunc non solum nocturna diurna manu versan-
dum, sed & prorsus ediscendum esse clamitent: & quod æque detestandum est, illum, ut
qui reliquos omnes, si diuis placet, in hoc scribendi genere vicerit, adhuc hodie in tā-
ta bonorum auctorum copia, in publicis scholis enarrandum, ac suis auditoribus non
solum ediscendum, sed plane deuorandum, tanquam omni errore vacuum, proponunt:
Id quod superioribus annis Ingolstadtii factitasse *μεγαλόν* illum, magnum Thrasionem,
& insignem *επιμήλορον*, compertum habemus, quem huic auctori ita additum esse
constat, ut citius Christum, veritatem ipsissimam, quam illum mendacii insimularet,
imo quod horrendum est, & penitus abominandum, citius Christo diuinitatem, F
quam Mesue auctoritatem suam detraheret. Sed valeat Cyclops ille cum vniuersa sibi
similium turba, digni enim sunt, qui perpetuo cum Gryllo, instar suum, sterquilinio
defectentur: nos Mesues verba ex suo *de simplicium medicamentorum libro*, Eupatorio vim
purgatoriam tribuentia, subiiciam. *Eupatorium*, inquit, *solutione educit cholera & phlegma
facile.*

Megastomus.

Eupatoriū
non habet
vim pur-
gandi.

Peritiarnis
quàm discē
dam nobis
proponi-
mus atq̃
res legendi.

Arabum in
ter se diffen
sio.

Serapionis
de Turbit
sententia:

Turbis Sex
rap. est Tri-
polinum.
Tripoli de
scriptio.

Plin. Tripo-
lium cum
Polio con-
fundit.

Pandectarii
error.

Mesues de
Turbit sen-
tentia.

Septem spe-
cies Tithy-
malorum.

Turbit Mes-
ue non est
Pityusæ ra-
dix.

Pityusa a-
pud Sera-
pionem
Scebram
dicitur.

Lathyrus
quid.
Turbit no-
strum non
est Sera-
pionis.

Turbit no-
strum non
est Mesues.
Turbit vn-
de.

Tripolium eandem herbam cum Polio esse putat. Hinc est, quod Polii foliis assigna-
uerit miraculum, quod Tripoli floribus veterum auctoritate debetur. Sic enim *lib. 27.
cap. 7.* de Polio scribit: *Folia eius mane candida, meridie purpurea, sole occidente carulea aspicuntur.* Ex iam dictis etiam Pandectarii immensus error agnoscitur, qui in suis mendaci-
simis Pandectis, duo facit capita, vnum de Tripolio Dioscoridis, alterum vero de Tur-
bit Serapionis, quasi Turbit apud Serapionem aliud sit a Dioscor. Tripolio: id enim
falsum esse ex prædictis evidentissimum est. Ceterum Mesuen aliud a Serapionis
Turbit descripsisse, ex eiusdem verbis innotescet: ita enim Turbit suum depingit:
Turbit est radix herba, cuius folia sunt sicut folia Ferule, minora tamen. & est ex habentibus lac.
Quorum certe nihil in Serapionis Turbit cernere licet: folia enim hæc latidis, quæ
Plantagini similia sunt, habet: illa autem Ferule, quæ Feniculi foliis accedunt. Quod si
vero Ferulæ folia habuerit Turbit, ex iis quæ lac habent, ut ait Mesue, esse non potest:
nam si lac habet, tum vel aliqua specierum Tithymalorum, vel radix Pityusæ erit.
Quum autem septem sint Tithymalorum species, *Dioscoride libro 4. capite 155 auctore,*
nulla tamen ex his Ferulæ similia folia, qualia Turbit Mesues habeat, fieri non potest,
vtrillarum aliqua Turbit eiusdem esse queat. Nullam vero Tithymalorum speciem
Ferulæ foliis constare, Dioscoridem diligenter excutienti patebit. Singularum enim
specierum descriptiones afferre superuacaneum esse duxi. Neque etiam Turbit a Mes-
ue descriptum Pityusæ radix esse potest, siquid hæc non Ferulæ, sed Piceæ folio con-
stat, quemadmodum *lib. 4. capite 156. testatur Dioscorides,* qui Pityusam *quæ maior est, & hinc, & inde*
λαμψύνη, ἡ μείζων, ἡς τὸ πικρὸν. quod est, *foliis acutis, tenuibus, Picea similibus vestitam esse* scribit. C
Quibus accedit, quod Pityusa apud Serapionem non Turbit, sed Scebram nuncupa-
tur, id quod palam fiet, si quis vtriusque descriptiones contulerit. Denique Mesues
Turbit non potest esse, vel Lathyrus, vel Peplion, vtraque licet inter lactarias a Diosco-
ride connumeretur herbas, quod vtriusque radix a Dioscoride inutilis esse censeatur.
Et certe Lathyrus ea est herba, quæ hodie *Cataputia minor*, barbaro vocabulo dicitur.
Qui iam fieri posset, ut quid esset Turbit, ex tam diuersis ambiguisque Arabum pla-
citis, nostræ ætatis Medici scire possent? Non enim esse Serapionis Turbit, quo nunc
passim officinæ vruntur, vel ex eo manifestum sit, quo radix illa, quam Serapion de-
pingit odorata est, ea autem, qua nos vtimur, odore penitus caret, tantum abest ut
Serapionis Turbit dici possit, Neque Mesues esse poterit Turbit, quoniam, ut doctis-
simus Ioannes Manardus ex nonnullis fide dignis se audiuisse scribit, ex planta acci-
pitur, quæ Myrti folio, & minime ferulæ constat: ita ut nihil mirum sit nostræ ætatis
Medicos ignorare, quid sit radix, quam sub Turbit nomine officinæ vendunt, præ-
sertim cum Græci, ad quos tanquam ad sacram anchoram in iis dubiis cōfugiendum
erat, de ea radice sub nomine Turbit nihil scripserint: barbara enim vox est, & a po-
sterioribus Medicis, ob vehementem forte, quam habet in mouenda aluo turbatio-
nem, sic appellata. Neque obstat, quod apud Dioscoridem capite de Pityusa hæc ver-
ba *ἡ καλεῖται τυρπίλ* inserta sunt, nam ea ab aliis adiecta esse argumento est, quod in nullis
Græcis aut Latinis vox Turbit legitur codicibus. Proinde si verum est, quod Ioannes
Manardus se audiuisse dicit, nimirum quod planta eius radice, quam Turbit hodie E
nominamus, folium Myrti habeat, interque lactarias herbas refertur, certe aliqua Ti-
thymalorum species erit, non tamen ex earum septem numero, quæ a Dioscoride cō-
memorantur, sed ea quam hodie Crentensem Tithymalum appellant, ut abunde *tomo
tertio nostrorum de stirp. histor. commentariorum monstrauimus*, vbi iconem eius subieci-
mus, & vn. uersam hystoriam luculenter exposuimus. Ceterum Turbit Mesue, quod feru-
læ folia, ut dictum est, obrinet, ut a Turbit communis vsus diuersum est: ita a Thapsia
Dioscoridis non differt, quemadmodum *loco iam citato pluribus*, & iis quidem effica-
cissimis, argumentis demonstrari, ut opus non sit hic denuo referre.
*Prudenter facturos Medici artis studiosos, si Mesuen Rheubarbaro, Epithymo, Scammonio, Polypo-
dio, & Euphorbio exhibitionis præscribentem pondus, haud sectati fuerint.* F

CAP. X.

Rheubarba
si pondus.

EX multis aliis medicamentis, in quorum præscribendis ponderibus Mesue aber-
rasse videtur, pauca hæc enumeranda delegimus, quod cetera ex Manardi margi-
neis in hunc auctorem annotationibus studiosus quisque venari queat. Rheubarbari
itaque

A itaque dosiſ a Meſue præſcripta eſt, vt potio eiſ infulſi ſeu macerati ſit a drachmiſ duabus & ſemis uſque ad drachmas decem, triti autem ad quatuor: quæ nimirum quantitatis nimis excellit, nec eſt hodie ſane mentis Medicus, qui tantam portio- nem exhibear, adeo vt multa confutatione nihil opus ſit. Præterea pulueris Epithymi drachmas ſeptem exhiberi poſſe Meſue ſtatuit, cum tamen veteres multo minorem quantitatem præſcripſerint. Dioſcorides enim quatuor tantum drachmas concedit: cuiuſ hæc lib. 4. capite 168. de Epithymo verba ſunt: *πρίθμιοι δὲ οὐν μέλιτι καὶ πικρῶν φλέγματι καὶ γαλλόμελαις, ἰδίως ἀρμόζει ἐπὶ μελαγχολικῶν καὶ ἐμπύρετον καὶ ἐνδοφθόνον πλῆθος*. *ἄλλοι δὲ οὐν μέλιτι καὶ αἰσὶ ὀλίγῳ ὄζει*. Potum cum melle pituitam bilemque nigram per inferna purgat, priuatim melancholicis & inflatis accommodatum acetabuli menſura uſque ad drachmas quatuor, cum melle ſaleque ex ace-

Epithymi
doſiſ

B ro modico. Oribafiuſ quoque in compendio ſuo vix drachmas tres tranſcendit, ita ſcri- bens: *Dabis cum vino duplici penſo drachmas tres & adhuc amplius, & cum melle ſaliſ admiſcebiſ cochlearum medium*. Pauluſ tamen Aegineta lib. 7. dandas eſſe drachmas quinque. Epithymi cum lactis hemina contritas permittit. Pliniuſ libro 26. capite 8. ad ſex uſque drachmas progreditur, dum in eum ſcribit modum: *Aluum ſoluit a quatuor drachmiſ ad ſex, cum mellis exiguo ſaliſque & aceti*. Auiſenna autem cap. 229. 2. Canonis; potionem Epithymi quatuor eſſe aureos præcipit, adeo vt nemo ſit præter vnum Meſuen, qui ad ſeptem uſque drachmas progredi auſuſ ſit. Proinde conſultum erit, vt quinque tan- tum, vel ſummum ſex, idque in pauciſſimiſ, drachmas concedamus. Ceterum in Scammonia doſim eſſe a quinque granis ad duodecim ſcribit Meſue, cum tamen Dioſco-

Scammonia
doſiſ

C rides dare integram drachmam, imo obolos quatuor non timeat: id quod verba eiſ- dem, quæ ſcribit libro quarto capite 165. liquido monſtrabunt. *διναμιον δ' ἔχει, αἰε, δ' ἐπὶ ἐνδοφθόνιῳ οὐν μέλι καὶ πικρῶν καὶ γαλλόμελαις καὶ πικρῶν καὶ γαλλόμελαις καὶ πικρῶν καὶ γαλλόμελαις*. hoc eſt, vim habet Scammonii liquor cum miſſa aut aqua pura drachma vniſ aut obolorum quatuor pondere per inferna bilem & pituitam purgare. Ad ſoluendam vero aluum bini oboli ſatiſ ſunt. Animaduertendum autem binos obolos eſſe ſcrupulum vnum, id quod præter alios in ſuo de ponderibus & menſuriſ carmine, Rhemniuſ hiſ verſibus indicat:

Obolus
quid.

Semioboli duplum eſt obolus, quem pondere duplo

Gramma vocant, ſcrupulum noſtri dixere priores.

D Ita vt lapſuſ ſit Angeluſ Politianuſ, vir alioqui doctuſ, *epiſtolarum ſuarum libro 10. dum ſcrupulum Latinis dictum, ὀβολὸν Græciſ nominari contendit*: ὀβολὸς enim dimidiuſ tan- tum ſcrupuluſ eſt. Sed nihil opuſ in re manifeſta pluribuſ verbis. Vt ig tur ad inſtitu- tum redeamus, Pauluſ etiam Aegineta libro 7. febre carentibuſ, & ſtomacho non imbecilliſ, Scammonii ponduſ obolorum quatuor cum zingibere exhibendum docet. Et in *Compendio ſuo* Oribafiuſ drach. integram exhiberi poſſe aſſerit. Id quod non ideo dixerim, quod tantam hodie de Scammonio quantitatem exhiberi poſſe pu- tem, atque adeo Scythiciſ illiſ Medicis patrociner, ſed vt oſtendam, Scammoniam, qua hodie vtimur, non eſſe genuinam: niſi enim adulterina foret, ruto ea quantitas quæ a veteribuſ præſcripta eſt, dari poſſet. Adulterinam autem eſſe quiuſ experitur, qui illam cum notis vel a Dioſcoride, vel a Meſue traditiſ contulerit. Omnium autem

Scammonia
qua hodie
vtimur
non eſt ge-
nuina.

E videtur eſſe deterrima, quæ Syriacam & Iudaicam appellat Dioſcorideſ, quæ quoniam lacte tithymali vitiata eſt, ſit vt genuina ſit multo in purgando violentior: nam Plinio teſte, ſtrangulat ſumta. Scio tamen quendam qui ſcrupulum integrum, & (ni fallor) pluſ etiam, ſine noxa hauſerit. Non eſt autem vt ideo diuerſum Græcorum Scammonium ab Arabum eſſe credamus, quemadmodum Symphorianuſ Campegiuſ in *horto ſuo Gallico, libello ex pluribuſ antea ab ipſo editiſ congeſto*, leuibuſ & nulliſ momenti argu- mentiſ perſuadere nititur. Quemadmodum enim Dioſcorideſ ceteriſ quod ex Myſia Aſiæ deſportatur, & Plinuſ Colophoniuſ atque Prieneſe præpoſuit, ita Meſue Antiochenum. Denique vt illi Iudaicum & Syriacum damnant, ita hic Coraſcenum. Nemo autem eſt, qui neſciat Colophonē, Prienen, Antiochamq; conterminaſ eſſe regione. Colophon enim Ioniz, Priene vero & Antiochia Cariz ciuitateſ, *Ptolameo lib. 5. cap. 2. tab. 1. Aſia teſte*, exſiſtunt. Coraſceni autem quantum ex Serapione colligere licet, nihil aliud eſt quam Syria, ita vt dubium non ſit tam Græciſ quam Arabes vtrū- que cognouiſſe Scammoniuſ. Conueniunt quoq; in hoc vtriq; auctoreſ, quod plantæ vnde Scammoniuſ extrahitur, eadem folia aſſignant Dioſcorideſ namq; hederacca

Scammonium Græcorum ab Arabum Scammonio non eſſe diuerſum contra Symphorianuſ Campegiuſ. Colophon, Priene, Antiochia.

Manardus
ab iniuria
vindictatur.

Campegii
error.

Polipodii
pondus.
Euphorbii
pondus.

& triangularia, Mesue vero instar sagittæ alata. Quis est vero qui nesciat hederæ folia angulosa esse, & sagittæ eius cuius Mesue meminit formam habere? Huc accedit quod Serapio in descriptione Scammoniz Dioscoridis & Galeni de Scammonia verba citet, quod nunquam facturum erat, si Arabum a Græcorum diuersa fuisset Scammonia. Sunt & alia multa quæ vtrisque descriptionibus collatis, quadrare videntur. Proinde non erat cur Manardum atque me ignorantia in simularet Campegius, neque enim verum est quod ille scribit, Scammoniam Arabum esse de genere peculiari lactariorum, & de ea Græcos nihil scripsisse, sed tantum de ea quod in Colophone nascitur: nam, ut iam diximus, Scammoniam Syriacam, quæ lacte Tithymalorum adulteratur, tam Græci quam Arabes cognouerunt: & ad hanc certe pondus Mesues referendum erit, nā Antiochena seu Asiatica maiori quantitate deuorari potest. Quod verum B esse testatur Auicenna, qui cap. 636. Can. 2. ita scriptum reliquit: Scammonia in regionibus diuersificatur, ita enim eius interpres loquitur: adeo quod ego viderim in quibusdam Medicorum libris exhibitionem eius plurium ponderis. Quibus sane verbis Auicenna significare voluit Scammoniam in diuersis regionibus nunc validioribus, nunc vero infirmioribus virib. nasci. Non est igitur quod ob vires vehementiores, aut imbecilliores genus, sed duntaxat pondus mutet. Errat ergo potius Campegius, quod Scammonium in Colophone tantum nasci putat, cum in Myfia Asia, Priene & Antiochia etiam nascatur. Hactenus de Scammonio. Porro Polypodii dosim scribit Mesue esse vsque ad aureos quatuor: at satis constat vnciam integram parum purgare, id quod multa confutatione non eget. De Euphorbio vero, ex Dioscorid. auctoritate, C scribit eiusdem aureum vnum sumtum interficere. Quo siquidem in loco, ut alias sapissime, in Mesue requiritur fides: neque enim vsquam hoc ipsum Dioscoridem scripsisse legimus. Imo Paulus Ægineta lib. 7. cap. 4. Euphorbii drachmam vnam cum melle decocto potam, pituitam quidem, impenitus vero aquas, educere docet. Serapion vero & Auicenna cap. 236. sec. Canon. non vnum aureum, sed drachmas tres interficere dicunt. Idem quoque Auicenna Fen. 1. cap. 3. tract. 5. cap. 7. de curatione incubi, drachmæ vni Euphorbii, Scammonii drachmæ 3. partem, & quartam colocynthidos addere præcipit. Quod non ideo dixisse putent studiosi, quasi tantam quantitatem exhibendam esse suadeam, sed ut haberent veritatis cultores, si quando necessitate ita urgente Mesues præscriptum excesserint, quod impudentibus calumniatoribus obtruderent. D

Centaurium maius Mesuen, Auicennam in hoc ut plerisque, aliis secutum, præter antiquorum exemplum, cum minore confundere ac vires vtriusque indiscriminatim commiscere: minus quoque non sine magnò errore, maiori præferre.

C A P. XL

Mesue de
Centauria
sententia.

MAIVS Centaurium confundere Mesuen cum minore, non aliunde certius nisi ex eiusdem verbis sciri potest, quæ in libro suo simplicium medicamentorum in hunc modum scribit: Centauria alia maior, alia minor, inter quas distinguuntur proprietates notæ. Minor melior est in omni re, cuius flores & crura habent colorem citrinum palearem, & melior pars planta sunt flores & semina ipsius. Et melius tempus collectionis eius est principium æstatis. Calida complexionis & sicca in secundo est, & est composita ex partibus terreis adustis, in parte dantibus ei amaritudinem, & ex non adustis cum permixtione aquositate, a quibus inest ei stypticitas. Et est in ea de dulcedine aliquid a partibus acris. Et in ipsa est ex acredine aliquid a partibus igneis. Et amaritudo in ea plus est stypticitate ipsius, & stypticitas plus dulcedine & acredine, & acredo in ipso est remissa sine mordicatione. Quare est ex maxime curantibus vulnera. Imo ipsa est abstersiva, exsiccatiua, consumptiua superfluitatum, & solutiua ventris. Et quando superfluit purgatio, ex ea solutione educit sanguinem: aperit enim orificia venarum, apertione sanguinem manare faciente. Hactenus Mesues verba recensuimus, quæ ex cap. 102. secundi Can. Auic. esse desumpta intelliget quisquis capita hæc inter se conferre voluerit. Vtrunque autem in Auicennam & Mesuen Centaurium maius cum minori confudisse, ex iam adductis verbis monstrabimus. Neque obstat, quod primo vterque idem in maius atque minus diuidit, mox enim obliti diuisionis, vtriusque proprietates atque vires indiscriminatim miscant, horumque historiam confusissime tractant, id quod ex sequentibus euidentissimū erit. Nam ut omnia ordine excutiamus, falsum est quod vterque minus Centaurium maiori prætulit: id enim præter antiquorum auctorum exemplum eos fecisse constat, qui cuique suas

Centaurii
minus ma-
iori non
præfere-
dum.

A suas vires seorsim tribuerunt, nec vnum alteri prætulerunt, alia enim in re vtraque melior. In eo tamen minus a maiori vincitur; quod minoris radix Dioscoridi & Galeno auctoribus plane inutilis sit, id quod apertis verbis vterque monstrauit. Dioscoridis iis *ρίζα ἀχρεῖα*: Galenus illis, *κατὰ φύσιν τὸ μικρὸν μὴ ἢ ῥίζα κατὰ φύσιν ἀχρεῖα*. hoc est: *Centaurei minoris radix plane inefficax est*. Et Plinius lib. 25. cap. 6. *Centaureum*, inquit, *minus radice tenui & superuacanea*. Nec dissensit Paulus: qui lib. 7. ita scribit: *Centaurei minoris radix ignaua plane & inefficax est*. Adeo vt insigniter eirent, qui minoris radicem vsui Medico hodie accommodent. Falsum quoque est, quod ait Mesue, *flores Centaurei minoris habere colorem citrinum & palearem*: vt enim res ipsa & Dioscorides testatur, flores eius colorem in puniceo purpureum referunt, talisque plane, quod ad formam suam attineret, flos est, qualis *Lychnidis*. Denique veritate carere videtur, quod vterque in principio ætatis legendas esse herbas scribit, quum Dioscor. auctore, minus Centaureum non nisi semine prægnans legendum sit, quod certe in ætatis principio fieri non potest. Hinc est, quod Plinius in autumnum colligi velit. Ceterum confundunt deinceps vtriusque qualitates: nam quod inesse Centaureo amaritudinem & stypticitatem scribunt, hoc de minori intelligendum venit. Testis Galenus, qui de eo, lib. 7. de simplicium medicamentorum facultat. ita tradit: *κατὰ φύσιν αὐτῆς ἡ πικρὰ πύξις ἐλγυρὶς ἐν ψύχεις μετρίως*. quod est: *Vincit in eo qualitas amara, paululum habens & adstrictionis*. Dioscorides quoque radicem *κατὰ φύσιν πικρὰν* ait, Hinc est, vt propter amaritudinem aliqui *Fel terra* dixerint: quod indicat Plinius loco iam citato, inquit: *Hoc Centaureum nostri Fel terra vocant*, propter amaritudinem summam. Quod vero paulo post Mesue & Auicenna scribunt, *Centaureo inesse dulcedinem cum acredine, hoc ad maius tantum referendum erit*. Testis iterum Galenus vbi supra, ita scribens: *κατὰ φύσιν τὸ μέγαλον ἢ ῥίζα κατὰ φύσιν ἔχει δριμύτητα πικρὰν καὶ σφόδρα φέρονται μετρίως* *δριμύτης γλυκύτης*, id est: *Centaurei magni radix gustu quidem acris simul adstringensque apparet cum leuicula dulcedine*. Et Dioscor. lib. 3. cap. 7. in hunc modum de Centaureo maiori loquens: *ρίζα παχύη, σπῆρα, βαρύν, ἔχει πικρὸς δύστη γυλῶ, δριμύτης μετὰ πύξις σφύρις καὶ γλυκύπυξις*, hoc est: *Radix illi densa, solida, grauis, longitudine ad bina cubita, succo plena, acris cum adstrictione aliqua & dulcedine*. Plinius quoque loco antea citato: *Radix*, inquit, *vasa, rubescens, tenera, fragilisque, ad bina cubita, madida succo, amara cum quadam dulcedine*. Porro quod sequitur in contextu Mesue, *In ea est acredo remissa sine mordicatione*, de minori intelligendum est:

Minoris est
centaurii radix
inutilis.

Quando
colligendum
Centaurei.

Fel terra
Centaurei
cur dicitur.

C propter amaritudinem summam. Quod vero paulo post Mesue & Auicenna scribunt, *Centaureo inesse dulcedinem cum acredine, hoc ad maius tantum referendum erit*. Testis iterum Galenus vbi supra, ita scribens: *κατὰ φύσιν τὸ μέγαλον ἢ ῥίζα κατὰ φύσιν ἔχει δριμύτητα πικρὰν καὶ σφόδρα φέρονται μετρίως* *δριμύτης γλυκύτης*, id est: *Centaurei magni radix gustu quidem acris simul adstringensque apparet cum leuicula dulcedine*. Et Dioscor. lib. 3. cap. 7. in hunc modum de Centaureo maiori loquens: *ρίζα παχύη, σπῆρα, βαρύν, ἔχει πικρὸς δύστη γυλῶ, δριμύτης μετὰ πύξις σφύρις καὶ γλυκύπυξις*, hoc est: *Radix illi densa, solida, grauis, longitudine ad bina cubita, succo plena, acris cum adstrictione aliqua & dulcedine*. Plinius quoque loco antea citato: *Radix*, inquit, *vasa, rubescens, tenera, fragilisque, ad bina cubita, madida succo, amara cum quadam dulcedine*. Porro quod sequitur in contextu Mesue, *In ea est acredo remissa sine mordicatione*, de minori intelligendum est:

D hoc enim, Galeno auctore, *φαρμακὸν ἀντὶ δέξης*, id est: *medicamentum expers mordicationis est*. Sed cum ait, *est ex maxime curantibus vulnera*, id minori adaptandum erit Centaureo. Hæc enim herba, Dioscor. referre, *κατὰ φύσιν χλωρὴ καὶ κατὰ πλάτος μὲν τετυμμένη ἐν κρηματῇ, ἀνὰ σφύρις ἐλκεὶς παλαιὰς ἐν δαπνὶ ὠκείᾳ*, quod est: *Virens adhuc tusa & illita vulnera conglutinat, vetera quoque vulnera & purgat, & cicatrice obducit*. Et ad minus esse referendum clarius indicat Galenus: ita scribens: *τὰ μέγιστα τραύματα καὶ δάκτυλα καὶ ἄλλα τὰ ἐν τῇ αἰσθητικῇ καὶ πύξις αὐτῆς ἐν σφύρις καὶ τὰ παλαιὰ δὲ, καὶ δυνάμει* *κατὰ φύσιν ἐκτετακται καὶ τὴν αὐτὴν τὴν χλωρίαν*, id est: *Vlcera magna herba ipsius recens illita conglutinantur, & vetusta, quæque agre ad cicatricem perducere queunt, cicatrice eodem modo vntibus obducuntur*. Quod vero tandem subiicit Mesue, imo ipsa est absterfua, exsiccatiua, consumptiua superfluitatum, & solutiua ventris, iterum minori Centaureo v-

E teres tribuunt, nam de eo ita Dioscorides scribit, *ἀφ' ἑαυτοῦ καὶ κατὰ φύσιν μὲν ἔχει κατὰ φύσιν καὶ παχύη*, id est: *Si decocta deuoretur, per aluum biliosa & crassa ducit*. Id quod & Galenus facit, inquit: *τὸ δ' ἀφ' ἑαυτοῦ τῆς πύξης ἵνα πύξις ἰσχυρὰ καὶ αἵμα καὶ χολὰ καὶ τὴν καὶ παχύη, καὶ τὸ κατὰ φύσιν ἵνα πύξις*. hoc est: *Decoctum herba quidam Ischiadicis infundunt; cū biliosa & crassa ducens, nam & talia purgat*. Paulus quoque lib. 7. *Decoctum* ait, *herba ischiadicis iniectum, biliosa quadam educit*. Et in cap. 4. eiusdem libri: *Centaureum minus*, inquit, *quoniam bilem crassaque purgat, coxendice laborantibus peculiariter succurrit*. Sequitur in Mesue: *Et quando superfluit purgatio, ex ea solutione educit sanguinem*. Aperit enim orificia venarum, apertione sanguinem manare faciente. Quod sane iudem de minori Centaureo inaudiendum erit, nam de eo sic tradit Dioscor. *ἐκτετακται τὸ ἀφ' ἑαυτοῦ αὐτῆς ἐν τῇ ἰσχυρὰ καὶ αἵμα καὶ χολὰ καὶ τὴν καὶ παχύη, καὶ τὸ κατὰ φύσιν ἵνα πύξις*, quod est: *Decoctum eius*

F ischiadicis conuenientissime infunditur, sanguinem educens, doloremque leuans. Et Galenus: *ἐκ δὲ* *ἐστὶν διεγέρσις σφύρις ὡς αἰμὴ ἐκ τῆς καὶ, ὡφελὲς μάλα*. hoc est: *Quum adeo vehementer operabitur ut cruenta euacuet, tunc plus proderit*. Paulus quoque de eodem ita scribit: *Nonnunquam vero tam violenter operatur, ut & sanguinem euacuet, atq; tū quidē magis proderit*. Animaduertendū autem, Centaureiū sanguinolenta educere, nō quia ex propria natura seu natura, quadam

Centaurei
minus san-
guinem e-
ducere po-
test.
Centaurei
qua ratio-
ne sangui-
nem edu-
cat.

proprietate venas aperiat, sed ut quodlibet aliud facit, dum violentius operatur: acrimonie enim atque mordacitatis, ut antea diximus, expers est, quam adesse oportet iis quae venas aperiuunt. Utinam vero Mesue tam oculatus in aloë, quam hic in Centauryo fuisset: nam etsi ille indiscriminatim de maiore ac minore Centauryo scribens, maioris acrimoniam in minus quoque transferre videatur, non usque adeo tamen in illo, sicut in aloë excutit, ut scilicet educere sanguinem aut aperire venas simpliciter, sed cum superflue purgat, dicat: Quod si itaque hæc de aloë eius quoque fuisset sententia, non erat cura nobis reprehenderetur. Insuper in recensendis Centauryi viribus mirum in modum utriusque facultates confundit Mesue, id quod ex iam dictis, & ex veterum collatione quivis deprehendet. Et si cui ingenium ista conferendi deest, is Manardi margineas in hunc auctorem annotationes adeat, & quod asserimus, verissimum esse comperiet. Proinde nihil apertius, quam Mesuem utriusque Centauryi & historiam & facultates confudisse, ita tamen ut nemo, licet oculatissimus sit, eas citra veterum collationem discernere, & cuilibet suas adaptare queat. Horum denique confusio effecit, ut hodie Centauryum maius omnibus incognitum sit, atque adeo in officinis, solius minoris usus existat, ut hoc saltem nomine suspecta nobis Arabum Medicorum lectio esse debeat, quod horum inscitia multarum herbarum, maxime earum quae in quotidiano Medicorum usu sunt, cognitio interciderit. Sed faxine superi, ut vel tandem sero cum Phrygibus sapiamus.

Centauryi
malus ho-
die omni-
bus inco-
gnitum.

Arabes ferme omnes, non sine magna inscitia nota, Armenium lapidem cum Cyaneo, quem Lazuli vulgo vocant, confundere.

C A P. XII.

Armenius
lapis.

Caruleus
lapis.
Facultates
lazuli lapi-
dis ex Ara-
bum senten-
tia.

Q UEM lapidem Plin. alique Latini *Armenium*, Gal. autem *Armeniacum*, hunc Arabes barbarique *Armenum* vocant. Et quæ hi, maxime Serapio *lazulum*, Græci *cyantum*, Theophrastus *cyaneum*, Latini *caruleum* appellant. Hos autem confundere Arabes, eorundem de iis verba satis monstrabunt. Inter hoc enim princeps Auic. cap. 57. secunda Can. ita de lapide lazuli scribit: *Virtus eius est, sicut virtus eius, quæ adhaeret aurum, debilius parum est.* Et Serapion: *Virtus eius est similis virtuti glutinis auri, nisi quia ipse est debilius eo, quæ tamen veteres non de lazula seu cyaneo lapide, sed de armenio potius scribunt.* Dioscorides namque lib. 3. cap. 59. ita de armenio dicto lapide tradit: *τὸ αὐτὸ τοῦ τῆ χρυσολῆς, ἀλλὰ τὸν ἀρμένιον λίθον λέγουσιν αὐτῆς, id est: Eadem quæ chrysocolle præstat, viribus tamen ea infirmior.* Id quod & Plin. lib. 55. cap. 6. facit, inquit: *Armenia mittit, quod eius nomine appellatur: lapis hic quoque chrysocolle modo operatur.* Sequitur de lapide lazuli in Auicenn. *Inest ei virtus eradicativa, putrefactiva, & abstersio eius cum acuitate & stypticitate pauca.* Quem imitatus Abenrois ait: *Minuit humores calidos, eo quod abstergit, & cum eadem habet stypticitatem.* Et Mesue: *In ipso, inquit, est acuitas non vacuata stypticitate aliqua, quæ itidem debentur armenio lapidi.* Galen. lib. 9. de simpl. med. facult. teste, ubi ita scribit: *ἡ ἀρμενία δὲ διὰ τὴν ἰσχυρίαν αὐτῆς βεβαία ἐστὶν ἐν τῇ ἀκρίμονίᾳ, & ἐν τῇ στυπτικότητι, quod est: Armeniacum vim habet extergentem cum lenicula acrimonia, & levisima adstrictione.* Confirmat idem Paulus libro 7. ita scribens: *Armeniacum abster- gendi virtute cum levi acrimonia, & exigua adstrictione præditum est.* Pergit Auicenna in lazuli viribus enarrandis, dicens: *Bonos efficit pilos palpebrarum, & prolongat eos, & est ultimum, sicut dicitur in illo, propter proprietatem, quæ est in ipso, & dicitur propterea, quia ipsum euacuat humores malos, prohibentes oriri pilos.* Mesue: *Conseruat & prolongat pilos, & generat eos in palpebris.* Serapion: *Facit nasci pilos in palpebris.* Abenrois: *Pulverisatus super palpebras, facit nasci pilos.* Et iterum: *Ideo facit oriri pilos, quia remouet humores calidos, & reducit membrum ad pristinam complexionem.* Quæ nimirum vis non lapidi lazuli seu cyaneo, sed Armenio a probatis scriptoribus tribuitur. Dioscorides namque ita de illo scribit: *τὸν δὲ ἐν τῇ ἐν τῇ βλεφάρῳ τοῦ αὐτοῦ, hoc est, facit ad pilos in palpebris alendos.* Et Galenus subscribit Dioscor. in hunc modum: *αὐτὸ δὲ καὶ αὐτὸ λεγόμενον ἐν χρυσολῆς ἰσχυρίαν ἔχει καὶ πρὸς αὐτῇ τὴν ἐν τῇ βλεφάρῳ τοῦ αὐτοῦ ὑποδριμνίαν, ὡς καὶ ἐν τῇ ἀκρίμονίᾳ αὐτῇ, τοῖς δὲ αὐτοῖς, & ἀπὸ τῶν ἰσχυρίαν τοῖς δὲ δριμύτητος πύκνους ἐν τῇ δριμύτητος οἷς τὴν ὑπὸ φόνιν ἐν τῇ ἐν τῇ μίαν, quod est: Ipso per sese ad pollinis leuorem redacto, utuntur sicco ad pilorum in palpebris incrementum, nempe ubi præ humorum acrimonia partim excidunt, partim vero nec crescunt nec aluntur. Siquidem de partibus his acrimoniis, in bonum natura habitum pars reducitur.* Et paulus inquit: *Prodest isidem ad pilorum in palpebris incre-*

incre-

- A** *incrementum*. Ceterum quod Auicenna tandem lapidi lazuli inesse vim eradicationem & putrefactionem scribit, id ceteri etiā Arabes eum sequētes faciūt. Mesue enim adustiuū, vlcerauium, putrefactiuum, & incisiuum lapidem hunc esse ait. Serapio vero, habere virtutem adustiuam & putrefactiuam inquit. Et in hoc probe scribunt, nam & ea facultas peculiaris est huic lapidi, qui Arabibus *lazuli*, Græcis vero *cyaneus* dicitur, ideoq; veteribus etiam cognita. De eo enim Dioscorides libro 5. cap. 60. in hunc scribit modum: *κυανὸς λίθαιος ἔχει κατακαλιτικὴν, καὶ μετεώριον σπυλιαν, ἐστὶ χαρσινὴν τε καὶ ἰαχουμανίαν*. Id est, *cyaneus vim habet reprimentem, mediocriter putrefacientem, crustas gignentem, & exulcerantē*. Vnde luce meridiana clarius fit, Auicennā & Arabes alios indiscriminatim de vtroq; scripsisse lapide, eorumq; facultates mirum in modum confudisse. Et nisi id ipsum fateantur aduersarii,
- B** Auicennam Arabesq; ceteros in grandius erratum incidisse conuincemus, nimirum q; in vno eodemq; capite sibi pugnancia scripserint. Si namque de vno tantum lapide tractant, quomodo conueniunt, hunc simul habere facultatem detrahendi & alendi pilos? facultate enim detractrice nullo pacto alit & producit pilos, sed eosdem magis detrahitis & radicitus extirpat. Præterea, vt & hoc obiter moneam, si lapis lazulus seu cyaneus vim putrefacientem & exulcerantem habet, quemadmodum vno ore omnes tam Græci q; Arabes fatentur, quo pacto ab exitiali sese rursus errore tuebuntur Arabes, qui ad purgandam atram bilem hunc lapidem deuorandum esse docent? Et sunt hodie non pauci, qui hos imitantes illum hoc nomine, fere quotidie deglutendum præbeant. Nullius autem veterum auctoritate sese tueri possunt, quando nemo ex Græcis veteribus auctoribus lapidem cyaneum bilis atræ purgandæ gratia deuorari docuerit. Neq; Arabum ea in re iussu potest auctoritas, quando sole clarius fit, hos duorum inter se lapidum proprietates ac facultates miscuisse. Sed nec rationem illis suffragantem habent, cum euidentissimum sit, medicamenta putrefacientem & exulcerantem vim habentia, qualem cyaneus lapis obtinet, sine magno nocumento deuorari non posse. Id quod Galenus lib. 3. de simpl. medic. facult. cap. 20. & sequenti, multis ostēdit, docetque medicamenta, quæ erodendo & putrefaciendo nos necant, genere, non qualitate, deleteria esse dicta: & quanto diutius in corpore morantur, tanto magis agere nata esse. Atqui dicit quispiam, fateor cyaneum non lotum erosione non vacare, quod si tamen bene abluatur, multum iuuat, & vel nihil, vel parum ledit. Huic respondemus, nos quidem fateri, quod cyaneus
- C** lotus multum noxiæ facultatis amittat, decebat tamen Arabes, vt id diserte suis in scriptis indicarent. Tamen cum illi, maxime Serapio & Mesue, expressis verbis non lotum, hanc facultatem sine noxia purgandi facultatem tribuant, non est, cur se ab errore vindicare possint. Huc accedit, quod per ablutionem vniuersa malicia vix remoueatur. Quum enim putrefacientem simul vim cyaneus lapis obtineat, difficile est vt illam crebra lotionem prorsus abigere queas. Proinde, etiam si bene abluatur, tamen putrefacientem vim omnem vix eximes. Proinde consultius erit, si atræ bili expurgandæ armenium potius lapidem, & hunc quidem præparatum, & sæpius ablutum, adhibuerint, nam is sine omni molestia per inferna illam purgare potest. Testis est Alexander Trallianus libro primo cap. 22. in hunc modum scribens: *Νοβίς σάνη ηelleborὺν ἄλβον ἀρμενίους λίθος βο-
νιτάτε πρæcedere videtur, si ex eo conficiatur vt debet potio. Quod utiq; præsidium nostra ætate nuper admodum compertum est: quapropter a veteribus medicis minus celebratum, sed a nobis & alijs compluribus feliciter usurpatum, hellebori usum propter discrimen antiquauit. Lapidem vero armenium, qui viribus, sat scio, helleboro non cedit, quoniam omni vacat periculo & molestia caret, non iniuria prætulimus. Habes autem is, non tam per inferna, quam per superna, vim purgandi minime vulgarem. Ad quem usum etiam illotus adhiberi debet. Exhibendi autem sunt iuxta dosi plus minus, pro robore quidem languentis, scrupuli terni aut quaterni. Hactenus Alexander. Itaque caueant posthac studiosi, ne Arabibus nimium fidant, neve lazulum lapidem illotum, deuorandum facile nisi robustissimis exhibeant, cum alias satis magna medicamento-
rum meliorum atram bilem purgantium copia præsto sit. Quod si tamen omnino morbo id postulante, & virium robore suadente, hunc propinare quis ægro voluerit, non nisi bene & sæpius, nempe duodecies, Tralliano teste, lotum exhibear hortor. Hinc est, quod in catapotis suis ex iam dictis lapidibus compositis, non nisi lotos hodie vsurpent Medici.*

Immensus
Arabum
error.

Lapis cyaneus ad purgandam atram bilem minime dandus.

Obiectio.

Responsio.

Ablutio lapidis cyanei non omnem malitiam auferit.

Armenius lapis per inferna purgare atram bilem potest.

In describendis Cicuta & Napello herbis non solum ancipitem fuisse, sed & earundem vires misceisse Auicenn. ita ut verisimile admodum sit, illum utramque ignorasse.

C. A. P. XIII.

Auicenna
minime
medicina
princeps.

Auicenna
regulas
fuit.

Sucaram
quid
Cicuta.

HAtenus Mesues recensendis erratis occupati iam ad Auicennæ, quem hodie, si diis placet, vniuersæ medicinæ principem statuunt, errores nonnullos indicados stylum vertamus, ut ex iis saltem paucis quid in ceteris fidendum sit homini, intelligat, deprehendantque quantis in tenebris versentur, qui singula eius hominis scripta absque omni delectu, quasi ex veritatis sacrario pronuntiata excipiunt. Nihil autem mirum illum tam frequenter lapsum esse, quum aliorum tantum, ut omnes fere Arabes, transcriptor fuerit: adde, quod eorum, quæ scripsit nullam habuerit experientiam, regem enim fuisse constat, qui curandis ægrotis operam non dedit. Sed ut hominis in rebus medicis ignorantiam demonstramus, ad institutum redeûtes, quam ambigue, quamque confuse de cicuta & napello scripserit, videamus. Primum autem omnium sciendum *sucaram* Arabibus eam esse herbam, quam Latini *cicutam*, Græci vero κώνιον appellant, id quod præter Sera, vtriusque descriptio pulcre monstrat. Auic. namque cap. 671. 2. Canon. *sucaram* ita depingit: *Crus, inquit, huius planta est, sicut crus ferula, & habet florem album, & semen sicut anisum.* Dioscorides autem lib. 4. cap. 73. in hunc modum: κώνιον καλὸν ἀνισὶ ῥοιτῶν, ὡς μάδαρον μάγαν, φύλλα δὲ γάρθηκι ἐμφερέει, σκυώτερα δὲ καὶ βαρύτερα, ἐπὶ αἰσῶν δὲ ἀπὸ φύσος καὶ σπινθιάδων, αὐτὸ δὲ ὑπόλευκον, σπέρμα ἐμφερέει ἀνισὶ καὶ λευκότερον. id est: *Cicuta caulem geniculatum profert, fæniculi modo grandem: folia ferula similia, angustiora tamen & grauius odorata: in cacuminibus adnascentes ramulos & umbellas habet. Florem subcandidum, semen aniso simile, sed candidius.* Ex quibus sane descriptionibus collatis nemo non vider, *sucaram* eandem cum *cicuta* herbam esse. Atqui Auicenna tanquam sibi parum constans, mox in eodem capite *sucaram* folia cucumeris, aut mandragoræ habere tradit, dicique a quibusdam *euphorbium* inquit. Fen. quoque 6. Can. 4. tract. 2. sum. tert. cap. 6. *cicutam* esse *hyoscyamum nigrum* ait, id quod manifestum fiet, si ea signa, quæ ab Auicenna tribuuntur ei, qui *hyoscyamum nigrum* hausit, cum iis, quæ ab Diosc. adaptantur, his, qui *cicutam* biberunt, contrulerimus. Neque remedia, quæ in *cicutæ* potione laudat Dioscorides, alia sunt ab his, quæ contra *hyoscyamum nigrum* Auicenna tradit. Auicennæ verba hæc sunt: *accidunt ex eo praefocatio & friguse extremitatum, & tensio vehemens praefocans, & tenebrositas visus, & forsitan non videt aliquid, & destruit imaginationem, & infrigidat extrema, deinde conuellit, & praefocat, & interficit.* Cura: *Administra in primis clysteres, & vomitum, & ventris solutionem, deinde da in potu de vino puro aliquid, post aliquid quoniam est magni iuuamenti cum eo quod bibit & absinthium, & detur in potu piper cum vino similiter castoreum & ruta.* &c. Quæ singula Diosc. lib. 6. cap. 11. *cicutæ* tribuit, in hunc modum scribens: κώνιον ποτὴν ἐπιφέρει σωτώματα καὶ ἀγλύνει ὥς τι μὴ δὲ ἐπὶ δόλῳ βλάψαν λυγρόν τε καὶ διανοίας παραφορὰν, καὶ ὑψὲν αἰσῶν. ἐπὶ τέλει δὲ σπώμενοι πνίγονται, σάπην λαμβάνουσι καὶ τὸ κατὰ τὴν ἀσπληνίαν πνεύματι. κατὰ κράτος μὲν οὖν, ὡς καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων διατῶν ἐμέτων αὐτὸ κομιούμεθα. ἐπὶ ταῖς κατὰ ματι χρησίμους τὸ εἰς τὸ ἐν τέρα παραλοισθηκὸς ἐκκινῶμεν, καὶ τότε ὡς ἐπὶ μέσων βοήθημα ἐπὶ τὴν ἀνταποποίησιν παραχρῆμα δίδοντες μετὰ δὲ διάσμμα, ἐκ τῆς πικρῆς δίδμενον βοηθεῖ γὰρ αὐτὸν ἢ ἀλίνειον μετὰ πεπέρειας, καὶ οἶνον καὶ καστορέου καὶ πηγάρι. quod est: *Cicuta pota vertigines, oculisq. caliginem affert, ita ut nec parum etiam videre liceat: singulum itidem, mentis alienationem, & extremarum corporis partium refrigerationem: postremo conuulsi strangulantur, suppresso in arteriis spiritu.* Inter initia itaque, ut in reliquis, vomitionibus eam excutiemus: dehinc vacuatione usi, quod ad intestina prolapsum est excernamus: iam veluti ad efficacissimum remedium meracas vini potiones deueniemus, dantes per intervalla, in quibus asininum lac potui datum, aut absinthium cum pipere, vino, castoreo, & ruta proderit. Quæ certe omnia satis indicant, quam ambiguus in depingenda *cicuta* fuerit Auicenna. Sed non minus quam *cicutam* ignorasse Auicennam *Napellum*, hinc colligere licet, quod hunc haud aliter quam illam diuersis non modo nominibus, sed & descriptionibus notificauerit. Fen. p. sexta, Can. quarti, tractatu primo, cap. 2. *Napellum* sub *Alfarfas* nomine venenū esse scribit, quod interficit hominē, non a. interficiens turdos. Et cap. 503. Canonis secundi, coturnices ex eo cibari, & minime mori ait. Quod certe Galeno lib. 3. de simpl. med. facul. ca. 17. teste, non *Napello* & *Turdis*, sed *Cicutæ* & *Sturnis* adscribendū erit. Verba Galeni, quib. hoc ipsū docet, hæc sunt: τὸ κώνιον ἀνθρώπον μὲν ἀναρεῖ τῇ τε τῶν ποσῶν ἐνστάτι, καὶ τῆς πλήθους τῶν θερμότητος, καὶ τῇ ῥύμνι τῶν ἀρτηριῶν ὅλην ἰσχυρόν ἐστι πρὸς τὴν καρδίαν ἀρκινούμενον. καὶ ἀναρεῖ δὲ

Napellus
Auicenna.

- A** τὴν φάρμακον ἐπὶ τοῖς ἐναντίοις αἰσίοις ἐπεχόμενον τε καὶ βραδύνον, καὶ φάρμακον ἐν τῷ χρόνῳ προπύλαιον καὶ ἀποπαρὰν ἐν ἀ-
 ζαρματῶν ἐστὶν αἰσίοις πρὸ τῆς ἀρδίας φαρμακείας ὡς ἐξω τὸ ἔλκον. quod est: *Hominem quidem Cicuta ne-*
cat, tum ob meatuum amplitudinem, calorisq; multitudinem, tum ob attractionis arteriarum robur
validum etiamnum ad cor pertingens. Sturnos vero ob causas contrarias haud interficit, ut puta
quum & retineatur & cunctetur, ac sese temporis tractu concoqui prepararique a corde tanquam a
foco incalescens sinat, non secus ac ligna extrinsecus. Idem etiam testatur libro 3. de temper. dicēs:
 τὸ κύνιον τῷ φάρμακον μὴ τροφῇ, φάρμακον δ' ἀνθρώπου, id est: *Cicuta sturno nutrimentum est, homini vene-*
num. Et Alex. Aphrodisius in proæmio suorum problematū inquiens: Cicuta sturni vescuntur,
qua toxica hominibus esse certum est. Vnde manifestissimū fit, ignorasse Napellū Auicennā,
 quod id sc. huic tribuat, quod veterū auctoritate Cicuta potius debet. Sed ut rem aper-
B tius videant aduersarii, nonne Auic. loco antea citato ex Galeni sententia refert, quæ
 ibidem de Napello scribit? Maxime sane: sed de Cicuta esse intelligendum, iam ex Ga-
 leni verbis demonstraui, ita ut euidentissimū sit, Napellum Auicennæ a cicuta
 Galeni non differre. Id verum esse, historia etiā illa, quam de Napello ibidem narrat
 Auicenna, pulcre indicat. *Fuit quædam anus, inquit, suscipiens in principio rei de Napello rem*
paruam, deinde non cessauit uti eo, donec assuefacta est eo natura, & audacter usa est eo, & nihil no-
cuit ei. Haftenus ex Galeni sententia Auicenna: eandem enim historiā refert Gal. lib. 3.
de simpl. med. facul. ca. 17. in hunc modū scribēs: κατὰ τὸν αἰσὶν οἶμαι τρέπον καὶ τὸ κύνιον ἀνθρώπου μὴ
 ἀναίρει τὸ φάρμακον, φάρμακον δ' ἀνθρώπου ἀναίρει καὶ οὐκ ἀνθρώπου ἀνδρῶν ληθῆναι. καὶ τὸτο καὶ ἡ ἀπὸ τῆς φαρμάκης ἐ-
 δειξέτω, ὅτι ἀπαρτὶς μνημονεύουσιν. ἀπὸ ἐλαχίστου μὲν ἀρχαίως καὶ νῦν, προλεθούσης δ' ἀλύπτως ἐπὶ πολλῶν & ἰσχυρῶν, ἐξ-
C αέρως μὲν γὰρ ἐκινῆσθαι τὸ βραχὺ δι' αὐτὴν τὰν ὀλιγότητα, τῷ δ' ἐδισμῶ σίμφυλον ἐγένετο. id est: *Ad eundē arbitror*
modum, Cicuta hominem quidem celeritate distributionis interficit, sturnos autem tarditate ipsa
nurit. Quod si vero exiguum quiddam sumatur, mortem homini nequaquam inferet: id quod anus
Athen. experimēto docuit, cuius apud omnes per celebri memoria est. Etenim ea ab exigua Cicuta
portione auspicata, nullo detrimento ad permagnam progressa est copiam: principio enim paucum ex-
iguitate ipsa deuictum est, ac consuetudo naturale reddidit. Vbi rursus perspicuum fit, Napellū
iuxta Auicennæ sententiam a cicuta diuersum non esse. Quanquam ne id dissimulem,
Auicennæ verba paulo ante citata de Veratro siue Elleboro etiam intelligi possunt. Si-
quidem Galenus lib. 3. de temperamentis cap. 5. disertis verbis testatur, Coturnici Elleborum
esse nutrimentum, homini vero medicamentum, ut hoc nomine Auicennæ Napellus idē etiā
 cum Elleboro sit, adeoq; Proteo mutabilior, aut Chymæra. Sed mox alibi mutata sen-
D tentia Napellum eundē cum toxico facit. Signa namq; quæ is *Fen 6. iam citati libri, Sum. 2.*
cap. 1. huic, qui Napellum hausit, tribuit, eadem sunt iis, quæ a Dioscoride traduntur de
illis, qui toxicum biberunt, quemadmodū collatis vtriusq; verbis dilucide patebit. Auic-
cennæ de Napello verba hæc: Napellus est ex deterioribus, & accidis potanti ipsum, ut aposte-
mentur labia ipsius & lingua eius, & frequentes sunt super ipsum vertigo & syncopis, & ex eo raro
evadunt, ex eiusque succo tinguntur sagittæ. Diosc. autem lib 6. capite 20. de toxico illa: τὸ δὲ
τοξικὸν δούκει μὲν ἀνθρώπῳ καὶ τῷ τε τὸ ἐξ αὐτῶν βαρβαρίων καὶ αὐτῷ χεῖρ. παραχολοῦσθαι τοῖς πεποκῶσι χεῖρας καὶ γλῶσ-
σας φλεγμονή, μανία τε ἀνατάχεται, ποικίλας ἐπιβάλλουσιν φαντασίας, ὥς καὶ διὰ τοῦτο δυσπρόσιτοι εἶναι ἐν ταῖς δι-
αγνωσίαις. σπαιότες δὲ καὶ οὐκ ἐκδύναντες τῶν πεποκῶτων. quod est: Toxicum ex eo nominari videtur, quod
E *Barbarorum sagittæ eo illiniebantur. Sequitur potantes labiorum & lingua inflammatio, furorq; in-*
coercitus, varias inducens imagines, ita ut hoc nomine vix sanari possint, raroq; qui hauserunt eva-
dant. Ceterum idem veneni genus paulo post, cap. nimirum 29. corrupto vocabulo Tu-
sompro Toxicon appellat, cuius se quoq; naturam & curationem ignorare dicit, oblitusq;
antea sub Napelli nomine de eo scripserit. Et mirum profecto est, cum illi eisdem tri-
buat effectus, quos paulo supra Napello assignarat, eum veneni huius naturam latuisse.
Atqui solet homo ille passim obliuisci eorum, q̄ antea scripsit, aut postea scripturus erat,
 adeo ut omni cerebro destitutum fuisse hunc ipsum merito quis suspicari queat: namq;
 alias fieri potuisset, ut tam pugnancia nusquam non scriberet? Hic adesse cupio medicos
 mordicus tenentes Auicenn. quo idolum illud suum, in quod ita iurarunt, ut ne latū qui-
F dem digitum ab illo discedendum putent, tueantur, videantq; quam concinno ordine
 vastum illum suum Canonem confuerit. Certe si pleraq; eius hominis loca diligentius
 excusserint, non ordinem & lucem, sed potius confusum chaos, ac tenebras plane Cim-
 merias in hoc Canone inuenient. Argumento erunt Napellum & cicuta, quas nimirū
 plantas, earumque facultates ita confudit, ut nescias quid per vtrasque intellexerit.

Napellus
Auicennæ a
Cicuta non
differt.

Auicenna
Napellum
eundem cū
toxico fa-
cit.

Auicenna
eorum que
scripsit pa-
rū memor
est.

Napellum.

Napellum, lethale homini in cibo aut potu venenum, ad leucem, quam albaram nominat, abigendam, perperam & non sine capitali errore ab Auicenna propinatum esse.

CAP. XIV.

A Vicenna cap. 503. secundi Can. vno eodemq; loco, vt fere solet, sibi pugnancia tradit. Primum enim Napellum esse venenum perniciosum ait, destruens bibentem se. At paulo post veluti oblitus eius, quod antea dixerat, subiungit: *Delet albaras linitum & bibitum.* Non vero sine magno errore docet, Napellum, & presentissimum esse venenū, sui ipsius testimonio constat, in potu deuorandū. Nam etsi quid per Napellum intellexerit Auic. certo sciri non possit, vt præcedenti paradoxo diximus: tamen euidentissimum est, interdum per illum cicutam, interdum etiam toxicum & elleborum nigrum intellexisse, id quod supra abunde satis monstrauius. Siue autem cicutam quis dixerit, siue toxicum, tamen non est vt in potu exhiberi tuto possit. Nam Diosc. libro quarto cap. 73. teste, *κύνιον ἐστὶ καὶ τῶν φαρμακῶν κατὰ φύσιν ἀναρῶν* id est: *Cicuta inter lethalia connumeratur venena, frigidityte enecans.* Hinc est, quod & illam in numero venenorum libro 6. collocet. Plinius etiam lib. 25. cap. 13. hanc inter venena lethifera recenset, dum inquit: Cicuta venenū est, publica Atheniensium pœna inuisa. Quis vero est, qui nesciat, toxicum esse tam lethale venenum, vt si quis sub ea arbore, vnde colligitur, dormiat, aut cibum accipiat, moriatur? Et sane, qui id genus veneni hauerunt, vt supra ex Diosc. auctoritate diximus, raro euadunt: vnde satis liquet, quod bibi non debeat. Sunt autem, qui per Napellum Auic. Aconitum Græcis & Latinis dictum intellexisse velint: quod si verum est, certe fatendum erit, Auicennam de vna eademq; re tanquam diuersa duobus capitibus scripsisse. Fen. enim 6. Can. 4. Sum. 2. tract. 1. cap. 1. de Napello, quod iuxta illorum sententiā Aconitum est, agit: & post cap. 23. de strangulatore adip, id est, lupi, & strangulatore leopardi, nihil ab Aconito differentibus, iterum tractat. Nihil autem differre, primum ex nomine liquet. Vt enim ille duplicem strangulatorem facit, vnum lupi, alterum leopardi: ita Græci duplex Aconitum, vnum quod lupos interficiat *λύκωλον*, alterum vero ab enecandis pardis *παρδαλιαν* vocatum. Dein vtriusque tam notæ, quam curationes, pulcre monstrant, non esse diuersum Aconitum a strangulatore Auicennæ. Nos breuitati cōsules, curationes tantum conferemus. Auicenna vbi supra ita de curatione strangulatoris scribit: *Oportet vt tu properes ad faciendū ipsum vomere cum eis quæ scis. Deinde clysteriza ipsum, & postea da in potu sicut origanum montanum, & prassium, & rutam, & absinthium, aut detur in potu olei balsami drachma vna in vino: & melius vinum est illud, in quo extinctū est ferrum, & argentum, & aurum, &c. nam reliqua quisque conferre poterit.* Dioscoridis vero libro sexto cap. 7. de Aconiti curatione hæc sunt verba: *δι' ἐμέτων ἐκκομιδῆναι δὲ τὸ φάρμακον, ἢ καὶ διὰ κλύσιν κατὰ δυνάμιν τὴν κοιλίαν. χηρσίμεθα προποτισμῶ, δειράνω, ἢ πρᾶσι, ἢ ἀλυσίν, ζέματι μετ' οἶνον ἀλυσίν. ἀμύζει δ' αὐτοῖς καὶ ὀποβαλσαμὸν ὀλίγον & αὖν μέλιτι, ἢ αὐτὸς ὁ σίδηρος, ἢ χρυσός, ἢ ἀργύρος διάπτυσθαι ἐν οἶνῳ σβεδόντα.* hoc est: *Venenum vomitionibus educere, aut clystere per alium deicere oportet. Vtimur inter arcentes potus origano, ruta, marrubio, aut absinthij decocto, cum vino absinthite. Prodest etiam opobalsami drachma cum melle. Item vinum in quo ferrum, aurum, argentum ve candens extinctum fuerit. Quapropter illorum sententiā, qui Napellum Auicennæ eundem cum Aconito esse voluit, vt olim probauimus, ita hodie penitus refutam, cum manifestum sit per Napellum cicutam, aut elleborum nigrum, aut toxicum intellexisse Auicennam. Per Napellum autem Auicennam etiam Elleborum nigrum intellexisse, tomoprino nostro, de stirp. historia commentariorum capite de Aconito, euidentissimis argumentis ostendimus. Manardus etiam in epist. 3. lib. octau medicinalium epistolarum, Napellum esse id, & toxicū vocant Græci, testatur. Sed fac, Napellum esse Aconitum, adhuc tamen in potu nō esse exhibendum, constanter asserimus. Dioscoride namq; li. 4. ca. 71. teste, primum Aconiti genus *κτείνε παρδάλεις καὶ οὐς καὶ λύκους καὶ πάντας θηρίων χρεάσις. ἐν πιδμένον καὶ παραβαλλόμενον*, quod est: *Enecat pardos, fures, lupos, ferasq; omnes carnisbus inspersum, & illis obiectū.* Alterius autem ad venationes luporum vsum esse docet his verbis, *χρῶνται πρὸς τὰς τῶν λύκων θήρας, ἐν πιδέντες χρεάσιν αἰμοῖς, βραβεῖται γὰρ ὑπὸ τῶν λύκων ἀναρῶσιν αὐτούς.* i. *Ad luporum venationes vtuntur radicib. crudis. eas insperantes carnisbus, quæ a lupis deuorata illos enecat.* Si itaq; lupos & pardos fortissimas feras interimunt, cur nō multo magis hominē? Sed neutrum in potu esse sumendū clari⁹ Gal. 6. de sim. med. fac. indicat, ita de 1. genere Aconiti scribens. *ἀκόνιον ἢ παρδαλιαν σπῆλαι καὶ ἐν πιδέντες διὰ δυνάμειν ἐστὶ**

Quid Auic. per Napellum intellexerit.

Strangulator apud Auic. ab Aconito nihil differt.

Napellus non est Aconitum.

Aconitum in potu nō sumendū.

A ὅθεν αὐτὸ πολὺ αἰτιότερον ἐν δόγματι λαβεῖν ἢ πότῳ. πρὸς μὲν τοὺς τὸ ἀποσπῆσαι πρᾶτὴν ἐκ τοῦ σώματος ἢ καὶ δίδαναι ἐπιτήδευον ἐστὶ. hoc est: *Aconitum seu Pardalianches putrefacientis & venenosa facultatis est. Itaque in cibo potuq; fugiendum: attamen ad putrefaciendum quadam extra os & sedem aptum est.* De altero sic: ἀκόνιτον ἢ λυκόκλον ἐστὶ μὲν παραπλησίως βατὴρ δυνάμειος, ἰδιώτερον λύκος ἀναρῶν πείθειται, ὡς παρὰ δάλαις. hoc est. *Aconitum siue Lycostomum similis alteri facultatis est, sed peculiariter lupos interficit, sicut illud pardos.* Galeno subscribit Paulus libro 7. dicens: ἀκόνιτον τὸ μὲν παραδάλια χέει σπληνὸς καὶ δυνάμειος δυνάμειος ἐστίν, ὅθεν αὐτὸ οὐ λητίον. ἔξωθεν μὲν τοὺς ἐπὶ τῶν σπληνῶν δομένους *Carum* χεῖσιν ἀντὶ τῶ. τὸ δὲ λυκόκλον, ἡς αὐτῆς ἐν τῇ πρὸς τὴν δυνάμειος, ἰδίως τοὺς λύκους ἀναρῶν ὡς παρὰ δάλαις. id est: *Aconitum quod Pardalianches cognominatur, putrefacientem & lethalem vim habet, quam ob causam intro non assumendum, foris tamen in carnibus, quas putrefacere oportet, utendum eo.*

B Quod vero *Aconitum Lycostomum* vocatur, eandem cum priore vim habet: peculiariter autem lupos enecat, quemadmodum illud pardos. Plinius quoque libro vigesimo septimo, capite secundo, omnium venenorum ocysimum *Aconitum* esse scribit: nec est præter *Auicennam*, qui ad delendas albaras in potu propinandum *Aconitum* unquam dixerit. Atqui hic aduersatur *Montuus*, *Plinium* obtrudens, qui loco iam citato, *scorpionum icibus aduersari Aconitum in vino calido datum*, inquit. Cui ita responsum velim, me non ignorare *Plinium* ista tradere, idque ex *Theophrasti* auctoritate, qui libro nono de historia plantarum cap. 19. de *Aconito* sub *Thelyphoni* nomine ita scribit: *χρήσιμον δὲ πρὸς σκορπίων πλῆθος πινόμενον.* quod est: *Potum contra scorpionum icibus prodest.* Sed ob id *Aconitum* ad delendas albaras seu leucen esse bibendum, adhuc constanter negamus. Nam si ea natura est *Aconito*, veluti *Plinius* scribit, ut hominem occidat: nisi inuenerit, quod in homine perimat, quomodo in ea vitiliginis specie, quam leucen nominant, in qua certe veneni nihil est, ad potandum propinari potest? In potu itaque datur *Aconitum*, at minime in vitilagine, sed ubi in corpore venenum est, cum quo solo, ut *Plinii* verbis utar, colluctatur, velut pari intus inuento. Sola hæc pugna est, cum venenum in visceribus reperit. Mirumque exitialia per se ambo cum fuerint, duoq; venena in homine commoriantur, ut homo superfit. Quare *Auicennam* suum *Montuus* tueri non potest, quod non sine extremo summentis incommodo *Napellus* ad delendas albaras in potu dari queat. Potuisset itaq; hanc ut alias omnes annotationes suas omisisse, quando parum frugis, utpote frigidissimæ, lectori attulerint.

Montui obiectio refellitur.

Quando *Aconitum* intro assumi potest.

D Radicis *Pentaphylli* succum minime perniciosum, quemadmodum *Auicenna* somniauit, sed potius contra lethalia venena admodum efficacem esse.

CAP. XV.

V Erba *Auicennæ*, quibus radicis *Pentaphylli* succum tanquam exitiosum damnat, habentur cap. 554. secundi Can. ubi in hanc sententiā scribit: *Succus radicis eius est medicina perniciosa.* Errare autem toto cælo *Auic.* cuius constat, qui veterum de hac planta scripta, diligentius excusserit. Nemo enim ex veteribus *Auicennæ* opinioni subscribit, sed huic vno ore omnes reclamant. Etenim *Diosc.* lib. 4. cap. 39. ita de radice *Pentaphylli* tradit: *χυλὸς τῆς ῥίζης ἀπαλὴς ποιεῖ πρὸς τὰ ἐν ἡπατι καὶ πνεύμονι παῖδες καὶ τὰ θανάτῳ. & est. Radicis*

Pentaphylli radicis succus non exitiosus.

E tenera succus contra iocinatoris pulmonisq; affectus & lethalia venena facit. Idem etiam lib. 6. ca. 20. radicem *Pentaphylli* contra toxica efficacem esse, his verbis ostendit: *ἰδίως δ' ἐν αὐτῶν ἀρμύζει καὶ ἡ τῆς πενταφύλλου ῥίζα ὁμοίως λαμβανόμεν.* id est: *Præsertim vero ijs conuenit Pentaphylli radix similiter sumpta.* Loquitur autem de illis, qui toxicum hauserunt. Cui *Paulus* lib. 5. cap. 54. subscribit, inquit: *Peculiariter autem contra toxicum valet Pentaphylli radix eodem modo pota.* *Plin.* quoq; lib. 25. ca. 9. *Pentaphylli* seu quinque folii radicem aduersus venena valere testatur iis verbis: *Aduersus serpentes bibitur eius radix, quæ sparganton vocatur, ex vino albo.* Quæ etiam sequitur *Apuleius* ille *Madaurensis* ca. 2. sui libri, quem de herbarum virtutibus conscripsit, ad morsum serpentis quinquefolium pota & contritam, mire utile esse tradens. Proinde nemo est, nisi *Leberide* cæcior sit, qui non hallucinari *Auic.* videat. Id quod eo libentius studiosis inculcatus, ut vel tandem ab *Auic.* desciscant, discantque huius decreti non nisi exacto adhibito iudicio esse imitanda. Neq; enim tantam esse *Auicennæ* auctoritatē volumus, ut radicem salutarē admodum & contra venena potentē, faciat lethalem. Quod si animaduertissent superioris seculi Medici, nunquā *Pentaphylli* radicem in usu medico tanquā perniciosam abhorruissent. *Sauonarola* n. celebris sua ætate

Auicennæ placita non temere imitanda.

Medicus, quemadmodum Leonicens vir, & de literis, & de re medica optime meritus scribit; radicem Pentaphylli non alio nomine in quartana propinare non ausus fuit, nisi quod damneretur a Principe. Iacobus quoque de Dondis, ut idem scribit, Auic. auctoritate seductus, huius radicem intervenena numeravit. Discant itaque studiosi bonorum virorum periculo in tempore sapere, ut medicinam ex puris fontibus potius, quam ex turbidis lacunis hauriant, nec eo dementiæ perducantur, ut cum Auicenna errare malint, quam cum eruditis ac bonis viris recte sentire.

Harmel Arabibus non cicutam, sed rutam potius sylvestrem alteram significare, ut cumq. Auic. ac huius sequaces reluctentur, veterum omnium testimonys evidentiſſimum eſſe. CAP. XVI.

Verba Auicennæ, quibus Harmel non esse rutam sylvestrem afferit, habentur *Fen. 6. Can. 4. tract. 3. cap. 33.* ubi in hunc modum scribit: *Ruta sylvestris non est Harmel, ut quidam existimauerunt.* Quæ utique verba multis non solum medicis, sed & pharmacopolis errandi occasio fuerit, ut passim Harmel pro Cicutâ interpretati sint. Ita interpretes Abenrois quinto *Colliget.* non sine maximo errore Harmel pro Cicutâ interpretatus est: nec animadvertit, quod hoc loci Abenrois, Harmel calidam & siccam in tertio ordine esse dicat. Cicutâ autem veterum omnium testimonio, quemadmodum paradoxo 14. diximus, inter venena frigiditate nimia enecantia numeretur. Fuerunt etiam non pauci pharmacopolæ, qui falsa ista interpretatione seducti, semper pro Harmel Cicutam in usum Medicum arripuerint. Testatur id vetustum admodum Antidotarium, quo annis multis ad conficienda medicamenta usus est pharmacopola Onoltzbachensis, in quo passim Harmel pro Cicutâ semine interpretatum erat, nec animadvertit errorem, donec per me tandem monitus fuit. Accessit tandem multorum errorum sator Matthæus Syluaticus, quem Pandectarium alio nomine vocant, qui Harmel cum aspiratione apud Arabes scriptum Cicutam, sine vero aspiratione rutam sylvestrem significare scripsit. Id certe quod non solum non verum & minime otiosum, ut Montuus arbitratur, sed omnium mendacissimum ac otiosissimum est, quod veterum sententiæ, adde Arabibus etiam ipsis, ex diametro pugnet, nec vlla ex hac distinctione doctorum concordia fieri possit. Nemo enim eruditorum unquam Harmel cum aspiratione pro Cicutâ interpretatus est, sed vno ore omnes rutam esse sylvestrem affirmarunt. Testis est Diosc. qui *lib. 3. cap. 49.* ita scribit: *καλοῦσι δὲ πρὸς πηχρον ἀγριον ἄρμαλα, id est: Vocant autem nonnulli rutam sylvestrem Harmala.* Et Galenus *lib. 7. de simpl. med. facult.* dicens: *Μῶλυ πρὸς τὸ πηχρον ἀγριον ὀνομάζουσιν. ἐνίοι δὲ ἄρμαλα, quod est: Moly quidam rutam sylvestrem vocant, nonnulli Harmalan.* Esse autem idem Moly cum ruta sylvestri altera, docet in 8. libro de *simpl. med. facult.* Galenus ita scribens: *ὁ δ' ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις μῶλυ, καὶ ἐν τῶν ἐξαμην ἐνομάζετο, ἐστὶν ἂν καὶ αὐτὸ πηχρον ἀγριον.* Hoc est: *Quod superius moly & besanum nominari diximus, & ipsum utique fuerit ruta sylvestris altera.* Non est vero, ut quispiam hic moly Homericum intelligat, quod ab eo, quod alio nomine ruta sylvestris altera dicitur, plane diuersum est, pingiturque seorsim a Dioscor. Paulus quoque *Ægi. lib. 7.* rutam sylvestrem alteram alio nomine vocari harmalam his verbis ostendit: *Moly quod quidam rutam sylvestrem nominant, nonnulli vero harmalan, Syri besanum.* Inter Arabes denique Serapion *cap. 275.* harmel pro ruta sylvestri interpretatur, alioque nomine moly dici ait. Auicenn. quoque *cap. 340. secundi Can.* harmel esse rutam sylvestrem alteram fatetur, id quod proprietates, quas illi tribuit, abunde monstrat: eadem enim sunt cum illis quas rutæ sylvestri alteri inesse Diosc. Galenus, ac alii veteres scribunt. Ait enim: *Harmel est incisiva & subtiliatiua, est bona dolori iuncturarum, & sciatica, cum desuper illinitur: trita cum melle & vino & felle gallinarum & aqua feniculi, est conueniens debilitati visus: pronocat urinam & menstrua, & confert colicæ ventosæ.* Quas nimirum facultates omnes rutæ sylvestri veteres etiam assignant. Diosc. enim loco iam citato in hunc modum de illa scribit: *πηχρον ἀγριον πινόμενον ὠφελεῖ ἰσχιαδικαῖς. κινεῖ δὲ καὶ κατὰ μὲν. τὸ σπέρμα ἀρμόζον ἐστὶ πρὸς ἀμβλυωπίας μετὰ μέλιτος διανόμενον καὶ οἶνον καὶ ῥολῆς ἀλεξιδόμων, πρόκου τε καὶ μαρμαρίου κυλοῦ. hoc est: Ruta sylvestris coxendicum doloribus prodest, menses mouet. Semen cum melle, vino, gallinaceo felle, croco, & feniculi succo tritum, ad oculorum hebetudinem utile est.* Galenus autem libro 7. ἡ δύναμις αὐτοῦ λεπτομερὲς ἐστὶν καὶ διερχομένη κατὰ τὴν τρίτην ἀπόστασιν, ὅθεν καὶ τέμνει τοὺς παχέας χυμοὺς καὶ διαφορεῖ, καὶ ἐπ' οὐρεσιν περιέρπει, id est,

Pandectarius errorū seminor. Montuus refellitur.

Harmel ruta sylvestris.

Moly idem cum ruta sylvestri. Moly Homericum.

A id est, vis eius tenuium est partium, & calida in tertio ordine, unde & crassos humores diffecat & digerit, & urinam mouet. Et libro octauo, πῆπαν το ἀγριον τέμνειν καὶ διαφθερεῖν ἐκ τοῦ παχέος καὶ γλί-
 ρους χυμοῦ, διὰ δὲ τὴν αὐτὴν δύναμιν καὶ δι' οὗτων κινεῖ, καὶ μὴ δὴ καὶ λεπτομερὴς ἐστὶ, καὶ ἄφυσον, διὰ τὰ πρὸς τὰς ἐμ-
 πνευματώσεως ἀρμότητες. quod est: Ruta sylvestris incidere atque digerere crassos lentosque humores po-
 test, ob eandem vim & urinas mouet, quin & tenuium est partium, flatusque exstinguit, quare ad
 inflammationes competit. Galeno subscribit Paulus iis verbis: Ruta sylvestris tertia est classis cat-
 facientium cum partium tenuitate: unde crassos & tenaces humores incidit ac discutit, urinamque
 mouet. Porro harmel apud Abenroen descriptio ac proprietates in vniuersum cum iam
 dictis conueniunt: inquit enim: Harmel calida & sicca est in tertio ordine, incidit humores
 crassos, prouocat urinam & menses, valet dolori coxendicum, pituitamque purgat. Ita vt eviden-
B tissimum sit vtrorumque, tam Græcorum quam Arabum, testimonio, harmel cum a-
 spiratione, imo vtcunq; scribatur, perpetuo significare rutam syluestrem alteram. Nec
 ab re passim adiecimus alteram dictionem. Quia n. geminae sint Rutæ syluestres, vt tomo ter-
 tio nostrorum de stirp. historia commentariorum ostendimus, ea quæ Harmel nominatur, alte-
 ra earum existit. Præterea quum ruta sylvestris crassos lentosque humores, vt iam osten-
 dimus, incidere & discutere possit, manifestum est, eam commodius ad catapotiorum
 foetidorum & de hermodactylis confectionem adhiberi quam cicutam: non enim alio
 nomine deuorantur, nisi vt crassos lentosque humores educant: id certe quod cicutam
 non potest, cum eisdem sua frigiditate & humiditate potius crassiores & magis lentos
C reddat, atque ita membris & articulis impingat & infarciat, & nulla vi aut omnium dif-
 ficilime eximi possint. Atqui hoc loci Montuus oblectatur, non omnem cicutam frigi-
 dam & humidam, adeoque lethalem esse dicens, sed quandam vtpote terrestrem cali-
 dam & siccam existere, quam etiam intra corpus salubriter adhiberi posse, recentiorum
 medicorum, præsertim Conciliatoris auctoritate ait. Mirum autem Montuum ita de-
 lirare, vt me tam nullius momenti argumentis a concepta iam olim sententia deturbari
 posse existimet. Satis compertum habeo, recentiores Cicutæ duo facere summa gene-
 ra, vnum aquaticæ frigentis & humentis naturæ, alterum terrestris calidæ & siccæ. Sed
 quoniam qui hoc scribat, sententiamq; illorum confirmet, auctorem nullum idoneum
 proferunt, quid est, cur non hallucinatos esse, vt fere solent, constanter dicamus? Nec
D enim Conciliator tantus est, vt huic errori patrocinari possit, quem constat in multis
 aliis ita turpiter errasse, vt conturbatoris potius nomen, quam conciliatoris meruerit.
 Quid multis moror? quum nemo ex veteribus aut probatissimis scriptoribus Cicutam,
 quod frigida & humida sit, facile intra corpus adhibendam censuerit, quid est, quod
 recentiorum quorundam temere excogitatis nugis in tantum moueamur, vt cicutam
 calidam & siccam dicamus, cum tamen constet, nulla alia ratione Gal. lib. 5. de simplicium
 medicamentorum facultate cap. 18. Cicutam in potu damnaſſe, nisi quod frigida & humida
 sit? Verba eius subiiciemus: ἡ δὲ πικρὴ καὶ ψυχρὰ, ὡς περὶ καὶ τὸ λάνειον, οὐκ ἀγαθὰ πρὸς
 σῶσιν. quod est: Quæ frigida quum sint, humiditatis item copiam obtinent, seu cicutam, ea potu non
 sunt utilia. Non ab re autem paulo ante a nobis dictum, facile intra corpus adhibendam
 censuerit. Si enim Cicutam intra corpus adhibetur, id necessitate quadam compellente
E fit, quæ cogit, vt interdum etiam opium propinetur deuorandum. Sic Galenus quidem
 lib. 10. de compo. med. localium cap. 3. in vesicæ exulceratione ad mitigandum eius dolorē,
 Cicutam ex Andromachi sententia bibendam præbet. Insuper prædictis fidem faciūt,
 quod nec Dioscorides, diligens herbarum scriptor, duplicem Cicutam, quarum alte-
 ra simpliciter frigida, altera vero calida sit, quemadmodum Conciliator facit, ita vt sole cla-
 rius sit, recentiorum de duobus cicutæ generibus commentum, esse omnium frigidis-
 simum. Sunt quidem duo Cicutæ genera: vt tomo 2. nostrorum de stirp. hist. commentario-
 rum monstrauius, tamen neutra earum simpliciter calida existit, sed tantum alterius
 collatione, nempe maioris, quæ plus minore refrigerat. Sunt etiam duo Cicutæ gene-
F ra, vt ibidem docuimus.

Cicutæ ad
 Catapotio-
 rum confe-
 ctionem non
 debet ad-
 hiberi.

Montui ad
 notationem
 culæ respō-
 detur.

Cicutæ nō
 duo sunt
 genera.

Concilia-
 tor contur-
 bator po-
 tius dicen-
 dus.

Ladanum, vel, vt Barbari, addita litera, loquuntur Laudanum, non ex Hedera, perin-
 de vt Auicenna somniat, sed Cisthopotius frutice, quem Ladañ alias no-
 minant, colligi. CAP. XVII.

A Viennæ verba, quibus Ladanum ex hedera provenire statuit, habentur capite 432. *secundi Can.* ubi in eum scribit modum: *Laudanum est humiditas pendens in pilis caprarum pascuntium, & barbis earum, cum pascunt plantam, qua nominatur Cusum.* Et in cap. 173. eiusdē *Can.* de Cuso, ubi ita inquit: *una quidem specierum eius est, qua nominatur laudanum, & cusum quidem in radice est Laudanum.* Cusum autem utrobique pro cistho corrupto vocabulo interpretes dixit: *κισθός* vero Græcis, hedera Latinis vocatur. Sed ne quis Auicennæ patrociniari possit, ac dicere cusum corrupte haud aliter, quam apud Serap. cap. 42. pro cistho positum, facit quod uterque alias cusum pro hedera seorsum describit, & Auicenna in *capite de Cuso*, haud secus quam in capite de *Ladano* utriusque herbæ vires miscuit, ita ut evidentissimum sit, Auicennam cisthon herbam ladaniferam non satis compertam habuisse, nec illam a cisso, hoc est, hedera, discernere potuisse, sed nominis vicinitate deceptum, quæ cistho debentur, ad cisson transtulisse: id quod perspicuum fiet, caput de Cuso apud Auicennam, cum capite de cistho apud Dioscoridem conferenti. Quod vero pingue illud, quod a lada herba, quæ *κισθός* Græcis dicitur, *laudanum* appellatur, hircorum barbis adhærescens, non de cisso seu hedera, sed de cistho colligatur, in primis Dioscorides lib. 1. ca. 119. testatur, ita scribens: *ἔστι δὲ καὶ ἕτερον ἔϊδος κισθῶ, καλούμενον ὡς ἐν τῷ λῆδον, δάμνησθαι αὐτὰ τοφύοντες τῷ κισθῷ, μακρότερον δὲ τὰ φύλλα ἔχει καὶ μελάντερον, λιπαρίας πᾶσι κατὰ τὸ ἐκ δισσώμενα, οὗ φύλλον ἢ δύναμις συμικτὴ καὶ δέσνηκε, ποιεῖσα περὶ νασαχὸς κισθῶς, γίνεται δ' ἐξ αὐτῶ τὸ λεγόμενον λάδανον τὰ φύλλα δὲ αὐτῶ περιόμενα αἱ αἷες καὶ οἱ τρύγχοι, τὴν λιπαρίαν ἀναλαμβάνοντες τῷ πάσῳ γινώσκουσιν, καὶ τοῖς μετέωροις ἀπλομένω διατὸ τυγχάνειν ἐξ ὧν, ἢν ἀραιεῖν τις ὑλίσσῃσι παρὰ τοῖς ἀναπλάστοντες μαζίδας.* hoc est: *Alterum quoque cisthi genus est, ladanum a nonnullis appellatum, frutex similiter cistho nascens, oblongiora tantum & nigriora folia habet, qua verno tempore quiddam contrahunt, foliorum eius vis adstringens, omnibus quibus & cisthus accommodata. Fit ex eo, quod ladanum dicitur. Folia eius cum pascuntur capra, hircis, pinguitudinem conspicue barba carpunt, & suo lentore femoribus adhærescentem reportant, quam depectentes colant, coguntque in offas, & recondunt.* Et Galenus lib. 7. de *simpl. med. facule.* in hunc modum loquens: *κισθός ἢ λάδανον, ἐν μὲν τοῖς θερμοτέροις χωρίοις οὗτος ὁ κισθός γινώσκουσιν, οὐχ ἕτερος δὲ τῷ γένει τῷ παρ' ἡμῖν, τὸ δὲ καλούμενον λάδανον ἐξ αὐτοῦ γίνεται.* quod est: *Cisthus aut ladanum. In calidis regionibus hic cisthus proveniens, non alius existit genere, quam qui apud nos nascitur. Verum ladanum quod vocant, ex eo colligitur.* Galeno subscribit Paulus libro septimo, inquitens: *λάδανον ἀπὸ κισθῶ τοῦ λάδανου λεγόμενου γίνεται, ἔστι δὲ ἐν Κύπρῳ.* hoc est: *Ladanum e cistho, quam ladana vocant, provenit: est autem in Cypro.* Diosc. quoque Cyprium Ladanum veluti ceteris præstantius laudat. Si itaque ladanum optimum in Cypro nascitur, fieri non potest, ut ex hedera, quæ, si Theophrasto grauissimo auctori credimus, in Cypro non nascitur, proveniat: adeo ut toto cælo erret Auic. qui hoc ipsum ex hedera colligi tradit.

Pandectarii In hunc errorem, ut in alios multos, Pandectarius quoque incidit, & ut Auicennam suum tueretur, hederæ nomen aliquanto, quam reliqui, fusiùs accepit, omnemque herbam, qua caprae libenter vescuntur, ab edendo hedera appellari posse stolidissime dixit. Neque Plin. ab hoc errore immunis fuit, sed perinde atque Auic. utriusque herbæ historiam confudit, quemadmodum Nic. Leonicens, reconditæ eruditionis vir, in suo, quem de Plinij erroribus conscripsit, libro, abunde satis indicavit.

Auicennam Volubilis maioris facultates cum Hedera proprietatibus confundere notius ferme esse, quam ut demonstrari debeat.

CAP. XVIII.

Descriptio maioris Volubilis apud Auicennam habetur capite 735. *secundi Can.* ubi in hanc sententiam scribit: *Lac Volubilis magna abradit pilos, & interficit pediculos. Folia sumis pauperum recentia convenientia sunt ulceribus magnis, & consolidant ea decocta in vino, & ex eis emplastrum factum superimpositum adustioni ignis, & proprie cum cerato. Destillatur succus eius in aurem dolorosam, & confert ulceribus antiquis.* Has autem facultates ab Auicenna Volubili maiori tributas, hederae deberi in uniuersum omnes testantur veteres: in primis Dioscorides li. 2. cap. 168. ita docens. *τὸ δὲ λάκρυον κισθῶ καὶ τοῖς τρύγχοις, κτείνον τοὺς ἰσχυροὺς ἐπαλοφόμενον. καταπλάσσειται δὲ τὰ φύλλα πρὸς πᾶν ἔλκος ἐν τῇ σὺν οἴνῳ, καὶ καταπλάσσειται καὶ ταχυμάτα κακοῦς δὲ κακοῦς. ὁ δὲ χυλὸς τῶν φύλλων, καὶ τῶν κορυμμένων τρυγχείων, καὶ πυρρῶντα αὐτὰ σὺν ἐλαίῳ ἰᾶται. i. Hedera lachryma depilat, illita pediculos enecat.* (Hic aduerte Auicennam aut eius saltem interpretem ineptissime lac pro lachryma reddidisse.) *Folia in vino decocta omnium ulcerum generi illinuntur. Ambusta*

- A** quoque, etiamsi malefica sint, illa sanant. Foliorum vero & corymborum succus dolentibus auribus & purulentis cum oleo medetur. Et Galenus li. 7. de simpl. med. facult. in eum modum scribens: τὸ δάκρυον κισσοῦ φθειρὰς κτείνει, καὶ τρεῖς ψιλλοῖ. ὃ δὲ χλωρὸς, ἐκθιέντων τῶν φύλλων σὺν οἴνῳ, καὶ τῶν μεγάλων ἑλκῶν ἐστὶ κολλητικὸς, καὶ τῶν χακοθυμένων ἱαπικὸς. τὰ δὲ ἀνθὶ αὐλοῦ ἰσχυρότερα πῶς ἐστίν, ὥς μετὰ κηρωτῆς λειομένα ἰοῖς πυρρὰ τοῖς ἀρμόττει. ὃ δὲ χυλὸς ἐστὶ μὲν καὶ ἔρρινον φάρμακον, καὶ τὰ ῥόγια δὲ τῶν ὠτων ἰᾶται. φύματα καὶ τῶν ἑλκῶν τὰ παλαιὰ κατὰ τὰ αὐτὰ. quod est: *Lacryma hedera pediculos interimit, pilis nudat. Viridis autem, folijs eius in vino decoctis, ulcera grandia conglutinat, quæque maligna sunt sanat. Flores vero quoadmodum valentiores sunt, ut ad laeuorem redacta cum cerato ambustis prosint. Præterea succus medicamentum est quod naribus infunditur, & vetustis aurium fluxionibus, & quæ in his sunt ulceribus medetur.* Galeno in septimo subscribit Paulus his verbis: *Lacryma hedera pediculos interficat, & pilis nudat. Viridia eius folia in vino decocta ulcera conglutinant, ambustis conducunt. Succus medicamentum est, quod naribus infusum caput purgat, tum vetustas aurium fluxiones sanat.* Iam dicta confirmant, quæ libro 24. capite 10. in hunc modum scribit Plinius: *Succus hederae taderis narium graucolentiamque emendat. Infunditur etiam purulentis auribus aut dolentibus cum oleo. Illinitur decocta in vino omnium ulcerum generi, etiamsi cacoethe sint. Lacryma eius psilothrum est, phthiriasimque tollit, & ambustis illinitur utiliter cum cera.* Quare neminem esse puto, nili lapide stupidior sit, qui non aperte videat, Auicennam hederæ facultates, non sine magno errore, Volubili maiori tribuisse: ita passim herbarum inter se vires miscet Auicenna. ut nihil certi ex hoc auctore, studiosus decerpere possit. Proinde animaduertendum Volubilem maiorem aliam esse ab ea, quæ simpliciter hedera vocatur, herbam, illam nimirum quam Græci *helxinen* aut *cissampelon*, hoc est, vinealem hederam nominant. Hæc plurimo quidem lacte manat, & aliuum haud secus quam scammonia citat, quam Dioscorides libro quarto capite 42. iis verbis describit: ἑλξίνη, ἢ καὶ κισσάμπελον, καὶ φύλλα ὁμοία κισσοῦ, ἐλάττω δὲ καὶ κλωνία μικρὰ περιπλεόμενα ὅπου αὐτὸς τῷ χυμῷ. φύμα δὲ ἐκ φραγμῶν καὶ ἀμπέλων καὶ αἰτρῶ δύναμιν δὲ ἔχει τῶν φύλλων ὁ χυλὸς πινόμενος λυτικὴν κοιλίας. id est: *Helxine quæ & cissampelos dicitur, folia hedera similia habet, minora tamen, ramusculos quoque paruos amplectentes quicquid conuigint. Nasctur vero in septs, vineis & frumento. Succus foliorum potus vim habet aluum subducendi.* Et mirum admodum utrumque interpreterem, Ruellium & M. Virgilium, hoc caput tanquam adulterinum in Diosc. omisisse, cum tamen constet antiquorum, Galeni præsertim & Pauli testimoniis, duas esse helxinas dissimilis inter se naturæ: id quod & idem M. Virgilius in suis fatetur annotationibus, vnam quæ hodie parietaria, alteram quæ Volubilis appellatur.

Ex Auicenna
nihil certi
decerpitur.

Ta Ruellius
quam M.
Virgilius
caput de
cissampelo
præter ra-
tionem om-
miserunt.

Sucutum neque semperuiuum, neque mandragora speciem esse, quemadmodum Auicenna putat, sed eam potius herbam, quam veteres symphytum petraem nominant.

CAP. XIX.

- Q**uam varium se in fucuti descriptione exhibuerit Auic. pbe intelliget, qui eiusdem de illo placita diligenter expendere. In capite namq; 642. *secundi Can.* ita scribit: *Sucuti quid est? Dicitur quod est semperuiua, & dicitur quod est species seminis mandragora, & dicitur aliud.* Et rursus Fen. 10. *Can. 3. tract. 3. cap. 6.* de puti sanguinis curatione in hunc modum: *Sucutum est semperuiua, & scripsit vir quidam in suis aggregationibus esse calamenti specie, nascentem inter lapides.* Quid, per Apollinem oro, certi ex his descriptionibus medicæ professionis studiosi venientur? Nihil equidem: nam quid cognitionis conferre queat Auic. qui metipse ignorauit, quid *sucutum* esset? Ignorasse autem id tot de illo diuersæ eius sententiæ declarant: compertam enim fucuti naturam si habuisset, in referendis aliorum sententiis minime contentus fuisset, sed tandem in te tam dubia pronuntiaffer, & suam etiam sententiam interposuisset. Proinde resipisceret velim, qui adhuc hodie Auic. tanquā idolum aliquod exosculantur, nec vilo pacto huic esse contradicendum putant, cum tot erratis eius libros, secundum præsertim, refertos esse constet, ut multo consultius esset hunc penitus interiusse, quam ut tot bonis viris auctoritate, quæ hūc plurimum valere arbitrantur, imponeret. Discant igitur ex hoc aliisq; erroribus, quā vari⁹ sit, & verumtū quouis inconstanti⁹ Auic. ut vel tandem pudeat tam inconstantis magistri esse discipulos. Sed ad institutum reuertentes *sucutum* neq; semen mandragoræ, neque etiam calamenti esse speciem, sed eam potius herbam quam Diosc. & alii Græci

Auicenna
Sucuti na-
tura igno-
rauit:

Sucutum a
Symphyco
petrae ni-
hil differt.

symphytum petræum nominant, demonstrabimus. Id quod facillimum erit, si utriusque A descriptiones contulerimus. Auic. siquidem in loco secundi Can. antea citato hæc subiungit verba: *Sucutum est duarum specierum, quarum una est petrosa, & alia non petrosa. In ipsa est humiditas calida temperata, & subtilitas & incisio, & habet odorem ac dulcedinem quandam, & aqua eius attrahit sputum, & aggregando partes carnis in vase facit rem unam. Decoctio eius sanat asperitates pectoris & gutturis, & prohibet sputum sanguinis, & cum aqua mellis mundificat pulmonem, confert ulceribus intestinorum & abrasioni, & ruptura inguinis, & doloribus renum, & retinet fluxum sanguinis menstrui. Quæ sane descriptio in vniuersum cum descriptione symphyti petræi quadrat, quam tradit Dioscorides lib. 4. capite 10. dicens: Σύμφυτον πέτραιον φέται ἐν πέτραις. Ἰδὲ δ' ὅλον ἐστὶ ξυλῶδες καὶ εὐώδες, γλυκύ τε πρὸς τὴν γαστέρα, καὶ πύον προκλητικόν· τὸτο ἐφ' ἡδὲ συνμικράται καὶ ποθὲν ἀνακαθαίρει τὰ ἐκ πνεύμονος. συνὸν φτε ἐφ' ἡδὲν, πίνεται πρὸς δυσεντερίαν, καὶ ῥοὴν γυναικείον ἐρυθρόν, καὶ νεφρίτιν· συνὸν δὲ διδοται ἀρμόζει καὶ ταῖς βρόγχου τραχύτησι, κολλᾷ καὶ νεότερωτα καὶ ἐντεροκόλλας ἀποκρατεῖ κατὰ πλάτος μόνον. καὶ τὰ κρέα συμπέτελει ἐφ' ὅμοια συνὰ τοῖς. hoc est: *Symphytum petræum nascitur in petris, totum est lignosum, odoratum, gustu dulce, salinamque ciens. Decoctum in aqua mulsa & potum, quæ sunt in pulmone purgat, in vino vero decoctum ad dysenteriam, rubraque sæminarum profluuia, & renum malis ex aqua datur, gutturis quoque asperitati prodest, vulnera recentia conglutinat, intestinorumque ramices illitum cohibet, carnes quoque, cum quibus decoquitur, coalescere facit. Neque disconueniunt, quæ de symphyto scribit Galenus lib. 8. de simpl. medic. facult. in hunc modum. Σύμφυτον πέτραιον ὅς ἐστιν ἄνθρωπον ἀντιθέτων δυνάμεων, ἔχει μὲν γὰρ καὶ τμητικὸν, καὶ αὐτὸ πτενίζον ἐν τῷ στήθει καὶ πνεύμονι πύον ἐκκαθαίρειν ἐφικναι. ἔχει δὲ καὶ συναπτικόν, ὃ καὶ πρὸς τὰς ἐμῆματος ἀναγωγὰς ἐπιβοηθεῖ. καὶ τέτιον ἐπὶ αὐτοῖς ὑγρῶσι τὰ πνεύματα ἐκ ἀκέρως, δι' ἧν καὶ γλυκύ φαίνεται γινωσκόμενοι, καὶ ἡδὲ πρὸς τὴν ὀσφρην. τὰς ἐν ἀσθμῇ τρυχίτητας ἰάται. κατὰ δὲ τὴν ὁρμὴν ἀπασῶν τῶν εἰρημένων δυνάμεων, καὶ ἐν ἀμῶσι καὶ διαφορῇ ἰκανόν ἐστὶν καὶ συνάγειν καὶ σφίγγειν τὰ σώματα, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ταῖς ἐντεροκόλλαις ἐπιτίθεται, ὅσοι δ' αὐτὸ καὶ πρὸς δυσεντερίαν, καὶ ῥοὴν ἐρυθρόν ἐφοντες ἐν οἶνῳ διδοασιν, ὡς ξηραίνοντα τε καὶ συνάγοντα χεῖναι. καὶ ὅσοι πρὸς νεφρίτιν, ὡς ἐκκαθαίροντα καὶ τέμνοντα. id est: *Symphytum petræum ex contrariis constat viribus: habet enim secandi vim quampiam, qua collectum in thorace & pulmone pus expurgare potest: habetque etiam quandam contrahendi vim, qua eiectionibus sanguinis auxiliatur: & tertia ad eas inest humiditas quadam non immodice calida, per quam gustantibus dulce apparet, & odoratu incundum: arteria asperitates sanat. Porro secundum omnium dictarum virium mixturem simul digerere abunde potest, simulque corpora contrahere constringereque: proinde intestinorum ramicibus imponitur. Qui ipsum D in vino decoctum ad muliebri exhibent profluvium, utuntur tanquam desiccante & contrahente. Qui vero ad nephritin, tanquam expurgante & incidente. Galeno subscribit Paulus in 7. dicens: *Symphytum petræum ex contrariis constat facultatibus. Habet namque vim secandi, qua nimirum in thorace, pulmone & renibus pus expurgat. Quandam etiam contrahendi, qua sanguinis excreationibus, rubris sæminarum fluxionibus, & enterocolis medetur. Adhæc omnia calidam quandam humiditatem habet, qua sitim exstinguit, & arteria asperitates. Prædictis accedunt quæ scribit Plin. li. 27. capite 6. in hunc modum: Alum nos vocamus, Græci Symphyton petræum, nascitur in petris, ideoque petræum cognominatum, utilissimum lateribus, renibus, torminibus pectoris, pulmonibus sanguinem reijcientibus, faucibus asperis. Vulneribus sanandis tanta præstantia est, ut carnes quoque cum coquuntur conglutinet addita, unde & Græci nomen imposuerunt. Quæ ideo nobis ordine recentenda fuerunt, ut ex iis luce meridiana clarius cerne- E rent veritatis auidi sectatores, fucutum cum symphyto idem esse, id quod præter utriusque descriptiones, quæ in vniuersum conueniunt, nomen etiam satis indicat. Corrupto enim vocabulo symphytum fucutum appellauit Auic. Proinde cum is error, in quem lapsus est Auic. ex linguæ inscitia ortus sit, consultum erit omnibus, qui medicinæ operam daturi sunt, ut illam non nisi linguarum, Græcæ præsertim, peritia instructi accedant, nam ita multas errorum occasiones subterfugere poterunt, in quas alias impro- uidi incident.****

Medicinæ studiosi græcæ linguæ peritia præditi sint.

Ignorasse populum arborem Auicem. cum ex ambigua eius de illa sententia, tum etiam quod calidam esse in ordine tertio statuit, colligi.

CAP. XX.

Auicennæ populum arborem fuisse ignoram, indicio primum est, quod illam in secundo Can. diuersis capitibus sub aliis atque aliis nominibus tanquam rem diuersam describit: quod certe nunquam fecisset, si huius formam atque naturam probe per-

A perspectam habuisset. Ter enim de vna hac arbore diuersis locis tractat. Primum cap. 344. sub hauri Romani nomine, vbi quid haurum, cui *achirosa* respondet: quam sane dictionem corruptam esse constat, ac pro ea αἰχρῶς scribendum, quæ dictio Græcis *nigram populum* significat. Dein cap. 510. sub nucis Romanæ nomine idem facit, id quod verba illic scripta, quæ a prioribus in nullo differunt, nisi quod pro *achirosa* hic *aceus* habetur, satis monstrant. Tertio in cap. 351. simpliciter sub hauri nomine populum describit arborem, vbi etiam ea, quæ de alba & nigra populo a Diosc. Galen. & aliis veteribus diuersis dicuntur capitibus, vno capite confundit, viresque harum non sine magno errore miscet. Nam cum scribit, *aureum ex fructu ipsius arboris conferre sciatica, & succum foliorum*

Auicenna
vtriusque
populi fa-
cultates co-
fundit.

B eius tepesfactum destillatum in aurem sedare dolorem, item aureum ex fructu eius destillationi urine conferre, ex eius fructu cum melle fit alcohol, & est confortatiuum oculi, & aureum ex fructu eius cum aceto post purgationem mēstruorum, prohibere imprægnationem, omnia ad populum albam referenda sunt. Has enim eius esse facultates in primis Dioscor. li. i. cap. 100. docet, ita scribens: λευκὴν τὸν δρυὸς ὁ φλοιὸς ποδαγρῶν ὅσον διγρία μία πλὴν ἰσχιάδας ὀφελεί, & στραγγείας. ὀφελεί & ὡς παλγίας ὁ χυλὸς τῶν φύλλων χλιαρὸς εὐσαζόμενος. τὰ δὲ κατὰ τὴν ἐκλάσην τῶν φύλλων σπασίει λεῖα μετὰ μέλιτος ἐγχρίματα ἀμβλυωπίας διασπείρει, & τὰ φύλλα δὲ πινόμενα μετὰ χυδαρῶν συνόνων ἀτόκια εἶναι ἰσχυροῦται. id est: Populi alba cortex potius vinctæ unius pondere ischiadicis ac urine stillicidio prodest. Foliorum quoque succus tepens instillatus aurium dolores inuat. Pilula in prima foliorum germinatione trita & cum melle illa oculorum hebetudini medentur. Folia denique cum vino post purgationem pota sterilitatem facere produntur. Necnon Plinius libro 24. capite octauo dicens: Cortex potius ischiadicis & stranguriæ prodest,

Populi alba
vires.

C foliorum succus calidus aurium dolori. Quod vero in capite paulo ante citato scribit Auicenna, emplastrum factum ex folijs romana cum aceto conferre dolori podagra, & fructum eius prodesse epilepsia, ad nigræ referendū populū erit: Ita enim de ea Dioscor. lib. i. c. 104. tradit: αἰχρῶν τὰ φύλλα μετ' ὄξους κατὰ πλάττωμένα ποδαγρῶν ὁδὸν ὀφελεί. ὁ καρπὸς δὲ μετ' ὄξους πινόμενος ἐπιτὴν θηκοῦς ὀφελεί. quod est: Populi nigra folia cum aceto illa podagricos dolores inuant, semen vero potū cum aceto, comitialibus utile est. Et Plinius loco iam citato, *Populus nigra*, inquit, efficacissima habetur, quæ in Creta nascitur: comitialibus semen ex aceto utile, folia podagris in aceto decocta imponuntur. Vnde euidentissimum fit, Auicennam contra veterum sententiam vtriusque populi facultates indiscriminatim miscuisse, adeo vt hinc quoque discere liceat hunc ipsam suā nullo penitus ordine vtunque sese obtulerunt congestisse. Ceterum ignoras-

Auicenna:
sua sine or-
dine con-
gestit.

D se naturam Populi arboris Auicennam inde etiam colligi potest, quod hanc cap. 344. & 510. calidam in tertio ordine esse dicat, licet ca. 351. æqualem esse in caliditate, & ad paucam declinare siccitatem scribit; id quod & in Carabe, de quo sequenti paradoxo dicemus, facit: adeo nunquam non sibi similis, hoc est, Proteo ipso inagis varius est Auicenna. Non esse autem calidam in tertio ordine populum nigram, testatur Galenus libro sexto de simpl. med. facultatibus ita scribens: αἰχρῶν τὰ μὲν ἀνθηδερμὰ διῶσιν ἐσιν ἐκ τῆς πρώτης ἀποστάσεως ἀπὸ τῶν συστάτων. ἐν δὲ τῇ κατὰ τὸ ξηραίνεν τε & ὑγραίνεν διαφορά. Ἐραχὺ τῶν συστάτων & μέσων ἀποστάσεων ἐστὶ τὸ ξηρότερον. ἐστὶ δὲ & λεπτομερὲς καλλὼν, ἢ παχυμερὲς. & τὰ φύλλα αὐτῆς ὁμοιωμένως ἐστὶ πρὸς ἀνθρώπου, πλὴν εἰς ἅπαν ἀενάεστέα τε & ἀσφατότερα αἰχρῶν ἢ πρὸς αὐτοῖς ὁμοία τῆς ἀνθρώπου δύναμει ἐστὶ, & θερμότερα π. το. δὲ πτέρυγα λεπτομερέστερον ἐστὶ ξηραντικώτερον τῆς πρὸς αὐτοῖς, & τῶν ἀνθρώπων, θερμὸν δὲ οὐ σπάνιον, id est: Aegiriflores calidi quidem sunt in primorecessu, a temperatis, & in differentia, quæ habetur in siccando & humectando, paululum quiddam a temperatis ac medys ad siccius deflecterunt: sed & subtiliorum potius quam crassiorum sunt partium. Et folia quoque ipsius quodammodo floribus similia sunt, nisi quod ad omnia imbecilliora, minusque efficacia. Sed & resina eius floribus similem facultatem obtinet, atque etiam calidiorē. Porro semen tum resina, tum floribus, & subtiliorum est partium, & exsiccantiū, non tamen admodum calidum. Quæ ideo longius a nobis repetita sunt, vt hinc studiosi verum Populi nigra, omniumque eius partium temperamentum, quandoquidem Auic. nihil certi ea de re statuatur, agnoscerent. Nec est, quod nobis quif-

Populus ni-
gra non in
tertio ordi-
ne calida.

E quam veterem Galen. traductionem, quæ calidam in tertio ordine asserit, obtudat: nam cum illa ex Arabica lingua traducta sit, id quod Barbara & Arabica capitibus passim præfixa nomina, adde multa etiam, quæ in Græco non habentur exemplari, illi addita, abunde monstrant, exigua huic fides adhibenda erit, maxime quod constet versionem illam non semel tantum, sed fere singulis capitibus multifariam deprauatam esse, quemadmodum perspicuum erit, si quis illam cum Græcis contulerit. Non esse autem legendum in tertio recessu, sed in primo potius, omnium maxime fidem

Vetus Gale-
ni traditio
qualis.

Paulus Ga-
leni simia.

facit Paulus Aegin. Galenum passim ita referens, ut Simia eius dici coeperit, qui li. 7. de Populo nigra ita scribit: *Aegiros excalfacit in primo temperaturum ordine, siccatur vero medio- criter, estq; partium tenuium. Verum quae ex ea stillat resina, floribus paulo calidior est.* Præterea natura ipsa arboris ad tantum caliditatis gradum illam non posse extolli, satis indicat. Qui enim sapor, quis odor, quæ denique qualitas tam præcellentis hanc esse caliditatis indicio esse potest? neq; enim valde odorata, neq; eximio aliquo sapore prædita est, sed dum gustatur, primum quidem modice adstringit, postea amaritudinem quandam sub- obicuratam inuehit, olfacienti quid non insuaue, verum exiguum id omnino repræsentat: quæ certe singula non excedere primum a calefaciendo ordinem argumento existunt. Quod si quis etiam via regia, quam in libris de simpl. med. facul. Gal. ostendit, incedens, illam in corporibus & temperatis & ægris experiri voluerit, non admodum calefacien- tem inueniet. Quum itaq; ex iam dictis satis constet populum nigram primum calidita- tis ordinem non excedere, quid obstat, cur non intrepide Auicennam errasse pronun- ciamus?

Carabe quod Græci electrum, Latini autem succinum vocant, non esse Populi nigrae la- chrymam, veluti Auicenna & alij quidam fabuloso seducti errore, docent. CAP. XXI.

Haurus Ro-
mana nux.

AVicenna cap. 351. secundi Can. Carabe gummi arboris Hauri esse docet iis verbis: *Gummi quod ex hac arbore romana est, Carabe dicitur.* Et rursus cap. 374. ubi Carabe hi- storiam ex professo tractat, idem facit, dum, *Carabi gummi arboris, quæ nux romana vocatur, esse,* inquit. Manifestum vero ex præcedentibus, Haurum romanum, seu nucem roma- nam, Arabibus nihil aliud esse quam Populum nigram. Auicennam sequitur Serapion, qui cap. 266. sui de simpl. med. temp. Carabe Hauri romani gummi esse scribit, idq; ex Ga- leni sententia, quem tamen constat nullam de electro succinove mentionem fecisse: ita passim in citandis Græcis, illorum auctoritate abutuntur Arabes. Ea autem de succi- no sententia, ex fabula quadam hominum mentes irrepsit, qua Heliades Phaetontis so- rores fratrem mensibus quatuor fleuisse, ac tandem iuxta Padum in Populos arbores il- lius desiderio conuersas, pro lachrymis molle succinum iugiter stillare ferunt. Hanc certe Ouidius lib. 2. metamorph. multis iisdemq; elegantissimis versibus descripsit, inter quos & illi leguntur.

Fabula He-
liadum.

*Mater tunc truncis auellere corpora tentat,
Et teneros manibus ramos abrupit, at inde
Sanguinea manant tanquam de vulnere guttae.
Parce precor mater, quæcunq; est saucia clamat,
Parce precor, nostrum laceratur in arbore corpus,
Iamq; vale, cortex in verba nouissima venit.
Inde fluunt lachryma, stillatq; sole rigescunt
De ramis electra nouis, quæ lucidus amnis
Excipit, & nurius mittit gestanda Latinis.*

Refertur & a Diodoro Siculo lib. 6. de fabulosis antiquorum gestis, iis verbis: *De electro qui- dam veteres fabulas scripsere haud dignas fide, & quæ a posteris reprehense sint. Nonnulli enim sum poeta, tum historici tradunt Phaetontem solis filium, quum puer esset petysse a patre, ut unicum diem solus currum regeret. Illo assentiente, sumto curru, quum equorum frenâ regere nequisset, ab equis contempto puero, extra solitum cursum esse currum delatum, & primo cælum equorum errore incensum, circumq; qui Galassia dicitur, exinde factum, deinde magnam combustam orbis par- tem. Quare commodum Iouem fulmine Phaetontem tradunt peremisse, solemq; in pristinum rede- gisse cursum. Phaetontem in fontibus eius, qui nunc est Padus, olim Eridanum dicebant, decidisse. Eius mortem Nymphas fleuisse sorores, dolorisq; magnitudine mutata in Populos fuisse versas: has annis singulis eodem tempore educere lachrymas, e quibus electrum fiat, reliquum splendore superans.* Hactenus Diodorus. Fabulosum autem hunc errorem non tantum Arabes, sed & ex Græcis plurimi, ut Arist. cap. 70. de admirandis in natura, secuti sunt, & inter Medicos Paulus maxime Aegineta, qui lib. 7. ita scribit: *Populi arboris lachryma est electrum, prope flumen Eridanum, ut aiunt, ex ea destillans congelascit colore auri.* Nihil autem miri in tam va- riis scriptorum de succini prouentu sententiis deceptum fuisse Paulum, qui in Græcia viuens

Paulus Ae-
gineta in
succino de-
ceptus.

A viuens, vbi terrarum succinum generaretur videre non potuit: quapropter communem multis opinionem sequi voluit. Plurimi tamen fuisse qui fabulam hanc damnaverunt, velati est Diodorus Siculus loco iam citato, & Herodotus libro tertio. Nemo autem veterum fere, vbi nasceretur succinum certius, quam Plinius, fidelissimus naturæ interpret, indicauit, qui li 37. c. 2. varias de illo cōmentitias explodens sententias; in hūc modum scribit: *In succinis causam ne delicia quidem adhuc excogitauerunt. Occasio est vanitas Graecorum diligentia. Legentes modo aequæ perpetuantur me de ortu eorum, cum hoc quoque intersit vitæ, scire posteros quicquid illi prodidere mirandum.* Phaetontis fulmine ic̃ti sorores fletu mutatas in arbores Populos, lachrymis electrum omnibus annis fundere iuxta Eridanum amnem, quem Padum vocamus: & electrum appellatum, quoniam sol vocitatus sit elector. pluri-

B mi Poeta dixerunt, primique, ut arbitror, Aeschylus, Philoxenus, Nicander. Euripides Satyrus: quod esse falsum Italia testimonio patet. Diligentiores eorum Electridas insulas in mari Adriatico esse dixerunt, ad quas dilaberetur Padus. Quæ appellatione nullas unquam ibi fuisse certum est. Nec vero vllas ibi appositas esse, in quas quicquam cursu Padi deueni possit. Nam quod Aeschylus in Iberia, hoc est, in Hispania, Eridanum esse dixit, eundemque appellari Rhodanum, Euripides rursus, & Apollonius in Adriatico littore confluere. Rhodanum & Padum faciliorem veniam facit ignorati succini, in tanta orbis ignorantia. Modestiores, sed aequæ falsum prodidere, in extremis Adriatici sinus rupibus inuis arbores stare, quæ canis ortu hoc effunderent gummi, &c. nam varias aliorum quam plurimorum de succino sententias recenset, quas ne longiores simus, missas facimus. Capite autem tertio; post falsas multorum opi-

C niones. huius orum certius monstrat, sic dicens: *Certum est gigni in insulis septentrionalis oceani, & a Germanis appellari glessum, itaque & a nostris unam insularum ob id Glessariam appellatam; Germanico Cesare ibi classibus rem gerente Austrariam a Barbaris dictam.* Nasctur autem defluente medulla pinei generis arboribus, ut gummi in cerasis, resina pineis. Erumpit humoris abundantia, densatur rigore vel tempore autumnali. Cum intumescens aestus rapuit ex insulis, certe in littora expellitur, ita volubile, ut pendere videatur, atque considere in vado: quod arboris succum esse prisca nostri credidere, ob id succinum appellant. Pineæ autem arboris esse indicio est pineus in attritu odor, & quod accensum tedamodo ac nidore flagret. Afferitur a Germanis in Pannoniam maximè prouinciam. Inde Veneti primum, quos Græci Henelos vocant, rei formam fecere, proximi Pannonia, id accipientes circa mare Adriaticum. Hæc ille.

Glessaria.

D Plinio subseribit Solinus capite trigesimo tertio in hunc modum: *Glessaria dat succinum, quod Germani gentilititer vocant glessum. Qualitas materiae istius summatim antea; Germanico autem Cesare omnes Germania oras scrutante comperta est arbor pinei generis, cuius medulla autumni tempore succinā lachrymat. Succum esse arboris de nominis capeffes qualitate. Pinum verò unde sit genitum; si offeris, odor indicabit. Precium opera est iræ longius, ne Padaneæ syluæ credantur lapidem fleuisse. Hanc speciem in Illyricum Barbari intulerunt. Quæ cum per Pannonica commercia vsu ad transpadanos homines foret delatā, quod ibi primum nostri eam viderant, ibi & natam putauerunt.* Cornelius autem Tacitus succini prouentum melius tenens in li. de situ, moribus & populis Germaniæ, tradit Effusorum gentes mare scrutari, & solos omnium succinum, quod ipsi Glesum vocant, intervada atque in ipso littore legere.

E re legere. Glesum autem olim appellarunt, quod instar vitri pelluceat, nam Germani vitrum Glas nominant. Sunt autem Effusi, vel ut Rhenanus legit Aestii, qui hodie Pruteni seu Borussii vocantur, apud quos nunc ut olim succinum colligitur, cuius nuper magnam copiam multiuigæ eruditionis vir Martinus Girbigus, Illustrissimi Principis Alberii Marchionis Brandenburgensis & Borussiae ducis archiatros, pro amicitiae nostræ iuce ad nos transmisit. Abundare autem hanc oram Borussiae succino notius est quam ut multa demonstratione egeat: quum enim velut peninsula sit, ob sinuosos maris flexus, terramque spaciose in freta excurrentem, sit ut vitæ pestatum in hunc succinum aduehatur. De qua re multa quoque scribit Erasmus Stella Libonothanus libro primo, de Borussiae antiquitatibus. Proinde aberrare omnes constat, qui ex populo arbore iuxta Eridanum fluitum succinum colligi putant, quum Plinio & experientia ipsa docentibus, potius in Borussia regione, a qua procul abest Eridanus, proueniat. Neque Dioscoridi, ut obiter moneam, ea quæ tum ferebatur fama, ex populi resina succinum durari probatur, ex quo inquit, ferri id & narrari, id quod etiam Marcellus Virgilius monuit. Dioscoridis autem hæc sunt verba: *ισοπέτρης* &

Glesum succinum quare dictum.
Effusi siue Aestii qui Martinus Girbigus. Borussia.

Dioscoridi fabula de succino non probatur.

ἡ τὴν αἰσθητὴν δύναμιν ἔχει τὸν ἡλιόθεν πότισμα ἔχοντα ἡδονοῦν πηγυτῶν, ἢ γίγνεται τὸ καλὸν ἡλικῶν. quod est: *Fertur lachrymam ex iis quæ in Padum amnem defluit, durari ac densari, fierique quod electrum vocant.* Eo nanque quod ait, *fertur*, insinuat id commentum non probare; quod vulgo dicebatur succinum esse populi arboris lachrymam in Eridanum defluentem, illicque induratum. Ceterum vniuersam Succini historiam fusius & verius, quam Plinius in nostris commentariis in nonum Galeni librum de simplic. medicam facultat. tradidimus. E igitur lector recurat. Quam incognitum vero fuerit Carabe Auicennæ, facili d. f. et qui pugnantes eius de huius temperamento sententias expendere velit. Capite enim 374. *secundi Canonis*, Carabe parumper esse calidum statuit: id quod & in libello de *viribus cordis tract. secund.* facit, calidum in primo, & siccum in secundo dicens. Mox vero pro sua inconstantia subdit, *Opinio tamen est quod sit frigidum.* Capite vero 344. eiusdem *B. Canonis*, *Carabe gummi calidissimum esse* docet, quod capite 510. iis confirmat verbis: *Eius gummi est ultimum in calefaciendo.* Quod ideo diximus, ut iterum Auicennæ inconstantiam Medicæ artis studiosis indicarem, quo ita sibi facilius prouiderent ne in hunc auctorem imparati inciderent, neq; illum magno suo & aliorum periculo sibi imitandum temere proponerent.

Haud recte Auicennam & Mesue herbam Mezereon, quæ a Græcis Chamelæa dicitur, inter lactariorum genera connumerare, ac cum Thymelæa confundere: multa quoque Chamelæa debentur, nominis vicinitate deceptos Chamelæa tribuere. C A P. XXII.

ER R A S S E toto cœlo in Mezereon descriptione Auicennam, Arabesque reliquos, *Leorundem* verba pulchre commonstrant. Auicenna enim capite 467. *secundi Canonis*, Mezereon ita depingit: *Mezereon est lacticinium magnum quod est duorum modorum: unum eorum est magna habens folia & spissa, & hoc est deterius amborum: & quod nigrum est, perniciosum existit. Melius Mezereon est, in quo sunt folia plurima, & similia foliis oliuæ, & subtiliora: est acutum, excoiatium, & eius acrimonia est vehemens.* Nec aliter Mesue in suo de simplicib. med. libro illam describit, dicens: *Mezereon est planta vocata apud Persas rapiens vitam, cuius stirpes eleuatur super terram circiter cubitos duos, & eius folia sunt similia foliis oliuæ sed maiora, & producit grana nigra in magnitudine fructus myrti. Est & planta lacticiniorum, maiorum, cuius species sunt plures: Est enim quedam magna habens folia & subtilia. Est & parua habens folia sicut oliuæ folia & spissa nimis: & est folia habens crispa & aspera, & ex eis aliud est colorem habens viridem, & aliud habens colorem subnigrum.* Hinc animaduertendum omnium primum, Mezereon eam esse herbam, quæ Græcis Chamelæa vocatur, id quod præter Serapionem, qui Mezereon Græcis Chamelæam dici ait, huius descriptionis quoque aperte demonstrat, hæc enim probe cum iis, quæ iam ex Arabum sententia retulimus quadrat. Chamelæam vero Dioscorides li. quarto c. 162. ita pingit: *χάμελαια κλωνία ῥβν ἔχει σπῆλαιος, ὃ ἢ ῥβν φρυγανῶν. φύλλα ἔχει ἰσάκια ὡς ῥαπῆσις, λεπτότερα ἢ τὴν πυρᾶν, πικρὰ, σπῆλαια τὴν γαστρίν, χαλεπότερα τὴν ἀρτηρίαν.* quod est, *Chamelæa adodrantes ramos habet, frutex surculosus, folia oleæ similia habet, tenuiora tamen, frequentia & amara, gustum mordentia & arteriam scarificantia.* Quam sane descriptionem pulchre cum eo Mezereon, quod melius ab Auicenna, a Mesue autem minus dicitur, quadrare videmus, adeo ut nemo dubitare possit Mezereon Arabum, Græcorum Chamelæam esse. Porro hoc demonstrato, nemo non videt errare Arabes, quod inter lactarias herbas Mezereon connumerant: nullus enim ex veteribus Chamelæam, quæ nihil aliud est quam Mezereon, ut diximus, inter herbas, quæ lac habent, collocauit, id quod patet Dioscoridem, Galenum, & alios eius farinæ auctores diligenter excutienti. Etsi ex genere lactariorum esset, aliqua certe Tithymalorum species, aut alia quedam lactaria herba, a veteribus, Dioscoride præsertim, descripta esset, id tamen quod affirmare nemo potest, quod nulla illarum descriptio Mezereon competere queat. Quod autem Arabes, Mesue præcipue, Mezereon seu Chamelæam cū Thymelæa confuderint, ex illorum verbis quoq; demonstrabimus. Nam cum Mesue ait, eius stipes eleuatur super terram circiter cubitos duos, & producit grana nigra in magnitudine fructus myrti, ad Thymelæam certe referendum erit, de qua lib. 4. cap. 163. ita scribit Diosc. *θυμολαία ῥαβδὸς ἢ ἀνὸς καλὰς ἢ πολλὰς ὅταν διπλήσῃ, φύλλα χαμελαίας ὅμοια, & μετὰ αὐτῶν ὁ καρπὸς, ὡς μέγαν μικρὸς ἐστὶν ὅλῳ.* id est: *Thymelæa ramos edit speciosos & multos binum cubitorum. Folia Chamelæa similia, inter quæ fructus paruum*

Carabe Auicennæ incognitum.

Mezereon Græcis est Chamelæa.

Mezereon inter lactarias herbas non connumeranda.

Arabes Chamelæam cū Thymelæa confundunt.

Arabes Cha
melææ quæ
Chamæleō
fi debentur
tribuerent.

Chamelza
inter vene-
na connu-
merari non
debat.

Plantarum
facultates
ex Arabib.
discere peri-
culosum.

scriptis conferenti. Nos tamen, cum id abunde Manardus noster in suis in Mesuë an-
notationibus præstiterit, superuacaneum esse duximus ista denuo ad exemplum præ-
cedentium conferre. Hinc iterum discant studioi, quam periculosum sit, ex Arabib.
auctoribus plantarum discere vires, qui ita singulas confundunt, vt impossibile sit nõ
capitaliter eum errare, qui illos sequi voluerit. Præstaret hoc nomine illorum decre-
ta plane esse extincta, imo auctores ipsos vna cum illis radicitus perditos. Ergo sane
Arabum auctorum lectionem nunquam ita medicinæ initiatis perniciosam esse an-
tea, vt hodie, credidi, indies enim magis atq; magis quantum illis incommodare possint
anima duerto, quapropter mitius quam par erat etiam illos olim a me tractatos esse fa-
teor. Iam multo acerbius tractand. sarbitor, vt hoc pacto posteris saltē consulatur, ne
Arabica illa lupanaria incidant improvidi. Et certe me illorum hostem futurum esse
omnium acerrimum publice omnibus denūcio, m. ioriq; conatu quam hactenus vn-
quā cœpi illorum castra oppugnare pergam, neq; desinam, modo vita Dei benigita-
te supersit, donec castris penitus exuero. Quis n. has pestes in vitam humanam diutius
grassari pateretur? nemo sane, nisi qui homines, Christianos præsertim, omnes abla-
tos iri cupiat. Ad fontes potius pergamus, illicq; aquā puram nullis inquinamentis p-
tuitatam hauriamus. Exemplo nobis sit Mezereon, seu, vt Græci vocant, Chamelæa,
cuius facultates vt consulisime tradiderunt Arabes ita breuissime ac omnium diluci-
de Græci. Quid n. breuius, quid deniq; magis perspicuum quam hæc Dioscor. verba,
quibus in hunc modum Chamelæam depngit? *παντες τὰ φύλλα καὶ τὰ κλάδια φλέγμεν ἐν ὕδατι, μέλιτος
ὡς καὶ ποτίω λαμβανόμενα, μισγόμενα διπλοσίου ἀλφειδὲς πρὸς τὸ μέλιτος χαμελαιῶς ἀνταμειβόμενα ἢ ὕδατι ἢ μέλιτι
καὶ τῷ ποτίω ἢ ἀλφειῶς ἀμειβόμενα ἢ ὕδατι λαμβανόμενα ἀνταμειβόμενα λεία τὰ φύλλα μετὰ μέλιτος ἀνακαταίρειται ἢ ὕδατι
ἢ μέλιτι ἢ τῷ ποτίω, hoc est: Eius folia pituitā bilem q; per inferna purgant, maxime in catapotio deuora-
ta, vni Chamelæa partis, duab. Absinthii mixtis. Conformentur autē aqua aut melle in pilulas. Hæc
vero in ventre non conficiuntur, sed qualia sumt a fuerunt excernuntur. Reliqua quæ sequuntur, su-
pra a nobis interpretata sunt.*

*Auicennam Calamentum cum Origano confundere, atq; utriusq; vires promiscue
docere.*

C A P. XXIII.

CALAMENTVM Auicennam confundere cum Origano testantur ea, quæ
scribit capite 158. secundi Canonis, in hunc modum: *Calamentum aliud est fluuiiale, & ali-
ud montanum, simile Hyssopo in sapore, & similiter folia eius sunt ei similia. Et est alia species eius
qua nominatur Albanium. Et est quadam species eius qua vocatur Calamentum hirci, & virtus e-
ius est sicut virtus aliorum acris, & montanum est fortius fluuiali. Quibus sane ex verbis euidē-
tissimum fit cuius sanie re mente prædico, Auicennā toto cœlo errare, imo vix verbū
vnum proferre quod non veritatē repugnet. Verū quidē est, Calamentū aliud esse flu-
uiiale, aliud vero montanum. in hoc enim Nicandrū sequi videtur, qui in theriaci. suis
duo tantū Calaminthes genera, aquaticū alterū, montanum vero alterum facit. F. l-
sum autem quod montanum Hyssopo similia folia habere dicit, nam id, Dioscoride
auctore, Ocymi potius folia habet. Proinde genera Calamenti recte constituisse cer-
tum est, perperam autē illis Hyssopi folia, quæ Origano debentur, adaptauit, quæ ad-
modū Dioscorid. docet li. 3. c. 30. organū ita depngens: *ὄργανον ἡερacleωτικὸν φύλλον ἔχει ἡμφερὲς ὡς ἀ-
πὸ σπινθόδιον δὲ ὑψηλὸν ἔστι, ἀπὸ ὧν δὲ ὄργανον καὶ ἐπὶ ὧν ὄργανον τὸν ῥαβδῶν τὸ σπινθόδιον πυκνόν, ἢ δὲ ὡς ἡερacleωτικὸν λαμβανόμε-
να τὰ φύλλα ἐστὶν, & μέλαν ἰσχυρὰ ὡς ἀπὸ ῥαβδῶν ἡμφερὲς ἔστιν, ὡς ὄργανον ἡερacleωτικὸν ἀνέχει ὡς ἀπὸ τὰ φύλλα καὶ τὰ κλάδια,
id est: Origanum Heracleoticum folium habet Hyssopo non dissimile, non tamen umbellam in ro-
ta speciem orbiculatam, sed veluti multifidam ac diuisam. Semen illi in summis virgis haud qua-
quam densum. Quæ vero Onitis appellatur, candidioribus est foliis, & Hyssopo magis similis.
Tragoriganum frutex est exiguus, Origano aut serpillio sylvestri foliis & ramulis similis. Ex qui-
bus utique verbis Auicennæ, error liquido sese prodit, quod scilicet Calamintham
cum Origano ita miscuerit. Vt nisi quis oculatissimus sit, hæc genera discernere pos-
sit. Manifeste tamen hallucinatur cum Calamentum hirci tertiam facit speciem,
cum nemo veterum Tragocalamintham, sed potius Tragoriganum descripserit, nec
inter Calaminthes, sed Origani species, cōnumerarit. Id quod Plin. quoq; facit lib. 20. c.
27. post Heracleoticū & Onitin, Tragoriganū sylvestri serpillio similem inter Origani
species recensens. Quod vero deinceps ait, virtus eius est sicut virtus aliorum acris, i-
terum, ad Calaminthæ respexit species, harum enim omnia folia gustu feruentia &
acria**

Auicenna
Origani &
Calamin-
the vires
confundit.

Anic. Calz-
minthæ
tribuit, quæ
Tragoriga
no debetur

Непрет:

Arabum de
herbarum
facultatib.
placita me-
ra menda-
cia.

С А Р. XXIII.

E E e 3.

330. Operum Leonhard. Fuchsi Pars I V.

Thefific a
pud Auic.
quid.

usque descriptione ac viribus satis innotescet. Auicenna, nanq; ita de suo Thefific. 710. A
secundæ Cax. scribit: Est mundificatiua, solutiua, & maturatiua. Et est ex eis, quæ attrahunt vehe-
menter & violenter ex profundo corporis. Facit nasci pilos & confert alopitia valde. Prodest oc-
cultationi sanguinis, sed non dimittitur super ipsam præter horam. Similiter confert vestigiis, pa-
no, & albaras. Inungitur cum compressione super mollificationem neruorum, & super podagram,
& super iuncturas frigidas. Confert sputo saniei, & difficultati anhelitus, dolori amborum late-
rum, & proprie dolori ipsorum, vel cum oleo antiquo linita, & ut emplastrum superposita. Ad-
iuvat ad expuendas superfluitates linita. Dioscorides vero haud aliter de Thapsia libro

quarto capite 147. scribit, inquiens: θύναμις δὲ ἔχει καρτερικὴν ὁ, τε φλοῖς τῆς ρίζης καὶ ὁ χυλός. κίτταται δὲ καὶ
μετασχηματίζουσα θύναμις ὅ, τίς ὁπὸς καὶ ἡ ρίζα, πάντων μέγιστον ἴσθι θύναμις, ὅπου τὸ εἶναι ἐκ δάδης ἰλαύουσα, ὅθεν ἀλωπεκίας κα-
ταχρησθῶν ὁ χυλός, ἡ ἡ ρίζα χλωρὰ, ὡς εἰς βόρην δαί, σὺναι, ὅ παρὰ τὴν αἰρὶν πεινῶνται λέει ἡ ρίζα ἡ ὁ χυλός συνδύαν τῶ
ἐκ πρῶτος, δει δὲ καὶ πάλιν δυοῖν αἰρῶν ἔαν. αἰρεῖ δὲ καὶ ἱφλιν σὺν μέλιτι κατὰ χροῖός, καὶ λήσας ἀφίστησι, φύματι τε ριπίει μετὰ
δὲ κατὰ χροῖόν, ὁ χυλός, χρῆσιμος δὲ καὶ χροῖός, καὶ ἐπὶ τῶν χροῖας ἔχοντων δὲ χροῖας πρὸς τὸν δόρυ ἡ πεινῶν τῶν πώδας, ἡ
ἐθρεῖ. αἰρεῖ δὲ καὶ αὐτὸς πᾶσι πᾶσι δὲ καὶ μετὰ χροῖας, πᾶσι δὲ καὶ ἀλγύμασι χροῖας καὶ ἀνωμαλίας. quod est: Tam cor-
tex radicis, quam succus, purgandi vim habent. Succus deniq; pariter & radix facultatē possident ex
alto euocantem, omnium maxime quæ pares cū eis vires adepta sunt, ubi eximo quidpiā trahendū est.
Vnde succus illitus, aut radix recens confricata, alopecias explet. Radix aut succus cū aquis thuris ce-
ræ, portionib; sugillata, liuoresq; tollit. Oportet autē non plus binis horis dimittantur. Vitia cutis in
facie cum melle illitus emendat. Lepras pellit. Tubercula quoq; disiccit cum sulphure perunctus suc-
cus. Vtiliter in diuturnis laterum, pulmonum, pedum, articularumque affectibus illinitur. Eius
purgatio conuenit suspiriosis, diuturnis laterum doloribus reiectionibusq;. Gal. etiam li. 6. de simpl.
med. facult. Thapsiam inter ea medicamenta, quæ ex alto vehementer trahunt recen-
set. Eius verba hæc sunt: θύναμις θύναμις ἐπὶ καὶ ἰσχυρὸς θερμαίνον καὶ δυνάμις σὺν ὑγρότητι. ἔκταται γὰρ ἐκ δάδης
ἐκείνης, καὶ αὐτὸς δὲ φέρει τὸ ἐλκύν, quod est: Thapsia acrem ac valenter exalfacientem facultatem,
cum humiditate coniunctam habet, quam ob rem ex alto violenter trahit, & quod trahit discutit.

Thapsia ve-
hementer
ex alto
trahit.

Id quod & Paulus in septimo facit, ita vt euentissimum sit Thapsiam eandem cum
Thesfia Auicennæ esse. Ceterum quod Græcis Ixias est, id Auicennæ Aldibic di-
citur, quemadmodum ex eorum quæ vtrique de iis scribunt, collatione pare-. De Al-
dibic enim Auicenna Fen. 6. Can. 4. tract. 1. sum. 2. capite 33. ita scribit: Si quis bibit Aldibic,
accidunt illi rugitus in ventre & punctura absque fluxu ventris & vertigo. Cura: Oportet vt in po-
tu dentur aqua & mel, & euomat ea, & clysterizetur clysteri leui, & confert ei sumere in potu absin-
thium cum melle, & syrupum acetosum. Et illud quod appropriatur cum decoctione rutæ. De Ixia

Aldibic, I-
xias est
Græcorum.

vero Dioscor. libro sexto capite 21. ita: ἱξίας ἐστὶ τῶν πινέσθαι βορβορυγμὸς τε καὶ ψόφος μετὰ λειποθυμίας ἐπὶ
φίρει δὲ καὶ τὸ ἀπορρεῖν π. ἐστὶ δὲ αὐτὸς μετὰ τὴν ἐξέμισιν τὸ πάλιν ἡ μετὰ τὸ τὴν ἡλικίαν λαβὼναι πινόμενον ἀψινθίου δασύρου γὰρ
σὺν εἰνὰ πικρῶ ἢ ὀσμύλιν, πικρὰ τε αἰγρίου σάκεα, id est. Ixias inter potandum intestinorum strepitus & tu-
multum affert, nec quicquam tamen secedit. Post vomitionem multam, aluumque solutam, auxilia-
tur aqua in qua absinthium maduerit, cum vino copioso, aut aceto mulso pota, rutæque sylvestris se-
men. Vnde iterum constat Aldibic Auicen. nihil esse aliud, quam Ixiam Græcorum.
Animaduertendum tamen multa esse in Auicenna hoc loci, vt passim alias, depraua-
ta, vt dum eruca pro rutæ legitur, vaporetur pro potetur, vt abunde patebit ea, quæ Diosc.
scribit, diligenter expendenti, ita vt hodie non exister Auicenna auctor perniciosior,

Auicenna
vix auctor
alius perni-
ciosior.

quando vix paginam in illo offendere liceat, in qua non insignis error committatur. E
His itaque sic habentibus, manifestum erit, Auicennam Thapsiam cum Ixia confun-
dere, quod illi tribuat, quæ huic conueniat. Vniuersi nanque effectus, quos ille Fen. 6.
Can. 4. tract. 1. sum. 2. c. 13. Thesfia adscribit, pares sunt iis, quæ Dioscorides Ixiæ assignat:
Verba Auicennæ subiiciamus: Thesfia est gummi rutæ montana, & quandoque sentitur in sa-
pore eius, sicut sapor albedarungi. Accidit illi qui bibit eam, retentio eorum omnium, quæ currunt ex
vtriusque viis, & apostematur lingua, & accidunt strepitus & inflatio, & adustio in gutture. Cura
est vt properet & euomat & sumat in potu syrupum acetosum, & infusionem absinthii, & ex eis,
quæ nota sunt apud eos, sicut bezahar. Quibus sane verbis nemo non videt, Auicennam
Thapsiæ tribuere, quod Aldibic, quæ Ixias est, ex eiusdem auctoritate conuenit. Cuius
rei Diosc. etiam testis est, qui loco antea citato ita scribit ἱξίας δὲ ὅς καὶ οὐλόφωτον καλεῖται ἐν τῇ πρῶ-
τῃ διότι ἀπὸ μὲν καὶ τὴν πρῶτον ἐμφανὲς ἐπιφέρει δὲ γλῶσσης φλεγμονὴν ἡγορεῖται, καὶ τὰς ἐκκρίσεις ἐπὶ τῇ πρῶ-
τῃ, βορβορυγμὸς τε καὶ ψόφος μετὰ λειποθυμίας ἐπιφέρει δὲ καὶ τὸ ἀπορρεῖν π. ἐστὶ δὲ αὐτὸς μετὰ τὴν ἐξέμισιν τὸ πάλιν, ἡ μετὰ
τὸ τὴν ἡλικίαν λαβὼναι πινόμενον ἀψινθίου δασύρου γὰρ σὺν εἰνὰ πικρῶ ἢ ὀσμύλιν. Hæc verba paulo ante interpreta-
ti sumus, ideo vt denuo iterentur nihil opus est. Paul. certe Ægin. li. 5. c. 47. haud aliter quā
Diosc. Ixiæ assignat, quod Thapsiæ Auic. dū ait: Ixias, quæ uolophonō quoq; vocatur, inter po-
tandum

Arandum ocymo quiddā simile gustu & odore refert. Valentē lingue inflammationē facit, omnia etiā excrementa suppressit, & cum animi deliquio intestinorū strepitum & tumultū excitat, nec quicquā tamen excernitur. Opem adfert post vomitionem, aut alui deiectionem, cum largiore vino, aut oxymelite, aqua in qua absinthium maduerit pota, ita vt nihil clarius sit quam Auic. cum Ixia confudisse Thapsiam, atq; adeo vtriusq; vires ac naturam ignorasse. Si enim Thapsia naturam satis perspectam habuisset, nunquam certe illam esse sylvestris rutæ gummi scripisset, id tamen quod non solum, in loco, sed variis facit, præsertim cap. 710. secūdi Can. & Fen. 6. Can. 4. toties iam citati. Minime autem Thapsia alio nomine ruta sylvestris, sed ferulæ potius sylvestris, aut ferulago dicitur. Testis Diosc. qui ita scribit: *ἡ θάψια ὅμοια φερίλῳ ἐστίν, οἱ δὲ φερίλα συλβέρις, ὅτι τῇ ἑλῇ φύσει ὁμοίαν ἔχει τῇ φύσει* quod est: *Thapsiam Romaniferulam*

Thapsia nō est sylvestris rutæ gummi. Thapsia alio nomine ferula sylvestris dicitur.

Balii ferulam sylvestrem, quod tota natura ferula similis sit, appellant. Porro ignorasse Thapsiam Auic. inde etiam colligi potest, quod sibi ipsi in Thefisia contradicit. In secundo enim Can. docet, quod in radice eius, & corticibus ipsius, & lachryma eius, est solutio, id quod & Dioscoridem, vt supra annotauimus, fecisse constat, Fen. vero 6. Can. quarti contrarium plane tradit, nempe quod accadat ei, qui Thefisiā bibit, retentio eorum omnium, quæ currunt ex vtriusque viis. Quis autem tam stupidi est animi, qui retentionem & deiectionem excrementorum contrarios esse effectus non intelligat? Sed quid multis moror? si Auicenna Thapsiam ab Ixia veneno secernere potuisset, nunquam sibi tam pugnantia docuisset. Hic rursus monitos esse volo medicinæ solidioris studiosos, quō sibi vel hinc etiam cauere discant, ne Auicennæ decreta, tanquam Delphica quædam oracula suspiciant, id quod magna hodie ineruditorum Medicorum pars facit, quod vniuersa fere illius ambigua & inter se mire pugnantia sint. Neq; est, cur de illo mirentur: transcriptor enim cum aliorum tantummodo fuerit, singula vera, falsa, sine iudicio & nullo habito delectu, vt cunque sese obtulerunt cortasit, nec aliud studuit, nisi vt Canonem suum ad iusti voluminis magnitudinem deduceret, non animaduertens, quomodo temere consarcinati centones sibi responderent, perinde ac sicæc sea, quæ collegerat, esset obtrufurus.

Auicenna sibi ipsi in Thefisia contradicit.

Herbas quatuor, Alsinen videlicet, Helxinen, Anagalliden, & Myosotida, natura & figura plurimum distantes, Auicenn. vno eodemq; capite sub Auricula muris appellatione, confudisse.

C A P. XXV.

AVICENNAM iam dictas quatuor herbas confundere, ex eiusdem verbis, quæ capite 18. secundi Canonis scribit, monstrabimus. Auricula, inquit, muris est herba, cuius virtus secundum Galenum propinqua est virtuti herba, quæ vitrum abstergitur. Quibus sanè verbis Auicenna herbam Alsinen dictā depingit, quæ helxini vitrea extergenti vasa, similes vires obtinet. Testis est Gal. qui lib. 6. de simpl. med. fac. Alsinen ita describit: *ἡ ἄλσιν ἐστὶν αὐτῇ τῇ διώματι τῇ ἑλξίνι, ἥ ἔχειται τε καὶ ὑγροποιεῖται.* quod est: *Alsine ipsa facultatem helxines habet, nempe refrigerantem & humectantem.* Diosc. quoq; qui lib. 2. capite 172. ita tradit: *ἡ ἑλξίνη ὁμοίαν διώματι ἔχει αὐτῇ τῇ ἑλξίνι,* id est: *Alsine in vniuersum eadem, quæ helxine potest.* Quibus subscribit, Paulus in septimo dicens: *Alsine vires omnino æquales habet ei, quæ dicta est Helxine.*

Et Plinius lib. 27. cap. 4. inquit: *Alsine emendat omnia, quæ Helxine, sed infirmius.* Per herbam vero, quæ vitrum abstergitur, Auicennam intellexisse Helxinen, notius est, quam, vt demonstrari debeat, illam enim in extergendis vitris esse valentem omnes testantur veteres, in primis Galenus, qui lib. 6. de simp. med. fac. de Helxine in hunc modum scribit: *τὸ εὐκλεῖς εὐαργὴ πᾶσι τοῖς παρῆχταις ἐπὶ τῷ αἵματι σκεδᾷ.* quod est: *Euidens extergendi experimentum prebet & in vasis vitreis.* Nec alitnde certe Viceolaris, seu, vt vulgo nominatur *Vitriola*, dici cœpit, nisi quod extergendis vrceolis, vasisque vitreis, experimento esse efficax inuenta sit. Ceterum post i. m. citata verba Auicennæ ita inquit: *Et hoc nomen concessum est duabus herbis, quarum vna est, quam nominat Galenus.* Quæ quidem verba vera sunt: interdum enim tot mendaciis veritatem etiam inserere voluit: nam auriculæ muris nomen alfini quoque herbæ ab auctoribus tribuitur, quod folia murium auribus similia habear. Ita Diosc. *ἡ ἄλσιν, οἱ δὲ μὲν ὠτα.* id est: *Alsinen non nulli auriculam muris vocant.* Et Gal. *ἡ ἄλσιν ἢ μὲν ὠτα,* hoc est, *Alsine, aut auricula muris.* Paulus deniq; *Alsine, quæ aliqui Græcorum auriculam muris nominant.* Plin. quoq; *Alsine, quæ quidam Myosoton appellant.* Licet aut auriculæ muris alfini cū ea verba, quæ proprie *Myosotis* dicitur cōmune sit, tamen differunt

Helxine vitrea abstergitur.

Vitriola.

adhuc natura & figura, quando constet illam refrigerare, hanc vero calfacere. Sequitur apud Auicennam: *Et altera quam nominauit Dioscorides, & existimauit quod sit similis Volubili, nisi quia habet minora folia.* Quæ verba nequede Myosotide, neque de alline nuncupata intelligi possunt, quod neutra illarum Volubili; neque in foliis, neq; in flore similis sit. Quare vt ad aliam quandam herbam ab iis diuersam referantur, necesse est. Ad nullam vero aliam rectius, quam ad eam, quæ Helxine aut Cissampelos Græcis, Latiniis Conuoluulus, nostris Volubilis maior, vt paradoxo 18. diximus, vocatur, referri poterit: huius enim folia Hederæ, quam hic per Volubilem intelligit, similia sunt, minora tamen: id quod testatur Dioscorides lib. 4. cap. 42. dicens: ἡλξιν ἐστὶν κισσαμπελὸς, ἔχει φύλλα ὅμοια κισσῷ ἐλάτῳ αὐτῇ. quæ verba supra per nos interpretata sunt. Quare secundam quoque herbam, Helxinen scilicet, ab Auicenna esse descriptam hoc capite de auriculâ muris monstrauimus. Sed vt & tertiam illic depictam esse ostendamus, agere quæ in Auicennâ subsequuntur excutiamus. Ait autem: *Et est herba expansa super faciem terra, paruos habens stipites, & azulinos flores, cuius semen semini Coriandri similatur, & est calida.* Quibus vtique verbis non Auriculam muris proprie nominatam, sed Anagallidis alteram potius speciem, quæ caruleum errorem habet, describit. Duo enim esse Anagallidis genera, flore tantum distantia. Dioscorides libro 2. cap. 167. in hunc modum scribens testatur: τὴν ἀναγάλιν δύο εἶδη ἐστὶν ἀμφὲρ αὐτῆς. ἡ μὲν γὰρ καλεῖται ἡλξιν, ἡ δὲ τὸ φονικόν, ἀπλῶς. ἡ μὲν δὲ ἐστὶν κισσοειδὴς καὶ τὴν φύλλα ἔχει ὅμοια τῇ κισσῷ, καὶ τὴν ἀναγάλιν καλεῖται. καὶ τὴν ἀναγάλιν καλεῖται. id est. Duo sunt Anagallidis genera; quæ flore tantum distant. Nam quæ caruleo flore est, femina dicitur: quæ vero puniceo, mas. Frutices sunt in terra iacentes, foliis in quadrangulo caule paruis, subrotundis, ad Helxines folia accedentibus: semine rotundo. Plinius quoque lib. 25. cap. 13. duo eius genera facit, ita scribens: Duo genera Anagallidis. Mas flore phæniceo, femina caruleo, non altiores palmo, frutice tenero, foliis pusillis, rotundis, in terra iacentibus. Nascuntur in hortis & aquosis. Ex quibus liquido apparet Auicennam alteram etiam Anagallidis speciem sub hoc capite Auriculæ muris descripsisse. Quod vero deinceps ait Auicenna: *Inquit Musai-hach, iuuamentum eius est iuuamentum Absinthii,* non ad Anagallidas, sed ad eam herbam quæ proprie auricula muris nominatur, referendum erit: huic enim perinde atque Absinthio vis enecandi lumbricos inest, id quod Paulus etiam Aegineta libro 4. capite 57. docet, vbi inter alia etiâ præsidia lumbricos enecantia, *Auricula muris herba decoctum* quoque enumerat: ita vt euidentissimum sit, Auicennam vno eodemque capite quatuor herbas, natura & figura plurimum differentes, miscuisse: primum enim, vt retulimus, quæ Alfini, dein quæ helxini, tertio, quæ Anagallidis speciei, & postremum quæ Myosotidi conueniunt, narrauit. Differre autem non tantum naturâ, sed & figura prædictas herbas testantur vno ore veteres, Dioscorides, Galenus, Paulus, Plinius atq; alii, qui seorsim & formas & facultates illarum pingunt atque exprimunt, id certe quod minime fecissent, si easdem & natura & forma diuersas non esse agnouissent. Quia etiam Auicenna ipse cap. 33. secundi Canonis, oblitus, quod antea eius proprietates in Auriculâ muris tractauerat, seorsim de Anagallide tanquâ ab illa diuersa egit. Cur vero in hunc errorem inciderit Auicenna, nullo alio nomine factum est, nisi quod nomen Auriculæ muris omnibus his quatuor herbis a quibusdam ob foliorum similitudinem inditum sit; nam & Helxine seu conuoluulus, vt in Myosotide tradit Dioscorides, a nonnullis auricula muris dicta est, id quod & Anagallidi accidit; sunt enim qui adhuc hodie eandem hoc nomine appellant. Cum itaq; videret vno omnes appellari nomine, putauit, vterat materię medicę plane ignarus, easdem nec natura nec forma inter se distare. Porro iam dictarum herbarum etiam facultates confundit, Helxini enim tribuit, quod Anagallidi debetur, id quod ita Collige. Capite de auriculâ muris inter cetera sic scribit: *illa quam nominauit Dioscorides, extrahit spinas & surculos.* Antea demonstrauimus, eam herbam, quam paulo ante etiam nominasse Dioscoridem, & Volubili similem esse dixerat, esse Helxinen seu Cissampelon, cui certe ea facultas extrahendi surculos minime conuenit, sed Anagallidi potius, quemadmodum in capite proprio de anagallide metipse docet Auicenna. Nec dissentit Diosc. qui loco paulo supra citato de Anagallide ita scribit: ἀμφότεραι σκολόπαν ἐκπῶσιν αἰκῶν. id est: Vtraque surculos aculeos ve extrahunt. Et Galenus libro 6. de simpli med. facul. in hunc modum scribens. ἔχουσι καὶ ἐν ὑπόθεμον, ἀκάνθων, ὥς τι καὶ σκόλοπος ἐκπῶσιν αἰκῶν. quod est: Habent nonnihil caloris, & quandam trahendi facultatem, adeo vt

Cissampelos.

Duo anagallidis genera.

Auriculæ muris nomen quatuor herbis inditum.

Anagallis extrahendi surculos facultatem obtinet.

Ignorasse Auicennam, Serapionem, Pandectariumq; Isatim herbam, quam illi Nil & Nilech appellant, variam & ancipitem eorundem de illa sententiam satis indicare. CA P. XXV.

C δὲ τὸ πικρὸν, ὡς τὸ μέλιον, λεπτὸν. quod est: *Isatis domestica* qua lanarum tinctorum utuntur, folium habet Plantagini simile, verum pinguius, nigriusq. Caulem autem duobus cubitis altiozem, Isatis vero sylvestris sativa similis existit. Folia habet maiora ad lactucæ folia accedentia, caules tenuiores, multifidos, rubentes, in cacumine folliculos linguarū quandam effigiē referentes, multos pendulosq. habentes, in quibus semen. Florē luteum, tenuem. Quæ sane descriptiones ita quadrant, ut nemo non, nisi talpa cæcior sit, videat, Nil siue Indicum eandem esse cum Isatide herbam, id certe, quod ex facultatibus etiam, quas suo Nil aut Indico tribuunt Arabes, abunde colligi potest: plane enim cum iis quæ Græci Isatidi assignant conveniunt. Avicenna namque cap. 116. secundi Canonis, hos effectus Nil ascribit: *Est, inquit, stypticū, & prohibet fluxum sanguinis & quod est domesticum exsiccat fortiter sine mordicatione, & detumescere facit apostema-*

Eglutinat, etiam si in capitibus musculorum fuerint: & sanguinis profluvio laborantibus parti-
bus utiliter illinitur, tumores œdematos mirifice digerit simul ac reprimat, & aduersus omnia
ulcera maligna mirabiliter resistit, etiam si putrescant, etiam si exedantur. At Isatis syluestris
licnosis quoque utilis existit. Galeno subscribit Paulus in 7. & Dioscorides loco an-
te citato dicens: διώται τὴ φύλῃ κατέπλαστέρα πάντων οἰδηματῶν, καὶ φύματι καὶ ἰσχυρὰ ἱερὲς ματὶ
κοιλῆ. αἱμορροίας τε στήθων, καὶ φαραγγικὰ, καὶ ἐρπητος ἐκυστῖλά τε τι σπηλιδίους ἱερὲς κύνειν. hoc est, *Folia illita;*
tumores omnes discutere possunt, & tubercula, cruenta vulnera conglutinare, sanguinis eruptiones si-
stere, exedentia, ignes sacros, & putrescentia ulcera sanare. Ita ut evidentiſſimum sit ex iam an-
notatis, Nil Arabum nihileſſe aliud, quam Isatim Græcorum. Ceterum ignorasse Auicen-
nam, Serapionem, Pandectarumque, Nilipsum, utcumque ex Græcorum sen-
tentia illud descripserint, indicio est, quod tam ancipites in illo depingendo fue-
runt. Serapion namque paulo ante adducta notificatione non contentus aliorum
etiam de eo sententias affert, quas certe improbare debuisset, si herbam Nil diſtam
probe cognitam habuisset. Verba autem Serapionis hæc sunt: *Et est arbuſtum pulueru-*
lētum, eleuatur cum ſtipide ſuo longitudine vnius brachii, & habet germina ramorū, & in ſummita-

Auicenna
& Serapion
Nil ignoras
uerunt.

A dos, vllum eorum esse posse vsum expertus sit, adeo vt Arabum post Galenum medicâ tractantium experimentum nobis obici non queat. Si enim Galenus diligentissimus omnium medicæ materiæ facultatis explorator, nihil in iis, quod vel ad sanitatem tuendam, aut morbos curandos conduceret, explorari potuit, non est cur credamus, Arabes id ipsum inuenisse, qui ne vnam quidem Galeni, quantum ad eruditionis & ingenii acumen atque perspicacitatem attinet, assecuti sunt. Galeno subscribit Plinius, non ille naturalis historiæ scriptor, sed huic posterior, Valerianus Medicus vocatus, lib. 4. de re med. cap. 40. de Ziziphis dicens: *Zizipha modicum cibum corpori præstat, licet illis saporis nonnulli gratia lenocinetur.* Habent tamen plurima incommoda, ægre concoquuntur, sitim accendunt, prægrauant stomachum, difficillimum reddunt officium ventris.

Quinetiam Auicenna ipse capite iam citato Galeni sententiam probat, & suam acerrime damnat, suoque sese, vt dicitur, iugulat gladio, inquiens: *Sermo quidem in eis bonus est ille, quem dixit Galenus: non reperi Iuiubas in conseruanda sanitate, & remouenda aegritudine aliquid operantes, sed reperi eas difficilis digestionis, & pauci nutrimenti.*

Præterea ex iam dictis perspicuum fit, inligniter falli iuniores Medicos, Razim imitantes, Iuiubas ad purificandum sanguinem, scilicet, vt illi loquuntur, ad sanguinis multiplicationem, & aluum leniendam, passim adhibentes, cum tamen fieri non posset, quandoquidem ventriculo inutiles sint, difficulterque concoquantur, vt sanguinem purificent: crassiorem certe multo quam antea fuerit reddunt, tantum abest vt puriorem facere possint. Id quod verum esse Auicennæ etiam illorum principis testimonio

conuincemur, qui ita in capite de Iuiubis inquit: *Ingrossant sanguinem, & id ipsum viscosum faciunt.* Et illorum existimatio, qui putant, quod ipsæ clarificent sanguinem & lauent eum, est existimatio corrupta, ad quam ego non declino, & nutrimentum earum & digestio sunt difficilia. Quid per superos oro his verbis apertius? ita vt mirari non satis possim, qui factum sit, vt conuiuentibus oculis hunc locum pertransierint; cum tamen assidue Auicennam, præ illo omnibus aliis contemptis auctoribus, in manibus habuerint. Manifestissimum itaque est, errare in vniuersum Iuniores, quod Iuiubæ fructui aliquem esse in sanguine purgando, & aluo leniendam vsum decant, quum tamen constet quicquam ad eadem conducere posse. Facultates autem nonnullæ quas illi fructui tribuunt, folijs radici & cortici potius eius arboris Iuiubas ferentis conueniunt, vt est mitigare tussim, & ad vesicæ dolores prædesse. Testis eius rei Plinius ille

Valerianus est, dum libro paulo ante citato in hunc modum scribit: *Folia tamen ipsa contrita & imposita spleneticos & hydropicos adiunare certissimum est. Radicis & corticis eadem virtus habetur, quorum succus ex melle coctus tussim mitigat, cum mero mixtus iecori medetur, vesicam leniat, urina largiori.* Quomodo autem Galeni, Pliniique & Arabum sententiæ inter se pugnantes conciliandæ sint, tæm primo nostrorum de stirpibus commentariorum in historia Ziziphi monstrauimus. Ad hunc igitur locum, ne idem nobis sæpius dicendum sit, lectorem amandamus. Verum hic nobis aduersatur Montuus, ac suam temeritatem pulchre prodit, telluris ratione simplicium medicamentorum commoditates effectusque commutari dicens, vt liquet de Persica planta in Ægyptum translata: atque adeo in Galeni

patria Iuiubas seu Zizipha vsui Medico inutilia tui de fatetur, nostras autem hodie salubres. Quomodo enim in Pergamo tantum inutiles fuisse Iuiubas afferre potest Montuus, quati illic solum & nusquam alibi medicinam professus sit Galenus, quum tamen constet, illum varia perlustrasse loca, & in Italia etiam, Roma nimirum ciuitate, omnium tum maxima, ægrois curandis operam dedisse? Quare easdem, quas Montuus, ipse etiam agnouit Iuiubas, illasque iuste, vt pote inutiles expertus, damnavit. Et ne id transeamus, merito accidit Montuo, vt dum Arabes suos ab errore vindicare nititur, ipse in errorem alium incideret, vt recte sibi illud occini possit: *in xapôdri êκφυρσι, τῶν ὀκλῶν ἐκείνων.*

Neque enim Persica planta, vt ille putat, in Ægyptum translata pristinas interficiendi vires amisit, sed Persica potius, quæ a Persica arbore diuersa est. Testis est Dioscorides, qui seorsim de vtraque scribit, id quod Galenus etiam facit. Libro enim 7. de simpl. med. facult. de Persica agit, in 8. autem de Persea. & in lib. 2. de alimentorum facultatibus iterum seorsim de vtraque tractat. Quod vero Persea fuerit, quæ in Ægyptum translata vires amisit, testantur quæ scribit Dioscorides lib. 1. cap. 155. *περί τῆς περσικῆς, in hunc modum: τὴν δὲ ἰσχυρότατην ἔχει ἐν ἀφροδίτῃ ἀναπτύσσουσαν, καὶ μετὰ τὴν δὲ αὐτῆς ἀλγυπτίαν ἀναπτύσσουσαν.*

Montui obiectio exploditur. Arabes Galeno ingenii acumen impares, Plinius Medicus.

Iuiubæ sanguinem non purificant.

Nonnulla quæ folijs, radici & cortici tribuenda erant, Arabes perperam ad fructum referunt.

Montui respondendum solum inueniuntur.

Persica differt a Persica.

Persica in Ægyptum translata vires interficiendi amisit.

ἐδιδιδμεν γὰρ τοῦτο. quod est: *Prodiderunt quidam hanc arborem in Perside letalem esse, translataque in Aegyptum mutata natura edendo factam esse.* Et Galen. lib. 2. de ali. fac. dicens: εἰδὼν καὶ τὴν τὸ φυτόν ἐν αἰγύπτῳ εἶναι, τὸν μέγιστον ἐν αὐτῷ δένδρον. ἰσχυροῦσι δὲ τὸν καρπὸν αὐτῆς μοχθηρὸν ὄντως ὑπάρχειν ἐν πύσσει, ὡς αἰγύπτῳ τῶν φαρμάκων. εἰς αἰγύπτῳ δὲ κομιθεὶς ἐνταῦθα ἐδιδιδμεν περὶ γινώσκοντες ἰατροὺς ἀπὸ τοῦ αἰγύπτου, ὡς καὶ ἐν τῷ μέγιστῳ εἶναι. id est: *Hanc quoque plantam in Alexandria vidimus, que ipsa etiam magnis arboribus est annuenda.* Tradunt huius apud Persas fructum tanta perniciem esse, ut edentes interimat. In Aegyptum vero translatum in esculentum mitescere, & pirorum malorumque, modo, cum quibus & magnitudine conuenit, estimari. Ita ut nemo non videat impudenter hoc loco hallucinatum esse Mōtium. Sed ad Sebesten fructum sermonem vertamus, quem certum est Myxum, vel Myxam Græcis & Latinis dictum esse: id enim in primis Auicenna docet, qui Sebesten alio nomine *Mulzeita* dici cap. 464. secundi Canonis scribit: quam sane dictionem corruptam esse ac barbaram inane testum est, ac pro illa *Myxa* potius legendum. Mxam vero fructum esse arboris, testatur Paulus lib. 7. de eo ita scribens: *Myxa arboris cuiusdam fructus est, prunis quidem longe minor.* Et cum omnibus in confesso sit Sebesten a Myxa non differre, mihi tempus in eius rei probatione conterendum non esse censeo, quod illud nobis *tomo secundo nostrorum de stirpium historia* tomo abunde monstratum sit, ad huius itaque vire: explicandas descendamus. Huic autem ex Auicenna loco citato ascribit: Sunt, inquit, quasi temperata, sunt lenitiora, leniunt enim in pectus & guttur, sedant sitim, leniunt ventrem. Cuius rei gravis & minime contemnendus testis est Plinius ille Medicus, qui libro 4. cap. 57. de Myxa in eam sententiam scribit. Hoc genus manifeste stypticæ virtutis apparet & frigida, quamuis plurima illi de frigore siccitas decoquat. Verum & ardores febricitantium exstinguit, ore compressum, & sitim mitigat, & in cibo sumtum stomachum erigit, solutioni ventris obsistit. Quum autem huic sententiæ non solum Arabes, sed & recentiores Græci reclamant, ac quotidiana Medicorum experientia contrarium doceat, non cur illis omnibus vnus Plinii, & auctoris nondum satis notæ auctoritatem anteferamus, quod fieri potuerit, ut Myxorum nomine alium a Sebestinis fructum intellexerit. Paulus Aegineta quidem expressis verbis Myxum facultate pruno arbori simile esse tradit.

Nostri atque Medici herbam veteribus Pedem coruinum appellatam, ob ambiguitatem illius Auicennae sententiam, a nostra sic hodie vocata esse diuersam prorsus ignorare.

C A P. XXVIII.

Ambigua
Auicennæ
de Ped. cor-
uino sen-
tentia.

VT ignorasse Auicennam Pedem coruinum, aliisque errandi occasionem præbuisse dicamus, ambigua eius de hac herba sententia facit. *Capite* siquidem 567. *secundi Canonis*, de Pede coruino in hunc modum differit: Radix huius herbæ cum decoquitur confert solutioni antiquæ. Et dixerunt Paulus & alii quod confert colicæ, & efficit operationem Hermodactylorum absque nocumento. Et *Fen. 22. Canonis 3. tract. 2 cap. 8.* in podagræ curatione iterum ex Pauli sententia ita scribit: Et dixerunt quidam quod Pedi coruino inest operatio Hermodactylorum, & non est eius nocere stomacho. In quibus utique verbis verum est quod radicem Pedis coruini decoctam solutioni antiquæ conferre docet, eam enim facultatem veteres vno omnes ore suo Coronopodi, hoc est, pedi cornicis, inesse testantur. Primum autem omnium Dioscorides *lib. 2. cap. 17.* Coronopoda hoc pacto describens: *κρονώπιος ἀσκήνης βοτάνη, τῆ ἰαφύου ἐπιδόρον, κατὰ χερμυδιστῶν τῆ φύλας λαχανώσεως δὲ ἐκ τούτο ἴσθην. ῥίζην λεπτήν ἔχει, συνήκην, ἐκδιδομένην πρὸς χυλίας καὶ ποίσηται,* hoc est: *Coronopus oblonga herbula est per terram strata, fissis foliis. Idonea est esui olerum modo cocta. Radicem habet tenuem, adstringentem, mansueti cæliacis conferentem.* Galenus quoque *lib. 7. de simpl. medicament. facultatib.* idem tradit, dicens: *κρονώποδος ἢ ῥίζα πικρὴ δυνάμις χυλίας καὶ ἀφελὲς ἐστὶν ἀπὸ* quod est: *Coronopodis radix cæliacis prodesse creditur manducata.* Cui Paulus quoque libro septimo subleget, & Plinius *libro 22, capite 19.* iis verbis: *Coronopus oblonga herba est cum fissuri. Seritur interim, quoniam radix præclare facit cæliacis in cinere tosta.* Ceterum fallum est quod Auicenna ex Pauli sententia Pedem coruinum colicæ conferre scribit, nusquam enim id dixisse Paulus, quod sciam, offenditur. Error autem iste ex deprauato codice ortus esse potest, qualem Albanus Torinus etiam & Ioannes Guinterius habuisse videntur, dum Coronopoda ad colicos dolores conducere apud Paulum transtulit, cum ex Galeni verbis paulo ante citatis euidentissimum sit, non colici-

Coronopodis facultas.

Pes corni-
cis colico
dolori non
confert.

**Pes corni-
cis non ha-
bet opera-
tionem
Hermo-
dactylo-
rum.**

Auicenna
perperam
Coronopedi tribuit
quod Dia-
coronopo-
dii confe-
ctioni tri-
buendum
erat.

Pes corui.
us nostri
temporis.

Leonica
mus.

Prescori-
nus Rann-
culus est
herba.

Coronopo
a cur Pau-
is Pod-
ricis medi-
amentis
discuerit.
erapionis
e sanguine
raconis
ntentia.

& Egilos : ita enim illic mendose pro Sideritin Achilleam legitur : nominant, & est A
 planta habens virgas longas vnius palmi, aut plus, similes fusis quibus filatur, super
 quas sunt folia parua, similia foliis Coriandri, quorum color vergit ad rubedinem,
 & habet viscositatem & odorem fortem, non tamen malum, sed prope odorem me-
 dicinarum, & in summitatibus ramorum sunt coronæ rotundæ, & flores albi in prin-
 cipio natiuitatis eorum, in fine vero fiunt aurei, & nascitur in terra bona culta. Et
 paulo post ex Constantini auctoritate : Succus, inquit, huius plantæ dicitur sanguis
 draconis. Ex quibus verbis dilucidum fit, Serapionem sanguinem draconis nihil al-
 liud esse putasse, quam eius herbæ succum quæ Græcis a ferro, quoniam glutinandis
 vulneribus apta, præcipuum in bello haberet vsum, Sideritis Achillea dicta est : ita ut
 plane corrupta sint duo hæc in Serapione Sidrichis & Egilos vocabula, atque pro illis B
 legendum sit. ut dictum est : Sideritis & Achilleos, id quod omnium maxime eius her-
 bæ quæ lib. 4. cap. 32. apud Dioscoridem habetur, descriptio monstrat, quæ ita cum Se-
 rapionis notificatione quadrat, ut ne verbo quidem variare videatur. Ea autem sic habet :
 ἀχιλλεύου, καλεῖται ἡντις ἐν τῇ ἀχιλλεύου σιδριτί. φέρει ὃ ἐσθλὴ ἀσθηματικὴ ἢ ἐν μείζονι, ἀσθηματικὴ, ἢ ἀπὸ αἰσθη-
 ματικῆς, ἀσθηματικὴ ἐν τοιαύτῃ, ὅτι πικρὰ, ἀσθηματικὴ ὑπερῶς, ὑπόπικρη, γλισχρὰ, πολύσπορη, σὺν αἰσθη-
 ματικῇ, σιδριτί, ἢ ἀπὸ ἀσθηματικῆς ἀπὸ ἡδονῆς ἐκ χειρὸς ὅτι. φύεται ἐν ἀγροῖς πίοις. quod est : *Achilleos,*
aliqui Achilleon Sideritin nominant. Dodrantes virgas aut maiores fusorum figura fert, &
circa has tenuia foliola in lateribus crebras incisiones habentia, Coriandro similia, subrussa, te-
niacia, multum odorata, non insuauia, medicamentosa vero in odore. Umbella in cacumine ro-
tunda. Flores candidi, & aurum emulantes. Nascitur fecundo solo. Hætenus Dioscorides.

Nostræ te-
 pestatis Me-
 dicorum de
 sanguine
 draconis o-
 pinio.

Montuius
 dialecticis
 ignorantia
 ostenditur.
 Argumen-
 tum ab au-
 thoritate ne-
 gatiue du-
 ctum inter-
 dum valere,
 maxime in
 sacris.

Quando ab
 auctoritate
 negatiue li-
 ceat argu-
 mentum
 ducere.

Serapionem sequuntur omnes feræ nostræ ætatis Medici, ac vno omnes ore ita C
 tuunt sanguinem draconis vulgo dictum Sideritidis herbæ succum esse. At cum
 nemo ex veteribus ex ea herba succum talem exprimi aut destillare scribat, cer-
 tum est in vniuersum & Serapionem & reliquos hunc imitatos, falsos esse. Neque e-
 nim Dioscorides vel verbo eius rei meminit, neque enim Galenus, qui in 8. de med.
 simpl. facul. libro hanc herbam describit, succum eiusmodi inesse tradit, nunquam certe
 silentio præterituri, si verum esse deprehendissent, quod temere asserere Serapion-
 voluit. Sed obgannit hic Montuus, ac more suo pueriliter admodum oblectatur, ar-
 gumentum ab auctoritate Dioscoridis negatiue ductum inualidum esse dicens, pul-
 chre suam in dialecticis ignorantiam interrim prodens. Quis enim est qui nesciat argu-
 mentum ab auctoritate etiam negatiue ductum valere interdum? veluti cum in sacris D
 disputamus, ubi omnia a scripturæ auctoritate pendunt. Ut quum hodie cum impiis
 Sophistis nobis incumbit digladiatio de iustificatione, mox ad scripturæ auctorita-
 tem nobis confugiendum erit, ac strenue pronuntiandum sola nos fide iustificari, hoc
 est, solius misericordiæ propter Christum fiducia nos iustos coram Deo reputari, &
 minime propter nostra opera, aut nostras virtutes. Cuius rei locuples testis est diuus
 Paulus, in epistola ad Romanos cap. 3. ita scribens : *Iustitia vero Dei per fidem Iesu Christi in om-*
nes, & super omnes eos qui credunt. Et paulo post : *Arbitramur igitur fide iustificari hominem*
absq; operibus legis Hinc cum si riptura iustificationem fide acceperam fert, probe argu-
 mentum ab auctoritate eiusdem negatiue ductum valebit, si in hunc modum quis
 colligat : *Sacra scriptura iustificationem operibus non tribuit, ergo opera non iustificunt.* Pari ra- E
 tione & in aliis quibusdam disciplinis argumentum ab auctoritate negatiue ductum
 non semper irritum existit. Verbi gratia, hoc loci si ita colligas : *Dioscorides, qui Galeno*
lib. 6. de simplic. med. facult. teste, omnium perfectissime tractatum de materia medicamentorum
confecit, & Sideritide Achillea non colligi succum, qui sanguis Draconis hodie dicitur, tradit : er-
go Serapion non tanta herbarum, quanta ille præditus cognitione, diuersum tradens errat. Hinc
 ubi tanta alicuius scriptoris fuerit auctoritas ut multis aliis opponi possit, qualis certe
 in materia medica omnium testimonio Dioscoridis est, licebit haud aliter, quam in
 sacris ab huius auctoritate negatiue etiam ducere argumenta, quando quidem ad hu-
 ius scripta, reliquorum omnium placita, tanquam ad Lydium lapidem, probanda e-
 runt. Non itaq; irritum argumentum erit, ut Montuo os plane obstruamus, si sic colli- F
 gas : *Eupatoriū Dioscoridis eas notas, quas herba hodie Eupatoriū dicta habet, minime obtinet : Er-*
go nostri seculi Eupatoriū nō est verum ac genuinū Græcorum Eupatorium. Ceterum si Sideritis
 herba a Dioscoride non descripta fuisse, & huic plane incognita mansisset, tū certe
 argu-

Argumentum negative ab illius auctoritate dictum inuolidum penitus esset. Vt non valet argumentum, *Dioscorides non meminit Sideritidis, nullas igitur vires habet*. Aut ita: *Dioscorides Sideritiæ herbam non depingit, minime igitur ex eo succus, quem sanguinem Draconis appellant, colligitur*. Sed quid multis moror? Fateatur oportet Montuus, vtcunque ringatur, me neque hic neque alibi solius Dioscoridis auctoritate, quamuis, *vt iam demonstrauimus*, ad probationem sufficere posset, vsum esse, sed simul Galeni, Pauli, Plinii, ac aliorum probatissimorum Medicorum adlunxisse testimonia; ita vt rectius ferme huiusmodi argumenta a testibus, quam vnius auctoritate ducta esse videantur. Proinde quicquid garrat bonus ille senex, probare tamen nunquam poterit, sanguinem Draconis herbæ Sideritidis esse succum, quandoquidem succus ex Achillea Diosco-

Bridis, vel Sideritidis Achillæ Galeni expressus, sanguinis colorem non referat. Non tamen inficias inus; imo constanter affirmamus, Serapioni sanguinem draconis, non esse nisi nominatam iam herbam. Quod nos etiam *primo nostrorum de stirpium commentariorum* tomo in Achillæ historia, quam plurimis atque efficacissimis rationibus demonstrauimus. Quare Achillæ herbæ succum Serapio sanguinem draconis appellare haud debuisset. Quinetiam nec Auicenna ipse sanguinem Draconis 2. Canone ex professo tractans, eius herbæ aut alterius succum esse docet, sed rubeum esse succum simpliciter scribit. Neque ego reluctor, vt succum esse non credam. Vt credam

Aloisius Cadamustus.

enim mihi persuasit Aloisius Cadamustus Venerus Patricius, qui *cap. 4. sua nauigationis*, Sanguinem draconis lachrymam arboris cuiusdam Africanæ esse tradit. Nam *Citato*, inquit, *anni tempore arbores ferro sauciant, quæ ubi sunt incisa, anno sequenti gummam emittunt per incisiones. Gumma vero ahenis decocta & defecata, sanguis efficitur, quem appellant Draconis. Eius arbor producit fructum cerasi instar mense Martio, gustu eximium, coloris veneti, quemadmodum copiosius lib. 1. de medic. compositione cap. 10. monstrauimus*. Hinc et si succum esse arboris vel herbæ Sanguinem draconis esse fatemur, succus tamen Sideritidis non erit: neque enim hæc herba fructum instar cerasi producit, nec ullus veteram eiusmodi rubrum succum illam effundere memoriæ prodidit. Ceterum duplex esse genus eius, quod sanguinem draconis in officinis appellant quibusdam videtur, alterum *rubens*, quod illi sincerum nec adulteratum, ac Cinnabarim Dioscoridis esse cum

Duplex sanguinis draconis genus.

B Leoniceo putant, quod eo tam pictores quam Medici ipsi, haud aliter quam olim Cinnabari vrantur, quodq; in picturis proprie sanguinem reddat, & antidotis, medicamentisq; vtilissimum sit. Præterea quod hoc non minus care, quam Cinnabaris vendatur. Atqui horum sententiam probare non possum, quod Dioscorides suam Cinnabarim inter metalla recenseat, minimeq; succum ex arbore vel herba expressum dicat. Accedit quod is sanguis draconis qui illis sincerus esse videtur, & in officinis quibusdam prostat, care haud vendatur, & satis magna copia afferatur, secus atq; Dioscoridis Cinnabaris, quæ magno constabat, & tam pauca afferebatur, vt versicoloribus pictorum lineis vix satisfaceret. Quapropter alterum hoc officinarum sanguinis draconis genus, aut liquor ille Africanus, aut certe is qui ex herba exprimitur, quæ hodie vulgo sanguis draconis appellatur, de qua in nostris de stirp. hist. commentariis **E** copiose scripsimus. Porro alterum sanguinis draconis genus, de quo prædicti scribunt atrum, inque orbem quasi circumactum, compressum tamen, & in globum non affurgens, non est nisi sanguinis draconis genus factitium & adulteratum. Siquidem ex hircino sanguine, bolo armenia, & Sorborum succo constat.

Cenabrium vulgo vocatum, a Cinnabari veterum diuersum esse.

C A P. XXX.

CENABRIUM vulgo hodie dictum inter venena recenseri, notius est quam vt **C** demonstratione opus habeat. Inter venena enim Antonius ille Guainerius col- **C** locat, adeo vt inter ea medicamenta quæ intra corpus adsumuntur, ob veneni quod **C** habet maleficium referri non queat. Factitium namque est, & a Chymistis ex argento **F** viuo & sulphure conficitur. Argentum autem viuum a Dioscoride ac aliis veteribus **C** inter venena connumerari nemo est qui nesciat. Veterum autem Cinnabaris duum **C** est generum. Vna quidem a Theophrasto & Galeno descripta, quæ non est nisi Mi- **C** nium natium. Hæc perinde atque recentiorum Cenabrium, venenatum est. Alte- **C** ra vero Dioscorides, de qua *libra 5. de materia medica cap. 100.* ita scriptum reliquit, **C** genus.

Cenabrium nostrum venenum est.

Cinnabaris antiquorum, est alterum sanguinis draconis genus.

Marina
Spina:

Galenus
Cubebas
Carpesia
appellat.

**Galen de
Carpesio
sentencia.**

¶ Eo igitur lectorem a legamus.

С а р. XXII.

**Pandectarii
liber erro-
ribus sca-
ret.**

Alibem
quid.
Alibium.

Ff 3

Et Paulus Ægineta in septimo dicens: *διὰ τὸ ἔχει ἀγνὸς ἡ πόσις ἐν βυβωνίῳ διὰ τὸ πλεονάζειν, ὅτι οὐ μέντοι ἔχει* A
ποκατάρτιστον, ἀλλὰ καὶ ἀποκατάρτιστον ὡφελὲν βυβωνίῳ πρὸς δύσιν. id est: *After Atticus, alii Bubonion vo-*
cant, non ob id tantum quod illitum, sed etiam quod suspensum bubonibus opitulari creditur.
 Idem Plinius lib. 27. cap. 5. docet iis verbis: *After ab aliquibus Bubonion appellatur, quo-*
nam inguinum presentaneum remedium est. Ex quibus omnibus probatum satis arbitror,
 Alibium Arabum a Bubonio Græcorum, & Latinorum Inguinaria non esse diuer-
 sum, quicquid nugator insignis Pandectarius garriat. Descriptionem Bubonii videre
 licet apud Dioscoridem libro iam citato, nihil enim necesse est, descriptione ad eam
 rem, quam conamur ostendere, cum nomen utriusque satis indicet, herbas inter se
 esse haud dissimiles.

Herbam vulgarem Boraginem hodie dictam, veterum exsistere Buglossum, adeoque
hanc pro illo ad medicinæ usum esse adhibendam.

CAP. XXXIII.

BORAGINEM herbam nostræ ætatis herbariis appellatam, veterum esse Buglof-
 sum, multi ante nos viri eruditi docuerunt: verum cum adhuc paucos esse videam,
 qui id ipsum credant, aut ab inueterato errore recedere velint, operæ precium me fa-
 cturum existimaui, si quod illi dixerunt, hic denuo repeterem, ut vel tandem iterum

Borago no-
stra ab anti-
quorum Bu-
glossum non
differre.

atque iterum moniti resipiscant. Boraginem autem nostram non differre ab anti-
 quorum Buglossum, primum omnium descriptio eius, quam tradit Dioscorides libro 4.
 cap. 119. monstrat, quæ ita nostræ Boragini quadrat, ut in nullo ab illa discrepare videat-
 ur. Ea autem sic habet: *βούλαστος δὲ φάρμακον. φύλλον χαμηλὸν, τετραγώνιον καὶ μελάντερον, ὁμοίον βότρυ γλώσσῃ.* C
 id est: *Buglossum Verbasco simile est. Folium in terram depressum, asperum, nigrius, lingua Bubu-*
le simile. Quis vero tam lippis est oculis, qui non nostram hic Boraginem, & mini-
 me Buglossum describi cernat? Folia enim Boraginis Verbasco similia sunt, atque
 multo quam Buglossæ nostræ, quæ longiora existunt, latiora. Hinc est, quod M. Ca-
 to cap. 40. sui de re rustica Operis, ramorum infitionem ex professo tractans, surculum
 Lingua Bubula, seu Buglossum obtegere si pluat, docet, ne aqua in librum permeet: vo-
 luitque in operiendo infusæ stirpis rotunda sectione, rotundiore atque latiore potius
 folio, quale Boraginis est, quam longiore & angustiore, quale Buglossa habet, uti. Præ-
 terea Boraginis folia humi depressa ferme iacent, & in terram inclinantur, Buglossæ
 vero surgunt, & in altum tendunt. Adde, quod Boraginis folia aperta sint, Buglossæ D
 contra modicæ hirsuta & mollia. Albicant denique buglossæ folia boraginis autem
 nigricant, ita ut singula Diosc. iam numerata indicia boragini in uniuersum conue-
 niant, & minime buglossæ. Porro herbam boraginem a nostræ ætatis Medicis esse
 antiquorum buglossum, usus etiam, quem hodie in medicinis habet, satis declarat.

Boraginis
in medici-
na usus.

Omnes enim Medici, vulgus quoque ipsam, boraginem in vinum proiectam, aut
 potui datam, lætitiā generare dicunt, id quod ex æquo veteres suo etiam buglossum
 tribuunt: ita enim de illo Diosc. tradit. *βούλαστος ὑγρὸν ἐστὶν καὶ θερμὸν ὡς τὸν οἶνον ἀποφθίνων, διὰ τὸ εἶναι.* quod
 est: *Buglossum in vinum deiectum lætitiā animi facere creditur.* Cui subscribit Galen. lib. 6.
de fas. simpl. med. in hunc modum: *βούλαστος ὑγρὸν ἐστὶν καὶ θερμὸν ὡς τὸν οἶνον ὑπερβαλόντων ἀποφθίνων* E
ὡς τὸν οἶνον πρὸς δύσιν, hoc est: Buglossum humide calideque temperiei est: itaque vinis iniectum,
lætitiæ seu hilaritatis causa esse creditum est. Et Paulus in septimo iis verbis: *βούλαστος ὑγρὸν*
καὶ θερμὸν ἐστὶν τὸ κρῖνον. ὅθεν τοῖς οἶνοις ὑπερβαλόντων ἀποφθίνων πρὸς δύσιν λέγεται. quod est: *Buglossum humidum*
& calidum est temperamento, quomobrem vino immixtum lætitiā ac animi voluptatem effice-
re dicitur. Nec dissentit Plinius libro vigesimo quinto capite octauo dum sic scribit:
 Iungitur huic Buglossus Boum linguz similis, cui præcipuum quod in vinum deiecta
 animi voluptates auget, & vocatur Euphrosynon. Errorem hunc Medicorum a-
 gnouit etiam Franciscus Marius Grapaldus, in suo Lexico ita scribens: Buglossus &
 fatiua est, quam Boraginem triuiales vocant, & syluestris. Latini ab asperitate lin-
 guam bubulam vtranque appellauere. Calida est & humida: cardiacis auxiliatur in
 cibo sumta, sanguinem purgat, & hilaritatem inducit. Flores eius in conditura & F
 medicina peculiarem gratiam habent. Ipsa vero in vino deiecta animi voluptates au-
 get. Hinc *ἀποφθίνων* Græci dixere, quasi *lætificantem*: nam *ἀποφθίνω* est *lætari*, *ἀποφθίνω* *læti-*
tia, & ἀποφθίνω *exultatio.* Error vero ille Medicorum quod Pseudobuglossum pro genuino
 vtuntur, peruerustus admodum est, quando Auicennæ temporibus etiam grassari
 corpe-

Sandaracam Arabum & hos ipsos sequentium a Sandaraca Græcorum & Latinorum

non solum forma, sed viribus etiam esse diuersam.

C A P. XXXIV.

Sandaraca
quid secun-
dum Ara-
bes;

Sandaraca
Graecorum.

Sandaraca
alio nomi-
ne Sandyx
dicitur.

Etiam a Sā-
daraca Ara-
bum discre-
pat.

ἰδωμένων ἔχει Ἐπίτησιν τῶν ὠτίων τῶν ὀφθαλμῶν. Θεραπεύει δὲ καὶ ἀλωπεκίαν καὶ ἀλλοφρέσιν ῥιτίτην καὶ λευκούς ὄνυχας σὺν πύσση ἀφίστησι, καὶ ὡς φθειράσεις σὺν ἑλαίᾳ ποιεῖ, φύματι τε σὺν στικτῇ διὰ πόρεαι ἀεργαί καὶ δὲ ὡς καὶ τὸν ῥιτίτην ἔσπασιν ἑλκεα, καὶ ὡς τὸ λοιπὸν ἐκ τῶν ὠτίων σὺν ῥοδίῳ, ὡς ὡς ῥοδιολύματα. Δίδεται ἔμπροσθεν σὺν οἰνορέματι, καὶ ὑποσημαίνεται σὺν ῥιτίτη ὡς πεποιημένον βήχα διὰ σίφωνος ἐκ δανδύρου τῶν ἀγρωστῶν σπέρειν. Φώλω τὴν ἀντιόδοχον, ἐκ λειψιδῶν σὺν μέλιτι, ἔκ ἀδμακίης σὺν ῥιτίτη καὶ ὑποπύποι. Δίδεται.

id est: Vim vstionemq, eandem auripigmento habet. Resina excepta alopecias sanat. Cum pice scabros ungues eximit. Contra phthiriasin cum oleo prodest. Tubercula cum adipe discutit. Ad narium orisque ulcera efficacis est. Et cum rosaceo ad ceteras papularum eruptiones, Et condylomata. Datur ex mulso purulenta excreantibus. Sufficitur quoque cum resina aduersus veterem tussim, per fistulam vapore eius in os attracto. Vocem expurgat cum melle delincta. Suspiriosis cum resina in pilula datur. Galenus paucis vires eiusdem complexus ita inquit: Σανδαράκη καὶ οὐκίτης ἰσὶ δυνάμεις ὡς περ τὸ ῥοδιολύγιον οὐκίτην ὀφθαλμοῦ. hoc est: Sandarace vrentis est facultatis, seu Arsenicum quod vocant. Eadem Paulus quoque in septimo scribit. Nec inter Latinos dissentit Plinius, p in hanc sententiam scribens: Valet purgare, sistere, excalescere, perrodere. Summa eius dos septica. Explet alopecias ex aceto illita. Additur oculorum medicamentis. Fauces purgat cum melle, sumta. Vocem lymphidam Et canorum facit. Suspiriosis tussientibusque iucunde medetur, cum resina terebinthina in cibo sumta. Eisdem profecto facultates Sandaracæ lux tribuit. Au. cenna cap. 627. secundi canonis, ubi sic scribit: In ipsa est stypticitas Et proprietas retinendi sanguinem;

Sandaracæ
viros.

344 Operum Leonhard. Fuchsi Pars IV.

Et luctatores ipsa utuntur ut leues & fortes fiant, & non incurrant difficultatem anhelitus. Desiccat fistulas quando cum ea suffumigatur. Eius fumus prohibet catarrhos. Fluxum denique sanguinis & asthma humidum sua exsiccatione arceat. Id quod & Serapion facit, ut patet sua legenti.

Nemo autem miretur, quod Arabes in plerisque assignandis Sandaracæ facultatibus a Græcis Latinisque discordent: nam cum variæ res veteribus vno Sandaracæ vocabulo designentur, illi vnam esse putantes, iam huius, iam alterius, secundum diuersos auctores ex quibus sua desumerunt, facultates huic tribuere: atque adeo factum ut iam Sandaracæ tanquam metalli, nunc vero ut gummi proprietates promiscue, & confusim descripserint. Immenſæ autem incertiæ nota est, quod Arabes suam Sandaracam gummi esse statuunt, neque tamen, cuius arboris sit, interim explicant. Noſtri certe ſeculi Medici Iuniperi arboris gummi eſſe aſſerunt. Ridiculum autem eſt, & erroneum plane, quod iidem gummi illud Iuniperi ſimpliciter Vernicem nominant, cum Vernix ſit gemina, ſponte nata ſcilicet, & facticia. Sponte autem nata non eſt niſi lachryma ſiue gummi Iuniperi. Facticia vero eſt ea, qua pictores & fabri lignarii utuntur, dum ea colores imbutos tingunt, ut pertinacius hæreant. A vernice autem, Vernigo, quæ alio nomine ſandaracæ etiam, & ab Ariſtotele in 7. de hiſtoria animalium, ca. 22. vocatur, longe alia res ſit. Teſtis eiſ rei Plinius exiſtit, qui lib. 11. cap. 7. in hunc modum ſcribit: Præter hæc conuehitur erithacæ quam alii ſandaracam, alii cerinthum vocant. Hic erit apud dum operantur cibus, qui ſæpe inuenitur in fauorum inanitatibus ſepoſitus: & ipſe amaritaporis, ſed plenus humoris cibus. Gignitur autem rore verno, & arborum ſuceo, gummi modo. In quibus ſane verbis Plin. & nomina & formam Erithacæ pulchre expreſſit. Nomen autem Erithacæ Græcis idem eſt quod Latinis Vernigo. Vtrumque autem nominis ſortita eſt ſandaracæ illa, quam Ceraginem Theodoruſ appellat, a vere, in quo, ut ex Plinio docuimus, naſcitur, namque Ver Græcis dicitur. Verum eſſe quod aſſerimus docent ea quoque quæ in Corollarii ſui cap. 115. ſcribit non contemnendæ auctoritatis vir Hermolaus, ſic dicens: Cerinthus & Rhitacen, ſiue ut Ariſtoteles Erithacen ſignificat, quæ & ſandaracæ appellatur, & a Dioſcoride Ceranthemos, ex arborum ſuceo, gummi modo genita, & verno rore: unde vernigini quoque vulgo nomen. Erithacæ enim deſcribit Marcus Varro lib. 3. rei ruſtica, cap. 16. iis verbis: Etiam pauca extra oſtium aluci obturant omnia, qua venit inter fauos ſpiritus, quam, & alii appellant Græci. Et paulo poſt: Erithacen vocant quo fauos extremos inter ſe conglutinant, quod eſt aliud melius propoli. Ex quibus omnibus ſatis monſtratum eſt, Arabum Sandaracam, utpote gummi, a Græcorum, quod metallum eſt, plurimum diſſerre. Denique non ſatis ſcire noſtræ ætatis Medicos, quid ſit hoc genus medicaminis quo hodie pro ſandaracæ utuntur. Si enim Iuniperi gummi eſt, eas utique in medicina vires habebit, quas ipſi recentiores Græci assignant, & nos in noſtris de ſtirp. hiſtoria commentariis indicauimus. Nec obſtat quod Plinius lib. 13. cap. 11. Iuniperi gummi ad nihil vtile eſſe ſcriptum reliquit. Fieri enim potuit, ut Plin. i ætate eiſ gummi uſus ignotus fuerit, qui tandem poſterioribus Græcis innotefcere cepit: quod in multis etiam aliis accidiffe conſtat. Sin vernigo, quam Erithacen Græci nominant, erit, eas certe vires quas illi vel Græci, vel Latini E tribuunt, obtinebit. Suo itaque errori renuncient, vel ſaltem a ſandaracæ abſtineant, donec quotuplex Sandaracæ ſit plenius cognoscant.

Saccharum antiquorum & vulgari hoc noſtro, quod nunc voce parum deſlexa barbaro vocabulo zaccarum appellamus, eſſe diuerſum, & a Sale Indo, contra Gentilem & Herculanum, nihil diſſerre.

C A P. XXXV.

NE alicui nominum confuſio imponat, animaduertendum per ſaccharum antiquorum noſ intelligere rem illam quæ ſub hoc nomine a Dioſc. Galeno, Plinio, ac aliis eiſdem ætatis ſcriptõribus deſcripta eſt, quæ certe nihil aliud eſt niſi mellis ſpecies, quam obrem ſit ut & inter mella de hac ipſa loquantur. Dioſcorides ſiquidem F lib. 2. capite 73. ita de ſaccharo ſcribit: καλὴται δὲ πρὸς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ Ἰνδῇ καὶ ἐν τῇ Ἀραβίᾳ. ὁ δὲ ὀνόματι τῆς ἰνδίας καὶ τῆς ἀραβίας. ὁ δὲ ὀνόματι τῆς ἰνδίας καὶ τῆς ἀραβίας. ὁ δὲ ὀνόματι τῆς ἰνδίας καὶ τῆς ἀραβίας. hos eſt: Vocatur & quoddam ſaccharum mellis genus exiſtens in India & felici Arabia concreti. Inuenitur ſuper arundines ſali concretiome ſua ſimile, dentibus ſalis inſtar fragile. Cui conſentit Galenus libro

Saccharum antiquorum.

Saccharum antiquorum.

Saccharum antiquorum.

Saccharum antiquorum.

Saccharum antiquorum.

Saccharum antiquorum.

Saccharum antiquorum.

Saccharum antiquorum.

Saccharum antiquorum.

Saccharum antiquorum.

Saccharum antiquorum.

Alibros de simplicium medicis facile sic dicens: *quod dicitur de cantharidis, dicitur et de saccharo, quod est: Sed ut Sacchar, ut vocant, quod ex India atque felici Arabia conuehitur, calamis, ut aiunt, concreuit. Est vero et ipsum mellis species.* Hanc Paulus etiam sequitur, & mel esse Sacchari e felici Arabia portatum ait. Plinius quoque libro duod. cimo capite octauo, a iam dictis nihil variat, in hunc modum scribens: Saccharum & Arabia fert, sed laudatius India. Est autem mel in harundinibus collectum, gummi modo candidum, dentibus fragile. Amplissimum nucis auellanae magnitudine ad medicinæ tantum usum. Quibus subseribit etiam Alexander Aphrodisiæ lib. 2. probl. 74. in eam sententiam scribens: *Quod Sacchar Indi appellant, mellis coagulum est, sole cogente rores, conuertenteque ad mellis dulcedinem, quam idem in monte etiam Libano fieri certum est. Fit Sacchar id proximum salis glebulis candidum, fragile, vim quoque tergendis & purgandis mellis similem habet.* Ex quibus sane verbis evidētissimum fit, Saccharum antiquorum nihil aliud esse quam mellis speciem, adeoque eadem sane est materia mellis apum, Mânæ & Sacchari, ita ut parum admodum, quemadmodum ex Alexandro Aphrodisiæ dictis colligitur, a nunc vocata Arabum Manna differat Saccharum: in hoc autem differre videntur, quod Manna supra alias plantas, & aliquando supra petras, variis in regionibus reperitur. Saccharum autem in felici tantum Arabia & India in arundinibus, maioribus frustis maiori que duritia, obvehementiores illic solis radios, aptioraque ad id tolerandum arundinum folia, coagulantur. Hinc fit, quod non perinde, ut Manna, aluum leniat, quando & inter vocas hodie Mannas, hæ magis subducere aluum videntur, quæ sunt liquabiliores. Ceterum diuersum esse Saccharum antiquorum iam dictum ab eo, quo hodie Zuccarum appellant, satis patebit, ubi quid Zuccarum sit, explicauerimus. Est itaque nostrum Zuccarum, quo hoc tempore utimur, succus a proprii generis planta bene contrita expressus, calore ignis plus minusve excoctus, coactus, & defæcatus. In Zuccarum vero tanto candidius ac durius euadit, quanto plus concoctionis defæcationisque iustinuerit. Proinde primum plantam arundinis similem excoquunt, deinde flaua pars secernitur, & Zuccarum existit. Hoc iterum coqui potest, atque ita candidius fit & cōcretius. Quod si tertio coquatur, maxima in eo & candoris & densitatis fit accessio. Quartum & quintum quoque concoqui solet, donec specie aluminis scissilis fere translucet.

D hoc quoque genus Candidum, seu, ut hodie loquuntur, *Candum*, atque *Taberzeth* barbaris vocabulis nominant. Preterea de ut olim Saccharum, quod ex India & felici Arabia deferrebat, suapte natura, quia sic nimia solis ex candescencia obdurauerat, candidum erat, & dicebatur: ita nostrum Zuccarum *Candi* res factitia est, ex Zuccaro quater vel quinquies excocto, maioris quæstus faciendi gratia per seplariarios Venetos confecta. Hi harundines etiam immittunt, ut supra has videri possit conglobatum. Gossipio denique inuoluunt, ut nauis ex orientalibus regionibus aduectum putetur. Esse autem plantam quandam unde Zuccarum exprimitur, abunde testantur ea quæ scribit Marnardus noster, immensæ & eruditionis & experientia vir, libro suarum Epistolarum medicinalium 2. scilicet a Lusitanis & Siculis cognouisse plantam, a qua Zuccarum exprimitur, humectis locis proprio semine feri, exteriori quidem specie arundinis magis similem, interiore substantia valde dissimilem. Pulposam enim esse, grauem, mollem, & succi plenam, quum arundo sit e contrario leuis, dura, & vacua. Ex quibus omnibus apertius fit, quam ut iterum in dubium vocari debeat, antiquorum Saccharum a Zuccaro nostro esse omnino diuersum. Antiqui enim Sacchari materia mel ac ros existit, noui autem Zuccari plantæ succus, quæ certe ita distant, ut planta ab aqua. Accedit quod forma utrorumque etiam diuersa sit. Dioscorides enim ac alij veteres suum Saccharum quo ad consistentiam ac concretionem salis modo dentibus fragile dicunt. Plinius gummi instar candidum esse etiam scribit. Nostrum contra priusquam excoquatur, colore potius nigricans & subflauum, quam candidum existit: nec dentibus perfringitur, sed per succum deglutitur. Efficiens quoque nostri primum est forma ipsa plantæ, secundum artifex calore ignis coquens & defæcans, & deum in hanc, quam videremus, metæ formam in ligneis quibusdam vasculis deducens. Veterum vero Saccharum noctis primo frigus agglutinant, dehinc superueniens solis calor obdurat. Nostrum insuper Zuccarum plantæ pulpæ, in Sicilia & Canariæ in-

Saccharum antiquorum a Zuccaro hodie vocato differt. Zuccarum quid.

Zuccarum candidum.

Zuccarum candi res factitia.

Marnardus

fulis, continet, effigie tantum arundini similis. Hinc Cadamustus Venetus capite A
 sexto suæ navigationis, sacpharea harundineta in Medera insula Canariæ proxima ef-
 se scribit; non quod arundines sint, sed quod illarum speciem effigiemve præ se fe-
 rant. Verba eius hæc sunt: Quoniam vero hæc insula frequentioribus irrigatur flumi-
 nibus, memoratus princeps sacchareum harundinetum ibi plantari iussit; ex quo
 sacchari quam plurimum legit. Inde veniunt scitissima Sacchara toto orbe præci-
 pua, primæ decoctionis; nec non mixta, & quantum ex aliorum relatu colligere po-
 tui, indies meliora Sacchara sperant, quoniam ea insula temperie cœli meliore Sac-
 charum suapte natura gignit: nam ea qualitas est plagæ illius quæ Cypri & Sicilia.
 Animaduertendum autem quod dicat Sacchara primæ decoctionis, quibus verbis
 iterum innuit Zuccarum hoc quod ex Medera affertur non esse tale, nisi per deco-
 ctionem. Confirmat hoc ipsum Brocardus monachus, qui inter alia in terræ sanctæ
 descriptione ita inquit. Crescunt ibi cannæ molles, ex quibus colligitur Saccharum.
 Habent enim hæc cannæ medullam quandam humidam in modum Sambuci, quæ in
 peluim expressa, atque in æneis caldariis decocta, optimum efficitur Saccharum. An-
 tiquorum vero in India & Arabia tantum felici in arundinibus, & illarum foliis gigni-
 tur. Hoc ad medicinæ tantum usum, ut ex Plinio didicimus, accommodabatur: no-
 strum autem ad dapes suatissimas faciendas adaptatur, adeo ut nullum magnificum
 iam sit epulum quod non multo sic Zuccaro conditum. Nam qui hoc tempore Prin-
 cipum ac potentiorum sunt *zucchero* vel *coqui*, iuxta proverbum, nullum ferculum
 corrumpi Zuccaro existimant. Porro utriusque etiam vires illa inter se differre decla-
 rant. Antiquorum namque Dioscor. teste, *in Indis, diaphanum, et sic videtur et nigrum*, id est: *alio*
idoneum est, et stomacho utile: nostrum thoraci potius quam ventriculo accommodum
 experimur. Antiquorum denique Galeno & Paulo testibus, *in diaphano*, hoc est, *situm non*
afferens: nostrum autem non minorem sitim, quam mel ipsum excitat: quod certe
 quotidiana confirmat experientia. Matthiolus quidem hoc loco meam suggillat in-
 terpretationem, quod vel linguae græcæ ignorantia, ut multi suspicantur, vel nimio a-
 lios reprehendendi studio factum esse constat. Quod vero Saccharum antiquorum
 situm non afferat, & cum melle collatum, non minus illo, ut Matthiolus censet, sitim
 excitet, e verbis Galeni fit manifestissimum, qui simpliciter dixit illud *in diaphano*, id
 est, *sitim non afferre*, mellis nulla facta mentione. Paulus quoque d. fertis verbis ait, *D*
partem quædam est, et sic videtur et nigrum. Quare frigida sit Matthioli cavillatio necesse est. Cum
 itaque antiquorum & nostrum saccharum non solum materia, sed & forma, effi-
 ciente, loco, viribusque varient, quis tam præfracte contentiosus erit, ut posthac non
 differre dicat? Insuper saccharum antiquorum a sale. Inde, ut Avicennæ enarratores
 somniant, non differre, ostendit in primis antiquissimus medicinarum scriptor Archi-
 genes, id Salem Indicum, & harundinetum mel vocans. Paulus quoque Aegineta lib. 2.
 capite 4. ex Archigenis auctoritate Salem Indicum non diversum esse a Saccharo in-
 nuat, dum ad asperam linguam plurimum conferre scribit, id quod omnium maxi-
 me descriptio eius indicat quam ille ponit, ita dicens, *admodum induratum, et sic videtur et nigrum*.
 id est: *Sal Indicus colore quidem et concretionem communi salis nihil diffi-*
det, gustu autem melleus. Quibus utriusque verbis euidenter admodum ostendit, Salem
 Indicum, quando quidem mellis instar gustanti dulce appareat, a Saccharo antiquo-
 rum, quod & substantia & gustu huic simile est, nihil distare. Paulum sequitur Avi-
 cenna *Fen. 1. Cap. 4. tract. 2. cap. 27.* de asperitate linguae febricitantium, ubi inter cetera
 sic scribit: Aut teneat in ore suo salem, qui asportatur de India, & est in colore salis, &
 dulcedine mellis. Et sumat de eo secundum quod dixit Archigenes, quantitatem fa-
 bæ vnius. Quid multis opus est verbis? manifestum est veteres, Græcos potissimum,
 Saccharum appellasse Salem Indicum, quod scilicet sua concretionem sal simile esset,
 candoremque ac friabilem in eo siccitatem, & cum dilueretur humore aliquo lique-
 factionem, instar salis, ostenderet. Plura in suis epistolis ea de re Manardus habet. F
 Num vero Galenus, ac alii veteres Græci ac Latini, hodie etiam vsitatum Sac-
 charum cognouerint, libro primo de compositione medicamentorum
 capite decimo, luculenter ostendimus.

Cadamu-
stus Vene-
tus.

Sacchari
Antiquo-
rum facul-
tates cum
zuccari vi-
ribus con-
feruntur.

Saccharum
a sale Indo
distat.

A Memithe Arabum neque esse Chelidonium, neque Papauer cornutum, ut Medici nostri seculi putant, sed id potius quod Dioscorides & alii veteres Glaucium appellant. C A P. XXXVI.

VARIA de Memithe nostræ ætatis Medicorum est sententia. Quidam enim sunt, qui Chelidonium esse interpretantur, in quorum albo Gerardus Cremonensis, & alii quidam existunt. Sunt nonnulli qui Papauer Cornutum, Græci μένισθα νεκρὴν vocant, esse contendunt. Hoc modo quoties olim Razem prælegerat, Wolfgangus Peifferus, magni tum nominis Medicus, barbaræ tamen medicinæ lectator in interpretatus est. Verum ex æquo omnes deceptos fuisse notius pene esse puto quam ut demonstratione egeat. Primæ enim sectæ Medicos Chelidonium esse existimantes falsos fuisse inde satis liquet, quod in confesso sit apud omnes Arabes, Memithen temperamento suo esse frigidam. Ita Auicenna cap. 381. Canon. 2. Memithes naturam frigidam & siccam in primo ordine esse statuit. Serapion quoque haud aliter quam Auicenna cap. 224. sui libri de temperamentis simplicium, ex Galeni auctoritate Memithen frigidam esse asserit. Quem & Abenrois sequitur, illam in primo caliditatis ordine collocans. Razes quoque in libro suo de simp. med. frigidam esse dicens. Si itaq; verum est, ut est sane, Memithen esse frigidam, fieri non potest ut sit Chelidonium, quod calidæ facultatis, teste Galeno libro 8. de simp. med. facult. existit. Is enim de illo ita scribit: χηλιδόνιον ὁμοιωτὶς ἰσχυρὸς ἐστὶ καὶ θερμὸς διὰ τὴν αἰσθησίνην. quod est: Chelidonium extergentis vehementer & calidæ facultatis est. Galeno subscribit Paulus in septimo, calidum esse secundum tertium a medio excessum dicens. Inter Arabes Razes quoque calidum esse docet. Proinde errasse Gerardum & eius sequaces satis liquet. Seducti autem sunt nomine Memithe ac Memire vicinitate, quorum hoc Arab. b. Chelidonium, illud vero Glaucium significat. Vel quia descriptio Memithe apud Auicennam & Serapionem in plerisque cum Chelidonii maioris descriptione conveniat, veluti est succus crocei coloris, cum amaritudine aliqua & odoris grauitate, hæc namque singula Chelidonii succo. Alterius sectæ asseclas Memithen Papauer cornutum esse asserentium, lapsos esse abunde innoscet, ubi primum quæ Græcis & Latinis herba sit quam Arabes Memithen appellant, demonstrauiamus. Est autem Græcis Memithe nihil aliud quam Glaucium, id quod vtriusque descriptio satis indicat. Serapio loco antea citato Memithen iis verbis designat: Memithe est succus herbæ eiusdem nominis, quæ est similis in foliis suis herbæ speciei papaueris dicti ceratidis, id est, cornuti, nisi quia est in ea humiditas adhærens manui, & est propinqua terræ, & habet grauem odorem, & habet multum succum, & color succi eius est similis color croci. Quæ sane descriptio per omnia cum notificatione Glaucii, quæ est apud Dioscoridem libro 3. capite 92. conuenit. Ea autem talis est: Γλαυκίον χολῆς ἐκ βοτάνης ἐστὶν ἰσχυρὸν καὶ τῆς σφύρας γαστρικῆς. τοῖς δὲ αὐτῆς πρὸς φύσιν τῆς κροκεῖδος, μέλαν, & λιγνύοντι δὲ τὴν χηλιδόνιον, βαρύνοντι καὶ πικρύνοντι τὴν γένειαν χολὴν δι' ἧν πολλὸν κερμαίζοντι. quod est: Glaucium succus est herbæ, quæ ad Hierapolim Syria nascitur. Folia eius Cornuto papaueri similia sunt, pinguiora tamen, & in terram depressa, odoris tetri, & gustu amariora. Præterea descriptio Memithes apud Auicennam etiam satis indicat, Glaucium nihil a Memithe differere. Nam quæ de Memithe Auicenna scribit, ea quoque de Glaucio Galenus tradit, Auicennæ liquidem hæc de Memithe sententia est: In ipsa est amaritudo & substantia aquea & terrea, & non est vehemens, sed sicut lacunarum. Stipticitatem habet multam, & sanat erysipelam non fortem. Galeni autem lib. 6. simpl. de Glaucio illa: ἡ κροκεῖς αὐτῶν οὐδὲν ἐξ οὐδὲν ἰσχυρὸς & γαυδὸς οὐδὲν, ψυχρὸν μὲν ἀμφοῖν, οὐ μὴν ἀκρὸς, ἀλλ' ὅπως αἰς οὐδὲν κλεῖται ἐν σφύρας μετὰ τὴν ἀνδρίας, ἀλλὰ τὴν ψυχρὴν σφύρας οὐτως ἀπὸ θερμότητος μόνον ἐκαστὴν πρὸς τὴν γένειαν ὅσα γὰρ μὴ ἰσχυρὰ. id est: Mistura eius composita est ex aquea terreaque substantia, utraque sane frigida verum non summe, sed ceu aqua fontana. Adstringit cum quodam fastidio: tum adeo manifeste refrigerat, ut solum saepe erysipelata, utique si valentia non fuerint, curet. Quid multis opus? Quæ in Serapione paulo supra dicta, ex Galeni & Dioscoridis sententia sequuntur, euidentissime docent Memithen cum Glaucio eandem esse, ita ut nemo sit, nisi sensu plane destitutus fuerit, qui non sentiat, & videat verum esse quod dicimus. Ceterum si Memithe Glaucium est, si. ri non potest, ut Papauer cornutum, quæ diuersa a Glaucio herba est, existat. Et mirum certe hæc ætenus nihil profecisse Dioscoridem, quæ lib. 4. cap. 60. errorem hunc, ut potest seculo etiam suo multorum animis insedentem, explorum cupiens, de Papauere conueto sic

Variæ de Memithe nostri seculi Medici sententia.

Memithe non est Chelidonium.

Memithe non est papauer cornutum. Memithe Græcis & Latinis Glaucium dicitur.

ſcribit: *ἡ δὲ τῶν ἀνθῶν τοῖς μὲν αὐτοῖς ἐκ τούτου τὸ γλαυκίον γίνεσθαι, τὴν τὸν φύλλον μίμνησιν.* hoc est: *Falsi sunt nō. A nulla foliorum similitudine, Glaucium ex hoc Papaueris genere fieri existimantes.* Plinius quoque errorem hunc libro 20. cap. 19. indicauit, dum post cornuti Papaueris notificationem ita inquit: *Quidam hoc genus Glaucium vocant.* Et post eum Hermolaus in suo Corollario cap. 99. ita ſcribens: *Hinc temperatur collyrium, quod Medici Diaglaucium vocant, in quod recentiores Papauerē cornuto vtuntur, aut etiam Chelidonio maiore, vt nihil profecerit Dioscoridis attestatio in mentione Papaueris illius, cum alioquin magno periculo hac parte hallucinentur, quod Chelidonii & Papaueris eius natura erodendo sit, Glaucii multo mitior, & refrigerando fere.* Propterea collyrium ex illo iumentorum oculis adhiberi solet, ex Glaucio humanis. Proinde sicubi posthac in Arabis Memithes mentio incidat, Medici nō Chelidonium maius, aut cornutum Papaueris, sed Glaucium potius intelligant.

Herbam Lichenem Græcis dictam, Platearium præter omnem rationem Hepaticam, quasi hepatici conferat, nominare quando id nominis Eupatorio Græcorum potius, veterum testimonio, conueniat.

CAP. XXXVII.

Platearii de
Hepatica
ſententia.

PLEATEARIUS herbam Hepaticam ita pingit: *Hepatica est herba crescens in aquis & lapidosis, habet folia minuta, terra lapidibusque adherentia.* Et dicitur Hepatica, quia præcipue est hepatis iuuatiua. Platearium secutus est Pandectarius & alii quidam, qui hanc herbam contra lienis hepatisque valere obstructions, eiusque morbos omnes dixerunt. Quantum vero ea in re decepti sunt, pulchre monstrabimus, vbi primum C herbam Hepaticam Serapioni, Plateario, & aliis dictam, ab ea quam Dioscorides, Galenus, Plinius, atque alii Lichenem nominant diuersam non esse ostenderimus. Minime autem differre inter se Lichenem & Hepaticam vtriusque descriptio satis probat: quæcunque enim Serapion de Hepatica ſcribit, eadem omnia Galenus de Lichene quoque tradit. Serapio namque de Hepatica ita: *Hepatica, inquit, nascitur in lapidibus humectis, & cadit super eam ros, & est similis lenticula aqua. Et virtus eius prima infrigidat infrigidatione pauca, & desiccatur. Et secunda abstergit, quoniam ipsa acquirit absterſionē & desiccationem a lapide, & infrigidationem ab aqua. Et tertia prohibet impetiginem, & apostemata calida.* Galenus autem lib. 7. de simp. med. facult. de lichene in hunc modum: *λεγχὴν οὖ μὲν τῶν πετρῶν, ἐστὶ δὲ οὖν βρύον, τὸ γένος δ' ἐστὶν ἀνθῶν τοῖς μὲν αὐτοῖς ἐκ τούτου τὸ γλαυκίον γίνεσθαι, τὴν τὸν φύλλον μίμνησιν. ἡ δὲ τῶν ἀνθῶν τοῖς μὲν αὐτοῖς ἐκ τούτου τὸ γλαυκίον γίνεσθαι, τὴν τὸν φύλλον μίμνησιν. ἡ δὲ τῶν ἀνθῶν τοῖς μὲν αὐτοῖς ἐκ τούτου τὸ γλαυκίον γίνεσθαι, τὴν τὸν φύλλον μίμνησιν.* D *ἡ δὲ τῶν ἀνθῶν τοῖς μὲν αὐτοῖς ἐκ τούτου τὸ γλαυκίον γίνεσθαι, τὴν τὸν φύλλον μίμνησιν.* *Lichē qui in petris nascitur, est velut muscus quidā, sed recte ex plantarum genere censerī potest. Porro ita nominatus videtur, quod lichenas curet. Extergentem habet ac modice refrigerantem facultatem, utranque vero resiccantem. Atque abstergentem quidem atq; exsiccantem a petra obtinet, refrigerantem vero ab humore aquæ: nascitur enim in humidis & grauiter oblitibus saxis. Porro quod ex talibus componitur substantiis, aduersum esse phlegmone nihil mirum est. Imo quæ apud Serapionem ex Dioscoridis auctoritate de Hepatica ſcribuntur, manifeste indicant hanc esse Lichenem. Serapion namq; ita ait: Quando fit emplastrum cum ea, abscondit hæmorrhagiam, & sedat apostemata calida, & curat impetiginem, & configitur cum melle, & confert icteritiæ, & sedat apostemata linguæ. Quæ certe ex Dioscoride esse desumpta nemo non videt, qui libro 4. cap. 50. in hunc modum Lichenem depingit: *λεγχὴν ὁ ἐπὶ τῶν πετρῶν, ὃ δὲ βρύον καλεῖται. βρύον ἰσὶν αὐτοῖς γένος τῶν ἐσθρῶν πετρῶν. τὸν αἰσθητικὸν ἰσθμὸν, & φλεγμονῆς παρακτῆται, & λεγχῆν γένος τῶν ἀνθῶν. ὠφέλι δὲ & ἰκτερικὸς μετὰ μίλιον. ἡ δὲ τῶν ἀνθῶν τοῖς μὲν αὐτοῖς ἐκ τούτου τὸ γλαυκίον γίνεσθαι, τὴν τὸν φύλλον μίμνησιν.* hoc est: *Lichen qui in saxis, aliquibus Muscus appellatur. Muscus est roscidis petris adherens. Hic illius sanguinis profluvia sistit. Inflammationes arceat, & impetigines sanat. Iuuat regio morbo correptos cum melle inunctus. Oris & linguæ defluxiones inhibet.* Ex iis descriptionibus omnibus inter se collatis euidentissimum fit, Hepaticam non esse aliam herbam præter eam, quæ a Græcis Latinisque Lichen dicitur. Quod si verum est, vt est vtiq; satis dilucidum est, Hepaticam id nominis non assecutam, quod Hepati proſit, quemadmodum Platearius ſomniat, quod iis effectus, & sicque a Dioscoride, neque a Galeno, aut aliquo alio veterum, adde, neque etiam Serapione ipso, Licheni tribuatur. Lege Paulum Aeginetam & Plinium ipsos lib. 26. cap. 4. vbi Lichenem describit, & nusquam Licheni eam facultatem illorum testimonio inesse comperies. Quod si verò quis Lichenem herbam iccinori prodesse ea ratione*

Hepatica
Græcis Li-
chen dici-
tur.

Lichen ic-
cineri non
prodest.

A si one quod morbo regio, qui hepatis vitio prouenit, affectis conferat, contenderit, huic ita responsum volo: Lichenem herbam non intro sumtam ad tollendum regium morbum, sed extrinsecus potius adhibitam efficacem esse; idque non alia ratione, nisi quia extergendi facultate prædita sit, qua ut impetigines, ita & cutis sceleratam in regio morbo obortam auferre potest. Proinde si qua herba propter insignem iuuandi iecur facultatem hoc nomine insigniri meretur, ea certe Eupatorium Græcorum erit, quæ Hepatorium & Hepaticis Dioscoride etiam teste dicta est, quod hepatis non parum proficit: ita enim Dioscorides de eadem libro quarto, capite 38. scribit:

Εὐπατόριον ἔστιν ἡ βότρυς τοῦ κιννάδου, ἢ τοῦ κιννάδου, ἢ τοῦ κιννάδου, ἢ τοῦ κιννάδου. id est: Semen aut herba in vino pota, iecinorosis con-

fert. Et Galenus libro 6. de simpl. med. facult. in eam sententiam: τὸν κιννάδου ἡ βότρυς τοῦ κιννάδου. id est: Obstructiones iecoris expurgat. Inest

et iudem & adstrictio quadam, per quam robur addit visceri. Quare quod Eupatorio debet, Licheni, quam Hepaticam vocant,tribuendum non erit. Sed hic nobis reclamatur Montuus, ac suis ficulis copius nobiscum congregi aude, dicens, aliquot simplicium medicamentorum effectus, & per multa alia quæ priscos latuerunt, posteriores reperisse. Fatemur quidem multa esse hodie in Medicorum frequenti usu, quæ veteribus incognita fuerunt, ut est *Casia Arabum*, & alia nonnulla, nec ea esse inutilia ob id dicimus quod priscos ignorata sunt, quis enim eo stultitæ progredieretur? Negamus autem constanter quod illarum herbarum quæ veteribus cognitæ fuerunt, non uos hodie, ac ab illis ignoratos, inuenerint effectus. Nam, ut supra quoque diximus, tam

experientiam nostri sæculi Medici nondum consecuti sunt, ut gloriari possint se quicquam iis medicamentis, quæ Galeno ac veteribus aliis cognita fuerunt, addidisse, inuenisseque in iisdem, quod uis illis signotum fuerit. Non est itaque par argumentatio, veluti Montuos dialecticæ rationis non satis peritus putat, si quis ita colligat: Arabum Casia Galeno incognita fuit, ad leniendam igitur aluum inutilis, ac si quis in hunc modum argumentetur: Hepatica a Dioscoride ac aliis veteribus probe cognita, ac sub Lichenis nomine descripta, nullas iisdem auctoribus iuuandi iecur facultates habere inuenitur, iecori igitur minime confert. Prima siquidem colligendi ratio plane inutilis est & invalida, quod argumentum ab eius auctoritate qui rem illam de qua testari debeat ignorauit, deductum inefficax sit, quæ eademmodum supra etiam

multis docuimus. Altera vero argumentandi ratio valida admodum existit, quod ab eius auctoritate deductum sit, qui rem de qua testatur absolutissime agnouerit & perfecit. Nec tantum ab vnius Dioscoridis, sed multorum aliorum recta cognitione herbarum præditorum auctoritate deductum est, adeo ut hoc genus argumenti a testium numero quicquid ductum videri possit. Quare cum suis ineptissimis argumentis Montuus sese in angulum aliquem tutum recipiat, nam talia sunt quæ in planitie ac in aperto consistere non possunt. Et ut id silentio non transeamus, nemo inficias ibit herbam Lichenem, Hepaticam ideo dici posse, quod iecoris fibræ similis sit, & idcirco ita nominatam primum ab Herbariis arbitror, donec Platearius & alii quidam succedentes, aliam quandam & erroneam eius nominis causam eninfixerint.

Phaselum non a Phasolo, sed a Phascolo legumine, quod Dolichum alio nomine vocant, diuersum penitus esse.

C A P. XXXVIII.

M V L T I nostræ ætatis raræ eruditionis viri, Phaselum cum Phascolo, non sine magno errore confundunt. Inter quos certe Marcellus Florentinus, Dioscori interpret, existit, qui 98. lib. 2. eius auctoris caput 4. de phascolo quidem non recte inscribit, *Phascolum*, namque Dioscoridis, a Phascolo est diuersus, ut post ostendemus: errat etiam quod in commentariis Dolichon esse eundem suspicatur, cum Smilax eiusdem hortensis sit, ut ex sequentibus patebit. Nullam denique inter Phaselum & Phascolum diuersitatem faciunt Copus, & Albanus Torinus, Pauli Æginetæ interpretes, cap. 79. lib. 1. ubi tamen idem auctor manifeste Phaselos a Phascolis distinguit, hos dolichos alio nomine, illos autem Phascolos tantum vocans. Proinde diligenter admodum animaduertendum quid auctores Græci Phaselum, quidq; Phascolum nominauerint. E nullo autem id ipsum rectius discemus, quàm e Galeno, qui libro primo de alimentorum facultatibus eorundem leguminum cognitionem exacte tradit, locis illa

Eupatorium
Hepatorium
quare di-
ctum.

Montui an-
notatio con-
fatur.
Multa ho-
die in fre-
quenti sunt
Medicorum
usu veteri-
bus inco-
gnita.

Quando ar-
gumentum
ab auctori-
tate ductum
valcat, &
quando mi-
nus.

Lichenem
Hepatica
primum
dicta.

Marcelli
Florentini
error.
Phascolum.

Phascoli
rubei.
Varia Pha-
seolorum
nomina.

Phaeolos
Diotcori-
des sub Smi-
lactis Hor-
tensis nomi-
ne descri-
pſit.

**Smilacis
hortensis
descriptio.**

Ala cantha
ridum non

abicienda.

Monti an
notario re-
felliens

Cánthari-
destotas in
gerendas

elle Galeni
testimonio.

potius esse ingeren las, quam citra alas, testatur grauissimus auctor Galenus, qui lib. II. A de simpl. med. facult. ita de Cantharidib. scribit: *οἱ δὲ πῶς ἡμεῖς διδάσκοντες βίβαναι αὐτῶν ἕλγος εἰς ὀφθαλμοὺς φέρουσιν. ἔτι δὲ μὲν τὸ πλεονεξῆς τὸς πόδας ἐμβάλλουσιν, ὃ δὲ καὶ ἀλεξήτεια φασὶν εἶναι τοῖς τὰ πόδια ποιεῖν αὐτῶν. ἔτι δὲ ἱμπαλὸν ἡμεῖς δὲ ὅλους ἐμβάλλομεν.* quod est: *Quidam præceptorum meorum earum paulum quiddam in medicamenta urinam mouentia solet iniicere. At quidam solas alas & pedes iniiciunt, qui aiunt esse remedia iis qui corpora ipsorum bibissent.* Id quod & in commentario centesimo decimo quarto libri quarti de victus ratione in morbis acutis facit, vbi inscitiam Medici cuiusdam Hippocratem non recte intelligentis notat, qui corpora potius Cantharidum quam caput, pedes & alas exhibere non sine summo ægrotantis exitio voluit. verba Galeni hæc: *Ταῦτα πρὸς ἀναγνώσας τὴν ῥῆσιν ἰατρῆς πολλῆς, ἀφελὼν τὰ ἀναγκαῖα μέρος τὸν καυτηριδίου ἐδύκετο ὑδροπικῶν, καὶ μετακίνας ἡμέρας δαψνησάμεν χρόνι ὁ αὐτῶν εἰς τὴν γαστροτερμίαν, ὅτε μὴ τρεῖς ἡμέρας, τμηθεὶς ὑπ' αὐτῶν πλείους ῥηέντες ὑδάτες, ἰδέσθαι γαστροπικῶν, ἀποστρέφειν γὰρ τὸ πλεονεξῆς τὸ πλεονεξῆς τὸ πλεονεξῆς, αἰὲν ὅμως ἐπίσταντες ὅτι πολλὰς ἡμέρας ἐπὶ τῆς δυνάμει τῆς ἰατρῆς κακῶς φέρονται διδόντες τὸ σῶμα τῶν καυτηριδίων, ἐχθρῶν ἀφελόντες τὰ σώματα δύνανται πλεονεξῆς τὴν κεφαλὴν καὶ τοὺς πόδας καὶ τὸ πλεονεξῆς, καὶ πῶς εἶναι τὸ καὶ τὸ βίβαναι εἰρημῶν, ὅτι ὡς ἔστιν ὅτι οὐ πάλιν ἰατρῆς, ἐπ' ἄλλου πάλιν δίδουκε οὕτως, ὅτι δαψνησάμενος ὅμως καὶ τὴν μὲν γαστροτερμίαν καὶ τμηθέντες αὐτὸν μὴ πολλὰς ἡμέρας, δαψνησάμενος συνήκει καὶ τέτοιον.* hoc est: *Quidam dictionem haudquaquam intelligens audax Medicus, prædictas partes a cantharidibus abiecit, deditque hydropico, cui quum a primo die abscessus in sura comparuisset, post tres alios dies sectus est, effusaque copiosa aqua, curatus esse visus est, quod plurima pars tumoris præter naturam statim ad moderationem redacta sit: veruntamen non multis post diebus obiit. Quam ob causam Medicum quidam increpauit perperam datam esse Cantharidum corpora inquiens, etenim propinanda ablatis corporibus tum caput, tum pedes, tum alas idque esse quod in dictione libri diceretur. Quare non cunctatus audax ille Medicus, alteri ita propinauit, moxque factò similiter in femore abscessu, sectoque multis post diebus, hominem mori contigit.* Ex quibus iterum satis liquet corpora Cantharidum sola, citra alas præsertim, pedes, & capita, non esse exhibenda: ita vt vehementer errent qui dictas partes abiiciunt: nihilq; mirum si vlusearundē male cesserit. Præterea cum vis illarū, teste Dioscoride libro iam dicto, sit erodere, vlcerare, caloremq; elicere, curandum vt iis tantum medicamentis misceantur quæ extrinsecus ad mōta pforas, lepras, ac sepra quædam sanant. In interiore autem vsu plāne suspectæ sint, nam iis qui hauserunt Cantharides, Dioscoride lib. 6. cap. 1. teste, ab ore ad vesicam cuncta eroduntur, ac cum lotio subinde sanguinem emittunt. Proinde cum multa alia sint medicamenta quibus urinam ciere datum sit sine noxa, caueant horrore a tam periculoso medicamento Medici, ne infelicem quorundam audaciam secuti, multo neci tradant. Delegitimo autem Cantharidum vsu plura etiam libro 1. de compositione medicamentorum capite decimo quinto diximus.

Cur vsus cantharidum Medicis nostræ temperatis male cesserit. Cantharides in vsu interiore suspectæ.

Mumiam vocatam non solum esse humanorum cadauerum tabidam saniem, vt multi crediderunt, sed id etiam quod Pissasphekton Dioscorides nominat.

C A P. X L.

NE M o hodie ferme est Medicorum qui non pertinaciter credat Mumiam tantum humanorum cadauerum saniem, aloe & myrrha commixtam & e sepulchris effluentem esse: idq; vt crederent effecit in suis synonymis Razes, qui de Mumia ita tradit: *Mumia res est qua inuenitur in terris vbi mortuorum corpora aloe condiuntur, a quibus humor mortui cum aloe mixtim resoluitur.* Razem secutus est interpres Serapionis cap. 283, præter tamen huius, vt paulo post monstrabimus, mentem, ita scribens: *Mumia sepulchrorū cum aloe & myrrha, & quod admiscetur eis ex humiditate corporis humani.* Hos duces tandem vniuersus & Medicorū & pharmacopolarum chorus sequi cœpit, Mumiamque hanc vnicam, tanquam rem preciosam admittari, in vsum medicum adhibere, cum tamen vera, iuxta etiam illorum sententiam, haberi vix possit, timorq; sit ne impostores quidam æmulam illius, accepta scilicet e patibulo, aut rota tortrice cadauerum sanie, coruorum stercoribus pro aloe & myrrha, commaculata, conficiant, ac aliis pro vera vendant. Et eouq; etiam processit pharmacopolarum stoliditas, vt non saniem tantum cadauerum venalem exponant, sed tota etiam corpora in vulgi admirationem, tanquam aliquid ex septem illis orbis spectaculis, ostendunt. Quod quidem damnandum non erat, modo abiectis ossibus ipsis, saniem tantum cum aloe & aliis commistam in vsus medicos adhibuissent. Ceterum, vt Mumia iam dicta, & hodie etiam sola a plurimis tum Medicis, tum pharmacopolis vsurpata, artificialis est: ita quoq;

Razis de Mumia sententia.

Pharmacopolarum mira stoliditas.

A quoque præter hanc alia est natiua, Serapioni & Auicennæ Mauritanis cognita, quæ Dioscoridi & Plinio Pissasphaltus nominatur. Serapion liquidem *cap. 283. sui de simplicium temperamenti libri*, Mumiam iis verbis, ex Dioscoridis sententia, describit: *Est in terris quæ dicuntur Acolonia, (Apollonia legendum) descendit namque ex montibus qui ducunt flumina, cum aqua, & eicit eam aqua fluminis in ripis, & est coagulata, & fit sicut cera, (gleba scribendum) & habet odorem picis & asphalti mixtorum.* Quibus utique verbis Serapion ita euidenter Dioscoridis Pissasphaltum inuauit, ut nemo, nisi talpa cæcior sit, hoc ipsum non videat. Verba enim Dioscoridis *lib. 1. cap. 93.* quibus Pissasphaltum depingit, hæc sunt: *καλεῖται δὲ τις ἐκ πηλᾶσφαλτος. γεννᾶται ἐκ δακρυῖος τῆς ἐκ τῶν ἐπιδάμνων, ἢ τις ἐκ τῶν κερκίρων ὅπου συνίσταται φέρεται τῆ τοῦ ποταμοῦ ῥοῆς, καὶ βράζεται ἐν τῇ πύρρῳ, καὶ οὕτως ἐκέρχεται, ὅθεν πικρὸς μίγματις ἀσφαλτος.* quod est: *Vocatur & quoddam bituminis genus Pissasphaltus: nascitur ad Apolloniam circa Epidamnnum,*

B *Id ex Cerauniis montibus fluminis impetura pitur; & in littora eructatur glebarum modo coactum, mistam bitumini picem redolens.* Ex quibus verbis quisque Serapionis Mumiam nihil aliud quam Dioscoridis Pissasphaltum esse intelligit. Meminit & Pissasphaltum; Galen. *lib. 11. de simpl. med. fac.* quod in Apollonia Epiri; & per alia id genus loca multa aquis sponte nascentibus cum spumam quandam innatantem reperiunt ait; & molle quidem esse dum innatat, postea vero resiccatum pice sicca durius effici. Neque alia est Mumia quam secundo Canone, *cap. 478.* describit Auicenna iis verbis: *Mumia quid est? Ipsa est in virtute picis & asphalti commixtorum, & naturis utrorumque.* Adeo ut satis mirari non queam, quo pacto acciderit ut tam assidui Auicennæ lectores iam dudum errorem hunc non deprehenderint. Atqui tam stupida est quorundam

C Medicorum nostri seculi credulitas, ut ab eo quod semel sibi persuaserunt, recederent, non velint nec possint, ideoque factum ut vanissimum hoc de vñica Mumia commentum per tot annos mordicus tenuerint. Curent igitur horror ut potius natiuam Mumiam siue Pissasphaltum in usum medicum reuocent, ne vulgus officinas nostras, in quibus sanies cadauerum pro medicamento venditur, tanquam ipsissimas carnificinas, ac vulturum potius quam hominum tabernas, abhorreat, fugiat, & miseris modis exsecratur. Quis enim, nisi ex anthropophagorum sit albo, remedium id non fastidiat? Abstineant itaque ab horrendo hoc & modis omnibus vulgi iudicio exsecrando medicamento horror, quandoquidem, eas facultates quas illi hodie tribuunt, natiua Mumia multo efficaciores habeat. Nec est cur Arabibus, Razi præ-

D sertim, additi Medici, odiosius nobis repugnent, ut usitatam hætenus Mumiam ex officinis nostris, & plane e medio tollamus, quum aliam, adeoque veram, pro illa demonstramus: nempe Pissasphaltum, quæ hodie magna copia affertur, & a Strugardianis Sepalsariis venalis pro vera Mumia usurpatur. Hic silentio inuoluere non possum, me olim a Georgio Tanstettero Collimicio viro doctissimo deceptum fuisse, qui pro vera Mumia & Pissasphalto ad me olim rem misit, quam tribus fere miliaribus ab Inspruck inueniri, & germanice Tirschenblut aut verius Dursenblut, id est, Gigantum sanguinem, vocari scripsit, quæ non erat nisi Gagatis lapis. Nam dura est & lapidem duritiæ donata, colore nigra, aliqua ex parte læuis, nec Picis modo liquefcit, guttasque de se fundit si igni admoueat, sed trita in puluerem redigi potest, accensa-

E que bitumen redolet, omnesque adeo Gagatis lapidis notas a Dioscoride traditas refert. Contra Pissasphaltus pinguis est, ignique admota, aut manibus tractata liquefcit ac mollescit, guttasque de se fundit, ac mistam bitumine picem redolet, ut *fusus libro primo de comp. medicamentorum cap. 20. diximus*, ad quem locum lectorem nunc remittimus. Ceterum ut & quam facultatem vera Mumia obtineat Medici perspectum habeant, sciant illam nullas alias, nisi picis & bituminis habere vires, nam ut illorum nomina, sic & facultates possideret. Testis est Diosc. qui capite 92. primi libri ita scribit: *ἢ ἢ πηλᾶσφαλτος διὰ τὴν ὅτι πικρὰ ἐστὶν καὶ ἀσφαλτος μίγματις, hoc est, Pissasphaltos omnia, quæ pix & bitumen mixta simul, potest. Id quod confirmat etiam Auicenna, qui loco paulo ante citato, Mumiam picis & bituminis vires naturamque habere dicit. Pix vero, arida præfer-*

F tim, Dioscoride *lib. 1. cap. 88. teste*, calefactoriam vim habet, emollit, pus mouet, tubercula & furunculos d. scurit, vlcera replet. Vulnerariis præterea medicamenti commode miscetur. Gal. *lib. 8. simplicium* leprosos ungues eximere cum cera mistam, lichenetq; detergere, duos & crudos tumores omnes concoquere posse ait. Ad ea que o-

Officinae
pharmaco-
polarum,
vulgarum
porius ta-
betna.

Georgius
Tanstetter.

Picis vis

Bituminis
facultas.

omnia humidam valentiorē esse: aridam vero picem, tametsi ad hæc quidem deteri-
or sit, glutinandis tamen vulneribus magis congruere. Bitumen autem, *Dioscoride lib. 1.
cap. 92. auctore*, inflammationes arcere potest, glutinat quoque, emollit & discutit. Vul-
narum procidentis stragulationibusq; appositum, olfactum & suffitum prodest. Co-
mitiales morbos suffitu, Gagatis lapidis instar, deprehendit. Menses cum vino & ca-
storio potum cit. Prodest diutina tussi, anhelantibus, & suspiriosis, serpentium morfi-
bus, coxendicum & laterum doloribus. Datur deuorandum coeliacis. Cum aceto po-
tum sanguinem concretum dissoluit, Dysentericis cum præsana liquefactum infundit-
tur. Destillationes suffitu sanat. Dentium dolores oblitum mitigat. Calfactum cum
farina hordeacea, cera, & nitro illitum, podagris, articulorum doloribus, lethargicis-
que confert. Et ut summam Galen. libro 11. de simpl. med. facul. inquit: *Bitumine utimur* B
& ad glutinationes vulnerum cruentorum, & ad alia omnia quæ exsiccari debent cum modica cal-
factione. Plinius lib. 24. cap. 7. breuibus Pissaphalton depingit sic scribens: *Est & Pissaphal-*
tos, mixta bitumini pice, naturaliter ex Apolloniatarum agro. Quidam autem ipsi miscunt
præcipuum ad scabiem pecorum remedium, aut si fortis mammas læserit. Has ita-

Arabes Mu-
miam cum
Cyrenai-
co succo con-
fundunt.

que facultates vera mumia, quæ Pissaphalton est, veterum testimonio haber. Porro
nonnulli e familia Arabum Mumiam non sine magno errore cum succo Cyrenai-
co, qui ex Silphio, quod Romani Lascerpitium vocant, colligitur, confundunt, ut vi-
dere licet apud Serapionem, ubi Aben Mesuah Galenum Mumiam inter oculares
medicinas referentem his verbis citat: *Galenus memorauit eam in Almayemur quando lo-*
cutus est de soda in libro quarto, & dixit quod ex medicinis oculorum sunt quadam calida acuta, sic C
ut mumia, & asa, & serapinum, & euphorbium, & vniuersaliter omnis medicina quæ calefacit
fortiter, absque eo quod faciat in oculo asperitatem. Evidentissimum autem est, Galenum
hoc loco nullam Mumie mentionem fecisse, id quod eius verba abunde demon-
strant, quæ sic habent: *ἡ δὲ τῶν ὀφθαλμίων ἐκαστοῦ τῆς τῆς ὕλης καὶ γὰρ ἐστὶν ἡ τῶν ὀφθαλμίων ἰσχυρὸς ὁ πικ-
ρῶν, καὶ μολιγῶν, ὁ σαρκῶν, καὶ εὐφωρίου, καὶ ἀπὸ τῶν ἐκείνων, ἡ τῶν ἡμετέριων σφοδρῶς ἀπὸ τῶν τερψιφῶν:* quod est:
Contrariissima autem genere existit prædictorum materia, ea quæ acrium est succorum, veluti Cy-
renaiici, Medici, Sagapeni, euphorbii, & ut summam dicam; eorum qui valenter sine exasperatio-
ne calefaciunt. Ex quibus verbis satis clarum est Mesuah *κυρηναίου* dictionem perperam pro
Mumia vertit. Proinde cum Arabes suæ Mumie multas facultates, quæ Cyrenai-
co debentur, assignauerint, prouidos esse cupio Medicos, ne illas Mumie veræ ineffe D
credant. Hic iterum expendant studiosi, quantum Arabum inscitia, illosque mordi-
cus tenentium morosa imitatio pristinae ac veræ medicinae incommodarit: vtinam
autem illorum nugæ nunquam introspexisset maiores nostri, aut saltem non tanti
fecissent, nam ita minus hodie errorum haberet medicina.

Arabum in-
scitia pristi-
nae medici-
nae multum
incommoda-
uit.

*Medicamentum purgans detrahendis humoribus esse simile, contra Mesuen,
illumque sequentes Medicos.*

C A P. XLI.

M V L T I s hætenus Mesue errandi occasio fuit, eo quod libro primo Canonum uni-
uersalium capite primo, intentionis primæ medicamentum purgans attrahendis
humoribus minime simile esse scripsisset. Verba eius subiiciemus: *Medicina*, inquit, E
laxativa non est sic, quia simile attractiuum huius, vel radicativum, sed quia tale. Sed quantum
a veritate deuiet, monstrant ea quæ scribunt veteres, in primis Hippocrates, qui in li-
bro de natura humana in hunc modum scribit: *ἢ φάρμακον ἐντὸν εἰσέλθῃ ἐν τῷ σώματι, πρῶτον μὲν*
ἀγὰρ ἐν αὐτῷ καὶ φύσιν μέλειται ἢ τὸν ἐν τῷ σώματι ἐντὸν, ἔπειτα δὲ καὶ τὸ ἄλλο ἔλκει πρὸς ἑαυτὸν. hoc est: *Pharmacū*
cum corpus intrauerit, primo id quod omnium maxime sibi secundum naturam cognatum atque
simile est, in corpore agit, exinde reliqua trahit & purgat. Probata autem idiptum eleganti
comparatione dicitur: *ὡς γὰρ τὸ σπέρμα πρὸς τὸ σπέρμα, ὅταν εἰς τὴν γῆν εἰσέλθῃ, ἔλκει ἑαυτὸν ὥστε φύσιν ἐκ τού-
του ἐν τῇ γῇ, καὶ ὅθεν γλυκύ καὶ πικρὸν καὶ ἄλμυρον καὶ πικρῶν πρῶτον μὲν ἐν καὶ πλεῖστον ἔλκυσσιν οἷς ἰσχυρὸν τὸ ὅτι ἀπὸ αὐ-
τοῦ καὶ φύσιν μέλειται, ἔπειτα δὲ ἔλκει καὶ τὸ ἄλλο. τοιοῦτον δὲ καὶ τὸ φάρμακον ποιεῖ ἐν τῷ σώματι.* id est: *Quemad-*
modum enim semina & stirpes terram ingressæ, sibi quæque quod in terra idoneum ac naturale F
est trahunt, vel acre, vel dulce, vel amarum, vel salsum, vel quodcunque. Primum igitur & pluri-
imum quod ipsis maxime secundum naturam sit trahunt, post alia quoque trahunt. Tale quid & me-
dicamenta in corpore faciunt. Quibus verbis aperte docet Hippocrates medicamenta
haud aliter quam plantas ac semina similem atq; proprium humorem trahere, quem-
admo-

Mesue erro-
nea de me-
dicamento
purgante
sententia.

Medicamē-
tum purgās
attrahendis
humoribus
simile.

Quare hu-
mor, quan-
doquidem
similis me-
dicamen-
tum non
trahat.

Montui argu-
menta
confutan-
tur.

Similitudi-
nem non
identitatem
substantiis
inesse oportere.

contrarium quotidiana nos, rerum magistra, experientia docet. Sed hic iterum ob-
luctatur Montuus, atque pro sua in rebus Dialecticis acrimonia ita ratiocinatur: Si
similitudo causa esset quare purgatorium medicamentum humorem traheret fer-
rum, ut inquit *Auicenna 4. primi*, certe ferrum attraheret, quando illi dominaretur, &
aurum itidem aurum traheret, ubi sua quantitate illi praevaleret. Cui obiectum non
est cur respondeamus, quandoquidem Galenus loco iam citato illam funditus ex-
plodat, sic scribens: *αἰμαῖ ἐπεὶ δὴ καὶ τὰς ἐλκυσ τῆς τῶν οὐσιῶν ομοίτητι ἰδεῖσθαι γίγνεται (διδασκῶν γὰρ παλαιὸς
ὡς ἐν ταῖς κηδεύσειν ὁλὴν τοῦ αἵματος τῆς κηδεύουσι φαρμάκῳ ἐστὶν, ἐν παντὶ ὁμοῦ τῶν χυμῶν ἀλοιωσὶς) ἀναγκαῖον ομοι-
ότητα ἵνα τῆς οὐσίας ὑπάρχει ἀμφοτέρω, τῇ τε τοῦ κηδεύοντος καὶ τῇ τοῦ κηδεύμενου. ἔπει τῶν κηδεύμενων ἐστὶ φλέ-
γμα, πᾶσι δὲ πρὸς τὸ ἔλκεν ἀνάγκη φλέγμα τῶνδε ὑπάρχειν. φλέγμα τῶνδε δ' εἶποι γίγναι ὑπάρχειν τὸ ἔλκεν, ὅτε ἀπ' αὐτοῦ αὐτὸ
φλέγμα. Ἐ γὰρ ομοιότητι, τῆς οὐσίας ὑπάρχει ἴσχυος, ἐν ταύτῃ τῇ, ὅταν αὐτοῖς γὰρ ἀπ' αὐτοῦ σιδήρεος ἀδρῶν, οὐτὶ περὶ ἔλκεν
σιδήρεον. αἰμαῖ γὰρ σιδήρεος λεῖος τὸ σιδηρεόν, ὅδ' ὑπὲρ τὸ αἷμα. ἀλλ' οὐ μὴν γὰρ δὲ οὐ μὴν τὸ πᾶσι καὶ τὸ οὐ μὴν φλέγμα γὰρ γὰρ φλέγμα* B
ταύτῃ, καὶ κινῶν κινῶν. φλέγμα δὲ ομοιότητι, οὐ μὴν ταύτῃ γὰρ. id est: *Posteaquam attractiones substantiarum
fieri similitudine ostendimus (demonstratum enim subinde est, in purgationibus attractionem
esse eorum quae purgantibus medicamentis similia, haud vero omnium simul succorum altera-
tionem) similitudinem inesse quandam utrisque substantiis & eius videlicet quod purgat, & eius
quod purgatur, necesse est. Porro quum quod purgatur, pituita est, quod trahit, pituitosum sit oportet.
Pituitosum autem esse oportere quod trahit diximus, non autem plane pituitam. Etenim
similitudinem inesse substantiis diximus, non identitatem: contrarium enim in uniuersum. Nam
neque ferrum attrahit ferrum, neque caro carnem, sed lapis sideritis ferrum, caro sanguinem. Diffe-
runt enim, mea quidem sententia, idem & simile. Quippe pituita pituita eadem est, & cnicus cnicus:
similis autem pituita cnicus, non tamen idem. Similia enim sunt, quae in eodem qualitatibus
prædita sunt. Quod capite octauo suarum categoriarum confirmat Aristoteles,
qui similia & dissimilia per solas qualitates dici ait. Ut proprie loquendo similitu-
do non sit nisi differentium rerum eadem qualitas. Recte igitur Galenus ait, simi-
le & idem differre. Nam in iis quae similia sunt, circumstantiae aliquae dissimiles re-
periuntur: in iis vero quae eadem sunt nequaquam. Proprie itaque loquendo ferrum
ferro idem est, quod nulla dissimilitudinis circumstantia in duobus ferris appareat,
non autem simile. Nec ab re adlectum nobis est proprie, quod scilicet cet vulgari & com-
muni loquendi ratione etiam ea quae eadem sunt, saepe similia dicantur, ut quum
ouum ouo, lac lacti non esse magis simile affirmamus. Quae enim hac ratione similia
inuicem dicuntur, non secundum insitam familiaritatem, seu qualitatem, sed iuxta D
idēam, ut Galeni verbo utar, id est, formam siue speciem, similia sunt. Ouum enim ouo
forma simile, itidem ferrum ferro, absinthium absinthio. Quae utique loquendi ra-
tione & ego olim contra Montuum disputans usus sum. Plura vero ad erroneam Mes-
uez sententiam refutandam conducentia in commentariis nostris super libros Gale-
ni de simplicium medicamentorum facultatibus diximus. Proinde ad Montui
rationem non sequitur, quod ferrum traheret ferrum, quia ferrum non simile,
sed & idem ferro est. Quod vero deinceps ait Montuus, medicamentum purgans
non attrahere humorem, quod huic secundum manifestam qualitatem simile sit,
plane ridiculum est: quis enim est qui nesciat id ipsum de manifestis qualitatibus
non esse intelligendum? qui enim ita fieret ut Cnici semen, quod tertii est ordinis
calefacientium, pituitam quae frigida existit, attraheret: Quare non opus erat cur
Paulum Aeginetam in testam ascisceret. Mentitur vero insigniter, quod Mesuen
Hippoerati & Galen. non dissentire ait, cum constet Mesuen simpliciter negare, nul-
lo habito ad occultas aut manifestas qualitates respectu, medicamentum purgans
humoribus attrahendis esse simile. Atqui bonus senex instar sui magistri Auicennae, a
quo medicinam doctus est, simul calidum & frigidum spirare solet: iam enim similes
humores medicamentis purgantibus, iam autem dissimiles esse fatetur. Hinc post
multa quibus praeter necessitatem occultam proprietatem ostendere conatur, ita
colligi: *Omnis actio fit a contrario, ut declarat Aristoteles primo de generatione & corruptione:
Humores autem attractio a solutiua medicina actio est, igitur attractio illorum a contrario, ac conse-
quenter a dissimili fit. Quae argumentandi ratio quam pulchre procedat, quisque me-
diocriter saltem eruditus intelligere potest. Nam hac ratione colligere licebit, nullam
inter id quod nutritur & alimentum ipsum, esse similitudinem: quod omnium falsis-
simum est, quemadmodum ex libro 3. de temperamentis Galeni liquet, ubi in hunc
modum**

Medicame-
rum purgans
non per ma-
nifestas qua-
litates attra-
hit.

Nō omnis
actio fit a
contrario.

- A** modum scribit: τὸν ζῶον ἕκαστον οὐκ αὖτε τρέφεται τρεφόμενος, ἀλλὰ ἐκ τῆς ἐν αὐτῷ τρεφῆς τῆς ἐν αὐτῷ ἐξ ὧν διαιτᾷ τῇ τρεφόμενῳ σῶματι: καὶ τὸν τὴν ὅλην οὐσίαν αὐτῷ τρέφοντα, ὅλην δὲ τρέφοντα φύσει ἡγεμονίαν τὴν πρὸς ἐμμεσίαν καὶ κατὰ φύσιν. quod est: *Omne animal conueniente sibi nutritur alimento, conueniens autem cuique alimentum est, quicquid assimilari corpori quod nutritur, potest. Oportet igitur toti nutrientis substantia, cum tota nutriti natura communio aliqua, similitudoque sit.* Proinde sic colligamus: *Omnis actio fit a contrario: alimenti autem in nutritione attractio est actio: igitur alimentorum attractio fit a contrario.* quod omnium falsissimum est. Attractio enim alimentorum nō a contrario, sed simili fit: est enim, ut diximus, inter alimentum, & id quod alitur, alimentumq; ad se trahit, similitudo quædam, veluti supra etiam ex Hippocratis comparatione de seminibus & plantis monstrauimus. Quid itaque ad Aristotelis, quo Montuus vitur, dictum respondeamus? hoc nimirum, Montuum hoc loci abusum esse tanti philosophi: testimonio, neq; enim ille vnquam dixisse offenditur, etiam si totum illum ἀπὸ γένους ἐ φρεσὶς Aristotelis dictum velle intelligendum.
- B** librum perlustres, omnem actionem a contrario fieri. Et ut rem penitus habeant studiosi, in cap. 7. eius libri Arist. duas veterum recenset sententias, quarum prima dicit, *ὅτι τὸ πρὸ ὅργου ἰσχυρὸν ὁ ὁρμὴ πρὸς ἀπὸ τοῦ ἐν, hoc est, quod nullum simile a simili quicquam patitur.* Altera Democriti existens contrarium plane statuit, nempe ὁρμὴν εἶναι τὴν πρὸς τὸ ἐν τὴν πρὸς τὸ ἐξ, id est, *tum agens tum patiens similia esse*, atque adeo vna secta actionem a contrario, altera autem a simili fieri dixit. Vtrique autem improbat Aristotel. tanquam veritati nō satis consonas, cum ea quæ agunt & patiuntur talia existere oporteat, ut quodammodo similia, & quodammodo dissimilia & contraria sint. Ita Cnicus agit in pituitam, hanc scilicet attrahens, quod huic partim similis, partim dissimilis existat. Similis quippe secundum substantiam, quia pituitosus est: dissimilis autem secundum qualitatem manifestam, eo quod pituita frigida Cnicus autem calidus sit, huicq; adeo fit, ut Cnici manifestus calor insitam sibi tractricem facultatem, ut paulo ante dictum est, inueniat.
- C** Errat itaq; Montuus quod simpliciter omnem actionem a contrario fieri putat, cum hanc sententiam Aristoteles vta veritate alienam penitus impugnet. Proinde ipse soluitur, Aristoteles non recte intelligens, potius quam Manardus aut ego, qui ita, Dei benignitate, Galeni placita ac dogmata tenemus, ut Montuo in hoc probe tractando præceptores esse non detrectaremus. Reliqua quæ producit, ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ διόρου, ob id necesse non est, ut illa diluamus. Nos hic simplicium medicamentorum paradoxis colophonem imponemus, quod alibi de his multa dixerimus, & quod facile quisque ad illorum exemplum reliqua, etiam suo Marte scrutari ac colligere possit, atq; composita aliquot, in quibus a vulgi sententia dissentimus, attingemus.
- D**

Theriacam, cuius vix hodie verum exstat nomen, eos quos veteres pollicentur effectus nostro seculo non præstare, quod multa huius confectionem constituentia, nedum a Pharmacopolis, sed a Medicis etiam ignorentur.

C A P. XLII.

- N**emo est qui nesciat hodie nobilissimam illam Andromachi antidotum, corrupto passim nomine Theriacam, a Thiro nimirum serpente Arabibus nominato dici, cum Theriaca recte diceretur, ita enim veteres nominandam esse voluerunt, Theriaca vnde dicta.
- E** Galeno in libro de Theriaca ad Pisonem teste: *ὅτι ὅτι αὐτῶν διγμῶν ἀπορροήσας, ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ πρὸς τὴν ἐν αὐτῷ ἐν τῇ σκευῇ μνησθῆναι, id est, non solum quod ferarum moribus probe conueniat, sed etiam quod fera ipsa deinceps in confectione misceantur.* Cuius certe miri a veribus traduntur effectus, ut videre licet apud Galenum in libris de Theriaca ad Pisonem & Pamphilianum, ita ut vix morbus fuerit cui non commode adaptari potuerit. Atque hinc factum ut καλὴν etiam Græcis dicta sit, non sane a Galeno Medico, ut Nicolaus Præpositus vulgo vocatus negatur, sed a tranquillitate, quam ægrotis afferre solet. Testis Andromachus qui ita scribit:

ἰατρὴν μὲν ἐπικλεῖονσι γαλήνην, ὅθεν καὶ καλεῖται δὲ γαλήνην. id est:

- F** *Dicitur hac Galenæ hilare simul Eudios, atque galenæ. Quæ verba Gal. expli at deinceps, in eam sententiam scribens: γαλήνην δὲν αὐτὴν ἐν τοῖς ἀσθενέσις ἐπὶ τῷ Ἀνδρόμαχος ἀπὸ τοῦ ὀνόματος κληθεῖσιν ἐπὶ δὲ αὐτῇ ἐν τῷ ὅτι καὶ πάλιν γαλήνην, καὶ τὸ πρὸς τὴν γαλήνην τὴν ἐν αὐτῇ τοῖς σῶματι ἐγείρεται, quod est: Galenem itaque ipsam in propositis versibus. Andromachus arbitror ideo vocauit, quoniam eum ex quadam affectuum tempestate tranquillitatem quandam, ipsam nempe sanitatem corporis, conciliat.*

Miri apud veteres Theriaca effectus. Theriaca cūr galenæ dicta.

Theriaca
hodie pri-
stinos effe-
ctus amisit.
Viperam A-
rabes non
satis cogni-
tam habue-
re.
Viperæ
quid.

Thirus a vi-
pera non
differt.

Viperarum
in Italia ma-
gna copia.

Amisisse autem nostra tempestate pristinos effectus iam dictam antidotum nihil mi-
rum; multa enim sunt ad compositionem eius necessaria medicamenta, quæ penitus
ad nos non afferuntur, vel si afferuntur aut adulterina, aut plane nedum Medicis,
sed & sepelariis ipsis incognita sunt. Nam ut a vipera initium sumamus, quis est Ara-
bum ac iuniorum decretis hodie additus, qui illam agnoscat: tam varia enim imo in-
constantia de hac ipsa produnt, ut nemo sit qui certi quidpiam ex illis colligi ac vena-
ri queat, quemadmodum videre licet apud Leonicenum in libro de Dyspnoe & aliis ser-
pentibus. Item in libro de Thiro seu Vipera. Est itaque Vipera serpentis genus, quod Græcis,
ἰχθυόφιον, Arabibus Thirus, nominatur. Arabes autem nomen generis speciei tribuerunt:
cum enim vipera *meis*, hoc est, fera species sit, illi tamen pro Therio, corrupto & ex
Græcorum lingua detorto vocabulo, Thirum dixerunt. Quod vero Thirus Arabum B
ab Echidna Græcorum Latinorumque vipera nihil differat, vnus Serapion docet:
quæcunque enim is cap. 448. sui de simplicium temperamentis libri de Thiri carne ex Gale-
ni & Dioscori sententia scribit, hæc omnia de Vipera dicta esse vtrorumque scripta con-
ferens manifeste comperiet. Proinde vehementer errant qui Thirum aliud a Vipera
animal esse credunt, cum in nomine tantum, nulla autem re ipsa sit diuersitas. Hinc
Trochisci siue pastilli e Thiro a Trochiscis e vipera nihil differunt. Est autem vipe-
rarum in Italia magna copia, vulgoque dicitur Marassus, nomenclatura nec barbara,
nec citra rationem excogitata. Quippe a Marforum populis nomine ducto, quid ge-
nus serpentis olim maxime consecretabantur, circumferebantque. Testis eius rei, ne
quis nullo auctore confictum putet, Aulus Gellius lib. noct. arti. 16. cap. 11. in hunc mo-
dum scribens: *Genis in Italia Marforum orta fertur a Circes filio Marso: propterea Marsis homi-
nibus, quorum duntaxat familia cum externis cognationibus nondum etiam permixta corruptaque
sunt, ut quidam genitali datum, ut serpentium virulentorum domitores sint, & incantationibus
herbarumque succis faciant medelarum miracula.* Gellio subscribit Plinius lib. 7. cap. 2. Marfos
itidem a Circes filio ortos esse, & naturalem illis vim quandam contra serpentes inesse
se dicens. Et Virgilius libro *Aeneid.* 7. sic scribens:

*Quin & Marrubia venit de gente sacerdos,
Fronde super galeam, & felici comptus oliua,
Archippi regis iussu fortissimus Umbro,
Vipereis generi & grauiter spirantibus hydrys,
Spargere qui somnos, cantuque manuque solebat,
Mulcebatq; iras, & morsus arte leuabat.*

Syllius quoque Italicus lib. 8 eadem de Marsis caritat, ita dicens:

*Hæc bellare acres norant, ac Marsica pubes,
Et bellare manu, & Chelydris cantare soporem,
Vipereumque herbis hebetare & carmine dentem.*

Idem denique testatur Galenus lib. 11. de simpl. med. facult. qui se Marfos Romæ vipers
venantes interrogasse scribit, num quid haberent signi, quo genus dipsadum & vipe-
rarum discernere. Marfos autem interrogauit, tanquam eius rei peritos, ac quo-
tidie manibus vipers tractantes. Inde discere possunt nostræ ætatis Medici, quan-
to hætenus fuerint in errore versati, qui Thirum seu Viperam ex terris admodum
calentibus aridisque, ex Ægypto nimirum & Arabia petierunt, quum tamen in Ita-
lia hunc haberent serpentem, multo peregrinis & Memphisicis meliorem. Hinc
nisi ad Theriacorum orbiculorum seu pastillorum confectionem veram illam & ge-
nuinam viperam adhibuerunt, id quod hætenus factum esse vix crediderim, non est
cur pristinos illos effectus sperare debeant. Sed fac veram adhibitam esse viperam,
quæ adhuc in Hedychroo magmate, quod sic a coloris iucunditate ac hilaritate di-
ctum est, sunt medicamenta simplicia, quæ a nemine ferme hodie probe agnoscuntur?
qualia sunt Aspalathus, Casamus aromaticus, Xylobalsamum, Phu, Cinamomum, A-
momum, Casia, Rhaponticum, Myrrha, & alia quædam, ita ut nec illorum ratione ge-
nuini effectus sperari queant. Aspalathum enim fruticem quotusquisque est qui agno-
scat? Hunc certe Auicenna in descriptione Trochiscorum Alindaracon, ita enim He-
dychroon appellat, Darisahan nominat, quemadmodum & Serapion capite 26. de sim-
plicium med. temperamentis facit, ut patebit conferenti caput hoc de Darisahan, cum capi-

Hedych-
roon vnde
dictum.

Aspalathus
frutex ho-
die igno-
tus.

- A** capite Dioscoridis de Aspalatho. Nicolaus autem, apud quem summa atque præcipua nostra tempestate in componendis medicaminibus, si Diis placet, fides est, trochiscos Alindaraconi, vocat trochiscos diacoralli, magno nimirum errore pro Aspalatho Corallios ponens, cum nemo sit qui nesciat Aspalathum longe a Corallis diuersum esse. Variant & in plerisque aliis ab Henychroi confectione prædicti Nicolai trochisci, adeo ut veræ Theriacæ adaptari non mereantur. Sunt qui Darisahan seu Aspalathum, ex quorum numero Serapionis interpres existit, arborem granati syluestris esse putant, ita ut nihil mirum sit in tanta Arabum auctorum, eorundemque interpretum diuersitate, non fuisse qui quid esset Aspalathus intelligerent. Aspalathus vero *Dioscoride lib. 1. cap. 19. teste*, nihil aliud est quam frutex lignosus, multis spinis horrens, qui nascitur in Istro, Nisyro, Syria, & Rhodo. Ceterum Calamus aromaticus, quem passim officinæ venalem habent, non videtur esse is quem Matthiolus esse Acorum censet, ut tomio altero nostrorum de stirpium historia commentario, monstrauimus. Differt vero ab eo, mea quidem sententia quem Dioscorides ac alii veteres describunt, nam illæ radix potius quam calamus esse apparet. Huc accedit, quod notæ quas Dioscorides illi tribuit, nostro non conueniant: est enim, *ut lib. 1. cap. 18. ait.* *μακρὸς, πυκνὸς, ὀσμύνης, καὶ εἰς πολλὰς σὺν δακτύλοις ἰσχυρὰς, καὶ ἀσπέρων τὰν στέμματα, πολλὰς δὲ, καὶ τῇ ἀλγεῖ καὶ οὐκ ἔστι γλυκύς, ἐν πικρῷ, ὑπόδριμς.* hoc est, *rufus, geniculatus, & in multas assulas fractus, fistulis aranearum plenus albicans, in mandendo glutinosus, adstringens & subacer*: cum noster in multis discrepet. Nec Xylobalsamum, quod in officinis prostat, verum est Xylobalsamum, quod Dioscoride auctore fuluum, odoratum, opobalsamum spirans existit, cum nostrum plane inodorum sit. Phu denique quæ herba sit hodie ita multis ignoratur, neque enim Valerianæ nostræ per omnia apud Dioscoridum historia responderet. Phu namque, caulis, quæ admodum Dioscorides scribit, *λεῖος, καὶ τρυφερός*, id est, læuis & tener mollisve existit. Flores etiam Narcissi floribus similes: Valerianæ contra caulis angulosus ac duritiem nonnullam præ se ferens, neque flores Narcisso similes. Cinamomum verum ad nos non adferri, ante nos indicauit Mariardus noster libro suarum epistolarum medicinalium sexto, id ipsum ex Galeni de Antidotis libris probans. Et Dioscoridem expendenti facile animum subit suspicio ex tot generibus Cinamomi non optimū ad nos inuehi. Neque mirum hodie Germanis hoc modo imponi, quum constet Galeni temporibus id ipsum quoque factum esse, quemadmodum ipse in libro de Theriaca ad Pisonem indicat. Quid multis opus est? si quis nostrum Cinamomum cum eo quod bonitate alia omnia antecedit, commiserit, facile quod asserimus verum esse comperiet. Est autem præstantissimum omnium Cinamomum, Galeno loco iam citato teste, *πυκνὸς, καὶ ὀσμύνης, καὶ εἰς πολλὰς σὺν δακτύλοις ἰσχυρὰς, καὶ ἀσπέρων τὰν στέμματα, πολλὰς δὲ, καὶ τῇ ἀλγεῖ καὶ οὐκ ἔστι γλυκύς, ἐν πικρῷ, ὑπόδριμς.* quod est, *Cinerium colore, odore longe optimum suauissimumque, & gustu acre, & admodum mordax mansueta, rutam præ se ferre videtur.* Quæ quomodo nostro Cinamomo quadrare in vniuersum possint non video, nihil enim minus quam rutæ odorem commanducatum refert. Amomum quod in officinis venditur, nihil minus est quam id quod Dioscoridi describit *lib. 1. cap. 14.* hoc enim *λαμπρὸν, ἡ ὑπερπυκνόν, βοτρυώδες, ὀσμύνης, καὶ εἰς πολλὰς σὺν δακτύλοις ἰσχυρὰς, καὶ ἀσπέρων τὰν στέμματα, πολλὰς δὲ, καὶ τῇ ἀλγεῖ καὶ οὐκ ἔστι γλυκύς, ἐν πικρῷ, ὑπόδριμς.* id est, *candidum, vel subrubrum, racemosum, graue,*
- E** odoratum vehementer, sine carie, acre, gustu mordens, simplici colore & minime vario. Nostrum e regione nec odoris argumento, nec alia ratione huic responderet. Cassia vero quæ nunc officinæ vtuntur non esse veram quæ Dioscorides ac alii eius farinæ scriptores describunt, diximus paradoxo quinto. Monet vero Galenus in libro de Theriaca ad Pisonem, ut in hac diiudicanda solliciti simus: quod inexpertis frequenter imponere soleat, esse enim pseudocassiam, mirum quam germanæ similem, sed odore minus grato coarguitur. Rhaponticum veterum ab eo quod hodie in vñu habetur fuisse diuersum, paradoxo quarto ostendimus. Myrrha quam passim obtrudunt seplafarii, non est vera & optima illa Myrrha, quæ ut Dioscorides refert *lib. 1. cap. 75.* esse debet, *μακρὸς, καὶ ὀσμύνης, καὶ εἰς πολλὰς σὺν δακτύλοις ἰσχυρὰς, καὶ ἀσπέρων τὰν στέμματα, πολλὰς δὲ, καὶ τῇ ἀλγεῖ καὶ οὐκ ἔστι γλυκύς, ἐν πικρῷ, ὑπόδριμς.* hoc est, *fragilis, levis, undique concolor, & quæ confracta internas quasi ungues candidas & laues diuisiones ostendat, minutis glebis, amara, odorata, & acris.* Quibus notis ut nostra respondeat, videant qui adulterinam esse nondum persuasum habent. Hactenus simplicia medicamenta Hedychroi confectionem ingredientia, quorum hodie exactam cognitionem non esse demonstrauius, obiter attigimus,

Nicolai eror.
Trochisci Alindaraconi.

Calamus aromaticus officinarum non videtur esse genuinus.

Calami veri notæ.

Xylobalsamum hodie verum in officinis non prostat. Phu non videtur esse Valeriana.

Cinamomum verum ad nos non affertur.

Cinamomum quod præstantissimum.

Amomum nostrum non videtur esse genuinum.

Cassia ligata est.

Rhaparbarum nostrum a veterum diuersum.

Myrrha Seplafariorum non genuina.

iam alia quædam, quæ scilicet Theriaces compositionem constituunt, prosequamur, A
 quorum itidem ut prædictorum nostra ætate certa noticia nondum habetur. Ea sunt
 Piper longum, Opobalsamum, Scordion, Nardus, Iunci odorati flos, Dictamnus, Pe-
 troelinum Macedonicum, Quinquefolii radix, Rubrica Lemnia, Thlaspi; & alia
 multa quæ brevitatis gratia omittere placuit. Quod ad piper enim attinet longum,
 vix credibile est, verum ad nos asportari, quod in illo dolos fieri certum sit. Testis eius
 rei Galenus est, qui ad Pisonem ita scribit: *εἰς δὲ τὴν ἐπὶ τῷ μακρῷ πίπτεσιν γρηγορήσας πανουργία μὴ
 ἀγνοεῖν. ἀναπλάσσει τις γὰρ πικρὸν αὐτὸ ἵσταν τῷ ἀλαθεύειν τὸ μέγεθος, ἐν ᾧ γέντις αὐτῷ τοῦ πυρίθρου, ἢ τοῦ ἰάπτου ὀλισθενέτω τῷ δη-
 πᾶν τῆς γέντιος πλάσσει τὸν γόρδιον.* quod est: *In pipere oblongo dolos fieri te ignorare haud est verifi-
 mile. Siquidem nonnulli adulterantes ipsum aequalem cum germano longitudinem habens, pyrethri
 vel sinapi modico indito, ita gustus mordacitate gustantem fallunt.* Quod si utique Galeni tem- B
 poribus sic adulterari piper longum contigit, quid mirum si hodie in tanta merca-
 torum copia, ac insatiabili auri similiter accidat? Opobalsamum certe ad nos non af-
 fertur, vel si affertur, syncerum non est, multis enim modis Dioscoride teste adulte-
 ratur. Argumento est quod is qui ad nos asportatur, colore, odore, & substantia longe
 a vero distat, qui *σφοδατῶ, τῇ ἐσμῇ ἴσταν, ἐ δὲ λευκός, ἐ μὴ παραβῆται, διδιδασκῶ, λῆος, τυφλῶ, ἐ δόκον με-
 τέως τὴν γλῶσσαν.* id est: *Recens est, odore firmo & syncero, non ad acorem vergens, citissime pene-
 trans, levis adstringens, & modice linguam mordens.* Quid multa? si opobalsamum germa-
 num Theriacæ confectioni adhiberetur, certe totius antidoti præcium præueteret.
 Duodecim enim drachmas, præter id quod in Hedychroi confectionem inditur,
 tota Andromachi compositio recipi. Scordion qui agnoscat paucos esse hodie cre- C
 do: neque enim est allium sylvestre, ut quidam non sine magno errore existimant.
 Habet autem is error inde originem. *Σκώρδιον* Græcis Allium significat, hinc *σκώρδιον*
 allium sylvestre esse putabant, idque non modo in Theriacam, sed in plures quæque
 alias compositiones adhibeant. Inde factum ut non solum herbam ipsam Scordion
 dictam amiserunt, sed ut vocis ipsius significatum, huius loco allium sylvestre no-
 minis similitudine decepti accipientes, cum tamen Allium sylvestre, quod alio no-
 mine *ἰσχυροσκώρδιον*, hoc est, *Anguinum* allium vocatur, a Scordio herba plane diuertum
 sit. Et mirum certe est cum Scordion folio Trixaginis seu Chamædryos, non Allii
 descriptum legerint, cur in eum errorem imprudentes lapsi sint. Scordion namque
 hunc in modum D. oscorides *lib. 3. cap. 117.* describit: *σκώρδιον φύεται ἐν ὄρεσι τῶν ἐν ἡλίδι
 φῶν ἔχει ἰσχυρὸν χαμαὶ δρυὶ, μέλιτι δὲ καὶ οὐκ ὄντως σκώρδιον τὴν σκώρδιον, πικρὸς τῇ ἐσμῇ σκώρδιον, τυφλῶ δὲ
 ἐν πικρῶ καὶ τὴν γλῶσσαν, καυλὸς δὲ καὶ τὸ τριχάριον, ἐφ' ᾧ αὐτὸς ὑπὸντρον.* hoc est: *Scordion in montanis lo-
 cis & plaustribus nascitur, folia Chamædryos seu Trixaginis habens, maiora tamen, nec sic in
 ambitu diuisa, Allium aliquo modo redolentia, adstringentia, & gustu amara. Caules quadrangulos,
 in quibus flos subrubescens.* Mira autem huius contra venena vis est, sordidaque
 vulnera purgat. ita ut Galeno libro primo de antidotis teste. *ἡ γὰρ πικρὸς καὶ τὸν αὐτὸν ἀντι-
 δότον πολλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἡμετέρων πικρῶν γινώσκων, ὅσα τὰν συνήθων ἐπὶ σκώρδιον καὶ τὴν γλῶσσαν, πολλὴν αὐτῶν ἀσπλῆ-
 νος ἀφαιρέσει, ἐν μέλιτι αὐτῶν ἔσταν τὸ μέλιτι τῷ σκώρδιον ὅσα τῆς πικρῆς ἔσταν τοῦ σκώρδιον.* id est: *A fide dignis au-
 thoribus proditum sit corpora eorum, qui in prælio ceciderant, diuque insepulti iacebant, quæcunque
 fors tulit ut supra Scordion decumberent, diutius incorrupta putredinique minus obnoxia mansisse,
 secundum eas præsertim partes qua herbam ipsam attigerant.* Nardi spica nos caret re qui E
 dam arbitrantur, nam inquit, quam passim hodie officinæ habent, ea inodora est,
 cum vera perquam odorata sit, & Cyperum redoleat. Proinde quum ea quæ ad nos
 vehitur sit odoris valde ingrati, fieri non potest, ut vera spica esse queat. Itæ & Iunci o-
 dorati nos flore destitutos esse multi putant, qui Squinantum, sic enim barbari Scho-
 num non inani, in officinis venale festucas potius quam flores esse dicunt, nulla pe-
 nitus odoris suauitate præditas, ita ut nomen saltem odorati iunci satis indicet, in-
 quiunt rem diuersam esse quod officinæ Squinatum appellant. Dictamnio porro ve-
 ra nos hæc tenui caruisse vel inde satis liquet, quod ea herba quæ nostra ætate hoc no-
 mine insignita fuit, & flores & semen producat, cum germana Dictamnus his plane
 careat. Testis est Dioscor. qui *lib. 3. cap. 33.* de ea ita scribit: *dictamnῶν πικρὸς ἐστὶν καὶ ὀσμὴν, δριμύτην, λῆος, F
 ἐν γλῶσσαν, μέλιτι δὲ καὶ γρηγορήσας διὰ τὴν φθόνην, καὶ ἰσχυρὸν τὸν ἐπὶ φθόνον, ὅτι αὐτὸς, ὅτι καρπὸς φθόνου.* quod est: *Di-
 ctamnus Cretensis herba est, acris, levis, Pulegio similis, maioribus tamen foliis, tomentosis, & lanu-
 gine quadam obductis. Neq. florem, neq. semine profert.* Dioscoridi subscribit Plin. *li. 25. c. 8.* in hunc
 modum

Piper lon-
gum verum
ad nos non
asportatur.

Opobalsa-
mum ad
nos non
affertur.

Scordion
nemo ho-
die agno-
scit.

Allium syl-
vestre a
Scordio
differt.

Scordii de-
scriptio.

Nardi spi-
ca caremus.

Iunci odo-
rati flore
destituti
sumus.

Dictamno
vera carui-
mus.

A modum scribens: *Dictamnium ostendere, ut indicauimus, vulnerata eo statim decidentibus telis.* Non est alibi, quam in Creta, ramis prætenue, pulegio simile, feruens & acre gustu: foliis tantum vtuntur. Flos nullus ei est, aut semen, aut caulis: radix tenuis & superuacua. Deniq; *Dictamnium in Creta tantum nasci præter Plinium Virgilius quoq; 12. Aeneid.* ita canens indicat:

Dictamnus in Creta tantum nascitur.

*Tum Venus indigno nati concussa dolore,
Dictamnium genitrix Cretæa carpit ab Ida,
Puberibus caulem folijs, & flore comantem
Purpureo: non illa feris incognita capris
Gramina, cum tergo volucres hæserè sagittæ.*

B Cum itaque ex veterum testimoniis vera dictamnus tam flore quam semine careat, nostra hæc vulgaris pseudodictamnus sit, vt pote istis maxime abundans, oportet. Et cum in Creta tantum nascatur, fieri non potest, vt passim in Germania producat. Veram tamen Dictamnium me vidisse apud pharmacopolam Georgiū Ellingerum puto, cuius equidem folia multa lanugine obducta erant. Præterea Petroselinum semē, quod miscendum Theriacæ iussit Andromachus, non est id quod passim in hortis nascitur, & nusquam non venale habetur, sed quod in Macedonia præruptis locis prouenit, quod Diosc. teste

Dictamnus vera flore & semine caret.

Petroselinū verum non habemus.

C lib. 3. cap. 71. *οὐτὲρ μὲν ἔστι τοῦ ἀμμι, ἐν ᾧ δὲ σπέρμα τῆς δαυδ, καὶ ἀρωματίζον.* hoc est: *Semen habet ammi simile, odoratus tamen, acre, & aroma olens.* Lemnia rubrica, quam hodie terram sigillatam vocant, quæ in officinis iam habetur, nec facie nec viribus germanæ æqualis existit: illa enim alba quædam terra esse apparet, cum hæc rubra sit, q̄ ex collo in Lemno, Galeno teste, qui totus colore fuluo est, accipiat, vnde & Lemnia rubrica appellata est. Lemnia siquidem quod ex Lemno in insula cōportetur, dici cœpit. Animaduertendum vero, rubricam Lemniam alio nomine etiam dici terram Lemniam, aut sigillum Lemnium, id quod nono de simp. med. facul. libro Galen. iis verbis docet. *τοιοῦτον γὰρ πρὸς τὴν ἀμμιαν ἵκνται γῆν, ἢν μάλιστα ἐνομάζουσιν, ἐν ᾧ ἀμμιαν, καὶ πρὸς ἀλλὰ σφαγίδα ἀμμιαν, διὰ τὴν ἐπιβαλλομένην αὐτῇ σφαγίδα τῆς ἀμμιαν, καὶ ἐστὶν.* quod est: *Tale quiddam & in Lemnia terra sit, quam cognominant quidam rubricam Lemniam, & alij quidam sigillum Lemnium, ob impressum videlicet illi sigillum Diana sacrum.*

Lemnia rubrica non est germana. Sigillum Lemnium.

Dioscoridis in terra Lemnia erratū.

Adeo vt commentitium plane sit, quod scribit Dioscorides libro quinto capite 63. *Lemniam terram caprino sanguini permistam incolas cogere in pastillos, & imagine capræ signare.* Quem errorem etiam Galenus cum aliarum rerum ad medicinæ vsum necessarium, tum huius præsertim terræ diligentissimus vestigator, libro iam citato iis verbis explodit: *Ceterum quum & apud Dioscoridem & alios quosdam scriptum legissem, Lemnia terra hircinum misceri sanguinem, atque ex luto quod ea missione conficiebatur, sacerdotem Lemnia sigillatum conformare, tum consignare, cupiebam profecto, & ipse missionis modum inspicere atque symmetriam. Itaque quemadmodum in Cyprum nauigarem videndorum quæ in ea sunt metallorum gratia, & in causam Syriam Palestinam partem profectus fueram, biuuminis & aliorum quorundam inspiciendorum causa, ita nec in Lemnum enauigare piguit, vt quantum sanguinis terra admisceretur conspicerem. Nam quum iterum Romam pedestri peterem itinere per Thraciam & Macedoniam, prius a Troade Alexandraam in Lemnum adnauigauit, nactus illic nauem quæ ad*

E *Thessalonicam cursum destinabat. Conueniebam autem cum nauclero, vt in cursu Lemno appelleret. Et sane ille præstitit, sed non ad eam ciuitatem ad quam oportebat. Antea enim nesciueram duas esse in Insula ciuitates, sed credebam, vt Samus, Chius, Cos, Andrus, Tenus, & omnes adeo quæ in Aegæo sunt mari, vnā duntaxat ciuitatem habent toti insula cognominem; ita & Lemnum nominis sui vnā habere ciuitatem. Porro vt ex nauī descenderam, intellexi ciuitati nomen esse Myrina: nec in regione ciuitatis illius aut Philoctetis templum esse, aut sacrum Neptuni collem, sed in altera quæ vocaretur Hephestias: nec ciuitatem eam Myrina esse propinquam. Quumq; me nauclerus expectare non posset, distuli, vt quum Roma in Asiam redirem, tunc Hephestiada viserem: id quod feci prout speraueram & proposueram. Nam ubi ex Italia in Macedoniam intratissem, eamq; pens totam pedestri itinere pertransissem, peruenissemq; Philippōs, quæ ciuitas est finitima Thracia, inde ad mare descendi, quod proximum aberat ceterum viginti stadiis, primumq; Thason transmisi, distantem plus minus ducentis stadiis: atque illinc in Lemnum septingentis, ac rursum ferme septingentis in Alexandraam Troada traieci. Ac proinde sane ex industria tum de nauigatione, tum de stadiis adscripsi, vt si quem eadē quæ me caperet Hephestiada videri cupiditas, cognitio eius situ, sic nauigationem institueret. In tota namq; insula Lemno orientem spectat Hephestias,*

occidentem vero Myrina. Et quod a poeta dictum de Vulcano est, qui Grace dicitur *ἰκάρως*, Decidit in Lemnium, propter collis naturam occasionem sumsisse fabula crediderim. Apparet enim combusto similimus tum colore ipso, tum etiam quia nihil in eo nascitur. In hunc itaq. collem sacerdos quo tempore ego ad insulam accesseram, egressa, certo quodam tritici hordeiq. numero in terrā coniecto, alijsq. quibusdam pro religione patria perpetratis, plaustrum totum terra impleuit, atque ubi in urbem conuexisset, quo dixi modo, illas fama hominum adeo celebratas Lemnias sphrægidas præparabat. Visum ergo mihi erat percontari, numquid unquam antea hircinum sanguinem huic misceri solitum memoria proditum accepissent. Quo audito omnes in risum soluti sunt, nec ij sane quiuis ex vulgo, sed viri oppido quam eruditi cum in alijs, tum præcipue in vniuersa patriæ historia. Haftenus Galeni verba recensuimus, quæ ideo prolixius tractanda duxi, ut inde nostræ ætatis Medici Galeni in iis rebus quæ ad Medicum necessariæ erant, vsum exquisitam diligentiam agnoscerent, quo & ipsi in iis rebus vestigandis, pari opera ac studio uti velint, nec perpetuo, ut haftenus fecerunt, illas ipsas negligere, & Andabatarum more clausis oculis aduersus morbos pugnare. Confectionem porro terræ Lemniæ Galenus hoc modo fieri tradit.

Confectio
terre Lem-
niæ.
Morbus.

Terram hanc sacerdos cum patrio quodam honore sumens, haud mactatis animalibus, sed tritico atq. hordeo piamenti gratia terræ redditis, in urbem comportat: quam deinde aqua maceratam, atq. in lutum redactam, ubi valenter conturbauit, paulumque inde quiescere fuit, aquam quæ supernatat, aufert, & mox quod sub ea est lutum tollit, ac reliquum duntaxat quod ad imum subsedit, lapidosum scilicet & arenosum, relinquit ut inutile ac superuacaneum. Porro lutum illud pingue vsq. eo desiccatur, dum mollis ceræ consistentiam accipiat, huiusq. acceptis exiguis periculis, sacrum Dianæ signum imprimit, ac postea rursus in vmbra siccandum reponit, donec omnem plane humiditatem amittat, fiatq. illud medicis omnibus cognitum medicamentum Lemnium sigillum. Sic enim quidam illam cognominant ob impressum illi sigillum: ceu etiam nonnulli ob colorem Lemniam rubricam appellitant. Non prætereundum est & hoc quod libro primo de antidotis scribit Galenus: *καλεῖν αὐτὴν αἰμύρον οὐ μίλτον, ἀλλὰ γῆν. ἔστι γὰρ περὶ λιμνία μίλτος ἐν τῇ μίλτῳ γινωσκόμενῃ πρὸς ἄλλας χρεῖας ἐπιτίθεισθαι, οὐ μὴν εἰς αὐτὴν ἢ καλεομένην λιμνία σφραγίς.* hoc est: Præstat ipsam vocare non rubricam, sed terram: est enim Lemnia quædam rubrica in Milto nata, ad alios vsus, quam ad quos Lemnium sigillum, accommodata. Rubricam hanc Dioscorides *μίλτον σινωπικὴν*, vocat, a Lemnia siquidem, quæ terra potius dicitur, hoc modo distinguens. Thlaspin postremo pauci hodie sunt Seplasiarii qui agnoscant. Notæ autem, Dio- C

Terra po-
tius quam
rubrica
Lemniam di-
cenda.

Thlaspi ho-
die penitus
ignoratur.

scoridelib. 2. ca. 142. auctore, ut & alii obseruare hanc plantā possint, eiusmodi sunt: *βεῤῥαίνων ἐστὶ φανερὸν τοῖς φύλλοις ὡς δακτύλου μῦκος, περιπακόντες ἐπὶ τῆς γῆς, ἀχροκίδισιν, ὅπολι πάροις καυλὸν δὲ λεπτὸν ἀνίστι, διαπταμαιῶν, ἀποφυάδας ὀλίγας ἔχοντα, καὶ περὶ ὅλον αὐτὸν κερπὸς ὑπόπλατος ἐξ ἀκροῦ, ἐν τῷ στερματίονι μ-
φερεῖς καὶ δάμω διοσκόριδος, οἰοῦνται ἐν τιθλασμένον, ἐξ οὗ καὶ τὸ ὄνομα ἔρχεται. ἀνδρὶ δὲ ὑπόλευκον. ἐν ὁδοῖς καὶ τοιχῶν καὶ ἐπὶ θειγλῶν φαινόμενον. σπέρμα θριμύ. q. est: Herbula est angustis folijs, ad digiti longitudinem, super terram ia-
centibus, in summo scissis, subpinguibus. Caulem tenuem, duorum palmorum emittit, adnascens
paucas habentem, & citra ipsam totam fructus in summo modice latus, in quo semen exiguum Na-
sturtio simile, disci figura, veluti conuassatum, unde & nomen inuenit. Florem subalbum. Nascitur
in vijs, sepulchris, sepibusq. Semen acre. Eodem modo describit Thlaspin Plinius lib. 26. ca. 13.*

Auicenna
error.

cuius verba in priore editione citauimus, hic autem breuitatis ratione habita omitemus. Porro noti tacendum, Auicennam in descriptione Theriaces Andromachi, non sine pudendo errore pro Thlaspeos nomine, Siseleos posuisse. Haftenus monstraui-
mus, multa esse medicamenta simplicia ad Theriaces germanæ compositionem neces-
saria, quorum hodie exacta cognitio plane perierit: non quod omnia quæ ignorentur
recensuerimus, multa enim studio prætermisimus, paucis tantum ostensis, ut ex illis
saltem intelligeremus, Theriacam nostrā tempestate pristinos effectus præstare non
posse. Si etenim *ἡ ἐνὸς πνὸς κακία πολλὰ καὶ διαφθείρει τὰ πάντα*, hoc est: *uniūs cuiusdam medica-
menti vitium omnia subinde corrumpit*, ut in libro de Theriaca ad Pisonem ait Galenus,
qui nobis spes esset tot hodie simplicia medicamenta seplasiariis ignorantibus, ut con-
fectio illa recte pararetur? Vtinam autem ad Barbarorum, Arabumque lupanaria non
deflexissemus, sed a Græcis potius fontibus medicamenta hausissemus, ita enim The-
riaca optima hodie non careremus. Sed satis ea de re. Porro quæ haftenus de medi-
camentis Theriacæ structuram ingredientia commemorauimus, non sic accipi volo,
quasi hodie sic quoque sentiam, & de illis perinde atque tum quum hæc scripsi, statuam,

Siqui-

A Siquidem multa ex iis, quum illa scriberem, prorsus medicis & Seplesiariis incognita, hodie sunt notissima, ut est Dictamnus, Thlaspi, & multa alia. De plerisque etiam nunc secus quam olim sentio. Quare qui scire cupit quid hodie de singulis iam ordine commemoratis sentiam, is nostros de comp. med. libros, & commentarios de stirpium historia inscriptos adeat. Hinc enim facile nostram de iis omnibus sententiam cognosceret.

Syrupū, ut vocant, de Eupatorio, eos quos Mesue pollicetur effectus, prestare nō posse: quod multa huius compositionem ingredientur medicamenta, quæ Seplesiarijs prorsus ignota sint.

CAP. XLIII.

B Compositio Syrupi de Eupatorio apud Mesuen hæc est: Radicum apij, Fœniculi, Endi- Confectio
Syrupi de
Eupatorio.
uia, singulorum uncias 2. Glycyrrhizæ, Schœni, Cuscutæ, Absinthij, Rosarum, sing. drachmas 6. Capillorum Veneris, Bedeguar, Florum Buglossæ, Anisi, Eupatorii, singulorum drachmas 5. Ruedseni, Mastichis, sing. drachmas tres. Spicæ, Asari, folij, singulorum drachmas duas. Coque in aq. libris 8. donec tertia eius pars consumatur, & cum libris 4. Sacchari, & succi Apij, & endiuia idonea quantitate, fiat Syrupus. Quis vero est tam caligantibus oculis, qui non videat multa hic a Mesue recenser, quorum hodie nulla apud Pharmacopolas est exacta cognitio?

C Et, ut aliqua ex iis attingamus, quis est, qui hoc tempore Endiuia, quæ intybi species Endiuiæ ve-
ra incogni-
ta.
Endiuiæ nō
est cardus
Mariz. est, agnoscat? Alia enim est, quæ in Italia, alia quæ in Germania videntur nunc Pharmacopolæ, & vix est hodie Pharmacopola, qui non propriam ostendat. Et, quod mirum Bedeguar
qualis her-
ba. admodum est, scio, qui pro Endiuiâ herbam accipiant, quæ hodie Cardus Maria nominatur, idque maximo errore. Passim tamen iam pro Endiuiâ lactuca sylvestris videntur, id quod lactis liquor qui in ea est, satis indicat. Schœno denique, hoc est, odorato iunco, seu, ut nostri nominant, Squinanto, nos carere nonnullos, paradoxo præcedenti monstrauimus. Sed quid de Bedeguar dicam herbam, in qua Pharmacopole nostri magis varii quam hydra existunt, neque quisquam illorum, quid Bedeguar sit, certo agnoscit? Vnus esse Chamæleontem album, alter Chamæleontem nigrum, hic Cardopaciâ vulgo dictam, ille aliam quandam spinam esse ait, neque est, qui non peculiarem afferat. Proh cæcitatem nostram! qui in tam manifestis cæutimus. Quis enim est, qui non videat Bedeguar Arabum nihil aliud esse, quam eam herbam, quam Græci ἀκανθὰ λευκήν, Latini vero

D Spinam albam vocant? nemo sane nisi qui talpa cecior sit. Nam ita Bedeguar descriptio Spina alba.
Bedeguar
descriptio. apud Serapionem cum descriptione Spinæ albæ apud Dioscoridē conuenit, ut eandem herbam esse euidentissimum sit. Descriptio autem Bedeguar apud Serapionem capite 99. hæc est: Bedeguar nominatur Acanthis leuce, & est in Græco spina alba. Nascitur in montibus, & habet folia similia Chamæleonti albo, nisi quia sunt strictiora & albiora, & super ea est simile borra, & sunt spinosa & habet stipitem longum duobus brachijs, in crassitudine digiti pollicis, vel plus: color eius est vergens ad albedinem, & super summitates eius sunt capitella spinosa similia ericio marino, nisi quia sunt minora & oblonga, & flos eius est coloris purpurei, & semen eius est simile grano caritami, nisi quia est rotundius eo. Spinæ vero albæ libro tertio cap. 19. apud Dioscoridem illa: Spinæ albæ
nouificatio,

ἀκανθὰ λευκήν φέρει τὴν ὄρεσιν καὶ ὑψίστοις τοῖς ὄρεσι. φύλλα ἔχουσα χαμαιλέοντι λευκῷ ἑμφερῇ, στενότερα δὲ καὶ λευκότερα, ὑποδίσσα, ἀκανθὰ δὲ ἔχουσα ὑπὲρ δύο πῆχας δακτύλου τὸ μέγεθος αὐτῆς καὶ μακρότερὰ πλάτος, ὑπολευκὸν, κενὸν ἐνδοθεν. ἐπ' αὐτοῦ δὲ αὐτοῦ κεφαλὴ πρόσεστιν ἀκανθὰς, ἐκ τῆς δακτύλου ἑμφερῆς, πλὴν ἐλάσσων καὶ ὑπομήκης. αὐτὴ πορφυρὰ, ἐν αὐτῇ τὸ σπέρμα καὶ καὶ ἐν γυμνοτέρῳ δὲ. quod est: Spina alba nascitur in montibus & syuosis locis, folia albo Chamæleonti similia, angustiora tamen & candidiora, aliquantum hispida, & aculeata. Caulis supra binis cubitis altum, digiti magni aut pollicis crassitudine, subalbum, intus cauum. In cacumine eius caput adest spinosum, Echino marino simile, atamen minus & oblongum. Flores purpurei, in quibus semen seu Cnicus, sed rotundius. Ex his itaque descriptionibus sole clarius fit Bedeguar a spina alba non differre: id quod si verum est, ut est sane, neque Chamæleon albus, neque niger esse potest, quod diuersæ a spina alba herbæ sint, eorūque a Dioscoride diuersis capitibus descriptæ. Ceterum qualis sit herba hodie spina alba in nostris de stirpium historia commentarijs diximus. Herba vero quæ hodie Cardus Maria, germanice

E Wehdistel, appellatur, non est nisi Leucacantha diuersa a spina alba, ut altero loco commen- Bedeguar
est spina al-
ba. tiorum de stirpium historia monstrauimus. Ceterum pro Buglossa, nisi quis Boraginem sumserit, vitiosa confectio erit. Qualiter in Eupatorio passim omnes hallucinantur Medici, in paradoxo septimo diximus: omnes enim herbam esse putant, quæ vulgo Kunigundis herba dicitur, cum ea, nec Græcorum, nec Mesue, sed potius Auicennæ sit Eupatorium, Eupatoriū.

F Pro Buglossa accipenda Borago.

est Agrimo-
nia nostra.
Folium ho-
die ignotū.

ut primo nostrorum de stirp. historia comment. tomo docuimus. Si itaque Mesue Eupatorium A
præcipuum, quod huius Syrupi compositionem ingreditur, & vnde illi nomen indi-
tum est, ignoratur, quid de eius facultatibus sperare possent ægrotantes? Folium præ-
terea, quod Græcis pariter & Romanis *Malobathrum* appellatur, hodie ignotum est, nec
eo propter pretii immensitatem uti licet. *Est autem hoc, Dioscoride libro 1. capite 11. teste,*
cum nigredine quadam candicans, non facile fragile, odore sensum feriens, & odoris suauitate diu-
ius permanens, & Nardum gustu referens. Has certe notas nostrum Folium non habet, ad-
ulterinum enim est, neque mirum quod germanum ex India afferri debeat. Scribit &
Manardus se toto vitæ suæ tempore vix vnicum videre Folium potuisse. Proinde si tot
medicamentorum syrupi de Eupatorio compositionem constituentium cognitio nos B
latet, qui eos, quos Mesue pollicetur, effectus præstare posset? Quare Mesue Eupato-
rium adhibeant, aliaque in eorum locum, quæ haberi non possunt, succedanea accipi-
ant, ubi hoc genere syrupi posthac uti voluerint. Hic libro primo colophonem impo-
nemus, quod superuacaneum esse putamus, plurium medicamentorum compositorū
confectiones, in quibus hodie multa desiderantur, indicare, quando quiuis ad priorum
exemplum, agnitis tantum simplicibus illa cognoscere, atque adeo tandem has etiam e-
mendare possit. Et hic certe vnicus est modus, quo hodie Pharmacopolarum ignauia
mederi licebit, ut scilicet nostratum herbarum viribus probe agnitis, peregrina & exo-
tica medicamenta, ea maxime, quæ nobis suspecta & non exacte cognita sunt, abiicia-
mus, & in illorū locum, alia, quæ indies oculis conspiciere datum est, substituamus. Nam
quot hodie neglectæ iacent herbæ, vno hoc nomine, quod omnib. cognitæ sunt, & pe-
dibus fere calcantur, quarum tamen mira vis medica existit? Has itaque ambabus mani-
bus arripiamus, & exotica prorsus, vel, si non licet omnia, saltem nonnulla, quæ nobis
non satis cognita sunt, remoueamus. Sed ea de re alias forte multa.

Pharmacopolarum
ignauia vt
medendū.

LIBRI PRIMI FINIS.

LEONHARTI FUCHSII PARADOXORVM MEDICINÆ, LIBER SECVNDVS.

PROOEMIUM.

Simplicium
medicamentorum
cognitio ad rectam
medendi rationem
uti-
lis.



Quæ in se-
cundo hoc
libro tracta-
buntur.
Nostrum Me-
dicum præ-
cautione de-
sciuerunt.

Morborum
causæ pri-
mum inqui-
rendæ.
Medici no-
stri seculi
cæcis simi-
les.
Medici ex
commentario.

Quum ad rectam medendi rationem perdiscendam non parum momenti simplicium D
medicamentorum cognitio afferat, quemadmodum Galenus in libro, quem de meden-
di ratione inscripsit, multis in locis testatur, primo siquidem libro paradoxa quadam,
quæ quantum in materia medica exacte cognoscenda Arabes olim, ac nunc nostri seculi
Medici aberrarint, demonstrarunt, produximus, ut hac scilicet ratione solida medi-
cina studiosis viam quandam præstrueremus, quæ ad simplicium medicamentorum veram cognitio-
nem peruenirent, atque adeo expeditius medendi methodum aggredi possent. Secundus autem hic, quæ
auspicamur, liber, paradoxa nonnulla habebit, quæ ad causas morborum, eorundemque curandi veram
rationem attinent, in quibus a frequentissimis illis vulgarium medicorum opinionibus recedimus, ita
ut ex his ipsis iterum discere queant veritatis studiosi, quantum a prisca & germana medendi ratione
nostra tempestatis descuerint Medici, ubi quisque sibi peculiarem in medendo magistrum ac ducem imi-
tandum proponit, citra omnem methodum quicquid ille præscripserit adhibens. Nemo enim sana-
mentis nescit maximam hodie medicorum partem non antea curâ agrotis manus admonere, nisi ubi
prius remedia ab ijs, quos practicos, rectius meo iudicio prætoros nominant, sine omni delectu & iudi-
cio emendicarint: satis enim esse arbitrantur, ubi remedium magnum aceruum miseris obtulerint
egris, magnique usus medicos se esse censent, quoties semper aliquid noui moliri videntur, nescientes
alterum alteri impedimento esse, & hoc pacto non raro in longius tempus protractum iri morbum.
Lange itaque consultius esset, si methodo curare vellent, morborum imprimis naturam eorumque caus-
as inquirerent, e quibus tandem curationis indicationes, haud aliter quam Gale. in suis de medendi
methodo libris docuit, eruenda essent, quæ deinceps pulcre remedium inueniendorum rationem, sine
prædictorum auctorum ope & subsidio, ostenderent. Cæcis persimiles sunt eiusmodi doctoreculi,
quibus nisi dux quispiam, qui iter commonstret, conzigerit, nusquam progredi possunt. Et accidit
plerumque, ut cæcis illis cæcus dux obtingat, atque adeo utrique in foueam incendant. Hos certe Medicos
ab aliorum præscriptione nelatum quidem unguem recedentes, Manardus noster apposite Me-
dicos ex commentario dixit, quod scilicet non in pectore & mente, sed in chartis & membranis
sua

F

A sua remedia ac curandi rationem sepositam habeant: neque enim mederi morbo sciunt, nisi nomine prius habito, proprio eius capite a libris remedia requirant. Nemo autem me hæc dicere putet quasi ad libros plane non esse recurrendum existimem, atque adeo in totum reijciendos medendi rationem præscribentes auctores velim, id quod superioribus annis Morophrastus quidam (ab Theophrastus dicere volui) docere ausus fuit: absit enim ut in eam dementiam deducar: sed ut monerem ne se, tanquam cæci essent, a nudis nominibus illuc duci patiantur veluti ad iudices, & ut ea quæ apud illos legunt ad examen rationis vocent, nec illorum placitis tanquam Delphicis oraculis passim obtemperent, sed illa potius ad suas indicationes prosequendas exigant. Neque enim adeo nos scriptorum, Arabum potissimum, nominibus mancipare conuenit, ut posthabita ratione, solis eorum auctoritatibus innitamus. Id autem quam necessarium, quamque utile fuerit, probe paradoxa nostra qua hoc libro tractamus monstrabunt: euidenter enim nostra etatis Medicos, Arabum ac iuniorum decreta in medendi ratione sectantes, toto cælo errare docent. Quare ea diligenter expendant, ut ad illorum exemplum reliqua quoque medicorum placita, quæ hic non attingimus examinare possint: neque enim omnia quæ in dubium vocari possunt prosequi animus est, sed pauca saltem, atque ea sane quæ quodidie fere inter medendum accidunt.

Theophrastus Paracelsus.

Non esse nisi duo tantum causarum salubrium genera, externam scilicet & internam, vel ut hodie loquuntur, primitiuam & antecedentem, contra Auicennam, totumque iuniorum medicorum cætum, coniunctum enim in morbis Galenum ne somniasse quidem.

CAP. I.

A Vicenna Fen. 2. Canonis primi, Summa 1. doct. 2. ca. 1. tria esse causarum morbificarum genera his verbis innuit: Causæ dispositionum corporis sunt tres, primitiua, antecedentes, & coniunctæ. Exemplum coniunctæ causæ putredinem in febribus esse inquit. Auic. in sua Ilagoge sequitur Ioannitius Monachus ita de causis scribens: Modi occasionum infirmitatē facientium sunt tres, Nam aliæ sunt quæ vocantur primitiua, quæ exterius accidunt corpori, ut calor & frigus. Sunt & antecedentes, quæ admoventur intrinsecus in corpore, ut repletio & inanitio. Sunt & aliæ quæ vocantur coniunctæ, quæ cum adsunt, adest infirmitas, & abeuntibus his infirmitas abest, ut putredo in febribus. Ioannitium deinceps forte quæ Monachus fuerit, illum numinis loco colentes: sacrosancta namque iis temporibus, fraterculorum illorum auctoritas fuit: imitati sunt omnes in vniuersum medici recentiores, eandem in suis libris cuius morbo assignantes. Errare autem illos vehementer studiosi videbunt, ubi definitionem, quam illi causæ coniunctæ adscribunt, falsam & mendacem esse demonstraui. Neque enim Putredo, ut Ioannitius & Auicenna, quæ se falso Galen. gloriatur esse interpretem, sentiunt, febris causa coniuncta existit, si enim esset, tunc putredine amota calor quoque febrilis amoueret: quod non fit, nam si fieret, tunc infrigidatio, vltima nimirum in curatione febris medici operatio, esset superuacanea, quæ tamē Galenus, ut necessariā valde post deuictam putredinem, adhibendam esse passim admonet. Præsertim v. c. 89. artis parua, ubi ita scribit: Eadē ratione in aliis tribus intemperaturis, vnum commune præceptum obseruauimus, ut vnam quamque prius, quæ efficit causam rescindamus, deinde ita ad illam quæ ab eadē causa facta est, ægritudinem accedamus. Quibus utique verbis generatim Galenus semper causam morbum facientem primū rescindendam esse docet, ab ea v. & ægritudinem a causa factam: ita ut euidentissimum sit causam morbi immediatam, quæ coniunctam nostri appellant, auferri posse morbo adhuc remanente, quod tamen definitioni eius repugnat. Sic post rescissam putredinem, quæ febris putridæ causa efficiens est, remanet calor febrilis accensus in corde, & per arterias ac venas in totum corpus diffusus, qui tandem quamprimū per refrigeratiam extinguī debet. Hunc sane ordinē in curanda febre putrida Galenus etiam li. 31. ther. met. ca. 4. obseruat, ita scribens: Fieri non potest ut febris sanetur, nisi inhibita prius putredo sit. Quare summouenda putredo ipsa primum, mox febris sanari debet. Et lib. 8. ca. 1. sic dicens: Itaque si iam præsens febris est, sed causa, quæ eam excitauit iam desit, huc tantum sananda eius consilium dirigetur, ut refrigeretur. Et rursus li. 11. cap. 10. Hoc vero tempore, inquit, etiam vires roborare, quæ & putredinem superent, & succos concoquant, studebimus. Quod vero febris ipsius iam accensum est, id refrigerabimus. In auxiliorum enim inueniendorum ordine, vltima est quæ ab hac sumitur indicatio, quamuis alia ratione sit prima, quippe cum a febre cœperit inueniendorum præsidiorum nunc methodus. Quibus utique verbis Galenus manifeste docet, quod in ordine præsidiorum vltima indicatio sit remouere febrem per refrigeratiam.

Auicenna & illum sequentium erronea de causa, cum generibus sententia.

Putredo non est causa coniuncta febris.

Causa eadem coniuncta potestamone-ri adhuc remanente morbo.

post amotam putredinem. Evidentissimum itaq; est si febris putrida putredinem habe-
ret causam coniunctā, tunc ea amota, id n. definitio vrget, submoueretur & morbus, &
minime necessarium esset, iuxta Galeni consilium, ad iam factā febris curationē Medi-
cum venire. Proinde errant Auicenna ac Ioannitius, illosq; imitantes Medici, putredi-
nem causam coniunctā febris statuētes, cum iuxta Galeni dogma, nec febris putrida,
nec alii morbi causam coniunctā habeant, sed ipsimet lesarum actionū causā coniuncte
sint. Et cum illa causā, quam coniunctā vocant, sēpius amoueat, morbo adhuc rema-
nente, quemadmodum de putredine demonstrauimus, falsam esse definitionē quā illi
afferunt oportet, dicentem causā coniunctā semota, amoueri & morbum. Quod vero
crediderint Galenum in morbis statuēte causam coniunctā, nulla alia ratione factum
est, nisi q; librū de definitionibus, & eum qui Introductio seu Medicus appellat, Galeni

Morbi causā
coniunctā
erant.

Liber de de-
finitionib.
& Intro-
ductio spu-
sui.

Eculso telo
morbis re-
manet.

Lapis in ve-
fica morb.
non autem
causa ex-
istit.

Duo tantū
causarum
genera.

Causā an-
tecedētes.
Causā pri-
mitiuā.

esse existimauerunt, in quib; sane causā coniunctā mentio fit. Sed eos libros esse spurios
nemo hodie nescit, idq; alias non raro in nostris lucubrationibus testati sumus, q; in iis
multa sint, quā cum Galeni placitis ex diametro pugnent. Et certe in Græcō exemplari
vterq; liber inter vobis, & Galeno falso adscripta, enumeratur. Non esse autem Galeni le-
gitimum librum Introductorium evidentissimum fiet, si quis definitionē quā illi causā
coniunctā notificare studuit, intimius expendit. Sed verba auctoris, quisquis ille
fuerit, subiecimus. *συνεχπικὸν, inquit, αἰτιὸν ἐστὶν, ὃν παρόντων, πάρεστι καὶ τὸ νόσημα, καὶ ἐξαιρεμένου, λυέται, ὡς
σκόλοψ, καὶ βέλτε.* quod est: *Causa coniuncta siue continens est, quae cum praesens est, eius quoque mor-
bus adest, quum vero tollitur, etiam morbus euanesceat, ut spina & velum. Quae quidem notifica-
tio nulli grauioris auctoritatis Medico, tantum abest, vt Galeno medicorum κορυφαία ad-
scribi queat, congruit, quod in propatulo falsum sit, quod hic in exemplo pfertur. Quis
enim nescit euulso telo infixum vulnus adhuc remanere? Vulnus autem esse morbum
actionemq; vitare omnibus in confesso est: continuitatis enim solutio existit. Iisdem
pene verbis auctor libri definitionum causam describit coniunctā, dicēs: *συνεχπικὸν αἰτιὸν,
ὃ παρὸν μὲν παρούσαν φυλάττει τὴν νόσον, ἀναρροῦμενον ὃ ἀναρρεῖ, ὡς ὁ ἐν κύσει λίθος.* id est: *Causa coniuncta est,
quae quum praesens est, praesentem quoque morbum custodit, quum vero tollitur, morbum quoq; simul
tollit, ut lapis in vesica. Quam itidem definitionem haud aliter quam priorem piaculum
sit in Galenum auctorem referre, quod manifeste falsum sit, lapidem in vesica in causa-
rum numero collocari posse, quum morbus sit, actionem enim laedit. Quicquid enim
primo actionē vitiat, morbus sit oportet. Et Hippocrates quidē inter morbos puerorū
3. aph. 62. lapidem vesicae recenset. Ita plane in apertissimis cecutimus: neq; mirum, q;
nullus nobis constitutus ac proprius loquendi de rebus medicis modus sit, qualem ve-
teres obseruasse videmus. Hi namq; duo tantum causarum morborum genera esse
statuunt, externam videlicet & internam, siue vt nunc loquuntur, primitiuā & ante-
cedentem. Id ipsum fecisse Galenum legimus lib. 1. ther. method. cap. 8. dum in eam sen-
tentiam scribit: *τέταρτον δ' ἐπὶ τοῖςδε γένος πείθεω, τὸ τὰν παρούσων αἰτιῶν καὶ τῶν τῶν τὰ μὲν οὐκ ἀντιπρὸς ζῆτα
σώματα συνιστάμενα, προηγούμενα καλεῖται. τὰ δ' ἐξωθεν προσπίπτοντα προεπαρχέοντα. hoc est: *Quantum vero ab
ijs genus statuito, quod sit morborum causarum. Atque harum, quae quidem in ipso animalis cor-
pore consistunt, antecedentes nominet: quae vero extrinsecus accidunt, primitiuas. Et in lib. de mor-
borum causis ita scribens πάλιν οὖν ἀπανελδόντες ἐχόμενα τῶν προκείμενων. ἢ ὅτιμα προκείμενα ἀπὸ τῶν
αἰτιῶν νοσημάτων ἐπείν τὰς προηγούμενας αἰτίας ἀρχὴ καὶ τῶν προεπαρχέοντων. οὐδὲν γὰρ χεῖρον τοῖς οὗτοι διαστειλάμενοι
τὰς προσηγείας τῶν σεφῶς ἐνέγκει ἀκολουθῶσαι. τὰς μὲν δὲ κατ' αὐτὰ τὸ ζῶον, εἴτε οὖν διασείσεις, εἴτε καὶ κινήσεις, παρὰ φύσιν
αἰτίας ὀνομάζουσι προηγούμενας νοσημάτων. τὰ δ' ἐξωθεν προσπίπτοντα, καὶ ἀλλοιούντα καὶ μεταβάλλοντα μέλας τὸ σῶμα,
προεπαρχέοντα τὰ καὶ προεπαρχέοντα καλοῦσιν αἰτία. quod est: *Redeamus igitur ad id quod propositum nobis
erat, nempe, vt singulorum simplicium morborum explicemus, tum antecedentes, tum primitiuas
causas: neq; enim fuerit absurdum, dilucidioris doctrinae gratia, eas huiusmodi nominib; distinge-
re. Eas siquidem, quae in animali ipso consistunt, siue affectus, siue motiones praeter naturam, causas
nominant morbos antecedentes. Quae vero extrinsecus adueniunt, & vehementer alterant, immu-
tantq; corpus, eas primitiuas appellant. Ex quibus omnibus luce clarius fit, Galenum inter
morbificas causas, coniunctā non numerasse. Et quod ea penitus fuerit eius sententia,
en adamantino hoc ipsum argumento euincemus. In arte medicinali cap. 78. ita scribit:
τὴν ἡδὴ μηχανημένην τε καὶ οὐκ ἀνέναντον ἰατρικὴν καὶ τὴν δὲ οὕτω μὲν οὐκ ἀνέναντον, ἐσομένην δὲ, ἐκ τῆς κατὰ τὸ σῶμα διασείσεως κα-
λύσαι γενέσθαι. τῆς γινόμενης ὅτι μὲν ἡδὴ μηχανημένη ἰατρικὴ. ἡ γινόμενα δὲ, καλύσαι γενέσθαι. καλυπθῆναι τῆς διασείσεως,
ἢ ὅτι γινέσθαι πέφυκεν, ἀναρρεθίσσης. ὀνομάζεται δὲ ἡ τοιαύτη διασείσις αἰτία προηγούμενη. μηχανή δὲ νόσος ἡδὴ, διαρραγεύ-
σθαι τῆς διασείσεως, ὅτι ἡ πρώτη ἢ κατὰ φύσιν ἐνέργεια ἐλάττωται, λυθίσσης ἢ παρὰ φύσιν ἀντὶ τῆς ἐνέργειας
νόσος*****

Rerum per
mar. et iura
non sunt
causae con-
iunctae.

auferri. Morbos autē esse res permanentes, fatetur Montuus ipse, & idem docet etiam Galenus. Morbi enim affectus sunt. Affectus autem, ut ait Galenus lib. de symptom. differ. constans & permanens est. Imo lib. 2. method. medendi cap. 3. disertis verbis, sanitatem & morbum ex constantium & permanentium numero esse ait. Morbus autem qui adhuc fit, nō dicitur morbus iuxta Galenum, sed pathos, ut videre licet loco iam citato, & lib. 2. ther. metho. Falsum præterea est quod Montuus causam coniunctam in morbis Galenum lib. 1. de sympto. causis statuere ait, neq; enim vllibi eius meminit. Morbum quidem symptomatis esse causam coniunctam illic statuit, id quod nos etiam fatemur. Septimo quoque aphorismorum. com. 30. causæ quidem coniunctæ mentionem facit, at non ut morbificæ, sed tantum ut spumosa puitia. Sic & in libro de pulsibus causæ coniunctæ mentio fit, quod pulsus utpote ex fientium numero, habere causas coniunctas indubitarum sit. Proinde parum quid dicatur hoc loco animaduertit Montuus, nobis enim de morbificis, huic vero de quarumvis rerū causis coniunctis sermo est. Stat itaq; firma adhuc sententia Galeni, nullam plane in morbis esse causam coniunctā, quicquid Arabes, ac barbarissimi illorum sectatores nugentur. Fatemur autem iuxta definitionē, morbum actionis læsæ quæ symptoma est, causam cōiunctam dici posse. Perinde enim ut morbo posito, actio quoq; læsa ponitur, ita illo remoto, & hæc etiam remouetur. Atqui morbi ipsius plane nullam esse causam coniunctam constanter affirmamus. Exquifitorem & copiosorem eius rei tractationem studiosi in eo libello quem de causa continente edidimus, & in eo etiam, quē filius meus Fridericus, aduersus Iacobum Schegkium scripsit, reperient.

Medicos iuniores repletionis species confundere, neque quod turpe admodum est, easdem recte definire. CAP. II.

Nostræ ætatis medicorum repletionis diuisio erronea.

Repletio quid. πληθω. πλεονεξία.

Repletio duplex.

Nostræ ætatis Medici duplicem faciunt repletionem, vnam quidem ad vasa, alteram vero ad virtutem nominantes. Quæ ad vasa fit, alio nomine repletionē in quantitate appellant: eam vero quæ ad virtutem, in qualitate repletionē vocant. Quæ in quantitate fit Plethoriam, ita enim loquuntur, alio nomine dicunt, quemadmodum eam quæ in qualitate fit, Cacochymiam. Plethoriam seu repletionem in quantitate describunt esse, vbi omnes simul humores sua quantitate excedunt, aut vnus tantum. Cacochymia autem vbi humores sua qualitate tantum, puta caliditate vel frigiditate, humiditate aut siccitate exsuperant. Hæc quidem iuniorū de repletionē sententia est, q̄ quam erronea sit satis cōstabit, vbi primū quid repletionis nomine intelligendum sit explanauerimus. Repletionem hoc loco magis generatim inaudire oportet, q̄ ut cum plenitudine coincidere possit, quam Galenus πληθω & πληθώρα nominat, ut sit eadem cum ea q̄ Hippocrati, & Galeno πλεονεξία, latinis redundantia dicit. Id quod ideo monendum esse duxi, ne scil. quis temere me postea cacochymia inter species repletionis enumerantē ignorantia arguere, ac plane obtrudere Galenū queat, hanc neq; plenitudinem, neq; plethorā vocari posse in libro de plenitudine asserentē. Lōge enim alia nobis ratione hoc loco de repletionē sermo fit, quam Gal. illic de plenitudine, quam duplicē tantum facit, quemadmodum in li. de curandi ratione per sanguinis missionē, & com. 17. secund. aphor. 1. tom. Neq; n. simpliciter de eo quod redundat in eo libro agit, sed tantū de plethora plenitudine, quæ est humorū in animatis corpore abundātia, vel vasa extendens, vel vires grauās. Adeoq; repletio generalius multo quā plenitudo vocabulū est, q̄ hoc ad plethorā, & ad vires, multitudinem tantum, illa vero vltra iam dicta, ad qualitatē redundantiam & cacochymiam quoq; genus sit. Quare repletionē hoc loco de omni eo quod in corpore redūdat dictum esse, genusq; ad plenitudinē existere, atq; idem quod redundantia significare, & minime cū illa in significato coincidere intelligamus, atq; ex veterū sententia eam ita diuidamus: Repletio seu redundantia duplex est, vna in quantitate, altera in qualitate. Repletio in qualitate, in qua nuda qualitas citra humoris affluxum iustā mensuram excedit. In quantitate vero, vbi cibi potusue, aut humoris in corpore tanta est quantitas, ut nobis molestiam exhibeat, vel morbum aliquem cōciliet. Hæc duum est generum. Vna quidem cibi, quæ Græcis πλησμονή, Latinis satietas vel saturitas dicitur. Atq; hæc vtiq; gemina est, ad vasa scilicet, & ad vires. Altera autem humoris, quæ Græcis ut cōprehensum est, πληθω & πληθώρα, Latinis plenitudo & multitudo vocatur. Repletio vero siue redundantia

- A** dantia in quantitate iterum dissectari potest in eam, quæ cacochymia dicitur, & eam quæ plenitudo. Plenitudo rursus duplex, una ad vasa, altera ad vires. Et hæc sane optima est repletionis diuissio, nihil a Galeni ac aliorum veterum dogmate varians. Cacochymia autem, quæ Græcis nihil aliud sonat, quam succorum vitium, a Gal. lib. 13. the. meth. ca. 3. iis verbis describitur: ὅταν ἢ δὴ ξανθὴς χολῆς, ἢ μελαίνης, ἢ φλέγματος, ἢ τῶν ὁρῶν ὅρων μετὰ γένηται τὸ σῶμα, καὶ κυρίως οὐ πλεονάζει τῶν τοιαύτων διαβόλων. quod est: *Vbi vel flaua bili, vel nigra, vel pituita, vel ferofis humoribus refertum est corpus, cum habitum cacochymiam, & non plethoram nominant.* Plenitudinem vero ita definit: ὅταν μὲν ὁμοτῆτος ἀλλήλοις ἀνενδῶσιν αἱ χυμοὶ, πλεῖθον τοῦτο καὶ πλεονάζειν ἐπικαλεῖται. id est: *Quando æquabiliter inter se succi adaucti sunt, id est plenitudinem, & plethoram, seu succorum redundantiam vocant.* Si itaque succi ita æquabiliter adaucti fuerint, ut
- B** lata valorum spatia distendant, tum plenitudo seu multitudo ad vasa dicitur. Vbi autem illorum extuberantia tanta est, ut vires grauare possit, tunc multitudo seu plenitudo ad vires appellatur. Adeoque altera plenitudo locum continentem respicit, altera vero vires. Eius quæ locum continentem respicit, tanta oportet copia sit, ut omnino ferri nequeat: eius autem quæ vires, tanta ut grauaret. Proinde quemadmodum, qui onus gestat, non protinus, vbi grauatur ac fatigatur, iam cecidit, & victus ab eo est, ad eundem modum si virtus a plenitudine grauatur, fieri potest, ut nondum ægroter. Haud aliter in libro de plenitudine iam dictas repletionis species describit Galenus, dum ita scribit: μὴν εἶποτε πλεονάζειν ἢ ὡχρῶς, ἢ ξανθῇ προσαρροδυσμένη χολῇ, καὶ ἀπερὶ ἐν ἰκτερίκοις, οὐκ ἐπὶ πλεθρῶν, οὐδὲ πλεθρῶν διὰ βίαιας, ἀλλὰ καὶ κυρίως τὸ τοιοῦτον πάθημα ἐστίν. κατὰ ταῦτα δὲ καὶ ἐπὶ τῆς μελαίνης χολῆς καὶ τῆς φλέγματος. ὅταν δὲ εἴρηται πρότερον, ἢ βίαιον, ἢ ὡχρῶς ἢ πλεονάζειν, ἢ πλεθρῶν μὲν ἢ τοιαύτη διαβόλος εἴρηται. hoc est: *Si sola pallida bilis, quam & flauam nominant, aliquando superauerit, ut in regio morbo laborantibus, non adhuc plenitudo, neque plethoricus affectus, sed cacochymia huiusmodi vitium est. Hoc pacto in atrabile & pituita dicendum. Vbi vero, ut antea dictum est, vel grauitas, vel tumor supra naturam sit, plethoricus quidem talis affectus dicitur.* Ex quibus omnibus constat, multifariam in repletionum siue redundantiarum nominibus aberrasse iuniores. Primum enim repletionem siue redundantiam cum plenitudine confuderunt, quod minime faciendum erat, quum hæc species, illa vero genus sit. Deinceps, quod cacochymiam inter plenitudinis species collocarint, quam tamen plethoram, ut antea ostendimus, non esse liquet. Hallucinantur quoque, quod plethoram esse definiunt, vbi vnus humor abundat, cum ex iam dictis manifestum sit, plethoram seu plenitudinem fieri, vbi æquabiliter succi adaucti sint, quod non ita intelligendum erit, quasi eo pacto adauctos esse oporteat, ut vnus alium proportionem non excedat: sed quod increuisse omnes necesse sit, si plethoræ nomen mereri debeant. Proinde nihil obstat, si vnus ex illis proportionem excesserit reliquos, modo omnes adaucti sint: & id sane ὁμοτῆτος dictio, quæ æquabiliter interpretatur, hoc loco significat. Testis huius rei Gale. est, qui in li. de plenitudine sic scribit: πλεονεξία δὲ ἐστὶ τὸ πλεῖθον τῶν κατὰ ὅλον τὸ σῶμα τοῦ ζώου χυμῶν. οὗτ' οὖν τῶν κατὰ μέρος ὀγκῶν, οὐτε καὶ κυρίως ἀνοίειν χρὴ περὶ ἐν ἐν τῷ λόγῳ τῷδε τὰς ἰδέας, ἀλλ' ὅταν ἦτοι κατὰ τὴν ἀρχαίαν ἀναλογία ἀνενδῶσιν ἅπαντες, ἢ πᾶσι βραχύναν ὑπερβολὴν ἐξ αὐτῶν εἰς λάβειν. ἰδὲ μὲν οὖν αἷμα παμπόλλω ὑπερβῆναι δύναται λαβεῖν, ἐν ταῖς πλεθρῶν διαβόλοις, τῶν δ' ἄλλων χυμῶν οὐδὲν. id est: *Plenitudo est humorum in animantis vniuerso corpore abundantia. Neque igitur particularium tumorum, neque vitiosi succi species in hoc sermone audire desiderandum est, sed cum vniuersi iuxta pristinam proportionem increuerint, vel exiguum quendam excessum vnus inter eos acceperit. Itaque sanguis in plethoricis statibus vehementer potest praevalere, aliorum humorum nullus.* Ceterum cum fere semper contingat in plethoricis dispositionibus, ut vnus aliquis humor ceteros excedat, docet eodem lib. Galenus plenitudinis species ita distinguere: τὰς δὲ ἰδέας, inquit, τοῦ πλεθροῦς ὅταν γὰρ ὁμαλῶς ἐκτεταμένον εἰς ὅλον τὸ σῶμα ἦ, κατὰ δὲ διαίρεσιν. ἐξ ἐρυθρῶν μὲν γὰρ ἰδὲ τοῦ αἵματος πλεθρῶς ἐστίν, ὑποχρὸν δὲ τῆς ξανθῆς χολῆς. ἐπὶ δὲ τὸ λευκώτερον ἐκτρέπεται τοῦ κατὰ φύσιν, ὅταν τὸ φλέγμα κρατῇ, καὶ ἀπερὶ ἐπὶ τὸ μελάντερον, ἢ ἢ μελάντα χολῇ. καὶ ἐξ ὧν δὲ τῶν εἰρημένων συννεξήσῃ κατὰ τὸ αἷμα. quod est: *Ipsas plenitudinis species, cum totum corpus equaliter humoribus distentum fuerit, hoc modo distinguere oportet. Rubicunda siquidem sanguinis plenitudo est, subpallida vero, flauæ bilis.*
- F** Albescit supra naturalem habitum quum pituita excedit: quemadmodum nigrescit, vbi atrabilis superat. In singulis autem commemoratis sanguinem simul coauctum esse oportet. Proinde si sanguinem semper simul coauctum esse in plenitudine oportet, fieri non potest, ut vnus tantum humor plethoram seu plenitudinem, sicut iuniores existimauerunt, facere possit, quum sanguini oēs humores alii cōmixti sint. Quapropter vbi vnus tantum abundat humor, tum

Plenitudo duplex.
Cacochymia quid.

Plenitudo seu multitudo quid.
Ad vasa.
Ad vires.

Iuniores in repletionum nominibus multifariam errauerunt.

ὁμοτῆτος.

Plenitudinis species, ut distinguenda.

Obiectio
diluitur.

πλεοναμία
quid.

Nunquam
syncerus
sanguis in
venis con-
tinetur.

Montui ob-
iectiones
diluantur.

Sanguis re-
liquis hu-
moribus
largior.

In cacochy-
mia humo-
res non tā-
tum sua
qualitate
molestant.

Repletionū
curationes.

cacochymia dicitur, quemadmodū Galenus post verba iam citata docet, & paulo supra A
eius sententia adscripta est. Sed hoc loco posset quispiam in hūc modum iam dictis ob-
stare. Fateor quidem neq; solam pituitam, neq; vtramq; bilem solas, plenitudinem dici
posse: solus autem sanguis vehemēter adauctus, ita vt venæ amplius distendi nō possint,
plethora dicenda est. Cui ita responsum volo. Licet tantum sanguinis incrementum, vt
testatur Gal. in lib. de plenitudine, vt venæ distendi amplius non possint, exacte loquendo,
plethora dicenda non sit, sed πλεοναμία, πικρὸν γὰρ πλεονεξία χυμῶν ἐστὶ τῶ σῶματι συνιστάμενη. i.
Plethoria enim humorum in toto corpore redundantia est, vt idem ait: atq; adeo si humorum est
abundantia, non vnus erit: contingit tamen interdum; vt in sanguine solo plethoræ
generatio statuatur, idq; dum sit, sanguinis copiam per excellentiam dictam esse putan- B
dum erit, non segregando, vt diximus, reliquos humores, qui simul cum illo in venis
continentur, cumque eo pariter abundant. Nunquam enim syncerus in venis sanguis
continetur. Proinde idem est dicere humores, & sanguinem abundare. Testis est Gale-
nus, qui libro iam sæpius nominato ita inquit: ἀδυνάτον οὗτος ἀκρίβης αἷμα ποτὶ περιέχεσθαι κατὰ τὰς
φλέβας, ὥς μηδὲν αὐτῷ μήτε χολῆς ἐμφέρειν, μήτε φλέγματός, μήτε ὀρράδου ἰχθῆρος. ὁ δὲ ἐγὼ εἰς τοὺς ἐμπροσθεν
ἡξίουν ὡσπύτως ἀκούειν, εἴτε τοὺς χυμοὺς πλεονάζειν, εἴτε αἷμα φήσαιμι. τοῦ γὰρ ἀμίκτου καὶ καθαροῦ τῶν ἄλλων ἰχθῶν αἵ-
ματος οὐδὲ ποτὶ τὰς φλέβας περιεχομένον. quod est: Fieri non potest tam exacte sanguinem unquam in
venis contineri, vt nihil vel bilis, vel pituita, vel serosa saniei inferatur. Vnde & ego in superiori-
bus idem intelligi volo, siue humores, siue sanguinem abundare dixerim: quippe immixtus, & ab a-
lijs humoribus syncerus sanguis nunquam in venis detinetur. Ex iam dictis & Montui delira- C
mentis occurri potest, dum in plethora humorum omnium non ex æquo semper abun-
dantiam esse contendit, quod in ea sanguis vehementer præcellere possit, Galeno teste;
aliorum humorum nullus. Nam nihil obstat quin phlethora dici possit, etiam si vnus
humor reliquis antecellat, vt antea abunde demonstraui: satis enim est vt omnes
ex æquo, hoc est simul, & non vnus tantum auctus sit. Cur autem sanguis in omnibus
plethoricis statibus præcellat, nulla alia ratio est, nisi quod is semper reliquis humorib.
vt recte in problematis Aphrodiseus asserit, largior sit. Hinc cum omnes increſcunt
humores, quid mirum si sanguis, vtpote copia sua ceteros vincens, in plethora vehe-
menter præcellat. Proportio enim eius ad reliquos humores nunquam non maior exi-
stit. Quid multis opus est? in plethora non ita ex æquo se habent humores, vt omnium D
æqualis sit copia, semper enim sanguis largior, dein pituita, tertio bilis flaua, & postre-
mo atra, sed quod secundum iam dictam proportionem omnes simul augeri & incre-
ſcere contingat. Vnus enim tantum si redundauerit, tum non plethora, sed cacochy-
mia vocatur. Ita nemo nō videt nihil plane illorum, quæ diximus, intellexisse Montuiū,
minimeq; falsum esse, vt ille impudenter contendit, in plethora ex æquo seu simul o-
mnium humorum abundantiam esse. Porro errant iuniores Medici, quod in cacochy-
mia humores tantum sua qualitate molestare putant, cum satis constet eosdem etiam
sua quantitate nocere, vt de flaua bile in morbo regio affectis liquet. A lia vtiq; est reple-
tio in qualitate ab ea quæ cacochymia dicitur, veluti ex supra dictis satis manifestū est.
Nec minus errant, dum cacochymiam repletionem ad virtutem nominant, quando E
antea ostensum sit cacochymiam non posse simpliciter dici plenitudinem, multo mi-
nus ad virtutem, ita vt plane ab illa differat. Hactenus itaq; ex Galeni ac veterum sen-
tentia repletionum nomina, quæ a nullo hactenus ita explicata esse constat, enarraui-
mus, idq; non ab re, quod iis ipsis exacte cognitis, cuiq; etiam sua curatio facile adhiberi
queat. Redundantia enim in qualitate, alteratione tantum, manente adhuc substan-
tia, curatur. Cacochymia vero purgatione, quæ cuiq; superanti succo sit accommoda.
Plenitudo seu plethora tum sanguinis missione, tum frequenti balneo, & alijs quibuscūq;
quæ a Galeno lib. 13. the. meth. cap. 3. enumerantur. Vnde iterum abunde dilucidum fit, ca-
cochymiam a repletionem in qualitate, & ab ea quæ ad virtutem dicitur, differre, diuersas
namq; curationes habent. Vnius autem & eiusdem morbi diuersa curatio esse non po- F
test. Sed ea de re satis, plura enim ad hanc rem pertinentialib. 2. Institutionum nostrarum
sect. 6. cap. 1. diximus.

Quandoq; virūq; auxilijs, & vena scilicet sectione, & purgatione opus erit, tum venam
potius incidendam ante purgationem, quam purgandum ante venæ sectionem esse, contra
omnium ferme hodie medicinarum facientium sententiam.

- A** Nemo fere nostra tempestate Medicorum est, qui non tam in iis, quos a morbis præservare, quam in illis quos a iam correptis curare studet, venam ante purgationem incidendam esse confidenter consulat. Et eousq; animos vulgi etiam hoc irreptit dogma, ut nullus hodie sit qui non id ipsum sequi tuto posse sibi persuaserit: tantum inueterata, etiam si pessima sit, consuetudo potest. Quantum autem ea in re aberrant, probe novit quisquis veterum scripta paulo intimius cognovit. Neq; enim illos venam post purgationem incidisse, sed plane contra purgationem post venæ sectionem adhibuisse, modo utriusq; opus fuerat, legimus. Ita Hippocrates *lib. 4. de rat. victus in morbo acuto, aphor. 18.* ubi morborum, qui primum sanguinis egent missione, deinde ab ea purgari expostulāt, catalogum recenset, fecisse cōstat. Nam illic sic scribit: οὐ δυνάμνται λύειν τὴν πρὸ τῆς πύλης φαρμακείαν, ἀλλὰ φλεβοτομία τῶν λοιπῶν δὲ ἡγεμονικὸν ἐστίν. ἐπειτα δ' ἐπὶ κλυσιμῶν ἦν μὴ μέγα καὶ ἰσχυρὸν τὸ νόσημα ἢ εἰ δὲ μὴ, καὶ ὑπερὸν φαρμακείας δεῖ, δεῖται δ' καὶ τῆς ἀσφαλείας καὶ μετρίότητος μετὰ φλεβολομίας φαρμακείας. id est: *Soluti non possunt si quis primum purganti medicamento uti aggressus fuerit, nam vena sectio in his preferenda venit. Deinde ad clysterem procedendum, si magnus et vehemens fuerit morbus. Si vero non, et postea medicamento opus sit, sane id post sanguinis missionem secure et mediocriter adhibendum.* Mox autem rationem subiungit, dicēs: ἐκδοσι καὶ τὰ φλεγμαίνοντα ἐν ἀρχῇ τῶν νοσούντων εὐδώς ἐπιχειροῦσι λύειν φαρμακείαν, τὴν μὲν εὐτεταμένον καὶ φλεγμαίνοντα οὐδὲν ἀφένουσιν, οὐ γὰρ δεχόμενοι, αὐτὸν δὲ τὸ πάθος. τὰ δ' αὐτὴν χροῖα τῶ νοσήματι καὶ ὑμενὰ συντήκουσιν. ἀδένει δ' οὗ τοῦ σώματος χροῖαμένου, τὸ νόσημα ἐπικρατεῖ. ἐκδοτὰν δ' τὸ νόσημα ἐπικρατεῖ τὸ σώμα, τὸ τοιοῦτον δὲ αἰνέτως ἐχει. hoc est: *Quicumq; ea qua inflammantur statim inter morborum initia medicamento solvere conantur. et ab distantia inflammataq; parte nihil auferunt, non enim affectus, utpote crudus, remittitur dissipaturve, ac ea qua morbo adversa et sana sunt, colligescunt, ductoq; ad imbecillitatem corpore, morbus superior evadit, qui ubi corpus vicerit, remedium non habet.* Præterea nunquā non Galenus, ubi & venæ sectione & purganti medicamento opus fuit, ad sanguinis missionem ante medicamentum peruenit, id quod luce clarius videbit qui quartum eiusdem de tuenda valetudine librum diligenter perlustrabit. Hic enim lassitudinis species curare docens, non semel, sed iterum atq; iterum a sanguinis detractioe auspicatur, dein quoq; alium medicamento deiecit. Sed ne quisa nobis excogitatum putet, ecce verba Galeni subiiciemus: ἀν μὲν ὁλίγον ὑπάρχει τὸ χροῖον αἷμα, πλείους δ' ἄλλος τις χυμὸς, ἀφίσταται τῆς φλεβοτομίας, ἀν δ' οὗτο μὲν ὁλίγος ἢ διαφιλὲς δ' ὑπάρχει τὸ αἷμα, καθήκοντος χροῖος τῆς φλεβοτομίας. εἰ δ' οὕτως ὡς εἴρηται πρόθεν ὑπάρχειν καὶ ἴσα, πρὸς τὸ πλεονάζοντα, καὶ τὴν ἰδίαν τὴν πλεονάζοντα χροῖον. quod est: *Siquidem bonus sanguis exiguus sit, reliquus vero succus plurimus, utique in his a detractioe sanguinis abstinendum est. Sin is quidem exiguus fuerit, sanguis vero copiosus, audacter incidenda vena est. Dein alium, ut dictum est, deicere oportet, ratione habita de abundantis succi copia, pariter et specie.* Et paulo post: μάλα μὲν οὖν ὡς εἴρηται ἐχέειν τοῦ αἵματος ἀφελόντα, καθήκοντα τοῦ πλεονάζοντος τὸν χυμὸν, ὅς ἀν ἐπικρατεῖν φαίνεται. μὴ προσπειμένῃ δ' τὴν τοῦ αἵματος ἀφάρεσιν, αὐξήσει τὴν χροῖον. id est: *Maxime ergo, ut dictum est, detrabere primo de sanguine oportet, dein succum illum educere qui superare videtur. Non sustinente autem homine sanguinem sibi detrabi, augeri detractionem.* Idem quoque faciendum docet in suis commentariis quos in sextum Hippocratis Epimion librū edidit. In his enim comment. quinto de venæ sectione & purgatione loquēs ita scribit: εἰ δ' ἀμφοῖν αὐτὸς ἀνθρώπος δεῖται τῶν βοηθημάτων, ἐν δὲ ὁλίγον ἐστὶν ὡς ἀπὸ φλεβοτομίας ἀρκετέν ἐστι. hoc est: *Si homo utriusq; auxilijs opus habuerit, tum manifestum est quod a venæ sectione auspicandum sit.* Quid oro iis verbis apertius? quid denique receptum iam dogma magis impugnat, atq; explodit? Verum ut & ratione nostram sententiam firmemus, videant quid ea de re auctor eius libri, qui de renum affectuum dignotione & medicatione inscribitur, statuatur. Is enim et si Galenus non fuerit, apparet tamen fuisse vir apprime doctus, veterumque, Hippocratis præsertim, diligens imitator. Scribit vero in hūc modum: εἰ δὲ οἱ τέσσαρες χυμοὶ πλεονάζουσιν, πρότερον φλέβα τέμνεται πρὸ τῆς καθάρσεως, ἢ καθάρισεν πρὸ τῆς φλεβοτομίας. quod est: *Si quatuor humores iuxta abundauerint, potius vena incidenda ante purgationem est, quam purgandum ante venæ sectionem.* Et subiungit mox rationem dicens: ἐπειδὴ εἰ προκενώσωμεν διὰ φλεβολομίας τὸ σῶμα τὸ καθάρσειον διδύμανον εὐεργετῇ τὰς φλέβας, καὶ τὰς ἀρτηρίας, καὶ τὰς κενὰς χροῖας μὴ πεπληρωμένας, καὶ διερχεται ἀκωλύτως ἐπὶ ὅλον τὸ σῶμα, καὶ ἐλκεῖ τοὺς χυμοὺς. καὶ ῥά σι γίνεται ἡ κένωσις αὐτῶν διὰ τὴν εὐεργεσίαν τῶν ἀγγείων καὶ τὴν χύσιν καὶ λεπτότητα τῶν χυμῶν, εἰ δὲ πεπληρωται ἀπὸ τοῦ αἵματος τὰ ἀγγεία, καὶ δώσει καθάρσειον, οὐ δύναται διελθεῖν διὰ τὴν πλήρωσιν, ἀλλ' ἐσθλάται, καὶ οὐδὲν ποιεῖ, ἢ κακῶς ποιεῖ δ' ποιεῖ. quod est: *Quandoquidem quum sanguinis missione corpus primo vacuatum est, medicamentum purgans exhibitum, venas et arterias, inanesq; corporis regiones inuenit minime oppletas, quo fit ut absq; ullo impedimento in totū corpus dimanet, succosq; attrahat: facilima quoq; sit earū dē per vasorū latitudinē seu spatia, fusione, et tenuitate succorū, enacuatio.*

Secunda ve.
na ante pur
gationem.

Nam si vasa sanguine repleta sint, & purgatorium dederis, medicamentum, non poterit A
propter plenitudinem in corpus differri, sed substat, & nihil efficit, aut id quod efficit, male
efficit. Hac siquidem ratione nihil efficacius esse potest, nam ita aduersariorum senten-
tiam expugnat, ut nullus plane sit qui contra mutire audeat, aut queat, etiam si maxime
id facere cupiat. Et mirum certe admodum est, cur non Auicennae ea in re consilium securi
fuerint, quem tamen in aliis tanquam ducem optimum sequuntur, qui *Fen. 1. Can. 3. tract. 1.
ca. 29.* de canonibus vniuersalibus idem etiam docuit, quod veteres iam docuisse monstra-
uimus. Inter reliqua enim sic inquit: Et si alii etiam dominantur humores, tamen ab ea
incipimus, quoniam phlebotomia est communis humorum euacuatio. Cogitent itaque
nostri seculi Medici, quanto hactenus in errore versati sint, dum passim omnibus maxi- B
me iis, quos ab imminente morbo praeseruare studuerunt, purgationem ante venae se-
ctionem adhibendam esse docuerunt, & resipiscant tandem, iuxtaque veterum praescri-
ptum ac veram medendi rationem, sanguinis missione primum, ubi nimirum utrisque
praesidiis opus erit, uti discant.

*In interiorum viscerum phlegmonibus tutius rectiusque, e directo, quam in opposito latere, con-
tra Arabum, ac recentiorum ferme omnium sententiam, venam secandam esse, idque non
modo vacuandi, sed & reuellendi gratia faciendum.*

CAP. IV.

A Vicenna loco praecedenti, capite citato, communissimi eius erroris, quem omnes C
fere hodie medicinam exercentes sequuntur, auctor fuisse videtur, dum venae sectionem
in contraria doloris parte fieri debere suadet. Hunc & alii Arabes veluti ducem imitati
sunt, illosque superioris aetatis Medici ex aequo omnes, licet non nihil diuersi inter se fue-
rint, id quod horum scripta abunde testantur. Quantum autem a vera medendi ratione
aberrarint, conspicuum fiet, ubi veterum Graecorum medicorum ea de re sententiam pro-
ducemus, rationibusque Arabum tandem opinionem explodemus. Breuiiores autem erimus,
quod fusius, imo ita copiose ut nihil desiderari possit, in apologia nostra contra Hiere-
miam Thriuerum Brachelium illam & aliis multis locis confutauerimus. Peruersam itaque
hanc Arabum, recentiorumque sententiam, in interiorum viscerum phlegmonibus venam D
ex opposito latere secandam esse, in primis explodunt ea, quae de curatione pleuritidis
& peripneumoniae scribit Hippocr. lib. 4. de rat. vict. in morb. acu. aph. 67. dicens: ἢν μὴ ἐδωκὴν
ἀνὸς περιάνη πρὸς κληίδα, ἢ περὶ μαστὸς καὶ βραχίονα, τέμνειν χεὶρ τὴν ἐν τῶν βραχίωνι φλέβα, τὴν εἰσω, ἐφ' ἧς ὡς τὸν αἵμα
τῶν μερῶν κατὰ τὸ δεξιόν. id est: Si dolor sursum penetrauerit ad clauiculam, mamillam, vel brachium, inter-
nam brachij venam secare oportet, ab ea videlicet parte qua dolore fuerit affecta. Et in li. primo de morbis,
ubi iterum de iam dictis affectibus agit, in eum modum scribens: Συμφέρει τὴν φλέβα ἀποσκάσαι
τὴν ἐν τῇ χειρὶ, τὴν πτωλίην καλεομένην, ἢ τὴν ἡπατικήν, καὶ ὅποτένην ἀν' ἐν τῷ νόσσημα καὶ οὕτως ἢ ἐδωκὴν μαλακώτερον
γίνεται τοῦ πλευρῶν τε καὶ τῶν ἄλλων, id est: Lienarem vocatam venam, vel iocinoralem in manu secare confert,
qua morbus fuerit, sicque dolor lateris & aliorum lenitur. Quod autem his locis in pleuritide & peripneu-
monia faciendum suadet, hoc in sexto epidemion, aphor. 7. in omnibus doloribus simpliciter E
esse tentandum docet, nimirum ex proximis loco dolenti venis sanguinem detrahen-
dum fore. Verba eius haec sunt: ἐδωκὴν τὴν ἐγγύτατα κοιλίῳ καθεύρειν, αἷμα δ' ὃ κοιλίῳ διαρῆν. hoc est:
Dolorum proximum ventrem purga, sanguinis vero ventrem seca. Quare autem non ex di-
stantioribus venis, ut quidam temere docent, sanguinem mittendum docuerit, nulla
alia ratio est, nisi ea, quam Galenus in libro de artis constitutione affert, ita dicens: ἢ γὰρ
τῶν ἐγγυτάτων τε καὶ κοινῶν τῶν πνευόντων μείω φλεβῶν κένωσις αἰεὶς τε καὶ ῥάσις, quod est: Quoniam ex proxi-
mioribus & communibus laborantis partis venis, vacuatio optima & facilima. At quidne quis
hic dicere queat, verum esse euacuationis ratione ex proximioribus venis sanguinem
detrahendum esse, reuulsionis autem gratia ex distantioribus, aut saltem parti laboran-
ti opposita: age demonstremus & eam venae sectionem, quae reuellendi etiam causa
fit, e directo locis laborantis faciendam esse. Galenus siquidem libro secundo ad Glauco-
nem ca. 7. euidentissime utrumque euacuationis genus per communes fieri debere venas precipit, F
dum sic scribit: τῶν μὲν ἐπὶ ἐπὶ ῥέοντων ἢ ἀντήσας, οὕτω γὰρ ἡ ἰσχυρότης οὐκ ὀνομάζει, τῶν δ' ἢ κατεληφθῶν τοῖς
μέγεθος ρευμάτων ἢ παροχέτους ἰαμα. αἵμα δ' ἡ δὲ τῆς κενώσεως διὰ τῶν κοινῶν ποιῆσαι καλεῖται φλεβῶν διον τὰς ἐπὶ
μυρῶν ἀντησάσεις, εἰ τὴν ἐν ἀγγωνί. τέμνοισ φλέβα, ἢ παρὰ τὴν πλῆθος σπύας προσβάλλοις, ἢ ἐπὶ τὰς χεῖρας δευράνοις τε καὶ
ἀναλείψας καὶ δεξιόσιν παροχέτους δὲ τὰς ἐν ἰγνύας ἢ σφυροῖς διαρῆν, καὶ σπύας μὲν προσβάλλων, καὶ δευράνων, καὶ
φνατεῖων καὶ δεξιόσιν τὰ σκέλη καὶ μὲν δεξιὰ μῆτρα πνευόντων ἐκ δεξιᾶς χειρὸς καὶ σπύας ἀπ' ἀγρόν τοῦ αἵματος τῆς τε δεξιᾶς

Eta fuerint, incidere humeralem in manu. Et si ea non cernitur, mediam. Vbi vero iecur, pectus, pulmo aut cor ita laborat, internam. In angina autem primas in manibus, secundas eas quae sub lingua. At iis quae in occipite sunt sic afflicti, etiam eam quae circa cubitum est, necnon eam quae habetur in fronte. Renibus vero & vesica, pudendo & utero sic habentibus, eas quae in cruribus sunt, potissimum autem quae circa poplitem. Sin minus, eas quae iuxta malleolos. Perpetuo vero in omnibus quae directo est: ubi iecur phlegmone laborare inceperit, quae in dextra sunt manu: ubi lien, contra. E quibus verbis iterum dilucidum fit errare eos qui in principio phlegmonum venam quae directo est incidendam esse negant, cum aperte hoc loco bis Galenus principii inflammationis meminerit, in eoque venam eiusdem lateris incidendam esse docuerit. Galeno accedit Alexand. Trallian. libro primo, cap. i. 4. sic scribens: *Noli reuellendi causa, aliam quam in laborante parte venam incidere. Verum si parte dextra dolor magis excruciat, eodem statim latere vena ter quaterue, ut dixi, non copiose soluenda est.* His itaque testimoniis iuniorum sententiam satis superque improbatam putamus: neque est ex Graecis auctoribus quispiam, quod sciam, praeter Aetium Amidenum, qui illorum sententiae accedat. Nihil autem mirum hominem Syrum Arabico errore fuisse infectum, maxime

In princi-
pio inflam-
mationum
e directo
mittendus
sanguis.

cum aliquot annis post Galeni tempora vixerit. Sunt enim qui sub Constantino Magno, qui etiam sub Theodosio iuniore, quod verisimilius est, & qui sub Iuliano ipsum vixisse putant. Quod si verum est, contemporaneus Oribasii fuit, qui eius Cæsaris archiatros fuit, quemadmodum epigramma hoc, quod in quarto libro habetur epigrammaton, testatur:

Ἰτὴς μέγας οὗτος Ἰουλιανὸς βασιλεὺς
 ἄξιός ἐστι βίβης δι' οὗ ῥεῖαί εἰσι,
 εἴη γὰρ οἱ μέγιστος σφόν νόν. ἀποθνήσκει
 ἱστῶν ὡς πρὶν ἀνθρα δρεψέμεν.

Id est:

*Magnus Iuliani Medicus qui Cæsaris olim,
 Diuino cultu dignus Oribasius,
 Hinc animo sapiens apud instar carpere flores
 Nouit, quos Medicus priscus ubique tenet.*

Reliquum est ut & ratione sententiam nostram firmemus, quam tamen aduersarii plane nullam, aut omnium frigidissimam habent. Incidendam itaque in internorum viscerum phlegmonibus venam esse quæ e directo est, & minimè eam quæ in distantissimis, aut opposita parte doloris, hac ratione ostendi potest. Quum in omni mendendi ratione medico ad id quod magis vrget respiciendum sit, ut scilicet id ipsum quamprimum fieri potest tollat, debet certe in omnibus internorum viscerum phlegmonibus omnium maxime animum aduertere, ut humorum defluxum, impetumque, dolorem ac tensionem immensam in parte ægra facientes, amoueat: nam nisi id ipsum fecerit, dolor semper auctior fiat necesse est, eoque aucto maior quoque humorum copia confluat oportet. Nam Galeno cap. 95. artis Medice teste, ὁ δὲ πᾶσι πνεύματι τὰ ῥεῖα μέγας, quod est, *Dolor omnis fluxiones irritat.* Et lib. ther. meth. 3. cap. 4. τὸ ὀδυμῶδες ἐρεθίζει τὸ πᾶν ἐν τῷ ῥεῖα, hoc est: *Quod dolet plus ut affluat efficit.* Tum autem humorum defluxum dolorem ac tensionem in parte ægra procreare prohibebit, ubi non solum humorum impetum in contrarium auertet, sed etiam plurimum, & celeriter a phlegmone vacuabit. Id vero faciet, si venam quæ parti laboranti e directo est, quæque cum ea communitatem habet, pertulerit. Ita in pleuritide internam venam quæ e directo est Galenus secandam monet, quod hæc partem eam quæ phlegmone laborat non solum plurimum & celeriter vacuet, verum etiam ab ea reuellat. Verba eius lib. secundo de vict. rat. in morb. acut. comment. 10. hæc sunt: αὐτὸν γὰρ οὗτος τῆς συμπτῶσεως ἀξιομαρτυροῦν, φλέβα γὰρ πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις τὸ μέγιστον ἐστὶν ὅσον τῆς πρὸς τὸν ῥεῖα μελέων διωκτικῶν ἀνταποσφύτις τε καὶ κενώσις τῆς αἵμα. id est: *Cum igitur superiorum partium condolentia signum fecerit, venam in gibbero secare eam oportet, quæ sanguinem laborante parte & magis & velocius tum reuellere, tum vacuare possit.* Et paulo post: γνώσκων τὰς κοῦσας εἶναι ἀνθρώπων αἰσθητικὰς μέρεις τὸ σῶμα τῶν ζώων ὅλον, οὐκ ἂν οὕτως περὶ τῶν, οὐδ' ὅπως εἰς ἀπὸς φλεβός. ἡ μὲν δὲ καὶ περὶ τῶν ἀπὸν μέρων κοῦσας ἀνταποσφύτις τῶν φλεβῶν, ὅτι τῶν ὀξέων τοσημέτων, ὅτι τῶν φλεβῶν ὡς ἀγχοῦν ποῖα, ὅτι πολλὰ μέρη, ὅταν τὴν ῥεῖαν αὐτῶν τὸ πᾶν σφύτις αἵμα φασίται πεινῶμεν. ἡ καὶ τὸ ἴδιον ἐστὶν ἐν τῇ φλεβῇ. quod est: *Vacuantes quidem undecunque fiant ab uniuerso animalium corpore euacuare nosti, quanquam neque celeriter, neque similiter ex omni vena. Nos vero partem eam quæ phlegmone obsidetur, tum celeriter tum quam ceteras partes plus, præsertim in acutis morbis, vacuare contendimus. Quod sane interna gibberi vena facit, multoque magis ubi sanguinis redundantia ad superiora vergere videatur, aut superiores thoracis partes laborant.* Quid multa? in omnibus internis phlegmonibus quoniam multum & celeriter a parte afflicta vacuandum est, ideo vena quæ e directo est, & cum ea parte communitatem habet, inter initia etiam secanda, quod i la non tantum celerrime euacuet, sed & in contrarium defluxus impetum verat. Ceterum cum in phlegmonibus humorum impetus fere nunquam non secundum restitutionem fiat, veluti parte 2. sexti epid. 7. Hippocrat. demonstrat, dicens: κατ' ἐξὶν τὸν ὀξέων ὀδόν, καὶ τὴν ζωντῶν κοῦσας ἀνταποσφύτις, καὶ πολλὰς ἐν τῇ κοῦσας, ὅτι τῶν φλεβῶν ὡς ἀγχοῦν ποῖα, id est: *Secundum restitutionem sunt laterum dolores, precordiorum distentiones, lienis tumores, sanguinis ex naribus eruptiones, & angina rubores.* Conuenit maxime Medico motum hunc naturæ obseruare, ut scilicet sciat, promptius per id latus humores phlegmonem procreantes, & reuelli & vacuari posse. Proinde vena potius quæ e directo loci laborantis est quam opposita incidenda venit. Per illam enim sanguis qui nuper defluxit, neque adhuc vehementer adhæsit affixusue est, remeabit in ea loca a quibus in partem ægram delatus est,

Oribasius
 Iuliani archiatros.

Medico ad
 id quod
 magis vrget
 respiciendum.

Dolor fluxiones irritat.

Quo pacto
 ne fiat dolor prohibebit Medicus.

Humorum
 impetus in
 phlegmonibus
 secundum
 restitutionem
 fit. Medicus
 nature motum
 obseruet.

In inflam-
mationibus
celerrime à
loco affecto
vacuandū.

In appoſita
parte ſecta
vena bonū
tantum ſan-
guinem va-
cua.

Medicus
naturæ mi-
nister.

*Hic nemo
non videt
quædam in
contextu
deesse, ea
scilicet quæ
antiquus
Latinus in-
terpres ha-
bet.

καὶ τὴν
κατ' ἐξ
quid signi-
ficet.

recto fit loci laborantis commendatur, quod celeriter & reuallat & euacuet: da-
 mnatur autem quæ ex opposito fit, quod scilicet vires, bonum euacuans sanguinem,
 citra morbi leuamen, ab eo enim nihil aufert, deiciat. Hunc sane locum eo liben-
 tius hic tractauimus, quod illum Brachelius in sua contra nos disceptatione deprauare
 nititur, cui quandoquidem tum cum responderemus, ad manum non erat ex-
 emplar Græcum, non in vniuersum forte satisfactum est. Ob id hoc loco genuinam
 plane lectionem subscribere placuit, vt inde studiosi quantum à veritate aberret
 Brachelius, agnoscere possint. Ita enim vt hic legitur, esse legendum, antiquus cer-
 te interpres aperte monstrat. Deesse autem aliqua, verba *ἐν τῇ χειρὶ δυνάμει*, & quæ se-
 quuntur, satis indicant: nam nisi aliqua præmiseris, penitus superuacanea & nul-
 lum sensum præ se ferentia manebunt. Minimè igitur rota ea pars, sed reuulsio qui-
 bus in directum adhibetur euidentem vtilitatem, adscititia est, vt putat Brachelius,
 sed tam necessaria vt omitti citra totius contextus deprauationem non queat. De
 duplici enim reuulsione eo loci Galenus loquitur: vna est quæ fit per cucurbitas,
 altera per venæ sectionem: ad quarum primam pulchrè quadrat illatio illa: *Dextra
 igitur nare sanguinem erumpentem, &c.* Hæ quidem rationes in præsentiarum suffi-
 ciant, nam plures aliæ adduci possent, quas consulto prætermittimus, quod hic
 locus à multis eruditis viris ante nos etiam tractatus sit diligentissime. A nullo au-
 tem diligentius quam à Petro Brissoto homine ad miraculum crudito, quem vti-
 nam Deus nobis diutius esse superstitem voluisset. Scripsit post nos ea de re quo-
 que lectu digna Hubertus Barlandus, quæ & ipse consulere poteris, vbi hæc no-
 stra tibi non omni ex parte satisfecerint. Porro hic copias suas producit Montuus,
 atque pulchre suam in rebus medicis iascitiam prodit, dum nescio qualiter detor-
 tis Hippocratis verbis Arabum placita ac recentiorum opinionem roborare niti-
 tur. In primis autem locum Hippoc. in libro de natura humana obtrudit, vbi ita scribit:
*ἐπιπλεῖσιν ὅ γὰρ τοῖς πρὸς αἰσθητικῶν τιμῶν δὲ τῶν χειρῶν ὅτι αὐτὸς ἰδὼν μὲν ἔστιν ὁ δὲ αὐτὸς οὐκ
 ἔστιν. ὅτι ὅτι αὐτὸς ἰδὼν μὲν ἔστιν ὁ δὲ αὐτὸς οὐκ ἔστιν. ὅτι ὅτι αὐτὸς ἰδὼν μὲν ἔστιν ὁ δὲ αὐτὸς οὐκ ἔστιν.*
 hoc est: *Danda opera est, ut quam longissime à locis vbi dolor esse & sanguis cogi didi-
 cit, venarum incisiones fiant, sic enim haud magna repente mutatio fiet, & consuetudinem muta-
 ueris, ne amplius eo loci sanguis coeat.* Hanc etiam sententiam in libro de ossium natura
 iisdem plane verbis repetit, tantum abest vt Hippocratis esse negemus. Mirum
 autem tam delirum esse Montuum, vt mihi nudis iis Hippocratis verbis satisfactum
 esse putet, cum ne syllaba sit quæ mihi aduersetur. Cum enim nobis contentio sit,
 in internorum viscerum phlegmonibus è directo venam secandam esse, quod illic
 non solum reuellendi, verum etiā euacuandi necessitas sit, ipse Hippocratem affert
 longe alia de re loquentem, nempe de præseruatione à doloribus, morbisq; aliis non-
 dum præsentibus, sed futuris adhuc, in quibus certe cum reuellendi tantum inten-
 tio est, nihil prohibet, imo commodissimum est, quam longissime a locis dolori
 obnoxio incisionem fieri. Loqui autem Hippocratem de præseruatione a morbis
 & doloribus, euidenter verba hæc, *sic enim consuetudinem mutaueris, ne amplius eo lo-
 ci sanguis coeat*, demonstrant. Et Galenus in expositione eius sententia, vbi sic scribit:
ἐν τῇ χειρὶ πρὸς αἰσθητικῶν τιμῶν δὲ τῶν χειρῶν ὅτι αὐτὸς ἰδὼν μὲν ἔστιν ὁ δὲ αὐτὸς οὐκ ἔστιν.
 hoc est: *Quod quidam incisiones venarum dixit, quas consuetudo nomine phlebotomias nominamus, re-
 cte interpretes intellexerunt, in hoc enim vniuersi consentiunt. Quoniam autem utrum à
 iam dolentibus membris existimet procul fieri reuulsionem humorum confluentium, an in
 tempore bona valetudinis, non definiuit, in hoc utique ab aliquo accusabitur. Mihi au-
 tem videtur de his, qui adhuc recte valent potius dixisse, quod ita qui hæc scripsit voluerit re-
 dundantes humores, vt ad alias corporis deferantur partes, assuefacere. Proinde cum no-
 bis sermo sit de iis qui iam ægrotant, & minime de illis qui adhuc valent, nihil ad-
 ductæ per Montuum sententiæ nobis obesse possunt. Deniq; in uriana facit Mon-
 tuus, quod solo autoritatum numero me contra Arabum sententiam contendere*

A negatur, cum constet non solum numero auctoritatem, sed & rationibus firmissimis nos esse superiores. Vanum quoque est quod olim homines non sic, ut hodie, in vitio deliquisse existimat, ob idque plethoricis dispositionibus minus tentatos, ut hoc nomine recte venam quæ e directo loci laborantis est, secandam præceperint. Nam, utcumque Hippocratis tempore verum sit, Galeni tamen seculo, qui idem in omnibus libris docet, verum esse non potest: cuius tempore quanta fuerit compotandi consuetudo, nemo non nisi qui libros eius non degustavit, ignorare potest. Nonne in primo ther. meth. libro conqueritur neminem esse qui præ inexplebilibus voluptatum deliciis veritatis studio ac inquisitioni deditus sit? Non exiguum enim numerum esse inquit eorum, qui vesperi omnes ad symposia colliguntur: ubi post-

Galeni seculo compotandi mos inolevit.

B quam vino seimplerunt; non lyra citharaue, aut aliud musicum instrumentum circumfertur, sed nec sermones ulli habentur, quales in symposiis agitari solere veteres prodiderunt, nec aliud honestum quicquam, imo inuicem sibi propinant, & de magnitudine peculorum certant, utpote inter quos optimus censetur, non qui plurimis instrumentis musicis, aut etiam sermone Philosophico uti nouit, sed qui multos eosque maximos calices exsiccauit. *In comment. quoque 28. sexti aphorismorum*, propter immodicum sui seculi ocium, & victum intemperantem eunuchos podagra laborasse fatetur. Quid multa? satis ex Athenæo perspicuum fit Græcos fuisse bibacissimos. Hinc quod veteres eam quæ e directo est in pleuritide & aliis phlegmonibus internis venam secandam docuerint, non ideo factum est, ut Montuus putat, quod eorum seculo homines in victus ratione non deliquerint. qui enim alias Galenus, cuius tamen tempore haud secus quam hodie intemperantissimo victu vti sunt, hoc dogma inculcare sine incitæ nota potuisset? Quare longe alia subest ratio oportet, quam Montuus somniauit, ea scilicet quod Galenus ac alii veteres ad id quod magis vrget respexerint, atque adeo non tantum reuellere, sed & euacuare a loco affecto voluerint. Hic præterire non possum, quin ad Ioannis Agricolæ, amici optimi, in Galenum annotata non nihil respondeam: is enim *lib. 13. cap. 2. ther. method.* etsi manifeste nihil statuat, latenter tamen sese in aduersariorum sententia adhuc esse, vel saltem hærere, ne nostram penitus amplecti queat, indicat: Nec puto ægre feret si eius coniecturas confutauerim, quando quidem nec ego ægretulerim Brachelii contra me

Græci bibacissimi

C iudicium attulisse, cui tamen apologia quadam per me responsum esse non ignorabat. Vellem tamen penitus siluisse Agricolam, ita enim plerisque errandi occasio non fuisset, neque mihi ab illo dissentienti antiam præbuisset. Boni itaque pro candore suo sat scio consulat, quando quidem veritate viro bono nihil esse antiquius compertum habeat, si & nostram de iis argumentis quæ producit sententiam attulerimus, ut scilicet hac lege multis qui eiusmodi argumentis in contrariam duci sententiam potuissent, consulatur. Locus igitur Galen. quem adfert Agricola, quemque contra me in sua disceptatione affert Brachelii, quod manu laborante scarificanda crura sint, & altero crurum male habente, reliquum, nihil nobis aduersatur, ut multis in apologia nostra comprobauimus. Nobis enim de venæ sectione, Galeno de scarificatione sermo existit. Nobis de internorum viscerum inflammationibus contentio est, Galenus autem de externis, manuum nempe & crurum, loquitur. Phlegmone interna magnus adeoque acutus morbus est, externa contra paruus, ac periculo vacans. Aliter autem tractandos esse morbos magnos, aliter exiguos quis est qui nesciat? Hinc cum Medici studium in internis phlegmonibus in hoc vno situm sit, ut celeriter & plurimum non solum a loco afflicto reucllat, sed & vacuet: sit ut ad venam quæ e directo est, secandam, sibi festinandum sit. In externis contra humores in partem ægram decumbentes, ex vna parte in aliam traducere æque ignobilem, reprimentia quoque medicamenta adhibere, ac digerentia quæ suppurationem prohibere possunt, quamuis neque ex suppuratione, etiam si superuenerit, aliquod periculum ratione dignum imminet, licebit. Cum itaque tum quouis modo humorum impetum ad laborantem partem sistere liceat, loco laborante neglecto, satisque sit utcumque ab afflicta particula reuellere, posthabita euacuatione, potest Medicus a distantioribus etiam, & ex opposito, sanguinem detrahare. Neque Manardi ratio, quam adfert Agricola, ad firmandam aduersariorum sententiam satis ponderis ha-

Obiectio Brachelii & Agricolæ diluitur.

Aliter magnos aliter exiguos esse tractandos morbos.

D iudicium attulisse, cui tamen apologia quadam per me responsum esse non ignorabat. Vellem tamen penitus siluisse Agricolam, ita enim plerisque errandi occasio non fuisset, neque mihi ab illo dissentienti antiam præbuisset. Boni itaque pro candore suo sat scio consulat, quando quidem veritate viro bono nihil esse antiquius compertum habeat, si & nostram de iis argumentis quæ producit sententiam attulerimus, ut scilicet hac lege multis qui eiusmodi argumentis in contrariam duci sententiam potuissent, consulatur. Locus igitur Galen. quem adfert Agricola, quemque contra me in sua disceptatione affert Brachelii, quod manu laborante scarificanda crura sint, & altero crurum male habente, reliquum, nihil nobis aduersatur, ut multis in apologia nostra comprobauimus. Nobis enim de venæ sectione, Galeno de scarificatione sermo existit. Nobis de internorum viscerum inflammationibus contentio est, Galenus autem de externis, manuum nempe & crurum, loquitur. Phlegmone interna magnus adeoque acutus morbus est, externa contra paruus, ac periculo vacans. Aliter autem tractandos esse morbos magnos, aliter exiguos quis est qui nesciat? Hinc cum Medici studium in internis phlegmonibus in hoc vno situm sit, ut celeriter & plurimum non solum a loco afflicto reucllat, sed & vacuet: sit ut ad venam quæ e directo est, secandam, sibi festinandum sit. In externis contra humores in partem ægram decumbentes, ex vna parte in aliam traducere æque ignobilem, reprimentia quoque medicamenta adhibere, ac digerentia quæ suppurationem prohibere possunt, quamuis neque ex suppuratione, etiam si superuenerit, aliquod periculum ratione dignum imminet, licebit. Cum itaque tum quouis modo humorum impetum ad laborantem partem sistere liceat, loco laborante neglecto, satisque sit utcumque ab afflicta particula reuellere, posthabita euacuatione, potest Medicus a distantioribus etiam, & ex opposito, sanguinem detrahare. Neque Manardi ratio, quam adfert Agricola, ad firmandam aduersariorum sententiam satis ponderis ha-

bet. Ignoscat autem velim Manardus, ut sibi Galeni manes ignoscere precatur. A
 quamvis hodie in ea sententia perseverare illum non putem, neque enim videretur
 scribit, vilius commentaria in ea materia sibi videre dum hæc scriberet contigit,
 quæ forte hunc aliter & sentire & scribere coegissent. Nemo itaque est qui simulta-
 neam sanguinis vacationem non esse cauendam doceat, ubi æger illam sufferre
 non poterit: rarissimum autem est ut tantum sanguinis auferatur, ut inde virtus de-
 iiciatur, maxime ubi inter initia phlegmonis adhibita fuerit, namque tum multa
 copia sanguinis adhuc non confluit. Sed fac tantum esse sanguinis qui in phlegmo-
 ne continetur, ac extra duci debet, ut non semel citra ægri periculum educi queat,
 an non tum contraria patienti lateri vena reuulsionis potius gratia quam euacuatio-
 nis sanguinis in tumore contenti, secunda? Minime: nam ad id primum quod ma- B
 xime urget respiciendum erit: plus autem urget sanguis qui in partem laborantem
 præter naturam confluit, atque huc iam affixus est, quam in opposito est latere.
 Ob id igitur quam ocysime fieri potest sanguis, qui in laborante est latere, & re-
 uellendus & euacuandus erit per venam, quæ est directo est. Sed dices, immodicam
 hanc euacuationem æger ferre non potest, ideoque cauenda. Fateor quidem. Ergo
 ex opposito latere sanguis est detrahendus? Nullo pacto. Quid igitur faciendum?
 Præstat tum non semel quantum convenit extrahere, sed in vices partiri. Ita enim
 docet Galenus libro de ratione curandi per sanguinis missionem, sic scribens: *ὁ φιλὸς ἰατρὸς*
πολλὰ καὶ ὀλίγα ἀλλὰ καὶ ἀνὰ χρόνον ἀφαιρῶν τὸ σπέρμα, ἀπὸ τῆς ἀπορίας τοῦ σπέρματος, ἀπὸ τῆς δὲ μετὰ τὴν ἡμέραν.
 id est: *Multum iuvat lienem affiictum sanguinis, & sinistra manu detractio. Præstat autem non C*
semel quantum convenit extrahere, sed in duos id partiri dies satius est. Et iterum, eodem libro:
ἀπὸ τῆς ἐν τῷ μὲν ἰατρῷ τῇ ἀπορίας τοῦ σπέρματος, ἀπὸ τῆς ἀπορίας τοῦ σπέρματος, ἀπὸ τῆς δὲ μετὰ τὴν ἡμέραν.
 id est: *Præstat, nisi quid urgeat priori missione minus detrachere iterumque eam repetere, imo si lu-*
bet & tertio. Vbi ergo multa vacatione opus est, verum vires sunt imbecilliores, in his eua-
cuationem partiri expedit. Porro in pleuritide pestilentiali, hoc est, vagante & per-
 niciosa, sanguinem magis per tali, quam alterius venæ sectionem longissime à
 membris principalibus posse distrahi constanter negamus, nam tum bonus san-
 guis potius, quam vitiosus detrahatur, atque adeo vires una euacuantur, inque lo-
 cum optimi sanguinis paulatim descendit, atque surrogatur malignus, imo ad iecur
 in corpore principatum habens, deducitur. Præterea mulieri cui menstrua purga- D
 tio defecit, aut viro cui consueta sanguinis per ani venas cessauerit vacuatio, nihil
 prohibemus, venam in cruribus secare, modo a loco affecto prius, quod influxit
 per venam, quæ est directo est, reuulsum fuerit atque vacuatum. Quod autem
 Galenus in utroque casu, Vere crurum venas secuit, id cautelæ gratia, ut ait Ma-
 nardus, hoc est, ut ab imminenti morbo præservaret hominem, factum esse fate-
 mur. Ita & comitiali & vertiginoso morbo laborantibus venas cruris secare sua-
 det, non quidem, ut a loco afflicto euacuet, sed ut ab illo, reuellat, atque adeo ab
 imminenti morbo tueatur. Et cum hæc sit reuulsio, ut ita dicam, præservatiua,
 licet tum a distantissimis partibus sanguinem detrahere, ut diximus antea, & in no-
 stra apologia ad nauseam usque inculcauimus. Nobis autem non de præservatione E
 ab phlegmonibus internis disceptatio est, sed de illarum iam præsentium curatione.
 Quomodo denique Galenus ex contrario latere in pleuritide venæ sectionem non
 vituperat, cum illam parum, vel non nisi post tempus iuvare dicat? Quis tam sine
 mente esse, ut collatis duobus aureis, si dicat alterum, parum vel nihil valere, non
 meliorem eligat: Pari ratione cum ex brachio, quod est directo est, venæ sectio sem-
 pere evidentem utilitatem afferat, quis est qui illam non præ ea quæ opposito fit, quæ
 parum & raro admodum conducit, eligat? Ceterum cur cruris vena per rectum si-
 ta non sit secanda, ratio nulla alia est, nisi quod non multum & celeriter, quod sum-
 me necessarium in internis phlegmonibus existit, a loco laborante reuellit & eua-
 cuat, quemadmodum paulo ante etiam dictum est. De manu patiente inter ini- F
 tra confutari nis abunde diximus. Non cessat hoc quo Hippocratis ac Galeni eua-
 cuandi intentio: nam dato corpora esse imbecilliora, ut eas vacationes semel fer-
 re non queant, tamen licebit partiri in his, ut antea docuimus, euacuationem, do-
 nec su-

Præstat in-
 terdum e-
 uacuatione
 partiri.

Galenus
 venæ oppo-
 sitæ sectio-
 nem in pleu-
 ritide vitu-
 perat.

A nec superuacuum vniuersum extraxerimus. Porro quomodo non negligenda vtilitas alterius brachii venam sectam sequetur, cum obscuram admodum, & non nisi post temporis interuallum apparentem dicat Galenus? Neq; etiam ea venæ sectione, quæ ab eodem fit latere securior est, quod scilicet timor sit ne vitiosus sanguis de affecto latere in alterum traducatur. Et qui securior esse possit, cum id quod vehementius vrget hoc pacto negligatur, & plus afflictum locum dolore remanente confluat? Sed hæc ad Manardi argumenta confutanda sufficiant, quæ certe hodie a seipso confutata esse nihil dubito. Brachelii obiectiones quas Agricola produxit non opus habent vt refellantur, quando in nostra aduersus hunc apologia id ipsum abunde præstiterimus. Quod si quis paulo exquisitiorem & pleniorẽ huius quæstionis explicationem requirit, is Institutiones nostras, & commentarios quos in librum de curandi ratione per sanguinis missionem Galeni scripsimus, legat. Ibi enim pleraque loca rectius explanauimus.

Parcam seu diminuentem materiam, euacuationem, minorationem hodie barbaro vocabulo nominant, concoctioni humorum, nisi turgeant non esse pratermittendam, contra multorum hodie medicinam exercentium sententiam.

C A P. V.

COMNIBVS in confesso est qui nostra tempestate scribentium Medicorum libros medendi rationem præscribentes legerunt, in locis quamplurimis, imo nunquam non vbi euacuationis mentio fit, de minoratione in principio morborum adhibenda ab illis verba fieri, putantibus hanc in quouis morbo euacuatione indigente commodè adhiberi poss. Quantum autem decepti sint, quisque facile deprehendet, qui veterum, Hippocratis præsertim, scripta paulo diligentius excusserit. Nam is vnus errorē hunc vulgo receptum satis explodit, dum 1. aph. 22. it. scribit: *πικρα φαρμάκων οὐκ αἰσιν πρὸς ἀρχήν, ἀλλὰ μετὰ τὸν χρόνον, καὶ μετὰ τὸν χρόνον οὐκ ἀρχήν.* quod est: *Concocta medicari & mouere, non cruda oportet, neque in principiis, modo non turgent, plurima vero non turgent.* Si igitur humores crudi, qui in aliqua corporis parte firmati sunt, nullo

D penitus pacto mouendi sunt, consequitur, nec eodem parca illa vacatione educi licere, neque enim citra motum eorundem minoratio fieri potest. Manifestissimum itaque minorationi ante concessionem non esse locum. Testis eius rei exfi-

fit Galenus libro quarto, de tuenda valetudine, nunc modum scribens : ἐὰν τις τοῦ ἀνθρώπου ὑπάρχῃ αὐτῷ κρυπταὶ σώματι, τὸ μὲν αἷμα τὸ χρηστὸν ὀλίγον, οἱ δὲ αἷμαί χυμοὶ πᾶμπολλοὶ, μὲν τε φλεβοσμεῖν, μὲν τε κινεῖσθαι, μὲν τε γυμνάζειν, ἀλλὰ μὴδὲ κινεῖν ὅλως, μὴδὲ λούειν, αἰσθῆναι δὲ φλεβοσμεῖσθαι τὸ μὲν χρηστὸν αἵματος, τὸ δὲ μοχθηρὸν ὅσῃ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν μέγιστα φλεβίταις καὶ κατὰ ἅπασας τὴν μεσοστάσιον ἀφροίσταται, αἷος ὅλοο ἐκπαύονται τὸ σώματι, κρύσταλλοις ἢ ἰνδὶ πῦν θύοντα σφόδρα, ἐκ δὲ ὁξέος ἐκτρέχεται καὶ λεπτοψυχρὸς οὖν τὰ μὴ κινεῖν ἀεὶ οὐλίσκει, οἱ δὲ αἷμαί χυμοὶ πᾶσι τὰ ἄλλα ἐκ δυσκινεῖν ἄλλο τὸ πᾶσις ἐκ τῆν ψυχρότητα, αἰσθησικωφροῦσθαι οὖν αἰσθάνεσθαι τὰς γενεὰς ὁδούς, οἱ δὲ ὡς χρὴ τὸ περὶ σπύλον ἐκ ταῖς κρύσταλλοις ἐπὶ τὴν μεσοστάσιον ἀφροίσταται, ἐκ δὲ αἷος ἰσχυρὸν τὴν αἰσθήσιν, ἀπὸ αὐτῶν κρύσταλλοι, καὶ τὸν αἵματος ἐκπαύονται, πῦν τοῦ μὲν οὖν ἐφ' ἵσπερ κρύσταλλοις ἄλλο βραχυπύκνους παρὶντο καὶ μέγιστος ἐπὶ τὸν πῦν φαρμακείας μὴ ὡς.

id est: Si in eodem homine, in laeso corpore sanguis bonus exiguus sit, crudi humores plurimi,

E huic nec sanguis mittendus, nec alui deiectio, aut exercitatio, aut omnino motus, aut balneum adhibendum. Quippe incisa vena bonum sanguinem emittit, malum vero qui in primis maxime venis circa iecur, & quod mesenterium vocant colligitur, in totum attrahit corpus. Deiectio autem in talibus tormina & rosiones creat, animique deliquia, cum eo quod nec notatu quippiam dignum educit, quando crudi omnes succi, pigri, atq. ad motum inepti, propter crassitiam & frigiditatem sint. Quo fit, ut omnes angustas vias obstruant, per quas id, quod medicamentum vacuat, ferri ad alnum debeat, acciditq. hac ratione, ut neq. ipsi educantur, & alii sint impedimento, id quod sane Hippocrates breuissima illa sententia admonuit, dicens: *Concocta medicamento tentanda esse non cruda.* Hinc est quod & libro De iis quos oportet purgare, & qualibus medicamentis purgantibus, & quando, humores crudos ante coctionem

F quibus medicamentis purgantibus, & quando, humiores crudos ante coctionem Crudi hu-
nullo pacto mouendos esse docet iis verbis: τὰς κατ' ἡμέραν περιβαίνουσας αἷμα πρὸ βοήθησιν χρὴ
κινεῖν, ἐπεὶ φαρμάκοις ἐπὶ τοῦ σώματος, τιμωκαῖται γὰρ καὶ τὴν φύσιν ἐπιβόησαι βοηθεῖσαν τῇ κινήσει. Φαίνεται γὰρ αὐτῇ εἰ ταί τε πέψαι, δι-
κεῖν οὐδ' αὖτε χυμοὺς ἀποθιμῆναι πρὸ τοῦ σώματος ὅ αὐτῇ κατὰ τὴν φύσιν κίνησις γίνεται; hoc est: *Qui in parte certa corporis*
fixi sunt succi, hoc antea quā concoquantur, nullo alio auxilio mouere, neq. medicamentis tentari o-
poret: tunc enim naturam ipsam habemus euacuationi adminiculantem: ut detur siquidem

Et ipsa post coctiones humores secernere, & superuacua expellere, quo in tempore sunt indicationes. His accedit, quod medicamentum materiam diminuens imbecille admodum sit, atque adeo crudis humoribus ac copiosis existentibus præualere non possit, alias enim a debiliore in fortius fieret actio, quod naturæ impossibile est, ideoque illos tantum mouet, nec educit, ita ut necessario magna totius corporis turbatio sequatur. Proinde consultissimum est iuxta Hippocratis ac Galeni consilium, non solum non diminuere crudos adhuc humores existentes, sed ne mouere quidem. Quod si tamen turgeant humores, licet illos quidem circa principia euacuare, nondum etiam concoctis: ἡγρῶν δὲ χυμοὶ ἀγρῶνται, teste Galeno libro iam citato, τῶν ἐν κινήσῃ σφοδρῶτερ ὁμοῖοι, καὶ μακρῶτερον ἀπὸ μέρους εἰς μέρος, κατὰ τὴν δόξαν τῆς φύσεως, ὅτι ἡ φύσις ἀλλοτρίους καὶ μακρῶτερον ὁμοῖοι, quod est: *Turgere autem humores dicuntur, dum motu uementiore correpti, ab una parte in aliam transfluunt, infestantque ac dolore afficiunt statim ad morbi initia hominem, turbantque ac quiescere non permittunt.* Verbum autem *turget*, Hippocrates ab animalibus quæ ad coitum properant, transfulit, quum naturali concupiscentia moueantur ad feminis genitalis excretionem. Quando igitur in toto corpore similis huic fuerit naturæ impetus ad excretionem superfluitatum, vel si non in toto corpore, saltem in partibus principalioribus, tale quid consuevit Hippocrates per verbum, *turgere*, significare. Tales itaque humores statim euacuare, quum mouentur, transfluuntque, non expectata aliqua concoctione, expedit. Proinde ut in longis morbis, Galeno teste, comment. 24. primi aphorism. semper oportet expectare coctionem, ita in acutis, cum *turgent*, etiam ab initio possumus uti medicamentis purgantibus. Hinc Hippocrates ait: ἐν τῷσι δὲ ἐστὶ πᾶσι δολοῖς, καὶ ἐν δόξῃσι, τῇσι φαρμακίῃσι χρῆσθαι, id est: *In acutis morbis raro, & in principiis, medicinis purgantibus uti oportet.* Ob id quum humorum de vna parte in aliam transfluxus non nisi raro accidat, plerumque autem hi per vniuersum morbi tempus vno tantisper loco quoad concocti tandem soluantur resideant, præstat illos non tantum non minuere, sed ne mouere quidem donec coquantur. Sed oblectatur iis quæ diximus hoc loco Montuus, atque vacationem quæ morbi materiam minuit, non turgentibus etiam humoribus ante concoctionem ex Hippocratis & Galeni sententia adhiberi posse probare nititur. Primum autem ad id euincendum, *aphorismum 29. secunda sectionis* producit, vbi Hippocrates ita inquit: Quum morbi inchoant, si quid mouendum videtur, moue. Qua sane sententia quid ostendere velit Montuus non video, neque enim quicquam nostræ aduersatur sententiæ: fatemur enim aperte circa morborum initia mouendum esse, si quid mouendum videtur. Tum autem mouere licet ante concoctionem, quum morbi inchoant, quumque humores *turgent*. Proinde iis verbis, Si quid mouendum videtur, dilucidè Hippocrates insinuat, non in quouis morbo circa principia esse euacuandum, sed tunc quando humores instabiles sunt, & de vna parte in aliam transfluunt. Et nisi hanc particulam adiecisset, & simpliciter pronuntiasset, morbis inchoantibus mouendos esse humores, sibi ipsi pugnantia scripsisset, quandoquidem paulo ante cruda non esse mouenda dixerat. Galenum deinde affert, qui in iam citati aphorismi enarratione ita inter cetera scribit: Circa initia illorum morborum, in quibus speratur ægrotum conualesciturum, tentandum maiora afferre remedia: de quibus Hippocrates dixit: Si quid videtur mouendum, moue. Sunt autem hæc maxime, venesectio, nonnunquam vero & purgatio, quorum nihil oportet morbo iam consistente adhibere: ut enim in libro de crisi bus manifestauimus, coctiones tunc maxime fiunt. Ut igitur hæc citius eueniant, melius est circa principia euacuare, quo minorem iam factam materiam, facilius possit natura concoquere. Quibus ut quæ Galeni verbis probare conatur, licere ante concoctionem materiam morbi minorem facere, quali nos simpliciter negaremus nunquam ante coctionem diminuente materiam euacuatione uti licere, quum tamen fateamur interdum licere, quando scilicet morbus valde acutus fuerit, ac humores *turgent*. Nam ut 4. aphorism. 10. ait Hippocrates, φαρμακίῃσι ἐν τῇσι λίαν ὀξείῃσι, καὶ ἐν γὰρ, ἀνὴρ μετὰ χρῆσθαι ὅδ' ἐν τοῖσι θινοῖσι, καὶ ὅδ' quod est: *Medicari in valde acutis si materia turget, eadem die oportet. Tardare enim in talibus malum est.* Statim itaque in his facienda euacuatio, antequam videlicet robur corporis dissoluatur, vel febris caliditas augeatur, aut ad aliquod membrum principale, hi qui per corpus vagantur humores.

၁၄၃၁ ခု၊ ခုနစ်၊

Turgere
quid.

Montui ar-
gumenta
refelluntur.

Hippocra-
tis locus ex-
penditur.

F

- A** humores, decumbant. Quid multa? Galenum non de iis morbis, in quibus crudi admodum humores, inque loco fixi sunt, locutum esse, inde colligi potest, quod venæ sectionis & purgationis meminit, quorum remediorum neutrum, ut supra etiam ex Galeni in libro de tuenda valetudine sententia diximus, morbis prædictis adhiberi potest. Locutus itaque est de acutis morbis, quibus venæ sectio peculiare est remedium, ut quarto de victus ratione in morbis acutis 16. testatur Hippocrates, dicens: *πὶ δὲ ἐξ ἡμῶν φλεβοτομία, καὶ ἰχθυὸς φαίνεται τὸ νόσημα, καὶ οἱ ἴσχυες ἀκμῶναι τῇ ἡλικίᾳ, καὶ ἰσχυρὰ παρὰ αὐτοῖσι.* id est: *In acutis affectibus sanguinem detrahe: si vehemens videatur morbus, & agrotus ætate floreat, roburq; illi aderit.* De acutis autem locutum esse morbis inde etiam manifestum fit; quod ait, Nonnunquam vero & purgatio: neq; enim semper purgatio accommodum
- B** in morbis acutis remedium est, ut Hippocrates etiam in aphorismis indicat, dicens: *In acutis affectibus raro, & in principiis medicinis purgantibus uti oportet, & hoc cum præmeditatione faciendum.* Cum igitur fateamur, diminuente materiam vacuatione in acutis morbis, in quibus humores turgent, uti posse Medicum, nihil plane iam dicta Galeni sententia nobis aduersari potest. Vacuationem autem diminuentem materiam eam intelligas, quæ tantam humorum molem educere potest, ut humores posthactenus gurgere desinant. Quod si enim talis fuerit, quæ parum, aut nihil plane educat, quum maiorem in humoribus turbationem excitet, consultius erit penitus illam negligere, quam magno ægri detrimento adhibere. Reliqua, quæ producit, nulla confutatione egent, nihil enim nobis pugnant. Optandum erat igitur validiora attulisse Montuuum argumenta, quibus suam robore opinionem ac stabilem facere putauit. Plura de hoc paradoxo reperient studiosi in commentariis nostris super Hippocratis aphorismos sectione prima, commentar. vigesimo secundo.

Non esse ætate etiam consistentes tam sanos quam ægros, ut multi hodie Medicorum facere consueverunt, immodicis medicamentis purgatoriis ex carnificandos, multo minus infantes.

CAP. VI.

- N**EMO est qui nesciat, Medicorum hodie quorundam tantam esse inscitiam, ut in quouis morbo deiectoria medicamenta commode & citra noxam exhiberi possent existiment. Quinetiam eousque illorum processit temeritas, ut si quispiam bona adhuc etiam valetudine utens, vel leuissime saltem in victu deliquerit, mox huic deuorandum pharmacum adhibeant, Neq; quouis tempore aliud in ore habent illi, carnifices verius quam Medici, nisi hoc vnum, purgatione opus erit, quasi vnico hoc remedio quibuslibet morbis succurri queat, non animaduertentes quantæ sit noxa, quæ ex crebra medicamenti sumptione subsequi solet. Quare diligenter admodum cauendum ne integra adhuc valetudine præditis temere pharmaca exhibeamus. Hippocrate enim 2. aphor. 36. teste, *οἱ σὺν τῇ σωματικῇ ἐν τῇ φαρμακείᾳ ἰσχυροὶ ὄντες ἐκλύονται πρῶτον.* id est: *Qui salubritatem corporis habent, per medicamenta purgati cito exsoluuntur.* Et mox sequenti: *οἱ δὲ τῇ σωματικῇ ἐν τῇ φαρμακείᾳ ἀδύνατοι.* quod est: *Qui bene se habent corpore, difficulter ferunt medicationes.* Quum enim medicamentum purgans, proprium quidem attrahere humorē appetat, vel flauam scilicet bilem, vel atrā, aut pituitam, aut aquosam superfluitatem, illis vero non presentibus, sanguinē colliquet, ac carnes, ut ex ipsis proprium attrahat humorem necesse est. Sed obiciet hic sciolus quispiam: dicens: Fateor quidem bene habentes non facile medicamentis esse purgandos, verum cum indies in corpore multa superuacaneorū fiat generatio, expedire crebra alui subductione illa euacuare, ne si plus æquo redundauerint morbum procreent. Cui ita responsum volo: Non opus esse ob eam quæ quotidie in corpore accretatur superfluitatem crebra purgatione, sed sufficit ut singulis diebus collectam, exercitiis expurgemus, interdum etiam per balneas, aliosq; euacuationis modos educamus. Testis est grauissimus auctor Galenus, qui 3. aphor. 15. in hunc modum scribit: *ὅτι μὴ τοῖς αὐτοῖς ἀλλὰ φορεῖται τὸ αἷμα τὸ ὑγρὸν. κατὰ δὲ τὸ ἰσχυρὸν ἔστιν ὁ σωματικὸς ἀπὸ τοῦ σώματος ὁρμήσας, ὅστις αὐτὸν καὶ ἰσχυρὸν ἡμῶν ἀπὸ τοῦ σώματος αὐτοῦ αὐτοῖς τοῖς γυναικείοις. οὐ μὲν γὰρ καὶ ἡ ἀλγὴ τῶν βαλανείων κίνωσι, καὶ μὴ οὐ σκεδόν τι τῶν καὶ τὸ δερμα. καὶ δὲ τὸ τῷ βλεννίᾳ κατὰ τὸν αὐτὸν τῇ τε σκεδόν καὶ τοῖς τριαντίοις ὁρμήσας, ὅτι αὐτοῖς αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ σώματος αὐτοῦ αὐτοῖς τῶν βαλανείων, ὅτι μὴ ἀπὸ τοῦ σώματος αὐτοῦ αὐτοῖς τῶν αὐτῶν ἰσχυρῶν, καὶ τῶν αὐτῶν ἰσχυρῶν, καὶ τῶν αὐτῶν ἰσχυρῶν, καὶ τῶν αὐτῶν ἰσχυρῶν.*

In siccitatibus superuacanea humiditates discutuntur. Per imbres autem intra corpus collectae putrescunt, nisi quis singulis diebus congregatas exercitiis expuret. Qua enim fit per balneas euacuatio modica est, & solum ea ferme quae circa cutem sunt euacuat. Quae autem in profundo per carnem, & partes solidiores dispersa sunt superfuitates, haud sufficienter per balnea euacuantur. Neque tamen ea quae fit per purgantia medicamenta superuacaneorum vacuatio, idonea est, nam valde indigentibus, & ex longis interuallis utilis est. Eorum vero quae quotidie generantur in corpore superuacaneorum euacuatio, minor est quam ut exigat purgatis medicamento operationem. Quod si vero quispiam voluerit bis mense, aut semel saltem ea uti, veritus ne superuacaneorum multitudo aggregetur, praeter id quod nocebit, corpora etiam in malam consuetudinem trahit. Quid (oro) his verbis apertius est? ita enim hodie medicantium peruersi medendi rationem damnant, ut nemo sit qui illos non toto caelo aberrare videat. Neque enim, ut solent, quibusuis temere, & quocunque tempore purgantia medicamenta esse exhibenda moment, sed indigentibus tantum, & ex longis interuallis. Qua ergo ratione se habebunt qui leuculam ob causam, quam vel victus recta ratione vincere queas, mox deuorandum medicamentum propinant? Quo denique pacto ab errore se vindicabunt, qui non semel aut bis, quod tamen Galenus reprehendit, sed quauis hebdomada catapotia deglutienti iis, qui integra adhuc fruuntur valetudine, exhibent? Multo itaque consultius erit ut hoc potius contentur, quo vitiosorum humorum, superuacaneorumque multorum generationem recta victus ratione aliisque modis prohibeant, quam ut semper tot immodicis purgationibus sanos iuxta ac ægros excrutient. Id quod Galenus etiam probat lib. 2. de natur. facultat. capit. 8. ubi contra Erasistratum disputans ita scribit: Ταῦτ' οὐκ ἔχον ἀγνοεῖν τὸν Εὐρασίτητον, ὅτι καὶ κατὰ φύσιν ποτὲ τοῖς σώμασι καθάρσεις συνίσταται, αὐτοῖς οὐδὲ πρὸς τὴν γαστέρα τῶν χυμῶν, ὑπερὺν οὐδὲν ἔχει εἰπεῖν, ἀλλ' οὐδὲ μείζων τῇ μετρίᾳ πηλαίων, οὕτω δὲ διαφύγειν, σκοπεῖν δὲ, ὡς οὐδὲ χρῆσιμον ὄλως ἐστὶν αὐτῷ τοιαύτων ἐπισημίας· ὁ γὰρ Διὸς, ὅπως μὲν τὴν στήθεα κατὰ τὴν γαστέρα πίπτεται χρησιμὸν ἐπιστάς, πῶς δὲ καὶ τῶν φλεβῶν ἢ τῶν ζώων καθάρσει, καὶ τῆς κενώσεως περὶ φρενας αὐτῆς μέγας, ἀπειλητικὸν δὲ τῆς υἱότητος, αὐτοῖς οὐκ ἀμεγαλόν ὑπαρξαι μακροῦ καλόν τε, ὥς δὲ δόξης Ἀναξάρχου πελάστα, & περιγεγραμμένον ἔχει κατανοοῦντες. Id est: Hæc minime ignorasset Erasistratus, si vel per somnium aliquando cum peripateticis fuisset versatus, æque ut ea neque quæ ad generationem succorum pertinent, De quibus quum quod diceret nihil haberet, ne quod mediocriter quidem probabilis esset, fallere se putat, dum inutilem prorsus esse id genus contemplationem prætendit. Sed nunquid per Iouem quæso quemadmodum cibi concoquantur in ventriculo scisse est utile, quemadmodum autem in venis bilis fiat est superuacuum, ac solius vacationis eius habenda est ratio, generationis eius nulla cura? ceu non longe satius sit prohibere ab initio, ne multa gignatur, quam sollicitos esse & occupatos de vacuanda. Proinde oportet & nostræ ætatis Medicos, si non Erasistratii magis quam Galeniani esse gaudent, de non generandis præuis humoribus potius sollicitos esse, quam de crebra illorum per medicamenta purgantia vacatione, quibus nonnunquam ægotantium misere perdunt. Hunc accedit, quod cum haud medica morborum pars ex indigentia seu inanitione oriatur, non decet certe quouis momento ad exhibenda medicamenta purgantia tam proclines esse Medicos, quando hos ipsos repletionē potius quam vacatione curare conueniat, id quod Hippocrates quoque faciendum esse monet, dum 2. aphorism. 22. ita inquit: ὃς ὀγκοῖ καὶ κοιλίᾳ καὶ πόσει καὶ διὰ τὴν ἀνάγκην καὶ τὴν ἀποκαθάρσιν: hoc est: Quicumque morbi ex saturitate fiunt, curat euacuatio, & quicumque ex vacatione, refectio, & aliorum contrarietas. Denique cum Hippocrate auctore in libro de flatibus: ἡ νόσος ἐστὶν ἀπόδειξις καὶ ἀφαιρεσις, quod est: medicina sit appositio & detractio, diligenter curandum ut Medicus iis apponat quæ deficiunt, auferat autem ab illis tantummodo quæ redundant, neque temere vni tantum, ut ferme hodie fit, intentus sit. Sed quid dicam? scio esse hodie, qui nedum immodica exhibendo medicamenta delinquent, verum in eam etiam sæuitiam prorumpunt, ut ne infantes quidem ab hac carnificina immunēs esse permittant. Scythæ profecto aut carnifices veriùs quam Medici, quod contra omnium tum veterum, tum recentiore decretum in adhibendis medicamentis purgatoriis ætatem non animaduertunt. Neque enim frustra est quod

Neq; bis
neq; semel
mense pur-
gatione vi-
liscr.

Errant qui
sapius cata-
potia deglu-
tienda præ-
bent.

Hand mo-
dica mor-
borum pars
ex indigen-
tia.

Aphorism. 16. magnus ille Hippocrates in purgationibus admonet: *ἐπιβάλλειν δὲ ἐν χρόνῳ, καὶ ὥρῳ καὶ ἡλικίῃ, καὶ νόσῳ, ἐν ᾗ σὺ δὲ ἔμεις.* hoc est, *inspicere oportere & regionem, & tempus, & aetatem, & morbos, in quibus conueniant aut non.* Nullo autem pacto esse purgandos pueros, multo minus infantes, in hunc modum scribens *lib. 9. cap. 16. ther. meth.* Galenus ostendit: *ἡ πᾶσι παιδῶν οὐσία ῥᾶπε ἀφροδῖται καὶ σκεδάσσεται, διὸ πᾶσιν ἰσὺ ἐν ὑγροτάτῃ, ψυχροτάτῃ ἢ οὐδὲ μίας. ὥς πὺν χρεῖται κοινὸν βελήματα, ἃ ἐν αὐτῇ χροσὶ τὸ κοινὸν ἀπομυφῶ.* quod est: *Puerorum substantia omnium facillime digeritur ac dissipatur, propterea quod est omnium humidissima, nulla vero frigidior, ita ut vacuante remedio aut praesidio non opus habeat, cum ex se ipsa obtineat, unde naturaliter vacuetur.* Si itaque nullo plane vacuante auxilio pueri opus habent, igitur nec purgatione, quæ post venæsectionem potissima existit. Atqui dicit quispiam, quid itaque faciendum si infanti aut puero alius nimium adstricta fuerit? nam citra periculum nisi subuenias, alio hoc pacto adstricta, durare non poterunt. Curandum ubi lactentes adhuc fuerint, ut nutrix aut animal cuius lacte infantes vescuntur aliquid quod subducendi aluum vim habeat, assumat. Ita enim Galenus *libro tertio de alimen. facult.* faciendum suadet, dum ita inquit: *ἀλλὰ καὶ αἶγας ἢ πρὸς ἄλλου ζῴου μητρὶς σκαμμασίαν, ἢ πρὸς πολλόν ἐν τοῖς κίρις ἀποτρίχεται πρὸς γάλα, ἢ ὅσῳ αὐτῶν πένει, ἢ γὰρ ἢ αὐτῶν.* hoc est: *Si capra aut alterius cuiuspiam animalis scammoniam aut tithymallum depasti lac cibi loco quis sumat, omnino alius illi profluxura est.* Idipsum vero ab Hippocrate didicit, qui *part. 6. epi. 34.* in eum modum scribit: *γυνή, αἰχελανέραν ἢ οὐκὸν ἄρχειν βελήματα, ἃ παιδῶσι κρήσεις.* quod est: *Mulier, capra cucumerum sylvestrem comedentes, pueris purgatio.* Quod si vero ablactati fuerint, glande supposita alius citari potest. aut mel, vel resina terebinthina cibo adiicitur, id quod Paul. *Ægineta lib. 1. capit. 6.* iis verbis faciendum docet: Porro si pueri alius adstricta fuerit, mel cibo adiectum dabis: quod si ne sic quidem deficit, resinam terebinthinam, quæ ciceris quantitatem æquat, adicies. In tantum certe veteres Medici nonnullos nostro seculo hoc titulo sese vendentes superarunt, ut si illos cum hispis conferre volueris, meros latrones præ illis dixeris. Nihil autem mirum tales hodie oberrare passim Medicos, cum, ut Plin. *lib. 29. cap. 1.* inquit, nulla lex sit quæ inscitiam capitalem Medicorum puniat, nullum exemplum vindictæ. Discunt periculis nostris, & experimenta per mortes agunt, medicoque tantum hominem occidisse summa impunitas est, quando hercule in hac artium sola eueniat, ut cuicumque Medicum se proficienti statim credatur. Verum dignum admodum est ut vulgo, quando non nisi laruatos illos exoptet Medicos, tales quales desiderat contingant, ut scilicet similes habeant labra lactucas. Minime vero manifestandum esset sic desipere vulgus, nisi simul maxima principum & magnatum pars etiam eo infantiæ deuenisset, ut non nisi indoctissimos eosque infantissimos, adde quoque moriones ipsissimos ad curam valetudinis suæ adsciscerent. Neque admiratione dignum puto, si indoctis hodie plerunque principibus, & nulli rei penitus nisi compositionibus ac venationibus deditis, indocti contingant Medici, *ἡμῶν γὰρ, Aristotele lib. 8. moralium* teste *ἴσως ἴσμεν.* id est, *Simile enim appetit simile.* Et ut omnis cruditionis Oceanus Homer. quoque Odyss. inquit: *αἰεὶ τὸν ὀργιστὴν ἄγει ὡς τὸν ὀργιστὴν,* hoc est: *Semper Deus similem ducit ad similem.* Proinde quum docti in aulis principum plerunque ludibrio habeantur, neque enim adulari nouerunt, quæ una ars vere aulicos facit, fit ut hi qui garriendo, iactando, pollicendo, nugando, mentiando, adulandoque plurimum possint, omnium sint gratissimi. Hinc merito stultis principibus multo stultiores obtingunt Medici, qui probe illos non solum expilatos, sed & excarnificatos *αἰδὲ ἀποκτείνου.*

Pueri non purgandi.

Infantium alius ut subducenda.

Medicorum nostri seculi latrocinium.

Vere aulici qui.

Catapotia vehementius trahentia, pilulas nostri vocant, non nisi ieiuno, & ei qui probe concoxit esse exhibenda, contra omnium ferme hac tempestate medicantium sententiam.

C A P. VII.

NON RV M omnibus esse puto, qui tenuiter saltem nostræ ætatis Medicorum libros degustarunt, in vniuersum omnes catapotia ea, quæ ut ex capite vehementius trahant exhibentur, non nisi vnam alteramue post coenam horam, contra omnium veterum sententiam ac rationem quoque ipsam deuorandam esse docere. Non enim nisi ieiuno, aut ei qui probe iā concoxit, esse exhibenda medicamenta purgativa, in quorum numero & catapotia sunt vehementia, in primis monstrat Hip. *2. de vict. ratione in morb.*

Medicamenta purgantia ieiunis exhibenda.

acut. 13. ita scribens: *ἵνα καὶ λόγον ἔσται μισθὸν τῆς κατὰ φύσιν μὴ δίδου ῥοφῆν*, id est: *Quoniam rationi consentaneum est in media purgatione sorbitionem dandam non esse*. Cur autem apparente iam purgationis initio a sorbitione abstinendum esse veruerit, nulla alia ratio est, vt Galenus in comment. indicat, nisi quod alias purgantis medicamenti operatio exoluatur. Si itaque timor est ne iam coepta etiam purgatione si quid sorbitionis sumtum sit, operatio purgantis medicamenti imbecillior reddatur, cur non multo magis idem inter initia timendum, vbi longe facilius est medicamenti vim obtundere? Quapropter ieiuno certe danda medicamenta purgantia, ne scilicet multitudine ciborum in stomacho operatio medicamentorum impediatur, id quod facile fit, quum natura iam concoquendis cibis occupata sit. Testis est Paulus Aegineta, qui *lib. 7. cap. 6.* in hunc modum scribit: Summatim in omni purgatione efficaci, medicamentum homini quem certa prius victus ratione alueris, ieiuno, & ei qui probe concoxerit trades, ac somno quoad in totum purgatus fuerit, arcebis, motu mediocri si fieri potest adhibito, cibo omni & potu abstinere vsque ad consummatum purgationem compelles. Quinetiam Avicenna ipse, quem tamen vnum se vt ducem optimum sequi putant, haud aliter quam Paulus ac alii veteres, *Fen. 4. primi Canon. cap. 5.* prohibet, ne quid post medicamenti purgatorii sumtionem vel cibi vel potus sumatur, ne scilicet facultas medicamenti iis ipsis obruatur, atque adeo imbecillior fiat. Verba eius hæc sunt: Qui medicamentum sumsit, non debet comedere neque bibere donec pharmacum suum perficiet officium. Proinde quemadmodum diligenter cauendum ne medicamenti operatio per subsequentes cibos aut potus imbecillior reddatur, ita summe cauendum, quo neque ciborum concoctio per subsequencia medicamenta purgantia interturbetur. Hinc Paulus *libro iam citato capit. 4.* Aloen etiam medicamentum ceteris minus nocens, post cibum non esse exhibendam docet. Sed præstat verba subscribere: Bilem, inquit, flavam optime educit aloes denarius cum melicrato matutino tempore exhibita: nam qui vespere eam propinant, vel post cibum, lædunt, quoniam alimentum distrahit corrumpitque. Si ergo Aloe, quæ, vt eodem loco Paulus, & alibi Diosc. & Galen. scribunt, inter omnia purgantia medicamenta sola amica & utilis est stomacho, ea ratione ne nutrimentum distrahatur post cibum exhiberi non debet, multo minus catapotia illa fortia, quæ non Aloen tantum, verum etiam alia multo hac vehementiora in se continent medicamenta, exhibere licebit. Discedant itaque a peruersa illa consuetudine Medici, qua nondum perfecta concoctione medicamenta purgantia propinare didicerunt, nam hoc pacto concoctio non solum impeditur, sed & nutrimentum ita distrahitur, vt conuenienter membra nutriri non queant, & potius tempore matutino vbi perfecta penitus concoctio existit exhibeant, ea enim lege illorum operatio probe perficietur, & quicquid noxium est omnium facillime attrahetur. Sed tanta est illorum hominum pertinacia, vt vel citius mori eligant, quam ab eo cui assueverunt vel latum digitum recedere velint. Plura vero ad institutum facientia *lib. 2. Institutionum nostrarum sect. 5. cap. 18. & lib. 3. de compo. medicamentorum cap. 9.* diximus, vbi etiam quæ catapotia, & in quo effectû sumere ante vel post epulas liceat indicauimus.

Præter omnem rationem nostrates solo decocto pisorum post epota medicamenta purgantia abluendi abstergendine gratia uti.

C A P. VIII.

Quemadmodum non probo penitus post epota medicamenta purgantia abluendi vi præditis non uti, ita nec laudo si post quodcunque medicamentum purgatorium adhibeantur. Perinde enim vt non conuenit, quemadmodum auctor est Hippocrat. semper purgante sumto medicamento a sorbitione cremoris ptisanæ abstinere, sed illum interdum sorbuisse salutare est, ita & abluere non nunquam confert, non nunquam vero minime. Quando autem ptisanæ cremorem utile sit sorbere post epotum medicamentum, & quando minus, pulchre Galen. super Hippocrat. *de rat. vict. in morb. acut. lib. 2. comment. 12.* in hunc modum scribens indicat: *καὶ ἄλλω μὲν καὶ τῶν αἰσθητῶν τῆς γαστρὸς, ὅ ἐστι τὸ σφύζον ἐνομήζον, ὡς ἀφ' αὐτοῦ ἐβλαβὲς ἐν ταῖς τῶν κατωτέρων φαρμακικῶν ποτίσεων μεγάλῃ δι' ὅταν ἐπὶ τῶν πυρετῶν τῶν διδωτῶν θεοῦται αὐτὸ μὲν γὰρ καὶ καθαρὸν φάρμακον, ὡς ἐν ὀλίγῳ διείσῃ τὸν πυρετὸν τῆς κατὰ φύσιν ἀφικνέται, καὶ δὲ τὸ διόθεν ὁ σφύζων ὅσον τι ὑπερβολὴν τῆς γαστρὸς, οὐ μόνον τῆς ποιότητος ἀλλὰ καὶ τῆς οὐσίας αἰσθητῶν ἐστὶν ὁ δόλος*

A τῇ διόδῳ μετὰ λαμβάνειν μετὰ λῶς βλάπτεται. χρῆσιμῶς, οὐκ ὁ χυλὸς τῆς πικρῆς ἐπιρροφῆς, ὡς αὐτὸς ἀπορροφῶν ἔχει καὶ παύσαι κατὰ τὴν ἀπορροφῆν ἐν τῇ διόδῳ διεικνύει, ἐπιρροφῶν ἢ καὶ ὑποαδαῖσαι τὴν ἐν τῇ διόδῳ τοῖς μύελοις πύκνιναν φαρμάκον. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὐκ ἐπὶ τῇ ἑκτακτικῇ πύκνιναν πικρῆς ἐπιρροφῆς. ἀλλὰ ἀρκύτης δὲ γίνεσθαι τῆς κατὰ τὴν ἀπορροφῆν πύκνιναν. διόθεν τῆς πικρῆς ἐπιρροφῆς, ἐκλυθῆναι τὴν ἐν τῇ διόδῳ φαρμάκον. quod est: *Maxime quidem ori ventris, quod & stomachum vocant, ut in ipsis purgantium medicamentorum potibus illisum maneat, providere oportet, praesertim ubi febricitantibus tale quiddam propinatur. Namque purgans medicamentum ipsum tanquam exiguum, ad ventris fundum pervenit, dumque transit, stomachus & quaecunque sublimior pars non qualitatem medicamenti purgantis modo, verum & substantia qua in transitu adheret aliquid assumens, vehementer laditur. Pisanum igitur cremor absorptus commoditate affert nempe, & detergere, & deorsum trahere quod via ad haeret, & qualitatem medicamenti quod his partibus adheret, tum temperare, tum permutare potest. Ob eas igitur causas a purgantis medicamenti potu, pisanam superforberi praecipit. Sed ubi purgatio coepit, ab ea esse abstinendum praecipit, purgantis medicamenti operationem exsolui veritus. Quae sane verba repetit in libro De iis quos purgare oporteat, quibusque medicamentis, & quo tempore. Discenda vero inde erit vera abluendi ratio, ut scilicet non quovis tempore, nec post quodlibet medicamentum epotum abluamus, sed tum solum quando nondum purgatio coepit, & non nisi ubi timor est, ne illisum os ventriculi, quemadmodum in febribus fieri contingit, permaneat. Errant itaque nostrae tempestatis Medici, qui non nisi ubi iam coeperit purgatio, ac venter bis aut ter deiecerit, abluunt, etiam si nulla stomachi mordicatio apparuerit, cum potius ante purgationis initium id faciendum esset, quod alias medicamenti purgantis operatio obtundatur. At qui non tantum hac ratione delinquant, verum etiam in hoc quod solo decocto pisorum ad abluendum utuntur, cum omnium veterum ac probatissimorum scriptorum testimoniis constet illa exigua duntaxat abstergerendi vi praedita esse: id quod satis aperte monstrat Gal. lib. I. de alimentorum facult. de pis. in hunc modum scribens: πύκνιναν ἢ κατὰ τὴν διόδῳ εἰσὶν ἔχοντες καὶ μύελους, ἐκλυθῆναι τὴν κατὰ τοὺς μύελους πύκνιναν, οὐ δύναται τὴν πύκνιναν ἀπορροφῆσαι, ὅτι τὰ φαρμάκων ὁμοίως οὐκ εἰσὶν οἷς καὶ μύελους, ὅτι τὰ τῇ πύκνινῃ δύναται οὐκ ἔχοντες, καὶ ἀλλὰ τὴν πύκνιναν ἀπορροφῶν καὶ κατὰ τὴν διόδῳ εἰσὶν. hoc est: *Simile quidem tota substantia pisa cum fabis obtineat, nec alio quam ille modo comeduntur. Duo tantum sunt in quibus evariant, non enim similiter ac faba inflant, nec abstergunt, ideoque segnius quam ille per aluum secedunt. Verum hoc loco nobis minime tacendum erit, quod Galenus per haec verba: τὴν πύκνιναν δύναται οὐκ ἔχοντες. id est: abstergerendi facultatem non habent, pis. haud omnino, ut alicui apparet, omnem abstergerendi facultatem adimit, sed minus duntaxat ea quam fabas abstergere docet. Non enim simpliciter pisa haud abstergere dixit: sed collatione cum pis. facta, illa non similiter ut fabas detergere dixit. Hanc autem esse legitimam iam dictorum verborum Galeni sententiam manifestissimum fit ex iis, quae ille in libello de cibis boni & mali succi scribit, inquiens: τὸ πύκνιναν καὶ μύελους ἔχοντες, τὸ δὲ πύκνιναν οὐκ ἔχοντες τὴν καὶ μύελους. Hoc est: *Pisum flatulentum non est, sed faba aequalem extergendi vim non habet. Sed plura ea de re, in historia Pisi tom. 3. nostro de stirp. commentariorum diximus. Quod si itaque quis abluentibus uti commodum voluerit, potius id ipsum decocto cicerum agat: ὑπάρχει γὰρ ἐν πύκνινῃ δύναται αὐτοῖς. ut libro primo de alimentorum facult. Galenus ait: ἐπιπλέον ἢ οἷς καὶ μύελους, αἱ τὴν πύκνιναν ἔχοντες. id est: *Inest enim ciceribus abstergerendi vis potentior quam ipsis fabis, adeo, ut quadam species contractos in renibus calculos evidenter frangant. Licebit & hac ratione uti hordei decocto, quod & ipsum, Dioscoride teste, abstergerendi vi praeditum sit.****

Quando fortis
bendum.

Quando
abstinendum
forbitione.
Quando
abluendum.

Pisa non ab-
stergunt.

Febricitantes, tertiana praesertim exquisita correptos febre, immodicis medicamentis purgatoris non esse excarnificandos, ut plerique hodie faciunt, cum alterantibus uti interdum satis sit.

C A P. IX.

F M V L T I sunt hac tempestate Medici, qui non satis arbitrantur esse semel in febribus, tertiana etiam exquisita, medicamentum purgans exhibuisse, nisi id iterum atque iterum deorandum propinarent, idque nulla veterum autoritate, nec ratione, quae alicuius saltem momenti sit, confisi, ita ut hos ipsos errare hac medendi ratione omnium evidentiissimum sit. Sed ut id ipsum clarius studiosi deprehendere possint,

primum veterum testimoniis ostendimus quam suspectas illi euacuationes, immo. A
 dicas maxime, quæ per medicamenta purgantia ac alia auxilia in febribus fiunt, ha-
 buerint. Galenus siquidem *lib. 2. artis curat. ad Glauconem*, tertianæ exquisitæ curatio-
 nem ex professo tractans, hanc ipsam primum omnium quanto magis fieri potest, re-
 frigerare oportere ac humectare docet: nã contrariorum cõtraria remedia esse. Fla-
 uam enim bilem humorẽ inter omnes, qui in corpore sunt aridiorẽ sicciorẽq; exsi-
 stere. Posthæc tanquam ad minus necessariã, quam sit prior, indicationẽ, bilis scilicet
 excretionem, respicit, admonens nõ immodicis medicamentis ad eam educendam
 opus esse, cum interdum ad ventriculũ repar, atq; tum per vomitum educi possit, in-
 terdum autẽ ad inferiora vergat, & tunc per aluum subduci queat, hoc quod sponte
 plerunq; fieri solet. Quod si vero non fiat, ventrẽ mollibus clysteribus exinanandum B
 monet, adeo vt immodica per medicamẽta purgatoria vacuatione minime opus sit.
 Non esse autẽ opus multa vacuatione, ipse mox aquarũ marinarum & salсарũ exẽplo
 monstrat, sic scribẽs: τὰ λειρὰ θαλάσσια καὶ ἀλμυρὰ, καὶ νιτρικὰ, καὶ θειώδη πλεονεχῶν ἀπάντων τῆς χολῆς, πολὺ δὲ ἢ πλεον
 ὀφθαλμοὶ τοὶ ποτίζοντες. ἀμεινόν δὲ εἶπεν ὅδ' ὀφθαλμοὶ αὐτῶν, μειζώτερος βλάβη γὰρ ταῖς ποιήσιν ἢ βοηθός. ταῖς κενώσιν, ὅπως εἰς ὁ-
 δὴν καὶ κερδὴν λογισμὸς τοῖς δὲ χηρικοῖς λειρῶσι ἀναπειθόμενος, εἴπερ ἐκρημνίζονται τὴν ἰκτὴν ὁ σιμυγλῶν, εἰς ἑσπέρῳ τὴν ἀλ-
 γὴν τιμωρὴν εἰς πέναντα. ἐπὶ ταῖς δὲ αὐτῶν καὶ ἡ ἀδὴν πᾶσα διαίτα σφῶς τὴν κύωσιν τῆς χολῆς: αἱ δὲ ἵγγρα σποινῆς ὁμοιωτικῆς τῇ κενώ-
 σιν τῆς χολῆς φύσιν αὐτῶν εἶναι, ὥς πολὺ τὸ βλάυναι τῶν ὁ κενῶν πινόντων ὁμοῖον ὅς αὐτὸς ἰγνύσκειν, ὅς ἰππῶν ἰμυδῶν λογίζονται.
 hoc est: Marina balnea, salsa, nitrosa, atq; sulphurea, plus quidem bilis educunt, sed multo minus
 iis quæ ex potabili aqua fiunt, profunt. Prestat vero neq; ipsa utilia dicere, quandoquidem plus qua-
 litate nocent, quam euacuationibus iuuent. Equidem noui quendam corrupto iudicio hisce balneis
 uti persuasum, deinde extenuato corporis habitu, ad tantam venisse perniciem, vt tabe consumptus C
 interiret. Reliqua quoq; victus ratio ad bilem exercendam illi adaugebatur. Semper vero oportet
 contrarias qualitates illis quæ præter naturam inualuerunt, opponere, cum hoc multo melius sit,
 quam quomodo libet euacuare. Atqui neq; hoc ipse nouerat, neq; ab aliis docentibus didicerat. In
 quibus sane verbis Galenus periculo cuiusdam qui incitia Medici periit nos admo-
 net, ne in tertiana exquisita immodicis euacuationibus studeamus, sed id potius co-
 nemur, vt contrariis qualitatibus, quæ habitum corporis corrigere possunt, febrem
 oppugnemus, id quod multo præstantius est, quã hac aut alia ratione vacuare. Quod
 si itaq; balnea aquæ salis, marinæ, nitrosæ & sulphureæ tantum huic cuius Galenus
 meminit, obfuerunt, vt tabe tandem absumptus perierit: cur non idem periculum
 purgatoria medicamenta, immodica præsertim, quæ non tantum qualitate sua, quã- D
 do omnia id generis sunt potentia calida, verum etiam vacuatione nimia nocent ad-
 ferrent? Huc respexit etiam in aphorismis Hippocrates, dum *1. sectione 24.* præcipit,
 in acutis morbis raro, & non nisi cum præmeditatione multa, esse purgantibus me-
 dicamentis vtendum. Et in compendio Oribasius in eam sententiam scribens: Crudi
 existentes humores antequam incipiant generare morbos, caute sunt vacuandi,
 iam autem febrientes nullo modo. Inter Latinos etiam Cornelius Celsus *libr. 1. ca-*
pitem 11. nunquam, inquit, in aduersa valetudine medicamentum eius rei causa recte
 datur, nisi vbi iis morbus sine febre est. At vbi febres sunt, satius est eius rei causa ci-
 bos potionesq; assumere, qui simul & alant, & ventrem molliant. Ceterum inedia ca-
 lidis & siccis corporibus, Galeno *lib. 10. ther. meth. cap. 5. teste*, maxime est noxia. His autem E
 qui in calida & sicca ætate febre laborant, quæ scilicet ex vstione, aut labore im-
 modico, aut vigiliis, aut comprehensis iam animi motibus sit contracta, non tantum no-
 xia est, sed si quicquam aliud plane pernicioſa, quippe vel in febres ardentes ex ea in-
 cidunt, a quibus nisi prius mors occupet, in hecticas migrant, atq; ab iis in marasmũ,
 vel prius ardentibus præteritis in hecticas. Quapropter si calidas & siccas naturas
 tantũ malum ob inediã sequitur, cur idẽ non ab immodicis medicamentis, quæ sub-
 inde multo magis quam inedia corpus exhauriunt, contingeret? Et scio ipse quosdã
 qui hoc pacto deducti ad tabẽ perierunt. Præterea quum tertianæ, & aliarum ex pu-
 tredine humorum natarum febrium, curationis duplex sit indicatio, vna quæ humo-
 res febres efficientes, altera vero quæ febres ipsas respicit, semper Medico ad febres
 magis quam ad humores respiciendum, quod calor humoribus noxiis vehementior
 sit, atq; adeo magis etiam vrget. Proinde ad contrariã opponendam qualitatẽ magis
 animum aduertamus oportet, quam vt euacuemus. Ita Paulus Ægineta *lib. 2. cap. 20.*
 tertianæ exquisitæ tanquam morbo originem a bile flaua habenti, humectantibus
 & re-

A & refrigerantibus medicamentis in primis occurrendum esse statuit, nec non & cum eiusdem effectus victus ratione, Tandem si quid sese in ventrem recipit, & tanquam in sentinam confluit, id vel per vomitum, vel per inferna euacuandum. Diximus autem supra sæpe sua sponte alium, ea quæ ad inferiora repunt, in tertiana exquisita deducere, ita vt non semper opus sit purgante ad hanc rem medicamento. Quare quemadmodum immodicis medicamentis purgantibus vacuare febricitantes semper noxium est, ita interdum semel ea adhibuisse vtile existit, id quod fit si maior est noxiorum humorum euacuatione vtilitas, quam ex purgantibus medicamentis consequitur detrimentum, quemadmodum dilucide in prima sectione aphorismorum Hippoc. com. 24. in hunc modum scribens Galenus indicauit:

B κίνδυνος οὐ μικρὸς οὐ ὅτε νοσήσῃ καὶ καὶ φάρμακον, τὸ πᾶντα μὲν τὸ καὶ αἰσθῆναι φάρμακον, ἡμεῖς τῆς δυνάμεως ἐπὶ τῆς δυνάμεως, ἢ πύρετος, ἢ πύρετος ἐστὶν, καὶ τὸ πᾶν ἰατρικὸν λόγῳ, οὐκ ὅπως τῶν θερμαζόντων ἢ ξηραίνοντων, ἀλλὰ τῶν ἐναισθησάντων αὐτοῖς, οὗτοι ἐπὶ τῶν ὑπεραινέτων τε καὶ ψυχρότων. ἔχουσιν οὐδὲ αὐτοῖς ἐνέχει τῆς πυρετῆος θερμότητος ἢ κρύου ἐκείνου ἀσθενέστερον, περὶ τοῦ τοῦ ἰσχυροῦ ὅτι ἰατρικὴ βλαπτομένη, ἀλλὰ τῶν ἐξαίρετον αὐτῶν ἐνέχει χυμῶν, καὶ τοῖνυν μείζονα τῆς ἐφίλειας οὐ τῆς τῶν ληπτέων χυμῶν κοινότητος γίνεσθαι τῆς βλάβος, ἐν ἧς ἀνάγκης βλάπτειται τὸ σῶμα, πρὶν τῶν καὶ αἰσθῆναι φάρμακον, ἐπὶ δὲ ἡ ἐφίλεια μείζον, καὶ ἀλλοῦς τε καὶ πᾶσι ὁ βλάπτων ὁ λυτὸν ἀκονίζον χυμῶν, hoc est:

Periculum non minimum in morbo acuto perperam medicamento purgante vti, quod omnia id genus medicamenta facultatibus calida sint. Febris vero quatenus febris est, & sui ratione, nedum calefacientibus atque exsiccantibus, sed potius contrariis, hoc est, humectantibus & refrigerantibus egeat, Non igitur ob igneam febris caliditatem purgationem adhibemus, hanc enim scimus sui ratione nocituram, sed propter humores illam efficientes, Quare maiorem oportet ex noxiorum humorum euacuatione fieri vtilitatem, quam id quod necessario consequitur ex purgantibus medicamentis detrimentum.

C Est autem vtilitas maior, si absque molestia omnis humor noxius & infestans euacuetur. Quibus utique verbis Galen. etiam admonet, non temere febricitantes esse purgandos, quod id plerumque non sine magno ægrotantis periculo fieri possit. Quod si tamen purgandi necessitas interdum incumbat, videndum tum, vt ita purgemus, quo ex euacuatione maius incommodum, quam detrimentum, sequatur, id quod fiet, si lenibus, & sine molestia euacuantibus medicamentis vsi fuerimus. Hinc manifestum est in febribus, tertiana maxime exquisita, non facile medicamēta purgantia esse adhibenda, quod ferme semper natura sua sponte humorem febrem efficientem vincat atq; educat. Si tamen ita contingat, vt

D natura humorē integre vincere non queat, satis erit vbi leuioribus eam medicamentis iuerimus. Et hoc inter Arabes etiam faciendum suadet Abenrois, qui lib. 7. coll. cap. 11. sic scribit: Hæc febris si fuerit exquisita tertiana, erit secuta & absq; periculo. Et scimus certo, quod natura vincet hunc humorem, & ob id non debemus hunc medicamentis attractoriis mouere, sicut est scammonia, eo quod rectificando illā quantum possumus, membris principalibus inducet noxam, atq; adeo virtutem imbecillio-rem reddit, augeat quoq; calorem febrilem, suamq; siccitatem. Et si aliud non induceret nocumentum, nisi surgendi & decumbendi conatum, modicum non inueniretur, quia temperamentum inde magis calefit & debilitatur. Sed apparente signo concoctionis, non est malum dare aliquam medicinam attractoriam, in hunc modum, vt des ea quæ habent lenire materiam & humectare. Diligenter igitur in

E febribus animaduertant Medici, vt plus in humectando & refrigerando, quam nimium vacuando sint occupati. Hic iterum cum ridicula sua annotatione in medium prodit Montuus, ac ostendere conatur licere in tertiana exquisita exhibere medicamenta purgantia, id tamen quod nunquam negauimus, satis enim constat, vt ex iam dictis etiam colligi potest, nonnunquam in tertiana quoq; exquisita purgantium medicamentorum vsum vtilem esse. Nos vero immodicum & minime necessarium illorum vsum damnamus, nec vlla nisi fuerint lenia, adhibere commode posse adferimus. Potuisset utiq; & hanc omisisse annotationem, vt alias omnes Montuus, nam nihil habet quod nobis aduersetur.

Alterationi
potius quā
vacuationi
studendum.
Montuo re
sponderet.

F Quum veterum omnium testimoniis ad febrium curationem balneo nihil vtilius sit, inique facere hodie Medicos, quod febricitantibus illo interdicit.

C A P. X.

QUOD nostra tempestate magna Medicorum pars in eam dementiam prolapsi sunt, vt febricitantes in vniuersum omnes, tertiana etiā correptos febre a balneo

prorſus arcent, nulli acceptum ferendum niſi vni Razi, qui tractat. 10. cap. 4. de ter-
 tiãz cura ita ſcribit: Cum febris ægrum dimiſerit, adhuc eodẽ regimine quo prius
 poſt febrem per tres dies erit regendus. Quibus tranſactis pullina caro aut hœdina
 danda eſt. Interim tamen à balneo & ſole & vino abſtinendus eſt. Quod ſi de laco-
 niõ intellexit Razes, nihil illi aduerſamur. Si vero de balneo aquæ dulcis, nihil de-
 creto illo mendacius. Quicquid tamen ſit, euidentiffimum exiſtit noſtrę ætatis Me-
 dicos etiam ab aquæ dulcis balneo prohibere febricitantes, id quod erroneum eſſe
 multorum veterum teſtimonium euincimus. Primum omnium Hip. qui 1. aph. 17. ita
 ſcribit: αἰὲρ αἰ διαταχῆται πᾶσι τοῖς πυρεταῖς οὗτοι ζυμφοῦνται, quod eſt: *Victus humidus febricitantibus o-*
mnibus confert. Quod ſi ergo in vniuerſum humidus victus febricitantibus vtilis eſt,
 conſequitur, & balneum aquæ dulcis eiſdem conferre, quandoquidem illud non ſo-
 lum humectet, ſed & refrigeret, vt teſtatur Hippoc. lib. 2. de rat. vict. dicens: ὁδὸν πᾶντος ὁ

Balneum a-
 quæ dulcis
 humectat
 & refrige-
 rat.

ζυμφοῖται καὶ ψύχεται. id eſt: *Dulcis aqua humectat & refrigerat.* Galenus quoq; lib. 10. therap. meth.
 cap. 7. ſolium aquæ dulcis inter remedia quæ extrinſecus admota corpus refrigerant,
 & humectant, recenſet, inquiens: ἔξωθεν μὲν οὐκ ἀποπνίγει τότε πρὸς αἶμα αὐτὸ, & ὅσα δυνάμει φαρμά-
 κων ὑπερβαίνει τε καὶ ψύχειν πεφύκαται, καὶ πλείονα πρὸς τοῖς ὑδατῶν γλυκύων λυτὰ. id eſt: *Extr. inſecus corpori ac-*
cedunt tum aer ipſe qui nos ambit, tum medicamenta quacumq; humectandi refrigerandiq; vim
obtinent, & tertium præter hæc dulcis aqua ſolium. Et libr. 3. de tuenda valetud. vbi ſic ait:
 ἔτι δὲ τῶν γλυκύνων ὑδατῶν θερμῶν ἢ δυνάμει, ὑπερβαίνει μὲν ὅταν ὑγρὰ & θερμὰ γλυκυστέρων ἢ γενναίων ὑγρὰ καὶ ψυχρὰ, θερμότε-
 ρων ἢ δυνάμει δυνάμει δυνάμει. hoc eſt: *dulcium calfactarum aquarum, ſi*
media temperie ſint, vis calida & humida eſt: ſi tepidiores ſint, humida & frigi-
da: quod ſi iuſto calidiores ſiant, calida quidem, ſed non perinde humida. Ex quibus ver-
 bis Medicus non ſolum balnei vim, ſed & applicandi in febribus modum diſcere po-
 teſt, vti ſcili et tepidum ſit, ſi vt inſrigider atq; humectet voluerit. Balneū aquæ dulcis
 humectare & refrigerare Alexand. quoq; Trallianus lib. 3. cap. 43. docet, ita ſcribens:
 Nouimus quippe & experti ſumus balnea dulcis aquæ frigorificam & humectantem
 obtinere facultatem. Si itaq; balneum, maxime vbi tepidum fuerit, refrigerare & hu-
 mectare poteſt, cur febricitantibus non ſuo tempore, cum qualitate ſua febrium na-
 turæ in vniuerſum aduerſetur, adaptari queat, non video. Quod autem in omnibus
 fere febribus balneo commode vtiliceat, ordine iam quodam demonſtrabimus. In
 diariis ſiquidem febribus, quæ ephemeras Græci vocant, vtile eſſe balneum docet

Diariis bal-
 neū cõfert.

Galenus lib. 1. cap. 2. ad Glauconem, ſic de curatione illarum ſcribens: καὶ ἐπὶ τῇ λυτῇ πρὸς αἶμα
 ἀγνοῦν αὐτὸς, καὶ τὴν αἰσθάνειαν τὴν συνήθη διαſταλῆναι. id eſt: *Oportet ſiquidem eos conſeſtim ducere ad balnea, atq; ad*
conſuetam victus rationem. Id quod & lib. 8. therap. meth. cap. 3. facit, dum ita de diariarum
 curatione ſcribit: ἀγνοῦν μὲν ἵνα πᾶσι λυτῇ καὶ πᾶσι οὐ τῇ ἀρχῇ καὶ πρὸς αἶμα πρὸς αἶμα. hoc eſt: *Quip-*
pe in prima acceſſione inclinante ducendi in balneum omnes ſunt. Ex quibus vbi bis tempus
 quoq; balnei inſinuat Galenus, οὐ μὲν ἀπαντῶν, vt paulo poſt ait: καὶ μὲν τῶν πυρετῶν λυτῶν, αἱ
 οὐ τῇ ἀρχῇ καὶ πρὸς αἶμα πρὸς αἶμα quod eſt: *Non enim quouis tempore febricitantes lauandi ſunt, ſed in ac-*
ceſſionis remiſſione. Lauandos præterea eſſe diaria febre correptos Paulus etiam Ægin.
 libro ſecundo, cap. 16. docet. Et Alexand. Trallianus libro 5. cap. 1. præſentiſſimam fe-
 bribus diariis curationem balneum eſſe inquit. Ceterum quod in putridis febribus
 etiam conferat balneum, libro 10. & 11. therap. meth. Galenus multis in locis oſtendit,

Quando
 lauandi fe-
 bricitantes.

præſertim autem capit. 10. libr. 10. vbi balneum febribus per ſe & ex accidente vtile
 eſſe ſcribit. Nam cum vacuatio excrementorum ſub cute derentorum illis vtiliſ-
 ſima ſit, certum eſt in balneo neceſſario ob æqualem per omne corpus calorem,
 exiguorum meatuum rarefactionem fieri, atque adeo cutim laxari, & ſic quæ
 detenta ſub hac fuerunt vacuari, balneumque ſic per ſe, quandoquidem vacuat
 prodeſſe. Quia vero denſatam atque coarctatam cutim ipſam, vt ſuperuacua illuc
 educi queant, laxat, ſit vt ex accidenti refrigeret. Tempus autem lotionis eodem
 quoque loco Galenus monſtrat eſſe febris inclinationem, & putridum humo-
 rum concoctionem. Hinc eſt quod in libro quoque de tabe febribus putridis bal-
 neum eſſe vtile ſtatuit, at non niſi poſt concoctionem: Verba eius hæc: τῶν μὲν οὖν ἐπὶ
 χυμῶν σηπιδμῶν ἀναπνέοντων πυρετῶν μετὰ τὴν πύψιν τῶν χυμῶν ἰαμὰ βαλανεῖον ἐστὶν. quod eſt: *Febrium*
quidem ex putredine humorum accenſarum, balneum poſt humorum concoctionem adhibitum,

A *remedium est.* In intermittentibus vero febribus esse balneum vtile satis liquet, qui Galenum *libr. 1. therap. meth. ad Glauconem*, ita de tertiana exquisita scribentem legit: *λαπαὶ δὲ θερμὰ δι' ὧν τὸ πρῶτον, τὸ ῥῆμα καὶ αὐτὸ τῆς χολῆς ἀπαρτίζεσθαι. τὸ δὲ πρῶτον αὐτῇ τῇ μετὰ τὴν κρίσιν οὖνται, ὡς αὐτὸν ὁ δὲ ἴσχυς κατὰ δύναμιν ὅσα ποιῶνται λατρεῖ.* id est: *Balnea calida ex aqua potabilis profunt, tum quia bilis a liquid educunt, tum etiam quia qualitate sua plurimum iuuant, humectant enim ac potentia refrigerant.* Et paulo post: *τοὺς δὲ φιλοστερνύμενοι οὐδ' αἱ διὰ τῆς ἡμέρας λούειν ἵλαται ἀμαρτυρίας, ἀλλ' ἐν κατὰ μάλιστα οὐ τῷ τοῦ μετὰ τὴν κρίσιν, αἱ δὲ ἐν σφίσι τῆς νύκτι σημεῖα φαίνονται, καὶ αἱ παλαιότεραι λούειν, οὗτοι δὲ ἀμαρτυρίας,* hoc est: *Et qui balneis admodum delectantur, si etiam bis in die lauare permiseris, non aberrabis, sed illud semper in memoria habeto, ut in tempore id faciant. Si vero etiam coctionis morbi signa apparuerint, tunc etiam si sapius laueris, nihil delinques.* Quibus vtrique verbis indicare videtur Galenus, etiam ante concoctionem morbi in tertiam febris exquisita eos qui delectantur semel aut bis tuto lauari posse: coctionis autem notis apparentibus etiam si ter aut sæpius quis lotus fuerit, nihil obesse. In tertiana vero notha balneum quoque expedit, at non nisi ubi coctionis signa apparuerint. Hinc est quod ita scribat: *ἐν δὲ τοῖς τοῦ ἀκροβασίου τριτημῆρος οὐδὲ λούειν ὅτι καὶ ὁ χρόνος ἀναρτῶν, ἀλλ' ὅταν αὐτοὶ φαίνονται τὰ σημεῖα τῆς πύξης.* Idem hoc quod iam ex Galeni sententia diximus docet Paulus *libr. 2. cap. 20. & 21. dit.* In quartana denique non solum Hippocrates *lib. 2. & 3. de morbis* balneum probat, sed & Galenus *lib. 1. ad Glauconem*. Denique in libro de *tabe* inquit: *τοῖς ἐκ τῆς ῥῆμα.* quod est: *Hecticis solis sine quidem alicuius alterius febris complicatione constitutis, omne tempus ad balneum idoneum existit.* Item docet *libr. 10. cap. 10. therap. method.* Sed oportet ut prorsus contra laborem æger in balneum super lectulo deportetur, ne vires resoluantur. Auicenna denique in febribus balneum non raro probat, quem mirum est cur hic ut principem suum non sectentur. Inter Arabes etiam balneum febribus vtile esse statuit Avenrois, qui *7. coll. cap. 10.* ita scribit: *Et scias quod balneum in declinatione febrium collaudatur, quoniam superfluitates euacuat subtiles.* Adeo ut mirari satis non possim, cur nostra ætate medicinam exercentes in uniuersum omnes, tertiana etiam exquisita correptos, febri- *Ridicula Valeficia.* citantes a balneo arceant. Sed tantum ex Valefco colligere licet, id nulla alia ratione fit, nisi quod hodie arbitrantur sudorem in fine accessionis factum sufficere. Sed verba Valefci subiiciamus, quæ scribit *lib. 7. cap. 7.* in eum modum: *Antiqui post digestionis signa balneabant in aqua dulci tepida, & valet eis, ut vult Galenus.* Iam autem Dicunt vulgares, quod vera, brevis est terminationis, ideo nunc tales non ponuntur in balneo, sed sufficit eis quod sudent in fine paroxysmorum. Quibus sane Valefci verbis quid stultius, quid denique magis ridiculum esse posset, non video. Et enim si balneum febricitantibus, ut fatetur, vtile est, quid est cur non adhibendum putet? neque enim pius, multo minus Medicus censeretur debet, qui commoda ægrotanti auxilia denegat. Rifu præterea dignum est, quod tertiana exquisita correptos ideo non balneandos esse existimat, quia breuissima sit, quasi Hippocratis ac veterum seculo non itidem brevis fuerit tertiana, quum tamen *4. aphorism. 59.* scribat ita: *τῇ τριτῇ ἀκροβασίᾳ καὶ τῇ ἐν τῇ μετὰ τὴν κρίσιν τῷ μετὰ τὴν κρίσιν, id est: Tertiana exquisita septenis circuitibus, quod longissimum est, iudicatur.* Nemo tamen veterum hoc nomine tertiana laborantibus balneo interdixit. Stultissimum autem est, quod ait hodie a balneo prohibendos esse, quia in accessionis fine sudent. An non Hippocratis Galenique temporibus sudarunt quoque febricitantes Valefci? an naturæ ordinem inuersum suspicaris? Videant itaque studiosi quam ficulna sit Valefci & aliorum, qui hunc imitantur ratio, ut puer pene illam refellere possit. Quapropter probatissimos potius medicæ rei scriptores, quam frigidos illos sophistas sequantur veritatis amatores moneo: e quibus præter sterilem ac inconcinnam loquacitatem, nihil plane fructus sperare possunt.

Flauam bilem tenuesque succos ut facilius ex corpore educantur non indigere ut crassiores reddantur, quemadmodum præter omnem rationem

F *Auicenna credidit.*

C A P. XI.

A VICENNA *Fen. 1. Can. 4. tract. 2. cap. 7.* de intantione ad curationes vniuersales febrium putredinis inter cætera sic scribit: *Non emacues materiam indigestam in*

390

Humor tenuis non est vacationi ineptus dū mobilis est.

- A** humores meatus corporis pertransire non possunt, atque adeo in aliqua parte corporis firmati manent. Si itaq; tenues existentes nisi prius crassiores fiant educi non possunt, quare Hippocrates illos eadem die purgantibus medicamentis esse vacuandos monet? Respondeat hic Auicenna, aut quispiam eius hominis patronus, rationemq; afferat cur tenues humores Hippocrates, omnesq; alii veteres sine præparatione, vel ut Auicennæ more loquar, sine concoctione, hoc est, absq; eo crassiores fiant, mox educendos docuerint. Nullam certe aliam efficaciorē quam vacuandi facilitatē, quæ & ex parte humoris vacuandi, nec non impellentis naturæ se tenet, afferre poterunt. Quod enim tenue est, mobile quoq; sit oportet, ita ut hoc nomine facilius per medicamenta trahi posse nemo non videat. Recte itaque Hippocrates
- B** & veteres alii crassos tantum atque tenaces humores, quique aliqua corporis parte firmati sunt, antequam vacuentur præparatione egere scribunt, neque aliquis præter Auicennam in eam insaniam delapsus est, ut bilem præparatione, vel ut ipse appellat, concoctione indigere putauerit. Hæc enim cum semper acutos morbos, teste Gateno 7. *aphor. comm. 32.* faciat, & in acutis morbis, ut idem 2. *aphor. comm. 24.* docet, circa principia statim, primo videlicet die medicamentis purgantibus sit vacuandum, sit ut nihil necesse sit hunc fieri crassiorē. Ex his igitur omnibus satis probatum est, tenues humores non indigere ut crassiores fiant, quo ductu faciles sunt, cum quanto tenuiores sunt, tanto promptius trahentia medicamenta sequantur. Hinc Galenus libro 2. *aphor. 9.* ubi de humoris præparatione agit, crassitiem duntaxat
- C** & visciditatem corrigi oportere docet: illam quidem, eo quod crassus humor motui ineptus sit, ac per angustos meatus transmitti nequeat: hanc vero, quoniam quæ suo lentore adhærent, auelli haud facile possint. Hac ratione motus & integrum de extenuantē v. & librum conscripsit. Porro iam Auicennæ rationes, quibus ut in eam deueniret sententiam motus est, expendamus. Intentio, inquit, in digerendo est æquare substantiam humoris, materiei, hoc est medicamento, ut fiat præparata ad expulsionem facilem. Quibus verbis se in eo esse errore, in quo libro 1. cap. 4. Mesuen quoq; versari diximus, indicat, medicamentum scilicet purgans attrahendis humoribus non esse simile, quod quam veritati ex diametro pugnet, multis ibidem ostendimus. Cum itaque medicamentorum purgantium naturam atque operationem ignorarit Auicenna, nihil mirum, si tam vana ac friuola ratione seductus
- D** sit. Non enim opus est, æquare humores medicamento, cum illa antea attrahendis humoribus similia sint. Neque enim attractiones substantiarum sine similitudine fieri possunt, ut in naturalem facultatem commentarius demonstrauit Galenus. Proinde cum quodlibet non trahat nisi sibi familiare ac simile, nihil ad faciliorem a medicamentis expulsionem opus est illis equare humores attrahendos, cum antea iisdem similes sint. Nisi forte æquare dixit pro præparare humorem, ut facilius a medicamento trahi possit. Nam ita nihil absurditatis eius haberet oratio, modo non adiecisset eam esse ubi bilis crassior reddatur. Sin secus æquare verbum usurpauit Auicenna in doctē admodum ad medicamenta retulit, quod ad humores tantum referendum erat. Cur
- E** namq; tenues humores difficilius a natura expelluntur, non medicamentorum fit ratione, sed ideo quia humores tenues ab vna parte in aliam transfluunt, atq; adeo cum in continuo sint motu, & natura eo tempore veluti furis agitata, haud recte motus suos instituere ac dirigere possit, sit ut ab illa superari non facile queant. Ob id igitur opus est quopiam manum porrigente, atq; ad excretorios meatus humores agitato dirigente, atq; adeo illico medicamentum purgans adhibendum, quod humores sic turgentes familiaritate sua attrahat, id quod omnium facillime fit, eo quod tenuitate sua promte per angustos venarum meatus ferri possint. Sed inquit Auicenna, *Subtile facile membris immergitur, vel, ut ipse loquitur, imbibitur, ideoq; difficulter educitur.* Respondeo, minime. Nam qua facilitate immergitur, eadem quoq; educitur: im-
- F** mergitur autem nullo alio nomine, nisi quia tenuis, eadem igitur de causa rursus a trahente medicamento facile educitur. Inefficaces igitur sunt iam dictæ Auicennæ rationes, ut aliz multæ, quas utcumq; tanquam possibiles, etsi omnium maxime impossibiles sint, confingit atq; imaginatur. Verissimum enim est: quod de eo scribit

Auicennæ rationes reselluntur.

Non opus est æquare humores medicamento.

Obiectis diluitur.

in libr. de urinis Theophilus, hunc quidem magnum Medicum atque Philosophum A
fuisse ratione, sed inexpertum: id quod Matthæus de Gradi cap. 3. suorum in nonum
Razis librum comment. ita interpretatur: Magnus fuit ratione, hoc est, multas effinxit ra-
tiones, qua tamen experientia omnium rerum magistra maxime aduersabantur. Vel, ut ver-
b. s. eius utar, quacunque per rationem sibi visa fuerunt possibilia, illa tanquam verba concess-
sit, ei si nunquam in rerum natura fuerint, sint, nec futura erunt. Quibus verbis quid verius
dici possit non video, ita enim Auicennam deliniant, ut nullus pictor, quantumvis
ingenio & arte pollens, addere Apelles quidem, hunc certius exprimere potuisset.
Quisquis enim eius hominis scripta diligenter excusserit, inueniet illum passim e-
iusmodi friuolis ac temere excogitatis rationibus uti. Qui vero exquisitiorem hu-
ius paradoxii explicationem requirit, & quæ inter concoctionem & præparationem B
humoris sit differentia certius cognoscere satagit, is capita 19. & 20. libri secundi Institu-
tionum nostrarum sect. 2. legat. Nunc præstat, ut ad alia pergamus.

Capitale esse pleuriticis lenticulam ex aceto dare, id quod tamen facere Auicennam
contra omnium veterum præscriptum, constat.

CAP. XII.

Auicennæ
in reb. Me-
dicis insci-
tia.

Sputi facilis
excreatio
in pleuri-
tide.

NVSQVAM ferme apertius, quam hoc loco, inscitiam suam in rebus medicis pro-
dit Auicenna, dum lentes ex aceto, cibum pleuriticis conuenientem esse tra-
dit. Et certe ob vnum hunc errorem meritis est, cur doctis omnib. s. suspectus ha-
beridebeat. Sed verba eius subiiciamus, quæ scribit Fen. 10. Canon. 3. tractat. 5. cap. 3.
dicens: Et maximi quidem error est, in potu tribuere in frigidantia vehementia, nisi in fa-
ctis ex cholera. Et non dentur in potu in frigidantia styptica & cibi eorum sint sicut lentes cum a-
cetositate & similibus. Quæ utiq; verba quam erronea sint, imo quam ex diametro sibi
pugnent, facile experietur, quisquis illa paulo diligentius excusserit. Porro vnicum
post venæ sectionem Medici in pleuritidis curatione studium esse debet, ut sputum
celeriter facileq; excreetur, id enim omnium maxime ad sanitatem recuperandam
conducit, cuius rei locuples testis est Hippocrat. 2. præfagiorum 43. sic scribens:
πλευριτικῇ νόσῳ πῶς τοῖσι ἀλγέουσιν πῶς αἰετὶ τὸν πότον καὶ τὰς ἀλγείας παύειν τὴν ἀναπνοὴν καὶ διπύτιον, συμμυ-
μεῖν τοὺς φωνὰς τὴν ἐκφύσησιν καὶ τὴν πύσησιν: εἰ γὰρ πολλὰ ὕστερον μετατῆς δέχθαι τῆς ἰδίας ἀναπνοῆς τὴν ἐκφύσησιν καὶ τὴν πύσησιν πο-
λὴν βλάβην παράγει, καὶ μὴ ἰσχυρὸς συμμυμεῖσθαι, καὶ οὐκ ἔστιν ἰσχυρὸς. quod est: In omnibus pulmonis costarumque D
doloribus, ut sputum cito facileq; excreetur necesse est, flauumq; cum sputo vehementer commixtum
appareat. Etenim si multo post doloris initium aut flauum, aut rufum, aut multam tussim
inferens, aut non admodum permixtum expuitur, deterius est. Et 1. de ratione victus in morbis
acutis 27. in hunc modum scribens: αἷμα γὰρ ἰδύμεν ἐν τοῖσι πλευριτικῇ νόσῳ αἰνῶνται αὐτῶνται, αὐτῶνται
ἐπὶ τῇ ἐκφύσσει αἵματος τὴν ἐκφύσησιν καὶ τὴν πύσησιν. hoc est: Dolores siquidem pleuriticorum illico sua spon-
te desinunt, ubi aliquid effatu dignum tum expuere, tum expurgare coeperint. In prima deniq;
sectione, aphor. 12. vb. licinquit: ἐν πλευριτικῇ νόσῳ αἵματος αἰνῶνται αὐτῶνται ἐκφύσσει αἵματος, βραχυῖος, καὶ
δι' ὕστερον ἐκφύσσειται, μακροῖος. id est: In pleuriticis si circa initia statim sputum appareat, morbum
breuiat, si vero postea appareat, producit. Cum itaque in omni dolore costarum utile sit
celeriter excreari sputum, probe facit Auicenna quod refrigerantia & adstrin- E
gentia pleuriticis neque in cibo neque in potu exhibenda esse monet, hæc enim ne
sputum facile creari possit impediunt. Errat autem insigniter, ac sibi ipsi pugnan-
tia dicit, quod lentes cum aceto & similibus illis exhibendas docet; nam hæc quia
adstringunt, faciunt ut ægre difficileque sputum excreetur, id quod certe ægrotanti
summum exitum affert. Adstringere vero lentes in primis Hippocrates 4. de ratio-
ne victus in morbis acutis 88. sic scribens tradit: φακὸς εὐφραίνει καὶ ἀρῶν ἱκανοῖος. quod est: Lens
adstringit, turbationemque facit. Et Dioscorides quoque libro secundo, capite 117.
φακὸς δύναται ἐκφύσσειν καὶ τὴν πύσησιν. scribit. Galenus quoque lib. 8. de simpl. medic. facult. Idipsum con-
firmat ita scribens: φακὸς εὐφραίνει καὶ τὴν πύσησιν. ἡμεῖς γὰρ οὐ γινώσκουσιν ἐν τῇ μέσῃ καὶ ἐκφύσσει, καὶ μὴ οὐ καὶ
ἐκφύσσει καὶ τὴν πύσησιν. αὐτὸ μὲν οὐν αὐτῶν τὸ αἷμα ἐκφύσσει, καὶ οὐκ ἔστιν ἰσχυρὸς. hoc est. Lentes valen- F
ter adstringunt, medium tenent caliditatis & frigiditatis: desiccant tamen in secundo ordine.
Ipsum itaque earum corpus desiccet, & sistit ventrem. Proinde cum adstringant vehemen-
ter lentes, non debent pleuriticis in cibum adhiberi, ne scilicet sputum quo mi-
nus ex-

Anus exſciari queat prohibeant, atq; adeo ægrum ſuffocent. Id quod omnium diligentiſſime Galenus quoque *lib. 1. de victus ratione in morb. acut. comm. 27.* monuit, dicens: *ἡ τὴν φάρμακον διδόντος ἰατρὸς ἐκ τῆς αἰτίας διὰ τὴν ἰσθμὸν τοῦ πνεύματος πάλιν ἢ παρὰ τὴν ἰσθμὸν, ὥς μὴ δύνανται εἰσελθεῖν ἢ ἀναπεύσεως τῶν περικυκλωμένων, εἰς τὸν ἰσθμὸν ἵκναιται, καὶ τὸν πνεύματος πάλιν ἢ παρὰ τὴν ἰσθμὸν, ὥς μὴ δύνανται εἰσελθεῖν ἢ ἀναπεύσεως τῶν περικυκλωμένων, εἰς τὸν ἰσθμὸν ἵκναιται, καὶ τὸν πνεύματος πάλιν ἢ παρὰ τὴν ἰσθμὸν, ὥς μὴ δύνανται εἰσελθεῖν ἢ ἀναπεύσεως τῶν περικυκλωμένων, εἰς τὸν ἰσθμὸν ἵκναιται.* id est: *Lentem ex aceto confectam pleuritico in ea morbi declinatione, qua nihil aliud quam coctorum expuitione indigebat, qui exhibuit Medicus, non immerito ægrotanti ipse, qui sequenti nocte suffocatus est, mortis occasio fuisse visus est: imo lentisculam nemo qui mentis compos fuerit dederit.* Quibus sane verbis exemplo indocti cuiusdam Medici, quem etiam Auicenna temere ſectatus est, nos detertere conatur, ne lentes ex aceto confectas pleuriticis exhibeamus, maxime in eiusdem declinatione, ne coctorum expuitionem adstringente illarum vi prohibeamus, sed potius iuxta Hippocr. consilium vnum hoc conemur, vt ea quæ humectent, mediocriterq; incidant, adhibeamus, atq; adeo ea quæ in thorace sunt superflua ad expuitiones præparemus: ira enim, vt ait ibidem Hippocrat. *αἱ καθαίρειες πολλὰν τελειώτερον εἰσιν, ἢ ἡ ἰσχυρὰ ἡ ἰσχυρὰ γίνονται, ἢ εἰ ἀδύνατος τις διαγινώσκει, καὶ αἱ καθαίρειες αἱ πολλὰς εἰσιν, καὶ οὐκ ἀδύνατος εἰσιν, καὶ ἡ ἰσχυρὰ ἡ ἰσχυρὰ γίνονται.* id est: *Purgationes longe perfectiores sunt, minusq; purulentæ fiunt, quam si quis aliter cibaret. Insuper indicationes simpliciores, facilioresq; sunt, & minus morbi reuertuntur.* Hinc iterum discant studiosi, quam periculosum sit ita addidum esse Auicennæ placitis, id quod multi, hodie faciunt, vt piaculum ducamus ab illis vel latum vnguem discedere.

Historia

C Omnium exitiosissimum esse, veterumq; placitis maxime aduersum, dysenteria affectos purgantibus excarnificari medicamentis.

CAP. XIII.

NO STRÆ ætatis Medicos in dysenteria medicamenta propinare purgantia, notius est, quam vt demonstrari debeat: nemo enim est, qui practicas, vt vocant, illorum legerit, qui id ipsum ignorare possit. Sunt enim, qui diaprunis solutiui, & electuarium de succo rosarum exhibendum esse suadent, in quorum albo Marcus Gatinaria existit. Omnes autem quotquot hodie fere exstant rheubarbarum exhibet, saltem torrefactum, in eoq; se exemplū veterum imitari existimant. Verum quam capitaliter ex æquo omnes errent, tam veterum scriptis, quā rationibus aliquod ostendimus. Non esse itaq; purgandos dysenteria correptos in primis Hippoc. in libro de morbis qui extra, monstrat, vbi dysenteriz curationē ex professo tractans nihil medicamentorum aluum subducentium exhibet, sed ventrem cum lacte tantum decocto diluendum esse docet. Lac autē cum marinis maxime lapillis decoctū fluxiones alui sistere Diosc. *lib. 2. cap. 77.* scribit. Quin etiam Alex. Trallianus *lib. 3. cap. 21. de curatione dysenteria*, principio lactis decocti trium cyathorum mensuram potui dandam suadet. Galenus etiam in *lib. 9. de compositione medicaminum per singulas corporis partes*, in curatione dysenteriz ne verbo vno purgantium medicamentorum meminit, sed vniuersam curationem adstringentibus medicamentis absoluit. Neque id temere facit, memorem enim est eius quod scribit *lib. 13. ther. meth. cap. 3.* in hunc modum: *οὐκ οὐκ οὐδ' ὅταν ἡ τοι κατὰ τὴν ἰσθμὸν, ἢ τὴν πνεύματος πάλιν ἢ παρὰ τὴν ἰσθμὸν, ὥς μὴ δύνανται εἰσελθεῖν ἢ ἀναπεύσεως τῶν περικυκλωμένων, εἰς τὸν ἰσθμὸν ἵκναιται, καὶ τὸν πνεύματος πάλιν ἢ παρὰ τὴν ἰσθμὸν, ὥς μὴ δύνανται εἰσελθεῖν ἢ ἀναπεύσεως τῶν περικυκλωμένων, εἰς τὸν ἰσθμὸν ἵκναιται.* quod est: *Neque igitur cum vel circa sedem, vel aliquam huic vicinam partem initium phlegmones fit, aluum deiciat. Neque cum in vesica, pudendo vel renibus cæpta est, medicamenta qua urinas prouocent bibenda dabis. Neq; si mulieri in utero vel pudendo infedit, menses prouocabis, sed ad alias partes qua maxime longinq; sunt, semper auersionē facies.* Et paulo post: *αὐτὸς αὐτὸς καὶ τὸν πνεύματος πάλιν ἢ παρὰ τὴν ἰσθμὸν, ὥς μὴ δύνανται εἰσελθεῖν ἢ ἀναπεύσεως τῶν περικυκλωμένων, εἰς τὸν ἰσθμὸν ἵκναιται.* hoc est: *Longissime a tentata fluxione parte auellere, nequaquā ad eam trahere oportet.* Hac itaq; ratione, nec si ventrē, aut intestina phlegmone occupare iam cæperit, medicamine quod aluum deiciat, uti cōuenit. Quibus verbis Galenus aperte innuit, ad membra phlegmone aut fluxione tenrata non esse trahendum, sed potius longissime auertendum: Quum vero in dysenteria intestina non tantum fluxione, sed etiam vlceratione, phlegmone tentata sint, non conuenit, vt ad illa plus humorum per medicamenta purgantia trahamus: ita enim non solum vlceratio intestinorum vehementior fit, sed totus humorum impetus huc fertur,

Dysenteria correpti nō purgandi

arque adeo intestina tandem frustatim per aluum excernuntur. Hinc rectissime lib. A
 1. ad Glauconem, cap. 13. scribit Galenus: *dicens: ἀλλ' οὐδ' εἰ μετὰ Διάρροιας ὁ πυρετός εἴη, καὶ οὐκ αὖτις
 ἀλλ' αὐτῆς καὶ αὐτῆς αὐτῆς, καὶ μὴ κατὰ λόγον ἢ ὅτι παλαιός, ὅτι γὰρ τῶν ποικύλων οἷς παλαιότερον ἔχουσιν ἀφαι-
 ρέσας, ἢ ὅτι ἄλλοι ἀπαγνίσταλμεναι, ἢ τῶν κατὰ τὴν κινεῖν: ἐν μὲν οὖν ἔχεις κινεῖν τοὺς ἐν τῇ σπλῆνι.* hoc est: *Sed
 neq. si fuerit febris cum profluuiio alui, alia est opus euacuatione, verum hac sola sufficit, quamuis
 non sit pro multitudinis ratione. Quicunque enim iis plura adimere fore necessarium putantes, aut
 sanguinem mittere, aut ventrem mouere tentarunt, in grauiora pericula duxerunt. Quod si er-
 go in alui tantam cum febre profluuiio Gal. medicamentum purgans exhibere ab-
 horruit, cur non multo magis in dysenteria cauebimus, ne id ipsum adhibeamus. Se-*

Dysenteria
 laborantes
 animo defi-
 ciunt.

quitur namq; illa maior ad intestina humorum decursus, & tandem ob crebras alui
 deiectiones animi quoq; defectus, cui malo antea quoq; qui dysenteria laborant, satis
 obnoxii sunt, quemadmodum loco iam citato testatur Galenus, sic scribens: *λειποθυμοῦσι
 γὰρ ἐν τῇ χολίρῳ καὶ Διάρροιας, ὁ δὲ συνηθὺς καὶ μενίσχῃς.* id est: *Animo deficiunt & in morbo cui cholera
 nomen est, & in profluuiis ventris, & dysenteris.* Paulus deniq; Aegin. li. 2. ca. 42. cōmuniter
 vtēdum esse in dysenteria ait iis, quæ in aliis præter naturam excretionibus compre-
 hensa sunt, hoc est, adstringentibus medicamentis, nec per vniuersum hoc caput alia
 nisi restringentia remedia recenser. Id quod etiam facit Aetius *serm. 9. cap. 45.* Et A-
 lexander Tral. loco paulo ante citato. Cornelius quoq; Celsus *libr. 4. cap. 10. de dysenteria
 curatione*, omnia ea, quæ exulcerationem concitare possunt, fugienda esse admo-
 net, atq; illico ab adstringentibus curationem orditur, dicens: *Oportet in primis qui-
 escere, siquidem omnis agitatio exulcerat, deinde ieiunium sorbere vini cyathum, cui contrita ra-
 dix quinque folii sit adiecta.* Et paulo infra: *Si vetustior morbus est, ex inferioribus partibus
 tepidum infundere oportet, vel ptisania cremorem, vel lac, vel adipem liquatum, vel medullam
 ceruinam.* Quod si igitur ex Celsi sententia omnia, quæ exulcerationem mouere na-
 ta sunt, procul abiicienda erunt. Quid Deum immortalem remotius abesse debet,
 quam medicamentum purgans, quod attractrice sua facultate immensam acrum
 ac pungentium humorum molem ad exulcerata iam intestina deducit? Hinc auctor
 libri Dinamidiorum *cap. 4.* recte dixit, dysenteria affectos per medicamenta purga-
 tioni ineptos esse. Idem quod iam citati auctores, docet etiam Auicenna ipse, quem
 vtinam iuniores Medici in his potius vbi recte & cum veteribus sentit, quam in illis
 vbi falsa inculcat, sequi voluissent, ita enim hodie melius audirent qui passim medica-

Auicenna
 dysenteria
 curationem
 recte tra-
 dit.

tractant. Fen. namq; 16. Can. 3. tractat. 2. cap. 7. de cura ulcer. intestinorum ita scribit:
*Etsi fuerit necessaria vacuatio propter humoris malitiam, utere ea cum timore & cautela, & stu-
 de ne solutiuum vehementer noceat vestigio & ulceri, imo sit sicut myrobalanus, & rectifica ipsum
 cum eo, quod miscetur ei ex eis, quæ sunt sicut dragacanthum & similia.* Si itaque miroba-
 lanus ex Auic. sententia, quibus non vulgaris inest vis bilis feruorem exstinguendi,
 sine alio medicamento glutinandi facultate prædito exhibere dysenteria correptis
 non licet, quid de purgantibus medicamentis & rheubarbaro, quod certe inter illa
 non postremum locum habet, sentiendum erit? At dicent quod rheubarbarum in dysen-
 teria propinamus, id nō sine exemplo veterum fit, nam & Galen. *lib. 9. de compositione me-
 dicinalium per singulas corporis partes*, rheopōtico seu rheubarbaro, quod idem est, vsum
 esse constat. Diosc. etiam rheubarbarum vnice conferre dysenteria docet. Respon-
 deo, verum esse veteres rheubarbaro in dysenteria vsos, atqui rheubarbarum illorū
 ab hoc nostro diuersum erat, vt *lib. 1. cap. 4. monstrauimus*: huic enim aluum subducen-
 di facultas inest, illi suum in contrarium plane vsum adhibebant. Errat itaq; rursus in-
 signiter Montuus, quod veteres rheubarbarum ad contrarios vsus adhibuisse scribit:
 euidentissimum enim est ad vnum tantum vsum, nempe vt adstringerent, adhi-
 buisse, quapropter ad dysenteria curationem rhabarbarum veterum benefacere nō
 negamus. Quod autem aluum simul etiam subducatur, minime concedimus. Nec ob-
 stat Pauli Aeginetæ autoritas, qui inter veteres non numerandus venit, neq; de vete-
 rum rhabarbaro quod ille scribit intelligendum est, sed de nostro quo hodie vtimur, F
 quod Pauli temporibus in vsum Medicorum iam primum veniebat, quemadmodum
 loco iam citato diximus. Atqui hic errori suo patrocinantes dicunt, *et si rhabarbaro purgan-
 di facultatem inesse negare nobis non liceat, tamen vt non nihil etiam adstringat post se, illud torre-
 fiat oportet.* Quibus ita responsum volo. Fateor non nihil ablatum iri de rhabarbari
 purgandi

Paulus in-
 ter veteres
 non con-
 numeran-
 dus.

A purgandi virtute dum affatur: quod autem adhuc de illa remanet tantum existit, ut ad perdendos dysentericos sufficere possit, id quod quotidiana etiam nos experientia docet. Lupus namq; vtcunq; cicur est, lupus tamen permanet: ita rhenbarbarum vtcunq; torrefiat, rhabarbarum tamen manet, nec purgandi facultates suas penitus amittit. Quum itaq; dysenteria correpti purgandi non sint, *ut iam ostendimus*, ideo nec etiam torrefactum Rheubarbarum tuto illis dari potest. Nam, *ut Galenus lib. 9. simpl. testatur*, relinquitur in eo, ut omnibus aliis vstulatis, *in igne duntaxat*, id est, ignitio quædam, quam per ablutionem abstergere oportet. Præstat igitur non costum exhibere. Quum enim Mesuæ etiam testimonio, Rhabarbarum sit tantum amarum & adstringens, atq; minime acre, vstum, ut Galenus libro 1. de simplicium medicamentorum facultate capite primo, auctor est, acrimoniâ assumit, adeoq; exulceratis intestinis magis nocet. Quid multis opus est? si dysenteria correptos quis probe curare voluerit, veteres imitetur oportet, qui vnum hoc studebant, ut primum abstergerent, ac dein mox exulcerata intestina glutinarent, nam hæc vera dysentericæ medendi ratio est. Erroneam vero hodie medentium methodum plane fugiat, quæ purgantia medicamenta adhibenda docet, nam ipsissima ægrorantis mors est, id quod non pauca hodie multorum sic intersectorum exempla monstrant. Et nisi nominibus parcendum esse mihi imperassem, aliqua his interfererem, ut saltem aliorum periculo quidam sibi cauere discerent.

Colico cruciatu tentatos validis medicamentis purgantibus, ut hodie multifaciunt, non esse purgandos.

C A P. X I V.

MVLTI hodie Medicorum in cholico affectu valida exhibere medicamenta purgantia non aliunde certius nisi ex practico, ut vocant, quos imitantur, libris deprehendere licet: passim enim electuaria Indi & diaphœnicon coli doloribus correptis propinanda esse docent, quarum tamen compositionem turbit, scammonia, aliaq; similia medicamenta ingrediuntur. Quantum vero à vera medendi ratione aberrant vel hinc colligi potest, quod magnam humorum, valida sua vi, copiam ad ventriculum, atq; dein ad intestina trahunt, qui illa plus subinde distendunt, atq; adeo coli dolorem auctiorem reddunt. Is autem eo vehementior fieri solet, quo maior illic obstructio fuerit, quod tum vna cum excrementis, humorum quoq; per purgantia medicamentorum attractorum multitudo in intestinis detineatur, quod sane non sine magno dolore & periculo ægri accidit. Quare consultum est medicamenta exhibere ea quæ humoribus noxiis tantum educere, nec aliunde alios attrahere possunt. Testis Galenus lib. 12. ther. meth. cap. 7. ubi ex duabus historiis docet fortia medicamenta colicis non esse exhibenda. Vna est de quadragenario quodam, qui cum colo laboraret, non modo nihil a fomentis tum humidis tum siccis leuiatus, sed nec cataplasmatibus nec clysteribus ex rutaceo oleo, castoreo, melle cocto cum pipere confectis, verum potius exacerbatum est. Cum igitur mordentes succi in tunicis intestinorum immerfi dolorē facerent, hiera picra non semel, sed iterum atq; iterum ex modicis quibusdam interuallis vacuatus, prorsus sanatus est. Altera de iuvene quodam qui non raro ante colico cruciatu affectus fuerat, accepto scammonia succo purgatus est. Cum autē bene largiterq; fuisset vacuatus, aliaq; multa, quæ ibidē Galenus recenset, adhibita fuissent, post deinde per circuitus similis rediit cruciatus. Audiens autē eius symptomata Galenus, intellexit noxam ex scammonia, quæ aliquid a toto corpore ad loca ventris detulit, in illis maxime intestinis, percubuisse, quæ prius etiam imbecilla fuerant. Ex quibus sane historiis nemo non videt Galenum diligenter monere, ne colico affectu laborantibus purgantia medicamenta, fortia præsertim, propinemus, quod inde æger nihil leuetur. Hinc ut cautos faceret Medicos, ne simili noxa ægros afficerent, lib. 1. de affect. loc. modum, quem in adhibendis medicamentis purgantibus, his qui coli cruciatibus detinentur obseruare debent, præscribit, dicens: Non est dubium quin possint ea exhiberi, quæ educunt humores ex intestinis, nec aliunde alios attrahunt, Paulus denique Ægin. lib. 3. cap. 43. curationem coli doloris ex professo tractans, medicamentorum purgantium nullam penitus mentionē facit. Aetius quoq; serm. 9. cap. 29. & sequenti, haud aliter quam Galenus nullum nisi hiera picra

Quare colica affectis purgantia medicamenta non exhibenda.

In coli affe-
ctibus, locus
affectus di-
ligenter
scrutandus.

C A P. XV.

Clysterium
vsus quan-
do in calcu-
lo proban-
dus.

B repente siue pedetentim in renem incurfantibus ex commemoratis iam caussis, illico nisi quid prohibeat alium decocto aliquo eleuemus, sicut caricarum, fœnogræci, aristolochiæ, & similium. Et si vacuatum satis est, bene vertit, sin minus, bis ter aut amplius enemate vacuare oportet, sed ex eorum decoctis quæ conducibilia sunt & familiaria naturæ egrotantis, ne renes & vrinæ viæ angantur. Quibus utrique verbis diligenter monet, quo Medicus in exh. bendis in renum calculis clysteribus multa utatur prouidentia: nam etsi excrementa illis in intestinis detenta vacuare expediat, atque etiam necesse sit; cauendum tamen ne ex iis rebus fiant quæ in causâ erunt; ut renes & vrinæ meatus angantur:

D quod non perinde vt incolli doloribus prolint. Hoc nomine factum, vt nec Hippo-
crates *in libro de morbis*, qui intus, vbi calculi curationem ex professo tractat, clysté-
rium vtpote raro conducentium, vnquam meminerit. Earatione etiam Alexan-
drum Trallianum nihil de illorum iniectione præcepisse puto. Cum itaque cly-
sterium vsus iam renem lapide non admodum nisi vbi excrementa multa in intesti-
nis fuerint, probetur, non debent quouis tempore Medici ad illorum iniectionem
festinare, sed conuenit etiam alia experiri præsidia: Si enim æger iuuenis ro-
bustusque, & detractioni sanguinis assuetus fuerit, optimum remedium erit venæ
poplitis sectio, nec eo sine præsentius excogitari potest. Cum enim ob sanguinis ad-
renes defluxum meatus coarcentur, vacuato qui circa renes est sanguine, distensio

In calculos
quæ præsi-
dia experiri
conueniat.
Venę popli
tis sectio.

Topica re-
media.

iam multoties citati de renum affect. dig. & med. Et Alexand. quoque Trallian. lib. 3. ca. A
pit. 34. sic scribens: Inter ipsam statim morbi accessionem relaxantia & mitigantia medicami-
num auxilia adhibe. Verum balnea ceteris cunctis vilitate præstant, quoniam do-
lores sedare pariter & morbo mederi assolent. Vbi vero lauerit ægrotus, locus affe-
ctus oleo chamæmelino perungendus est, inque solio multum ac diu perfricandus.
Idem docet Paul. Aegin. lib. 3. cap. 45. Et Razes lib. 9. ad Almanforem, cap. 74. ita di-
cens: Cum in renibus fuerit lapis, æger balneum aqua dulcis frequenter ingrediatur, & renes, & ilia ex
oleis inungantur. Posthac utendum etiam iis erit medicamentis, quæ urinam mouere, calculosque
atterere possunt, quorum omnium copiam docet Aetius ac alii iam citati auctores. Iam dictam
vero medendi rationem vnico aphorismo complexus est Hippocrates. sect. libro se-
cto. epid. 5. ita scribens: *ἰς νεφρὸν ὁδὴν βαρεῖα, ὅταν πληρῶνται οἷα ἐκείναι καὶ φλέγμα. ὅταν δὲ πληρῶσιν ἰώδεια, καὶ
ῥαῖες ῥῆρ' ἰσχύονται. λύνονται δ' ὅταν αἵται κενώσωνται, ψαμμίαι τε πυρρὰ ὑφίστανται. αἱματώδεις τε οὐρεῖται, ἀρχὴ μὲν οὖν ὅ κατ' ἔξιν
ἰλινοῦν οὐ συμφύζει, ἀλλὰ γυναικεία, καὶ ἐμπύουσα, τὴν νέου ἐκαστοῦ ἔξιν, ἰγνύου τὰ μὲν, οὐρητικῆς καὶ αἵματι, λεπτύου, καὶ
ἐπικλύου, quod est: In renem dolor grauis, quando cibo replentur pituitam quidem vomunt, cum
vero dolores abundauerint, eruginosa, & leuiorēs fiunt. Soluuntur cum cibo vacuantur, arenu-
lae rufa subsident, cruentum mingunt, stupor eius femoris quod directo est. Quiescere non con-
fert, sed exercitari, non impleri, iuuenes veratro purgare, poplitis venam incidere, urinam mo-
uentibus purgare, attenuare & mollire. Cuius quidem sententiæ vberiore explicationem
videre licet in nostris in hunc librum Hippocrat. commentariis. Eandem
ferme curandi methodum præscribit in libro de internis affectibus, vbi sic ait: τῆς ἐν τῇ
τῆς σκαμμοῦνης, ἢ αὐτῇ τῇ ῥίζῃ, περιέσσει πρὸς ὅσον ἢ ἔσται τὸ σῶμα, ὑποκαθίρει. τῇ δὲ ὑστερὶ τῇ ἀπὸ ἐμβίβηται λευκῶν χυλῶν
ὑποκαθίρει δύο χυλοῖσι, αἷας δὲ παρεμβαλὼν δίδοται πίνειν. μετὰ δὲ ταῦτα ποτοῖσι καὶ βρωμασίσι καὶ λυτρεσίσι μελετεῖν, διδύς τὰ
αὐτὰ καὶ τὰ φαρμακείων διδοται φάρμακα. ἀκόταν δ' ἡ ὁδὸν πίνειν, λύνειν ποτῶν καὶ θερμῶν. Ἐχλιασμοῦται πρὸς στήναι ἐπὶ ποτίει
μολύβδι id est: Prius vbi corpus foueris, scammoniaque succo vel eius radice subter purgato. Postri-
die ciceris albi succum, salem immiscens, duobus congiis propinato. Postea cibo, potu, balneis que cu-
rato, medicamenta dato quæ stillicidio vrina laboranti dari solent. Cum vero dolor presserit, mul-
ta calida lauato, & calefacientia locis quæ maxime dolent apponito. Proinde imprudenter
hodie agunt, qui ceteris ferme omnibus præsidiiis neglectis, in calculo renum me-
dendo assidua clysterium iniectione tantum vtuntur, cum illarum nō nisi vbi mul-
ta in intestinis detenta sunt excrementa vsus sit, adeo vt mirari satis non possim cur
Montuus hic annotare voluerit, ad renum calculum curandum benefacere etiam
clysteres, cum id in vniuersum non negauerim, sed immodicum ac intempestiuum
illarum vsus tantum damnauerim, hoc quod & ipse facit. Potuisset itaque facile
hic quiescere, ac vacuas chartas temere non commaculare, quod sciret se mecum
eadem sentire. Sed voluit aliquid vt cunque confarcinatum producere, ne prorsus
tacuisse videretur.*

*Elephantiasin & Leporam morbos aliter apud Arabes Medicos, aliter apud Græcos
accipi, contra multorum hodie sententiam.*

C A P. XVI.

Elephantiasin & lepram aliter ab Arabibus, aliter a Græcis describi, non aliunde
certius, nisi ex collatis illorum descriptionibus deprehenderetur: id enim vbi fa-
ctum fuerit, nemo non videbit verum esse, quod asserimus. Inter itaque Arabes pri-
mastenens Auicenna Fen 23. Can. 3. tract. 1. ca. 16. Elephantiasin in eum depingit mo-
dum: *Elephantia est additio in pedibus secundum modum, qui accidit in venis varicum, quare
ingrossat pedem cum equalitate sua.* Haud aliter describit eandem Razes lib. 9. cap. 93. sic
inquiens: *Elephantiasis est, cum pedis crassities augeri videtur, & color obscurari, vena quoque
qua vites vocantur, apparere cœperint.* A iam citatis non dissentit Auenzoar lib. 2. cap. 26.
sic de illa scribens: *Et accidit cruribus crassitudo præter naturam, quæ dicitur elephantia, &
hoc ideo quia assimilatur cruribus elephantis in crassitudine.* Hos deinceps imitati sunt re-
centiores omnes, ac elephantiasin haud secus quam illi, pro morbo in quo pedes su-
pra modum intumescunt, acceperunt, ita vt elephantiasis iuxta horum sententiam
non aliud sit nisi pedum tantum morbus. Quam vero diuersus sit morbus iis, quem
sub eodem elephantiasis nomine describunt Græci, facile experietur, qui illorum
de hoc morbo sententiam diligentius rimatus fuerit. Inter quos certe nemo
hoc mali genus accuratius quam Aetius ipse descripsit, qui sermon. 13. ita de e tra-
dit: *Elephantiasis a quibusdam leontiasis, ab aliis satyriasis appellatur. Elephantiasis quidem*
a ma-

Elephantia
Arabum.

Elephan-
tiasis Græ-
corum.

A a magnitudine & diuturnitate affectionis nomen accepit, imo & propter cutis asperitatem quæ in quibusdam succedere consuevit. Leontiasis autem vocatur quum frons agrorum cum quodam tumore laxior redditur, ad similitudinem pellis flexilis superciliorum leonis. Satyriasis vero dicitur propterea quod male faciei iisdem cum rubore attolluntur, & musculis maxillaribus veluti conuulsionem patientibus; mentum ipsum dilatatur, quemadmodum etiam ridentibus euenire solet, similitudine quadam ad picturas satyrorum. Quin & alacritas ad coitum ipsis adest, quemadmodum & de satyris fertur. Est autem grauis morbus, & prope ex eorum numero qui incurabiles existunt. Et grauis quidem est ipsi agro, intollerabilis autem conspicientibus, utpote qui ipsum omnino aduersantur, adeo ut & plerique ex necessariis & domesticis agri ipsius conuersationem deuitent, etenim suspicionem de se prabet malum tanquam sit contagiosum. At-

B que ego sane malum esse affirmo cum ipsis conuersari, inquinatur enim aer quem inspirando attrahimus ex ulcerum fœtore, & vitiosa spiritus exhalatione. Hactenus Ætii verba recensuimus, in quibus non solum quale genus morbi sit elephantiasis, sed & nomina eiusdem explanantur. Constat autem cuius verba iam citata probe expendenti elephantiasin non esse alium morbum, quam eum, quem nostræ tempestatis Medici ex Arabum traditione lepram vocant. Is namque morbus, quem lepram hodie vocant, haud secus quam elephantiasis ex eorum prope numero est, qui incurabiles existunt. Grauis etiam agro est, & intuentibus intolerabilis. Contagiosus præterea est, adeo ut qui lepra affecti sint, cum aliis conuersati tuto non queant. Nihil vero differre elephantiasin Græcorum a lepra Arabum, certius, nisi ex

Elephantiasis
Græcorum est
lepra Arabum.

C utrorumque auctorum collatione sciri non potest. Galenus siquidem libro de tumoribus præter naturam elephantiasin sic describit: Elephas quoque melancholicus affectus est, originem ex sanguine melancholico ducens, tempore vero atrabilis sanguine copiosior redditur, quando tali morbo obnoxii grauiter olent, & aspectus sunt ingrato, quibusdam ipsorum hulcera quoque accedunt. Hoc malum dum incipit, satyriasmum vocant, quia satyris similes facie redduntur. Et in libro de causis morborum in hunc modum: *ἑλεφᾶσις ὀνομαζομένη ἐστὶν φθὴν φανερώς ἐξ ἀκάθουσι τὴν μορφήν, σιμυγνύει μὲν ὅδ' ἡ σῆς, ἐπὶ χεῖρσι παχύνει, καὶ ἀπὸ τοῦ ῥέματος τοῦ ὠκυφάνετου, ἐπὶ στήθεσιν ὁμοίως σιμυγνύει οἱ ἑλεφᾶσι πάντες γίνονται.* hoc est: Quippe morbus qui elephas nominatur, atque tabes ipsa plane formam immutant. Etenim nasus simus, labra crassa, aures acuminatae in elephantiasin videntur, atque in totum sic laborantes satyris similes sunt. Paulus Ægineta libro quarto capite primo,

D haud aliter, quam supra Ætius elephantiasin, vbi iam superauerit, incurabilem, atque cancrum totum occupantem corpus esse ait. Sed verba eius subiiciemus: Si cancer unum tantum corporis membrum infestans, Hippocr. sententia incurabilis est, quanto magis elephas, qui cancer est totius corporis, immedicabilis erit? Eadem itaque, quæ ex Galeni & Pauli sententia de elephantiasin dicta produximus, Auicenna de lepra tradit: Fen. namque 3. Canon. 4. tract. 3. cap. 1. ita scribit: *Lepra est infirmitas mala, proueniens ex sparsione cholera nigra in corpore toto, quare corrumpitur complexio membrum, & forma ipsorum, & figura eorum, & fortasse corrumpitur in fine eius ipsorum continuitas; ita ut corrodantur membra, & cadant casu qui sit ab ulceratione, & est sicut cancer communis toti corpori.* Razes quoque lib. 5. cap. 35. lepram morbum esse scribit vulnerantem mem-

E bra, ac eorum corruptentem figuras: Auenzoar etiam lib. 2. cap. 12. lepram esse cancrum pessimum ortum in corporibus hominum tradit. Ita ut ex iis euidentissimum sit lepram Arabum ab elephantiasin Græcorum nihil distare: vbiunque enim Paulus elephantiasin habet, hic Auicen. aut eius interpretes lepram transtulit. Id quod manifestissime indicant verba eius, quæ loco paulo ante citato scribit in hunc modum: *Et cum cancer, qui est lepra unius membri, sit de illis quibus non est sanatio; quid dicemus de lepra quæ est cancer totius corporis?* Quæ sane verba si cum iis quæ antea ex Pauli sententia diximus contuleris, videbis euidenter, quod contendimus verum esse. Idem Auicen. eodem capite ita de lepra scribit: *Et quando aggregatur caliditas aeris cum malitia cibi, & eius essentia est ex genere piscium, & carne salita, & carne crassa, & carnibus asinorum & lentibus, proculdubio est ut eueniat lepra sicut multiplicatur in Alexandria.* Quæ utique verba ex 2. lib. artis curat. ad Glauconem desumpta sunt, vbi de elephantiasin sic scribit: *αἰτὶν ἐν Ἀλεξανδρίᾳ παραπλήσιον ἡ θρίσις ἀντὶ τῆς διὰ τὴν ἰστίαν ἀφίεσις ὅδ' ἰδίσις, καὶ φαίνεται ἐν χειρὶ καὶ ποσὶ καὶ παχύνει, καὶ ἀπὸ τοῦ ῥέματος τοῦ ὠκυφάνετου, καὶ μετὰ πολλὴν θρόνην χυμὸν ἀπὸ τοῦ μεσοῦ ἐκείνου ὅδ' ὄντος, ἐν ἰστίᾳ τῆς φθορᾶς αὐτῶν πρὸς τὸ δέμας γίνεται.* quod est. In Alexandria vero

[illegible]

Lepra Græcorum di-
versa est a
lepra Ara-
bum.

402 Operum Leonhard. Fuchsi Pars IV.

quod lepram interdum pro cutis vitio, interdum etiam pro elephantiasi accipi
 apud Græcos ait, idque exemplo satyriasis ostendere conatur, ita colligens: *Quemad-*
modum satyriasis iuxta Græcos diuersos denotat affectus, ita & lepra. Quis autem nisi plane a-
 mens sit, illam sequelam admitteret? Fateor quidem verum esse, satyriasin diuersos
 denotare affectus, elephantiasin scilicet, & pudendi præter naturam erectionem;
 nam id abunde Græcorum testantur scripta. Quod vero itidem de lepra dici possit,
 constanter nego. Nam producat vnum saltem testimonium ex Græcorum Medico-
 rum libris, quod lepram elephantiasin esse vocarint, astruat Montuus, & victum me
 fatebor. Tanta est ergo dialecticus Montuus, vt sequelas eas etiam admittat, quæ o-
 mnium maxime pugnare videntur si rectius expendas. Sed verum esse puto, quod
 vulgato iactatur prouerbio, *Bis pueri senes*: anxie enim laborat in eo, vt ostendat saty-
 riasin significare diuersos affectus id quod tamen nemo it inficias: at ne vno quidem
 verbo, quod omnes eruditi negant, lepram cum elephantiasi apud Græcos nonnun-
 quam coincidere, probare studeat. Verum valeat cum suis deliramentis ac ficulneis
 argumentis Montuus, discatq; interim vel meliora proferre, vel penitus silere.

Morbum quem vulgo Gallicum vocant, non esse eum quem Græci Lichenem, Latini vero Impeti-
ginem appellant, sed nouum potius & veteribus incognitum.

CAP. XVII.

Iniurium me sibi fecisse hoc loco conqueritur Symphorianus Campegius, quod in
 ea sententia illum esse suspicatus sim, quasi Gallicum morbum nō differre a liche-
 ne seu impetigine putauerit, cum tamen omnium notissimum sit id ipsum *in lib. 2.*
cap. 12. Aggregatoris Lugdunensis eum astruxisse. Et certe nisi librum hunc ad se per-
 tinere negabit, fateri cogetur hoc, quod scripsimus se sensisse. Titulus enim capitis
 id ipsum satis monstrat, qui sic habet: *De lichene seu mentagra siue pudendagra, quam nostri*
Neapolitanum morbum vocant, Itali vero Gallicum. Quibus verbis quid (oro) apertius esse
 potest? Afferunt enim, lichenem nihil aliud esse, quam eum morbum, quem hodie
 quidam *Neapolitanum*, aliqui vero *Gallicum* vocant, ita vt mirari satis non possim, qua-
 re se sic non sentuisse ausus fuerit negare Campegius. Confinxit denique nescio quā
 annotationem, camque passim suis libris inseruit isto lemmate. *Hoc capite respondet do-*
minus Symph. Campegius Leonardo Fuchsio, qui eum de pudendagra siue morbo Gallico immerito
reprehendit. Quibus verbis iterum satis monstrat, se in ea esse sententia, vt menta-
 gram a morbo Gallico nihil differre putet. Præterea quæ ibi contra me annotauit,
 plane ad institutum nihil faciunt. Mihi contentio est morbum gallicum non esse li-
 chenem: ille rheologum agens ostendere conatur iram esse Dei, id quod nemo ne-
 gavit. Optarem certe eiusmodi naniis bonas chartas non commaculari. Mendacii
 itaque arguendis nobis potius venit Symphorianus, qui non tantum mihi, sed &
 Leonicensi iniurius existit. Leonicensi siquidem, quod hunc lichenem a morbo
 gallico nihil differre docuisse asserit, cum tamen idem in libro de morbo gallico edi-
 to eam opinionem quæ morbum gallicum esse lichenas astruit, penitus explodat.
 Mihi porro, quod me morbum Gallicum ab impetigine diuersum non facere putat,
 cum tamen constet confutationes meas legenti, me ab ista sententia fuisse olim, vt
 hodie sum, alienissimum, vt qui docuerim lichenas non esse morbum Gallicum, sed
 eum potius qui *impetigo* Latinis dicitur. Scio autē quid deceperit Campegium: præ-
 positionem *is* in themate ad lichenem referendam, ad Gallicum morbū retulit per-
 peram. Atqui erroris sui eum monuisse confutatio mox sequēs potuit, ita vt mirum
 sit, cur hoc loco in nostris legendis tam negligens fuerit, cum alias non raro totas pa-
 ginas, imo folia etiā integra, in sua transferre e nostris solitus sit. Sed vt hæc missa fa-
 ciamus, ad institutū reuertentes monstremus, quam turpiter errēt, qui morbū Gal-
 licum vocatū eundē cum lichene putent. Nouus cum sit morbus is, quē hodie Gal-
 licum aut Neapolitanū nominant, fieri non potest vt lichen dicatur. Lichenas enim
 seculo etiam Hippoc. fuisse constat, harum namq; *in tertia parte aphor. 20.* inter verna-
 les morbos meminit, & *in lib. de morbis*, multisque locis aliis. Quapropter recte cen-
 set Plin. qui *lib. 26. cap. 1.* lichenem morbum non Italiæ modo, verum etiam vniuer-
 sæ prope Europæ ante Cl. Tiberii Cæsaris principatum incognitum fuisse scribit.

A Erſi autem toti prope Europæ incognitus fuit lichen, nullo tamen modo Hippocrati, ut qui eius tam crebrâ mentione fecerit, quemq; multis annis ante Tiberiū eviuis, exceſſiſſe conſtat. Verum igitur eſt, quod paucis ante Tiberii principatum in Italia cognitus fuerit, quod in medio eius principatu a quodam Peruſino equite Romano, qui quæſtorius ſcriba Romæ erat, ex Aſia adueſtus ſit. Antea quoq; nondū Rom. imperio ad exteras nationes ꝑꝑagato nomine carebat, donec Medici Græci, qui urbem Romanam frequentare cœperunt, hunc morbum ſuæ linguæ vocabulo lichenē nominantes, illuſtiores pluribuſq; notum fecere. Meminit lichenum Dioſc. Galenus, Paulus, & quotquot ſunt Græci alii Medici, ita ut morbus Gallicus dici non poſſit. Is enim anno à Chriſto nato M. CCCXCIII. apud Neapolim primum irrepiſit. **B** men vero inde fortitum eſt, quod in Gallorum exercitu, qui illic Caroli regis ſui auſpiciſ belligerabat, apparuit prius quam uſquā alibi. Hac occasione Galli ominoſam à ſe appellationem amolientes non Gallicum hunc, ſed morbum Neopolitanū vocarunt, Peruicit tamē conſuetudo, ut *Gallicus* vulgo dicatur: Quare *λεχη* Græcis aliud à Gallico morbi genus eſt, cutis ſcilicet vitium & aſpredo, Latiniſq; *impetigo* nominatur. Fiunt autem lichenes, teſte Paulo lib. 4. cap. 3. mixtis ſanieb. tenuibus, & acribus, cum aliis craſſis humoribus, & celeriter in lepram, & pſoram, ſcabiemue tranſeunt. Lichenem eſſe cutis aſpredinem teſtatur quoq; auctor libri definitionum, dicens: *λεχη* ἐν τῇ σφαιρῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ ποδὸς ὡς ὁ μύς id eſt: *Impetigo eſt ſumma cutis cū multo pruritu aſperitas*. Autor quoq; introductorii quiſquis tandem ille fuerit, lichenē inter cutis affectus recenſet, iis verbis: *ὅ ἐστι λεχη πῶτος ἢ ἐ αὐτὸς δερματός, δι τὸν ὅτι αἶδος λεχη*, ἢ μὲν ἡμεῖς καὶ προῶτιος, ὅ ἐστι ἄγριος καὶ χαλεπότερος. ἀφισυντῆναι ὅ ἐστι τὸν ποδὸν καὶ λεπίδες τοῦ δερματός. ὅ ἐστι ἄγριος καὶ λεπίδες τὸν ποδὸν αἰσθητὴν καὶ ἄγριος ἐκαστοῦ φανερῶν. quod eſt: *Impetigo quidem ipſa cutis vitium exiſtit. Etiam autem duæ ſunt ſpecies, una tolerabilis mitiorq; eſt, altera fera, difficiliorque. Squamula in his ex ſumma cute descendant, ſub quibus locus rubicundior, ſereque exulceratus apparet. Impetiginem vero eum eſſe morbum, quem Græci lichenem appellant, in primis teſtatur Caſſius Felix, ſic ſcribens: Impetigines Græci lichenas dicunt naſcuntur ex melancholico humore, rotundo ſchemate, in ſuperficie cutis, cum ingenti pruritu. Et confirmat id ipſum Cælius Aurel. lib. 1. Chronic. cap. 3. ita de lichenibus equorū loquens: Sunt squamula anteriorum crurum ſub armorum partibus in ipſis animalibus natae, has Græci lichenas vocant, nos vero impetigines. Porro lichenas eſſe impetigines, vel inde ſatis liquet, quod ſingula ferme remedia, quæ à Paulo Græciſq; aliis lichenibus accommodantur, eadē etiam à Latinis quibuſdam ac Arabibus autoribus impetigini adaptantur. Et ut vnum atq; alterum referamus, Paulus Aegineta lib. 4. cap. 3. lichenas puerorum ſaliua humana perfricandas eſſe docet, id quod & Serenus Samonicus cap. 10. in impetigine faciendum ſuadet iis carminibus:*

Si vero vitium eſt quod ducit ab impete nomen.

Hoc matutina poteris cohibere ſaliua.

Id quod & Auicenna, facit Fen. 7. Canon. 4. tractat. 3. cap. 4. ita de impetiginis curatione ſcribens: *De medicinis quidem ſingularious eius eſt ſaliua hominis ieiuni, & illud, quod reſidet ſuper dentes eius*. Paulus denique eodem loco folia capparidis, ſulphur cum aceto, & alia multa remedia lichenum recenſet, quæ ſingula quoque ab Auicenna, non tamen ſine multa corruptione, enumerantur. Proinde euidentiffimum eſt ex iam dictis, Latinis eſſe impetiginem, quod Græcis *Lichen*, neque eſt hodie inter Latinos interpretes, qui non Lichenem impetiginem vertat. Cornelius tamen Celf. libro 5. lichenas papulas vertit, id quod inde colligi poteſt. Quemadmodum auctor Introductorii duas lichenum ſpecies facit, quarum altera mitis, altera autem fera ſit, ita quoque Celfus papularum duo eſſe genera ſtatuit, vnā mitem, alteram vero *αγρίαν*, id eſt, feram. Et ut prima a Caſſio Felice deſcribitur eſſe figura rotunda, in ſuperficie cutis, cum ingenti pruritu & aſperitate, ita Celfus primum genus eſſe vitium in quo per minimas puſtulas cutis exaſperetur, & rubeat, **F** leuiterque rodatur, & maxime rotundum incipiat, eademq; ratione in orbem procedat. Præterea, ut Paulus lichenibus, & Auicenna impetigini ieiuni hominis ſaliua medentur, ita & Celfus leuem pabulam ſi ieiuna hominis ſaliua quotidie deſricetur ſanari ait, ut hinc manifeſtum ſit pabulas Celfi a lichenibus Græcorum nō diſferre. Habet autem libro iam citato Celfus caput quoddam de impetigine, quæ

Gallicus morbus quando primum orbē irrepiſit.

Lichenes Latine impetigines.

Cornelius lichenas papulas vertit.

Impetigo apud Celfum eſt lepra Græcorum.

certe non est ea, de qua Arabes scribunt, nec cum lichene eadem, sed potius cum lepra Græcorum, id quod hinc colliges. Paulus lichenas celeriter in lepram transire scribit. Celsus itidem de pabulis, quas in impetiginem verti inquit, docet iis verbis: *Qua minus rotunda est, difficilins sanescit: nisi sublata est, in impetiginem vertitur*. Nul-
 lum deniq; in Celso de lepra caput est, adeo ut hanc sub impetiginis nomine descri-
 pisse non levis suspicio sit. Sed sunt præter iam dicta alia multa, quæ Celsum hoc ca-
 pite lepram Græcorum depinxisse argumento esse possunt, quæ lubens prætereo. Ceterum hic postremum cum Montuo ineunda pugna erit, qui iterum inuisa, imo
 stolidissima annotatione sua probare nititur, morbum Gallicum dici posse lichenas, quandoquidem a symptomatibus morborum nomina interdum mutuari liceat, Quapropter ita colligit: *Morbo Gallico affectos lichen magna ex parte concomitari solet, morbus igitur Gallicus lichen dici potest*. Validum plane argumentum, quod vel puer infringere posset ita colligens: *Coli dolores paralytis magna ex parte sequi solet, coli igitur dolor paralytis dici potest*. Vel ita: *Pulmonis phlegmonem non raro, Hippoc. teste, phrenitis sequitur, pulmonis ergo phlegmone phrenitis dici potest*. Quibus argumentis quid per Apol. oro insultus? quid magis ridiculum? Tanta est Montui in dialecticis ignorantia, ut plane minima eius artis principia non calleat. Perperam deniq; Galenus & Auicenna citat Montuus, cum ait, ex illorum sententia aliquando a symptomatibus morborum mutuari li-
 cere nomina: quasi dicat, si nomen morbi proprium ignoratur, tum licet eum sui symptoma-
 tis nomine appellare. O senem delirum, quid hic confusionis non faceret Galenus? Absit autem ut Galenum, artis Dialecticæ, quæ a confusione maxime abhorret, tam
 ignarum fuisse putemus. Ut vero Montui incertiam hic studiosi clarius agnoscant, locum Galeni, quo abutitur, breuibus explicemus. Is in 2. thet. meth. diuersitate no-
 minum, quæ morbis imposuerunt ipsorum primi auctores, indicare volens, inter ce-
 tera scribit, quibusdam ab ipso symptomate indita esse nomina, in quorum numero illos, hoc est, conuoluulus, ab ipso recensetur. Huic enim morbo a circumactione
 doloris in intestinis, qui illum sequitur, nomen impositum est. Nam *εὐλαδὺς* Græcis cir-
 cumagi & circumuolui significat. Tineismos quoq; morbus est, cui a symptomate, quod inducit, nomen impositum est, nempe ab assidua desidendi cupiditate & conatu, *τείνειν* enim Græcis conari est, & ire contendere. Talis etiã Dyspnœa, hoc est difficultas spirandi, & Spasmus, id est conuulsio, morbi sunt: huic enim a cōuellendo nomen inditum est
σπασμὸς, namq; conuello Græcis significat, illi autē a spirandi difficultate, quam affert, *πνέειν* enim spiro est, *δύσ* autē particula adiecta difficultatem indicat. Mens itaq; Galeni lo-
 lo citato est, quod morbis quibusdā a symptomatis, quæ faciunt, sint imposita nomi-
 na: minime autē quod liceat morbos eorum nominibus appellare, in quos interdum commutantur: nā alias attam bilem, aliquando hæmorrhoides dicere licebit, quod absurdissimum erit. Ita passim Montuus in citando Galeno frequens est, at illorum, quæ affert, plane nihil intelligit. Quiescat itaq; iam & senectutis suæ dies in ocio trēsi-
 gat, illudq; mulliret. Qui quæ vult dicit, quæ non vult audiet.

Non esse diuersa morborum genera Prunam seu ignem Persicum, Carbunculum atq; Anthracem, ut multi medicorum hodie putant, sed vnum potius eundemq; diuersis his designari nominibus morbum.

C A P. XVIII.

SUNT non pauci inter recentiores hodie Medici, qui prunam ignemue persicum, carbunculumq; ab anthrace diuersum esse malum putent, differreque ea ratione potissimum anthracē a carbunculo, quod anthrax fiat ex materia maligniore & magis adusta, quam sit ea ex qua carbunculus generatur. Hac nimirum opinione ducti, de iis in diuersis, tanquam morbis differentibus, capitibus egerunt. Ex horum sane numero Valescus existit, homo ut tum tempora ferebant non indoctus, qui in tantum tamen desipuit, ut nomini Græco Latinam daret deriuationem, anthracem nimirum ab antro, id est fouea, deducens, quod foueam scilicet faciat, non intelligens
ανθραξ Græcam esse dictionem, neq; aliud nisi id quod Latini carbunculum nomināt, significare. Cur autem boni illi viri in hunc errorem, ut inter anthracem atq; carbunculum seu prunam differentiam statuerēt, lapsi sint, Arabes, quorum lectioni nimis addicti fuerunt, occasionē dederunt. Inter hos namq; Rhazes in libro *Diuisionū* cap. 133: de igne

Montui po-
strema an-
notatio re-
fellitur.

Locus Ga-
leni expli-
catur.

Tineismos.

Valescus
perstrin-
gitur.

A de igne persico, mox autem *cap. 135. de anthrace* seorsim scripsit: Proinde illum secuti diuersos esse morbos putantes, diuersis quoque capitibus de iis tractarunt. Quod autem anthrax à carbunculo nihil differat, vel iis qui primis saltem labris Græca degustarunt notum esse potest. Nam ubique Latinus interpres carbunculum habet, ibi de anthrace agere Græcum auctorem constat? Exemplo nobis sit Galenus, qui *libr. 2. artis curationem. ad Glauconem* ita de anthrace loquitur: *ἐπὶ τὸ ἐπιρρεῖον αἷμα θερμοὺς καὶ ἡνίκα περὶ τὸ μέγεθος αἰσθάνεται ἐπὶ τῷ, τότε καυστὶν ἔλατ' ἐχέοντες ἔχον ἐνθάδε, τὸ πείρειν αὐτοὺς πᾶσι εἰς φλεγμαὴν ἐκέρχεται, καὶ οὕτως ἐπὶ τῷ πύρετον, ἐν αὐτῷ τῷ πύρετον αὐτῶν.* quæ verba interpres ita vertit: *Quum sanguis influens calidus sufficienter exstiterit & crassus, quodcumque membrorum subito occupauerit, hoc comburendo facit vlcus crustam habens. Quicquid vero circumiacet, in inflammationem leuat, & effervescentem grauemq; dolorem inferi.* Vocatur autem humilissimi affectus carbunculus. Et libro de tumoribus præter naturam, vbi sic scribit: *αἱ δὲ καὶ φλεγμοναὶ καὶ οἱ αἰσθάνονται ἐπὶ τῷ αἵματι τῷ πύρετον φλεγμαὶς ἀνακαύσῃ τὸν πύρετον, ταῦτ' ὅρα. ἔστιν ἐνθάδε γίνονται καὶ φλεγμαὶς αἰσθάνονται ἐπὶ τῷ πύρετον, ἐν αὐτῷ τῷ πύρετον αὐτῶν.* quod ita vertendum: *Gangrena & carbunculi sunt, quum sanguis veluti ferueat, fereq; ut phlegmone cutem adurat. Crusta quoque in iis oritur, & pustula vlcus præcedunt similes iis, quæ ambustis fiunt, quæ febrem acutissimam inferunt, & imminens vitæ periculum.* Ex quibus omnibus manifestum fit anthracem penitus à carbunculis nihil differre. Præter id enim quod passim anthrax pro carbunculo interpretatur, contextus etiam verborum satis docet carbunculum seu anthracem à pruna, igne persico minime diuersum esse. Quemadmodum enim Galenus 2. ad Glauconem carbunculum

C describit, ita Auicenna. *Fen. 3. Canon. 4. tractat. 3. capit. 9.* prunam seu ignem persicum, Ait autem: *Hæc duo nomina fortasse absoluta sunt super omnem pustulam corrosiuam, vesicantem, adurentem, facientem accidere escharam, qualem facit accidere combustio.* Et paulo post: *Et fortasse non erit illic pustula omnino, imo incipit in primis pruna, & totum illud incipit cum pruritu sicut scarificationes.* Amplius quandoque vesicat ignis persicus aut pruna, & currit ex ea aliquid sicut currit a cauterisato cum combustione, & est locus cineritii coloris niger. Quæ verba etsi non nihil deprauata videantur, sunt tamen desumpta ex capite decimo, *libro 14. ther. meth.* vbi sic de carbunculo scribit: *ἐρχεται δὲ τὸ πᾶσι καὶ ἐπὶ τῷ πύρετον, οἷον δὲ καὶ περὶ ταύτης. αἱ δὲ καὶ ταῦτα πᾶσι ἐν τῷ πύρετον, εἴτ' αὖτε πᾶσι φλεγμοναὶ καὶ οἱ αἰσθάνονται ἐπὶ τῷ πύρετον, ἐν αὐτῷ τῷ πύρετον αὐτῶν.* hoc est: *Incipit hoc plerumque a pustula. aliquando vero & sine hac. Ceterum inter initia scabunt particulam omnino, mox oritur pustula quadam, qua rupta vlcus crustosum gignitur. Sæpe vero non una oritur scabentibus pustula, sed multa exiles veluti milii semina. Omnibus tamen crustosum fit vlcus, modo crusta ipsa cineris colorem præferente, modo nigrorem.* Ex excerpta videri possunt ex 25. *libr. 4. Pauli Æginetæ*, vbi de carbunculis seu anthracibus ita loquitur: *Quandoque sine pustula emergunt, particulam quibus hoc malum instat ab initio omnino scabunt, unde pustula nunc una oritur, qua rupta, vlcus cum crusta gignitur, nunc plures etiam tenues milii magnitudine erumpunt, disruptisque iis crustosum redditur vlcus, similiter iis omnino, quæ cauterio adusta fuerunt, quandoque cinereo colore crusta apparente, quandoque vero atro.* Vnde iterum satis liquet quatuor his nominibus, anthrace, carbunculo, pruna, igne persico, vnum eundemque morbum significari. Id quod & antiquus Galeni interpres non ignorauit, qui caput decimum *lib. 14. therap. method.* de anthrace, pruna, igne persico, & carbunculo inscripsit. Nihil autem distare a pruna & igne persico carbunculum, & eorundem etiam curationibus abunde declarari potest. Nam quam curationem Galenus ac Paulus anthraci seu carbunculo adhibendam docent, eandem Auicenna ac alii Arabes prunæ & igni persico quoque accommodant. Galenus siquidem *lib. 14. cap. 10. de anthracis curatione* in hunc modum loquitur: *καὶ ἡ δὲ καὶ ὡς δὲ φλεγμαὶς ἀρκτεῖται ἐπὶ τῷ αἵματι αἰσθάνεται ἐπὶ τῷ πύρετον, ἐν αὐτῷ τῷ πύρετον αὐτῶν.* hoc est: *Sed & incipiendam ab incisa vena curationem esse, id quoque neminem latere puto, qui præsertim meminerit, quæ in curatione febrium de sanguinis missione diximus. Nec illud obscurum, sanguinis vaccinationem quæ ad animi defectum usque sit adhibita, magis*

his etiam cellaturam, nisi tamen aliud quid obset ex iis, quæ venam incidi vetent. Paulus quoque Ægineta haud secus medendum carbunculo, loco prædicto docet: dicens: *Medendum itaque iis si nisi omnino perpusilli sint, sanguinis secta vena detractio, ad animi usque deliquium auferendo.* Idem sane remedium quod prædicti auctores Auicenna prunæ igniq; persico accommodandum docet iis verbis: *Neccessaria est phlebotomia ut euacuetur sanguis cholericus, & quando agritudo est timorosa, tunc necessarium est ipsam appropinquare syncope.* Quæ verba, quod ad venæ sectionem attinet, pulchre cum Galeni & Pauli sententia quadrant: variant autem multum si ad causam carbunculi, quam latenter hic Auicenna insinuat iis verbis, & euacuetur sanguis cholericus, respexeris: neq; enim a bili carbunculum Galenus in secundo ad Glauconem fieri ait, sed a sanguine crasso, fæculento a feruente, id quod & Paulus docet, dum generari carbunculum inquit, cum referbuerit sanguis, copiosiore atra bile abundans. Porro si pruna a bile flaua generatur, vt Auicenna somniauit, quomodo hic curationis modus iis quæ alibi scribit, conueniat non video. Passim enim sanguinem bilis esse frenum clamat, & Canone primo cauendum esse admonet, ne immodica sanguinis missione ægrum ad humorum biliosorum ebullitionem perducamus. Quapropter iuxta huius in aliis locis placita, in morbo ex bili sanguineue bilioso procreato, venæ sectio non comperit, vel saltem non tanta, quæ ad animi defectum perducatur. Hinc falsum in vniuersum sit oportet quod dixit Auicenna, prunam ex sanguine bilioso generari, cum potius ex crasso, fæculentoq; seu melancholico fiat. Id quod Auicenna quoque sibi ipsi contradicens, *Fen. 3. Canon. 4. tractat. 1. cap. 1.* fatetur, sic scribens: *At vero ex sanguine crasso malo fiunt species exiturarum malarum. Nam si eius malitia vehemens fiat, & ipsius adustio, proueniet erysipela, & veniet combustio & crusta, & deterior ea est ignis persicus.* Ceterum non esse diuersum carbunculum a pruna, testantur & reliqua, quæ de illius curatione Græci tradunt. Galenus namque *14. therap.* sic de illo inquit: *ὅτι καὶ τὸ ἀποκτείναν τὰς πύλους ὄγκος ὅταν καὶ ἀποφλεβήσῃς σὺν αὐτῇ τῇδεον. ἔστι δὲ βαρύτερα τῆς συμμέτρων αἱ ἀμύχαι, καὶ τὸ πάχος ἔχει πᾶν τοῦ χυμοῦ.* quod est: *Quin etiam scarificare eiusmodi tumores post sanguinis missionem, alienum non sit. Sunt autem incisiones mediocribus altiores, propter infestantis humoris crassitudinem.* Quem secutus Paulus ita ait: *Post verò sanguinis e vena missionem, scarificationibus incumbere altioribus neque alienum fuerit neque absurdum, ob humoris crassitudinem.* De prunæ autem curatione Auicenn. in hunc modum: *Et fortasse est necesse & proprie in pruna facere scalpellationem profundam, ut egrediatur sanguis malus constrictus in ea qui est in natura veneni.* Et non fiat illud quando materia est decliuis ad choleram. Ex quibus iterum innotescit, carbunculum a pruna non differre. Animaduertendum autem raro admodum fieri vt Auicenn. veritatem sincere doceat, semper enim adtexere somnia solitus est, id quod vbi factum fuit, mox hunc in scopulum impigisse certum est. Exemplo erit nobis hic locus, in quo sane pulchre cum Galeno & Paulo sibi conuenit ab initio, in fine autem dum ait, Et non fiat illud quando materia est decliuis ad choleram, iterum ad priorem respicit errorem, putatq; prunam ex bili flaua posse procreari, id quod paulo ante confutauimus. Adeoque merito bonis omnibus suspectus esse debet Auicenna, quod fere nunquam non falsa veris permisceat, quæ nemo nisi acri iudicio præditus sit discernere queat. Et mirum certe admodum est tam timidum in carbunculo fuisse Auicenn. vt dum materia declinaret ad choleram, profundam scarificationem prohiberet, cum tamen capite ante hoc sexto, de cura formicæ, ex Galeni sententia extirpare formicam cum aliquo quod sit sicut embuba, & extremitas pennæ aut alterius rei, cuius extremitas sit acuta, quæ possibile sit deglutire formicam, docuerit. Quæ tamen extirpatio formicæ si diligenter inspicatur, multo esse quam scarificatio violentior deprehendetur. Quare si hanc timuit Auicenn. quando materia erat decliuis ad choleram, multo magis tale aliquid facere formidare debuerat in morbo cuius materia non tantum ad bilem decliuis, sed mera bilis, vt ipse putat, existit. Errata autem hoc loco Auicenn. falsoq; Galenum citat, qui id præsidii non ad carbunculum, sed myrmæcias potius, vt sequenti capite dicemus, accommodauit. Sed vt ad nauseam vsq; ostendamus prunam seu igne persicum ab anthrace carbunculoque non differre, en alia quæ in Auicenn. de prunæ curatione sequuntur, cum iis quæ Galenus & Paulus de carbunculi medela scribunt, con-

Pruna ex
fanguine
crasso fit.

Avicennæ
doctrina
rarsyn-
cera.

A conferemus. Inquit igitur Auic. Cura autem localis necessaria est, ut sit sicut cura erysipelas. Verum non oportet ut sit inimentum vehementis infrigidationis sicut in erysipela, quoniam materia ad crassitiam declivis est, & quoniam ipsa est taliter, quod non tolerat ut redeat parum ex ea ad interiora, quoniam materia est venenosa. Et non licet ut administrentur ea quæ sunt vehementis stypticis iterum, nam illa materia est tardæ resolutionis, imo oportet ut administres medicinas exsiccativas, in quibus est infrigidatio & resolutio quædam cum expulsiōe, sicut emplastrum quod fit de arnoglossa & gallis, & lentibus, & plane plurimi furfuris. Galenus vero lib. 14. therap. method. in hunc modum: ἡ δὲ τῆς πεποησμένης μέθης ὁσπερ ἐπὶ τῇ φλογώσῃ τῶν χυμῶν, τῶν ψυχρῶν καὶ χροῖα. Διὰ τὸ πύρεθρον χυμῶν, καὶ ἰσχυρὸν ἐστὶν καὶ ἀποτρεῖται ποτὶ τὸ ἐξ ἑαυτοῦ πύρεθρον, καὶ τὸ πύρεθρον βλάπτει, οὐ μὴν οὐδ' ἐπὶ τὴν αὐτὴν συζωοῦται ἐστὶν. ἀλλ' ὁρίσκειν φάρμακα, μετὰ τῇ μετεῶς διακρούσει καὶ διαφύσει δυνάμεθα. τοιοῦτον δ' ἐστὶν τὸ δι' ἐντομῶν καὶ ἀποτρεῖται ποτὶ τὸ ἐξ ἑαυτοῦ πύρεθρον, καὶ τὸ δι' ἐφθῆς φαικῆς, ἀφ' οὗ κλίσκονται μαγνύται ἡ μὴ αὐτοῖς ὁσπερ ἀπὸ τῆς ποτὶ τὸ ἐξ ἑαυτοῦ πύρεθρον. quod est: *Imponi vero sibi laborans particula, quod ad inflammationem spectat, refrigerantia desiderat. Propter autem humoris crassitudinem, atq; etiam malitiam, neq; fluxionem auertere poteris. Et si quando id feceris, aliud quippiam quod in alto sit corpore offendes. Alqui nec affluere is permittendus est, quin potius inquirenda remedia sunt, quæ cum modice reprimendo, etiam dirigere possint. Tale profecto est tum cataplasma, quod ex plantagine conficitur, tum quod ex cocta lente, scilicet miscentibus his micam panis qui in furno sit coctus.* Paulus ita: Ita parte vero afflicta, reprimentibus, modice & discutientibus utamur, cuiusmodi est cataplasma ex plantagine, & lente elixa, sumendo panis in furno cocti micam. Ex quibus iterum clarum est, quod pruna nihil ab anthrace differat: quæcunque enim

C Auicenna de prunæ curatione tradit, ea ex capite de carbunculi curatione Galeni transtulit, ita ut toto cœlo errare manifestum sit eos qui iam dictis vocabulis diversa morborum genera significari putauerunt.

Auicennam erysipelas, formicas, myrmeciam, ignemq; persicum, morbos natura distantes, eorundemq; curationes turpiter admodum confundere.

C A P. XIX.

TR E S nominatos morbos, illorumq; curationes confundere Auic. dilucidum erit, si quis ea quæ de iis horumq; curatione scribit, cum veterum ea de re placitis contulerit. Quod enim ad erysipelas attinet, clarum est illud confundere cum formica miliari. *Fen. namq; 3. Can. 4. tract. 1. cap. 4.* inter cæteras erysipelatis notas sic scribit: Et peruenitur quandoq; ex caliditate erysipelas ad hoc ut comburat cutem, & eius virulentiā vesicat. Quorum utq; posterior nota Herpeti, vel ut ipse loquitur formicæ miliari ex Gal. in lib. 2. ad Glauconē sententia, qui ideo sic nominatā scribit, quoniam in hoc affectu pustulæ parvæ ac multæ per summam cutem similes miliis excitantur, potius conuenit. Id quod & Paulus testatur, qui lib. 4. cap. 20. in hunc modum scribit: Si vero tenuis bilis, minoreq; acrimonia fuerit, & calore exiguas pustulas miliis seminibus similes in summa cutis superficie excitauerit, miliaris herpes à similitudine nuncupatur. Idem Auic. cap. 1. citati loci ita scribit: At vero à sanguine crasso malo sunt species exiturarum malarū. Nam si eius malitia vehemens fiat, & ipsius adustio pueniet erysipela: ita enim interpret ipse loquitur: & veniet combustio & crusta. Quibus nimirum verbis nothas anthracis seu ignis perfici, erysipelati tribuit: nam ut capite præcedenti ex Galeni autoritate diximus, anthrax est qui ex sanguine crasso & sæculo procreatur, quiq; comburendo vlcus eum crusta facit, adeo ut manifestum iam sit Auic. erysipelas non tantum cum herpete miliari, sed etiā carbunculo confundere. Neq; vero notas tantū, sed curationes quoq; prædictorum morborum confundit. Inter reliqua enim Auic. de cura erysipelatis hæc scribit: Et si fuerit erysipelas super cutem, curetur ex scoria plumbi, cum vino pontico bullito cum foliis siclæ bullitæ cum vino. Quod sane remedium Paulus Ægin. vnde Auic. desumit, non ad erysipelas, sed ad herpetem miliarem accommodat. Verba eius subiiciemus: Aliud ad pustulosum herpetem: Recrementum plumbi ex vino austero contritum, mox illinitur, superiniiciuntur folia betæ in vino decocta. Præterea quæ iam citata apud Auic. verba sequuntur, satis etiā monstrant, quod curatio erysipelatis illic herpeti potius exedenti conueniat. Inquit enim: Et curetur cum eo in quo est resolutio & exsiccatio fortis cum infrigidatione. Quis est vero qui nesciat, nisi qui tritum illud in medicina

Anic. erysi-
pela cura-
tionem cō-
fundit cum
herperis mi-
liaris.

- A** *αὐτὸς δὲ διὰ πνέοντος ἰσχυροῦ πνεύου περιττεμένου κυκλωτέρας τῇ μυρμηκίᾳ ποιοῦμεθα τὴν ἄρσιν αὐτῆς. καὶ δὲ σύμμετρον ἔχειν διλονότι τὴν αὐτοῦ κενὴν σύειν, αὐτὸ πλεον τῷ πάχῃ μυρμηκίας, ἵνα τε πανταχόθεν αὐτὴν ἀκρίβως σφίγγῃ. καὶ πῆτα περιτρέψαι μετὰ τοῦ κράτος διὰ ζέου, ταχίστα τε γὰρ ἀν' οὗτω καὶ οὐν αὐτὴ εἰς τὴν μυρμηκίαν ὅλῳ ἐκβάλλει.* *Q* *est: Aequè autem & valente aliqua penna circulo myrmecia imposita, ipsam educimus. Debet porro penna fistula esse myrmecia crassitudini par, ut eam undique prorsus constringat, quæ postea circumacta, ac simul deorsum impulsæ, celerrime ita myrmeciam cum ipsa radice totam educet. Hunc sane modum curandi myrmecias ipsemet etiam Auic. docet Fen. 7. Can. 4. tract. 3. cap. 13. nec tamen ad Gal. auctore refert. Sed sic solet Galenum citare Auicen. ut illum, ubi maxime opus sit, prætermittat, ubi vero reticere, citet. Neq; mirum, eiusmodi n. fere omnia sunt placita Auicennæ, ut in his fides desideretur. Porro nō minorem nobis in pruna seu igne Persico confusionem peperit Auic. neq; n. quid sit ignis Persicus, aut qua ex causa procreatus, ex illius scriptis satis sciri potest. Interdum namq; illum ex sanguine crasso & melancholico generari scribit, ut Fen. 3. Can. 4. tract. 1. cap. 1. ubi sic ait: *At v. a sanguine crasso malo fiunt species exiturarum malarum: nam si eius malitia vehemens fuerit & ipsius adustio, proueniet erysipela, & eueniet combustio & crusta, & deterior est ignis Persicus.* Aliquando ex bile flaua originem ducere insinuat, ut capite 16. ubi ita de curatione prunæ scribit: *Necessaria est phlebotomia, ut euacuetur sanguis cholericus.* Per id enim, q. ait, sanguis cholericus, latenter innuit, prunæ causam esse bilem flauam. Ad hæc igne Persicum nunc idem morbi genus, ut sane est, cum pruna facit, veluti Fen. 3. Can. 4. tract. 1. cap. 9. ubi in hunc modum scribit: *Hæc duo nomina absoluta sunt super omnem pustulam corrosiuam, vesicantem, adurentem, facientem accidere & charam, qualē facit accidere combustio & cauterium.* Interdum autē diuersum etiam a pruna esse tradit, ut facit capite eodē, dum ita inquit: *Ignis Persicus vehementius cholericus, & pruna vehementius melancholica.* Nonnunq̃ etiam ipsum ad formicā corrosiuā transfert, sicut cum eodem loco ait: *Et quandoq; absoluitur nomē ignis Persici de illis, super quod est illic pustula de genere formicæ, comestina adurens, vesicans, in qua est aliquid ambulans.* Interdū vero cum formica miliari confundit, veluti cum capite iam citato sic inquit: *Et quandoq; sunt cum formicæ speciebus & miliaris mala febres vehementis caliditatis perniciose.* Quib. verbis satis indicat, iuxta suam sententiā ignem Persicum & formicā miliare parum aut nihil differre. Proinde parum referre existimat, utrū ignis Persici vel formicæ miliaris signa manifestet. Evidentissimum itaq; igne Persicum Auic. nō satis cognitum fuisse, neq; n. alias tā ambigua de illo scripsisset. Id quod probe expendāt cupio nostri seculi Medici, ut tandem intelligere possint, quantum in Auic. libris sit tenebrarum, quantæ etiam nō admodum eruditis errandi illic occasiones occurrāt. vix enim pagina, in qua homo hic sibi recte constet, & non ex diametro pugnantia scribat, ut hoc nomine mirari satis non queam, qui factum sit, ut illum antea ætatis Medici principem suum statuerint. At qui conueniebat forte, ut cæcis militibus dux cæcus obtingeret.*

Auicennam perperam omnibus Bubonibus indiscriminatim remedia reprimentia adhibere, cum ijs tantum qui ab humoribus non malignis ortum habent, conueniant.

CAP. XX.

- E** *N* *ex ignotis sermo noster procedat, animaduertendum Althohoin Auicennæ esse* *Althohoin* *id, quod Græcis βουβών dicitur, id q. in primis testantur verba eiusdem, quæ scribit quid,* *Fen. 3. Can. 4. tract. 1. cap. 17. ita dicens: Antiquissimi antiquorum nominauerunt eam nomine, quod translatum est in Arabico Althohoin, omne apostemma existens in membris glandinosa carnis, aut alibi. Quemadmodum n. Auic. althohoin glandularum esse phlegmonem docet, ita etiā Gal. l. 2. ad Glau. bubonem, sic nimirum inquiens. ἐστὶ γὰρ ὁ μὲν βουβὼν καὶ τὸ φῦμα, καὶ τὸ φύγεθλον αἰσένων παθήματα, βουβὼν μὲν ἡ φλεγμονή. quod est: Sunt quidem bubon, phyma, & phygethlon, glandularum seu partium laxarum vitia. Bubo sane phlegmone. Quineriā Paulus lib. 4. capite 22. scribit, bubonem glandularum adenumq; vitium esse. Constataurem antiquos Græcos, omnium quid.* *F* *generum præter naturam tumores in quacunq; corporis parte factos bubones vocasse. Paulatim deinde ad certa aliqua genera contracta vox fuit, priuatimq; dicti bubones, qui aut offensa p̄p̄inqua parte, aut vlceribus aliis, aut doloribus, sine periculo in glandulis excitant, aut qui in febribus pestilētibz præsentī periculo in inguinibus, alis, colloq; ingruere solēt. Cū itaq; satis ex iam dictis manifestum sit Althohoin Auic. nihil aliud esse,*

nisi id, quod Græci bubonē nominant, certum est, eundem errare cum *cap. 18.* iam citati A
 loci, ubi de curatione pestilentialium bubonum agit: sequenti enim capite, cuius titu-
 lus est, *de apostematibus accidentibus in glandulis*, tradit curam bubonum non pestilentia-
 lium, sic scribens: *Alcoholin vero ipsum & quod currit cursu eius de eis, quæ nominata sunt,*
curetur in principio cum eis, quæ constringunt & infrigidant cum spongia infusa in aqua & aceto, aut
in oleo rosarum, aut oleo de pomis, & arbore mysticis, aut oleo de myrtho, ista sunt in principio.
 Paulus siquidem multo aliter, quam Auicenna, iuxta duplicem bubonem, suam cu-
 rationem distinxit. In primo enim, qui ex humoribus non malignis oritur, refrige-
 rantibus atque adstringentibus medicamentis vritur. In secundo vero, in quo humo-
 res venenati sunt, refrigerantibus & reprimentia remedia plane negligit. Sed verba B
 eius subiiciamus: *Verum priores bubones statim in initia statim, quemadmodum quavis phlegmo-*
ne, præsi his refrigerantibus & adstringentibus aueruntur, veluti spongia ex posca imposita, vel
lana ex vino, & oleo acerbo, vel rosacco, vel melino, vel lentiscino, vel myrthino imbuta. Porro
 in febribus, vel in humorum malignitate, auersanda ac fugienda sunt, refrigerantia
 & reprimentia, ne rursus retrusa in profundum descendat materia, sed a discutiendi
 facultate prædictis confestim auspicandum est. Sic Galenus *libro 14. iher. meth.* ubi car-
 bunculi curationem tradit, refrigerantia & valde reprimentia cauenda esse monet.
 ἐπὶ δὲ τῷ περιθώστῳ μέγας ὄσων μὲν ἐστὶ τῇ φλογώσει τῶν χυμῶν, τῶν ψυχόντων ἐστὶ χρεία διὰ τὸ τὰ ἐξ αὐτοῦ χυμοῦ, ὅ
 μόντοι, τὴν κακοθυσίαν, εἶτ' ἀπ' τρέφειν ποτὶ τὸ πρῶτον, καὶ εἰ τοῦτο ποτὶ τίχῃς, ἐπεὶ ὅτι ἐν τῷ βάθει βλάπτει. quod ē:
 Imponi autem sibi laborans particula, quod ad inflammationem spectat refrigerantia desiderat. C
 serum propter humoris crassitudinem, atque etiam malitiam, nec fluxionem auertere poteris. Et si
 quando id feceris, aliud quippiam, quod in alto si corpore offendet. Ita & nostræ ætatis Medici in
 vniuersum omnes bubonibus pestiferis nullo pacto refrigerantia reprimentiaque me-
 dicamenta, sed calida potius & digerentia discutientiæ adhibent, intelligentes con-
 trariis præsidis ad interiora penitus humorum impetum verti. Mirum igitur est, cur
 Auicenn. præceptum id quod *Fen. 1. Can. 1. doct. 1. cap. 1.* inculcat, neglexerit, quo mo-
 net, omnibus phlegmonibus adhibenda esse ab initio quæ refrigerare atque reprimere
 possint medicamenta, de multis iis, quæ sunt de materiis, ita enim loquitur, quas princi-
 palia membra expellunt. Quis est autem qui nesciat bubones pestilentes a membris D
 principatum in corpore habentibus emergere? Neque enim temere Hippoc. 2. part.
 6. epid. 4. ait: αἱ ἀποσάσεις, οἷον βυβῶνες, σημεῖον μὲν τῶν τὰ βλασθήματα ἔχοντων. hoc est: Abscessus, velu-
 ti bubones, signa sunt eorum membrorum a quibus suppullulant. Si quidem qui a cerebro emer-
 gunt, in collo apparent, qui vero a corde, sub alis, quemadmodum ii qui ab hepate, in
 inguinibus. Proinde nunquam his reprimentia ac refrigerantia medicamenta adapta-
 re licebit, quod alias ad ea membra, quæ in alto sunt constituta, quæque principatum
 gerunt in corpore, humores maligni detrudantur, quod non sine magno ægri pericu-
 lo, imo certissima morte fieri solet. Hinc iterum satis liquet, Auicennam tua fere o-
 mnia vtcunque sine omni iudicio & delectu corrasisse, quando omnibus ex iam dictis
 constet, ea remedia, quæ bubonibus a non malignis humoribus ortis debentur, pestife-
 ris adhibuisse, adeo ut eius Canon merito confusissimum chaos dici possit. E

*Cœnam non in vniuersum, ut fere omnes nostræ ætatis Medici docent, prandio minorem esse
 debere, sed ut plurimum pleniorē.*

CAP. XXI.

Nemo est, qui hodie medendi methodum præscribentium libros vel a limine salu-
 tauit, qui nesciat vulgatum atque tritum hoc illis esse decretum, ut nunquam non
 prandio cœna minor sit. Quantum vero aberrant, facile deprehender qui rem alius
 expendet. Cœnam enim in omnibus, de multis iis, qui morbis nocturnis & catarrhis
 seu destillationibus affliguntur, prandio pleniorē esse conuenit. Qui enim iam no-
 minatis corripiuntur morbis, horum cœna omnino modica sit, tenuis, sicca, ac præter
 aliorum morem, noctemque præueniens oportet, ut ingruentibus scilicet morbis, na-
 tura ab omnibus aliis munus libera, vnius morbi concoctioni operam nauare queat.
 Sunt & qui consueuerunt minus in cœna ciborum assumere, quam in prandio, horum
 certe

- A** certe consuetudo non temere etiam immutanda erit. τὰ γὰρ ἐκ πολλοῦ χρόνου συνήθεια, ὡς αἶψα Hippocr. 2. Apho. 50. καὶ ἢ χεῖρα ἰσὺν ἀσυνήθων ἥσων ἐνοχλεῖν εἰσάγει. hoc est: *Quæ enim ex longo tempore consueverunt, etsi deteriora sint, insuetis minus molestare solent.* Cur autem in aliis omnibus plenior cœna salubrior sit, multa in causa sunt. Primum autem omnium noctis mox accedens frigiditas, quæ extrinsecus circumstant calorē natium in profundum secedere, & hoc nomine fortiolem fieri cogit, ita ut necessario ciborum tum melior fiat concoctio. Et certe idem potest noctis frigiditas, quod alias anni tempus hybernū, aut regio frigida potest. Horum enim vnumquodque calorē natium adaugere potest. Testis Hip. qui lib. 6. epid. 10. 6. sic inquit, οἷον ψυχρότερον ἐν ψυχρῷ αἵματι καὶ χύμα ἐν θερμότερον ἐστίν. quod est: *Perfrigidior in tempore, & regione frigidis, percalidior erit.* In 1. aph. 15. quoque ventres hyeme & vere natura calidissimos esse asserit. Deinceps est somnus, qui cœnam subsequitur, hic enim mirum in modum concoctionem adiuuat, τὸ δὲ αἷμα ἐν ὕπνῳ εἶσω μάλλον φεύγει, ὡς testatur Hipp. 6. epid. 10. 5. aph. 29. id est: *Sanguis enim in somno ad interiora magis refugit.* Cum itaque sanguis, cumque eo calor natius per somnum ad interiora secedat, quid mirum si calor auctus fortiolem concoctionem ciborum efficiat? Hinc rectissime Hip. lib. 6. epid. 10. 5. aph. 10. dixit: σὺν τοῖσιν ἀρθεσίον καὶ ψαλγῇ, οἷον ὕπνῳ πάλαι χύμασι. hoc est: *Labor articulis & carnibus, cibis vero ac somnus visceribus prodest.* Somnum quoque optime cibum concoquere testatur Galenus libro primo de Sympt. causis ita scribens: εἰσὶν οὖν ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ πᾶσι τῶν κατὰ τὸν ὕπνον ἀναπνεύσασθαι μὲν ἢ ψυχικῇ δυνάμει, ἐνεργεῖν δὲ ἰσχυρότερον ἢ φυσικῇ. τεκμαίρετο δ' ἄρτις τῷ καὶ κινηθῆναι αὐτὴν ὑπνωσάντων ἀναρρώσασθαι, καὶ μάλιστα ὅταν ἐπὶ τερφῇ συμμετρῶ κοιμηθῶμεν, ἐπὶ τῇ ἐπὶ τῷ πείθεσθαι τὴν τερφῇ ὑπνῶντων χάλλισα καὶ δ' ἄλλοι τῷ ζώον τὸν ὄγκον, οὐκ ἐν γαστρὶ μόνον. quod est: *Itaque, toto hoc tempore quo quis dormit, animalis facultas quiescere, naturalis vero validius agere videtur. Cuius rei coniecturam ex eo facies, tum quod ipsa si quando laborauerit, post somnum robustior euadit, idque maxime, cum a modico cibo somnum admittimus, tum etiam quod per somnum cibis optime concoquitur, non solum in ventriculo, verum etiam per universi corporis habitum.* Cui subscribit quoque Paulus Aeg. lib. 1. cap. 97. dicens: *Somnus est animalium facultatum quies, ab utili humore cerebrum madefaciente proveniens: hunc qui rite capessit, multa consequuntur commoda, cibos enim conficit, humores digerit.* Quod autem hac ratione plenior cœna esse debeat, testatur Gal. vel quisquis tandem eius libri auctor fuit, in lib. de dissolutione continua, in hanc sententiam scribens: *Antiqui cœnam prandio præferēbant, præcipientes plus ciborum in cœna sumendum esse, ob caloris circa interiora aggregationem noctis frigiditate, & per somnum factam. Calor namque in somno ad interiora corporis reuocatur, eademque calefacit, perinde ut in vigilia contrarium plane accidit.* Id quod Hippocrates etiam epid. 6. 10. 4. aph. 12. iis verbis indicavit: ἐμφανέως ἐργασθὲς θερμότερον τὰ ἐξω, τὰ ἐσω δὲ ψυχρότερον ἰσχυρότερον τὰ ἐναντία. quod est: *Plane vigilans calidior circa exteriora, frigidior vero circa interiora. Dormiens contra.* In cuius aphorismi explicatione nonnulla etiam in nostris commētariis produximus, quæ ad institutum facere possunt. Sed hic reclamabunt quidam, pleniorēque cœnam ideo damnābunt, quod pleno ventriculo ingrata sit quies, atque adeo somnus minus conueniens. His ita responsum volo: *Nemo est tam sine sensu communi, qui nesciat inter cœnam & somnum aliquid temporis interuenire debere, neque quemadmodum in brutis, nullam aliam nisi vorandi ac mox dormiendi vicissitudinem esse, quum omnium Medicorum consensu consultum sit, ut inter cœnam & somnum aut*
- E** *hōra aut amplius intersit.* Neque etiam est, ut pleniorē cœnam quis eam esse putet, quā multa ingeruntur tanta voracitate, ut vix spirare liceat, & periculum sit, ne vel crepant, qui ita sese replent, sed frugalem potius, talem tamen, in qua plus quam in prandio assumitur ciborum. Quod si tamen hic parum peccatum fuerit, melius certe id quod admissum est in cœna, quam in prandio fertur, quod somnus post cœnam non diu subsequens, facilius delictum quam vigilia quæ prandium concomitatur, corrigat. In somno enim, ut diximus, calor interiora petit, & quæ illic sunt, cibis concoquendis solis vacat. Interdiu vero ad exteriora protrahitur, neque iis quæ intus sunt prospicere potest, adeo ut verissime dixerit Hippocrates 2. vict. acut. 39. ἀνὴρ πρὶν ἰσχυρὸν πόμα καὶ στήνασμα καὶ ἀπεπθίεντα ποιεῖν. hoc est: *Vigilia vehemens cruditate incoctionemque ciborum tum potioris efficit.* Porro cur cœnam prandio pleniorē esse oporteat & hæc ratio est, quod rarā admodum existat corporis facultas, quæ paulo liberalius prandium spatio vel quinque vel sex horarū, quod fere inter prandium & cœnam interest, conficere possit. Quāntū autem incommodi adfert, si quis nondum plane concocto eo, quod prius ingestum fuit, aliud ingerat

Quare cœna prandio plenior esse debeat.

Somnus cibum concoquit.

Plenior cœna quæ.

hinc manifestum est: morbum enim facit οὐκ ἂν γὰρ τερφὴ παρὰ φύσιν πλείων, ut ait Hipp. 2. aph. A 17. εἰσέλθῃ τῷτο ῥῶσι ποιέι. id est: *Vbi cibius prater naturam plus ingestus est, hic morbum facit.* Et si quis denuo obiecerit, utcumq; somnum a cœna differam, tamē quando fieri nō possit, quin ad somnū cōuerfis, q; materia tū ad interiora tēdat, caput impleat: huic Gal. quidē respōdebit, qui lib. 4. aph. 67. ita scribit. καὶ μέντοι καὶ ὡς περ ἐπὶ τῇ τερφῇ κατενεχθέντες εἰς ὕπνον πλεονούτω τὴν κεφαλὴν, οὕτω καὶ ταῖς πλεονεξίαις διαδύσιν οἱ ὕπνοι πλεονύντες αὐτὴν βαρύνουσι τὸν ἐγκέφαλον. καὶ οἱ ὕπνοι δὲ δηλονότι διαπαντὸς ἂν ἐβλαπτον, ὅσον ἐπὶ τῷ σὺρρεῖν εἰς τὸ βάθος τε καὶ τὰ πλάγῃ τὴν ὕλην, εἰ μὴ τῷ τῆς πείρας λόγῳ πλείον ὄχη τὸ τῆς ὠφελείας, ὡς περὶ τῆς βλάβης ἐστὶν ἐκ τῆς ἐσω ῥοπῆς. hoc ē: *Et quidē sicuti a cibo ad somnū cōuerfis impletur caput, sic in plethoricis affectib. somni ipsum replētes aggrauāt cerebrū. Et somni videlicet semper nocerēt, quatenus ad p̄fundū & viscera materia cōfluit, nisi coctionis ratione plus afferrent utilitatis, quam sis damnum, quod ex motu ad interiora consequitur.* Et hæc ad vulgarem multisque communem errorem explodendum sufficiant, quod alibi plura etiam eade re dixerimus.

Pultem ex auena confectam, non sine magno errore & periculo agri, a nostra atatis Medicis febricitantibus, ac alijs eiusmodi morbis correptis, exhiberi.

CAP. XXII.

Auenatum.

Confectam ex auena pultem, *auenatum* hodie passim nominant, non tantum in febribus, sed omnibus ferme morbis a nostrę tempestatis medicis dari notius est, quā C ut multis demonstrari debeat: nihil enim æque in ore habent, atq; hoc, detur illi auenatum, cui parum aceti commixtum sit. Et dispeream si hodie in albo Medicorum esse reputetur, qui non mox ascitus ad ægrum auenę pultem comedendā præscribat, præsertim si febrib. eiusmodi æger correptus fuerit. Quantū a. a recta victus ratione, atq; adeo medendi methodo aberrant, facile iudicabūt, qui auenę tēperamentum atq; facultatē expenderint. Quod enim ad temperamētū rationē attinet, euidentissimū est eius pulvis esum febricitanubus non competere: iis enim Hippocrate teste. 1. aph. 16. victus humidus confert: auena vero non tantum sicca, sed calida quoq; existit, adeo ut hoc nomine veteres eius pulte ad cohibendam aluum etiam vti sint. Tettis est Diosc. qui li. 2. cap. 104. D ita scribit: πολλὰ δὲ ἐκ τοῦ βρώμου γίνεται σαλπικὸς κοιλίας, i. *Ex pulve auena aluum sistitur.* Cui subscribit Paulus Aegineta li. 1. ca. 79. iis verbis: *Auena calida est, & siccandi vim habet, exiguiq; alimentū est.* Et lib. 7. in hunc modum: *Auena similem hordeo vim obtinet, desiccet autē; & mediocriter sine mordicatione digerit. Adstringit quoq; nonnihil, quo fit, ut ventris diarrhœas persanet.* Quæ sane verba desumpta sunt ex libro sexto Gal. de simp. med. fac. vbi ita scribit: βρώμος ἐστὶ μὲν ἂν π τὸν ὁσπίον, ἀλλ' ὡς φάρμακον ὁμοίαν ἔχει διῶσιν κριθῇ κατὰ πλεονάζοντα γὰρ ἐνηλπίει καὶ διαφθορῇ κατελείβῃ καὶ ἀδύνητος. ἐστὶ καὶ θερμώτερον ἀπὲρμα τῇ κρύσει, καὶ πικρῇ σύμφασι ἔχει, ὡς τε καὶ τὰς κατὰ γαστέρα διαφθορὰς ὠφελεῖν. hoc est: *Auena unum ex leguminibus est, verum ut medicamentum similem hordeo vim habet. Nam illud desiccet & digerit mediocriter, & sine morsu. Temperiem autem habet paulo calidiorem, ac nonnihil adstrictionis obtinet, ut ventris profluvia iuuet.* Calefacere etiam auenam in libro primo de aliment. facultatib. Galenustestatur in hunc modum, περὶ βρώμου scribens: τοῦτο γὰρ ἀπὲρμα πλείον ἐστὶν ἐν αἰσῇ καὶ μάλα κατὰ τὴν ὑπερκειμένην περιέμεν μυσίαν, ἔνθα καὶ τύφαι καὶ ὀλῦραι πάμπολλαι γίνονται. τερφὴ δ' ἐστὶν ὑποζύγιον, εὐκ ανθρωπῶν, εἰ μὴ ποτὲ ἄρα λιμνῶντες ἐχάτες ἀναγκασθῶν ἐκ τούτου τοῦ ἀπέρματος ἀρτοποιήσθαι. θερμότητι δ' ἵκεν ὡς μετέχει καὶ τερφὴν ἐλάττωσιν παρὶ χει τῷ σώματι. quod est: *Hoc semen in Asia perfræquē est, & potissimum in Mysia qua Pergamo superiacet, ubi & typha & olyra uberrime est prouentus. Iumentorū magis pabulum quā hominū, nisi utiq; aliquando extrema fames hoc quoq; seminis in panes corrogare cōpellat. Multū calefacit, & minus quoq; corpus enutrit.* Ex quibus omnib. satis liquet, auenam febricitantibus nullo pacto cōuenire, primum quod calefaciat, deinceps a. q; ventrē cohibeat, quādo nihil æque illis obit, ac nō semper apertam habere aluum. Quid multa? cum contraria contrariis curentur, non potest febricitantibus exhiberi commode puls auenę, quod illa scilicet calida & sicca sit, atque adeo febris naturę per- F similis. Et quid opus est eiusmodi legumine ægros in cibo vti, quum, Galen. teste, iumentorum magis pabulū, quam hominum existat. Plinius quoq; scribit li. 18. ca. 17. quod frumenti vitium sit, ideoq; latenter Germaniæ populos notat, ac de barbarie inculat, quod auenę pultem edant, neq; alia pulte viuant. Hinc antiqui tantum extrinsecus eius farinam aut panem illinebant, & rarissime nisi ad sistendam aluum intra corpus adhibebāt. Id

Auenę tēperamentū.

Auenę febricitantibus non cōuenit.

A Id quod ex antea dictis abunde intelligi potest, & ex cap. 25. lib. 22. Plinii, ubi illius meminit prolixius. Sed tanta est hodie medicorum inscitia, imo cæcitas, ut nihil horum animaduertant.

LIBRI SECUNDI FINIS.

LEONHARTI FVCHSII PARADOXORVM MEDICINÆ, LIBER TERTIVS.

PRO OE MIV M.

B Vanto olim in honore habita sit anatome, vel hinc satis liquet, quod illam clarissimi Anatomes laus. quique non modo philosophi aut Medici, sed & patritij etiam, & prima nota viri, magna industria cognoscere studuerint. Testes sunt locupletissimi Flavius Boethus Romanorum consul, qui, ut Galenus libro primo anatomicarum administrationum scribit, tam anatomica speculationis amore flagrabat, quam mortalium, qui vixerunt unquam, nemo alius: in cuius etiam gratiam libros iam dictos Galenus composuit. Sergius denique Paulus Romanorum praefectus, vir, ut ait Galenus, tum rebus, tum disciplinis philosophicis per omnia praeceps, anatomen haud minori quam Boethus studio ut exacte perdisceret ambiuit, neque non raro, ubi sectiones ostenderet Galenus, adfuit. Quo autem illam studio sectari fuerint Philosophi, vel unus Plato, inter hos facile princeps, qui in Timæo nihil maiori studio agit, quam ut singulas corporis partes explicet: & post eum eius discipulus, quamquam mirifice in ipsum ingratus, etiam Aristoteles satis monstrare potest, quem libro primo de historia animalium humani corporis partes, earumque nomina docere simul & scribere non puduit. Cum itaque tot viri & rebus bellicis, & doctrina celebres, anatomes amore & immensa eiusdem utilitate compulsi quaslibet corporis partes tanta diligentia agnoscere conati sint, quanto magis medicis laborandum erit, ut hanc partem medicina recte perdiscant, qua ad accuratam artis cognitionem nihil est quod aequè conducere possit. Hac enim singularum partium situm, figuram, magnitudinem, usum, colorem, ordinem, duritiem, mollitiem, lenorem, contactum, processus deinde singulorum, & recessus, & siue quid inseritur alteri, siue quid partem alterius in se recipit, perdocet. Neque enim cum dolor intus incidit, scire quid doleat eum, qui qua parte quodque viscus intestinum ve situm sit, non cognouerit, possibile est. Neque curari id quod egrum est potest ab eo, qui quid sit ignorat. Et cum per vulnus alicuius viscera patefacta sunt, eum, qui sana cuiusquam partis fabricam & constitutionem haud nouit, quid integrum, quid corruptum sit nesciat oportet. Præterea quomodo tela extrahemus, continuata diuidemus, putrifica vitia & abscessus secemus, si ubi neruus aut musculus insignis situs sit, ubi arteria aut vena grandior, ignoremus? Hinc vere in arte medica cap. 74. Galenus dixit: ὅταν τις ἐν τοῖς ἀνθρώποις τῇ αἰσθήσει μάλιστα συντάξῃ πρὸς διάγνωσιν ἢ τὴν ἐξ ἀνατομῆς γινώσκῃ, ἢ τὴν ἐκ τῶν ἐνέργειων τε καὶ τῶν χειρῶν εὐρεῖται. ὅς τις οὖν διαγνωστὸς εἶναι βούλεται τὸν ὅς ἐστιν τὸν ἑσφαλμένον σμάτῳ, ἐν τοῖς ἀνθρώποις αὐτὸν γινώσκῃ, ἢ τὰς τῶν ἐνέργειων τε καὶ τῶν χειρῶν εὐρεῖται. id est: Constat quod plurimum ad eorum quae latent sensum confert cognitionem, ea quae ex sectionis inspectione habetur peritiam, & operationem atque usum inuentio. Quicunque igitur facultatem dignoscendi corpora lapsa consequi cupit, oportet ipsum in sectionibus ac operationibus & usu inuentionibus exercitari. Quam diligenter autem hanc partem medicina tractauerit Galenus, tot eius ea de re conscripti libri probe testantur. Eo autem maiori studio anatome perdiscenda erit, quo plus momenti in praesagijs exacta partium cognitio habet. Solemus enim non raro ex ea qua in parte corporis morbus sit praesagire, quemadmodum Galenus in libris de locis laborantibus pulcre docet. Proinde si corpus cartilagineum quod secundum asperam arteriam est, bronchion appellant, aliquando tussiendo exspuatur, maximum vlcus in pulmone esse iudicamus. Sic quoque cum intestini tunicam per dysenteriam deiectam anatomes peritus conspexerit, sitque latitudine & crassitudine ijs, quae a tenuioribus soluuntur, multo maior, non ab re ulcerationem in crassis intestinis consistere praedixerit. Quid multis moror? Anatome velut medicina fundamentum existit, quo sublato reliqua omnia corruiere necesse est. Atque hinc est quod illam Hipp. Galenus, ac alia veterum medicorum familia tantopere excoluerint. Atqui, prohi dolor, hoc seculo tanta est Medicorum socordia, imo temeritas & insania, ut hanc tanquam ad medicina cognitionem plane non conducentem penitus negligant atque contemnant, ita ut timor sit nonnullos etiam esse, qui principalem viscerum regionem non satis perspectam habeant. Hi autem hactenus intemporum infelicitatem, qua pauci, qui recte anatomica traderent fuerunt, culpam reycere potuerunt: iam vero emeriso Galeno

**Duodenū
intestinū.**

Obiectio dilatoria

Biliosam superfluitatem non ad ieiunum intestinum, quemadmodum Auic. putauit, neque ad Pyloron, ut alij quidam opinantur, sed ad duodenum potius confluere.

CAP. II.

Auicennae
de bilis mea-
tu cronica
sententia.

A Vicenna *Fen. 16. Can. 3. tract. 1. cap. 1.* de ieiuni intestini dissectione ita scribit: *Et portio alia abluitur ab eo ad illud quod est sub eo de intestinis, quoniam cholera citrana venit ex felle ad hoc intestinum, & est pura non permixta, quare est fortitudo ablutionis vehementer commouens virtutem expulsiuam cum mordicatione, propterea quod lauat & adiuvat ad expellendum ad inferiora per hoc quod commouet expulsiuam.* Quibus vniue verbis Auicenna satis innuit meatum illum, qui a vesica fellis biliosam ad intestina superfluitatem deferret, ieiuno implantatum a natura esse intestino. Quam sententiam Valescus etiam sequitur, qui *lib. 1. ca. 1.* B ita scribit: *Cistis fellis habet duos poros, unus illorum dirigitur ad medium hepatis, & alius dirigitur ad fundum stomachi. Et ab isto unus ramus descendens diuiditur in duas partes, quarum una dirigitur ad intestinum ieiunum, ut expresse ponit Auic. 14. tertij tract. 1. cap. 1.* Et alia pars mittitur ad intestinum colon, ut ibi faciat stimulationem. Sunt alii quidam, in quorum numero Alexander Benedictus existit, qui meatum illum ad pyloron peruenire arbitrantur. Libro enim *sua anatomes, 2. cap. 8.* ita de pyloro scribit: *Ad hanc portam fellis meatus pertinet unus.* Id quod *cap. 15.* apertius iis docet verbis: *Huic bini meatus sunt, aliter in medium iecoris deriuat, quo bilis attrahitur vel effunditur interdum, alter euidentior ad πυλωρον, id est ianitorum deferitur.* Errare autem omnes euidentissimum est ex iis, quae anatomes peritissimi scriptores tradunt: inter hos enim Galenus, earum rerum diligentissimus inquisitor, *lib. 5.* C *de usu partium* id ipsum satis monstrat, ita scribens: *πρώτη πάντων εντέρων η νήσις υποδέχεται την εν τῇ γαστρὶ χυλὸν θειάν τε καὶ πικρὴν τροφήν. ἡ δὲ νήσις δ' αὐτῆς πλεονέκτητον τοῦ ἡπατος, ἀγγείων δ' ἀμφοτέρων ἐστὶν ἐν αὐτῇ σωματι, τὸ τε χολαῖδες περιτόμιμα μικρὸν ἀνωτέρω, κατὰ τὴν ἐκ τῆς κοιλίας ἐκφυσιν οἱ χολαγωγοὶ πόροι καταφύσσουσιν.* id est: *Primum omnium intestinorum ieiunum suscipit in chylum versum & concoctum in ventriculo cibum. Situs autem eius est prope iecur, vasorum vero multorum in eo sunt ora. Adhuc biliosam superfluitatem paulo superius, secundum ipsum ex ventriculo exortum, bilis ductores meatus deferunt.* Et paulo post sic dicens: *μνησθέντες δὲ μοι διάπαντος ἀκούει τῶν ἐφεξῆς ἀρχομαι γὰρ δεῖξαι ὅτι μικρὸν προέσθιν ἀπὸ τοῦ χολαῖδους περιτόματος, ὡς ἐστὶν ἐκ τῆς γαστρὸς ἐκφυσιν ἀμεινον ἢν ἀπὸ συρρίν.* quod est: *Memor igitur horum semper, audi quae deinceps sequuntur. Incipio enim ostendere quod paulo* D *ante suspendebam ac differebam dicere, de biliosa superfluitate, quod ad ventriculi exortum melius erat eam confluere.* Id quod & in *lib. de temp. 2.* facit, ubi sic scribit: *οὐ πολλὰ μὲν πόρος ἀσπλούς ἐστιν, εἰς τὰ μετὰ πυλωρον τε καὶ νήσεως ἐκφυύουσιν, ὅ δὲ γαστρὸς ἐκφυσιν ὀνομάζουσιν.* id est: *ut plurimum quidem vnicus est meatus, in id intestinum, quod pylori & ieiuni medium est insertus, quod quasi ex ventriculo exortum nominant.* Et libro sexto *anatomicarum, administrationum* ita dicens: *ὁ ψῆσις δ' ἐυδῶς ἂν ἀκρεβῶς ἔχειν τοῖς κατὰ τὰς πύλας χυλοῖς, καὶ τὸν ἐκ τῆς χοληδόχου κύστεως πόρον εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς τῶν εντέρων ἐκφυύουσιν ἀκινέμενον, οὐ πολλὰ κατωτέρω τοῦ πυλωροῦ χολαυόμενον.* hoc est: *Mox utiq; accurate se habere* portarum regionem spectabis, meatum etiam ex bilis vesica ad intestinorum exorti initium peruenientem non multo inferius quam pylorus vocatus habetur. Ex quibus omnibus satis ostensum est, meatum bilem ad intestina deferentem non ieiuno, sed duodeno implantatum esse, a quo sane satis superque in ieiunum quod huic proximum est descendit, adeoque pro E prio meatu minime eger. Testis est Galenus libro quinto *de usu partium* in hunc modum scribens: *Διὰ μὲν γὰρ τὸ πλεονέκτητον τῶν ἀγγείων, καὶ τὴν ἐγγὺς τοῦ ἡπατος δέσιν, καὶ τὸ πρῶτον δέχεσθαι τὰ προέσθιντα, καὶ κενὸν τῇ ἡπατι παρχειν, πλείστη τε καὶ διὰ πλεονέκτητον ἢ ἐξ αὐτῆς ἀνάδωσις γίνεται. διὰ τὸ πλεονέκτητον εἶναι πρώτης τοῦ χολαῖδους περιτόματος εἰς τὸ ἐντέρον ἐκφυύουσιν, ἢ τῆς ἐνεργείας αὐτῆς σφοδρότης αὐξάνεται.* Propter multitudinem vasorum, & proximam iecoris positionem, & quia primum suscipit ea quae concocta sunt, & quia hepatis vacuo ea prabet, plurima & citissima ex ipso ieiuno fit distributio. Propterea vero, quia propinquum est prima illapsui & fluxui biliosae superfluitatis ad intestinum, actionis eius vehementia augeatur. Vnde iterum satis liquet, meatum illum deferentem ad intestina bilem non ieiuno, sed duodeno, implantatum esse: huic enim illapsui Galenus ieiunum propinquum esse ait, ita ut bilis pura, & nondum superfluitatibus aliis permixta, facile a duodeno quod pro F ximum est, ad ieiunum fluere queat. Hinc Galenus haud procul a praedictis verbis rationem affert nullam aliam, cur ad exortum eiusmodi meatus implantatus sit, nisi quod ita ex eo facile etiam ad reliqua intestina ut purgaret quae illic sunt crassa & viscosa, descenderet bilis, nec externo aliquo indigeret auxilio. Sed praestat verba eius subiicere: *ἐν δ' αὐτῶν ἐστὶν ἰαματόν, ἢ τῶν παχίων καὶ γλίσχρων ἀφαιρεῖν τε καὶ τέμνειν καὶ ἀπορρίπτειν διαμέγων προσφορά. ταῦτ' ἐστὶν τῆς*

Cur meatus
biliosus
duodeno
implanta-
tus.

Meatum bilem ad intestina deferentem non in omnibus geminum esse, ut Mundinus ac alij quidam arbitrantur, cum paucissimis quibusdam exceptis, omnibus reliquis unicus sit.

B

Mūdini de
bilis meati
falsa opi-
nio.

D

E

F

ἄλλῃς δὲν εἶχε χολῆς. ἔπεμψε γὰρ αὐτὸν ἐν τούτῳ τὸ χολῶδες ὑγρὸν ἐξ ὀχλαίνοντα πόρον οὐ μικρὰν ἐαυτοῦ μέγεθος εἰς τὸν πύλο- A
 ρον τῆς γαστρὸς ἀποπέμπειν, ὡς ἐπ' ἐνίων φαίνεται ζῶον. hoc est: *Alterum quidem vidi, cuius totus habitus*
pituitam praeseferbat, quotidie tamen bilem pallidam euomentem. Censui igitur inspicienda alui ex-
crementa, in quibus minimum bilis apparebat. Quare coniectura quadam deprehendi eum meatum,
qui biliosum euomit humorem, non minimam eiusdem partem ad imum ventriculi pyloroni seu iani-
torem effundere, ut in quibusdam apparet animalibus. Proinde etiam dictis abunde claret,
 meatum bilem ad intestina deferentem plurimum vnicum esse, in paucissimis autē gemi-
 num. Quod si vero geminus sit, maior ad duodenum, minor ad ventriculi fundum per-
 tingit. Accidit tamē ut & maior ad ventriculum perueniat, at rarissime. Friuola autem,
 imo ridicula, ac cachinnis multis explodenda ratio est, quā Mundinus ac alii recētiore B
 confinxere, quare opus sit alterum meatum pyloro inseri, ut scilicet concoctionē ven-
 triculi bilis eo defluens adiuuet, cum illam potius interturbet, cogatq; cibū pellere de-
 orsum, antequam plene & perfecte concoquatur. Hinc non negligētiā naturā adscri-
 bendum, q; meatum bilem ad ventriculum deferentem non fecerit, sed providētiā po-
 tius eius ac benignitati, quā modicum commodum quod ex hoc meatu erat cōsecutū-
 rus ventriculus, magnum euitare malum voluit, crebram videlicet ciborum euomitio-
 nem. Cuius rei locuples testis est Galenus qui libro quinto de usu partium in hunc mo-
 dum scribit: οὐκ οὐκ ὁμικρὸν, ὅδ' ἐπὶ τὸ τυχόν, ἢ φύσις εἰς ὑγρὴν τοῖς ζῴοις ἐκ τῆς ὀγκώσεως κατὰ φύσιν τῆς χολῆς δέχον
 πόρον προσήκοιτο. τί δὲ ἔστιν ἢ εἰς τὴν κοιλίαν αὐτῶν πρὸς μίαν ἐκείνου, ἢ ὀλίγα καὶ ἄνω ἀποκτείναν τὰ τοιαῦτα πε-
 ριτρώματα; ταῦτα καὶ πολλὸν εἰμὰς θανάτου ἂν αὐτῆς τὴν πρένοιν. ἡμεῖς μὲν γὰρ ἀπειροκτετότες ἀνόμεδα τὸ λυσι-
 πλὴν, εἰ καὶ τυχὼι ποτὲ μὴ ζῶντος εἰς ἑτέρη βλάπτῳ πεφυκός, ἢ ὠφελὲν εἰς ἃ χρῆζομεν. ἢ φύσις δ' ἐκ τῆς ἐν τῶν αὐτῶν ἐξ- C
 ὄχων ἀπειροκτετό, ὅδ' ὑπὲρ βαθυμίας ἐνίοτε μεγάλη κακὰ αἰρμένη δι' ἐλαττον ἀγαθόν, ἀλλ' ἀπειρὴ μῆτρος τὸ ποσὸν ἐν ἡ
 κρῶ κρῖνται, πολλὰ πλάσιον αὐτῶν τὸ χρεῖν ἐκτελεῖ. ἢ μὲν γὰρ ὅδ' ἐν ἐμμελῇ μέγα λυπὴν εἰς τὴν κοιλίαν ἡ ξαν-
 θή χολή καταρρέουσα, ἡ καὶ ὑπορεῖ (τῆς ὠφελείας ἢ φύσεως, ὡς ἐκ τῆς ῥύτης ἐφ' ἡμέραν τὸ γλίσχρον περιτρώμα παρέχον ἂν
 ἡμῖν ὁ χυμὸς ἔσθ'· εἰ δὲ τὸτο μὲν ἔτω μικρόν, ὡς διὰ τῆς ἐξ ὀχθῆς ὀγκώσεως ἰσχυρῶς ἐπαρῆσθαι δύναται. τὰ δ' ἐπὶ ὀμμελῇ
 τῇ τῶ καὶ πλινχῶ τῇ μὲν γὰρ ὡς ἀρδὴν ἀνατρέπεται τὸ τῆς γαστρὸς ἔργον, ἢ οἷα πῶς ὀχλαίνεται ὅτ' ἐκ αὐτῆς εἰς
 τὴν ἔτω προσήκοι μὲν αὐτῶν φύσιν, ἢ τῶν δικαίων ἐπαίων φθορῶν ὅτ' ἐκ τῆς πρὸς τὴν χολαίαν τῆς
 γ' ἔν' ἀρῶνται ξανθῆς χολῆς τὴν δύναμιν ἰσχυρῶς ὀγκώσαν ὑπάρχουσα δάκνυσαν τε καὶ ῥύτισαν ἀπανταστὶς δ' ἀποκεί-
 ναι ποτὲ γὰρ πλεονατῆς χυμὸν τῷτο, ἢ ἡδ' ἐκ τῆς πρὸς ἡμῶν ἐν τοῖς ἐντέροις δέξεται; τίς δ' ἐκ τῶν ὡς ἐμέτου χολῶ-
 δος ἄλλα τέσσαρα παθήματα καὶ καρδιαλίαν διῆξιν ὅσα εἰς ὀγκώσιν τῆς γαστρὸς ἐξ ἀνάγκης προσγίγνεται; καὶ μὴν εἰ γινώ-
 σκεται ὅσα ἢ τῆς ξανθῆς χολῆς δύναμις, ὅσα χαλεπὸν ἐξενεῖν, ὅπ' ἂν ἀνατρέψῃ τὸ τῆς γαστρὸς ἔργον. ἢ περὶ εἰς αὐτὴν συρ-
 ρέου, καὶ δ' ὅν γὰρ λόγον ἀρεστῶς ἐμπίπτει τοῖς πρῶτοις ἐντέροις ἐκ δὲ δάκνυσαν καὶ κοιλίαν μὲν ἐν αὐτοῖς τὴν τρεφὴν, D
 ἔτω καὶ τὴν κοιλίαν οὐαδ' ὅσοι τρεφὴν ὑπάρχουσα τῆς νήσεως, ἢ ἀνάγκη ἂν ἀποθῆναι τὴν τρεφὴν γὰρ πρὸς τὴν δύναι
 χαλῶς ἀπὸ πλάγ' ἐκκείνυσιν αἱ σφοδραὶ διῆξιν τὰ στήθια. Q. E. *Nō igitur parū neq; cōtingenter natura ad sani-*
tatē animalib. ex decēti applicatione meatus bile suscipiēdis puidit. Cur a. nō ad vētriculū inseruit e-
ius meatus aliq̄ partē, quū non paucas & ipse gignat huiusmodi superfluitates? Hinc & magis, puto,
miraberis eius puidētiā. Nos n. magis temere eligimus quod confert, quāuis interdum soleat magis
nocere alijs, quā conferre ijs, quibus egemus. Natura autē ne in vno quidē suo opere temeraria est, neq;
per negligentiam quandoque magnum malum eligit, propter minus bonū, sed exacta mensura quan-
titatem in vnoquōq; discernens, quod multifariam vtile est, prauī respectū, semper efficit. Si enim
nulla magna molestia debebat afficere bilis flaua in ventriculum influens, male neglexit commodita-
tem natura, quam abstergendo quotidie viscosam superfluitatem nobis humor ille prabuisse. Si vero
hoc quidem commodum ita paruum est, ut per auxilium extrinsecus allatum sufficienter corrigi pos-
sit, mala vero, quae sequuntur influentem ventri bilem tam magna sunt, ut funditus euertatur ope-
ratio ventriculi, nescio qualiter non erit aliquis admodum ingratus erga naturam, quā ita illypsi pra-
uidit, aut valde inuidus iustarum laudum, si quam deceret laudare, eam incuser. Quis deniq; igno-
rat flaua bilis vim satis acrem exsistere & mordentem, abstergentemque omnia? Quis autem excer-
nens aliquando inferne copiosum hunc humorem, non sensit precedere intestinorum mordicationē?
Quis vero non nouit, quod vomitum biliosum, tum alia quadam vitia, tum mordicatio oris ven-
triculi necessario praecedit? Et nimirum si ab omnibus flaua bilis virtus agnoscitur, non difficile est
inuenire totum ventriculi opus subuerti, si ad illum confluxerit. Qua enim ratione bilis pura primis
intestinis incidens, irritat mordicans, & prohibet ne in eis maneat cibus, eadem & ventriculum, ut
qui exactiore sensu sit praeditus quam ieiunum, cogeret utiq; quo cibum deorsum pelleret, priusquam
bene concoqueretur. Incocta enim excernunt cibaria velida mordicationes. Hanc Galeni senten-
tentiam confirmant etiam ea, quae scribit Auicenna, iuniorum medicorum numen &c
idolū, dum Fen. 15. Can. 3. tract. 1. ca. 1. ita inquit: Et plurib. hominib. est meatus vnus cōtinuus cū
duodeno. Et paulo post: Et nō fuit creata in plurib. fellib. via ad stomachū, ut lauaretur humiditates F

Jejunum non eandem quam rectum intestinum habere rectitudinem, quemadmodum Razes, Mundinus, ac alij quidam putant.

F *Fem. 16. Can. 3. tract. 1. ca. 1. idem ostendit, sic dicens: Et pars in. e. l. in quod sequitur duodenum, nominatur ieiunū, & in hac parte est initium circumuolutionis & circutionis. Auctor etiam librorū de inuamentis membrorum, neq; enim Galeni est, sed alterius cuiusdam, qui librum Galeni de usu partium in cōpendium redigere voluit, lib. 6. ca. 2. iam dictis cōsentit, in hūc scribens modum: Et providentia creatoris indigentia illarū venarum & nervorum loco amplo nō posuit in primo intestino inuolutiones, sed locauit ipsum recte extensum super dorsum. Et cum stud*

*intestinum pertransit ad paruum remotionem inuoluebatur, & pars inuoluta ex intestino dicitur ie-
iunum.* Itaq; sole clarius, Razem ac Múdinum hallucinatos esse, quod ieiunum circum-
uolutionibus plane destitutum scripserint. Neq; Mundinum suum Carpus ille Bono-
nienfis ab errore vindicare potest, dicens, *id intestini parte superiore esse rectum, inferiore ve-
ro implicitum.* Nam rectum in vniuersum Mundinus stare ait. Razes etiam rectum esse
sicut vltimum intestinum, quod tam superiore quam inferiore parte anfractibus caret,
esse asserit. Ita pauci Arabum & recentiorum fuerunt, qui anatomica recte tradiderunt,
sed fere omnes in scribendis anatomicis turpiter lapsi sunt. Proinde diligenter admoni-
tos velim studiosos, vt Galeni & aliorum, qui nostra ætate anatomen illustrarunt, libros
diligenter perlustrant. Et certe nulla alia causa factum est, vt tot in anatome hodie cõ-
mittantur errata, nisi quod Græcorum veterum libris prioris seculi Medici caruerint, B
quos hodie renascentibus vndique bonis auctoribus, Dei benignitate, Vesalius & alii
sarcire conati sunt. Vtinam autem omnia veterum anatomica haberemus, ita enima-
liorum opera facilius careremus. Quam multa vero horum perierint, ex libro Galeni,
quem *de proprijs libris* scripsit, sciri potest.

*Ad ileon siue tenue intestinum non plures pertingere venas, quam ad vllum aliud intestino-
rum, id quod tamen Mundinus præter veritatem asserit.*

CAP. V.

MVndinus de ileo inter cetera sic scribit: *Ad ipsum perueniunt plures vena mesaraica,
quam ad aliquod aliud intestinum.* Mundini sententiæ subscribit Carpus, qui de ileo
in eum scribit modum: *In isto intestino sunt plures mesaraica, quam in aliquo alio propter suam
longitudinem.* Sed quantum a vero deuiauerit vterq; facile deprehendet, qui veterum,
Galenii maxime, ea de re sententiam paulo diligentius excusserit, tum enim ad intesti-
num, quod ieiunum nominant, multo plures quam ad ileon venire venas intelliget. Is
enim li. 6. admin. anat. ita scribit: τούτω δ' ἐρεῖς ἐστὶ τὸ λεπτόν, καὶ τὰ μὲν τὴν οὐρίαν ταυτὸν τῷδε. ὁ δὲ φέρον
δὲ τῷ τε μήτε κενὸν ἐνείπεται, μήτε τοσούτων ἔχειν ἀρχίων πλεονάζει. id est: *Inde tenue intestinum est, substan-
tia huic simile. Differt autem, quod neq; vacuum reperiatur, neq; tot vasis scatet.* Quibus verbis
aperte admodum testatur Galenus, ieiunum vasorum multitudine vincere ileon, quod
non tot sicut ieiunum vasis scatet. Id quod confirmat libro quinto de usu partium, sic dicēs
πρώτη πάντων ἐντέρων ἡ νῆστις ὑποδέχεται τὴν ἐν τῇ καρδίᾳ κυλωθεῖσαν τε καὶ περθεῖσαν τροφήν. ἡ δὲ νῆστις δ' αὐτῆς πλεονάζει
τοῦ ἡπατός, ἀρχίων δὲ παμπόλων ἐστὶ ἐν αὐτῇ σύματα. quod est: *Primum omnium intestinorum ieiunum
suscepit in chylum versum & concoctum in ventriculo cibum. Situs autem eius est prope hepar, vaso-
rum vero multorum sunt in eo ora.* Sic & lib. 6. lib. r. meth. cap. 4. ieiunum multo plures habe-
re venas innuit, dum ita ait: ἐνίαια μὲν οὖν τὰ ποχέα τῶν ἐντέρων, διπλαστέρα δὲ τὰ λεπτά. παντάπασιν δὲ
ἀνίατα ἡ νῆστις, διότι τὸ πλεονάζει καὶ τὸ μέγεθος τῶν ἀρχίων, καὶ τὸ λεπτόν καὶ νεῖρεσθαι τοῦ χιτῶνος. hoc est: *Crassa
quidē intestina facilia sanata sunt, ecō rario d' fficilia quæ tenuia sunt. Ieiunū tamē omnino incurra-
bile est, v̄ ppter multitudinē magnitudinēq; vasorum, quod tunica eius prætenus nervosaq; sit.* Au-
ctor deniq; librorū de iuuamentis membrorum lib. 6. cap. 2. idem attruit, dicens: *Intestinum
ieiunum est propinquum hepati, ac pertingunt ad ipsum multarum venarum ora. Et bilis flaua de-
fluit per suos meatus in primum, quod super ipsum est. Et quia istud propinquissimum hepati inter o-
mnia membra, quando hepar caruerit cibo, & fuerit vacuatum ab eo, capiet eum ex propinquiore sibi
loco, scilicet, ab intestino ieiuno, & a venis cum attractione.* Sed nemo apertius Mundini erro-
rem confutat quam Auic. qui Fet. 16. Cap. 3. tract. 1. cap. 1. in eam scribit sententiam: *Et
nominatur hoc intestinum ieiunum, quoniam ipsum inuenitur secundum plurimum vacuum & in-
anatum, & causa in hoc est connexio duarum rerum, quarum una est, quoniam illud quod attrahitur
ad ipsum de multitudine chyli, velociter separatur ab eo, portio namq; eius attrahitur ad hepar, quo-
niam plures venarum mesaraicarum continuatæ sunt huic intestino, quoniam hoc intestinum est p-
pinquius hepati, quam alia intestina. Et no. est in aliquo intestinorum aëramis mesaraica, quantum
est in eo.* Ex quibus omnibus abunde liquet, & testium multitudine, rationeq; ipsa, de er-
rore conuictos esse & Mundinum & huius inter pretem Carpum. Ieiunum enim inte-
stinum cum iecori valde vicinum sit, fieri non potest quin vasorum ad ipsum pertingen-
tium multitudine reliqua omnia vincat intestina.

*Stercora seu alui excrementa in ventriculo non generari, vt Auicenna ac alij nonnulli hunc se-
quentes sentire videntur.*

CAP. VI.

- A** Vicen. Fen. 16. Can. 3. tract. 1. cap. 1. de intestinorum anatomie in hunc modum scribit. Penetranti in meri non attribuitur ex virtutibus naturalibus nisi virtus una. Penetrans autem in intestino, primo patitur a duabus virtutibus, quarum una est expulsiva, qua est in stomacho, & altera est attractiva, qua est in intestinis, & adiuvat eam fax, qua provenit propter summam cibi, & fit facilis propter illud expulsio per viam temperata amplitudinis. Quibus verbis postremis manifeste Auic. satis innuit se in ea esse sententia, ut fæces seu stercora in stomacho generari putet: euidenter enim ait, ut attractiva duodeni & aliorum intestinorum, faciem a stomacho expulsam attrahi. Quæ etiam verba Gentilis enarrans, ita fæces ab intestinis trahi, sicuti a vesica urinam scribit. Cum tamen Gal. in lib. 4. de usu part. & multis etiam aliis locis, testetur, intestina nullam plane attracticem habere facultatem, quod scilicet villis re-
- B** ctis, per quos attractio fit, careant. Præsertim vero lib. 3. de fac. natu. vbi sic scribit: ἐκαστὴν μὲν τῶν ἐντέρων σεργγύλαι καὶ ἐκάτερον τῶν χιτώνων αἰνὴς εἰσι, πειρᾶλλοντα ὃ μόνον, ἔλκυσιν δ' ἔδεν. ἢ γὰρ καὶ δὲ τῶν ἰσθμῶν τῆς μὲν εὐθείας ἔχει, καὶ οὐδ' ὅλῃς, τὰς δὲ ἐγκυρσίας ἐνεκα πειρᾶλλοντα. quod est: Singulis quidem intestinis circulares in utraque tunica fibra sunt. Contrahuntur enim duntaxat, nec quicquam trahunt. At ventriculus alias fibrarum rectas habet, quibus scilicet trahat, alias transversas, quibus constringat. Auicen. opinionem sequitur Iacobus Forliuensis, qui 2. particula aphor. quærens in quo loco corporis fæx vel egestio suam recipiat formam, ita scribit: Stercoris forma substantialis in corpore naturaliter disposito, & debite recto acquiritur in stomacho. Separatio autem & depuratio facis a chylo, & accidentalium dispositionum acquisitio, quibus fax a chylo discernitur, acquiritur in intestinis. Quibus utrique verbis manifestissime indicat, stercora suam
- C** formam substantialem seu essentiam prius in stomacho, ac deinde accidentalem, hoc est, figuram & colorem in intestinis acquirere. Quod si enim in intestinis per depurationem atque separationem tantum a chylo, ut ipse inquit, fiunt stercora, certo certius est eorundem essentiam in ventriculo prius esse procreatam, alias namque a chylo iam segregari non possent: Cuius sententiæ quoque fuisse videtur Alexan. Benedictus lib. 2. cap. 7. vbi scilicet ait, excrementa in colo intestino diutius immorari, atque ibi quandam effigiem suscipere. Verum falsum docere omnes, quis est qui vel a limine medicinam solidam saluauerit, qui nesciat? Satis enim constat, quouis tempore in sanitate integra fruentibus hominibus secundum utrasque formas in intestinis generari stercora per alterationem, quæ ad substantiam terminatur. Materiam quidē, ex qua fit stercus, in ven-
- D** triculo gigni fatemur, nondum tamen esse stercus dicimus, donec ad tenuia intestina proveniat: perinde ut materiam urinæ in ventriculo ex cibis & potibus generari concedimus, nec tamen urinam adhuc esse dicimus, donec in renibus formam suam substantialem recipiat. Quod autem non in ventriculo, sed in tenuibus magis intestinis generetur stercus, testatur Gal. qui lib. 3. de fac. nat. sic scribit: διδινεται ὃ ἐν αὐτῷ περὶ εἶναι, ὥς ἔδεν εἰς τὴν ἐναντίαν ἀδρῶος μεδίσταται ποιότητι. πῶς οὖν ὁ ἀρτὸς αἷμα γίνεται, πῶς δὲ τὸ τεύτλον, ἢ ὁ κύσμις, ἢ πτῶν ἀλλων, εἰ μὴ περὶ τὴν πναιτέραν ἀλλοίωσιν ἐδέξατο, πῶς δ' ἢ κόπρος εὐδὺς ἐν τοῖς λεπτοῖς ἐντέροις ἀδρῶος γενηθήσεται, ἢ ὃ ἐν τοῖς σφοδρότερον εἰς ἀλλοίωσιν ὅτι τῶν κατὰ τὴν γαστέρα, πότερον τῶν χιτώνων τὸ πλεόνος, ἢ τῶν χιτύνοντων σπλάγχων ἢ πειρᾶται, ἢ τῆς μόνῃς ὁ χυλὸς, ἢ συμμῶς τις ἐν τοῖς θερμαῖς δερμασί, καὶ μὴν κατ' ἔδεν τέτων πλεονεκτεῖ τὰ ἐντέροις τῆς γαστρός. π. ποτ' ἔν ἐν μὲν τῇ γαστρὶ νυκτὸς ὅλης πόλλας μείαντα τὸν ἀρτον, ἐπὶ φυλάττειν βέλονται τὰς ἀρχαίας διστάζοντα ποιότητις. ἐπειδὴ δ' ἀπαλὴ ἐμπέσει τοῖς ἐντέροις εὐδὺς γίγνεται κόπρος, quod est: Mor-
- E** stratum namque supra est, nihil in contrariam qualitatem totum simul migrare. Ergo quomodo sanguis ex pane? quomodo ex betafabane, aut reliquis id genus, nisi hac alteram prius mutationem sine adepta? Iam quomodo in tenuibus intestinis confestim stercus fiet? Quid enim in his efficacius ad alterationem existit, iis que sunt circa ventriculum? Num tunicarum numerus, an circumpositorum viscerum vicinitas, an mora spatium, an innatus quidam in instrumentis calor? Atqui nullo horum superant intestina ventriculum. Cur igitur vbi panis tota sæpe nocte moratus est in ventriculo, etiam servari eum volunt, ac pristinas suas qualitates tueri, vbi semel intestinis incidit, statim effici stercus? Quibus sane verbis Gal. abunde monstrat, stercora in tenuibus fieri intestinis, non quidem per separationem atque deputationem a chylo, ut Forliuensis putat, sed
- F** per alterationem potius quæ ad substantiam terminatur: oportet enim ut prius alteram quandam mutationem quam stercus fiant, adipiscantur, id quod iterum eodem libro testatur Gal. ita scribens: ὃ δ' ἐν τῇ μὲν στήθι τὴν ἀρχαίαν ὑπαλάττει ποιότητι ταχέως ὕψως, ὥς τ' ἐπειδὴ ἐμπίσῃ τοῖς λεπτοῖς ἐντέροις εὐδὺς εἶναι κόπρον, id est: Non enim profecto cibi ipsi adeo celeriter priorem qualitatem deponunt, ut protinus, postquam in tenuia intestina descenderint, stercus fiant. Quasi dicat: opus esse & in tenuibus intestinis mutatione prioris qualitatis, ut stercus fiant. Ita ut plane constet

mentum fit in stomacho generari stercora. Galenus denique *lib. 5. de usu partium corporis A* humani rationem indicans, cur ieiunum intestinum dictum semper vacuum existat, inter cetera sic scribit: σφοδρέστες δ' ενεργείας ποσὶ γίνονται μὴ πῶς τῆς χολεῖς μίμνχμῆνς τοῖς περὶ τὸμάσας, ἀλλ' ἐν περὶ τῆς ἀνέστου καὶ αὐτὸς τὸς χιτῶνας τῶν ἐντέρων, καὶ δακνύσιν αὐτὰ, καὶ ποσὶ τὴν ἐκκρίσιν ἐρεδίζουσιν, hoc est: *Vehementior vero actio efficitur, quando bilis nondum permixta est excrementis sed adhuc circumfluit pura secundum ipsas intestinorum tunicas, mordetque ipsa & ad excretionem excitat.* Si vero bilis, quæ adhuc ab excrementis pura est, ad ieiunum confluit, quomodo verum esse potest stercora seu excrementa in ventriculo procreari? Hinc Auicennam quoque sibi contradicere necesse est, quum loco iam læpius citato probat secundum in ordine intestinum semper vacuum reperiri, quia videlicet cholera citrina venit, ad hoc intestinum pura, hoc est impermixta fæcibus, ita enim Auicennæ interpretes exponunt. Nam si fæx, iuxta huius alibi sententiam, chylo commixta trahitur ab intestino duodeno, a quo statim descendit ad sequens intestinum ieiunum nominatum, quomodo poterit cholera citrina pura, hoc est, impermixta fæcibus, peruenire ad intestinum ieiunum, in quo inuenit fæces chylo commixtas, sicuti & in aliis sequentibus? Neque enim possunt dicere integram fæcem a chylo separationem fieri in intestino, duodeno nominato, qui asserunt fæces chylo permixtas usque ad monoculum & colon quoque peruenire. Præterea stercus in ventriculo non gigni, vel inde colligi potest. Si enim in ventriculo generaretur stercus, tunc homo quotidie vomeret stercus, quotidie etiam singultiret, haud aliter quàm ileosus, cui eiusmodi symptomata nulla alia causa eueniunt, nisi quia stercus ad ventriculum ascendit. Testis Hippocrates 7. *aphor. 10.* sic inquit: ἐπὶ ἐν σπλάγχμῳ ἢ λυγρῷ, quod est: *In ileo vomitus aut singultus.* Et Galenus in eius sententiæ explicatione, sic scribens: ἐν τοῖς ἐν τοῖς ὑδρὶν ὑπερέχεται κατὰ τὸ τῶν ἰδίων ἀρρέων τῶν πᾶσι, ἡμεῖς δὲ ἐκ αὐτῶν συνέστιν, ἀλλ' ὅταν ὁλεθρίως ἐχθροσιν, εἰ πλείον δὲ παρὰ τὸν τῶν χυλῶν ἀνταρρέεται καὶ λυγρῷ, id est: *In ileis nihil exit per inferiora, & hoc est proprium in separabile affectus. Vomitus autem non semper adest, sed quando exitiales sunt, & si vehementius distorqueantur, stercus eis ascendit, atque singultunt.* Proinde si eiusmodi symptomata stercus ab intestinis ad ventriculum ascendens efficere potest in ileo, quid prohiberet, cur non eadem efficeret in ventriculo procreatum? Porro si in ventriculo stercus generaretur, minime necessarium foret, ut in ileo stercus ad proximiores superiacentium intestinorum partes expelleretur ad ventriculum, adeoque totum tenue intestinum pertransiret, si prius suā habuisset in eo generationem. Sed quid opus in re manifesta temere verba fundere, cum nemo hodie sit paulo eruditior, qui non errare Auicennam suosque ea in re sequaces intelligat.

Mesenterium falso a quibusdam inter intestina connumerari, quum peculiare potius ab iis membrum sit.

CAPVT. VII.

Macrobii *lib. 1. de somnio Scipionis*, mesenterium inter intestina iis verbis connumerat: *Intestina principalia tria, quorum unum dissipium vocatur, quod ventriculum, & cetera intestina secernit: alterum medium, quod Græci μεσεντέριον dicunt.* Quem imitatus est Alex. Benedictus *lib. 2. sua anatomes c. 8.* sic scribens: *Graciliora deinceps intestina ventriculo annexa sunt. Horum primum quod tenuius vocatur, in sinus tortuosos vehementer implicitum est & orbes, & intestino quod medium Latini, Græci μεσεντέριον καὶ μεσόν τέριον vocant, singuli connectuntur.* Ex quibus utriusque verbis manifestum fit, utrunque mesenterion inter intestina Benedictum numerare, cum tamen omnium consensu sex tantum intestina sint, & recenset illa Galen. *lib. 5. de usu part. hum. corporis* in hunc modum: πρῶτον μὲν τὴν ἐκφυσιν, δεύτερον δὲ τὴν νῆστιν, τρίτον δὲ τὸ λεπτὸν ἐντέρον, καὶ τέταρτον τὸ τυφλόν, καὶ πέμπτον τὸ κῶλον, καὶ ἕκτον τὸ ἀπενδυσμένον. id est: *Primum est exortus, secundum ieiunum, tertium tenue intestinum, quartum cæcum, quintum colon, sextum rectum.* Et *lib. 6. de anat. administ.* hoc pacto: πρῶτον μὲν ἢ ἐκφυσιν, μετὰ δὲ ταῦτί τινος ὀνόματι νῆστιν, ὅπ κενὸν αὐτὸ τροφῆς εὐερίσκειται. τὸ τέτρω δὲ ἐφ' ἑξῆς ὅτι τὸ λεπτόν. ὅπ τὸ τέτρω δὲ τὸ τυφλὸν καλούμενον. ἔπειτα τὸ κῶλον. ἐφ' ἧς τὰ πέρας αὐτῆς ἔδρας ὁκτέταται τὸ ἀπενδυσμένον ὀνομαζόμενον ἐντέρον. hoc est: *Primum itaque exortus. Ab hoc quod ieiunum nominant, quia semper inane est. Inde tenue intestinum est. Deinceps cæcum appellatum. Postea colon. Ab hoc in extremo rectum intestinum ad sedem usque porrectum est.* In quorum sane catalogo mesenterii nulla penitus mentio fit, neque mirum cum peculiari quædam ab intestinis corporis pars sit, illa ipsa dorso alligans copulan sue. Quare mēlen-

- A**re mesenterion nomen non ideo apud Græcos sortitum est, quod sit medium intestinum, quādoquidem in numero intestinorum non habeatur, sed potius quod in medio intestinorum collocatum sit, adeoque nomen illi a situ factum est. Vocatur autem alio etiam nomine *mesaraion*, quod omnes, quæ ad ipsum ex iecore feruntur venas, cum adiacentibus arteriis & nervis, circumquaque ambiat & complectatur. Variusque rei locuples testis est Galen. qui *lib. 6. de anat. administ.* ita scribit: τὸ μεσεντέριον ὃ καὶ μεσάραιον ὀνομάζουσιν, ἀπὸ τῶν συμβεβηκότων αὐτῷ τὰς περιτρίβειας ἀμφωτέρας διασώμενοι. μεσεντέριον μὲν ἀπὸ τῆς διείσεως. μεσάραιον δὲ ἀπὸ τῆς οἰκίας ὑσίας. μέσον τε δὲ τῶν ἐντέρων, καὶ πᾶσας ταῖς ἡπατὶς εἰς αὐτὸ καταφερόμενας φλέβας, ἅμα ταῖς παρακινέμεναις ἀρτηρίαις τε καὶ νέρveis ἐν κύκλῳ περιλαμβάνει, καὶ διὰ τούτων τῶν ἐντέρων. quod est: *Mesenterion* quod etiam *mesaraion* appellant, viroque nomine ab accidentibus ipsi indito, *mesenterio* quidem a si-
- B**iu, *mesaraio* autem a peculiari substantia, nam & medium inter intestina situm est, & omnes venas ex iecore in ipsum descendentes una cum vicinis arteriis & nervis in orbem complectitur, quemadmodum intestina singula. Ita & Mundinus mesenterion ab intestinis distinguit, quemadmodum omnes alii, qui anatomica scripserunt, ut omnium sit evidentissimum aberratisse Benedictum, quod inter intestina mesenterium numerauerit. Libentius autem eius hominis errata refero, ne scilicet huius auctoritas improuidis imponat. Scio enim eius libellum omnium hodie in manibus versari, quod nemo præter hunc ex recentioribus elegantiarum studiosius fuerit, qui anatomica tractauerit.

Venas nullas per quas fœtus in utero urinam emittit, in suminis seu abdominis extremam cutim terminari, quemadmodum, præter omnem rationem & sensum, Mundinus & Alexander Benedictus docent.

C

CAPVT VIII.

- M**undinus de anatomia ventris inferioris inter cetera in eam sententiam scribit: Quarto est pars que vocatur *sumē*, infra umbilicū per quatuor digitos, & est pars in qua vena quedā terminatur ad cutim, per quas pueri in matrice exsistentes emittunt aquositate. Et ideo, ut dicit Auicenna, tales venæ & talis pars notior est in non natis quam in perfectis, ut ego monstraui multoties. Quam Mundini sententiam, sequitur etiam Alexander Benedictus in *lib. 2. cap. 3. sue anatomies*, ita scribens: Pars qua infra umbilicum situm habet, *sumen* dicitur, ab antiquis abdomen, venas prætenues habet, subter cutem dispersas, quibus in utero conceptus aquas emittit. Quæ sane sententia quam erronea sit, mox ostendemus, ubi primum, quid sit *sumen* explanauerimus. *Sumen* anatomicis id est, quod Græci *ἐντρίσιον*, Latini *Sumen abdomen* appellant. Est autem ea pars, quæ a pube sursum versus ad præcordia peruenit. Et complectitur in teilia, umbilicum, & ventrem imum, id quod testatur Galenus *lib. 2. aphorif. comment. 35.* sic scribens: ἡ τε γὰρ ἐξ ἰδίας ὀνομαζέται τὸ ἐντρίσιον τῆς γαστρός, ὅσον δὲ μετὰ τὸ αἰδοῖν. καὶ τὸ ὀμφαλῶς εἰς τεῖλα τὰ ταυτα διακρίνεται τὸ σπικαι ἐντρίσιον, τὸ ὑποχόνδριον, τὰ ἐπὶ τὸν ὀμφαλόν, καὶ τὸ ἥπειρ, id est: *Imum ventrem* proprie nominat partem ventris *imam*, qua umbilicum ac pudenda inieritacet. Ita ut in hac tria totum abdomen diuidatur, in *ilia*, ad umbilicum attinentia, & *ventrē imum*. Mundinus vero & Alexand. ab usu vocabulo *suminis* seu abdominis, eam partem, quæ digitorum quatuor spatio infra umbilicum est, dixerunt, atque totius vocabulum perperam parti accommodarunt. Quibus iam expensis, facile erronea illorum de urinae fœtus in utero emissionem sententia explodi potest: nemo enim est, qui Galenum paulo diligentius excusserit, qui nesciat porum quendam esse secundum umbilicum vrachum dictum, qui ex fundo vesicæ fœtus exportat urinam ad membranam alantoidea nominatam. Sunt enim fœtui undique membranæ circumpositæ, quemadmodum pulcre Galen: *lib. 15. de usu part.* monstrat, ita scribens: ὅσα ἢ περὶ τὸ κύμανον ἐπὶ ζῶον ἢ φύσει φιλοπετρῶν διαπλάττουσι τε καὶ τερεῖν καὶ πνύμα παρὰ τῆς μητρός ἐπάγουσα, καὶ χώρας τοῖς περιτρίβουσιν ἐντερεπίζουσα, καλεσθὲν μὲν ἐσμὴν ὅτι σαφὲς ὁφείδεται καὶ μὴ ἀκριβὲς διὰ τῶν ἀνατομῶν ὑδρίας ἀναδίδει διακρίνεται τὸν διασώμενον. ὁ φανερὸν γὰρ αὐτῷ πανταχόθεν ὑμὴν περιβέβηται λεπίδος. ἐν ἀγνῶν ὀνομάζουσιν, ἐκτελέμενον τὸν ὅσον ἰδρῶτα τοῦ κυομένου, τοῦτο δὲ ἐξ ὅθεν ἔτερον ὀφείδεται λεπίδος, ἐν ἀλάνθῳ δὲ περιτρίβουσιν. εἰς τὴν κύσιν αὐτῷ ἀντρίτρηται ἀδρῶν.
- F**ζω: ἐν τῷ σπικαίῳ ὅτῳ ἀχρὶ τῆς ἀποκνήσεως τὸ ὅθεν ἔτερον τὸ κύμανον. τοῖς δὲ ἐξ ὅθεν ἐν κύκλῳ περιβέβηται τὸ χωρίον, ἀπασιν ὑπαλείφον ἐνδοτὴν μῆτραν, ὡς μηδὲ μὲν φαίνεται αὐτῆς ἰδὲ ὑποκείμενον, καὶ διὰ τούτου μέσον συνάπτεται τῇ μητρὶ ἰδὲ κύμανον. ἐξ ἑνὸς δὲ σώματος ἰδὲ εἰς τῆς μητρός ἐκτρίβον ἀγγείων. δι' ὧν περὶ καὶ ἰδὲ κατὰ μέδον εἰς αὐτὴν ἐφείρτο, γινώσκει παρὰ τὸ ἰδὲ κύμανον καὶ ἐπὶ τῶν ἀγγείων, ἀρτηρίαν μὲν ἐπὶ τῇ ἀρτηρίᾳ σώματι, φλέβας δὲ ἐπὶ τῷ τῆς φλέβας ὡς τὸ ἐνδοτὴν ἀεὶ μὲν ἴσα τὰ γινώσκοντες εἰσὶν τῆς μητρός περιτρίβον σώματι. συνδίδει δὲ οὐδὲν πρὸς ἀλλήλα λεπίδος μὲν ἰδὲ ὡς δὲ ὑμὴν. ἐξ ὅθεν τὸ περιτρίβον ἀπασιν τοῖς ἀγγείοις, καὶ τῶν ὑπερῶν τοῖς ἐν τοῖς μέρεσιν ἐμφορῶν ὅτῳ οὐ μὴν. μάλιστα μὲν δὲ τῶν ἀγγείων ἐκτρίβον ἵνα πρῶτον ἐκφύεται τῆς μητρός, ὅσον δὲ ὅθεν ἐκτρίβον τῶν εἰς τὴν γῆν κατὰ πόντον

424 Operum Leonhardi Fuchsi Pars IV.

περιεχόμενα. περιεχόμενα δ' ὅληρον εἰς ταύτον ἀλλήλοισ ἐρχεται καὶ αὐτὸν διασπῶν, καὶ πᾶσι ἐν ἑαυτοῖς γενόμενον πάλιν Ἀ
ἐκείνων ἕκαστον ἐκείνῃ τῶν ὁμηγμένων εἰς ταύτον ἀεικνέται. καὶ τὸ τοῦ πατρὸς γινόμενον ἀχρὶς ἀνέως δύο μεγάλα συσταθῆ
πάντα τὰ μικρὰ, καὶ διὰ πῆρπα πρέμνα ἰερούμενα τῷ κυμένῳ διὰ τὸ κατὰ τὸν ὁμφαλὸν χωρεῖν, τίτλας δ' ἐν ἐταῖς
τὰ πᾶσι ὄντι ἀγγεία, δύο μὲν ἀρτηρίαι, δύο δὲ φλέβες. quod est: Quaecunque circa id animal quod utero ad-
huc geritur, natura machinata est, tam confirmando, quam nutrimentum & spiritum ad matri-
cem inducendo, & loca excrementis apta preparando, difficile quidem est liquido exponere. Sed
quando videntur exacte per dissectiones, videntem mirari mox cogunt. Toti enim ipsi factui vndi-
que membrana circumposita est tenuis, quam agnion vocant, suscipiens id quod est veluti sudor fa-
ctus. Huic autem foris alia superiacet tenuior, quam allantoidea nuncupant, in vesicam eius perfora-
ta. Aceruat vero in seipsa etiam hac usque ad partum, id quod est velut urina factus. His autem ex-
trinsecus in circuitu apposita est secunda, totam subiungens sublinensue internam uteri partem, ut B
nulla parte tangi queat a subiacentibus, & per hanc mediam factus matri copulatur. In uno quoque
enim ore peruenientium intra matricem vasorum, per quae & menstruum in ipsa ferebatur, aliud
vas tempore quo factus utero gestatur, generatur, arteria quidem in ore arteria, vena vero in ore ve-
nae, ut sint ea quae generantur numero aequalia oris, quae intra uterum finiuntur. Colligat autem ea
in vicem subtilis, sed tamen fortis membrana, extrinsecus circumplectens omnia vasa: est vero hac
eadem membrana internis quoque uteri partibus inserta. Vnumquodque autem vasorum, ubi
primo ab utero explantatur, paruum, quales sunt arborum radicum extremitates, quae terram per-
tingunt. Procedentia vero paululum in eandem coitionem conueniunt, ac deinceps unum ex ambo-
bus factum, rursus quodlibet illorum in idem alteri quod eiusdem generis est peruenit, idque non
cessat fieri, quousque in duo magna conueniant omnia illa parua, quae tanquam stipites quidam fa-
ctui per locum, qui in umbilico est, inferuntur. Quatuor igitur sunt illic vniuersa vasa, duae scilicet C
arteriae, & venae totidem. Ex quibus Galeni verbis abunde liquet, porum illum lotium
factus ex vesica efferentem, vna cum aliis vasis, non in lumen, sed in umbilicum inferi.
Est vero is meatus in medio iam dictorum vasorum situs, Vrachusque dicitur, quem-
admodum testatur Galenus lib. eodem, sic dicens: τίτλας τοῖον ὄντι τὰ περιεχόμενα καὶ τὸν ὁμφαλόν,
δύο μὲν ἀρτηρίαι, δύο δὲ φλέβες, μέσον ἑαυτῶν ἔχοντες τὸν ὕπερ, ὅτι καὶ ὁμαζύνει ἑδὸς τοῖς ἀνατομικοῖς, τὸν ἐκ τῆς πυθ-
μὲν & τῆς κύστεως πύρρον ἐξέρχεται πρὸς τὸν ὅλον εἰς τὸν ὅλον ἐκπεσέν εἰρημένον ὑμένα τὸν ἀλάντοειδῆ. καλεῖται δ' ὅτις
ἀπὸ τῆς σπῆς τὸς ἀλάντας ὁμοίωται κατὰ ὁμοίαν. ἀλλὰ τῇ ἰστίᾳ ἀρτὴ ἀρτῶν τῶν περὶ τὸν ὕπερ, ὅτι μὲν τῶν ἀνω
πύρρον, αἱ φλέβες εἰσὶν, αὐτὰ δὲ αὐτὰς εὐδῶς ἰέναι βέλτιον ἢν, ὡς ἐπὶ τὸ ἴσος. ἐκ τῶν ἑστῶν αἱ ἀρτῆραι, καὶ δὲ καὶ κα-
τὰ ταύτας ἐξέρχεται πύρρον τῆς κύστεως ἀποχρῆμας ἢν ἀμνιον. id est: Quatuor igitur per umbilicum pra-
dicta sunt vasa, duae scilicet arteriae, & venae totidem in medio sui habentes vrachum, ita enim dis-
sectoribus nominare consuetudo est meatum, qui ex vesica fundo urinam ad paulo ante dictam
membranam alantoidea exportat. Vocatur autem ita a similitudine forma siue figurae, quam ad far-
cimina habet. Atqui vasorum quatuor, quae circa vrachum sunt, superioribus partibus venae sunt:
sursum enim versus hepar, mox ire melius erat, inferioribus vero arteriae, deorsum enim has ferrila-
teribus vesica inuehendas consultius erat. Alantoidea denique membranam suscipere fac-
tus urinam, clarius testantur ea quae sequuntur, ubi sic scribit: τῶν δ' ἁλάντων δύο ὁ μὲν ἀλάν-
τοειδὲς ὀνομαζόμενος, ὃν εἰς τὴν κύστην ἔφαμεν συντελεσθῆναι καὶ τὸν ὕπερ, εἰς ὑποδῶρον ἔστιν παρεσκευασμένη. βέλτιον ἔν
μακρῷ μὴ καὶ τὸ αἰδοῖον οὐρεῖν τὸ κυούμενον, ἀλλὰ, ὡς νῦν ἔχει, καὶ τὸν ὁμφαλόν, ἐπειδὴ καὶ ὅλον αὐτὸ περιέληφεν ὃ
ἀμνιον ὀνομαζόμενον ὑμῶν, ἔτερον εἶδος ὕψους ἐκπεσέν, ὅτι ἢν εὐλογῶν ἀναμνησθῶν τοῖς τοῖς τῶν οὐρῶν. ἐναρτῶς
καὶ φαίνεται τὸ καὶ τὸν ἀλάντοειδῆ σπῆς τὸ λεπτότερον τὸ εἶναι, καὶ χαλκότερον τὸ κατὰ τὸ ἀμνιον. ἐπὶ δὲ δριμύτερον ὑπάρχει,
ὡς καὶ τὴν ὁσφρηθῆναι ἀνὰ καὶ πλήθει ἀνατεμένον τὸν ὑμένα. τὸ μὲν ἔν ἐν ἰστίᾳ λόγῳ κατὰ τὸ ἀμνιον ἀδρῶς ὀνομαζόμενον, ἐν
κύκλῳ περιέχεται τῷ κυμένῳ, μὴ δὲ βλάπτειν αὐτὸ τὸ δέμα δύναμεν. ἰδίᾳ δ' ἀπὸ τῆς τοῦ δὲ σπῆς ἀποκρίσεως τὸ ἔστιν,
ἔτε τοῦ δέματος, οὐτε ἰὼν καὶ τὸ χωρεῖν ἀπομένον φλεβῶν, ὅτι μὴ δὲ ὑπὸ τῆς δριμύτητος αὐτοῦ πλησιάζοντα βλάπ-
τοισι. quod est: Aliarum vero duarum, quae alantoidea nominatur, quam perforatam esse per vra-
chum ad vesicam diximus, ad urinam susceptionem preparata est. quum sit multo melius non perpu-
dendum urinam factum reddere, sed sicut nunc habet per umbilicum. Postquam enim totum ipsum
factum complectitur membrana nominata amnios, aliam speciem humoris suscipiens, non erat ratio-
nabile eam humoris speciem urinam commisceri. Evidenter enim humoris, qui intra alantoidea est,
& tenuior & magis flaua esse apparet eo qui intra amnion est. Adde quod & acrior existit, ut et-
iam dissecantium hanc membranam odoratum molestet & offendat. Quod igitur in sudoris ratione
intra amnion aceruatur, in circuitu factui circumfusum est, nequaquam cuti eius nocere potens. F
Seorsum vero abacta & separata est a factu urina, neque cutem, neque venas quae sunt per secundam
attingens, ne urina vicina ipsius acrimonia ledantur. Quod autem hactenus de vasis mem-
branis, & vracho multis diximus, complexus est Galenus, in libro de foetuum formatio-
ne, in hunc modum scribens: τὰ καὶ μὴν ἀγγεία τὰ καὶ τὸ χωρεῖν πύρρον τῆς κύστεως μὲν ἔχειν τὰς ἀρτῆρας, δι' ὅτι ὡς ἐφ' ἡμῶν
ἦν

Vrachus.

- A**ννοται τοῖς πέτραις τῶν κατὰ τὴν μήτηρ ἀγγείων, ἀποχωροῦντα δ' αὐτὸν, εἰς ταυτὸν ἀλλήλοις ἀρικνῆται, τέτοιον ὁμοίωτατον ταῖς ρίζαις τῶν φυτῶν. ὥς γ' ἐπ' ἐκείνων οὐ πολλὸν καὶ λεπτὸν παρ' ἀλλήλαις συνιόντων ἑτέρας ρίζαι παχύ τε καὶ γεννῶνται, καὶ κείνων αὖτις ἀλλήλαις ἐναμένων ἔτεροι, καὶ τὸ τὸ γινόμενον παύεται μέχρις ἂν ἀπασα τελευτήσῃσιν εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς πέτρης, κατὰ τὸν αὐτὸν ἵσπον αἱ κατὰ τὸ χρεῖον ἀρτερίαι καὶ φλέβες συνιούσαι πρὸς ἀλλήλαις ἑτέρας γινώσκον αὐτῶν ευρυτέρας, ἐξ ὧν ἀλλήλαις συνιουσὶν, ἕτα γινόμενον αὖτις ἄλλαι, καὶ ταῦτα πάνυ πολλὰ καὶ αὐταῖς συμβάντων, εἰς δύο μὲν ἀρτερίας δύο δ' φλέβας ἢ πάντων τῶν κατὰ μὲν ἀγγείων κεφαλαίουται σύνδεσθαι, ὧν ἐν τῇ μετὰ ξὺ γεννᾷται πρὸς εἰς τὸν πυθμένα τῆς κύστεως τὰ κυκλόμενα συντελεσμένον, ὅν οἱ δεινὰ ἐπὶ τὰς ἀνατομὰς ὀνόμασαν ὑπερχόν, τὸ δ' ἔτερον τῇ πόρᾳ τῆδε σωμα χωρεῖ δυνεν τῶν τετάρτων ἀγγείων εὐρίνεται κατὰ ὑπερχόν, λεπτὸν ὑμένα πᾶσι πληρόν, ἀλλὰ τὸ τὸ γῆμα γινώσκον, ἐπιτεταμένον ἐξ ὧν ἐτέρω τοιούτῳ, ὃ περικέχθαι τὸ ἐμβρυον. ὀνόματα δ' τοῖς δύο τέτοις ὑμένιοι ἀνατομικοὶ τέθειται. τῷ μὲν ἀπὸ τοῦ γῆματος ὀλλαντοειδὲς, διὰ τὸ τῷ περικέχοντι τὸ ἐμβρυον ἀμνιῶν ταῦτα μὲν ἐξ ὧν ἐστὶ τοῦ κυκλόμενου. hoc est: *Vasa quidem, que in secunda exsistunt, angustissima habent*
- B**initia, per quæ, ut dixi, extremitatibus vasorum, quæ in utero sunt, uniuntur. Vbi vero ab eo discedunt, inter se in idem redeunt, haud aliter quam plantarum radices. Quemadmodum enim in his ex multis iisque tenuibus inuicem coeuntibus extremitatibus, radices alia crassiores nascuntur, & rursus illis inter se unitis alia, & hoc fieri non cessat, donec uniuersa in trunci principium finiantur. ita & in secunda arteria atque vena inuicem coeunt, alias ipsis latiores generant, ex quibus inter se coeuntibus deinceps alias rursus producunt, eoque multoties ipsis contingente, omnium particulatim vasorum coitio in duas arterias, totidemque venas colligitur, quorum in medio meatus quidam gignitur in fundum vesicæ ipsius fœtus perforatus, quem in dissectionibus celebres vrachium nominauerunt. Alterum autem huius meatus os, a vasis quatuor segregatum paululum dilatatur iuxta membranam tenuem, figuram sarciminis generantem, extrinsecus altera tali circumdatam,
- C**qua fœtus complectitur. Duabus vero iis membranis dissectionis periti nomina fecerunt, illi quidem a figura alantoidi, alteri autem fœtum complectēdi animo. hæc quidem extrinsecus fœtum ambiunt. Ex quibus verbis iterum claret, vrinam fœtus per meatum vrachium in membranam alantoidem aceruari, & minime per venas in extremam suminis cutem finientes. Neque autem temere, ut obiter dicam, humorem hunc natura usque ad partus tempus in dicta membrana detinet, sed ut cum perfuso collo vteri, fœtus facilius excidat, quemadmodum docet Galenus lib. 15. de usu partium corporis humani, in eum modum scribens: *περὶ ὑπερχόντι καὶ ἀλλήλαις χρεῖαι τῶν ὑπερχόντων, τοῖς δὲ κοινῇ κατὰ τὴν ἀποκρίσιν τοῦ ζῶντος γινόμενῳ ἔχον ἀπὸ τῆς μήτρας ἀνέχοντι τὸ κυκλόμενον, ὑπερχόντι πολλὰ τε γινόμενον, ὀρυσσόμενον, ἐξ ἀνάγκης πλεονεχῆσαι τῶν ὑμένων, ὁ μόνον γὰρ εἰς ὀλλαντοῖδον συμβάλλει* τοῖς ἐμβρυοῖς ἢ ὑπερχόντι, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀνχένα τῶν μητρῶν ἑτοιμον εἰς τὸ διατέλλεσθαι μέχρις ὅτε πλείον ὑπερχονάξει, βρεχόμενον γὰρ ἀπὸ τῶν περιεργιζόμενων ὑπερχόντων, μαλακώτερον γίνεται, καὶ ἔχον διατέλλεσθαι. κατὰ τὴν ἀπόδωσιν τοῦ λιγυρέως τὸ κατὰ τὰς μαιάς ἐπὶ δὲ ἀνὸς αἰσθῶν ἐκρύνει τὸ ὑπερχόν, αὐτὰς ἀναγκάζει μίμουσιν τὴν φύσιν, ὑπερχόντι πλεονεχῆσαι ὑπὲρ τοῦ διατέλλεσθαι τῶν μητρῶν τὸν ἀνχένα. quod est: *Accedit autem & alia quedam utilitas humoribus iis communis in parturitione animalis facta, scilicet ut fœtus a collo vteri facilius excidat, humiditate multa perfuso, huius tunc necessario ruptis membranis. Non solum namque ad lubricitatem parui humiditas illa confert, sed etiam collum vteri ut plurimum dilatetur, promptum efficit. Perfusum enim a predictis humoribus, mollius est, & facilius dilatatur. Maxima autem eius quod dicimus demonstratio est, quod obstetrices postquam ante partum hic humor effluxerit, naturam imitantes coguntur habere nonnullas humiditates, quibus collum vteri perfundant. Sed dicet hic quispiam, qui sit, ut cum collum vesicæ meatum habeat, non tamen fœtus per ad meat, sed tota in umbilicum & vrachium vrina transit? oportet enim quum ex utraque parte vesicæ effluxiones exitusue habeat, non magis per vrachium quam per collum vrinam efferri. Huic Galenus loco citato ita respondet: *Διὰ τὸν τὸ περιεργιζόμενον τῆς κύστεως περικέχοντα ἅμα ἀμφοτέρω ποιῶν, τὸν μὲν ὀμφαλὸν ἀνατείνει, τὸ δ' ἐν τῇ κύστει περιεργιζόμενον ἐκδιδύκειν περιλαμβανόν τῇ χειρὶ. Διὰ τὴν δὲ τὸ οὖρον ἐκρύνει εἰς τὸν ὀλλαντοειδὲς διὰ τοῦ κατὰ τὸν ὀμφαλὸν πόρου. καὶ μὲν δὴ καὶ ἐπὶ θλίψεϊ πάλιν αὐτὸν τὸν ὀλλαντοειδὲς, πληρώσας τὴν κύστιν. εἴτι αὖτις τὴν κύστιν θλίβων, πληρώσας τὸν ὑμένα, καὶ τὸ γινόμενον αὖτις διδύκει, τὰ τε τὴν ἐνδυτήν καὶ τὸ μέγεθος τοῦ κατὰ τὸν ὀμφαλὸν πόρου ὅσον ἐκείναι τὸ οὖρον. ἥ τε γ' εὐρύτης ἢ κατὰ τὸν ὑπερχόντον πολλαπλάσιος ἐστὶ καὶ κατὰ τὸν ἀνχένα. τὰ τε ἵνα ἐνδυτή οὐδὲ πλεονεχῆσαι δύναται. οὐλοῖται μὲν γ' ἵνα ὅπως ὁ τῆς κύστεως ἀνχὴν, ἐνδὺς δ' ἀκραιβῶς ὁ ὑπερχόντος. id est: *Dissecans vesicæ propositum peritonæum simul ambo faciet, umbilicum quidem extendat, & quod in vesicâ continetur manu comprehendens exprimat. Videbis vero vrinam in alantoides per meatum, qui in umbilico est, effluentem: & si quidem rursus ipsam alantoidem***
- F**compresseris, vesicam implebis: & rursus vesicam comprimens, membranam implebis. Id autem quod accidit, te docebit, quod propter rectitudinem & magnitudinem meatus qui in umbilico est, prius hac ratione vrina effluat. Amplitudo enim quæ in vracho est, multo maior quam quæ in collo vesicæ. Ea vero quæ sunt rectitudinis, ut comparentur iniusta sunt. Obliquum enim sufficienter vesicæ collum, rectius vero vrachus. Ex iis itaq; abunde monstratum est, Mundinum toto ab-

errare cœlo, quod venas vrinam fœtus in vtero efferentes ad ſuminis cutem finiri do-
 ceat, cum non per venas, ſed meatum potius, qui in medio venarum & arteriarum ſi-
 tus, in veſicam fœtus pertingat. Et ſi venę ad ſuminis cutem deſinentes vrinā efferrent,
 vnde, rogo, hæ venę ſuminis vrinā haurirēt? an ex emulgentib. tales venę in ſumen vri-
 nā traducerent, q̃ nunquam compertum eſt? Et ſi ſic etiā haberet, qua oro, vi aquoſus il-
 le humor a ſanguine, quem ſimul cōmixtum emulgentes deferunt, ſecerneretur? Fru-
 ſtra certe ſic renum conſtitutus vſus eſſet, qui eius rei gratia, vt lib. 4. de vſu partiū cor-
 poris humani teſtatur Gal. facti ſunt, quo aquoſam ſuperfluitatē attrahant, nec vlla alia
 pars eſt, cui hæc facultas ſecernēdi aquoſum humorē a ſanguine inſita ſit, quā renibus.
 Si itaque non ex emulgentib. vrinam ſuminis venę hauriunt, tum ex renibus hauriant
 neceſſe eſt, & plures tunc meatus vrinarii, *ὀυρητῆρες* Græci vocant, quam vnus ex ſingu-
 lis renibus emergent, quod falſum tamen eſſe conſpecta renum ſtrutura, & ſua ipſius
 Mundini ea de re decreta teſtantur. Quod ſi ergo nec ex renibus vrinam hauriunt, ex
 meatibus vrinariis hauriant oportet. Inferuntur itaque multa hæ ſeminis venę pertu-
 ſis in multa foramina vreteris, quod nec vnquam viſum eſt. Neque enim natura com-
 mittit, vt tōt foraminibus exitioſo periculo adſciras vreteras pertundat. Si autem ne-
 que ex vreteris ſeu meatibus vrinariis vrinam hauriunt, igitur ex veſica, & ſic quoque
 in idem periculum hominem natura cōiiceret, quod ex crebra vaſorum inſertione at-
 que perforatione veſicę ſibi immineret. Eſto autē, hoc periculum a natura neglectum
 ſit, quo, per ſuperos oro, tot venarum ora vrinam deferentur, forte etiā alantoida tam
 crebro perforabunt, quod tamen conſilium a natura alieniſſimum exiſtit, quæ diſper-
 ſa vaſa ad vnum inſtituta ſinem, omnia circa eorundem in membrum aliquod ingreſ-
 ſum, in oſculum vnum ſemper colligit vnitque, veluti in porta iecoris, & in inuolucro
 exteriori fœtum in vtero complectenti, videre licet. Errat itaque Mundinus, multiſ-
 que ſecum errandi occaſio fuit, quod venas ad ſuminis extimam cutem pertingentes
 vrinam fœtus in vtero deliteſcentis efferre docuerit, cum per meatum potius peculia-
 rem ad membranam alantoida nominatam efferatur, illicque vſque ad parturitionis
 tempus detineatur, quemadmodum pluribus forte quam oporteat verbis demonſtra-
 uimus. Prolixius autem hanc rem tractare placuit, partim quod pauci ſint hodie, qui
 vere de ea ſcripſerint, partim etiam vt commune facerem ſtudioſos, ne temere Mun-
 dino aliſque eius farinæ auctoriſus crederent, ſed ex Galeno, tanquam optimo eius
 rei artifice, diſſectionis notiā haurirent, non neglecta tamen crebra partium cor-
 poris inſpectione, oculataque fide, ſine qua auctorum lectio parum aut nihil ferme pro-
 derit. Exquiſitorem membranarum fœtum inuoluentium tractationem in *Inſtit. noſt.*
lib. 1. ſect. 5. cap. 13. ſtudioſi reperient.

*Vterum non habere ſeptem ſinus ſeu cellulas, vt Mundinus præter omnem verita-
 tem aſtruit, ſed duos tantum, idque in homine.*

CAPVT IX.

Mundinus in anatome vteri ſic ſcribit: *Figura matricis eſt quadrangularis cum quadam
 rotunditate, habens collum longum in parte inferiori. Per talem figuram habet diſtinctionem
 ſeptem cellularum: ſit paulo poſt: Concauitas vero eius habet ſeptem cellulas, tres in parte dextra,
 & tres in parte ſiniſtra, & vnā in ſummitate, vel in medio eius. Et iſta cellula non ſunt, niſi qua-
 dam concauitates in matrice exiſtentes, in quibus poteſt ſperma coagulari.* Mundinum ſequitur
 Valeſcus libro ſexto, capit. nono, in eum modum ſcribens: *Quamvis matrix non habeat niſi
 vnā concauitatem, tamen ſecundum longum in qualibet medietate eius reperiuntur tres cellule,
 & vnā in medio, & ſic ſunt in ea ſeptem cellula.* Quæ ſane ſententia quam erronea ſit, facile
 deprehender, qui oculis vterum humanum intueri voluerit, quique ea, quæ veteres
 de huius ſinibus tradidere, expendere curauerit: de aliorum enim animalium vtero
 nobis hic contentio non eſt, vt quam plures quam duos habere ſinus probe ſcimus.
 In homine vero non eſſe niſi duos ſinus, teſtatur Hippocrates in libro de natura ſænis,
 ita dicens: *Δίδυμα ὅ γίνονται ἀφ' ἑνὸς λαγνύματος. ἔχουσιν αἱ μήτραι κέλευθους συχνούς καὶ χαμφούς. τὰς μὲν τῆς*
λατῆρας

A λωτέρω, τὸς δὲ πλησιαιτέρω τῷ αἰσθύν, καὶ τὰ πολύτρονα τῶν ζώων πλείους ἔχει κόλπους τῶν ὀλῆα κινδύνων. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ πρὸς ἑαυτὴν δειλά τε καὶ ὀρεαοῦσαν δὲ ἡ γυνὴ τυχὴν χωριθεῖσα εἰς δύο κόλπους ἀφικομένη, καὶ αἱ μήτρες δέχονται τὴν γυνήν, οἱ κόλποι τε μὴ ἔτερος πρὸς τὸν ἑτέρον χαλάσῃ, ἢ χωριθεῖσαι ἐν κατέρῳ κόλπῳ ὑμνεοῦνται, καὶ ζωοῦνται τῷ αὐτῷ τρέφῳ ὥστε καὶ τὸ ἐν ᾧ εἴνεκεν εἴπωμεν. ὅππῃ δὲ ἀφ' ἑνὸς λαγνέουμα γῶ διδυμα γίνεται, ἰστέριον τὸ δὲ δὴ κύων καὶ ἔς καὶ ἑλλὰ ζῶα ὅσα ἀφ' ἑνὸς λαγνέουμα γῶ πικίη καὶ δύο, καὶ πλείονα. καὶ ἕκαστον τῶν ζώων ἐν ἑαυτῇ μήτρησιν ἐν κόλπῳ καὶ ὑμνέει. ὥστε δὲ καὶ τῇ γυναικὶ ἀπὸ μιᾶς μίξις γινόμενα τὰ παῖδια, ἑκάτερον ἐν κόλπῳ καὶ χωρεῖ δὴ. καὶ τίθει τῇ αὐτῇ ἡμέρῃ ἀμφότερα, καὶ πρὸς τὴν δάτερον χωρεῖ ἕξω καὶ τὸ χωρεῖον αὐτοῦ. hoc est, *Gemelli vero uno coitu gignuntur. Multos sinus habent uteri, variosque, partim longius, partim propius pudenda. Quaeque animalia plurima generant & pariunt, plures habent sinus, quam quae pauciora: similiter oves, fere, & aues. Cum vero genitale semen in duos sinus diuiditur, uterique suscipit, nec sinus alter in alterum demiserit, diuisum in utroque sinu membranam obducit, similique modo, quo &, ut diximus, animatur. Quod autem uno coitu gemini creentur, comprobant canis, fies, ceteraque animalia, quae uno coitu duos vel plures catulos pariunt. Nam unusquisque suo sinu conditur, suaeque membrana conuolutur. Sic & mulier uno coitu duos pueros enititur, unumquemque suo sinu, suaeque membrana conuolutum, utrosque autem eodem die parit, primumque unus suaeque membrana prodit. Et paulo post: ἔς ἐκότερον αὐ τῶν κόλπων τυχὴ ἡ γυνὴ παχυτέρη καὶ ἰσχυρότερη ἐσιῦσα, καὶ δὴ ὄρσεν γίνεται. ἔς ἐκότερον δ' αὖ ἰσχυρότερη καὶ ἀδυνεστερή, καὶ δὴ θῆλυ γίνεται. ἢν δ' ἔς ἀμφοῖν ἰσχυρῇ εἰσέλθῃ, ἀμφοῖν ἄσυνα γίνεται. ἢν δ' ἀδυνεστὴς ἔς ἀμφοῖν, ἀμφοῖν θήλεια γίνεται. id est: *Siquidem crassum robustumque genitale semen in quemcunque sinum intrauerit, mas illic gignitur: si vero contra humidius & inuolidius, femina. Si autem sinus utrosque semen validum intrauit, mares utrique erunt, sin inuolidum, utraque femina generabuntur. Quibus sane verbis Hippocrates aperte monstrat, duos tantum in hominis utero esse sinus, licet in animalibus multa generantia, plures reperiantur. Id quod etiam testatur Galenus, qui lib. 14. de usu partium in eam sententiam scribit: τοῦτον μὲν ἔν σωμαχὸν ἕνα, τὸ δ' ἡ κύτος τῶν ὑτέρων ὀυχῶν ἐν ἡ φύσιν ἐπὶ ὁμοίαν, ἀλλ' ἐν μὲν τοῖς ὕσι καὶ ἄλλοις ποσὶ πλείων κώπεδον δεομένοισι, παμπόλλους κόλπους ἐδημιουργήσεν. ἀνδρῶν γὰρ καὶ τοῖς ὁμοίοις, ὡς πρὸς ὅλον ὅτι τὸ σῶμα διδυμον ἀεισεργεῖς τε καὶ δεξιῶς, οὕτω καὶ τῆς ὑτέρας κόλπῳ, ὁ μὲν ἐν τοῖς δεξιῶς, ὁ δ' ἐν τοῖς ἀεισεργεῖς τέτακται. quod est: Itaque collum hoc unum quidē, sinusque autem cavitatem uteri natura non unam fecit, sed in suis quidem & aliis nonnullis multa concipere seu in utero ferre indigentibus, per multos creauit sinus. In homine vero & similibus, sicut totum corpus geminum diuisumque dextris & sinistris est, sic & uterique sinus, unus quidem in dextris, & alius in sinistris est. Et mox postea ita: περιουμένη γὰρ ἡ φύσις, ὅπως αὐτὴ μὴ ζῶν πὶ γένῳ ἀρανιδεῖν μηδὲν, ὅσα διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀδυνεστειαν, ἥτοι βραχυχρηνία τελέως, ἢ ὅσα τοῖς ἰσχυρότεροις ἐμῇ γυνήσῃ, τοῖς αἰσιν ἰαμα τῆς συσχευῆς φθόρας ἐξῆρε τὴν πολυγυνίαν. ἐστὶ μὲν δὴ καὶ τὸ ταυμάσιον ἔργον τῆς φύσεως. ἀπάντων δ' αὐτῶν ὅππῃ ταυμάτων ἐπέκεινται οἱ δίδειν ἢ κεν τὸ πλῆθος τῶν κόλπων ἰστέριον γινόμενον τοῖς πλῆθος. ὁ γὰρ ἐπ' ἑγχαρεῖ λέγειν ἐν ταῦτα τοῖς σοφισταῖς, ὡς ἀλογῶ ἀπίστω τυχὴ πρὸς ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων μὲν δύο τῶν μητρῶν ἴσος κόλπους ἐδημιουργήσεν, παμπόλλους δ' αὖ τῆς ὑπὸ τὸ δὲ ὅσα ἐκείνων ἀεργεῖς, τοσούτον γινέσθαι καὶ τὸν πτῶν, ἀπάρχει τὴν γνώμην τῆς αὐτομάτου γένεως. id est: *Natura n. providens ne aliquod genus animalis destruat, quacunque propter corporis imbecillitatem, vel parum duratura prorsus, vel cibo fortiora erant futura, omnibus iis remedium crebra corruptionis inuenit, plurimum generationem. Est autem & hoc mirabile naturae opus. Vitra vero omnia, scio, mirabilia tibi peruenire videbitur multitudo sinuum, numero aequalis facta mamillis. Non enim hic etiam dicere licet sophistis, quod causa irrationalis, & fortuna quaedam inartificiosa, hominibus quidē duos uteri sinus, plurimos vero suis creauit. Hoc namque quotus est sinuum numerus, tantum fieri & mamillarum numerum sententiā fortuita generationis tollit. Et paulo post: ὡς πρὸς γὰρ αἱ μήτρες δύο γυνάσιν ταῖς γυναιξίν, εἰς ἕνα περιαινοῦσαι τρέφοντες οὖν καὶ τῇ θηοῖ δύο τῆς καὶ ἑαυτὰς ἑκάτερος μήτρες, οἷον ὑπὸ ἡμέτης πρὸς ἀγαθὸς. οὕτως γυνὴ καὶ ἡ ἰσχυρότερη ἔλεγε, γυναικὶ ἐν κατεῖχουσῃ ἢν ὁ ἑτέρος μαζὸς ἰστέριον γέννηται, διδυμον ἐχούσῃ, δάτερον ἐκπτερόσκειται. καὶ ἢν μὲν ὁ δεξιῶς ἰσχυρὸς γέννηται, τὸ ἄρσεν, ἢν δ' αὖ ἀεισεργεῖς, τὸ θῆλυ. οὗτος γὰρ ὁ λόγος ἐκείνων συνάδει ἐμῇ ταῦ μὲν ἄρρετα ἐν τοῖς δεξιῶς, τὰ δ' ἑλλὰ ἐν τοῖς ἀεισεργεῖς. hoc est, *Sicut enim duo uteri mulieribus facti sunt, in unum collum finiti, sic & mammae duae in iis cuilibet utero una veluti ministra quaedam existens. Ita & Hippocrates dixit, mulieri in utero habenti, si altera mamma gracilis fiat, geminos habenti, alterum abortit: & si quidem dextra gracilis fiat, marem, si vero sinistra, feminam. Hic enim sermo consonat cum illo: Foetus mares quidem in dextris, femina vero in sinistris. Ex quibus omnibus clarum est, duos tantum uteri muliebris esse sinus, quod illos mammis numero aequales esse oporteat: quemadmodum etiam Auerenna vigesimo primo, 3. tractatu 1. capit. 1. docet, sic scribens: Et habet matrix in omnibus duas concavitates. Loquitur autem de mulieribus, id quod verba praecedentia satis indicant. Iam dictis subscribit quoque Lactantius in lib. de opificio Dei. ca. 12. ita inquit: Item in feminis uterus in duas se diuidit partes, quae in diuersum diffusa ac reflexa circumplectantur, sicut****

428 Operum Leonhardi Fuchsi Pars IV.

arietis cornua. Quæ pars in dextrum torquetur masculina est, quæ in sinistrum fæminina. Quapropter eidentissimum est aberrare Mundinum, huncque sequentes sophistas, quibus septem in vtero cellulæ placent, ternis in dextra, sinistraque constitutis, vna tantum in meditullio composita, quod totidem sint in vnoquoque animali quot mammæ. Nihil refert autem, sinus, cellulas, siue concauitates dices, nam omnibus iis idem significatur, vt ex Mundini verbis abundeliquet. Ceterum de vteri sinibus, & vniuersa eiusdem historia & fabrica clarius & verius in Epitome nostra de fabrica humani corporis tractauim⁹, ad quam nunc, vt in ceteris omnibus anatomicis paradoxis, lector vt recurrat, hortor.

Septum transuersum, quod Græci diaphragma nominant, non prorsus carne carere, quemadmodum Alexander Benedictus, Plinium in hoc secutus, sentire videtur.

C A P V T. X.

Plinius lib. 11. cap. 37. de diaphragmate in hunc modum scribit: *Extra homini ab inferiore viscerum parte separantur membranæ, quæ præcordia appellant, quia cordi prætenduntur, quod Græci phrenas appellauerunt. Omnia quidem principalia viscera, membranæ propriis, ac velut vaginis inclusit prouidens natura. In hac fuit & peculiaris causa vicinias alui, ne cibis supprimeretur animus. Huic certe refertur accepta subtilitas mentis, ideo nulla est ei caro, sed nervosa exilitas. Quem secutus est Alexander Benedictus, lib. 3. suæ anatomes cap. 3. ita de diaphragmate scribens: Septum transuersum sub pulmone collocatum est, cinctum alii appellant, veteres quoniam cordi prætenduntur, præcordia dixere, diaphragma alii. Plato vero phrenas ceu prudentiæ participes menteque coniunctas, vnde quidam mentis subtilitatem accipi putauere, ideo ei nulla caro est, sed nervosa exilitas. Errant autem vtrique duplici nomine, primum quod diaphragmati nullam prorsus inesse carnem tradunt: secundo quod eidem mentis subtilitatem acceptam referri dicunt, quod tamen falsum esse Aristoteles, & omnes Peripatetici contendunt. Quod ad primum atinet, diaphragmati scilicet carnem nullam inesse, cum Galeni Medici omnium doctissimi, ac in dissectionibus membrorum exercitissimi placitis pugnat, qui lib. 7. de usu partium corporis humani septum transuersum musculum esse tradit iis verbis: τῶν φρενῶν ἡ μὲν ἰδιόουσία μὲν ἔστιν. id est: Phrenon quidem substantia propria musculus est. Si itaque musculus est, carnem habeat necesse erit, nam hoc ipsum propria natura euincit ratio, cum musculus aliud nihil sit, nisi caro nervis intexta. id quod testatur Galenus lib. 1. de usu partium corporis humani, ita scribens: ἐπεὶ δὲ οὐδεμία σὰρξ ἐξ ἐαυτῆς αἰσθάνει ἐνέκτιστο, καὶ ἡ αἰσθήσις ἀντικειμένη ὄργανον ἀναδύσθαι σκεπάζουσα τῶν εἰς ὅλας τὰς χεῖρας ἀναδύναντων νεύρων οὐ μικρὸν μὲν ἐστὶν εἰς τὰς σάρκας αἰ τὰς κατέφυσεν. ἀλλ' ἐπὶ τῷ τῷ ἐγένετο, μίαν ἐνὸς αἰ σάρκας ἦσαν. hoc est: Quoniam vero nulla caro ex seipsa sensum acquisiuit, & absurdum erat instrumentum apprehensorium insensibili regi particula, nervorum ad totas manus de super venientium, non parua portionem, natura ad carnes ipsas deriuauit. Sed cum hoc factum esset, musculi ex carnes fuerunt. Clarius autem lib. 2. idiplum indicat, vbi in eum modum scribit: ἐπὶ δὲ αἱ σάρκες μέγιστα τῶν μὲν εἶσιν, ἀπασιν μὲν εἰρηται χεῖδον τοῖς ἀνατομικοῖς, ὥστε ἔν τε καὶ ἡμῖν ἐν τοῖς πρὸς κινήσεως αὐτῶν. quod est: Quod vero carnes musculorum partes sint, ab omnibus fere qui in dissectionibus periti fuerunt, quemadmodum & a nobis in libris de motibus ipsorum dictum est. Et paulo post: τὸ δ' ἐμολογούμενον τε αἶμα καὶ φαινόμενον ἐν ταῖς διαρίσεσιν, ἀρκεῖ πρὸς κατὰ παρόντα, τὸ τὰς σάρκας ἐν τῇ τῶν μὲν οὐσίᾳ περιέχεσθαι. hoc est: Id vero quod confessum est, & apparet simul in resectionibus, ad presentia sufficit, nempe carnes in musculorum substantia contineri. In libro denique 2. de temperamentis Galenus carnem perpetuo musculi esse partem scribit. Verba eius hæc: πρώτη μὲν ἡ κυρίως ὀνομαζομένη σὰρξ, ἣν οὐκ ἀν' εὐρείας καὶ αὐτὴν οὐδ' αἰσθάνειν τῷ σώματι, ἀλλ' ἐστὶν ἀπὸ μέρους μόνος. hoc est: Prima quidem quæ proprie caro appellatur, quā nusquā in corpore per se inuenies, sed est perpetuo musculi pars. Inter Arabes etiam Auic. Fen. 1. Can. 1. doct. 5. Sum. 2. c. 1. musculum carnē habere testatur, dum ita scribit: Musculus est membrum ex nervo & ligamento, & eorū villis, & carne implente, & panniculo cooperiente compositum. Razes quoq; lib. 1. c. 3. idem docet iis verbis: Musculum itaq; ex carne, & nervo & ligamento componi dicimus. Inter recentiores etiā Mundinus in sua anatome diaphragma non ex omni parte carne carere iis verbis ostendit. Tertius panniculus est diaphragma, qui etiā dici potest musculus, cuius situs est in thorace, in fine pectoris & costarum, altior existēs in parte anteriore quā posteriore. Nam quantū ad eius partē carnosam, est cōtinuatum cum cartilaginib; costarū mendo sarū. Ex quib; lane omnib; satis monstratū est, diaphragma seu septum transuersum, antiqui phrenas appellarunt, esse carnosum, aliqua scilicet eius parte,*

F quum a veteribus inter musculos censeatur, fieri nequit, ut carne careat.

Perperam Alexandrum Benedictum in trium ventriculorum cordis assertione defendere Aristotelem, cum plurimum duo tantum sint.

Aristoteles variis in locis librorū de historia animalium tres esse cordis sinus seu ventriculos asserit, nimirum ca. 17. lib. 1. in verbis: ἡ δὲ καρδιά ἔχει μὲν τρεῖς κοιλίας, μέγιστον μὲν ἐν τοῖς δεξιῖς, ἐλαχίστον δὲ τὴν ἐν τοῖς ἀριστεῖς, μέσθον δὲ μετέσθον τὴν ἐν τοῖς ἀνὰ μέσον. quod est: Cor ventriculos tres habet, maximum quidem in dextro latere, minimum autem in sinistro, medium magnitudine inter sinistrum & dextrum. In cap. etiam 3. libr. 3. indiscriminatum omnia in vniuersum animalia tres habere ventriculos pronuntiat, sic dicens: ἔχεισι δ' αἱ πάντα μὲν καρδίᾳ κοιλίας ἐν αὐτοῖς, ἀλλ' αἱ μὲν τῶν σφόδρα μικρῶν ζώων, μέγας φανερὰν τὴν μέγιστον ἔχουσιν. τὰ δ' ἡμέσθον τῶν μετέσθον τῶν ζώων καὶ τὴν ἐπὶ πλεον. τὰ δὲ μέγιστα πάντας τὰς ἰσθμ. ἐπὶ δ' ἡν καρδίας τὸ οὐδὲν ἐξέσθον εἰς τὸ μετέσθον καὶ εἰς τὸν μέσθον, ἡ μέγιστη μὲν κοιλία ἐν τοῖς δεξιῖς καὶ ἀνωτάτα ταύτης, ἡ δ' ἐλαχίστη ἐν τοῖς ἀριστεῖς, ἡ δὲ μέσθον μετέσθον ἵππων ἐν τῷ μέσθον ἀμφότες. ἀμφότεραι δὲ αἱ δύο σφόδρα ἐλάττω εἰσὶ τῆς μέγιστης. συντέτρωται μὲν ἵππῳ πάντως αὐτῶν μετέσθον πνεύμονα, ἀλλ' ἀδελφοὶ δὲ σμικρῶτα τῶν πόρων, πλὴν μίας. hoc est: Habent intra se corda omnia sinum ventriculorum triplicem, sed munitissimorum animalium qui maximus est vix conspici potest. Mediocrum animalium secundus etiam conspicuus est, maximorum omnes tres perspicui possunt. Et cum priorem in partem cor suo mucrone spectet, ut dictum est, maximus sinus dextrum, supremumque suscipit situm, minimus sinistrum, mediocris medium. Qui autem maximus inter eos est, hic longe reliquis ambobus amplior est. Omnes tamen ad pulmonem parui sunt, sed propter exiguitatem meatuum latent, uno excepto. Aristotelem sequitur Auicenna Fen. 11. Can. 3. tract. 1. capit. primo, tres quoque in corde ventriculos esse statuens. Alexander etiam Benedictus cap. 13. libr. 3. sua anatomes, tres esse in corde ventriculos contendit. Ac Aristoteli inibi patrocinari cupit, at quam feliciter ex his, quæ dicemus, dilucidum fiet. Et hi duo tantum sunt, quæ sciam, ex omnibus fere qui Aristotelis sequi sententiam temere voluerunt. Errare autem Aristot. vel vnus Galen. qui in dissectionum peritia Aristot. longe superauit, ut qui illo etiam posterior fuerit, ac omnia quæ ab eodē scripta sunt, diligenter excusserit examinaueritque, abunde docere potest, qui euidentissimis argumentis hanc passim Aristotelis sententiam conuellit exploditque, ut qui in dissectionibus animalium probe conspexerit, non esse æqualem in cunctis ventriculorum cordis multitudine. In lib. siquidē 6. de usu par. ita scribit. πλεον μὲν δὲ τῶν κοιλίων τῆς καρδίας ἐκ τῶν ἐν ἀπασιν τοῖς ζώοις εἶναι, ἀλλ' ὅσα μὲν ἐξ ἀέρος εἰσπνέει διὰ φάρυγγος καὶ ῥινοῦ καὶ στόματος κοιλία. εὐδὲς μὲν καὶ πνεύμων τότε εἶναι, εὐδὲς καὶ τῆς καρδίας ἡ δεξιὰ κοιλία δὲ ἀλλοῖς ἀπασιν ὅτε πνεύμων εἶναι, ὅτε ἐν τοῖς δεξιῖς τῆς καρδίας εὐδὲς ὑδρῆμα. συναπτόμεναι δὲ αὐτῶν πνεύμωνι δύο ταῦτ' ἐξ ἀνάγκης, ἡ τὴν φωνὴν τῶν ζώων, καὶ ἡ δεξιὰ τῆς καρδίας κοιλία. καὶ τὸ δὲ δύον εἰς ὅσον ἐκτέτρωται αὐτὴν ἡ καὶ ῥησῆς, ἡ μὲν δὲ δεξιὰ κοιλία τῶν πνεύμων ἐνεκα γάρ, ὅς τ' ὁ πνεύμων αὐτὸς ἀναπνέει τὴν καὶ φωνὴν εἰς ὅσον ὄργανον. ἀκον ὁρδῶν. Αἰετοῖς δὲ διηρητο περὶ τῶν πλεον τῶν ἐν τῇ καρδίᾳ κοιλίων, εἰς μέγιστον καὶ σμικρῶτα. τὸ σμικρῶτα ἀνάσθον αὐτῶν τῶν ἀεὶ μόνον. ὅτε δὲ τοῖς μέγιστοις ζώοις ἀπασιν τρεῖς, ὅτε τοῖς ἐλαχίστοις δὲ μία, τὴν αὐτὴν δὲ ἀκρίβως ἔχει κατασκευασμένην καρδίαν ἵππου. ὁ μέγιστος, ἐλαχίστος σφόδρα, καὶ εἰ μὴν ἀναίετοι, καὶ εἰ βούλονται εἰ τῶν ἀλλων ζώων, καὶ εἰ τὴν μικρότερον ἐπὶ μύδον, ἡ μὲν τῶν βούων, ἀπασιν αὐτοῖς ὅτ' ἀσθμῶν τῶν ὁ τῶν κοιλίων, ἡ δὲ ἀλλὰ κατασκευασμένη τῆς καρδίας ἡ αὐτῇ. ὅς εἰς μέγιστον ἀποβλέπουσα καὶ σμικρῶτα σμικρῶτα. ἡ φύσις ἐξ ἀλλήλων τῶν ὀργάνων τὴν ἰδέαν, ἀλλ' ἡ τῆς ἐνεργείας διάφορος σκοπὸς αὐτῇ γίνεσθαι τῆς κατασκευῆς, αὐταῖς δὲ αὐτῶν πάλιν τὰς ἐνεργείας, τῇ πρώτῃ χρεῖα μετρεῖ. quod est: Multitudo itaque ventriculorum cordis non in cunctis animalibus equalis est, sed quacunque aerem inspirant per fauces, & nares, & os, his mox quidem & pulmo est, & dexter cordis ventriculus. Reliquis autem vniuersis, neque pulmo est, neque in dextris aliqua cordis amplitudo, semper namque cum pulmone simul pereunt necessario hac duo, animalis vox, & dexter cordis ventriculus. In hoc vero manifestum est ad quantum usum vniuersumque ipsorum peruenit, dexter enim ventriculus pulmonis gratia factus est, pulmo autem ipse respirationis & vocis instrumentum est. Haud recte igitur Arist. ventriculorum cordis multitudinem distinxit, ad magnitudinem & paruitatem corporis numerum eorum reducens. Neque enim maximis quibusque animalibus sunt tres, neque minimis est vnicus: eandem enim cordis constructionem exacte habet maximus equus cum minimo passere. Et si murem dissectueris, aut bouē, aut aliquod aliorum animalium, vel quod minus etiam mure, vel maius boue sit, his omnibus equalis est ventriculorum numerus, & reliqua cordis constructio eadem. Neque enim natura magnitudinem & paruitatem corporis respiciens, instrumentorum formam permutat, sed actionis differentia huic scopus & intentio fit. Ipsas autem rursus actiones primo vsui commensurat. E quibus vtiq; verbis nemo non intelligit aberrasse Aristot. quod indiscriminatum omnibus animantibus tres esse cordis ventriculos asseruerit, cum ventriculorum numerus nō in omnibus æqualis sit. Quidam enim dextrum ventriculum non habent, veluti sunt ea quæ pulmone carent: id quod etiam oculata in dissectionibus fides abunde docet, ita ut ad Arist. confutandā sententiam non multis opus sit verbis. Proinde satis mirari non possum, cur Alexander Benedictus

- A dictus iniuste Galenum Aristotelem perstrinxisse, cum eundem a veritate deuiasse omnibus fere notum sit. Sed putat hominem per tot secula laudatissimum fas non esse de errore accusare, immemor sane eius dicti, quod ad Aristotelem auctorem refertur, *Amicus Socrates, amicus Plato, magis amica veritas*. Si Aristot. superiorum omnium placita, Platonemque summum tum Philosophum atque præceptorem suum, ubi a veritate sibi aberrare visus est, conuellere ausus fuit, cur non pariter Galeno & nobis, eundem hallucinantem perstringere licebit? Neque potest eum ab errore vindicare Alexandri de auribus cordis commentum, neque enim sinistram aurem, sinistrum esse ventriculum admittimus, cum ventriculi sint in ipso corde, aures vero ex vtraque parte cordis, haud aliter quam in capite animalis, emicent. Testis Galenus loco iam citato, sic scri-
- B bens: *ὠνόμασαι δ' ὅτως ἐκ τοῦ χρείας, ἢ ἐκ τῆς χρείας πρὸς, ἀλλὰ ἀπὸ μικρᾶς ὁμοιότητος, ὅτι τῆς καρδίας ἐκ τέρθεν ὡς κεφαλῆς τὸ ζῶον περιέχεται τὰ ὠτα.* id est: *Nominantur vero aures, non ab usu aut aliqua actione, sed a modica similitudine, quoniam scilicet vtrinque cordi, perinde atque capiti animalis aures, adiacent.* Id quod etiam l. b. 7. anat. administ. iis docet verbis: *νυνὶ δ' ἐπὶ τὰ τῆς περιεχόμενης περιγυμνασίας ἵστα μετέλθωμεν, ἀπὸ τῶν ὠτῶν ἀρχόμενοι τῆς καρδίας, ἀκαθ' ὁμοιοτήτα πῶς τοῖς κινεῖσιν ὀνομαζομένοις ὡς ἐκ ἀλλοτρῶν οἱ περιέχονται, ὡς γὰρ ἐκείνα περιέφυκεν ἐκ τέρθεν τῇ κεφαλῇ, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ταῦτα τῇ καρδίᾳ. νευροδύστερα τε καὶ δερματῶδεις ἐστὶν αὐτὴν σαφὲς αὐτῇ τῇ καρδίᾳ σώματι.* id est: *Nunc autem ad propositi operis peculiaris digrediamur, ab auribus cordis auspicati, quas ad similitudinem quandam aurium proprie dictarum maiores vocarunt. Et enim ille capiti vtrinque annexa sunt, ita & hæc cordi nervosiores ac magis cuticulares ipso cordis corpore manifesto apparent. Et paulo post cordis auriculas extra ventriculos ipsius consistete Galen. scribit. Errat denique idem Alexander, quod au-*
- C res tantum in cadauere conspici posse putat, atque adeo qui eas in corde posuerunt, cadaueris tantum posituram considerasse, quasi Galenus singula quæ de anatome tradit, non tam in viuis quam in mortuis contemplatus sit. Quoties enim se viuam dissecuisse simiam, quæ hominis figuræ proxima est, scribit, eo tantum nomine vt singula ad anatomes cognitionem necessaria exactius rimaretur? Non is fuit Galenus, qui anatomem ex libris tantum, & ex aliorum scriptis didicerit, qualē Alex. hunc aliorum non solum sententiam, sed & verba imitantem, fuisse constat. Quid vero in maximis etiam animantibus nulla fiat ob magnitudinem in corde differentia, atque adeo in iis etiam non nisi duo cordis sint ventriculi, testatur ea quæ Gal. lib. 7. anat. administ. in eum scribit modum: *πάντες μὲν γὰρ τοῖς ζῴοις ὡσαύτως ἡ καρδία ὑπάρχει, μηδεμίαν δὲ διαφέρειν ἐν αὐτοῖς γεγονέναι διαφορὰς, ὡς Ἀεὶς τέλεις αἰεταί, σαφὲς ἐστὶν ἡδεῖα κατὰ τὰς μεγάλας καὶ τὰς μικράς, καὶ ἐν αὐτῇ τῇ κατ' αὐτὴν ὄντι τῶν μεγάλων ζῴων ὡσαύτως νομίζονται, καὶ τῶν ὡσαύτως, ἐν πᾶσιν μὲν ὅτι καὶ τοῖς ἄλλοις, ἐμὴν ὅσον πᾶσι καὶ ἀφιδίαι, ἀλλὰ χινοῖσι. Σαυμαστὴν δὲ ἔδεν ὅτι τῶν μικρῶν ζῴων ἀρχόμενος τέλειος, αὐτὸ τοῖς ἀγνόμενοις ἐπὶ τὰς ἀνατομὰς, ὅτι καὶ κατὰ μέτρον λαμβάνει πολλὰς αἰσάς. καὶ πᾶσι τὰ μέτρα, καὶ αἰσάς γὰρ ἀλλήλων ἐναγχαῖ ἐν ῥῶμῃ σφαγῇ, καὶ ἰσχυρῶς ὅσον ἐπὶ τὴν ἀνατομὴν αὐτῶν πολλοὶ τῶν ἰατρῶν, ἐνεκα τῆς γυναικὸς πότερον ἔχει δύο κορυφὰς, ἢ ἑῶν ἡ καρδία, καὶ δύο κοιλίας, ἢ τρεῖς. ἀρῶν καὶ πρὸς τῆς ἀνατομῆς αὐτῆς διετηνόμεναι εὐρεῖται τὴν αὐτὴν κατασκευὴν τῆς καρδίας ταῖς ἄλλαις πάσας ἰσὺς ἐξ ἀεὶ ἀναπνεύσιν ζῶων, ἀπερ' ἐφάνη καὶ τῆς διαμετρήσεως, εὐρεῖν δὲ φασὶν καὶ τὸ κατ' αὐτὴν ὄν, αἵματι τοῖς ἐπὶ αἰσάσι ἐπιβαλὼν τὸς δακτύλους. οἱ δὲ ἀγνοῦντες αἰσάσι μὲν ἐλπίζοντες δὲ εὐερίσκον, ὡς ἐν μεγάλῳ ζῴῳ, τὸ μὲν εὐνοῦμενον ὅτι ἰσὺς ἄλλων ὑπέλαβον ἡ δὲ πρὸς ἐλέφαντα καρδία ἔχειν ὄν, ἐρῶ δὲ ἡμέλει καὶ μὲν αἰσάσι δεικνύναι, ἰσὺς δὲ ἐπὶ αἰσάσι γελῶντες ὅτις ἐρῶν ἀνασπῆντες ἐκείνους διὰ τὴν ἀγνοίαν ὡς ἰσὺς ἀλλοτρῶν καλεσάντων δὲ μὴ δεικνύναι, ὑπέχον τὴν δειξίαν ἀρδεύσεως μέντοι τῆς καρδίας ὑπὸ τῶν τῶν Καίσερος μαγείρων, ἐπεὶ πᾶσι τῶν γυμνασμένων ἐπὶ αἰσάσι περὶ τὰ λοιπὰ παρὰ τὰς αἰσάσεις τὰς μαγείρας ὁππότερ' αἰσάσι κατ' αὐτὴν ὄν ἐξελθόν, καὶ ὅπως ἐργετῶν καὶ παρ' ἡμῖν ὅτι νῦν ὁ σμιλρὸν μὲν ὑπάρχον τῶν μεγάλων, Σαυμαστὴν καὶ παρ' ἡμῖν ἀπίσταν τοῖς ὁρῶσιν, ἐπὶ τὴν αὐτὴν ὄν ἐλάνθαντες τὸς ἰατροὺς, ὡς ἀρα καὶ τὰ μέγιστα τῶν ἐν τοῖς ζῴοις μορίων λαμβάνει τὸς ἀγνοῦντες, καὶ Σαυμαστὴν ἔδεν ἄλλα ἢ πολλὰ καὶ τὰς ἀνατομὰς Ἀεὶς τέλει διαμαρτύνει, καὶ ἡγεῖσθαι τρεῖς ἔχειν κοιλίας, ὅτι τῶν μεγάλων ζῴων ἰσὺς καρδία, ὅτι μὲν ἐν ἀνθρώποις ὡς ἐν ταῖς ἀνατομῇς ἐσφάλη περὶ τὴν τῶν μορίων εὐρεσιν, ὅτι Σαυμαστὴν καὶ καὶ συγγινώσκον αὐτῶν περὶ τὴν αἰσάσιν, ὅτι καὶ οἱ τὸς ὅλον αὐτῶν βίον ἀνασπῆντες τῇ θεωρίᾳ ταύτῃ, κατὰ πρὸς Μαρίων, ἡμετέρον πολλὰ, πρὸς καὶ νομίζον συμβαίνειν τοῖς ἐξ αἰσάσι μὲν ἐπ' αὐτὴν ἐλθόν, περὶ τὴν αἰσάσιν οἱς πρῶτον ἐκείνους, ὡς μικρῶν ὅτι καὶ περὶ αὐτῶν ἰσὺς, quod est: *Omni-
bus enim similiter animantibus cor inest, quum
nulla ob magnitudinem in ipsis sit differentia, sicut Aristoteles autumat: sed clarior in magnis cordibus
est speculatio quoniam & ipsorum os, quod magnis inesse animalibus arbitratur, atq; his non omni-
bus, etiam aliis natura concessit, haud tamen os vniuersis exactum, sed cartilaginem. Nullum vero
miraculum, est in minutis ipsum animantibus confectionum rudes penitus ignorare, quum & in gran-
diori frequenter ipsos lateat. At quid dico in grandioribus? Nuper Elephanto maximo Roma iugulato,
pleriq; Medici ad ipsius dissectionem conuenerant, discendi gratia, duosne cor haberet vertices, an 1. &
ventriculos ne 2. aut 3. Ego aut vel ante ipsius confectionem afferēbam, eandē cordis struct. r. cum aliis
omnibus animalium aerem spirantium inuentum iri, quæ etiam ipso diuiso apparuerunt. Itē: si ipsius si-
ne negotio reperi, una cum familiaribus digitis admolitus. At in exercitatu sperantes id, quod in**

aliis animantibus apparet, ceu in magno se inuenturos, ne elephantum quidem cor os habere putabant, A
Ego autem ostensurus ipsis eram, nisi familiares risissent, quod attonitos illos ac sensus expertes pro-
pter loci ignorantiam conspicerent, & quum adhortarentur ne indicarem, subtrixi. Corde vero a
Casaris coquis exemit, nisi aliquem ex familiaribus in huiusmodi exercitatis, rogatum coquos, ut
os ipsius eximi sinerent, atque sic factum est. Seruatur idem apud nos etiam hodie eximia adeo magni-
tudinis, ut ab iis qui inuentur, nullo modo credi queat tantum os Medicos latuisse. Ita sane & maxi-

Aristotelis
in anatomi-
cis errores
multi.

me in animantibus particularum, in exercitatis ignorantur. Ac miri nihil est, si prater alia multa
etiam in anatomis Aristoteles errauerit, qui triplicem sinum cor habere in magnis animalibus ex-
istimat. Quod igitur in confectioibus parum exercitatus circa partium inuentionem errorem
commiserit, neque mirandum est, & condonare homini conuenit: quam enim qui totam suam vi-
tam huc speculationi dedicarunt, quemadmodum Martinus, in plerisque falsi sunt, quid existi- B
mandum est iis accidere, qui repente ipsam adierint, persuasiva qua prius non viderunt, ut denuo
inspicere non aggrediantur? Haftenus Galenus, cuius utique verba, et si prolixa admodum
sint, eo tamen libentius recitavi, quod sola ad Aristotelis sententiam explodendam
sufficere videbantur. Quod si tamen exactiorem eius rei disputationem scire cupis,
lege quae in anatomicis scripsit Galenus & voti compos efficietis. Ceterum Galeni sen-
tentiam confirmat Hippocrates in libro de corde, sic scribens: ἡ καρδία δύο ρατέρες ἔχει διακερι-
μένας ἐν ἐν πειβόλῳ, τὴν μὲν ἐνδοῦ, τὴν δὲ ἐξωδοῦ. ἡ μὲν δὲ ἐν τοῖς δεξιόσι ἐστὶν ὅτι σῶμα κέεται ἐμὲλειοσα τῇ ἐτέρῃ φλεβί-
δι τῇδε καὶ πύμπααν εὐρυκοίλιον καὶ λαγυρῶτερη πολλῶν τῆς ἐτέρας, ἐδὲ τῆς καρδίας νέμεσθαι τὴν ἐξαπύλιν. ἡ δὲ ἐτέρη κέ-
εται, ἡ πένες δὲν μὲν μάλιστα καὶ ἐστὶν ἰδυοείλω. μάλιστα μὲν μαζῶν ἀερεῶν. σῶματα δὲ αἱ τέτοιον ἐκ ἀνθρώπων, εἰ μὴ πρὸς
ποικίλῃ τῶν οὐράτων τὴν καρδίαν, καὶ τῆς καρδίας τὴν κεφαλὴν. ἢ δὲ δὲ σποκερὴ φανήσεται καὶ διὰ τὰ σῶματα ὅτι δύο ρατέρες. C

id est: Cor duos sinus ventriculosque utrinque discriminatos habet circuitu & vallo uno, quorum
unus in parte dextra os versus positus est, qui cum vena una communicat. Quin & hic latior est ac
mollior multo quam alter, nec in ultimam usque cordis partem penetrat. Sinus vero alter superne
recte, & contra sinistram mammam situs est. Ora autem horum non patent, nisi quis aures & caput
cordis praeceat: quasi praeceantur, patent. geminaque in singulis sinibus ora sunt. Et Cornelius
Celsus lib. 4. cap. 1. iis verbis: Huic cor annexum est natura musculosum, in pectore sub sinistro
re mamma situm, duosque quasi ventriculos habet. Iulius quoque Pollux secundo Onomastici,
duos tantum in corde sinus agnoscit. Inter Arabes Abenrois primo Collig. cap. 24. duas
tantum cordis cavitates, & utique amplas esse statuit, in dextra vnam, in sinistra alte-
ram. Quin etiam Razes lib. 1. cap. 14. cor duos magnos habere ventriculos tradit, quo-
rum unus in dextro est latere, & alter in sinistro. Quid multa? sensu deprehensum est, in-
diesque adhuc in dissectionibus deprehenditur, duos tantum cordis esse ventriculos,
ut errasse Aristotelem, eumque sequentes omnium evidentissimum sit. Nec valet quo-
rundam hic ex Auicenna desumpta concordia, qui Galenum ventrē medium foueam
appellasse tradunt. Nam liber hic, ex quo ista desumfit Auicēna, non est Galeni, sed al-
terius cuiuspiam Arabis, qui multa ex Galeni commentariis anatomicis trāscripsit. Est
autem liber hic de anatomia viuorum inscriptus, in quo sic scribitur: Duo sunt in corde
vētρες, & fouea, quae est quasi meatus quidam inter ventres, & non est venter. Et rursus in eodem
libro de cordis anatomia in hunc modum: Cor autem habet tres distinctiones siue folliculos
admodum quarundam busarum, in quarum parte suprema recipitur aer, in infima sanguis, in me-
dia qua fouea appellatur, acris & sanguinis commixtio, & spirituum generatio, unde ille locus in cor-
de dicitur minera spirituum. Ex hoc siquidem libro Auicennam, quae Fen. 11. Can. 3. tract. 1.
cap. 1. scribit, desumfitse constat, quemadmodum verba eiusdem abunde testatur. Non
esse autem hunc librum Galeni, vel hoc vno argumento colligi potest. Auctor libri
quisquis ille fuit, Galenum non semel, sed iterum atque iterum citat, quod minime fa-
ctum fuisset, si Galeno auctore conscriptus hic liber fuisset. Quid enim attineret sci-
psum in testem vocare? Extremæ certe esse dementiæ quis diceret, si tale quid commi-
sisset Galenus. At ita insaniunt hodie, qui citra iudicium temere quosvis libros ad opti-
mos quosque auctores referunt, quos certe si hodie viuerent, neuquam agnoscerent,
quandoquidem ne umbram quidem illorum referrent. Porro exquisitiorem ventricu-
lorum cordis tractationem lib. 5. Epitomes nostra de fabrica humani corporis, capit. 10. inue-
nient studiosi.

Gulam nullos habere musculos motui deglutionis deservientes, quemadmodum Auicenna ac alii nonnulli putant, quando motus ille sit plane naturalis, atque adeo mus-
culis minime eget.

CAPVT XII.

NE alicui vocabulorum ignorantia imponat, animaduertendum, gulam Latinis esse id, quod Græci *εισοφάγον*, Arabes *meri* vocant. Huic itaque corporis partilaten-
 musculos inesse innuit Auicenna, dum illi motum voluntarium in plerisque locis tri-
 buit. Neque enim voluntarius motus fit nisi a musculis, id quod testatur Galen. *lib. 1. de
 motu musculorum* ita scribens: *ὅργανα κινήσεως τῆς κεφαλῆς ἐπὶ τοῖς οἰ μὲν εἰσὶν, id est: Instrumenta motus
 voluntarii musculi sunt. Et in lib. 1. de usu partium corporis humani, omnes voluntarios motus
 a musculis fieri docet. Id quod & Razes confirmat lib. 1. cap. 3. sic dicens: Omne membrum
 quod voluntario mouetur motu, musculus habet, quo mouetur. Quod vero Auicenna meri vo-
 luntarium tribuat motum, eius aperte monstrant verba, quæ *Fen. 1. Cano. 1. doct. 6. cap. vl-
 timo*, ita habent: *Et similiter transglutienti operatio duabus completur virtutibus: una est attra-
 ctiva naturalis, & altera est attractiva voluntaria. Et prima quidem suam complet operationem per
 villum, qui secundum longitudinem protenditur, qui est in ore stomachi & isophagi: & secunda
 completur operatio per villum lacerti transglutienti. In eandem fere sententiam de duabus
 virtutibus, altera naturali, altera animali, adiuuantibus deglutitionem loquitur idem
 Auicenna *Fen. 16. Can. 3. cap. 1. dicens. Et secunda causa est quod penetranti in meri non attri-
 buitur ex virtutibus naturalibus nisi virtus una, quamuis voluntas adiunget ipsum ex parte una,
 & est attractiva: adiuvat ergo aperiendo viam & dilatando ipsam. Clarius multo circa finem
 eiusdem capituli in meri esse musculos ostendit, dum ita inquit: Et non mouetur aliquod
 horum membrorum, quæ sunt via cibi per lacertos, nisi duo extrema, scilicet caput, & est meri, & gut-
 tur, & inferius, & est fisteris. Si itaque per lacertos meri mouetur, quid est cur etiam illic
 motum voluntarium esse dicamus? Idem denique Auicenna *Fen. 9. Can. 5. cap. 8. tertiam
 speciem suffocationis apostemolæ in lacertis intrinsecis meri fieri scribit, inquit: Aut erit in lacertis intrinsecis meri, & quæ sequuntur ipsum, & stringit anhelitum. Ex quibus
 omnibus Auicennæ locis a nobis iam citatis manifestissime colligitur, eundem voluisse
 meri habere lacertos, hoc est, musculos, in ea enim significatione interpretatur, at-
 que ita moueri ipsum non modo ex vi sua naturali, sed etiam animali seu voluntaria, quæ
 per musculos seu instrumenta operatur. Errorem hunc Auicennæ statuentis, meri in-
 trinsecos habere musculos, sequitur Iacobus Forliuensis in enarratione aphorism. 34. quartæ
 Hipp. particule, ubi quatuor anginæ species enumerans, tertiam numero illam constituit,
 quæ in lacertis intrinsecis meri fieri solet. Quamuis eo loci Forliuensis bis aberraret, pri-
 mum quod falso meri intrinsecos musculos assignet; deinceps etiam quod perperam
 tertio præfagiorum Hippocratem & Galenum in 4. de locis affectis libro, de eiusmodi an-
 ginæ specie intrinsecos gulæ musculos occupante loquentes, citet, cum tamen neque
 Hippocrates neque Galenus ibidem illum enarrans, neque etiam de affectis locis libro,
 ubi quatuor anginæ species recēser, quicquam de tali specie, in qua gulæ intrinseci mu-
 sculi phlegmone afficiantur, loquantur. Sequitur est & hunc errorem Alexander Be-
 nedictus, dum *lib. 5. sue anatomes. cap. 18. musculos gulæ, haud aliter quam epiglottidi &
 trachæ arteriæ tribuit. Verum a veritate aberrasse omnes satis constat, si motum de-
 glutitionis probe expēdimus: is enim cum plane naturalis sit, hoc est virtute fibrarum,
 quæ deglutitionis tempore in se contrahuntur, & hac cessante relaxantur, factus, fieri
 non potest, ut ex naturali & animali seu voluntario compositus sit. Cum itaque volun-
 tarius non sit, nulli ad eum afficiendum musculi necessarii sunt, sed villis seu fibris tan-
 tum, quas *ιναι* Græci vocant, per quas facultas attractiva naturalis suam actionem exer-
 cet, opus erit. Testis satis locuples existit Galenus, qui *lib. 3. de facultatibus naturalibus de-
 glutitionem per facultatem ventriculi attracticem, ope fibrarum seu villorum fieri
 monstrat. Sed præstat eius verba subiicere: καὶ μὴν δύο χιτῶνες ἡ γαστήρ ἔχει, πάντως ἐνεχθεὶς τε γινόμεται,
 καὶ διηκούσιν οὗτοι μέγχει καὶ τοῦ σώματος. ὁ μὲν ἐνδόν, ὅς ἐστι κατὰ τὴν γαστέρα τοιοῦτως διαμένων, ὃ δὲ ἔτερος ὅτι τὸ σαρ-
 κώδες ἐστιν ἐν τῷ σώματι γὰρ τρεπόμενον. ὅτι μὲν οὖν ἐναντίας ἀλλήλας τὰς ὀπισθολαῖς τῶν ἰνῶν ἐχουσιν οἱ χιτῶνες οὗτοι, τὸ
 φανόμενον αὐτὸ μαρτυρεῖ, ὃ μὲν ἐνδόν ἐνδεῖα ἔχει τὰς ἰνὰς. ὁ δὲ ἔξωθεν ἐλκερσίου ὑπὲρ κατὰ κύκλον
 περὶ ἐλλείδου ἐκείνης γὰρ τῶν κινήσεων ὁρῶντων τοῖς σώμασι κατὰ τὰς τῶν ἰνῶν θέσεις αἱ κινήσεις εἰσὶν ἐπὶ αὐτῶν δὲ περὶ-
 τον τῶν μύων, εἰ βούλει, βασιάνισον τὸν λόγον, ἐφ' ᾧ καὶ αἱ ἰνὲς ἐναρξάται, καὶ αἱ κινήσεις αὐτῶν ἐρῶνται διὰ σφοδρῶς ὅτι τὰς
 μὲν δὲ τοὺς ὅτι τὰ φυσικὰ τῶν ἐξάντων ἴση καὶ πάντως ὅλη κατὰ τὰς ἰνὰς κινούμενα. καὶ διὰ τοῦτο ἐκείνη μὲν τῶν ἐντέρων
 συγγυλᾷ καὶ ἐκείνη τῶν χιτῶνων αἱ ἰνὲς εἰσὶ. περὶ ἐλλένται γὰρ μόνον, ἔλκουσιν δὲ ἑδόν, ἡ γαστήρ δὲ τῶν ἰνῶν τὰς μὲν
 ἐνδεῖας ἔχει χάσιν ὁλκήν, τὰς δὲ ἐλκερσίου ἐνεκα περὶ σφοδρῶς. ὥστε γὰρ ἐν τοῖς μισοῖν ἐκείνης τῶν ἰνῶν τινος μέρους τε καὶ πλεονέ-
 την ἀρχὴν ἐλαττωμένης αἱ κινήσεις γίνονται, κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἐν τῇ γαστρὶ τῶν μὲν ἐλκερσίου ἰνῶν τινος μέρους, ἐλαττω-
 ἀνάλην γίνονται τὸ εἶδος τῆς περὶ ἐκείνης ὑπὸ αὐτῶν κοιλότητος, τῶν δὲ ἐνδεῶν ἐλκερσίου τῶν καὶ ἐκ αὐτῶν συναρμῶν******

των ἐκ ἐνδέχεται μὴ ὁ συναρτῆσθαι τὸ μῆκος. ἀλλὰ μὲν ἐναρτῶς φαίνεται καταπινόντων συναρτημένων καὶ τοσοῦτον ὁ λάρυξ ἀνατρέχων, ὅσον ὁ στήμαχος κατασπᾶται. καὶ ὅταν γε συμπληρωθείσῃ τῆς ἐν τῷ καταπίνειν ἐνεργείας, ἀφελθὴ τῆς πίσεως ὁ στήμαχος, ἐναρτῶς πάλιν φαίνεται κατασπῶμενος ὁ λάρυξ. ὁ δὲ ἐνδὸν χιτῶν τῆς γαστρὸς ὁ τὰς εὐθείας ἴσας ἔχων, καὶ τὸν στήμαχον ὑπαλείφων, καὶ τὸ στήμα τοῖς ἐν τοῖς μέρεσιν ἐκτείνεται τῷ λάρυγγι. ὁ οὖν ἐνδέχεται κατασπῶμενον αὐτὸν ὑπὸ τῆς κοιλίας, μὴ οὐ συναρτῶσθαι καὶ τὸν λάρυγγα. quod est: *Atqui ventriculus duas habet tunicas, qua omnino alicuius gratia sunt condita, pertinguntque haec etiam usque ad ipsum os. Quae interior est qualis in ipso est ventriculo, talis persistens: altera ad carnosiores speciei in gula conuersa. At quod contrarias inter fibrarum dispositiones haec tunica habeat, ipsa rei euidencia testatur. Quae interna est, in directum porrectas habet fibras, ut quae trahendi causa sit instituta. Externa transversas, quo circulo contrahant. Quippe singulorum quae mouentur instrumentorum corpora, pro fibrarum positura motus habent. Primum autem si placet, in musculis ipsis sermonem examina, in quibus tum fibra ipsa, tum motus propter vehementiam euidentissime cernuntur. A musculis ad naturalia instrumenta te conferas licet, omnino videbis ea per fibras moueri. Itaque etiam singulis intestinis circulares in utraque tunica fibrae sunt, contrahuntur enim duntaxat, nec quicquam trahunt. At ventriculus alias fibrarum rectas habet, quibus scilicet trahat, alias transversas, quibus constingat. Tanquam enim in musculis dum fibra quaeque intenditur, atque ad principium retrahitur, motus eorum obitur, itidem in ventriculo dum transversa fibra tenduntur, latitudinem contenta inter ipsas cavitatis minorem fieri est necesse. Recte vero dum trahuntur ac in se ipsas coguntur fieri nequit, ut non minuatur longitudo. At vero deglutientibus nobis liquido cernitur larynx simul sublata sursumque in tantum currens, quantum gula deorsum trahitur. Quumque completa iam deglutitione retenderit se gula, luculenter descendere cernitur summa arteria seu larynx. Siquidem interna ventris tunica quare etiam habet fibras, quae tum gulam intrinsecus vestit, tum os ipsum, ea super internis laryngis partibus extenditur: itaque fieri nequit, quum ipsa a ventriculo deorsum trahitur, ut non simul larynx attrahatur. E quibus verbis Galeni euidentissimum fit, motum deglutitionis non per musculos, sed fibras potius fieri, atque naturalem & minime voluntarium esse. Proinde meri seu gula musculi potius ministerium in animalibus praestat, quam ut per musculos moueatur. Id quod Gal. etiam docet lib. 1. de motu musculorum, sic scribens: καὶ δὲ ὁ στήμαχος τῆς γαστρὸς, ὅν οἱ σφάγρον ἐκάλουν οἱ παλαιοί, αὐτὸς τε μὲν ὄρεξις, καὶ τὸ μὲν ἐργα τοῖς ζώοις ἰππερεῖς, οἷς αὖ καὶ οὗτος ὁ μῦς, οὗτε οἱς τένοντα, τελευτῶν, οὗτε ὅσων σελκινῶν. id est: *Quod si etiam stomachi ventriculi, quem oesophagum, hoc est, gulam vocabant veteres, musculus est, & musculi officia animalibus ministrat, erit utrique & hic musculus, neque in tendonem desinens, neque os simul mouens. Iam dictis accedit, quod Gal. nusquam in suis anatomicis libris, neque etiam in aliis, ubi de musculorum varietate agit, musculorum gulae mentionem facit. Sed neque Auicenna Fen. 1. Can. 1. Doc. 5. Sum. secunda, ubi ex professo de omnibus omnium membrorum musculis tractat, quicquam de meri musculis refert, sed tantum gutturis musculos commemorat, quos deglutitionem iuuare inquit. Ita nec Aliabas tercio theorices sua vllum de lacertis meri verbum facit, sed solum de gurgulionis, hoc est, faucium, lacertis mentionem facit. Atqui differre fauces a gula seu meri nemo est qui nesciat. Quinetiam Alex. Benedictus, immemor eorum, quae alibi scribit lib. 3. cap. 17. haud secus quam Galenus, gulae naturalē quandam facultatem tribuit, qua deglutitionis modus per villos & minime musculos perficitur. Ait ita: Gula duplici membrana, varioque villorum ordine constat: altera stamine per latitudinem procedente cibum expellit, qui cum attrahitur cedit, nec leditur: altera vero interior, deorsum trahit villorum oblongo stamine cibum, ea vis κατελκύνει dicitur. Ex quibus liquido apparet, gulae nullos inesse musculos deglutitionis functionem perficientes, nam nisi ita esset, frustra illos fecisse naturam quis dicere posset: ad quē enim alium usum hos ipsos natura, nisi vel ad attrahendum, vel expellendum cibum dedisset? Verum cum villorum fibrarumue hoc opus sit, musculi frustra creati sunt necesse erit. Quare nullo pacto intrinsecos gulae musculos admittant studiosi, cum & veterum placitis, ac rationi adeoque oculari inspectioni ipsi ex diametro pugnet. De musculis vero laryngis, quos illi inepte admodum, & non sine risu gulae assignarunt, lib. 2. Epitomes anatomica nostra diximus, ad quam nunc lectorem ailegamus.**

Viam vocis ac spiritus tracheam, id est, asperam arteriam dictam non esse interiorē, neque cibi & potus gulam nominatā exteriorē, ut Alex. Bened. asserere ausus fuit.

CAPVT XIII.

ET si exemplaria anatomes Alex. Benedicti recens excula per auctorem ipsum, aut amicū forte quendam, emendata sint, tamen quando constat, priora exemplaria adhuc

- A** adhuc multorum in manibus esse, quæ semidoctis errandi occasionem exhibere possunt, committere nolui, quin hunc ipsum errorem ab Alexandro commissum, ne scilicet alicui hominis auctoritas imponeret, impugnarem. Scio enim quam mordicus plerique hodie Medici auctorem hunc teneant, quem tamen lapsum esse quamplurimis in locis evidentissimum est. Is itaque *lib. 3. cap. 8.* de binis iam nominatis viis primum ita scribere ausus fuit: Binæ, inquit, ab oris faucibus canaliculæ coeunt, quarum altera brevior, interiorque est, *τερχία ἀρτηρία* Græci, Latini *spiritalē fistulam* appellant. Altera vero longior, exteriorque est, *οισοφάγος* Græci & *σώμαχος*, Latini *gulam & cibalem fistulam* vocant. Quibus verbis contra naturæ positum, gulam in anteriore colli parte, tracheam vero in posteriore collocat. Gulam namque, qua cibus potusque deuoratur, esse viam
- B** interiorē seu posteriorem, tracheam vero arteriam exteriorē, in homine viuo citra etiam dissectionem dignosci potest. Eam autem olim Alexandri fuisse sententiam, exemplar Plinianum, quod suis auspiciis in publicum prodiit, quodque tanquā emendatissimum passim defendere conatur, pulchre testatur, in quo *lib. 11. cap. 27.* in hunc modum legendum esse contendit: *Sub ea minor lingua, qua nulli oua generantium, opera eius gemina duabus interposita fistulis. Interior earum appellatur arteria, ad pulmonem atque cor perti- nens, hanc operit in epulando epiglossis, spiritu ac voce illac meante, ne si cibus ac potus in alienum de- errauerit tramitem, torqueat. Altera exterior est, appellatur sane gula, qua cibus atque potus deuoratur.* Quod si itaque aliter quam verba iam citata præ se ferunt, sensisset, nunquam passus fuisset exemplar, ut aliis omnibus, ut ipse putabat, castigatus, eam lectionem continens, in publicum prodire, multo minus tueri hanc lectionem in animum induxisset. At locum hunc Plinii deprauatum in sua editione, quam nuper ex elegantissima Frobenii officina acceperimus, linguarum ille antistes Erasmus Rotterodamus pro ingenii sui acrimonia ita restituit: *Sub ea minor lingua epiglossis appellata, nulli oua generantium opera eius gemina, duabus interposita fistulis. Exterior earum appellatur arteria, ad pulmonem atque cor pertinens. Hanc operit in epulando, ne spiritu ac voce illac meante, si potus cibusue in alienum deerrauerit tramitem, torqueat. Altera interior est, appellatur sane gula, qua cibus atque potus deuoratur.* Sic autem esse legendum in primis testatur Aristoteles, qui *lib. 1. de historia animalium c. 12.* de duabus his viis ita scribit: *ἐν τῇ δὲ μετὰ τὴν στήθεος καὶ ὤψεως καὶ τοῦτον τὸ καὶ στήθεος μέρος ἁρτηρία, τὸ δὲ πρὸς τὸν σῶμαχος. τοῦτον δὲ τὸ μετὰ χονδρῶδες καὶ στήθεος αἶμα καὶ ἡ φωνὴ καὶ ἀναπνοή, ἀρτηρία. τὸ δὲ σαρκοῦδες σῶμαχος ἐν τῷ στήθεος τῆς ἐλάχους.* id est: *Collū vero inter thoracē & faciem est. Huius quidē pars prior guttur posterior autē gula. Quantū vero colli ipsius cartilagineū priorem situm obtinens vocem transmittit & spirationem, id arteria nominatum est. At quantum interius carnem spina præiacet, gula.* Et *lib. 3. de partibus animalium c. 3.* in hunc modum: *καὶ τὴν δὲ ἐμπροσθεν τῷ οισοφάγῳ ἡ ἀρτηρία.* hoc est: *Ante gulam arteria posita est.* Cornel. quoque Celsus *lib. 4. c. 1.* iam dicta confirmat, sic dicens: *Deinde duo itinera incipiunt, alterū asperam arteriā nominant, alterū stomachum. Arteria exterior ad pulmonē, stomachus interior ad ventriculū fertur.* Cuietiam subscribit auctor introductorii his verbis: *Δύο τοίνυν πρὸς ἀρχήν ἀπὸ τῆς τοῦ σώματος ἐνδοχώρας, ὁ μὲν κατὰ τὸ ἐμπροσθεν τοῦ τερχίης πέταλαι, καὶ καλεῖται βέρχης ἢ τερχία ἀρτηρία, ὁ δὲ σῶμαχος. διαπέμπει δὲ τὸ πνεῦμα ἢ τερχία ἀρτηρία εἰς τὸν ἀνεύμονα. ὁ δὲ σῶμαχος ἐνδοτῆρος τοῦ βέρχου ὢν, ἀπὸ τοῦ σπινθῆρος τοῦ τερχίου* quod est: *Duo igitur meatus siue itinera a lato oris spacio incipiunt, alterum iuxta priorem colli partem asperam arteriam nominant, alterum gulam. Aspera autem arteria spiritum pulmoni transmittit. Gula vero interior arteria existens, cervicis vertebri annexa est.* Sic itaque legendo verba Plinii, ut legenda esse demonstrauimus, a grauissimo etiam errore alio vindicatur Plinius. Nam si ne prohibitiua particula præponatur verbis illis si potus, & nō prioribus, legendo ne si spiritu, illud sequetur absurdum, asperam arteriam eodem temporis momento & opertam & apertam esse, quod impossibile erit. In epulando enim operitur ac clauditur, spiritu autem & voce meante aperitur. Ea enim a minore lingua operta, neque vocem, neque spiritum per eam transire possibile est. Hæc itaque ad præsentis errati confutationem sufficiant, neque enim quod res in propatulo sit, pluribus probationibus eget.

Alexandrum Benedictum, præter veterum exemplum, pharyngæam asperam arteriam confundere.

Confundere Alexandrum tracheam arteriam cum pharynge verba eiusdem satis indicant, quæ scribit *lib. 3. sua anatomes ca. 8.* sic dicens: *Bina ab oris faucibus canalicula eorunt, quarum altera breuior interiorq. est, τερχίαν ἀρτηρίαν ἢ φάρυγγα Græci, Latini guttur vel spiritalem fistulā appellant.* In quibus sane verbis errat Alexan. primum quod tracheam arteriam alio nomine vocari ait *pharynga*, q. tamen nemo veterum, proprie locutus, asserere ausus est. Deinceps quod *pharynga* guttur interpretetur, cum id nominis laryngi potius cōueniat. Proinde cum & alii multi *pharyngis & laryngis* Græcis, *fauciumque & gutturis* Latinis vocabulis, hodie abutantur, necessarium erit, vt hoc loco genuinum earundem vocum vsum studiosis indicemus. Animaduertendum itaque proprie loquendo, *pharynga* nihil aliud esse Græcis, nisi id spatium, quod gulam & guttur præiacet, Latiniq. *fauces* nominantur. Guttur autem ea pars est, quæ veluti caput seu initium est asperæ arteriæ, Græcisq. *λάρυξ* dicitur. Testis Gal. *lib. 7. de vfu part. corporis humani* ita scribens: *ὁ δὲ μὲν ἐκ τοῦ στήθους ἡ ἀρτηρία τῷ πνεύμει· ἡ δὲ τῶν βρογχίων συνημνῇ. καλεῖν γὰρ οὕτω τοῖς ἰατροῖς τοὺς χόνδρους αὐτοῦ, ὡς περ γὰρ καὶ ἄλλω μὲν βρογχίον, καὶ κεφαλὴν τὸ σῶμα πύεος αὐτοῦ, ὡς περ δὴ καὶ λάρυγξ ὄνομα. id est: Hæc quidem est natura arteria pulmonis, quæ ex bronchiis consistit. Vocare enim ita Medici eius cartilagines consueuerunt, quemadmodum & ipsam totam bronchum. Superiorem autem eius extremitatem caput, quæ vtiq. etiā guttur nominatur.* Et rursus *lib. 8. πρῶτον καὶ κλειώτατον ἐργαζομένης φωνῆς, ἢ λάρυγξ ὄνομα, τὸ ἀνω πύεος δὲ τῆς τερχίαν ἀρτηρίας.* quod est: *Primum & principalissimum vocis instrumentum, cui guttur nomen est superior aspera arteria finis existit.* Idem etiam testatur *lib. 6. de tuenda valetudine*, iis verbis: *τὴν γὰρ τὸ σῶμα φορῶν τῶν περιτομάτων ὑπο δέχεται σίμαχος τε, καὶ ἡ τερχία ἀρτηρία, καλεῖται δὲ αὐτὴν καὶ βρογχίον, ἢ τὸ συνάπτον τῷ σώματι πύεος ἱψύλον, ὀνομάζεται δὲ λάρυγξ ἐργαζομένης ὑπὲρ φωνῆς.* hoc est: *Excrementorum in os decursum tum gula excipit, tum aspera arteria, appellant hanc Græci & bronchum, aut etiam summa eius pars, qua ori coniungitur. guttur autem nominatur, vocis instrumentum existens.* Proinde cum *λάρυξ* nihil aliud sit, nisi asperæ arteriæ caput, consultum erit, vt passim hæc dictio in Græcis auctoribus obuians pro *gutturis* interpretetur. *Pharynga* vero fauces esse sedem gulæ & gutturi præiacentem omnium maxime testantur ea, quæ Galenus in *commentatione aphorismi 34. tom. quarti aphorismorum* scribit, sic dicens: *ὡς ἢ καὶ πνιγὲς ἐπὶ στενοχωρίᾳ μὲν γίγνεται πάντως, ἢ στενοχωρία, δὲ ἢ τι πεπλαρημένως τῆς μεταξὺ τοῦ στήθους τε καὶ πνεύμονος χώρος, ἢ τῶν συσφύγγων τοῦ πνεύμονος, ἢ τινος φλεβιότητος πρὸς τὸ πλάγχρον ὅλον οὕτως, ἢ κατὰ τὴν τερχίαν ἀρτηρίαν, ἢ τὴν εἰς κεφαλὴν αὐτῆς, ἢν ὀνομάζουσι λάρυγγα. καὶ ποτε κατὰ τὴν συνημνίαν ἐνυρχειαν ταύτης ἢ τοῦ νομα φάρυγξ δὲ, πνιγέσθαι πέφυκεν, οὕτως δὲ καὶ ὁμοιῶς ἐπὶ, φάρυγγος δὲ ἐξ αὐτοῦ οὐκ ἴσμεν ἀνδρόμοι. τὴν συνημνίαν ἐνυρχειαν σωμαχο καὶ λάρυγγος ὀνομάζουσι φάρυγγα, id est: Strangulatio omnino ex angustia fit. Angustia autem vel repleta intermedia regione, qua inter thoracem & pulmonem est, aut pulmonis cauernis, vel aliqua phlegmone totum viscus occupante, vel asperam arteriam, vel eam partem quæ est veluti caput eius, quam nominant guttur. Quæ etiam phlegmone in præiacenti spatio, quod fauces appellant, aliquando facta strangulare solet. Nam & Homerus ita nominavit, inquiens: Per fauces autem vinum erumpebat, frustra que humana. Spacium illud laxius, quod gulam & guttur præiacet, fauces nominans. Ex quibus Galeni verbis liquido constat, quid Græci utroque vocabulo, & laryngis & pharyngis intellexerint, præsertim autem quid Homerus *Odyssæa primo* Cyclopi temulentiam depingens, *pharyngos* voce significare voluerit, nempe spatium id, quod ante gulam & guttur est. Quod si itaque, vt *Alexander somniat*, Homerus per *pharynga* asperam arteriam intellexisset, certe iuxta Homerum, potius per tracheam arteriam primum ad pulmonem deflueret, nisi enim illuc primum migraret, per illam euomi non posset. Atque adeo in ea sententia esse Homerus, in qua Plato olim fuit, deprehenderetur, potum nimirum ad pulmonem primum, & minime ventriculum ipsum delabi, quod certe de tanto vate, quem haud temere *Oceanum eruditionis* appellat, suspicari alienissimum sit, quandoquidem tale quid ne per somnium quidem cogitauerit. Quare *pharynx* aliud a trachea arteria erit, nempe spatium illud, vt diximus, quod gulam & guttur præiacet. Id quod præter iam dicta testantur etiam ea, quæ *lib. 4. de affectis locis cap. 6.* Galenus scribit, dicens: *φάρυγγα ὀνομάζω τὴν ἐνδον τοῦ σώματος χῶρον, εἰς ἣν ἀνέκει τό τε τοῦ σωμαχο καὶ τὸ τοῦ λάρυγγος πύεος.* quod est: *Fauces voco internum oris locum, ubi simul conueniunt, & gula & gutturis partes extrema.* Et *lib. 3. prasagiorum aphorismum 18.* explicans, vbi in hunc modum scribit: *ὅτι φάρυγγα τὴν συνημνίαν χῶρον σωμαχο τε καὶ λάρυγγος ὀνομάζει δὴλον ἐστὶ.* hoc est: *Per fauces præiacentē gula & gutturi locum appelles, perspicuum est.* Ex quibus omnibus clarum est, *pharynga* seu fauces locum esse, ad quem*

- A** quem tam summum asperæ arteriæ, quam gulæ pertingit, adeo ut errare Alexandrum, qui hunc trachea arteria non distare putauit, omnium euidentissimum sit. At qui non latet, Galenum inter initia *lib. 8. de usu partium corporis humani* scribere, *tracheam arteriam pharynga æquiuoce illi, quæ est ante larynga seu guttur nominari*. Verba eius hæc: *πρῶτον ἡ κλειστόν ὄργανον τῆς φωνῆς, ὃ ἀρτυρὲς ὄνομα, τὸ ἀνω πύλος ἐστὶ τῆς τευχέας ἀρτηρίας, ἣν δὲ ἡ φάρυγγα καλοῦσιν, ὁμωνύμως τῇ πρὸς τὴν ἀρτυρῆσιν. hoc est: Primum & principalissimum vocis instrumentum, cui guttur nomen est, finis superior asperæ arteriæ existit, quam utique pharynga nominant æquiuoce cum ea pharynge quæ gutturi incubat*. Quibus verbis certe latenter indicat quorundam errorem, qui abusi vocabulorum proprietate tracheam arteriam æquiuoce faucium, quæ ante guttur sunt, nomine appellauerunt. Quod autem laryngem siue guttur interdum etiam *φάρυγγα* nomine donarint veteres, id nulla alia de causâ factum est, quam quod larynx pharyngis dignissima pars sit. Vtroque autem in genere, masculino nimirum & foemino, *φάρυγγα* nonnunquam pro larynge vsurpatur, ut parum valeat Suidæ distinctio, qui in masculino genere *φάρυγγα guttur*, in foeminino autem *fauces* significare tradit. Nam Galenus *lib. 2. de simpl. medic. facul. cap. 12.* *φάρυγγα* in foeminino genere pro larynge accepit. Sed nos hic illos nihil moramur, qui de genuino, proprio ac vsitato pharyngos significato loquimur. Quapropter si proprie loqui curauerimus, quemadmodum in membrorum dissectionibus maxime conuenit, semper in Græcis auctoribus pharynga, dissectionem corporis ex professo docentibus per dictionem Latinam *fauces* interpretemur. Nec nos offendar Plinius, qui *lib. 11.* summum gulæ *fauces* vocari dicit, nam in plerisque præsertim in anatomicis, vocabulorum etiam proprietatem neglexit. Eadem ratione & laryngis vocabulum, per *guttur* reddamus, non animaduertentes, quomodo alii vsi sint, ita enim proprie iam dictis vtimur vocabulis. Tolerabilior certe Alexandri fuisset sententia, si tracheam arteriam *larynga* vocari dixisset, ita enim partis vocabulum toti accommodasset, larynx enim suprema arteriæ pars est. Extra igitur dissectionis tractationem veteres laryngem interdum *φάρυγγα* nominarunt. Quapropter Alexander Benedictus anatomica tractans, hæc duo nomina diuersas significantia partes confundere haud debuisset.

Magno & impudenti errore Alexandrum Benedictum bronchum cum larynge confundere.

CAPVT XV.

- A**lexander *lib. 3. c. 18. sua anatomes* bronchum iis describit verbis: *Bronchus, inquit, in suprema parte situs est, pelliculare membrum, musculosum, cartilaginofumque ut argutius sit, in quod percussus spiritus, sonus aut vox ipsa perfectius elidatur*. Quæ sane descriptio broncho minime conuenit, id enim membrum pelliculare, musculosum, neruofum, cartilaginofumque, præcipuum vocis, de quo ipse loquitur, instrumentum, non bronchus a Græcis, sed bronchi caput seu larynx nominatur, quemadmodum capite præcedente diximus: Bronchus. adeoque errare Alexandrum euidentissimum est, quum bronchus nihil aliud sit, quam aspera alio nomine vocata arteria. Id quod testatur Galenus ab initio *lib. 7. de anatomica administratione*, ita scribens: *ἑτέρον δὲ γένος ἀρτηριῶν, ὃ ὀνομάζεται τευχέας, ἐν τευχέῃ μὲν μία μέγιστη, καὶ ὅλον δὲ τὸν πνεύμονα ταύτης ὑπονεμένης πολλά. τῷ δὲ ἀνω πύλῳ τῆς εἰρημένης ἐν τευχέῃ μὲν μέγιστη ἀρτηρία, διὸν, κεφαλὴς ὅτι καὶ μόνον ὁ πνεύμων ὑπονεμένης ἀρτυρὲς ὀνομάζεται, καὶ τὸ πρὸς τὸν πνεύμονα ἀνατομικῶν βέλχον κεφαλὴ, διὸ καὶ αὐτὴν τὴν τευχέαν ἢ μόνον ὕτως, ἀλλὰ καὶ βέλχον καλοῦσι. id est: Alterum genus arteriarum est, quas nominant asperas. In ceruice quidem una maxima, quæ frequentiarum serie pulmones adit. Superiore dicta in collo grandis arteria extremo veluti caput quoddam incumbit particula guttur appellata. Dicitur autem hæc etiam a recentioribus anatomicis bronchi caput, eo quod & ipsam totam asperam arteriam non ita solum, sed bronchum quoque nuncupant. Idem docet ab initio *7. lib. de usu par. cor. humani*, ubi ita scribit: *διὰ τὴν τέτον αὐτοῖς ἀγγείον ἢ φύσιν ἐξ ἧς τὸ ἀπὸ τῆς φάρυγγος ἐκκινούμενον, ὃ πνεῦμα μὲν τευχέαν ἀρτηρίαν, ἑνὶ δὲ βέλχον ὀνομάζουσι, νῦν εἰρήσεται. hoc est: Cur autem eis natura coniunxit tertium a faucibus prodiens vas, quod quidam asperam arteriam, quidam autem bronchum nominant, nunc dicitur. Et rursus eodem libro: Nominatur autem, sicut & ante diximus, non hoc nomine solum, sed etiam bronchi caput, quoniam & ipsam arteriam asperam bronchum appellant. Idem docent loca, quæ capite præcedenti ex septimo, de usu partium corporis humani, & sexto, de tuenda valetudine libris citata sunt, quæ repetere in præsentiarum superuacaneum esse duxi. Ex his omnibus sole clarius fit, broncho Græcis nihil aliud**

esse, quam id corporis membrum, quod alio nomine *asperam arteriam* nominant, & nequaquam larynga seu guttur dictum, quemadmodum Alexander Benedictus putat. Proinde cum Alexandro bronchus a gutture nihil distet, non aliud iis verbis, bronchus in gutturis suprema parte situs est, videtur dicere, quā guttur in suprema parte gutturis situm est, aut larynx in laryngis suprema parte sita est, quo certe nihil ridiculosius dici posset. Quod veto larynx siue guttur præcipuum vocis sit instrumentum, multis Galen. lib. 7. de usu partium corporis humani ostendit, præsertim cum sic scribit: ἔτι δ' ἐχόντες οὗτος ἐστὶ τὸ πρῶτον τῆς φωνῆς ὄργανον, ὃ λάρυγξ· δεικνύσθαι σοι μάλιστα. καλεῖται δ' οὕτω τὸ συνάπτον τῷ φάρυγγι τῇ τετραχῶν ἀρτηρίαν μόνον, ὃ δὲ καὶ περιπετὲς φαίνεται κατὰ τὸν τετραχῶν, καὶ φαιδόντων σκληρὸν ἐστὶ, καὶ ἀνατρέχει κατὰ πινόντων, οὗτο· οὐν ὅτι μὲν αὐτὸ τὸ πρῶτον τε καὶ κλειώτατον ἐστὶ τῆς φωνῆς ὄργανον, ἐν τοῖς περὶ τῆς γενέσεως, αὐτῆς δεικνύται καὶ μάλιστα. id est: *Quod autem cartilago hac primum vocis instrumentum est, vel guttur tibi maxime ostendat. Vocatur vero ita particula ea, quæ faucibus asperam arteriam coniungit. Hac utique prominens apparet in collo, tangentibusq; dura sentitur, & deglutientib; recurrit. Hanc igitur ipsam primū & maxime præcipuum vocis esse instrumentum, in lib. de generatione vocis demonstratū est.* Sunt autem laryngi, & aliæ quædam particulæ ad edendam vocem necessariae, quemadmodum loco iam citato Galenus ostendit, & lib. 1. de affectis locis, vbi partes illas quoque enumerat, ita dicens: τῆς φωνῆς αὐτῆς ἰδίᾳ μόρια ταῦτα ἐστὶ συνελόντι μὲν εἰπεῖν, ὃ σύμπεπλῆσται λάρυγξ. καὶ ἁ μέγιστος δ' ἐκ μὲν ἐκόντων, οἷ τε τρεῖς αὐτῶν χόνδρον, καὶ οἱ κινούντες αὐτοὺς μύες τρεῖς, ἅμα τοῖς ἀπ' ἐγκεφάλου νεύροις. ἐπὶ τῇ περὶ τῶν τοῖς ἡένδον τῷ λάρυγγι ἐπιγλωττίδι, ἥ περὶ τὸ κλειώτατον ὄργανον τῆς φωνῆς. αὐτῇ γὰρ ὑπὸ τῶν μὲν ἀνοισμένη τε καὶ συναρμυμένη μελείως ἐξέρχεται τὰς φωνάς. quod est: *Proprie vocis ipsius partes, summam quidem loquendo, totum guttur. Si vero particulam explicare volueris, sunt tres cartilaginee, & totidem has mouentes muscoli, quibus accedunt nervi a cerebro demissi. Et præterea in gutture ligula, hac maxime proprium vocis instrumentum est: etenim cum moderate & aperitur & committitur, vocem efficit.* De qualigula sequenti capite multa. Et discant hinc iterum studiosi, quam necessarium sit in omni disciplina propria rerum nosse vocabula.

Perperam Alexandrum Benedictum epiglottidem cum ligula, quam glottida Græci vocant, confundere, & epiglottidi musculos tribuere, qui proprie loquendo laryngi gutturine potius tribuendierant.

CAPVT. XVI.

Ligula
quid.

NE aliquem vocabulorum moretur ignorantia, sciendum *γλωττίδα* seu *ligulam* nihil aliud esse, quam laryngis rimam, quam duo tertie cartilaginis laryngis processus, in media laryngis cauitate pingui membrana obducti constituunt, præcipuum vocis instrumentum. Sic dicta a ligularum similitudine, quæ ex duabus arundinum laminis inuicem compactis tibiis accommodantur. Non est igitur, nisi ad membrum, quod in regione interna gutturis situm est, linguæ fistulæ perfimile, non solum ad edendam recte vocem, sed etiam spiritus comprehensionem, necessarium. Id quod testatur Galen. lib. 7. de usu partium corporis humani ita scribens: *In regione laryngis gutturisue interna, per quam intro & foras spiritus fertur, locatum est quoddam corpus, neque substantia, neque figura simile alicui aliorum, quæ in toto animali.* Assimilatur quidem linguæ alicuius fistulæ, maxime si infernam & supermam eius partem spectaueris. Vt autem vocem edat animal, indiget omnino etiam ea spiritus latione, quæ ab infernis repente simul erumpit. Indiget autem nihilominus quam hac, etiam strictiori qui est secundum guttur transitu. At non simpliciter strictiori, sed qui paulatim quidem ex amplo ad strictum adducatur, paulatim rursus ex stricto amplificetur. Quod exacte efficit corpus, quod hoc sermone exprimimus ac enarramus, *γλωττίδα*, hoc est, linguam gutturis nomino. *Ἐπιγλωττίς* autem operculum est dictæ iam laryngis rimæ siue ligulæ impositum, ne quid inter epulandum in alienum delabatur tramitem, cauens. Sic vero non alia de causa nominata est, quam quod ligulæ, quæ, vt diximus, *γλωττίς* vocatur, incumbat. Cuius rei testis est loco paulo ante citato Galen. qui ita scribit. τὴν ἐπιγλωττίδα περιμετρὸς ἡ φύσις εἶον ἐπὶ τῇ κατὰ τὸν λάρυγγα σφύρα, ἐκτετατὴν μὲν ἐν τῷ περὶ τὸν ἀπὸ τῆς ἀναπνοῆς τὰ ζῶα, κατὰ τὴν ἀναπνοὴν δ' ἐπὶ τὸν λάρυγγα καταπινόντων ὁπουν. quod est: *Epiglottida non sine prouidentia natura velut operculum quoddam ori gutturis præposuit, stantem quidem rectam toto priori tempore quo animalia respirant, cadentem vero supra guttur quodcumque deglutientibus.* Id quod confirmant etiam ea quæ de epiglottide scribit auctor introductorii, ita dicēs: ὁ μὲν βελόχης περιμέτρους ἐπὶ τὸ κατὰ πινόντων

Epiglottis.

- A** πίνεσθαι τὴν τρεφὴν περὶ σνατρεῶν ἐπιποματίζεται ἀκείβωσ τῇ ἐπιλωτρίδι, ἥ τις πέφυκεν ἐν τῇ ῥίζῃ τῆς λωτῆς, ἢ ἐπὶ λωτῆς οὐ μόνον τὸ σῶμα ἐπιποματίζει. ἀλλὰ καὶ τὴν τρεφὴν, τὴν ὑπὸ τῆς λωτῆς εἶον ὑπὸ πῶς ἀναλεσμένῳ, διαπερδεύει ὁ πνεύματι ἐπὶ τὸν σῶμαχον, ὑπερτὸ σῶμα τοῦ ἐξέσχει ὑπερδεῖσιν αὐτὴν. id est: *Trachea arteria adiacens dum cibis deuoratur recurrens epiglottide, quæ ex radice lingua producta est, operitur. Hac autem non solum os aperit, sed cibum a lingua velut ventilabro purgatum, ori ipsius arterie superimposita ponit modo ad gulam transmittit.* In hunc vsum a natura esse creatam epiglottida, testantur etiam ea, quæ scribit Alexander libro tertio, cap. 18. *sua anatomes*, ita inquit: *Gutturi epiglottis sub ipsis faucibus quoddam operculum lingue postrema annexum accommodauit, ne quid cibi potusue in alienum delabatur iter, quoniam spirandi meatus intercluduntur.* Quum igitur duæ & inter se diuersæ sint corporis partes glottis seu ligula & epiglottis, perperam fecisse
- B** Alexandrum Benedictum libro tertio, *sua anatomes*, capit. 18. constat, quod illas inter se confuderit, atque vnam & eandem esse statuerit, dicens: *Miro igitur opere id operculum constitutum est, quod linguam minorem Galenus vocat, eam ob causam duabus apposita est fistulis, ut per vices aperiat, & integat.* Alexandro autem imposuit deprauata codicis Galeni lectio. Huic quoque membro aliquot musculos tribuit lib. 5. cap. 18. *sua anatomes*, dum sic scribit, *In epiglottide, gutture ac gula 32. sunt musculi.* Quibus verbis etsi nō manifestet quot epiglottidi, quot gutturi, quotque gulæ tribuat musculos, tamen cum per guttur, vt supra diximus, asperam arteriam & eius superiorem partem, larynga dictam, intelligat, ipsius quidem arteriæ erunt musculi quatuor, laryngis vero viginti: totidem enim huic membro Galenus libro septimo, de usu partium corporis hum. assignat his verbis: *Mouetur autem guttur a musculis secundum suam quidem propriam compositionem duodecim, secundum communionem vero, quæ ei est cum adiacentibus ab aliis octo.* Et paulo post: *Propter hoc ipsum autem & communes trium cartilagineum musculi facti sunt decem numero, primo quidem duo dicti, qui anteriores partes copulant, & claudunt magnam gutturis cartilaginē. Qui vero consequenter duo sunt, eas quæ per profundum. Aliorum vero sex, quatuor quidem aperiunt aritenoidæ cartilaginem, reliqui vero duo claudunt. Quibus adiutores duo musculi transversi pluribus animalibus sibi inuicem inniti, basin stringunt tertiæ cartilaginis. Hi igitur omnes musculi in gutture continentur, nulli adiacentium instrumentorum copulati. Alii vero octo musculi colligantes ipsum corporibus quæ sunt in circuitu, alterius motus sunt duces, per quem totus spiritalis meatus amplificatur & contrahitur.* Cum itaque viginti sint gutturis seu laryngis ex Galeni sententia musculi, & quatuor arteriæ, tunc simul iuncti erunt vigintiquatuor: octo ergo supererunt epiglottidi tribuendi, nullos enim habere gulam antea monstrauiamus. Nemo autem vnquam ex probatis scriptoribus totidem epiglottidi musculos assignauit. Si qui enim huic musculos tribuunt, duos tantum tribuunt, qui propemodum teretes, & ex media interiori ossis vel referentis sede explantati, radici epiglottidis siue laryngis operculi inseruantur. Atque duobus iis musculis munus id concreditum est, vt epiglottidem cibis potuque depressum, denuo eleuent. Secutus est autem in hoc Razem, qui lib. 1. cap. 3. eandem quoque sustinet sententiam, dum ita scribit: *Musculi qui gulam & epiglottim mouent sunt triginta duo.* Atqui præstat, vt nullos plane epiglottidi, præter duos iam dictos, musculos tribuamus, quum alios non habeat præter illos, qui eam depre-
- E** sam rursus alleuant. Neque obstat quod Auicenna Fen. 1. Can. 1. doct. 5. Sum. 2. c. 11. epiglottidi musculos tribuat. Is enim per epiglottidem non operculum laryngis, sed larynga siue guttur intelligit, id quod aperte eiusdem testatur descriptio, quæ sic habet: *Epiglottis est membrum cartilagineum, creatum vt sit vocis instrumentum, quod ex tribus compositum est cartilaginibus.* His enim verbis plane larynga depingit, vt videre licet apud Galen. libr. 7. de usu partium corporis humani, vbi sic scribit: *Constat autem larynx ex tribus magnis cartilaginibus, quarum maxima est anterior, quam & tangimus, foris quidem cōuexa, intus autem concava, scuto maxime similis. Secunda vero cartilago quanto minor est prima, tanto maior est quam tertia, internis quidem partibus locata est, qua stomachus subsidet. Tertia cartilago in angustum valde transitum desinit, quemadmodum prolixius ibi Galenus differit.* Quare euidentissimum est Auicennam, vel huius interpretem per epiglottidem non laryngis operculum, sed guttur intellexisse. In quem etiam errorem multi hodie recentiorum lapsi sunt, qui abutentes vocabulo, per epiglottim passim larynga siue guttur, & interdum etiam ligulam accipiunt. Qui certe merito reprehendendi sunt, quod proprietate vocabulorum neglecta, perspicue de rebus loqui non valeant, atq; adeo fit, vt ambiguitate

Auicenn. per
epiglottim
larynga in-
telligit.

Vocabulorū
proprietates
non negli-
genda.

vocum multis errandi occasionem præbeant. Discant igitur monco veritatis studiosi A
propria rebus suis adhibere vocabula, ita enim citra difficultatem quod expetunt ad-
discent, eademque facilitate reliquos post docebunt.

*Cerebrum naturam aduersus cordis calorem non esse molitam, veluti Alexander
Benedictus, Aristotelem in hoc secutus, putat.*

CAPVT XVII.

ALexandri sententia habetur lib. 4. cap. 2. *sue anatomes*, vbi inter cetera de cerebro
sic scribit: *Cerebrum omnium frigidissimum est pro cordis temperamento. solet enim natura
semper moliri contra cuiusvis exuberantiam auxilium per coniunctionem rei aduersa, vt excelsum
alterum altero compestcat. In vniuerso enim corpore frigiditas ad temperandum naturalem calo-
rem a natura data est, quod tactu percipitur & ratione intelligitur, sanguinis enim nihil habet.*
Quibus sane verbis aliud non innuit, nisi quod cerebrum gratia caloris, qui circa cor
est, a natura factum opinetur: lecutus in hoc Aristotelis erroneam sententiam, quam
prodit lib. 2. de par. animalium, cap. 7. sic scribens: ὁ μὲν γὰρ ἐγκέφαλος ψυχρότατος τῶν ἐν τῷ σώματι
μορίων. αἰὲν γὰρ ἡ φύσις μηχανάται πρὸς ἑξέσαι ὑπερβολὴν βοήθειαν τὴν τοῦ ἐναντίου περιτρίβειαν, ἵνα ἀνιστάται τὴν δια-
τέραν ὑπερβολὴν διατέραν. διὰ ταῦτα τὴν αἰτίαν πρὸς τὸν τῆς καρδίας τόπον καὶ τὴν ἐναντίαν θερμότητα μεμνημένηται τὸν
ἐγκέφαλον ἡ φύσις. τοῦτου χάριν ὑπάρχει αὐτὸ τὸ μόριον τοῖς ζώοις, τὴν φύσιν ἔχον κοινὴν ἵδαντα καὶ γῆς καὶ διὰ τοῦτο
τὰ ἔναιμα ἔχει πάντα ἐγκέφαλον. τῶν δὲ ἄλλων οὐδὲν ὡς εἶπεν, πλὴν ὅτι κατὰ τὸ ἀνάλογον οἶον ὁ πολὺς ποῦς, ὁ λιγύς τε
μα πάντα διὰ τὴν ἀναμίαν. ὁ μὲν οὖν ἐγκέφαλος ἔυκροτον ποιεῖ τὴν ἐν τῇ καρδίᾳ θερμότητα καὶ ζῆον. hoc est: Cere-
brum omnium partium corporis frigidissimum est, solet enim natura semper emoliri contra cuius-
vis exsuperantiam auxilium per coniunctionem rei aduersa, vt excessum alterius altero compen-
set, & moderetur. Idcirco aduersus cordis sedem & calorem, cerebrum natura molita est. Et ea
de causa pars ista animalibus iuncta est, naturam obtinens aqua & terra communem. Atque ob
eam rem cerebrum omnia sanguine prædita habent, ex ceteris nullum fere nisi per proportionem, vt
polypus, parum enim caloris obtinet omne id genus propter sanguinis priuationem. Cerebrum igitur
calorem feruoremque cordis moderatur, & temperiem affert. Erroneam autem esse vtriusque
sententiam vel litus maxime cerebri satis demonstrat: cum enim locus alterans parti
alteranti proximus sit oportet, fieri non potest, vt ex tanto interuallo, præsertim densis
ac tutis duorum ossium sepimentis interpositis, frigiditatem suā cerebrum ad cor per-
fundat. Id quod fusius docet Galenus lib. 8. de usu partium corporis humani in eū modum
scribens: τὸ οἷον τῆς ἐπὶ τὴν καρδίαν θερμασίας ἕνεκα γιγνόμενον τὸν ἐγκέφαλον, ἀναψύχοντά τε αὐτὴν, καὶ εἰς μετεο-
ρήματα κρᾶτεις ἀγρία, παντοίως ἀποπον. οὐτε γὰρ αὐτὸ οὕτω πόρρω τῆς καρδίας ἡ φύσις ἐτάξεν αὐτὸν, ἀλλ' ἵτοι πάντη περιεί-
βαλεν αὐτὸν ὡς περὶ καὶ τὸν πνεύμονα, ἡ ἐν ὥσπερ καὶ πάντας κατέτετο, οὐτ' αὖ τῶν αἰσθησέων ἀπασῶν τὰς ἀρχὰς εἰς αὐτὸν
ἀνῆρτησεν. ἀλλ' εἰ καὶ τοσούτον παρῆσεν, ὡς καὶ πόρρω τάξει, καὶ τὰς αἰσθήσεως συνάψαι μὴδὲν δέον ἀλλ' οὐ γὰρ διττοῖς αὖ
περιβάλοις οὕτως ἀσφαλές καὶ πυκνοῖς δευτέρῃσι, τῷ μὲν τὸ κρᾶνιον ὅλον, τῇ δὲ τὸν ὥσπερ περιείχετο. ἡ εἰ καὶ ταῦτα πα-
ρῆσεν. τὸν γοῦν τετραχλον οὐκ αὖ εἰς τὸ μέσον ἀμφοῖν φέρονσα κατέτετο. καὶ ταῦτα ἐν τοῖς θερμότητος ζώοις, καὶ τοῖς θερ-
ματέροις ὀνομαζομένοις ἰκανῶς μακρόν. ἐν δὲ τοῖς ῥηνοῖς ἐπὶ καὶ μᾶλλον. ὥστ' ἴσιν ἀφραίνει τῆς καρδίας τοῖς πρὸς τὸν
ἐγκέφαλον. ὁμοιον γὰρ τοῦτο καὶ τὸ δέματι τῷ φάσκον ἕνεκα καὶ τῆς καρδίας τὰς πύργους γιγνόμενα. καὶ μήσιν δοκεῖν μετὰ γαλῆν
χάριν οὕτως εἶπεν, ἀλλ' αὖ ἀκρίβως σκοποῖνς δῆλον ἐκ τῶν πλεονῶν εἰς τὴν καρδίαν ἀφίξεται τῆς ψυχῆς, ἡ οὐλοῖ ἐγκεφα-
λου. εἰ γὰρ καὶ πόρρωτέρω τετάχθαι δοκοῖν οὐ γὰρ ἀνθρώποις, οὐ γὰρ ἐν ἀπασιν κατὰ τοῖς ζώοις, ἀλλ' εὐπὶ ποδηγεῖτον διττοῖς
ὁσῶν περιβάλοις. οἷον ἀσφαλές τείχεσιν. ἐν μὲν γὰρ τοῖς κατὰ μέρεσιν μόνοις, οὐκ ὅσον ὁρεῖν. ὁ δὲ ὥσπερ, ἀλλ' ὑμνωδὲς τε
καὶ μυῖαι σῶμα, τὸ διάφραγμα καλούμενον, ἐν ταῦτοί τε τέλει, διαπέμπειν ἐτοιμότερον ψύξιν. ἢ μὴν οὐδ' ἡ τῶν ψυ-
χρᾶς εὐρεῖς αὖ τὰς πύργους τοῦ ἐγκεφάλου. τοῦτο γὰρ καὶ μὴδὲν, ἀλλὰ τότ' ἀπενεκεῖ τῆς κινήσεως ἰκανὸν ἐκθερμαίνειν, ἵνα
ᾧ ὥσπερ λαίπει τὸ πλεονῶν καὶ μέγεθος τῶν ἐν αὐτῷ φλεβῶν καὶ ἀρτηριῶν, αὐτὸν οὐδὲν ὅτι θερμότερον ἐν ζώου σώματι μόριον,
ἀλλὰ καὶ τὸ σκεπόμενον διττοῖς μνήνι. καὶ μετὰ ταῦτα συληροτάτω τε ἅμα καὶ πυκνοτάτω καὶ παχυτάτω ὁσῶν. τοῦτον γὰρ
τὸν κατὰ τὴν βάση αὐτοῦ, δι' ὅ πάντως ἡ ἐπὶ τὴν καρδίαν ἑλθὼς τῆς ψυχῆς. ἢ γὰρ διὰ καὶ τῆς κορυφῆς, καὶ ταῦτα τὴν γὰρ
ἐν αὐτῷ θερμασίαν ἐξ ἀνθρώπου ἐπαυξήσει, καὶ τῆς κατεψυγμένης ψυχρῆς τῆς τῆς ἐπὶ τὴν καρδίαν ὁδὸν ἀμείχανον τε καὶ
παντελῶς ἀπορὸν ἐξέρχεται. id est: Opinari gratia caloris, qui in corde est, factū esse cerebrum, vt scilicet id
refrigeret, & ad moderatā temperiem ducat, omnino est absurdum. Nequaquā n. natura ipsum tam
longe a corde locasset, verū aut id vnde quaq. cordi circumposuisset, perinde atq. pulmonē, aut in tho-
race omnino posuisset: neq. etiam sensuum omnium principia id ipsum cerebrū locasset. Sed tamen si ne-
glexisset, vt illud procul a corde locaret, & contra quam decuit sensus ei affixisset, non tamen demum
binis septis ita munitis & densis easuisset, huic quidem cranium totum, illi autem thoracem cir-
cumponens. Si vero & hac contempsisset, collum tamen nequaquam in medio anborum posuisset.
Adde quod hac in calidissimis animalibus, & asperos dentes habentibus satis parua sint. In volati-
libus autem adhuc negligentius se gessit, vt quibus aequaliter distent a corde pedes & cerebrum.

Simile

- A** Simile enim est hoc placitum, ac si diceretur, gratia cordis factos esse calcaneos. Neque putet quis me gratia derisionis ita dicere, nam si diligenter intenderit, citius a calcaneis ad cor aliqua perueniet refrigeratio, quam a cerebro. Licet enim longius locari videantur in hominibus, non tamen in omnibus animalibus, sed neque duobus ossium septis velut tutis muris prohiberentur. In solis namque infernis partibus non est ossus thorax, sed membranosum ac musculosum corpus, septum transversum vocatum, ibi locatum est, ad frigiditatem immittendam promptissimum. At vero neque minus frigidus inuenies utrique calcaneos quam cerebrum, hoc enim etsi nihil est, continuus tamen motus sufficiens est excalfacere: ut interim omittam multitudinem & magnitudinem venarum & arteriarum qua in eo sunt, quibus nulla est calidior in corpore animalis particula. Sed & quia cooperitur duabus membranis, ac præter hæc esse durissimo, densissimo, & crassissimo, tale enim est id quod in basieius iacet, per quod omnino refrigerationis ad cor via ablata est, non enim utrique per cacumen hæc caliditatem, qua in eo est, necessario augebunt, viam frigiditatis ad cor impossibilem, & qua inueniri haud queat, operabuntur. Ex quibus sane verbis satis liquet, ob remotam a corde positionem, itemque ob alia, quæ obstant, fieri non posse, ut cerebrum cordis caliditatem moderetur. Et quid attinet cor a cerebro refrigerari, cum id abunde possit respiratio, quæ quidem frigidum aerem inspirat, feruentesque fumos halitusque exspirat? Mirum autem est, Aristotelem Hippocratice & vere de respiratione alibi sentientem, hoc loci quod alias recte dixit, oblitum esse. Sed diceret forte quispiam, aerem cerebro multo esse calidiorem, proinde quum parcius, quam conuenit, cor ab eo refrigeretur, auxilio egere, quod a cerebro, utpote frigidiori, præstetur. Huic cum Galeno respondemus, ita loqui aut sentire nullos, nisi qui excedentia veritatem loquuntur, aut ea quæ apparent, ignorant. Cerebrum enim nunquam non aere calidius multo esse inuenitur, si fractum alicuius caput manu contrectemus. Et qui fieri posset, ut aër cerebro calidior esset, cum incisus cranio aut huius membranis citissime festinemus, summeque cauemus, ne perfrigeretur ab ambiente aere cerebrum? Quid si itaq; aer cerebro calidior esset, nequaquam ab eo refrigeraretur, cuius tamen contrarium, ætate etiam ipsa, ubi omnium maxime calet aer, experimur. Porro cum omni calido ad sublime sit impetus, cor cerebrum, quod sibi superpositum est, magis calcfaciet, quam cerebrum cor. Quid multa? monstro siquidem simile erit, si cerebrum longissima sane & calidissima, perque multos in medio obices, in frigidare potest, proxima autem & minus calida, sibi que congenita ac applicata, veluti est membrana tenuis, similiter afficere haud potest. Calidam autem esse tenuem membranam, ut quæ plurimas in seipsa venas & arterias habeat, & quæ semper tota pulset, id quod nequaquam absque feruente caliditate efficitur, nemo sane mentis negare potest. Quare & Aristotelem, huiusque æmulum Alexan. Benedictum, errate necesse est, quemadmodum fusus loco prænominato Gal. ostendis: cerebrumque nulla alia ratione factum a natura existit, nisi ut neruorum principium & vniuersorum sensus instrumentorum, motusque voluntarii dux esset.

P E R O R A T I O.

- E** Hæc habui studiose Lector, quæ in præsentiarum de paradoxis Medicinæ differerem, nulla siquidem gloriæ cupiditate ductus, nec ullis liuoris stimulis agitur, sed tantum veritatis amore huc pertractus. Quid enim gloriæ ex aliorum sugillatione sperarem, unde plus odii ac inuidiæ quam laudis venari licet? Fieri n. non potest quin obsequium amicos, ut ille ait, veritas autem odium pariat. Neque est quod spe lucri in eum scribendi campum me diuertisse quispiam temere suspicetur, quando probe expertus sim, quantum inde annis aliquot & rerum & fortunarum iacturam fecerim. Dum n. omnes alij ampliandæ rei familiaris ac dignitatis ratione habita, ut summis honoribus afficiantur, & quam ditissimi euadant student, huncque solum sibi rerum agendarum scopum proponunt, vnus ego in Germania fere indagandæ veritati, posthabitis omnibus, operam nauans, præter multorum odia, ac rei familiaris tenuitatem & inopiam ipsam nihil exspecto. Neque interim tamē in hoc campo pugnare pigebit, modo aliqua inde ad studiosos comoditas perueniat. Poinde mordeant, sugillant, vulnerent, dilacerent etiā, nunquam tamen dum viuam in acie pro veritate stare detrectabo. Vltima denique experiri potius quam signa turpiter deferere mecum constitui. Quare laborē hunc nostrum boni consulas, & si non per omnia tibi satisfactum fuerit, conatum saltem quæso, quando in magnis

442 Operum Leonhardi Fuchsi Pars III.

& voluisse sat sit, donec meliora obtingant probato. Spero enim futuros post hac multos, qui & eruditione & dicendi facultate nos longe superabunt. Hi itaque ea quæ a nobis omiſſa, aut non pro dignitate tractata sunt, in lucem proferent, maioriq[ue] dicendi copia illustrabunt. Cuius rei euidentissimum nobis exemplum nuper præbuere viri eruditissimi, Petrus Franciscus Paulus, & Leonardus Grachinus, quorum opuscula Arabes atque barbaros Medicos suis depingentia coloribus, dum paradoxæ hæc nostra absoluissemus, typographorum opera in lucem prodierunt: in quibus certe multa sunt, quæ his, quæ hic docuimus, fidem facere possunt. Multa denique quæ nos prodece distulimus, iam pridem tamen muſſitauimus, veluti est aquarum destillatarum comiectum, quod sane vt inutile, ac præter omnem rationem excogitatum, multis iam annis negleximus, parum curantes quantum a multis nostræ tempestatis Medicis probetur, admireturque. Sunt & plura alia, quæ viri iam nominati in studiosorum gratiam illic docuerunt, quæ ad exactam medendi rationem probe cognoscendam non parum momenti afferunt. Quapropter & erudita illa opuscula omnibus modis tibi commendata esse velim. Et faxint superi, vt ex hac noua Academia multi indices eiusmodi libelli prodeant. Tu vale, & conatum nostrum æqui bonique facito.

FINIS.

INDEX



INDEX RERVM ET VERBORVM

IN OPERIBVS Dn. LEONHARDI FVCHSII

CONTENTORVM.

*NUMERVS PRIOR OPERIS PARTES,
posterior paginas designat.*



A Bdominis muscoli octo, 3. 171
f. obliqui, descendentes, al-
cendentes, recti transuersi 1
3. 72. a. obliqui descendentes
ortus 1. 372. a. oblique ascen-
dentes ortus, ibid. b. recti o-

rigo, ib. d. transuersi origo ib. f. abdomi-
nis musculorum vsus, 1. 373 a b
ablutione quando vtendum, sumto medi-
cament 0 4. 385

abscessus qui 3. 229 e causæ, ibid. signa, cu-
ratio ib. f. curatio 3. 230 b

abscessus curatio 3. 24 d

abscessus vnde dictus 3. 207 a

abscessus, 1. 2. 13 c eius genus duplex ibid. d

abscessuum notæ communes, propriæ 1. 229
b c

abscessum ruptentia catapotia 3. 91. a

abstinthum surmum ventriculi remedium
3. 191 c

abstinthum Romanum 2. 219 b

abstinthum necat lumbricos 4. 332

abstergentiapap 3. 215 a

abstinentia 1. 163 b

abstinentiæ incautæ adhibendæ incommo-
da 1. 163 c

acacia officinarum 2. 24 c

acacia vera 1. 32 f officinarum, ib.

acacia officinarum nostratum, 2. 257 a

acarbia 2. 13 c vltata vt conficiantur, ibid.

acantha, 1. 304 c

accidentia natura 4. 308

accidentia vicem differentiarum sustineat ib.

acerabula, 2. 63 f

acerabulum, 1. 282 e

acerabulum femori articulando paratum,
1. 335 a

acetosæ semen, 2. 18 c

acetositas citri, 2. 37 c

acetum, 2. 31 c

acetum album, 2. 210 b

acetum scylliticum, 2. 216 b

aceti vis ad scirrhus salutaris, 3. 228 c

aceti vires, 1. 137 d

achor quid, 3. 7 d

achores, 1. 194 c

acidula cibocana, 1. 156 c

aconitum non bibendū contra albas 4. 316

aconitum quando intro sumendum ibid.

aconitam in potu non sumendum, ibid.

aconyti lycoctoni radix, 2. 25 c

acorus, 2. 156 c

acorus quid, 3. 37, b

acorus conditus, 2. 201 a

acori adulterini vsus, 2. 26 a

acori veri radix, 2. 25 c

actionum vsus quando ischiadicis conueni-
ens, 3. 175 a

acro aggrigentius, 1. 15, b

acro chinismus, 1. 102 a

acromiatus summus humerus 1. 47

actio lzla laborantem partem prodit, 1. 84 a

ex actionibus corporis constitutio digno-
scitur 1. 84 a. num actio nulla lzdatur, nisi
pars quæ ipsam efficit laboret, 1. 84 a

actio quid, 1. 78 d actio animalis, ib. c. f. vira-
lis, ib. f. naturalis, corporalis, 1. 79, a. ani-
malis quid 1. 79 a. naturalis quid ibid. pra-
ctica actio quid & quæ, ibid, d actionum
quæ motu voluntario fiunt, duplex diff

rentia, 1. 79 c. actionis vitalis differentia, 1.

80 b. naturalis actionis differentia, 1. 80 c

actionum naturalium quæ practica dicantur, 1. 83 f

actiones corporis a medico cur consideran-
da, 1. 83 f

actu & potestate esse quid, 1. 35 d

actuarius iocus emendatus, 2. 127 b

actuarius quando vixit, 1. 120 b

acus qualis debeat esse in suendo vulnere, 3.

243 c

adamas, 2. 68 d

adeps, 2. 50 d

adeps seu pinguedo, 1. 332 b Eius generatio,

ib. b pinguedo quibus copiosior ibid, quis

color & vsus, ibid, c

adhærens tunica, 1. 71 d

adianthum, 2. 176 a

adianthum, 2. 175 a

adianthum album, 2. 214 b

adipum preparatio, 2. 23 c

adunata cur ita dicta, 3. 51 d. causæ, notæ ibid,

adstringentia, 3. 118 a

adstringentium commoditas, 3. 125 c

adstringentia medicamenta, 3. 152 b

adstringendi facultas non solum frigidis, sed

& calidis inest, 2. 103 b

adstringentibus medicamentis in ischiade no

vtendum, 3. 174 c f

adstrictio quid 1. 14 c

adurentia, 2. 105 a

adurentia, 3. 175 c

aduria quid 3. 63 c eius causæ, notæ, curatio

ibid.

aer cur, medico considerandus 1. 90 d, pesti-

mus 1. 91 a. frigidus & humidus cur paran-

das 1. 91 f

aer pestilens quis 3. 202 b

aer calidus & siccus cur parandus, 1. 92 b

aer peste infectus vt corrigendus, 3. 209 d

aeris viridit signa 3. 200 b

aeris nos circumdantis temperies conside-

randia 3. 250 d

aereolum 2. 125 d

erugo 3. 273 c

erugo æris duplex 2. 55 c

erugo æris fossilis triplex 2. 55 c

erugo rasilis 2. 55 d factitia triplex ibid, d

æz vltum seu crematum 2. 55 d

æz vltum officinarum improbatum 2. 55 e

æris fex 2. 59 b

æsculapius, 1. 1 d

æstiu qui 4. 32 f

ætas quid 1. 25 c

ætas quid indicet 1. 272, d

ætas virilis 1. 26 c eius temperamentum

ætates sex 1. 25 c

ærii locus expensus, 2. 135 a

ærius defensio 1. 198 d

ædytes 2. 68 d

affectus vulnere coniunctus primo curandus,

3. 253 b c

affectus lzla laborantem partem prodit, 1. 84 b

affectus trifariam sumitur 1. 166 c. contracte,

& proprie, ibid, d c

affectus nostri corporis quotuplices 1. 187 d c

affodillum officinarum est lilii species 2. 29 b

affodillum 2. 29 b

agaricum 2. 26 a

agaricum quid ; vnde dictum, eius genera,

mas, formina, vires, pondus 2. 118 d c f

agaricum trochi statum 2. 227 b

agatici dilurum 3. 82 f

agglutinator 1. 81 a

agni costi flores 2. 16 a

agollochon 2. 45 d

agresta 1. 31 c

agresta 2. 206 c f

agricolæ obiectio, 4. 377

agrimonia auicennæ 2. 9 a

agrimoniæ effigies, 4. 307

agrimonia pro Eupatorio vsurpanda ibid.

alabastra 2. 68 c

alabastrites 2. 68 c

alantoides, 4. 424

alarum narium musculus, 3. 56 c

albarecta 2. 229 d

alboras 3. 224 c

albugines siue cicatrices oculorum duplices,

3. 58, c vnde dictæ ib. d. earum curatio ib, b.

album græcum 2. 54 c

alchachengi 2. 13 b

alchachengi 2. 239 a

alchechengi p. 2. 9, c

alcola, 1. 20, d

alcola vide aphtha,

aidibik est lxiæ 4. 330

alexandri benedicti lapsus 4. 474

alex bened. error de vtriculis cordis, 4. 429

alex benedicti error de Trachea 4. 435

alexandri error de broncho 4. 437

alexander confundit bronchum cum gutte-

re, 4. 437

alex benedicti error de Phamige 4. 435. 436

alexipharmaca 2. 106 d

alexiteria, 2. 106 d

aliben vox Arabica 4. 341

alibium non est eryngium ibid.

alimentum exsuperans non est causa conco-

ctionis, 1. 174 c

alimenti preparatio in ore 1. 81 f

alkali 2. 56 c

alkarmes 2. 17 c

aloes 2. 178 b

aloe optima quæ 2. 33 a

aloe sola inter omnia purgantia ventriculi

confirmat 2. 115 d

aloe in pestilenti constitutione non lauanda,

2. 190 a

aloes faculas in lumbricis necandis, 3. 124 c

aloes aridæ in partibus pudendi exulceratis

remedium praesentissimum 3. 155 d

aloes facultas praecipua in calidis ventriculi

humoribus expurgandis 3. 102 b

aloes vires 3. 38 a

aloes delectus & genera 2. 114 c

aloes pondus 2. 115 f

aloes lotio simplex 2. 90 c exquisitior ibid. f

lotio cum aromatiz 2. 91 b

aloe quando venas aperiat, 4. 499

aloe adhibetur catapotii epatis, 4. 301. 302

aloes vires, 4. 298

aloe an ora venarum aperiat, 4. 498

aloe non nocet iocinosi, 4. 301

aloe intus sumta, an venas aperiat, 4. 300

aloe non nocet stomacho, 4. 301

aloe non erodit, 4. 300

aloe mixta melli plus purgat, 4. 301

aloe post cibum non exhibenda, 4. 384

aloe contrarias habet facultates, 4. 300

aloisus cadamaftus, 4. 359

alopecia quid 3. 1 a

INDEX

- alopecia, 1. 194 c
alphos 1. 212 d
alphos, 3. 224 c. Vide vitiligo
alsine habet æquales vires helxinæ 4. 331
alsine an auricula muris, 4. 331
alteratio stabilis & permanens, 1. 173 b
alterationi plus, quam vacationi studendū,
4. 388
alteratrix Vide facultas
altheæ semen 2. 16 b
altheæ radix, 2. 26 b
althohoin quid, 4. 409
altrix Vide facultas,
alumen plumosum, 2. 69 a
alumen 1. 55 f. liquidum, ibid. Rochæ, phori-
mon, paratum, concretum, 2. 56 a
alumen capillare differt a plumoso 2. 56 a
alumen scissile, rotundum, talare, latercula-
tum, crutaceum, tabularum 2. 56 b
alumen Rochæ, rupeum, plumcum, catinum,
scaliolæ, succarinum 2. 56 c
alumen catinæ & scaliolæ, ibid.
alui deiectio, vide deiectio.
alui excrementa, 1. 150 b
alui fluor cum lumbricis coniunctus vt cure-
tur, 3. 225 b
alui profinium non temere sistendum 3. 114 a
alui in excrementis sunt considerandæ quali-
tas, consistentia, color, mutatio excreme-
torum, 2. 150 b c
amaræ herbæ nomine quid intelligatur, 2.
146 a
amara cur non nutriant, 1. 31 b
Amari Lustrani error 2. 70 d
Amari Lustrani error 1. 197 f
ambar Auicennæ 2. 67 d
ambar subalbidum 3. 150 d
ambarum factitium 2. 73 b
ambarum subalbidum 2. 67 d
ambra 2. 72 c
ambra officinarum 2. 73 b
ambra recentiorum triplex 2. 73 b
ambrosia 1. 283 a
ambustis medentia 2. 106 c
ambustorum curatio 3. 223 a
amentum dulce 2. 48 d
amethystus 2. 68 f
amianthus 2. 68 f
amianthus lapis 2. 55 b
amianthus 2. 250 a
ammi 2. 171 c
ammisemen 2. 16 b
amomum 2. 129 c. eius succedaneum ibid.
amomum 2. 183 a
amomi semen 2. 16 b
amomum adulterinum, 4. 359
amor quid 1. 81 c
anamoniacum 2. 136 c
ammos 4. 425
amygdala 2. 20 a
amylum 2. 170 c
anacardina Ioannis Damasceni 2. 152 d
anacardium 2. 20 a
anachites 2. 68 d
anagallidis duo genera 4. 332
anagallis extrahit furculos 4. 332
anagallis an auricula muris 4. 332
analepticum 2. 155 b. curata dictum ibid. e
anaphrodisia 1. 283 d
anasarca 3. 139 f. signa, curatio, ib. in ea quæ
medicamenta purgantia, & quæ extrinse-
ca adhibenda 3. 140 f
anasarca 3. 138 c
anasarca 1. 209 c
anastomosis 3. 254 c. f. vnde excitetur ib. ef
anatomie an Galeno commode peti possit,
1. 278 a. eius anatomica qui in epitomen
redegerint ib.
anatomie quid 2. 79 c. eius vsus & necessitas,
ibid. dux est ad Dei cognitionem ibid. ad
sui ipsius, & ad mores formandos, ibid. ef
medico utilis est & necessaria eius cogni-
tio 1. 280 d. in ea olim pueri exerciti, ib. f.
item & Philosophi veteres 1. 281 a. quin &
reges & principes ibid. b. cur ab ossibus sit
aspicienda ib. c
anatomie a Germanis medicis contempta &
neglecta 1. 277 d
anatomici libri Galeni diligenter legendi,
anatomie laus 4. 420
anatomie basis medicinæ 4. 413. 4. 406
andromachis 2. 131 d
anethum sylvestre 2. 29 c
anethi flos 2. 13 d
anethi semen 2. 16 c
aneurisma 1. 215 a
anfractus cerebri 1. 476 c. eius vsus ib. f
angelica radix 1. 26 b
angina 1. 205 c
angina quid 3. 79 f. vnde dicta ibid. f. eius dif-
ferentia quatuor ibid. causæ, signa, cura-
tio 3. 80 b
angina 4. differentia 1. 205 c
anglicus sudor, 1. 133 c. medicorum in eo cu-
rando inscitia ibid.
angulorum oculi vitia 1. 203 c
animalia quæ plures sinus vteri habeant 4. 427
animalia, & eorundem partes quomodo ad
seruandæ 2. 77. d
animal aut stirps quando optime se habeat,
1. 211 c
animalis spiritus generatio 1. 63 d. vide spiri-
tus
animalis fac. vide facultas.
animalis actio. vide actio
animantes quorum vsus in medicina 2. 47 c
anthesisemen 2. 16 c
annata & cornæ vitia 1. 204 d
anodyna 2. 106 b c
anodyna 3. 104 f
antali 2. 250 b
antallium vtrā dentali differt 2. 48 c
antali non sunt lapides 2. 48 a. quatesta offi-
cinæ hodie pro antalis vtantur 2. 48 a
antalium 2. 47 c
antali quid 2. 47 d
anthos 2. 13 d
anthos 2. 161. f
anthos 2. 15 c
anthos 2. 203 a
anthrax & carbunculus Synonyma 4. 405
anthraxidem cum igne Persico, ibid.
anthrax quid ibid.
anthrax 1. 211 c
anthrax. vide carbunculus
antidotus diaphneticon Mesuæ filii 2. 185 d
antidotus plures argonticæ 2. 164 c
antidotus liquida roborans 3. 209 f
antidotus e Damascenis pennis 2. 176 b c. e
psyllio 2. 180 b. e succo rosarum 2. 181 a. e
rosaceo iulapio ib. c. antidotus catholica
Nic. Præpositi 2. 183 f. catholica Nic. My-
repsi 2. 184 b. curata dicta ibid. d
antidotus Episcopi Mesuæ filii 2. 186 b. anti-
dotus Hamech Mesuæ filii 2. 186 antido-
tus hamech altera 2. 187 a
antidotus e tragacantha calida 2. 158 d
antidotus hæmagogos 2. 159 a
antidotus e floribus 2. 161 c. e margaritis, 2.
162 a. 2. 163 a
antidotus anacardina 2. 152 d
antidotus Mithridatis 2. 155 d
antidotus e baxis lauri 2. 152 c
antidotus e gemmis Ioan. Damasceni 2. 164 a
antidotus e curcuma magna 1. 169 c. e mar-
rubio ib. f. exiride 2. 170 d. ex hyssopo 2.
170. f. et tribus piperum generibus 2. 170 a.
e nucibus 2. 172 b c. ex ouo incerti au-
ctoris 2. 172 c. ad tussientes 2. 173 c. e se-
minibus 2. 174 a. cordialis ibid. b
antidotus e penidiis 2. 158 f. & 2. 159. b. manus
Christi cur dicta 2. 159 c. aromatica rosata
Gabrielis 2. 160
antidotus diambra 2. 160 d
antidotus ex aniso 2. 167 c d. e cymino ib. d.
e calaminta 2. 168 a. e lachamagna ib. c
antidotus e brassica marina incerti auctoris
2. 189 a
antidotus ex acoro, 2. 156 a. e rosis ib. f. e tra-
gacantha frigida 2. 158 b
antidotus e castorio 2. 150 c. hætenus recte
parata non est ib. c
antidotus e cinamomo 2. 166 b. e ligno aloes
ib. c. e canamo 2. 188 b. e brassica, 2. 189 a
antidotus aurea Alexandrina 2. 226 c. aurea
cur dicta ibid. f
antidota robur corpori adicientia, liquida,
2. 150 c
antidotum liquidum pro obstructione ictero-
ris 3. 130 d
antidotum liquidum 3. 158
antidotum Mithridatium Andromachi, 2.
137 a
antidota robur corpori adicientia solida, 2.
156 f
antidota 2. 263 f. eorum veteribus tres dif-
ferentia 2. 264 a. antidotum quid appelle-
mus ibid. a b. antidotorum lethaliibus ad-
uerfantium vsus 2. 264. b c
antimonium 2. 68 b
antiochia 4. 411
antipodion 2. 65 f
antophyllus 2. 165 c
anusi 3. 83. eius musculi sedem sursum extol-
lentes ibid. vsus eorum ib. orbicularum re-
cto intestino obductus, ibid. b. connexus,
ib. c. eius vsus ib. d
aniprocidentia 3. 126 f. causa ibid. curatio,
3. 127 a
antrima 3. 127 c d. causæ, signa, curatio, ibid.
accessionis vox bifariam accipitur 1. 219 b
aperientia ora vasorum 2. 103 c
apii sativi radix 2. 16 b
apii sativi semen 2. 16 c
aphronitrum ab aphronitro non est diuer-
sum 2. 62 a
aphronitrum vox exolera 2. 62 a b.
aphronitrum 2. 60 d
aphronitrum quid 2. 61 a. album, nigrum ib.
aphroselenus 2. 69 a
aphthæ seu Alcolæ quid 3. 73 b. causæ, signa,
ib. eius curatio ib. c. earum remedia mo-
derata 3. 74 f. vehementia ib.
aphthæ putrescentes vt curandæ 3. 74 f. aph-
tharum cura in infantibus 3. 74. c. in ad-
ultis ibid. d
appendix 1. 282 b
appetentia 1. 81 a b. animalis, ibid. naturalis
ibid.
appetentia canina 1. 207 c
appetentia amissa 3. 104 c f. signa 3. 105. a.
quando periculo vacet, nec ne 3. 105 b. cu-
ratio ib.
appetentia canina 3. 105 c. causæ ibid. signa,
curatio 3. 106 a b. si ex acidis humoribus,
ibid. b. si ex immodica dissipatione ib. f.
apodyterium 1. 157 b
apollo medicinæ inuentor 1. 12 a
Apollonii 1. 15 b
apologia contra Brachelium, 4. 373
apophlegmatismi in ophiassi 3. 2 b
apophlegmatismi 2. 287 c. compositionis ma-
teria ib. vsus ib. tempus vtendi 2. 288 a
apoplexia 1. 282 c
apoplexia 1. 201 c
apoplexia quid 3. 15 a. eius causæ ibid. notæ
ibid. quos potissimum occupet ibid. c. cu-
ratio ibid.
apostiot 1. 81 a.
apospasmata quæ, 1. 184 d
apostema 1. 213 b
apostematis & phlegmones nomina a recen-
tioribus confusa 3. 229 c
apothera quid 1. 107 f. cur suscipiatur, ib.
ad eam tria necessaria 1. 108 a b. eius factio
qualis

qualis esse debeat ib. c. in apothecia cur
partes tendendæ, ibid. d
apuleius 1. 12 a
aqua marina sicca est 1. 35 c
aqua anguriz 2. 177 c
aqua miræ utilitatis 3. 115 b c
aqua inter cutem 3. 138 d. eius causæ, ibid. c.
signa 3. 139 a. Vicius ratio communis ib. b.
curatio ib. c
aqua mulsæ 2. 220 c. aqua calida vulneratis
neruis infestissima 3. 263 a
aqua optima quæ 1. 100 a. vitiosa quæ 1. 100
b. quibus eius potio conuenit 1. 100 c
aqua marinæ succedaneum, 2. 239 f
aqua destillatæ 2. 31 f
aqua calidæ potus commoda 3. 293 b
aqueus humor 1. 71 c
aqua rum destillatarum fraus, 4. 42
aquilegii semen 2. 16 d
arabum error 1. 382 b a
Arabes ignorant armenium lapidem 4. 312
arabum error grauis 4. 313
arabes cur Græcos male citent 4. 298
arabes medicinæ noxiæ 4. 354
arabes male citant Græcos 4. 298
arabes citant non exstantia 4. 306
arabes vires radicis tribuunt fructibus 4. 335
arabum scripta lupanaria 4. 328, arabes mali
simpliciter, 4. 329, arabes legendi sunt cum
iudicio 1. 11 a. arabum prodigiosum & hor-
ridum sermonis genus 1. 27, f. arabum in
doctrina nihil certum ac solidum 2. 15 d.
arabum doctrina nihil certi aut solidi conti-
net 2. 167 c. arabum doctrina confusa 2. 40
arabum doctrina qualis 1. 129 b.
aranciorum cortex 2. 442 a
Argentarii lapsus 1. 196 a. Argentarii opinio
improbata 1. 86 f. eius obiectiones 1. 87 b.
Argentarius & Montanus Galenū non recte
naturalem sciaturæ contendunt 1. 86 a.
argentum viuum 3. 281 a. argentum 2. 51 b.
argentum viuum 2. 59 d. argentum fusile seu
viuum 2. 59 d. natium & factitium ibid.
argumentum ab auctoritate negatiue ductū
valet 4. 338
Aristolochia rotunda destituta sunt seplasia,
2. 26 b. rotunda 2. 135 c
Aristotelis error de causâ creati cerebri 4.
440. error de ventriculis cordis 4. 430. er-
rat in Anatomia 4. 432. error 1. 71 d. er-
ratum 1. 301 a. erratum 1. 316 a. deceptus 1.
455 b.
Armenius lapis 2. 69 b. eiusdē vires, pondus, 2.
apuleius 1. 284 a (121 c d
aromatica coryophylata Iōan. Damasceni 2.
160 c d. rosata Gabriellus 2. 760 b.
atquatus 1. 209 b
archoideus tunica 1. 71 a.
Arnoldi de villa noua erratum 2. 142 a.
ars quid 1. 7 b
Arsenicum sublimatum 3. 260 c. arsenicū na-
tium triplex 2. 55 b. factitium duplex, al-
bum, luteum 2. 55 c. seplasarum quatuor
arsenicū genera 2. 55 c. arsenicum sublima-
tum 3. 276 a. arteria quid 1. 463 a. arteriæ
veteribus venæ appellatæ ib. b. eius corpus
quale & duæ ipsius tunicæ ib. tunicarum fi-
bræ ib. c. adscititiæ earum tunicæ ib. c. ar-
teriarum vsus ib. d. fibrarum tunicis anna-
tarum vsus ib. d. arteriarum numerus ib. c.
magna, venalis ibid. arteriæ ortus 1. 463 c.
arteriæ coronales ib. arteriæ caudicis bi-
partitio 1. 464 a. ascendētis partis arteriæ
series ib. a. b. sinistram maxillam petentis
portionis series ib. c. f. arteriæ ramus, cuius
pulsus ante brachiale exploramus 1. 465 c.
series maioris portionis magnæ arteriæ
partis, quæ superiora corporis petit, 1. 465
d. soporalis sinistra 1. 465 c. arteriæ ad se-
dum transeuntium 1. 466 d. e. in iecur ibid.
omentum, ventriculū, bilis vesiculam,
duodenum & coli partem, 1. 466 c. lienem

adcentes rami 1. 467 b. præcipua mesente-
rium accedens ib. d. arteriæ renum, semi-
minales ib. d. e. ad humiliorum mesenterii
sedem ib. ad lumborum vertebrae & car-
nes 1. 468 a. magnæ supra os sacrum diui-
sio ib. a. b. pubis offis foramen transiens ib.
e. arteriæ in epure series 1. 469 a
Arteria siccoribus medicamentis eger quam
vena 3. 260 f. leuis 1. 64 d. aspera ib. sopo-
ralis sinistra, dextra 1. 66 b. arteriæ renum,
1. 66 c. feminalis ibid. apertæ signa 1. 133 d.
arteria venosa 1. 69 d. magna ibid. arteriæ
magnæ deductio 1. 66 a
Artes non ex materiis, sed ex fine indicandas
esse 1. 8 b. artium quatuor genera 1. 8 c. fa-
ctiæ triplices 1. 8 d.
Artifici nota sint instrumenta 4. 297
arthritus 1. 210 c.
Aspidia 1. 283 d
aria radice pro serpentaria vtuntur officinæ
2. 26 b
Aristolochia tenuis 2. 134 c
articulorum vitia 1. 210 c. articulus 1. 283 b c.
artimonium 2. 151 a
artus iuuantia 2. 101 c
Arum & sectarū eorum immensus error.
1. 128 d. eorum doctrina confusa, 1. 199 c.
eorum ineptiæ, 1. 189 b
Asa dulcis 2. 33 b. asa foetida 2. 33 c
asari radix 2. 26 c
asbestos 2. 69 a
Ascarides 1. 208 d. ascaridium curatio 3. 125 d
Asclepiades 1. 15 d. asclepiadis & Celsi error 1.
231 a. asclepiadis radix 2. 26 c
Ascites 3. 138 c. 3. 141 b. signa, curatio ib. ascites
1. 209 b
asiz petra flos 2. 61 c. eius flos 2. 65 d
aspalatus quid 4. 358
aspalathos 2. 46 d
asparagi semen 2. 16 d. radix 2. 26 c
Aspera arteria 1. 448 f. eius nomina ibid. nu-
merus 1. 409 a. situs ib. eius superficies ex-
terior, ib. c. connexus ib. f. interior super-
ficies qualis 1. 450 a. eius cartilagines qui
inuicem colligantur 1. 450 c d. tunica a-
spæra exterior ib. d. interior c. eius vsus ib.
f. situs, ratio ib. asperam membrana sub-
stantia oportuisse exstrui 1. 450 a. cartilla-
ginum coordinationis ratio 1. 451 d. tuni-
carum vsus 1. 451 d. pinguedinis in tunicis
vsus 1. 452 a. arteria non est pharinx 4. 436
asperæ arteriæ officium ib.
asphodeli radix 2. 26 d
asplenium 2. 273 a
asplatio quid 2. 87 c
aster atticus 4. 341 & 342
asthmatici qui dicantur 3. 83 b
asthmatis causæ ib. c. curatio ib. c
assius lapis 2. 69 b
astragalitis 2. 29 a
astrologorum de iudicatoriis diebus figmen-
ta fugienda 1. 233
astrutii radix 2. 29 a
athanasia magna 2. 147 d. curatio dicta 2. 141 d.
atheroma 3. 229 c. 1. 113 d
atra bilis rodens 1. 40 c
Attramentum scriptorium 2. 263 a. attramentū
sutorium 2. 57 b. metallicum, scriptorium
& sutorium 2. 57 b c d.
atriplis semen 2. 16 d
attonitus morbus 1. 201 c
attrahitrix Vide facultas
attrahitio alimentorum a simili 4. 357. attra-
hitio quid 182 b
attrahentia quæ 2. 103 d. eorum materia du-
plex ibid.
attrita 1. 275 c
audiendi facultas, Vide facultas
auctio quid 2. 79 c. auctio quid 1. 81 a
auctrix Vide facultas.
auctoris de stirpium historia commentario-
rum romi duo 1. 11 c

auditus Vide organum.
auditio quid 1. 79 c
auditus instrumentum 1. 490 f. 175 a
aurenatum quid 4. 412
aurenæ temperamentum ibid. puls inuulilis
febricitantibus ib.
auellana 2. 20 b. auellana 2. 30 b
aurethoes in omnes fere cōmestiosus 1. 22 d
augmentum morbi, Vide tempus
207 1. 222 c
Aucennæ error 1. 426 a. error detectus 1. 142 c.
erroris occasio 1. 143 c. error 1. 39 c. in-
gens error 1. 132 b c. locus emendatus 2. 239
a d. erratum 1. 9 b. error immensus 1. 275 b.
immensus error detectus 2. 136 d. error 2. 72
f. & 2. 73 a. error perniciosus 2. 142. habet
labilem memoriam 4. 325. confundit cicu-
tam cum Napello 4. 315. non est princeps
medicinæ 4. 314. regulus fuit 4. 314. contra-
dictiones 4. 302. Canon confusum chaos,
4. 315. 323. male napellum propinat contra
leucen 4. 315. napellum polysemum 4. 316.
strangulator 4. 316. parū sibi constat 4. 314.
ignorauit napellum 4. 314. ignorauit quid
sit Harmel 4. 314. Chameleam cum Thy-
melæ confundit 4. 326. confundit Cha-
meleam cum Chameleonte 4. 326. confun-
dit rum calamitum cum origano 4. 328.
ignorat Thapsiæ vires 4. 329. ignorat liriæ
vires 4. 329. & 330. Thapsiam cum liriæ cō-
fundit 4. 329. & 330. ignorat succum 4. 321.
confundit Napellum cum Toxicæ 4. 315.
turdos facit ex sturnis 4. 314. Proco muta-
bilior 4. 314. nesciuit vires Pentaphylli 4.
317. errat in ventriculis cordis 4. 430. error
de Epiglottide 4. 439. ignorat Nil 4. 433.
placita non vitanda 4. 317. nomen vnum
dat quatuor diuersis herbis 4. 332. 333. Tra-
goriganum confundit cum calamintha 4.
329. refutatur 4. 321. volubilem maiorem
confundit cum hedera 4. 320. dogmara in-
certa 4. 320. & 321. decreta ambigua 4. 332.
raro syncerus 4. 406. recte curat dysente-
ricos 4. 394. quando imitatus 4. 394. igno-
rauit Carabem 4. 326. ambigua docet 4.
336. bilem flauam ante purgationem cras-
siorē reddit 4. 390. & 391. error in musculis
gula 4. 432. pleuriticis dat lenticulæ ex ac-
to 4. 192. error in myrmecia 4. 407. 408. er-
ror in igne Persico 4. 407. 408. error in ery-
sipelate 4. 407 & 408. confundit erysipela-
tationē cū herpetis miliaris cura 4. 407.
& 408. confundit formicā cum erysipelate
4. 407. 408. nesciuit causam prunæ 4. 406
aucennæ error in aloe 4. 301. & 302.
auctores medicinæ confesepit 4. 228.
Aucennæ error de generatione stercoreis 4.
420. nesciuit populum 4. 332. confundit
vires vtriusque populi 4. 323. male asserit
coniunctam causam morbi 4. 368. error in
sectione venæ 4. 372. errat in causis mor-
borum 4. 366. pro Thlaspis ponit siselis 4.
362. error de Ladano 4. 320. ignorauit Ci-
sthorii 4. 320. ignorauit meatū bilis 4. 416.
ignorauit verum eupatoriū 4. 306. & 307.
error de Pyloro 4. 414. ignorauit statum 4.
332. perniciosissimus auctor 4. 330.
aulici qui 4. 382. 383
aurantia 2. 20 c
aureus 2. 125 c. aurea Alexandrina 2. 126 c. 2. 20
aurum malum 2. 20 c
aurigo 1. 209 b
aurum 2. 55. a
aurum virū in antidotis omitti possit 2. 255 f.
auris cartilago 1. 49 d. nasi ibid.
aures cordis an tantum in cadauere conspici
possint, 4. 432 qui mouere possint 1. 355 c.
aures vermiculantes 2. 204 f
aurum doloris ab humoribus crassis & flatu-
bus curatio 3. 64 c
aurum sonitus Vide sonitus.
aurum sonitus a crassis humoribus 3. 66 a

I N D E X.

ab exquisita audiendi acrimonia ib. aurii
doloris causæ 3.64, notæ ib. aures vt
curentur commune præceptum 3.64 vitia 1.
204 auripigmentum rubrum 2.67, autu-
mnus cur morbi ferit 2.5
auulsiões 1.184
axillarum cavitates seu vallum 1.368

B

Bacca iuniperi 2.20, lauri ib. ribes cōditæ,
2.202, myrsi sylvestris fortent 4.340. iun-
iperi magnæ 2.146
Baccharidis 1.283
Balamclæon 2.35
balanos myreplice 2.20
balanidium 2.13
Balbi 2.206
balneum acreum 1.157 aquæ dulcis 3.191. &
192. Maris 2.86, 3.50, aquæ dulcis 3.48, bal-
neum refrigerat 3.187 quibus conferat 3.
189.
Balnea duplicia 1.153, naturalia ib. eorum ge-
nera ib. eorum vniuersalis facultas ib. ni-
trofa ib. falsa 1.154, aluminosa ib. sulphu-
rea ib. bituminosa ib. ærata ib. ferrata, at-
rametosa ib. cerulea, ærugine & chrysocol-
la infecta ib. sandaracha ibid. persilices &
calcarium fluentia ib. plumbea, acida, ar-
gentea, aurea, ib. mista ib. plumbaria 1.155.
piperina ib. Badenia Helueticorum ib. Embe-
sebada ib. Geberfucilana ib. badena ibid.
Bildebade ib. Cellensia ib. blasiana 1.156 e-
Vberlingensia ib. Oppenhauensia ib. VVi-
sebaden 1.156, Gastenia ib. Abudiaca ibid.
Balneo cur vtendum, antè crurum sacrificia-
tionem 1.156, balnea male prohiberi febrici-
tationibus 4.387, balnei aquæ dulcis vires
4.388 balneum conducit diarris ib. balnea-
rum calidarum vsus 1.156, artificialium quin-
que partes 1.156, earum facultates 1.158, bal-
neum quibus inutile 1.158, quomodo ho-
diea medicis parentur ib. balnei formulæ
ib. balsami succedaneum 2.127, balsamita
2.12, 2.245, balsamum artificiale, chirur-
gorum 2.242, cur eo chirurgi in omnibus
vulneribus vtantur ib. 2.170,
barbari ac recentiores medici 1.276
bardana 2.11, 2.248,
basilare 1.45,
basilicum 2.11 tetrapharmarum 2.253,
basilici 2.18,
baurach 2.58, 2.60,
bdellium 2.39,
Pisticum, Arabicum, Indicum, ibid.
bedeguard 2.12, bedeguar quid 4.363, bede-
guar est spina alba ib.
bedarung 2.152.
beben alba & rubra 2.129, succedaneum eius
ib. 2.26,
belemnites 2.154,
belliculi 2.250,
βελλινος Dioclis 3.240, 3.239,
belzoe, belzoïn, belzuinum 2.33,
ben rubrum 2.26,
ben 2.26, ben album officinarum est polemi
radix 2.26,
benedictæ radix 2.28,
benedicta laxatiua Nicolai 2.182,
benedicta laxatiua vera Nicolai Myreplici 2.
182,
berberis, oxyacanthæ bacculæ 2.21,
berberis 2.25,
berberorum succus 2.31,
Bernhardi Deslennii error ingens 2.139, ofci-
rantia eiusdem ibid.
berzilius 2.46,
betonica 2.13,
betonica 2.141,
betonica coronaria 2.13,
bili excipienda parati meatus 1.59,
biliosa superfluitas fluit ad duodenum 4.416,
bilis meatus cur duodeno implantatus 4.417,
bilis meatus ignorauit Mundinus ib.

bilis meatus an vbique geminus ib.
bilis meatus 1.410,
bilis flauæ vesicula 1.413, nomina, forma, ib.
substantia ib.
bili excipienda & emittenda parati meatus 1.
424,
bilis flauæ sedes 1.36,
bilis flaua vt in vesiculam trahatur 1.36,
bilis flauæ vsus 1.38,
in bilis redundantia quibus medicamentis
meatus referandi 1.142,
bilis quos efficiat 1.38,
bilis atra an ex pituita procreari possit 1.40.
bilis atræ naturalis seu melancholici humo-
ris sedes 1.37,
bilis flauæ species cœrulea non differt ab ea,
quæ Isarodes nominatur 1.40,
bilis flaua amara est, 1.36, atra acerba est 1.36,
bilis vesicula, Vide vesicula.
bilis atræ non naturalis species tres 1.40,
bilis interdum vt vacuetur, commode coctio-
nem exigit, nunquam autem vt crassitiam
adipiscatur 1.16
bilis flaua an concoctione egeat 1.145,
bilis flauæ non naturalis species quinque 1.
39, d
bilis flaua potestate calida & sicca 1.35,
bilis in intestina fluens, attenuat 1.424,
bilis feruorem restringens decoctum 3.190,
bistorta 2.16,
bitumen 2.72, durum, liquidum ib.
bituminis vis 4.354,
blasi 1.206,
blazitas 1.206,
blatta bysantia 2.57,
blarton bysantium ab vngue odorato diuer-
sum 2.51,
blartion byzantium 2.162,
bolus armenia 2.71,
bolus quid 2.229,
bolus armenius 3.214, cum aceto sumtus pe-
sti aduersatur ib.
bolus armenia officinarum adulterina 2.71,
bolus purgatorius 3.16,
bombices 2.54,
bombax 2.21,
bombax, bombacii, & bombaci semen 2.19,
borachia gemma 2.249,
borachius lapis 2.249,
borrago 2.27, veterum buglossum 4.342,
borrago cur euphrosynō dicta ib. borraginis
vsus, ibid. borrago cur ligula bibula dicta
ib. borax 2.58, 2.61, 2.249,
bostrychites 2.69,
bortys Gallica 2.333,
Brachelius Galeni locum corrumpit 4.376
brachiale mouentes muscoli 1.376,
brachiale, postbrachiale 1.48,
brachiale 1.329,
brachialis ossa quibus sedibus, ligamentis &
cartilaginibus obducantur 1.329, cur duo-
eorum ordines ibid. brachialis ossa octo 1.
330. octauis & quanti ossis processus 1.331,
brachium 1.47
brachii motus quot 1.366,
brachium mouentes muscoli 1.366, & 367,
branca vrsina 2.151, eius succedaneum ibid.
branca vrsina 2.245,
branca vrsina officinarum 2.94,
brassica tenuis 2.180,
brassica marina 3.141,
brassica sylvestris 2.151,
brassica semen 2.16,
bressilium 2.46,
brocardus 4.346,
bronchus nō est larynx 4.438, bronchus ib.
bruscus 4.340, brusci 2.19, brusci 2.30,
bryonia 2.151, bryoniæ radix 2.31. 2.27,
bubon quid 4.409
bubonibus omnibus non conueniunt repri-
mentia ibid.
bubonion herba 4.341

bubon 1.212
bulo pestilens exortus quid portendat 3.200.
bubonocœle 3.158
bucca 1.355
buccarum musculi vtriusque quatuor 2.355,
buccarum vsus ib. & 1.356
buglossæ flos 2.14, buglossi radix 2.27
buglossum 2.180, buglossum 2.209,
buglossum domesticum & sylvestre 2.180
buglossum borrago est 4.363,
burungi 2.152
bulimos 3.107, causæ, signa, curatio ib.
bulbus 2.152, eius succedaneum ib.
buxæ quid 1.51

C

Cachexia 1.209.
Cachexia 3.138, causæ, signa ib. curatio
ibid.
cacochymia vniuersi humoris in vasibus 2.119,
cacochymia cur ita dicta 1.120
cacochymia totius corporis 1.120
cacochymia non consistit in sola humorum
qualitate 4.370
cacochymia quid 4.368, & 369,
cadmia 2.232,
cadmia capnitis 2.57 cadmia 2.56
Diua duplex, fossilis simpliciter 2.56
cadmia fossilis Metallica 2.56
cadmia factitia, fornacaria 2.56
cadmia crustacea, singularis, onycitis 2.56,
testacea, raccmola 2.57, cadmiæ fornacaria
quatuor genera 2.56 argentea 2.224,
calaminaris lapis 2.56, veterum 2.57
calamentum non est organum 4.328
calaminthes duo genera 4.328. & 329, mon-
tanz folia 4.320, calaminthæ vires ibid.
calamintha domesticæ & sylvestris 2.218
calamus officinarum 4.359, verus ibid.
calamo aromatica vero caramus 2.27, cala-
mus aromaticus 2.27, officinarum quid sit
2.27,
calcis os 1.49, ossis sedes terram aspiciens 1.
341, superior calcis sedes extra tibiam rectitu-
dinem retrorsum ducta ib. calcis internū
& externum latus quale 1.342, eius anterior
pars ibid
calculus non curandus per clysteres assiduos
4.356, quomodo curandus 4.357 calculi topi-
ca remedia 4.397, & 398, calculus renum
si circa collum vesicæ detentus fuerit quid
agendum 3.146, calculi præcauendi præserua-
tio 3.146, puluis ad calculos renes 3.146.
calculus vesicæ 3.149, cur eo pueri magis labo-
rent quam renum ib. eius causæ ibid signa,
curatio, calculus vesicæ atterentia ib. re-
num 3.144, eius causæ ib. signa, curatio, ib.
eorum differentia ib. frangentia quando
adhibenda 3.145
calefacientia primo, secundo, tertio, quarto
ordine 2.99, calefacientium quatuor ordi-
nes 2.99
calefactio quid 2.86
calidum quid Hippocrati significet 1.18, effe-
ctus 1.179, frigidi, humidi & sicci acceptio-
nes 1.23, calidum per exsuperantiam bifa-
riam dicitur, absolute, & non absolute 1.23.
calidum & frigidum num vno & eodē tempore
in quauis corporis parte sentiantur 1.178,
calor tractionē medicamentorum inuaret 2.110,
calidarium 1.157, Callos extirpantia 3.280
calli generatio 3.288, quibus notis generati
deprehendatur ibid. & 3.290, victus callo
gignendo aptus ib.
callurichum 2.12, Callosus corpus 1.67,
callosus corpus cerebri vide cerebri corpus
caluaria 1.287, cur donata sit suturis ibid. cur
caneriosa ib. caluariæ pars mollissima 1.290
caluitium 1.294
calumnia Christophori de Vega detecta 2.27,
calx viua 3.269, viua & extincta 2.57, e. f. & 4.
58, 2
cambire 1.41, d

camera 1. 63

cambium 1. 41

cancanum 2. 39 e, cancam & canchæ confusio 2. 40

cancer 1. 211 e, evidens & occultus ib. cancer quid 3. 230, causæ ib. cancerum differentiarum ib. occulti & manifesti ib. signa ib.

cancer exulceratus 3. 282, eius causæ, signa, curatio ib. quinam canceri vicerati vitione aut sectionem desiderent ib. in cancro quæ extrinsecus admouenda 3. 234

cancerorum humalium cinis 2. 48

candela suffumigabilis 2. 232 a

cancellæ 2. 44, cancellæ 2. 128

canis rabiosi morsus probatio 3. 258, curatio, canis rabiosi mors 3. 257 (ib.)

cannæ Saccharum ferentes 4. 346

cannalis semen 2. 16

cantharides 2. 48 e, earum legitimus vsus ib. alarum earundem vsus

cantharides totæ ingerendæ 4. 351, cantharidum vsus interior cur suspectus 4. 352

cantharidum alæ non abiiciendæ 4. 351

caphura 2. 73

camphora, natura, facticia 2. 73

caphuræ succedaneum 2. 230

capilli quomodo aurei fiant 3. 5, quomodo albi fiant 3. 6, quomodo tingantur 3. 6 a, capillus Veneris 2. 212, Veneris 2. 252, Veneris 2. 212 b

caput purgum 2. 28 b caput 30 b, caput quæ de causâ factum 2. 286 d, eius naturalis figura 1. 287 b, quatuor figuræ non naturales ib. ed. caput quor. modis agatur 1. 362, capitis cui parti remedia adhibenda 1. 390

capitis dolor, Vide dolor capitis, capita papaverum recentia 2. 214 d, caput quomodo expurgetur 3. 18, caput iunantia 2. 101, calefacientia, refrigerantia ib.

capparis lignosa 2. 27, cappares 2. 20,

cappisfolium 2. 11

carabe 1. 72, carabe non est lacryma populi nigra 4. 324, carabe quid 4. 326

cancrum 2. 278

carbunculus quid 4. 404, idem cum anthrace 4. 405, carbunculi cura 4. 405, & 406, carbunculus 2. 211, 2. 69, quid 3. 217, causæ, signa ib. curatio ib. in eo non adhibenda pus mouentia, & vt adiacentes partes muniendæ ib.

cardamomum 2. 166, cardamomum duplex 2. 16, cardamomum, cardumenum, & cordumenum 2. 134

Cardani contradictionum libri stud. osis haud legendi 1. 8

Cardiani calumnia refutata 1. 191

cardapatium 2. 27,

cardapatium 3. 103,

cardapatium 3. 103,

cardapatium 3. 103, causæ ib. signa, victus, curatio ib.

cardiobota non 2. 246

cardumenum & cordumenum 2. 16, cardamomum Græcorum 2. 16, Arabum ib. arabum Punichum ib. maius & minus ib. cardamomum officinarum 2. 16

Carduncellus 2. 246

caricæ 2. 20, Caricæ 2. 184

Carium Alexandrinum 2. 154

carmanum 2. 197

Carnabadium 2. 161, 2. 119, 2. 170

Carolus Stephanus 1. 288, 1. 284, 1. 289, 1. 296

Caroli Stephani commentum exploditur 1. 318

cardus Martis non est vera endivia 4. 363,

Caros quid 3. 31 eius a lethargo differentia ib. causæ ib. ab apoplexia ibid. eius causæ & curatio ib.

Caro glandulosa 1. 405, veteribus quid 1. 184, caro in viceribus supercrefcentis quomodo tollenda 3. 268, carniū crefcentiarum maxime vt tollendæ 3. 269

Carnes bubulas qui minori negotio concoquantur 3. 107, carnem generantia 2. 105, carnis generandæ duplex excrementum laniens & sordes 3. 249, carni producendæ apta medicamenta 3. 249, carnem bubulam cur aliquid facilius quam saxatiles pisces concoquant 1. 38, imminentia 2. 105, carnis detractoria medicamenta 3. 253

carnea membrana 1. 50, carnea substantia manus 1. 375, eius vsus ib.

carniformis 2. 41

carpus Bononiensis 4. 420

carpesia Galeni 4. 41, carpesium 2. 20

carpobalsamum 2. 127, 2. 20

carramus vide Cnicus, carrami semen 2. 17

cartilago quid 1. 344, cartilaginum vsus ib. & 2. 345, cartilagine palpebrarum ib. auris ib. nasi ib. laryngis gutturisue 1. 346, spinarum apicibus agnata 1. 304, brachiale cap. vlna dirigens 1. 319

cartilago scapulæ vide scapulæ, secunda, tertia 1. 49, cartilagine macronæ 1. 319, cartilagine, quibus tribus cillis sinus augentur 1. 338, tribus cillis fibulæ ac tubera, quibus talo articulantur 1. 339

carui semen 2. 16, carus 1. 199, caros duplex 1. 199, non morbosus, siue bonus, morbosus, mitior, perniciosus 1. 199, cari causæ ibid. & 1. 200

caryophyllus 2. 20, caryophyllorum folia 2. 183, calcutæ 2. 14

Cassa 2. 182, 2. 128, 2. 44, cassa officinarum ib. cassa ligosa ib. extracta 2. 174, eius decoctum quo extrahitur cassa medulla 2. 175, nigra 2. 110, cassa extracta pro clysteribus 2. 175, extracta sine foliis tenax 2. 174, fistula 2. 184, fistula 2. 141, fistula 2. 44, fistula 2. 143, fistularis 2. 20, cassæ nigra flores 2. 174, eorum facultates ib. vt validius aluum ducant ib. nigra forma, delectus, temperamentum, pondus 2. 110, cassæ succedaneum 2. 128, b

cassa vera caremus 4. 359, & 303, Græcorum 4. 302, Arabum 4. 303, Arabice & Græce discrimen ib. Arabice natalis ib. Græca non lenitalum ib. Arabice non ciet menstrua ib. lignæ vera caremus ib.

castanea 2. 170, castonum 3. 163, 2. 49

castuta 2. 144

cata ixin quid 4. 375,

cataphora quid 1. 195

cataleptis causæ varietates 1. 198

cataplasma suppuratorium 3. 268

cataplasma 2. 294, adstringens, leniens, mentes euocans ib.

Catapota 2. 189, ex eupatorio Mes. filii 2. 189, ex Rhabarbaro Mes. filii ib. pestilentialia incerti auctoris ib. communia, & trib. sine custodia 2. 189, catapota pestilentialia Rufi 2. 190, pestilentialia nostra 2. 190, cocticia Rhabarbari cocticia Myrepsi ib. ex agarico Mesfuz filii 2. 190, ex agarico Myrepsi 2. 191, hiera simplici Galeni ib. hiera composita Myrepsi ibid. hiera cum agarico ib. optica maiora Mesfuz filii ib. optica minora Mesfuz filii & cur veraque sic dicta ib. arthritica Nicolai ib. catapota lucis 2. 191, arthritica vera Nicolai 2. 192, ex hermodactylo Mesfuz filii maiora ib. ferida maiora Mesfuz filii ib. ex euphorbio Mesfuz filii 2. 193, ex sarcocolla Mesfuz filii ib. catapota Inda Hali ib. Inda quare dicta ib. lapide cyaneo Mesfuz filii ib. lapide Armenio Mes. filii ib. elapide Armenio Tralliani ib. aizareth Auicennæ 2. 194, aromatica Damasceni ib. cur ita dicta ib. alephangina ib. stomachica Mesfuz filii ib. stomachica maiora Damasceni 2. 195, minora eiusdem ib. polychresta Damasceni ib. aggregata ib. cur dicta polychresta ib. fumaria Auicennæ ib. sine quibus esse nolo, Præpositi ib. Benedicta Myrepsi ibid. mastichina conciliatoris ib. ex aloë & mastiche Præpositi 2. 196, ex aloë lora ib. Arabica Præpositi ib. cynoglossa Præpositi ib. cynoglossa Myrepsi ib. quinque myrobolanis Myrepsi ib. bechica Damasceni 2. 197, linguæ subdita Myrepsi ib. Sebellia Damasceni ib. quid 4. 375, purgatiua ieiunæ sumenda 4. 383, & 384, non sæpius deglutienda 4. 382, minor 4. 309, aurea Nicolai Myrepsi 2. 189, cur ita dicta 2. 189, ex colocythide & aloë 3. 2, Rufi 3. 213, ex colocythide Damasceni 2. 197, ex Thymelea Damasceni ib. esarcocolla Damasceni ibid. esagapene Damasceni 2. 198, ex epoponace Damasceni ib. esbellio maiora Damasceni ib. imperialis incerti auctoris ib. ex octorebus Nicolai Præpositi ib. ex aloë Galeni 2. 199, genitale semen argentia ib. de cynoglossa 3. 122, catapota minor 2. 18, maior 2. 17, catapota minoris facultas, pondus 2. 120, catapota causæ 3. 70, signa 3. 71, curatio ibid. 2. 105, catapota 2. 105, catapota 1. 202, catapota imperiale Nicolai 2. 188, alia descriptio ib. catapota & cataleptis 3. 31, eius causæ ib. nota 3. 32, catapota, carus a lethargo quid differentiat ib. curatio 3. 32, catapota & cataleptis 1. 197, veteribus duplex, proprie & impropre dicta 1. 197, triplex ib. 1. 196

caua vena Vide vena caua.

caucalis 2. 41, 2. 127,

cauda 1. 30,

cavitas partium indecenti 1. 181,

caulis 2. 16,

causæ quid 1. 167, aduerix 1. 172, sine qua non 1. 272, concausæ ib. mota quiescente molestior est 3. 204, morbi 1. 167, morbi gemina 1. 168, præincipiens, primitiua, quæ incipientibus vocata 1. 168, externa causæ cur nominata ib. præcedens, addita ib. morbi proxima antecedens vocatur Galeni 1. 168, in morbis continens nulla 2. 169, triplices 1. 166, affectus 1. 167, continens quæ 1. 169, eius in ægris necessaria est cognitio 1. 171

causæ internæ non omnes sunt affectus 1. 167, causæ morborum medico perscrutandæ, 1. 172, causarum corpus nostrum mutantium ac destruentium duo genera 1. 90, causæ morbi internæ 4. 365, morbi coniuncta ib. morbi externa ib. causam coniunctam non habent morbi 4. 366, coniunctam non habent res permanentes 4. 367, causæ morborum ingerendæ 4. 365, causæ antecedentes 4. 366

causæ primitivæ ib.

causæ coniuncta est morbus ipse 4. 367

causæ morborum duæ 4. 365

causticum 3. 175

Celsi locus enarratus 1. 151

cenabrium nostrum venustum 4. 359

centaurium herba vnde dicta 1. 2

centaurium vim habet glutinandi & desiccandi in nervis vulneratis 3. 264

centaurium minus non præferendum maiori 4. 310, & 311

centaurii minoris radix inutilis 4. 311

centaurium quando colligendum ib.

cer, urium fel terræ ib.

centaurium minus ducit sanguinem ibid.

centaurium maius incognitum 4. 312

centaurii magni radix cur Rheci postici non

men hodie in officinis retineat 2. 116,

centaurii magni radix 2. 27

centum nerua 2. 246,

cephala 2. 282

cephala 1. 194,

cephala 3. 9

cephala quid 3. 22, eius causæ & nota 3. 22,

curatio 3. 23

cephalalgia 1. 194, 3. 9

cephali 2. 145,

ceratum liquidum 3. 156

ceratum liquidum 3. 287,

- Ceratum** quid, 2.295 c. eorum compositio, ib. forma, ib. c. ventericulum roborans, ib. f. ad movendos menses, 2.295 a
- Ceratum liquidum**, 2.261 c. fantalinum, ibid. d. stomachicum, ibid. c. f. album seu infrigidans Galeni, 2.261 c. stomachicum Galeni, 2.262 a. nostrum, ibid. b. ad ramicem Nicolai, ib. c. nostrum, ib. d
- Cerata**, cerata, 2.25 d
- Cera condita**, 2.202 b
- Cera optima** quæ, 2.33 a
- Cera virginea**, 2.35 c
- Cera alba viridis**, virginea, 2.33 b
- Cera rubæ conficiendæ modus**, 2.262 f. viridis faciendæ ratio, 2.262 f. ceræ flauæ, 2.263 a
- Cerebella passerum**, 2.49 d
- Cerebrum leporis**, 2.49 d
- Cerebrum**, 1.67 a Cerebellum, 1.67 a
- Cerebrum an propter cordis calorem creatum**, 4.440
- Cerebri ventriculi**, eorum numerus, 1.478 dexteri & sinistri historia, ibid. situs, ibid. ventriculi tertii historia, 3.479 c. meatus a tertio ventriculoeducti, ibid. quarti historia, 1.480 a. ventriculis singulis quid insit, 1.480 c. eorum usus, ibid.
- Cerebri ventriculus quartus**, 1.68 a
- Cerebri**, cerebelli & dorsalis medullæ color & substantia, 1.477 c
- Cerebri substantiæ ac essium medullæ discrimin**, 1.477 d
- Cerebri infundibulum & glandula piritam excipiens**, 1.483 a. c
- Cerebrum quatuorplex**, 1.475 c. eius partes, ib. f. situs & magnitudo, 1.476 a. c. d. forma, ib. c. f. sectio dextram cerebri partem a sinistra dirimens, 1.476 c. cerebri sectionis ratio, 1.477 c
- Cerebri corpus callosum**, & ventriculorum cerebri dexteri & sinistri septum, 1.477 f. situs, ib. nomen, 1.478 a. initium eius, ibid. dexteri sinistrique ventriculi septi historia, ibid. c
- Cerebelli implexuum ratio & species**, 1.477 a. partes, ibid. b
- Cerebri substantia**, 1.477 d
- Cerebelli situs & magnitudo**, 1.476 b. forma, ibid. c
- Cerebri ventriculi quatuor**, 1.67 c. septum, ib. f. eius anfractus. vide Anfractus.
- Cerebri nates**, 1.68 b. vermiparæ excrecentiæ, ib. b. eius cameræ, & eorum nomina, 1.480. eorum ortus, substantia, 1.481. figura, ibid. c. usus, ib. d. eius glans, 1.481 c. eius situs, 1.481 c. nomina, ibid. usus, 1.482 a. Cerebri testes & nates quot, 1.482 b. d. eorum situs, substantia, forma 1.482 c. nomina, ib. d
- Cerevisia** quibus conveniat, 1.100 f. & 1.101 a. eius confectio & temperamentum, ib. facultas medica mentosa, ibid. 101 a. b. robustos facit homines, viresq; auget, ibid.
- Cerumina**, 1.205 a. Cervix, 1.282 c.
- Cervix** quot fibras contineat, 1.46 c
- Cervicis vertebrae**. vide Vertebrae.
- Cerufla**, 2.58 a
- Cerufla præparata cum draconio**, 2.250 b. c. duplex Nicolao, ib. conficiendi fuci modus ex Dracunculo, ibid. c
- Cerufla plumbaria**, 2.250 c
- Cestron**, 2.13 f. Chalastrum, 2.61 a
- Chalcantem**, 2.57 b. Chalcitis, 2.273 b.
- Chalcitis**, 2.57 d. rubra, ibid.
- Chalcitis** quomodo uratur, 2.134 c
- Chalcitis ut torrenda**, 2.131
- Chamelea** non est venenata, 4.327
- Chameleontis albi**, 2.27 c
- Chameleontis nigrae vires**, 4.327. 326
- Chama leuce**, 2.155 c
- Chama meliflos**, 2.14 a
- Chama pyxis asula**, 2.300
- Charmes**, 2.40 b
- Charmesinus color**, 2.40 b
- Charonium autrum**, 1.91 a
- Charonii specus**, 1.91 a
- Charonia scrobes**, 1.91 a
- Chartæ combustæ medicamentum**, 3.277 d
- Chebuli**, 2.143 c Xēlā, 1.283 a
- Cheiron**, 2.185 Chermes, 2.17 c
- Chermes**, 2.211 d Chexua, 2.17 b
- Chiron Centaurus**, 1.2 b
- Chirurgia inventio**, 1.2 d
- Chirurgorum praxis communis**, 3.151
- Chirurgica**, 1.12 d. eam Galenus multis in libris docuit, 1.12 c
- Cholera**, 2.207 c. 3.112 c. causæ, signa, curatio, 3.112 d
- Choriaci**, 3.112 c Chordapsus, 1.208 c
- Choræ publicæ cavendæ tempore pestis**, 3.212 c
- Chrysololla**, 2.55 d. 2.249 d. 2.61 a
- Chrysololla nativa**, factitia, 2.58 b
- Chilos** quid, 2.31 b Chylus, 1.32 a
- Chymus**, 1.83 b
- Cibandi consilia a quibus petenda**, 1.221 f
- Cibandi consilia a duobus petuntur**, 1.94 a
- Cibalis fistula**, 4.435. Cibus, vide victus.
- Cibus ingestus animale**, sed non naturalem appetentiam sedat, 1.37 c
- Cibus ingestus famem duntaxat animale** sedat, 1.82 c
- Cibus boni vel mali succi**, 1.93 b
- Cibus vesperi non multus ingerendus**, 1.112 b
- Cibus medioeris qui**, ib. d. valentior qui, ib.
- Cibi fastidium**, 3.104 c. vide Appetentia.
- Cibi qui**, & quibus aratibus quales conveniant, 1.99 b. c. d
- Cibi delectantes num ægris semper exhibendi**, 1.96 b
- Ciborum assumendorum legitimus ordo**, 1.96 d. tempus assumendorum in sanis, 1.97 a
- Cibi & potus quis usus**, 1.92 f
- in Cibi consideranda novem**, 2.93 a
- a Cibo prorsus abstinendum in accessibus morborum**, 1.97 f. non in omnium tamen febrium accessibus, 1.98 a
- Cibi singuli anni temporibus convenientes**, 1.98 c. Cicatrices, 1.204 c
- Cicatricem inducens**, 3.252 a. per se & primario malicorium, ib. b. ex accidente, ib. c. cicatrices ut in vulneribus corrigendæ, 3.252 c. nigrae quæ tellant, ib. d
- Cicatricem inducentia**, 3.169 d. 2.105 c
- Cicatricis inducendæ modus**, 3.251 c
- Cicerbitæ**, 2.212 c Ciceris semen, 2.17 b
- Cichorium**, p. 2.9 d Cichorii radix, 2.27 d
- Cichorii flos**, 2.14 a Cici semen, 2.17 b
- Cicuta non adhibenda catapotii**, 4.319
- Cicutam quando Galenus propinavit**, 4. ib.
- Cicutæ semen**, 2.17 b
- Cicutam calidam & siccam nō reperiri**, 4.319
- Cicuta cur non necet sturnos**, 4.315
- Cilia**, 1.49 Cimeni quid, 2.166 c
- Cimolia terra**, 2.71 d
- Cimolia terra**, 2.146 a. eius succedaneum, ib.
- Cinamomum**, 2.44 c
- Cinamomum nostrum quale**, 2.128 b
- Cinamomi folia**, 2.45 a. decoctum, 3.69 c
- Cinamomo vero caremus**, 4.359
- Cinamomum optimum**, ib.
- Cinis alkali**, 2.16 c Cinnabaris, 2.58 c
- Cinnabaris**, 2.146 c. f. eius vis, 4.340
- Cinnabaris antiquorum**, 4.339
- Cinnabaris fossilis**, 2.58 d
- Cinnabaris Galeni**, 2.58 f. recentiorū, 2.59 a
- Cinnabaris Dioscoridis**, Galeni, 1. theophrasti, 2.58 c. d
- Cinnabri nostri & Dioscoridis differentia**, 4.340
- Cinnabaris Dioscoridis**, ibid.
- Circocle**, 3.158 c Citonia, 2.21 a
- Citrugo**, p. 2.10 c
- Citrei mali cortex**, 2.45 a
- Citrei mali semen**, 2.17 b Citri, 2.17 b
- Citria condita**, 2.201 c Citrium, 2.200
- Clarificatio** quid, 2.86 b
- Claves seu claviculae**, 1.47 c Clavus, 1.203 d
- Clavus** quid, 3.223 d. eius causæ, signa, curatio, ibid.
- Clavus**, 1.214 c
- Claviculae**, 1.323 a. earum ad pectoris articulationem, 1.321 b. articulationis claviculae cum pectoris osse peculiaris cartilago, ib. c. claviculae curvitas & figura, ib. d. curvitatibus usus, 1.324 a. claviculae cur superioris scapulae processui connexa, ib. 2. b. Eius ad summum humerum nexos, ibid. c. substantia, ib. capita, asperitates, levitates, foramina, ib. d
- Clymia**, 2.56 d Clyster, 3.17 a
- Clyster cui admoendum**, supinus decumbere debet, 3.149 c
- Clyster**, 2.282 a. eorum componendi ratio, ib. pondera eorum quæ clysteres componunt 2.284 c. eorum differentia, ibid. d. leues, vehementes, ib. leniens, ibid. c. emolliens, ib. c. adstringens, ib. f. abstergens, 2.285 a. validus, fortis, ibid. nutriens, ib. b. tempus eos iniiciendi, & retinendi, ib. c
- Clysteribus ciebrius non utendū**, 3.145 b
- Cnicus**, 2.154 d. succedaneum, ib.
- Cnici carami semen**, 2.17 b
- Cnici delectus**, facultas, pondus, 2.116 a
- Coagulum leporis**, 2.49 d Coactum, 1.45 a
- Coccognidum**, 2.17 d
- Coccus baphica**, 2.17 c
- Coccyx** os, 1.47 b Cochlea, 2.49 d
- Coctionis medicamentorum vis**, 2.84 b
- Cocitudo nocturna**, 3.62 c
- Cœcum**, 1.58 f
- Cœcum intestinum** 2.400 d. nominis ratio, ib. d. forma, ib. c. situs, 1.401 c
- Cœcum foramen**, 1.69 c
- Cœcum foramen**, 1.69 c. 1.491 a
- Cœli erratum**, 1.163 a
- Cœli Rhodigini lapsus**, 1.103 a
- Cœna plenior quæ**, 4.411
- Cœna an semper prandio minor**, ibid.
- Cœna an prandio liberalior esse debeat**, 1.112 d
- Cœna cur prandio plenior**, 4.411
- Cepæ semen**, 2.17 b
- Ceruleus lapis**. vide Cyanus. eccitus, 1.101 c
- Cognitio triplex**, fortuita, consultata, & imitatrix, 2.13 d
- Coindicatio** quid, 1.264 c. coindicantia, ib.
- Coitum concitantia**, 3.158 a
- Collisio**, 1.215 a. 1.184 c. colatura quid, 2.85 f
- Colica laborantes non valide purgandi**, 4.395
- locum affectum considerent**, 4.396
- Colatura** quid, 2.85 f. colchicorum, 2.122 c
- Colicus dolor**, 1.208 b. c
- Colici cur in sella alium deiectionis animi deiectionem incurrant**, 1.401 d. e
- Colicis doloribus a tota substantia conferentia**, 3.122 b
- Colicis resoluti curatio**, 3.39 c
- Colliculi glandium**, 2.20 c
- Collistia**, 2.285 d. liquida, arida, ib. eorum materia, ib. visus, ib. c. reprimens, ib. f. dolorem sedans, 2.284 a. costringens, discuties, ib.
- Collyrium aridum**, 3.57 f
- Collyrium aridum album**, 2.232 b. aridum rubrum, ib. aridum viride, ib. c. aridum e plumbo, ib. aridum e thure, ib. d. aridum e myrrha, ibid. cygnus albus, 2.232 c. liquidum e pompholyge, 2.233 a. e cadmia, ibid. ad cicatricem ducens, 3.58 c. ad ophthalmiam 3.55 a
- Colocynthis**, 2.21 a. 2.119 d. eius facultas, delectus, pondus, ibid. d. c. f. eius vires infrenantia, ib. eius præparatio, 2.92 c
- Colum**, 1.59 a Colophon regio, c. 4.309
- Colon intestinum**, 1.401 c. eius vasa, 1.402 a
- Coli dolores**, 3.120 a. causæ signa, ib. crassi humoris, ib. b. acris & erodentis, 3.120 b
- Colici doloris curatio**, 3.121 b. c

solophonia vera quæ 2. 42. veteribus triplex
2. 42. resina 2. 41
eoloquitis 2. 21
color faciei & oculorum 3. 137. vrinæ, vide v-
rina. colores 1. 30
colorationis in medicamentis quis vsus 2. 80
columella 1. 65. phlegmone 3. 76. eius caussa,
signa, curatio ib. laxata quid 3. 77
coma 2. 168. coma quid 3. 32. eius caussa 3.
33. notæ, curatio ib. quid 1. 195. vnde dictū
ib. duplex ibid. somniculosum, graue seu
profundū, lene, tenues siue lenes somnos
habens, ibid. perpetuo præter naturam, 1.
196. coma seu cataphora generatim 1. 196
comatosi qui 1. 195
combeba & compeba 2. 20
comminutio quid 2. 78
commissorum conseruatio 3. 142. commissa
bifariam coniuncta manent & aggluti-
nata 3. 241. commissuræ ossium 1. 283.
earum differentie ib. connexio ossiū quæ
nullum motum habent ib. instar vnguiū
commissura 1. 284. structuræ ossium bifa-
riam committuntur ib.
comitialis morbus. Vide Epilepsia.
communitas quid 1. 14
compositio de baccis lauri 1. 181. mala 1. 181
compendiorum & scribendorum & legēdo-
rum ratio 1. 278.
complexus mistione quid 1. 14
concaussa 1. 172. concoctio quid 3. 16
concoctio quid 1. 143. duplex 1. 143.
concoctiones a calidis externis adiuvantur
1. 146. concoctio nulla a frigidis fit 1. 146
Concoctio 1. 81
concoctio triplex ib.
concoctio prima ventriculi ib.
concoctionis caussa efficiens ib.
concoctionis primæ humor 1. 82
concoctionis excrementum ib.
concoctio secunda iccoris 1. 82
concoctionis secundæ humor 1. 83
concoctionis excrementa ib. tertia concoctio
in singulis partibus 1. 83. eius præparatis ib.
concoctionis humores ib. excrementa ib.
concupitus. Vide Venus
condylomata 3. 127. 1. 108
conditum quid 2. 275. condita 2. 200
conditura quid 2. 80. cōfectio hamech 2. 186
confectiones, vide Antidotas. confectiones
quo pacto struendæ 2. 21. magor 2. 264
confidentia quid 1. 80
conformatio partium indecens 1. 181
congelatio 3. 31. 1. 196
conglutinationes squamosæ temporū 1. 45
squamosæ 1. 239
conferuæ quomodo parandæ 2. 80. conferua
florum perfici purgatoria 2. 209. consoli-
da maior 2. 10
cōstitutio celi quid indicet 1. 271. quid 1. 171.
conseruando prana in mutata sit, nec ne 1. 95.
acquisititia siue altera natura 1. 95. quid in-
dicet 1. 271. victus rationem ostendit ib.
quando mutanda ib. singulorum corpo-
rum naturam ostendit ib. consuetudinis
mutatio quo tempore fiat 1. 95. ad eā quæ
requirantur 1. 96
continui solutio 1. 181. solutio partibus simi-
laribus vetius, quam instrumentariis, cō-
uenit & tribuitur 1. 182. continuitatis so-
lutionis in similibus partibus euenien-
tis differentie 1. 184. contraactionū in mus-
culis factarum curatio 3. 113. contrarietas
quid indicet 1. 267. contrarium quid 1. 126.
contraria contrariorum remedia 1. 267. con-
trarietas quid 1. 267. communis tum mor-
bo, tum temperamento, tum acri ambien-
ti indicatio ibid. contrariorum modus &
quantitas noscenda 1. 269. mixturæ quali-
tatem summatas frangunt 1. 17
contraindicatio 1. 264
convulsio 1. 184. 1. 215.

convoluolus 1. 400.

convulsio quid 3. 45. eius caussa ib. convulsio
per consensum ib. eius notæ ib. convulsio-
nis ab ictu feræ venenatæ curatio 3. 46. cō-
volutus 1. 208

convulsio 1. 201. canina 1. 206. convulsionis
nerui præmissio 3. 262. a plenitudine 3. 46.
eius curatio ib. convulsio ab inanitione 3.
44. curatio ib. cum rapture 1. 184

cor 1. 171. 1. 171. 2. 78

cor & instrumenta ipsius functioni mini-
strantia 1. 64. an sedes prudētæ 4. 429. aer-
norum principium Aristoteli 1. 461. non est
formæ caussa 1. 110. non est primum senso-
rium ib. 1. 65. eius auriculæ ib. iudantia
2. 76. cordis sinus duo 1. 65. vasa ib. ventri-
culi 1. 458. cordis vasa quæ 1. 459. orificio-
rum membranz 1. 461. earum numerus ib.
pulsus & motus 1. 80. substantiæ peculiāres,
venæ & arteriæ 1. 456. inuolutum 1. 454.
aqua in corde multa quantitas ib. & eius
vsus ib. aquæ vsus in corde ib. cordis mem-
branz 1. 65. cordis tantum duo ventriculi
4. 429. palpitatio vide Tremor. & Palpita-
tio.

cordis intemperiei calidæ curatio 2. 93. cura-
tio frigidæ ib.

Cordi error maximus 2. 163. 2. 155. 2. 136.
2. 245. 2. 179. 2. 150. 2. 129. 2. 153. 2. 211. 2. 225
2. 249. 2. 246.

Cordi immensus error 2. 151. 2. 127. 2. 231.

Cordus errat 2. 180. 2. 182. cordi error 2. 156

Cordus 2. 167. 2. 158. 168. 2. 165. temeritas ibid.

2. 166. 2. 170. 2. 177. 2. 129. 2. 198. 2. 149

Cordus errat 2. 239. 2. 744. 2. 207. 2. 210

Corianri semen 2. 17

Corianri refellitur 2. 62. eius pertinacia 2.

83 b

Corianri Galeni aliquot loca deprauiat 2. 63

cordi opinio improbata 2. 127

Corianri error 3. 203

Corianri error 2. 74

Corianri de poterio pudendus error detegi-
tur ac confutatur 2. 22

Corianri aper rectius quam leo diceretur 2.

23 d

Corianri refutatur 2. 24

Corianri a calumnia Matthioli affectus 2.

138

cornæ vitia 1. 203

Corianri lapsus 2. 225

cornæ tunice color præter naturam non le-
dit primo actionem 1. 174

cornæ tunica 1. 71

Cornelius Tacitus de succino 4. 325.

Coraelii Celsi error 1. 288

cornix 1. 282

cornu ceruinum vltum 2. 138

cornu ceruinum, caprinum 2. 49

coronæ 1. 282

coronæ vrinæ quid 1. 243

Corascene est Syria 4. 309

totonopolis vires 4. 336

corpus totum confusile & confusibile 1. 28

torporis forma quæ 1. 180

corporalis actio vide Actio.

corporis laborantis natura cognoscenda 2.

269

corporis glandosi vsus 1. 396

corpora animantium non tantum ex quali-
tatibus elementorum nasci 1. 18

corpus salubre trifariam nominatur 1. 5

corpus neutrum trifariam appellatur 1. 6

corpus salubre, insalubre, neutrum 1. 5

corrigiola 2. 11

corruptela 1. 120

corruptelæ curatio 1. 274

cortex Arantiorum 2. 44

cortices vt auellendi 2. 76

cortices quomodo asseruandi 2. 77

cortices in medicorum officinis vltati qui 2.

corymbi thymi 2. 179

costa inferior 1. 320. costæ veræ & spuriz 1.

316. earum substantia ib. cartilaginea sub-

stantia ib. costis omnibus non par longi-
tudo nec amplitudo ib. earum leuitas &
asperitas ib. sinus ib. earum asperum tu-
berculum 1. 317. ad vertebra articulatio
ibid.

costæ duodecim 1. 47. veræ, spuriz 1. 47

costarum ductus 1. 319

Costus horrensis 2. 246

costus 2. 128. succedaneum ib.

costus herba 2. 246

costus officinarum qualis 2. 27

costus horrensis 2. 27

costus Arabicus, indicus, Syriacus 2. 27

costus vera 2. 27

coxendicis os 1. 334. & 1. 335

coxendicis ossis acutus processus 1. 335. coxen-
dicis ossis appendix ib.

totes aquariz 2. 70. oleariz ib.

cori semen 2. 19

coronea 2. 21

coronæ cordonum cordonumue semen 2. 17

corula fetida 2. 11. totum 2. 11.

corula 1. 287

corula 1. 287

trapula quorundam notatur 1. 97

crassa non omnia etiam cocta 1. 146

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

crassitudo non omnis excretioni aduersatur
1. 145

I N D E X

Cupressi pillula 2. 27. c
Cuprum, 2. 35. d. eius cremandi modus, ibid.
Cupulæ glandium, 2. 20. d.
Curcuma officinarum, 2. 28. a, Serapionis, ib.
Cuscuta, 2. 14. c.
Cutis eadem specie cum ea, quæ perit, regigni non potest, 3. 151. 9, cuticula, 1. 50. c.
Cutis & cuticula, 1. 351. a. d. Eius substantia differentie, ibid. Cuti venas & arterias ad nervos porrigi, ipsamque sensus esse competentem, 1. 351. c.
Cutis volæ manus instrumentum, 1. 28 d manus cur depilis, 1. 375
Cyanei nomina, facultas, probatio, pondus, 2. 122 c f.
Cyanus, 2. 71 b flos, 2. 14 a
Cyathus quid, 1. 117 b
Cyclaminus, 2. 27 c f.
Cydonia condita, 2. 201 e
Cydonia, 2. 21 a
Cygnus, 2. 232 c
Cymbalum, 2. 248 c
Cynamomum tenue, 2. 166 b vilius ibid.
Cynoglossa, 2. 29 b radix, 2. 28 a
Cynofarchis, 2. 30 c
Cyrthum medicamentum, 3. 278 c
Cyperus Babylonicus, 2. 28 c radix, 2. 27 f
Cypheos compositio, 2. 37 d
Cyrenaeus liquor, 2. 33 b
Cyrthus exquisitus, non exquisitus, 1. 211 e
Cytinus, 2. 13 d

D.

Dacrydion, 2. 33 d. 2. 119 c
Dacrydium, 2. 177 f
Dactyli, 2. 22 a ossa, 2. 18 c
Damocratis locus emendatus, 2. 137
Darseni quid, 2. 166 b
Darich, 2. 125 d.
Dauci Cretici succedaneum, 2. 152 a
declinatio morbi neminem finit mori, 1. 219.
et. 1. 21 d vnde dignoscatur, 1. 221 a
decoctum pituitam extenuans, 3. 17 c purgans melancholiam, 3. 51 b magistrale vulgo nominatum, 2. 278 f eorum compositio improbat, 2. 279 b tempus & modus eorum assumendorum, ib. c. decocta purgantia, ib. c. modus ea exhibendi, ibid.
decubitus, 1. 213 c forma legitima, 1. 113 b supinus, ib. c. pronus, ib.
desiniendi forma optima, 4. 307
descriptio inepta similium partium, 1. 43 b
deslavi ex densitate meatuum curatio, 2. 5 a ex meatuum raritate, 3. 4 c capillorum causæ 3. 3 f. signa, 3. 4 a curatio, ibid. & 3. 4 c victus ratio, ib. a penuria substantiæ nutritientis capillos, curatio, ib. b
desfrutum, 2. 278 c
deiectionis alui signa, 1. 228 f
deligatur tres modi 3. 242 d agglutinatoria ibid. expulsoia, ib. f deligatum retinens, 3. 243 b
Denarius, 2. 124 d
dens ut citra dolorem & absque ferro extrahatur, 3. 73 c
densantia, 2. 104 a
dentali, 2. 250 b
dentali quid, 248 b qua resta hodie officinae pro dentali vtiuntur, 2. 48 c
dentalium, 2. 47 c
dentes albificans, 3. 75
dentificia, 2. 285 a vltus, ib. compositionis ratio, ib. optimum, 3. 37 c & 3. 74 a
denti dolor a frigore, 3. 2 d a calore, ibid. ab humorum redundantia, ibid. e dolorem reprimentia, oiscutientia, stupefacientia, a tota essentia conducuntia, 3. 73 a b mobiles firmantia, ib. a fcur denigretur, ibid. e quomodo curentur, ibid. incisorii, canini, maxillares, molares, genuini, 1. 46 b sapientie qui, 1. 46 c vitia, 1. 205 b numerus, ib. a. doloris causæ, 3. 72 b lingua, ib. c esse cili, 1. 297 c sensu esse præditos, ibid. crescere & nutrir, ib. d e eorum numerus, ib. c. incisio-

rii octo, ib. e canini quatuor, ib. maxillares, 20. ib. f molares cur dicti, 1. 298 b. quo pacto maxillis infigantur, ib. eorum radices, ib. dentes genuini, ib. d. eorum vltus, ib. e
Derivatio quid, 1. 126 c
desiccantia vide succantia & exsiccantia, 2. 101. a
Deslennius, 2. 135 a 2. 145 f notatus, 2. 157 c cōpositionū veterū depravator, 2. 168 c notat 2. 145 c non audiendus, 2. 131 d salumnia depulsa, 2. 184 f iudicium parum exquisitum, 2. 64 c error, 2. 42 d error, 2. 167 c stupor, 2. 23 d desperatio quid 1. 80 c
desperatis non sunt remedia adhibenda, 3. 207 b
despumatio quid 2. 85 c
destillatio quid, 2. 86 d
destillatio. 1. 202 c
destillatio in duplici vase, 2. 86 d
destillatio capitis vide Catarrhus
destillationem capitis reprimentia medicamentis, 3. 72 a
detentio, 1. 196 a
detergentia, 3. 254 a
detergentia, 3. 183 d c
Diabetes quid, 3. 148 a eius causæ, signa, curatio, ib. b c
Diabetes, 1. 209 b
Dia Acorus Nicolai Myrepsi, 2. 156 a
Dia calamintha, Galeni, 2. 168 a
Diacaryon simplex, 2. 205 c
Diacaryon Myrepsi, 2. 206 a
Diacarrami, 2. 188 c
Diacareon compositum, 2. 206 a
D. a cassia cum manna incerti auctoris, 2. 173 c
Dia cinamomum Ioan. Damasceni, 2. 166 a
Diambareos Ioannis Damasceni, 2. 160 d
Diamoschu dulcis Ioan. Damasceni, 2. 160 f
Diamoschu amarum Ioannis Damasceni, 2. 161 d
Dianitu Ioannis Damasceni, 2. 167
Dianthon Nicolai Myrepsi, 2. 161 e
Diapenidion Nicolai Myrepsi, 2. 158 f
Diapenidion Nicolai Prapoli, 2. 159 b
Diapedesis, 3. 254 c vnde oritur, ib. f
Diaphœicon solidū incerti auctoris, 2. 186 a
Diaprasu Nicolai Myrepsi, 2. 169 f
Diaprunum simplex, 2. 176 c
Diapretum Mesuz filii, 2. 188 a
Diaphragma quid, 4. 428
Diaria vide Febres
Diarrhœa, 1. 207 f
Diarrhœa, 3. 313 d causæ, signa, ib. d e curatio, ib. f biliosæ diarrhœæ cura, 3. 114 b ex pituitosis tumoribus curatio, ib. d ex imbecillitate retentis facularis, ib. e
Diaprasu, 1. 283 c
Dialaryon Nicolai Myrepsi, 2. 151 d
Dialaryum, 2. 30 c
Diasena vera Nic. Myrepsi, 2. 183 c. Diasena vulgaris Nicolai, ib. b
Diaspermatum Nicolai Myrepsi, 2. 174 a
Diacassaron cur dicta, 2. 135 b
Diaprasu aliter Galeno ac Aristoteli vsurpatur, 1. 137 c
Diamtharon Nic. Myrepsi, 2. 165 c
Diarragacanthos frigida Nicolai Myrepsi, 2. 157 b
Diarragacanthos calida, 2. 158 d
Diatrion pipereon compositum, simplex, 2. 171 b c
Diatrion pipereon Mesuz filii, 2. 171 c
Diatrion pipereon Nicolai, 2. 171 a
Diaturpetu incerti auctoris, 2. 188 a
Diaturpetu cum Rheubarbaro Montagnaris, 2. 187 c diaturpetu maris incerti auctoris, 2. 187 c et mino zezaris, ib.
Diarylaloos Ioannis Damasceni, 2. 166 d c
Diazingiber incerti auctoris, 1. 171 c
D. ctamnus, 2. 220 b
D. ctamnus, 2. 132 d
D. ctamno vero caremus, 4. 380
Dictamni natalis, 4. 361
Dictamnus semine caret, ibid.

Dictamni radix, 2. 28 b
dies decretorii, 1. 229
dies intercurrentes, 1. 232 a prouocatorii, ibid.
dies naturales, 1. 188 d
dies indices, contemplabiles, 1. 229 f
Differentiæ duæ similium, 1. 42 c
differentia quatuor partium corporis, 1. 44 a
differentia principii & elementi cur tenenda, 120 c
Difficultas urinae, 1. 209 c
Digestio quid, 1. 102 f
Digitos pedis mouentes muscoli, 1. 190 b
Digitus manus quinque & qui 1. 48 b
Digiti cur vnguibus donati, 1. 344 b
Digiti manus, 1. 331 c eorum nomina & numerus, 16. f. iusta digitorum ossium magnitudo, 2. 332 a decens digitorum ossium forma, 16 b. Digitorum ossa cur supra infraque crassiora, ib. e
Digiti quinque pollex, ib. f. index, medius, annularis, minimus, 1. 133 a b.
Digiti cur inæquales, ibid. c. quinque iure exstructi, ib.
Digiti muscoli tredecim, 1. 378. octo qui quatuor digitis seruiunt, ibid. b. duo qui pelli-
cis primo ossi famulantur, ib. d. tres qui secundo pollicis ossi famulantur, ibidem, c.
Digitos mouentes muscoli, 1. 377 c. d. c. naturæ in ius industria, ib. f. sunt viginti octo, 1. 378 b. c
Dignitas, 1. 273 c
Dilutum shabarbari 3. 16 e
Diocles, 1. 15 d
Dioscorides pictor herbarum optimus, 4. 307
Dioscorides bonus simplicista, 4. 396
Dioscoridis error de terra lemnia 4. 361
Dioscoridis & Plinii lapsus, 2. 60 b
Dioscoridis locus 2. 45 d
Dioscoridis de spuma nitri & aphronitro sententia exposita, 2. 63 c
Diphyrgos, 2. 59 a. natuum, ib.
Diptami, 2. 28 b
Discus, 1. 102 b
Discutientia mixta refrigerantibus, 3. 116 f
Discutientia quæ, 3. 9 b
Discutientia, 3. 19 b
Discutientia, 3. 229 c
Discutientia 3. 119 d
Discutientia, 3. 15 d. 2. 29 b. & 3. 76 e
Discutientia quæ, 2. 103 d
Dispensatorium, 2. 123 c
Dissidentium partium coniunctio 3. 241 f
Dissolutio quid, 2. 87 e
Dissentio immoderata cauenda 3. 285 quando remittenda, ib. b
Diuisio, 1. 184 d
Dolor capitis, vtrum intra caluariam capitis vel extra versetur, signa, 3. 9 c
Dolor capitis ex intemperie calida nati causæ 3. 10 c. Victus ratio, ibid. Curatio ibid. f. in dolore capitis cui parti medicamenta adhibenda, 3. 12 a stupefacientia
Doloris capitis triplex, prima dictus cephalalgia, alter cephalæa, tertius hemigrania, 3. 9 dignotio affectus vtrum intra, an extra caluariam consistat, vnde pendeat ibi. d. eius causæ, ib. e
Dolor capitis ex intemperie calida, 3. 9 f. 3. 10 c
Dolor capitis ex intemperie frigida, 3. 10 a
Dolor capitis ex intemperie frigida, 3. 10 a
Dolor capitis ex calida intemperie natus vt curandus, 3. 10 c. f. cui parti in eo curando applicanda medicamenta, 3. 11 a linimenta ib. e. vnguenta ib. f. sarcelli 312 a embrocha, ib. stupefacientia, ib. capitis procreatus ab intemperie frigida quo pacto curetur, 3. 12 c. vnde oritur, 3. 12 c. vt dignoscendus, ibi. quæ in eo victus ratio obseruanda, ib. d. quomodo curetur ib. e. q. vnguenta adhibenda, ib. f.

Dolor capitis & biliosis humoribus unde oriatur 3. 15 c. eius signa ib. Vistus ratio ib. f. curatio 3. 16 a. capitis ex pleuritide quid 3. 14 b. eius causae & notae ib. d. curatio 3. 14
Doloris capitis ex ictu vel casu curatio 3. 20 f. dolorem capitis in febribus repellentia 3. 22 b. excitantia 3. 22 d. capitis & ventriculi vitio orti causae 3. 19 a. notae ib. b. curatio ib. b. ex ebrietate ib. c. eius curatio 3. 19 f. Vistus ratio 3. 20 a. capitis differentiae tres 3. 9 c. eius causae ib. d. 3. 30 c. curatio ib. c. & 3. 12 c.
Signa intemperiei calidae 3. 9 f. frigidae 3. 10 a. necesse ibid. Signa prognostica 3. 10 b
Doloris capitis & pituitosis humoribus causae 3. 17 c. notae ib. c. Vistus ratio ib. c. curatio 3. 17 d. doloris colicis a phlegmone curatio 3. 121. d. e. ab acerbis & rodentibus humoribus curatio 3. 121 e. doloris capitis ex frigida intemperie procreati causae 3. 12 c. notae ib. Vistus ratio ib. c. vnguentum f. sacculus 3. 13 a. doloris capitis ex intemperie frigida vel humida orti causae 3. 13 d. signa 3. 13 e. ib. c. curatio, linimentum 3. 14 a
dolore in capitis quae vena sit secanda 3. 14 c
Dolorem leuonia medicamenta 3. 152 c. dolorem vnicuique infusus 3. 118 c. mitigantia 2. 106
Dolor fluxiones irritat 4. 374
Dolorem in pleuritide prohibere ib. dormire vide somnus
Doronicum 2. 28 b. mauritanum 2. 145 c. orientale, Romanum, dulcichenū, officinā. ū & vulgatum quod 2. 28 c
Dorsum flecti auctorium commodius fuit 1. 305 b. quot modis agatur 1. 364 c. sedecim id mouentes muscoli 3. 64 c
drachma 2. 124 c
dracunculus 2. 28 c. 2. 26 f
dracuncum 2. 26 f. dracuncum 2. 26 b
dragacantha 2. 43 a
dragax 2. 280 a
drax 2. 126 a
dropax quid 2. 296 c. simplicissimus ib. c. cōpositus ib. d
drofarum 2. 108 a
dulcinarum Nicolai Myrepsici 2. 173 d
dulciani panes 2. 173 c
duodenum 1. 58 d. e. duod. & portonarium idem 4. 214. duodenum quid, ib.
duodenum 1. 398 d. situs eius ib. nomen ib. c. a pyloro diuersum ibid. venae, arteriae, nervi eius ib. f. meatus bilem deferentis inferio ib. a
Dura mater 1. 67 b. dura mater vide Membrana dura. Dura tunica 1. 71
Duratio 2. 90 c
Dysenteria 1. 103 a. dysenteriae cruentae quatuor species 1. 208 b. dysenteriae 3. 116 c. eius cruentae quatuor species ib. c. causa ib. f. signa 3. 117 a. notae exulcerationis intestinorum tenuium 3. 117 a. b. notae exulcerationis crassorum ib. b. c. curatio 3. 117 f. crassorum & tenuium curatio 3. 118 b d
Dysenterici non sunt purgandi 4. 393
Dysenterici curantur animo deficientes 4. 394
Dyspepsia quae 3. 271 c
Dyspnea quid 4. 404
Dysuria 3. 153. causae, signa ibid. c. curatio frigida intemperiei ib. f. dysuria 1. 209 c
E.

Ebur 2. 49 c. legitimum in officinis nō prostat ib.
Eboris preparatio 2. 91 f
Echidna 2. 28 c
Echidna 2. 14 a
Echymomatus notae seu signa 3. 255. curatio ib. propria eius curatio ib. b. c
Echymoma 1. 255 a. eius species ib.
Echymomatus species fugillat 3. 254
Echymosis quid 3. 254 d. causa ib.
Elegma sanum & expertum Damasci 2. 103. b. c. scyda Dam. ib. b. c. pincus Damasci ib. c.

e pulmone vulpis Dam. 2. 104 a. e. papauere Dam. ib. b. ad asthma Dam. ib. c. ad vocem amissam Myrepsici ib. c
Elegmata 2. 203 b. quid 2. 175 d. eorum vsus ib. d. exhiolimonis tempus 2. 276 a
Elegmatum vsus 2. 275 d. e
Epilepsia 1. 102 a
Epilepsia 2. 104
Echymata 3. 221 d. 1. 214 a
Efflatio 1. 371 c
Ex egestionibus quid praedicendum 1. 244 ege-
stio optima quae ib
Elaterium 2. 112 a. 2. 31 d. quid 2. 112 c
Electuarium lenitiuū incertum auctoris 2. 175 f.
Electum 2. 72 d.
Electuarium de nucibus appellatum 3. 213. c.
de oio 3. 208 f. Ducis Nicolai 2. 177 c
Electuarium Indum minus Meliae filii 2. 182 b. curia dictum ib. d. Sebesten 2. 177 c
Electuarium totum Meliae filii 2. 181 d. Indum maius Meliae filii 2. 181 c. cur Indum & cur maius dictum 2. 182 a
electuarium anseption 2. 115 b. unde antidotus.
electuarium Iustini Nicolai 2. 172 a sapientum 2. 152
electuarium c. myxus 2. 177 c. regium Meliae filii 2. 173 a
Elementum quid 1. 79 f. & principium quid differant 1. 19 f
elementa non sunt qualitates 1. 20 a
electuaria 2. 150 c
Elementum quid 1. 16 c. hominis non est vñ 1. 17 d. elementa quorū 1. 17 f. elementum putum in animalium corporibus nullum reperiri 1. 18 d. elementa prima perpetua 1. 10. c. hominis propria 1. 43 b. Medico cur consideranda 1. 20 d. cum his quorum sunt elementa eiusdem sunt generis 1. 20 a. animalium sanguine praedictorum 1. 32 a. purum sine alio ibi 1. 18 f. in elementis vtriusque qualitates summa 1. 17 b. elementorum substantiae, non qualitates seu vires nobis asseruantur 1. 18 b
elementa officinarum 2. 41 e
Elleborus albus 2. 121 b. elleborus 2. 28 d. ellebori genera, album & nigrū 2. 120 c. forma ib. f. facultas, pondus 2. 121 a
elixir ex herba 2. 281 c
emborisma 2. 155 a
emborche 2. 298 b. vsus, compositio ib. capitate, calefaciens, refrigerans ib. d. emborcheaio dolore capitis 3. 12 a. 3. 12 b. & 3. 12 b.
Empedoclis opinio refutata 1. 18
emollientia 2. 104 c. 3. 227 c
empetron alterum 2. 128 c
emphrastica 2. 104 b
emplastica medicamenta 3. 259 c. 2. 104 b. emplastica & refrigerantia vehementer, non temere adhibenda sunt 1. 54 d
emplastrum rubificans 3. 36 a. Galeni 3. 262 c
emplastrum rubificans 2. 197 a. 2. 294 a. veteres vtriusque composuerunt ib. b. coram d. fferentia ib. componendorum hodie visitatorum modus ib. c. vsus ib. c. f
Emplastrum suppuratorium in peste 3. 210 c.
emplastrum diachylon simplex 2. 26 a. compositum ib. d. diachylon magnum ib. d. diachylon paruum ib. c. emucaginibus 2. 257 a. diachylon Myrepsici 2. 257 b. c. baccis lauri ib. b. & d. ventriculum & iecur calefaciens ac roborans ib. d. c. meliloto ib. c. tripharmacū 2. 258 a. b. oxycroceon ib. cur ita dictum ib. c. apostolicum ibid. c. & 2. 259 a. album coctum, simplex, ib. compositum ibid. d. ceroneum ib. d. de ianua 2. 260 a. gratia Dei ib. a. diuturnum ib. b. griseum ib. c. viridum ib. f. basilicum magnum 2. 261 a. c. crusta panis ib. a. ad bubones pestilentes ibid. b. santalinum 2. 261 c. tetrapharmacū 2. 28 c.
Empirici qui dicantur 1. 13 a
Empiricæ auctores & principes 1. 15 b
Empirothotonos 1. 202 a
Empyici 3. 96 c

Endimia p. 2. 9 c. vera, incognita 4. 363. semen 2. 18. b
entallum 2. 48 c
entocoele 3. 158 b
epar Vide iecur.
ephemeri non lethalis flos 2. 14 b
Empyici 1. 351 c
epididymis 1. 62 d
epigastrium 4. 423
epiglottis 1. 346 f. & 1. 347 a
epiglottis quot habeat musculos 4. 431
epithales 1. 201 c
epilepsia 1. 201 c. quid 3. 39 c. eius tres differentiae ib. c. causae ib. f. primogenia a tenui humore fieri quid potest 3. 40 d. epilepsia & apoplexia quid differant ib. f. non fit a tenui humore 3. 41 c. nec a flaua bile ibid. d. Eius notae 3. 42 d. quos potissimum corripiat ib. c. in ea quae vistus ratio ib. f. epilepsia infantium curatio 1. 43 b. adultorum curatio ib. c. ex ventriculi vitio orta quomodo curetur 3. 44 d. epilepsia inueterata cura 3. 44 a. preparatio, purgatio, discussio ib. b. c. d. medicamentis illi naturae proprietate repugnancia ib. d. a particula quadam orta cura ib. c. f.
epiphora 1. 202 c
epiplocele 3. 158 c
epiploentocoele 3. 158 c
Epiphora 1. 282 b
epithema iecoris refrigerans 3. 198 b. refrigerans 3. 198 a. proprie quae 2. 297 d. generatim quae ib. c. & componendi ratio visitata ib. modus miscendi ib. c. epithematis ventriculi & iecoris adstringentia admiscenda ib. c. f. cordiale 2. 298 a. iecori adhibendum ib. vsus ib. c
epithymum 2. 14 c
Epithymum Arabum & Graecorum, vñum & idem 2. 14 b. vtrum sit thymi flos 2. 14 d. c. f.
epithymum dosim nesciunt Meliae 4. 309
epithymi vires & pondus 2. 114 d
equitationis vsus 1. 105 f
Erasistratus 1. 3. cr. 1. d.
Erasmus Stella de Borussia 4. 325
Erasmus 2. 21 c
Erepsitarii 4. 382
eridanus in Hispania 4. 325
erithace quid 4. 344
erodentia 3. 230 d
erratum Auicennae & suorum sequacium 1. 38 c
Erythina 2. 286 c. vsus 2. 287. 3. 18 c. 3. 278 a.
eringii radix 2. 28 d
Error medicorum linguam cum epiglottide confudentium 1. 50 a
error quorundam detectus in verbenaria 2. 13 c. Razis & recentiorum Medicorum 1. 424 d. c. error Gentilis & Valefci 3. 210 c
eruca vera semen 2. 17 d
eruum 2. 136 c. succedaneum eius ib.
eruum 2. 172 b. eius succedaneum ib.
erui semen 2. 17 f
Erysipelas 3. 215 a. causae, signa ib. erysipelas exquisitum ib. b. inflammatum ib. c. eius curatio ib. c. erysipelas 2. 211 b. exquisitum ibid. phlegmonosum ib. erysipelas non est myrmecia 4. 407. non est ignis Persicus 4. 407. erysipelas oedematofum 3. 277 a. scirrhusum ibid.
eruca pro ruta 4. 330.
esbrium 2. 245 d
escarotica 3. 260 b
esthiomenum 3. 275 b c
esara Nicolai Myrepsici 2. 145 a
Esula 2. 73 a
Esula minor 2. 30 c
Esula vide 3. ithymalus.
Esula preparatio 2. 92 c
Esula radix 2. 28 c
Evacuatio quid,
Evacuatio quandoque partienda 4. 378
Eucrasia in latitudinem extenditur 1. 22 a.

Fufragia, p. 2. 9 b
Eupatorium, 2. 189 c. 2. 217 e. 2. 168 e
Eupatorium Græcorum, p. 2. 9 a
Eupatorium Mesues, 2. 169 c
Eupatorium cur hepatorium dicta, 4. 349
Eupatorium Græcorum est vulgaris Agri-
monia, 4. 305
Eupatorium verum quid, 4. 306
Eupatorium prodest dyentericis, 4. 309
Eupatorium Auicennæ, 4. 305
Eupatorium Græcum non purgat, 4. 309
Eupatorium agrimonia est, 4. 364
Euphorbii pondus nesciunt Mesue, 4. 310
Euphorbium, 2. 33 d
Euphorbii vires, 2. 121 b. cas infrenantia, ex-
hibendi modus, pondus, ib. b. c
Exagium, 2. 124 c
Exanthemata, 3. 221 d. 1. 214 a
Exanthemata duplicia, sublimia & lata, 3. 221
d. eorum causa, signa, ib. c. laterum exan-
thematum eruptione multi moriuntur, 3.
222 a. eorum curatio in infantibus, ibid. b.
in adultis, ibid. d
Exanthemata duplicia sublimia & lata, 1. 214 b
Exandescencia quid, 1. 80 d
Excessibus in iudicandis opus aliquo medio-
cri, 1. 29 b
Excrementa, vide Alui.
Excretio quæ cuique speciei morbi conueniat,
1. 223 f
Excretionis futuræ nota, 1. 227 c
Exemplum, 1. 17 a
Exercitationes singularum partium, 1. 105 c
Exercitationes ante corpus ab excrementis va-
cuandæ, 1. 106 a. & quomodo ad eas præ-
parandum sit, 1. 106 a. b
Exercitia & opera quid, 1. 105 a. b
Exercitia quæ sunt, 1. 101 c
Exercitia quantisper adhibenda, quibus no-
tis cognoscatur, 1. 107 c. d
Exercitationis inhibendæ notæ, 1. 107 d
Exercitationum genera ac differentia, 1. 101 b
Exercitiorum differentia, 1. 105 b. velox, tar-
dum, ibid. valentia, imbecilla, vehementia,
lenis, ibid.
Exercitiorum tria præcipue commoda, 1. 105
ibid. d
Exercitii tempus legitimū quodnam, 1. 106 c
Exitura, 1. 213 c
Exitus oculi quid, 3. 63 a. eius causa, signa,
curatio, ibid.
Experientia quid, 1. 13 a
Experientia & ratio instrumenta fidei, 4. 249
Experientia necessaria, atqui non sola, 1. 15 a
Experimentatrix medicina, incerta & incon-
stans, 1. 2 c
Expressio medicamentorum quid, 2. 84 b
Expultrix, vide Facultas.
Exquisite adstringentia, 1. 13 a
Excretionis, 1. 161 f. quid in iis medico con-
siderandum, ib. & 1. 162 a
Exsiccantium quatuor ordines, 2. 99 a
Exsiccatio quid, 2. 87 d
Extergentia, 2. 104 d
Extinctio medicamentorum quid, 2. 89 b
Exufflatio, 1. 446 b

F.

Fabarum semen, 1. 18 a
Fabarum farinæ, 1. 16 a
Faciei color vitiat, ut amouendus, 3. 137 f
Faciei color vitiat, ut amouendus, 3. 137 f
Faciei vitia, 1. 205 b
Facultas, vide Functio.
Facultas quid, 1. 174 c. c
Facultas quid, 1. 73 d. cur ita dicta, ib. essentia
facultatis quæ 1. 73 a. facultates animalia
gubernantes, 1. 74 b. animalis, ib. c. vitalis, ib.
naturalis, ib. d. corpus nostrum gubernan-
tes a medico considerandæ, ib. e. animalis
tres differentia, ib. f. sentiens, 1. 75 a
Facultas imaginatrix cur Galeno compre-
hendat sensum communem, 1. 76 a
Facultas vitalis cur ita dicta, 1. 76 c. eius neces-

itas, ib. f. a reliquis diuersa, 1. 77 a. genera-
trix, 1. 77 b. duabus completur partibus,
immutatrice & formatrice, ib. c
Facultates naturales quæ habeant instrumē-
ta, 1. 78 b
Facultas videndi, 1. 275 a. audiendi, ibid. odo-
randi, ib. b. gustandi, ib. c. tangendi, ibid. d.
mouens, ib. e. princeps, facti, ix, practica fa-
cultas, ib. c. imaginatrix, ibid. e. f. ratioci-
natrix, 1. 76 b. memoratrix, ibid. b. c. prin-
cipum facultatum sedes, 1. 75 c
Facultatis principis actiones, imaginatio, ra-
tiocinatio, memoria, 1. 80 a
Facultatis sensitiuæ actiones, 1. 79 c
Facultatis motricis actio, 1. 79 c
Facultates a partibus cur nominatæ, 2. 102 d
Fex æris, 2. 59 b
Fames diutius tolerata ventriculū prauis hu-
moribus implet, 1. 97 d
Fames Thuringica memorabilis, 1. 52 c
Famem facile ferunt pituitosi, 3. 178 b
Farinæ vires, 1. 37 d
Fasciæ, 1. 208 d
Fasciculus, 2. 125 c
Fasciæ cur cruciatæ aspiciantur, 3. 290 a
Fauces, 1. 194 c
Fauces, 1. 64 c. earum glandulæ, ibid.
Faucium nominæ quid intelligatur, 3. 79 f
Faucium glandulæ, vide Glandulæ.
Fauus quid, 3. 7 c. eius curatio, 3. 8 a. & 3. 9 b
Febris quid, 1. 188 c. eorum differentia, ibid.
diaria simpliciter, ibid. d. plurium dierum,
ib. Synochus non putrida, & putrida, ib. c.
f. continens, non putrida, putrida, 1. 189 a.
continua, ib. c. continuæ idem genus cum
intermittentibus obtingit, ibid. c. conti-
nuarum & intermittentium differentia, 1.
190 a. interpolata, 1. 190 a. deficiens, ibid. a.
tertiana exquisita, 1. 90 a. spuria, ib. a. quo-
tidiana exquisita, ib. b. Hepiala, ib. b. He-
pialos cur dicta, ibid. c. quintana, sextana,
septimana, noviana, ib. pestilentialis, 1. 190
d. ardens, perniciofa, 1. 191 d. lipiria, ib. c. ty-
phodes, ib. d. cæci, gemina, ibid. typica fe-
bres, erraticæ, hectica, 1. 193 b. c. februm
compositarum ratio, complicatio, confu-
sio, ib. d. e. tertianæ & quotidianæ compli-
cationes, ib. c. semitertiana, ib. e
Febris ardens, 3. 188 a. causa, ib. eius a tertia-
na differentia, ib. b. signa, ib. curatio, ib. c
Febris exquisita tertiana intermittens, 3. 189
b. causa, ibid. c. cur exquisita tertiana di-
cta, ib. signa, ib. tertianæ rigor quo distet a
rigore quartanæ, 3. 189 c. duplices tertianæ
horæ, ib. f. in eius accessione haud dormi-
endum, 3. 190 d. curatio, ib. e. tertianæ no-
thæ signa, 3. 192 b. causa, ibid. curatio, ib. d.
quartanæ causa, 3. 193 c. signa, ib. quare in
quartana longiores cessationes, 3. 193 d. cu-
ratio, ib. e. quotidiana, 3. 195 c. causa, ib. fe-
bris hepialos, 3. 196 c. signa, ib. d. Hectica quid
3. 196 vnde sic dicta, ib. c. marasmus, ib. d. si-
gna, ib. e. curatio, 3. 197 a. hemitritæus quid
3. 198 b. causa signa, ib. c. d. exquisitus, ib. c.
non exquisitus, ib. curatio, ib.
Febris synochus putrida, 3. 184 b. putrida seu
cōtinens, duplex putrida, nō putrida, ib. b.
c. synochorū tres differentia, ib. c. causa,
ibid. d. signa, ibid. c. curatio, ib. sanguinis
missio ad animi deliquium, 3. 184 f. frigida
quando exhibenda, 3. 185 a. continentium
februm duo maxima remedia, 3. 186 a. ca-
laborantes quando alendi, 3. 186 b. c.
Febris continua, 3. 186 c. continens & con-
tinua differentia, 3. 186 c. in quo conueniat,
ib. c. d. causa, ib. d. continuarum tres diffe-
rentia, ib. d. febris ardens seu causus, ib. d.
continua eiusdem generis cum intermit-
tentibus, ib. d. e. continuarum & intermit-
tentium differentia, 3. 186 c. signa, f. curatio
nis methodus, 3. 187 a. quinque sunt res a
quibus in febribus continuis indicationes
colliguntur, 3. 187 b. c

Febris diaria ob vigiliam, lassitudinem, curas
& merores, iracundiam, animi perturbati-
onē, tristitiam, 3. 180 a. b. c. d. e. ob timo-
rem, uisionem solis, lassitudinem, temule-
tiam, famem, bubonium seu adenum tu-
morem, 3. 181 a. b. diaria plurium dierum, 3.
183 a. synochus non putrida, ib. b. causa, si-
gna, curatio, ib. b. c. d
Febris ephemera quid, 3. 179 d. e. diaria sim-
plicissima, ib. diaria duplex, ib. diaria sim-
pliciter, ibid. e. diaria plurium dierum cur-
diurna dicta, ib. e. f
Februm simplicium tria genera, 1. 488 b
Febres ut differant, 1. 189 c. in quo conue-
niant, ibid.
Febres laboriosæ, 1. 151 f
Febris tertiana refrigeranda, 4. 385
Febris tertianæ duplex indicatio, 4. 387
Febricitantibus balnea conducunt, 4. 388
Febricitantibus Diaria conducit balneū, ib.
Febricitantes quando lauandi, ibid.
Febribus putridis balneum conducit, ibid.
Febribus intermittens conducit balneū,
4. 389
Febri tertianæ nothæ vtile balneum, ibid.
Febri quartanæ vtile balneum, ibid.
Febri hecticae prodest balneum, ibid.
Febri tertiana correpti non immodice pur-
gandi, 4. 385
Femur, 1. 48 e. Femur, 1. 336 a
Femur mouentes musculi, 1. 383 c. f. eorum
munus, 1. 384 c. f. femur mouentes quot
constitui possint, 1. 385 f
Femoris ligamentum ad coxendicis os, 1. 392 a
Ferrum in aqua extinctum, lenem indura-
rum curat, 3. 135 a
Ferulæ quando in fractura circumponendæ,
13. 187 c. modus ac ratio eas adhibendi, 3.
237 c
Ferulæ, quando in fractura cum vulnere ad-
hibendæ, 3. 291 a
Ficus, 1. 280 f. Fibula, 1. 338 a
Fibula, 1. 49 a
Fidei instrumenta, 4. 299
Fistula quid, 3. 279 a. curatio, ib. d
Fibula cum telo articulatoria, 1. 339 b. per ipsius
longitudinem figura triangulari, 1. 339 c
Fibulæ ad tibiam os nexus, 1. 338 d. ubi fibulæ a
tibiam osse distat, ib. e
Figulus luteus, 2. 25 f
Figura partium quid indicet, 1. 273 b
Figura partium indecens, 1. 181 c
Figura capitis naturalis, 1. 45 b
Figura recti sima quæ, 3. 287 b
Filipendula, 2. 29 d. Filix, 2. 28 c
Finis, 1. 50 c. Finis quid, 1. 265 b
Fistula, 1. 215 c. Flatus discurientia, 3. 121 e
Flaua bilis non crassior reddenda ante vacua-
tionem, 4. 389
Flos salis, 2. 67 b. Flos æris, 2. 55 c
Flos casii, vide Casii. Flos maris, 2. 67 c
Flores quando decerpendi, 2. 75 c
Flores quomodo recondendi & asseruandi,
2. 77 a
Fluor muliebris, 1. 210 c. d. Fluor quid, 1. 14 d
Fluor vrens, vide Vterus.
Fluxionum diuersitas, 2. 168 f
Focile maius & minus, 1. 326 f
Fœniculum, p. 2. 9. b. Fœniculi semen, 2. 18 a
Fœni græci semen, 2. 18 a
Fœni græci succus ut parandus, 3. 57 b
Fœoris crasis causa, 3. 75 b. signa, curatio, ib. a
Fœtus prodeuntis naturalis figura, 3. 172 d
Fœtus, vide Meatus. item Arteria.
Fœrum integentes tunicae ures, 1. 442 b. 1. 443
b. & c
Folium Indum, p. 2. 10 b
Folium malabar, p. 2. 10 c. Arabicum, ib. c.
Folia malabarini, 2. 134 b
Folia ga. y. phyllorum, 2. 183 c
Folia succedaneum, 2. 127 d
Foliorum myrti quantitas ad oleum facien-
dum, 2. 234 d

Fomenta 2. 298. vsus ib. Fomentum discuti-
ens in lippitudine ipsius oculis adhibendū
354
Fons acidus ad Gebbingen. 156. ictu 1. 156
fontes Martiaci 1. 156
foramina ossium capitis & maxillæ inferioris
1. 299. odorum & aeris ingressus causa in-
cisa ib. & pag. seqq. 300. & 301. foramen
cœcum 1. 69. foramen secundum par spi-
nalis medullæ transmittens 1. 306
foramina capitis 1. 46
foramina nervis emittendis parata 1. 304
foraminum nervos in latera transmittentiū
ratio 1. 308
forma corporis & partium quæ 1. 180.
formatio quid 1. 81
formæ virtus quid 1. 110
formatrix vide Facultas
formica 3. 223. eius causæ signa & curatio
ibid.
formicæ quibus medicamentis tollatur 3. 224.
fornix 1. 68. **fornix** ib.
fossula 1. 203
fractura 1. 184. **fractura quid** 3. 283. eius diffe-
rentiæ ib. simplices ib. cōpositæ ib. causæ
3. 284. signa ibid. curatio ib. fractura per-
transversuræ quomodo curanda 3. 284. ossa
fracta reducendi modus 3. 285. immodera-
ta distinctio cauenda ibid. æger quomodo
collocandus ib. distinctio quando remit-
tenda ib. ossium existantiæ haud frangen-
dæ 3. 285. notæ ossis fracti & sua sede mori
ib. deligaturæ modus 3. 286. splenia cur ad-
hibenda 3. 286. repositionis fractorum a-
pissima figura 3. 287. ferulæ quando in fra-
cturis circumponendæ 3. 287. fracturæ cur
diu interdum sine collo permaneant 3. 289.
ferulæ quando in fracturæ vulnere ad-
hibendæ 3. 291. fracturarum in longitudi-
ne curatio 3. 291
fragaria 2. 246
Francisci Alexandri reprehensio repulsa 2. 122
Francisci Vallerioli de coryce opinio falsa
relicta & explosa 1. 102
fraxini cortex 2. 45
frictio medicamentorum quid 2. 81
Frictio præparatoria 1. 106. eius differentiæ ib.
dura, mollis, mediocris 1. 106. multa, pau-
ca, mediocris ib. frictio apothecarum qua-
lis esse debeat 1. 108. mediocris ut perfici-
da 1. 108
Friderici Fuchsii liber contra Scheggium de
causa morbi conius & 4. 368
frigida quando exhibenda 3. 185. eius incom-
moda ib. quibus non exhibenda ib.
frigida quando exhibenda 3. 189
frigida nervis non adhibenda 3. 262
frigidi effectus 1. 179
frons cur voluntario motu prædita 1. 352. fi-
ris musculorum substantia ib. frontis fi-
brarum series 1. 353. in fronte sectiones
transversæ non tentandæ ib. frontis cuius
cur depilis 1. 353
fructus quando decerpendi 2. 75. quid 2. 20.
Fuchsius candide errorem revocat 2. 74
Fuchsius ab Argenterii reprehensione assertus
1. 201
fuscus vide cerussa.
fumaria 2. 9
functionum nobilitas quid indicet 1. 272
functionum noxæ 1. 187. animalium sensilium
morticum principum actionum natura-
lium ib.
fungus marinus 2. 74
furcula superior 1. 318.
furfures 1. 194
futor exoticus seu protrepticus 1. 202
futor 1. 80

G.

Gagates 2. 72. 2. 155
Galanga minor 2. 28. maior 2. 25
Galaxæ circulus vnde 4. 314

Galbanum 2. 33 **Galea** 1. 287
Galenus anatomiz peritissimus 4. 417. non se-
cat oppositam venam in pleuride 4. 378.
de terra Lemnia 4. 361. cur in Lemnum na-
vigavit 4. 296. Galeni Carpesia 4. 341. gale-
nus non est auctor libri de descriptionibus
in scripti 4. 366. non est auctor Introductio-
rii ib. Medicorum Coryphæus ibid. Galeni
vetus translatio qualis 4. 323. Galenus e di-
rectio vbi venam fecerit 4. 373. defensus 4.
306. Galenus novit mannam Arabicam 4.
304.
Galenus exploravit Dioscoridis dogmata 4.
299
Galenus ventriculos cordis recte intellexit 4.
307
Galenus locus explicatus 4. 376.
**Galenus in componendis medicamentis imi-
tandus** 1. 11. ab iniuria Argentarii defensus
1. 197. 1. 198. 1. 199. Galenus simiarū & canu
historia descripsit 1. 279. Galenus ab iniu-
ria vindicatus 1. 267. Galenus relinquitur a
Fuchsio alicubi 1. 284
Galenus a pugnantia vindicatur 1. 42
Galenus cur de spiritu naturali dubitabundus
loquatur 1. 89
Galenus de euen. san. accurate legendus 1.
106. ab insania vindicatur 1. 277
Galenus a pugnantia vindicatus 2. 3
Galenus ab iniuria assertus 3. 47
**Galenus non cit auctor Græcorum succeda-
neorum** 2. 15 a Cornarii calumnia defensus
2. 13. Galenus non tantum qualitatem, se-
& substantias morbos appellavit 1. 176. locus
emendatus 1. 91. Galeni laudes 1. 3. Galenus
a Deo excitatus 1. 3. Galeni locus emenda-
tus 1. 184. galeni locus explicatus 33. gale-
ni difficultas locus emendatus 1. 292. ab iniu-
ria vindicatus 1. 292. sententia de spiritibus
1. 85. Galenus de spiritu naturali cur dubita-
uerit 1. 85. Galeni sententia de influentibus
spiritibus, vitali & animali 1. 86. galeni lo-
cus enarratus 1. 146. loci conciliati 1. 196
galenus ab Argenterii reprehensione ad-
tertus 1. 196.
Galenus locus emendatus 2. 64 aduersarii con-
futantur 2. 108
Galenus locus enarratus 1. 399. Galeni locus re-
sistutus 2. 127. Galeni codex græcus emen-
datus 2. 61. galeni locus enarratus 1. 219
Galenus locus enarratus 1. 173
Galenus locus enarratus 1. 201
Galenus in compositionibus medicamentorum
qui adiungendi 2. 21
galcopsis 2. 30. maior, minor ib.
Galla 2. 21.
gallæ vires 1. 17
gallicus morbus vide Morbus
gallicus morbus quando coeperit 4. 403
gallicus morbus cur dictus ib.
gallicus morbus cur Neapolitanus dictus ib.
gangræna 1. 212
gangareon 1. 452. nomina ib. substantia situs
forma, vasa, vsus 1. 452
gangræna quid 3. 218. eius causæ, signa, cura-
tio ib.
gangræna signa 3. 254
gargarismi compositio 2. 284. pondus ib. vsus
ib.
gargarismata 2. 2
garyophyllatæ radix 2. 28
gaudium subito mortem intulit 1. 165
guaiacum 2. 46
In guaiaci vsu quando cœnandum 3. 236
Gemma 2. 68
Genera quatuor siccitatum 1. 41
Generatio quatuor secundorum humorum
41.
Generatrix vide Facultas.
Genista semen 2. 18
Genista flos 2. 14
Genitale cervi 2. 49

Genitalium vicia 1. 209
gentiana 2. 146
gentianæ radix 2. 28
gentilis error de theriaca 1. 47
Georgius Tansfetter 4. 353
Georgius Ellingerus 4. 303
Germani liberalius citandi 3. 236
**Germanorum a venæ sectione mors detestabi-
lus** 2. 135
Gestatio 1. 105
gestationis vsus 1. 105
gingidium 2. 9
gingiber 2. 31
Gith 2. 18
Githia 2. 282
Githia 2. 283
gonorrhæa 1. 210
gossipium 2. 21
gossipii semen 2. 173
Glanis 1. 65. **Glanis vnguentaria** 2. 20. 2. 21
Glanis 2. 281. cur subicienda ib. glandium
vsus, & differentiæ ib. mellis ad species & sa-
lem proportio ib. glandes leues, mediocres
rationes, vehementiores ib. deiciens alui
ib. discutiens flatus ib. stupefaciens ib.
Glandis pituitam excipientis historia 1. 483.
eius figura ib. substantia ib. canales ab ea
deducti ib. vsus & constructionis ratio ib.
Glandes 2. 21
**glandosum corpus vasorum semen deferenti-
um in sectionem excipiens** 1. 433. eorum v-
sus 1. 434.
glandulæ faucium 2. 452. triplex earum generis
1. 452. **glandula** 1. 68
glesum 4. 325
glestaria ibid.
glaucias 1. 15. **glaucium** 2. 34
glaucoma 1. 203
gloritis quid 4. 438
gluten 1. 41. piscinum quid 2. 256
gluten tragacanthæ 2. 226
glutinantia 2. 105. 3. 147
glutinatorium 3. 252
gly. yrrhiza 2. 28. **glycyrrhizæ succus** 1. 33
Græci bibacissimi 4. 377
Grana solis 2. 182
granatorum cortex 2. 45
Granatus 2. 69
Granum Tinctorum 2. 17. **Granum Ben** 2. 21
Granum Paradisi 2. 16. **guidium** 2. 17
gradus quid 3. 99. primus, secundus, tertius,
quartus ib.
Grauedo 2. 202. capitis 3. 70
Guaiacum optimum quod 3. 235. eius vsus ib.
præparatio ib. spumæ decocti vsus ib. aqua
medicata ibid. decoctum tenue ibid. vius
medicati decocti ib.
Gula 1. 58. gula an habeat musculos morui
deglutitionis feruientes 4. 432. 4. 435
gulæ stomachicæ ardor 1. 207
gummi quid 2. 43
gummi h. deræ officinarum non est legitimum
2. 41
gummi hederæ 2. 154
gummi quomodo asseruandum 2. 77
Gummi Thebaicum. Babylonicum 2. 43
gummi amygdalarum, cerasi, iuniperi 2. 43
gummi elemi 2. 47
gummi prunorum 2. 44
gummi cedri 2. 136
Gummi iuniperi 4. 344
gummi quomodo colligatur 2. 76. & 2. 77
gurgulior 65
gustandi facultas, vide facultas.
Gustus quid 1. 79
Gustus instrumentum 1. 69
Gutta hammoniaca 2. 34
Guttur 1. 64
Gymnasium quid 1. 105
Gypsea 1. 39
Gypsum 2. 59

H.

Hemagoga antidotus 2. 138 a. cur ita di-
 Hæmorrhoides, 2 70 a (sta 2. 139)
 Hæmorrhoides e caua ortæ, 1 420 d. e
 Hæmorrhoides 1. 139 a. earum ortus. ib. b. cō-
 moditas ib. non temere suppressendæ. ibi.
 c. caudam ne immodice prominent. i.
 bid. d
 Hæmorrhoides cæcæ, 3 125 e. apertæ. ib. causæ
 signa, ib. cæcæ curatio. ibid. Hæmor-
 rhoides apertæ, 3 126 a. apertarum fluē-
 tiumque curatio, ib. b. c
 Hæmorrhoides 1. 208 c. apertæ. ib. e. portæ ve-
 na ortæ. 1 412 e
 Hæmorrhoidum indicia 1. 229 e
 Hali 2 193 c
 Halicacabi semen. 1. 18 b
 Halicacabus. p. 2 9 b
 Halinitrum. 2 61 b
 Halmirag. 2 60 e
 Hameth 2 186 f
 Hammoniacum thymiana. 2 34 a
 Harmel. 2 11 d. 2. 19 d. Arabicū an sic cicutā, 4.
 378 ruta sylvestris, ib.
 Harmonia quatuor. 1. 166 d
 Harpastum 1. 104 d
 Haurus Romana. 4 324
 Haussen blasen 2 256 d
 Hederæ lacrymæ. 2. 40 e
 Hederichron vnde dicta. 4 338
 Hederæ ceymon falsum. 4 319
 Hedyotis. p. 2 9 c
 Heli 2 166 c. 2. 167 d
 Helenium. 2 142 a. 2 28 f
 Helix in auricula muris 4 331 duæ 4 31 p.
 Hemierania 1 194 f 3 9 c
 Hemiplegia. 1 20 c 3 35 a
 Hemitritæus. vide Febus
 Hepatica. p. 2 10 a
 Hepatici qui. 3 128 a
 Hephaistus. 4 361
 Herba vt reponendæ. 2 76 f. quando collige-
 dz. 2 75 a
 Herba Kuncgundis. p. 1 9 ibid. S. Mariz. 2 246
 b. crassala 2 236 c. ventri. 2 251 c. 2 246 a. p.
 ralyss. 2 13 c. moschata. 2 246 f. S. Petre. 2.
 246 b. capuræ 2 247 a
 Herbarum tormæ, an melius verbis, quam pi-
 cturis exprimantur. 4 307
 Herbis noſcendis an oblit ſoli mutatio. ib.
 Herbas male piungit Arabes. 4 309,
 Hermodactyli radix. 2 28 f
 Hermodactylus. 2 26 c
 Hermodactylum infirmitas. 2. 122 b. eius
 pōdus. ib. Pauli 2 122 a Nicolai. 2 129 b. duo
 genera. 2 127 a albus & purpureus postero-
 rum. Græcorum. 2 26 c
 Hermolai Barbari & Volaterrani error. 1 101 e
 Hernia, 3 138 b. eius causæ, ib. c signa ibi. era-
 micis intestinorum & inguinum curatio 3.
 139 a aquosæ curatio 3 139 d
 Herophilus. 1. 15 d. subtilitatis ac garrulitatis
 stud. osus 1 6 c
 Herpes 1. 211 a exedens, ibi. b. Herpes quid, 3.
 215 b. exedens herpes ib. c. miliaris ib. causæ
 signa, ib. curandi ratio ib.
 Hiera ex matrubio. 2 179 e veterum simplex 2
 177 f. Galeni 2. 178 c hiera cum agarico, 2.
 178 d. composita Nicolai Myrephi, 2. 178 d.
 logadii Nic. Myrephi. ib. e. ex colocynthide
 Myrephi. 2. 180 a. magna Galeni. ib. b. Pac-
 chii Scribonii largi. 1 179 c. simplex, 177 f.
 vnde dicta picra. 2 178 a non a Galeno in-
 uentæ, ib. a. picræ facultas, 3 100 c
 Hippocras. 3 92 b 2 147 e
 Hippocratis locus enarratus, 1 192 d. medici-
 nam apud Græcos primis in artem rede-
 git, 3 115 d. verba cataixin. 4 373 locus
 expenditur. 4 380 quæ elementa inquirat,
 1 16 f.
 Hippocystis 2 34 b.
 Hippoceleni semine falso Pharmacopos pro
 Petro felino Macedonico vti, 2 18 a

Hippocelinum, 2 209 d. 2. 171 f
 Hirudines quem sanguinem eliciant, 1 137 c.
 quando detrahendæ 1 137 c
 Historia quid, 1 14 a
 Homo cur pluribus ossibus constet, 1 286 b
 Honores Medicis olim decreti 1 4 c
 Homotimos quid significat, 4 369
 Horminum, 2 119 c
 Hordeum mundatum, 2 414 b
 Hordei semen, 2 18 b
 Hubertus Barlandus, 4 376
 Humanitas quid, 1 80 e
 Humectatio quid, 2 87 b
 Humectantia primo, secundo, tertio, quarto
 ordine, 2 100 a b
 Humectantium quatuor ordines, 2 99 a
 Humerus, 4 47 f. eius rotula, ib.
 Humeri os, 1 324 f. Eius pars superior, ib. infe-
 rior, 1 325 c. inferioris humeri capita, 1 376
 a humeri partes mediæ, ib. c
 Humidum radicale, 1 41 e
 Humor crudus, 1 39 b dulcis ibi. melancholi-
 cus quos efficiat, 1 38 d. infusus, 1 42 c. alimē-
 tarius, 1 42 c. primogenitus & natiuus, 1 41 c
 Humores crudi qui 1 44 c. quatuor, 1 34 f. esse
 æqualiter auctos puid, 2 118 d. oculi tres, vi-
 de Oculi
 Humoris melancholici vsus, 1 38 e
 Humores quomodo calidi, frigidi humidi, &
 sicci dicantur, 1 35 d. secundarii rectius si-
 militarium partium humores appellarentur
 1 41 b. naturales qui, 1 36 b. in phlegmoni-
 bus recte fluunt, 4 375
 Humor vitzæ cur vsque ad partem conseruetur,
 4 426 tenuis nō est vacuationi ineptus
 4 390
 Humores crudi non purgandi, 1 143 e bifari-
 am putrescent, 1 189 a
 Humorum quatuor motus de Sorani senten-
 tia, 1 38 d. quatuor procreatio & secretio, 1.
 32 c
 Hyacinthus, 2 70 6
 Hydrargyrus 2 59 d.
 Hydrocele 3 158 c
 Hydromelion 2 207 a
 Hydromelum simplex, 2 307
 Hydrophobia, 3 218 a 3 258 d
 Hydrops, 1 209 b
 Hymis victus debet esse vberior, 1 98 c. & cur
 ibid. Himen quid, 1 420 f
 Hyoscyamus simpliciter elatus, 2 127 a. p. 2 9 c
 Hyoscyami semen, 2 18 b
 Hyperfarcoſis, 3 168 c
 Hypochondria 1 47 c. 316 c
 Hyssopum, p. 2 9 c humida, 2 54 a

I.
Iacobi de partibus canillatio, 1 298
 Ianitor, 1 58 d
 Iaspis, 2 70 c. 2 146 c. Turcica 2 70 c
 Idem & simile differunt, 4 336
 Idiopathia, 1 167 c
 Icterus, 1 209 a. 3 136 a. causa, signa ib. c. cura-
 tio iſterus indicationis ratione accidentis
 ib. c. ex mortu virulentorum, ob intempe-
 riam & phlegmonem iocineris. ab obſtru-
 ctione, eorumque curatio, ib. e. f.
 Iecur, 1 59 b. eius fibræ. ib. d. 1 408 eius situs no-
 mina ib. forma. ib. d. fibras num habeat, 1.
 409 b. Iecoris lobi, ib. magnitudo, ibi. sub-
 stantia ib. Parergima, ib. ligamenta connex-
 us, ib. d. nerui, ib. c. arteria, ib. f. Venæ 1 410
 a. firmantia, 2 102 b. generationis sanguinis
 officina, 1 36 d. lupinum, 3 129 c. eius facul-
 tates, ib. canis rabidi, caprinum, lupinum,
 2 49 e. lupi præparatio, 2 93 a. inflammā-
 tione laborante nihil actū frigidum adhi-
 bendum, 3 131 f. phlegmone si ad suppura-
 tionem tendat quid faciendum, 3 132 b. in-
 temperici calidæ, frigidæ, siccæ, humidæ si-
 gna 3 128 a. b. curatio, ib. c. Calidæ intēpe-
 ricæ curatio, ibid. c. frigidæ curatio, 3 129 a
 humidæ curatio, 3 129 & siccæ curatio, ibi.
 Iecori robur addentia 3 140 d

Iecinorosi 1 209 a
 Ieiunum, 1 58 c. f. plura habet vasa, quam ile-
 on, 4 420
 Ieiuni rectitudo 4 419
 Ieiunum 1 399 b. eius nomina. ib. ratio nomi-
 nis & situs ib. eius venæ & arteria. ibid. c.
 nerui ib. d
 Ignis Persicus, 1 211 d
 Ilcos, 1 400 b. 3 122 c. vide Iliaca passio. vnde
 dictus 4 404
 Ilium os 1 334 b. ossis appendix. 2 334 c. spina,
 dorsum, ib. c. f.
 Ilii ossis sedes, sacro ossi cōmissa qualis, 1 334.
 c. ossis pars retrorsum magis, quā sacri ossis
 tranſuerſi processus exporrecti, 1 334 c. pas-
 sio, 3 122 c. eius causæ, ib. quibus malū hoc
 familiare sit, 3 121 d. signa, ib. curatio ibi. e
 si a cruditatibus acciderit, ib. c. f. si ex vene-
 nato medicamento, 3 123 c. si ab inflam-
 matione ib. si ex delapsu intestini in ſto-
 machum, ib. d. os. 1 48 e
 Illisio 1 184 c
 Imaginatio quid, 1 80 a
 Imbecillitas iecinoris vide Iecinoris
 Immutatio quid 1 80 f
 Immutatrix vide Facultas imperfecta quæ,
 3 159 c
 Impages, 3 245 f
 Impetigo 3 219 c
 Impotentia rei Veneræ causæ, 3 157 c. victus
 ibid.
 Incrementa medicinæ Asclepiadæ, 1 3 b
 Incubus, 1 201 c. quid 3 47 c. eius causæ, signa,
 curatio, ib. d. & e
 Indicatio quid, 1 264 b. vnde dicta ibi. c. quid
 1 13 b. quid 1 267 c. a virib. petita omnium
 prima 1 20 d. simplex prima, 1 265 c. secū-
 da ib. d. tertia ib. f. particulares quæ & quot
 1 269 d. venire quid, 1 264 f
 Indicia quibus totius corporis & partium e-
 iusdem temperamenti cognoscuntur, 1 29
 e. Qualitates secundæ quæ, 1 29 f. quid 1 216 c
 Inflatio, 1 213 e. vter. 3 63 c. vide vterus. ex
 spiritu venenato, 3 217 b. quid 3 226 b. ea-
 rum ab ordemate differentia, ib. b. causæ,
 signa curatio. ib. c. d
 Infixa quomodo extrahenda, 3 241 c. ea ex-
 trahentia, ib. c
 Infundibulum, 1 68 c
 Infusio quid, 1 252 a
 Intemperies iccoris, vide Iecoris
 Inflammatio vide Phlegmone.
 Inguinum cavitatem glandulæ explent. 1 421
 c. f. Inſeſſiones vide Inſeſſus.
 Inſeſſus, 2 299 d. eius vsus ib. ad calculosos, ib.
 e. ad menses constrictos, ibid. c. constrin-
 gēs, ib. f
 Infomnia cur medico expendenda, 1 114 b. vi-
 de Somnia.
 Infomniorum quorundam interpretationes,
 1 114 c. d
 Inſitæ, 1 208 d
 Instrumenta duo fidei. 4 300
 Instrumenta telis atque infixis aliis rebus ex-
 trahendi idonea & necessaria. 3 236 c. duo
 ad res inueniendas necessaria, 1 52 a
 Instrumentum auditus, 1 45 d. quid 1 43 e
 Instrumentorum naturalium & animalium
 differentia, 1 84 b. c
 Intemperatum quid, 1 22 b
 Intēperies quid, 1 177 b. duplex ibi. c. salubris
 ib. c. morboſa, ibid. octo 1 22 d. Lienis vide
 Lien inæquales dolore secum inducunt,
 1 178 c. æqualis cur nullo dolore afficiatur,
 1 178 c. morboſæ nudæ qualitates, 1 177 c. eū
 affluxu morborum, ib. c
 Intentio quid, 1 265 a
 Intercisio, 1 184 c
 Intersceminum, 1 422 b. i. 63 c. d.
 Interpassare, 2 295 e
 Interpretum Galeni error, 2 114 c. Galeni no-
 tantur. 1 186 d. Galeni error, 1 49 b.
 Intertrigines, 1 215 d

Intestina cibum concoquunt 1.83 a. 1.38 d e, intestinorum laeior 3.115 c, intestini recti musculi 1.83 a, intestina terræ 2.49 f, intestinorum tenuium & crassorum exulceratorum notæ 3.117 a b, crassiorum curatio, 3.118 b, tenuium curatio 3.118 d, extrinsecus quæ adhibenda ib. intestini lupi præparatio 2.93 d, intestinorum vitia 1.207 f, nomen quid complectatur 1.397 b, eorum substantia ib. tunica ib. fibrae ib. c, figura ib. d Venarum arteriarumque ratio ib. d, nervorum ratio ib. e, intestinorum caua pars ib. e, intestina duplicia ib. f, tenuium vsus 1.398 a, orbiū & anfractuū intestinorum vius ib. c, crassiorum vsus ib. d, intestinum lupinum 2.49 e f

Introductorii seu Medici auctor quis fuerit 1.7 b

Intybum 2.177 b, 2.9 c, 2.148 c, intybus 2.144 a, intybum 2.180 c, angustifolium 2.175 c, fatuum duplex 3.14 c, intybilemen 2.18 b

Ioulae radix 2.28 f

Inuidentia quid 1.80 d

Iocinoris imbecillitas 3.117 f, causæ ib. phlegmone 3.130 e, causæ, notæ ibid. simarum partium iecoris inflammationis signa, gibbarum 3.131 a, obstructio 3.129, causæ ib. notæ ib. curatio 3.130 b, simplicitas iocinoris obstructionem tollentia ib.

Ioannes Agricola 2.168 a, Ioan. Baptista Mōtani laus 2.117 c, Ioan. Damascenus 2.135 b, Ioannitus Monachus 4.361, Ioannis Guinterii error 4.336, Ioannes Manardus 4.303,

Iofacehar 2.199 c, Ira quid 1.80 d, ira 1.164 c, quid ib. f, iracundia quid 1.80 d

Irafcibilis 1.80 b

Iris 1.486 c, 1.171 c, illyrica 2.131 e f, iridis illirica radix 2.28 f

Isatis domestica 4.133, eius vires ibid. ignota Aulicæ 4.333, pandectario incognita 4.334, non est sanaria ibid.

Ischias 1.210 f, 3.174 b, eius causæ, ib. c, signa ib. curatio ib. d, ischiadici 3.174 b

Ischimos 1.205 c

Ischuria 1.209 e 3.154 c. Eius causæ ib. signa, ib. d, curatio ib. f, si p. opter imbecillitatem vesicæ fiat ibid. si ob crallos & lentos humores 3.157 a, si a lapide aut grumis ib. b, si propter tumores præter naturam ibid. b, si propter carunculam aut callum ib. si propter obstructum vesicæ lentum ibid. si in lanis retenta fuerit ib. c

Isuris 1.282 a a

Iudicium quid 1.221 a, varie ab auctoribus usurpatum ib. turbantia, tam externa quam interna 1.230 e f, morbi quale futurum sit, 1.227 a, absolutum, perfectumue, imperfectum, fidum, firmum, certum, infidum 1.222 e f, periculosum, certum, securum, manifestum, euidens, obscurum, indicatum, non indicatum, bonum, malum, salutare, lethale 1.223, boni iam instantis notæ ac indicia 1.224 a, optimum certe prænoticiatur 1.224, in iudiciorum optimorum cognitione primum Medicum exercitari cōuenit 1.225, a iudicii boni præcipua signa quatuor 1.223, d iudicium futurum, quibus notis prænotandum 1.225, iudicii mali cognitio incerta & instabilis, 1.225, a iudicia optima quando fiant, & quando mala 1.225 c

Iuglandes conditæ 2.202

Iugulum 1.318 d 1.47, d

Iurubæ 2.23, d non purificant sanguinem 4.334 iurubæ ib. fructus inuiles ib.

Iulebum 2.204, 2.208, 2.276, e f, iulebirosacei parandi varii modi 2.205, iulebum clarum & purgatum 2.211, iulebi parandi modi 2.205 a

Iuncus odoratus 2.168, odoratus 2.9 d

Iunci odorati flore caremus 4.360

Iunci odorati cacumina 2.168 f

Iunci odorati flores 2.15 a

Iuneus odoratus 2.132, f

Iuniperi grana 2.20 b

Iustitia quid 1.21 f

Iuquiam semen 2.18,

Iuuenibus vinum non conuenit 1.99, cur pau ci iuuenes hodie ad frugem perueniant 1.99 d

K.

Karmes 2.17,

Kirat 2.125 d

Kist quid 2.239 f

L.

Labiorum substantia 1.353, eorum musculi quatuor ib. vius ibid. & 356

Laborantis loci natura quid indicet 1.271 f,

Lacha 2.39 d e, triplex ib.

Laccha 2.136, lora 2.168, infectorum 2.169, a

Laccha triplex ib. lachæ lotio 2.91,

Lac 2.54, generantia 2.106, in mammis quidam vii habent 1.445, in grumos conuersum 1.98

Lactis redundancia 3.97, eausa, signa, curatio ib. Empiastrium ceratum 3.98, victus ibid.

Lactis cum silicibus decocti vsus 3.114, crumescencia 1.207, defectus 3.97, eius causæ, signa ibid. eius a sicca intemperie curatio

ib. a sanguinis paucitate ib. b, a sanguinis malignitate ib. curatio ibid. lactis in grumos conuersi causæ, signa, curatio 3.98, & 99, lactis serum 2.54, lactes 1.400 c, 1.58 f,

lactes mesenterium putantium error 1.400

Lacryma quid 2.39, lacryma lodoci 2.18,

Lacrymæ quomodo excipienda 2.76

Lactuca 2.251 f, 2.9, lactuca semen 2.18

Lacuna 1.67,

Lada quid 4.319, & 320

Ladanum vnde colligatur 4.320, barbaredici ib. non ex hedera ibid. ex lada ib. quid 3.4 b, 2.34 d

Lactificans Galeni 2.166, Rhafis 2.167

Læritia quid 1.80

Lamina plumbea 3.157, laminæ cupri 2.55,

lanæ vires in sistendo sanguine 2.137

Lapathum acutum 2.20,

lapathum 2.251, 2.9 f, 2.246 c

lapathi, lapathi radix 2.29

Lapis ærolus 2.56, lycis 2.70, lapis stellatus vide Cyaneus, lapis velicæ apri 2.154, Eius succedaneum ibid. lycis 2.251, cyaneus non corrigitur omnino abiurione 4.312

lapis armenius quomodo purget bilem atram ib. lapis lazuli 4.312, & 313, armenius 4.312, cyaneus 4.313, cœruleus 4.312, cyaneus non purgat bilem atram 4.313, armenius vnde dictus 4.312, armenius non est lapis cyaneus ib. lazuli vires ibid. in velicæ morbus est 4.366,

lapis velicæ non est causa morbi ibid.

Lapis lycis 2.254, eius succedaneum 2.154

Lapis cyaneus 2.69, lapis specularis 2.69,

lapis armenius 2.69, alius ibid.

Lapis iudaicus 2.70, Syriacus 2.70,

Lapis Heraclius 2.70, Phrygius 2.70, cœruleus 2.69, lazuli 2.69, stellatus ib. estque duplex narius & factus ib.

lapides in vesica atterentia 3.149,

lapidum renalium differentia 3.144

lapis vide calculus.

Lappa maior p. 2.11,

larynx cur pharynx dicta,

laryngis operculum 1.450, cartilaginum eius forma ib. laryngis vius 1.451, operculi eius vsus ib. cartilaginum coordinationis vsus, 1.451

laryngis musculi 1.360, proprii duodecim ib.

proprium vsus ibid. communes musculi sex 1.369, operculi laryngis musculi duo 1.361, laryngis ligamenta 1.362,

laserpitium Germanicum 1.173,

laserpitii liquor 1.33,

laserpitii radix 2.29

lathyrus 2.252,

lathyrus 4.320,

lathyrus, vide Cataputia minor.

lathyrus semen 2.18

lauandula 2.12, lauandulae flores 2.15,

Chetiri 2.15

laudanum 2.34,

laureola p. 2.10, laureolæ semen 2.18

Laurus p. 2.9, laurus Alexandrina ib.

laxantia meatus 3.145,

lazuli vide cyaneus.

lemnia rubrica nō est germana 4.362, lemniæ terræ confectio 4.362, lemnia rubrica ibid.

lemnium sigillum 4.361,

lemnium sigillum 2.71,

lens 2.18

lentigo 1.205

Leoniceus laus 4.318,

lenientia 3.54,

lenitatis 1.212,

lepra Arabum 1.212, Græcorum ib.

lepra cur coloris vitium vocatum ab Augustino 4.402,

lepra a Moie descripta ibid.

lepra sanatio miraculum ib.

lepra Græcorum morbus facilis ibid.

lepra Græcorum non est lepra Arabum, ib.

lethargus 1.200, proprius ib. veteranus ibid. generatim ib. simplex, mistus ib.

lethargus quid 3.29, eius causæ, notæ ib. curatio 3.30

leuce 1.212, leuce vide Vitiligo

leuce quid, 4.401

leucoiorum luteorum flores 2.15 a

leucophlegmatia 1.144

leuisticum 2.18,

lex præcipua ægrotorum & sanorum 1.95

libanus 2.148

libelli de nitra ac brabyla confutatio 2.62

liber Galeni de cibis boni & mali succi 1.93

liber de corde non est Hippocratis 1.76

libra medica quatuor quadrantes continet 2.124, libra medica 2.124, duodenaria, Romana, pondo, ib.

libyficum 2.129 f, eius succedaneum 2.130

libyficum 2.18

libyficum 2.172, succedaneum ib.

lichen 2.175

lichen 3.219, vide Impetigo

lichen 1.212

lichen p. 2.19

lichen 2.212

lichen an sit hepatica 4.347

lichena vnde dicta ibid.

lichen lecori non prodest ibid.

lichen cur dicta hepatica 4.349

lichen an morbus Gallicus 4.402

lichen ignora italica ante Cl. 1 yberium ibid.

lichen est impetigo 4.403. quid 4.402

lichenæ papulæ dictæ ib.

licium 2.34

lien 1.62, 1.425, eius situs, forma ibid. color, ib. substantia ibid. magis, v. n. ib. nerui,

tunica: nerui ib. lienis vius ib. lien quomodo alatur 1.83, lienosi 1.209, lien nihil astringit frigidum imponendum 3.134, lienem inuuantia 2.202.

lienis obstructionis causæ 3.135, signa, curatio ibid. intemperies 3.132, causæ, signa, ib. si

gna intemperie nuda qualitatibus lienis ib. frigida, calida ib. sicca, humida 3.133, notæ

intemperie cum fluore substantiæ biliosæ ib. atræ bilis, pituitosæ, sanguinæ ib. curatio

intemperie lienis nuda qualitatibus, calida, frigida, humida, sicca ib. curatio intemperie cum fluore substantiæ ibid. e, lienis

phlegmone 3.133, indicia, curatio ibid. lien quæ imponenda ib. lienis medicamentis valentiora quæ sint 3.134. lienis scirrhus

3.134, causæ, signa, curatio ibid. curatio pituitosi humoris obstructoris 3.134

PPP 6

Lienteria, 3.115 c. r. 208 a
Lienteria cauffa, 3.115 c. figna, ib. d. eximbe-
 cillitate facultatum ventriculi curatio, 3.
 116 a. 2. c. c. attrice inducitur curatio, 3.116 c
Ligamentum quid, 3.50. eius usus, ibid.
Ligamenta, 2.57 d
Ligamenta ossa inuicem cōnectentia, 1. 381 b
Ligamenta genu articuli, 1. 392 b. c. fibulam
 tibiz ossi committentia, 1. 392 d. pedis li-
 gamenta tranfuerfa, ib. d. alia pedis li-
 gamenta ossa tantum committentia, ib. e
Ligamenta facri ossis cum ipfis annexis, 1.
 391 c. f
Ligamenta annulorum modo tendines con-
 nitentia, 1. 380
Ligamenta humeri ad scapulā articuli, 1. 368 d
Ligamentum primam vertebram capiti com-
 mittens, 1. 364 a. secundum vertebram cō-
 mittens, ib. tranfuerfum denti obductū ib.
Ligamentum quid, 1. 347 d. eorum substantia,
 ibid. e. differentia, 1. 348 b. c. d
Ligamenta communia, ib. c
Ligamenta manus, 1. 380 d
Ligamenta vertebrarum corpora cōmitten-
 tia, 1. 368 b. aliis sedibus quam ad corpora
 vertebrarum posita, 1. 366 d
Ligamentorum tranfuerforum usus, 1. 378 a
Ligamenti & nerui permittio, 1. 349 b
Ligare quid, 1. 306 c
Lignum aloes crudum, 1. 155 f
Lignum aloes, 2. 45 c. eius optimi probatio, 2.
 45 e
Ligni guaiaci usus docetur, 3. 235 c
Lignorum in medicina usus, 2. 45 d
Ligula quid, 4. 438. Ligusticum, 2. 28 b
Lilium interpiticas, p. 2. 11 b
Lilium conualidum, 2. 14 b **L**ilii radix, 2. 29 b
Liliorum alborum flores, 2. 15 a
Limaces, 2. 49 d **L**imones, 2. 20 f
Limones conditi, 2. 202 a
Linamentum quid, 3. 245 c eorum usus, ib. e
Linaria, p. 2. 11 b **L**incium quid, 2. 275 d
Linea vitalis, 1. 378 c **L**inea cādidiol, 1. 371 c. f
Lingua minor, 4. 438. & 439
Lingua, 1. 359 a. eius substantia, magnitudo,
 ibid. musculi, figura & numerus musculo-
 rum, ib. b
Lingua auis, 2. 28 c. 2. 152 b
Linguae membrana duplex, 1. 360 a. fibrae, ib.
 ligamenta, ibid. b
Linguae resoluta curatio, 3. 39
Lingula, 1. 362 b. 1. 502 a. 1. 347 b
Linum, 2. 59 a. **L**inilemen, 2. 17 c. 2. 158 c
Linimentum ulceris sordidi, 3. 275 c
Linimentum in oph. 2. 33 c
Linimentum in dolore capitis, 3. 11 c. & 3. 14 a
Linimenta quæ, 2. 293 d. ad resolutos, ib. e. ad
 scabiem & impetiginem, 2. 294 a
Lippitudo quid, 3. 55 d. adnata cur appellata,
 ib. eius cauffa, ib. e. notæ, ib. curatio, 3. 54 a
Lipoptilus quid, 1. 131 b **L**ipyrria, 1. 191 c
Lignatio quid, 2. 87 b **L**iquiritia, 2. 33 f. 2. 28 c
Liquor quid, 2. 32 c
Liquor moschatrus odoratus, 2. 233 c
Liquor papaueris, 2. 131 c
Liquor hippocystidis, 2. 34 b. c
Liquor Cyrenais quis, 2. 33 b
Liquores ut colligendi, 2. 76 d
Liquores stillatini qui, 2. 31. eos eliciendi mo-
 dus optimus, 2. 32 a
Liquoribus stillatinis quando vtendū, quan-
 do non, 2. 32 d
Lithargyrus munita, 3. 252 d
Lithialis, 1. 209 c
Lithontribon Nicolai, 2. 153 c
Litholpermen, 2. 28 c **L**ithospermum, c. 171 f
Litrum, vide Nitrum. **L**obi, 4. 351
Lochi, 2. 203 d **L**ochi, quid, 2. 275 d. e
Lolium p. 2. 10 a
Lotio medicamentorum quid, 2. 82 d
Lotie lachæ, scuræ, ferri, pompholygis, 2. 91.
 c. d. e
Lorus syluestris, p. 2. 20 a **L**uctus, 1. 101 c

Lues Hispanica, 2. 197 c
Lues Venerea, vide Morbus Gallicus.
Lumbi, 1. 45 a
Lumbricorum tria genera, 1. 208 c. necandi,
 lati instite, fasciæ, 1. 208 d
Lumbricorum semen, 2. 19 a
Lumbricorum enecandorum pulueres, 3. 124
 f. vnguenta cerata, 3. 125 a
Lumbrici enecati ut expellendi, 3. 125 c
Lunæ figura octo, 1. 231 f. **L**uparia, 2. 25 e
Lupini semen, 2. 18 c
Lupus salictarius, 2. 144 a
Lupus cicur manet lupus, 4. 345 ?
Lupi quomodo aconito capiuntur, 4. 316
Lupus salictarius, p. 2. 10 b **L**usciosi, 1. 202 d
Luscitiosi, 1. 202 d
Luxatio quid, 3. 291 c. differentia, ib. cauffa,
 ib. a. figna, ib. b. luxatio cum vulnere, 3. 294
 a. luxatio cum fractura, ib. e
Lycantropia, 1. 202 b
Lycopis radix, 2. 20 b **L**yncurium, 2. 251 d
Lyncurium, 2. 70 d. lyncurium veterum, ib.
Lythargyros, 2. 60 a

M.

Macedonicum, 2. 53. c. f. 2. 140 c
Macedonifium, 2. 129 c. 2. 18 a
Maior, 2. 145 c **M**acer, 2. 45 b
Maceratio medicamentorum quid, 2. 81 c
Macis, 2. 45 b
Macula oculi 3. 58. b. eius cauffa, figna, cura-
 tio, ibid.
Madere, vel medere, 2. 38 e
Magistrantia, 2. 29 a
Magma hædygreum, 2. 131 c
Magnes, 2. 70 c
Magnitudo b. fariam æstimatur, 1. 273 d. c.
Magorum commentum, 1. 344 a
Maiorana semen, 2. 18 d
Malabar folium, p. 2. 10 c
Malabathrum Syriacum, p. 2. 10 b
Mala græca, 2. 16 f **M**aliconum, 2. 45 b
Malleolus interior, 1. 359 a. exterior, ib.
Malum puniceum, 2. 21 a
Malum puniceum dulce, 3. 267 c
Malum terræ, 2. 179. f **M**alua, p. 2. 10 b
Malva syluestris, 2. 248 b. 2. 246 d
Malva syluestris flores, 2. 15 a
Malva semen, 2. 18 d **M**ammæ, 2. 64 c
Mammæ phlegmone affecta, 3. 99 a. cauffa,
 figna, curatio, ib. b
Mammillarum numerus æqualis sinui uteri
 numero, 4. 427
Mammillarum cum utero communitas, 1.
 421 c
Mammæ repente extenuatæ abor ū gainan-
 tur, 1. 421 c
Mammillarum situs, 1. 444 a. forma, substan-
 tia, ib. b. venarum eas penitium series, ib.
 e. earum cum vtero convenientia, 1. 445 a.
 earum nerui, ib. b. munus & vfus, ib. c. viris
 nonnullis lac in iis generatur, 1. 445 d
Mamyræ, 2. 145 c. eius succedaneum, ibid. f
Mandragora, 2. 29 b
Mandragoræ cortex, 2. 45 b
Manna, 2. 34 d **M**anna Arabica, 4. 305
Manna Græca, ibid.
Manna Arabica & Græca discrimen, ibid.
Manna vtriusq; vires, ibid.
Manna Arabica est mel acreum, 4. 306
Manna Arabica definitio, ibid.
Manna Arabica Galeno nota, 4. 305
Manna granata & mastichina, bombicina &
 brianfina, 2. 34 c. f
Manna Cydoniorum, 2. 35 a
Manna thuris, 2. 42 f
Manna delictus, facultas, pondus, 2. 110. f. &
 2. 111. a. b. c
Manardus defensus, 4. 312 **M**ania, 1. 202 a
Mania 1. 200. a quid, 1. 47 f. eius cauffa, 3. 48 a.
 notæ, ib. victus ratio & curatio, ib. c
Manus quid, 1. 380 d **M**anus summa, 1. 48 b
Manus vola cur depilis, 2. 375 a
Manus externa quid, 1. 329 c

Manus Christi recentiorum iuuenum, 2. 355
 c. cur ita dicta ib. manus Christi prolata ib.
Marasmus, vide Febbris.
Marasmus, 1. 191 e
Marcelli Florentini error, 4. 302
M. Virgili caput Diofcor. de cissampelo omi-
 fit, 4. 321
Marchasita, 2. 71 a **M**arciatum, 2. 245 d
Margarita, 2. 53 a **M**argarita integræ, 2. 130 a
Maris flos, 2. 67 c **M**arilca, 1. 208 f
Marilca, 1. 208 f **M**armorata, 1. 205 a
Martubium, p. 2. 10 d **M**orfi qui, 4. 358
Martinus Gribigus, 4. 325
Marum & eius succedanea, 2. 225 e
Marzepanes, 2. 173 c
Masticatoria, vide Apophlegmatismus.
Mastiche, 2. 163 b. 2. 41 c. 2. 145 f
Mater sanguinis, 1. 215 a. b
Mater margaritarum, 251 d
Mater dura, 5. 67 b
Materia prima perpetua, 1. 20 b
Materia unius elementū concretis mistisque
 corporibus gignendis satis esse non potest
 1. 21 f.
Mattheus Syluaticus, 4. 318
Matricis quot cellulae, 1. 432 b
Matrisyllua, 2. 246 c. f
Matthiotes caullator, 4. 346
Matthioli error, 4. 346. 2. 139 d. calumnia de-
 pulsa, 2. 140. a. 2. 26 d. 2. 133 d. e. 2. 25 c. 2. 38.
 b. 2. 127. c. errata duo, 2. 36 c. reprehensio
 notata, 2. 32. b. c. sententia improbat, 2.
 149. c. f.
Matthiolo responderetur, & eius opinio repro-
 batur, 2. 44. c
Matthioli mordacitas reftusa, 2. 225. b. refuta-
 tur, 2. 67 c. opinio improbat, 2. 137. c. error
 insignis, ib. d. lapsus, ib. f
Matthiotes hallucinatur, 1. 137. 2. 138. a.
Maxilla inferior, 1. 46 a. mouetur quiescente
 superiore, 1. 356. c. eius processus, 1. 46 a. su-
 perior cur pluribus constet ossibus, 1. 294 d
 eorum numerus, ibid. inferior maxilla cur
 homini breuissima, 1. 296. c. quot cōtineat
 ossa, ib. d. maxillæ inferioris duo utrinque
 processus, ib. c. peculiaris in earum articula-
 tione cartilago, ib. e. inferioris foramen,
 ib. f. inferioris musculi, 1. 356. c. maxillæ in-
 ferioris motus, ibid. c. maxilla musculo-
 rum nomina, 1. 356. c. musculus maxillæ man-
 forius, ib. e. temporalis, 1. 357. d. in ore deli-
 tescentis, ib. d. os aperiens, ib. f
Maximilianus imperator, 3. 208 f. 2. 172 f
Meatu bilis ad intestina, 1. 38 a. quæ pituitam
 ad offectus organa deducunt, nulli sentin
 animante secundum naturam se habente,
 1. 484. 2.
Meatu bilis excipiendæ & transmittendæ pa-
 rati, 1. 59. c. meatu bilis duodeno insertus,
 ibid. c.
Meatu repurgantia, 2. 104 c
Meatu bilis, 1. 410 a **M**econium, 2. 35. b. c.
Medendi præcepta unde discenda, 1. 274. d. c.
 non ex Arabibus, ib. operam omnem circa
 tria consistere, 1. 268. b
Medera Insula, 4. 346. **M**ediaftinum, 1. 64 d
Medicamentarius liber, p. 2. f. 1. b. 2. 123. c
Medicamenta lethalia, p. 2. fol. 2. & 3
Medicamentum familiar, 2. 118 c. cirrhum, 3.
 278 c. quid, p. 2. 2. d. eorum natura quadri-
 plex, ib. e.
Medicamenta sola quantitate lethalia, p. 2. 2.
 e. quoruplicia, ib. toto genere lethalia, p. 2.
 3. b. quomodo recte componantur, p. 2. 4 a.
 ad recte cōponenda quæ requirantur, 1. 12 a
Medicorum nostri temporis in componendis
 medicamentis stultitia & lasciuia, 1. 12 a
Medicam. ex combusti charta compositio, 3.
 277. d. cui parti capitis in eius dolore ad-
 mouenda, 3. 11 a.
Medic. purgantia, vide Purgantia.
Medicamenta destillationem capitis repri-
 mentia, 3. 71 f

Medicamenta simplicia & parata facilia, 3.3 a composita, 3.3 castringentia & reprimentia quæ, 3.34 c morbo comitiali naturæ proprietate aduersantia, 3.44 d piloscorumpentia, 3.6 b non omnia æqualiter coquenda, 2.85 a semen extinguentia, 3.157 b cur macerentur, 2.81 f cur lauentur, 2.82. lauandi modus, 2.83 c cur terantur, 2.78 c lenientia aluum, eamque purgantia, liquida & solida, 2.174 e simplicia coitum concitantia, 3.158 a entuema, 3.278 a glutinans, ibid. simplicia, peculiare corporis partes iuuantia recensentur 2. p. 112. & seqq. & cur certas partes lædant aut iuuent, 2.101 c purgantia, 3.37 d discutientia, ibid. e composita quæ, 2.123 c reprimentia quæ, 2.103 a b ex alto trahentia, ibid. c discutientia aperientia vasorum ora obstruentia, ibid. e f calefacientia, densantia, mearus repurgantia, extergentia, emollientia, subcæctia, 2.104 b c d crustas efficiantia, adurentia, putrefaciencia, cicatricem inducentia, glutinantia, carnem facientia, vrinam mouentia. menses cientia & sistencia, 2.205 a b c d e f lac, semen generantia, lenientia dolorem stupefacientia, venenis resistentia, ambustus medentia, strumas discutientia, 2.106 a b c d e f.

Medicamentum purgans detrahendis humoribus est simile, 4.354

Medicamenta plantis conferuntur, 4.354, 355

Medicamentum optimum ad sanguinem sistendum, 3.70 a

Medicamentorum compositorum vsus necessarius, 1.12 d

Medicamentorum simplicium cognitio Medico necessaria est, 1.10 e compositio necessaria, 2.123 c in mensibus suppressis sumendum tempora, 3.160 e simplicium facultates secundæ & tertiæ, 2.102 f compositorum duo primaria genera, 2.263 c eorum species, quæ in corpus sumuntur, ibid. d c purgatio interna & externa, 2.89 d e f

Medicilatrores, 4.383

Medicum oportet esse Græcum, 4.323

Medicus naturæ minister, 4.375

Medicus naturæ motum seruet, ibid.

Medico ad quid respiciendum, 4.374

Medici scythici, 4.312

Medici ex commentario, 4.364

Medici simplicium ignari, 4.297

Medici imperiti taxantur, 3.251

Medicorum nostræ ætatis error, 1.138 b

Medicorum recentiorum error, 1.120 c

Medicorum nostri temporis error, 1.417 e f

Medicorum recentiorum error, 1.145 d, 1.146 e f

Medicorum recentium de miscendorum medicamentorum ratione scripta qualia, pa. 2.1 biuniorum & officinarum error, 2.77 a & officinarum error gladiolo tureo pro acoro vrentium, 2.26 a & pharmacopolarum error non ferendus in bistorta, 2.26 f iuniorum error in lapide Phrygio, 2.70 c, huius ætatis error communis.

Medicorum pertinacia in soncho, 2.72 c error in cantharidibus, 2.49 a error in nymphaea, 2.15 d

Medicina cur coniectrix ars dicatur, 1.7 d

Medicina cur ars, 2.6 f cur apud Ægyptios repecta esse credatur, 2.6 f est ars factiua, 2.8 e

Medicina nō geminus, sed vnus est finis, 1.8 f

Medicinam neque theoreticam, nec practicam esse, 1.9 a

Medicina omnis adeoq; remedia omnia in quatuor versantur, ad mouendum, faciendum, reducendum, foris incidentibus, 1.266 a

Medicinæ definitio, 1.6 e definitio Hippoc. 1.15 b Herophilæ definitio, 1.15 d

Medicina quæ doceat, 2.4 c

Medicina partes in vniuersum quot, 1.9 d

Medicinam cur quidam in theoreticam & practicam secant, 1.10 b

Medicinæ origo diuina, 1.1 a

Medicina Dei munus, 1.1 b

Medicus Geographicus notitiam habeat oportet, 1.92. d Astrologiam contemnere debet, 92 e

Medulla seu pulpa prunorum, 2.176 b

Medullæ spinalis necessitas, 1.303 c eam transmittentia foramina cur inæqualia, 1.304 b

Medullæ dorsalis ab ossium medulla differentia, 1.493 d eius procreandæ necessitas, ibid. c. dorsalis medulla qui murata, 1.494 a b mumia est ossibus spinæ & membranis, ibid. b membranarum vsus, ibid. c dorsalis vnica cur, ibid. d

Medullæ præparatio, 2.93 f

Megastomos ingolfadianus, 4.308

Mel bonum, 2.220 c rosatum, ibid. d rosatum cum foliis seu non colatum, ibid. e colatum, ibid. f rosatum aliud, ibid. violaceum, 2.221 a anacardium, ibid. emblicorum, ibid. b passulatum, ibid. myrtinum, ibid. c

Mel arundineum, 2.36 b optimum purum, 2.31 d anacardium, 2.220 b cannæ, 2.37 b acrium, rosinum, 2.111 a acrium, 2.34 d c myrtinum, 2.114 f cedrinum, 2.34 c Articum 2.137 a passulatum, 2.203 f

Mellis acris definitio, 4.306

Mel acreum est manna Arabica, ibid.

Mellis quantitas, 2.135 c

Melanteria, 2.57 c

Melancholia, 1.202 b

Melancholia quid, 3.49 b eius causæ tres, ibid. species tres, ibid. d notæ, ibid. e Melancholicorum variæ imaginationes, 3.49 e signa peculiaria, 3.50 b victus ratio, ibid. b

Melancholiam purgantia, 3.51 c

Melancholice hypochondriacæ curatio, 3.52 b

Melancholici excrementi vsus, 1.425 f

Melancholici humoris vsus, 1.407 c

Meliceris, 3.229 e earum curatio, 3.230 b

Meliloti flores, 2.15 a

Melilorum, 2.156 e 2.10 d

Meligeria, 2.16 f

Melegetta, 2.16 f

Meliosphyllum, 2.10 e phylli flores, 2.13 c

Membrana cavitatem thoracis intrinsecans, 1.447 e eius nomina, numerus, situs, forma, magnitudo, ibid. quo pacto inuicē distent, 1.448 a quæ earum substantiam subeant, ibid. c venæ & arteriæ, ibid. c d superficies & connexus, ibid. ortus & vsus, ibid. c

Membranas cerebri duplicatio, 1.476 e

Membrana pubis effus foramen occupans, 1.392 a crassa, 1.67 a remies, ibid. d

Membrana musculus obnata, 1.381 a

Membranz cordis, 1.65 e venæ canæ, ibid. venæ arteriales, ibid. venalis arteriæ aquinæ, ibid. f tricuspidæ, 1.464 d earum vsus, ibid. membranæ venalis arteriæ, 1.461 c venæ arterialis membranæ, 1.461 c membranulæ sigmoideæ, 1.462 d earum vsus, ibid. membranæ arteriæ magnæ, 1.462 f

Membranz duræ processus, 1.474 a eius interior superficies qualis, ibid. b cum tenui connexus, 1.474 d foramina, ibid. d eius vsus, ibid. c Membranz caluariam succingentis creatio & vsus, 1.475 a Membrana tenuis cerebri vnica, 1.475 c eius situs, ibid. vsus, nomen, ibid. d constructionis ratio, 1.475 e exterior superficies, ibid. c

Membranz duræ sinus, 1.67 b carnosa, 1.352 a orificiorum cordis, 1.461 a causæ venæ, ibid. d duræ situs, nomina, 1.471 a numerus, ibid. b forma, ibid. b eius sinus, ibid. c sinus primi & secundi congressus, 1.472 b eius ad caluariam nexus, 1.473 c

Membranas mucosarum vsus, 1.378 a

Membrum demorsum supra vulnus deligandum, 3.256 d

Membræ demorsi amputatio, 3.257 c d

Membræ demorsa quomodo curanda, 3.256 e & f 327 a b c

Memithe non est papauer cornutum, 4.347

Memithe est Glaucium, ibid. 2.34 a

Memoria quid, 1.80 b

Memoriæ abolitæ causæ, 3.33 e notæ, ibid. cæratio, 3.34 a

Menegeta, 2.16 f Menodorus, 1.15 c

Menses cientia & sistencia quæ, 2.105

Mensium profluuii vitias, 1.159 e naturaliter quando retineantur, ibid. e præter naturam quibus detineantur, 1.160 a

Mensium suppressorum signa, 3.160 b ob calidiorum temperaturam suppressorum curatio, 3.160 e f ob viciosos succos suppressorum curatio, 3.161 a b suppressorum curatio, 3.159 e quibus naturaliter menses supprimantur, 1.159 e quibus præter naturam detineantur, ibid. f suppressio ob pinguedinem & gracilitatem mulierum curatio, 3.162 a curatio earum, quæ propter vici vitium non purgantur, ibid. b

Mensibus suppressis quando medicamenta assumenda, 3.160 d

Menses euocantia, 3.161 e

Menstrua vide Menses,

Mentagra, 3.219 e vide Impetigo,

Mentagra Plinii, 1.212 b

Mentula, vide penis.

Meon, 2.29 b Mercurialis, 2.112

Mercurius, 2.59 d sublimatus & præcipitatus 2.59 e f

Mergi ventriculus, 2.145 c

Meroiles, 2.70 c Mefarzon, 4.413

Mesenterium, 1.402 c eius nomina, ibid. situs, substantia, ibid. d forma, ibid. d tria mesenteria, ibid. d medium, dextrum, sinistrum, ibid. e eius substantia, curatio & vsus, 1.403 a eius adeps, ibid. b

Mesenterium non est intestinum, 4.422

Mesenterium cur ita dictum, 4.423. 1.59 b

Mespila condita, 2.202 b

Melus temeritas, 2.118 c opinio improbara, 2.117 c

Mesue error de aloe, 4.300 & 301. nescit dosin Euphorbiæ, 4.310. nescit dosin pōdus podii, ibid. nescit dosin scammoniæ, 4.309. nescit dosin Epithymi, ibid. nescit dosin Rhabarbari, ibid. d. nescit maius centaureum, 4.310 nescit minus centaureum, ibid.

Mesereon est Chamelæa, 4.326. non est lactaria, ibid.

Miclera Nicolai Myrepsi, 2.144 b

Milium Solis, 2.18 a Mille folium, 2.13 a

Minium natium, 2.58 e. secundarium, 2.58 e 2.60 c. natium & factitium, ibid.

Minorario quid, 4.379. non est præmittenda sectioni venæ, 4.379

Misericordia quid, 1.80 c

Misy, 2.57. d non est vitriolum Romanum, 1.57 d e

Miuæ, 2.278 e. cydoniorum, 2.207 a

Miuæ cydoniorum simplex vitata, 2.207 b. composita seu aromatica, 2.207 c

Mixa, 2.187 c

Mæror sapen numero mortem intulit, 2.165 b

Mæstitia, 1.16, a

Mola, 1.49 a 2.210 d. quid, 3.166 d. cur ita dicta, ibid. c causæ, signa, ibid. curatio, 3.61 a

Mollitio, 2.90 d. Moly quid, 4.318. Bescanum, ibid. Homericum, ibid.

Momia, 2.224 c 2.141 c

Monachi commentatores filii Mesue, 2.169 d

Mondini de Anatomie scriptum, 1.277. c. Carpi in eum commentarii, ibid.

Montuus delirar, 4.376. auctoritatis numero pugnat, 4.377.

Montui cauiatio, 4.349. ridendum somniū, 4.333. error de lepra, 4.401

Montuus male morbum Gallicum lichenas vocat, 4.404. male citat Aristotelem, 4.357 non intelligit plethorum, 4.320

Montui in euacuatione error, 4.380. refutatio, 4.299 & 305

Montuus ignarus Dialecticæ, 4.307 & 338

Montui de coniuncta causæ error, 4.367. de sicurt error, 4.319.

Morbus est contrarietas, 1. 268 a. affectus 1. 167 b. comitialis 1. 201 d. facies, magnus, Hercules, caducus, lunaticus, puerilis, infantilis 1. 201. Gallicus a mandragora diuersus 1. 212 c. Gallicus quid 3. 234 c. eius causa ib. c. recentis curatio ib. d. victus ratio ib. c. venæ sectio ib. f. purgatio 3. 235 a. carapotia, cucurbitulæ, balneum siccum ib. b. potio mirifice conducent pusillam eruptionem ib. c. inuenerat quomodo curandus ib. c. morbi compositi 1. 181 e. magni aliter quæ exiguam tractandi 4. 377. sunt res permanentes 4. 365. 366. sunt e numero permanentium & constantium 1. 169 d. in conformatione, figura, cavitare, asperitate & leuitate, numero, magnitudine & compositione 1. 181 e. breues, peracuti qui 1. 184 f. exquisitæ vel simpliciter ib. non exquisitæ vel non simpliciter 1. 185 a. acuti simpliciter, non simpliciter ib. ex mutatione ib. longi, communes, parui ib. b. patii, vulgares, pestilentes, maligni, benigni ibid. c. magnus, vehemens, validus, gravis, exquisitus, legitimi ib. d. nothi, spurii, non exquisiti, in habitu, simplices ib. d. e. compositi ib. f. c. complicati, confusi, ordinatus, inordinatus, errans, stabilis, recurrentes 1. 186 a. recidua facientes, primarii, secundarii, perse, ex accidente, salutares, lethales, ib. b. cur in vere eecidant 1. 24 d. morbi causa vide causa. exitus ex quib. c. gnoscatur 1. 226 a. species vnde cognoscatur 1. 226 b. morbus nū iudicabitur, an minus vnde cognoscatur, 1. 226 f. morbi principium, augmentum, vigor, declinatio, Vide Tēpus, vigor, Declinatio. requisita duo 1. 174 a. tria genera 1. 268 c. tempus, vide tempus. Indicium, vide indicium. morbi quid indicent 1. 269 d. e. genera vtrum plura in similibus partibus præter interperiem 1. 178 d. morborum causa medico perscrutanda 1. 172 c. d. morbus quid 1. 172 c. morborum propriorum, instrumentariorum partium genera quatuor 1. 181 b. omnium curatio triplex 1. 265 c. genera tria 1. 174 b. morbum presigati quomodo consideranda 1. 269 b. c.

Mordacitatem obundantia 3. 112 a

Morofitas quid 1. 80 e

morphea 1. 222 d

morsu 1. 18 f

Morsus acrum humor obundantia medicamenta 3. 147 d. Morsus animantium duplices 3. 256 b. venenati, non venenati ib. signa, curatio ib. rabiosi canis probatio 3. 258 b. curatio ib. c. canis rabiosi 3. 257 f.

Morsibus magnis medicamenta congrua 3. 256 f. & 257 a

morrem quomodo pii non metuere debeant 3. 211 c

Mortis citra iudiciū notæ 1. 233 b. c. eorum, qui citra iudiciū moriuntur indicia 1. 233 c

mos morbi quid, 1. 226 b

mortis dies & hora, vt prænoscentia 1. 233 f. & 234 a

mortui merore, gaudio, pudore 1. 165 b. c. d. e. f.

morus p. 2. 172 a. 1. 101 b. c. morum 2. 21 c

mofchus 2. 53 b

morus quid 1. 78 d. actiuus, passiuus ib.

morus cordis 1. 80 b

mucaginis vel mucilaginis extractio 2. 90 b

muccago 2. 31 b

mucharum 2. 208 e

mucilago vt paranda 3. 57 a. b. quid 2. 31 b

mucus 1. 205 a. 1. 36 c

mulier gradata, si mammas obtineat repente extenuata abortit 1. 421 c. mulieres an feminem habeant 1. 440 c. mulierum frigidioris tēperaturæ notæ 3. 160 d. calidioris notæ 3. 160 d

multitudo 1. 118 c

Mumia quid 4. 352. Razis ibid. artificialis ibid. natua ibid. Rhazis, artificialis 2. 49 f.

natua 2. 50 b. duplex, natua, factitia duplex 2. 74 c

Mundini error 1. 399 c. error de meatu bilis 4. 417. error de venis per quas foris vrinam emittit 4. 423. error de venis intestini tenuis 4. 420. error de cellulis vteri 4. 425. error de lemno 4. 419

Musculosa substantia frontiscurem mouens 1. 352 d. e

Musculus quid 1. 50 b. 1. 38 c. vnde dictus ib. musculus partes tres caput, venter, finis 1. 50 b. 349 c. d. eorum differentia ibid. e. f. musculorum impressiones 1. 350 e. an carnem habeat 4. 28. Musculi muliebris vteri 1. 54 vesicæ virilis ib. vesicæ muliebris ib. recti intestini tres ib. brachium mouentes septem 1. 54 b. cubitum flectentes duo ib. d. eundem extendentes tres ibid. e. musculus vnus nervosa sua exilitate mediz volæ & internæ digitorum cuti subnatus 1. 54 c. f. radium mouentes quatuor 1. 55 a. brachiale agentes quatuor vtrinque ib. b. digitos manus mouentes viginti octo ibid. c. d. e. f. femoris decem 1. 56 a. tibiam mouentes non uem ibid. e. f. pedem mouentes non uem ib. c. f. vnus in poplite occultatus ib. c. pedis digitos mouentes octodecim 1. 57 b. scapulam mouentes octo 1. 53 b. abdominis octo ib. c. obliqui descendentes, recti, transuersi ib. d. Penis quatuor ib. d. viriliū testium duo ib. c. sedecim dorsum mouentes 1. 52 c. sub stomacho latitantes 1. 52 c. octo mouentes maxillam inferiorem 1. 51 a. proprii ossis hyoidis octo 1. 51 b. linguæ nouē 1. 51 c. laryngis 1. 51 c. laryngis communes octo 1. 51 c. caput mouentes 1. 52 a. thoracem mouentes octogeni 1. 52 b. intercostales 1. 52 d. exteriores, interiores ibid. buccarum, labiorum & nasi alarum duodecim 1. 50 f. palpebræ superiores duo 1. 50 e. musculi temporali quomodo natura prope xerit 1. 293 c. musculi oculorum septem 1. 50 c. caput mouentes 1. 362 c. primum par musculorum aut caput aut primam vertebram mouentium ib. d. & nū forma triangularis ib. d. secundum par ib. c. primi & secundum paris munus 1. 363 b. reliqua paria ib. b. c. d. e. intercostales vtrinque viginti duo 1. 370 b. c. exteriores intercostales ib. c. interiores ib. d. musculus vtrinque lateri communis seu septum transversum 1. 370 f. respirationis artifices quibus a vertebis nervos suos recipiant 1. 497 c. musculorum contusorum remedia 3. 227 a. musculorum abdominalis phlegmone 3. 131 a. curatio ib. b

musculus p. 2. 11 a

muza 2. 218 c

myacantha 4. 340. 341

myoforis 4. 331

myreplici 2. 168 c

myricæ radix 2. 30 c. Myrina 4. 331

myrmecia non est erysipelas 4. 407

myrobalanus magnus 2. 144 c. myrobalani 2. 112 a. 2. 22 b. 2. 51 f. flauo, cyrini, cepuli, chebuli, cerulei, nigri, indi, empelici vel emblici, bellirici 2. 21 b. belerici, cepulæ, emblicæ conditæ 2. 202. cepuli conditi 2. 201 c. empelici conditi ib. obstructions pariunt 2. 112 d. e. eorum forma & genera ib. flauo, nigri siue Indici, cepuli, empelici, belerici ibid. b. temperamentum ib. b. flauorum, nigrorum, cepulorum, emblicorum, belerizicorum facultas 2. 112 c. d. eorum pondus ib. e

Myrrha 2. 127 c. 2. 40 f. eius vsus parum tutus 2. 41 a. myrrha officinarum 2. 41. flacta 2. 41 a. vera caremus 4. 359

myrrhis p. 2. 11 a

myrtilli 2. 21 b. c. semina 2. 18 d

myrti baccæ 2. 21 c

myxa 2. 176 a. 2. 177 d. myxa & myxaria 2. 21 c.

N.

N Apellum interficit homines 4. 374

Naphtha 2. 72 c. 2. 241 c. 2. 244 f.

Napus syluestris 2. 132 a

Nardus indica 2. 229 c. nardi spica earem? 4. 360

narium vitia 1. 205 a

nasalia vide Errhina.

nasalia, vide Pessus

Nasturtium 2. 155 a. p. 2. 113 a. 1. 197 c. 2. 144 c. aquaticum 2. 12 b. nasturtii semen 2. 18 d

Natura 1. 268 b. p. 2. 3 d. e. quid 1. 123 d. 1. 123 e. quid 1. 13 f. eius in creando thorace industria 1. 315 d. e. consuetis gaudet 1. 272 a. in vacuandis noxiis iuuanda 1. 164 b. calida Hippocrati quæ 1. 94 f. eadem cum facultate 1. 174 c. naturalis actio Vide actio fac. vide Facultas.

nauculare 1. 49 b

Nausea quid 1. 150 c. 1. 207. 3. 101. eius causa, signa, curatio ib. d. e. f.

nehemisch 2. 167 c

nenuphar 2. 15 c

nepeta 4. 329. 2. 112 a

Nephritis 1. 209 d

nephrocatticon Nicolai Myrepsi 2. 154 b

Nerii flores 2. 146 c. succedaneum eius ib.

Nervi erus petentes 1. 73 a. dorsali medulla ori 1. 71 c. f. a vertebis ceruicis ib. f. a thoracis 1. 72 a. clunborum vertebis 1. 72 c. a sacro osse ib. f. brachii subeuntes 1. 72 abcd. visorii vitia 1. 204 c. casum vulnerati curatio 3. 263 b. per transversum casum curatio 3. 264 b. c. cōfusi 3. 265 d. confusiois causa, signa, curatio ib. f. si cum nervo cutis confusa sit ib. f. si citra cutem nervus cōfusus sit ib. f. si nervus totus confusus sit ib. e. casum vulnerati & nudati cura 3. 264 e. nervum quid veteres dixerint, 1. 284 c. iis frigida non adhibenda 3. 262 a. eorum officium 1. 470 c. cerebri 7 paria 1. 68 c. casum vulneribus accommodanda medicamenta qualia in vniuersum esse debeant 3. 263 f. dolor vehemens vt sedandus 3. 262 a. Nervus coronalis 1. 456 c. nervus cerebri dexter recurrens 1. 70 b. sinister ibid. punctum vulnerat? 3. 261. vulnerationis eius causa, signa, curatio ibid. materiam cōfluentis subtrahit ib. c. doloris sedatio ib. d. punctum dilatio ib. c. nudatus vehementem vim medicamentorum ferre non potest 3. 264 f. nervo nudato nihil frigidū adhibendum 3. 265 b. vulneratus, si phlegmone oppletur, quomodo curandus 3. 262 f. nervus vulneratus aqua calida infestissima 3. 262 a. cartilagineus 1. 392 b. nervus quid 1. 438 b. nomina ib. ortus ib. c. differentia a mollitie & duritie ib. d. naturæ in nervis digerendis scopus triplex ib. f. diff. a forma, a serie, 1. 489 a. b. nervorum a cerebro ortorū quot sint paria 1. 489 b. c. nervi visorii ib. f. nervus gustatorius 1. 490 d. nervi renerui cur facti 1. 492 c. nervorum quot paria a dorsali medulla oriuntur 1. 494 c. f. septem nervorum parium e ceruicis vertebis profiliētium series 1. 495 a. septi transversi nervorum constitutio 1. 496 d. duodecim nervorum dorsalis medullæ thoracis complexæ vertebres series 1. 497 c. nervus intercostalis 1. 498 e. f. nervi a thoracis vertebis profiliētes ib. c. nervorum in vniuersum manum series 1. 499 c. d. & pag. seq. nervorum e lumborū vertebres profiliētium series 1. 503, a sacro osse profiliētium series 1. 504 a. nervorum, femur, tibiam & pedem ad euntium distributio, 1. 504 c

Nicolaus Myrepsi a Fuchio conversus 2. 17.

Nicolai Leonici laus 4. 318. error 4. 359.

locus repositus 2. 136 c. 2. 161 d. 2. 165 c. 50.

lonitæ & Scruitoris error 2. 124 d. Myrepsici latini codices errabundi 2. 165 b. codex e. maculatus 2. 153. 2. 235. codices latini deprauati 2. 154 c. Myrepsici locus expensus 2. 159 c. f. 2. 244 a. 2. 179 b.

Obscuriora nomina cur ab initio expli-
canda. 1. 282. a
Obscuritas visus quid, 3. 16. b eius causæ, si-
gna, curatio, ib. c & d victus ratio, 3. 62 a
Obstetricis bonæ prudentia 4. 425. & 426.
Obstruentia ora vasorum, 2. 103. f
Obstructio epatis. 1. 129 f vide lecur. vt sanan-
da, 3. 187.
Obstructionum duo genera, 3. 201 f
Obtundentia mordacitatem, 3. 112 a
Obrundentia morsus, vide Morsus.
Obtundentia & contemptantia, 3. 118 a b
Obturanantia, 2. 104 b
Obulus, 2. 124 c
Ocimum, p. 2. 11. a semen 2. 18. c
Occiput, 1. 44. c
Occludentia vulnera, 3. 259 c
Occulta proprietates. 2. 107 c
Oculus visus instrumentum, 1. 485 d. eius no-
mina, situs, numerus, substantia, forma
parres & constructio, ib. d. e. color, tunica
c. vitreus humor, 1. 486. a. tunica retiformis,
ib. b. c. vena, ib. d. iris, ib. e. pupilla, ib.
vires colores, 1. 487 b tunica cilii palpe-
brarumve pilis similima ib. c. dura tunica
ib. e adhærens albæ oculi tunica, 1. 488.
Odoratus quid, 1. 76. c
Odorandi facultas, vide facultas.
Odores, 1. 30. b
Odoramenta 2. 288. eorum materia. ib. c
lesaciens, refrigerans, ib. d. e
Odorem bonum faciens & dentes dealban-
3. 75 c
Oedema, 1. 111. a generatium, ib. d. quid, 3. 2.
d. eius causæ signa, curatio, ib.
Oenanthes. 2. 29 d
Oesophagus, 4. 431. c Vide ventriculus.
Ocypus 2. 255. b
Ocypus 2. 54. a humida, ib. præparandi m-
dus, 2. 93. c
Offæ. 2. 236. c
Officinæ error in cicuta, 2. 26. b in co-
guidio. ib. d. e in satirio. 2. 151 fin Tutia, 2.
a capitalis affodillo 2. 29 b in scordio 2.
d in melilotto. p. 2. 10. c in scarlea. 2. 12 a

fecordio. ib. b.
leum fusinum, liliaceum, 2. 236. a sambuci,
sambucinum, ib. b. nardinum simplex, ib. f. se-
faninum, ib. b. eius succedaneum, ib. amygdalarum
dulcium, ib. d. amygdalarum amararum, 2. 237. a balanium, ib. tici-
nium, ib. b. e semine lini. ib. claurinum,
ib. c. iuglandibus, ib. d. nitaceū, ibid. e. leni-
scinum, ib. f. mastichinum, ib. costinum, 2. 238. a ablinthinum, ib. menthaecum, ib.
leucoinum, ib. c. e castoreo simplex, ibid. c.
compositum, ib. d. euphorbium simplex,
ib. d. Galeni, ib. c. piperibus, ib. f. capparib.
2. 240. a elipica nostrare. b. e scarmentis iun-
peris. ib. c. e scorpionib. simplex, ibid. d. e
scorpionib. compositum, ib. c. e lumbricis
terrestrib. 2. 241. a e laterib. ib. oleum phi-
lophorum, ibid. b. c. Oleum sapientiz, 2.
241. a c perfecti magisterii, benedictum,
diuinum, sanctum, 2. 241. c. Oleum tartar-
e, 2. 241. d. eius parandi modus, ib. c. f. tere-
binthinum simplex, 2. 241. f. balsami, 2. 242.
a b d sampuchinum, ib. f. & 243. a ex hy-
perico, ib. a. Oleum de onis, ib. b. eius con-
ficiendi quatuor modi, ib. c. d. Oleum irinū,
ib. d. e molchatum, 2. 244. a muscellinum,
ib. nucum molcharatum, ib. c. Ligustriū,
ib. d. populinum, ib. c. eius alia compositio,
ib. rosaceum, 2. 233. d. violaceum, 2. 234. a
nymphaezum, ib. b. myrtinum, ib. c. e myrri-
baccis. ib. c. papauerinum. ib. c. chyosciami-
num, 2. 235. a e mandragora, ib. chameme-
linum, ib. c. anethinum, ib. c. liliaceum, ib.
f. eius praestantia, 3. 190. a cydoniorum, ne-
nufaris, 2. 234. b. c. myrrillorum, c. baccis
myrri, 2. 234. c. e semine papauertis, c. florib.
papauertis. ib. f. z. 235. a
Olei amygdalarum dulcium parandi mo-
dus. 2. 237. a
Olfactus organum, 1. 68. e. 1. 75. b. r. 484. d re-
centiorum de eo opinio confutatur. ib. d
vera de eo sententia, ib. c. sententia Galeni,
1. 485. a b
Olia. 2. 21. f
Omentum, 1. 38. b. r. 395. a eius varia nomina,
16. substantia figura, ib. situs, ib. c. ortus &
conexus. r. 396. a eius venae implicantes. ib.
b. arterie glandosi corporis vstis, ibid. c. v-
mentis vsus. ib. f
Omphacium. 2. 31. e
Omphacium, 2. 206. c
Ononis p. 2. 17. a
Operculum laryngis, 2. 49. f
Ophiafis, r. 194. d
Ophiafis, 3. 1. b. eius causae, ib. curatio, ib. e vi-
ctus ratio. ib. d
Ophthalmica, p. 2. 9. b
Opiata, 2. 126. c. vide Antidotus
Opinio Auicennae, qui quintam, adeoque no-
uam pro temperamento inuenit qualita-
tem explosa, 121. a
Opisthoronox, 1. 29. 2. 23. 45. c
Opium, 2. 35. b
Opium quoddam optimum, 2. 35. b. c
"Opium, 1. 283. a
Opobalsamum, 2. 242. a
Opobalsamum, 2. 35. c
Opobalsamum, 2. 243. b. c
Opobalsamo caremus, 4. 360
Opopanax, 2. 35. c
Opus quid, r. 78. d
Orbiculus odoratus, 3. 18. c. 3. 23. a. 3. 13. b
Orchios 2. 30. c
Ordo. 2. 99. a
Ordines tres vniuersae medicinae. 1. 15. c
Organum quid 430. o
Organum auditus. r. 293. c
Organismus Iuliani archiatet, 4. 380. o
Orichalcum. 2. 56. d
Origanum aquaticum p. 2. 9. a p. 2. 11. b. flore
2. 15. e
Oris visca, 1. 205. c. fecerit. 3. 75. b signa, visu
curatio, ib. si a calida intemperie. 3. 75. c. r.

media in singulis caussis competentia. 3.
75.f
Oris tortura. 3. 38. eius curatio. 3. 38 e sectio
in vulnerib. morsus. 2. 56.e
Oriminum syluestre. 2. 12. a
Orobi semen, 2. 17. f
Orithopoeici 3. 83. b
Oryza semen, 2. 18. e
Oscitancia nostri seculi medicorum notatur.
2. 10. d. Osculum malleo simile. 1. 45. d
Os quid. 1. 285. a. eorum vsus. ib. differentia ab
vsu. ib. a magnitudine, a substantia & con-
stitutione. ib. a b. a. foraminib. ib. c. a sensu.
ib. d. a forma, appendicibus, processibus,
ib. e. f. sinuum & cauernularum ossium v-
sus. ib. b. c. ossium numerus. ib. f. cur homo
ex pluribus constet. 1. 286. b. anterius na-
rium purpuræ. 2. 130. b. naris purpuræ. 2.
257. d. cordis ceruini. 2. 50. e. thoracis. 1.
215. d. naturæ in eo creando industria. 1. 315.
e. thoracis figura & ossa. ib. f
Os coxendicis. 1. 48. e
Os pubis. 1. 48. e. pectinis. 1. 48. e
Os sacrum. 1. 312. b. vendita dictum. ib. quot
constet partib. ibid. e. canis simæque ossis
sacri descriptione. ib. e. d. transuersi processus,
ib. ascendentes. ib. Oramina nervis tran-
smittendis incisa. ibid. f. eius in nomine de-
scriptio. 1. 313. b. sinus in eius lateribus. ib.
e. foramina nervos in eo transmittentia. 1.
314. a. anterior & posterior eius pars cuius-
modi. ib. c
Ostacrum curia dictum. 1. a.
Os cordis vt inuestigandum. 1. 319. d
Ossis figura, & Anatomicorum in eo lapsus.
ibid. e
Os cordis officinarum quale. ibid. f. Eius vsus
medicus ibid.
Os nauticæ. 1. 342. b. c. eius anterior sedes.
16. c. superior, inferior. ib.
Os post brachiale. Vide Meta carpium. Meta-
carpium. 1. 337. b
Os glandinosum. 1. 343. a
Os hyoides. 1. 302. a. eius latera humiliora, su-
periora. ib. c. d. eorum numerus & vsus. ib.
d. e. præruptæ petræ. 1. 45. c. sesamoides. 2.
330. c. cordis. 1. 47. d. ethmoides. 1. 45. a. sepiæ
2. 357. d. Ossis vitiati signa. 3. 270. e. curatio. i-
bid. quid siccities ossis alte descendat. 3. 272.
b. male ferruminati curatio. 3. 289. d. hyoi-
dis musculi duplices. 1. 158. a. b. propriorum
munus, numerus. ib. b. propriorum quatu-
or patia. 358. c. d. e. non propria. 1. 354. a.
pectoris descriptio. 1. 317. c. in quadrupedib.
ib. in homine. 1. 318. b. ossa pectoris tria. ib.
& 1. 319. a. tertium interdum desideratur. ib.
ossis pectoris forma. ib. a. substantia. ib. b.
vsus. ib. c.
Ossa sacri ossis laterib. commissa. 1. 334. a. eo-
rum vsus. 1. 334. b. petrosa. 1. 44. e. humeri
vide Humerus. maxillæ superioris. 1. 45. e.
fracta reducendi modus. 3. 285. c. exstantiæ
haud frangendæ. 3. 285. c. d. fracti & sua se-
de mori notæ. 3. 285. d. e. caluarie octo. 1. 44.
e. syncipitis duo. 1. 44. c. sacro ossi connexa
in viris & mulierib. quid differunt. 1. 336. a.
capitis vid. Ossa syncipitis. sesamina. 1.
344. a. pedum, quibus nullum in manu re-
spondet. 1. 342. e. pedis sex. 1. 49. b. syncipitis
duo. 1. 287. e. dicta parentalia. ib. Os frontis
num. ib. f. occipitis os. 1. 290. b. temporum
ossa. 1. 290. f. ossis temporis processus tres. 1.
291. a. os cuneiforme. 1. 291. b. os palati. ib.
d. os basilare. ibid. e. sinus cunei formi ossi
insculptus. 1. 291. c. os Ethmoides octauū.
1. 291. f. os iugale. 1. 291. a. b. ossa præruptæ ru-
piū familia. 1. 293. d. Ossium quas maxæ ex-
dere faciunt. 3. 270. e. f. commissuræ vide
Commissuræ connexio vide Commissuræ;
captis & maxillæ inferioris foramina. 1. 299.
a. b. c. d. e. humani corporis numerus. 1. 44. d.
ab Ossib. cur exordium. 1. 44. d. Ossicula
1. 48. d. sesamina extrema quot. 1. 336. d.

- Paechius**, 1. 179. c.
padus est eridanus, in Hispania 4. 316
palmula, 2. 185. c. 2. 22. a. fuluz, 2. 185. f. capitis dolorem inducit, 2. 20. b. earum nucleis, 2. 18. c.
palpebrarum vnde dicta, 1. 345. b. cartilaginis, 1. 49. d. earum constitutio, 1. 353. b. duo palpebrarum superioris musculi, 1. 353. c. eorum usus, ib. f. vitia, 1. 203. f.
palpitatio cordis, 392. c. f. Eius causa, ib. signa, 392. a. b. Curatio calidior cordis interperici, ibid. c. Vnguentum, Epithema, sacculus, ibid. c. d. Curatio palpitationis cordis ab humore, 393. d. f.
pamphlegia, 3. 36. d. eius causa, ib. c. notae, ib. victus ratio, ib. curatio, 3. 37. b.
pancreation, 1. 101. c. m.
pancreas, 1. 58. c. 1. 403. c.
pandectarius quis 4. 318. errores seminat, eius error 4. 310. 330. & 342. ignoravit Isatim 4. 334. eius error de isatide, 4. 331.
panniculus rimosus, 1. 351. a.
pannus, 1. 213. b.
papaver, 2. 148. c. rubrum, 2. 214. c. f. semen, 2. 18. c.
papilla, 1. 444. d. constructionis ratio 1. 445. d. papule, 1. 214. b. Vide Exanthemata, paralytis, 1. 202. c.
paraphrosine, 1. 202. b.
paraplegia, 1. 201. c.
pariendi difficultas vnde proveniat, 3. 172. c. d. c. signa, ib. curatio obesse, ib. pulvis optimus ad partus difficultatem, 3. 173. d.
parietaria, 1. 44. c.
parietaria, p. 2. 11. b. p. 2. 9
paronychia, 1. 214. c.
parotis, 1. 204. f. 3. 67. 6. causa, signa, curatio, ib. c.
partus difficultas, 3. 172. c.
partes reuera similes, 2. 20. c. medicatricis medicinarum quot, 1. 10. b. e. simplicissimarum, quae similes sensus iudicio, 1. 42. d. solidarum, instrumentarum, 1. 43. d. omnes tum in suis, tum influentibus facultatibus ac spiritibus gubernari, 2. 87. a.
partes similes quae, 1. 42. c.
partes corporis principes quae, 1. 44. a. ministrantes, ib. b.
partium corporis diversitas, 1. 269. instrumentariorum diversae appellationes, 1. 43. d. instrumentaria & instrumentum differunt, 1. 43. d.
parthenium, 2. 172. d. 2. 11. b.
pars superior, 3. 243. a.
passer troglodytes, 3. 149. c.
passio comitialis inueterata, 3. 44. a.
passula, 2. 25. d.
pastinacia, 2. 18. c.
pastilli, 2. 131. c. Theriaci, scillitici, ibid. ramix 2. 150. b. sacusiani, 3. 269. a. de ros & violis, 2. 155. f. asphodelorum, 3. 280. c. pro suffitu, 3. 72. a. massiles in ophiali, 3. 2. c. diarthodom, 2. 231. c. d. ex eupatorio, 2. 224. d. ex vipera, ib. c. scillitici, 2. 215. b. hedichroi, ib. d. gallecte moschatae, ib. f. aliptae moschatae, 2. 226. a. ex rubra baro, ib. b. ex absinthio, ib. c. c. spodio, ib. d. c. spodio cum semine oxalydis, ib. c. myrrha, 2. 227. a. ex absinthio, ib. a. e. latha, ib. b. c. capparibus, ib. d. ex agarico, ib. c. colocynthide, ib. f.
pastilli alhandal, 2. 228. a.
pastilli ramich, 2. 228. b. c. ex oxyacantha, ib. c. ex halicababo, 2. 229. b. pastilli alchachengi, ib. c. c. succino, 2. 229. d. e terra sigillata, ib. f. ex portulaca, 2. 230. b. c. ex captura, ib. c. violis, 2. 231. a. c. ros, ib. b. c. bechius albus, ib. d. bechius niger, ib. e. pro lauando capite, ib. f. pectoralis, ib. c. suffumigabilis, 2. 232. a. mentes euocans, 2. 280. f. adstringens, 2. 281. a. 2. 280. c. vrendi ratio, ib. p.odus, 2. 281. b.
patella, 1. 340. c. eius situs & forma, ib. b. substantia, ib. d. usus, ib.
pathos quid speciatim, 1. 166. f. & morbus siens
idem, 1. 167. a. quid generatim, 1. 167. d.
pathema generatim acceptum duplex, ib. 167. d. c.
Pauli Aeginetae lapsus, 1. 197. c.
paulus Galeni similia 4. 323. & 324. non annumerandus antiquis 4. 394. eius error de succino 4. 324. Aegineta non est antiquus scriptor, 4. 303.
pectoris os, 1. 47. c.
pectus quid, 1. 315. d.
peluis in qua cerebri in pituita cūfuit, 1. 483. b.
pedii historia, 1. 343. c.
pedis digiti, 1. 343. fossa, 1. 340. c. eorum numerus, ibid. c. eū mouentes musculi 1. 388. c. eorum nouem, vsus 1. 389. f.
pediculatio, 1. 194. c. vide phthiriasis
peluis, 1. 68. d. inquam cerebri in pituita cūfuit 1. 483. c.
penetrans, cito, 3. 109. c.
penicillum & linamentum quid, 3. 245. c. eorum usus, ib. c.
penidia alba, 2. 228. a. hordeata, 2. 186. a. preparandorum modus, 2. 92. c.
penis venae, arteriae, 1. 435. d. nervi, vincula, ib. e. musculi, ib. f. structurae ratio 1. 434. c. f. substantia, 1. 63. c. musculi, 1. 381. c. d. eorum usus, ib.
pentaphyllum, 2. 29. d. succus non perniciosus, 4. 317. vires nesciuit Auicenna, ibid. succus medetur veneno, ibid.
pephen, 4. 310.
per saccum colare quid, 2. 247. c.
pericardion, 1. 65. b.
periclymenon, p. 2. 11. b.
pericranion, 1. 67. 1. 288. c.
perinæum, 1. 422. b.
peripneumonia, 1. 285. d.
peripneumonia, 1. 209. f.
peripneumonia, 386. tres eius causa, signa, victus, curatio, 3. 86. d. c. & f. & 3. 87. b.
peritonæum, 1. 58. a. b. 1. 573. a. 1. 394. a. eius varia nomina, ib. vnde dictum, ibid. eius substantia, ib. forma, ib. e. ipsius superficies cuiusmodi, ib. e. processus eius, ib. c. non eadem ubique crassities, ib. d. quibus partibus peritium sit, ib. c. eius usus, 1. 395. a.
persea in Aegyptum translata non interfuit, 4. 335.
persea differt a persea, ibid.
persicum, 2. 149. d. 2. 197. c. flores 2. 15. c.
personae, 2. 18. c. 2. 136. c.
perturbationes animi, 1. 164. d. earum magna vis, ib. e.
pes cornicis non tollit colicam, 4. 336. non habet vires hermodactylorum, 4. 337. non stri tempore, 4. ibid. Auicennae, 4. 336.
peffarium vide pessus
pessus, 2. 285. c. eorum differentia, ib. d. emollientes, ib. aperientes, adstringentes, ib. e. emollientes, & eliciens pessus, 2. 288. a. adstringens, ib. b. c. mentes eliciens, ib. 5. eis vrendi tempus, ib.
pessis & phlegmone quae differentia, 3. 207. d. semina, 3. 202. c. cur sanguis non mittendus, 3. 202. d. quando venae rudentur, 3. 206. a. affectis quando cibis exhibendus, 3. 209. d. somnis quibus rebus arcendus, 3. 209. c. vt sudor excitandus, ib. d. grassante fugiendum 1. 91. c.
pestilentia, 3. 199. a. Causa, ib. c.
pestilentia curatio, 3. 209. a. b. c.
pestilentialia febres cur inter putridas Galenus recenset, 3. 203. c.
parasites, 2. 172. d.
petreleon, 2. 244. f.
petroleum, 2. 241. c.
petroleum, 2. 151. b.
petroleum, 2. 72. c.
petroselinum Macedonicum, 2. 133. b.
petroselini radice officinae carent, 2. 29. d.
petroselino vero catemus 4. 301.
petroselini semen, 2. 18. c. radix, 2. 26. b.
Petri Criniti error, 4. 305.
Petrus Brissotus, 4. 376.
peucedanum, 2. 29. d.
phaecontis fabula, 4. 324.
in pharmacopoeis nil nisi studium desideratur, 2. 98. c.
pharmacopaei Dioscoridem in suis officialis repositum habent, 2. 94. a.
pharmacopoeorum negligentia in genibus floribus, 2. 15. a.
pharmacopoeorum & Arnol. de villa noua error, 2. 143. c.
pharmacopoeorum error in semine rosarum, 2. 19. a. in nigella, 2. 18. d.
pharmacopoeorum munus & officium, p. 2. 4. b.
pharmacopoeorum error in eupatorio p. 2. 9. a. in inrybo, ib. 9. d.
pharmacopoeorum error, 2. 178.
pharmacopoeorum error in pondere, 2. 142. c. 2. 125. a.
pharmaceutica quid, 1. 10. d.
pharynx non est aspera arteria, 4. 336.
phaselum vnde dictum, 4. 349.
phaselum cum phascio confunditur, ibid.
phascoli rubentes, 4. 351.
phasolus Dioscoridis, 4. 350.
philinus, 1. 15. b.
philonium Galeni 2. 148. d. datur pontice nuci quantitate, ibid.
philosophiam quam contemnat Galenus, 2. 107. d.
philosophorum inter se dissidium, 2. 108. d.
philosophi ad totius substantiae similitudinem confugere coguntur, 2. 107. d. cur a principis exoritur, 1. 20. c.
Phimos, *περίφωμος* 1. 209. f.
phlegmonum mammarum vide Mamma.
phimos vteri quid, 3. 160. c. causa, signa, curatio, ib. c. f.
phlegmone vesicae vide vesica.
phlegmone renum vide Renum.
phlegmone vteri vide Vterus.
phlegmone vt fiat, 3. 207. d.
phlegmone bifariam somitur, 3. 214. b. generarum & proprie, ib. c. causa, signa, curatio, ib. d. generatim 1. 211. a. proprie, ib. c. rhyssipalaea, ib. c.
phlegmones & pestis quae differentia, 3. 207. d.
phlyctenae, 1. 214. a. i. 203. a.
phlyctenae quid, 3. 55. c. earum color quare variatur, ib. c. causa, ibid. f. curatio 3. 56. a. Collyrium, ibid. c.
phrenes, 4. 428.
phrenes vnde dicta, ibid.
phrenitis, 1. 195. a.
phrenitis quid, 3. 26. c. eius species tres, ibid. Causa, 3. 27. b. notae, ib.
phthiriasis quid, 3. 7. a. Eius causa, 3. 7. a. notae, ibid. curatio, ib. localia, 3. 7. b.
phylloides, 1. 213. b.
phu, 2. 29. c.
phu, 2. 129. d.
phu non est Valeriana, 4. 359.
phyllitis, p. 2. 11. c.
plurimii facultas, 3. 222. a.
phyma, 1. 213. a.
physiologia, 1. 16. b.
pica, 1. 207. c.
pipere vero longē catemus, 4. 360.
piper longum concoctionem inuat, 3. 109. c.
piper trium generum, longum, candidum, nigrum, 2. 22. b. c.
piper Indianum, 2. 17. a.
pisa non abstergunt, 4. 385.
pisorum decoctum non site post purgationē exhiberi, 4. 384.
piscium vsus verno tempore parum apertus, 1. 98. c.
pissasphaltus, 2. 50. a.
pissasphaltum, 2. 224. c.
pissasphaltus, 2. 73. f.

Pituitæ eruptiones, vide Exanthemata.
Pituitæ non naturalis quatuor species, 1, 39. b
Pituitæ reponendæ nullus a natura in corpo-
re destinatus locus, 1, 36. d. Eius usus, 1, 37. f
Pituitæ eruptiones, 1, 214. b
Pituitosi faciem facile ferunt, 3, 178. b
Pityl. smus, 1, 10. b
Pityulæ radix non est Turbit Mesues, 4
Piz Græca, 2, 42. b, proprie, 2, 42. b, sicca quæ,
2, 4. b

Picis vis, 4, 33 Plaga vide Vulnus,
Planta, 1, 49. c, quinque ossibus constat, 1, 343.
d, eius ossium intervalla, 1, 343. c, ad digitos
articulatio, ibid. e

Plantago, p. 2, 11. c,
Platearii error detectus, 2, 141. d
Platearii expositio qualis, 1, 2. a, ridicula in
interpretatio, 2, 179. b

Platyisma, 3, 274. c
Plenitudo, 1, 118. c, simpliciter, 1, 119. a, pleni-
tudo cum adiectione, ibid. eius 4 species,
sanguinea, biliosa, pituitosa, melancholica
1, 119. a, b, ad vasa, 1, 119. c, ad virtutem, ibid.
pura impura, 1, 119. d, ad vasa, 4, 369 ad vi-
res, ibid. non est repletio, ibid.

Plenitudinis species, 4, 369 notæ, 3, 160. d
Plenitudines vt distinguendæ, 1, 122. b, c
Plenitudinis cur venæ sectio competat, 1, 121. f
Plenitudinis qualitas, 1, 122. b in viraque pie-
ritudine celeriter vacuandam, 1, 123. c d

Pleonexia quid, 4, 368 Papilla, 1, 486. f
Pleris argonticæ cur ita dicta, 3, 165 a, argon-
uon Nicolai Myrepsi, 2, 104. c

Plethora, 3, 74 b, 1, 118 c, quid, 4, 368 & 369
Plethoræ mala definitio, 4, 11. d

Pleuritis quid, 3, 84 c. Eius causæ, ibid. signa,
ibid. Viçus, curatio, fomenta calida, venæ
sectio, clyster, 3, 85 a b c d e f. emplastrum, 3
86 e Vnguentum, 3, 86 d

Pleuritis, 1, 447 d
Pleuritici non danda lenticulæ ex aceto, 4,
392. 393

Pleuritis pestilentialis quid, 4, 378
Pleuritici vt sputum facile exferant, 4, 392
Pleuritici non lentes exhibendæ, 4, 392 a 393
cur lentes non dandæ, 4, 393

Pleuritici occisi a medico historia, ibid.
Plexus choroideus, 1, 68 d reticularis, ibid.
Plexus choroideus, 1, 466 b

Plexus in pñtribus cerebri ventriculi consti-
tutio, 1, 473 c reticularis Galeai quis, 1, 473 c

Plinius in cognitione simplicium non con-
temnendus, cum iudicio ramen legendus,
1, 112

Plinii locus enucleatus, 2, 43 c error in cinna-
bari, 2, 58 c lapsus, 2, 73 f error in hydrargy-
ro, 2, 59 c lapsus, 2, 138 c erratum, 2, 39 b er-
ror de tripolio, 4, 309. 310

Plinius medicus, 4, 335
Plinii locus restitutus, 4, 435 locus explicatur,
4, 435 error, 4, 320. 340

Plumbago, 2, 65 a eius genera, 2, 65 a natua,
factia, 2, 65 a

Plumbum trium est generum, 2, 65 b candi-
dum, cinereum, nigrum, ibid.

Plumbi lotio, 2, 91 d
Pluvialis aqua, 2, 274 d
Podagra, 1, 210 c

Podagra & arthritis, 3, 175 f causæ, 3, 176 a si-
gna, ib. c podagra sanguinei defluxus, ib. c
biliosi, ibid. d pituitosi, ibid. e melancholici
humoris influentis, ib. c sanguinei humo-
ris curatio, ib. f cur pauci hodie ab ea libe-
rentur, 3, 177 c d biliosi fluxus curatio, 3,
177 f pituitosi curatio, 3, 178 b topiorum
curatio, 3, 178 f an podagricis balneum cõ-
ducatur, 3, 179 a b quomodo se quis ab catu-
etur ibid. b c

Podalirius & Machaon, 1, 2 b
Pocouia, 2, 29 d
Pocouia semen, 2, 18 c
Polia, 2, 69 a

Polum, 2, 133 b 2, 179 b 2, 11 c

Politiani error, 4, 311

Pollen thuris, 4, 305

Pollen quid, 3, 244 c

Pollio Remulus, 3, 198 c

Pollucis & Cæli erratum, 1, 306 c

Polyæmia, 1, 118 c ab euzæmia distat, 1, 118 c f

Polyæmia quid, 4, 370

Polygonum, 2, 11 c

Polygonatum, 2, 29 e

Polypodium tempestivum, 2, 185 d 2, 29 d e

Polydodii pòdus nesciuit Mesues, 4, 312 facul-

tas, pondus, 2, 114 b c Eius malitiam infre-

nantia, ibid.

Polytrichum, 2, 73 b 2, 213 a 2, 212 b

Poma ambra vide Fila,

Polytrichum, 2, 246 c

Poma condita, 2, 202 b

Pompholyx, 2, 57 a 2, 65 c factitia triplex, 2, 65

c vera quæ, 2, 52 c in margine, 2, 237 c

Pompholygistorio, 2, 91 c

Poudera Arabum, 2, 125 c

Ponderum cognitio Medico necessaria, 2,

124 a notæ, 2, 126 a

Poples, 1, 421 c

Pophis musculi, 1, 388 a b

Populus, 2, 11 c

Populus ignota Avicennæ, 4, 322 323

Populi albæ vires, 4, 323

Populus nigra non tertio ordine calida, 4, 323

Porigo quid, 3, 6 b eius causæ, notæ, victus,

curatio, localia, 3, 6 c & d

Portæ uenæ vide venæ portæ,

Portonarium quid, 4, 414

Portulaca, 2, 11 d

Positus laborantis partis quid indicet, 1, 272 c

Potatio repetita nocet, 3, 20 d

Potentillæ decoctio, 2, 12. f

Potandi mos Galeni tempore, 4, 377

Potio vulneraria, 3, 247 a

Potiones sanguinem concretum discuten-

tes, 3, 35 c

Porus, 1, 100 a

Præfius, 2, 162 f eius succedaneum, ibid.

Præfium, 2, 132 d

Præfium viride, 2, 159 c

Præfium, 2, 11 d

Præzagoras, 1, 15 d

Præcepta generalia in victus ratione obser-

uanda 3, 20 c

Præcepta de tuenda & restituenda valetudi-

ne ex Galeno petenda, 1, 276 c

Præceptum diligenter obseruandum, 3, 89 c

Præcipitatio quid, 1, 80 c

Præcordia, 1, 52 c

Præcordiæ tymon, 4, 428

Præparatio materiæ medicæ, 2, 77 f. Eius mo-

di quor, 2, 78 a

præparatio solius crassi humoris, 1, 142 c

Præpositus pro præp. & dixerunt Græcæ lia-

guæ imperiti, 1, 11 c

præputium, 1, 63 c 1, 435 c

priapismus, 1, 209 f, 1, 155 c eius causæ, ibid. si-

gna, curatio, 3, 156 a b

priapismo laborantes in latus decumbere de-

bent, 3, 156 d

priene regio, 4, 311

principes trium sectarum in medicina qui

existunt, 1, 15 b c

principia quæ, 1, 20 b

principium morbi, vide tempus,

processus vermiformes cerebelli, 1, 477 b co-

rum forma, numerus, nomina, usus, 1, 482

c eorum tendines seu ligamenta, ibid.

processus ossium temporis, 1, 44 f transuersi,

1, 46 c alii similes, 1, 45 a 1, 78 c eorum usus,

ibid. transuersi, 1, 304 f ossis temporis tres,

1, 291 a alii similes, 1, 291 c femoris, 1, 48 f

processum transuersorum vertebrarum cer-

uicis natura, 1, 307 c ascendens & de-

scendens & processum naturæ, ibid.

processum transuersorum thoracis ductus,

1, 310 c d

processum numerus, 1, 308 b

procreatrix vide Facultas,

prophasis proprie quid, 1, 168 e

propolis, 2, 33 d

propolis, 2, 33 a

proportio quatuor humorum in sanguine

1, 32 c

propositum quid, 1, 265 a

proidentia vteri vide Vterus,

pruna quid, 4, 405 generatio, 4, 406 est ignis

Ptericus, 4, 405 1, 211 d sylvestris condita, 2,

102 b Damascena, 2, 12 c refrigerata, 2, 186

d multorum generum, 2, 22 c

prunellæ flores, 1, 15 c

prunulus & pruneculus, 2, 22 d

prunus sylvestris, 2, 22 d

prurigo, 1, 194 c

pruritus quid, 3, 221 b causæ, signa, curatio,

ibid.

pseudocinamomum pro casia vendi, 4, 304

plora, 1, 212 a quid, 4, 401

plythium, 2, 11 d

plymythion, 2, 58 a

psidion, 2, 45 b

pterygion quid, 3, 55 b eius causæ, ibid. b notæ,

victus curatio, ibid. collyria, 3, 55

pubertas & adolescentia temperata, 1, 26 a

pubis os, 1, 334 b ossis historia, 1, 336 a os cur

maximo foramine perurium, 1, 336 b c

pudendum virile Vide penis,

pudendum muliebre, 1, 432 f

pudendorum exulceratorum curatio præ-

sensibilissima, 3, 55 c

pudor quid, 1, 80 c sæpe mortem intulit, 1,

165 c f

pueri an iuvenes calidiores sint, 1, 16 b, non

purgandi, 4, 383

pueris quando lenienda alius, 1, 139 c

pulmo, 1, 453 a nomen, situs, numerus, 1, 453

forma, 1, 453 b lobi quor, 1, 453 c connexus,

substantia, ibid. d vasa, ibid. aspera arteria,

ibid. e venalis arteria, 1, 453 c vena arteria-

lis, ibid. f tunica, nerui, usus, 1, 454 a b c

pulmonis vulpis præparatio, 2, 93 a

pulsæ uena non conuenit febricitantibus,

4, 452

pulsario medicamentorum quid, 2, 81 c

pulpa ramarindorum, 2, 175 d

pulsus usus, 1, 446 c

pulsellus quid, 3, 244 a eorum usus, ibid. unde

sic dictus, ib. eorum materia, ib. numerus, ib.

figura, ib. rotunda, triangularis, quadrata, ib.

pulsus ruber, 3, 293 b cephalicus, 2, 223 c sarco-

ticus, ibid. f pestilentialis, 3, 213 c deterio-

rius, 2, 224 a ex vitriolo, ibid. cicatrices in-

ducens, ibid. ad eos qui ex alto ceciderunt,

ibid. b sang draconis, 3, 244 c exsiccari us,

3, 274 c vulnerum optimus, 3, 247 c & 3, 248

c confortatius calefaciens, refrigerans, 2,

280 b c pro epithemate cordis, 2, 221 f ie-

ceris, 2, 222 a aduersus calculum, ibid. ad-

uersus pestem, ibid. b lumbricos, ibid. b vel

diangria laxatiua, 2, 221 d medicamentum

turpeti, ibid. senæ præparata, ibid. e ad glā-

des validas conficiendas, ibid. f sternura-

torius, ibid. f sanguinem sistens, 2, 223 a a-

lex pharmacus, ibid. a b violarum odor,

ibid. b confortantium ex betionis modus,

2, 280 c pulueres purgatorii, ibid. c pondera

purgantium, ibid. exhibendi modus, ibid.

confortantes, 2, 279 f

pulsus quid, 1, 247 b eius causæ, ib. usus, d pul-

sus variæ diuisiones, 1, 248 a b pulsuum re-

laxatiles, ib. c genera & differentiæ, ib. c &

pag. sequenti, 249 pulsus inæqualitas vñ c

1, 251 c d e pulsus tempora, 1, 253 c pulsus m

causæ variæ, 1, 255 d & sequ. ex pulsib. quid

providendum, prævidendum, 1, 262 b,

causam contrariam habeat, 1, 271 f cor,

dis, 1, 208 b pumex, 2, 70 f

punctura, 1, 184 c nerui vide Nerui,

punicorum malorum cortex, 2, 45 a

- Purgationis peracta materia** 1.149.e. preparatio bifaria 1.142.a. in ea consideranda qualitas humorum, vires agrotantis 1.138.d. e. vacuandum non est villo tempore eradicatione 1.139.a. in ea adhibenda consideranda est morbi species 1.140.a. tempus accommodatissimum est verum 1.139.c. eam quæ præparando præcedere debeant 1.141.f. ex ætate vitandæ 1.139.d. vtrum in calida regione adhibenda 1.140.a. matutino tempore sumenda 1.140.f. vehemens periculosa 1.138.f.
- Purgatorius quando cibis porrigendus** 1.149.f.
- Purgatorius medicamentis nulli excarnificandi** 4.381.
- Purgatoria medicamenta duplicia** 2.107.3. trahunt humores sibi familiares totius substantiæ similitudine ibid.
- Puulenti vide Empyici.**
- Pus mouentia** 3.268.b.
- Pus vide Sanies.**
- Pus mouentia** 3.253.e expurgantia 3.91.c.
- Pustularum ex adustione ortarum curatio** 3.223.c.
- Purcanus confutatur** 2.112.e.2.115.a.
- Purrodo causa febris qualis** 4.367 non est causa coniuncta febris 4.415. nulla sanguinis missione vacuatur 3.204.d. ex tribus rationibus curatur ibid.e.
- Purridinis curatio** 3.287.d.e. principium vnde 3.199.d.
- Cur vnus interdum aliquis, ære nondum pestilente, hac luce inficiatur ib.e. quare nonnulli a pestilentia illi si permancant ib.f. pestilentie etiam diuinitus interdum immittuntur 3.200.a.b. quo tempore pestilentia potissimum grauat ibid.e. peste efficitur aliquem affectum quæ signa seu notæ demonstrent ib.d. Bubones pestilentialia exorti quid portendant ibid: Pestilentie curatio 3.280.f.**
- Purificacientia** 2.105.a. proprie dicta quæ, ib.b. eam prohibentia 3.218.c.
- Pylorus** 7.58.d.
- Pyloron non est intestinum** 4.414. est ianitor 4.415. non est duodenum ib.
- Pyra condita** 2.202.b.
- Pyretici radix** 2.29.c.
- Pyrites** 2.71.a. argenteus & aureus 2.71.a.b. concremat 2.59.b.
- Pyropus** 2.70.f. 2.69.d.
- Q**
- Quadrans** 2.124.c.
- Qualitas quid** 1.137.f. specificæ 1.180.e. secundæ quæ 1.179.c. tactiles 1.31.d. secundæ humorum 1.35.f. transmutationis elementorum causæ 1.19.d. non solum, sed etiam substantiæ elementorum in missis manent 1.21.a.
- Qualitatum familiaritas** 2.107.b.
- Quartana. Vide Febris.**
- Quaternarium nomina** 1.230.b.
- Quinquosolium** 2.29.d.
- Quinqueneruia** 2.246.c. 2.142.c.
- Quies** 1.108.f. & 109.a. vide Orium.
- Quotidiana vide Febris.**
- R**
- Radix vasii quid** 3.260.a. 3.243.b. pontica 4.303.
- Radices** 2.25.c. quomodo asseruandæ 2.77.c. quinque communes 2.31.a. quo tempore auellendæ 2.76.a.
- Radius** 1.326.c. & 1.482. eum agentes musculi 1.376.a.b.
- Radii ad humerum articulatio** 1.327.d. eius obliquitas 1.328.a. eius ad ulnam articulatio ib.b. Eius per ipsos longitudinem leuitas & asperitas ibid: c. inferioris partis historia ibid.e.
- Ramenta auri** 2.166.a.
- Ramex** 1.210.b. 1.395.e. 3.158.b. vide Hernia.
- Ramicis causæ** 3.158.a. signa ibid: c. Ramicis intestinorum ad inguinem curatio ib.e. Ramicis aquosi curatio 3.159.c.
- Ramigh** 2.228.d. Ramula 1.205.d.
- Rabunculus est pes corvinus** 4.337.
- Raphani cortex** 2.45.c. 2.30.a.
- Raphanitis** 2.29.a.
- Rapi semen** 2.18.
- Rarefacientia** 2.104.a.
- Rasercum duplex** 2.116.b.
- Ratiocinatio quid** 1.80.a.
- Rationales seu dogmatici** 1.14.c.
- Raucitas** 3.70.c. 1.202.c. eius curatio 3.72.b.
- Rax** 1.46.d.
- Rhagades** 1.208.c.
- Rhap** 1.183.f.
- Rha recentiorum** 2.117.a. eius genera duo, Barbaricum, Indicum, seu Cinaticum ib.e. vires ibid: c. veterum 2.116.b. purgandi facultas caruit, ibid: c.
- Rhaponticum officinarum est centaurei magi radix** 2.27.c. 2.30.b.
- Rhabarbarum** 2.30.b.
- Rhabarbari purgatorii exhibendi modus** 2.118.c. pondus ibid:.
- Rhabarbarum vulgare** 4.302. veterum ibid:.
- Rhabarbari nomina ib. veteris loc. natii ib. nostri naturalis ib. cymon ib. veteri non, ib. purgat ib. vnde an odore careat 3.302. 10 annis Monardi, ib. pondus nesciunt Mesue 4.311. Pzelo notum 4.303.**
- Rhemii Fanni locus commendatus** 2.125.c.
- Rheo barbaro cur recentiores in dysenteria vrantur** 2.118.b.
- Rheum Ponticum** 2.129.a. eius succedaneum 2.129.a. barbarum 2.169.a. ponticum 2.161.c.d. barbarum 2.137.c. 2.138.a. Indicum 2.143.c. 2.132.d. maceratum validius purgat 2.118.a.
- Rhei pontici succedaneum** 2.116.d.
- Rhois semen** 2.19.2. duo genera, rubrum, culinarium & coriarium, & Syriacum 2.146.d.
- Rhus** 2.25.b. 2.145. & 146.
- Rectitudo quid** 1.125.d. vtrum ea in sanguinis missione obseruanda 1.125.c.
- Rectum** 1.59.a. intestinum 1.402.a. nomina ib. suis ibid: b. vasa ibid: b.
- Redundantia humorum gemina** 2.118.b. eius genera & differentia 1.115.a. quantitas, qualitas ib. tabula 1.120.c.
- Reduntia** 2.214.c.
- Refrigerantia quo tempore adhibenda** 3.188.c. primo, secundo, tertio, quarto ordine 2.99.f. 2.100.a. b. quatuor ordines 2.99.a.
- Refrigeratio** 2.87.a.
- Refrigerationis terminus quis** 3.226.c.
- Regio quid indicet** 1.371.c.
- Remedia per methodum inuenta experientia confirmare debet** 3.262.b.
- Remedia localia** 3.259.d. desperatis non adhibenda 3.207.b.
- Remedia in singulis causis fortioris oris competentia** 3.75.f.
- Ren dexter, magna ex parte elatior** 1.419.d.
- Renes ambigunt** 1.125.c.
- Renes** 1.426.a. eorum numerus, situs ib.e. curatio discrepant ib.e. forma ibid: magnitudo ibid: vena, arteria ibid: sinus eorum duo 1.427.a.
- Renum munus** 1.427.c. nerui 1.428.b. roborantia 2.102.d. exsiccantia & roborantia 3.147.f. ad renes deducantia 3.145.d.
- Renum phlegmone** 3.143.b. causæ, signa ibid: curatio ibid: Renum suppurationis notæ 3.144.a. signa perfectæ suppurationis ib.b.
- Rupturæ fractæ indicia** ib.c.
- Renum cruciatam vrinam excernentium vrium** 3.142.b. eius causæ & signa ibid:.
- Renum calculus. vide calculus. vlcera** 3.146.f.
- causæ ib. signa** 3.147.a. curatio ib.c.
- Repletio** 1.215.b. ad vasa 4.308. ad virtutem ib. plethoria ibid: duplex ibid: curatio 4.370.
- Reprimentia & adstringentia** 3.104.b. quæ 2.103.b. 3.216.d.
- Reques Nicolai Myreplici** 2.148.b. curatio dicta ibid:.
- Requisita tria ad præceptum medicinæ** 1.73.
- Res non naturales** 1.89.c. & 1.90.a. 2.116.a. naturales numero septem 1.16.c. 1.15.c. præter naturam 1.166.b. 1.16.a. corpus nostrum necessario alterantes 1.16.a.
- Resiccantia** 3.118.b.
- Relina frigida & tosta** 2.41.c. tosta falso colophonina nominata 2.42.a. proprie quid 2.42.b. ex fictilibus 2.41.c. lentissima 2.41.c.
- Retolutio alterius lateris** 3.36.c. eius causæ ibid: e. notæ ibid: victus ratio ibid: curatio 3.37.b.
- Retolutio vnius saltem partis** 3.38.b.
- Respiratio naturalis** 1.371.c. actio voluntaria 1.79 non naturalis quæ 1.446.b. respirationis & pulsus 1.446.c.
- Respirationis & pulsus vsus vnus** 1.247.c.
- Retentio** 1.81.b.
- Retentrix vide Facultas.**
- Reticularis plexus** 1.68.d. Reticulum 1.38.c.
- Retiformis tunica** 1.70.f.
- Reuellendum quando sit ad loca maxime distantia** 1.128.b.
- Renulio quid** 1.126.b.
- Ribes** 2.25.a. baccæ conditæ 2.202.b.
- Ricini semen** 2.18.
- Rigor futuræ excretionis nota** 1.227.c.
- Rizæ ani. vide Anus.**
- Rizæ semen** 2.18.c.
- Roborantia medicamenta** 3.209.f.
- Rosmarini flos** 2.25.e.
- Rorator magnus cur ita dictus** 1.48.f. minor ibid:.
- Robi** 1.206.f. 2.187.c. 2.278.c. Robub. 2.205.d.
- Rob nucum vinidum** 2.205.
- Ros libani** 2.34.c. Syriacus 2.111.a.
- Rosa** 2.21.d. earum caput 2.19.a. semen 18 flores 2.15.c.
- rosæ nouella Nicolai Myreplici** 2.160.a.
- rosmarinus** 2.11.d. rubi mora 2.25.c.
- rubeta** 2.249.c. rubia latius radix 2.20.c.
- rubia tinctorum** 230.c. rubigo ferri 2.59.c.
- rubinus** 2.69.d. 2.70.f.
- rubrica** 2.72.a. sinopica, fabrilis, nauia, factitia ibid: b.
- Ruellius caput Dioscoridis de Cissampelo quod misit** 4.322.
- rumachi** 2.19.a.
- rumex** 2.11.d.
- rumpentia abscessum** 3.91.a.
- ruptura** 1.184.b.
- ru. colinarium & roriarium** 2.25.b.
- rusci** 2.155.b.
- rusci radix** 2.30.c. semen 2.19.a.
- ruta** 2.19.d. semen 2.19.a.
- S**
- Sabina** 2.11.c.
- Saccharum quid** 2.147.c.
- Sacchara & condita** 2.199.
- Saccharum sinum** 2.38.d. veterum duplex 2.36.a. coquendi ratio 2.85.d. rosaceum 2.199.c. buglossarum ibid: d. Nymphet ibid: c. cichorii ibid: c. oxalydis ibid: c. prunellæ ibid: c. echii ibid: f. rosmarini 2.200.a. laudendula ibid: a. salvia ibid: b. beronica ibid: b. prozonia, maiorana, melissophylli ibid: b. scabiosa, san. buci, mentha, fumariz, euphrasiz, ver. basculi, tilia florum, cardui benedicti, ephemeris non lethalis, persica floribus, genista floribus ibid: c. d.
- Saccharum optimum** 2.38.d. Valentium ibid: c. madere vel medere. ibid:.
- Saccharum sinum rubrum** 2.38.c. nostrum a saccharo veterum alterius generis, scilicet non differt 2.37.c. candi 2.148.d. rosaceum 3.92.b. c. tabazeth 2.166.d. antiquorum est sal Indum 4.346. antiquorum 4.344. antiquorum magna Arabum ib. Hi-rundi.

fundinet; 4. 348 decoquendi rationem pri-
 sci non ignorarunt, 2. 37 f. nostratis delectus,
 2. 38 e. eorum & conditorum vsus, 2. 275
 Seculus in dolore capitis, 3. 13. a pro catarrho
 3. 71 a eorum componendorum ratio, 2.
 299 a quibus corporis partibus, & qua for-
 ma adhibeantur, ibid. capiti apponendus
 sacculus, ib. b. cordi, ib. c. leniens & discuti-
 ens, ib.
 Sarcocolla, 2. 16 e
 Sagapenum, 2. 35. d. 2. 198. b. 2. 134 d
 Sagarum, 1. 58 c
 Sal, 2. 66 e. narius, fossilis, 2. 66 e. Sal ammo-
 niacus, 2. 66 f. Armoniacus, 2. 67 a extra ter-
 ram inuenitur, 2. 67 b. eius differentia, 2. 67
 b.
 Sal sacerdotalis, 2. 223 d. Marcellius ib.
 Sal alkali, 2. 56 d
 Sal gemma, 2. 67 b. Indus, 2. 193. c. succedaneus,
 ib. 4. 344. 346 indus, 2. 36 b
 Salis flos, 2. 67 c
 Salina, 2. 67 b
 Saliunca, 2. 128 b
 Saliuncula, 2. 165 f
 Salix, 2. 11 e. 1. 62 a
 Saluatella, 1. 417 b
 Saluia, 2. 11 e
 Salubria, insalubria, neutra quæ dicantur, 2.
 5 c
 Sambuci cortex, 2. 45 c. 2. 11 c. flos, 2. 15 f.
 Samius aster, 2. 232 f
 Sampyichum, 2. 11 e
 Sampyichi semen, 2. 18 d
 Sandarax, 2. 43 d
 Sandaraca, 2. 43 e. quid, 2. 269 a. b. triplex, 2. 67
 e. Arabum, 4. 343. Græcorum, 4. 343. vires, 4.
 ib. Polyfimon, ib.
 Sandyx, 4. 343. 2. 60 d. 2. 58 a. 2. 67 f
 Sanatio quid, 1. 267 b
 Sanicula, 2. 11 f
 Sanitas affectus, 1. 167 b
 Sanitatis magna est latitudo, 1. 177 a
 Sanguinalis, 2. 11 e
 Sanguis draconis, 4. 338 & 339 Hircinus an mi-
 sceatur terræ Lemniæ, 4. 362. Syncerus nun-
 quam reperitur in venis, 4. 370 fluxum si-
 flere, 4. 298 draconis duplex, 4. 339 reliquus
 humoribus largior, 4. 370 hircinus, 2. 51 c
 draconis, 2. 58 c. 2. 38 c. Draconis factitius,
 2. 39. c. 2. 38 c. non mittendus in cruditate
 ciborum, 3. 186 a. hircinus, 154 f. cur solus in
 venis appareat, 1. 36 c. non mittendus in fe-
 bre putrida & cruditate nata, 3. 201 c. d. & de
 quibus putridis Galenus locutus sit, ibid. d.
 carteriana febre correptis hodie sanguis
 non mittitur, 3. 202 a. non est calidus & hu-
 midus, 1. 33 f. in vulnere quantus vacuandus,
 3. 246 d. cur ex vulnere profluat, 3. 258 c.
 eius profusio ex vulnere quomodo sistitur,
 3. 258 a. purus & syncerus nusquam in venis
 reperitur, 1. 32 c. calidorem suum a corde ac-
 cipit, 1. 34 d. in venis purus geminus, 1. 32 f.
 temperatus, 1. 33 a. dulcis, 1. 35 f. venarum nō
 nihil differt a sanguine articularum, 1. 36 c.
 bonus vel malus, 1. 93 b. in plenitudine ad
 vires modice mittendus, 1. 122 b. venarum
 non est simplex, 1. 118 b. c. fluens quando co-
 hibendus, & ex quibus notis eius cohibi-
 tio cognoscenda, 1. 133. quare in ardentissi-
 mis febribus ad animi deliquium mitten-
 dus sit, 1. 130 c. in maximis phlegmonibus
 quare, ibid. in vehementissimis doloribus
 quare, ibid. c. quando in veris principio &
 quando in vltima eius parte mittendus, 1.
 124 b. verum in regione arida & feruente, 1.
 124 b. c. verum mittendus pluribus cibis &
 potionibus referis, 1. 124 c. d. verum mittē-
 dus sit non consuetis, ibid. d. verum oriosis
 an laborantibus largius, ibid. e. f. verum iis
 quibus excretionibus consuevit suppressun-
 tur, ib. f.
 Sanguinis reiectatio, 3. 87 d. causa, notæ, ibi.
 Yustus ratio, 3. 88 c. curatio, ibid. d. a capite

destillantis curatio, ibi. d. Curatio eorum,
 qui ob destillationem sanguinem expulsi-
 3. 88 e. eorum qui a pulmone sanguinem
 reiciunt, 3. 89 a. hircini præparatio, 2. 93 b.
 missio, vehemensque purgatio in tertianis
 exquisitis parum Galeno probatur, 3. 119 c.
 f. e. narius profusio causa, 3. 68 f. signa, 3.
 69 profusionem ex vulnere sistentia, aucten-
 tia, 3. 259 a. effrenantia, ib. b. occluden-
 tia, 3. 259 b. eius labra, crustam inducentia
 vala præcidentia sanguinem fundentia, ib.
 3. 260 b. c. e. narius fluens medicamen-
 tum appropriatum, 3. 70 b. ex vesica eru-
 ptiones & grumori eiusdem causa, signa,
 curatio, 3. 150 a. Sanguinem eductentia me-
 dicamenta, ib. b. grumori eius dissoluentia,
 ib. c. in vulnere missio, 3. 246 a. b. locus, 1.
 36 b. eius vsus, 1. 37 c. vsus, 2. 54 b. appellatione
 quid veniat, 1. 32 d. eius quatuor partes,
 1. 32 d. fluentis impetus labascens quid no-
 tet, 1. 134 b. non naturalis differentia, 1. 39 a.
 emissi iudicium ex substantia, sero, spuma,
 colore, pinguedine, granis, graneolentia, 1.
 134 d. e. mittendi scopi decem, 1. 122 c. ex
 narius profusio quibus maxime con-
 ferat, 1. 160 c. quando stringendū, quā-
 do minus, ibid. d. narius profusio nota, 1.
 227 f. mutatio in colore quando expectan-
 da, ib. d. b. sistendi a morfu hirudinum ra-
 tio, 1. 137 d.
 Sanguinem fluentem cohibendum esse signi-
 ficat pulsus mutatio, 1. 134 b. coctum dif-
 ferentia, 3. 255 c. f. eius missio atque vacua-
 tio quadruplex, 1. 126 b.
 Sanguisorba, 2. 129 c
 Sani similes cibos requirunt, ægri contrarios
 1. 94 c
 Sanies intra carneam quid, 3. 58 c. eius causa,
 notæ, curatio, 3. 58 c
 Santalum, 2. 46 f. Cyrtum officinarum est
 spurium, 2. 47 b
 Santeria, 2. 55 d
 Santeria, 2. 50 b
 Santonici semen, 2. 19 b
 Saphioli, 2. 164 c
 Sapa, 2. 278 e. quid, 3. 65 c. 2. 205 d. 2. 187 c
 Saporum differentia octo, 1. 39 c. instrumen-
 tum, 1. 69 c
 Sapphyrus, 2. 71 b
 Sarcophagus, 2. 69 c
 Sardoniches, 2. 164 d
 Sarcocela, 3. 158 c. 2. 242 c
 Sarcocelum, 3. 252 a
 Sarda, 2. 164 c
 Saryrium trifolium odoratum, germanicū,
 2. 30 c
 Satietas, 1. 155 b. duplex est, 1. 117 d. ad vasa, 1. 118
 a. ad virtutem, ib.
 Satyrasis, 3. 145. vide Priapismus.
 Satyri basilici radix, 2. 30 c
 Satyrium, 2. 151 f. Saturationis radix, 2. 30 c
 Satureia, 2. 11 f
 Saxifraga alba, 2. 30 c. 2. 128 c. 2. 220 b. semen, 2.
 19 b. 2.
 Scabies, 3. 220. Eius causa, signa, curatio, ibid.
 c. f.
 Scabiosa, 2. 11 f. flos, 2. 15 e
 Scammonium crudum, 2. 187 a
 Scammonium quid, 2. 119 a. eius delectus & fa-
 cultas, ib. pondus, ib. c
 Scammonium per se remere non dandum, 2.
 119 b. c. quibus non exhibenda, 2. 119 a. b. vel
 scammonium 2. 35 c. dosin ignoravit Melue
 4. 311. Græcum non differt ab Arabico,
 ibi. f. variatur d. uersitate soli, ib. nostra ad-
 uertina, ibid. natalis, ibid. vires infrenan-
 tia, 2. 119 ib. præparatio, 2. 92 a.
 Scapula, 1. 47 d
 Scapulæ nomina, situs, numerus, nexus, 1. 320
 a. ib. b.
 Scapulam mouentes muscoli, 1. 369 e. b. c. d
 Scarificatio quid, 1. 36 c
 Scariola, 2. 29 d

Scariolæ semen, 2. 18 b
 Scarlea, 2. 12 a
 Scaruncellus, 2. 248 f
 Scebræ, 4. 310
 Scelæ, 1. 282 b
 Schæm sunt pruna syluestria, 2. 22 d
 Scholasticorum Germanorum mos reprehē-
 sus, 1. 107 a
 Scolopomacharium, 3. 224 a
 Schminæ videlicet cerussa
 Scientia communiter sumta, 1. 5 d. proprie
 f. quid, 1. 6 c. 17
 Scinci, 3. 152 c
 Scinci officinarum (purii sunt), 2. 51 b
 Sciomachia, 1. 102 b
 Scyrhus quid, 3. 227 c. causa, signa, curatio,
 ib. c. d. cum emollientia, ib. c. scyrthorum
 in tendonibus & ligamenti curatio, 3. 228
 a. b.
 Scolopendrium, 2. 175 c. 2. 247 a. 2. 12 a. ibid.
 2. 169 c. 2. 227 c. p. 2. 11 c
 Scopulium, 1. 47 d
 Scopus quid, 1. 265 a
 Scopus quid differat ab indicatione, 1. 265 a
 Scordium herba, 2. 30 d
 Scordium ignotum, 4. 360
 Scordium non est allium syluestre, ibid.
 Scordii descriptio, ib.
 Scordium, 2. 132 c
 Scordium, 2. 150 f
 Scordium, 2. 12 a
 Scorioria, 2. 68 a. b
 Scorioria ferri lotio, 2. 91 d
 Scotoma, 1. 194 f
 Scriptores qui ad simplicium notitiam con-
 sequendum necessarii, 1. 19 f
 Scrophularia, 2. 30 d
 Scrolulæ, 2. 228 c
 Scrotum, 1. 431 a
 Scrotum, 2. 62 c
 Scrupulus, 2. 124 c
 Scutum stomachicum, 3. 113
 Scutum stomachicum, 3. 101 b
 Scylla, 2. 19 b
 Scylla ut afferat, 2. 225 c
 Scyllæ radix, 2. 30 c
 Scyllæ præparatio, 2. 92 d
 Scyllæ succus, 2. 203 d
 Scyllæ succus, 2. 203 d
 Sebesten, 4
 Sebesten, 2. 211 c
 Secacul, 2. 156. d. eius succedaneum, 2.
 d. e.
 Secta quid, 1. 12 f
 Sectæ tres medicorum, 1. 13 a
 Sectio ex opposito periculosa venæ, 4. 375
 Secundina tunica, 1. 72 b
 Secundina adustio, 3. 173 f
 Sedes, 1. 184 c
 Semicosta quæ, 1. 144 b
 Semen peponis, 2. 159 d
 Semen generantia & extinguentia, 2. 105 b
 Semen & fructus quid differant, 2. 16 a
 Semen genitale augentia cara potia, 2. 199
 a. b.
 Semen genitale quando marem & feminam
 gignat, 4. 247
 Seminis profusio, 3. 156 c. causa, signa, ibi.
 curatio, 3. 157 a. semen extinguentia, ib. b
 Semina cucumerum, 2. 184 d. e
 Semina quatuor calida & frigida, tam maio-
 ra quam minora quæ, 2. 19 c. f.
 Semperuium, 2. 12 b
 Sena, 2. 184 d. sena repurgata, 2. 18. d. 3. 115 a
 folliculi, 2. 25 c. facultas, pondus, genera, 2.
 114 a. b.
 Senecio, 2. 12 b
 Senecio ætas sexta, 1. 26. f. eius differentia sex
 1. 26 a. frigida & sicca, 2. 7. c. anguium, 2.
 51 c
 Sentus exteriores, visio, auditio, odoratus,
 gustus, tactus, 1. 79 c. communis, curatio di-
 stans, 1. 76 a. partis laborantis quid indicat,

- 1.272. e d 5. exteriores, 1.75. e cur percat motu adhuc integro, & contra, 1.303. a vere elementorum iudex non est, 116. f.
- Septimanarum in iudiciis morborum ratio.** 1.229. e
- Separatio medicamentorum quid,** 2. 81. e
- Septum transfuersum,** 1.51. e
- Septum transfuersum an carne careat.** 4. 428
- Septum transfuersum.** 1.370. f
- Splasiarii quashervas norunt.** 4. 297. sunt folidi. 4. 352. periculose vti cicuta pro Harmel. 4. 318. eorum error capitalis in ruta. 2. 11. c. error. 2. 276. b error in asphedelo 2. 26. d error 2. 151. a error. p. 2. 10. a
- Serapionis error.** 4. 298. vbi vitilis. ib. de cubebis. 4. 340. rudis herbarius. 4. 298. nesciuit Nil. 4. 333. laus 1. 11. b & 115. b locus expensus. 2. 63. c error. 2. 39. b locus emendatus 2. 152. f
- Serapium rosarum simplex.** 2. 205. c e succo rosaceo. ib. simplex 2. 205. c 2. 279. b eorum vltus. ib. breue, longum. ib. eorum miscendorum ratio. ib. c exhibitionis tempus. ib. e 2. 176. e eius legitima ex cichoriorum Rharbarbaro compositio. 2. 213. a acido vel dulci arantiorum succo. 2. 211. b magi stralia. 2. 220. a 2. 207. d violatum simplex. 2. 208. a serapium idem quod syrupus. ib. cur inuenta. ib. spuma a serapio cur aufertenda. ib. b violatum compositum Damasceni ib. c rosarum simplex. ib. d
- Serapium infusionis violarum.** ib. e d
- Serapiorum violatorum tria genera.** ib. d modus infusionis rosarum Nicolai improbat. ib. e infusionis foliorum morbus optimus. ib. serapium rosarum simplex purgatorium. 2. 208. f purgatorium ex floribus perfici. 2. 209. a rosarum exaridarum rosarum infusione. 2. 209. b rosarum purgatorium compositum. ib. b nymphæ simplex. ib. d. nymphæ compositum. ib. e acidum simplex 2. 210. a in lapideo vase cur coquendum. ib. b compositum. ib. b e duabus radicibus. ib. c e quinque radicibus. ib. d ex acido citrii succo. 2. 210. e ex acido limonium succo. 2. 211. a ex omphacio. ib. b e pomis. ib. c e granatis acidis. ib. d e granatis dulcibus. ib. e in tybo satiuo simplex & compositum. ib. e f 2. 212. a b ex intybo sylvestri cum rheo barbaro. 2. 212. c. e cichorio. 2. 213. c serapium Zephyrorum. ib. f iuiubinum duplex. 2. 214. a idque simplex, compositum. ib. d e papauere simplex. 2. 214. compositum. ib. e myrrinum simplex. 2. 214. f compositum. ib. 2. 215. a e succo oxalidis. 2. 215. c e succo borraginis. ib. c e succo echii. ib. d e stichade simplex. 2. 216. f compositum. 2. 217. a bizantinum sine aceto. 2. 217. b. cum aceto. ib. e eupatorio. ib. e e glycyrrhiza. ib. e ex hyssopo. ib. f e praffio. 2. 218. a b e calamintha. ib. c e mentha maior. ib. d. minus. ib. f ex absinthio simplex. 2. 219. a e fumaris. ib. b ex epithymo. ib. d ex artemisia. ib. e
- Serica** 4. 333.
- Sericum crudum.** 2. 54. c 2. 54. e
- Serpentina.** 2. 26. f
- Serpyllum.** 2. 12. b
- Seris.** 2. 12. b 2. 146. e
- Serum lactis vt parandum.** 3. 51. d
- Seseli.** 2. 19. b
- Sesimi semen.** 2. 19. c 1. 49. 2. 19. c 1. 48. b
- Seraragi.** 2. 198. b
- Sextans.** 2. 124. c
- Sextarius Romanus.** 2. 203. b Atticus. ibid. I. talicus. 2. 234. c
- Sextula.** 2. 124. c
- Siccantium medicamentorum tres gradus.** 3. 252. a 2. 100. modice simplicia. 3. 273. b composita. d
- Siccitas & humiditas per se dolorem capitis haud inferunt.** 3. 13. e causæ, signa victus. ib. d & e
- Sideritis vnde dicta.** 4. 338.
- Sideritis cur Achillæa dicta.** 4. ibid.
- Sidion.** 2. 45. b
- Sieff.** 2. 232. f
- Sigillum lemnium.** 4. 361
- Sigillum Salomonis.** 2. 29. e Lemnium 2. 134. b
- Signum quid.** 2. 115. e 1. 216. a eorum dignitas. 1. 215. f. fertilitas. 1. 216.
- Silerum montanum.** 2. 19. b
- Siliquæ.** 4. 350. 2. 25. d 2. 124. f.
- Similatum passium materia & forma quæ.** 1. 178. d e
- Similitudo totius essentia.** 2. 107. c quid, 1. 268. a
- Simplicia improprie dicta.** p. 2. 4. a simplicia proprie dicta. ibid. cognitio necessaria. p. 2. 1. e
- Sinapi album.** 2. 152. a simplicium cognitio medico necessaria. 4. 364. Sinapi & erucæ semen confunduntur in officinis. 2. 19. c 2. 19. c 2. 19. c semen 2. 128. c
- Singultus.** 1. 207. c
- Sinapismus quid.** 2. 296. c eius componendi ratio. ib. vltus. 2. 297. b
- Singultus quid.** 1. 177. a
- Sinon & Silon idem.** 2. 140. e Sinonis succedaneum. 2. 130. a Sinus radii deducendis locandisque musculis & ipsorum tendinibus. apti. 1. 329. a
- Sinos.** 1. 215. c
- Siriasis.** 1. 195. a
- Sisybrium.** 2. 12. b
- Sistra.** 2. 29. c
- Sitis causæ.** 1. 35. e
- Sitis immodica vnde proveniat.** 3. 102. e
- Situs laborantis partis quid indicet.** 1. 272. f & 273. b
- Smaragdus.** 2. 71. c 2. 164. c.
- Smilax horrensis.** 4. 359.
- Soda.** 1. 194. f
- Sol elector.** 4. 324.
- Solanum.** 2. 12. c 2. 144. a
- Soldanella.** 3. 140. c
- Soliditas partium inderens.** 1. 181. e
- Solii calidi facultas.** 3. 237. c calidum, 1. 157. d frigidum. ib. e
- Solæcismus Græcorum, recentiorum Medicorum.** 1. 189. c
- Soluere quid.** 1. 106. c
- Solutio continui, vide Continui.**
- Solutiua.** 2. 176. c
- Somnus cibum concoquit.** 4. 411.
382. f a fame admissus vacuat. 1. 162. b citè ab exercitiis factus. ibid. item factus a Balneo. ib. d
- Somnus num iuuat an lædat ægros considerandum.** 1. 113. d qualis debeat esse in somno decubitus. ib. b c somnus non semper concedendus ægrotantibus. ib. d in principio phlegmonum obest. ib. e in principio accessionum haud dormiendum. ib. f quid. 1. 109. e eius causæ. 1. 110. a b conciliantia. 1. 110. b c somni causæ vtrum cor sit. ib. d lo mni commoda quæ. ib. c. mediocris quid conferat. 1. 111. a immodici incommoda. ib. c quantisper dormiendum. 1. 111. c nocturnus somnus laudabilis. ibid. e diurnus noxius. ib. diurnus quando admittendus. 1. 112. a
- Somnia lapidea.** 1. 114. c lausæ, natæ, bibere, edere, venere vti granati, volare, currere, versari in stercore, locis odoriferis. 1. 114. c d
- Sparagi radix.** 2. 26. c a somno excitantia 3. 30. b
- Somnifera.** 2. 106. c 3. 28. f Sonchus. 2. 12. c
- Sonitus aurium quid.** 3. 65. e eius curatio 3. 66. a
- Sopor quid.** 1. 195. b eius species ibid.
- Soporifera.** 1. 110. c. Sory. 2. 57. e
- Spargula.** 2. 245. f
- Spartum a genista distat.** 2. 15. f
- Sparti flos.** 2. 15. f
- Spasmus non proportionatus ad materiam.** 3. 45. e Spasmus vide Convulsio. cynicus 3. 38. c eius curatio. ibid.
- Species mixtæ.** 2. 223. c Species Bertholdi. ib. incisæ. ib. odoratæ 2. 152. quid 2. 79. a
- Specierum nomine intelliguntur aromata.** 2. 152. c
- Specularis lapis.** 2. 69. b
- Speltæ semen.** 2. 19. d Sperma Ceti 2. 67. c
- Spes quid.** 1. 80. c Sphacelus. 1. 212. e vide Gangrena. Sphincter. 1. 54. a 1. 402. b
- Sphondylium.** 2. 245. e spicanardi. 2. 12. c Celtica. 2. 12. d spicula. 2. 29. c spicus seu nardus Celtica. 2. 142. e spina. 1. 322. c d 1. 46. d spina murina. 4. 341. spina alba. 4. 363. 2. 217. d Arabica. ib. spina scapula. 1. 320. c spinarum ductus. 1. 310. b cur ex multis vertebra constituta. 1. 303. b c cur non ex duobus aut tribus longis ossibus. 1. 30. e eius vertebra non par magnitudo. ib. f spina vertebrarum. 2. 304. c Arabica vel Egyptia Serapionis. 2. 12. d spinachia. 2. 12. d alba. ib.
- Spiritus animalis generatio.** 1. 470. c distributio. ib. f. 86. d animalis procreatur. 1. 66. d ex aere nutritur 1. 85. a eorum numerus. 1. 85. b vehicula facultatum 1. 87. b quid. 1. 84. d est substantia aerea. 1. 84. f an vnus sit influens. 1. 85. a quomodo sursum, deorsum, & in omnes partes feratur 1. 88. b naturalis, vitalis, animalis. 1. 88. d e vitalis procreatio 1. 86. c. quib. de causis pereat. 1. 86. c.
- Spiritus cohibitionis vitilis.** 1. 168. e Spiritus cohibito quid. 1. 108. e flatuosus si venenatus fuerit, quid agendum. 3. 227. b
- Splenis cur adhibeantur.** 3. 286. f 2. 295. c
- Spodos lutea.** 2. 65. e
- Spodium cannarum.** 2. 65. f 2. 144. a e 2. 65. d 2. 424. e 2. 261. e subterraneum siue fossile. 2. 65. c officinarum. 2. 66. a Arabum canna intra corpus non assumenda. 2. 66. b
- Spongia recens plus exsiccat.** 3. 225. e
- Spongia, noua spongia.** 2. 74. c qualis esse debeat. 3. 278. e & 279. a nouæ vires. 1. 137. d
- Spongites.** 2. 71. d
- Spuma argenti.** 2. 60. a sex conficitur modis. 2. 60. c. tulua, aurea, candida. ib. nitri. 2. 60. d seu flos nitri. 2. 61. a maris. 2. 67. b Spura Medico quando expendenda. 1. 245. e
- Sputi eductionem faciliem efficiantia.** 3. 86. e
- Squama æris.** 2. 55. e clauaris. 2. 55. f
- Squilla.** 2. 19. b
- Squillæ radix.** 2. 30. d
- Squinantus.** 2. 168. p. 2. 9. d. c 2. 132. c
- Stannum non est plumbum album.** 2. 132. f 2. 65. d 2. 65. b
- Staphys sylvestris.** 2. 151. a
- Staphylagria semen.** 2. 19. c
- Steatoma.** 3. 229. c
- Stercus.** 1. 82. d
- Stercus lupinum.** 3. 122. b eius in morbo colico facultas. ib.
- Stercus caninum aufert crustas tonsillarum.** 3. 79. d & 3. 81. b
- Stercora an generentur in ventriculo.** 4. 420.
- Stercoris materia vbi signatur.** 4. 421.
- Stercus generari alteratione.** 4. 421.
- Sterilitatis causæ.** 3. 170. b e viro & mulieri communis. 3. 171. a
- Sternuramenta simplicia.** 2. 287. c vsus. ibid. e
- Sternuramenta.** 3. 18. d
- Stibi.** 3. 273. c
- Stichas citrina.** 2. 12. f
- Stichadis flos.** 2. 15. f
- Stichas peregrina.** 2. 12. e Arabica. ib.
- Stichas.** 2. 133. a
- Stillicidium vrinae.** 3. 133. a Causæ, signa, curatio. ibid.
- Stimmi.** 2. 68. b
- Stomachi dolor.** 3. 103. c Eius causæ. ib. d curatio. ib. e 1. 58. d Stomachus vide Ventriculus. Roma.

- Stomachum roborantia**, 2.102.b
Stomama græcorū, 2.55.c. Plinii, 1.55.c. quid, 3.135.2
Strabismus, 1.202.d **Strabones**, 1.202.d
Strangulatio vteri vide Vterus
Strangulator Auicennæ, 4.316
Stranguria, 1.209.c
Stranguria, Vide **Stillicidium vrinæ**
Str. bili, 2.25.d
Strumæ, 1.213.2. 3.228.c. earum differentia, 3.228.c. a magnitudine ibid. a natura ibid. mites, & malignæ, ibid. ab ortu, multitudine, valorum complicatione, 3.229.a. causæ, signa, curatio, 3.229.a
Strumas discutiencia, 2.106.f
Struthia, 2.203.2
Studiorum tempus tempestiuum, 1.107.b.c
Studioli medicina Hippocratem & Galenum sibi duces proponant, 2.4.b
Stupefacientia non temere adiuuenda, 3.54.c. 3.122.3. 178.2. vñs, 3.65.c. 3.121.b. & 3.122.2
Strybium, 2.68.b
Stryx rubra, 2.151.c. liquidus officinarum, 2.41.a.b
Styrax calamites, 2.42.d. ficcus Galeni, ibid. e. liquidus officinarum, ibid. c. ficcus Arabum & officinarum, ibid. rubeus, ibid. f. liquidus, rubens, lacryma, 2.41.b. Calamitæ, 2.128.b. 2.136.b. 2.41.b
Subeth, 2.159.b
Sucaba, 2.112.c
Succedanea quæ, 2.94. libellus non est Gale- ni, 2.96.d. Græcorum quis auctor, 2.15.b
Succedaneorum catalogum per literas al- phabeti quære part, 2. pag 94. 95. 96. 97.
Succinum cur Glesum dictum, 4.3. 15. fabulam reuicit Dioscorides, 4.325. varie expositum, 4.325. quid, 4.324. 2.72.d. 2.130.b. Africanū & Asiaticum, 2.72.c
Succotrinum, caballinum, 2.114.c
Succus quid, 2.31. b. Cyrenæicus nō est mumia 4.354. semper viui, 2.150.b. corticis raphani 3.137.d. medicatus ribes simplex, 2.205.d. compositus ibid. ex vna vñs simplex, ibid. e. compositus, ibid. cicuti, 2.206.c. vñs im- maturæ, ibid. prunorum syluestrium, ibid. f. tragacanthæ, 2.189.c
Succi quomodo asseruandi, 2.77.c. quomodo seruari, 2.31.b.c. fenugræci vñs parandus, 3.58.b. solani modus vñs, 3.283.a. vñs clien- di, 2.76.c. medicati, 2.276.c. eorum vñs, ibid. f. medicati, 2.204.c
Sucrum non est mandragora, 4.327. esse sym- phycum Petrarum, 4.321. & 322. ignorat A- uicenna, ibid. non est semperuium, 4.321
Sudamina, 1.213.f
Sulforia peste vñs excitandus, 3.209.d. quid a sudore faciendum, 3.209.d. quid, 1.83.c. 1.245.b. signa, 1.228.a. euocatio, 3.149.a. im- modice coarctata, 3.95.a. pronocans, 3.191.c. omnibus febribus proprii, 1.224.b
Suffimenta, 2.291.a. vñs ibid. compositionis ratio, ibid. forma pulueris, pastilli, candela ibid. c.d.
Suffusio, 1.203.d. 3.59.b
Suffocatio vteri, vide vterus
Sugillata, 3.58.b. ecchymomatis species, 3.214.f. 215.a
Suggillatio, 2.204.d
Sulphur duplex, 2.68.b.c
Sumach, 2.25.b. 2.146.d. 2.145.c
Sumen, 4.423
Superb a commune Philosophorum vitium, 2.108.b
Supercilia, 1.283.a
Supervacua corporis per vrinam euacuat na- tura, 1.151.f
Suppositorium vide Glans, 2.281.b.c
Suppurantia, 2.104.c. 3.215.a
Suppuratio. Vide Empyema
Sura, 1.338.b. 1.49.a
Surditas, 1.204.f. ob biliosum humorem, 3.66.g. ob crassum humorem, ibid.
- Surditatis causa, signa, curatio**, 3.66.d
Suspiriosi. Vide Asthmatici
Sutura, 1.435.c. 1.284.a. 1.45.a. fictæ & mende- læ, 1.45.c. temporales, 1.45.d
Sutura Arabum quid, 4.314
Sutura vulcerum agglutinatoria modi quin- que, 3.243. nervorum curatio esse de- beant, 3.264.d. quales & quot numero sint, 1.288.d. emouenda tempus, 3.244.f
Suturarum vñs, 1.288.a
Sydenh, 1.417
Sylui opinio improbata, 2.182.a
Synagorum differentia tres, 2.189.b
Sympathia, 1.167.2. 1.165.c
συνπαθεια, 1.284.b
Symphycum maius, 2.30.c
Symptoma bifariam vñs patitur, 1.186.c. gene- ratum & speciatum, ibid. d
Symptomata nō omnia sunt affectus, 1.167.c
Symptomatum genera & differentia, 1.187.c
Symptomata iudicatoria, 1.218.a
συμπτωματα, 1.283.d
συνδρομη Empirica quid, 3.14.b
συνδρομη, 1.284.c
συνδρομη, 1.284.b.c
Syncope uomachica, 3.103.d
Syncope, 3.94.b. causæ, ibid. notæ, ibid. c. Syn- cope cordis, ibid. c. Syncope stomachica, ibid. c. Curatio eius, quæ propter immodi- cam inanitionem accidit, ibid. d. c. 1.207.c
συνκοπη, 1.284.c.d
Syrismus, 1.204.f
Syrupus de eupatorio, 4.363.1
- T**Abes, 1.206.d. 3.91.c
Tactus quid, 1.79.c. hominis index est temperamentorum, 1.28.c. quorum solus index sit, 1.28.c
Talus, 1.49.b. 1.340.c. 1.341.c. non occurrere, 1.339.c
Tamarix, 2.13.a. cortex, 2.45. radix, 2.30.c
Tamarisci, 2.47.b. 2.13.a
Tangendi facultas, vide facultas
Tangibiles differentia, 1.75.d
Tapius barbarus, 2.13.b
Taraxacon, 2.212.c. 2.9.c
Tarsus, 1.49.c. 1.342.c. tria interiora eius ossa, ibid. e. quartum & extrinsecum, ibid.
Tarsi ossi forma & quantitas varia, 1.343.b.a
Tartarus quid, 2.212.c
Taurus, 1.63.c. 1.435.f
Tecolitus, 2.70.d
Telline quid, 2.47.d. maior, minor, ibid.
Teluralium quomodo educendum, 3.240.a
Telum oblongum & angustum, vt extrahen- dum, 3.239.d
Telum rotundum, vt extrahendum, 3.240.a
Tela ex corpore, vt extrahenda, 3.239.c. corū attractio, ibi. proctusio, ibi. differentia, ibid.
Temperamentorum nouæ differentia, 1.21.c
Temperatum duplex, 1.21.c. simpliciter, 1.21.c. 1.12.d
Temperamentum hyemis, 1.25.b
Temperamentum in vna opposicione tem- peratum, in altera intemperatum, 1.22.c
simplex, 1.21.c. compositum, ibid. aeris ca- lidum & humidum pessimum est, 3.195.d. e. aeris calidum & humidum pessimum, 1.24.b. æstatis, 1.25.a. autumnii, 1.25.a. quid, 1.20.c
Temperatum laborantis partis quid indicet, 1.271.f. sanguinis quid in corpore humano efficiat, 1.37.f. æqualis ad iustitiam, 1.22.f
Temperata calefaciendo & refrigerando quæ, 2.99.c
Temperamentum, 1.44.c
Tempus quid indicet, 1.271.e
Tempora morbi ex spuro cognoscenda, 2.245.d. f
Tempus morbi quid, 1.218.a
Tendo, 1.50.c
Tendines quando musculis dentur, 1.349.d
Tenebrosus, 1.208.b. 1.58.f
Tenu intestinum, 1.400.a. b. eius nomina,
- ibid. eius sius, vasa lactes, ibid. e
Tepida ventriculi robur dissolunt, 3.182.e
membrorum vigorem exsolunt, 3.188
Tepidarium, 1.157.b
Terebinthina resina, 2.47.d. latices, abietio, colephonia, resina pinea liquida duplex, 2.45.c. coquenda modus, 2.93.c
Terendorum non vna est natura, 2.79.a
Tertiana. Vide Febris, 1.44.d. exquisita san- guinis missionem non requirit, 3.201.c
Tellera, 1.342.f
Testa concharum, 2.51.d. sepiæ, 2.51.d
Testes, 1.64.b. muliebres, 1.63.c
Testudo, 1.68.a. πτερυξ, 3.45.b
Tetanus, 1.202.a
Tetrapharmacum, 3.253. 3.268.b
Thamar Indus, 2.111.c. 2.165.c
Thamaritius, 2.143.c. Thamaritæus, 2.30.c
Thapsia Dioscoridi, 5. turbit Metues, 4.310. ex alto trahit, 4.330. ignora Auicenna, ibi. li- quor, 2.39.a. radix, 2.30.c
Themison communis, 2.115.c
Theodori Gezz laplus, 1.347.c
Theophilus medicus, 3.26.c
Theophrastus Paracelsus dicitur morophra- stus, 4.365
Theriacal communis, 2.135.d. communis, 2.135.d. distillata, 2.135.a. vñs dicta, 4.357
veræ effectus, 4.358. cur hodie nō efficit, ibid. optima cur desit, 4.362
Thiapi, 2.134.d. ignota, 4.362. 2.139.c
Thiapi, 1.214.f
Thoracis motus voluntarius, 1.369.d. ver- tebra, 1.47.a
Thus, 2.42.f. masculum & femininum, ibid.
Thoracis vitia, 1.206.b. roborantia, 2.201.f
Thus masculum, 2.148.a. substantia trifariam diuisa, 4.402.c. cortex, 2.45.c
Thuria, 2.57.a. Alexand. ibid. 2.65.d. 2.252.c
officinarum, 2.232
Thymelæa quid, 2.122.c. eius vires, 2.122.f
Thyres, 2.70.c. Thymbra, 2.157.c
Thymelæa, 2.13.a. 2.122.c. f. 2.197.f
Thymus, 1.214.c. flores, 2.14.c
Thymia, 2.42.f. Thymam, 2.13.b
Thyria, 1.194.d
Tib, 1.49.a. 2.133.8.a
Timor, 1.164.c. quid, ibid. f
Tincar, 1.58.c. 2.61.a
Tinez, 1.194.c. capris, 3.77.c
Tirus, 2.224.f
Tithymali, 2.13.a. 2.251.f. cyparissia radix, 2.30.c. vires, pondus, 2.122.d. c. Cretensis, 4.310. septem species, ibid.
Tonsillæ, 1.64.f. 1.205.d. phlegmone quid, 3.77.f. curatio, 3.78.b. suppurationis notæ, 3.78.d. Tonsillarum magna vlcera, 3.79.a. causæ, signa, curatio, 3.79.a
Torcular, 1.67.c
Tormentilla radix, 2.30.f
Tormina, 2.208.a. 3.116.c
Tortura oris, 1.206.a. Tostio quid, 2.87.c
Trachea quid, 4.434
Tragæa, 2.280.a. communis, 2.223.d
Trallianus locus emendatus, 3.11.c
Transitus ad similia, 2.13.c
Transpiratio quid, 1.162.c
Tremor, 1.202.c. quid, 3.53.b. eius causæ, ibid. notæ, ibid. Curatio, ibid. c. tremorib. con- ducencia medicamenta, ibid. d
Trichomanes, 2.13.b. Triens, 2.124.c
Tripolium differt a polio, 4.509
Tripoli descriptio, ibid. Tritina quid, 1.80.c
Triticum semen, 2.19.c
Tritura, 3.157.c. quid, 2.78.b
Tritura, 2.280.a. 1. rochisci Alindaracon, 4.359
Trochiscus vide Pastillus
Typhera Saracenicæ, 2.141.a. Persica, 2.143.d
Umores præter naturam, 1.212.a
Tunica succingens, 1.64.c. oculi, vide Oculi
tres fuerunt in vtero tegentes, 1.442.a. car- e latitudo, amplitudo, crassities, substantia, ibid. c. annata vitia, 1.201.c. f

ferum regentes, 1.64 a. b
 Tunica costas succingens, 1.446. d
 Tunica interioris ventriculi gallinarum preparatio, 2.93 b
 Turbatio excretiones & abscessus antecedens, 1.222 b
 Turbis, 2.30 e officinarum quid, 2.120 b eius vires, ibi. eas infrenantia, modus & pondus eius dandi, 2.120 d Mesues & Serapionis differunt, 4.320. nostrum non est Serapionis, ibi. nostrum non est Mesues, ibi. unde dicta, ibi. vox ignora Græcis, ibi. Manardi, ibi. Mesues non est ptyusa, ibi. Mesues est Thapsia Dioscoridis, ibi. Serapionis Tripoli, 4.309. 2.120 a eius varia nomina, ibi. variæ de eo auctorum sententiæ, ibi. a Serapionis, Mesues, Actuarii, 2.120. a. b
 Turgere quid, 4.147 e 4.308
 Turpetum, 2.184. c. 2.30 f
 Tussis quid, 3.82 e eius causæ signa, ibi. e f eius curatio ab intemperie frigida 3.82 e tussis a tenuibus & acerbis humoribus curatio, 3.82. c Iussis a crassis & viscidis humoribus curatio, ibi. e
 Tussilago, 2.13 b
 Tusum, 4.315
 Tympanites, 1.209 e 3.138 e 3.141 e. Eius signa curatio, ibi.
 Typhomania, 1.200 d 1.193. a
 Typhodes febris gemina, 1.192 c
 Typhodis contrarius ei, qui Manacus dicitur, 1.192 c V.
V Acinia, 2.25. c
 Vacuatio quid, 1.122 a vniuersalis, ibi. particularis, ibi. materiam minuens quid, 4.380 simplex quid, 1.126 e sponte facta, 1.121 c naturalis & oportuna, ibi. symptomatica, ibi. artificialis, ibi. d legitima & extraordinaria, ibi. pro plenitudine Galenus sæpe usurpat, 1.127 e. eius genere quo Medico sit utendum, 1.164 e ea num utendum Medicus consideret, 1.164. a
 Vacuationibus duabus simul, eodemq; tempore minime utendum, 1.140 b c
 Vacuandum esse ad animi deliquiū, quomodo intelligendum, 1.130 f
 Valeriana, 2.29 f
 Valefcus ridiculus, 4.389 arguitur 4.404
 Varicum orculus, 1.422. c f curatio, 3.269. e si varix crus occupauerit 3.270 b. Varicis conuulsio, 3.270 b
 Variolæ, 3.221. vide exanthemata, 1.214 b
 Varus, 1.205 b
 Vas semen a teste ad vesicæ ceruicem deferens, 1.63. a 1.433. e duplex ad medicamenta concoquenda quid, 2.84 f
 Vasa seminaria, 1.62 d in mulieribus & viris eadem, 1.440 d muliebria, 1.63. c preparantia, 1.433. a b semen a teste ad vesicæ ceruicem deferentis historia, 1.433. c semen deferentiū insertionem excipiens glandosum corpus, 1.63. b eorum præcisio, 3.260 d
 Vena quid, 1.410 b earum tunica propria ibi. adscititius venarum vsus, ibi. e numerus, ibi. humeralis seu cephalica, 3.14 e quando incidenda ibi. in peste quando tundenda, 3.206 a vtrum tundenda mollibus & raris & tenuibus, 1.123 e quo tempore anni secāda 1.123 f coronalis, 1.61 a paris aut coniugis expertis, 1.62 b caue caudicis in ingulo bipartitio, 1.61 b humeraria, ibi. b iugularis interna, externa, ibi. c humeralis distributio, ibi. c axillaris series, ibi. d vena communis, mediam, nigra, ibi. e in quibus morbis secāda, 1.122. d portæ, 1.59 d eius extra iecur distributio, 1.59 d caua, 1.60 a eius infra iecur consistentis distributio, ibi. b in quibus morbis secāda, 1.121 e coronalis, 1.414 a in plenitudine ad vires non semper secāda, 1.122 a vtrum in morbo magno mittenda, 1.122 f vtrum in imbecillitate virium, 1.123 a vtrum senibus ibi. b vtrum pueris ibi. d vtrum frigidis natura, ibi. d caua, 1.65 c arteriosa, ibi. d

quando in balneo secāda 1.133 b in quouis partium affectu quæ secāda, 1.126 e eadem quando de integro secāda, 1.128 b vena non tundenda in distantissima parte, vbi viscera phlegmone laborant, 1.128 c ab initio secāda, 1.132 a qua hora secāda, ibi. c si tundenda, qualis debeat esse partium situs 1.133 c interna quando tundenda, 1.125 a b externa & media quando ibi. ad sinistri renis membranam, 1.419. b ad dextri membranam, ibi. e axillaris, 1.415 b humeraria, 1.415 c decumbentibus tundenda, 1.133 c vmbilicis 1.408
 Venæ sectio antequam fiat, quæ preparatio necessaria sit, 132 d e purgationi præmittenda, 1.140 c cur plenitudini competat 1.121 f quando partienda & iteranda ibi. cab ea quid faciendum, 1.134 f quando alimentum offerendum, 1.135 a primæ quæ, 3.95 c mesaraicæ, 1.95. b poplitæ, & malleoli, 1.125 b minores pedum, manuumq; 1.133 d communes, 1.126 a emulgentes, 1.60 b seminales sinistra, dextra, ibi. caua supra iecur consistens distributio, 1.61 a quot hodie secantur, 1.125 a primæ quæ, 1.132. c
 Venæ portæ vsus, eiusque propaginum series, 1.411 a
 Venæ caua rami lumborum vertebri, carnibusque oblati, 1.420 b
 Venæ sectio quando præmittenda purgatio ni, 4.371. & 372
 Venæ renibus oblatæ, 1.421 e
 Venæ axillaris in brachio consistētis series, 1.416 c vniuersalis fortis vbi terminentur, 4.423 quot pertingant ad intestinum tenue, 4.420 coniugis expertem, cur a vena caua educi oportuerit, 1.414 a b coniugis expertis vsus ibi. b nominis ratio, c caua caudicis in ingulo bipartitio, 1.414. c sub pectoris osse deorsum repentes, 1.414 e humeraria sedes iuxta humerum, 1.416 a communis constitutio, 1.417 a eadem & nigra & saluarella dicta, ibi. eiusdem series, ibi. d iugularis exterior & interior, 1.418 a c caua portionis ad partes infra septum transversum locatas distributæ series, 1.419. b emulgentes 1.419 c seminales sinistra series, 1.419 c dextre ortus, ibi. f seminales mulieris series, 1.420 a caua quomodo arteriæ magnæ supra ossis sacri initium subiiciatur, 1.420 b c
 Venæ, arteriæ & nervi, 1.424. a
 Vesica, 1.428. a c eius situs, ibi. forma, ibi. d substantia, fibra ibi. e secāda eius tunica, 1.429 a Venæ & arteriæ, ibi. b nervi, ibi.
 Arteriæ fortis peculiare vesicæ commissæ, 1.429 c
 Veneris moderatæ & legitimæ commoda, 1.160 f immoderatæ incommoda, 1.161 b Veneri tempus aptum, 1.161 e hora cōcubitus Veneri, ibi. c quibus ea conueniat, quibus non, 1.161 e
 Veneri qui vti non possunt 3.157 c causæ, ibi.
 Veneris significatio varia 2.198 d
 Venter, 1.50 b inferior 1.398. e
 Ventriculus, 1.58 d
 Venæ intempestiue sectæ, nota, 1.131 e & arteriæ simplicissimæ & reuera similes non sunt, 1.421 e caua soboles in crus digestæ, 1.421 d ad renes, 1.419 c mesenterii præparat iecori cremorem, 1.83. a
 Venæ cōcoquendi ac sanguificandi facultatem obtinent, 1.83 a
 Veneris resistentia, 2.106 d
 Ventriculus, 1.403 d
 Ventriculi tunica cur conditæ, 4 totus sanguine nutritur, 1.82 a
 Ventriculus cremoris benignitate fruitur atque oblectatur, 1.37 d 182 a & iecur cur impensius quam cetera, membra adstringentia desiderant, 1.272 c
 Ventriculi imbecillitas, 3.99 f curatio 3.100 infatio, 3.110 a causæ, signa, curatio, ibi. b c phlegmone, 3.103. f causæ, indicia, ibi. cu-

ratio, 3.104 a b
 Ventriculum roborantia, 2.102 b
 Ventriculi vitia, 1.207 b
 Ventriculum sanguine vere nutrir, 1.37 e
 Verbascula, 2.13 b Verbasculum, 2.13 b
 Verbasca flos, 1.16. a
 Verbenæ, 2.13 c
 Verbenacæ, 2.13 c
 Vercinium, 2.46 a
 Verecundia quid, 1.80 d 1.165 a
 Veris temperamentum quid, 1.24 a
 Ver non calidum & humidum, 1.24 b sanguini amittendo accommodatissimū tēpus 1.24. a
 Vermes interimentia 3.270 c d
 Vermicularis, 2.248. d vermicales excrescētiæ, 1.68 b
 Vernatio, 2.51 b c
 Vernigo vnde dicta, 2.43 f
 Vernix, 2.43 d duplex. sponte nata & factitia, 2.43 d solida scriptorum, 2.43 d a vernigine distat, 2.43 e liquida, 2.43 d
 Verrucæ, 1.214 d earum euulsio, 3.223 f signa causæ, curatio, 3.223 c f. 3.223 d
 Vertebrae vnde dictæ, 1.46 d thoracis, 1.308 d e lumborum, 1.311 d earum corpora, foramina, ibi. processus, ibi. c ceruicis septem, 1.305 e
 Vertebrae spina, 1.304 e coarticulatio, 1.305. a ceruicis contextus, 1.308 a
 Vertigo, 1.194 f quid 3.24 c eius causæ ibi. f notæ, 3.25 a curatio ibi. d. a consensu ventriculi quomodo curetur, 3.26
 Vesica, 1.62 b eius phlegmone, 3.150. e curatio, 10 vlcera vesicæ cur infanabilia, aut saltem curatu difficilissima, ibi. e f vlcerum vesicæ curatio, 3.152 a calculus, 3.149 a vide calculus vesicæ, resolutæ curatio, 3.39 c ceruix 1.430 b
 Vesicula a sanguine alitur, 1.36 f 1.83 b c bilis fluxus, vide Bilis
 Veronica, 2.13 c
 Vibices, 1.215 a 3.255 a
 Victus nomen, 1.10 e ratio eadem in vsu guaiaci non omnibus conuenit, 3.236 b c
 Victus hyeme cur debeat esse copiosior, 1.98 c d qualis & quantus debeat esse vere 1.98 d e
 Victus qualis & quantus debeat esse æstare, 1.99 a qualis & quantus autumnus, 1.99 a
 Victus puerorum qualis esse debeat, 1.99 b qualis puberum & adolescentum, ibi. c qualis iuuenum, ibi. d. qualis senum, 1.99 c
 Vigilia quid, 1.114 d e eius commoda, ibi.
 Vigor morbi vnde dignoscatur, 1.221 a tribus de causis Medico cognoscendus, 1.221 c
 Vincere quando dicantur partes, 1.260 a
 Vincetoxicum, 2.170 c 2.26. c
 Vinosa, 2.218 c punica 2.218 f
 Vinum absinthites colicis conuenientissimū, 3.221 a Castoreum colicum morbum dissipat 3.12. b absynthitis in mensibus coocandis præstantia, 3.161 d e iuuenib. nō cōuenire, 1.99 d pueris inimicū, 1.99. b aruifū 3.130 vlceribus & vulnerib. optimū, 3.248 b eorum quintuplex differentia in alendo, 100 c quibus vinum cōueniat, quibus non 1.100 e vetusta, recentia quibus cōueniant, quibus non, ibi.
 Viola, 2.15 e flores, 2.16 a alba, 2.127 b
 Vipera, 2.51 d 2.224 f eius notæ ibi. Arabibus incognita 4.358 quid ibi. idē q Thirus ibi.
 Vipera in Italia copia ibi. caro ut paranda 2.225. a eius remedium elephantia, 3.233. f earum preparatio, 3.234 a
 Vir & mulier cur creati, 1.430. d
 Viride æris 2.55 d
 Vici nonnulli lacrima mammis habent, 1.445 d
 Virium maxima dignitas, 1.270. d ex indicatū agendum sit, 1.270 d e quantumque agendum ibi. e
 Virus vacuantia, 3.256 c
 Viscera quæ expurgant, 3.137 d iis quomodo prouidendum, 3.194 c

Vitis alba radix, 2.31 a

Vitidis semen, 2.19 c

Vitreus humor, 1.71 c

Vitriolum, 2.57 b. fossile, stillatitium, factitium, concretitium, Romanum, 2.57 b. c

Vlcera, 1.211 a. malefica, 1.215 c. 1.215 b. chironia, telephia, ib. b. c. theriaca, ib. vesicae, vide vesica. Vlcera reum. vide renes.

aggre cicatricem admittentia & maligna, 3.271. d. cacoethe, ib. eorum causa, signa & curatio ibid. malignorum curatio ab effe-
ctrice causa si adhuc manet, curatio 3.272. c. malignorum summus curationis scopus, 3.272 a. vlcis sordes unde nascantur, diligenter est inspiciendum, 3.272 c

Vlcus exedens quod, 3.273 f. causa, ibid. curatio, 3.274 a. exedentis qualis debeat esse ligatura, 3.274 c. ea quando solvenda, ib. c. fordidum & putre quod, 3.275 b. eius causa, signa, curatio, ibid. c. oculorum, 3.56 d. eorum signa, ibid. c. curatio, ib. vlcera quae periculosa, ibid. c. cum duritie & labrorum decoloratione curatio, 3.269 c. d. cum varicibus complicati curatio, ib. c. vermimosi curatio, 3.270 c. d. si varix crux occu-
pauerit, 3.270 b. disrupti & cum ossis corruptione complicati curatio, 3.270 c. 1. 184 b. pus manans, 3.7 c

Vlcus quid, 3.266 a. curatio, ib. a. b. & 267. 268
Vlcus profundum & cuniculosum quid, 3.276 b. curatio, ib. c. d

Vlcus renum ut purgetur, 3.147 d

Vlna, 1.48 a. eius processus duo, 1.48 a. 1.326 c. eius ad humerum articulatione, ibid. f. pro-
cessus duo, ibid. minor & maior, 1.327 a

Vlophonon, 4.330

Vmbilicus quid, 1.443 d. marinus, 2.250 a. vmbilicus Veneris, ib. vena, 1.408 b. vena & arteria, eorumque ductus, 1.442 c. d. ductum usus, 1.443 a. b

Vacia, 2.124 d

Vnguentum Marciarum magnum, 2.245 a. comitissae, 2.253 a. portabile, ib. c. rosatum d. basilicum magnum, ibid. c. basilicum minus, ibid. c. pectorale, 2.254 a. adversus sca-
biem, ibid. b. adversus lumbricos, ib. adver-
sus pediculos, ib. c. ad scabiem, ib. d. ex inu-
la seu enulatum, ibid. e. defensivum, reprimens, ibid. f. exsiccativum, 2.255 a. reficiens seu resumptivum, 2.255 a. tripharmacum, ib. b. nutritum, & de lithargyro, ibid. b. cycla-
mini maius, ibid. d. minus, ib. ex alabaistro
2.256 a. Agrippae, 2.247 c. Arcgon. ib. c. di-
altheae, 2.248 b. c. populeum, ibid. d. e. ci-
trius, 2.249 a. citrinum, ibid. nigrum, fu-
scum, 2.250 d. apostolorum, ib. c. aegyptia-
cum, de melle, ibid. f. vnguentum regis, 2.251 a. ex vermibus, 3.262 d. in ophiassi, 3.3 d. aurei, 3.261. alui soluens, ib. d. album 2.252 b. c. album commune, ib. d. album cum lychar-
gyro, ib. d. album cum sedo, ib. d. c. pompholyge
ib. c. album infrigidansve Galeni, ib. f. A-
gyptiacum, 3.278. adstringens, 3.207. quid
2.292 b. ut hodie componatur, ibid. c. ma-
labathrinum, 2.210 b. glutinans, 3.218

Vnguis, 1.203 a. c. caprarum, asinorum, 2.52 c. odoratus, 2.57 d. vngues. 1.49 c. 1.344 b. cur mediocriter duri, 1.344 c. cur rotundi, ibid. d. quare augeantur, ibid. d

Vngula caballina aquatica, 2.209 f. 2.155 c. 2.13 b.

Vnicornu, 2.52 c. f. vniones, 2.53 a

Vociferatio, 1.105 b. eius usus, ibid. c. f

Vola quid, 1.374 c. eius muscoli, ibid. d

Voluulus, 3.122 c. vide Iliaca passio.

Vomica, 2.21 d.

Vomitus, 3.109 c. 1.150 c. eius constrictio, 3.13 c. qui reprimendi, qui non, 3.102 b. c. im-
modici curatio, ibid. c. ut irritandus, 3.26 b. 3.52 c. commoda in vlcibus renum 1.50 c. 3.147 d. cum ciencia, 3.195 a. indicantia, 1.228 a. quibus utilis, 1.150 f. quoties vomend-
um, 1.151 a. quotidianus ac creber cauend-
us, 1.152 b. vomendi facilitas & difficultas, 1.151 b. ad vomendum difficiles & incepti, 1.151 b. vomitioni tempus aptissimum, 1.151 d. a vomitu eiecta medico sunt consideran-
da, ibid. c. 4.424.

Vrachus, 1.443 d

Vrachus quid, 4.424 Vrecolaris, 4.331

Vrendi medicamenta modus, 2.88 f. Phrygii lapidis vrendi modus, 2.89 a

Vrina supernacua corporis vacuat, 1.151 f

Vrinæ cruentæ ab imbecillitate renu aut va-
forum eius amplitudine curatio, 3.142 d. v-
rinæ cruentæ per circuitum euacuentis, aut
propter venæ rupturam, aut erosionem cu-
ratio, ibid. f

Vrinæ consistentia, 2.237 c. d. e.

Vrinæ contenta, 1.238.

Vrinæ variz significationes, 1.238 d

Vrinæ provocatio quando vrendum, 1.152 a. quando ab ea cavendum, ibid. b. c

Vrinam provocantia quo dici tempore dan-
da, 1.152 c

Vrinam provocantia medicamenta, 1.152 c

Vrinæ suppressio, 1.209 c.

Vrinæ stillicidium. vide Stillicidium.

Vrinæ difficultas, vide Dysuria. Vrinæ mou-
tia, 3.191 b. 2.105 d. ducentia, 3.245 d. ciencia
3.194 c. ciencia & lapide frangencia quan-
do adhibenda, 3.144 c

Vrina secundum naturam, 3.180

Vrinarii meatus initiu & explanatio, 1.427 c

Vrina quid, 1.324 c

Vrina quando colligenda, 1.235 b. quando ad
medicum deferenda, ibid. c. qualis matula
esse debeat, ib. quando medico de ea pro-
nuntiandum, ibid. c. d. non vehementer
movenda, quo in loco inspicienda, ab ambi-
ente non mutanda, ibid. d. e. optima & sa-
luberrima quæ, ibid.

Vrinæ color quibus ex causis mutetur, 1.236 c. f. & 1.237 a. c. prædictiones & vrinæ signi-
ficationes, 1.239 d

Vrina cur interdum multa, interdum pauca,
1.239 c. d. vrinæ contenta quid significant,
1.240 c. f. & 1.241 a. & quid ex concolore sit
prædicandum, 1.241 c. d. c. & quid ex con-
tentorum paucitate, multitudine, tenui-
tate, crassitie, 1.241 f. & 1.242 a. b. quid ite
ex locis contentorum, ib. b. c. e. quid ex in-
natantibus in vrina, ramentis, capillis, &
carunculis, arenulis, pure, squamulis, odo-
re ferido, telis araneis prædicandum sit,
ibid. f. & 1.243 a. b. c. quid ex corona, ibid. b.
quid ex pupillis, ibid. c. quid ex vrina con-
tentis privata, 1.244 b

Vsca, 2.99 c. Vstio quid, 2.88 b

Vstio solis, 1.195 a

Vstionum ex aqua feruente curatio, 3.223

Vrticæ semen, 2.19 c

Vterus an habeat septem cellulas, 4.426

Vterus non nisi duos habet sinus, ib.

Vterus, 1.436 a. eius in nō prægnantibus situs,
ibid. in gravidis, ib. c. situs ratio, ib. c. vteri
forma, ib. c. superficies cuiusmodi, 1.45 a.
vteri fundi sinus, ib. b. vteri cornua, 1.438 b

Vterus, 1.63 d. eius cornua, ibid. fundi vteri
sinus, ib. vteri os, ib. c. cervix, ib.

Vteri cum mamillis communis ratio, 1.445 a.
præfocatio, 1.210 d. præclusio, 1.210 d. clau-
si & aperti curatio, vide sterilitas.

Vitia venæ & arteriæ, 1.441 a. quibus parti-
bus adnascatur, quas solum tangit, 1.442 d

Vteri muscoli, ib. d. prominulæ in cervicis ore
caruncula, 1.442 a. acetabula, 1.441 a. infla-
tio, 3.168 c. causa, signa, ib. curatio, 3.168 d
vteri exulceratio, 3.169 a. causa, signa, ib.
curatio, ib. b. repurgantia medicamenta,
ib. c. ad cicatricem ducentia, ibid. c. mulie-
bris muscoli, 1.382 b. phlegmone, 3.167 d.
causa, signa, ibid. c. curatio, ib. f.

Vterum iuuantia, 1.102 c

Vua, 1.205 c. Vua uris, 2.21 a

Vua uris, 2.25 d. passio, 2.25 d. typhus semen,
2.19 c.

Vuca tunica, 1.71 a. eius vitia, 1.203 b

Vulcanus hephæstus, 4.361

Vulnera partis situs ac positus, 3.259 d

Vulnus, 1.184 b. 3.239 a. causa, signa, curatio,
ib. a. b. extrinsecus vulnibus incidentia, ut
amovenda, 3.239 c. in vulnere curatione
primum necessarium, 3.239 c. simplex, 3.242 a. ad suppurationem promovens mala-
gma, 3.253 c. f. æquale seu impletum, 3.251 d. supercrecentem carnem habent, 4.252 c. quando per effluxionem curandum, 3.248 d. sectio in parte opposita quando facien-
da, ib. d. effluxus in vulnere molliendi du-
plex ratio, 3.248 c. f. profundum & recon-
ditum, per amissionem substantiæ, in car-
ne acceptum, 3.248 c. cauum, 3.249 a. ge-
minæ in eo curando indicationes genera-
les, ibid. a. quatuor particulares, ibid. b

Vulneris puri nota, 3.254 b. contriti & cum a-
lio præter naturam affectu cōiuncti & im-
plici curatio, 3.253 b. c

Vulnere statura triplex, 3.243 d. ad glutina-
toria, 3.243 d

Vulnera venarū & arteriarum sui nequeunt,
3.259 c. d. trifaria magna 3.246 b. ex mor-
su velictu animantium tum venenatorum,
tum raborum, 3.256 b. ex virulento mor-
su in longum tempus proroganda, 3.257 d.
magna in superficie accepta, & minime
profunda, 3.247 d

in Vulneribus cur sanguis mittendus, 3.246 a.
utrum purgatio molienda, ib. c

Vuula, 1.65 a. Vuularia p. 2.9 f.

Weinstein, 2.222 c.

X.

Xylaloe, 2.45 c

Xyloaloes quod optimum, 2.45 c.

Xylocaracta, 2.25 d. Xylocerata, 2.25 d

Xylon, 3.245 b. c. Xylum, 2.21 a.

Xyli semen, 2.19 c.

Xylobalsamum verum deest, 4.304

Z.

Zex semen, 2.19 d. Zedearia, 2.31 a

Zelenythes, 2.69 b

Zingiber conditum, 2.200 c. Zizipha 15.

Zinzipha 2.25 c. Zizypha 2.25 c.

Zuccarum nostrum 4.345

Zuccarum nostrum quid ib.

Zuccari species ib.

Zuccarum Candi quid ib.

Zuccarum & planta exprimi ib.

Zuccari & Sacchari discrimen ib.

Zulapium, 2.108 b. effuso rosarum, 2.208 d.
rosatum, ib. violaceum, 2.204 c. rosaceum,
2.205 b. Zizyphorum, ibid. c. ex stillatitie
liquore violarum, 2.205 a. c. succo viola-
rum, ibid.

Zuccarum iuiubinum, 2.205 c.